



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Math-22

Math. 22.



UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK GENT



900000146514

P^o
+

g. b. 16.

80

Cont. 55 — : — :
2749



*Aristippus Philosophus Socraticus, naufragio cum ejectus ad Rhodiensium
litus animadvertisset Geometrica schemata descripta, exclamavisse ad
comites ita dicitur, Bene speremus, Hominum enim vestigia video.
Vitruv. Architect. lib. 6. Præf.*

delin. A. Burghers sculpit. Univ. Oxon.

APOLLONII PERGÆI
CONICORUM
LIBRI OCTO,
ET
SERENI ANTISSENSIS
DE SECTIONE
CYLINDRI & CONI
LIBRI DUO.



OXONIÆ,
E THEATRO SHELDONIANO, An. Dom. MDCCX.



Imprimatur.

GUIL. LANCASTER,

Vice-Can. Oxon.

Feb. 9. 1709.

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΠΕΡΓΑΙΟΥ
ΚΩΝΙΚΩΝ

ΒΙΒΛΙΑ Δ'. ΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑ

ΜΕΤΑ

ΠΑΠΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ

ΛΗΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ

ΕΥΤΟΚΙΟΥ ΑΣΚΑΛΩΝΙΤΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ

APOLLONII PERGÆI
CONICORUM

LIBRI IV. PRIORES

CUM

PAPPI ALEXANDRINI

LEMMATIS

ET

EUTOCII ASCALONITÆ

COMMENTARIIS.

Ex Codd. MSS. Græcis edidit EDMUNDUS HALLEIUS apud
Oxonienses Geometriæ Professor *Savilianus*.

Viro Præstantissimo,
JURISQUE CONSULTISSIMO,
D. JOANNI HOLT
EQUITI AURATO,
Capitali in *BANCO REGIO*
TOTIUS ANGLIÆ
JUSTITIARIO,
FIDO LEGUM CUSTODI,
RECTIQUE & ÆQUI per Iniquissima Tempora
VINDICI & ASSERTORI
CONSTANTISSIMO,
APOLLONII CONICORUM
LIBROS QUATUOR,
Nunc primum GRÆCE & LATINE
EDITOS
In Perenne Grati Animi Testimonium
D. D. C.

EDM. HALLEIUS.

P R Æ F A T I O
AD REVERENDUM VIRUM
D. GUIL. LANCASTER
S. T. P.
ACADEMIÆ OXONIENSIS
Quarto VICE-CANCELLARIUM,
Reliquosque PRELI SHELDONIANI
CURATORES.

EUCLIDE, qui Mathematicorum agmen ducit, non ita pridem à viro celeberrimo D. Dav. Gregorio, collega meo desideratissimo, in reipublicæ literariæ usum edito; idque eâ curâ eâque elegantia, ut eruditorum omnium plausum meruerit: Eidem mihiq̃ suaserunt amici artium optimarum amantissimi, ut unum aut alterum è veteribus Geometris ei comites adjungeremus. Hoc ut facere vellemus, Tu, Vir egregie, D^{nc} Vice-Cancellarie, assentiente Curatorum cœtu, auctoritate tuâ nosmet permovisti: Tu inquam, cui nihil antiquius est quam ut summo splendore gaudeat Academia nostra, bonæque literæ suam habeant & tueantur dignitatem. Cogitantibus igitur nobis quemnam Veterum potissimum eligeremus, in quo expoliendo opera nostra enitesceret, Archimedes, dum ætatem ejus & præstantiam respicimus, opem primus efflagitare visus est. Sed cum ille Elementa Conica ubique fere, ut prius cognita, assumpserit, quæ tamen non nisi ab Apollonio demonstrata habemus; atque Archimedes Græce pariter ac Latine aliquoties prodierit, dum Pergæus non nisi magna sui parte truncatus, idque versione minus fidei parumque eleganti, circumferretur: his causis adducti ad Apollonium emendandum & edendum nosmet summa cum alacritate accinximus; ea quidem lege ut Gregorius quatuor priores Conicorum libros cum Eutocii Commentariis Græce Latineque prælo pararet, atque ipse tres posteriores ex Arabico in Latinum sermonem verterem, Octavumque (quem temporis injuria desideramus) restituere conarer. Illi opus hoc aggredienti ad manus erat Apollonii Codex MS. Græcus è Bibliotheca Savilii Mathematica,

præstantissimi

P R Æ F A T I O.

præstantissimi istius Viri calamo hinc illinc non leviter emendatus; & paulo post accessit alter benigne nobiscum à Reverendo D^{no} Baynard S.T.P. communicatus: sed eadem fere utrisque communia erant vitia, utpote ex eodem Codice, ut videtur, descriptis. Ad Eutocium quidem publicandum non aliud repertum est exemplar Græcum, præter Baroccianum in Bibliotheca Bodlejana adservatum. His igitur auxiliis instructus, dum Græcis accurandis, Latinæque Versioni Commandini corrigendæ (quæ non exigui negotii res erat) strenue atque omni cura & cogitatione incumbit, icu mortis improvise, magno sane meliorum literarum damno, nobis ereptus est, opere jam sub prelo fervente, sed ad paginam duntaxat XLIV^{am} provento. Quo factum est ut absolvendi quod supererat labor in me devolveretur, novumque onus suscipere necesse habuerim.

Rei autem difficultate & magnitudine nihil deterritus, in Gregorii pariter ac mea quam nactus eram sparta ornanda processui, usus Apographo Bodlejano Codicis Arabici, ex Versione satis antiqua à Thebit ben Corah facta, sed (annis abhinc circiter ccccl.) à Nafir-Eddin recensita, (viris inter Mathematicos Orientis celeberrimis.) In consilium tamen nonnunquam adhibui etiam MS. Codicem Arabicum alium Bodlejanum, qui continet Epitomen ejusdem Versionis ab Abdolmelec Schirazita Persa ante quingentos annos confectam: qui quidem codex à Christiano Ravio ex Oriente advectus est, & ab eodem, magis quam facile existimari potest, barbare traductus. Quandoque etiam mihi adjumento fuit altera Conicorum Apollonii Epitome ab Abalphath Isphahanensi adornata, quam haud ita commode traduxit Abraham Echellenfis: commentariis tamen uberrimis illustravit eximius ille Mathematicus & Philosophus Alphonfus Borellus. Interpretatione autem mea, qua potui fide, ad umbilicum perducta, ad nos demum perlatum est exemplar illud Golianum antiquissimum, quod ab hæredibus Golii redemerat Vir maximus idemque optimus Narcissus Marsh Archiepiscopus Armachanus; quod, pro summo suo erga scientias Mathematicas amore, nobis ad operis emolumentum deesse noluit: codicem quantivis pretii per mare hyemale mediosque hostes ex Hibernia transmittens. Ex hoc optimæ notæ codice (qui septem Apollonii libros complexus est) non solum Versionem meam recensui, & à mendis nonnullis liberavi; sed & lacunas aliquot, quæ passim fere, etiam in Græcis, occurrebant, supplevi; sensumque auctoris, quoad ejus fieri potuit, primæva perspicuitate donavi. His peractis, ad librum Octavum restituendum aggressus sum; quem etiam ante ætatem Thebit deperditum fuisse comperimus: deprehendentes autem indicio Pappi, quod argumentum ejus argumento Septimi conjunctissimum fuerat, quodque problemata duodevigesima Octavi è theorematibus Septimi limites suos habuerant, tam problemata ipsa quam eorundem ordinem affecutus mihi videor. Analyses vero nostras, ut & Compositiones ipsorum problematum, quas loco Apollonianarum

P R Æ F A T I O.

rum substituiimus, si non cum illis ubique fere consentiant, ab iisdem tamen non multum esse diversas persuasum habeo. Sed hac de re aliorum esto iudicium. Porro singulis Apollonii libris Pappi Lemmata præfixa dedimus, è duobus Codd. MSS. Savilianis desumpta, quæ quidem vice Commentarii esse possunt in loca difficiliora: quem in finem eadem ipsa aliquoties ab Eutocio usurpantur. Ob argumenti autem affinitatem, Sereni libros duos de Sectione Cylindri & Coni publico donare haud gravatus sum, jam primum Græce impressos: quos è Codicibus tribus Bibliothecæ Regiæ Parisiensis sui in usum describi curaverat vir doctissimus Henricus Aldrichius S.T.P. Ædis Christi Decanus; mihiq; ut simul cum Apollonio lucem aspicerent, perhumaniter impertiit. In his omnibus evulgandis industriam haud levem & diligentiam adhibui; mecum (quod fateri non piget) summopere adnitente D. Joanne Hudsono Bibliothecæ Bodlejanæ Præfecto, manumque auxiliarem (prout in Euclide fecerat) non invito porrigente: cui, cum nostro tum communi omnium eruditorum nomine, gratias quas possumus maximas referimus. Hactenus de operibus nostro opere & studio qualicunque emendatis: de Autoribus ipsis pauca supersunt dicenda.

Apollonius Pergæ natus est (quæ celebris olim Pamphylia urbs) tempore Ptolemæi Evergetæ regis Ægypti (cujus regnum inivit anno CCXLVII. ante Christum) ut nobis autor est Heraclius sive Heraclides (nam utroque modo scribitur apud Eutocium) qui vitam Archimedis descripsit. Apud Euclidis discipulos Alexandria diu operam dedit studiis Mathematicis: & sub Philopatore (qui imperii sui anno XVII, ante Christum ccv. diem obiit supremum) maxima erat in celebritate, teste Ptolemæo Hephæstione apud Photium Cod. cxc. adeo ut hinc liceat conjicere, quod annis circiter XL. minor fuerit Archimede, quodque non longo intervallo præcesserit Geminum Rhodium, certe Hipparcho majorem. Testatur autem Geminus hunc nostrum Apollonium, propter eximium hoc Conicorum opus, inter sui ævi Mathematicos Magni Geometræ nomen adeptum esse. Quanti illum æstimarunt Veteres non solum ex Vitruvio constat, Cap. I. Lib. I. ubi etiam Archimedi, saltem ordine, præfertur; sed ex eo quod, ut inter Græcos magni nominis commentatores habuerit quamplurimos, Pappum, Hypatiam, Serenum & Eutocium, ita & inter Orientales etiam nonnullos ingenii doctrinaeque laude præcellentes; quales apud Arabes fuere Thebit ben Corah & Beni Moses; apud Persas vero Abalphath & Abdolmelec, à quibus in Epitomen redactus est; ac denique magnum illud Matheſeos Perficæ lumen Nafir-eddin, qui Conica hæc omnia recensuit, notisque illustravit, circa annum Christi MCCL. Unde mirum fortasse videbitur tanti nominis autorem, & fere per bis mille annos inter principes Geometras habitum, in hoc erudito seculo nondum Græce comparuisse. Præter Conica autem multa alia scripsit Apollonius noster, autore Pappo in Præfatione ad librum VII. Collect. Math.

quam

P R Æ F A T I O.

quam non ita pridem nos primi Græce edidimus: duos scilicet *ἑλὶ λόγῳ Σπυτομῆς* & *ἑλὶ χρεῖς Σπυτομῆς* libros, quos, nostro opere non infelicitè (uti speramus) restitutos, in lucem emisimus; dein *ἑλὶ δωδεκόμενης τομῆς* libros duos, ac totidem *περὶ ἐπαφῶν* duos quoque velut, ac pariter duos *τόπων ἐπιπέδων*. Lemmata his omnibus demonstrandis assumpta conservavit Pappi liber VII. unde etiam discimus hæc omnia fuisse τὸν ἀναλυο-
μεν, sive ad *Analysin Veterum* usurpata. Quin & aliud Apollonii opus laudatur ab Eutocio, in *Commentario in Archimedis Dimensionem Circuli*, *ἑλὶ τῶν κύκλων* dictum; quo tractatum fuit, uti videtur, de expediendo calculo *Arithmetico*, ante inventas cyphras Indicas valde intricato: ejusque specimen habetur in fragmento lib. II. Pappi, ut existimat subtilissimus Wallisius, qui anno MDCLXXXVIII. fragmentum istud edidit. Verum pro *ἑλὶ τῶν κύκλων* rectius (mea sententia) scriberetur *ἑλὶ τῶν ἀριθμῶν*: utpote cujus ope numerorum magnorum multiplices &c. cito & facillime producerentur.

De Eutocio (nam Pappum præterimus, spei pleni unum aut alterum quandoque exoriturum, qui illum ejusque opera illustrabit) nobis hoc tantum constat; quod Ascalone Palæstinæ urbe oriundus sub Justiniano floruerit, circa annum Christi DXL. Nam quæ commentatus est in Apollonium inscripsit Anthemio Tralliano; quæ vero in Archimedem præceptoris suo Isidoro Milefio *Mechanico*: illi vero, *Architecti clarissimi*, Justiniano imperante celeberrimum Sanctæ Sophiæ templum exstruxerunt, statim ab Anno Christi DXXXII. teste Procopio.

Quod vero ad Serenum attinet, de eo nihil comperimus, nisi quod Antissa Insulæ Lesbi urbe ortus fuerit; &, præter Librum unum de *Sectione Cylindri* & alterum de *Sectione Coni*, *Commentaria* scripserit in Apollonium; quodque ante Marinum (Procli discipulum) vixerit, uti constat ex Marini *Præfatione in Euclidis Data*.

Absoluta hac laboris mei & operum jam Vobis oblatorum historiola, reliquum est ut Vobis, *Preli Curatoribus*, gratias agam immortales, pro eo quo Mathesin, &, si id adjici patieminus, me quoque prosecuti estis studio; Deum O. M. obtestans atque precans, ut custodiat, servet, & protegat hunc rei literariæ statum, hæc florentissimam Academiam.

Erratis levioribus quæsumus ignoscat Lector, graviora sic corrigat.

Pag. 8. vers. 1. Eutocil lege *καμίντες*. & in versione v. 2. *Pamphylie*. p. 10. v. 37. l. *ἀρχαῖν περιμέτρην*. δι. p. 10. v. 38. l. *disposita in recta exhibere*. p. 18. v. 51. l. *ἀπὸ πλ.* p. 21. v. 35. l. *ἀπὸ πλ. 8*. p. 22. v. 22. l. *διὰ 2/3*. p. 33. v. 17. l. *ἵσται ἀπὸ 8 H πλ. A*. p. 43. v. 11. l. *2/3 μόνον*. v. 41. l. *πῶς τὰς ἀπὸ πλ. 8 ἐπὶ τῇ ἐκείνῃ, ἐπὶ 8 μόνον*. v. 45. l. *περιμέτρην*. p. 52. v. 16. l. *ἡ πλ.* p. 56. v. penult. l. *ἀπὸ πλ. 8*. p. 92. v. 42. l. *ἀπὸ πλ. 8*. p. 93. v. antepenult. l. *ἀπὸ πλ. 8*. p. 94. v. 4. l. *applicata possunt*. p. 99. v. 34. l. *ἐπὶ τῇ ἐκείνῃ*. p. 107. v. 3. l. *8 ΔΕ*. p. 144. in Schem. l. *duc rectam ΓΗ*. v. 42. l. *ἀπὸ πλ. 8*. p. 154. v. 22. l. *ἀπὸ πλ. 8*. p. 174. v. penult. l. *ἀπὸ πλ. 8*. p. 176. v. 19. l. *ἀπὸ πλ. 8*. p. 182. v. 23. l. *ἀπὸ πλ. 8*. p. 204. in Schem. 3. *duc rectam ΒΔ*.

ΠΑΠ'

ΠΑΠΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ

ΛΗΜΜΑΤΑ

ΕΙΣ ΚΩΝΙΚΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΠΕΡΓΑΙΟΥ.

PAPPI ALEXANDRINI

LEMMA

IN PRIMUM LIBRUM CONICORUM

APOLLONII PERGÆI.

ΛΗΜΜΑ α'.

Εἶς κώνος ἔστω βάσις μὲν ὁ AB κύκλος, κορυφὴ δὲ τὸ Γ σημεῖον. εἰ μὲν ἔνισοσκελὴς ἔστω ὁ κώνος, φανερόν ὅτι πᾶσαι αἱ ἀπὸ τοῦ Γ πρὸς τὸν AB κύκλον περιπίπτουσαι εὐθεῖαι, ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν· εἰ δὲ σκαληνός, δεῖν εἶναι εὐρεῖν τίς μεγίστη, καὶ τίς ἐλαχίστη.



ΗΧΘΩ δὲ ἀπὸ τοῦ Γ σημείου ὅτι τὸ τῷ AB κύκλῳ ἐπιπύοντες ἔστωι, καὶ πύπτοντες πρὸς τὸν AB κύκλον, καὶ ἔστω $\Gamma\Delta$, καὶ εἰλήθω τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ E , καὶ ἐπὶ τοῦ ΔE ἐκτελέσθω ἐφ' ἐκάτερα τὰ μέρη ὅτι τὰ A, B σημεῖα· καὶ ἐπιζεύχθωσι αἱ AG, GB . λέγω ὅτι μεγίστη μὲν ἔστιν ἡ GB , ἐλαχίστη δὲ ἡ AG πασῶν τῶν ἀπὸ τοῦ Γ πρὸς τὸν AB περιπίπτουσιν. περιτελέσθω γάρ τις καὶ ἑτέρα ἡ ΓZ , καὶ ἐπιζεύχθω ἡ ΔZ . μείζων ἄρα ἔστιν ἡ $B\Delta$ τῇ ΔZ , κοινὴ δὲ ἡ $\Gamma\Delta$, καὶ εἰσὶν αἱ πρὸς τὸ Δ γωνίαι ὀρθαί· μείζων ἄρα ἔστιν ἡ $B\Gamma$ τῇ ΓZ . κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ἡ ΓZ τῆς ΓA μείζων ἔστιν, ὥστε μεγίστη μὲν ἔστιν ἡ GB , ἐλαχίστη δὲ ἡ GA .

Ἀλλὰ δὴ πάλιν ἡ ἀπὸ τοῦ Γ ἔστωις ἀγομένη πύπτοντες ὅτι τὸ περιφέρειας τοῦ κύκλου AB , καὶ ἔστω ΓA , καὶ πάλιν ὅτι τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ E ἐπιζεύχθω ἡ $A\Delta$, καὶ ἐκτελέσθω ὅτι τὸ B , καὶ ἐπιζεύχθω ἡ $B\Gamma$. λέγω ὅτι μεγίστη μὲν ἔστιν ἡ $B\Gamma$, ἐλαχίστη δὲ ἡ AG . ὅτι μὲν ἔνισοσκελὴς ἡ ΓB τῆς ΓA φανερόν. διήχθω δὲ τις καὶ ἑτέρα ἡ ΓE , καὶ ἐπιζεύχθω ἡ $A E$. ἐπεὶ δὲ ἀμφοτέρω ἔστιν ἡ AB , μείζων ἔστι τῇ $A E$, καὶ αὐτῶς πρὸς ὀρθὰς ἡ AG , μείζων ἄρα ἔστιν ἡ $B\Gamma$ τῇ ΓE · ὁμοίως καὶ πασῶν. καὶ κατὰ τὰ αὐτὰ μείζων δειχθήσεται ἡ $B\Gamma$ τῆς ΓA · ὥστε μεγίστη μὲν ἡ $B\Gamma$, ἐλαχίστη δὲ ἡ GA τῶν ἀπὸ τοῦ Γ σημείου πρὸς τὸν AB κύκλον περιπίπτουσιν εὐθειῶν.

Τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων, πύπτοντες ἡ ἔστωις ἐκτὸς τοῦ κύκλου, καὶ ἔστω ἡ $\Gamma\Delta$, καὶ ὅτι τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ E ὅτι.

LEMMA I.

Sit conus cujus basis circulus AB , & vertex punctum Γ . si quidem isosceles est conus, manifesto constat rectas omnes, quæ ab ipso Γ ad circuli AB circumferentiam ducuntur, inter se æquales esse: si vero scalenus est; oporteat invenire quæ maxima sit, & quæ minima.




DUCATUR [per II. II.] à puncto Γ ad planum circuli AB recta perpendicularis, quæ primum cadat intra circulum, sitque $\Gamma\Delta$, & sumatur centrum circuli, quod sit E ; & juncta ΔE producatur in utramque partem ad puncta A, B ; deinde AG, GB jungantur. dico ipsam $B\Gamma$ maximam esse, & AG minimam linearum omnium quæ à puncto Γ ad circulum AB pertingunt. ducatur enim alia quævis ΓZ , & $Z\Delta$ jungatur. major igitur est [per 7.3.] $B\Delta$ quam ΔZ , communis autem $\Gamma\Delta$, & anguli qui ad Δ recti; ergo major est $B\Gamma$ quam ΓZ : eodem modo & ΓZ major ostendetur quam ΓA . ex quibus apparet ΓB omnium maximam, AG vero minimam esse.

Rursus perpendicularis à puncto Γ ducta cadat in ipsius AB circuli circumferentiam, quæ sit ΓA , & ad circuli centrum Δ juncta ΔA producatur in B , & $B\Gamma$ jungatur. dico $B\Gamma$ maximam esse, & AG minimam. rectam igitur ΓB majorem esse quam ΓA perspicuum est. ducatur autem alia quævis recta ΓE ; & jungatur AE . itaque quoniam AB diameter est, necessario major erit quam AE , & AG normalis est ipsis AB, AE ; ergo ΓB quam ΓE major erit: & similiter major quam ceteræ omnes. eodem modo & $B\Gamma$ major ostendetur quam ΓA : quare $B\Gamma$ maxima est, AG vero minima rectarum omnium, quæ ab ipso Γ ad circulum AB pertingunt.

Isidem positis, cadat perpendicularis $\Gamma\Delta$ extra circulum, & ad circuli centrum E ducta ΔE producat

tur, junganturque $\Delta\Gamma$, $\mathcal{B}\Gamma$. dico $\mathcal{B}\Gamma$ maximam, & $\Delta\Gamma$ minimam esse omnium quæ à puncto Γ ad $\mathcal{A}\mathcal{B}$ circum-
culum perducuntur. constat namque $\mathcal{B}\Gamma$ majorem esse ipsa $\Gamma\mathcal{A}$: sed & major erit omni-
bus quæ ab ipso Γ in circum-
ferentiam circuli $\mathcal{A}\mathcal{B}$ cadunt.
ducatur enim alia quævis rec-
ta $\Gamma\mathcal{Z}$, & $\Delta\mathcal{Z}$ jungatur. cum
igitur $\mathcal{B}\mathcal{A}$ per centrum tran-
seat, major est [per 8. 3.] quam
 $\Delta\mathcal{Z}$. est autem $\Delta\Gamma$ perpendi-
cularis ad rectas $\Delta\mathcal{B}$, $\Delta\mathcal{Z}$, quo-
niam & ad ipsum planum;
ergo major erit $\mathcal{B}\Gamma$ quam $\Gamma\mathcal{Z}$:
& similiter major quam aliæ
omnes. perspicuum est igitur
ipsam $\Gamma\mathcal{B}$ maximam esse. at
vero $\Delta\Gamma$ minimam *hoc modo*
ostendamus. quoniam enim
minor est [per 8. 3.] $\mathcal{A}\mathcal{A}$ quam
 $\Delta\mathcal{Z}$, atque est ad ipsas perpen-
dicularis $\Delta\Gamma$; minor erit $\Delta\Gamma$
quam $\Gamma\mathcal{Z}$: & ita minor quam
aliæ. recta igitur $\Delta\Gamma$ minima est, & $\mathcal{B}\Gamma$ maxima
omnium, quæ à puncto Γ ad $\mathcal{A}\mathcal{B}$ circuli circumferen-
tiam perducuntur.



$\zeta\upsilon\chi\theta\iota\sigma\iota\varsigma \hat{=}$ $\Delta\Gamma$ ἐκτελέσας, καὶ ἐπ' $\zeta\upsilon\chi\theta\iota\sigma\iota\varsigma$ αἱ $\Lambda\Gamma$,
 $B\Gamma$, λέγου ὅτι διὰ μέγιστον μὲρ ἔστιν ἢ
 $B\Gamma$, ἐλαχίστη δὲ ἡ $\Lambda\Gamma$ πασῶν ὅ-
 τες ᾤ Γ ὡς τ τὴν $\Lambda B\Gamma$ κύκλον
 περιεσπλησῶν οὐδ' ἔστιν. ὅτι μὲν ἐν μοί-
 ζον ἔστιν ἢ $B\Gamma$ ὅ $\Gamma\Lambda$ φασί τιν' λέ-
 γου δὲ ἔτι παρὰ πασῶν τῶν ὅτες ᾤ Γ
 ὡς τ τὴν ΛB κύκλου περιέσπλησας
 περιεσπλησῶν. περιεσπλησῶ γάρ τις
 καὶ ἑτέρα ἢ ΓZ καὶ ἐπ' $\zeta\upsilon\chi\theta\iota\sigma\iota\varsigma$ ἢ ΔZ .
 ἔπει ἐν $\alpha\beta\delta$ ᾤ κέντρον ἔστιν ἢ $B\Delta$,
 μείζον ἔστιν ἢ ΔB ὅ ΔZ . καὶ ἔστιν
 αὐτῶς ὁρθὴ ἢ $\Delta\Gamma$, ἔπει καὶ καὶ ὁμο-
 πλῆρες μείζον ἄρα ἔστιν ἢ $B\Gamma$ τῆς
 ΓZ ὁμοίας καὶ πασῶν. μέγιστον μὲρ
 ἄρα ἔστιν ἢ ΓB . ὅτι δὲ καὶ ἡ $\Lambda\Gamma$
 ἐλαχίστη. ἔπει γὰρ ἰσόσκιον ἔστιν ἢ
 $\Lambda\Delta$ ὅ ΔZ , ἔστι καὶ αὐτῶς ὁρθὴ ἢ
 $\Delta\Gamma$, ἰσόσκιον ἄρα ἔστιν ἢ $\Lambda\Gamma$ τῆς
 ΓZ ὁμοίας καὶ πασῶν. ἐλαχίστη ἄρα
 ἔστιν ἢ $\Lambda\Gamma$, μέγιστη δὲ ἢ $B\Gamma$ πα-
 σῶν ᾤ ὅτες ᾤ Γ ὡς τ τὴν ΛB κύκλου περιέσπλησας περιεσπλη-
 σῶν οὐδ' ἔστιν.


In Definitiones Conicorum.

SI ab aliquo puncto ad circumferentiam circuli &c.] Convenienter *Apollonius* addidit, *in utramque partem producat*; cum uniuscujusque conus generationem tradat. si enim isosceles sit conus frustra produceretur, quia recta linea quæ convertitur circumferentiam circuli perpetuo contingit; quippe cum ab ea punctum manens semper æquali distet intervallo. sed quoniam potest & scalenus esse conus, in quo, ut jam demonstratum est, & maximum, & minimum latus invenitur, necessario illud apposuit; ut quæ minima est linea usqueadeo augeri intelligatur quoad fiat maximæ æqualis, & propterea circuli circumferentiam semper contingat.

LEMMA 11

Sit linea $AB\Gamma$, & positione data $A\Gamma$; omnes autem, quæ ab ipsa linea ad $A\Gamma$ perpendiculares ducuntur, ita se habeant, ut quadratum uniuscujusque ipsarum æquale sit rectangulo sub basis segmentis, quæ ab ipsa secantur, contento: dico $AB\Gamma$ circuli circumferentiam esse, diametrum autem ipsius rectam $A\Gamma$.

DUCANTUR enim à punctis Δ , B , E perpendiculares ΔZ , BH , EO . ergo quadratum ex ΔZ æquale est rectangulo sub $\Delta Z\Gamma$, & quadratum ex BH rectangulo sub $AH\Gamma$, ipsum vero ex EO quadratum rectangulo sub $A\Theta\Gamma$ æquale. secetur $A\Gamma$ bifariam in K , & KA , KB , KE jungantur. itaque quoniam $\Delta Z\Gamma$ rectangulum unà cum quadrato ex ZK est æquale [per 5.2.] quadrato ex AK , & ipsi $\Delta Z\Gamma$ æquale est [ex hyp.] quadratum ex ΔZ : erit quadratum ex ΔZ unà cum quadrato ab ipsa ZK , hoc est [per 47. 1.] quadratum ex ΔK , æquale quadrato ex AK . quare AK ipsi $K\Delta$ est æqualis. similiter ostendemus & unamquamque rectarum BK , EK , ipsi AK vel $K\Gamma$ æqualem esse: ergo $AB\Gamma$ circumferentia est circuli cujus centrum K , hoc est circa diametrum $A\Gamma$ descripti.




Η Χ Θ Λ Σ Α Ν ὅτι ἀπὸ σημείων τῶ Δ, Β, Ε ἔχεται αἱ
ΔΖ, ΒΗ, ΕΘ. τὸ μὲν ἄρα ἀπὸ Δ Ζ ἴσιν ἐστὶ τῆς ὑπὸ
ΑΖΓ, τὸ δὲ ἀπὸ ΒΗ τῆς ὑπὸ ΑΗΓ, τὸ δὲ ἀπὸ ΕΘ τῆς ὑπὸ ΑΘΓ. γε-
γμένον δὲ διὰ τὴν ΑΓ κατὰ τὸ Κ,
ἐκτὶ ἐπιτεταχθέντων αἱ ΚΔ, ΚΒ,
ΚΕ. ἐπεὶ ὅτι τὸ ὑπὸ ΑΖΓ με-
τὰ τῷ ἀπὸ ΖΚ ἴσιν ἐστὶ τῆς ὑπὸ
ΑΚ, ἀλλὰ τῆς ὑπὸ ΑΖΓ ἴσιν ἐστὶ
τὸ ἀπὸ ΔΖ· τὸ ἄρα ἀπὸ ΔΖ μὲν
τῷ ἀπὸ ΖΚ, τὸ δὲ ὅτι τὸ ἀπὸ ΔΚ,
ἴσιν ἐστὶ τῆς ὑπὸ ΑΚ. ἴση ἄρα ἐστὶ
ἡ ΑΚ τῇ ΚΔ. ὁμοίως δὲ δείξομεν ὅτι καὶ ἑκατέρη τῶν
ΒΚ, ΕΚ ἴση ἐστὶ τῇ ΑΚ ἢ τῇ ΚΓ· κίελλε ἄρα σφει-
ρόειά ἐστιν ἡ ΑΒΓ εὐθὺς γίνεσθαι τὸ Κ, τὸ δὲ ὅτι εὐθὺς
δείξομεν πρὸς ΑΓ.

АММА

ΛΗΜΜΑ γ'.


Τρεῖς παράλληλαι αἱ $AB, \Gamma\Delta, EZ$, καὶ διήχθωσαν
ὡς αὐταῖς δύο εὐθείαι αἱ $AH, Z\Gamma$, $BHE\Delta$.
ὅτι γίνονται ὡς τὸ ὑπὸ AB, EZ πρὸς τὸ δὲ
 $\Gamma\Delta$ ὅπως τὸ ὑπὸ AH, Z πρὸς τὸ δὲ $H\Gamma$ τε-
τραγώνον.

ΕΠΕΙ γὰρ εἰναι ὅτι
 AB πρὸς πλὴν ZE ,
τούτ' ἐστὶν ὡς τὸ ὑπὸ AB ,
 ZE πρὸς τὸ ὑπὸ ZE ὅπως
ἡ AH πρὸς τὴν HZ , τούτ' ἐστὶν
τὸ ὑπὸ AH, Z πρὸς τὸ ὑπὸ
 HZ . ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ AB ,
 ZE πρὸς τὸ ὑπὸ ZE ὅπως
τὸ ὑπὸ AH, Z πρὸς τὸ ὑπὸ
 HZ . ἀλλὰ καὶ ὡς τὸ ὑπὸ
 ZE πρὸς τὸ ὑπὸ $\Gamma\Delta$ ὅπως
ὅτι τὸ ὑπὸ ZH πρὸς τὸ ὑπὸ
 $H\Gamma$. δι' ἴσιν ἄρα εἶναι ὡς τὸ
ὑπὸ AB, ZE πρὸς τὸ ὑπὸ $\Gamma\Delta$ τετραγώνον ὅπως τὸ ὑπὸ
 AH, Z πρὸς τὸ ὑπὸ $H\Gamma$ τετραγώνον.



LEMMA IIL

Sint tres rectæ parallelæ $AB, \Gamma\Delta, EZ$, & in
ipfas ducantur duæ rectæ $AH, Z\Gamma$, $BHE\Delta$:
dico ut rectangulum quod fit sub AB & EZ
ad quadratum ex $\Gamma\Delta$ ita esse rectangulum
sub AH, Z ad quadratum ex $H\Gamma$.




QUONIAM enim ut
recta AB ad ZE ,
hoc est [per 1. 6.] ut
rectangulum sub AB &
 ZE ad quadratum ex ZE ,
ita [per 4. 6.] AH ad
ipsam HZ , hoc est [per
1. 6.] rectangulum sub
 AH, Z ad quadratum ex
 HZ : erit [per 11. 5.] ut
rectangulum sub AB &
 ZE ad quadratum ex ZE
ita rectangulum sub AH, Z
ad quadratum ex HZ . sed
[per 4. & 22. 6.] ut qua-
dratum ex ZE ad quadra-
tum ex $\Gamma\Delta$ sic quadratum ex ZH ad quadratum ex $H\Gamma$.
ex æquali igitur [per 22. 5.] ut rectangulum sub AB
& ZE ad quadratum ex $\Gamma\Delta$ sic rectangulum sub AH, Z
ad quadratum ex $H\Gamma$.

ΛΗΜΜΑ δ'.

Εἴτω ὡς ἡ AB πρὸς πλὴν $B\Gamma$ ὅπως ἡ AA πρὸς
πλὴν $\Delta\Gamma$, ἔπιμήδω ἡ AG διχῶς κατὰ τὸ E ση-
μειον· ὅτι γίνονται τὸ μὲν ὑπὸ BE, Δ ἴσον τῷ ὑπὸ
 $E\Gamma$, τὸ δ' ὑπὸ AA, Γ τῷ ὑπὸ BA, E , τὸ δ' ὑπὸ
 AB, Γ τῷ ὑπὸ EB, Δ .

ΕΠΕΙ γὰρ εἰναι ὅτι ἡ AB πρὸς πλὴν $B\Gamma$ ὅπως ἡ AA
πρὸς πλὴν $\Delta\Gamma$. συνθέντι, καὶ τὰ ἡμίση τ' ἡγεμύον,
καὶ ἀνατρέψαντα, εἰναι ὡς ἡ BE πρὸς πλὴν $B\Gamma$ ὅπως ἡ GE
πρὸς τὴν ED . τὸ ἄρα ὑπὸ BE, Δ
ἴσον ἔστι τῷ ὑπὸ GE, E τετραγώνῳ.
καὶ τὸν ἀρρήδον τὸ ὑπὸ ED, Δ τετρά-
γωνον· λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ AA, Γ
ἴσον ἔστι τῷ ὑπὸ BA, E . ἐπει δὲ τὸ ὑπὸ BE, Δ ἴσον ἔστι
τῷ ὑπὸ $E\Gamma$, ἀμφοτέρω ἀρρήδῳ ὑπὸ τῷ ἀπὸ τῆς BE
τετραγώνῳ· λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ AB, Γ ἴσον ἔστι τῷ ὑπὸ
 EB, Δ . γίνονται ἄρα τὰ τοιαῦτα.



LEMMA IV.


Sit ut AB ad $B\Gamma$ ita AA ad $\Delta\Gamma$, & secetur AG
bifariam in puncto E : dico rectangulum sub
 BE, Δ quadrato ex $E\Gamma$ æquale esse; itemque
rectangulum sub AA, Γ æquale rectangulo sub
 BA, E ; & rectangulum sub AB, Γ rectangulo
sub EB, Δ .

QUONIAM enim ut AB ad $B\Gamma$ ita est AA ad
 $\Delta\Gamma$; erit [per 15, 18, & 19. 5.] componendo,
sumptisque antecedentium dimidiis, & per conver-
sionem rationis, ut BE ad $E\Gamma$
ita GE ad ED : rectangulum igitur
sub BE, Δ [per 17. 6.] æquale
est quadrato ex $E\Gamma$. commune
auferatur quadratum ex ED : er-
go quod relinquitur [per 3. & 5. 2.] rectangulum sub
 AA, Γ rectangulo sub BA, E est æquale. rursus quoniam
rectangulum sub BE, Δ æquale est quadrato ex $E\Gamma$, utra-
que auferantur à quadrato ex BE : reliquum igitur re-
ctangulum sub AB, Γ [per 6. 2.] reliquo sub EB, Δ [per
2. 2.] æquale erit. quæ tria erant demonstranda.

ΛΗΜΜΑ ε'.

Τὸ A πρὸς τὸ B τ' συνημμέμον λόγον ἔχτω ἕκ τε
τῶν ὄντων τὸ Γ πρὸς τὸ Δ , καὶ ἕξ δ' ὄντων τὸ E
πρὸς τὸ Z : ὅτι καὶ τὸ Γ πρὸς τὸ Δ τὸν συνημ-
μέμον λόγον ἔχει ἕκ τε τῶν ὄντων τὸ A πρὸς τὸ B ,
καὶ τὸ Z πρὸς τὸ E .

ΤΩ γὰρ τὸ E πρὸς τὸ Z λό-
γος ὁ αὐτὸς παραμένει ὁ
τὸ Δ πρὸς τὸ H . ἐπει δὲ ὁ Γ A
πρὸς τὸ B λόγος αὐτῶν ἐκ τε τῶν
 Γ πρὸς τὸ Δ , καὶ τῶν Γ πρὸς τὸ Z ,
τούτ' ἐστὶν ὁ Γ πρὸς τὸ H . ἀλλὰ ὁ
συνημμέμος ἐκ τε τῶν ὄντων τὸ Γ
πρὸς τὸ Δ , καὶ ἕξ δ' ὄντων τὸ Δ
πρὸς τὸ H , ὁ Γ πρὸς τὸ H εἶναι
ὡς ἄρα τὸ A πρὸς τὸ B ὅπως τὸ Γ
πρὸς τὸ H . ἐπει δὲ τὸ Γ πρὸς τὸ
 Δ τ' συνημμέμον λόγον ἔχει ἕκ τε τῶν ὄντων τὸ Γ πρὸς τὸ H ,
καὶ ἕξ δ' ὄντων τὸ H πρὸς τὸ Δ , ἀλλ' ὁ Γ πρὸς τὸ H
ὁ αὐτὸς εἶναι καὶ τὸ Γ πρὸς τὸ B , ὁ δὲ Γ πρὸς τὸ H



LEMMA V.

Habeat A ad B rationem compositam ex ra-
tione Γ ad Δ , & ex ratione E ad Z : dico Γ
ad Δ rationem compositam habere ex ra-
tione A ad B , & ratione Z ad E .

FIAT enim ratio A ad B
eadem quæ est E ad
 Z . & quoniam ratio A ad
 B composita est ex ratione
 Γ ad Δ , & ratione E ad
 Z , hoc est A ad B ; ratio
autem composita ex ratione
 Γ ad Δ , & ratione A ad
 B est [per 5. def. 6.] eadem
cum ratione Γ ad H : erit ut
 A ad B ita Γ ad H . rursus
quoniam Γ ad Δ rationem
habet compositam ex ratione Γ ad H , & ratione
 H ad Δ ; & ratio Γ ad H demonstrata est ea-
dem quæ A ad B ; & invertendo ratio H ad Δ
eadem

habet compositam ex ratione Γ ad H , & ratione
 H ad Δ ; & ratio Γ ad H demonstrata est ea-
dem quæ A ad B ; & invertendo ratio H ad Δ
eadem


eadem est quæ Z ad E : habebit igitur Γ ad Δ rationem compositam ex ratione A ad B , & ratione Z ad E .

ἐκ τῆ ἀνάπαλιν ὁ αὐτὸς ἔστι τῆ Z πρὸς τὸ E · καὶ τὸ Γ ἔστι πρὸς τὸ Δ τῆ συνημιθέτου λόγον ἔχει ἐκ τῆ $\tau\epsilon$ ὅτι ἔχει τὸ A πρὸς τὸ B , καὶ ἐξ ὅτι ἔχει τὸ Z πρὸς τὸ E .

LEMMA VI.

Sint duo parallelogramma $ΑΓ$, ΔZ æquiangula, quorum angulus B sit æqualis angulo E : dico ut rectangulum sub $ΑΒΓ$ ad rectangulum sub $\Delta ΕΖ$ ita esse parallelogrammum $ΑΓ$ ad ΔZ parallelogrammum.

SI enim anguli B, E recti sint, illud perspicue constat: sin minus, demittantur perpendiculares $AH, \Delta\Theta$. & quoniam angulus B æqualis est angulo E , & angulus ad H rectus æqualis recto ad Θ : erit triangulum ABH triangulo $\Delta E\Theta$ æquiangulum. quare [per 4.6.] ut BA ad AH ita $ΕΔ$ ad $\Delta\Theta$. sed [per 1.6.] ut BA ad AH ita rectangulum sub $ABΓ$ ad rectangulum quod sub $AH, BΓ$ continetur: & ut $ΕΔ$ ad $\Delta\Theta$ ita rectangulum sub $\Delta ΕΖ$ ad rectangulum contentum sub $\Delta\Theta, ΕΖ$. quare permutando, ut rectangulum sub $ABΓ$ ad rectangulum sub $\Delta ΕΖ$ ita rectangulum sub $AH, BΓ$, hoc est [per 36.1.] parallelogrammum $ΑΓ$, ad rectangulum sub $\Delta\Theta, ΕΖ$, hoc est ad parallelogrammum ΔZ .



ΛΗΜΜΑ 5'.


Εἰς δύο ὁμοειδή παραλληλόγραμμα τὰ $ΑΓ$, ΔZ ἰσογώνια, ἴσην ἔχοντα πλάτος γωνίαν τῇ E γωνίᾳ· ὅτι γίνεται ὡς τὸ ὑπὸ $ABΓ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\Delta ΕΖ$ ἔτω τὸ $ΑΓ$ ὁμοειδὲς παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ ΔZ ὁμοειδὲς παραλληλόγραμμον.

Εἰ μὴ ἔν ὁρθαί εἰσιν αἱ B, E γωνίαι, φανερὸν· οἱ δὲ μὴ, ἔχουσιν καθεύτου αἱ $AH, \Delta\Theta$. ἐπεὶ ἔν ἴση ἔστιν ἡ B γωνία τῇ E , ἡ δὲ H ὁρθὴ τῇ Θ · ἰσογώνιον ἄρα ἔστι τὸ ABH τρίγωνον τῇ $\Delta Ε\Theta$ τριγώνῳ. ἔστιν ἄρα ὡς ἡ BA πρὸς πλάτος AH ὕψος ἡ $ΕΔ$ πρὸς πλάτος $\Delta\Theta$. ἀλλ' ὡς μὴ ἡ BA πρὸς πλάτος AH ὕψος ἔστι τὸ ὑπὸ $ABΓ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $AH, BΓ$ · ὡς δὲ ἡ $ΕΔ$ πρὸς πλάτος $\Delta\Theta$ ὕψος ἐστὶ τὸ ὑπὸ $\Delta ΕΖ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\Delta\Theta, ΕΖ$. ἔστιν ἄρα ἐναλλαξ, ὡς τὸ ὑπὸ $ABΓ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\Delta ΕΖ$ ἔτω τὸ ὑπὸ $AH, BΓ$, τῷτ' ἐστὶ τὸ $ΑΓ$ ὁμοειδὲς παραλληλόγραμμον, πρὸς τὸ ὑπὸ $\Delta\Theta, ΕΖ$, τῷτ' ἐστὶ πρὸς τὸ ΔZ ὁμοειδὲς παραλληλόγραμμον.

LEMMA VII.

Sit triangulum $ΑΒΓ$, sitque $BΓ$ parallela ΔE , & quadrato ex ΓA æquale sit rectangulum sub ZAE : dico quod, si jungantur $\Delta Γ, BZ$, recta BZ ipsi $\Delta Γ$ parallela est.

HOC vero manifeste patet. quoniam enim [ex hyp. & per 17.6.] ut $Z A$ ad $\Delta Γ$ ita est ΓA ad ΔE ; & [per 2.6.] ut ΓA ad ΔE (ob parallelas) ita BA ad $\Delta \Delta$: erit ut $Z A$ ad $\Delta Γ$ ita BA ad $\Delta \Delta$. ergo $BZ, \Delta Γ$ sunt parallelæ.



ΛΗΜΜΑ 6'.



Εἰς τρίγωνον τὸ $ΑΒΓ$, ἔτω δὲ παράλληλῳ ἡ $BΓ$ τῇ ΔE , καὶ τῷ ἀπὸ τῆ ΓA ἴσην κείσθω τὸ ὑπὸ ZAE · ὅτι, ἐὰν ὁμοειδὲς ᾖ αἱ $\Delta Γ, BZ$, γίνετ' ὁμοειδὲς ἡ BZ τῇ $\Delta Γ$.

ΤΟΤΤΟ δὲ ἔστι φανερὸν. ἐπεὶ γὰρ ἔστιν ὡς ἡ $Z A$ πρὸς τῆ $\Delta Γ$ ὕψος ἡ ΓA πρὸς τὴν AB , ὕψος ἐστὶν, ἐν ὁμοειδέσιν, ἡ BA πρὸς $\Delta \Delta$ · καὶ ὡς ἄρα ἡ $Z A$ πρὸς $\Delta Γ$ ὕψος ἡ BA πρὸς $\Delta \Delta$. ὁμοειδῆλοι ἄρα εἰσὶν αἱ $BZ, \Delta Γ$.

LEMMA VIII.

Sit triangulum $ΑΒΓ$, trapezium vero $\Delta ΕΖΗ$, ita ut $ΑΒΓ$ angulus angulo $\Delta ΕΖ$ sit æqualis, & ΔH parallela EZ : dico ut rectangulum sub $ΑΒΓ$ ad rectangulum quod continetur sub utraque ipsarum $\Delta H, ΕΖ$, & ΔE , sic esse triangulum $ΑΒΓ$ ad trapezium $\Delta ΕΖΗ$.

DUCANTUR enim perpendiculares $A\Theta, \Delta K$. & quoniam angulus $ΑΒΓ$ æqualis est angulo $\Delta ΕΖ$, & qui est ad Θ rectus æqualis recto ad K ; erit [per 4.6.] ut BA ad $A\Theta$ ita $ΕΔ$ ad ΔK . sed [per 1.6.] ut BA ad $A\Theta$ ita rectangulum sub $ΑΒΓ$ ad id quod continetur sub $A\Theta, BΓ$; & ut $ΕΔ$ ad ΔK ita rectangulum quod continetur sub utraque $\Delta H, ΕΖ$, & ΔE , ad contentum sub utraque $\Delta H, ΕΖ$, & ΔK . est autem triangulum $ΑΒΓ$ dimidium rectan-



ΛΗΜΜΑ 7'.

Εἰς τρίγωνον μὲν τὸ $ΑΒΓ$, τραπέζιον δὲ τὸ $\Delta ΕΖΗ$, ὡς ἐστὶν εἶναι τὸ ὑπὸ $ΑΒΓ$ γωνίαν τῇ ὑπὸ $\Delta ΕΖ$ γωνίᾳ, ἡ δὲ ΔH τῇ EZ ὁμοειδὲς ᾖ· ὅτι γίνετ' ὡς τὸ ὑπὸ $ΑΒΓ$ πρὸς τὸ ὑπὸ συναμφοτέρων τῶν $\Delta H, ΕΖ$, καὶ τῆ ΔE , ἔτω τὸ $ΑΒΓ$ πρὸς τὸ $\Delta ΕΖΗ$.



HΥΠΟΘΕΣΑΝ καθεύτου αἱ $A\Theta, \Delta K$. ἐπεὶ δὲ ἴση ἐστὶν ἡ μὴ ὑπὸ $ΑΒΓ$ γωνία τῇ ὑπὸ $\Delta ΕΖ$ γωνίᾳ, ἡ δὲ ὁρθὴ ὁ Θ τῇ K ὁρθῇ ἴση· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ BA πρὸς $A\Theta$ ὕψος ἡ $ΕΔ$ πρὸς ΔK . ἀλλ' ὡς μὴ ἡ BA πρὸς $A\Theta$ ὕψος ἐστὶ τὸ ὑπὸ $ΑΒΓ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $A\Theta, BΓ$ · ὡς δὲ ἡ $ΕΔ$ πρὸς τῆ ΔK ὕψος ἔστι τὸ ὑπὸ συναμφοτέρων τῶν $\Delta H, ΕΖ$, καὶ τῆ ΔE , πρὸς τὸ ὑπὸ συναμφοτέρων τῶν $\Delta H, ΕΖ$, καὶ τῆς ΔK . καὶ ἔστι ἔτι μὴ ὑπὸ $A\Theta, BΓ$ ἢ μισοῦ τὸ $ΑΒΓ$.

ΑΒΓ τρίγωνον· τὸ δὲ ὑπὸ συναμφοτέρῃς δ' ΔΗ, ΕΖ, καὶ πρὸς ΔΚ ἡμισυ τὸ ΔΕΖΗ περιέχον. ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ ΑΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ συναμφοτέρῃς τῆς ΔΗ, ΕΖ, καὶ τῆς ΔΕ, ὅπου τὸ ΑΒΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΔΕΖΗ περιέχον.

Καὶ ἐὰν ἡ ΔΖ τρίγωνον τὸ ΑΒΓ, καὶ παραλληλόγραμμον τὸ ΔΖ· γίνεται ὡς τὸ ΑΒΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΔΕΖΗ παραλληλόγραμμον ὅπως τὸ ὑπὸ ΑΒ, ΒΓ πρὸς τὸ δις ὑπὸ

guli contenti sub ΑΘ, ΒΓ: & trapezium ΔΕΖΗ dimidium ejus quod sub utraque ΔΗ, ΕΖ, & ΔΚ continetur. ergo ut rectangulum sub ΑΒΓ ad rectangulum contentum sub utraque ΔΗ, ΕΖ, & ΔΕ, ita est triangulum ΑΒΓ ad ΔΕΖ trapezium.

Quod si ΑΒΓ triangulum sit, & ΔΖ parallelogrammum: eadem ratione fiet, ut ΑΒΓ triangulum ad ΔΕΖΗ parallelogrammum ita rectangulum sub ΑΒ, ΒΓ ad duplum rectanguli sub ΔΕΖ. ex quibus con-



ΔΕΖ, καὶ τὰ αὐτά. καὶ φανερόν ἐκ τούτου, ὅτι τὸ μὲν ὑπὸ ΑΒ, ΒΓ, ἐὰν ἡ παραλληλόγραμμον τὸ ΔΖ καὶ ἴσον τῷ ΑΒΓ τρίγωνῳ, ἴσον γίνεται τῷ δις ὑπὸ ΔΕΖ· ὅτι δ' ἡ παραλληλόγραμμον ὅπως τὸ ὑπὸ συναμφοτέρῃς δ' ΔΗ, ΕΖ, καὶ δ' ΔΕ.

stat rectangulum sub ΑΒ, ΒΓ (liquidem ΔΖ parallelogrammum sit ipfique ΑΒΓ triangulo æquale) æquale esse duplo rectanguli sub ΔΕΖ: si vero trapezium, æquale ei, quod sub utraq; ΔΗ, ΕΖ, & ipsa ΔΕ continetur.

ΛΗΜΜΑ 9'.


LEMMA IX.

Εἰς τὸ τρίγωνον ΑΒΓ, καὶ ἐκλεθθεῖσθαι τὴν ΓΑ διήχθῃ τις τετραπλευρὸς ἡ ΔΘΕ, καὶ αὐτῇ μὲν παράλληλος ἡ ΑΗ, τῇ δὲ ΒΓ ἡ ΑΖ· ὅτι γίνεται ὡς τὸ διὰ ΑΗ τετραγώνον πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΗΓ ὅπως τὸ ὑπὸ ΔΖΘ πρὸς τὸ διὰ ΖΑ τετραγώνον.

Sit triangulum ΑΒΓ, &c, producta ΓΑ ad Δ, ducatur quælibet recta ΔΘΕ, cui quidem parallela ducatur ΑΗ; ipsi vero ΒΓ parallela ΑΖ: dico ut quadratum ex ΑΗ ad rectangulum sub ΒΗΓ ita esse rectangulum sub ΔΖΘ ad quadratum ex ΖΑ.

ΚΕΙΣΘΩ τὸ μὲν ὑπὸ ΒΗΓ ἴσον τὸ ὑπὸ ΑΗΚ, τὸ δὲ ὑπὸ ΔΖΘ ἴσον τὸ ὑπὸ ΑΖΑ, καὶ ἐπεζεύχθω αἱ ΒΚ, ΘΑ. ἐπεὶ ἔν ἴση ὄντι ἡ Γ γωνία τῇ ὑπὸ ΒΚΗ, ἡ δ' ὑπὸ ΔΑΑ ἐν κύκλῳ, ἴση ὄντι τῇ ὑπὸ ΖΘΑ· καὶ ἡ ὑπὸ ΗΚΒ ἄρα ἴση ὄντι τῇ ὑπὸ ΖΘΑ γωνίᾳ. ἀλλὰ καὶ ἡ πρὸς τὸ Η γωνία ἴση ὄντι τῇ πρὸς τὸ Ζ· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΒΗ πρὸς τὴν ΗΚ ὅπως ἡ ΑΖ πρὸς τὴν ΖΘ. ἐπεὶ δὲ ὄντι ὡς ἡ ΑΗ πρὸς τὴν ΗΒ ὅπως ἡ ΘΕ πρὸς τὴν ΕΒ, ὡς δὲ ἡ ΘΕ πρὸς ΕΒ ὅπως ὄντι ἐν παραλλήλοις ἡ ΖΘ πρὸς ΖΑ· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΑΗ πρὸς τὴν ΗΒ ὅπως ἡ ΘΖ πρὸς ΖΑ· ἐπεὶ ἔν ἴση ὄντι ὡς μὲν ἡ ΑΗ πρὸς ΗΒ ὅπως ἡ ΘΖ πρὸς ΖΑ, ὡς δὲ ἡ ΒΗ πρὸς ΗΚ ὅπως ἡ ΑΖ πρὸς τὴν ΖΘ· δι' ἴσου ἄρα ἐν τετραπλευρῇ ἀναλογίᾳ, ὡς ἡ ΑΗ πρὸς τὴν ΗΚ ὅπως ἡ ΑΖ πρὸς τὴν ΖΑ. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΑΗ πρὸς ΗΚ ὅπως ὄντι τὸ ὑπὸ ΑΗ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΗΚ, οὕτως ἔστι πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΗΓ, ὡς δὲ ἡ ΑΖ πρὸς ΖΑ ὅπως ὄντι τὸ ὑπὸ ΑΖΑ, οὕτως ἔστι τὸ ὑπὸ ΔΖΘ, πρὸς τὸ ὑπὸ ΖΑ· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ ΑΗ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΗΓ ὅπως τὸ ὑπὸ ΔΖΘ πρὸς τὸ ὑπὸ ΖΑ.


PONATUR rectangulo sub ΒΗΓ æquale rectangulum sub ΑΗΚ, &c rectangulo sub ΔΖΘ æquale rectangulum sub ΑΖΑ, &c jungantur ΒΚ, ΘΑ. quoniam igitur [per 21. 3.] angulus ad Γ æqualis est angulo ΒΚΗ*; & angulus ΔΑΑ in circulo æqualis angulo ΖΘΑ: erit & angulus ΗΚΒ angulo ΖΘΑ æqualis. sed [per 29. 1.] & angulus ad Η est æqualis angulo ad Ζ: ergo [per 4. 6.] ut ΒΗ ad ΗΚ ita ΑΖ ad ΖΘ. quoniam autem ut ΑΗ ad ΗΒ ita ΘΕ ad ΕΒ; & ob parallelas ut ΘΕ ad ΕΒ ita ΘΖ ad ΖΑ: ut igitur ΑΗ ad ΗΒ ita ΘΖ ad ΖΑ. quoniam igitur est quidem ut ΑΗ ad ΗΒ ita ΘΖ ad ΖΑ, ut vero ΒΗ ad ΗΚ ita alia quædam ΑΖ ad antecedentem ΖΘ: quare ex æquali in perturbata proportionem [per 23. 5.] ut ΑΗ ad ΗΚ ita ΑΖ ad ΖΑ. ut vero ΑΗ ad ΗΚ ita [per 1. 6.] quadratum ex ΑΗ ad rectangulum sub ΑΗΚ, hoc est [per const.] ad rectangulum sub ΒΗΓ; & ut ΑΖ ad ΖΑ ita rectangulum sub ΑΖΑ, hoc est



sub ΔΖΘ, ad quadratum ex ΖΑ: ergo ut quadratum ex ΑΗ ad rectangulum sub ΒΗΓ ita rectangulum sub ΔΖΘ ad quadratum ex ΖΑ.

* Nam [per 35. 3.] circulus circa triangulum ΒΑΓ descriptus transit per Κ. Similiter circulus circa ΑΑΘ descriptus transit per Α.

Διὰ τῆς συνημμένης. Ἐπεὶ οἱ μὲν ἌΗ πρὸς ΗΒ λόγος
ὅστις ὁ ΘΕ πρὸς ΕΒ, τῷ τ' ἔστιν ὁ ΘΖ πρὸς ΖΑ· οἱ δὲ
ἌΗ πρὸς τῷ ΗΓ λόγος ὁ αὐτὸς ὅστις ὁ ΔΕ πρὸς ΕΓ,
τῷ τ' ἔστι τῷ ΔΖ πρὸς ΖΑ· ὁ ἀρα συνημμένης ἐκ τῶν τῶ



ὅτι ἔχει ἡ ΑΗ πρὸς ΗΒ, καὶ τὴν ὅτι ἔχει ἡ ΑΗ πρὸς ΗΓ,
οὐκ ὀρίν οὐ τὸ ἀπὸ ΑΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΒΗΓ, ὁ αὐτὸς ὅς τοι
συμμετρεῖται καὶ τὴν τὴν ΘΖ πρὸς ΖΑ, καὶ τὴν ΔΖ πρὸς
ΖΑ, ὅς ὀρίν οὐ τὸ ἀπὸ ΔΖ Θ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΑ τετραγώνων.

АПОЛ-

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΠΕΡΓΑΙΟΥ ΚΩΝΙΚΩΝ

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ,

ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΥΤΟΚΙΟΥ ΑΣΚΑΛΩΝΙΤΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ.

APOLLONII PERGÆI CONICORUM

LIBER PRIMUS,

CUM COMMENTARIIS EUTOCII ASCALONITÆ.

Απολλώνιος Εὐδήμῳ χαίρειν.

Apollonius Eudemo S. P.

ΕΙ πρὸς τὸ σῶματι εὖ ἐπανάγεις, καὶ τὰ ἄλλα κατὰ γνάμιν ὅσῃ σοι, καλῶς ἀνέχῃς· μετρίως δὲ ἔχῃς καὶ αὐτοί. καὶ ὅτι δὲ χερσὶν ἡμῶν μετὰ σε ὡς Περγάμῳ, ἐθεώρουν σε ἀπεύδοντα μεταγχεῖν τὸ πεπραγμένον ἡμῖν κωνικῶν. πέπομφα ὅτι σοι τὸ πρῶτον βιβλίον διορθωσάμενος· τὰ δὲ λοιπὰ, ὅταν εὐαρεστήσωμεν, ἐξαποστελέμεν. ἔκ ἀμνημονεῖν γὰρ οἴομαι σε παρ' ἐμὲ ἀκηκόστα, διότι τὸ πρῶτον τῶντα ἐφοδὸν ἐποιήσάμεν, ἄξιωθεις ὑπὸ Ναυκρατίδος ἔγγραμμεν, καὶ ὅτι δὲ χερσὶν ἐσχόλαζε παρ' ἡμῖν πρὸς γεννηθεὶς εἰς Αλεξάνδρειαν· καὶ διότι πρὸς γράμματα πάντες αὐτὰ ὡς ὅκτω βιβλίοις, ἐξ αὐτῆς μεταδεδώκαμεν αὐτὰ, εἰς τὸ ἀποδιδόναι, ἀλλὰ τὸ πρῶτον ἐκπλῶ αὐτὸν εἶναι, ὃ ἀφ' ἡμῶν ἀφ' ἡμῶν, ἀλλὰ πάντα τὰ ὑποπτόμενα ἡμῖν γένεσθαι, ὡς ἔχοντες ἐπελοδομήσοι. ὅταν χερσὶν νῦν λαβόντες, αἰεὶ τὸ τυγχάνον διορθώσας ἐκδίδωμεν. καὶ ἐπεὶ

ΣI & corpore vales, & aliæ res tuæ ex animi tui sententia se habent, bene est; nos quidem satis belle habemus. Quo tempore tecum Pergami fui, animadverti te cupidum intelligendi Conica, quæ à nobis conscripta sunt. Itaque misi ad te primum librum emendatum; reliquos deinceps missurus, cum animo ero tranquilliori. non enim arbitror te oblitum, quod à me accepisti, quid scilicet causæ fuerit, cur ego hæc scribere aggressus sim, rogatus à Naucræte Geometra, quo tempore Alexandriam veniens apud nos fuit: & cur nos cum de illis, octo libris, egissemus, statim illos cum eo communicavimus, non eâ quâ par erat diligentia (quod quamprimum erat navigaturus) eos emendantes, sed quæcunque sese nobis obtulerunt conscribentes; utpote qui ea denuo essemus percursuri. quæobrem nunc tempus nacti, ut quæque emendamus, ita edimus. Et quoniam

niam accidit nonnullos alios ex iis, qui nobiscum fuerant, habuisse primum & secundum librum antequam emendaretur; noli mirari si in quædam incidas, quæ aliter se habeant. Ex octo autem libris quatuor primi hujus disciplinæ continent elementa; quorum primus complectitur generationes trium confectionum, & earum quæ oppositæ dicuntur, itemque principalia ipsarum accidentia, à nobis & uberius & universalius, quam ab aliis, qui de ea re scripserunt, elaborata. Secundus liber tractat ea, quæ attinent ad diametros, & ad axes sectionum, & ad rectas asymptotos; tum de aliis differit, quæ & generalem & necessariam utilitatem ad determinationes afferunt: quas autem vocem diametros, & quos axes, ex hoc libro cognosces. Tertius liber continet multa & admirabilia theorematum, quæ utilia erunt & ad solidorum locorum compositiones, & ad determinationes, quorum complura & pulchra & nova sunt. Hæc nos perpendentes animadvertimus non positam esse ab *Euclide* rationem componendi loci ad tres & quatuor lineas; verum ipsius tantummodo particulam quandam, atque hanc non satis feliciter: neque enim fieri poterat, ut ea compositio recte perficeretur absque iis quæ à nobis inventa sunt. Quartus liber tradit quot modis conorum sectiones inter sese, & circuli circumferentiæ occurrere possint, & multa alia ad pleniorum doctrinam, quorum nihil ab iis, qui ante nos fuerunt, memoriæ proditum est; item conicæ sectionis, & circuli circumferentiæ, & oppositæ sectiones ad quot puncta oppositis sectionibus occurrant. Reliqui autem quatuor libri ad abundantiorum scientiam pertinent. Etenim quintus de minimis & maximis magna ex parte agit; Sextus de æqualibus, & similibus conicæ sectionibus: Septimus continet theorematum quæ determinandi vim habent; Octavus problemata conica determinata. At vero omnibus his editis, licet unicuique, qui in ea legendo inciderit, ex animi sui sententia judicare. Vale.

EUTOCII COMMENTARIUM.

APOLLONIUS geometra, *Antbemi* sodalis charissime, natus est *Pergæ*, quæ *Pamphiliæ* civitas est, tempore *Ptolemæi Energetæ*, ut tradit *Heracchus* in *Archimedis* vita, qui etiam scribit *Archimedes* quidem primum conica theorematum fuisse aggressum; *Apollonium* vero, cum ea invenisset ab

συμβέβηκε καὶ ἄλλας πρὸς τῆς συμμαχολογίας ἡμῶν μεταληφέναι τὸ πρῶτον καὶ τὸ δεύτερον βιβλίον πρὶν ἢ διορθωθῆναι, μὴ θαυμάσῃς, εἰ περὶ τῆς αὐτοῦ ἐπέρας ἔχουσιν. Ὡς δὲ τῆς ὀκτὼ βιβλίων τὰ πρῶτα πέντε πέπληκε πρὸς εἰσαγωγὴν τοιαύτην. περὶ δὲ τὸ μὲν πρῶτον τὰς γενέσεις τῆς πρῶτης τομῆς καὶ τῆς ἀντικειμένης, καὶ τὰς αὐταῖς ἀρχικὰ συμπλόματα ὅπῃ πλένται καὶ κατὰ μᾶλλον ἐξερρασιμὰ πρὸς τὰ ὑπὸ τῶν ἄλλων γεγραμμένα. τὸ δὲ δεύτερον τὰ πρὸς τὰς ἀφαιρέσεις καὶ τοὺς ἄξονας τῶν τομῶν συμβαίοντα, καὶ τὰς ἀσυμπλώτους, καὶ ἄλλα γενικὰ καὶ ἀναγκάσι χρεῖαν παρέχοντα πρὸς τοὺς διεισμούς· πῶς δὲ ἀφαιρέσεις, ἢ πῶς ἄξιαι καλῶ, εἰδήσεις ἐκ τῶν τῶ βιβλίου. τὸ δὲ τρίτον πολλὰ καὶ παρέχοντα θεωρήματα χρήσιμα πρὸς τὰς συλλήψεις τῶν γεωμετρικῶν τόπων καὶ τῶν διεισμοῦς, ὧν τὰ πλεῖστα καλὰ καὶ ξένα. ἃ καὶ κατανοήσαντες συλλεγόμενοι μὴ συνηγμένοι ὑπὸ Εὐκλείδου τὸν ὅτι πρὸς καὶ πέντε γεγραμμένας τόποι, ἀλλὰ μόλις τὸ τυχὸν αὐτῶν, καὶ τὸτο ὅτι εὐτυχῶς· ὃ γὰρ διωκτὸν ἀνευ τῆς πρῆς γεωμετρίας ἡμῶν τελειωθῆναι τίτλῳ σὺνίστην. τὸ δὲ τέταρτον ποταχῶς αἱ τῶν κώνων τομῆς ἀλλήλων τε καὶ τῇ τῶ κύκλου περιφέρειᾳ συμβάλλουσι, καὶ ἄλλα ἐκ περὶ αὐτῶν, ὧν ἔστι πρὸς τῆς πρῆς ἡμῶν γεγραμμένης κώνου τομῆς ἢ κύκλου περιφέρειᾳ, καὶ ἐπὶ ἀντικείμεναι ἀντικειμένης κατὰ πόσα σημεῖα συμβάλλουσιν· τὰ δὲ λοιπὰ ὅτι περιουσιαστικῶς· ἐπὶ γὰρ τὸ μὲν πρὸς ἐλαχίστων καὶ μεγίστων ὅπῃ πλένται· τὸ δὲ πρὸς ἴσων καὶ ὁμοίων τομῶν κώνων· τὸ δὲ πρὸς διεισκότων θεωρημάτων· τὸ δὲ πρὸς βλημάτων κώνων διεισμοῦς. οὐ μὲν ἄλλα καὶ πάντων ἐκδοθέντων ἔστι τοῖς περὶ τυχάνουσι κείναι αὐτὰ, ὡς ἀνὴρ αὐτῆς ἕκαστος ἀφῆται. εὐτυχῶς.


ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ὁ γεωμέτρης, ὃς φίλος ἐστὶν Ἀνθίμῳ, γέγονε μὲν ἐκ Πέργης τῆς Παμφιλίας, ἐν χρόνῳ τῷ Εὐεργέτου Πτολεμαίου, ὡς ἰσχυρῶς Ἡράκλειτος εἰς τὸν Ἀρχιμήδους γράβων, ὅς καὶ φησι τὰ κωνικὰ θεωρήματα ὅπῃ πλένται μὲν πρῶτον τῷ Ἀρχιμήδῳ, τὸ δὲ Ἀπολλωνίῳ σὺν ταῖς ἐν ταῖς

ἐόντα ὑπὸ Ἀρχιμήδους μὴ ἐκδοθέντα, ἰδιοποιήσαντες, ἐκ ἀλλοδαπῶν κατὰ γὰρ τὴν ἐμὴν. ὁ τε γὰρ Ἀρχιμήδης ἐν πολλοῖς φαίνεται ὡς παλαιωτέρας σοιχειώσας τὴν κωνικῶν μαθημῶν, καὶ ὁ Ἀπολλώνιος ὡς ἰδίᾳς διανοίας γράφει· καὶ γὰρ ἂν ἔφη, διηπλέον καὶ καὶ δὴ μᾶλλον ἐξαιρέτως ταῦτα φησὶ τὰ ὑπὸ τῶν ἄλλων γρηγορήματα. ἀλλ' ὅπερ φησὶν ὁ Γεμῖνος ἀληθὲς ὄν, ὅτι οἱ παλαιοί, κῶνον οὐκ ἐξήρῳτο καὶ τὸ ὀρθογωνίον περιγράφει μανύσας μᾶλλον τῶν φησὶ τὸ ὀρθὸν γωνίαν περιγράφει, εὐκρίτως καὶ τὰς κῶνας πάσας ὀρθὰς ὑπελάμβανον γινώσκοντες, καὶ μίαν τομὴν ἐν ἐκείνῃ, ἐν γὰρ τῷ ὀρθογωνίῳ τὴν νῦν καλεούμενην Παραβολὴν, ἐν δὲ τῷ ἀμβλυγωνίῳ τὴν Τριβόλιν, ἐν δὲ τῷ ὀξυγωνίῳ τὴν Ἑλλειψιν· καὶ ἔστι παρ' αὐτοῖς εὐρεῖν ὅπως ὀνομαζομένης τὰς τομὰς. ὡσαύτως ἐν τῷ ἀρχαίῳ ὅτι ἐνὸς ἐκείνου εἶδους περιγόνου διαμετρικῶν τὰς δύο ὀρθὰς, περιτρέπον ἐν τῷ ἰσοπλευρῷ, καὶ πάλιν ἐν τῷ ἰσοσκελεῖ, καὶ ὕστερον ἐν τῷ σκαλιῷ· οἱ μεταγενέστεροι καὶ δὴ κῶνον ἀπέδειξαν τοῖσιν· “ πάντος περιγόνου αἱ ἐν τῷ τρεῖς γωνίαι διπλὴν ὀρθὰς ἴσους εἶναι ”. ὅταν καὶ ὅτι τὸ κῶνον τομῶν, καὶ γὰρ λεγόμενην ὀρθογωνίαν κῶνον τομὴν ἐν ὀρθογωνίῳ μόνον κῶνον ἐθεώρουν, περιτομὴν δὲ διπλῶν ὀρθῶν ὡς μίαν πλευρὰν τῆς κῶνης, τὴν δὲ τῷ ἀμβλυγωνίῳ κῶνον τομὴν ἐν ἀμβλυγωνίῳ γινόμενην κῶνον ἀπέδεικνυσαν· τὴν δὲ τῷ ὀξυγωνίῳ ἐν ὀξυγωνίῳ, ὁμοίως ὅτι πάντων τῶν κῶνων ἀγορεύει τὰ διηπλέον ὀρθὰ ὡς μίαν πλευρὰν τῆς κῶνης· δηλοῖ δὲ καὶ αὐτὰ τὰ ἀρχαῖα ὀνόματα τῶν γραμμῶν. ὕστερον δὲ Ἀπολλώνιος ὁ Περγαιὸς καὶ δὴ πᾶσι πᾶσι ἐθεώρησεν, ὅτι ἐν παντὶ κῶνι, καὶ ὀρθῷ καὶ σκαλιῷ, πᾶσι αἱ τομᾶί εἰσι, κατὰ τὴν ἀφ' ἑαυτῶν τῶν διηπλέον ἀφ' ὧν καὶ κῶνον περιεβόλυν. ὅτι καὶ διαμαρτυρεῖται οἱ κατ' αὐτὸν γινόμενοι, ἀφ' ὧν τὸ διαμαρτυρεῖται τὸ ὑπὸ αὐτῶν διδεδυγμένων κωνικῶν διαμαρτυρεῖται, μέγαν Γεωμέτρω ἐξέλεν. ταῦτα γὰρ ἂν ὁ Γεμῖνος ἐν τῷ ἑκτῷ φησὶ τὸ τῶν μαθημάτων θεωρίας.

Ὁ δὲ λέγει σαφὲς ποιήσας ὅτι τὸ ὑποκειμένων κατασκευῶν. ἔστω τὸ διὰ τῆς ἀξὸνος κῶνος περιγόνου τὸ $AB\Gamma$, καὶ ἡ AB ὑπὸ πρῶτον σημείῳ Γ E πρὸς ὀρθὰς ἢ ΔEZ , καὶ τότε $\Delta\Gamma$ τὸ ΔZ διηπλέον ἐμβλεῖν ὀρθὸν ἀφ' ὧν AB περιμένει τὸ κῶνον· ὁρῶν δὲ ἐν ἐκείνῃ τὸ ὑπὸ $A\Delta E$, $A\Delta Z$ γωνίαν, καὶ ὀρθογωνίαν μόνον τῆς κῶνης, καὶ ὀρθῶς δηλοῖται τὸ ὑπὸ $B\Delta\Gamma$ γωνίαν, ὡς ὅτι τὸ περιττὸν κατασκευῶν, δύο ὀρθὰς ἔσονται αἱ ὑπὸ $B\Delta\Gamma$,

Archimede nondum edita; sicut propria sua edidisse, neque id vere, ut mea fert opinio. Nam & *Archimedes* multis in locis velut antiquioris conicorum institutionis mentionem facere videtur; & *Apollonius* ea scribit, non ut à seipso inventa: non enim dixisset, uberius & universalius hæc à se, quam ab aliis tractata fuisse. Sed quod scribit *Geminus* verum est, quod antiqui conum definientes, rectanguli trianguli circumvolutionem, manente uno eorum quæ circa rectum angulum sunt latere; & conos omnes rectos, & unam in singulis sectionem fieri arbitrati sunt; in rectangulo quidem cono vocatam *Parabolam*; in obtusangulo *Hyperbolam*; in acutangulo autem *Ellipsim*: atque ita nominatas apud ipsos sectiones passim invenias. Quemadmodum igitur antiquis illis in unaquaque triangulorum specie contemplantibus duos rectos, primum in æquilatero, deinde in æquicruri, postea in scaleno; ætate posteriores universale theorema demonstrarunt ejusmodi; *Omnis trianguli interiores tres anguli duobus rectis sunt æquales*: ita & in conicis sectionibus, rectanguli quidem conicæ sectionem dictam in rectangulo tantum cono contemplati sunt; secto scilicet plano ad unum conicæ lateris recto. obtusanguli autem conicæ sectionem in cono obtusangulo factam demonstrarunt; & acutanguli sectionem in cono acutangulo: similiter in omnibus conis ducentes plana ad unum conicæ lateris recta; quod & antiqua linearum nomina indicant. Verum postea *Apollonius Pergæus* universe inspexit in omni cono, tam recto, quam scaleno, omnes sectiones inesse juxta plani ad conum diversam inclinationem. Quem illius temporis homines, admirati propter mirificam conicorum theorematum demonstrationem, *Magnum Geometram* appellarunt. Hæc quidem *Geminus* scripta reliquit in sexto Mathematicarum præceptionum libro.

Quod autem dicit manifestum faciemus in subjectis figuris. Sit enim per axem conicæ triangulum $AB\Gamma$, & à quovis puncto E ducatur ipsi AB ad angulos rectos ΔEZ , & per ΔZ ductum planum rectum ad ipsam AB conum secet: rectus igitur est uterque angulus $A\Delta E$, $A\Delta Z$; rectanguloque existente cono & angulo $B\Delta\Gamma$ recto, ut in prima figura apparet, erunt anguli $B\Delta\Gamma$, $A\Delta Z$ duo recti anguli:



$A\Delta Z$ γωνίαι. ὡς φησὶ ἄλλοις ὅτι ἢ ΔEZ τῇ $A\Gamma$, καὶ γινέται ἐν τῇ διηπλέον τῆς κῶνης τομῇ ἢ καλεούμενην Παραβολῇ, ὅταν κληθεῖται ὑπὸ τῆς παραλλήλου τῇ ΔEZ , ἢ τῆς ἐν τῇ κωνικῇ τομῇ τῆς περιτομῆς διηπλέον καὶ τῆς διὰ τῆς ἀξὸνος περιγόνου, τῇ $A\Gamma$ πλευρᾷ τῆς περιγόνου. ἐὰν δὲ ἀμβλυγωνίος ἢ ὁ κῶνος, ὡς ἐπὶ τῷ διωτῆρι καὶ ἀρχαίῳ ἀμβλείᾳς δηλονότι ὅτι ὑπὸ $B\Delta\Gamma$, ὀρθῶς δὲ τὸ ὑπὸ $A\Delta Z$. δύο ὀρθῶν μείζους ἔσονται αἱ ὑπὸ $B\Delta\Gamma$, $A\Delta Z$ γωνίαι. ὡς ἐκ συμπτώσεως ἢ ΔEZ τῇ $A\Gamma$ πλευρᾷ ἐπὶ τὰς ἀφ' ὧν τὰς Z, Γ μέρη, ἀλλὰ ὅτι τὰ πρὸς ταῖς A, E , ἀποσκευαστομένης δηλονότι τῇ GA ὅτι τὸ Δ , ποίῃς ἐν τῷ τέμνον διηπλέον ἐν τῇ διηπλέον τῆς κῶνης τομῇ διηπλέον τῆς περιτομῆς, ὅταν κληθεῖται ὑπὸ τῆς ὑπερέκταλιν τὰς εἰρημίας, ποίῃς τὰς ὑπὸ $B\Delta\Gamma$, $A\Delta Z$ δύο ὀρθὰς, ἢ διὰ τὸ ὑπερέκταλιν τῇ ΔEZ καὶ κορυφῇ τῆς κῶνης, καὶ συμπίπτει

quare [per 28. 1.] parallela erit ΔEZ ipsi $A\Gamma$; & fiet in superficie conicæ sectio *Parabola*, sic dicta, quod recta ΔEZ , quæ communis sectio est plani secantis & trianguli per axem, parallela sit ipsi $A\Gamma$ lateri trianguli. Sed si obtusangulus sit conus, ut in secunda figura, obtuso videlicet existente angulo $B\Delta\Gamma$, & angulo $A\Delta Z$ recto: anguli $B\Delta\Gamma$, $A\Delta Z$ duobus rectis majores erunt, & non conveniet ΔEZ cum ipso $A\Gamma$ latere ad partes Z, Γ , sed ad partes A, E , producta nimirum GA in Δ . faciet igitur secans planum in superficie conicæ sectionem, *Hyperbolam* dictam, vel ab eo quod anguli $B\Delta\Gamma$, $A\Delta Z$ excedant duos rectos, vel quod ΔEZ excedat verticem conicæ, & cum ipsa $A\Gamma$ extra

δοῖας ἡμικύκλιον γράψῃ. ὅταν δὲ τῆς περιφέρειας λάβῃς σημείον, καὶ ἀπ' αὐτοῦ χέδῃς τὴν ἀγώνος ἐπὶ τῷ ἀγώνιστῳ, ποιήσῃ τὸ περιελάττειν. ὁμοίως δὲ δοῖας αὐτοῖς, ἐάν τις ἐπιτάξῃ εὐρεῖν ἐκτὸς αὐτῆς σημείον, ἀπ' ὃ ἐπὶ αὐτῇ γράψῃ δὴ τὰ πέρατα τῆς αὐτοῖς ἴσαι ἵσονται ἀλλήλους. καὶ ἀπὸ τούτου εἰ μόνον ἐν σημείοις τὸ ποιῶν τὸ περιελάττειν, ἀλλὰ πᾶσι ἐν ἐπιγὰρ ἢ ἀπὸ τῆς διχοτομίας αὐτῆς ἴσους ἀγώνιστῳ. ἐάν γὰρ τῷ δοῖας αὐτοῖς διχα πᾶσι, καὶ ἀπὸ τῆς διχοτομίας αὐτῆς ἴσους ἀγώνιστῳ, ὅσον ἐπ' αὐτῆς λάβῃς σημείον ποιήσῃ τὸ ἐπιτάττειν. ὁμοίως καὶ γράψῃ αὐτῆς Ἀπολλώνιος ἐν τῷ ἀναλυομένῳ τῷ πρῶτον ὑποκειμένῳ.

Si semicirculus describatur, quodcumque in circumferentia sumptis punctum, & ab ipso perpendicularem ad diametrum duxeris, quod propositum est efficiet. Similiter autem data recta, si quis proponat invenire extra ipsam punctum à quo rectæ ad ejus extrema ductæ inter se æquales sint; etiam in hoc non unicum duntaxat est punctum problema efficiens, sed locus quem occupat recta à puncto medio rectæ datæ ad rectos angulos ducta. nam si data recta bifariam secetur, & ab eo puncto recta ad rectos ducatur angulos, quodcumque in ipsa sumptis punctum faciet illud quod proponebatur. Huic simile scribit Apollonius in *Loco Resoluto* subnexo.

Δύο δοθέντων σημείων ἐν ὀρθογώνῳ, καὶ λόγῳ δοθέντος ἀνίσου ἐκείνῳ· δευτέρῳ ὅστις ἐστὶν ὀρθογώνῳ γράψῃ κύκλον, ὅτε ταῖς ἀπὸ τῶν δοθέντων σημείων ὅστις περιφέρειαν ἔκκεν κύκλος κλειόμενος ἐκείνῳ λόγῳ ἔχῃ τὸ αὐτὸν τῷ δοθέντι.



Datis duobus punctis in plano, & data ratione inæqualium rectarum: potest in plano circulus describi, ita ut rectæ à datis punctis ad circumferentiam circuli inclinatæ habeant rationem eandem datæ rationi.

ΕΣΤΩ τὰ μὲν δοθέντα σημεία τὰ Α, Β, λόγος δὲ ὁ τῆς Γ πρὸς τῷ Δ, μείζονος ἢ ὅσης τῆς Γ. δὲ δὴ αὐτῶν τὸ ὀρθογώνον.

Επιτεταχθῶ ἡ ΑΒ, καὶ ἐκτεταχθῶ ὅστις τῷ πρὸς τῷ Β μέρει. Ἐγερῶνται ὡς ἡ Δ πρὸς τῇ Γ ἢ Γ πρὸς αὐτῇ τινὰ, μείζονα δηλονότι τῆς Δ, ἢ ἔστω εἰς τὸν πρὸς τῇ ΕΔ. καὶ πάλιν γοημέτω ὡς ἡ Ε πρὸς τῷ ΑΒ ἢ Δ πρὸς τῷ ΒΖ, καὶ ἡ Γ πρὸς τῷ Η. Φανερόν δὲ καὶ ὅτι ἡ Γ μείζονα ἀνάλογον ἐστὶ τῇ ΕΔ ἢ τῇ Δ, καὶ ἡ Η τῇ ΑΖ, ΖΒ, καὶ μὲν κέντρον τῷ Ζ, ἀγώνιστῳ δὲ τῇ Η κύκλος γοηρόφθω ὁ ΚΘ. Φανερόν δὲ ὅτι τίμνει ἡ ΚΘ περιφέρειαν τῷ ΑΒ ἐκείνῳ ἢ ὅτι Η ἀνάλογον ἐστὶ τῶν ΑΖ, ΖΒ. εἰλήφθω δὲ ὅτι τῇ περιφέρειᾳ τυχὼν σημείον τὸ Θ, καὶ ἐπιτεταχθῶσι αἱ ΘΑ, ΘΒ, ΘΖ. ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΘΖ τῇ Η, καὶ ἀπὸ τούτου ὡς ἡ ΑΖ πρὸς τῷ ΖΘ ἢ ΘΖ πρὸς τῷ ΖΒ, καὶ ὡς τῇ αὐτῇ γωνίᾳ τῷ ὑπὸ Θ ΖΒ ἀνάλογον ἐστὶν ὁμοίον ἄρα ἐστὶν τὸ ΑΖΘ τῷ ΘΖΒ τρίγωνον, καὶ ἴση ἡ ὑπὸ ΖΘΒ γωνία τῇ ὑπὸ Θ ΑΒ. ἡ δὲ ΑΒ δὲ ἀπὸ τῇ Β τῇ ΑΘ ὁ κύκλος ἢ ΒΑ. ἐπεὶ ἐν ἐστὶν ὡς ἡ ΑΖ πρὸς ΖΘ ἢ ΘΖ πρὸς ΖΒ, καὶ ὡς ἄρα πρὸς τῇ ΑΖ πρὸς τῇ ΖΒ ἔστω τὸ δὸτὸ ΑΖ πρὸς τὸ δὸτὸ ΘΖ. ἀλλ' ὡς ἡ ΑΖ πρὸς ΖΒ ἔστω ἡ ΑΘ πρὸς ΒΑ. καὶ ὡς ἄρα τὸ δὸτὸ ΑΖ πρὸς τὸ δὸτὸ ΖΘ ἔστω ἡ ΑΘ πρὸς ΒΑ. πάλιν ἐπεὶ ἴση

SINT data puncta A, B; ratio autem data, quam habet Γ ad Δ, sitque Γ major: & oporteat facere illud quod propositum est.

Jungatur ΑΒ, & ad partes Β producat. & fiat ut Δ ad Γ ita Γ ad aliam majorem quam Δ; sitque Ε. & ad Ε, Δ simul. rursus fiat ut Ε ad ΑΒ ita Δ ad ΒΖ, & Γ ad Η: patet igitur Γ mediam proportionalem esse inter ΕΔ & Δ; itemque Η mediam proportionalem inter ΑΖ, ΖΒ*. quare si centro Ζ & intervallo Η circulus ΚΘ describatur, circumferentia ΚΘ rectam ΑΒ secabit; nam recta Η est media proportionalis inter ΑΖ, ΖΒ. Sumatur in circumferentia quodvis punctum Θ, & jungantur ΘΑ, ΘΒ, ΘΖ; erit igitur ΘΖ ipsi Η æqualis, & propterea ut ΑΖ ad ΖΘ ita ΘΖ ad ΖΒ. sunt autem circa eundem angulum Θ Ζ Β latera proportionalia: ergo [per 6. 6.] triangu-



lum ΑΖΘ simile est triangulo ΘΖΒ, & angulus ΖΘΒ angulo ΘΑΒ æqualis. ducatur per Β ipsi ΑΘ parallela ΒΑ. & quoniam ut ΑΖ ad ΖΘ ita est ΘΖ ad ΖΒ; erit [per cor. 20. 6.] prima ΑΖ ad tertiam ΖΒ ut quadratum ex ΑΖ ad quadratum ex ΘΖ. sed [per 4. 6.] ut ΑΖ ad ΖΒ ita ΑΘ ad ΒΑ: ergo ut quadratum ex ΑΖ ad quadratum ex ΖΘ ita ΑΘ ad ΒΑ. rursus quoniam angulus ΖΘΒ

* Quoniam [per constr.] Ε est ad ΑΒ ut Δ ad ΒΖ; erit [per 12. 5.] ΕΔ ad ΑΖ ut Δ ad ΒΖ. Sed Δ est ad ΒΖ [per constr.] ut Γ ad Η: & ideo ΕΔ est ad ΑΖ ut Γ ad Η; unde [per 4. & 16. 5.] Γ est ad ΕΔ ut Η ad ΑΖ. Rursus [per constr.] Γ est ad ΕΔ ut Δ ad Γ & ut ΒΖ ad Η: ergo ΒΖ est ad Η ut Η ad ΑΖ.

ΒΘΖ

$B \Theta Z$ æqualis est angulo $\Theta A B$; & angulus $A \Theta B$ [per 29.1.] angulo $\Theta B \Lambda$ æqualis, alterni enim sunt: & reliquus reliquo æqualis erit, & triangulum $A \Theta B$ simile triangulo $\Theta B \Lambda$. quare [per 4. 6.] latera quæ circum æquales angulos proportionalia sunt; videlicet ut $A \Theta$ ad ΘB ita ΘB ad $B \Lambda$, & ut quadratum ex $A \Theta$ ad quadratum ex ΘB ita $A \Theta$ ad $B \Lambda$. erat autem ut $A \Theta$ ad $B \Lambda$ ita quadratum ex $A Z$ ad quadratum ex $Z \Theta$: ut igitur quadratum ex $A Z$ ad quadratum ex $Z \Theta$ ita [per 11. 5.] quadratum ex $A \Theta$ ad quadratum ex ΘB , & idcirco ut $A Z$ ad $Z \Theta$ ita $A \Theta$ ad ΘB . Sed [ex supra ostensis] ut $A Z$ ad $Z \Theta$ ita $E \Delta$ ad Γ , & Γ ad Δ : ergo ut Γ ad Δ ita $A \Theta$ ad ΘB . Similiter ostendetur omnes alias rectas, quæ à punctis A, B ad circumferentiam circuli inclinantur, eandem rationem habere quam habet Γ ad Δ .

Dico porro si à punctis A, B ducantur rectæ ad punctum quod non sit in circumferentia circuli, ipsarum non eandem esse rationem quæ est Γ ad Δ . nam si esse potest, factum sit jam illud ad punctum M , quod extra circumferentiam sumatur (eo enim intra sumpto, idem absurdum sequetur) & junctis $M A, M B, M Z$, ut est Γ ad Δ ita supponatur esse $A M$ ad $M B$. ergo [per cor. 20.6.] ut $E \Delta$ ad Δ ita quadratum ex $E \Delta$ ad quadratum ex Γ , & quadratum ex $A M$ ad quadratum ex $M B$ *. ut autem $E \Delta$ ad Δ ita posita est $A Z$ ad $Z B$: quare ut $A Z$ ad $Z B$ ita quadratum ex $A M$ ad quadratum ex $M B$. & ex iis quæ sunt superius dicta, si à puncto B ducatur recta ipsi $A M$ parallela; ut $A Z$ ad $Z B$ ita demonstrabitur quadratum ex $A Z$ ad quadratum ex $Z M$. Sed modo demonstratum est ut $A Z$ ad $Z B$ ita quadratum ex $A Z$ ad quadratum ex $Z \Theta$: ergo $Z \Theta$ ipsi $Z M$ est æqualis. quod est impossibile.

Loci igitur plani ejusmodi sunt. *Solidi* vero *Loci* appellantur ex eo quod lineæ, per quas ipsorum problemata construuntur, à solidorum sectione generationem habent, quales sunt coni sectiones, & complures alie. Sunt & alii *Loci ad Superficiem* dicti, quibus ex eorum proprietate nomen impositum est. Invenitur deinde *Apollonius* in *Euclidem*, non, ut *Pappus* & alii nonnulli arbitrantur, quod duas medias proportionales non invenerit: siquidem *Euclides* recte invenit unam mediam proportionalem, & non infelicitur, ut ipse inquit; duas vero proportionales medias neque omnino in elementis investigare aggressus est, & *Apollonius* de duabus mediis proportionalibus in tertio libro nihil inquirere videtur: sed, ut verisimile est, *Euclides* in alio libro de *Loci* conscripto, qui ad nos non pervenerit, reprehendit. Quæ vero deinceps subjungit de quarto libro perspicua sunt. Quintus, inquit, liber de minimis & maximis magna ex parte agit. Quemadmodum enim in elementis [ad 7. & 8. 3.] didicimus, si ab aliquo puncto in circumulum rectæ ducantur, earum quidem quæ ad concavam ipsius circumferentiam pertingunt, maximam esse quæ per centrum transit; earum vero quæ ad convexam, minimam esse quæ inter dictum punctum & diametrum interjicitur: ita & de coni sectionibus in quinto libro inquirat. Sexti, septimi, & octavi libri propositum manifeste ab ipso *Apollonio* explicatur. Et hæc de epistola dicta sunt.

* Ex hypothesi enim est $A M$ ad $M B$ ut Γ ad Δ ; & ideo quadratum ex $A M$ ad quadratum ex $M B$ est ut quadratum ex Γ ad quadratum ex Δ , hoc est (ut supra ostensum) ut $E \Delta$ ad Δ .

ἐστὶν ἡ ὑποῦ $B \Theta Z$ τῇ ὑποῦ $\Theta A B$, ἐστὶ δὲ καὶ ἡ ὑποῦ $A \Theta B$ τῇ ὑποῦ $\Theta B \Lambda$ ἴση, ἐναλλάξ γάρ· καὶ ἡ λοιπὴ ἄρα τῇ λοιπῇ ἴση ἐστὶν, καὶ ὁμοίον ἐστὶ τὸ $A \Theta B$ τῷ $\Theta B \Lambda$. καὶ ἀνάλογόν εἰσιν αἱ πλευραὶ αἱ πρὸς τὰς ἴσας γωνίας, ὡς ἄρα ἡ $A \Theta$ πρὸς ΘB ἢ ΘB πρὸς $B \Lambda$, καὶ ὡς τὸ δὸτὸ $A \Theta$ πρὸς τὸ δὸτὸ ΘB ἢ $A \Theta$ πρὸς $B \Lambda$. ὡς δὲ ἡ ΘA πρὸς $B \Lambda$ τὸ δὸτὸ $A Z$ πρὸς τὸ δὸτὸ $Z \Theta$ · ὡς ἄρα τὸ δὸτὸ $A Z$ πρὸς τὸ δὸτὸ $Z \Theta$ ἔτω τὸ δὸτὸ $A \Theta$ πρὸς τὸ δὸτὸ ΘB , καὶ ἀφ' ἧς ἔστω ὡς ἡ $A Z$ πρὸς $Z \Theta$ ἢ $A \Theta$ πρὸς ΘB . ἀλλ' ὡς ἡ $A Z$ πρὸς $Z \Theta$ ἢ $E \Delta$ πρὸς Γ , καὶ ἡ Γ πρὸς Δ . ἔστω ἄρα ἡ Γ πρὸς Δ ἢ $A \Theta$ πρὸς ΘB . ὁμοίως δὲ δευχθήσεται πᾶσαι αἱ δὸτὸ $\Gamma A, B$ σημείων ὅτι πλὴν περιφέρειαν ἔκφυγαν κλῶμεναι τὸ αὐτὸν ἔχουσαι λόγον ταύς Γ, Δ .

Λέγω δὲ ὅτι πρὸς ἄλλω σημείω μὴ ὄντι ὅτι περιφέρειας ἔχουσαι λόγος τὸ δὸτὸ A, B σημείων ἐπ' αὐτὸ ὅτι ἀγνυμένων εὐθειῶν ὁ αὐτὸς τῷ τῆς Γ πρὸς Δ . εἰ γὰρ δυνατὸν, γιγνώσκω πρὸς τῷ M ἔκτος τὴν περιφέρειαν, (καὶ γὰρ εἰ ἔκτος λεγθήσεται τὸ αὐτὸ ἄπειρον συμβῆσθαι καὶ εἴτερον τῶν ὑποθέσεων) ἔπειτα ἔχουσιν αἱ $M A, M B, M Z$, καὶ ὑποκείσθω ὡς ἡ Γ πρὸς Δ ἔστω ἢ $A M$ πρὸς $M B$. ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ $E \Delta$ πρὸς Δ ἔστω τὸ δὸτὸ $E \Delta$ πρὸς τὸ δὸτὸ Γ , καὶ τὸ δὸτὸ $A M$ πρὸς τὸ δὸτὸ $M B$ *. ἀλλ' ὡς ἡ $E \Delta$ πρὸς Δ ἔστω ὑποκείσθω ἢ $A Z$ πρὸς $Z B$. καὶ ὡς ἄρα ἡ $A Z$ πρὸς $Z B$ ἔστω τὸ δὸτὸ $A M$ πρὸς τὸ δὸτὸ $M B$. ἔστι δὲ τὰς προδοχθέντων, εἰαν δὸτὸ $E B$ τῇ $A M$ ὡς ἀλλήλων ἀνάλογον, δευχθήσεται ὡς ἡ $A Z$ πρὸς $Z B$ ἔστω τὸ δὸτὸ $A Z$ πρὸς τὸ δὸτὸ $Z M$. ἐδεύχθη δὲ καὶ ὡς ἡ $A Z$ πρὸς $Z B$ ἔστω τὸ δὸτὸ $A Z$ πρὸς τὸ δὸτὸ $Z \Theta$. ἴση ἄρα ἡ $Z \Theta$ τῇ $Z M$. ὅπερ ἀδυνατον.

Τῶτοι ἔν ἐπιπλοῖ λέγον· τὰ πᾶσι. Οἱ λεγόμενοι στεροὶ τύποι πλὴν περιουσιάζονται ἐκείνους, ἀπὸ τῆς καμμένης δὲ ὅν χάρονται τὰ καὶ αὐτὸς περιουσιάζονται ἐκ τῆς καμμένης τῆς στεροῦς καὶ γίνονται ἔχον, οἳ αἱ εἰσὶν αἱ τῶ καμμένης καὶ ἔστω πλείους. οἳ δὲ καὶ ἄλλοι, τύποι πρὸς ὁποῖον λεγόμενοι, οἱ πλὴν περιουσιάζονται ἐκείνους ἀπὸ τῆς καμμένης ἰδιότητος. Μένονται δὲ ἔξω τῇ Εὐκλείδῃ, ἐκ ὧς οἳ Πάππος καὶ ἔστω εἰς πᾶσι, ἀφ' ἧς τὸ μὴ εὐκλείδῃ δύο μέσων ἀνάλογον· ὁ πρὸς Εὐκλείδῃς ἴσως εἴρηκε τὴν μίαν μέσων ἀνάλογον, ἀλλ' ἐκ ὧς αὐτὸς φησὶ, ἐκ εὐκλείδῃς, πρὸς τῇ δὲ δύο μέσων ἐδ' ὅπως δευχθήσεται (ἡ πᾶσι ἐν τῇ στοιχειώσει· ὁ πρὸς αὐτῇ Ἀπολλωνίῳ ἐδ' ἐν πρὸς τῇ δύο μέσων ἀνάλογον φαίνεται) (ἡ πᾶσι ἐν τῇ στοιχειώσει βιβλίῳ· ἀλλ' ὡς εἰσὶν ἐν τῇ βιβλίῳ πρὸς τῇ πᾶσι γινώσκονται τῇ Εὐκλείδῃ ὁποῖον πρὸς εἰς ἡμᾶς ἔφασκεν. τὰ δὲ ἐκείνους πρὸς τῇ πᾶσι βιβλίῳ λεγόμενα σαφῶς ἐστὶν. τὸ δὲ πᾶσι φησὶ ἀπὸ τῆς πρὸς τῇ ἐλαχίστην καὶ μέγιστην. ὡς γὰρ ὅτι τὸ κύκλου ἐμάδομεν ἐν τῇ στοιχειώσει, ὅτι ἐστὶ π σημείον ἀπὸ τῆς πρὸς τῇ καὶ ἰσὺς περιφέρειαν περιουσιάζονται μέγιστην ἐστὶν ἢ ἀφ' ἧς καίτοι, τὸ δὲ πρὸς πλὴν κυρτῶν ἐλαχίστην ἐστὶν ἢ μετὰ τῇ σημείν καὶ ἀφ' ἧς. ἔστω καὶ ὅτι τὸ π καμμένης φησὶ ἐν τῇ πᾶσι βιβλίῳ· τὸ ἔκτος καὶ ἐδ' ὅπως καὶ ὁ γὰρ βιβλίῳ σαφῶς ἢ πρὸς τῇ αὐτῇ εἴρηται. καὶ ταῦτα μὲν πρὸς τῇ ὁποῖον.

ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΙ.

DEFINITIONES PRIMÆ.

- α'. **Ε**ΑΝ ἀπὸ πινος σημείου πρὸς κύκλῳ περιφέρωμαι, ὅς ἐκ ἐπὶ ἐν τῷ αὐτῷ ὀριπτεῖον τῷ σημείῳ, εὐθεῖα ὀριπτεῖον ἐφ' ἑκάτερα πρὸς ἀπὸ ἀλλήλων, καὶ μέντοις ὁ σημείον ἢ εὐθεῖα πρὸς τὴν κύκλῳ περιφέρωμαι εἰς τὸ αὐτὸ πάλιν ἀποκατασταθῇ, ὅθι ἤρξατο φέρειν. καὶ γραφθεῖσαι ὑπὸ τῆς εὐθείας ὀριπτεῖον, ἢ σύγκειται ἐκ δύο ὀριπτεῖων καὶ κορυφῇ ἀλλήλων κειμένη, ἐν ἑκαστῇ εἰς ἀπὸ αὐτῆς, καὶ γραφθεῖσαι εὐθείας εἰς ἀπὸ αὐτῆς πρὸς ἀλλοιούσης, καλῶ κορυφῇ ὀριπτεῖον.
- β'. Κορυφῇ δὲ αὐτῆς, τὸ μεμνημένον σημείον.
- γ'. Αἵονα δὲ, τὴν ἀπὸ τῆς σημείου καὶ τῆς κέντρος τῆς κύκλῳ ἀπορρομένη εὐθεῖαν.
- δ'. Κῶνοι δὲ, τὸ περιγόμενον σχῆμα ὑπὸ τῆς κύκλῳ καὶ τῆς μεταξὺ τῆς κορυφῆς καὶ τῆς κύκλῳ περιφέρειας κατωῖς ὀριπτεῖον.
- ε'. Κορυφῇ δὲ τῆς κῶνος, τὸ σημείον ὃ καὶ τῆς ὀριπτεῖον ὀριπτεῖον.
- ς'. Αἵονα δὲ, τὴν ἀπὸ τῆς κορυφῆς ὀριπτεῖον τὸ κέντρον τῆς κύκλῳ ἀπορρομένη εὐθεῖαν.
- ζ'. Βάσις δὲ, τὸ κύκλον.
- η'. Ὀρθὸς μὲν καλῶ, τὸς πρὸς ὀρθὰς ἔχοντας ταῖς βάσεις τὸς αἵονας.
- θ'. Σχεληπὸς δὲ, τὸς μὴ πρὸς ὀρθὰς ἔχοντας ταῖς βάσεις τὸς αἵονας.
- ι'. Πάσης καμπύλης γραμμῆς, ἥτις ὅθι ἐν ἐν ὀριπτεῖον, ἀφ' ἑκάτερον μὲν καλῶ εὐθεῖαν, ἥτις ἡγεμένη ἀπὸ τῆς καμπύλης γραμμῆς πάσας ταῖς ἀπορρομένας ἐν τῇ γραμμῇ εὐθείας, εὐθεῖαν τὴν πρὸς ἀλλήλους, δίχα διαμεῖ.
- ια'. Κορυφῇ δὲ τῆς καμπύλης γραμμῆς, τὸ πέραν τῆς εὐθείας τὸ πρὸς τῇ γραμμῇ.
- ιβ'. Τεταγμένους δὲ ὀριπτεῖον τὴν ἀφ' ἑκάτερον κατωῖς ἔχοντα πᾶσι πρὸς ἀλλήλους.
- ιγ'. Ὀμοίους δὲ καὶ δύο καμπύλων γραμμῶν, ἐν ἐν ὀριπτεῖον κειμένη, ἀφ' ἑκάτερον καλῶ πλαγίαι μὲν, ἥτις εὐθεῖα, τέμνουσαι ταῖς δύο γραμμὰς, πάσας ταῖς ἀπορρομένας ἐν ἑκάτερᾳ τῶν γραμμῶν πρὸς ἑκάτερα εὐθεῖαν δίχα τέμνει.
- ιδ'. Κορυφὰς δὲ τῶν γραμμῶν, τὰ πρὸς ταῖς γραμμῶν πέρατα τῆς ἀφ' ἑκάτερον.
- ιε'. Ὀρθίαν δὲ ἀφ' ἑκάτερον, εὐθεῖαν, ἥτις κα-

1. **S**I ab aliquo puncto ad circumferentiam circuli, qui non est in eodem plano in quo punctum, juncta recta linea in utramque partem producat, & manente puncto convertatur circa circuli circumferentiam, quousque ad eum locum redeat à quo coepit moveri; superficiem à recta descriptam, constantemque ex duabus superficiebus ad verticem inter sese aptatis, quarum utraque in infinitum augetur, (nimirum recta quæ eam describit in infinitum producta) voco conicam superficiem.
2. Verticem vero ejus, manens punctum.
3. Axem autem, rectam lineam quæ per punctum & centrum circuli ducitur.
4. Conum vero voco, figuram contentam circulo & conica superficie, quæ inter verticem & circuli circumferentiam interjicitur.
5. Verticem autem coni, punctum quod & superfici conicæ vertex est.
6. Axem vero, rectam lineam quæ à vertice ad circuli centrum ducitur.
7. Basim autem, circumulum ipsum.
8. Rectos quidem conos voco, qui axes habent ad rectos angulos ipsis basibus.
9. Scalenos vero, qui axes non ad rectos angulos ipsis basibus habent.
10. ^b Omnis curvæ lineæ, in uno plano existentis, diametrum voco rectam lineam; quæ quidem ducta à linea curvâ omnes rectas in ipsa ductas, cuidam rectæ parallelas, bifariam dividit.
11. Verticem autem curvæ lineæ, terminum rectæ qui est in ipsa linea.
12. Ordinatum vero ad diametrum applicari unamquamque rectarum parallelarum.
13. ^c Similiter & duarum curvarum linearum, in uno plano existentium, diametrum quidem transversam voco, rectam lineam; quæ, utramque lineam secans, rectas omnes in ipsis ductas, rectæ cuidam parallelas, bifariam dividit.
14. Vertices autem linearum, diametri terminos qui sunt in ipsis lineis.
15. Rectam vero diametrum, illam,

D

lam,

Εάν κώνυς σκαλυνῶ δὲ τὸ τὸ κορυφῆς ὅτι τὴν βάσιν ἀχθῶσιν εὐθεῖαι· πασῶν τὸ δὲ τὸ κορυφῆς ὅτι τὴν βάσιν ἀχθῶσιν εὐθεῖων μία μὲν ἐστὶ ἐλαχίστη, μία δὲ μέγιστη, δύο δὲ μόναι ἴσαι παρ' ἑκάτερα τὸ ἐλαχίστης καὶ τῆς μέγιστης, αἱ δὲ ἡ ἐγγίον τὸ ἐλαχίστης τὸ ἀπώτερον ἐστὶν ἐλάσσων.

Εἰς κώνυ σκαλυνῶς, ἡ βάσις μὲν ὁ $ΑΒΓ$ κύκλος, κορυφὴ δὲ τὸ $Δ$ σημεῖον. καὶ ἐπεὶ ἡ ἀπὸ τῆς κορυφῆς τοῦ σκαλυνῶ κώνυ ὅτι τὸ ὑποκείμενον ὀπίσθον κέντρον ἀγόμενον, ἡτοι ὅτι τῆς περιφέρειας τοῦ $ΑΒΓ$ κύκλου παρῆναι, ἡ ἐκτὸς, ἡ ἐντὸς· ἐμπλητὴν ὁρίσασθαι ὅτι τῆς περιφέρειας, ὡς ὅτι τὸ ἀπὸ τῆς καταγραφῆς ἡ $ΔΕ$, καὶ εἰσάγων τὸ κέντρον τοῦ κύκλου, καὶ ἔστω τὸ $Κ$, καὶ ἀπὸ τοῦ $Ε$ ὅτι τὸ $Κ$ ἐπιζεύχῃτο ἡ $ΕΚ$, καὶ ἐκτελεσθῇ ὅτι τὸ $Β$ · καὶ ἐπιζεύχῃτο ἡ $ΒΔ$, καὶ εἰσάγῃτο δύο ἴσαι περιφέρειαι παρ' ἑκάτερα τοῦ $Ε$, αἱ $ΖΕ$, $ΕΗ$, καὶ παρ' ἑκάτερα τοῦ $Β$ αἱ $ΑΒ$, $ΒΓ$, καὶ ἐπιζεύχῃτοσαν αἱ $ΖΕ$, $ΕΗ$, $ΔΖ$, $ΔΗ$, $ΕΑ$, $ΕΓ$, $ΑΒ$, $ΒΓ$, $ΔΑ$, $ΔΓ$. ἐπεὶ ἔν ἴση ὄντι ἡ $ΒΖ$ οὐθεία τῇ $ΕΗ$ οὐθείᾳ, ἴσαι γὰρ περιφέρειαι ὑποτίθενται, κοινὴ δὲ καὶ ὁρῶναι ἡ $ΔΕ$ · βάσις ἄρα ἡ $ΔΖ$ τῇ $ΔΗ$ ὄντι ἴση. πάλιν ἐπεὶ ἡ $ΑΒ$ περιφέρειαι τῇ $ΒΓ$ ὄντι ἴση, καὶ ἀξίωμα τὸ $ΒΕ$ · λοιπὴ ἄρα ἡ $ΑΖΕ$ τῇ $ΒΗΓ$ ὄντι ἴση· ὅτε καὶ ἡ $ΑΕ$ τῇ $ΕΓ$ · κοινὴ δὲ καὶ ὁρῶναι ἡ $ΔΕ$ · βάσις ἄρα ἡ $ΔΑ$ τῇ $ΔΓ$ ὄντι ἴση. ὁμοίως δὲ καὶ πᾶσαι διεχθῶσονται, ἴσων ἀπὸ τῆς $ΔΕ$ ἡ τῆς $ΔΒ$, ἴσαι. πάλιν ἐπεὶ περιγόμεναι ἡ $ΔΕΖ$ ὁρῶναι ὄντι γωνία ἡ ἀπὸ $ΔΕΖ$, μείζων ὄντι ἡ $ΔΖ$ τῆς $ΔΕ$. καὶ πάλιν μείζων ὄντι ἡ $ΕΑ$ οὐθεία τῆς $ΕΖ$, ἐπεὶ καὶ περιφέρειαι ἡ $ΕΖΑ$ τὴν $ΕΖ$ περιφέρειας, κοινὴ δὲ καὶ ὁρῶναι ὁρῶναι ἡ $ΔΕ$ · ἡ $ΔΖ$ ἄρα τὴν $ΔΑ$ ἐλάσσων ὄντι. ἀλλὰ τὰ αὐτὰ καὶ ἡ $ΔΑ$ τὴν $ΔΒ$ ἐλάσσων ὄντι. ἐπεὶ ἔν ἡ $ΔΕ$ τὴν $ΔΖ$ ἐλάσσων ἐδείχθη, ἡ δὲ $ΔΖ$ τὴν $ΔΑ$, ἡ δὲ $ΔΑ$ τὴν $ΔΒ$ · ἐλαχίστη μὲν ἐστὶν ἡ $ΔΕ$, μέγιστη δὲ ἡ $ΔΒ$, αἱ δὲ ἡ ἐγγίον τὴν $ΔΕ$ τῆς ἀπώτερον ἐλασσὸν ὄντι.


Ἀλλὰ δὲ ἡ κέντρον περιγόμεναι ἐκτὸς τοῦ $ΑΒΓ$ κύκλου, ὡς ἐπὶ τῆς διευτήρας καταγραφῆς ἡ $ΔΕ$ · καὶ εἰσάγων πάλιν τὸ κέντρον τὸ $Κ$, καὶ ἐπιζεύχῃτο ἡ $ΕΚ$, καὶ ἐκτελεσθῇ ὅτι τὸ $Β$, καὶ ἐπιζεύχῃτοσαν αἱ $ΔΒ$, $ΔΘ$. καὶ εἰσάγῃτοσαν δύο ἴσαι περιφέρειαι παρ' ἑκάτερα τὸ $Θ$, αἱ $ΟΖ$, $ΟΗ$, καὶ παρ' ἑκάτερα τοῦ $Β$, αἱ $ΑΒ$, $ΒΓ$, καὶ ἐπιζεύχῃτοσαν αἱ $ΕΖ$, $ΕΗ$, $ΖΚ$, $ΗΚ$, $ΔΖ$, $ΔΗ$, $ΑΒ$, $ΒΓ$, $ΚΑ$, $ΚΓ$, $ΔΑ$, $ΔΒ$, $ΔΓ$. ἐπεὶ ἔν ἴση ὄντι ἡ $ΟΖ$ περιφέρειαι τῇ $ΟΗ$, καὶ γωνία ἄρα ἡ ἀπὸ $ΟΚΖ$ τῇ ἀπὸ $ΟΚΗ$ ὄντι ἴση. ἐπεὶ ἔν ἡ $ΖΚ$ οὐθεία τῇ $ΚΗ$ ὄντι ἴση, ἐκ κέντρον γὰρ, κοινὴ δὲ ἡ $ΚΕ$ · βάσις ἄρα ἡ $ΖΕ$ τῇ $ΗΕ$ ὄντι ἴση. ἐπεὶ ἔν ἡ $ΖΕ$ οὐθεία τῇ $ΗΒ$ ὄντι ἴση, κοινὴ δὲ καὶ ὁρῶναι ἡ $ΕΔ$ · βάσις ἄρα ἡ $ΔΖ$ τῇ $ΔΗ$ ὄντι ἴση. πάλιν ἐπεὶ ἴση ὄντι ἡ $ΒΑ$ περιφέρειαι τῇ $ΒΓ$, καὶ γωνία ἄρα ἡ ἀπὸ $ΑΚΒ$ τῇ ἀπὸ $ΓΚΒ$ ὄντι ἴση· ὅτε καὶ λοιπὴ οἱς τὰς δύο ὁρῶναι ἡ ἀπὸ $ΑΚΕ$ λοιπὴ οἱς τὰς δύο ὁρῶναι τῇ ἀπὸ $ΓΚΕ$ ὄντι ἴση. ἐπεὶ ἔν ἡ $ΑΚ$ οὐθεία τῇ $ΓΚ$ ὄντι ἴση, ἐκ κέντρον γὰρ, κοινὴ δὲ ἡ $ΚΕ$, δύο διὸν ἴσαι,

Si à vertice conici scaleni ad basis circumferentiam rectæ ducantur: omnium rectarum à vertice ad basim ductarum una quidem minima, & una maxima erit; duæ vero tantum, ex utraque parte minimæ & maximæ, inter se æquales; at quæ propinquior est minimæ semper minor erit remotiore.

Sit conus scalenus, cujus basis $ΑΒΓ$ circulus, vertex autem punctum $Δ$. & quoniam recta, quæ à vertice conici scaleni ad subjectum planum perpendicularis ducitur, vel in circumferentiam circuli $ΑΒΓ$ cadet, vel extra, vel intra: cadat primum in ipsam circumferentiam, ut in prima figura ipsa $ΔΕ$; sumptoque circuli centro $Κ$, ab ipso $Ε$ ad $Κ$ ducatur $ΕΚ$, & producat ad $Β$: jungatur autem $ΒΔ$, & ex utraque parte puncti $Ε$ sumantur circumferentiæ duæ æquales $ΖΕ$, $ΕΗ$; itemque ex utraque parte $Β$ sumantur aliæ duæ æquales $ΑΒ$, $ΒΓ$; & jungantur $ΖΕ$, $ΕΗ$, $ΔΖ$, $ΔΗ$, $ΕΑ$, $ΕΓ$, $ΑΒ$, $ΒΓ$, $ΔΑ$, $ΔΓ$. quoniam igitur recta $ΕΖ$ [per 29. 3.] æqualis est ipsi $ΕΗ$, æquales enim circumferentias subtendunt; communis autem & ad rectos angulos $ΔΕ$: erit [per 4. 1.] basis $ΔΖ$ basi $ΔΗ$ æqualis. rursus quoniam circumferentia $ΑΒ$ æqualis est ipsi $ΒΓ$ circumferentiæ, & est $ΒΕ$ diameter circuli; reliqua $ΑΖΕ$ reliquæ $ΕΗΓ$ æqualis erit: quare & recta $ΑΒ$ ipsi $ΕΓ$. sed $ΔΒ$ communis est utrique, & ad rectos angulos: basis igitur $ΔΑ$ æqualis est basi $ΔΓ$. Similiter etiam demonstrabuntur inter se æquales quæcunque ab ipsa

$ΔΕ$ vel $ΔΒ$ æqualiter distant. rursus quoniam trianguli $ΔΕΖ$ angulus $ΔΕΖ$ rectus est, recta $ΔΖ$ [per 18. 1.] major erit quam $ΔΕ$. & rursus recta $ΕΑ$ major est quam $ΕΖ$, quoniam circumferentia $ΕΖΑ$ major est quam ipsa $ΕΖ$ circumferentia; communis vero & ad rectos angulos $ΔΕ$: basis $ΔΖ$ minor erit quam $ΔΑ$. eadem quoque ratione & $ΔΑ$ minor quam $ΔΒ$. quoniam igitur ostensa est $ΔΕ$ minor quam $ΔΖ$, itemque $ΔΖ$ minor quam $ΔΑ$, & $ΔΑ$ minor quam $ΔΒ$: ipsa quidem $ΔΕ$ minima est, $ΔΒ$ vero maxima, & ipsi $ΔΕ$ propinquior remotiori semper est minor.

Sed cadat perpendicularis extra circulum $ΑΒΓ$, ut in secunda figura $ΔΕ$; & rursus sumatur circuli centrum $Κ$, junctaque $ΕΚ$ producat ad $Β$, & jungantur $ΔΒ$, $ΔΘ$. Sumantur præterea duæ circumferentiæ æquales ex utraque parte puncti $Θ$, quæ sint $ΟΖ$, $ΟΗ$, & ex utraque parte ipsius $Β$ aliæ duæ sumantur $ΑΒ$, $ΒΓ$, & jungantur $ΕΖ$, $ΕΗ$, $ΖΚ$, $ΗΚ$, $ΔΖ$, $ΔΗ$, $ΑΒ$, $ΒΓ$, $ΚΑ$, $ΚΓ$, $ΔΑ$, $ΔΒ$, $ΔΓ$. itaque quoniam æqualis est circumferentia $ΟΖ$ ipsi $ΟΗ$, & angulus $ΟΚΖ$ angulo $ΟΚΗ$ [per 27. 3.] æqualis erit. Quoniam igitur recta $ΖΚ$ rectæ $ΚΗ$ est æqualis, (ex centro enim sunt,) & $ΚΕ$ communis: ergo basis $ΖΕ$ æqualis basi $ΗΕ$. quoniam igitur recta $ΖΕ$ est æqualis $ΗΕ$, communis vero & ad rectos angulos $ΕΔ$: basis $ΔΖ$ basi $ΔΗ$ est æqualis. rursus quoniam circumferentia $ΒΑ$ æqualis est $ΒΓ$, & angulus $ΑΚΒ$ ipsi $ΓΚΒ$; & reliquus ex duobus rectis $ΑΚΕ$ reliquo $ΓΚΕ$ æqualis erit. quoniam igitur $ΑΚ$, $ΓΚ$ inter se æquales sunt, (ex centro enim sunt,) communis vero $ΚΕ$, duæ duabus



$\Gamma\Xi, \text{EM}, \text{HK}, \Theta\Lambda, \text{ZN}, \Delta\text{O}$ ipsi AB parallelas bifariam secans, recta diameter dicitur. ordinatim ad diametrum ΠP applicetur unaquæque rectarum $\Gamma\Xi, \text{EM}, \text{HK}, \Theta\Lambda, \text{ZN}, \Delta\text{O}$. si bifariam & ad rectos angulos ipsam secet, rectus axis dicitur. at si rectæ $\text{AB}, \Pi\text{P}$ sibi invicem parallelas bifariam secuerint, conjugatæ diametri dicuntur. quod si bifariam & ad rectos angulos, conjugati axes vocantur.

$\Gamma\Xi, \text{EM}, \text{HK}, \Theta\Lambda, \text{ZN}, \Delta\text{O}$ ὁμοῦ ἑκατέρωθεν τῇ AB δίχα τέμνουν, ἡ δὲ $\mu\epsilon\tau\epsilon\sigma\tau\epsilon\iota\varsigma$ αὐτῶν ΠP ἀφ' ἑαυτῆς ὁμοῦ διχοτομῶν. ὅταν δὲ ἡ ΠP ἀφ' ἑαυτῆς ὁμοῦ διχοτομῶν καὶ αἱ $\Gamma\Xi, \text{EM}, \text{HK}, \Theta\Lambda, \text{ZN}, \Delta\text{O}$ ἀφ' ἑαυτῶν ὁμοῦ διχοτομῶν, ὁ ἀξὺς ὀρθὸς ἐστίν. ἂν δὲ αἱ $\text{AB}, \Pi\text{P}$ ἀφ' ἑαυτῶν ὁμοῦ διχοτομῶν καὶ αἱ $\Gamma\Xi, \text{EM}, \text{HK}, \Theta\Lambda, \text{ZN}, \Delta\text{O}$ ἀφ' ἑαυτῶν ὁμοῦ διχοτομῶν, λέγονται συζυγεῖς ἀξεῖς. ἂν δὲ ἡ AB καὶ ἡ ΠP ἀφ' ἑαυτῶν ὁμοῦ διχοτομῶν καὶ αἱ $\Gamma\Xi, \text{EM}, \text{HK}, \Theta\Lambda, \text{ZN}, \Delta\text{O}$ ἀφ' ἑαυτῶν ὁμοῦ διχοτομῶν, λέγονται συζυγεῖς ἀξεῖς ὁμοῦ.

PROP. I. Theor.

Rectæ lineæ, quæ à vertex superficiei conicæ, ad puncta quæ in superficiei sunt, ducuntur, in ipsa superficiei erunt.

SIT superficies conica, cujus vertex A , & sumpto in superficiei conica aliquo puncto B , jungatur recta AB ; recta AB in superficiei erit.


Si enim fieri posset, non sit in superficiei, & recta, quæ superficiem describit, sit ΔE ; cir-

ΠΡΟΤΑΣΙΣ α'.

Αἱ ἀπὸ τῆς κορυφῆς τῆς κοινῆς ὀπίφανείας ἀγόμεναι εὐθεῖαι ἐπὶ τὰ ἐν τῇ ὀπίφανείᾳ σημεῖα, ἐν τῇ ὀπίφανείᾳ εἰσὶν.

ΕΣΤΩ κοινὴ ὀπίφανεια, ἥς κορυφὴ τὸ A σημεῖον, καὶ εἰληφθῶσι σημεῖον ἐπὶ τῇ κοινῇ ὀπίφανείᾳ τὸ B , καὶ ἐπιζεύχῃται τὸ εὐθεῖα ἡ AB . εὐθεῖα ἡ AB ἐν τῇ ὀπίφανείᾳ εἴσιν.

Εἰ γὰρ δυνατὸν, μὴ εἴσιν, καὶ ἔστω ἡ περιγραφὴ τῆς ὀπίφανειας εὐθεῖα ἡ ΔE ὅ ἡ κοινὴ.



culus autem, in quo ipsa ΔE fertur, sit EZ . itaque, si manente A , feratur ΔE in circuli EZ circumferentia; per B punctum transibit, atque erunt duarum rectarum iidem termini: quod est absurdum. non igitur à puncto A ad B ducta recta extra superficiem est: ergo in ipsa superficiei erit. quod erat demonstrandum.

Corollarium.

Et constat, si à vertex ad aliquod punctum eorum, quæ intra superficiem sunt, recta ducatur, illam intra superficiem conicam; & si ad aliquod eorum quæ sunt extra, extra superficiem cadere.

καὶ ὅ ἡ ΔE , ὅ EZ . ἂν δὲ μένοντος E A σημεῖου, ἡ ΔE εὐθεῖα φέρηται κατὰ τὸ E EZ κύκλου περιφέρειαν, ἥτις καὶ διὰ B σημεῖου, καὶ ἔστω δὲ εὐθεῖα τὰ αὐτὰ πύματα ὑπὲρ ἀπ' αὐτῶν. ἐκ δὲ αὐτῶν ἡ ἀπὸ A ἐπὶ τὸ B ὀπίφανειαν εὐθεῖα ἐκ εἴςιν ἐν τῇ ὀπίφανείᾳ ἐν τῇ ὀπίφανείᾳ ἄρα εἴσιν.

Πόρρωμα.

Καὶ φανερόν ὅτι ἐὰν ἀπὸ τῆς κορυφῆς ὅτι π σημεῖον τῆς ἐν τῇ ὀπίφανείᾳ ὀπίφανειαν εὐθεῖα, ἐν τῇ κοινῇ ὀπίφανείᾳ. ἔστω δὲ ὅτι π σημεῖον τῆς ἐν τῇ ὀπίφανείᾳ, ἐκ τῆς ὀπίφανειας.

EUTOCIUS.

De figuris diversis vel casibus theorematum illud scire oportet, casum esse, quando ea quæ in propositione dantur positione data sunt: ipsorum enim differens transmutatio, eadem conclusione manente, casum facit. similiter etiam & à constructione transposita sit casus. cum igitur theorematum plures casus habeant, una eademque demonstratio omnibus congruit & iisdem elementis, præterquam in paucis quibusdam, ut deinceps explicabimus. statim nam-

Περὶ τῶν ἀποδείξεων ταυταχῶς, ἵνα πλείονας τῶν θεωρημάτων ποῦται ἴσως, ὅτι πλείονες μὲν εἰσι, ὅτι τὰ ἐν τῇ ἀποδείξει διδωμένα τῇ δυνάμει ἢ δυνάμει: ἢ γὰρ ἀποδείξεις αὐτῶν μεταλλάξας, καὶ αὐτὸ συμπέρασμα ὄντως, ποιεῖ τὴν πλείον. ὁμοίως δὲ καὶ ἂν τῶν ἀποδείξεων μεταπαραστήσῃς γινώσκων. πολλὰς δὲ πλείονας ἔχοντων τῶν θεωρημάτων, πλείονες ἢ αὐτὰ ἀποδείξεις ἀρμυζοῦν καὶ ὅτι τὰ αὐτὰ στοιχεῖα, πλείονα βραχέως, ὡς ἐξῆς εἰσάγειν. εὐθὺς

Si enim fieri potest, aliquod ipsius $E\Theta$ punctum, nempe Θ , non sit extra, & juncta $A\Theta$ producat; cadet hæc vel in ipsam circuli circumferentiam, vel intra; quod fieri non potest: cadit enim in $B\Gamma$ protractam, ut in K . quare $E\Theta$ extra conicam superficiem erit.

Recta igitur ΔE cadet intra conicam superficiem, & quæ est in directum ipsi, extra cadet. quod erat demonstrandum.

EUTOCIUS.

Secundum theorema tres habet casus, propterea quod sumpta puncta Δ , E sunt vel in superficie ad verticem, vel in inferiori; & id dupliciter, vel intra circulum, vel extra. sciendum autem est in quibusdam exemplaribus totum hoc theorema per argumentationem, quæ deducit ad absurdum, demonstrari.


PROP. III. Theor.

Si conus plano per verticem secetur, sectio triangulum erit.

SIT conus, cujus vertex A , basis autem circulus $B\Gamma$, & per A secetur plano aliquo quod sectiones faciat in superficie lineas quidem AB , AG , & in basi rectam $B\Gamma$: dico $AB\Gamma$ triangulum esse.

Quoniam enim à puncto A ad B ducta linea communis sectio est plani secantis, & superficiæ conicæ; erit [per 1. 1. huj.] AB recta linea. eadem ratione & ipsa AG . est autem [per 3. 11.] & $B\Gamma$ recta: quare $AB\Gamma$ est triangulum.

Si igitur conus plano secetur per verticem, sectio triangulum erit. quod erat demonstrandum.



EUTOCIUS.

Tertium theorema casum non habet. oportet autem scire lineam AB rectam esse, cum sit communis sectio plani secantis, & superficiæ conicæ, quæ à recta manentem terminum ad verticem habente describitur. neque enim omnis superficies secta plano facit sectionem rectam lineam; neque ipse conus, nisi planum secans per verticem transeat.

PROP. IV. Theor.

Si alterutra superficierum, quæ sunt ad verticem, plano secetur æquidistante circulo, per quem fertur recta superficiem describens: planum, quod superficiem concluditur, circulus erit centrum in axe habens; figura vero contenta circulo, & ea parte superficiæ conicæ quæ inter secans planum & verticem interjicitur, conus erit.

SIT conica superficies, cujus vertex A , circulus autem, in quo fertur recta superficiem

Εἰ γὰρ διωκτὸν, ἔσω τι αὐτῆς $E\Theta$ μὴ ἐκτὸς τῆς κωνικῆς ὀπταίνεσθαι, καὶ ὀπταίνεσθαι ἢ $A\Theta$ ἐκβεβλήθῃ περὶ δὴ ἢ ἐπὶ τῇ περιφέρειᾳ ἢ κύκλῳ, ἢ ἐντὸς· ὅπερ ἐστὶν ἀδιώκτων· πῶς γὰρ ὀπταίνεσθαι $B\Gamma$ ἐκβεβηλομένην, ὡς κατὰ τὸ K . ἢ $E\Theta$ ἄρα ἐκτὸς ἐστὶ τῆς ὀπταίνεσθαι.

Ἡ ἄρα ΔE ἐντὸς ἐστὶ τῆς κωνικῆς ὀπταίνεσθαι, καὶ ἢ ἐκ· εὐθείας αὐτῇ, ἐκτὸς. ὅπερ εἶδει δεῖξαι.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ γ'.

Εάν κωνὸς ὀπταίνεσθαι τμηθῇ ἀπὸ τῆς κορυφῆς, ἡ τομὴ τρίγωνόν ἐστι.

ΕΣΤΩ κωνὸς, ὃς κορυφὴ τὸ A σημεῖον, βάσις δὲ ὁ $B\Gamma$ κύκλος, ἐπιμήδῃ ὀπταίνεσθαι πνὶ διὰ τῆς A σημείας, ἐπιείτω τομῆς ὀπταίνεσθαι τῆς AB, AG γραμμῶν, ἐν τῇ τῇ βάσει τὴν $B\Gamma$ εὐθείαν· λέγω ὅτι τὸ $AB\Gamma$ τρίγωνόν ἐστι.

Επεὶ γὰρ ἡ διὰ τῆς A ὀπταίνεσθαι τῆς B ἐπιμήδῃ κοινὴ τομὴ ἐστὶ τῆς τμήνου τῆς ὀπταίνεσθαι, καὶ τῆς κωνῆς ὀπταίνεσθαι· εὐθεῖα ἄρα ἐστὶν ἡ AB . ὁμοίως δὲ καὶ ἡ AG . ἐστὶν ἡ καὶ ἡ $B\Gamma$ εὐθεῖα· τρίγωνον ἄρα ἐστὶ τὸ $AB\Gamma$.

Εάν ἄρα κωνὸς ὀπταίνεσθαι πνὶ τμηθῇ ἀπὸ τῆς κορυφῆς, ἡ τομὴ τρίγωνόν ἐστι. ὅπερ εἶδει δεῖξαι.

EUTOCIUS.

Τὸ τρίτον θεώρημα πῶς ἔχει. εἴ τι ἐν αὐτῇ ὀπταίνεσθαι ὅτι ἢ AB εὐθεῖα ἐστὶν, ἀπὸ τῆς κοινῆς τομῆς τῆς ὀπταίνεσθαι, καὶ τῆς ὀπταίνεσθαι κωνῆς, ὅτις ὑπὸ εὐθείας ἐξέρχεται πῶς ἔχουσιν μόνον πρὸς τῇ κορυφῇ τῆς ὀπταίνεσθαι. ἢ γὰρ πᾶσα ἐπιμήδῃ, ὑπὸ ἐπιμήδῃ τμηνομένη, τῇ τομῇ ποιῇ εὐθεῖαν· εἰ δὲ αὐτὸς ὁ κωνὸς, εἰ μὴ ἀπὸ τῆς κορυφῆς ἐλθὼν τῇ τμήνου ὀπταίνεσθαι.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ δ'.

Εάν ὀπταίνεσθαι τῇ κορυφῇ ὀπταίνεσθαι ὀπταίνεσθαι πνὶ τμηθῇ ἀπὸ τῆς κορυφῆς, καὶ τῇ περιφέρειᾳ ἢ γράψουσιν ὀπταίνεσθαι εὐθεῖαν· τὸ ἀπολαμβανόμενον ὀπταίνεσθαι μεταξὺ τῆς ὀπταίνεσθαι κύκλος ἐστὶ, τὸ κέντρον ἔχον ἐπὶ τῇ ἀξονι· τὸ δὲ περιεχόμενον σχῆμα ὑπὸ τῇ κύκλῳ, καὶ τῇ ἀπολαμβανόμενης ὑπὸ τῆς τμήνου τῆς ὀπταίνεσθαι κωνικῆς ὀπταίνεσθαι πρὸς τῇ κορυφῇ, κωνὸς ἐστὶ.




ΕΣΤΩ κωνικὴ ὀπταίνεσθαι, ἥς κορυφὴ μὲν τὸ A σημεῖον, ὃ δὲ κύκλος, καὶ τῇ περιφέρειᾳ ἢ γράψουσιν ὀπταίνεσθαι.

φάνειαν γραφουσα εὐθεΐα, ἡ ΒΓ, καὶ περὶ μέσῳ ὀπί-
πιδω πρὶν παραλλήλῳ τῷ ΒΓ κύκλῳ, ὃ ποιῶν ἐν τῇ
ἐπιφανείᾳ τμήνῳ ΔΕ γραμμὴν λέγω ὅτι ἡ ΔΕ
γραμμὴ κύκλος ἐστίν, ὅτι ὁ ἄξονος ἔχων τὸ κέντρον.

Εἰλήφθω γὰρ τὸ κέντρον τοῦ ΒΓ κύκλου τὸ Ζ, καὶ
ἐπιζεύχθω ἡ ΑΖ· ἄξων ἄρα ἐστίν, ὃ συμβαλλείτω τῷ
πέμνοντι ἐπιπέδῳ. συμβαλλείτω κατὰ τὸ Η, καὶ ἐκ-
βαλλείτω πρὸς ΔΓ τὸ ΑΖ ὀπίπιδον· ἔστω δὲ ἡ πε-
ρὶ τριγώνον τὸ ΑΒΓ. καὶ ἐπεὶ πρὸς Δ, Η, Ε σημεῖα
ἐν τῷ πέμνοντι ἐστὶν ἐπιπέδῳ, ἐστὶ καὶ ἐν τῷ ΒΓ
ἐπιπέδῳ· εὐθεΐα ἄρα ἐστὶν ἡ ΔΗΕ. εἰλήφθω δὲ
πρὸς σημείον ὅτι τὸ ΔΕ γραμμῆς, τὸ Θ, καὶ ἐπιζεύ-
χθῶσι ἡ ΑΘ ἐκβάλλωσιν· συμβαλλοῖ δὲ τῇ ΒΓ
περιφερείᾳ. συμβαλλείτω κατὰ τὸ Κ, καὶ ἐπιζεύχθω-

describens, sit ΒΓ, & secetur plano quovis ipsi
circulo ΒΓ æquidistante, atque sectionem faciat
in superficie lineam ΔΕ: dico lineam ΔΕ esse
circulum qui centrum in axe habet.

Sumatur enim centrum circuli ΒΓ, quod sit Ζ,
& ΑΖ jungatur: axis igitur [per 3. def. huj.] est
ΑΖ, & occurrit plano secanti. occurrat in Η, &
per rectam ΑΖ planum aliquod ducatur: erit igitur
[per 3. 1. huj.] sectio triangulum ΑΒΓ. &
quoniam puncta Δ, Η, Ε sunt & in plano se-
cante, & in ipso ΑΒΓ plano: ΔΗΕ erit [per 3.
11.] linea recta. sumatur autem in ipsa ΔΕ linea
punctum aliquod Θ, & juncta ΑΘ producat: occurrit
igitur circumferentiæ ΑΒΓ. occurrat in Κ, junganturque ΗΘ, ΖΚ. & quoniam duo plana



σιν αἱ ΗΘ, ΖΚ. καὶ ἐπεὶ δύο ὀπίπιδες ἀξόλληται,
πρὸς ΔΕ, ΒΓ, ὑπὸ ἐπιπέδῳ πρὸς τμήνῳ ΒΓ,
αἱ κοινὴ αὐτῶν τμήνῳ ἀξόλληται εἶσι· ἀξόλλη-
τος ἄρα ἐστὶν ἡ ΔΕ τῇ ΒΓ. Διὸ καὶ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ
ΗΘ τῇ ΖΚ ἀξόλληται· ἔστω ἄρα ὡς ἡ ΑΖ πρὸς
τὴν ΑΗ, ὅτως ἡ ΖΒ πρὸς ΗΔ, καὶ ἡ ΖΓ πρὸς
ΗΕ, καὶ ἡ ΖΚ πρὸς ΗΘ. καὶ εἰσὶν αἱ τρεῖς ΒΖ, ΚΖ,
ΖΓ ἰσὴν ἀλλήλαις· καὶ αἱ τρεῖς ἄρα αἱ ΔΗ, ΗΘ,
ΗΕ ἰσὴν εἰσὶν ἀλλήλαις. ὁμοίως δὲ δεῖξομεν ὅτι
ἡ ΑΘ αἱ δὲ ΑΘ αἱ σημεία πρὸς τὴν ΔΕ γραμμὴν
περὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας ἰσὴν ἀλλήλαις εἰσὶ. κύκλῳ
ἄρα ἐστὶν ἡ ΔΕ γραμμὴ, κέντρον ἔχων ἐπὶ τοῦ ἄξονος.

Πόρισμα.

Καὶ φανερόν ὅτι τὸ περὶ μέσῳ ὀπίπιδον ἀξίωμα ὑπὸ τοῦ
τοῦ ΔΕ κύκλου, καὶ τὸ ἀπολαμβανόμενης ὑπὸ αὐτοῦ
πρὸς τὴν Α σημείῳ κοινῆς ἐπιφανείας, κώνος ἐστίν. ὃ
συνεπεδείχθη, ὅτι ἡ κοινὴ τμήνῳ τμήνοντος ἐπιπέ-
δου ἐστὶ διὰ τοῦ ἄξονος τριγώνου ἀξόμετρος ἐστὶ
κύκλος.

EUTOCIUS.

Πάντες τὶς τῶν διαρημάτων τρεῖς εἰσιν, ὡς αὐτὸ πρό-
τε καὶ διηγήσατο.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Ε΄.

Εἰν κώνος σκαλινὸς ὅταν πρὸς τμήνῳ ΔΓ, ὃ ἄξο-
νος πρὸς ὀρθὰς τῇ βάσει, τμήνῳ δὲ καὶ ἐπὶ τῷ

Corollarium.

Constat [per 4. def. huj.] figuram contentam
circulo ΔΕ, & ea parte superficie conicæ quæ
inter dictum circulum & punctum Α interjici-
tur, conum esse. simulque demonstratum est,
communem sectionem plani secantis & trian-
guli per axem, diametrum esse ipsius circuli.

Casus hujus theorematism tres sunt, quemadmodum
& primi & secundi.


PROP. V. Theor.

Si conus scalenus plano per axem fece-
tur ad rectos angulos ipsi basi, fece-
turque

turque altero plano ad triangulum per axem recto, quod ex verticis parte triangulum abscindat simile ei quod per axem; subcontrarie vero positum: sectio circulus erit. vocetur autem hujusmodi sectio SUB-CONTRARIA.

SIT conus scalenus, cujus vertex A punctum, basis circulus BΓ, & secetur plano per axem ad circulum BΓ recto, atque faciat sectionem triangulum ABΓ; secetur autem & altero plano ad rectos angulos ipsi ABΓ, quod ex parte A triangulum abscindat AHK triangulo ABΓ simile, subcontrarie vero positum; ut videlicet angulus AKH æqualis sit ABΓ angulo, & faciat sectionem in superficie lineam HKΘ: dico ipsam HΘK circulum esse.

Sumantur enim in lineis HΘK, BΓ puncta quæpiam Θ, Λ, à quibus ad planum trianguli ABΓ, perpendiculares ducantur: cadent hæc [per 38.11.] in communes planorum sectiones. cadant ut ΘZ, ΛM. parallela est igitur [per 6.11.] ΘZ ipsi ΛM. ducatur autem per Z ipsi BΓ parallela ΔZE. est vero & ZΘ ipsi ΛM parallela: ergo [per 15.11.] planum quod per ZΘ, ΔE transit, æquidistans est basi ipsius coni: & idcirco [per 4.1. huj.] sectio ΔΘB circulus erit, cujus diameter ΔE: æquale est igitur rectangulum sub ΔZ, ZE quadrato ex ZΘ. & quoniam parallela est EΔ ipsi BΓ: angulus AΔE [per 29.1.] æqualis est angulo ABΓ. & ponitur angulus AKH angulo ABΓ æqualis: ergo & AKH ipsi AΔE æqualis erit. sunt autem [per 15.1.] & qui ad Z anguli æquales; sunt enim ad verticem: igitur [per 4.6.] ΔZH triangulum simile est triangulo KZE. igitur ut EZ ad ZK ita HZ ad ZΔ: rectangulum igitur BZΔ æquale est [per 16.6.] rectangulo KZH. sed rectangulum BZΔ (hoc est sub ΔZ, ZB) demonstratum est æquale quadrato ex ZΘ: ergo & rectangulum sub KZ, ZH eidem æquale erit. Similiter demonstrabuntur & omnes, quæ à linea HΘK ad ipsam HK perpendiculares ducuntur, posse æquale ei quod sub segmentis ipsius HK continetur. sectio igitur circulus est, cujus diameter [per 2. lem.] est HK.



ἑλπίδω παρὰ ὀρθὰς μὲν πρὸς ἀξὸς τε-
γώνω, ἀφανίστην δὲ παρὰ τῇ κορυφῇ τείγων
ἴμοιον μὲν πρὸς ἀξὸς τεγώνω, ὑπε-
ναντίως δὲ καίμοιον ἢ τὴν κίρκον ἐστὶ. κα-
λείσθω δὲ ἡ τοιαύτη τομὴ ΥΠΕΝΑΝΤΙΑ.

ΕΣΤΩ κώνος σκαλιῦς, ἡ κορυφὴ μὲν τὸ Α σημείον, βάσις δὲ ΒΓ κύκλος, ἡ περὶ ἡμῶν ἑλπίδω ἀξὸς ὀρθῶς πρὸς τὸ ΒΓ κύκλον, καὶ περὶ ἡμῶν πρὸς τὸ ΑΒΓ τρίγωνον, ἡ περὶ ἡμῶν δὲ καὶ ἐπὶ ἡμῶν πρὸς ὀρθὰς ὅτι τῷ ΑΒΓ τεγώνω, ἀφανίστην δὲ τείγων πρὸς τῷ Α σημείῳ τὸ ΑΗΚ ἴμοιον μὲν τῷ ΑΒΓ τεγώνω, ὑπεναντίως δὲ καίμοιον, ταῦτα, ὥστε ἴσῃ εἶναι τὴν ὑπὸ ΑΚΗ γωνίαν τῇ ὑπὸ ΑΒΓ, ἡ περὶ ἡμῶν ἐν τῇ ἑλπί-
φανείᾳ τὸ ΗΚΘ γραμμῇ. λέγω ὅτι κύκλος ἐστὶν ἡ ΗΘΚ γραμμῇ.

Εἰλήφθω γάρ τινα σημεία ἐπὶ τῇ ΗΘΚ, ΒΓ γραμμῶν, τὰ Θ, Λ, καὶ δὸς τῷ Θ, Λ σημείων ἐπὶ τὸ διὰ τῷ ΑΒΓ τεγώνω ἑλπίδω καθετοὶ ἡχθώ-
σιν· πρὸς τὴν δὲ τῇ τὰς κοινὰς τομὰς τῇ ἑλπί-
δω. περὶ ἡμῶν ὡς αἱ ΘΖ, ΛΜ. ὁ ὁμοῦλος
ἀρα ἐστὶν ἡ ΘΖ τῇ ΛΜ. ἡχθὼ δὲ δι' αὐτὰς Ζ τῇ ΒΓ
ὁμοῦλος ἡ ΔΖΕ. ἐστὶ δὲ καὶ ἡ ΖΘ τῇ ΛΜ πα-
ράλληλος· τὸ ἀρα διὰ τῷ ΖΘ, ΔΕ
ἑλπίδω ὁμοῦλος ἐστὶ τῇ βάσει
ἡ κώνος· κύκλος ἀρα ἐστὶν ἡ τομὴ, ἡ
ἀξὸς ἡ ΔΕ· ἴσῃ ἀρα τὸ ὑπὸ
τῷ ΔΖ, ΖΕ τῷ δὸς τῷ ΖΘ. καὶ ἐπεὶ
ὁμοῦλος ἐστὶν ἡ ΕΔ τῇ ΒΓ· ἡ
ὑπὸ ΑΔΕ γωνία ἴση ἐστὶ τῇ ὑπὸ
ΑΒΓ. ἡ δὲ ὑπὸ ΑΚΗ τῇ ὑπὸ
ΑΒΓ ὑπεκκείνη ἴση· καὶ ἡ ὑπὸ
ΑΚΗ ἀρα τῇ ὑπὸ ΑΔΕ ἐστὶν ἴση.
εἰσὶ δὲ καὶ αἱ πρὸς τῷ Ζ σημεία
ἴσα, κατὰ κορυφὴν γάρ· ὁμοῦλον
ἀρα ἐστὶ τὸ ΔΖΗ τρίγωνον τῷ
ΚΖΕ τεγώνω. ἐστὶν ἀρα ὡς ἡ ΕΖ
πρὸς τὴν ΖΚ ὅτως ἡ ΗΖ πρὸς
ΖΔ· τὸ ἀρα ὑπὸ τῷ ΕΖΔ ἴσῃ ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῷ
ΚΖΗ. ἀλλὰ τὸ ὑπὸ τῷ ΕΖΔ (ταῦτα τὸ ὑπὸ τῷ
ΔΖ, ΖΕ) ἴσῃ εἰδείχθη τῷ δὸς τῷ ΖΘ. ἡ δὲ ὑπὸ τῷ
ΚΖ, ΖΗ ἀρα ἴσῃ ἐστὶ τῷ δὸς τῷ ΖΘ. ὁμοῦλος δὲ
δεσχεῖται· ἡ πᾶσαι αἱ δὸς τῷ ΗΘΚ γραμμῇ
τὴν ΗΚ ἡγούμεναι καθετοὶ ἴσῃ διωάμηναι τῷ ὑπὸ
τῷ τμήματων τῷ ΗΚ. ὁ κύκλος ἀρα ἐστὶν ἡ τομὴ, ἡ
διὰ μέρους ἡ ΗΚ.

EUTOCIUS.

Quintum theorema casum non habet. Exordiens autem Apollonius expositionem, "Secetur, inquit, conus per axem plano ad basim recto. Sed quoniam in cono scaleno, juxta unicam solummodo positionem triangulum per axem ad basim rectum est, hoc ita faciemus. Sumentes namque basis centrum, ab eo erigemus rectam ad rectos angulos ipsi pla-

Τὸ πέμπτον διόρημα πῶς ἐκ τῆς ἀρχῆς διὰ τὴν
δίωσιν, φασὶ, "Τετμήσθω ὁ κώνος ἑλπίδω διὰ τῆς
ἀξὸς ὀρθῶς πρὸς τὴν βάσιν. Ἐπειδὴ δὲ ἐν τῷ σκαλιῷ
κόνω, κατὰ μίαν μόνον δίωσιν τὸ διὰ τῆς ἀξὸς τείγων
ὀρθὸν ἐστὶ πρὸς τῇ βάσει, τότε ποιήσμεν ὅτι. λαβόντες τὸ κέν-
τρον τῆς βάσεως, ἀναστήσμεν ἀπ' αὐτοῦ τὴν ἑλπίδω τῆς βάσεως
πρὸς

αὐτοὺς ὁρᾷς, καὶ δι' αὐτῆς καὶ τῷ ἄδελφῳ ἐκδόδοις ἐν ἡμῶν
 ἔχομεν τὸ ζῆλον. ἡ δὲ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ καὶ ἐν τῇ
 τῇ Εὐκλείδῃ φοιτῶντας, ὅτι αὐτὴ οὐδὲν ἐν ἡμῶν
 ὁρᾷς ἢ, καὶ πάντα τὰ δι' αὐτῆς ἐν ἡμῶν καὶ αὐτῇ
 αὐτοὺς ὁρᾷς ἐσθλῶν. τῇ δὲ καὶ πᾶσι τοῖς ἐν ἡμῶν
 καὶ ἰσοσταθεῖ τὸ παρὰ τὸν αὐτὸν ἐν ἡμῶν, ἐπειδὴ ἐν
 τῇ καὶ πᾶσι τοῖς ἐν ἡμῶν τῇ βίᾳ ἐν ἡμῶν καὶ
 πᾶσι τοῖς ἐν ἡμῶν τὸ αὐτὸ ἐσθλόν.

Επ' αὐτοῦ, ὁ Τετράγωνος ἐπέκεινται ἐπὶ τῷ πλάτῳ πρὸς ὁ-
ρῶναι μὲν τῷ Διὰ τ' ἄξονος τεύγων, ἀφαιρῶντι τὴν
πρὸς τῇ κορυφῇ τεύγων ὁμοιον μὲν τῷ ΑΒΓ τρι-
γώνῳ, ὑποεναντίως δὲ κείμενον. τὸ τ' ἵσιν ἔσται.
ἔσω τὸ Διὰ τ' ἄξονος τεύγων τὸ ΑΒΓ, καὶ εἰληρῶν ὅτι τ'
ΑΒ πλὴν σημείον τὸ Η, καὶ συνεχίστω πρὸς τῇ ΑΗ εὐθείᾳ,
καὶ τὴν πρὸς αὐτῇ σημείῃ τῷ Η, τῇ ὑπο ΑΓΒ γωνίᾳ ἴση ἢ
ὑπο ΑΗΚ· τὸ ΑΗΚ ἄρα τεύγων τῷ ΑΒΓ ὁμοιον
μὲν ὄντι, ὑποεναντίως δὲ κείμενον. εἰληρῶν δὲ ὅτι τ' ΗΚ
πλὴν σημείον τὸ Ζ, καὶ ἀπὸ τ' Ζ τῇ τ' ΑΒΓ πείγων ἐπιπλάτῃ
πρὸς ὁρῶναι ἀνίσταται ἡ ΖΘ, καὶ ἐκβεβλήσας τὸ Διὰ τ' ΗΚ,
ΘΖ ἐπιπλάτῃ. οὗτο δὴ ὁρῶν ὄντι πρὸς τὸ ΑΒΓ τεύγων,
Διὰ τ' ΖΘ, καὶ πῶν τὸ συνεχείμενον.

Εν τῇ συμπέραςματι φησιν, ὅτι διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν ΔΖΗ, ΕΖΚ πριζόνων, ἡ ἴσην ἔχει τὸ ὑπὸ ΕΖΔ πρὸς τὸ ὑπὸ ΚΖΗ. διωρατὸν δὲ ἔχει τὸ τοῦ δεξιᾶς καὶ δεξιᾶς τῆς τῶν πριζόνων ὁμοιότητος λέγοντα, ὅτι ἐπειδὴ ἑκατέρα τῶν ΑΚΗ, ΑΔΕ γωνιῶν ἴσην ἔχει τῇ πρὸς τὸ Β· ἐν τῇ αὐτῇ τμήματι εἴσι τῶν περιλαμβανόντων κύκλοι παρὰ Δ, Ε, Η, Κ σημεία, καὶ ἐπειδὴ ἐν κύκλῳ δύο εὐθεῖαι αἱ ΔΕ, ΗΚ τέμνουν ἀλλήλας κατὰ τὸ Ζ· τὸ ὑπὸ ΔΖΕ ἴσον ἔχει πρὸς τὸ ὑπὸ ΗΖΚ. ὁμοίως δὲ δευχθίσεται ὅτι καὶ πᾶσι ὑπὸ τῆς ΗΘΚ γραμμῆς ὅτι τῶν ΚΗ κείναι ἀγόμεναι ἴσον διώραται πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν τμημάτων.

^α κύκλος ἀρα ἐστὶ ἡ τομὴ δυνάμετρος ὅ αὐτῆς ἢ
 ΗΚ.] καὶ δυνατὸν μὲν εἶναι ὀρθογώνιας οὗτο αὐτῆς τῶ οἰς ἀδύ-
 νατον ἀπαγωγῆς. εἰ γὰρ ὁ οἰς τῇ ΚΗ γραφομένου κύκλος ἐκ
 ἕξτε αὐτῆς τῇ Θ σημεία, ἔσται τὸ ὑπὸ τῇ ΚΖ, ΖΗ ἴσον, ἥτοι
 τῇ ὑπὸ μεζύονος τῇ ΖΘ, ἢ τῇ ὑπὸ ἐλάσσονος, ὅπερ ἐκ ὑπο-
 κείῃ. δεικνύμεν δὲ αὐτὸ καὶ ἐπ' αὐτοῖας. ἔστω περ γραμμὴ ἢ
 ΗΘΚ, καὶ ὑποτενέτω αὐτῷ καὶ
 ΚΗ, εἰληρωθῶ τῇ καὶ ὅτῃ τῇ γραμμῆς
 πυχόντα σημεία τὰ Θ, Ο, καὶ ὑπὸ αὐ-
 τῶν ὅτῃ τῇ ΗΚ κείσθῃται ἡ χύδαται
 αἱ ΘΖ, ΟΠ, καὶ ἔστω τὸ μὲν ὑπὸ
 ΖΘ ἴσον τῷ ὑπὸ ΗΖΚ, τὸ δὲ ὑπὸ
 ΟΠ τῷ ὑπὸ ΗΠΚ ἴσον· λίγῃ ὅπ
 κύκλος ἐστὶν ἢ ΗΘΟΚ γραμμῇ.
 πετμύδω γὰρ ἢ ΗΚ δίδχα κτ' τὸ Ν,
 καὶ ἐπιχύδαται αἱ ΝΘ, ΝΟ. ἔπει ἐν αὐτοῖα ἢ ΗΚ
 τίτμυς οἰς μὲν ἴσα κείτα τὸ Ν, εἰς τῇ αἰσισ κτ' τὸ Ζ· τὸ ὑπὸ
 ΗΖΚ μετὰ τῇ ὑπὸ ΝΖ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΝΚ. τὸ τῇ ὑπὸ
 ΗΖΚ ἴσον ὑποκείσθαι τῷ ὑπὸ ΖΘ· τὸ ἀρα ὑπὸ ΘΖ μὲν τῇ
 ὑπὸ ΝΖ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΝΚ. ἴσα δὲ εἶσι τὰ ὑπὸ ΘΖ, ΖΝ
 καὶ ὑπὸ ΝΘ, ὁρῶν γὰρ εἶναι ἢ οἰς τὸ Ζ· τὸ ἀρα ὑπὸ ΝΘ
 ἴσον εἶναι τῇ ὑπὸ ΝΚ. ὁμοίως δὲ δεικνύμεν ὅπ καὶ τὸ ὑπὸ ΝΟ
 ἴσον εἶναι τῇ ὑπὸ ΝΚ· κύκλος ἀρα εἶναι ἢ ΗΘΚ γραμμῇ,
 αὐτῆς δὲ αὐτῆς ἢ ΗΚ.

Διωκτὸν δὲ ὄντι, τὰς Δ Β Η Κ ἀφαιρέσεις ποτὶ τὴν ἴσιν,
 ποτὶ τὴν ἀρίσταν ἔστι, ἐπὶ ποτὶ μὲντοι διχα τέμνεται ἀλλήλους.
 ἔχου ἀφ' ἧς Κ τῇ Β Γ παράλληλος ἡ Ν Κ. ἐπειτὰ ἐν μὲν-
 ζον ὄντι ἡ Β Α τ' Α Γ· μείζων ἄρα καὶ ἡ Ν Α τ' Α Κ. ὁμοίως
 καὶ ἡ Α Κ τ' Α Η, ἀφ' ἧς κατασκευάσεται τομὴ ὡς τῇ Α Κ
 ἀπὸ τ' Α Ν ἴση λαμβανομένη μακροτέρῃ ἀπὸ τῆς τ' σημείωσιν Η, Ν.
 πλείετος ὡς ἡ Α Ζ· ἡ ἄρα ἀφ' ἧς Ζ τῇ Β Γ παράλληλος ἀγα-
 γομένη τέμνεται τὴν Η Κ, τμημένη ὡς ἡ Ε Ο Π. καὶ ἐπειτ' ἴση ὄντι


no bafis, perque ipfam & axem planum ducentes id
quod propofitum fuerat affequemur. oftendem
enim eft in undecimo libro [prop.18.] *elementorum*
Euchlidis, fi recta plano alicui ad rectos angulos fue-
rit, & omnia quæ per ipfum ducuntur plana eidem
ad rectos angulos effe. communis vero fcalenæ fuppo-
fuit, quoniam in æquilateri planum bafi æquidiftans
idem eft quod fubcontrarie pofitum.

Præterea ⁶Secetur, *inquit*, & altero plano ad rectos angulos ipsi triangulo per axem, quod abscindat ex verticis parte triangulum simile ipsi $AB\Gamma$, subcontrarie vero positum, illud ita fiet. Sit triangulum per axem $AB\Gamma$, fumaturque in AB quodvis punctum H , & ad rectam AH , & punctum in ea H , [per 23. I.] constituatur angulus AHK ipsi $A\Gamma B$ æqualis: ergo triangulum AHK triangulo $AB\Gamma$ simile erit, at subcontrarie positum. fumatur autem in recta HK quodlibet punctum Z , & à Z erigatur $Z\Theta$ ad rectos angulos plano trianguli $AB\Gamma$, & per HK , $Z\Theta$ planum ducatur: erit illud [per 18. II.] ad triangulum $AB\Gamma$ rectum, quia per rectam $Z\Theta$ transit, & faciet id quod erat faciendum.

In conclusione *dicit*, propter similitudinem triangulorum $\triangle ZH$, EZK , æquale esse rectangulum EZA rectangulo KZH , quod quidem & absque triangulorum similitudine demonstrari potest hoc pacto; quoniam enim uterque angulorum $\angle KH$, $\angle A$ æqualis est angulo qui ad B : erunt hi [per 21. 3.] in eadem portione circuli per puncta Δ , E , H , K transeuntis. & quoniam in circulo duæ rectæ ΔE , HK sese secant in Z : rectangulum ΔZE [per 35. 5.] æquale est rectangulo HZK . Similiter demonstrabuntur & omnes rectæ à linea $H\Theta K$ ductæ perpendiculares ad KH rectam, posse æquale ei quod sub ejus segmentis continetur.

^d Sectio igitur est circulus, cujus diameter H K.] possumus autem hoc demonstrare per deductionem ad absurdum. Si enim circulus, qui circa H K describitur, non transit per Θ punctum; erit rectangulum sub κ Z, Z H æquale quadrato, vel rectæ majoris ipsa Z Θ , vel minoris, contra hypothesin. Sed & illud idem directæ demonstratione ostendimus. Si licet cum

ne ostendemus. ut linea qua-
drata HK, cui subtenduntur
recta HK, sumatur autem
in linea duo quævis puncta
O, O, à quibus ad ipsam HK
perpendiculares ducantur OZ,
ON; sitque quadratum ex ZO
æquale rectangulo HZX, &
quadratum ex ON æquale ipsi
HNK rectangulo: dico lineam
HOOK circumlocum esse. secetur
enim HK bifariam in pun-
to N, NO. Quoniam igitur
HK in partes æquales in N, & in
N: rectangulum HZX una cum
quadrato ex ZN æquale erit [per 5. 2.] quadrato ex
HN & HK possumus est æquale qua-
drato igitur ex OZ una cum qua-
drato ex NK. æqualia
] ex OZ; 2N quadrata ipsi qua-
drato enim ad Z est rectus: ergo quadra-
tum ex NK æquale erit. similiter osten-
dendum quod quadrato ex NO æquale
est quadrato ex NK:
circulus est, & ejus diameter HK.



Fieri autem potest ut diametri ΔE , $H K$ quandoque
 æquales sint, quandoque inæquales; nunquam tamen
 sese bifariam secabunt. ducatur enim per K ipsi $B \Gamma$
 parallela $N K$. quoniam igitur major est BA quam AF ;
 & ipsa MA quam AK major erit. eadem ratione &
 AK major est quam AH , propter subcontrariam sectio-
 nem: quare si à recta AN abscissa fuerit æqualis ipsi
 AK , inter puncta H, N cader. cadat ut $A Z$: ergo per Z du-
 cta parallela ipsi $B \Gamma$ secabit $H K$. secet ut $Z O \Pi$. itaque
 quoniam

lelæ ei quæ est perpendicularis ad
trianguli basim, in communem se-
ctionem plani secantis & trianguli
per axem cadent; & ulterius produ-
ductæ ad alteram sectionis partem
ab ea bifariam secabuntur. & siqui-
dem rectus sit conus; recta quæ est
in basi perpendicularis erit ad com-
munem sectionem plani secantis &
trianguli per axem: si vero scalenus;
non semper, nisi cum planum, quod
per axem ducitur, ad basim coni re-
ctum fuerit.



SIT conus, cujus vertex punctum A , basis $\Delta B\Gamma$ circulus, & secetur plano per axem, atque sectionem faciat triangulum $AB\Gamma$, secetur autem & altero plano secante planum in quo est circulus $B\Gamma$ secundum rectam ΔE , vel perpendiculararem ad $B\Gamma$, vel ad eam quæ in directum ipsi constituitur, & faciat sectionem in superficie conï, lineam ΔZE ; communis autem sectio plani secantis & trianguli $AB\Gamma$ sit ZH , & sumatur in sectione ΔZE punctum quodvis Θ , à quo ΘK ipsi ΔE parallela ducatur: dico ΘK ipsi ZH occurrere, & ulterius productam ad alteram partem sectionis ΔZE , à recta ZH bifariam secari.

Quoniam enim conus, cujus vertex A punctum, & basis circulus BR , plano per axem secatur, atque sectionem facit ABR triangulum; sumitur autem in superficie punctum Θ quod non est in latere trianguli ABR , estque ΔH ad BR perpendicularis: ducta ergo per Θ recta ΘK ipsi ΔH parallela, triangulo ABR [per 6. huj.]

πρὸς ὁρὰς τῇ βάσει ἔ τρηγῶνς εὐθεῖα, ὅτι ἡ
 κοιλὴ τομῇ πιῶν) ἔ τέμνοντος ὅτι πέδον ἔ
 ἔ ἀφ' ἔ ἄξονος τρηγῶνς, ἔ περιστρεβαλλό-
 μενοι ἕως τῷ ὅτι μέρους ἔ τομῆς δίχα τμη-
 θήσονται) ὡς αὐτῆς. ἔ ἐὰν μὲ ὁρὸς ἢ ὁ κῶνος,
 ἢ ἐν τῇ βάσει εὐθεῖα πρὸς ὁρὰς ἔσαι τῇ κοίτῃ
 τομῇ τῷ τέμνοντος ὅτι πέδον ἔ τῷ διὰ τῷ ἄξο-
 νος τρηγῶνς. ἐὰν δὲ σκαλπὸς, ἔκ αὐτῷ πρὸς
 ὁρὰς ἔσαι, ἀλλ' ὅταν τὸ διὰ τῷ ἄξονος ὅτι πέ-
 δον πρὸς ὁρὰς ἢ τῇ βάσει τῷ κῶνι.

ΕΣΤΩ κῶνος, ὃ κορυφὴν μὲν τὸ Α σημεῖον, βά-
σις ᾧ ὁ ΒΓ κύκλος, ἔστι πημέθω ὀρθογώνιος διὰ
τὸ ἄκονος, καὶ ποιῶν τὸν πᾶν ΑΒΓ τετράγωνον, πε-
ριμετρὸν ᾧ καὶ ἐπὶ τὸν ὀρθογώνιον ἵκνεται τὸ ὀρθογώνιον,
ὅτι ὡς ἐπὶ ὁ ΒΓ κύκλος κατὰ εὐθείαν τὸ Δ Ε, ἥτοι πρὸς
ὀρθῶς ἔσται τῇ ΒΓ, ἡ τῇ ἐπὶ εὐθείᾳ αὐτῇ, καὶ ποιῶν
πημέθω ἐν τῇ ὀρθογώνιᾳ τὸ κῶνον τὸ Δ Ζ Ε, κοινὴ δὲ
πημὴ ἔστι πᾶν τοῦ ὀρθογώνιου ΑΒΓ τετράγωνου ἡ
Ζ Η, καὶ εὐκλείδης πειν σημειῖται ὅτι τὸ Δ Ζ Ε πᾶν τὸ
Θ, καὶ ἡ Ζ Η διὰ τὸ Θ τῇ Δ Ε ὡς ἡ ἀλλήλος ἡ Θ Κ·
λέγεται ὅτι ἡ Θ Κ συμβαλεῖ τῇ Ζ Η, καὶ ἐκβαλλομένη
ἕως τῇ ἐπὶ τὸν μέγεθος τὸ Δ Ζ Ε πᾶν δὲ ἡ τμηθῇ
ἐπὶ τὸ Ζ Η εὐθείας.

Ἐπει γὰρ πάντες, ἡ κερυφὴ μὲν τὸ Α σφαιρεῖν, βάσις
 ἢ ὁ ΒΓ κύβλος, πέμμηται ἐπαπιδύω ληθὶ τῆ ἀξίονος,
 καὶ παῖ ταμὴν τὸ ΑΒΓΤεργάνων, εἰληνηαιδὲ πση-
 μῶν ὅτι τ' ἐπαφανείας, ὁ μὲν ἔστω ὅτι παλαιοῦς τῆ
 ΑΒΓΤεργάνων, τὸ Θ, καὶ ἔστω κάθιστος ἡ ΔΗ ὅτι
 τ' ΒΓ· ἡ ἀρεα διὰ τῆ Θ τῇ ΔΗ ὁ δὲ ἄλλος ἀγο-
 μῆμη, τὸ τ' ἔστω ἡ ΘΚ, συμβαλλῇ τῷ ΑΒΓΤεργάνων,



occurret; & ulterius producta ad alteram partem superficiæ, à triangulo bifariam secabitur. quoniam igitur, quæ per Θ ducitur parallela ipsi ΔE , occurrit triangulo $AB\Gamma$; atque est in plano sectionis ΔZB : in communem sectionem plani secantis & trianguli $AB\Gamma$ cadet. sed ZH est communis sectio plano-

καὶ προσκαλλομένη ἕως ἑτέρου μέρους τῆ ἐπιφανείας,
 διχα τμηθῆσθαι ὑπὸ τῶν τετραγώνων. ἐπεὶ γὰρ ἡ διὰ τῶν Θ
 τῆ Δ Ε ὁμοῦ ἄλλος ἀνομοῖον συμβάλλει τῶν ΑΒΓ
 τετραγώνων, καὶ ἔστιν ἐν τῷ διὰ τῶν Δ Ζ Ε τριγώνῳ ἐπιπέ-
 δῳ. ὅπῃ τὸ κοινὸν ἄρα περὶ πρὸς τῶν τμήματων
 ἐπιπέδων καὶ τῶν ΑΒΓ τετραγώνων. κοινὴ γὰρ τὴν ἐπὶ τῇ
 πείδῳ

πέδων ἢ ZH · ἢ ἄρα διὰ τῆς Θ τῇ ΔE ὁμοειδής ἡ ἀνομοειδής πρὸς τὴν ZH , καὶ ὁμοειδὴς ἀλλοιούμην ἕως τῆς ἐπὶ τῆς μέσης τῆς ΔZE τομῆς διχα τμηθῆσθαι ὑπὸ τῆς ZH εὐθείας.

Ἦτοι δὴ ὁ κώνος ὀρθός ἐστιν, ἢ τὸ διὰ τῆς ἄξονος τριγώνον τὸ $AB\Gamma$ ὀρθὸν εἶναι πρὸς τὸν $B\Gamma$ κύκλον, ἢ ἑξῆς.

Ἐὰν ὁ κώνος ὀρθός· εἴη ἂν ἔν τῷ $AB\Gamma$ τριγώνον ὀρθὸν πρὸς τὸν $B\Gamma$ κύκλον. καὶ ἐπεὶ ὁπίπεδον τὸ $AB\Gamma$ πρὸς ὁπίπεδον τὸ $B\Gamma$ ὀρθόν ἐστι, καὶ τῇ κοινῇ αὐτῶν τομῇ τῇ $B\Gamma$ ἐν τῇ ἐπιπέδων τῷ $B\Gamma$ πρὸς ὀρθὰς ἡκται ἢ ΔE · ἢ ΔE ἄρα τῷ $AB\Gamma$ τριγώνῳ ἐστὶ πρὸς ὀρθὰς, καὶ πρὸς πάσαις ἄραις τὰς ἀπὸ τομῆς αὐτῆς εὐθείαις, καὶ ὅσαι ἐν τῷ $AB\Gamma$ τριγώνῳ, ὀρθῇ ἐστίν· ὥστε καὶ πρὸς τῇ ZH ἐστὶ πρὸς ὀρθὰς.

Μὴ ἔστω δὴ ὁ κώνος ὀρθός· εἰ μὴ ἔν τῷ ΔE κώνος τριγώνον ὀρθὸν εἶναι πρὸς τὸν $B\Gamma$ κύκλον, ὁμοίως δείξομεν ὅτι καὶ ἢ ΔE τῇ ZH ἐστὶ πρὸς ὀρθὰς.

Μὴ ἔστω δὴ τὸ διὰ τῆς ἄξονος τριγώνον τὸ $AB\Gamma$ ὀρθὸν πρὸς τὸν $B\Gamma$ κύκλον· λέγω ὅτι καὶ ἢ ΔE τῇ ZH ἐστὶ πρὸς ὀρθὰς· εἰ γὰρ διωκτὴν, ἔστω. ἐστὶ δὴ καὶ τῇ $B\Gamma$ πρὸς ὀρθὰς· ἢ ἄρα ΔE ἐκατέρᾳ τῇ $B\Gamma$, ZH ἐστὶ πρὸς ὀρθὰς· καὶ τῷ διὰ τῇ $B\Gamma$, ZH ἐπιπέδῳ ἄρα πρὸς ὀρθὰς ἐστὶ. τὸ δὲ διὰ τῇ $B\Gamma$, HZ ἐπιπέδον ἐστὶ τὸ $AB\Gamma$ · καὶ ἢ ΔE ἄρα τῷ $AB\Gamma$ τριγώνῳ ἐστὶ πρὸς ὀρθὰς· καὶ πάντα ἄρα τὰ δι' αὐτῆς ἐπιπίπδον τῷ $AB\Gamma$ τριγώνῳ ἐστὶ πρὸς ὀρθὰς. ἐν δὲ τῇ ΔE ἐπιπέδῳ ἐστὶ ὁ $B\Gamma$ κύκλος· ὁ $B\Gamma$ ἄρα κύκλος πρὸς ὀρθὰς ἐστὶ τῷ $AB\Gamma$ τριγώνῳ, ὥστε καὶ τὸ $AB\Gamma$ τριγώνον ὀρθὸν ἐστὶ πρὸς τὸν $B\Gamma$ κύκλον, ὅπερ ἔχοντες ὑποθέταμεν. οὐκ ἄρα ἢ ΔE τῇ ZH ἐστὶ πρὸς ὀρθὰς.

Πόρισμα.

Ἐκ δὴ τούτου φανερόν ὅτι τῆς ΔZE τομῆς διάμετρος ἐστὶν ἢ ZH , ἐπεὶ πρὸς τὰς ἀνομοειδῆς ὁμοειδὴς εὐθείας πρὸς τῇ ΔE διχα τέμνεται· καὶ ὅτι διωκτὸν ἐστὶν ὑπὸ τῆς διαμέτρου τῆς ZH ὁμοειδῆς πρὸς τὰς διχα τέμνεται, ἢ μὴ πρὸς ὀρθὰς.

Corollarium.

Hinc vero constat [per 10. def. huj.] rectam ZH diametrum esse sectionis ΔZE ; cum rectas omnes, quæ in ipsa ducuntur, uni cuidam parallelas bifariam secet. constat præterea fieri posse, ut rectæ parallelæ à diametro ZH bifariam quidem, non autem ad rectos angulos secantur.

EUTOCIUS.

Τὸ ἑβδόμῳ θεωρήματι πέντε ἔχει πένταρες· ἢ γὰρ ἢ συμβάλλει ἢ ZH τῇ AG , ἢ συμβάλλει περιχῶς, ἢ ἐκτὸς τῆς κύκλου, ἢ ἐντὸς, ἢ ὅττι Γ σημείν.

Septimum theorema quatuor casus habet: vel enim ZH non occurrit AG ; vel tribus modis occurrit, aut extra circulum, aut intra, aut in ipso Γ puncto.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ 7.

Εὰν κώνος ὁπίπεδῳ τομῇ διχα ἔξῃς, τομῇ δὲ καὶ ἑτέρῳ ὁπίπεδῳ τέμνηται τὴν βάσιν τῆς κώνου κατ' εὐθεῖαν πρὸς ὀρθὰς ὅσαι τῇ βάσει διχα ἔξῃς τομῆς, ἢ δὲ διάμετρος τῆς ἀνομοειδῆς τῆς ὁπίπεδῳ τομῆς, ἢτοι ὁμοειδῆς ἢ τῇ τριγώνῳ πλευρῶν, ἢ συμπίπτει αὐτῇ ἐκτὸς τῆς κορυφῆς τῆς κώνου, ὁμοειδῆς δὲ ἢ τῇ κώνου

Si conus plano secetur per axem, & secetur altero plano secante basim coni secundum rectam lineam quæ ad basim trianguli per axem sit perpendicularis; diameter autem sectionis faciat in superficie, vel sit parallela uni laterum trianguli, vel cum ipso extra coni verticem conveniat, & producantur in infinitum tum superficies

perficies conī, tum planum secans: sectio quoque ipsa in infinitum augebitur; & ex diametro sectionis ad verticem cuilibet rectæ datæ æqualem abscindet recta, quæ quidem à conī sectione ei quæ est in basi parallela ducta fuerit.



SIT conus, cuius vertex A punctum, basis circulus BΓ, & secetur plano per axem, atque sectionem faciat triangulum ABΓ; secetur etiam & altero plano secante BΓ circulum secundum rectam ΔE perpendicularem ad ipsam BΓ, & faciat sectionem in superficie lineam ΔZE; diameter autem sectionis ΔZE sit ZH, quæ vel ipsi AΓ parallela sit, vel producta extra punctum A cum ipsa conveniat: dico sectionem ΔZE augeri in infinitum, si & conī superficies & secans planum in infinitum producantur.

Producatur enim tam superficies conica quam secans planum; patet quod simul producentur & rectæ AB, AΓ, ZH. & quoniam ZH vel parallela est ipsi AΓ, vel producta, extra punctum A cum ipsa convenit; lineæ ZH, AΓ ad partes H, Γ productæ nunquam convenient inter sese. producantur ergo, sumaturque in ZH quodlibet punctum Θ, & per Θ ducatur ΚΘΑ ipsi BΓ parallela, ipsi vero ΔE parallela

ὁπρᾶνεια καὶ τὸ τέμνον ὁπίπεδον εἰς ἀπειρον καὶ ἡ τομὴ εἰς ἀπειρον αὐξήσῃ, καὶ ἀπὸ τῆς διαμέτρου τῆς τομῆς πρὸς τῇ κορυφῇ πᾶσι τῇ διδύσει εὐθείαι ἴσων ἀναλήφεται τις εὐθεῖα ἀγόμενῃ ἀπὸ τῆς κορυφῆς τομῆς πρὸς τὴν βάσιν ὅτι καὶ εὐθεῖαι.

ΕΣΤΩ κώνος, ὃς κορυφὴ μὲν τὸ Α σημεῖον, βάσις δὲ ὁ ΒΓ κύκλος, καὶ περμιχθῶ ἐπιπέδῳ διὰ τῆς ἄξονος, ὃς ποιῆται περὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον, περμιχθῶ δὲ καὶ ἐτέρῳ ἐπιπέδῳ τέμνοντι τὸν ΒΓ κύκλον κατ' εὐθεῖαν τὴν ΔΕ πρὸς ὁρθὰς ὥσιν τῇ ΒΓ, καὶ ποιῆται περὶ τὴν ἐπιφανείαν τὴν ΔΖΕ χεαμμῖν, ἡ δὲ διάμετρος τῆς ΔΖΕ τομῆς ἡ ΖΗ, ἥτις ὁρθὴ ἀλλήλος ἔστω τῇ ΑΓ, ἢ ἐκβαλλομένη συμπλήσεται αὐτῇ ἐκ τὸς τῆς Α σημείου· λέγω ὅτι ἔαν ἦτε τῆς κώνος ἐπιφανείας καὶ τὸ τέμνον ἐπίπεδον ἐκβάλλῃ εἰς ἀπειρον, καὶ ἡ ΔΖΕ τομὴ εἰς ἀπειρον αὐξήσῃ.

Εκβεβλήσθω γὰρ ἦτε τῆς κώνος ἐπιφανείας καὶ τὸ τέμνον ἐπίπεδον· φανερόν δὲ ὅτι καὶ αἱ ΑΒ, ΑΓ, ΖΗ συνεκβλήσονται. καὶ ἐπεὶ ἡ ΖΗ τῇ ΑΓ ἦτοι ὁρθὴ ἀλλήλος ἔστω, ἢ ἐκβαλλομένη συμπλήσεται αὐτῇ ἐκ τὸς τῆς Α σημείου· αἱ ΖΗ, ΑΓ ἄρα ἐκβαλλόμεναι ὡς ἐπὶ τῇ Γ, Η μέρει ἀδέποτε συμπέσονται. ἐκβεβλήσθωσαν δὲ, καὶ ἐκλήθωτι σημεῖον ἐπὶ τῇ ΖΗ τοχῶν, τὸ Θ, καὶ διὰ τῆς Θ σημείου τῇ μὲν ΒΓ ὁρθὴ ἀλλήλος ἦχθω



ducatur MΘN: quare [per 15. II.] planum, quod per ΚΑ, ΜΝ transit, parallelum est plano per ΒΓ, ΔΕ: & idcirco [per 4. huj.] ΚΑΜΝ planum circulus est. & quoniam puncta Δ, Ε, Μ, Ν sunt & in plano secante, & in superficie conī: ergo & in ipsa communi sectione erunt: sectio igitur ΔZE aucta est usque ad puncta Μ, Ν. igitur si tum conī superficies, tum secans planum producantur ad ΚΑΜΝ circulum; & sectio ipsa ΔΖΕ usque ad Μ, Ν puncta augebitur. Eadem ratione demonstrabitur sectionem ΜΔΖΕΝ augeri in infinitum, si & superficies conī & planum secans in infinitum producantur. per-

ἡ ΚΘΑ, τῇ δὲ ΔΕ ὁρθὴ ἀλλήλος ἡ ΜΘΝ· τὸ ἄρα διὰ τῆς ΚΑ, ΜΝ ὁπίπεδον ὁρθὴ ἀλλήλον ἐστὶ τῷ διὰ τῆς ΒΓ, ΔΕ· κύκλος ἄρα ἐστὶ τὸ ΚΑΜΝ ὁπίπεδον. καὶ ἐπεὶ τὰ Δ, Ε, Μ, Ν σημεῖα ἐν τῷ τέμνοντι ἐσὶν ἐπιπέδῳ, ἐστὶ δὲ καὶ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς κώνος ὅτι τῆς κορυφῆς ἄρα τομῆς ἐσὶν· ἥτις ἄρα ἡ ΔΖΕ μέχρη τῶν Μ, Ν σημείων. αὐξήσῃς ἄρα τῆς ἐπιφανείας τῆς κώνος ἐκ τῆς τέμνοντος ἐπιπέδου μέχρη τῶν ΚΑΜΝ κύκλου· ἥτις καὶ ἡ ΔΖΕ τομὴ μέχρη τῶν Μ, Ν σημείων. ὁμοίως δὲ δείξομεν ὅτι ἐὰν εἰς ἀπειρον ἐκβάλλῃ ἦτε τῆς κώνος ἐπιφανείας, καὶ τὸ τέμνον ὁπίπεδον, καὶ ἡ ΜΔΖΕΝ τομὴ εἰς ἀπειρον αὐξήσῃ. ἔ

φανερόν

Φανερόν ὅτι πύσις τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ ἴσως ἀπολή-
ψεται τις τῇ ΜΝ παράλληλος ἀπὸ τῆ ΖΘ εὐθείας
πρὸς τῷ Ζ σημείῳ. εἰν γὰρ τῇ δοθείσῃ ἴσην θάμεν
τῷ ΖΞ, καὶ ἀφ' τῆς ΖΞ τῇ ΔΕ παράλληλον ἀγάγω-
μεν, συμπίπτει τῇ τομῇ, ὥστε καὶ ἡ διὰ τῆς Θ ἀπε-
δείχθη συμπίπτει τῇ τομῇ κατὰ τὰ Μ, Ν σημεία·
ὥστε ἀγνοῖ τις εὐθείαν συμπίπτει τῇ τομῇ, πα-
ράλληλος ἔσται τῇ ΜΝ, ἀπολαμβάνουσα ἀπὸ τῆ ΖΗ
εὐθείαν ἴσην τῇ δοθείσῃ πρὸς τῷ Ζ σημείῳ.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Θ'.

Εἰν κῶνος ὅστις περὶ τριγώνου, συμπίπτει μὲν ἐκ-
τὴν πλευρὰν τῆς διὰ τῆς ἀξέως τετραγώνου, μήτε
δὲ ὡς τῆς βάσις ἡγεμῶν, μήτε ὑπεναγνῶν ἢ
τομῇ ἐκ ἑσῶν κύκλος.

ΕΣΤΩ κῶνος, ὃς κορυφὴν μὲν τὸ Α σημείον, βά-
σις δὲ ὁ ΒΓ κύκλος, καὶ περὶ τῆς ἀξέως περὶ τῆς
πυλῆς, μήτε ὡς τῆς ἀξέως ὄντι τῇ βάσει, μήτε ὑπενα-
γνῶν, καὶ ποιῶν τομὴν ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τῷ ΔΚΕ
γραμμῇ λέγω ὅτι ἡ ΔΚΕ γραμμὴ ἐκ ἑσῶν κύκλος.

Εἰ γὰρ διωκτὴν, ἔστω, ὃς συμπίπτει τὸ τέμνον ἐπι-
πέδον τῇ βάσει, καὶ ἔστω τῇ ἐπιπέδων κοινὴ τομὴ ἡ
ΖΗ, τὸ δὲ κέντρον τῆς ΒΓ κύκλου ἔστω τὸ Θ, καὶ ἀπ' αὐ-
τῆς καθέτως ἡχθῶ ἐπὶ τῇ ΖΗ ἢ ΘΗ, καὶ ἐκ τῆς ΒΓ
ἀφ' τῆς ΗΘ καὶ τῆς ἀξέως ἐπιπέδων, καὶ ποιῶν τομὰς
ἐν τῇ κοινῇ ἐπιφανείᾳ τὰς ΒΑ, ΑΓ εὐθείας.
ἐπεὶ γὰρ τὰ Δ, Ε, Η σημεία ἐν τῇ διὰ τῆς ΔΚΕ ἐπι-
πέδῳ ἔσιν, ἐστὶ δὲ ὃ ἐν τῷ διὰ
τῆς Α, Β, Γ· τὰς ἀρεὰς Δ, Ε, Η
σημεία ἐπὶ τῇ κοινῇ τομῇ τῇ
ἐπιπέδων ἐσὶν· εὐθεία ἄρα
ἐστὶν ἡ ΗΕΔ. εἰλήφθω δὲ ἡ
τῇ ἐπὶ τῇ ΔΚΕ γραμμῇ ση-
μείον τὸ Κ, καὶ διὰ τῆς Κ τῇ ΖΗ
παράλληλος ἡχθῶ ἡ ΚΜΛ.
ἔσται δὲ ἴση ἡ ΚΜ τῇ ΜΛ· ἡ
ἄρα ΔΕ διάμετρος ἐστὶ τῆς
ΔΚΕΛ κύκλου. ἡχθῶ δὲ ἡ
διὰ τῆς Μ τῇ ΒΓ παράλλη-
λος ἡ ΝΜΞ. ἐστὶ δὲ καὶ ἡ ΚΛ
τῇ ΖΗ παράλληλος· ὥστε
τὸ διὰ τῆς Ν, Ξ, Κ, Μ ἐπι-
πέδον παράλληλον ἐστὶ τῷ διὰ
τῆς ΒΓ, ΖΗ, τετρεῖς τῇ βάσει, καὶ ἔσται ἡ τομὴ κύκλος.
ἔστω ΝΚΞΛ. καὶ ἐπεὶ ἡ ΖΗ τῇ ΒΗ πρὸς ὀρθὰς ἐστὶ,
καὶ ἡ ΚΜ τῇ ΝΞ πρὸς ὀρθὰς ἐστὶ· ὥστε τὸ ὑπὸ τῆς
ΝΜΞ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῆς ΚΜ. ἐστὶ δὲ τὸ ὑπὸ τῆς
ΔΜΕ ἴσον τῷ ὑπὸ τῆς ΚΜ, κύκλος γὰρ ὑποκεί· ἡ
ΔΚΕΛ γραμμὴ, καὶ διάμετρος αὐτῆς ἡ ΔΕ· τὸ
ἄρα ὑπὸ τῆς ΝΜΞ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῆς ΔΜΕ· ἐστὶν ἄρα
ὡς ἡ ΝΜ πρὸς ΜΔ ὅτως ἡ ΕΜ πρὸς ΜΞ· ὁμοίον
ἄρα ἐστὶ τὸ ΔΜΝ τρίγωνον τῷ ΞΜΕ τετραγώνῳ, καὶ
ἡ ὑπὸ τῆς ΔΝΜ γωνία ἴση ἐστὶ τῇ ὑπὸ τῆς ΜΕΞ.
ἀλλὰ ἡ ὑπὸ τῆς ΔΝΜ γωνία τῇ ὑπὸ τῆς ΑΒΓ ἐστὶν ἴση, πα-
ράλληλος γὰρ ἡ ΝΞ τῇ ΒΓ· καὶ ἡ ὑπὸ τῆς ΑΒΓ ἄρα

spicuum igitur est cuilibet datæ rectæ æqualem
abscindere rectam ipsi ΜΝ parallelam ex ipsa ΖΘ
ad punctum Ζ. si enim datæ rectæ æqualem po-
namus ΖΞ, & per Ξ ipsi ΔΕ parallelam ducamus;
conveniet ea cum sectione, quemadmodum &
quæ per Θ demonstrata est cum eadem ad puncta
Μ, Ν convenire: quare poterit recta quædam
duci parallela ipsi ΜΝ, quæ cum sectione con-
veniat, & ex ipsa ΖΗ ad punctum Ζ rectæ datæ
æqualem abscindat.

PROP. IX. Theor.


Si conus plano secetur conveniente cum
utroque latere trianguli per axem,
quod neque basi æquidistat, neque
subcontrarie ponatur; sectio circulus
non erit.

SIT conus, cujus vertex Α punctum, basis
circulus ΒΓ, & secetur plano aliquo, ne-
que basi æquidistante, neque subcontrarie po-
nito, atque sectionem faciat in superficie li-
neam ΔΚΕ: dico ΔΚΕ non esse circulum.

Sit enim, si fieri poreft, occurratque planum
secans ipsi basi, & communis planorum sectio
fit recta ΖΗ, centrum autem circuli ΒΓ sit Θ, &
ab ipso ad ΖΗ perpendicularis ducatur ΘΗ, dein-
de per ΘΗ & axem producat planum, atque
in conica superficie sectiones faciat ΒΑ, ΑΓ re-
ctas. quoniam igitur puncta Δ, Ε, Η sunt & in
plano quod per ΔΚΕ transit, & in eo quod per

Α, Β, Γ; puncta igitur Δ, Ε, Η
in communi planorum se-
ctione erunt: quare [per 3.
11.] ΗΕΔ recta est. sumat-
ur in linea ΔΚΕ punctum
aliquod Κ, & per Κ rectæ
ΖΗ parallela ducatur ΚΜΛ.
estque [per 6. huj.] ΚΜ ipsi
ΜΛ æqualis: quare [per
conv. 3. 3.] ΔΕ diameter
est circuli ΔΚΕΛ. ducatur
deinde per Μ recta ΝΜΞ
ipsi ΒΓ parallela. est au-
tem & ΚΛ parallela ΖΗ:
ergo [per 15. 11.] planum
quod per Ν, Ξ, Κ, Μ duci-
tur, æquidistans est plano
per ΒΓ, ΖΗ, hoc est ipsi

basi; adeoque [per 4. huj.] sectio circulus est.
sit ΝΚΞΛ. & quoniam ΖΗ perpendicularis
est ad ΒΓΗ; sequitur [per 10. 11.] & ΚΜ ad
ΝΞ perpendicularem esse: quare [per 35.
3.] rectangulum ΝΜΞ æquale est quadrato ex
ΚΜ. sed & rectangulum ΔΜΕ æquale est qua-
drato ex ΚΜ; nam linea ΔΚΕΛ circulus ponitur
cujus diameter ΔΕ: rectangulum igitur ΝΜΞ
æquale est rectangulo ΔΜΕ: & idcirco [per
16. 6.] ut ΝΜ ad ΜΔ ita ΕΜ ad ΜΞ: quare [per
6. 6.] ΔΜΝ triangulum simile est triangulo ΞΜΒ;
& angulus ΔΝΜ æqualis ΜΒΞ angulo. sed
angulus ΔΝΜ angulo ΑΒΓ est æqualis; pa-
rallela enim est ΝΞ ipsi ΒΓ: ergo & angulus ΑΒΓ
æqualis



ΠΡΟΤΑΣΙΣ ια'.


Εάν κώνος ὅστις περὶ τὴν ἀξονα, τμήσῃ δὲ καὶ ἑτέρω ὅστις περὶ τὴν βάσιν τῶν κώνων κατ' εὐθείαν πρὸς ὁρθὰς ἔσονται τῇ βάσει τῶν διὰ τῶν ἀξόνων περιγώνων, ἐπὶ δὲ ἡ διάμετρος τῆς τομῆς ὁμοειδὴς ἢ μιᾷ πλευρᾷ ἢ ἀξονα περιγώνων· ἥτις ἀνὰ τὴν τομῆν τῶν κώνων ὁμοειδὴς ἀχθῇ τῇ κατὰ τὴν τομῆν ὁμοειδὴς καὶ τῇ βάσει τῶν κώνων, μέχρι τῆς ἀξονα περιγώνων, διήσεται τὸ ὁμοειδὴς ὑπὸ τῆς ἀξονα περιγώνων ὑπὸ αὐτῆς ἀπὸ τῆς διαμέτρου πρὸς τὴν κορυφὴν τῆς τομῆς, καὶ ἄλλης πινὸς εὐθείας ἢ λόγον ἔχει πρὸς τὴν μεταξὺ τῆς κώνων γωνίας καὶ τῆς κορυφῆς τῆς τομῆς, ὅτι τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς βάσεως ἢ ἀξονα περιγώνων πρὸς τὸ ὁμοειδὴς ὑπὸ τῶν λοιπῶν τῶν περιγώνων δύο πλὴρῶν, καλεῖσθαι δὲ ἡ ταιώτη τομὴ ΠΑΡΑΒΟΛΗ.

PROP. XI. Theor.

Si conus plano per axem secetur, secetur autem & altero plano secante basim conii secundum rectam lineam, quæ ad basim trianguli per axem est perpendicularis, & sit diameter sectionis uni laterum trianguli per axem parallela: recta linea, quæ à sectione conii ducitur parallela communi sectioni plani secantis & basii conii, usque ad sectionis diametrum, poterit spatium æquale contento sub ea, quæ ex diametro abscissa inter ipsam & verticem sectionis interjicitur, & alia quadam, quæ ad rectam, inter conii angulum & verticem sectionis interjectam, habet eam rationem, quam quadratum basii trianguli per axem ad id quod sub reliquis duobus trianguli lateribus continetur. dicatur autem hujusmodi sectio PARABOLA.

ΕΣΤΩ κώνος, ὃς τὸ Α σημειῖον κορυφῇ, βάσις δὲ ὁ ΒΓ κύκλος, καὶ περὶ τὴν ἀξονα διὰ τῶν ἀξόνων, ὃς ποιῶν τὸ ΑΒΓ τρίγωνον, περὶ τὴν ἀξονα ὅστις περὶ τὴν βάσιν τῶν κώνων κατ' εὐθείαν τῇ ΔΕ πρὸς ὁρθὰς ἔσονται τῇ ΒΓ, καὶ ποιῶν τὴν ἐν τῇ ὁμοειδῇ τῶν κώνων τῇ ΔΖΕ, ἡ δὲ διάμετρος τῆς τομῆς ἢ ΖΗ ὁμοειδὴς ἢ μιᾷ πλευρᾷ ἢ ἀξονα περιγώνων τῇ ΑΓ, καὶ ἀπὸ τῆς Ζ σημειῖον τῇ ΖΗ εὐθεία πρὸς ὁρθὰς ἔχουσα ἢ ΖΘ, ὃς περὶ τὴν ἀξονα ὡς τὸ ἀπὸ ΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΑΓ ἔστω ἢ ΖΘ πρὸς ΖΑ, καὶ εἰληφθῶσι σημειῖον ὅστις τῆς τομῆς τυχόν τὸ Κ, καὶ διὰ τῆς ΚΤ τῇ ΔΕ παράλληλος ἔχουσα ἢ ΚΛ μέχρι τῆς διαμέτρου τῆς τομῆς· λέγω ὅτι τὸ ἀπὸ τῆς ΚΛ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῆς ΖΘΖΑ.

Ἡχθῶ γὰρ διὰ τῆς Α τῇ ΒΓ ὁμοειδὴς ἢ ΜΝ. ἐστὶ δὲ ἢ ΚΛ τῇ ΔΕ ὁμοειδὴς ὁμοειδὴς τὸ ἄρα ΔΕ τῇ ΚΛ, ΜΝ ὁμοειδὴς ἐστὶ τῶν ΔΕ τῶν ΚΛ, ΜΝ ὁμοειδὴς κύκλος ἐστὶν, οὗ διάμετρος ἢ ΜΝ. καὶ ἐστὶ κατὰ τὴν τῇ ΜΝ ἢ ΚΛ, ἐπεὶ καὶ ἢ ΔΕ τῇ τῇ ΒΓ· τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΜΑΝ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΚΛ. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς τὸ ἀπὸ τῆς ΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΒΑΓ ἔστω ἢ ΖΘ πρὸς ΖΑ, ὃς τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΒΑΓ λόγον ἔχει τὸν συγκείμενον ἐκ τῶν τῶν ΒΑΓ ὅς ἢ ΒΓ πρὸς ΒΑ· ὃ ἄρα τῆς ΖΘΖΑ



SIT conus, cujus vertex punctum A, basis BΓ circulus, seceturque plano per axem, atque sectionem faciat triangulum ABΓ, & secetur altero plano secante basim conii secundum rectam lineam ΔΕ, quæ ad BΓ est perpendicularis, & faciat sectionem in superficie conii ΔΖΕ lineam; diameter autem sectionis ΖΗ parallela sit uni laterum trianguli per axem, videlicet ipsi ΑΓ, atque à puncto Ζ rectæ ΖΗ ad rectos angulos ducatur ΖΘ, & fiat ut quadratum ex ΒΓ ad rectangulum ΒΑΓ ita ΖΘ ad ΖΑ, sumatur præterea in sectione quodlibet punctum Κ, & per Κ ducatur ΚΛ ipsi ΔΕ parallela, usque ad sectionis diametrum: dico quadratum ex ΚΛ rectangulo ΘΖΑ æquale esse.

Ducatur enim per Α ipsi ΒΓ parallela ΜΝ. est vero ΚΛ parallela ipsi ΔΕ: ergo [per 15.11.] planum, quod transit per ΚΛ, ΜΝ, plano per ΒΓ, ΔΕ, hoc est ipsi basi conii, æquidistat: ideoque [per 4.huj.] planum per ΚΛ, ΜΝ est circulus, cujus diameter ΜΝ. est autem [per 10.11.] ΚΛ ad ΜΝ perpendicularis, quia & ΔΕ ad ΒΓ: rectangulum igitur ΜΑΝ [per 35.3.] æquale est quadrato ex ΚΛ. & quoniam [ex hyp.] ΘΖ ad ΖΑ est ut quadratum ex ΒΓ ad rectangulum ΒΑΓ; quadratum autem ex ΒΓ ad ΒΑΓ rectangulum [per 23.6.] rationem habet compositam ex ratione quam ΒΓ habet ad ΓΑ, & ex ea quam ΒΓ habet ad ΒΑ: ratio igitur ΘΖ ad

ad $Z\Lambda$ componitur ex rationibus $B\Gamma$ ad ΓA , & ΓB ad $B A$. ut autem $B\Gamma$ ad ΓA ita [per 4. 6.] MN ad $N A$, hoc est $M A$ ad $A Z$; & ut $B\Gamma$ ad $B A$ ita MN ad $M A$, hoc est $A M$ ad $M Z$, & [per 19. 5.] reliqua $N A$ ad $Z A$: ratio igitur ΘZ ad $Z A$ componitur ex rationibus $M A$ ad $A Z$, & $N A$ ad $Z A$. sed ratio composita ex rationibus $M A$ ad $A Z$, & $A N$ ad $Z A$ est [per 23. 6.] ea quam habet $M A N$ rectangulum ad rectangulum $A Z A$: ergo ut ΘZ ad $Z A$ ita rectangulum $M A N$ ad $A Z A$ rectangulum. ut autem ΘZ ad $Z A$ (sumpta $Z A$ communi altitudine) ita [per 1. 6.] $\Theta Z A$ rectangulum ad rectangulum $A Z A$: ut igitur rectangulum $M A N$ ad ipsum $A Z A$ ita rectangulum $\Theta Z A$ ad idem $A Z A$: & idcirco [per 9. 5.] æquale est rectangulum $M A N$ rectangulo $\Theta Z A$. sed [ex modo ostensis] rectangulum $M A N$ æquale est quadrato ex $K A$: ergo quadratum ex $K A$ rectangulo $\Theta Z A$ æquale est.

Vocetur autem huiusmodi sectio *Parabola*: & recta ΘZ , *Ea juxta quam possunt quæ ad $Z H$ diametrum ordinatim applicantur*: hæc etiam *Latus Rectum* appelletur.

πρὸς $Z A$ λόγος σύγκλη¹⁾ ἐκ τῶν $B\Gamma$ πρὸς ΓA , καὶ τῶν ΓB πρὸς $B A$. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ $B\Gamma$ πρὸς ΓA ἔστω ἡ $M N$ πρὸς $N A$, ταῦτέστιν ἡ $M A$ πρὸς $A Z$, ὡς δὲ ἡ $B\Gamma$ πρὸς $B A$ ἔστω ἡ $M N$ πρὸς $M A$, ταῦτέστιν ἡ $A M$ πρὸς $M Z$, καὶ λοιπὴ ἡ $N A$ πρὸς $Z A$. ὁ ἄρα ΘZ πρὸς $Z A$ λόγος σύγκλη¹⁾ ἐκ τῶν $M A$ πρὸς $A Z$, καὶ τῶν $N A$ πρὸς $Z A$. ὁ δὲ συγκείμενος λόγος ἐκ τῶν $M A$ πρὸς $A Z$, καὶ τῶν $A N$ πρὸς $Z A$, ὁ τῶν ὑπὸ $M A N$ ἐστὶ πρὸς τὸ ὑπὸ $A Z A$. ὡς ἄρα ἡ ΘZ πρὸς $Z A$ ἔστω τὸ ὑπὸ $M A N$ πρὸς τὸ ὑπὸ $A Z A$. ὡς δὲ ἡ ΘZ πρὸς $Z A$ (τῆς $Z A$ κοινῆς ὑψὸς λαμβανομένης) ἔστω τὸ ὑπὸ $\Theta Z A$ πρὸς τὸ ὑπὸ $A Z A$. ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ $M A N$ πρὸς τὸ ὑπὸ $A Z A$ ἔστω τὸ ὑπὸ $\Theta Z A$ πρὸς τὸ αὐτὸ τὸ ὑπὸ $A Z A$. ἴσων ἄρα ἐστὶ τὸ ὑπὸ $M A N$ τῷ ὑπὸ $\Theta Z A$. τὸ δὲ ὑπὸ $M A N$ ἴσων ἐστὶ τῷ δ πὸ $K A$. καὶ τὸ δ πὸ $K A$ ἴσων ἐστὶ τῷ ὑπὸ $\Theta Z A$.


Καλεῖσθαι μὲν ἡ πιαύτη τμήν Παραβολή· ἡ δὲ ΘZ , ἡ παρ' αὐτῇ διώσαν²⁾ αἱ καταγόμεναι τετραγώνως ἐπὶ τῇ $Z H$ διάμετρον καλεῖσθαι δὲ καὶ αὐτὴ Ὀρθία*.

EUTOCIUS.

* $E T$ fiat ut quadratum ex $B\Gamma$ ad rectangulum $B A \Gamma$ ita $Z \Theta$ ad $Z A$.] Certum quidem est quod dicitur, sed, si quis hoc plenius adhuc declarare velit, sit rectangulum $B A \Gamma$ æquale rectangulum $O P R$; quadrato autem ex $B\Gamma$ æquale id quod ad $P R$ adjacens latitudinem habet $P \Sigma$, & fiat ut $O P$ ad $P \Sigma$ ita $A Z$ ad ΘZ : ergo factum jam erit quod quærebamus. quoniam enim ut $O P$ ad $P \Sigma$ ita $A Z$ ad $Z \Theta$: erit & invertendo ut ΣP ad $P O$ ita ΘZ ad $Z A$. ut autem ΣP ad $P O$ ita rectangulum $\Sigma P R$ ad ipsum $P O$, hoc est [per constr.] quadratum ex $B\Gamma$ ad rectangulum $B A \Gamma$. hoc autem & ad sequentia theoremata utile erit.

* Quadratum autem ex $B\Gamma$ ad $B A \Gamma$ rectangulum rationem habet compositam &c.] Ostensum enim est in sexto libro elementorum, theoremate vigesimo tertio, æquiangula parallelogramma inter se rationem habere ex laterum rationibus compositam. sed, quoniam interpretes inductione magis quam necessaria argumentatione utuntur, visum est nobis illud ipsum investigare; quod tamen scriptum est in commentariis nostris in quartum theorema secundi libri *Archimedis* de Sphæra & Cylindro, & in *Theonis* scholiis in primum librum *Magnæ Constructionis Ptolemaei*, nihilominus tamen & hoc loco non inepte repetetur; propterea quod fortasse non omnes, qui hæc legent, in illos libros inciderunt, tum etiam, quod universa fere conicorum tractatio eum argumentandi modum usurpat. Ratio ex rationibus componi dicitur, quando rationum componentium quantitates inter se multiplicata quantitates compositæ faciunt [per 5. def. 6.]: per quantitatem intelligendo numerum, a quo ratio ipsa denominatur. in multiplicibus quidem quantitas erit numerus integer: in reliquis vero habitudinibus necesse est quantitatem numerum esse, & partem seu partes; nisi forte quispiam velit etiam ineffabiles esse habitudines, quales sunt magnitudinum incom-

* $K A I$ πεποιήσθω ὡς τὸ ἀπὸ $B\Gamma$ πρὸς τὸ ὑπὸ $B A \Gamma$ ἔστω ἡ $Z \Theta$ πρὸς $Z A$.] Σαφές μὲν ἐστὶ τὸ λεγόμενον.




πλὴν, εἴπερ καὶ ὑπομνησθῆναι βέλτεται, ἔστω τῷ ὑπὸ $B A \Gamma$ ἴσων τὸ ὑπὸ $O P R$, τῷ δὲ ὑπὸ $B\Gamma$ ἴσων τὸ πρὸς $P \Sigma$ πρὸς $P R$ παραλλήλων πλάτος ποιήτω τῷ $P \Sigma$, καὶ γινώσκω ὡς ἡ $O P$ πρὸς $P \Sigma$ ἡ $A Z$ πρὸς ΘZ . γινώσκω ἄρα τὸ ζητούμενον. ἐπεὶ γὰρ ἐστὶν ὡς ἡ $O P$ πρὸς $P \Sigma$ ἡ $A Z$ πρὸς $Z \Theta$. ἀνὰ πάλιν ὡς ἡ ΣP πρὸς $P O$ ἡ ΘZ πρὸς $Z A$. ὡς δὲ ἡ ΣP πρὸς $P O$ τὸ ΣP πρὸς $P O$, τὸ ἐστὶ τὸ ὑπὸ $B\Gamma$ πρὸς τὸ ὑπὸ $B A \Gamma$. τὸτε χρῆσθαι καὶ τῆς ἐξῆς θεωρήματι.

* Τὸ δὲ δ πὸ $B\Gamma$ πρὸς τὸ ὑπὸ $B A \Gamma$ λόγον ἔχει τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ὅν ἔχει ἡ $B\Gamma$ πρὸς ΓA .] Δίδεται μὲν ἐν τῷ ἑκτῷ βιβλίῳ τῆς στοιχείων, ἐν τῷ ἑκτοστῷ θεωρήματι, ὅτι τὰ ἰσογώνια παραλλήλογραμμά πρὸς ἀλλήλα λόγον ἔχει τὸν συγκείμενον ἐκ τῶν πλευρῶν. ἐπεὶ δὲ ἐπακμασθέντες μάλλον καὶ ἐκ τῶν ἀναγκαίων τεθέντων ὑπὸ τῶν ὑπομνηματιστῶν ἐλέγχετο, ἐζητήσαμεν αὐτὸ, καὶ γινώσκω ἐν τῇς ἐκδομένοις ἡμῶν εἰς τὸ τέταρτον θεωρήμα Φ δευτέρου βιβλίου τοῦ Ἀρχιμήδους περὶ σφαιρῶν καὶ κυλίνδρων, καὶ ἐν τῇς σχολίαις Φ περὶ τοῦ βιβλίου τῆς Πτολεμαίου συντάξεως, ἐκ αἰσίου δὲ καὶ ἐνταῦθα τῷτε γινώσκω. ἀλλ' ὅτι μὴ πάντας τὰς ἀναγκαζομένους καθεύουσιν ἐμπληρύνειν, καὶ ὅτι γὰρ τὸ ὅλον σύνταγμα τῶν κοινῶν λέγει αὐτὸ. Λόγος ἐκ λόγων συγκείμενος λέγεται, ὅταν αἱ τῶν λόγων πηλικότητες ἐφ' ἑαυταῖς πολλαπλασιασθεῖσαι ποιῶσι πηλ. πηλικότητες δηλοῦντι λογιζόμενος Φ ἀειδίμῳ ἢ παρόνυμῳ ἐστὶν ὁ λόγος. ἐπεὶ μὲν ὅν τῶν πολλαπλασίων δυνατὸν ἐστὶν ἀειδίμων ὁλόκληρον εἶναι πηλικότητα. ἐπεὶ δὲ τῶν λοιπῶν γίνονται, ἀνάγκη τὴν πηλικότητα ἀειδίμων εἶναι, καὶ μείον ἢ μέρει, εἰ μὴ ἄρα τις ἐξέλκοι καὶ ἀξέριτος εἶναι γένεσις, οἷα εἰσὶν αἱ κατὰ τὰ ἄλλα μεγέ-

* Scribitur etiam sæpius ὁρθία in MS. qualem vocem Græca lingua non agnoscit: nos igitur ὀρθία ubique usurpabimus.

34. ἐὰν πᾶσιν διὰ τῶν ῥῆσεων δῶλον ὅτι αὐτὴ ἡ πηλικότης
πολλαπλασιαζομένη ὅτι τὸν ἐπόμενον ὅσον τῶν λόγων ποιεῖ
τὸν ἡγούμενον. ἔστω τοίνυν λόγος ὁ Γ ἄρως τὸ B , καὶ εἰ-
λήθω τις αὐτῶν μίσης ὡς ἐπὶ γ , ὁ Γ , καὶ ἔστω ΓA λόγος
πηλικότης ὁ Δ , Γ δὲ ΓB ὁ E . καὶ ὁ Δ τὸν E πολλαπλασιάζ-
σας ΓZ ποιεῖτω· λέγω ὅτι Γ λόγος $\Gamma A B$ πηλικότης ὅστις ὁ
 Z , τὸ Γ ἔστιν ὅτι ὁ Z ΓB πολλαπλασιάζσας ΓA ποιεῖ. ὁ Z
 ΓB πολλαπλασιάζσας ΓH ποιεῖτω. ἐπεὶ γὰρ ὁ Δ τὸν $\mu\upsilon$ E
πολλαπλασιάζσας ΓZ ποιοῖκεν, Γ δὲ Γ
πολλαπλασιάζσας ΓA ποιοῖκεν· ἔστιν
ἄρα ὡς ὁ E ἄρως Γ ὁ Z ἄρως τὸν A .
πάλιν ἐπεὶ ὁ B ΓE πολλαπλασιάζσας Γ
ποιοῖκεν, Γ δὲ Z πολλαπλασιάζσας τὸν
 H ποιοῖκεν· ἔστιν ἄρα ὡς ὁ E ἄρως Γ Z
ὁ Γ ἄρως ΓH , καὶ ἐναλλάξ ὡς ὁ E ἄρως Γ
ὁ Z ἄρως ΓH . ἢν δὲ ὡς ὁ E ἄρως Γ
ὁ Z ἄρως ΓA · ἴσως ἄρα ὁ H τῷ A , ὡς
ὁ Z ΓB πολλαπλασιάζσας ΓA ποιοῖκεν
τῶν λόγων ἄρα τῶν $A B$ πηλικότης ὅστις ὁ Z .
μὴ παραστήτω Γ τὰς ἐνυπάρχοντας τὸ διὰ
 Γ ἀειδιμητῶν διδόντες τὸ οἷον ῥῆ-
σις, μαθηματικῶς μᾶλλον ὥστε ἢ ἀρι-
θμητικῶς, διὰ τὰς ἀναλογίας, καὶ ὅτι τὸ
ζητούμενον ἀριθμητικὸν ὄντι. λόγοι γὰρ, καὶ
πηλικότητες λόγων, καὶ πολλαπλασιασμοὶ
τοῖς ἀριθμοῖς περὶ τὰς ὑπάρχουσιν διὰ αὐτῶν τοῖς μεγέθεσι,
κατὰ τὸν εἰπόντα, ταῦτα γὰρ τὰ μαθήματα δυνάμει εἶναι
ἀδελφά.



mensurabilium. & patet quod in omnibus habitudini-
bus ipsa rationis quantitas multiplicata in consequen-
tem terminum, producit antecedentem. Sit igitur ratio
 A ad B , & sumpto termino quolibet intermedio Γ , sit
rationis A ad Γ quantitas Δ , rationis autem Γ ad
 B quantitas sit E . & Δ multiplicans E producat Z :
dico Z rationis A ad B quantitatem esse; hoc est si
 Z multiplicet B produci ipsum A . itaque multipli-
cet Z ipsum B , & producat H . quoniam igitur Δ
ipsum quidem E multiplicans produ-
cit Z , multiplicans autem Γ ipsum
 A producit: erit [per 17.7.] ut E
ad Γ ita Z ad A . rursus cum B mul-
tiplicans E faciat Γ , & multiplicans
 E faciat H : erit ut E ad Z ita Γ ad
 H ; & permutando ut E ad Γ ita Z
ad H . sed ut E ad Γ ita erat Z ad
 A : ergo [per 9.5.] H ipsi A est
æqualis; & idcirco Z multiplicans
 B producit A : rationis igitur A ad
 B quantitas necessario erit Z . non
perturbentur autem qui in hæc in-
ciderint, quod illud ex arithmeti-
cis demonstretur: antiqui enim hu-
iusmodi demonstrationibus sæpe uti
consueverunt; quæ tamen mathema-
ticæ potius sunt quam arithmeticæ;
propter analogias, & quia quæsitum
arithmeticum est. nam rationes,
rationum quantitates, & multiplica-
tiones primo numeris, secundo loco per numeros &
magnitudinibus insunt, ex illius sententia, qui ita
scripsit. *Hæc enim mathematica disciplina germanæ
esse videntur.*


ΠΡΟΤΑΣΙΣ 16.

Εὰν κώνος ὅστις περὶ τὴν ἀξιν ἔσῃ ὁ ἄξωνος, τμηθῇ
διὰ καὶ ἑτέρῳ ὅστις περὶ τὴν ἀξιν ἔσῃ ὁ ἄξωνος, κατ'
εὐθείαν περὶ ὁρθὰς ὅσας εἴσιν τῇ βάσει ἔσῃ διὰ
τῶν ἄξωνος τεγωνόν, καὶ ἡ διάμετρος Γ τομῆς
ἐκβαλλομένη συμπίπτῃ μὲν πλάτῃ τῆς διὰ Γ
ἄξωνος τεγωνόν ἐκτὸς Γ ἑκὼν κορυφῆς ἥτις
ἐν ὅτῳ Γ τομῆς ἀχρῆ παρὰλληλὸς τῇ κοινῇ
τομῇ Γ τμήματος ὅστις περὶ τὴν ἀξιν ἔσῃ ὁ ἄξωνος
ὡς Γ διάμετρος Γ τομῆς, δηλώσεται τι χωρίον πα-
ρακείμενον παρὰ πᾶσαν εὐθείαν, περὶ ἣν λόγον
ἔχει ἡ ἐπ' εὐθείας μὲν ὅσα τῇ ἀξιν περὶ τὴν ἀξιν
τομῆς, ὑποτείνουσα δὲ Γ ἐκτὸς Γ τεγωνόν γωνίαν,
ὅτι τὸ τετράγωνον τὸ ὅτῳ Γ ἡ γωνία ὅτῳ Γ κο-
ρυφῆς Γ ἑκὼν παρὰ Γ διάμετρος Γ τομῆς ὡς Γ
βάσεως Γ τεγωνόν, περὶ τὸ παρὰκείμενον ὑπὸ Γ
 Γ βάσεως τμηματῶν ὅτι ποιεῖ ἡ ἀχρῆ, πλά-
τος ἔχον Γ ὅτῳ λαμβανομένη ὑπ' αὐτῆς ἀπὸ Γ
ἀξιν περὶ τὴν κορυφῇ Γ τομῆς, ὑπερβάλλ-
οι εἶδει ὁμοίᾳ τε καὶ ὁμοίως κεκλιμῇ τῇ παρὰ-
κείμενῃ ὑπὸ τῆς ὑποτείνουσιν Γ ἐκτὸς
γωνίαν Γ τεγωνόν, καὶ τῆς παρ' ἣν διώκῃ αἱ
καταγόμεναι. καλέσθω δὲ ἡ ποσὴ τομῆς
ΤΗΡΒΟΛΗ.

PROP. XII. Theor.

Si conus plano per axem secetur, se-
cetur autem & altero plano secante
basim coni secundum rectam lineam,
quæ ad basim trianguli per axem sit
perpendicularis, & sectionis diame-
ter producta cum uno latere trian-
guli per axem extra verticem coni
conveniat: recta linea, quæ à sectio-
ne ducitur parallela communi sectio-
ni plani secantis & basim coni us-
que ad sectionis diametrum, poterit
spatium adiacens rectæ, ad quam ea,
quæ in directum constituitur diame-
tro sectionis, subtenditurque angulo
extra triangulum, eandem rationem
habet quam quadratum rectæ, quæ
diametro parallela à vertice sectio-
nis usque ad basim trianguli ducitur,
ad rectangulum sub basis partibus
quæ ab ea fiunt contentum, latitu-
dinem habens rectam, quæ ex dia-
metro abscinditur inter ipsam & ver-
ticem sectionis interjectam; excedens-
que figura simili & similiter posita
ei, quæ continetur sub recta angulo
extra triangulum subtensa, & ea juxta
quam possunt quæ ad diametrum ap-
plicantur. vocetur autem huiusmodi
sectio HYPERBOLA.

SIT conus, cujus vertex A punctum, basis circulus BΓ, & secetur plano per axem, atque sectionem faciat triangulum ABΓ; secetur autem & altero plano secante basim conī secundum rectam ΔB ad BΓ basim trianguli ABΓ perpendicularē, faciatque sectionem in superficie conī lineam ΔZE, & sectionis diameter ZH producta cum ipso AΓ latere trianguli ABΓ extra conī verticem conveniat in puncto Θ, & per A ducatur recta AK diametro ZH parallela quæ secet BΓ, & à Z ducatur ZA ad rectos angulos ipsi ZH, fiatque ut quadratum ex KA ad rectangulum BΚΓ ita ΘZ ad ZA; sumatur autem in sectione quodlibet punctum M, & per M ducatur MN parallela ΔE, per N vero ipsi ZA parallela ducatur NOΞ, & juncta ΘΛ, & ad Ξ producta, per puncta Λ, Ξ ipsi ZN parallelae ducantur ΛΟ, ΞΠ: dico MN posse spatium ΖΞ, quod quidem adjacet ipsi ZA, latitudinem habens ZN, excedensque figura ΛΞ, simili similiterque positæ ei, quæ sub ΘZ, ZA continetur.



ΕΣΤΩ κώνος, ὃς κορυφὴ μὲν τὸ Α σημεῖον, βάσις δὲ ὁ ΒΓ κύκλος, καὶ πετμήσθω ὀρθογώνῳ διὰ τῆς ἀξὸνος, καὶ ποιείτω τμήνην τὸ ΑΒΓ τρίγωνον, πετμήσθω δὲ καὶ ἐπὶ τῷ ὀρθογώνῳ τμήνοντι τὴν βάσιν τῆς κώνος κατ' ὀρθῶν τὸ ΔΕ πρὸς ὀρθὰς ὥστε τῇ ΒΓ βάσει τῆς ΑΒΓ τετραγώνου, καὶ ποιείτω τμήνην ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς κώνος τὴν ΔΖΕ γραμμὴν, ἣ δὲ διάμετρος τῆς τμήνης ἢ ΖΗ ἐκβαλλομένη συμπίπτει

μὴν ἀπὸ τῆς ΑΒΓ τετραγώνου, τῇ ΑΓ, ἐκτός τῆς κώνος κορυφῆς κατὰ τὸ Θ, καὶ διὰ τῆς Α τῇ Διμέτρῳ τῆς τμήνης τῇ ΖΗ παράλληλῳ ἤχθω ἡ ΑΚ, ἥτις πνέτω τῇ ΒΓ, καὶ δὲ τῇ Ζ τῇ ΖΗ πρὸς ὀρθὰς ἤχθω ἡ ΖΛ, καὶ πεπιθήσθω ὡς τὸ ἀπὸ Κ Α πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΚΓ ἔστω ἡ ΖΘ πρὸς ΖΛ, ἥτις εἰλήφθω π σημεῖον ὅππῃ τῆς τμήνης τυχὸν τὸ Μ, καὶ διὰ τῆς Μ τῇ ΔΕ παράλληλῳ ἤχθω ἡ ΜΝ, διὰ δὲ τῆς Ν τῇ ΖΛ παράλληλῳ ἡ ΝΟΞ, ἥτις ὀρθῶς ἤχθω ἡ ΘΛ ἐκτελεσθῶν ἐπὶ τὸ Ξ, καὶ διὰ τῆς Α, Ξ τῇ ΖΝ παράλληλῳ ἤχθωσαν

αἱ ΛΟ, ΞΠ· λέγω ὅτι ἡ ΜΝ διπλασιάζει τὸ ΖΞ, ὃ περιέχει τὸν ὀρθογώνον ΖΛ, πλάτους ἔχον τὴν ΖΝ, ὑπερέχον ἐν δὲ τῷ ΛΞ, ὁμοίῳ ὅντι καὶ ὁμοίως κειμένῳ τῷ ὑπὸ τῶν ΘΖ, ΖΛ.

Ἡχθὼν γὰρ διὰ τῆς Ν τῇ ΒΓ παράλληλος ἡ ΠΝΞ, ἐστὶ δὲ ἡ ΜΝ τῇ ΔΕ παράλληλος· τὸ ἄρα διὰ τῆς ΜΝ, ΠΞ ὀρθογώνιον περιέχον ἐστὶ τῷ Διὰ τῆς ΒΓ, ΔΕ, τετρίτῃ τῇ βάσει τῆς κώνος. εἰαν ἄρα ἐκτελεσθῇ τὸ διὰ τῆς ΜΝ, ΠΞ ὀρθογώνιον, ἡ τμήνη κύκλος ἔσται, ὃς διάμετρος ἡ ΠΝΞ, καὶ ἐπὶ αὐτῇ κείσθω ἡ ΜΝ· τὸ ἄρα ὑπὸ τῆς ΠΝΞ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῆς ΜΝ. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς τὸ διὰ τῆς ΑΚ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΚΓ ἔστω ἡ ΖΘ πρὸς ΖΛ, ὃ δὲ τῆς διὰ τῆς ΑΚ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΚΓ λόγος σύγκειται ἐκ τῆς ὅν ἔχει ἡ ΑΚ πρὸς ΚΓ, καὶ ΑΚ πρὸς ΚΒ· καὶ ὁ τῆς ΖΘ ἄρα πρὸς τὴν ΖΛ λόγος σύγκειται ἐκ τῆς ὅν ἔχει ἡ ΑΚ πρὸς ΚΓ, καὶ ἡ ΑΚ πρὸς ΚΒ. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΑΚ πρὸς ΚΓ ἔστω ἡ ΘΗ πρὸς ΗΓ, τετρίτῃ ἡ ΘΝ πρὸς ΝΞ, ὡς δὲ ἡ ΑΚ πρὸς ΚΒ ἔστω ἡ ΖΗ πρὸς ΗΒ, τετρίτῃ ἡ ΖΝ πρὸς ΝΡ· ὃ ἄρα τῆς ΘΖ πρὸς ΖΛ λόγος σύγκειται ἐκ τῆς τῆς ΘΝ πρὸς ΝΞ, καὶ τῆς ΖΝ πρὸς ΝΡ. ὃ δὲ συγκείμενος λόγος ἐκ τῆς τῆς ΘΝ πρὸς ΝΞ, καὶ τῆς ΖΝ πρὸς ΝΡ, ὃ τῆς ὑπὸ τῶν ΘΝΖ ἐστὶ πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς ΣΝΡ· καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ τῆς ΘΝΖ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΣΝΡ ἔστω ἡ ΘΖ πρὸς ΖΛ,

τετρίτῃ

ταύταις ἢ ΘN πρὸς NZ . ἀλλ' ὥς ἢ ΘN πρὸς NZ (τῆς ZN κοινῆς ὑψὸς λαμβανομένης) ἕ-
τως τὸ ὑπὸ τῶν ΘNZ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ZNZ .
καὶ ὥς ἀρα τὸ ὑπὸ τῶν ΘNZ πρὸς τὸ ὑπὸ
τῶν ENZ ἕτω τὸ ὑπὸ τῶν ΘNZ πρὸς τὸ ὑπὸ
τῶν SNP . τὸ ἀρα ὑπὸ SNP ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ
 ENZ . τὸ δὲ ἀπὸ τῆς MN ἴσον ἐδείχθη τῷ ὑπὸ
 SNP καὶ τὸ ἀπὸ τῆς MN ἀρα ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ
τῶν ENZ . τὸ δὲ ὑπὸ ENZ ἐστὶ τὸ EZ παραλ-
ληλόγραμμον ἢ ἀρα MN διῶν) τὸ EZ , ὃ πα-
ράκειται πρὸς τὴν $Z\Lambda$, πλάτος ἔχον τὸ ZN ,
ὑπερβάλλον τῷ ΛZ ὁμοίῳ ὄντι τῷ ὑπὸ τῆς $\Theta Z\Lambda$.

Καλεῖσθαι μὲν ἢ τοιαύτη τομὴ ὑπερβολή· ἢ
δὲ ΛZ , ἢ παρ' αὐτῆς διῶνται αἱ ὅτι τὴν ZH κατα-
γόμεναι πεπεγμένως· καλεῖσθαι δὲ ἢ αὐτὴ καὶ
ὀρθία, Πλαγία δὲ ἢ ΘZ .

ΠΡΟΤΑΣΙΣ γ'.

Εὰν κώνος ὅστις περὶ ἀξὸς τεμνῇ διὰ τῆς ἀξὸς, τεμνῇ δὲ
καὶ ἐτέρῳ ὅστις περὶ ἀξὸς συμπίπτῃ μὲν ἐκατέρῃ
πλευρᾷ τῆς ἀξὸς τῆς ἀξὸς τεμνῇ, μήτε δὲ
ὡς δὲ τῆς βάσεως ὅτις ἡ γωνία, μήτε ὑπεραν-
τίως, τὸ δὲ ὅστις περὶ ἀξὸς ἐστὶν ἢ βάσις τῆς κώνος, καὶ
τὸ τέμνον ὅστις περὶ ἀξὸς συμπίπτῃ κατ' εὐθείαν πρὸς
ὀρθίαν ἔσται ἢ τοὶ τῆς βάσεως τῆς ἀξὸς ἀξὸς τε-
μνῇ ἢ τῆς ἐκ' εὐθείας αὐτῆς ἢ τῆς ἀξὸς ἀξὸς τῆς
κώνος τομῆς παράλληλος ἀχθῇ τῇ κοινῇ τομῇ
τῆς ὅστις περὶ ἀξὸς ὥς τῆς ἀξὸς ἀξὸς τῆς τομῆς, διω-
σταί π' ἑκατέρῃ ὡς δὲ κώνος περὶ ἀξὸς πρὸς εὐ-
θείαν, πρὸς αὐτὴν λόγον ἔχει ἢ ἀξὸς ἀξὸς τῆς
τομῆς, ὅτι τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς ἡ γωνίας ἀπὸ
τῆς κορυφῆς τῆς κώνος πρὸς τῆς ἀξὸς ἀξὸς τῆς τομῆς
ὥς τῆς βάσεως τῆς τεμνῇ, πρὸς τὸ ὡς δὲ κώνος
ἴσον τῷ ἀπολαμβανομένῳ ὑπὸ αὐτῆς
πρὸς αὐτῆς τῆς τεμνῇ εὐθείας, πλάτος ἔχον τῆς
ἀπολαμβανομένης ὑπὸ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ἀξὸς ἀξὸς
πρὸς τῆς κορυφῆς τῆς τομῆς, ἐλλείπον εἶδει
ὁμοίῳ τῇ ὁμοίῳ κώνῳ τῷ ὡς δὲ κώνος ὑπὸ
τῆς ἀξὸς ἀξὸς τῆς παρ' αὐτῆς διῶν). κα-
λεῖσθαι δὲ ἢ τοιαύτη τομὴ $ELLIPSIS$.

Εἰς τὸν κώνον, ὃς κορυφὴ μὲν τὸ A σημεῖον, βάσις
τῆς $B\Gamma$ κύκλος, καὶ περὶ ἀξὸς ὅστις περὶ ἀξὸς διὰ τῆς
ἀξὸς, καὶ ποιέτω τομὴν τὸ $AB\Gamma$ τρίγωνον, περὶ
ὅτις ὅστις περὶ ἀξὸς συμπίπτῃ μὲν ἐκατέρῃ
πλευρᾷ τῆς ἀξὸς τῆς ἀξὸς τεμνῇ, μήτε δὲ ὡς δὲ
λήλῃ τῇ βάσει τῆς κώνος, μήτε ὑπεραντίως ἡ γωνία,

* Latus transversum & rectum (sive potius erectum) sic videtur dici, quod in delineanda Parabola, Hyperbola, vel Ellipsi, illud transversum sive à dextra ad sinistram est ducendum, hoc vero super latus transversum erigendum; eodem sc. sensu quo dicitur πλάτος φάλαγγος, ὀρθία φάλαγγος, quod de diametro transversa & recta similiter intelligendum. Consuetudini tamen & commodo sicuti consulescentes, schemata aliter aliquando delineamus.

hoc est ΘN ad NZ . ut autem recta ΘN ad NZ (sumpta ZN communi altitudine,) ita ΘNZ rectangulum ad rectangulum ZNZ : quare ut rectangulum ΘNZ ad rectangulum ZNZ ita rectangulum ΘNZ ad ipsum SNP : rectangulum igitur SNP [per 9. 5.] æquale est rectangulo ZNZ . sed quadratum ex MN ostensum est æquale rectangulo SNP : ergo quadratum ex MN rectangulo ZNZ æquale crit. rectangulum autem ZNZ est parallelogrammum ZZ : recta igitur MN potest spatium ZZ , quod rectæ $Z\Lambda$ adjacet, latitudinem habens ZN , excedensque figura ΛZ simili ei quæ sub $\Theta Z\Lambda$ continetur.

Dicatur autem hujusmodi sectio *Hyperbola*: & recta ΛZ , *Ea juxta quam possunt quæ ad ZH ordinatim applicantur*: hæc etiam *Latus Rectum* appelletur, ΘZ vero *Transversum*.*

PROP. XIII. Theor.

Si conus plano per axem secetur, & secetur altero plano conveniente cum utroque latere trianguli per axem, quod neque basi coni æquidistat, neque subcontrarie ponatur; planum autem, in quo est basis coni, & secans planum convenient secundum rectam lineam quæ sit perpendicularis vel ad basim trianguli per axem, vel ad eam quæ in directum ipsi constituitur: recta linea, quæ à sectione coni ducitur parallela communi sectioni planorum usque ad diametrum sectionis, poterit spatium adjacens rectæ, ad quam sectionis diameter eam rationem habeat quam quadratum rectæ diametro parallelæ, à vertice coni usque ad trianguli basim ductæ, habet ad rectangulum contentum sub basi partibus quæ inter ipsam & rectas trianguli lineas interjiciuntur, latitudinem habens rectam quæ ex diametro ab ipsa abscinditur ad verticem sectionis, deficientque figura simili & similiter posita ei, quæ sub diametro, & recta juxta quam posunt, continetur. dicatur autem hujusmodi sectio $ELLIPSIS$.

SIT conus, cujus vertex A punctum, basis circulus $B\Gamma$, & secetur plano per axem, atque sectionem faciat triangulum $AB\Gamma$, secetur autem & altero plano conveniente cum utroque latere trianguli per axem, neque basi coni æquidistante, neque subcontrarie posito,


atque

atque faciat sectionem in superficie conii lineam ΔE ; communis vero sectio plani secantis, atque ejus in quo est basis conii, sit ZH perpendicularis ad $B\Gamma$, diameter autem sectionis $E\Delta$, & ab E ducatur $E\Theta$ ad $E\Delta$ perpendicularis, perque A ducatur AK ipsi $E\Delta$ parallela, & fiat ut quadratum ex AK ad rectangulum $BK\Gamma$ ita ΔE ad $E\Theta$, sumaturque quodvis in sectione punctum Λ , & per Λ ipsi ZH parallela ducatur ΛM : dico ΛM posse spatium, quod ipsi $B\Theta$ adjacet, latitudinem habens EM , deficientisque figura simili ei quæ sub $\Delta E\Theta$ continetur.

Jungatur enim $\Delta\Theta$, perque M ducatur $M\Xi N$ parallela ipsi $B\Theta$, & per Θ , Ξ puncta ipsi EM parallelæ ducantur ΘN , ΞO , & per punctum M ducatur ΠMP parallela $B\Gamma$. itaque quoniam ΠP est parallela $B\Gamma$, & ΛM ipsi ZH : erit [per 15. 11.] planum ductum per ΛM , ΠP æquidistans plano per ZH , $B\Gamma$ ducto, hoc est basi conii. si igitur planum per ΛM , ΠP du-

χὲ ποιέτω περὶ ἐν τῇ ὀπίφανείᾳ τῆς κώνης τὴν ΔE γραμμὴν, κοινὴ δὲ περὶ τὴν τέμνοντος ὀπίπεδον, καὶ ἔνθα ὡς ἐστὶν ἡ βάσις τῆς κώνης, ἔστω ἡ ZH πρὸς ὀρθὰς ἔστω τῇ $B\Gamma$, ἡ δὲ διάμετρος τῆς περὶ τὴν $E\Delta$, καὶ ἀπὸ E τῇ $E\Delta$ πρὸς ὀρθὰς ἡχθῶ ἡ $E\Theta$, καὶ διὰ A τῇ $E\Delta$ ὁμοτέλῃς ἡχθῶ ἡ AK , καὶ πεποιθὼς ὡς τὸ ἀπὸ AK πρὸς τὸ ὑπὸ $BK\Gamma$ ἕτως ἡ ΔE πρὸς τὴν $E\Theta$, καὶ εἰληφθῶσι σημεῖον ὅτι τῆς περὶ τὸ Λ , καὶ διὰ A τῇ ZH ὁμοτέλῃς ἡχθῶ ἡ ΛM . λέγω ὅτι ἡ ΛM διώσται πλάγιον, ὃ ὁμοτέλῃς ἐστὶ τῇ $E\Theta$, πλάγιος ἔχον τὴν EM , ἑλλείπον εἶδει ὁμοίω τῷ ὑπὸ $\Delta E\Theta$.

Ἐπειεὺχθῶ ἡ $\Delta\Theta$, καὶ διὰ μὲν M τῇ $E\Theta$ ὁμοτέλῃς ἡχθῶ ἡ $M\Xi N$, διὰ δὲ τῶν Θ , Ξ τῇ EM ὁμοτέλῃς ἡχθῶσιν αἱ ΘN , ΞO , ἔτι δὲ M τῇ $B\Gamma$ ὁμοτέλῃς ἡχθῶ ΠMP . ἐπεὶ ἂν ἡ ΠP τῇ $B\Gamma$ ὁμοτέλῃς ἔστω, ἐστὶ δὲ ἡ ΛM τῇ ZH παράλληλος· τὸ ἄρα διὰ τῶν ΛM , ΠP ὀπίπεδον παράλληλον ἐστὶ τῷ διὰ τῶν ZH , $B\Gamma$ ὀπίπεδον, τέταρτον τῇ



catur, fiet [per 4. huj.] sectio circulus, cujus diameter ΠP ; & est ΛM ad ipsam perpendicularis: ergo [per 35. 3.] rectangulum ΠMP æquale est quadrato ex ΛM . Et quoniam est [ex hyp.] ut quadratum ex AK ad rectangulum $BK\Gamma$ ita ΔE ad $E\Theta$, & ratio quadrati ex AK ad rectangulum $BK\Gamma$ [per 23. 6.] componitur ex ratione quam habet AK ad $K\Gamma$, & ex ea quam AK habet ad $K\Gamma$. ut autem AK ad $K\Gamma$ ita [per 4. 6.] EH ad $H\Gamma$, hoc est EM ad $M\Gamma$; & ut AK ad $K\Gamma$ ita ΔH ad $H\Gamma$, hoc est ΔM ad $M\Gamma$: erit igitur ratio ΔE ad $E\Theta$ composita ex ratione EM ad $M\Gamma$, & ratione ΔM ad $M\Gamma$. sed ratio composita ex rationibus EM ad $M\Gamma$, & ΔM ad $M\Gamma$, est ea quam $EM\Delta$ rectangulum habet ad rectangulum ΠMP : igitur ut rectangulum $EM\Delta$ ad ipsum rectangulum ΠMP ita ΔE ad $E\Theta$, sive ΔM ad $M\Xi$. ut autem ΔM ad $M\Xi$ (sumpta $M\Xi$ com-


βάσει τῆς κώνης. εἰαν ἄρα ἐκβληθῇ διὰ τῶν ΛM , ΠP ὀπίπεδον, ἡ περὶ κύκλος ἐστὶν, ἡ δὲ διάμετρος τῆς ΠP , καὶ ἐπὶ καθέτως ἐπ' αὐτὴν ἡ ΛM . τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΠMP ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ ΛM . καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς τὸ ἀπὸ AK πρὸς τὸ ὑπὸ $BK\Gamma$ ἕτως ἡ ΔE πρὸς τὴν $E\Theta$, λόγος δὲ τῶν ἀπὸ AK πρὸς τὸ ὑπὸ $BK\Gamma$ σύγκειται ἐκ τῶν ὅν ἔχει ἡ AK πρὸς $K\Gamma$, καὶ ἡ AK πρὸς $K\Gamma$. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ AK πρὸς $K\Gamma$ ἕτως ἡ EH πρὸς $H\Gamma$, τετάρτην ἡ EM πρὸς $M\Gamma$, ὡς δὲ ἡ AK πρὸς $K\Gamma$ ἕτως ἡ ΔH πρὸς $H\Gamma$, τετάρτην ἡ ΔM πρὸς $M\Gamma$. ὁ ἄρα ΔE πρὸς τὴν $E\Theta$ λόγος σύγκειται ἐκ τῶν τῶν EM πρὸς $M\Gamma$, ἔτι τῶν ΔM πρὸς $M\Gamma$. ὁ δὲ συγκείμενος λόγος ἐκ τῶν ὅν ἔχει ἡ EM πρὸς $M\Gamma$, καὶ ἡ ΔM πρὸς $M\Gamma$, ὁ τῶν ὑπὸ τῶν $EM\Delta$ ἐστὶ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΠMP . ἐστὶν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ τῶν $EM\Delta$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΠMP ἕτως ἡ ΔE πρὸς τὴν $E\Theta$, τετάρτην ἡ ΔM πρὸς τὴν $M\Xi$. ὡς δὲ ἡ ΔM πρὸς $M\Xi$, τὸ $M\Xi$ κοινόν.

puncta; perque $B\Gamma$ & axem planum ducatur, quod sectiones faciat in circulis quidem rectas ZO , $B\Gamma$ parallelas; in superficie vero ipsas BAO , $ΓΑΞ$: & erit [per 10.11.] ZO ad HK perpendicularis; quoniam & $B\Gamma$ perpendicularis est ad $Z\Delta$, & utraque utrique est parallela. & quoniam planum per axem ductum sectionibus occurrit ad puncta M , N , quæ sunt intra lineas: plane constat ipsum etiam lineas secare. secet autem in Θ , E : ergo puncta M , E , Θ , N erunt & in plano per axem, & in eo in quo sunt lineæ ipsæ; & propterea [per 5.11.] $ME\Theta N$ recta erit. constat etiam [per 3. huj.] puncta Z , Θ , A , Γ in eadem recta esse, itemque B , E , A , O ; quoniam sunt & in superficie conica & in plano per axem. ducantur ergo à punctis Θ , E ipsi ΘB ad rectos angulos rectæ ΘP , $E\Pi$; perque A rectæ $ME\Theta N$ parallela ducatur ΣAT , & fiat ut quadratum ex $A\Sigma$ ad rectangulum $B\Sigma\Gamma$ sic ΘB ad $E\Pi$, & ut quadratum ex AT ad rectangulum $OT\Xi$ sic $E\Theta$ ad ΘP . itaque quoniam conus, cuius vertex A & basis $B\Gamma$ circulus, secatur plano per axem, quod sectionem facit triangulum $AB\Gamma$; secatur autem & altero plano secante basim conii secundum ΔMZ ad $B\Gamma$ perpendicularem, quod sectionem facit in superficie lineam ΔEZ , diameterque ME producta cum uno latere trianguli per axem extra coni verticem convenit, & per punctum A diametro sectionis EM parallela ducitur $A\Sigma$, ab E vero ducitur $E\Pi$ ad rectos angulos ipsi EM , atque est ut quadratum ex $A\Sigma$ ad rectangulum $B\Sigma\Gamma$ ita $E\Theta$ ad $E\Pi$: erit [per 12. huj.] ipsa ΔEZ sectio hyperbola, & recta EM ea juxta quam possunt quæ ad BM ordinatim applicantur; transversum vero figuræ latus est recta ΘE . eadem ratione & $H\Theta K$ hyperbola erit, cuius diameter ΘN ; recta ΘP ea juxta quam possunt ordinatim ad ΘN applicatæ; ΘB vero transversum figuræ latus.

Dico ΘP ipsi $E\Pi$ æqualem esse

Quoniam enim parallelæ sunt $B\Gamma$, ZO : ut $A\Sigma$ ad $\Sigma\Gamma$ ita erit [per 4.6.] AT ad $T\Xi$; & ut $A\Sigma$ ad ΣB ita AT ad TO . sed [per 23.6.] ratio $A\Sigma$ ad $\Sigma\Gamma$, una cum ratione $A\Sigma$ ad ΣB , est ea quam habet quadratum ex $A\Sigma$ ad rectangulum $B\Sigma\Gamma$, & ratio AT ad $T\Xi$, una cum ratione AT ad TO , est quam habet quadratum ex AT ad rectangulum ΞTO : ergo ut quadratum ex

$B\Gamma$ σημεῖα, καὶ διὰ τὸ $B\Gamma$ εἶναι ἄξονος ὀρθόπεδον ἐκβεβηκὼς ποιήσει δὴ τμήας ἐν μὲν τοῖς κύκλοις ὁρθογώνως εὐθείας τὰς ZO , $B\Gamma$, ἐν δὲ τῇ ὀρθοφανείᾳ τὰς BAO , $ΓΑΞ$: ἐστὶ δὲ ἡ ZO τῇ HK πρὸς ὀρθάς, ἐπειδὴ καὶ ἡ $B\Gamma$ τῇ $Z\Delta$ ἐστὶ πρὸς ὀρθάς καὶ ἐστὶν ἑκατέρωθεν ὁρθογώνιος. καὶ ἐπεὶ τὰ $Δ$ καὶ $Ε$ ἄξονος ὀρθοπέδων τὰς τμήας συμβάλλει κατὰ M , N σημεῖα ἐν τῇ $ME\Theta N$ ὀρθοπέδῳ, καὶ ἐν τῇ $ME\Theta N$ ὀρθοπέδῳ εἰς αὐτὴν αἱ γραμμαὶ εὐθείαι ἄρα ἐστὶν ἡ $ME\Theta N$ γραμμὴ. καὶ φανερόν ὅτι τὰ $π$ Z , Θ , A , Γ ἐπ' εὐθείας ἐστὶ, καὶ τὰ B , E , A , O , ἐπὶ γὰρ τῇ κοινῇ ὀρθοφανείᾳ ἐστὶ, καὶ ἐν τῇ $Δ$ καὶ $Ε$ ἄξονος ὀρθοπέδῳ. ἤχθωσαν δὴ διὰ τὸν μὲν Θ , E τῇ ΘE πρὸς ὀρθάς αἱ ΘP , $E\Pi$, διὰ δὲ A τῇ $ME\Theta N$ ὁρθογώνως ἤχθω ἡ ΣAT , καὶ πεποιθὼς ὡς μὲν τὸ διὰ τὸ Δ Σ πρὸς τὸ Σ $B\Sigma\Gamma$ ἔστω ἡ ΘB πρὸς $E\Pi$, ὡς δὲ τὸ διὰ τὸ Δ AT πρὸς τὸ Σ $OT\Xi$ ἔστω ἡ $E\Theta$ πρὸς ΘP . ἐπεὶ ἔν κώνος, ὁ κορυφὴ μὲν τὸ A σημεῖον, βάσις δὲ ὁ $B\Gamma$ κύκλος, τμήα $ME\Theta N$ ὀρθοπέδῳ διὰ Δ ἄξονος, καὶ πεποιθὴς τομὴν τὸ $AB\Gamma$ τρίγωνον, τμήα ΔEZ καὶ ἐπὶ τῷ ὀρθοπέδῳ τμήοντι τὴν βάσιν Δ κώνος κατ' εὐθείαν τὴν ΔMZ πρὸς ὀρθάς ἔσται τῇ $B\Gamma$, καὶ πεποιθὴς τομὴν ἐν τῇ ὀρθοφανείᾳ τὴν ΔEZ , ἡ δὲ



Διόμετρος ἡ ME ἐκβεβηκὼς συμπέσῃκει μὲν πάλωρ Δ καὶ Δ ἄξονος τριγώνου ἐκ τῶν Δ κορυφῆς Δ κώνος, καὶ διὰ Δ A σημεῖον τῇ διαμέτρῳ Δ τμήας τῇ EM ὁρθογώνως ἡ Δ $A\Sigma$, καὶ διὰ Δ E τῇ EM πρὸς ὀρθάς ἡ $E\Pi$, καὶ ἐστὶν ὡς τὸ διὰ Δ $A\Sigma$ πρὸς τὸ Σ $B\Sigma\Gamma$ ἔστω ἡ $E\Theta$ πρὸς $E\Pi$. ἡ μὲν ΔEZ ἄρα τμήα ὑπερβολῆς ἐστὶν, ἡ δὲ $E\Pi$ πρὸς ἡν διώκον αἱ Δ EM καταγόμεναι πεπαγμένως, πλαγία δὲ εἶδος πλευρὰ ἡ ΘE . ὁμοίως δὲ καὶ ἡ $H\Theta K$ ὑπερβολῆς ἐστὶν, ἡ δὲ Δ $Διόμετρος$ μὲν ἡ ΘN , ἡ δὲ ΘP πρὸς ἡν διώκον αἱ Δ ΘN καταγόμεναι πεπαγμένως, πλαγία δὲ εἶδος πλευρὰ ἡ ΘE .

Λέγω ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΘP τῇ $E\Pi$.

Ἐπεὶ γὰρ ὁρθογώνως ἐστὶν ἡ $B\Gamma$ τῇ ZO ἐστὶν ὡς ἡ $A\Sigma$ πρὸς $\Sigma\Gamma$ ἔστω ἡ AT πρὸς $T\Xi$, καὶ ὡς ἡ $A\Sigma$ πρὸς ΣB ἔστω ἡ AT πρὸς TO . ἀλλ' ὁ Δ $A\Sigma$ πρὸς $\Sigma\Gamma$ λόγος μὲν Δ $A\Sigma$ πρὸς ΣB , ὁ δὲ Δ $A\Sigma$ πρὸς τὸ Σ $B\Sigma\Gamma$ ὁ δὲ Δ AT πρὸς $T\Xi$ μετα τῶν Δ AT πρὸς TO , ὁ δὲ Δ AT πρὸς τὸ Σ ΞTO ἐστὶν ἄρα ὡς τὸ διὰ Δ $A\Sigma$ πρὸς τὸ

ὑπὸ ΒΣΓ ἕως τὸ δὸπ' ΑΤ πρὸς τὸ ὑπὸ ΕΤΟ.
καὶ ἔστιν ὡς μὲν τὸ δὸπ' ΑΣ πρὸς τὸ δὸπ' ΒΣΓ
ἕως ἢ ΘΕ πρὸς ΕΠ, ὡς δὲ τὸ δὸπ' ΑΤ πρὸς
τὸ ὑπὸ ΕΤΟ ἕως ἢ ΘΕ πρὸς ΘΡ· καὶ ὡς ἄρα
ΘΕ πρὸς ΕΠ ἕως ἢ ΕΘ πρὸς ΘΡ· ἴση ἄρα
ἔστιν ἢ ΕΠ τῇ ΘΡ.

ΛΣ ad rectangulum ΒΣΓ ita quadratum ex
ΑΤ ad rectangulum ΕΤΟ. ut autem quadratum
ex ΛΣ ad ΒΣΓ rectangulum ita [per constr.]
ΘΕ ad ΕΠ; & ut quadratum ex ΑΤ ad rectan-
gulum ΕΤΟ ita ΘΕ ad ΘΡ: ergo ut ΘΕ ad ΕΠ
ita ΕΘ ad ΘΡ: æqualis igitur est [per 9. 5.] ΕΠ
ipsi ΘΡ.

EUTOCIUS.

Δυνατὸν μὲν καὶ ἕως δεῖξαι. ἐπεὶ γὰρ ὁμοειδὲς ἔστιν
ἢ ΒΓ τῇ ΖΟ, ἔστιν ὡς ἢ ΓΣ πρὸς ΣΑ ἢ ΖΤ πρὸς
ΤΑ, καὶ ἀπὸ τῶν αὐτῶν ὡς ἢ ΑΣ πρὸς ΣΒ ἢ ΑΤ
πρὸς ΤΟ· δι' ἴσου ἄρα ὡς ἢ ΓΣ πρὸς ΣΒ ἢ ΖΤ
πρὸς ΤΟ· καὶ ὡς ἄρα τὸ δὸπ' ΓΣ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΣΒ
τὸ δὸπ' ΖΤ πρὸς τὸ ὑπὸ ΖΤΟ. ἔστι δὲ ἀπὸ τῶν
ὁμοειδῶν τῶν περὶ αὐτῶν, ὡς τὸ δὸπ' ΑΣ πρὸς τὸ δὸπ' ΣΓ
τὸ δὸπ' ΑΤ πρὸς τὸ δὸπ' ΖΤ· δι' ἴσου ἄρα ὡς τὸ δὸπ'
ΑΣ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΣΓ τὸ δὸπ' ΑΤ πρὸς τὸ ὑπὸ ΖΤΟ.
καὶ ἔστιν ὡς μὲν τὸ δὸπ' ΑΣ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΣΓ ἢ
ΘΕ πρὸς ΕΠ, ὡς δὲ τὸ δὸπ' ΑΤ πρὸς τὸ ὑπὸ
ΖΤΟ ἢ ΘΕ πρὸς ΘΡ· καὶ ὡς ἄρα ἢ ΘΕ πρὸς ΕΠ
ἢ ΕΘ πρὸς ΘΡ· ἴση ἄρα ἔστιν ἢ ΕΠ τῇ ΘΡ.

Πάντην μὲν ἐκ ἔχει. φανερὸν δὲ ἔστιν ὁ σκοπὸς, συν-
χεῖς ὡν τὰς πρὸ αὐτῶν περὶ τῶν ὁμοειδῶν γὰρ ἐκείνοις τὴν διά-
μετρον τῶν ἀντιστοιχούντων ζῆται τὴν ἀρχὴν, καὶ τὰς παρ' αὐ-
τῶν δυνάμεις.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Η'.

Εὰν ἐν ἐλλείψει ἀπὸ τῆς διχοτομίας τῆς ἀφαιρέσεως
ἀχθῶσα εὐθεῖα πεταγμένη ἐκλειπῇ ἐφ' ἐκεί-
νην ἕως τῆς τομῆς, καὶ ποιῶν ὡς ἢ ἐκλειπῶσα
πρὸς τῆς ἀφαιρέσεως ἕως ἢ ἀφαιρέσεως πρὸς
πῆλιν εὐθεῖαν ἥτις ἀπὸ τῆς τομῆς ἀχθῆναι ὀφεί-
λει ἐκλειπῶσαι ὁμοειδῶς τῇ ἀφαιρέσει
διωκῶν τὸ ὁμοειδῆς ὡς τῇ τριτῇ
ἀνάλογον, πλάτος ἔχον τὸ αὐτῆς ἀπο-
λαμβανομένη πρὸς τῇ τομῇ, ἐλλείποντι εὐθεί-
ᾳ ὡς τῇ ἀφαιρέσει ὑπὸ τῆς ἐφ' ἢ ἀχθῶν
καὶ τῇ παρ' ἢ διώκων. καὶ περὶ ἀλλομενῆς
ἢ ἐπὶ μέρους τῆς τομῆς δίχα τμηθῶν ὑπὸ
τῆς ἐφ' ἢ κατῆναι.

ΕΣΤΩ ἐλλείψις, ἥς διάμετρος ἢ ΑΒ, ἐπιμή-
δω ἢ ΑΒ δίχα κατὰ τὸ Γ, καὶ ἀπὸ τῆς Γ
ἡχθῶσα πεταγμένη ἐκλειπῶσα ἐφ' ἐκείνην ἕως
τῆς τομῆς ἢ ΔΓΕ, ἐπὶ δὲ Δ σημείω τῇ ΔΕ πρὸς ὁ-
ρθῶς ἡχθῶσα ἢ ΔΖ, ἐπιείδω ὡς ἢ ΔΕ πρὸς ΑΒ
ἕως ἢ ΑΒ πρὸς τὴν ΔΖ, καὶ εἰληφθῶσι σημείων
ὅτι τῆς τομῆς τὸ Η, καὶ διὰ τῆς Η τῇ ΑΒ ὁμοειδῶς
ἡχθῶσα ἢ ΗΘ, καὶ ἐπιεύχθω ἢ ΕΖ, καὶ διὰ μὲν τῆς
Θ τῇ ΔΖ ὁμοειδῶς ἡχθῶσα ἢ ΘΛ, διὰ δὲ τῆς Ζ, Α
τῇ ΘΔ ὁμοειδῶς ἡχθῶσαι αἱ ΖΚ, ΑΜ· λέγω
ὅτι ἢ ΗΘ διώκων τὸ ΔΛ, ὁ ὁμοειδῶς τῇ ΔΖ,
πλάτος ἔχον τὴν ΔΘ, ἐλλείποντι εὐθείᾳ ΑΖ ὁμοει-
δῶς τῇ ΔΕ ΔΖ.

Εἰς γὰρ παρ' αὐτῶν δύναται ἐπὶ τῇ ΑΒ κατὰ τὴν
πεταγμένην ἢ ΑΝ, καὶ ἐπιεύχθω ἢ ΒΝ, καὶ διὰ μὲν τῆς



PROP. XV. Theor.

Si in ellipsi, à puncto quod diametrum
bifariam dividit, recta ordinatim ducta
ex utraque parte ad sectionem pro-
ducatur, & fiat ut producta ad dia-
metrum ita diameter ad aliam: recta
linea, quæ à sectione ducitur ad pro-
ductam diametro parallela, poterit
spatium adjacens tertiæ proportio-
nali, latitudinem habens rectam quæ
inter ipsam & sectionem interjicitur,
deficiensque figura simili ei quæ con-
tinetur sub rectâ ad quam ducuntur
& eâ juxta quam possunt. & si ulte-
rius producat ad alteram partem se-
ctionis, bifariam secabitur ab ea ad
quam applicata fuerit.

SIT ellipsis, cujus diameter ΑΒ, secetur-
que ΑΒ bifariam in Γ puncto, & per Γ
ordinatim applicata ex utraque parte ad sectio-
nem producat, quæ sit ΔΓΕ; à puncto au-
tem Δ ipsi ΔΕ ad rectos angulos ducatur ΔΖ,
fiatque ut ΔΕ ad ΑΒ ita ΑΒ ad ΔΖ; &
sumpto quolibet puncto Η in sectione, per
Η ducatur ΗΘ ipsi ΑΒ parallela, & junga-
tur ΕΖ; deinde per Θ ipsi ΔΖ parallela du-
catur ΘΛ, & per Ζ, Α puncta ducantur ipsi
ΘΔ parallela ΖΚ, ΑΜ: dico ΗΘ posse spa-
tium ΔΛ, quod quidem adjacet rectæ ΔΖ, la-
titudinem habens ΔΘ, deficiensque figura ΑΖ
simili ei quæ sub ΕΔΖ continetur.

Sit enim ΑΝ ex juxta quam possunt ordina-
tim applicatæ ad ΑΒ, junganturque ΒΝ; & per
Η quidem


Η Τῇ ΔΕ **ἐν τῷ ἀλλήλῳ** ἡ ΧΥΙΩ Η ΗΖ, **αἱ δὲ εἰς τῶν**
 Ζ, Γ Τῇ ΑΝ **ἐν τῷ ἀλλήλῳ** ἡ ΧΥΙΩ **αἱ** ΖΟ, ΓΠ,
αἱ δὲ εἰς Τ Ν, Ο, Π Τῇ ΑΒ **ἐν τῷ ἀλλήλῳ** ἡ ΧΥΙΩ **αἱ**
 ΝΤΡ, Ο Σ, ΤΠ' **ἵστα ἄρα** ἐὰν τὸ μὲν ὄνομα τῆς
 ΔΓ τῷ ΑΠ, τὸ εἰς ὄνομα τῆς ΗΖ τῷ ΑΟ. **καὶ**
ἐπὶ ἐκείνῳ ὡς ἡ ΒΑ **καὶ** ΑΝ **ἐκείνῳ** ἡ ΒΓ **καὶ**
 ΓΠ, **καὶ** ἡ ΠΤ **καὶ** ΤΝ, **ἵστα δὲ** ἡ ΒΓ Τῇ ΓΑ,
καὶ τῇ ΤΠ' **ὅτι** ἡ ΓΠ Τῇ ΤΝ **ἐστὶν ἵστα ἵστα ἄρα**
 ἐὰν τὸ μὲν ΑΠ τῷ ΤΡ, τὸ δὲ ΣΤ τῷ ΤΥ. **καὶ** **ἐπὶ**
 τὸ ΟΤ τῷ ΟΡ **ἐστὶν ἵστα, καὶ** τὸ ΟΝ' τὸ ΤΤ
ἄρα ἵστα ἐστὶ τῷ ΝΣ. **ἀλλὰ** τὸ ΤΤ τῷ ΤΖ **ἐστὶν**
ἵστα τὸ ΤΖ **ἄρα ἵστα ἐστὶ τῷ** ΝΣ. **καὶ** τὸ ΤΣ'
ἄρα τὸ ΝΠ, **καὶ** τῇ ΠΑ, **ἵστα ἐστὶ τῷ**



ΑΟ μετα τῷ ΠΟ· ὡς τε ΠΑ τῷ ΑΟ ὑπερέχον τῷ
 ΟΠ· καὶ ὅτι τὸ μὲν ΑΠ ἴσον τῷ λοιπῷ τῆς ΓΑ,
 τὸ δὲ ΑΟ ἴσον τῷ λοιπῷ τῆς ΕΗ, τὸ δὲ ΟΗ
 ἴσον τῷ ὑποὶ ΟΣΠ· τὸ ἄρα λοιπὸν τῆς ΓΑ τῷ
 λοιπῷ τῆς ΗΕ ὑπερέχον τῷ ὑποὶ ΤΟΣΠ. Ἐπειὶ
 ἡ ΔΕ τέτταρτη οὐκ ἰσὺν κατὰ τὸ Γ, οὐκ δὲ ἄνωγε
 κατὰ τὸ Θ· τὸ ἄρα ὑποὶ τῶν ΕΘΔ μετα τῷ
 λοιπῷ τῆς ΓΘ, ταύτην ᾗ ΕΗ, ἴσον ἐστὶ τῷ λοιπῷ
 τῆς ΓΔ· τὸ ἄρα λοιπὸν τῆς ΓΑ τῷ λοιπῷ τῆς ΕΗ
 ὑπερέχον τῷ ὑποὶ τῶν ΕΘΔ. ὑπερέχει δὲ καὶ
 τὸ λοιπὸν ᾗ ΓΑ τῷ λοιπῷ ᾗ ΗΕ τῷ ὑποὶ ᾗ ΟΣΠ· τὸ
 ἄρα ὑποὶ τῶν ΕΘΔ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑποὶ ᾗ ΟΣΠ, καὶ
 ἐστὶ

$B\Lambda N$ æquale erit. & quia æquales sunt AB , BZ ; erit [per 7. 5.] ut AB ad AB ita BZ ad BA . ut autem AB ad AB sic MK [per 4. 6.] ad KB ; & ut BZ ad BA sic NA ad AA : quare ut MK ad KB sic NA ad AA . sed ut MK ad KB (sumpta KA communi altitudine) ita [per 1. 6.] rectangulum MKA ad rectangulum BKA ; & ut NA ad AA (sumpta BA communi altitudine) ita NAB rectangulum ad rectangulum $AA B$: ergo ut rectangulum MKA ad

$B\Lambda N$. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ AB τῇ BZ · ἔστιν ἄρα ὡς ἡ AB πρὸς AB ὅτως ἡ BZ πρὸς BA . ἀλλὰ ὡς ἡ AB πρὸς AB ὅτως ἡ MK πρὸς KB , καὶ ὡς ἡ BZ πρὸς BA ὅτως ἡ NA πρὸς AA · καὶ ὡς ἄρα ἡ MK πρὸς KB ὅτως ἡ NA πρὸς AA . ἀλλ' ὡς ἡ MK πρὸς τὴν KB , τὸ KA κοινὸν ὑψὺς λαμβανόμενης, ὅτως τὸ ὑπὸ MKA πρὸς τὸ ὑπὸ BKA , ὡς ἡ NA πρὸς AA , τὸ BA κοινὸν ὑψὺς λαμβανόμενης, ὅτως τὸ ὑπὸ NAB πρὸς τὸ ὑπὸ $AA B$.



rectangulum BKA ita rectangulum NAB ad ipsum $AA B$; & [per 16. 5.] permutando ut MKA rectangulum ad rectangulum NAB ita BKA rectangulum ad rectangulum $AA B$. est autem [ut modo ostensum] rectangulum MKA æquale rectangulo NAB : quare & BKA rectangulum æquale rectangulo $AA B$; & propterea AK ipsi AB æqualis erit. estque AG æqualis GB : ergo & tota KG toti GA : & ideo HZ ipsi EO æqualis. recta igitur HO ab ipsa $EG\Delta$ bifariam secabitur, atque est ipsi AB parallela: ergo [per 17. def.] diameter erit & $EG\Delta$ conjugata ipsi AB .

καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ MKA πρὸς τὸ ὑπὸ BKA ὅτως τὸ ὑπὸ NAB πρὸς τὸ ὑπὸ $AA B$ · καὶ ἐναλλάξ ὡς τὸ ὑπὸ MKA πρὸς τὸ ὑπὸ NAB ὅτως τὸ ὑπὸ BKA πρὸς τὸ ὑπὸ $AA B$. καὶ ἔστι ἴση τὸ ὑπὸ MKA τῷ ὑπὸ NAB · ἴση ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ὑπὸ BKA τῷ ὑπὸ $AA B$ · ἴση ἄρα ἡ AK τῇ AB . ἔστι δὲ καὶ ἡ AG τῇ GB ἴση· ὅλη ἄρα ἡ KG ὅλη τῇ GA ἴση ἐστὶν· ὡς καὶ ἡ HZ τῇ EO . ἡ HO ἄρα διχοτομῇ τὴν $EG\Delta$, καὶ ἐστὶν ὡς ἀπὸ τοῦ κέντρου τῇ AB · ἀξιωματικῶς ἄρα ἐστὶ, καὶ ἡ $EG\Delta$ συζυγὴς τῇ AB .

EUTOCIUS.

* Quare & BKA rectangulum æquale rectangulo $AA B$; & propterea AK ipsi AB æqualis erit.] Quoniam enim rectangulum BKA ipsi $AA B$ rectangulo est æquale; erit [per 16. 6.] ut KB ad AA ita AB ad AK , permutandoque ut KB ad BA ita AA ad AK , & componendo ut KA ad AB ita KA ad KA : æqualis igitur est KA ipsi BA .

Scire autem oportet, in quintodecimo & sexto decimo theoremate Apollonio propositum fuisse, ut secundas, & conjugatas quas vocant, diametros inquireret ellipsis, & hyperbolæ, & oppositarum sectionum: parabola enim ejusmodi diametrum non habet. sed & illud notatu dignum est, diametros ellipsis intra recipi; hyperbolæ vero & oppositarum sectionum diametros describi extra. oportet autem rectas juxta quas possunt ordinatim applicatæ, seu recta latera, & quæ ipsis æquidistant ad rectos angulos aptare; ordinatim vero applicatas, & secundas diametros non semper. maxime tamen debent in acuto angulo applicari, ut longe aliter & diversè ab eis quæ recto lateri sunt parallelæ, deprehendantur.

DEFINITIONES SECUNDÆ.

1. PUNCTUM, quod hyperbolæ & ellipsis diametrum bifariam dividit, centrum sectionis dicatur.

*

* ἴση ἄρα τὸ ὑπὸ BKA τῷ ὑπὸ $AA B$ · ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ AK τῇ AB .] Ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ BKA πρὸς τὸ ὑπὸ $AA B$ ἐστὶν ἴσον· ἀνάλογον ἐστὶν ὡς ἡ KB πρὸς AA ἢ AB πρὸς AK , καὶ ἐναλλάξ ὡς ἡ KB πρὸς BA ἢ AA πρὸς AK , καὶ συνθέντι δὲ ἡ KA πρὸς AB ἢ KA πρὸς KA · ἴση ἄρα ἡ KA τῇ BA .

Δεῖ δὲ πρὸς τοῦτο, ὅτι ἐν ταῖς πύμνις καὶ διχοτομῇ καὶ ἐκκεντρικῇ διαμέτρῳ σκοποῦν ἔχει ζῆναι τὰς κατασκευὰς διωτέρας καὶ συζυγίας ἀξιώματι τῇ ἐλλείψει, καὶ τῇ ὑπερβολῇ, καὶ τῇ ἀντικειμένῳ· ἢ γὰρ ὁρθῶς ἐκ τῆς ταύτης ἀξιώματι. ὁρθῶς γὰρ δὲ, ὅτι αἱ μὲν τῇ ἐλλείψει ἀξιώματι ἐνταῖς ἀπολαμβάνονται, αἱ δὲ τῇ ὑπερβολῇ καὶ τῇ ἀντικειμένῳ ἐκτὸς κατασκευάζονται. δεῖ γὰρ τὰς μὲν παρὰ αὐτὴν διώκειν, ἢ τοὺς ὁρθοὺς πλευρὰς, πρὸς ὁρθὰς ταύτας, καὶ διανοῖν καὶ τὰς παραλλήλους αὐταῖς· τὰς δὲ τεταγμένας καταγομῆσαι, καὶ τὰς διωτέρας διαμέτρους, ἢ παντὶ. μάλιστα γὰρ ἐν ὁξείᾳ γωνίᾳ δεῖ κατασκευάζειν αὐτάς, ἵνα σαφέως ὁσιν τὰς ἐν τῇ γωνίᾳ ἑταίρας ἴσαι τῇ παραλλήλῳ τῇ ὁρθῇ πλευρᾷ.

ΟΡΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΙ.

α'. ΤΗΣ ὑπερβολῆς καὶ τῇ ἐλλείψει ἐκείνης ἡ διχοτομία τῆς ἀξιώματι, καί τρεῖς τῇ τομῇ καλεῖσθαι.

β'. Η δὲ

guræ latera BA, AN . oportet autem hoc scire etiam ob commodam figurarum descriptionem. nam cum inæquales sint $AB, \Delta E$ diametri (in solo enim circulo sunt æquales) constat rectam, quæ minori earum ad rectos angulos ducitur, ut hoc in loco ΔZ , eo quod sit tertia proportionalis ipsis $\Delta E, AB$, utraque maiorem esse: eam vero, quæ ad angulos rectos ducitur majori ut AN , eo quod sit tertia proportionalis ipsis $AB, \Delta E$, utraque esse minorem; ita ut quatuor continue proportionales sint, ut enim AN ad ΔE sic est ΔE ad AB & AB ad ΔZ .


ἢ εἶδες πλευρῶν. δὲ ὅτι εἰδέναι καὶ οὗτο, ἀπὸ τοῦ ὅτι καὶ τὰς πλευρὰς εἶναι ἰσὰς, δηλοῦν ὅτι ἡ μὲν πρὸς ἑαυτὴν ἀγομένη τῇ ἐλάσσονι αὐτῶν, ὥς ἐνταῦθα ἡ ΔZ , ἀπὸ τείτῃ ἀνάλογον ἔσται τῶν $\Delta E, AB$, μείζονι δὲ τὴν ἀμφοῖν ἡ δὲ πρὸς ἑαυτὴν ἀγομένη τῇ μείζονι, ὥς ἐνταῦθα ἡ AN , ἀπὸ τείτῃ ἀνάλογον ἔσται τῶν $AB, \Delta E$, ἐλάσσονι δὲ τὴν ἀμφοῖν ὥς καὶ συνήκεις εἶναι τὰς τέσσαρας ἀνάλογον, ὥς γὰρ ἡ AN πρὸς ΔE ὡς ΔE πρὸς AB καὶ ἡ AB πρὸς ΔZ .

PROP. XVII. Theor.

Si in conii sectione à vertice ipsius ducatur recta linea parallela ordinatim applicatæ: extra sectionem cadet.

SIT conii sectio, cujus diameter AB : dico rectam, quæ à vertice, hoc est à puncto A , ducitur parallela ei quæ ordinatim applicatur, extra sectionem cadere.

Si enim fieri potest, cadat intra, ut AG . quoniam igitur in conii sectione sumptum est quoddam punctum G ; recta, quæ ab ipso G intra sectionem ducitur, ordinatim applicatæ parallela, [per 7. huj.] diametro AB occurrit, atque ab ipsa bifariam secatur: quare AG producta bifariam secabitur à recta AB ; quod est absurdum: AG enim producta [per 10. huj.] extra sectionem cadit. non igitur recta, quæ à puncto A ducitur ordinatim applicatæ parallela, cadet intra sectionem: ergo extra cadet; & propterea sectionem ipsam necessario continget.



ΠΡΟΤΑΣΙΣ κζ.

Εὰν ἐν κώνῃ τομῇ ἀπὸ τοῦ κορυφῆς τῆς τομῆς ἀχθῇ εὐθεῖα ὡς ἐνταῦθα τεταγμένης κατὰ τὴν μὲν ἐκτὸς περὶ τὴν τομῆν.

ΕΣΤΩ κώνη τομῆ, ἥς διάμετρος ἡ AB . λέγω ὅτι ἡ ἀπὸ τῆς κορυφῆς, τετάρτη ϵ A σημείω, ὡς ἐνταῦθα τεταγμένης κατὰ τὴν μὲν ἐκτὸς περὶ τὴν τομῆν.

Εἰ γὰρ δυνατὸν, πηλείτω ἐντὸς, ὥς ἡ AG . ἐπεὶ γὰρ ἐν κώνῃ τομῇ εἰληπταὶ τυχόν σημείων τὸ G . ἡ ἄρα ἀπὸ G σημείου ἐντὸς τῆς τομῆς ἀγομένη ὡς ἐνταῦθα τεταγμένης κατὰ τὴν μὲν ἐκτὸς περὶ τὴν τομῆν συμβαλεῖ τῇ AB ἀφ' ἑαυτῆς, καὶ διχα τμηθήσεται ὑπὸ αὐτῆς. ἡ AG ἄρα ἐκβαλλομένη διχα τμηθήσεται ὑπὸ τῇ AB , ὅπερ ἀπορον. ἐκβαλλομένη γὰρ ἡ AG

ἐκτὸς πίπτει τῇ τομῇ. ὅτι ἄρα ἡ ἀπὸ A σημείω, ὡς ἐνταῦθα τεταγμένης κατὰ τὴν μὲν ἐκτὸς περὶ τὴν τομῆν, ὡς ἐνταῦθα τεταγμένης κατὰ τὴν μὲν ἐκτὸς περὶ τὴν τομῆν, ὡς ἐνταῦθα τεταγμένης κατὰ τὴν μὲν ἐκτὸς περὶ τὴν τομῆν, ὡς ἐνταῦθα τεταγμένης κατὰ τὴν μὲν ἐκτὸς περὶ τὴν τομῆν.

EUTOCIUS.

Euclides in quinto decimo theoremate tertii libri elementorum ostendit rectam, quæ ab extremitate diametri ad rectos angulos ducitur, cadere extra atque circum ipsum contingere: Apollonius autem hoc loco universale quoddam demonstrat, quod tum tribus conii sectionibus, tum circulo convenit. hoc enim differt circulus à conii sectionibus, quod in circulo ordinatim applicatæ perpendiculares sunt ad diametrum; neque enim aliæ rectæ parallelæ à diametro circuli bifariam dividuntur: at in tribus sectionibus, perpendiculares non semper ducuntur, præterquam ad solos axes.

Ὁ μὲν Εὐκλείδης ἐν τῷ δεκάτῳ πύμῃ θεωρήματι τὴν πρὸς τὸν ἀξῶνα τῆς τομῆς εὐθεῖαν εἶδειν, ὅτι ἡ πρὸς ἑαυτὴν ἀγομένη ἀπ' ἀκρῆς τῆς ἀφ' ἑαυτῆς ἐκτὸς τῆς τομῆς καὶ ἐφάπτεται τῇ κύκλῳ. ὁ δὲ Ἀπολλώνιος ἐν τούτῳ θεωρήματι πρὸς τοὺς ἀξῶνας εἰσφέρει τὰς πρὸς τὸν κώνη τομῆς καὶ τῇ κύκλῳ. τὴν γὰρ ἀφ' ἑαυτῆς τὴν κύκλῳ τῶν κώνη τομῶν, ὅτι ἐπ' ἑαυτῇ μὲν αἱ τεταγμέναι πρὸς ἑαυτὴν ἀγομέναι τῇ διαμέτρῳ, εἰδὲ γὰρ αἱ εὐθεῖαι παράλληλοι αὐταῖς ὑπὸ τῇ διαμέτρῳ τῇ κύκλῳ διχοτομούνται. ὅτι δὲ τῶν ἐν τῇ τομῇ εἰσάγονται πρὸς ἑαυτὴν ἀγομέναι, οἱ μὲν ὅτι μόνος τὸς ἀξῶνας.

PROP. XVIII. Theor.

Si recta linea conii sectioni occurrat, productaque in utramque partem extra sectionem cadat; sumatur autem aliquod punctum intra sectionem, & per ipsum ei quæ sectioni occurrit parallela ducatur: ducta recta & producta ex utraque parte sectioni occurret.

SIT conii sectio, atque ipsi occurrens recta ABZ , quæ producta in utramque partem extra sectionem cadat; sumpto autem intra se-

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κη.

Εὰν κώνη τομῇ εὐθεῖα συμπίπτουσα, ἐκβαλλομένη ἐφ' ἑκάτερα ἐκτὸς πίπτει τῆς τομῆς, καὶ δὲ ἀπὸ σημείω ἐντὸς τῆς τομῆς, καὶ δὲ αὐτὴ ὡς ἐνταῦθα ἀχθῇ τῇ συμπίπτουσῃ ἡ ἀχθῶσα ἐκβαλλομένη ἐφ' ἑκάτερα συμπεσῇ τῇ τομῇ.


ΕΣΤΩ κώνη τομῇ, ἥς συμπίπτουσα αὐτῇ ἡ ABZ εὐθεῖα, καὶ ἐκβαλλομένη ἐφ' ἑκάτερα ἐκτὸς περὶ τὴν τομῆν, ὡς ἐνταῦθα πηλείτω πρὸς τὸν ἀξῶνα.

CONICORUM LIB. I.

45

τομῆς τὸ Γ, καὶ ἀπὸ τοῦ Γ τῇ ΑΖΒ ὁμοειδὴς ἡχθῶς ἢ ΓΔ· λέγω ὅτι ἡ ΓΔ ἐκβαλλομένη ἐφ' ἐκάτερα συμπεσέτω τῇ τομῇ.

Εἰλήφθω γάρ τι σημεῖον ὅτι τὸ τομῆς τὸ Ε, καὶ ἐπιζεύχθω ἡ ΕΖ. καὶ ἐπεὶ ὁμοειδὴς ἐστὶν ἡ ΑΒ τῇ ΓΔ, καὶ τῇ ΑΒ συμπίπτει πρὸς εὐθείᾳ ἡ ΕΖ, καὶ ἡ ΓΔ ἄρα ἐκβαλλομένη συμπίπτει τῇ ΕΖ. καὶ εἰ μὲν μεταξὺ τῶν Ε, Ζ, φανερόν ὅτι καὶ τῇ τομῇ συμπίπτει· εἰ δὲ ἐκτὸς τοῦ Ε σημεῖον, ὅσον τὸ Γ, ὅσον τῇ τομῇ συμπεσέτω. ἡ ἄρα ΓΔ ἐκβαλλομένη, ὡς ὅτι τὸ Δ μέρος, συμπίπτει τῇ τομῇ. ὁμοίως δὲ δείξομεν, ὅτι καὶ ὡς ὅτι Γ ἐκβαλλομένη συμπίπτει ἡ ΓΔ ἄρα ἐκβαλλομένη ἐφ' ἐκάτερα συμπεσέτω τῇ τομῇ.



ctionem puncto aliquo Γ; per Γ ipsi ΑΖΒ parallela ducatur ΓΔ: dico ΓΔ productam ex utraque parte sectioni occurrere.

Sumatur enim aliquod punctum in ipsa sectione, quod sit Ε, & jungatur ΕΖ. & quoniam recta ΑΒ re-

ctæ ΓΔ est parallela, ipsique ΑΒ occurrit recta ΕΖ, ΓΔ quoque producta ipsi ΕΖ occurret. & siquidem cadat [ut in fig. 1.] inter Ε, Ζ puncta, perspicuum est ipsam sectioni occurrere;

si vero [ut in fig. 2.] extra Ε, sectioni prius occurret: ergo ΓΔ producta, ut ad partes Δ, occurrat sectioni. similiter demonstrabitur, & ut ad partes Γ eidem occurrere: recta igitur ΓΔ producta ex utraque parte sectioni occurret.

EUTOCIUS.

Εν πῶσι ἀντιγράφοις τὸ θεωρήμα τῶν ὅτι μόνος παραβολῆς καὶ ὑπερβολῆς ἔστι. καλλίον δὲ καθολικώτερον ἔχειν πᾶσι περὶ τούτων, εἰ καὶ ὅτι τῆς ἐλλείψεως ἐν ἐκείνοις ὡς ἐκ ἀμφοτέρων ὁμοειδὴς πᾶσι· ἡ γὰρ ΓΔ, ἐν τῇ ἴσῃ τῶν τομῶν περὶ τῆς ἴσως, καὶ αὐτὴ ἐκβαλλομένη κατ' ἀμφοτέρων τῶν τομῶν. δὲ δὲ ἐπεὶ οὕτως, ὅτι, καὶ ἡ ΑΖΒ τῶν τομῶν τῶν αὐτῶν, ἡ αὐτὴ ἀπὸ τοῦ Ε ἀμφοτέρων.


In aliquibus exemplaribus hoc theorema in parabola & hyperbola tantummodo propositum ostendit. sed tamen præstat propositionem universaliorem esse; quamquam de ellipti, ut minime dubium, in illis prætermisum videri potest; nam recta ΓΔ, intra sectionem terminatam existens, si producat ex utraque parte, necessario ipsam secabit. sciendum autem est eandem congruere demonstrationem, etiam si ΑΖΒ fecer ipsam sectionem.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΘ'.

Εἰ πάση κατὰ τομῇ, ἥτις ἀνὰ τὸν τὸν διάμετρον παραβόλῃς κατὰ τὴν κατὰ τὴν ἀχθῇ, συμπεσέτω τῇ τομῇ.

ΕΣΤΩ κατὰ τομῇ, ἥτις ἀχθῇ ἡ ΑΒ, ἐκ τῆς ἀχθῆς τι σημεῖον ὅτι τὸ διάμετρον τὸ Β, καὶ διὰ τοῦ Β ὁμοειδὴς κατὰ τὴν κατὰ τὴν ἀχθῇ ἡ ΒΓ· λέγω ὅτι ἡ ΒΓ ἐκβαλλομένη συμπεσέτω τῇ τομῇ.

Εἰλήφθω γάρ τι σημεῖον ὅτι τὸ τομῆς τὸ Δ, ἐπὶ δὲ καὶ τὸ Α ὅτι τὸ τομῆς· ἡ ἄρα ἀπὸ τοῦ Α ὅτι τὸ Δ ὅτι τὸ τομῆς εὐθείᾳ ἐν τῇ τομῇ συμπεσέτω τῇ τομῇ. καὶ ἐπεὶ ἡ ἀπὸ τοῦ Α ὁμοειδὴς κατὰ τὴν κατὰ τὴν ἀχθῇ εὐθείᾳ ἐκτὸς τῆς τομῆς, καὶ συμπίπτει αὐτῇ ἡ ΑΔ, καὶ ἐπὶ τῇ κατὰ τὴν κατὰ τὴν ἀχθῇ ὁμοειδὴς ἡ ΒΓ· καὶ ἡ ΒΓ ἄρα συμπεσέτω τῇ ΑΔ. καὶ εἰ μὲν μεταξὺ τῶν Α, Δ σημεῖον, φανερόν ὅτι καὶ τῇ τομῇ συμπεσέτω. εἰ δὲ ἐκτὸς τοῦ Δ, ὡς κατὰ τὸ Ε, ὅσον τῇ τομῇ συμπεσέτω. ἡ ἄρα ἀπὸ τοῦ Ε Β ὁμοειδὴς κατὰ τὴν κατὰ τὴν ἀχθῇ εὐθείᾳ συμπεσέτω τῇ τομῇ.



SIT conici sectio, cujus diameter ΑΒ, sumaturque aliquod punctum Β in diametro; & per Β ducatur ΒΓ parallela ordinatim applicatæ: dico ΒΓ productam cum sectione convenire.

Sumatur enim quodlibet punctum Δ in sectione; est autem & punctum Α in sectione: ergo

[per 10. huj.] à puncto Α ad Δ ducta recta intra sectionem cadet. & quoniam [per 17. huj.] quæ ab Α ducta est ordinatim applicatæ parallela, cadit extra sectionem, & cum ipsa convenit recta ΑΔ, itemque

ΒΓ parallela est ordinatim applicatæ: sequitur quod ΒΓ etiam cum ΑΔ conveniet. & si quidem convenit inter puncta Α, Δ; perspicuum est eam cum sectione quoque convenire. si vero extra Δ, ut ad punctum Ε, prius conveniet cum sectione. ergo recta linea, quæ à puncto Β ducitur ordinatim applicatæ parallela, cum sectione conveniet.

M


PROP.

PROP. XX. Theor.

Si in parabola duæ rectæ à sectione ad diametrum ordinatim applicentur: ut eorum quadrata inter sese, ita erunt & rectæ, quæ ab ipsis ex diametro ad verticem abscinduntur.

SIT parabola, cujus diameter AB; & in ipsa sumantur puncta quæpiam Γ, Δ, à quibus ad AB ordinatim applicentur ΓΕ, ΔΖ: dico ZA ad ipsam AE ita esse ut quadratum rectæ ΔΖ ad quadratum rectæ ΓΕ.

Sit enim AH, juxta quam possunt ordinatim applicatæ; erit [per I. huj.] quadratum ex ΔΖ rectangulo ZAH æquale. at quadratum ex ΓΕ æquale rectangulo BAH: quare ut quadratum ex ΔΖ ad quadratum ex ΓΕ ita rectangulum ZAH ad rectangulum BAH. ut autem rectangulum ZAH ad rectangulum BAH, ita [per I. 6.] linea ZA ad lineam AE: ergo ut quadratum ex ΔΖ ad quadratum ex ΓΕ, ita erit ZA ad AE.



ΠΡΟΤΑΣΙΣ κ'.

Εάν οὖν ὀρθολογὴ δὴ τὸ τομῆς καταχρῶσι δύο εὐθεῖαι ὅτι τὸ ἀφ' ἑαυτῶν τετραγώνως ἴσαι ὡς τὰ ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα πρὸς ἀλλήλα, ὅπως αἱ δὲ ποτεμνόμεναι ὑπ' αὐτῶν δὴ τὸ διαμέτρου πρὸς τὴν κορυφὴν τὸ τομῆς.

ΕΣΤΩ ὀρθολογὴ, ἥς ἀφ' ἑαυτῶν ἡ AB, καὶ ἐκλήφθω τινὰ σημεῖα ἐπ' αὐτῆς τὰ Γ, Δ, καὶ ἀπ' αὐτῶν Γ, Δ τετραγώνως κατήχθωσιν ἐπὶ τῇ AB αἱ

ΓΕ, ΔΖ. λέγω ὅτι ἔστι ὡς τὸ δὴ τὸ ΔΖ πρὸς τὸ δὴ τὸ ΓΕ, ὅπως ἡ ZA πρὸς ἡ AE.

Εἰς γὰρ περὶ τὴν δύναμι

αἱ τετραγώνως κατὰ τὴν

σημείῃ AH ἴσων ἔσθ' ὡς τὸ

μὲν δὴ τὸ τῆς ΔΖ τῷ δὴ τὸ

ZAH. τὸ δὴ τὸ τῆς ΓΕ ἴσων

τῷ ὑπὸ τῇ EAH ἔσθ' ὡς ὅτι

ὡς τὸ δὴ τὸ ΔΖ πρὸς τὸ

δὴ τὸ ΓΕ, ὅπως τὸ ὑπὸ ZAH

πρὸς τὸ ὑπὸ EAH. ὡς δὴ τὸ ὑπὸ ZAH πρὸς τὸ

ὑπὸ EAH, ὅπως ἡ ZA πρὸς ἡ AE καὶ ὡς ὅτι τὸ

δὴ τὸ ΔΖ πρὸς τὸ δὴ τὸ ΓΕ, ὅπως ἡ ZA πρὸς ἡ AE.

EUTOCIUS.

Ab hoc theoremate incipiens Apollonius deinceps in omnibus accidentia, quæ ipsi parabolæ insunt & non alii cuiquam, ostendit: sicut plerumque eadem hyperbolæ, ellipsi, & circulo convenire demonstrat. Quoniam autem non inutile visum est iis qui mechanica tradunt, ob instrumentorum penuriam, sæpenumero per continuata puncta conicæ sectiones in plano describere: ex hoc theoremate suppeditatur modus sumendi ea puncta continuata, per quæ parabola regulæ adminiculo designabitur. si enim exponamus rectam ut AB, & in ea sumamus puncta continuata E, Z, à quibus ad rectos angulos ipsi AB rectas EG, ZΔ ducamus*, sumpto in EG quolibet puncto Γ, longius quidem ab E si latiore parabolam facere libuerit, si vero angustiore propius; & fiat ut AB ad AZ ita quadratum ex EG ad quadratum ex ZΔ: puncta Γ, Δ in sectione erunt. Pari modo sumuntur & alia puncta per quæ parabola describitur.

Απὸ τούτου τῆς θεωρήματος ἀρχόμενος ἔρχεται ἐν πᾶσι ταῖς συμπλήμασι τῆς ὀρθολογίας αὐτῇ δυνάμει ὑποκείμενα καὶ ἐκ ἄλλης πρὸς ὡς δὴ τὸ πάλιν τῇ ὀρθολογίᾳ, καὶ τῇ ἐλλείψει, καὶ τῇ κύκλῳ τὰ αὐτὰ δυνάμει ὑποκείμενα. Ἐπειδὴ ἔκαστος ἐκ τούτων τῶν τριῶν μηχανικῶς γράφεται, ἀλλ' ὅτι δυνάμει τῇ ὀρθολογίᾳ, καὶ πολλὰς διὰ συνεχῶς σημείων γράφεται τὰς τῶν καὶ τῶν καὶ ἐν ὅλῳ τῷ, διὰ τούτου τῆς θεωρήματος ἔστι περιέσθαι συνεχῶς σημεία, δι' ὧν γράφεται ἡ ὀρθολογία ὡς καὶ παραδείσιν. εἰς γὰρ ἐκδῶ μὲν οὐδέν, ὡς πάλιν AB, καὶ ἐπ' αὐτῆς λέγει συνεχῶς σημεία, ὡς τὰ E, Z, καὶ ἐπ' αὐτῶν πρὸς ὀρθὴν τῇ AB, καὶ ποιῶν ὡς τὰς EG, ZΔ, καθὼς δὴ τὸ EG πρὸς τὸ ZΔ, οἱ μὲν εὐνότερον βεβαιώσω ποιῶν περὶ ὀρθολογίας, πρὸς τῷ E, οἱ δὲ συνάπτειν, ἐγγύς τῶν, καὶ ποιῶν ὡς τὸ AB πρὸς AZ ὅπως τὸ ὑπὸ EG πρὸς τὸ ὑπὸ ZΔ: τὰ Γ, Δ σημεία δὴ τὸ τομῆς ἔσθ' ὡς. ὁμοίως δὲ καὶ ἄλλα λεγόμενα δι' ὧν γράφεται ἡ ὀρθολογία.

PROP. XXI. Theor.

Si in hyperbola, vel ellipsi, vel circuli circumferentia rectæ lineæ ordinatim ad diametrum applicentur: erunt quadrata earum ad spatia contenta sub rectis, quæ inter ipsas & vertices transversis lateris figuræ interjiciuntur, ut figuræ rectum latus ad transversum inter sese vero, ut spatia quæ interjectis, ut diximus, rectis continentur.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κα'.

Εάν οὖν ὀρθολογὴ, ἢ ἐλλείψει, ἢ κύκλῳ περιεφείη εὐθεῖαι ἀχρῶσι τετραγώνως ὅτι τὸ ἀφ' ἑαυτῶν τετραγώνως ἴσαι τὰ ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα πρὸς μὲν τὰ περιεχόμενα χωρία ὑπὸ τῶν δυνάμεων καὶ πλάγιαι πλάγους ὅς εἰδῶς, ὡς ὅς εἰδῶς ἢ ὀρθία πλάγους πρὸς τὴν πλάγιαν πρὸς ἀλλήλα δὲ, ὡς τὰ περιεχόμενα χωρία ὑπὸ τῶν, ὡς εἴρηται, δυνάμεων εὐδεῖται.


* Non opus est ut rectæ EG, ZΔ, &c. sint ad rectos angulos ipsi AB, sufficit ut sint inter se parallelæ.

ΕΣΤΩ ὑπερβολή, ἢ ἑλλειψις, ἢ κύκλος περιέ-
ρεια, ἥς διάμετρος μὲν ἡ ΑΒ, παρ' ἣν δὲ δύν-
αναι αἱ καταγόμεναι ἡ ΑΓ, καὶ κατὰ τὴν ὁμοίαν
ἀπομακρυνόμεναι αἱ ΔΕ, ΖΗ· λέγω ὅτι ἔστιν
ὡς μὲν τὸ ἀπὸ τῆς ΖΗ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΑΗΒ ἕτως ἡ
ΑΓ πρὸς ΑΒ, ὡς δὲ τὸ ἀπὸ τῆς ΖΗ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς
ΔΕ ἕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΑΗΒ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΑΕΒ.

Επιζεύχθω γὰρ ἡ ΒΓ διαμέτρος τοῦ εἶδος, καὶ
ἀπὸ τῶν Ε, Η τῇ ΑΓ παρὰλληλοὶ ἡχθῶσιν αἱ
ΕΘ, ΗΚ· ἴσιν ἄρα ἐστὶ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ΖΗ τῷ
ἀπὸ ΚΗΑ, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ΔΕ τῷ ἀπὸ ΘΕΑ.
καὶ ἐπεὶ ἔστιν ὡς ἡ ΚΗ πρὸς ΗΒ ἕτως ἡ ΓΑ
πρὸς ΑΒ, ὡς δὲ ἡ ΚΗ πρὸς ΗΒ, τῆς ΑΗ
κοινῆς ὑψὸς λαμβανομένης, ἕτως τὸ ἀπὸ ΚΗΑ

SIT hyperbola, vel ellipsis, vel circuli cir-
cumferentia, cujus diameter AB, recta au-
tem juxta quam possunt applicatae AG, & ad
diametrum applicentur ordinatim DE, ZH: dico
ut quadratum ex ZH ad rectangulum AHB, ita
esse AG ad AB; ut vero quadratum ex ZH ad
quadratum ex DE, ita rectangulum AHB ad
rectangulum AEB.

Jungatur enim BG figuram determinans, &
per E, H puncta ipsi AG parallelæ ducantur
EO, HK: quadratum igitur ex ZH æquale est
[per 12, aut 13. huj.] rectangulo KHA, & qua-
tum ex DE rectangulo OEA. quoniam autem
ut KH ad HB, ita est [per 4.6.] GA ad AB; & ut
KH ad HB sumpta AH communi altitudine, ita
[per 1.6.] rectangulum KHA ad rectangulum



πρὸς τὸ ἀπὸ ΒΗΑ· ὡς ἄρα ἡ ΓΑ πρὸς ΑΒ
ἕτως τὸ ἀπὸ ΚΗΑ, ταῦτα τὸ ἀπὸ ΖΗ, πρὸς
τὸ ἀπὸ ΒΗΑ. ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ δὲ ἔστι καὶ ὡς
τὸ ἀπὸ ΔΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΒΕΑ, ἕτως ΓΑ πρὸς
ΑΒ· καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ΖΗ πρὸς τὸ ἀπὸ
ΒΗΑ, ἕτως τὸ ἀπὸ ΔΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΒΕΑ·
ὅθεν ἀναλλὰξ ὡς τὸ ἀπὸ ΖΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΕ,
ἕτως τὸ ἀπὸ ΒΗΑ πρὸς τὸ ἀπὸ ΒΕΑ.

BHA: erit [per 11.5.] ut GA ad AB, ita re-
ctangulum KHA (hoc est quadratum ex ZH) ad
rectangulum BHA. eadem ratione demonstribi-
tur etiam ut quadratum ex DE ad rectangulum
BEA, ita GA ad AB: ergo [per 11.5.] ut quadra-
tum ex ZH ad rectangulum BHA, ita quadratum
ex DE ad BBA rectangulum; & permutando, ut
quadratum ex ZH ad quadratum ex DE, ita re-
ctangulum BHA ad rectangulum BEA.

EUTOCIUS.

Τὸ θεωρήμα σαφὲς ἔκκενται, καὶ πῶς ἐκ ἔχει. δι-
δάσκει δὲ τὴν ἀποδείξιν, ὅτι ἡ παρ' αὐτῷ δαπάνη, τῶν ἐστὶν ὁρμή-
ται, ὅτι τὸ κύκλος ἴσος ἐστὶ τῇ διαμέτρῳ. οἱ γὰρ ὅτιν ὡς
τὸ ἀπὸ ΔΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΕΒ ἕτως ἡ ΓΑ πρὸς ΑΒ, ἴσος ἔ-
στι τὸ ἀπὸ ΔΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΕΒ ὅτι τὸ κύκλος ἴσος ἔστι καὶ ἡ
ΓΑ τῇ ΑΒ. διὸ δὲ καὶ τὴν εἰδήσιν, ὅτι αἱ καταγόμε-
ναι ἐν τῇ τῷ κύκλῳ περιφέρειᾳ πρὸς ὁρμᾶς εἰσι πάντως
τῇ διαμέτρῳ, καὶ ἐπ' αὐτῆς γίνονται τὰς παραλλόλους
τῇ ΑΓ.

Διὰ δὲ τούτου τὸ θεωρήμα, πρὸς αὐτὴν προσέτις ὅτι τῆς
ὑπερβολῆς εἰρημένους προσέτις, καὶ ὁμοίως ὑπερβολῶν καὶ
ἑλλειψιν κέντρος παραδείσιν. ἐκείδω γὰρ εὐθεία ἡ ΑΒ, καὶ
προσέτις ἐκείδω ἐπ' αὐτῆς ὅτι τὸ Η, καὶ ἀπὸ τῆς Α ταύτης
πρὸς ὁρμᾶς ἡχθῶν ἡ ΑΓ, καὶ ἐπιζεύχθω ἡ ΒΓ καὶ ἐκείδω
καὶ εἰλήδω πρὸς σημεία ὅτι τῇ ΑΗ τὰ Ε, Η, καὶ ἀπὸ τῶν Ε,
Η τῇ ΑΓ παρὰλληλοὶ ἡχθῶσιν αἱ ΕΘ, ΗΚ, καὶ γινώσκω τὸ
μὲν ἀπὸ ΑΗΚ ἴσος τῷ ἀπὸ ΖΗ, τὸ δὲ ἀπὸ ΑΕΘ ἴσος τῷ
ἀπὸ ΔΕ· διὰ γὰρ τῶν Α, Δ, Ζ ἔχει ἡ ὑπερβολή. ὁμοίως δὲ
κατασκευάσμεν καὶ τὰ ὅτι τῇ ἐλλείψει.

Theorema manifeste exponitur, & casum non ha-
bet. oportet autem scire lineam juxta quam possunt,
videlicet rectum figuræ latus, in circulo quidem
diametro æquale esse. quoniam enim ut quadratum
ex DE ad rectangulum AEB ita est GA ad AB; qua-
dratum autem ex DE rectangulo AEB in circulo est
æquale; sequitur quod & GA æqualis sit ipsi AB.
Sed illud quoque sciendum est, lineas, quæ in cir-
culi circumferentia ordinatim applicantur, ad diame-
trum perpendiculares esse, atque in iisdem rectis lineis
in quibus sunt parallelæ ipsi AG.

Per hoc autem theorema, eo modo quo dictum
est in parabola, hyperbolam & ellipsim regulæ ad-
miniculo describemus. exponatur enim recta linea
AB, & in infinitum producat ad H; à puncto au-
tem A ad rectos angulos ipsi AB ducatur AG: jun-
ctæque BG & productæ, sumantur in linea AH pun-
cta quedam E, H, & à punctis E, H ipsi AG paral-
lelæ ducantur EO, HK, & fiat AHC rectangulum
æquale quadrato ex ZH, & rectangulum AEO æ-
quale ipsi quadrato ex DE; & transibit hyperbola
per puncta A, Δ, Z. similiter eadem & in ellipsi
construemus.


PROP.

PROP. XXII. Theor.

Si parabolam vel hyperbolam recta linea in duobus punctis secet, non conveniens cum diametro sectionis intra sectionem: producta cum eadem diametro extra sectionem conveniet.

SIT parabola, vel hyperbola, cujus diameter AB; & secet quæpiam recta linea sectionem in duobus punctis Γ, Δ: dico rectam ΓΔ productam convenire cum ipsa AB extra sectionem.

Applicentur enim à punctis Γ, Δ ordinatim rectæ ΓΕ, ΔΒ, & sit primum sectio parabola. quoniam igitur in parabola, ut quadratum ex ΓΕ ad quadratum ex ΔΒ, ita est [per 20. huj.] ΒΑ ad ΑΒ; major autem ΕΑ quam ΑΒ: erit quadratum ex ΓΕ quadrato ex ΔΒ majus; quare & linea ΓΕ major ipsa ΔΒ. & sunt inter sese parallelæ: ergo recta ΓΔ producta cum diametro AB extra sectionem conveniet. sed sit sectio hyperbola. itaq; quoniam [per 21. huj.] in hyperbola ut quadratum ex ΓΕ ad quadratum ex ΔΒ, ita est rectangulum ZBA ad rectangulum ZBA; quadratum ex ΓΕ majus erit quadrato ex ΔΒ. & sunt parallelæ: igitur ΓΔ producta cum diametro sectionis extra sectionem conveniet.




ΠΡΟΤΑΣΙΣ κβ'.

Εάν ὀρθοκλίω ἢ ὑπερκλίω εὐθεῖα τέμνῃ κατὰ δύο σημεῖα, μὴ συμπίπτουσα τῇ ἀξίμετρῳ τῇ τομῆς ἐντὸς τῇ τομῆς· συμπίπτειται ἐκβαλλομένη τῇ διαμέτρῳ τῇ τομῆς ἐκτὸς τῇ τομῆς.

ΕΣΤΩ ὀρθοκλίω ἢ ὑπερκλίω, ἥς ἀξίμετρος ἡ ΑΒ, ἣ τέμνεται πρὸς εὐθεῖαν τινὴν κατὰ δύο σημεῖα καὶ Γ, Δ, μὴ συμπίπτουσα τῇ διαμέτρῳ ἐντὸς· λέγω ὅτι ἡ ΓΔ ἐκβαλλομένη συμπίπτειται ἐκτὸς τῇ τομῆς τῇ ΑΒ.

Κατήχθωσιν λοιπὸν τῇ Γ, Δ πεπεγμένως αἱ ΓΕ, ΔΒ, ἔστω δὲ πρῶτον ἡ τέμνη ὀρθοκλίω. ἐπεὶ ἂν ἐν τῇ παραβολῇ ἔστω ὡς τὸ ἀπὸ τῆς ΓΕ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΔΒ ἕτως ἡ ΕΑ πρὸς ΑΒ, μᾶλλον δὲ ἡ ΕΑ τῇ ΑΒ· μᾶλλον ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΓΕ τῷ ἀπὸ τῆς ΔΒ, ὥς καὶ ἡ ΓΕ τῇ ΔΒ μᾶλλον ἔστω. καὶ οὕτως ὀρθοκλίω· ἡ ΓΔ ἄρα ἐκβαλλομένη συμπίπτειται τῇ ΑΒ ἀξίμετρῳ ἐκτὸς τῇ τομῆς. ἀλλὰ δὲ ἔστω ὑπερκλίω. ἐπεὶ ἂν ἐν τῇ ὑπερβολῇ ἔστω ὡς τὸ ἀπὸ τῆς ΓΕ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΔΒ, ἕτως τὸ ὑπὸ ΖΕΑ πρὸς τὸ ὑπὸ ΖΒΑ· μᾶλλον ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΓΕ τῷ ἀπὸ τῆς ΔΒ. καὶ οὕτως ὀρθοκλίω· ἡ ΓΔ ἄρα ἐκβαλλομένη συμπίπτειται τῇ ἀξίμετρῳ τῇ τομῆς ἐκτὸς τῇ τομῆς.




PROP. XXIII. Theor.

Si ellipsum recta linea secet inter duas diametros sita: producta cum utraque earum extra sectionem conveniet.

SIT ellipsis, cujus diametri AB, ΓΔ; & secet quædam recta sectionem, videlicet ipsa EZ, inter duas diametros AB, ΓΔ interjecta: dico EZ productam convenire cum utraque earum extra sectionem.

Applicentur enim à punctis E, Z ordinatim ad diametrum quidem AB rectæ ΗΕ, ΖΘ; ad ΑΓ vero ΒΚ, ΖΑ: est igitur [per 21. huj.] ut quadratum ex ΒΗ ad quadratum ex ΖΘ, ita rectangulum ΒΗΑ ad rectangulum ΒΘΑ. ut autem quadratum ex ΖΑ ad quadratum ex ΕΚ, ita rectangulum ΔΑΓ ad



ΠΡΟΤΑΣΙΣ κγ'.

Εάν ἑλλειψι εὐθεῖα τέμνῃ μεταξὺ καυδῆν τῇ διαμέτρῳ· ἐκβαλλομένη συμπίπτειται ἐκτὸς τῇ τομῆς τῇ διαμέτρῳ ἐκτὸς τῇ τομῆς.

ΕΣΤΩ ἑλλειψις, ἥς διαμέτροι ΑΒ, ΓΔ, καὶ τέμνεται πρὸς εὐθεῖαν τινὴν καυδῆν τῇ ΑΒ, ΓΔ διαμέτρῳ· λέγω ὅτι ἡ ΕΖ ἐκβαλλομένη συμπίπτειται ἐκτὸς τῇ τομῆς τῇ ΑΒ, ΓΔ ἐκτὸς τῇ τομῆς.

Κατήχθωσιν γὰρ ἀπὸ τῆς Ε, Ζ πεπεγμένως ὅτι μὲν ΑΒ αἱ ΗΕ, ΖΘ, ὅτι ὅτι τὸ ΔΓ αἱ ΕΚ, ΖΑ· ἔστω ἄρα ὡς μὲν τὸ ἀπὸ τῆς ΕΗ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΖΘ, ἕτως τὸ ὑπὸ ΒΗΑ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΘΑ. ὡς δὲ τὸ ἀπὸ ΖΑ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΚ, ἕτως τὸ ὑπὸ ΔΑΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΚΓ.

ΔΚΓ, καὶ ἐστὶ τὸ μὲν ὑπὸ ΒΗΑ μείζον τῷ ὑπὸ ΒΘΑ, ἐν μὲν γὰρ τὸ Η τῶν τ' διχοτομίας, τὸ δὲ ὑπὸ ΔΛΓ δ' ὑπὸ ΔΚΓ μείζον· μείζον ἄρα καὶ τὸ μὲν ὑπὸ τῆς ΗΕ τῷ ὑπὸ ΖΘ. τὸ δὲ ὑπὸ ΖΛ τῷ ὑπὸ ΕΚ μείζον ἐστὶ· μείζον ἄρα καὶ ἡ μὲν ΗΕ τῆς ΖΘ, ἡ δὲ ΖΛ τῆς ΕΚ. καὶ ἐστὶ ὡς ἐξ ἡλ. ἡ μὲν ΗΕ τῇ ΖΘ, ἡ δὲ ΖΛ τῇ ΕΚ· ἡ ΕΖ ἄρα ἐκβαλλομένη συμπίπτει ἐκάτερα τ' ΑΒ, ΓΔ ἀφαιρέτων ἐκτὸς τ' τομῆς.

rectangulum ΔΚΓ, atque est [per 5. 2.] rectangulum ΒΗΑ majus rectangulo ΒΘΑ; etenim Η propius accedit ad punctum quo diameter ΑΒ bifariam secatur; & rectangulum ΔΛΓ majus est rectangulo ΔΚΓ: quadratum igitur ex ΗΕ majus est quadrato ex ΖΘ, & quadratum ex ΖΛ majus quadrato ex ΕΚ: idcirco linea ΗΕ major est quam ipsa ΖΘ, & ΖΛ major quam ΕΚ. parallela autem est ΗΕ ipsi ΖΘ, itemque ΖΛ ipsi ΕΚ: ergo ΕΖ producta cum utraque diametro ΑΒ, ΓΔ extra sectionem conveniet.

EUTOCIUS.

Δεῖ δὲ εἰπεῖν, ὅτι ἐν τῇ προτάσει δύο ἀφαιρέσεις λέγονται, καὶ ἀπλῶς τὰς τομὰς, ἀλλὰ τὰς ἐκβαλλομένας συζυγίας, αἵ ἐκτέρῃ παρὰ τὴν τομὴν ἐκτείνονται, καὶ μίαν λόγον ἔχει τὴν εἶδος πλεονῶν τῆς ἑτέρας ἀφαιρέσεως, καὶ ἀφ' ἑκτὸς δὲ τὰς τέμνεται τὰς ἀλλήλων ἐκβαλλόμεναι, ὥς δὲ δεκτικαὶ ἐν τῇ δεκάτῃ πύμπτῃ θεωρήματα. εἰ γὰρ μὴ ὕτως λαβῶν, συμπίπτουσι πάλιν μεταξὺ εὐθείας τ' δύο ἀφαιρέσεων τῇ ἑτέρῃ αὐτῶν ἐκβαλλομένη ὅτι, ὅπου ἔχ' ὑπόκειται. ἐπειδὴ δὲ τὸ Η ἐγγίον ἐστὶ τῇ Μ, καὶ τ' διχοτομίας τ' ΑΒ, ἔπειτα τὸ Θ, καὶ ἐστὶ τὸ μὲν ὑπὸ ΒΗΑ μὲν τῷ ὑπὸ ΗΜ ἴσον τῇ ὑπὸ τῆς ΑΜ, τὸ δὲ ὑπὸ ΒΘΑ μὲν τῷ ὑπὸ τ' ΘΜ ἴσον τῇ αὐτῇ, τὸ δὲ ὑπὸ ΘΜ τῷ ὑπὸ ΗΜ μείζον· τὸ ἄρα ὑπὸ ΒΗΑ μείζον τῷ ὑπὸ ΒΘΑ.

Attendendum est in propositione *Apollonii* duas diametros intelligere, non simpliciter quascunque, sed quæ conjugatæ diametri appellantur; quarum utraque ordinatim applicatæ parallela ducitur, mediamque proportionem habet inter latera figuræ alterius diametri; & idcirco rectas invicem parallelas bifariam dividunt, ut in decimo-quinto theoremate est demonstratum. nisi enim ita sit, continget, lineam inter duas diametros inter-mediam alteri ipsarum esse parallelam, quod fieri non potest. quoniam autem Η propius accedit ad Μ medium punctum rectæ ΑΒ quam ipsum Θ, rectangulum quidem ΒΗΑ una cum quadrato ex ΗΜ æquale est quadrato ex ΑΜ, rectangulum vero ΒΘΑ una cum quadrato ex ΘΜ eidem est æquale; & quadratum ex ΘΜ majus est quadrato ex ΗΜ: erit igitur rectangulum ΒΗΑ rectangulo ΒΘΑ majus.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κδ'.



Εὰν ὡς ἐξ ἡλ. ἡ ὑπερβολὴ εὐθεῖα, καὶ εἰ σημείον συμπίπτουσα, ἐκβαλλομένη ἐφ' ἑκάτερα ἐκτὸς τομῆς τ' τομῆς συμπίπτει τῇ ἀφαιρέσει.

PROP. XXIV. Theor.

Si parabolæ vel hyperbolæ recta linea, in uno puncto occurrens, producta ex utraque parte extra sectionem cadat: cum diametro conveniet.

Εἰς τὴν ὡς ἐξ ἡλ. ἡ ὑπερβολὴ, ἥς ἀφαιρέσεις ἡ ΑΒ, ἡ συμπίπτουσα αὐτῇ εὐθεῖα ἡ ΓΔ Ε κατὰ τὸ Δ, καὶ ἐκβαλλομένη ἐφ' ἑκάτερα ἐκτὸς τομῆς τῆς τομῆς λέγω ὅτι συμπίπτει τῇ ΑΒ ἀφαιρέσει.

Εἰλήφθω γὰρ π σημείον ὅπου τῆς τομῆς τὸ Ζ, καὶ ἐπιζεύχθω ἡ ΔΖ· ἡ ΔΖ ἄρα ἐκβαλλομένη συμπίπτει τῇ ἀφαιρέσει ἐκτὸς τ' τομῆς. συμπίπτει κατὰ τὸ Α, καὶ ἐστὶ μεταξὺ τῆς π τομῆς καὶ τ' ΔΑ ἡ ΔΕ· ἡ ΓΔ Ε ἄρα ἐκβαλλομένη συμπίπτει τῇ ἀφαιρέσει ἐκτὸς τ' τομῆς.



το Δ, quæ producta ex utraque parte extra sectionem cadat: dico ΓΔ Ε cum diametro ΑΒ convenire.

Sumatur enim aliquod punctum Ζ in sectione; & jungatur ΔΖ: ergo [per 22. hujus] ΔΖ producta cum

diametro extra sectionem. conveniat autem in Α puncto, & recta ΔΕ est inter sectionem & ΔΑ. recta igitur ΓΔ Ε producta cum diametro extra sectionem conveniet.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κε'.

Εὰν ἐλλείψει εὐθεῖα συμπίπτουσα μεταξὺ τῶν δύο ἀφαιρέσεων, ἐκβαλλομένη ἐφ' ἑκάτερα ἐκτὸς

PROP. XXV. Theor.

Si ellipsi recta linea occurrens inter duas diametros *, producta ex utraque


* Nempe conjugatos ut in XIII.

parte cadat extra sectionem : cum
utraque diametro conveniet.

πίπτει τὴ τομῇ συμπίπτει ἐκείνῃ τῇ δια-
μέτρῳ.

SIT ellipsis, cujus diametri AB, ΓΔ; & ipsi
occurrat recta EZ inter duas diametros in
puncto H; & producta in
utramque partem extra se-
ctionem cadat : dico EZ
cum utraque diametro AB,
ΓΔ convenire.

Applicentur enim à pun-
cto H ordinatim ad diame-
tros AB, ΓΔ rectæ HΘ, HK.
itaque quoniam HK est
parallela ipsi AB, con-
venit autem quædam EZ
cum HK; cum ipsa quoque
AB conveniet. eodem mo-
do & EZ cum diametro ΓΔ convenire demon-
strabitur.



ΕΣΤΩ ἔλλειψις, ἥς διὰ μέτρον αἱ AB, ΓΔ, καὶ
παύτῃ συμπίπτει τις εὐθεῖα μεταξὺ τῶν δύο
διαμέτρων ἡ EZ καὶ αὐτὸν H,
ἐκβαλλομένη ὅφ' ἐκείνῃ
ἐκτὸς πίπτει τὴ τομῇ· λέ-
γω ὅτι ἡ EZ συμπίπτει
ἐκείνῃ τῇ AB, ΓΔ.

Κατήχθωσαν δὲ τῇ H
ὅτι τὰς AB, ΓΔ πεπα-
γμύνας αἱ HΘ, HK. ἐπεὶ
ὁ ὁμοῦλος ἐστὶν ἡ HK τῇ
AB, συμπίπτει δὲ τις τῇ
HK ἡ EZ· καὶ τῇ AB ἄρα
συμπίπτει. ὁμοίως δὲ καὶ τῇ ΓΔ συμπίπτει
ταῖ EZ.

PROP. XXVI. Theor.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ κς'.

Si in parabola vel hyperbola recta li-
nea ducatur diametro sectionis pa-
rallela : in uno tantum puncto cum
sectione conveniet.

Εὰν ὁρθολῇ ἢ ὑπερβολῇ εὐθεῖα ἀχθῇ ὁρ-
τῶν διὰ μέτρον τὴ τομῇ· συμπίπτει τῇ
τομῇ καὶ ἐν μόνῳ σημείῳ.

SIT primum parabola, cujus diameter ABΓ,
rectum autem latus ΑΔ; & ipsi AB paral-
lela ducatur EZ: dico EZ productam cum se-
ctione convenire.

Sumatur enim in ipsa EZ aliquod punctum E,
à quo ducatur EH ordinatim applicatæ paral-
lela, & quadrato ex HE
majus sit rectangulum ΔΑΓ; à puncto autem Γ ordina-
tim applicetur ΓΘ: ergo
[per 11. huj.] quadratum ex
ΘΓ æquale est rectangulo
ΔΑΓ. atque est rectangu-
lum ΔΑΓ majus quadrato
ex EH: quadratum igitur
ex ΘΓ quadrato ex EH ma-
jus erit; & idcirco linea
ΘΓ major linea EH. &
sunt parallelæ inter se: er-
go EZ producta secabit ΘΓ;
proptereaque conveniet cum
sectione. conveniat in K. di-
co in uno tantum puncto
K convenire. si enim fieri
potest, conveniat etiam in
Λ. quoniam igitur parabolam recta linea se-
cat in duobus punctis, si producat [per 22.
huj.] conveniet cum diametro sectionis; quod
est absurdum. positum enim est ipsi esse paral-
lelam. ergo EZ producta in uno tantum puncto
cum sectione conveniet.




ΕΣΤΩ πρῶτον παραβολῇ, ἥς διάμετρος ABΓ,
ὀρθὸν δὲ ΑΔ, ἐτὶ τῇ AB ὁμοῦλος ἡχθῇ ἡ
EZ· λέγω ὅτι ἡ EZ ἐκβαλλομένη συμπίπτει
τῇ τομῇ.

Εἰλήφθω γάρ τι σημεῖον ἐπὶ τῇ EZ, τὸ E, ἐ-
κτὸς E ὁμοῦλος πεπαγμύνας κατηγμύνην ἡχθῇ
ἡ EH, καὶ ἐκτὸς τῇ HE μᾶ-
ζον ἔστω τὸ ὑπὸ ΔΑΓ, καὶ
ἐκτὸς τῇ ΓΘ πεπαγμύνας ἀνήχθω
ἡ ΓΘ· τὸ ἄρα ἐκτὸς τῇ
ΘΓ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῇ ΔΑΓ. μᾶ-
ζον δὲ τὸ ὑπὸ ΔΑΓ ἐκτὸς
EH· μᾶζον ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ
ΘΓ τὸ ἀπὸ EH· μᾶζον ἄρα
καὶ ἡ ΘΓ τῇ EH. καὶ εἰσι
ὁμοῦλοι· ἡ EZ ἄρα ἐκ-
βαλλομένη πίπτει πρὸς ΘΓ,
ὥστε καὶ τῇ τομῇ συμπίπτει.
συμπίπτει κατὰ τὸ K. λέ-
γω δὲ ὅτι ἐκτὸς ἐν μόνον
σημεῖον τὸ K συμπίπτει.
εἰ γὰρ δυνατὸν συμπίπτει
καὶ κατὰ τὸ Λ. ἐπεὶ οὖν ὁμοῦλος εὐθεῖα
πίπτει κατὰ δύο σημεία, ἐκβαλλομένη συμπί-
πτει τῇ διὰ μέτρον τῇ τομῇ· ὅπερ ἄτοπον. ὑπό-
κειται γὰρ ὁμοῦλος. ἡ EZ ἄρα ἐκβαλλο-
μένη καὶ ἐν μόνον σημείῳ συμπίπτει τῇ τομῇ.

Εἰσω

BAZ, ut BA ad AZ sic [per cor. 20. 6.] erit quadratum ex BA ad quadratum ex AA; hoc est quadratum ex BA ad quadratum ex AZ. ut autem quadratum ex BA ad quadratum ex AZ, sic quadratum ex BG ad quadratum ex ZH; & [per 1. 6.] ut BA ad AZ sic rectangulum BAM ad rectangulum ZAM: igitur ut quadratum ex BG ad quadratum ex ZH ita rectangulum BAM ad ipsum ZAM, & permutando [per 16. 5.] ut quadratum ex BG ad rectangulum BAM ita quadratum ex ZH ad rectangulum ZAM, at [per 11. huj.] quadratum ex ZH æquale est rectangulo ZAM, propter sectionem: ergo & quadratum ex BG rectangulo BAM æquale erit. est autem [per constr.] AM rectum figuræ latus, & BG ordinatim applicatæ parallela: sectio igitur transit per Γ punctum, & ΓΔ cum sectione necessario convenit in puncto Γ.



BAZ, ἔστιν ὡς ἡ BA πρὸς AZ ἕτως τὸ ἀπὸ BA πρὸς τὸ ἀπὸ AA, τέτρεται τὸ ἀπὸ BA πρὸς τὸ ἀπὸ AZ. ὡς δὲ τὸ ἀπὸ BA πρὸς τὸ ἀπὸ AZ ἕτως τὸ ἀπὸ BG πρὸς τὸ ἀπὸ ZH· ὡς δὲ ἡ BA πρὸς AZ ἕτως τὸ ὑπὸ BAM πρὸς τὸ ὑπὸ ZAM· ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ BG πρὸς τὸ ἀπὸ ZH ἕτως τὸ ὑπὸ BAM πρὸς τὸ ὑπὸ ZAM· καὶ ἐναλλάξ, ὡς τὸ ἀπὸ BG πρὸς τὸ ὑπὸ BAM ἕτως τὸ ἀπὸ ZH πρὸς τὸ ὑπὸ ZAM. τὸ δὲ ἀπὸ ZH ἴσον τῷ ὑπὸ ZAM, διὰ τὴν περὶ αὐτῆς καὶ τὸ ἀπὸ BG ἄρα ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ BAM. παλάγια δὲ ἡ AM, ὥστε πεπεγμένης δὲ κατηγμένης ἡ BG· ἡ ἄρα περὶ ἐρχεται διὰ τοῦ Γ, καὶ συμπίπτει τῇ περὶ ἡ ΓΔ κατὰ τὸ Γ.


EUTOCIUS.

In aliquibus exemplaribus vigesimiseptimi theorematibus talis legitur demonstratio.

SIT parabola cujus diameter AB, & hanc secet recta quædam HA intra sectionem: dico HA productam ad utrasque partes cum sectione convenire.

Ducatur enim per A punctum ordinatim applicatæ parallela AE: ergo [per 17. huj.] AB cadet extra sectionem; itaque vel HA ipsi AB parallela erit, vel non. & siquidem HE sit parallela, ipsa ordinatim applicata est, ideoque [per 19. huj.] si producat ad utrasque partes, bifariam secta à diametro conveniet cum sectione. sed non sit ipsi AB parallela, sed producta conveniat cum AE in B puncto. perspicuum est ipsam, si cum AB convenit, multo prius sectioni occurrere.

Dico etiam ad alteras partes productam cum sectione convenire. sit enim MA linea juxta quam possunt, & in directum ipsi producatur AZ: ergo MA ad AB est perpendicularis. fiat ut quadratum ex AE ad triangulum ABA sic linea MA ad AZ; & per puncta M, Z ipsi AB parallelæ ducantur ZHK, MN. cum igitur quadrilaterum sit AAΔH, & positione datur AA; ducatur ΓKB ipsi AA parallela, quæ abscindat ΓKH triangulum quadrilatero AAΔH æquale, & per B ipsi ZAM parallela ducatur ZBN. itaque quoniam [per constr.] ut quadratum ex AE ad triangulum ABA ita est MA ad AZ, & ut quadratum ex AE ad AAΔ triangulum ita quadratum ex GB ad triangulum AΓB; etc-



Εν παλαιῇ ἀντιγραφῇ τὸ οὐκ ἔστιν ἐκδοκίμου φέρει τὴν αὐτὴν ἀδείκνυται.

Εἰς τὴν ἀντιγραφὴν τῆς διὰ μέτρον ἡ AB, καὶ ταύτην περὶ αὐτῆς ἐστὶν ἡ HA ἐν τῇ τῇ περὶ αὐτῆς λέγειν ὅτι ἡ HA ἐκβαλλομένη ἐφ' ἐκάτερα τὰ μέρη συμπίπτει τῇ περὶ.

Ἡ δὲ αὐτὴ περὶ αὐτῆς διὰ τοῦ A ὥστε πεπεγμένης κατηγμένης ἡ AE· ἡ AE ἄρα ἐκτὸς περὶ αὐτῆς τῇ περὶ αὐτῆς ἡ HA τῇ AE ὥστε ἀλλήλως ἐστὶν, ἡ δὲ εἰ μὴ ἐν παράλληλός ἐστιν πεπεγμένης κατὰ τὴν· ὡς ἐκβαλλομένη ἐφ' ἐκάτερα, ἐπὶ δὲ ἄρα περὶ αὐτῆς τῇ διὰ μέτρον, συμπίπτει τῇ περὶ. εἰς δὲ μὴ παράλληλος τῇ AE, ἀλλὰ ἐκβαλλομένη συμπίπτει τῇ AE κατὰ τὸ E. δὴλον εἰ μὴ τῇ AE συμβάλλει, ὅτι πολὺ πρὸς τὴν περὶ τὴν περὶ.

Λέγουσιν ὅτι καὶ τῇ περὶ αὐτῆς ἐκβαλλομένη συμπίπτει τῇ περὶ. εἰς γὰρ παρὰ τὴν διὰ μέτρον ἡ MA, ἐκβαλλομένη ἐφ' ἐκάτερας αὐτῆς ἡ AZ· ἡ MA ἄρα τῇ AB πρὸς ὅσον ἐστὶν. περὶ αὐτῆς ὡς τὸ ἀπὸ AE πρὸς τὸ AEΔ τρίγωνον ἕτως ἡ MA πρὸς τὴν AZ, καὶ διὰ τοῦ M, Z τῇ AB ὥστε ἀλλήλως ἡ δὲ αὐτῆς αἱ


ZK, MN. περὶ αὐτῆς ἐν ὅντος ὡς AAΔH, καὶ διότι ἕως τῆς AA, ἡ δὲ αὐτῆς ὥστε ἀλλήλως ἡ ΓKB, διότι αὐτῆς τὸ ΓKH τρίγωνον τῷ AAΔH περὶ αὐτῆς ἴσον, καὶ διὰ τοῦ B τῇ ZAM ὥστε ἀλλήλως ἡ δὲ αὐτῆς ἐστὶν ὡς τὸ ἀπὸ AE πρὸς τὸ AEΔ τρίγωνον ἕτως ἡ MA πρὸς τὴν AZ· καὶ ὡς μὴ τὸ ἀπὸ AE πρὸς τὸ AEΔ τρίγωνον ἕτως τὸ ἀπὸ GB πρὸς τὸ AΓB τρίγωνον, ὥστε ἀλλήλως γάρ

γὰρ ἐστὶν ἡ ΑΕ τῇ ΓΒ, καὶ ὁπότε γινώσκουσιν αὐτὰς αἰ
ΓΕ, ΑΒ. ὥς ὅτι ἡ ΜΑ πρὸς ΑΖ ὅτως τὸ ΑΜΝΒ
ὡς ὡς ἀπὸ ΓΒ πρὸς τὸ ΓΔΒ τρίγωνον
ὅτως τὸ ΑΜΝΒ ὡς ὡς ἀπὸ ΓΒ πρὸς τὸ ΓΔΒ τρίγωνον
ὡς ὡς ἀπὸ ΓΒ πρὸς τὸ ΓΔΒ τρίγωνον. ἴσων δὲ ἐστὶν τὸ ΑΖΞΒ ὡς ὡς ἀπὸ ΓΒ πρὸς τὸ ΓΔΒ τρίγωνον
τῷ ΓΔΒ τριγώνῳ (ἐπεὶ γὰρ τὸ ΓΗΚ τρίγωνον
τῷ ΑΛΗΔ περὶ πλεύρω ἐστὶν ἴσων, κοινὸν γὰρ τὸ ΗΔΒΚ
περὶ πλεύρων τὸ ΑΒΚ ὡς ὡς ἀπὸ ΓΒ πρὸς τὸ ΓΔΒ τρίγωνον
ἐστὶν ἴσων. τὸ γὰρ ΑΒΚ ὡς ὡς ἀπὸ ΓΒ πρὸς τὸ ΓΔΒ τρίγωνον
τῷ ΖΑΒΞ ὡς ὡς ἀπὸ ΓΒ πρὸς τὸ ΓΔΒ τρίγωνον ἐστὶν ἴσων,
ὁπότε γὰρ αὐτῆς βάσεως ἐστὶ τὸ ΑΒ, καὶ ἐν αὐτῇ
ὡς ὡς ἀπὸ ΓΒ πρὸς τὸ ΓΔΒ τρίγωνον. ἴσων δὲ ἐστὶν τὸ ΑΖΞΒ ὡς ὡς ἀπὸ ΓΒ πρὸς τὸ ΓΔΒ τρίγωνον
τῷ ΖΑΒΞ ὡς ὡς ἀπὸ ΓΒ πρὸς τὸ ΓΔΒ τρίγωνον ἐστὶν ἴσων. τὸ γὰρ ΑΜΝΒ ὡς ὡς ἀπὸ ΓΒ πρὸς τὸ ΓΔΒ τρίγωνον
ἴσων ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΜΑΒ, ἡ γὰρ ΜΑ πρὸς ὁρθὰς ἐστὶ τῇ ΑΒ. τὸ ὅρα ὅτι
ΜΑΒ ἴσων ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΓΒ. καὶ ἐστὶν ἡ ΜΑ ὁρθὰς εἰς
τὴν ΑΒ, ἡ γὰρ ΑΒ διάμετρος, καὶ ἡ ΓΒ περὶ
γυῖως κατηγυῖω, ὡς ὡς ἀπὸ ΓΒ πρὸς τὸ ΓΔΒ τρίγωνον
τῷ ΖΑΒΞ ὡς ὡς ἀπὸ ΓΒ πρὸς τὸ ΓΔΒ τρίγωνον ἐστὶν ἴσων. ἡ ΔΗΓ ὅρα συμ-
βάλλει τῇ τομῇ κατὰ τὸ Γ. ὅπερ εἶδει δεῖξαι.

Commentarius in Præcedentem Demonstrationem.

^a Πεπιόδω ὅτι ὥς τὸ ἀπὸ ΑΕ πρὸς τὸ ΑΕΔ
τρίγωνον ὅτως ἡ ΜΑ πρὸς ΑΖ. Τὸ δὲ διδασκται
ἐν ῥητῇ ὅτι ἐνδεκάτῃ θεωρήματι. ἀναγράφει γὰρ τὸ ἀπὸ
ΑΕ, καὶ τῇ πλεύρῃ αὐτῇ χωρεῖν τὸ ΑΕΔ τρίγωνον ἴσων
ὡς ὡς ἀπὸ ΓΒ πρὸς τὸ ΓΔΒ τρίγωνον.

^b Τετραπλεύρω ὄντος εἰς ΑΛΔΗ, καὶ ἵσους ἔσσης
τὴν ΑΛ, ἡ γὰρ τῇ ΑΛ ὡς ὡς ἀπὸ ΓΒ πρὸς τὸ ΓΔΒ τρίγωνον
τῷ ΓΚΗ τρίγωνον τῷ ΑΛΔΗ τετρα-
πλεύρῳ ἴσων. Τὸ δὲ ποιῶμεν ὅτι. ἐὰν γὰρ, ὥς ἐν
ταῖς στοιχείοις ἐμάθομεν, τὸ δὲ διδασκται ἐνδεκάτῃ θεωρήματι
τὸ ΑΛΔΗ περὶ πλεύρω ἴσων καὶ ἄλλῃ τῇ δὲ διδασκται ἐνδεκάτῃ θεωρήματι
ὅμοιον τὸ αὐτὸ συνησόμενα τὸ ΣΤΥ, ὥς
ὁμολογοῦν εἶναι τὸ ΣΤ τῇ ΑΔ, καὶ ἀντιθέτω-
μεν τῇ μὲν ΤΣ ἴσων τῇ ΗΚ, τῇ δὲ ΤΤ ἴσων
τῇ ΗΓ, καὶ ὁπότε ὁρίζομεν τὸ ΓΚ, ἴσων τὸ
ζητούμενον. ἐπεὶ γὰρ ἡ πρὸς τὸ Γ γωνία ἴσων
ἐστὶ τῇ Δ γωνίᾳ, τῇ γὰρ τῇ Η. ἀλλὰ τὸ ὅτι ἴσων
καὶ ὅμοιον τὸ ΓΗΚ τῇ ΣΤΥ. καὶ ἴσων ἡ Γ
γωνία τῇ Β, καὶ εἴσιν ἐναντία. παρόμοιος ὅρα ὅτι ἡ ΓΚ
τῇ ΑΕ. φανερόν δὲ ὅτι ὅταν ἡ ΑΒ ἀξὸν ὅτι, ἡ ΜΑ ἐφα-
πτεται τὴν τομῇ. ὅταν γὰρ μὴ ἀξὸν, τέμνει, καὶ πρὸς ὁρθὰς ἀγα-
ται πάντως τῇ ἀξὸν.



^c Fiat ut quadratum ex ΑΕ ad triangulum
ΑΕΔ sic ΜΑ ad ΑΖ. Demonstratum est hoc
in commentariis in undecimum theorema. si enim,
describentes quadratum lineæ ΑΕ, ipsius lateri appo-
suerimus [per 44.1.] spatium triangulo ΑΕΔ æquale,
factum jam erit quod queritur.

^d Cum igitur quadrilaterum sit ΑΛΔΗ, &
positione data ΑΛ, ducatur ΓΚΒ ipsi ΑΛ pa-
rallela, quæ abscindat ΓΚΗ triangulum quadri-
latero ΑΛΔΗ æquale. Hoc ita faciemus. Si
enim, ut in elementis [ad 25.6.] didicimus, dato
rectilineo, videlicet quadrilatero ΑΛΔΗ, æquale &
triangulo dato ΑΕΔ simile constituerimus triangulum
ΣΤΥ, ita ut latus ΣΥ lateri ΑΔ respondeat,
& [per 3.1.] fecerimus ΗΚ ipsi ΥΣ æ-
qualem, & ΗΓ æqualem ΤΥ, & junxerim-
us ΓΚ; factum erit quod queritur. quo-
niam enim angulus ad Υ æqualis est angu-
lo ad Δ, hoc est ei qui ad Η; erit trian-
gulum ΓΗΚ æquale ac simile triangulo
ΣΤΥ, & angulus Γ angulo Ε æqualis, &

alterni sunt: linea igitur ΓΚ [per 27.1.] est parallela
ipsi ΑΕ. perspicuum autem est, quod, quando ΑΒ sit
axis, linea ΜΑ tangit sectionem; quando vero non sit
axis, secat, & ad diametrum omnino perpendicularis
ducitur.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κη'.

Εὰν εὐθεῖα ἐφαπτή μίας τῶν ἀντικείμενων, ληθῇ
δὲ τι σημεῖον ἐντὸς τῆς ἐτέρας τομῆς, καὶ δι'
αὐτῆς ὡς ὡς ἀπὸ ΓΒ πρὸς τὸ ΓΔΒ τρίγωνον
τῷ ΖΑΒΞ ὡς ὡς ἀπὸ ΓΒ πρὸς τὸ ΓΔΒ τρίγωνον ἐστὶν ἴσων.
τῇ τομῇ.

ΕΣΤΩ ΣΑΝ ἀντικείμεναι ὧν ἡ ΑΒ ἀξὸν
τομῆς, καὶ τὸ Α τομῆς ἐφαπτόμενος τις εὐθεῖα

PROP. XXVIII. Theor.

Si recta linea unam oppositarum sectionum contingat, sumatur autem punctum intra alteram sectionem, & per ipsum recta contingenti parallela ducatur: producta ad utraq; partes cum sectione conveniet.


SIN T oppositæ sectiones, quarum diameter ΑΒ;
& sectionem, in qua est Α, contingat quavis
recta

recta $\Gamma\Delta$; sumatur autem aliquod punctum B intra alteram sectionem; & per E ducatur EZ ipsi $\Gamma\Delta$ parallela: dico BZ productam ad utraque partes cum sectione convenire.

Quoniam enim ostensum est [ad 24. huj.] $\Gamma\Delta$ productam convenire cum diametro AB ; atque est BZ ipsi parallela: EZ producta cum diametro conveniet. conveniat autem in H ; & ipsi HB æqualis ponatur $\Lambda\Theta$. deinde per Θ ducatur ΘK parallela ipsi EZ ; & sit $K\Lambda$ ordinatim applicata: ponatur HM æqualis $\Lambda\Theta$, ducaturque MN ordinatim applicatæ parallela: &

ἡ $\Gamma\Delta$, καὶ εἰληφθῶσι σημεῖον ἐν τῇ ἐπείρας τομῇ τὸ E , ἐξ ἧς ἡ EZ τῇ $\Gamma\Delta$ παράλληλος ἤχθῃ ἡ EZ . λέγω ὅτι ἡ EZ ἐκβαλλομένη ἐφ' ἐκάτερα συμπίπτει τῇ τομῇ.

Ἐπεὶ ἔνδεον ὅτι ἡ $\Gamma\Delta$ ἐκβαλλομένη συμπίπτει τῇ AB διαμέτρῳ, ἔστι παράλληλος αὐτῇ ἡ EZ . ἡ EZ ἄρα ἐκβαλλομένη συμπίπτει τῇ διαμέτρῳ. συμπίπτει κατὰ τὸ H , καὶ τῇ HB ἴση κείσθαι ἡ $\Lambda\Theta$, καὶ διὰ τῶν Z E παράλληλος ἤχθῃ ἡ ΘK , καὶ τεταγμένως κατήχθῃ ἡ $K\Lambda$, καὶ τῇ $\Lambda\Theta$ ἴση κείσθαι ἡ HM , καὶ πέρα τεταγμέ-



HN in directum producat. itaque quoniam $K\Lambda$ ipsi MN est parallela; & $K\Theta$ ipsi HN ; & est ΛM una eademque recta: triangulum $K\Theta\Lambda$ [per 9.1. & 4.6.] simile est triangulo HMN . est autem $\Lambda\Theta$ æqualis HM : quare & $K\Lambda$ ipsi MN æqualis erit: ideoque quadratum ex $K\Lambda$ æquale quadrato ex MN . rursus quoniam $\Lambda\Theta$ æqualis est HM & $\Lambda\Theta$ ipsi BH , communis autem AB ; erit BA æqualis AM ; & propterea rectangulum $B\Lambda A$ rectangulo $A M B$ æquale: ut igitur rectangulum $B\Lambda A$ ad quadratum ex $K\Lambda$, ita rectangulum $A M B$ ad quadratum ex MN . sed [per 21. huj.] ut rectangulum $B\Lambda A$ ad quadratum ex $K\Lambda$, ita transversum figuræ latus ad rectum: quare ut rectangulum $A M B$ ad quadratum ex MN ita erit latus transversum ad rectum. ex quibus colligitur, punctum N in sectione esse: ergo EZ producta cum sectione conveniet in puncto N . similiter ostendemus, si ex altera parte producat, cum sectione convenire.

νως κατηγμένην ἤχθῃ ἡ MN , καὶ προσεκβεβλήσθαι ἐπ' αὐτῆς ἡ HN . καὶ ἐπεὶ παράλληλος ἐστὶν ἡ $K\Lambda$ τῇ MN , ἡ $\angle K\Theta$ τῇ HN , καὶ μία εὐθεῖα ἐστὶν ἡ ΛM , ὁμοίον ἐστὶ τὸ $K\Theta\Lambda$ τριγώνον τῷ HMN τριγώνῳ. ἔστιν ἔνδεον ὅτι ἡ $\Lambda\Theta$ τῇ HM ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ $K\Lambda$ τῇ MN . ὥστε ἔστι τὸ διπλὸν $K\Lambda$ τῷ διπλῷ MN ἴσον ἐστὶ. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ $\Lambda\Theta$ τῇ HM , ἡ $\angle A\Theta$ τῇ BH , κοινὴ δὲ ἡ AB : ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ BA τῇ AM . ἴσον ἄρα ἐστὶ τὸ ὑπὸ $B\Lambda A$ τῷ ὑπὸ $A M B$. ὥς ἄρα τὸ ὑπὸ $B\Lambda A$ πρὸς τὸ διπλὸν $K\Lambda$ ὅπως τὸ ὑπὸ $A M B$ πρὸς τὸ διπλὸν MN . καὶ ἐστὶν ὡς τὸ ὑπὸ $B\Lambda A$ πρὸς τὸ διπλὸν $K\Lambda$ ὅπως ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὀρθίαν. καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ $A M B$ πρὸς τὸ διπλὸν MN ὅπως ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὀρθίαν. τὸ N ἄρα πρὸς τῇ τομῇ ἐστὶν. ἡ EZ ἄρα ἐκβαλλομένη συμπίπτει τῇ τομῇ κατὰ τὸ N . ὁμοίως δὲ ἡ δευτέρη ὅτι καὶ ὅτι καὶ ἐπεί μέρη ἐκβαλλομένη συμπίπτει τῇ τομῇ.

EUTOCIUS.

Quod si $\Gamma\Delta$ hyperbolam secet, eadem sequentur, quemadmodum in decimo octavo theoremate.

Ὅτι καὶ ἡ $\Gamma\Delta$ τέμνῃ τὴν ὑπερβολὴν καὶ αὐτὰ συμβαίνει, ὡς περὶ τὸ 18. δεικνύει ὁ ὅτι.

PROP. XXIX. Theor.

Si in oppositis sectionibus recta linea per centrum ducta occurrat uni sectioni; ulterius producta alteram quoque secabit sectionem.

Si in sectionibus oppositis, quarum diameter AB , centrum autem Γ ; & recta $\Gamma\Delta$ sectionem $\Lambda\Delta$ secet: dico sectionem $\Gamma\Delta$ alteram quoque secare.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ κθ'.

Εὰν ἐν ἀντικείμεναις εὐθείαις παρασπίπῃ διὰ τὸ κέντρον πρὸς ὅποτέραν τῶν τομῶν ἐκβαλλομένη τέμνῃ ἢ ἐτέραν τομήν.

Εἰς τὸν $\Sigma\Lambda\Gamma$ ἀντικείμεναις ὧν διάμετρος ἡ AB , κέντρον δὲ τὸ Γ , καὶ ἡ $\Gamma\Delta$ τέμνῃ τὴν $\Lambda\Delta$ τομήν. λέγω ὅτι καὶ τὴν ἐπείρας τομήν.

Τεταγμένως

Τεταγμένης γὰρ κατὰ τὴν $\epsilon\delta$, καὶ τῇ $\alpha\epsilon$ ἴση παύσθαι ἢ $\beta\zeta$, καὶ τεταγμένης ἡχθῆαι ἢ $\zeta\eta$. ἐπεὶ ὅν ἴση ἐστὶν ἢ $\epsilon\alpha$ τῇ $\beta\zeta$, κοινὴ δὲ ἢ $\alpha\beta$ ἴσων ἄρα τὸ ὑπὸ $\beta\epsilon\alpha$ τῷ ὑπὸ $\alpha\zeta\beta$. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς τὸ ὑπὸ $\beta\epsilon\alpha$ πρὸς τὸ δὸπὸ $\delta\epsilon$ ὅτως ἢ πλάγια πρὸς τὴν ὀρθίαν, ἀλλὰ καὶ ὡς τὸ ὑπὸ $\alpha\zeta\beta$ πρὸς τὸ δὸπὸ $\zeta\eta$ ὅτως ἢ πλάγια πρὸς τὴν ὀρθίαν ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ $\beta\epsilon\alpha$ πρὸς τὸ δὸπὸ $\delta\epsilon$ ὅτως τὸ ὑπὸ $\alpha\zeta\beta$ πρὸς τὸ ἀπὸ $\zeta\eta$. ἴσων δὲ τὸ ὑπὸ $\beta\epsilon\alpha$ τῷ ὑπὸ $\alpha\zeta\beta$ ἴσων ἄρα καὶ τὸ δὸπὸ $\epsilon\delta$ τῷ δὸπὸ $\zeta\eta$. ἐπεὶ ὅν ἴση ἐστὶν ἢ $\mu\delta$ τῇ $\gamma\zeta$, ἢ δὲ $\delta\epsilon$ τῇ $\zeta\eta$, καὶ εὐθεία ἐστὶν ἢ $\epsilon\zeta$, καὶ ὁμοῦ ἢ $\epsilon\delta$ τῇ $\zeta\eta$ · καὶ ἢ $\delta\eta$ ἄρα εὐθεία ἐστὶ, ὥς ἢ $\gamma\delta$ ἄρα περὶ καὶ τὴν ἐπὶ τὴν τμήν.



Ordinatum enim applicetur $\beta\alpha$; ipsique $\alpha\epsilon$ ponatur æqualis $\beta\zeta$; & $\zeta\eta$ ordinatim ducatur.

quoniam igitur $\beta\alpha$, $\beta\zeta$ æquales sunt, & $\alpha\beta$ utrique communis; rectangulum $\beta\epsilon\alpha$ rectangulo $\alpha\zeta\beta$ est æquale. & quoniam [per 21. huj.] ut rectangulum $\beta\epsilon\alpha$ ad quadratum ex $\delta\beta$ ita est transversum latus ad rectum: ut autem rectangulum $\alpha\zeta\beta$ ad quadratum ex $\zeta\eta$ ita latus trans-

versum ad rectum: ergo ut rectangulum $\beta\epsilon\alpha$ ad quadratum ex $\delta\beta$ sic rectangulum $\alpha\zeta\beta$ ad quadratum ex $\zeta\eta$. sed æquale est rectangulum $\beta\epsilon\alpha$ rectangulo $\alpha\zeta\beta$: quadratum igitur ex $\delta\beta$ [per 14. 5.] quadrato ex $\zeta\eta$ ex æquale. quod cum $\epsilon\gamma$ æqualis sit ipsi $\gamma\zeta$; & $\delta\epsilon$ ipsi $\zeta\eta$; sitque $\epsilon\zeta$ recta, & $\epsilon\delta$ ipsi $\zeta\eta$ parallela; erit [per 32. 6.] & $\delta\eta$ recta: ergo $\gamma\delta$ sectionem quoque alteram secabit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ λ΄.

Εάν τις ἐλλείψει ἢ ἀντικειμέναις εὐθείαι ἀχθῇ, ἐφ' ἑκάτερα ἔκτερες συμπίπτουσαι τῇ τομῇ διχα τμηθῶσιν κατὰ τὸ κέντρον.

PROP. XXX. Theor.



Si in ellipfi, vel oppositis sectionibus, recta linea ducatur, ad utrasque centri partes sectioni occurrens: ad centrum bifariam secabitur.

ΕΣΤΩ ἑλλείψις, ἢ ἀντικείμεναι, διάμετρος δὲ αὐτῶν ἢ $\alpha\beta$, κέντρον δὲ τὸ γ , ἐξ ἧς ἢ $\epsilon\gamma$ ἡχθῶσι εὐθείαι ἢ $\delta\gamma\epsilon$. λέγω ὅτι ἴση ἐστὶν ἢ $\gamma\delta$ τῇ $\gamma\epsilon$.

SIT ellipsis, vel oppositæ sectiones, quarum diameter $\alpha\beta$, centrum γ ; & per γ ducatur recta $\delta\gamma\epsilon$: dico $\gamma\delta$ ipsi $\gamma\epsilon$ æqualem esse.

ἡχθῶσιν γὰρ τεταγμένης αἱ $\delta\zeta$, $\epsilon\eta$. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς τὸ ὑπὸ $\beta\zeta\alpha$ πρὸς τὸ δὸπὸ $\zeta\delta$ ὅτως ἢ πλάγια πρὸς τὴν ὀρθίαν, ἀλλὰ καὶ ὡς τὸ ὑπὸ $\alpha\eta\beta$ πρὸς τὸ δὸπὸ $\eta\epsilon$ ὅτως ἢ πλάγια πρὸς τὴν ὀρθίαν, καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ $\beta\zeta\alpha$ πρὸς τὸ δὸπὸ $\zeta\delta$ ὅτως τὸ ὑπὸ $\alpha\eta\beta$ πρὸς τὸ ἀπὸ $\eta\epsilon$ · καὶ ἐναλλάξ, ὡς τὸ ὑπὸ $\beta\zeta\alpha$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\alpha\eta\beta$ ὅτως τὸ ἀπὸ $\delta\zeta$ πρὸς τὸ ἀπὸ $\eta\epsilon$. ὡς δὲ τὸ ἀπὸ $\delta\zeta$ πρὸς τὸ ἀπὸ $\eta\epsilon$ ὅτως τὸ ἀπὸ $\zeta\gamma$ πρὸς τὸ ἀπὸ $\gamma\eta$ · ἐναλλάξ ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ $\beta\zeta\alpha$ πρὸς τὸ ἀπὸ $\gamma\zeta$ ὅτως τὸ ὑπὸ $\alpha\eta\beta$ πρὸς τὸ ἀπὸ $\gamma\eta$ · καὶ ὡς ἄρα (ὅτι μὲν τὸ ἐλλείψεως συνθέντι, ὅτι δὲ τὸ ἀντικειμένων ἀνάπλεον καὶ ἀναστροφέντι) τὸ ἀπὸ $\alpha\gamma$ πρὸς τὸ

Ordinatum enim applicentur $\delta\zeta$, $\epsilon\eta$. & quoniam ut rectangulum $\beta\zeta\alpha$ ad quadratum ex $\zeta\delta$ ita est [per 21. huj.] transversum latus ad rectum; & ut rectangulum $\alpha\eta\beta$ ad quadratum ex $\eta\epsilon$ ita latus transversum ad rectum: erit [per 11. 5.] ut rectangulum $\beta\zeta\alpha$ ad quadratum ex $\zeta\delta$ ita rectangulum $\alpha\eta\beta$ ad quadratum ex $\eta\epsilon$; & permutando [per 16. 5.] ut rectangulum $\beta\zeta\alpha$ ad rectangulum $\alpha\eta\beta$ ita quadratum ex $\delta\zeta$ ad quadratum ex $\eta\epsilon$. ut autem quadratum ex $\delta\zeta$ ad quadratum ex $\eta\epsilon$ ita [per 4. & 22. 6.] quadratum ex $\zeta\gamma$ ad quadratum ex $\gamma\eta$: ergo permutando, ut rectangulum $\beta\zeta\alpha$ ad quadratum ex $\gamma\zeta$ ita rectangulum $\alpha\eta\beta$ ad quadratum ex $\gamma\eta$. * ut igitur (in ellipfi componendo, in



ita est [per 21. huj.] transversum latus ad rectum; & ut rectangulum $\alpha\eta\beta$ ad quadratum ex $\eta\epsilon$ ita latus transversum ad rectum: erit [per 11. 5.] ut rectangulum $\beta\zeta\alpha$ ad quadratum ex $\zeta\delta$ ita rectangulum $\alpha\eta\beta$ ad quadratum ex $\eta\epsilon$; & permutando [per 16. 5.] ut rectangulum $\beta\zeta\alpha$ ad rectangulum $\alpha\eta\beta$ ita quadratum ex $\delta\zeta$ ad quadratum ex $\eta\epsilon$. ut autem quadratum ex $\delta\zeta$ ad quadratum ex $\eta\epsilon$ ita [per 4. & 22. 6.] quadratum ex $\zeta\gamma$ ad quadratum ex $\gamma\eta$: ergo permutando, ut rectangulum $\beta\zeta\alpha$ ad quadratum ex $\gamma\zeta$ ita rectangulum $\alpha\eta\beta$ ad quadratum ex $\gamma\eta$. * ut igitur (in ellipfi componendo, in



oppositis vero sectionibus invertendo & per conversionem rationis) quadratum ex $\alpha\gamma$ ad quadratum

ex ΓZ , ita quadratum ex $B\Gamma$ ad quadratum ex ΓH ; quadratum autem ex $A\Gamma$ æquale est quadrato ex ΓB : ergo & quadratum ex $Z\Gamma$ quadrato ex ΓH æquale erit: idcircoque $Z\Gamma$ ipsi ΓH æqualis. & cum ΔZ , $H B$ inter se sint parallelæ, necesse est [per 4.1.] $\Delta \Gamma$ ipsi ΓB æqualem esse.

ἀπὸ ΓZ ὅτως τὸ ἀπὸ $B\Gamma$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓH . ἴσον δὲ τὸ ἀπὸ $A\Gamma$ τῷ ἀπὸ ΓB . ἴσον ἄρα καὶ τῷ ἀπὸ $Z\Gamma$ τὸ ἀπὸ ΓH . ἴση ἄρα ἡ $Z\Gamma$ τῇ ΓH . καὶ εἰσι ὁμοῦ καὶ ἀλλήλοι αἱ ΔZ , $H B$. ἴση ἄρα καὶ ἡ $\Delta \Gamma$ τῇ ΓB .

EUTOCIUS.

• Ut igitur in ellipfi componendo, in oppositis vero invertendo & per conversionem rationis.] In ellipfi quidem ita dicemus. quoniam ut rectangulum $A Z B$ ad quadratum ex ΔZ ita est rectangulum $A H B$ ad quadratum ex $H E$. ut autem quadratum ex ΔZ ad quadratum ex $Z\Gamma$ ita quadratum ex $H E$ ad quadratum ex $H\Gamma$; erit igitur ex æquali [per 22. 5.] ut rectangulum $A Z B$ ad quadratum ex $Z\Gamma$ ita rectangulum $A H B$ ad quadratum ex $H\Gamma$, & componendo ut rectangulum $A Z B$ una cum quadrato ex $Z\Gamma$ ad quadratum ex $Z\Gamma$, hoc est [per 5. 2.] quadratum ex $A\Gamma$ ad quadratum ex $Z\Gamma$ (etenim recta $A B$ secatur in partes æquales ad punctum Γ & in partes inæquales ad Z) ita rectangulum $A H B$ una cum quadrato ex $H\Gamma$ ad quadratum ex $H\Gamma$; hoc est, propter eandem causam, quadratum ex $B\Gamma$ ad quadratum ex $H\Gamma$. & [per 16. 5.] permutando ut quadratum ex $A\Gamma$ ad quadratum ex ΓB ita quadratum ex $Z\Gamma$ ad quadratum ex $H\Gamma$. At vero in sectionibus oppositis: quoniam est ut rectangulum $B Z A$ ad quadratum ex $Z\Gamma$ ita rectangulum $A H B$ ad quadratum ex $H\Gamma$; erit invertendo ut quadratum ex $Z\Gamma$ ad rectangulum $B Z A$ ita quadratum ex $H\Gamma$ ad rectangulum $A H B$, & per conversionem rationis, ut quadratum ex $Z\Gamma$ ad quadratum ex ΓA ita quadratum ex $H\Gamma$ ad quadratum ex ΓB . nam cum linea $A B$ bifariam secetur in Γ , atque ei adjiciatur $Z A$, erit [per 6. 2.] rectangulum $B Z A$ una cum quadrato ex $A\Gamma$ æquale quadrato ex ΓZ : quare quadratum ex ΓZ superat rectangulum $B Z A$ ipso quadrato ex $A\Gamma$. pulchre igitur dictum est sequi illud



• Ως ἄρα ὅτι τὸ ἐλλείψους συνθέντι, ὅτι τὸ ἀντικειμένων ἀνάπαλιν καὶ ἀναστρέφαντι.] Ἐπὶ μὲν ἐν τῇ ἐλλείψει ἐρῶμεν. ἵκεν δὲ ὅτι ὡς τὸ ὑπὸ $A Z B$ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔZ ὅτως τὸ ὑπὸ $A H B$ πρὸς τὸ ὑπὸ $H E$, ὡς δὲ τὸ ἀπὸ ΔZ πρὸς τὸ ἀπὸ $Z\Gamma$ ὅτως τὸ ἀπὸ $H E$ πρὸς τὸ ἀπὸ $H\Gamma$. δι' ἴσου ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ $A Z B$ πρὸς τὸ ἀπὸ $Z\Gamma$ ὅτως τὸ ὑπὸ $A H B$ πρὸς τὸ ὑπὸ $H\Gamma$, καὶ συνθέντι ὡς τὸ ὑπὸ $A Z B$ μετὰ τὸ ἀπὸ $Z\Gamma$ πρὸς τὸ ἀπὸ $Z\Gamma$, τετίσι τὸ ἀπὸ $A\Gamma$ πρὸς τὸ ἀπὸ $Z\Gamma$. ἡ γὰρ $A B$ τέμνεται εἰς μὴ ἴσα κατὰ τὸ Γ , εἰς δ' ἀνισα κατὰ τὸ Z . ὅτως τὸ ὑπὸ $A H B$ μετὰ τὸ ἀπὸ $H\Gamma$ πρὸς τὸ ἀπὸ $H\Gamma$, τετίσι τὸ ἀπὸ ΓB πρὸς τὸ ἀπὸ $H\Gamma$. καὶ ἐναλλάξ, ὡς τὸ ἀπὸ $A\Gamma$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓB ὅτως τὸ ἀπὸ $Z\Gamma$ πρὸς τὸ ἀπὸ $H\Gamma$. ἐπὶ δὲ τῇ ἀντικειμένῳ, ἵκεν ὅτι ὡς τὸ ὑπὸ $B Z A$ πρὸς τὸ ἀπὸ $Z\Gamma$ ὅτως τὸ ὑπὸ $A H B$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓH . ἀνάπαλιν ὡς τὸ ἀπὸ $Z\Gamma$ πρὸς τὸ ὑπὸ $B Z A$ ὅτως τὸ ἀπὸ $H\Gamma$ πρὸς τὸ ὑπὸ $A H B$, καὶ ἀναστρέφαντι ὡς τὸ ἀπὸ $Z\Gamma$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓA ὅτως τὸ ἀπὸ $H\Gamma$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓB . οὕτως γὰρ ἡ $A B$ τέμνεται δίχα κατὰ τὸ Γ , καὶ πρόσκειται ἡ $Z A$, καὶ τὸ ὑπὸ $B Z A$ μετὰ τὸ ἀπὸ $A\Gamma$ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ ΓZ . ὡς τὸ ἀπὸ ΓZ τὸ ὑπὸ $B Z A$ ὑπερέχει τῷ ἀπὸ $A\Gamma$. καὶ ὡς ἴσως εἴρηται τὸ ἀναστρέφαντι.

ὅτι ὡς τὸ ὑπὸ $B Z A$ πρὸς τὸ ἀπὸ $Z\Gamma$ ὅτως τὸ ὑπὸ $A H B$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓH . ἀνάπαλιν ὡς τὸ ἀπὸ $Z\Gamma$ πρὸς τὸ ὑπὸ $B Z A$ ὅτως τὸ ἀπὸ $H\Gamma$ πρὸς τὸ ὑπὸ $A H B$, καὶ ἀναστρέφαντι ὡς τὸ ἀπὸ $Z\Gamma$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓA ὅτως τὸ ἀπὸ $H\Gamma$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓB . οὕτως γὰρ ἡ $A B$ τέμνεται δίχα κατὰ τὸ Γ , καὶ πρόσκειται ἡ $Z A$, καὶ τὸ ὑπὸ $B Z A$ μετὰ τὸ ἀπὸ $A\Gamma$ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ ΓZ . ὡς τὸ ἀπὸ ΓZ τὸ ὑπὸ $B Z A$ ὑπερέχει τῷ ἀπὸ $A\Gamma$. καὶ ὡς ἴσως εἴρηται τὸ ἀναστρέφαντι.

PROP. XXXI. Theor.

Si in transverso figuræ latere hyperbolæ sumatur aliquod punctum, non minorem abscindens ad verticem sectionis quam sit dimidia transversi lateris figuræ, & ab ipso ducta recta sectioni occurrat: si producatu cadet intra sectionem, versus ulteriora ejus.

SIT hyperbola, cujus diameter $A B$; & in ipsa sumatur punctum aliquod Γ , non minorem abscindens rectam ΓB , quam sit ipsius $A B$ dimidia; & occurrat sectioni quævis recta $\Gamma \Delta$: dico $\Gamma \Delta$ productam intra sectionem cadere.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ λα'.

Εάν ὑπερβολῆς ὅτι τὸ πλαγίας πλευρᾶς ὅς ὅπως ληφθῇ τι σημεῖον, μὴ ἐλάττωον ἀπολαμβάνον πρὸς τῇ κορυφῇ τὴν τομῆς τὴν ἡμισείας τῆς πλαγίας ὅς ὅπως πλοῦρας, καὶ ἀπ' αὐτῆς πρὸς πύση εὐθεῖα πρὸς τὴν τομῆς ἢ πρὸς ὁλοκληρωθεῖσα ἐντὸς πιστεύεται τὴν τομῆς, κατὰ ἐπόμενα μέρη τὴν τομῆς.

ΕΣΤΩ ὑπερβολῆς ἡ διάμετρος ἡ $A B$, καὶ εἰλήφθω ἐπ' αὐτῆς σημεῖον τι τὸ Γ , μὴ ἐλάττωον ἀπολαμβάνον τὴν ΓB τὴν ἡμισείας τὴν $A B$, καὶ πρὸς πύση εὐθεῖα πρὸς τὴν τομῆς λέγω ὅτι ἡ $\Gamma \Delta$ ἐκβαλλομένη ἐντὸς πιστεύεται τὴν τομῆς.


Ei

Εἰ γὰρ διωπατὸν, ἐκτὸς πεπιέτω τῆς τομῆς, ὡς
ἡ ΓΔΕ, καὶ δὴτὸ τυχόντος σημείου τῷ Ε πεπα-
γμύνας κατῆχθω ἡ ΕΗ, καὶ ἡ ΔΘ. καὶ ἔσω
πρὸς τὸν ἴση ἡ ΑΓ τῇ ΓΒ. καὶ ἐπεὶ τὸ δὴτὸ
ΕΗ πρὸς τὸ δὴτὸ ΔΘ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ
τὸ δὴτὸ ΖΗ πρὸς τὸ δὴτὸ ΔΘ, καὶ ὡς τὸ δὴτὸ
ΕΗ πρὸς τὸ δὴτὸ ΔΘ ἔτῳς τὸ δὴτὸ ΗΓ πρὸς
τὸ δὴτὸ ΓΘ, διὰ τὸ
ΕΗ ὁμοειρηλον εἶναι τῇ
ΔΘ. ὡς δὲ τὸ δὴτὸ ΖΗ
πρὸς τὸ δὴτὸ ΔΘ ἔ-
τῳς τὸ ὑπὸ ΑΗΒ πρὸς
τὸ ὑπὸ ΑΘΒ, διὰ τὴν
τομὴν· τὸ ἄρα δὴτὸ ΗΓ
πρὸς τὸ δὴτὸ ΘΓ μεί-
ζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ
ὑπὸ ΑΗΒ πρὸς τὸ ὑπὸ
ΑΘΒ· ἐναλλαξ ἄρα τὸ
ἀπὸ ΓΗ πρὸς τὸ ὑπὸ
ΑΗΒ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ἀπὸ ΓΘ πρὸς
τὸ ὑπὸ ΑΘΒ. * διελόντι ἄρα, τὸ ἀπὸ ΓΒ πρὸς
τὸ ὑπὸ ΑΗΒ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ἀπὸ
ΓΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΘΒ· ὅπερ ἀδιώατον. ἐκ
ἄρα ἡ ΓΔΕ ἐκτὸς πεσεῖται τῇ τομῆς, ἐντὸς
ἄρα· καὶ διὰ τῆτο, ἡ ἀπὸ πινος τῇ ὀπί τῇ ΑΓ
σημείων πολλῷ μᾶλλον ἐντὸς πεσεῖται, ἐπειδὴ καὶ
ἡ ΓΔ ἐντὸς πεσεῖται.

Si enim fieri potest, cadat extra sectionem, ut $\Gamma \Delta \text{ E}$; & à quovis puncto E ordinatim applicetur EH, itemque ipsa $\Delta \Theta$. sit autem primum linea $\Lambda \Gamma$ æqualis $\Gamma \text{ B}$. & quoniam [per 8.5.] quadratum ex EH ad quadratum ex $\Delta \Theta$ majorem rationem habet quam quadratum ex ZH ad quadratum ex $\Delta \Theta$, & ut quadratum ex EH ad quadratum ex $\Delta \Theta$ ita [per 4. & 22. 6.] quadratum ex

$H\Gamma$ ad quadratum ex
 $\Gamma\Theta$; propterea quod EH
 ipsi $\Delta\Theta$ fit parallela. ut
 vero [per 12. huj.] qua-
 dratum ex ZH ad qua-
 dratum ex $\Delta\Theta$ ita recti-
 angulum AHB ad recti-
 angulum $A\Theta B$, propter
 sectionem: quadratum
 igitur ex $H\Gamma$ ad quadra-
 tum ex $\Gamma\Theta$ rationem ma-
 jorem habet quam recti-
 angulum AHB ad recti-
 angulum $A\Theta B$: &

permutando, quadratum ex ΓH ad rectangulum $A H B$ habet majorem rationem, quam quadratum ex $\Gamma \Theta$ ad rectangulum $A \Theta B$. ⁴ ergo dividendo, quadratum ex ΓB ad rectangulum $A H B$ majorem habet rationem quam quadratum ex ΓB ad rectangulum $A \Theta B$: quod [per 8.5.] fieri non potest: igitur linea $\Gamma \Delta E$ non cadet extra sectionem: quare intra cadet: & idcirco quæ ab aliquo puncto rectæ $A \Gamma$ ad sectionem ducitur, multo magis cadet intra, quoniam & $\Gamma \Delta$ intra cadit.



EUTOCIUS.

^αΔιελόντι ἄρα, τὸ ἀπὸ ΓΒ ὡς τὸ ὑπὸ ΑΗΒ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ἀπὸ ΓΒ ὡς τὸ ὑπὸ ΑΘΒ.] Ἐπεὶ γὰρ εὐθεία ἡ ΑΒ τέμνεται διχα κατὰ τὸ Γ, καὶ ἀνίσταται αὐτῇ ἡ ΒΗ, τὸ ὑπὸ ΑΗΒ μιστὸν τοῦ ὑπὸ ΓΒ ἴσους ἔστι τοῦ ὑπὸ ΓΗ· ὥστε τὸ ἀπὸ ΓΗ τὸ ὑπὸ ΑΗΒ ἀντρίχει τοῦ ἀπὸ ΓΒ. Ἀφ' οὗ δὲ πάλιν αὐτὴν αἰτῶν καὶ τὸ ἀπὸ ΓΘ ἴσον τοῦ ἀπὸ ΑΘΒ ἀντρίχει τοῦ ἀπὸ ΓΒ. ὥστε ὁρῶντες εἴρηται τὸ διελόντι.

* Ergo dividendo, quadratum ex ΓB ad rectangulum AHB majorem habet rationem, quam quadratum ex ΓB ad rectangulum $A\Theta B$.] Quoniam enim recta linea AB bifariam secatur in Γ , & ipsi adjicitur linea BH , rectangulum AHB una cum quadrato ex ΓB [per 6. 2.] æquale est quadrato ex ΓH : ergo quadratum ex ΓH superat rectangulum AHB quadrato ex ΓB . & propter eandem causam quadratum ex $\Gamma\Theta$ superat rectangulum $A\Theta B$ ipso quadrato ex ΓB . recte igitur dixit dividendo illud concludi.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ 46'.

Εὰν κῶνς τομῆς ἀφ' ἧς κορυφῆς εὐθύνῃ ὁδὸν τε-
ταγμένως κατηγμένῳ ἀχθῇ ἐφ' ἧς ἡ το-
μῆς, καὶ εἰς τὴν μετὰ τὸν τόπον τῆς τε κῶνς τομῆς
καὶ τὴν εὐθείαν εἴτα εὐθύνῃ ἐπαρμυνομένηται.

ΕΣΤΩ κώνυς τομή πτόπειρον ή καλκιδύνη πζα-
 βολή, ής διέμετρος ή ΑΒ, κ' άπο τ' Α πζα
 πεταγιδύνας κατηγιδύμην ήχθω ή ΑΓ· όπ' μδν' εν
 ή ΑΓ έκπες πίπτει τ' τομής, δίδεται). λέγω δ' ή όπ'
 Ε εις τόν μεταξυ τόπον τής ΑΓ ευθείας κη' τ' το-
 μής έτέρα ευθεία ε' παρεμπεσείται.

Εἰ γὰρ διωκτὸν, παρεμπιπτεῖται ὡς ἡ Α Δ, καὶ ἐλ-
λῆφθαι τι σημῆσον ἐπ' αὐτῆς τοχὸν τὸ Δ, καὶ πεπα-
γμένως κατήχθω ἡ Δ Ε, καὶ ἔξω παρ' αὐτῶν
αἱ καταγόμεναι πεπαγμένως ἡ Α Ζ. καὶ ἐπεί τὸ
δοτὸ Δ Ε πρὸς τὸ δοτὸ Ε Α μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ

PROP. XXXII. Theor.

Si per verticem sectionis conï recta linea ordinatim applicatæ parallela ducatur, sectionem continget: & in locum, qui inter conï sectionem & rectam interjicitur, altera recta non cadet.

SIT conic sectio prius parabola, cujus diame-
ter AB; & à puncto A ducatur AF ordi-
natim applicatæ parallela: cadet AF extra se-
ctionem, quod [ad 17. huj.] supra demonstratum
est. dico in locum, qui inter AF & sectio-
nem interjicitur, alteram rectam non cadere.

Si enim fieri potest, cadat, ut $\Lambda \Delta$; sumaturque in ipsa quodvis punctum Δ ; & ordinatim applicetur ΔE . sit autem ΛZ , juxta quam possunt quæ à sectione ordinatim ducuntur. & quoniam [per 8. 5.] quadratum ex ΔE ad quadratum ex $E \Lambda$ majorem rationem habet quam


P
quadratum

quadratum ex HE ad quadratum ex EA; estque [per 11. huj.] quadratum ex HE æquale rectangulo ZAE: quadratum igitur ex ΔB ad quadratum ex EA majorem rationem habet quam rectangulum ZAE ad quadratum ex EA; hoc est [per 1. 6.] quam ZA ad AE. itaque fiat ut quadratum ex ΔE ad quadratum ex EA sic ZA ad AΘ:

& per Θ ducatur ΘAK parallela ipsi ED. quoniam igitur est ut quadratum ex ΔB ad quadratum ex EA sic ZA ad ipsam AΘ, hoc est [per 1. 6.] rectangulum ZAΘ ad quadratum ex AΘ; & ut quadratum ex ΔB ad quadratum ex EA ita [per 4. & 22. 6.] quadratum ex KΘ ad quadratum ex ΘA: rectangulo autem ZAΘ æquale est [per 11. huj.] quadratum ex ΘA: quare ut quadratum ex KΘ ad quadratum ex ΘA sic quadratum ex AΘ ad quadratum ex ΘA: æqualis est igitur [per 11. 5.] linea KΘ ipsi ΘA; quod est absurdum. quocirca in locum inter rectam lineam AG & sectionem altera recta linea non cadet.


Verum sit sectio hyperbola, vel ellipsis, vel circuli circumferentia, cujus diameter AB, & rectum

τὸ ἀπὸ HE πρὸς τὸ ἀπὸ EA, τὸ δὲ ἀπὸ HE ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ZAE· καὶ τὸ ἀπὸ ΔE ἄρα πρὸς τὸ ἀπὸ EA μέγιστον λόγον ἔχει ἢ πρὸς τὸ ὑπὸ ZAE πρὸς τὸ ἀπὸ EA, τέστιν ἡ ZA πρὸς AE. πεποιθὼς ὅτι ὡς τὸ ἀπὸ ΔE πρὸς τὸ ἀπὸ EA ἔσται ἡ ZA πρὸς AΘ, καὶ ἀπὸ τῆς Θ ἀφ' ἧς ἀγόμεναι τῇ ED



ἡ ΘAK. ἐπεὶ γὰρ ἐστὶν ὡς τὸ ἀπὸ ΔE πρὸς τὸ ἀπὸ EA ἔσται ἡ ZA πρὸς AΘ, τέστιν τὸ ὑπὸ ZAΘ πρὸς τὸ ἀπὸ AΘ· καὶ ἐστὶν ὡς μὲν τὸ ἀπὸ ΔE πρὸς τὸ ἀπὸ EA ἔσται τὸ ἀπὸ KΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘA, τῷ δὲ ὑπὸ ZAΘ ἴσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ ΘA· καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ KΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘA ἔσται τὸ ἀπὸ AΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘA· ἴση ἄρα ἡ KΘ τῇ ΘA, ὅπερ ἀπορον. ἔκ ἄρα οὗτος μεταξὺ τόπων τῇ AG εὐθείας καὶ τῆς τομῆς ἐπίστα εὐθεία περιμπεσέσθαι.

Ἐστω δὲ ἡ τομὴ ὑπερβολὴ ἢ ἑλλειψὶς ἢ κύκλος περιφέρεια, ἥς ἀσάμακτος ἡ AB, ὁρθῶς



figuræ latus AZ; juncta autem BZ producatur; & à puncto A ordinatim applicatis parallela ducatur AG, quæ extra sectionem cadet, ut [per 17. huj.]

δὲ ἡ AZ, καὶ ἀφ' ἧς ἀγόμεναι ἡ BZ ἐκβεβλήσθω, καὶ ἀπὸ τῆς A ἀφ' ἧς ἀγόμεναι κατὰ τὴν ἑλκυσμένην ἡ AG. ὅτι μὲν γὰρ ἐκτὸς πίπτει τῆς τομῆς δὲ δεικνύται.

δεικται· λέγω δὴ ὅτι καὶ εἰς τὸ μεταξὺ τόπον τῆς ΑΓ εὐθείας καὶ τῆς τομῆς ἐπεὶ εὐθεία ἐπαρμεπείσεται.

Εἰ γὰρ δυνατὸν παρεμπεπίετω ὡς ἡ ΑΔ, καὶ εἰλήφθω τι σημεῖον ἐπ' αὐτῆς τυχόν τὸ Δ, καὶ πεταγμένως ἀπ' αὐτῆς κατήχθω ἡ ΔΕ, καὶ ἀφ' αὐτῆς Ετῆ ΑΖ ὡς ὁ ἄλλος ἡχθῶ ἡ ΕΜ. καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ ΗΕ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ ΑΕΜ, πεποιήσθω τῷ ἀπὸ ΔΕ ἴσον τὸ ὑπὸ ΑΕΝ, καὶ ὁπλίσθω ἡ ΑΝ πεμνέτω τὴν ΖΜ κατὰ τὸ Ε. καὶ ἀφ' αὐτῆς Ετῆ ΖΑ ὡς ὁ ἄλλος ἡχθῶ ἡ ΕΘ, ἀφ' αὐτῆς δὲ Ετῆ ΑΓ ἡ ΘΑΚ. ἐπεὶ γὰρ τὸ ἀπὸ ΔΕ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ ΑΕΝ, ἔστιν ὡς ἡ ΝΕ πρὸς ΕΔ ὅτις ἡ ΔΕ πρὸς ΕΑ· καὶ ὡς ἡ ΝΕ πρὸς ΕΑ, ὅτις τὸ ἀπὸ ΔΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΑ. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΝΕ πρὸς ΕΑ ὅτις ἡ ΕΘ πρὸς ΘΑ, ὡς δὲ τὸ ἀπὸ ΔΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΑ ὅτις τὸ ἀπὸ ΚΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘΑ· ὡς ἡ ΕΘ πρὸς ΘΑ ὅτις τὸ ἀπὸ ΚΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘΑ· μέση ἄρα ἀνάλογον ἐστὶν ἡ ΚΘ τῇ ΕΘ, ΘΑ· τὸ ἄρα ἀπὸ ΚΘ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΑΘΞ. ἐστὶ δὲ καὶ τὸ ἀπὸ ΑΘ τῷ ὑπὸ ΑΘΞ ἴσον, ἀφ' αὐτῆς τὴν τιμήν· τὸ ἄρα ἀπὸ ΚΘ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ ΘΑ, ὅπερ ἄτοπον. οὐκ ἄρα εἰς τὸ μεταξὺ τόπον τῆς ΑΓ εὐθείας ἐπ' αὐτῆς ἐπάρμεπείσεται.

ostensum est: dico in locum, qui inter lineam rectam ΑΓ & sectionem interjicitur, alteram rectam lineam non cadere.

Cadat enim, si fieri potest, ut ΑΔ; & in ipsa sumatur quodvis punctum Δ, à quo ΔΕ ordinatim applicetur; & per Ε ducatur ΕΜ ipsi ΑΖ parallela: & quoniam [per 12. vel 13. huj.] quadratum ex ΗΕ æquale est rectangulo ΑΕΜ; fiat rectangulum ΑΕΝ quadrato ex ΔΕ æquale; & juncta ΑΝ secet ΖΜ in puncto Ε, deinde per Ε ipsi ΖΑ parallela ducatur ΕΘ, & per Θ ducatur ΘΑΚ parallela ipsi ΑΓ: itaque cum quadratum ex ΔΕ æquale sit rectangulo ΑΕΝ, erit [per 17. 6.] ut ΝΕ ad ΕΔ ita ΔΕ ad ΕΑ: & idcirco [per cor. 20. 6.] ut linea ΝΒ ad ΕΑ, ita quadratum ex ΔΕ ad quadratum ex ΕΑ. sed [per 4. 6.] ut ΝΕ ad ΕΑ ita ΕΘ ad ΘΑ, & ut quadratum ex ΔΕ ad quadratum ex ΕΑ ita quadratum ex ΚΘ ad quadratum ex ΘΑ: ut igitur ΕΘ ad ΘΑ sic quadratum ex ΚΘ ad quadratum ex ΘΑ: ergo [per cor. 20. 6.] ΚΘ media proportionalis est inter ΕΘ, ΘΑ: & propterea [per 17. 6.] quadratum ex ΚΘ æquale rectangulo ΑΘΞ. est autem [per 12. vel 13. huj.] & quadratum ex ΑΘ rectangulo ΑΘΞ æquale, propter sectionem: ergo quadratum ex ΚΘ æquale est quadrato ex ΘΑ; quod fieri non potest. in locum igitur, qui est inter ΑΓ & sectionem, altera recta non cadet.

EUTOCIUS.

Εν τῷ ἐπιφανέστερῳ θεωρήματι ἀπλυστέρῳ ἐδείχθη, ὅτι ἡ διὰ τὴν κορυφὴν παρακείμενη τῇ εὐθείᾳ ἀγομένη, τῆς τομῆς ἐφαπτομένη. ἐνταῦθα δὲ τὸ ἐν ταῖς στοιχείοις ἐπὶ τῇ κύκλου μόνον δεδεικνυμένον καθολικώτερον ὅτι πάσης κώνης τομῆς ὑπάρχον ἐπιδείκνυσσι. δεῖ γὰρ τοὺς δεικνύσας, ὅπως καὶ ἐδείχθη, ὅτι καμπύλῳ μὲν ἴσως γραμμῷ ἐδὲν ἄτοπον ὅτιν ἐμπίπτει μεταξὺ τῆς εὐθείας καὶ τῆς τομῆς, εὐθείᾳ δὲ ἀμύναντο· περὶ γὰρ αὐτῆς τῆς τομῆς καὶ ἐκ ἐφαπτομένης. διὸ γὰρ ἐφαπτομένης εὐθείας κατὰ τὴν αὐτὴν σημεῖον εἶναι ἀδύνατον. πολυτρόπως δεδειγμένον τὰς τῶν θεωρημάτων ἐν ἀσφόροις ἐκδόσεσιν, ἡμεῖς δὲ ἀπλυστέρως καὶ σαφέστερον ἐποιήσαμεν.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ λγ'.

Εὰν ἐν ὡσάβωλῃ ληφθῇ τι σημεῖον, καὶ ἀπ' αὐτοῦ πεταγμένως ὅτι τῇ ἀφ' αὐτοῦ κατὰ τὴν εὐθείαν, καὶ τῇ ἀπολαμβανομένη ὑπ' αὐτῆς ἀπὸ τῆς διαμέτρου πρὸς τὴν κορυφὴν τῆς ἴσης ἐπ' εὐθείας ἀπ' ἀκρᾶς αὐτῆς· ἡ ἀπὸ τῆς γωνιόμην σημεῖον ὅτι τὸ ληφθὲν σημεῖον ὅτι τῇ ἀπολαμβανομένη ἐφαπτομένη τῆς τομῆς.

ΕΣΤΩ ὡσάβωλῃ ἡς διάμετρος ἡ ΑΒ, καὶ κατήχθω πεταγμένως ἡ ΓΔ, καὶ τῇ ΕΔ ἴση καίθω ἡ ΑΕ. Ἐπεξεύχθω ἡ ΑΓ· λέγω ὅτι ἡ ΑΓ ἐκβαλλομένη ἐκτὸς πεσέσεται τῆς τομῆς.

Εἰ γὰρ δυνατὸν, πεπίετω ἐντὸς, ὡς ἡ ΓΖ, καὶ πεταγμένως κατήχθω ἡ ΗΒ. καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ ΗΒ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΔ μείζονα λόγον ἔχει ἢ τὸ ἀπὸ ΖΒ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΔ, ἀλλ' ὡς

PROP. XXXIII. Theor.




Si in parabola sumatur aliquod punctum, à quo recta linea ad diametrum ordinatim applicetur; & ei, quæ ab ipsa ex diametro abscinditur ad verticem, æqualis ponatur in directum ab ejus extremitate: recta linea, quæ à puncto sic invento ducitur ad illud quod sumptum fuerat, sectionem continget.

SIT parabola, cujus diameter ΑΒ; & recta ΓΔ ordinatim applicetur, & ipsi ΒΔ æqualis ponatur ΑΕ, & jungatur ΑΓ: dico ΑΓ productam extra sectionem cadere.

Si enim fieri potest, cadat intra, ut ΓΖ; & ΗΒ ordinatim applicetur. & quoniam [per 8. 5.] quadratum ex ΗΒ ad quadratum ex ΓΔ majorem rationem habet quam quadratum ex ΖΒ ad quadratum ex ΓΔ, & [per 4. & 22. 6.] ut

ζῶνα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ OA πρὸς AN . ἀλλ' ὡς ἡ NZ πρὸς EO , ὅτως ἡ KB πρὸς BM . ἡ KB ἄρα πρὸς BM μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ OA πρὸς AN . τὸ ἄρα ὑπὸ KB, AN μείζον ἐστὶ τοῦ ὑπὸ MB, AO . ὥς τὸ ὑπὸ KB, AN πρὸς τὸ δὸτὸ $ΓΕ$ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ὑπὸ MB, AO πρὸς τὸ δὸτὸ $ΓΕ$. ὁ ἀλλ' ὡς μὲν τὸ ὑπὸ KB, AN πρὸς τὸ δὸτὸ $ΓΕ$ ὅτως τὸ ὑπὸ $BΔA$ πρὸς τὸ δὸτὸ $ΔΕ$, $ΔΙθ'$ πλὴν ὁμοιότητι τῶν $BKΔ, ΕΓΔ, ANΔ$ τριγώνων. ὥς δὲ τὸ ὑπὸ MB, AO πρὸς τὸ δὸτὸ $ΓΕ$ ὅτως τὸ ὑπὸ BHA πρὸς τὸ δὸτὸ HE . τὸ ἄρα ὑπὸ $BΔA$ πρὸς τὸ δὸτὸ $ΔΕ$ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ὑπὸ BHA πρὸς τὸ δὸτὸ HE .

tionem quam OA ad AN . sed [per 4. 6.] ut NZ ad EO ita KB ad BM : ergo KB ad BM majorem rationem habet quam OA ad AN : ideoque [per 16. 6.] rectangulum quod fit sub KB, AN majus est eo quod fit sub MB, AO : sequitur igitur [per 9. 5.] rectangulum sub KB, AN ad quadratum ex $ΓΒ$ majorem rationem habere quam rectangulum sub MB, AO ad quadratum ex $ΓΕ$. at vero [per *Parri* lem. 5.] ut rectangulum sub KB, AN ad quadratum ex $ΓΕ$, sic rectangulum $BΔA$ ad quadratum ex $ΔΕ$, propter similitudinem triangulorum $BKΔ, ΕΓΔ, ANΔ$; & ut rectangulum sub MB, AO ad quadratum ex $ΓΕ$, sic rectangulum BHA ad quadratum ex HE : ergo $BΔA$ rectangulum ad quadratum ex $ΔΕ$ majorem rationem habet quam rectangulum BHA ad quadratum ex



ἐναλλάξ ἄρα τὸ ὑπὸ $BΔA$ πρὸς τὸ ὑπὸ BHA μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ἀπὸ $ΔΕ$ πρὸς τὸ ἀπὸ EH . ἀλλ' ὡς μὲν τὸ ὑπὸ $BΔA$ πρὸς τὸ ὑπὸ AHB ὅτως τὸ ἀπὸ $ΓΔ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $HΘ$. ὥς δὲ τὸ ἀπὸ $ΔΕ$ πρὸς τὸ ἀπὸ EH ὅτως τὸ ἀπὸ $ΓΔ$ πρὸς τὸ ἀπὸ ZH . καὶ τὸ ἀπὸ $ΓΔ$ ἄρα πρὸς τὸ ἀπὸ $ΘH$ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ἀπὸ $ΓΔ$ πρὸς τὸ ἀπὸ ZH . ἐλάσσων ἄρα ἐστὶν ἡ $ΘH$ τῆς ZH , ὅπερ ἐστὶν ἀδιύατον. οὐκ ἄρα ἡ $ΕΓ$ τέμνει πλὴν περιλήψεως ἄρα.

HB ; & permutando [per 16. 5.] rectangulum $BΔA$ ad rectangulum BHA majorem habet rationem quam quadratum ex $ΔΕ$ ad quadratum ex BH . sed [per 21. huj.] ut rectangulum $BΔA$ ad ipsum AHB ita quadratum ex $ΓΔ$ ad quadratum ex $HΘ$, & [per 4. & 22. 6.] ut quadratum ex $ΔΕ$ ad quadratum ex EH sic quadratum ex $ΓΔ$ ad quadratum ex ZH : quadratum igitur ex $ΓΔ$ ad quadratum ex $ΘH$ majorem rationem habet quam quadratum ex $ΓΔ$ ad quadratum ex ZH : & idcirco [per 9. 5.] $ΘH$ minor est ipsa HZ ; quod fieri non potest. igitur $ΕΓ$ sectionem non secat: quare sectionem ipsam contingat necesse est.

EUTOCIUS.

Δεῖ δὲ πρῶτον, ὅτι ἡ $ΓΔ$ κατὰ τὴν ὁρίσιν ἐστὶν πλὴν ἀφαιρέσεως, ὅτι ἡ $ΓΔ$ ὑπερβολῆς ἐστὶν $ΔΒ, ΔΑ$ ὁρίζουσαι, πλὴν $ΒΑ$ κατὰ τὴν ὁρίσιν ἐστὶν τμήματα εἰς $Β, Δ$, $Δ, Α$ λόγον. ὅτι $Ν$ τῆς ὑπερβολῆς καὶ τῆς κύκλου περιφέρειας ἀντίστοιχος, πλὴν $ΒΑ$ τέμνουσα εἰς ἀντιστοιχίαν λόγον τῆς $ΒΔ, ΔΑ$, ὅτι ζυγὸν ἡμῶς ποιεῖ τὴν $ΒΒ, ΕΑ$. ἐστὶν γὰρ διὰ τὴν

Sciendum est $ΓΔ$, quæ ad diametrum ordinatim applicatur, in hyperbola quidem terminare lineas $ΔΒ, ΔΑ$, cadens extra ipsam $ΒΑ$, quæ in ratione linearum $ΒΔ, ΔΑ$ secari debet: in ellipsi vero & circuli circumferentiâ contrarium evenit, nam cum secet ipsam $ΒΑ$, necesse est ut inquiramus $ΒΒ, ΕΑ$ in determinata ratione, in qua videlicet sunt $ΒΔ, ΔΑ$. neque enim diffi-

Q

civ



ἡ ἀφ' ἧς εὐθεῖα ἀχθῆσα πεταγμένης ὅτι τὴν
ἀξίμετρον ἴσῃ ἀπολήψεται ἀπὸ τῆς ἀξίμέ-
τρος, ὡς τῇ κορυφῇ τῆς τομῆς, τῇ μεταξὺ αὐ-
τῆς καὶ τῆς ἐφαπτομένης καὶ εἰς τὴν μεταξὺ τόπον
τῆς ἐφαπτομένης καὶ τῆς τομῆς ἑδμήια εὐθεῖα
παρεμπίσεται.

ΕΣΤΩ ὡς ἐπὶ τῇ διάμετρος ἡ AB , καὶ πε-
ταγμένης ἀνήχθω ἡ BF , καὶ ἔστω ἐφαπτομένη
τῆς τομῆς ἡ AG . λέγω ὅτι ἡ
 AH ἴση ἐστὶ τῇ HB .

Εἰ γὰρ δυνατὸν, ἔστω ἄλλος
αὐτῇ, καὶ τῇ AH ἴση κείσθω ἡ HE ,
ἡ πεταγμένης ἀνήχθω EZ , καὶ
ἐπιεύχθω ἡ AZ . ἡ AZ ἄρα
ἐκβαλλομένη συμπίπτει τῇ AG
εὐθείᾳ ὅπερ ἀδυνάτον, διὸ γὰρ
ἔσται εὐθεῖαν καὶ αὐτὴ πέρατα. ἔκ
ἄρα ἄλλος ἐστὶν ἡ AH τῇ HB .
ἴση ἄρα.

ΛΕΓΩ δὲ ὅτι εἰς τὴν μεταξὺ
τόπον τῆς AG εὐθείας καὶ τῆς
τομῆς ἑδμήια εὐθεῖα παρεμ-
πίσεται.

Εἰ γὰρ δυνατὸν, παρεμπί-
πτει ἡ $ΓΔ$, καὶ τῇ HA ἴση
κείσθω ἡ HE , καὶ πεταγμένης
ἀνήχθω ἡ EZ . ἡ ἄρα ἀπὸ
τῆς $Δ$ ὅτι τὸ Z ὅτι ἡ $Δ$ γινυμένη
εὐθεῖα ἐφαπτομένη τῆς τομῆς ἐκ-
βαλλομένη ἄρα ἐκτὸς πίπτει
αὐτῆς ὡς συμπίπτει τῇ AG ,
καὶ διὸν εὐθεῖαν ἔσται καὶ αὐτὴ
πέρατα, ὅπερ ἀδυνάτον. οὐκ ἄρα
εἰς τὸν μεταξὺ τόπον τῆς τομῆς καὶ τῆς AG εὐθείας
παρεμπίσεται εὐθεῖα.



SIT parabola, cujus diameter AB ; ordina-
timque applicetur BF ; & sit AG sectionem
contingens: dico AH ipsi HB
æqualem esse.

Si enim fieri potest, sit in-
æqualis; & ipsi AH æqua-
lis ponatur HE ; recta au-
tem EZ ordinatim applice-
tur; & jungatur AZ : er-
go [per 33. huj.] AZ pro-
ducta conveniet cum AG ; quod fieri non potest: dua-
rum enim rectarum iidem ter-
mini essent. non ergo inæ-
qualis est AH ipsi HB : quare
necessario erit æqualis.

RURSUM dico in locum,
qui est inter AG & sectionem,
aliam rectam lineam non ca-
dere.

Si enim fieri possit, ca-
dat $ΓΔ$; ipsique HA æqua-
lis ponatur HE ; & EZ ordi-
natim applicetur: ergo [per
33. huj.] à puncto $Δ$ ad
 Z ducta recta contingit se-
ctionem; quare producta ex-
tra ipsam cadet: & propter-
ea conveniet cum AG , erunt-
que duarum rectarum iidem
termini; quod est absurdum.

non igitur in locum, qui est inter sectionem &
 AG , alia recta cadet.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ λς'.

Εάν ὑπερβολῆς, ἢ ἐλλείψεως, ἢ κύκλου περιφέρειας
ἐφάπτηται τις εὐθεῖα, συμπίπτουσα τῇ πλα-
γίᾳ τῆς εὐθείας πλάγῃ, καὶ ἀπὸ τῆς ἀφ' ἧς καταχθῇ
εὐθεῖα πεταγμένης ὅτι τῆς ἀξίμετρον ἴσῃ ὡς
ἡ ἀπολαμβομένη ὑπὸ τῆς ἐφαπτομένης ὡς
τῇ πέρατι τῆς πλαγίας πλάγῃ ὡς τῇ
ἀπολαμβομένη ὑπὸ τῆς ἐφαπτομένης ὡς
τῇ ἐτέρῃ πέρατι τῆς πλάγῃ, ὥστε ἡ ἀπο-
λαμβομένη ὑπὸ τῆς ἐφαπτομένης ὡς τῇ
πέρατι τῆς πλάγῃ ὡς τῇ ἀπολαμβο-
μένη ὑπὸ τῆς ἐφαπτομένης ὡς τῇ ἐτέρῃ
πέρατι τῆς πλάγῃ, ὥστε τὰς ὁμολόγους συν-
χέει (εἰ) καὶ εἰς τὴν μεταξὺ τόπον τῆς ἐφαπτομένης
καὶ τῆς κώνος τομῆς εὐθεῖα ἢ παρεμπίσεται.

PROP. XXXVI. Theor.


Si hyperbolam, vel ellipsim, vel circuli
circumferentiam contingat quædam
recta linea conveniens cum transverso
figuræ latere, & à tactu recta ad
diametrum ordinatim applicetur: erit
ut recta, quæ interjicitur inter con-
tingentem & terminum transversæ la-
teris ad interjectam inter eandem &
alterum lateris terminum, ita quæ
est inter ordinatim applicatam & ter-
minum lateris ad eam quæ est in-
ter eandem & alterum terminum,
adeo ut continuatæ inter se sint quæ
sibi ipsis respondent; & in locum,
qui inter contingentem & sectionem
coni interjicitur, altera recta non
cadet.

SIT

SIT hyperbola, vel ellipsis, vel circuli circumferentia, cuius diameter AB; recta vero contingens sit ΓΔ, & ΓΒ ordinatim applicetur: dico ut ΒΒ ad ΒΑ sic esse ΒΔ ad ΔΑ.

Si enim non est ita; sit ut ΒΔ ad ΔΑ sic ΒΗ ad ΗΑ, & ordinatim applicetur ΗΖ: ergo [per 34. huj.] quæ à puncto Δ ad Ζ ducitur recta sectionem continget, & producta conveniet cum ipsa ΓΔ: quare duarum rectarum iidem termini erunt; quod est absurdum.

ΕΣΤΩ υπερβολή, ἢ ἑλλείψις, ἢ κύκλος περιφέρεια, ἧς διάμετρος ἡ ΑΒ, ἐφαπτομένη ᾗ ἔστω ἡ ΓΔ, καὶ πεπλεγμένως κατὰ χθρὴ ἡ ΓΕ· λέγω ὅτι ἐστὶν ὡς ἡ ΒΕ πρὸς ΕΑ ὅτως ἡ ΒΔ πρὸς ΔΑ. Εἰ γὰρ μὴ ἐστὶν, ἔστω ὡς ἡ ΒΔ πρὸς ΔΑ ὅτως ἡ ΒΗ πρὸς ΗΑ, ἐπεπλεγμένως ἀνέχθω ἡ ΗΖ· ἡ ἄρα ἀπὸ Δ [ὅτι τὸ Ζ] ὁπλῆδυνυμένη εὐθεῖα ἐφάπτεται τῇ τμήσιν ἐκβαλλομένη ἄρα συμπίπτει τῇ ΓΔ· δύο ἄρα εὐθειῶν τὰ αὐτὰ πέρατα ἐστὶν, ὅπερ ἀδύνατον.



Dico etiam in locum, qui inter sectionem & ΓΔ interjicitur, nullam rectam cadere.

Si enim fieri potest, cadat ΓΘ; & ut ΒΘ ad ΘΑ ita fiat ΒΗ ad ΗΑ, & ΗΖ ordinatim applicetur: juncta ergo ΘΖ, si producat, [per 34. huj.] conveniet cum ipsa ΘΓ, atque erunt duarum rectarum iidem termini; quod fieri non potest. non ergo inter sectionem & ΓΔ altera recta cadet.

ΛΕΓΩ ὅτι μεταξὺ τῇ τμήσιν καὶ τῇ ΓΔ εὐθείας ἀδύναται εὐθεῖα παρεμβεσθαι.

Εἰ γὰρ δύναται, παρεμπίπτειτω ὡς ἡ ΓΘ, καὶ πεπιθήσθω ὡς ἡ ΒΘ πρὸς ΘΑ ὅτως ἡ ΒΗ πρὸς ΗΑ, καὶ πεπλεγμένως ἀνέχθω ἡ ΗΖ· ἡ ἄρα ἀπὸ Δ [ὅτι τὸ Ζ] ὁπλῆδυνυμένη εὐθεῖα ἐκβαλλομένη συμπίπτει τῇ ΘΓ· δύο ἄρα εὐθειῶν τὰ αὐτὰ πέρατα ἐστὶν, ὅπερ ἀδύνατον. ἔκ ἄρα οὐκ ἐστὶν μεταξὺ τῶν τῇ τμήσιν καὶ τῇ ΓΔ εὐθείας παρεμβεσθαι εὐθεῖα.

PROP. XXXVII. Theor.

Si recta linea hyperbolam, vel ellipsum, vel circuli circumferentiam contingens cum diametro conveniat, & à tactu ad diametrum recta ordinatim applicetur: quæ interjicitur inter applicatam & centrum sectionis, una cum interjecta inter contingentem & sectionis centrum, continebit rectangulum æquale quadrato rectæ quæ est ex centro sectionis: sed una cum ea, quæ inter applicatam & contingentem interjicitur, continebit spatium, quod ad quadratum ordinatim applicatæ eandem rationem habet quam transversum figuræ latus ad rectum.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ λζʹ.

Εάν υπερβολῆς, ἢ ἐλλείψως, ἢ κύκλου περιφέρειας εὐθεῖα ἐκτεταταίῃσιν συμπίπτῃ τῇ διαμέτρῳ, καὶ ἀπὸ τῆς ἀφ᾽ ἧς ἐκτεταταίῃσιν ἀφ᾽ ἑαυτῆς κατὰ χθρὴ εὐθεῖα πεπλεγμένως ἢ ἀπολαμβατομένη εὐθεῖα ὑπὸ τῆς κατὰ χθρὴς πρὸς τὸ κέντρον τῆς τομῆς, μὴ μὲν τῆς ἀπολαμβατομένης ὑπὸ τῆς ἐφαπτομένης πρὸς τὸ κέντρον τῆς τομῆς, ὅσοι πλείονες εἰσι τὰ ἀπὸ τῆς ἐκ τῆς κέντρον τῆς τομῆς μετὰ δὲ τῆς μεταξὺ τῆς κατὰ χθρὴς καὶ τῆς ἐφαπτομένης περιέχει χώρου, λόγῳ ἔχον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς κατὰ χθρὴς τετραγώνου ὅτι ἡ πλαγία πλάττειται πρὸς τὴν ὀρθίαν.

ΕΣΤΩ

ΕΣΤΩ υπερβολή, ἢ ἑλλειψις, ἢ κύκλος περι-
φέρεια ἧς διὰ μέτρος ἡ ΑΒ, ἢ ἐφαπτομένη
ἡ ΓΔ, καὶ κατὰ τὴν πεταγμένην ἡ ΓΕ, κέν-
τρον ᾧ ἐστὶ τὸ Ζ· λέγω ὅτι ἴσον ἐστὶ τὸ ὑπὸ Δ Ζ Ε τῷ
ὑπὸ Ζ Β, καὶ ὡς τὸ ὑπὸ Δ Ε Ζ πρὸς τὸ ὑπὸ Ε Γ ὅ-
πως ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὀρθίαν.

Επεὶ γὰρ ἐφαπτομένη ἡ

ΓΔ τῇ περιφέρειᾳ, καὶ πετα-

γμένης κατὰ τὴν ἡ ΓΕ,

ἐστὶ ὡς ἡ ΑΔ πρὸς ΔΒ

ὅπως ἡ ΑΕ πρὸς ΕΒ·

συνθέντι ἄρα ἐστὶ ὡς συν-

αμφοτέρους ἡ ΑΔ, ΔΒ

πρὸς ΔΒ ὅπως συναμ-

φοτέρους ἡ ΑΕ, ΕΒ πρὸς

ΕΒ, ἢ τῇ ἡγεμονίᾳ τῶν

ἡμίσεων. ὅτι μὲν τῇ ὑπερ-

βολῇς ἐρεῖται. ἀλλὰ συναμφοτέρους μὲν τῇ ΑΕ, ΕΒ

ἡμισεία ἐστὶ ἡ ΖΕ, τῇ δὲ ΑΒ ἡ ΖΒ· ὡς ἄρα ἡ ΖΕ

πρὸς ΕΒ ὅπως ἡ ΖΒ πρὸς ΒΔ· ἀνατρέψαντι ἄρα,

ἐστὶ ὡς ἡ ΕΖ πρὸς ΖΒ ὅπως ἡ ΖΒ πρὸς ΖΔ· ἴσον

ἄρα ἐστὶ τὸ ὑπὸ Ε Ζ Δ τῷ ὑπὸ Ζ Β. καὶ ἐπεὶ ἐστὶ ὡς ἡ

ΖΕ πρὸς ΕΒ ὅπως ΖΒ πρὸς ΒΔ, τρεῖς τὴν ἡ ΑΖ

πρὸς ΔΒ· ἐναλλάξ ὡς ἡ ΑΖ πρὸς ΖΕ ὅπως ἡ ΔΒ

πρὸς ΒΕ, καὶ συνθέντι ὡς ἡ ΑΕ πρὸς ΕΖ ὅπως ἡ

ΔΕ πρὸς ΕΒ· ὡς τὸ ὑπὸ Α Ε Β ἴσον τῷ ὑπὸ Ζ Ε Δ.

ἐστὶ δὲ ὡς τὸ ὑπὸ Α Ε Β πρὸς τὸ ὑπὸ Γ Ε ὅπως ἡ

πλαγία πρὸς τὴν ὀρθίαν· καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ Ζ Ε Δ

πρὸς τὸ ὑπὸ Γ Ε ὅπως ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὀρθίαν.

Επεὶ δὲ τῇ ἐλλείψει καὶ τῇ κύκλῳ περιφέρειᾳ.

ἀλλὰ συναμφοτέρους μὲν τῇ ΑΔ, ΔΒ ἡμισεία ἐστὶ

ἡ ΔΖ, τῇ δὲ ΑΒ ἡμισεία ἐστὶ ἡ ΖΒ· ὡς ἄρα ἡ

ΖΔ πρὸς ΔΒ ὅπως ἡ ΖΒ πρὸς ΒΕ· ἀνατρέ-


ψαντι ἄρα ἐστὶ ὡς ἡ ΔΖ πρὸς ΖΒ ὅπως ἡ ΒΖ

πρὸς ΖΕ· ἴσον ἄρα ἐστὶ τὸ Δ Ζ Ε τῷ ὑπὸ Β Ζ.

ἀλλὰ τὸ μὲν ὑπὸ Δ Ζ Ε ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ Δ Ε Ζ καὶ

τῷ ὑπὸ Ζ Ε, τὸ δὲ ὑπὸ Β Ζ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ Α Ε Β



SIT hyperbola, vel ellipsis, vel circuli cir-
cumferentia, cujus diameter AB; ducatur-
que contingens ΓΔ, & ΓΕ ordinatim applice-
tur; centrum autem sit Z: dico rectangulum
Δ Ζ Ε quadrato ex Ζ Β æquale esse; & ut rectan-
gulum Δ Ε Ζ ad quadratum ex Ε Γ ita transver-
sum latus ad rectum.



Quoniam enim ΓΔ
contingit sectionem, &
ordinatim applicata est
ΓΕ; erit [per 36.huj.]
ut ΑΔ ad ΔΒ ita ΑΒ
ad ΕΒ: ergo [per 18.
5.] componendo, ut
utraq. ΑΔ, ΔΒ ad
ΔΒ ita utraq. ΑΕ, ΕΒ
ad ΕΒ; & anteceden-
tium dimidia. In hy-
perbola quidem in hunc
modum argumentabi-

mur. sed utriusque ΑΕ, ΕΒ dimidia est ΖΕ,
ipsius autem ΑΒ dimidia ΖΒ: ut igitur ΖΒ ad
ΕΒ ita ΖΒ ad ΒΔ; & [per cor. 19. 5.] per
conversionem rationis ut ΕΖ ad ΖΒ ita ΖΒ ad
ΖΔ: quare [per 17. 6.] rectangulum Ε Ζ Δ qua-
drato ex Ζ Β est æquale. Et quoniam ut ΖΕ ad
ΕΒ ita ΖΒ ad ΒΔ, hoc est ΑΖ ad ΔΒ; erit [per
16. 5.] permutando ut ΑΖ ad ΖΕ ita ΔΒ ad ΒΕ;
& [per 18. 5.] componendo ut ΑΒ ad ΕΖ ita
ΔΒ ad ΕΒ: ergo [per 17. 6.] rectangulum Α Β Β
æquale est rectangulo Ζ Ε Δ. sed [per 21.huj.] ut
rectangulum Α Ε Β ad quadratum Γ Ε ita transver-
sum latus ad rectum: ut igitur rectangulum Ζ Ε Δ
ad quadratum Γ Ε ita transversum latus ad rectum.

In ellipsi vero, & circuli circumferentia hoc
modo. sed utriusque ΑΔ, ΔΒ dimidia est ΔΖ;
& ipsius ΑΒ dimidia ΖΒ: ergo ut ΖΔ ad ΔΒ ita
ΖΒ ad ΒΕ; & [per cor. 19. 5.] per conversionem
rationis, ut ΔΖ ad ΖΒ ita ΒΖ ad ΖΕ; rectangu-
lum igitur Δ Ζ Β [per 17. 6.] æquale est quadrato
ex Β Ζ. At vero [per 3. 2.] rectangulum Δ Ζ Β
rectangulo Δ Ε Ζ una cum quadrato ex Ζ Ε est æ-
quale; & [per 5. 2.] quadratum ex Β Ζ æquale est



μετὰ τῷ ὑπὸ Ζ Ε. καὶ ὅταν ἀφαιρεθῇ τὸ ἀπὸ Ζ Ε·
λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ Δ Ε Ζ λοιπὸν τῷ ὑπὸ Α Ε Β ἴσον
ἐστὶ· ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ Δ Ε Ζ πρὸς τὸ ὑπὸ Γ Ε
ὅπως τὸ ὑπὸ Α Ε Β πρὸς τὸ ἀπὸ Γ Ε. ἀλλὰ ὡς
τὸ ὑπὸ Α Ε Β πρὸς τὸ ὑπὸ Γ Ε ὅπως ἡ πλαγία
πρὸς τὴν ὀρθίαν· ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ Δ Ε Ζ πρὸς τὸ
ἀπὸ Ε Γ ὅπως ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὀρθίαν.

rectangulo Α Ε Β una cum quadrato ex Ζ Ε. com-
mune auferatur quadratum ex Ζ Ε: reliquum
igitur rectangulum Δ Ε Ζ reliquo Α Ε Β æquale
erit: ut igitur rectangulum Δ Ε Ζ ad quadratum
ex Γ Ε, ita [per 7. 5.] rectangulum Α Ε Β ad qua-
dratum ex Γ Ε. sed [per 21. huj.] ut rectan-
gulum Α Ε Β ad quadratum ex Γ Ε ita transversum
latus ad rectum: ergo ut rectangulum Δ Ε Ζ ad
quadratum ex Ε Γ ita transversum latus ad rectum.

R

EUTQ.

Ex his theorematibus patet, quomodo per datum punctum in diametro vel vertice sectionis contingentem rectam ducere possimus.

Διὰ τῶν τῶν θεωρημάτων φαίνεται, ὅπως διὰ δυνάμιν ἀφ' ἧς δίδιντο σημεῖα ἐπὶ τῶν ἀξόνων καὶ τῶν κορυφῶν τῶν τομῶν ἐφαπτομένην ἀγαγεῖν.

PROP. XXXVIII. Theor.


Si hyperbolam, vel ellipsum, vel circuli circumferentiam recta linea contingens cum secunda diametro conveniat; & à tactu ad diametrum applicetur recta alteri diametro parallela: quæ interjicitur inter applicatam & sectionis centrum, una cum interjecta inter contingentem & centrum sectionis, continebit rectangulum æquale quadrato quod fit ex dimidia secundæ diametri; sed una cum ea, quæ inter applicatam & contingentem interjicitur, spatium continebit, quod ad quadratum applicatæ eam rationem habeat, quam figuræ rectum latus ad transversum.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ λη'.

Εὰν ὑπερβολῆς, ἢ ἐλλείψεως, ἢ κύκλου περιφέρειας εὐθεῖα ὁριζώουσα συμπίπτῃ τῇ δευτέρᾳ ἀξονί, καὶ ἀπὸ τῆς ἀφῆς εὐθεῖα καταχθῇ ὅτι τῇ αὐτῇ ἀξονί ἀξονί, ὡς ἀλλήλῃ. τῇ ἐτέρᾳ ἀξονί, ἢ ἀπολαμβατομένη εὐθεῖα ὑπὸ τῆς κατηγμένης πρὸς τὴν κέντρον τῆς τομῆς, μὴ μὲν τῆς ἀπολαμβατομένης ὑπὸ τῆς ἐφαπτομένης πρὸς τὴν κέντρον τῆς τομῆς, ἴσον περιέξῃ τὸ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς δευτέρας ἀξονίς τετραγώνῳ μὴ δὲ τῆς μεταξὺ τῆς κατηγμένης καὶ τῆς ἐφαπτομένης περιέξῃ χαλεπὸν λόγον ἔχον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς κατηγμένης, ὅν ἔχει ἡ ὀρθία τῶν εὐθῶν πλευρὰ πρὸς τὴν πλαγίαν.

SIT hyperbola, vel ellipsis, vel circuli circumferentia, cujus diameter AHB, secunda diameter ΓΗΔ; recta vero sectionem contingens sit ΕΛΖ, quæ conveniat cum ΓΔ in Z; & ΘΒ ipsi ΑΒ sit parallela: dico rectangulum ΖΗΘ quadrato ex ΓΗ æquale esse; & ut rectangulum ΗΘΖ ad quadratum ex ΘΒ ita rectum figuræ latus ad latus transversum.

ΕΣΤΩ ὑπερβολή, ἢ ἐλλείψις, ἢ κύκλος περιφέρειας ἧς ἀξονίς ἡ ΑΒ, δευτέρα δὲ διάμετρος ἡ ΓΗΔ, ἐφαπτομένη δὲ ἔξω τῆς τομῆς ἡ ΕΛΖ συμπίπτει τῇ ΓΔ κατὰ τὸ Ζ, ὡς ἀλλήλος ἢ ἔξω τῇ ΑΒ ἡ ΘΒ. λέγω ὅτι τὸ ὑπὸ ΖΗΘ τὸ ἀπὸ ΗΓ ἴσον, καὶ ἔστιν ὡς τὸ ὑπὸ ΗΘΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘΒ ὅπως ἡ ὀρθία πρὸς τὴν πλαγίαν.



Ordinatum namque applicatâ MB, erit [per 37. huj.] ut rectangulum ΗΜΛ ad quadratum ex MB ita transversum latus ad rectum. sed [per def. 2^{ae} diam.] ut transversum latus ΒΑ ad ΓΔ ita ΓΔ ad latus rectum: ergo [per cor. 20. 6.]

Ἡχθὼν παραγμένως ἡ ΜΕ· ἔστιν ὅρα ὡς τὸ ὑπὸ ΗΜΛ πρὸς τὸ ἀπὸ ΜΕ ὅπως ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὀρθίαν. ἀλλ' ἔστιν ὡς ἡ πλαγία ΒΑ πρὸς ΓΔ ὅπως ἡ ΓΔ πρὸς τὴν ὀρθίαν· καὶ ὡς ὅρα ἡ πλαγία

Corollarium.

Ex jam dictis manifestum est BZ contingere sectionem, sive rectangulum $ZH\Theta$ æquale sit quadrato ex $H\Gamma$, sive $Z\Theta H$ rectangulum ad quadratum ex ΘE eam, quam diximus, rationem habeat. conuerso enim modo illud facile ostendetur.

Πόρυσμα.

Φανερίν δὲ ὅτι τῶν εἰρημύμων ὅτι ἡ EZ ἐφ' ἀπὸ τῆς τομῆς, εἴαν τε ἴσων ἢ τὸ ὑπὸ $ZH\Theta$ τῷ ἀπὸ τῆς $H\Gamma$, εἴαν τε λόγον ἔχη τὸ ὑπὸ $Z\Theta H$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘE τὸν εἰρημύμων. δευχρήσεται γὰρ ἀντιτρόφως.

EUTOCIUS.

In aliquibus exemplaribus hoc theorema in sola hyperbola demonstratum inuenimus: sed hoc loco universaliter demonstratur, quoniam eadem contingunt & in diversis sectionibus. Apollonio autem visum est non solum hyperbolam sed etiam ellipsim secundam diametrum habere, ut sæpe ex ipso in superioribus didicimus. Et in ellipsi quidem casum non habet, in hyperbola vero tres habet casus. punctum enim Z , in quo recta sectionem contingens cum secunda diametro convenit, vel est infra Δ , vel in ipso Δ , vel supra; & propterea punctum Θ similiter tres locos obtinet. attendendum autem est, cum Z cadit infra Δ , & Θ infra Γ cadere; cum vero Z cadit in Δ , Θ cadit in Γ ; & cum Z supra Δ , & Θ supra Γ cadit.

Εν τῶν ἀντιτρόφως τὸ διὰ τὸν μόνον τὸ ὑπερβολῆς εἰσάγεται διδρυμύμων. καὶ οὕτως δὲ ἐν ταῦτα δὲ δεσμεύεται. τὰ γὰρ αὐτὰ συμβαίνει καὶ ὅτι τῶν ἄλλων τομῶν. καὶ τὸ Απολλωνίου δὲ δοκεῖ μὴ εἶναι μόνον τὴν ὑπερβολὴν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἑλλειψιν ἔχον διυτῆραν ἀξίμετρον, ὡς πολλὰ αὐτὴν ἐκείνην ἐν τοῖς περιλαμβανόμενοις. καὶ ὅτι μὲν τῆς ἑλλείψεως πᾶσι πᾶσι ἔχει, ὅτι δὲ τῆς ὑπερβολῆς πᾶσι. τὸ γὰρ Z συμπίπτει, καὶ δὲ συμβαίνει ἢ ἐκαστομένη τῇ διυτῆρι διαμέτρῳ, ἢ κατωτέρῳ Γ ἢ ἐπὶ Γ , ἢ ἀνωτέρῳ Γ . καὶ ἀπὸ τῆς Θ ὁμοίως αὐτῇ πᾶσι ἔχει τοπὸς. καὶ περιλαμβανόμενοι, ὅτι ὅτι κατωτέρῳ πᾶσι τὸ Z Γ Δ , καὶ τὸ Θ Γ ἔσται κατωτέρῳ ὅτι τὸ Z ὅτι τὸ Δ , καὶ τὸ Θ ὅτι τὸ Γ . ὅτι ἀνωτέρῳ τὸ Z Γ Δ , καὶ τὸ Θ Γ ἔσται ἀνωτέρῳ.

PROP. XXXIX. Theor.


Si hyperbolam, vel ellipsim, vel circuli circumferentiam recta contingens cum diametro conveniat; & à tactu ad diametrum recta ordinatim applicetur: sumptâ quâvis rectâ ex duabus, quarum altera interjicitur inter applicatam & centrum sectionis, altera inter applicatam & contingentem, habebit ad eam applicata rationem compositam ex ratione quam habet altera dictarum rectarum ad applicatam, & ex ratione quam rectum figuræ latus habet ad transversum.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΛΘ'.

Εἴαν ὑπερβολῆς, ἢ ἑλλείψεως, ἢ κύκλου περιφέρειας εὐθεῖα ὁπτηαύσασα συμπίπτῃ τῇ διαμέτρῳ, καὶ ἀπὸ τῆς ἀφῆς κατωτέρῳ εὐθεῖα ὁπτηαύσασα τῇ ἀνωτέρῳ τεταγμένης ἥτις ἀνὰ ληρῆν τῆς δύο εὐθεῶν, ὅτι ὅτι ἢ μεταξὺ τῆς κατωτέρῳ καὶ ἀνωτέρῳ τομῆς, ἢ δὲ μεταξὺ τῆς κατωτέρῳ καὶ ἐφαπτομένης τῆς τομῆς, ἔξει πρὸς αὐτὴν ἢ κατωτέρῳ τῆς συγκείμενοι λόγοι, ἔσται ὅτι ἔχει ἢ ἐπὶ τῆς δύο εὐθεῶν πρὸς κατωτέρῳ, καὶ ἐκ τῆς ὅτι ἔχει ἢ ἐπὶ τῆς δύο ὁρῆας πρὸς τὴν πλαγίαν.

SIT hyperbola, vel ellipsis, vel circuli circumferentia cuius diameter AB , centrum autem Z ; ducaturque $\Gamma\Delta$ sectionem contingens, & ΓE ordinatim applicetur: dico ΓE ad alteram rectarum $Z E$, $E\Delta$ rationem habere compositam ex ratione, quam habet rectum figuræ latus ad transversum, & ex ea quam altera dictarum rectarum $Z E$, $E\Delta$ habet ad ipsam $E\Gamma$.

Εἰς τὸν ὑπερβολῆς, ἢ ἑλλείψεως, ἢ κύκλου περιφέρειας ἥς ἀξίμετρος ἡ AB , κέντρον δὲ αὐτῆς τὸ Z , ἐφαπτομένη πᾶσι τῆς τομῆς ἡ $\Gamma\Delta$, ἐφαπτομένης κατωτέρῳ ἡ ΓE . λέγω ὅτι ἡ ΓE πρὸς τὴν ἐπὶ τῆς $Z E$, $E\Delta$ τὸν συγκείμενον ἔχει λόγον, ἔσται ὅτι ἔχει ἢ ὁρῆας πρὸς τὴν πλαγίαν, καὶ ὅτι ὅτι ἔχει ἢ ἐπὶ τῆς $Z E$, $E\Delta$ πρὸς τὴν $E\Gamma$.



Sit enim rectangulum $Z E\Delta$ æquale rectangulo sub $E\Gamma$ & recta H : & quoniam [per 37. huj.] ut rectangulum $Z E\Delta$ ad quadratum ex ΓE ita transversum latus ad rectum; atque rectangulum $Z E\Delta$ rectangulo sub $E\Gamma$ & H æquale est: erit ut


Εἰς τὸν γὰρ ἴσων τὸ ὑπὸ $Z E\Delta$ τῷ ὑπὸ $E\Gamma$ ὅτι πρὸς H καὶ ἐπὶ τῆς ὡς τὸ ὑπὸ $Z E\Delta$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓE ὅτι πρὸς τὴν πλαγίαν πρὸς τὴν ὁρῆαν, ἴσων δὲ ὅτι τὸ ὑπὸ $Z E\Delta$ τῷ ὑπὸ $E\Gamma$, H ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ

ὑπὸ ΓΕ, Η πρὸς τὸ δὲ ΓΕ, ταῖς τῆς Η πρὸς ΓΕ, ἔστω ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὀρθίαν. καὶ ἐπεὶ ἴσων ἐστὶ τὸ ὑπὸ ΖΕΔ τῷ ὑπὸ ΓΕ, Η, ἐστὶν ὡς ἡ ΕΖ πρὸς ΕΓ ἔστω ἡ Η πρὸς ΕΔ. καὶ ἐπεὶ ἡ ΓΕ πρὸς ΕΔ τὸν συγκείμενον ἔχει λόγον, ἔκτε δ' ὃν ἔχει ἡ ΓΕ πρὸς Η καὶ τὴν ὃν ἔχει ἡ Η πρὸς ΕΔ. ἀλλ' ἐστὶν ὡς μὲν ἡ ΓΕ πρὸς Η ἔστω ἡ ὀρθία πρὸς τὴν πλαγίαν, ὡς δὲ ἡ Η πρὸς ΔΕ ἔστω ἡ ΖΕ πρὸς ΕΓ. ἡ ΓΕ ἄρα πρὸς ΕΔ τὸν συγκείμενον ἔχει λόγον, ἔκτε δ' ὃν ἔχει ὀρθία πρὸς τὴν πλαγίαν ἔκ τε δ' ὃν ἔχει ἡ ΖΕ πρὸς ΕΓ.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Μ'.

Εάν ὑπερβολῆς, ἢ ἐλλείψεως, ἢ κύκλου περιφέρειαν εὐθεῖα ἐπιφανύσασα συμπίπτῃ τῇ δευτέρᾳ διαμέτρῳ, καὶ ἀπὸ τῆς αὐτῆς καταχθῇ εὐθεῖα ἐπι τὴν αὐτὴν διάμετρον ὁμοῦ ἄλλῃ τῇ ἐτέρᾳ διαμέτρῳ ἥτις ἀν' ἀπορρῇ τὴν δύο εὐθειῶν, ὅν ὅστις ἢ μὲν μεταξὺ τῆς καταγεμμένης καὶ τῆς κέντρου τομῆς, ἢ δὲ μεταξὺ τῆς καταγεμμένης καὶ τῆς ἐφαπτομένης, ἔξει πρὸς αὐτὴν ἢ καταγεμμένην τὸν συγκείμενον λόγον, ἔκτε δ' ὃν ἔχει ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὀρθίαν καὶ ἐξ ὅτι ἔχει ἡ ἐτέρα τὴν δύο εὐθειῶν πρὸς τὴν καταγεμμένην.

ΕΣΤΩ ὑπερβολῆς, ἢ ἐλλείψεως, ἢ κύκλου περιφέρειαν ἡ ΑΒ, διάμετρος δὲ αὐτῆς ἡ ΒΖΓ, δευτέρα δὲ ἡ ΔΖΕ, ἐφαπτομένη ἡ ΧΘΩ ἢ ΘΑΑ, καὶ τῇ ΓΒ ὁμοῦ ἄλλῃ ἡ ΑΗ. λέγω ὅτι ἡ ΑΗ πρὸς τὴν ἐτέρα τὴν ΘΗ, ΖΗ τὸν συγκείμενον ἔχει λόγον, ἔκτε δ' ὃν ἔχει ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὀρθίαν καὶ ἐκ δ' ὃν ἔχει ἡ ἐτέρα τὴν ΖΗ, ΘΗ πρὸς τὴν ΗΑ.



Εἰς τὸ ὑπὸ ΘΗΖ ἴσων τῷ ὑπὸ ΗΑ, Κ. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ ὀρθία πρὸς τὴν πλαγίαν ἔστω τὸ ὑπὸ ΘΗΖ πρὸς τὸ δὲ ΗΑ, τῷ δὲ ὑπὸ ΘΗΖ ἴσων τὸ ὑπὸ ΗΑ, Κ. καὶ τὸ ὑπὸ ΗΑ, Κ ἄρα πρὸς τὸ δὲ ΗΑ, ταῖς τῆς Κ πρὸς ΑΗ, ἐστὶν ὡς ἡ ὀρθία πρὸς τὴν πλαγίαν. ἔπειτα ἡ ΑΗ πρὸς ΗΖ τὸν συγκείμενον ἔχει λόγον, ἔκτε τῶν ὃν ἔχει ἡ ΑΗ πρὸς Κ καὶ ὅτι τῶν ὃν ἔχει ἡ Κ πρὸς ΗΖ. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΗΑ πρὸς Κ ἔστω ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὀρθίαν, ὡς δὲ ἡ Κ πρὸς ΗΖ ἔστω

rectangulum sub ΓΕ & Η ad quadratum ex ΓΕ, hoc est [per 1. 6.] ut Η ad ΓΕ, ita transversum latus ad rectum. rursus quoniam rectangulum ΖΕΔ æquale est rectangulo sub ΓΕ & Η; ut ΕΖ ad ΕΓ ita [per 16. 6.] erit Η ad ΕΔ, habet autem ΓΕ ad ΕΔ rationem compositam ex ratione quam ΓΕ habet ad Η & ex ea quam Η habet ad ΕΔ; utque ΓΕ est ad Η (ut mox ostensum) ita rectum latus ad transversum; & ut Η ad ΔΕ ita ΖΕ ad ΕΓ: ergo ΓΕ ad ΕΔ rationem habebit compositam ex ratione quam habet rectum latus ad transversum, & ex ea quam ΖΕ habet ad ΕΓ.

PROP. XL. Theor.

Si hyperbolam, vel ellipsim, vel circuli circumferentiam recta linea contingens cum secunda diametro conveniat; & à tactu ad eandem diametrum recta applicetur diametro alteri parallela: sumptâ quâlibet rectâ ex duabus, quarum una inter applicatam & sectionis centrum interjicitur, altera inter applicatam & contingentem, habebit ad ipsam applicatam rationem compositam ex ratione quam habet transversum figuræ latus ad rectum & ex ea quam altera dictarum rectarum habet ad applicatam.

SIT hyperbola, vel ellipsis, vel circuli circumferentia ΑΒ, cujus diameter ΒΖΓ, & secunda diameter ΔΖΕ; ducaturque recta sectionem contingens ΘΑΑ, & ipsi ΓΒ parallela ducatur ΑΗ: dico ΑΗ ad alteram rectarum ΘΗ, ΗΖ rationem habere compositam ex ratione quam habet transversum figuræ latus ad rectum, & ex ea quam altera dictarum rectarum ΖΗ, ΘΗ habet ad ipsam ΗΑ.

Sit enim rectangulum ΘΗΖ rectangulo quod fit sub ΗΑ & Κ æquale. itaque quoniam [per 38. huj.] ut rectum latus ad transversum ita rectangulum ΘΗΖ ad quadratum ex ΗΑ; rectangulo autem ΘΗΖ æquale est [ex hyp.] id quod fit sub ΗΑ & Κ: erit rectangulum sub ΗΑ & Κ ad quadratum ex ΗΑ, hoc est [per 1. 6.] Κ ad ΑΗ, ut latus rectum ad transversum: & quoniam ΑΗ ad ΗΖ compositam habet rationem ex ratione quam habet ΑΗ ad Κ & ex ea quam Κ habet ad ΗΖ; estque ut ΗΑ ad Κ ita transversum latus ad rectum; & [per 16. 6.] ut Κ ad ΗΖ ita

S

ΘΗ

ΘH ad HA , propterea quod rectangulum ΘHZ æquale est rectangulo sub AH & K : constat ergo AH ad HZ compositam habere rationem ex ratione diametri transversæ ad latus rectum & ex ea quam ΘH habet ad HA .

PROP. XLI. Theor.

Si in hyperbola, vel ellipsi, vel circuli circumferentia recta linea ordinatim applicetur ad diametrum; & ab applicata, & ab ea quæ ex centro, parallelogramma æquiangula describantur; habeat autem applicata ad reliquum parallelogrammi latus rationem compositam ex ratione quam habet ea quæ ex centro ad reliquum latus, & ex ratione quam rectum figuræ latus habet ad transversum: parallelogrammum factum à recta, quæ inter centrum & applicatam interjicitur, simile parallelogrammo quod fit ab ea quæ ex centro, in hyperbola quidem excedit parallelogrammum ab applicata parallelogrammo quod fit ab ea quæ ex centro; in ellipsi vero & circuli circumferentia, una cum parallelogrammo quod fit ab applicata æquale est parallelogrammo facto ab ea quæ ex centro,

SIT hyperbola, vel ellipsis, vel circuli circumferentia, cujus diameter AB , centrum E ; & ordinatim applicetur $\Gamma \Delta$; à lineis autem EA , $\Gamma \Delta$ æquiangula parallelogramma describantur, quæ sint AZ , ΔH ; & habeat $\Gamma \Delta$ ad ΓH rationem compositam ex ratione quam habet AE ad EZ & ex ea quam rectum figuræ latus habet ad transversum: dico in hyperbola parallelogrammum quod fit ex $E \Delta$, simile ipsi AZ , parallelogrammis AZ , $H \Delta$ æquale esse: in ellipsi vero & circuli circumferentia, parallelogrammum quod fit ex ΔE , simile AZ , una cum parallelogrammo $H \Delta$ ipsi AZ esse æquale.

Fiat enim ut rectum figuræ latus ad transversum ita $\Delta \Gamma$ ad $\Gamma \Theta$. & quoniam [ex hyp.] ut $\Delta \Gamma$ ad $\Gamma \Theta$ ita rectum latus ad transversum; ut autem $\Delta \Gamma$ ad $\Gamma \Theta$ ita [per 1. 6.] quadratum ex $\Delta \Gamma$ ad rectangulum $\Delta \Gamma \Theta$; & [per 21. huj.] ut rectum latus ad transversum ita quadratum ex $\Delta \Gamma$ ad rectangulum $B \Delta A$: erit [per 9. 5.] rectangulum $B \Delta A$ rectangulo $\Delta \Gamma \Theta$ æquale. rursus quoniam $\Delta \Gamma$ ad ΓH rationem habet compositam ex ratione quam habet AE ad EZ & ex ea quam rectum latus ad transversum, hoc est quam $\Delta \Gamma$ habet ad $\Gamma \Theta$. sed & $\Delta \Gamma$ ad ΓH compositam rationem habet ex ratione $\Delta \Gamma$ ad $\Gamma \Theta$ & ex ratione $\Theta \Gamma$ ad ΓH : erit igitur ratio composita ex ratione AE ad EZ & ex ratione $\Delta \Gamma$ ad $\Gamma \Theta$ eadem quæ componitur ex ratione $\Delta \Gamma$ ad $\Gamma \Theta$ & ex ratione $\Theta \Gamma$ ad ΓH . communis auferatur, ratio scilicet $\Delta \Gamma$ ad $\Gamma \Theta$: reliqua igitur ratio AE ad EZ ea-

ύτως ή ΘH προς HA , διότι τὸ ἴσον ὄναι τὸ ὑπὸ ΘHZ τῷ ὑπὸ AH, K . ή AH ἄρα προς HZ τὴν συγκείμενον ἔχει λόγον, ἔκτε τῶν ὅν ἔχει ή πλαγία προς τὴν ὀρθίαν καὶ ὅτι ὅν ἔχει ή $H \Theta$ προς HA .

ΠΡΟΤΑΣΙΣ μα'.


Εάν ἐν ὑπερβολῇ, ἢ ἐλλείψει, ἢ κύκλῳ περιφέρῃ αὐτῶα καταχθῇ τεταγμένης ὅτι τ' ἀξίμετροι, καὶ δὸτ' ἡ τεταγμένη καὶ τ' ἐκ τ' κέντρου ἀναγραφῇ εἰς ὁμοιολόγραμμο ἰσωνίαν, ἔχει δὲ ἡ καταγεμένη πλευρὰ πρὸς τὴν λοιπὴν τ' εἰς πλευρῶν τ' συγκείμενον λόγον, ἔκτε τῶν ὅν ἔχει ή ἐκ τοῦ κέντρου πρὸς λοιπὴν τοῦ εἰς πλευρῶν, καὶ ἐκ τοῦ ὅν ἔχει ή τοῦ εἰς πλευρῶν τῆς τοῦ κέντρου ὀρθίας πλευρῶν πρὸς τὴν πλαγίαν. τὸ δὸτ' τῆς μετὰ τοῦ κέντρου καὶ τῆς καταγεμένης εἰδος, τὸ ὅμοιον τῶν εἰς τοῦ κέντρου εἶδει, ὅτι καὶ τῆς ὑπερβολῆς, καὶ ὅτι τῶν δὸτ' τῆς καταγεμένης εἰδος τῶν δὸτ' τῆς ἐκ τοῦ κέντρου εἶδος ὅτι δὲ τῆς ἐλλείψεως καὶ τῆς τοῦ κύκλου περιφέρειας, μετὰ τοῦ δὸτ' τῆς καταγεμένης εἰδος, ἴσιν ὅτι τῶν δὸτ' τῆς ὅτι τ' κέντρου εἶδει.

ΕΣΤΩ ὑπερβολή, ἢ ἐλλείψις, ἢ κύκλος περιφέρεια, ἥς ἀξίμετρος ή AB , κέντρον δὲ τὸ E , καὶ τεταγμένης καταχθῇ ή $\Gamma \Delta$, καὶ δὸτ' ἡ EA , $\Gamma \Delta$ ἰσωνία εἰς ὁμοιογράμμο πρὸς AZ , ΔH , καὶ ή $\Gamma \Delta$ πρὸς τὴν ΓH τ' συγκείμενον ἔχτω λόγον, ἔκτε τῶν ὅν ἔχει ή AE πρὸς EZ καὶ ὅτι ὅν ἔχει ή ὀρθία πρὸς τὴν πλαγίαν. λέγω ὅτι, ὅτι καὶ τ' ὑπερβολῆς, τὸ δὸτ' ἡ $E \Delta$ εἶδος, τὸ ὅμοιον τῶν AZ , ἴσιν ἐστὶ πρὸς $AZ, H \Delta$. ὅτι τ' ἐλλείψεως καὶ τ' κύκλου, τὸ δὸτ' ἡ $E \Delta$, ὅμοιον τῶν AZ , μετὰ τῶν $H \Delta$ ἴσιν ἐστὶ τῶν AZ .

Πεπιησθῶ γάρ ὡς ή ὀρθία πρὸς τὴν πλαγίαν ὥτως ή $\Delta \Gamma$ πρὸς $\Gamma \Theta$. καὶ ἐπει ὅτι ὡς ή $\Delta \Gamma$ πρὸς $\Gamma \Theta$ ὥτως ή ὀρθία πρὸς τ' πλαγίαν, ἀλλ' ὡς ή $\Delta \Gamma$ πρὸς $\Gamma \Theta$ ὥτως τὸ δὸτ' ἡ $\Delta \Gamma$ πρὸς τὸ ὑπὸ τ' $\Delta \Gamma \Theta$, ὡς τ' ή ὀρθία πρὸς τ' πλαγίαν ὥτως τὸ δὸτ' ἡ $\Delta \Gamma$ πρὸς τὸ ὑπὸ $B \Delta A$. ἴσιν ἄρα τὸ ὑπὸ $B \Delta A$ τῷ ὑπὸ $\Delta \Gamma \Theta$. καὶ ἐπει ή $\Delta \Gamma$ πρὸς ΓH τ' συγκείμενον ἔχει λόγον, ἔκτε τῶν ὅν ἔχει ή AE πρὸς EZ καὶ τῶν ὅν ἔχει ή ὀρθία πρὸς τὴν πλαγίαν, τέστιν ή $\Delta \Gamma$ πρὸς $\Gamma \Theta$. ἐπὶ τ' ή $\Delta \Gamma$ πρὸς ΓH τ' συγκείμενον ἔχει λόγον, ἔκτε τῶν ὅν ἔχει ή $\Delta \Gamma$ πρὸς $\Gamma \Theta$ καὶ ὅτι ὅν ἔχει ή $\Theta \Gamma$ πρὸς ΓH . ὁ ἄρα συγκείμενος λόγος, ἔκτε τῶν ὅν ἔχει ή AE πρὸς EZ καὶ ἔκτε τῶν ὅν ἔχει ή $\Delta \Gamma$ πρὸς $\Gamma \Theta$, ὁ αὐτὸς ἐστὶ τῶν συγκειμένων λόγος, ἔκτε τῶν ὅν ἔχει ή $\Delta \Gamma$ πρὸς $\Gamma \Theta$ καὶ ἔκτε τῶν ὅν ἔχει ή $\Theta \Gamma$ πρὸς ΓH . κοινὸς ἀφαιρεθῶ ὁ τ' $\Gamma \Delta$ πρὸς $\Gamma \Theta$. λοιπὸς ἄρα ὁ τ' AE πρὸς

πρὸς ΕΖ λόγος λαμβάνει τὸ ΘΓ πρὸς ΓΗ λόγος
ἐστὶν ὁ αὐτός. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΘΓ πρὸς ΓΗ ἔστω τὸ
ὑπὸ ΘΓΔ πρὸς τὸ ὑπὸ ΗΓΔ, ὡς δὲ ἡ ΑΕ
πρὸς ΕΖ ἔστω τὸ δὴ ΑΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΕΖ.
ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ ΘΓΔ πρὸς τὸ ὑπὸ ΗΓΔ ἔ-
στω τὸ δὴ ΕΑ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΕΖ. τὸ δὲ ὑπὸ
ΘΓΔ ἴσον ἐδείχθη τῷ ὑπὸ ΒΔΑ. ὡς ἄρα τὸ
ὑπὸ ΒΔΑ πρὸς τὸ ὑπὸ ΗΓΔ ἔστω τὸ δὴ ΑΕ
πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΕΖ, καὶ ἐκβαλλόμενος ὡς τὸ ὑπὸ ΒΔΑ
πρὸς τὸ δὴ ΑΕ ἔστω τὸ ὑπὸ ΗΓΔ πρὸς
τὸ ὑπὸ ΑΕΖ. ὡς δὲ τὸ ὑπὸ ΗΓΔ πρὸς τὸ
ὑπὸ ΑΕΖ ἔστω τὸ ΔΗ πρὸς τὸ ΖΑ, ἰσογώνια γάρ ἐστι καὶ λόγον ἔχει τὸν σπινδι-
λόνον ἐκ τῶν πλάγιων, τὸ ΗΓ πρὸς ΑΒ καὶ τὸ
ΓΔ πρὸς ΕΖ. καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ ΒΔΑ πρὸς

dem est quæ reliqua ΘΓ ad ΓΗ. ut autem
ΘΓ ad ΓΗ ita [per 1. 6.] rectangulum ΘΓΔ
ad rectangulum ΗΓΔ; & ut ΑΒ ad ΕΖ ita
quadratum ex ΑΒ ad rectangulum ΑΕΖ: er-
go [per 11. 5.] ut rectangulum ΘΓΔ ad rectan-
gulum ΗΓΔ ita quadratum ex ΑΒ ad rectan-
gulum ΑΕΖ. sed ostensum est rectangulum
ΘΓΔ æquale esse rectangulo ΒΔΑ: ut igitur
rectangulum ΒΔΑ ad rectangulum ΗΓΔ ita qua-
dratum ex ΑΒ ad rectangulum ΑΕΖ; permutan-
doque [per 16. 5.] ut rectangulum ΒΔΑ ad qua-
dratum ex ΑΒ ita rectangulum ΗΓΔ ad ipsum
ΑΕΖ. sed ut rectangulum ΗΓΔ ad ΑΕΖ rectan-
gulum ita parallelogrammum ΔΗ ad parallelo-
grammum ΖΑ; parallelogramma enim [ex hyp.]
æquiangula sunt, & [per 22. 6.] rationem habent
compositam ex ratione laterum ΗΓ ad ΑΒ & ΓΔ
ad ΕΖ: quare ut rectangulum ΒΔΑ ad quadra-



τὸ δὴ ΕΑ ἔστω τὸ ΗΔ πρὸς ΑΖ. λεγέτω γάρ
τις ὅτι μὴ τὸ ὑπερβολῆς. ὡς τὸ ὑπὸ ΒΔΑ
μετὰ τῷ δὴ ΑΕ πρὸς τὸ δὴ ΑΕ, τέτληται τὸ
δὴ ΔΕ πρὸς τὸ δὴ ΕΑ, ἔστω γὰρ ΗΔ, ΑΖ
πρὸς τὸ ΑΖ. ὡς δὲ τὸ δὴ ΕΔ πρὸς τὸ δὴ
ΕΑ οὕτως τὸ δὴ ΕΔ πρὸς τὸ δὴ ΕΑ ὁμοίον καὶ
ὁμοίως ἀνασχηματισμένον τῷ ΑΖ πρὸς τὸ ΑΖ.
ὡς ἄρα τὰ ΗΔ, ΑΖ πρὸς τὸ ΑΖ ἔστω τὸ
δὴ ΕΔ πρὸς τὸ δὴ ΕΑ ὁμοίον τῷ ΑΖ πρὸς τὸ ΑΖ. τὸ
δὴ ΕΔ ἄρα εἶδος τὸ ὁμοίον τῷ ΑΖ ἴσον ἐστὶ
ταῖς ΗΔ, ΑΖ.

Επὶ δὲ τῆς ἐλλείψεως καὶ τῆς τῆς κύκλου
περιφέρειας ἐρεῖται. ἐπεὶ γὰρ ἐστὶν ὡς ὅλον τὸ δὴ
ΑΕ πρὸς ὅλον τὸ ΑΖ ἔστω ἀφαιρεθὲν τὸ ὑπὸ
ΑΔΒ πρὸς ἀφαιρεθὲν τὸ ΔΗ, καὶ λοιπὸν ἐστὶ πρὸς
λοιπὸν ὡς ὅλον πρὸς ὅλον. δὴ δὲ τῷ δὴ ΕΑ
ἐὰν ἀφαιρεθῇ τὸ ὑπὸ ΒΔΑ, λοιπὸν ἐστὶ τὸ δὴ

tum ex ΑΕ ita parallelogrammum ΗΔ ad ipsum
ΑΖ. itaque dicendum in hyperbola: ut rectan-
gulum ΒΔΑ una cum quadrato ex ΑΒ ad quadra-
tum ex ΑΕ, hoc est [per 6. 2.] quadratum ex ΔΕ
ad quadratum ex ΕΑ, sic parallelogramma ΗΔ,
ΑΖ ad parallelogrammum ΑΖ. sed [per 20. 6.]
ut quadratum ex ΕΔ ad quadratum ex ΕΑ sic
parallelogrammum quod fit ex ΕΔ, simile & si-
militer descriptum ipsi ΑΖ, ad parallelogrammum
ΑΖ: ut igitur parallelogramma ΔΗ, ΑΖ ad pa-
rallelogrammum ΑΖ, sic parallelogrammum ΔΕ
descriptum & simile ipsi ΑΖ ad ΑΖ: ergo paral-
lelogrammum ΔΕ factum & simile ipsi ΑΖ æ-
quale est parallelogrammis ΗΔ, ΑΖ.


In ellipsi vero & circuli circumferentia dice-
mus. quoniam ut totum, quadratum scilicet ex
ΑΕ, ad totum parallelogrammum ΑΖ, sic abla-
tum rectangulum ΑΔΒ ad ablatum parallelo-
grammum ΔΗ: erit [per 19. 5.] reliquum ad re-
liquum sicut totum ad totum. quod si à quadrato
ex ΕΑ auferatur rectangulum ΒΔΑ, relinquetur
[per

[per 5. 2.] quadratum ex ΔE : ut igitur quadratum ex ΔE ad excessum quo parallelogrammum AZ excedit parallelogrammum ΔH , sic quadratum ex $A E$ ad parallelogrammum AZ . sed [per 23. 6.] ut quadratum ex $A E$ ad parallelogrammum AZ sic quadratum ex ΔE ad parallelogrammum quod fit à ΔE simile ipsi AZ : ergo ut quadratum ex ΔE ad excessum quo parallelogrammum AZ excedit ipsum ΔH , sic quadratum ex ΔE ad parallelogrammum ΔE simile ipsi AZ : parallelogrammum igitur ex ΔE simile AZ æquale est excessui quo parallelogrammum AZ excedit ΔH : quare [per 9. 5.] sequitur parallelogrammum à ΔE , simile ipsi AZ , una cum parallelogrammo ΔH ipsi AZ æquale esse.

ΔE · ὡς ἄρα τὸ δὲ ΔE πρὸς τὴν ὑπεροχὴν ἢ ὑπερέχει τὸ AZ τῷ ΔH , ὥτως τὸ δὲ ΔE πρὸς τὸ AZ . ἀλλ' ὡς τὸ δὲ ΔE πρὸς τὸ AZ ὥτως τὸ δὲ ΔE πρὸς τὸ δὲ ΔE εἶδος ὁμοιον τῷ AZ · ὡς ἄρα τὸ δὲ ΔE πρὸς τὴν ὑπεροχὴν ἢ ὑπερέχει τὸ AZ τῷ ΔH , ὥτως τὸ δὲ ΔE πρὸς τὸ δὲ ΔE εἶδος τὸ ὁμοιον τῷ AZ · ἴσιν ἄρα τὸ δὲ τῆς ΔE εἶδος ὁμοιον τῷ AZ τῇ ὑπεροχῇ ἢ ὑπερέχει τὸ AZ τῷ ΔH · τὸ ἄρα ἀπὸ ΔE εἶδος τὸ ὁμοιον τῷ AZ μετὰ τῷ ΔH ἴσιν ἐστὶ τῷ AZ .

EUTOCIUS.

Theorema hoc in hyperbola casum non habet; in ellipsi vero, si applicata in centrum cadat & reliqua eodem modo disponantur, parallelogrammum quod fit ab applicata parallelogrammo quod fit ab ea quæ ex centro æquale erit. fit enim ellipsis cujus diameter AB , centrum Δ , ordinatimque applicetur $\Gamma\Delta$, & ab ipsis $\Gamma\Delta$, ΔA parallelogramma æquiangula describantur ΔH , AZ ; habeat autem $\Delta\Gamma$ ad ΓH rationem compositam ex ratione quam habet $A\Delta$ ad AZ & ex ea quam rectum figuræ latus habet ad transversum: dico parallelogrammum AZ æquale esse parallelogrammo ΔH . quoniam enim in superioribus ostensum est, ut quadratum ex $A\Delta$ ad parallelogrammum AZ ita esse rectangulum $A\Delta B$ ad parallelogrammum ΔH : erit permutando, ut quadratum ex $A\Delta$ ad rectangulum $A\Delta B$ ita parallelogrammum AZ ad parallelogrammum ΔH . sed quadratum ex $A\Delta$ æquale est rectangulo $A\Delta B$: ergo parallelogrammum AZ parallelogrammo ΔH æquale erit.



Τὸ θεωρήμα τῆτο ἐστὶ τὸ ὑπερβολῆς πῶπιν ἐκ ἔχει. ἐστὶ ἢ τὸ ἐλλείψιδος, ἐὰν ἡ καταγομένη ἐστὶ τὸ κέντρον πῶπιν, καὶ δι' αὐτὴν γίνεσθαι τὰ αὐτὰ, τὸ δὲ τῆς καταγομένης εἶδος ἴσιν ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ἐκ τῷ κέντρῳ εἶδος. ἔστω γὰρ ἐλλείψιδος, ὅς ἀξίμετρος ἡ AB , κέντρον δὲ τὸ Δ , καὶ καταχθῶν τιταγομένης ἡ $\Gamma\Delta$, καὶ ἀνταγοχθῶν ἀπὸ τῆς $\Gamma\Delta$ καὶ τῆς $A\Delta$ εἶδος ἰσωνόμια, καὶ ΔH , AZ , ἐχέτω δὲ ἡ $\Delta\Gamma$ πρὸς ΓH τὴν συγκείμενον λόγον, ἐκ τῆς ὅν ἐχέτω ἡ $A\Delta$ πρὸς AZ καὶ τῆς ὅν ἐχέτω ἡ ὁρθία πρὸς τὴν πλαγίαν· λέγω ὅτι τὸ AZ ἴσιν ἐστὶ τῷ ΔH . ἐπεὶ γὰρ ἐν τῇ ἐντὶ δεικνύται, ὡς τὸ ἀπὸ $A\Delta$ πρὸς τὸ AZ ὅπως τὸ ἀπὸ $A\Delta B$ πρὸς τὸ ΔH · φημι ὅτι καὶ ἐν ἀλλὰς ὡς τὸ ἀπὸ $A\Delta$ πρὸς τὸ ἀπὸ $A\Delta B$ ὅπως τὸ AZ πρὸς τὸ ΔH . ἴσιν ἄρα καὶ τὸ AZ τῷ ΔH .

PROP. XLII. Theor.

Si recta parabolam contingens cum diametro conveniat, & à tactu ad diametrum recta ordinatim applicetur; sumpto autem quovis puncto in sectione, applicentur ad diametrum duæ rectæ, altera quidem contingenti parallela, altera vero parallela ei quæ à tactu ordinatim applicata est: triangulum quod ab ipsis constituitur æquale erit parallelogrammo contento ab ordinatim à tactu applicata, & ea quæ interjicitur inter parallelam & verticem sectionis.

SIT parabola, cujus diameter AB , ducaturque linea $A\Gamma$ sectionem contingens, & $\Gamma\Theta$ ordinatim applicetur; à quovis autem puncto Δ applicetur ΔZ , & per Δ quidem ducatur ΔB ipsi $A\Gamma$ parallela, per Γ vero ΓH parallela ipsi BZ ; denique per B ducatur BH ipsi $\Theta\Gamma$ parallela: dico triangulum ΔEZ æquale esse parallelogrammo ZH .

ΠΡΟΤΑΣΙΣ μβ.



Εὰν ὁρθολογῆς εὐθεῖα ἐπιφανέσθαι συμπίπτῃ τῇ ἀξίμετρῳ, καὶ ἀπὸ τῆς ἀφῆς ἀρχῇ εὐθεῖα ἐκτὶ τῆς ἀξίμετρος τιταγομένης, ληφόντος δὲ πρὸς ἐκτὶ τῆς τομῆς σημείου καταχθῶσιν ἐκτὶ τῆς διαμέτρος δύο εὐθεῖαι, καὶ ἡ μὲν αὐτῶν ὁρθὴ καὶ ἐφαπτομένη, ἡ δὲ ὁρθὴ καὶ ἀπὸ τῆς ἀφῆς καταγομένη· τὸ γινόμενον ὑπὸ αὐτῶν τετραγώνον ἴσιν ἐστὶ τῷ περιγεγραμμῷ ὁρθογώνιῳ ὁρθογώνιῳ ὑπὸ τῆς ἀφῆς καταγομένης, καὶ τῆς ἀπὸ τῆς ἀφῆς καταγομένης ὑπὸ τῆς ὁρθολογῆς πρὸς τῇ κορυφῇ τῆς τομῆς.

ΕΣΤΩ ὁρθολογῆς ἀξίμετρος ἡ AB , καὶ ἡχθῶ ἐφαπτομένη τῆς τομῆς ἡ $A\Gamma$, καὶ τιταγομένης κατὰ τὴν $\Gamma\Theta$, καὶ ἀπὸ πινος σημείου τυχόντος κατὰ τὴν ΔZ , καὶ ἀξίμετρος $\Delta\Gamma$ τῇ $A\Gamma$ ὁρθολογῇ ἡχθῶ ἡ ΔB , διὰ δὲ καὶ τῆς ΓH τῇ BZ ἡ ΓH , καὶ διὰ τῆς $\Theta\Gamma$ ἡ BH . λέγω ὅτι τὸ ΔEZ τρίγωνον ἴσιν ἐστὶ τῷ ZH ὁρθογώνιῳ ὁρθογώνιῳ.

Επει

Επειδὴ γὰρ τὸ τομῆς ἐφάπτη) ἡ ΑΓ, καὶ περιγεμνῶς
κατασκευῇ ἡ ΓΘ, ἴση ἐστὶν ἡ ΑΒ τῇ ΒΘ· διπλασία
ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΘ τῆς ΘΒ· τὸ ΑΘΓ ἄρα τρίγωνον
τῷ ΒΓ ὡς ἀλληλόγραμμον ἐστὶν ἴσον. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν
ὡς τὸ ΔΟΓΘ πρὸς τὸ ΔΟΔΖ ὅτως ἡ ΘΒ πρὸς
ΒΖ, ἀλλὰ τὴν περὶ τὸν ἀκτὸν τὸ ΔΟΓΘ πρὸς
τὸ ΔΟΔΖ ὅτως τὸ ΑΓΘ τρίγωνον πρὸς τὸ ΕΔΖ

Quoniam enim ΑΓ sectionem contingit, &
ordinatim applicata est ΓΘ, erit [per 35. huj.] ΑΒ
æqualis ipsi ΒΘ, & ΑΘ dupla ipsius ΘΒ; trian-
gulum igitur ΑΘΓ [per 41. 1.] parallelogram-
mo ΒΓ est æquale. & quoniam [per 20. huj.] ut
quadratum ex ΓΘ ad quadratum ex ΔΖ ita linea
ΘΒ ad ipsam ΒΖ, propter sectionem; ut autem
quadratum ex ΓΘ ad quadratum ex ΔΖ ita [per



τρίγωνον, ὡς ἡ ΘΒ πρὸς ΒΖ ὅτως τὸ ΗΘ πα-
ραλληλόγραμμον πρὸς τὸ ΗΖ ὡς ἀλληλόγραμ-
μον· ἐστὶν ἄρα ὡς τὸ ΑΓΘ τρίγωνον πρὸς τὸ
ΕΔΖ τρίγωνον ὅτως τὸ ΗΘ παραλληλόγραμμον
πρὸς τὸ ΗΖ ὡς ἀλληλόγραμμον· ἐναλλάξ ἄρα
ἐστὶν ὡς τὸ ΑΓΘ τρίγωνον πρὸς τὸ ΗΘ ὡς ἀλλη-
λόγραμμον ὅτως τὸ ΕΔΖ τρίγωνον πρὸς τὸ ΗΖ
ὡς ἀλληλόγραμμον. ἴσον δὲ τὸ ΑΓΘ τρίγωνον
τῷ ΗΘ ὡς ἀλληλόγραμμον· ἴσον ἄρα ἐστὶν τὸ ΕΔΖ
τρίγωνον τῷ ΗΖ ὡς ἀλληλόγραμμον.

4. & 20. 6.] triangulum ΑΓΘ ad triangulum
ΕΔΖ; & [per 1. 6.] ut ΘΒ ad ΒΖ ita paral-
lelogrammum ΗΘ ad parallelogrammum ΗΖ:
erit [per 11. 5.] ut triangulum ΑΓΘ ad triangu-
lum ΕΔΖ ita ΘΗ parallelogrammum ad paral-
lelogrammum ΗΖ; & permutando, ut ΑΓΘ
triangulum ad parallelogrammum ΗΘ ita trian-
gulum ΕΔΖ ad parallelogrammum ΗΖ. sed tri-
angulum ΑΓΘ æquale est parallelogrammo ΗΘ:
ergo triangulum ΕΔΖ parallelogrammo ΗΖ æ-
quale erit.

EUTOCIUS.

Τὸ θεωρήμα τὸ τοῦτο ἔχει πέντε ἐνδεκά, μίαν μὲν ἐὰν ἐσω-
τέρως λαμβάνῃ) τὸ Δ Γ Γ· ὅταν γὰρ ὅτι καὶ παράλληλοι ἐσω-
τέρως πρὸς τὴν ΑΓ, ΓΘ. ἑτέρως δὲ πέντε ὅταν, ἐὰν τὸ Δ
ἐξωτερικῶς λαμβάνῃ) τὸ Γ, ἢ μὲν ΔΖ παράλληλος διηλόνῃ) ἐξω-
τέρως πρὸς τὸ Γ, ἢ δὲ ΔΕ ἢ μεταξὺ τῶν Α, Β, ἢ ὅτι τὸ
Β, ἢ μεταξὺ τῶν Β, Θ, ἢ ὅτι τὸ Θ, ἢ ἐξωτερικῶς τῶν Α, Β, ἢ ὅτι τὸ
Α, ἢ ἐξωτερικῶς αὐτῶν ἀδύνατον, ἐπειδὴ τὸ Δ ἐξωτερικῶς ὅτι τὸ
Γ, καὶ ὅταν ὅτι καὶ δὲ αὐτὸ παράλληλος ἀγορεύῃ) τῇ ΑΓ
ἐσωτέρως τῇ Α πρὸς τὴν Α. ἐὰν δὲ τὸ Δ ὅτι τὰ ἑτέρα μέρη
παράλληλα τῇ τομῇ, ἢ ἀμφοτέρωθεν αὐτὰ παράλληλοι μεταξὺ τῶν
Β, Θ περιεμπίπτουν, ἢ μὲν ΔΖ ἐσωτέρως τῇ ΑΓ, τὸ δὲ Ε
ὅτι τὸ Θ· ἢ δὲ ΔΖ ὡσαύτως μεταξὺ, τὸ Ε ἐξωτερικῶς τῇ
ἐλευσίν). τὸ δὲ Ε πάλιν ἐξωτερικῶς πρὸς τὸν Α, τὸ Ζ δὲ ὅτι τὸ Θ
πρὸς τὴν Α, ὡς ἐστὶν) τὸ Γ Θ Δ μίαν εὐθεΐαν, (εἰ καὶ μὴ ὡς εἶται
κυρίως τότε τὸ τὸ ὡς ἀλλήλους ἰδίωμα) ἢ ἐξωτερικῶς τῇ Θ. δὲ
δὲ, ὅτι τὸ ἀποδείξαι τὴν τελευταίαν πέντε πρὸς τὸν Α, τὸ Δ Ζ
ἐκείνην ὡς τὴν τομῇ καὶ τῇ Η Γ παράλληλον, καὶ ὅταν ποι-
ῶν) τὸ ἀποδείξαι. ὁμοίαν δὲ καὶ ἄλλαν μίαν κατασκευὴν
ἐπινοῶν) ἐκ τούτων, ὅταν ἀφ' ἀμφοτέρωθεν ἑτέρω σημείω
αὐτὴ ἐξ ἀρχῆς εὐθεΐαν ποιῶν) τὸ λεγόμενον. ἀλλὰ τὸ τοῦτο θεωρή-
μα ὅταν, ἢ πρὸς.

Hoc theorema undecim habet casus, unum quidem
si Δ intra Γ sumatur; constat enim rectas paral-
las cadere intra ipsas ΑΓ, ΓΘ. alios autem quinque
casus habet si Δ sumatur extra Γ: nam recta paral-
lela ΔΖ cadet extra ΘΓ, & ΔΕ vel inter Α & Β ca-
det, vel in ipso Β, vel inter Β & Θ, vel in Θ, vel
extra Θ; ut enim extra Α cadat fieri non potest, quo-
niam cum Δ sit extra Γ, & quæ per ipsum rectæ
ΑΓ parallela ducitur, intra Α cadet. quod si Δ suma-
tur ex altera parte sectionis; vel utraq; parallelæ
inter Β & Θ cadent, vel ΔΖ quidem cadet intra ΘΓ,
punctum vero Ε in Θ; vel, ΔΖ hunc situm retinente,
punctum Ε cadet extra Θ. puncto vero Ε cadente ex-
tra Θ, punctum Ζ vel in Θ cadet, ita ut ΓΘΔ sit
recta linea (quanquam tunc non exacte parallelarum
proprietas servetur) vel extra Θ cadet. oportet au-
tem in demonstratione quinque casuum postremo-
rum rectam ΔΖ usque ad sectionem & ad ipsam pa-
rallelam ΗΓ producere, atque sic demonstrationem ab-
solvere. sed ex his aliam quandam descriptionem
mente concipere possumus; cum nempe per sumptum
aliud punctum, quæ in principio supponebantur
rectæ efficiant rem propositam. sed hoc theorema
est, non casus.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ μγ'.

Εὰν ὑπερβολῇ, ἢ ἐλλείψει, ἢ κύκλῳ περιφύειται
εὐθεΐα ὁριζώσασα συμπίπτῃ τῇ ἀξονί, τῇ

PROP. XLIII. Theor.


Si hyperbolam, vel ellipsum, vel circuli
circumferentiam recta linea contin-
gens

gens conveniat cum diametro; & à tactu ad diametrum recta ordinatim applicetur; huic vero parallela ducatur per verticem sectionis, quæ cum recta per tactum & centrum ducta conveniat; & sumpto aliquo puncto in sectione, ab eo ad diametrum duæ rectæ ducantur, una quidem contingenti parallela, altera vero parallela ei quæ à tactu applicata est: triangulum ab ipsis factum in hyperbola minus erit quam triangulum, quod abscindit linea per centrum & tactum ducta, triangulo facto ab ea quæ ex centro similique abscisso; in ellipsi vero & circuli circumferentia, una cum triangulo abscisso ad centrum æquale erit triangulo quod ab ea quæ ex centro describitur, similique abscisso.

SIT hyperbola, vel ellipsis, vel circuli circumferentia, cujus diameter AB , centrumque Γ ; ducaturque recta ΔE sectionem contingens; & juncta ΓE , ordinatim applicetur EZ ; sumatur autem aliquod punctum in sectione, quod sit H ; & ducatur recta $H\Theta$ contingenti parallela, & HKM ordinatim applicetur; per B vero ordinatim applicetur recta BA : dico triangulum KMG differre à triangulo ΓAB triangulo HKE .

ἐν ᾧ τὸ ἴδιον κατὰ χεῖρας εὐθεία καταγόμενος
 ἔστι τὸ ἀλάττωτον, ἐν αὐτῇ ἀλάττωτον κορυφῆς
 ἀντιπαραπάλιν συμπέπληστα τῇ ἀλάττωτον
 ἀφ᾽ ἧς ἐν ἑκέντρῳ ἡμῶν εὐθεία, ληφθεὶς
 δὲ πῶς σημειῖται ἔστι τὸ τομῆς, ἀχρῶς δύο εὐ-
 θείαι ἔστι πῶς ἀλάττωτον, οἱ ἡ μὲν ἀλάττωτον
 ἐκκαταγόμενοι, ἡ δὲ ἀλάττωτον ἔστι τὸ ἀφ᾽ ἧς κατὰ
 γόμενοι τὸ γόμενοι ὑπὸ αὐτῶν τεταμένοι, ἔστι
 μὲν τὸ ὑπερβαλῆς, τεταμένους, ὃ ἀποτίμει ἡ διὰ
 ἑκέντρου ἐν ἑκέντρῳ, ἔλασται ἔσται πρὸς τὸ
 ἐν ἑκέντρῳ τεταμένους πρὸς ὁμοίῳ πρὸς ἀποτε-
 μοιῶν ἔστι δὲ τὸ ἐλλείψας ἐν ἑκέντρῳ
 περὶ αὐτοῦ, μὲν ἑκέντροι ἀποτεμοιῶν πρὸς τὸ κέν-
 τρον τεταμένους ἴσοι ἔσται πρὸς τὸ ἐν ἑκέντρῳ
 τεταμένους ὁμοίῳ πρὸς ἀποτεμοιῶν.

ΕΣΤΩ ὑπερβολή, ἡ ἄλλειψις, ἡ κύκλος περιφέρουσα, ἥς διείματτος ἡ ΑΒ, κέντρον δὲ τὸ Γ, καὶ ἤχθω ἐφαπτομένη τῇ τομῇ ἡ ΔΕ, ἔπιζεύχθω ἡ ΓΕ, καὶ πεπαγμένης κατήχθω ἡ ΕΖ, καὶ αὐτὴ φθῶσι σημείον ὅτι τῆς τομῆς τὸ Η, καὶ τῇ ἐφαπτομένη ὠδύλληλος ἤχθω ἡ ΗΘ, ἔπεπαγμένης κατήχθω ἡ ΗΚΜ, διὰ δὲ τῇ Β πεπαγμένης ἀνέχθω ἡ ΒΛ· λέγω ὅτι τὰ ΚΜΓ τεύχωνται ὧς ΓΑΒ τεργύνει διαφέρει τῶ ΗΚΘ τεργύνει.



Quoniam enim linea EA sectionem contingit, ordinatum vero applicata est EZ ; [per 39. huj.] habebit BZ ad ZA rationem compositam ex ratione ΓZ ad ZE , & ex ratione recti lateris ad transversum. sed [per 4. 6.] ut EZ ad ZA ita HK ad $K\Theta$; & ut ΓZ ad ZE ita ΓB ad BA : ergo HK ad $K\Theta$ rationem habebit compositam ex ratione ΓB ad BA , & ex ratione recti lateris ad transversum: quare, ex iis quæ in quadragesimo primo theoremate ostendimus, triangulum ΓKM à triangulo $B\Gamma A$ differt triangulo $H\Theta K$; etenim in parallelogrammis triangulorum istorum duplis hæc demonstrata sunt.

Επει γὰρ τὴ τιμῆς ἐφάπτη μὲν ἡ Ε Δ, καταπημμένη
 δὲ ἐπὶ ἡ Ε Ζ· ἡ Ε Ζ πρὸς Ζ Δ τὴ συγκείμενοι ἔχει
 λόγον, ὡς τῆς τὴ Γ Ζ πρὸς Ζ Ε καὶ τὴ ὀρθίας πρὸς
 τὴν πλαγίαν. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ Ε Ζ πρὸς Ζ Δ ἕτως ἡ
 Η Κ πρὸς Κ Θ, ὡς ἡ Γ Ζ πρὸς Ζ Ε ἕτως ἡ Γ Β
 πρὸς Β Α· ἔχει ἄρα ἡ Η Κ πρὸς Κ Θ τὴ συγκείμε-
 νον λόγον, ὡς τῆς τὴ Γ Β πρὸς Β Α καὶ τὴ ὀρθίας
 πρὸς τὴν πλαγίαν· καὶ διὰ τὴν διδογμένην ἐν
 ποταρακτοῦ πρὸς τὴν θεωρήματι, τὸ Γ Κ Μ τρίγων-
 ον ὅτι Β Γ Α τρίγωνος διὰφέρει τῷ Η Θ Κ· καὶ γὰρ
 ὅτι τὴ διπλασίαν αὐτῶν ὡς ἀλληλοζήμενον τὴ
 αὐτὰ διδοκται.

ΕΠΙ

EU-

Εν περὶ ὁρίτων ἀποδείξεως ἡ συνήματος τέτυκται.

Ἐπεὶ γὰρ ἴσιν ἐπὶ τὸ ὑπὸ ΖΓΔ τῷ ὁμοῦ ΓΒ·
ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΖΓ πρὸς ΓΒ ἕτως ἡ ΓΒ πρὸς
ΓΔ· καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ΓΖ εἰς τὸ πρὸς τὸ
ἀπὸ τῆς ΓΒ εἰς τὸ ἕτως ἡ ΖΓ πρὸς τὴν ΓΔ.
ἀλλ' ὡς μὲν τὸ ἀπὸ ΖΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΒ ἕτως τὸ
ΕΓΖ τριγώνον πρὸς τὸ ΒΓΛ τριγώνον, ὡς δὲ ἡ
ΖΓ πρὸς ΓΔ ἕτως τὸ ΕΓΖ τριγώνον πρὸς τὸ
ΕΓΔ τριγώνον· ὡς ἄρα τὸ ΕΓΖ τριγώνον πρὸς
τὸ ΒΓΛ τριγώνον ἕτως τὸ ΕΓΖ πρὸς τὸ ΕΓΔ
τριγώνον· ἴσιν ἄρα τὸ ΕΓΔ τριγώνον τῷ ΒΓΛ·
ἔστιν ἄρα, ὅτι μὲν τὸ ὑπερβολῆς ἀναστέφαντι, ὅτι
δὲ τὸ ἐλλείψεως ἀνάπαιλιν καὶ διελόντι καὶ ἐπὶ ἀνάπαι-
λιν, ὡς τὸ ΕΓΖ τριγώνον πρὸς τὸ ΕΛΒΖ τετρα-
πλευρον ἕτως τὸ ΕΓΖ πρὸς τὸ ΕΔΖ τριγώνον·
ἴσιν ἄρα τὸ ΕΔΖ τριγώνον τῷ ΕΛΒΖ τετρα-
πλευρῳ· καὶ ἐπεὶ ἔστιν ὡς τὸ ἀπὸ ΓΖ πρὸς τὸ ἀπὸ
ΓΒ ἕτως τὸ ΕΓΖ τριγώνον πρὸς τὸ ΛΓΒ τριγώ-
νον, ὅτι μὲν τὸ ὑπερβολῆς διελόντι, ὅτι δὲ τὸ ἐλλεί-
ψεως ἀνάπαιλιν καὶ ἀναστέφαντι καὶ ἀνάπαιλιν, ἔστιν
ὡς τὸ ὑπὸ ΑΖΒ πρὸς τὸ ἀπὸ ΒΓ ἕτως τὸ ΕΛΒΖ
τετραπλευρον πρὸς τὸ ΒΛΓ τριγώνον· ὁμοίως
καὶ ὡς τὸ ἀπὸ ΓΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΚΒ ἕτως τὸ
ΛΓΒ τριγώνον πρὸς τὸ ΜΛΒΚ τετραπλευρον·
δι' ἴσιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ ΑΖΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΚΒ
ἕτως τὸ ΕΛΒΖ τετραπλευρον πρὸς τὸ ΜΒΚΛ.
ὡς δὲ τὸ ὑπὸ ΑΖΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΚΒ ἕτως τὸ
ὁμοῦ ΕΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΚ, ὡς δὲ τὸ ἀπὸ ΕΖ πρὸς
τὸ ἀπὸ ΗΚ ἕτως τὸ ΕΔΖ τριγώνον πρὸς τὸ
ΗΘΚ τριγώνον· καὶ ὡς ἄρα τὸ ΕΔΖ πρὸς τὸ
ΗΘΚ ἕτως τὸ ΕΛΒΖ τετραπλευρον πρὸς τὸ
ΜΛΒΚ, καὶ συναλλὰξ ὡς τὸ ΕΔΖ τριγώνον πρὸς
τὸ ΕΛΒΖ ἕτως τὸ ΗΘΚ πρὸς τὸ ΜΛΒΚ. ἴσιν
δὲ τὸ ΕΔΖ τῷ ΕΛΒΖ εἰσεχθῆναι ἴσιν ἄρα καὶ τὸ
ΗΘΚ τῷ ΜΛΒΚ τετραπλευρῳ· τὸ ἄρα ΚΜΓ
τριγώνον τῷ ΗΘΚ διαφέρει τῷ ΓΑΒ τριγώνῳ.

Ἐπεὶ οὖν δι' ἐν ταύτῃ τῇ δέξει, (ὁμοίως γὰρ ἀποφανταίται
ἐν ταῖς ἀναλογίαις καὶ ἐλλείψεως) ἵνα τὰ ἀπὸ τῆς συνήματος
ἔστιν ὁμοῦ ἀποφανταίται ἀποφανταίται. οἷον ἔστι· [Ἐπεὶ
ἔστιν ὡς τὸ ἀπὸ ΖΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΒ ἕτως τὸ ΕΓΖ
τριγώνον πρὸς τὸ ΛΓΒ ἀνάπαιλιν καὶ ἀναστέφαντι καὶ
ἀνάπαιλιν.] ἔστι γὰρ ἀνάπαιλιν ὡς τὸ ἀπὸ ΒΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΖ
ἕτως τὸ ΛΒΓ πρὸς τὸ ΕΖΓ· ἀναστέφαντι δὲ ὡς τὸ ἀπὸ ΒΓ
πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΖΒ (τὸ ἔστιν ἡ ὑπερβολὴ τῆς ἀπὸ ΓΒ πρὸς τὸ
ἀπὸ ΓΖ διὰ τὸ διχοτομῆσαι τὸ Γ καὶ ΑΒ) ἕτως τὸ ΛΒΓ τρι-
γώνον πρὸς τὸ ΕΒΖΛ τετραπλευρον, καὶ ἀνάπαιλιν ὡς τὸ
ὑπὸ ΑΖΒ πρὸς τὸ ἀπὸ ΒΓ ἕτως τὸ ΕΛΒΖ τετραπλευρον
πρὸς τὸ ΒΛΓ τριγώνον. ἔχει δὲ πτώσεις, ὅτι μὲν τὸ ὑπερ-
βολῆς, ἐνδεῆς, ὅπως εἶχε καὶ τὸ ἀπὸ αὐτῆς ὅτι τὸ ὑπερβολῆς, καὶ
ἄλλως μίαν ἔχει τὸ ὅτι τὸ Η λαμβανόμενον σημῶναι τὸ αὐτὸ
τῆς Β. πῶς γὰρ συμβαίνει τὸ ΕΔΖ τριγώνον μετὰ τῷ
ΛΒΓ ἴσιν εἶναι τῷ ΓΕΖ· δίδεται μὲν γὰρ τὸ ΕΔΖ τρι-
γώνον ἴσιν τῷ ΛΒΖΕ τετραπλευρῳ, τὸ δὲ ΛΒΖΕ τῷ
ΓΕΖ τριγώνῳ διαφέρει τῷ ΛΒΓ. ὅτι δὲ τὸ ἐλλείψεως, ἡ
τὸ αὐτὸ ἔχει τὸ Η τῆς Ε, ἡ ὑπερβολὴ λαμβανόμεναι τῆς Ε· καὶ δὴλον
ὅτι ἀμφοτέρω ἀπὸ ἀντίλλοι μετὰ τῷ πῶς τῶν Δ, Ζ, ὡς

In aliquibus codicibus hujus theorematidis talis legi-
tur demonstratio.

Quoniam enim [per 37. huj.] rectangulum
ΖΓΔ æquale est quadrato ex ΓΒ; erit [per 17.6.]
ut ΖΓ ad ΓΒ ita ΓΒ ad ΓΔ: quare [per 20. 6.]
ut figura quæ fit ex ΓΖ ad figuram ex ΓΒ ita li-
nea ΖΓ ad ΓΔ. sed ut figura ex ΖΓ ad figuram
ex ΓΒ ita ΕΓΖ triangulum ad triangulum ΒΓΛ,
& ut linea ΖΓ ad ipsam ΓΔ ita [per 1. 6.] ΕΖΓ
triangulum ad triangulum ΕΓΔ: ut igitur ΕΓΖ
triangulum ad triangulum ΒΓΛ ita triangulum
ΒΓΖ ad ipsum ΒΓΔ: proptereaque [per 9. 5.]
triangulum ΕΓΔ triangulo ΒΓΛ est æquale: er-
go in hyperbola, per conversionem rationis; &
in ellipfi, invertendo dividendoque & rursus in-
vertendo, ut ΒΖΓ triangulum ad quadrilaterum
ΕΛΒΖ ita triangulum ΕΓΖ ad triangulum ΕΔΖ:
quare triangulum ΕΔΖ æquale est quadrilatero
ΕΛΒΖ. & quoniam ut quadratum ex ΓΖ ad
quadratum ex ΓΒ ita triangulum ΕΓΖ ad tri-
angulum ΛΓΒ; in hyperbola quidem dividen-
do, in ellipfi autem invertendo, & per conver-
sionem rationis & rursus invertendo, erit ut
rectangulum ΑΖΒ ad quadratum ex ΒΓ ita qua-
drilaterum ΕΛΒΖ ad triangulum ΒΛΓ; & si-
militer ut quadratum ex ΓΒ ad rectangulum ΑΚΒ
ita triangulum ΛΓΒ ad quadrilaterum ΜΛΒΚ:
ergo ex æquali, ut rectangulum ΑΖΒ ad rectan-
gulum ΑΚΒ ita ΕΛΒΖ quadrilaterum ad qua-
drilaterum ΜΒΚΛ. ut autem rectangulum ΑΖΒ
ad rectangulum ΑΚΒ ita [per 21. huj.] quadra-
tum ex ΕΖ ad quadratum ex ΗΚ: & ut quadra-
tum ex ΕΖ ad quadratum ex ΗΚ ita triangulum
ΕΔΖ ad triangulum ΗΘΚ: quare ut triangulum
ΕΔΖ ad triangulum ΗΘΚ ita quadrilaterum
ΕΛΒΖ ad quadrilaterum ΜΛΒΚ; & permutan-
do ut triangulum ΕΔΖ ad quadrilaterum ΕΛΒΖ
ita triangulum ΗΘΚ ad quadrilaterum ΜΛΒΚ.
sed triangulum ΕΔΖ ostensum est [supra] æquale
quadrilatero ΕΛΒΖ; ergo & triangulum ΗΘΚ
quadrilatero ΜΛΒΚ est æquale: triangulum igitur
ΚΜΓ à triangulo ΓΑΒ differt triangulo ΗΘΚ.

Sed cum hæc demonstratio obscuritatem quandam
habeat in proportionibus ellipseos, enitendum est ut
ea quæ breviter dicta sunt latius explicentur. [Quo-
niam, inquit, ut quadratum ex ΖΓ ad quadra-
tum ex ΓΒ ita triangulum ΕΓΖ ad triangulum
ΛΓΒ, erit invertendo & per conversionem ra-
tionis rursusque invertendo.] est enim inverten-
do ut quadratum ΒΓ ad quadratum ex ΓΖ ita ΛΒΓ
triangulum ad ΕΖΓ: & per conversionem rationis, ut
quadratum ex ΒΓ ad rectangulum ΑΖΒ (hoc est, ad ex-
cessum quo quadratum ex ΓΒ excedit quadratum ex
ΓΖ, quia punctum Γ lineam ΑΒ bifariam secat) ita tri-
angulum ΛΒΓ ad quadrilaterum ΕΒΖΛ: & inverten-
do, ut rectangulum ΑΖΒ ad quadratum ex ΒΓ ita
quadrilaterum ΕΛΒΖ ad ΒΛΓ triangulum. Habet au-
tem in hyperbola casus undecim, quot habebat præce-
dens theorema in parabola, & præterea alium quen-
dam; cum scilicet punctum quod in Η sumitur idem
sit quod Ε. tunc enim contingit triangulum ΕΔΖ
una cum triangulo ΛΒΓ æquale esse triangulo ΓΕΖ;
etenim ostensum est triangulum ΕΔΖ quadrilaterο
ΛΒΖΕ æquale esse, quadrilaterum autem ΛΒΖΕ à
triangulo ΓΕΖ ipso ΛΒΓ triangulo differt. sed in el-
lipfi vel punctum Η idem est quod Ε vel intra Ε sumi-
tur: & tunc utraque parallelas inter Α & Ζ cadere per-
spicuum

spicuum est. quod si H sumatur infra E , & ab eo ducta ipsi EZ parallela cadat inter Z & Γ , punctum Θ quinque casus efficit: vel enim cadit inter Δ & B , vel in B , vel inter B & Z , vel in Z , vel inter Z & Γ .

Si vero quæ per H ducitur applicatæ parallela in centrum Γ cadat, punctum Θ alios quinque efficit casus. attendendum tamen est triangulum hic factum à lineis quæ ipsi $E\Delta$, EZ sunt parallelæ triangulo $\Lambda B\Gamma$ æquale esse. quoniam enim ut quadratum ex EZ ad quadratum ex $H\Gamma$ ita triangulum $E\Delta Z$ ad triangulum $H\Theta\Gamma$, similia enim triangula sunt; & ut quadratum ex EZ ad quadratum ex $H\Gamma$ ita rectangulum BZA ad rectangulum $B\Gamma A$, hoc est ad quadratum ex $B\Gamma$: erit ut triangulum $E\Delta Z$ ad ipsum $H\Theta\Gamma$ ita rectangulum BZA ad quadratum ex $B\Gamma$: ut autem rectangulum BZA ad quadratum ex $B\Gamma$ ita ostensum est esse quadrilaterum ΛBZE ad triangulum $\Lambda B\Gamma$: ut igitur triangulum $E\Delta Z$ ad $H\Theta\Gamma$ ita quadrilaterum ΛBZE ad triangulum $\Lambda B\Gamma$, & permutando ut triangulum $E\Delta Z$ ad quadrilaterum ΛBZE ita triangulum $H\Theta\Gamma$ ad triangulum $\Lambda B\Gamma$. sed æquale est triangulum $E\Delta Z$ quadrilatero ΛBZE : triangulum igitur $H\Theta\Gamma$ triangulo $\Lambda B\Gamma$ est æquale. possumus autem hæc etiam aliter probare, si dicamus in parallelogrammis triangulorum duplis eadem demonstrata esse; videlicet in quadragesimo primo theoremate.

Quod si ducta per H parallela ipsi EZ cadat inter Γ & A , producat quidem quovisq; linea ΓE cum ipsa conveniat; & punctum Θ septem casus efficit. vel enim inter B & Δ cadit, vel in B , vel inter B & Z , vel in Z , vel inter Z & Γ , vel in Γ , vel inter Γ & A : & in his casibus contingit differentiam triangulorum $\Lambda B\Gamma$, $H\Theta K$ constitui à rectis $\Lambda\Gamma$, ΓB infra Γ productis. si vero H sumatur in altera parte sectionis, & ea quæ per H ducitur ipsi EZ parallela inter B & Z cadat, producat, ob demonstrationem, quovisq; secet ipsam $\Lambda\Gamma$; & punctum Θ faciet septem casus: vel inter B & Z cadens, vel in Z , vel inter Z & Γ , vel in Γ , vel inter Γ & A , vel in A , vel infra A . si vero $H K$ cadat inter Z & Γ , punctum Θ quinque casus efficit. vel enim erit inter Z & Γ , vel in Γ , vel inter Γ & A , vel in A , vel infra A . sed si $H K$ in centrum Γ cadat, punctum Θ casus efficit tres: vel inter Γ & A cadens vel in A vel extra A . atque in his casibus rursus contingit triangulum $H\Theta K$ æquale esse triangulo $\Lambda B\Gamma$. si vero $H K$ cadat inter Γ & A , punctum Θ vel cadet inter Γ & A , vel in A , vel extra A . itaque in ellipsi casus omnes erunt quadraginta duo, & totidem in circuli circumferentia; ita ut huius theorematism casus omnes sint nonaginta sex.

πτώσεις ὄνται μλ', καὶ ἐπὶ τῆς τῆς κύκλου περιφέρειας ποσάται· ὅσα ὄνται τὰς πάσας πτώσεις τότε τῆς περιφέρειας ζς'.

PROP. XLIV. Theor.

Si unam oppositarum sectionum recta linea contingens cum diametro conveniat, à tactu vero ad diametrum recta ordinatim applicetur; atque huic parallela ducatur per verticem alterius sectionis, ita ut conveniat cum recta

*

ἔχει ἐν τῇ ἐκτῇ. οἱ δὲ ἐξωτέρω λαμβάνειν τὸ $H\Gamma$ E , καὶ ἡ ἀπ' αὐτῆς τῇ BZ παράλληλος μεταξὺ πύσης τῇ Z, Γ , τὸ Θ σημῖον ποιῇ πτώσεις πέντε· ἢ γὰρ μεταξὺ τῇ Δ, B πίπτει, ἢ ἐπὶ τὸ B , ἢ μεταξὺ τῇ B, Z , ἢ ἐπὶ τὸ Z , ἢ μεταξὺ τῇ Z, Γ .

Εάν δὲ ἡ ἀπ' H τῇ EZ κατὰ γωνίαν παράλληλος ἐπὶ τὸ Γ κέντρον πίπτει, τὸ Θ πάλιν σημῖον ποιῇ πέντε ἄλλας πέντε πτώσεις αὐτῶνταις. καὶ οὕτως ἐπὶ τῇ περιφέρειᾳ ὅτι τὸ ἐκτὸς τῶν παραλλήλων τὰς $E\Delta, EZ$ γινώσκον

τείνοντες ἴσον γίνονται τῇ $\Lambda B\Gamma$ τείνῳ. ἔπει γὰρ ὅτι ὡς τὸ ἀπὸ EZ πρὸς τὸ ἀπὸ $H\Gamma$ ὕψος τὸ $E\Delta Z$ τείνοντος πρὸς τὸ $H\Theta\Gamma$, ὁμοίον γάρ· ὡς δὲ τὸ ἀπὸ EZ πρὸς τὸ ἀπὸ $H\Gamma$ ὕψος τὸ ἀπὸ BZA πρὸς τὸ ἀπὸ $B\Gamma A$, τὸ ὅτι τὸ ἀπὸ $B\Gamma$ ὡς ἄρα τὸ $E\Delta Z$ τείνοντος πρὸς τὸ $H\Theta\Gamma$ ὕψος τὸ ἀπὸ BZA πρὸς τὸ ἀπὸ $B\Gamma$ ὡς δὲ τὸ ἀπὸ BZA πρὸς τὸ ἀπὸ $B\Gamma$ ὕψος ἰσὺς ἔχον τὸ ΛBZE περὶ πλάτους πρὸς τὸ $\Lambda B\Gamma$ τείνοντος· καὶ ὡς ἄρα τὸ $E\Delta Z$ τείνοντος πρὸς τὸ $H\Theta\Gamma$ ὕψος τὸ ΛBZE περὶ πλάτους πρὸς τὸ $\Lambda B\Gamma$ τείνοντος, καὶ ἰσὺς ἔχον τὸ $E\Delta Z$ πρὸς τὸ ΛBZE περὶ πλάτους ὕψος τὸ $H\Theta\Gamma$ πρὸς τὸ $\Lambda B\Gamma$ τείνοντος. ἴσον ὃ τὸ $E\Delta Z$ τῇ ΛBZE .

ἴσον ἄρα $H\Theta\Gamma$ τείνοντος τῇ $\Lambda B\Gamma$. καὶ ἄλλως ὃ πρώτως δυνατὸν δεῖξαι, λέγοντας, ὅτι ὅτι τὸ διπλασθὲν αὐτῶν ὁμοεισῶν ταῦτα δίδωκε, ὅπως λόγος $\Gamma\mu\alpha'$. διαφύμωτος.

Εάν δὲ ἡ ἀπ' H τῇ EZ παράλληλος ἀγορεύῃ μεταξὺ πύσης τῇ Γ, A , ἐκκενδρῶν ὅτι ὡς ὅτι ἡ ΓE αὐτῇ συμπίπτει τὸ δὲ Θ σημῖον ποιῇ πέντε πτώσεις ἑπτὰ. ἢ γὰρ μεταξὺ τῇ B, Δ , ἢ ἐπὶ τὸ B πίπτει, ἢ μεταξὺ τῇ B, Z , ἢ ἐπὶ τὸ Z , ἢ μεταξὺ τῇ Z, Γ , ἢ ἐπὶ τὸ Γ , ἢ μεταξὺ τῇ Γ, A . καὶ ὅτι τῶν πτώσεων συμβαίνει ὃ διαφύμωτος τῇ $\Lambda B\Gamma, H\Theta K$ τείνοντων κατὰ γωνίαν συνίστασθαι $\Lambda\Gamma, \Gamma B$ ὑψώσεως ὑπὸ Γ ἐκκενδρῶν. εἰ δὲ τὸ H ἐπὶ τῇ ἐτέρᾳ μέρει λαμβῶν τὴν τομὴν, καὶ ἡ ἀπὸ H τῇ EZ παράλληλος μεταξὺ πίπτει τῇ B, Z , ἐκκενδρῶνται μλ', διὰ τὸ ἀπὸ δεξιῆς, ὡς ἡ τῇ $\Lambda\Gamma$ τὸ δὲ Θ σημῖον ποιῇ ζ' πτώσεις· ἢ μεταξὺ τῇ B, Z , ἢ ἐπὶ τὸ Z πίπτει, ἢ μεταξὺ τῇ Z, Γ , ἢ ἐπὶ τὸ Γ , ἢ μεταξὺ τῇ Γ, A , ἢ ἐπὶ τὸ A , ἢ ἐξωτέρω ΓA . εἰ δὲ ἡ $H K$ μεταξὺ πίπτει τῇ Z, Γ , τὸ Θ ποιῇ πέντε πτώσεις πέντε· ἢ γὰρ μεταξὺ τῇ Z, Γ πρὸς τὸ Γ , ἢ ἐπὶ τὸ Γ , ἢ μεταξὺ τῇ Γ, A , ἢ ἐπὶ τὸ A , ἢ ἐξωτέρω τῇ A . εἰ δὲ ἡ $H K$ ἐπὶ τὸ Γ κέντρον πίπτει, τὸ Θ σημῖον ποιῇ πέντε πτώσεις πέντε· ἢ μεταξὺ πίπτει τῇ Γ, A , ἢ ἐπὶ τὸ A , ἢ ἐξωτέρω ΓA . καὶ ὅτι τῶν πτώσεων συμβαίνει πάλιν τὸ $H\Theta K$ τείνοντος ἴσον γίνεσθαι τῇ $\Lambda B\Gamma$ τείνῳ. εἰ δὲ ἡ $H K$ μεταξὺ πίπτει τῇ Γ, A , τὸ Θ σημῖον ἢ μεταξὺ τῇ Γ, A πρὸς τὸ A , ἢ ἐπὶ τὸ A , ἢ ἐξωτέρω ΓA . συμβαίνει ἔν ἐπὶ πέντε ἰσὺς τὰς πάσας πτώσεις ὅτι ἐπὶ πέντε ἰσὺς τὰς πάσας πτώσεις τότε τῆς περιφέρειας ζς'.

ταξὺ τῇ Γ, A , ἢ ἐπὶ τὸ A , ἢ ἐξωτέρω τῇ A . εἰ δὲ ἡ $H K$ ἐπὶ τὸ Γ κέντρον πίπτει, τὸ Θ σημῖον ποιῇ πέντε πτώσεις πέντε· ἢ μεταξὺ πίπτει τῇ Γ, A , ἢ ἐπὶ τὸ A , ἢ ἐξωτέρω ΓA . καὶ ὅτι τῶν πτώσεων συμβαίνει πάλιν τὸ $H\Theta K$ τείνοντος ἴσον γίνεσθαι τῇ $\Lambda B\Gamma$ τείνῳ. εἰ δὲ ἡ $H K$ μεταξὺ πίπτει τῇ Γ, A , τὸ Θ σημῖον ἢ μεταξὺ τῇ Γ, A πρὸς τὸ A , ἢ ἐπὶ τὸ A , ἢ ἐξωτέρω ΓA . συμβαίνει ἔν ἐπὶ πέντε ἰσὺς τὰς πάσας πτώσεις ὅτι ἐπὶ πέντε ἰσὺς τὰς πάσας πτώσεις τότε τῆς περιφέρειας ζς'.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ μδ'.

Εάν μίας τῇ ἀντικειμένην εὐθεῖαν ἐκτεταγμένην συμπίπτει τῇ ἀφ' ἑαυτῆς, καὶ ἀπὸ τῆς ἀφ' ἑαυτῆς κατὰ γωνίαν τις εὐθεῖα τεταγμένης ἐπὶ τῇ ἀφ' ἑαυτῆς, καὶ ἑαυτῇ ἀφ' ἑαυτῆς κατὰ γωνίαν τῆς ἐτέρας τομῆς παράλληλος ἀχθῇ συμπίπτουσα τῇ ἀφ' ἑαυτῆς.

ἡ ἀφ' ἧς ἐκ τῆς κέντρος ἡ γινώσκουσα εὐθεία, λαμβάνεται
 δι' ὅτι τὸ τομῆς ἔστι ἐν τῇ σημείῳ, κατὰ χῶ-
 ρον εὐθείαν ἐπὶ τῇ ἀφ' ἧς μετροῦν, ὅτι ἡ μὲν παρὰ τὴν
 ἐφαπτομένην, ἡ δὲ παρὰ τὴν κατηγμένην ἀπὸ τῆς
 ἀφ' ἧς περὶ γινώσκουσας· τὸ γινώσκον ἐκ τῶν αὐτῶν τρι-
 γωνοῦν τετραγώνου, ὃ ἀποτείνεται ἡ κατηγμένη πρὸς
 τὸ κέντρον τὸ τομῆς, ἔλασσον ἔσται πρὸς τὸ ἐκ
 τῆς κέντρος τριγώνου ὁμοίῳ πρὸς ἀποτεμένομενον.

ΕΣΤΩΣΑΝ ἀντικείμεναι αἱ AZ, BE , ἀφ' ἧς
 μετροῦν τὴν αὐτῶν ἡ AB , κέντρον δὲ τὸ Γ , καὶ ἀπὸ
 τινος σημείου τ ὅπου τὸ ZA τομῆς ἔστι Z ἐφαπτομένη
 ἡχθῶ τὸ τομῆς ἡ ZH , περὶ γινώσκουσας δὲ ἡ ZO , καὶ ἐπι-
 ζευχθῶσαι ἡ $ΓΖ$ ἐκβεβλήσθω, ὡς ἡ $ΓΕ$, καὶ
 ἀφ' ἧς B τῇ ZO ὁμοειδής ἡ $ΒΛ$, καὶ εἰληφθῶ ση-
 μέων π ὅπου τὸ BE τομῆς τὸ N , ὃ ἀπὸ τῆς N περὶ
 γινώσκουσας κατῆχθῶ ἡ $NΘ$, τῇ δὲ ZH ὁμοειδής
 ἡ $NΚ$. λέγω ὅτι τὸ $ΘΚΝ$ τετραγώνον τὸ
 $ΓΜΘ$ τετραγώνου ἔλασσον ἐστὶ τῷ $ΓΒΛ$ τετραγώνῳ.

Διὰ γὰρ τῆς E τῆς
 BE τομῆς ἐφαπτο-
 μένη ἡχθῶ ἡ $ΕΔ$,
 περὶ γινώσκουσας δὲ ἡ
 $EΞ$. ἔπειτα ἐν ἀντι-
 κείμεναι εἰσιν αἱ
 ZA, BE , ὧν ἀφ' ἧς
 μετροῦν ἡ AB , ἡ δὲ
 διὰ τοῦ κέντρον ἡ
 $ZΓΕ$, καὶ ἐφαπτο-
 μέναι τὴν τομῆν αἱ
 $ZH, ΕΔ$. τῇ ZH

ὁμοειδής ἐστὶν ἡ $ΔΕ$. ἡ δὲ $NΚ$ ὁμοειδής ἐστὶ
 τῇ ZH . καὶ τῇ $ΕΔ$ ὁμοειδής ἐστὶν ἡ $NΚ$, ἡ δὲ
 $ΜΘ$ τῇ $ΒΛ$. ἔπειτα ἐν ὑπερβολῇ ἐστὶν ἡ BE , ἧς ἀφ' ἧς
 μετροῦν ἡ AB , κέντρον δὲ τὸ Γ , ἐφαπτομένη δὲ τὸ
 τομῆς ἡ $ΔΕ$, περὶ γινώσκουσας κατῆχθῶ ἡ $EΞ$, καὶ τῇ
 $EΞ$ ὁμοειδής ἐστὶν ἡ $ΒΛ$, καὶ εἰληφθῶ ὅπου τὸ
 τομῆς σημείον τὸ N , ἀφ' ἧς περὶ γινώσκουσας μὲν κατῆχθῶ
 ἡ $NΘ$, ὁμοειδής δὲ ἡ $τῇ ΔΕ$ ἡ $NΚ$. τὸ ἄρα
 $NΘΚ$ τετραγώνον ἔστι $ΘΜΓ$ τετραγώνου ἔλασσον ἐστὶ τῷ
 $ΓΒΛ$ τετραγώνῳ. τὸτο γὰρ ἐν τῷ ποσαστασθῶ τρι-
 γωνῷ θεωρηματι δέδεικται.

per tactum & centrum ducta; sumpto
 autem in sectione quovis puncto,
 applicentur ad diametrum duæ rectæ,
 quarum altera contingenti sit paral-
 lela, altera parallela ei quæ à tactu
 ordinatim applicata est: triangulum
 ab ipsis factum minus est quam trian-
 gulum quod abscindit applicata ad
 centrum sectionis, triangulo simili
 abscisso ab ea quæ ex centro.

SINT oppositæ sectiones AZ, BE , quarum
 diameter AB , centrum Γ ; & ab aliquo
 puncto eorum quæ sunt in sectione ZA , videli-
 cet à puncto Z , ducatur recta ZH sectionem con-
 tingens; ordinatimque applicetur ZO ; & juncta
 $Z\Gamma$ producat, ut ad E ; per B vero ducatur
 BL ipsi ZO parallela; & sumatur aliquod pun-
 ctum in sectione BE , quod sit N ; à quo $N\Theta$
 ordinatim applicetur, atque ipsi ZH parallela
 ducatur NK : dico triangulum ΘKN minus esse
 quam triangulum $\Gamma M\Theta$, triangulo $\Gamma B\Lambda$.

Ducatur enim
 per B recta $E\Delta$
 contingens sectio-
 nem EB ; & $E\Xi$
 ordinatim appli-
 cetur. itaque quo-
 niam oppositæ se-
 ctiones sunt ZA ,
 BE , quarum dia-
 meter AB ; & re-
 ctæ $Z\Gamma E$ per cen-
 trum ducitur; &
 $ZH, E\Delta$ sectiones
 contingunt: erit

ΔE ipsi ZH parallela. est autem [ex hyp.] NK
 parallela ipsi ZH : ergo & NK ipsi $B\Delta$; & $M\Theta$
 ipsi BL parallela est. quoniam igitur hyperbola
 est BE , cujus diameter AB , centrum Γ ; & recta
 ΔE sectionem contingit, ordinatimque applicata
 est $E\Xi$; & ipsi $B\Xi$ parallela est BL ; sumitur
 autem in sectione punctum N , & ab eo ordina-
 tim applicatur $N\Theta$, & ipsi ΔE parallela duci-
 tur NK : erit triangulum $N\Theta K$ minus quam
 triangulum $\Theta M\Gamma$ ipso $\Gamma B\Lambda$ triangulo. hoc
 enim in quadragesimo tertio theoremate osten-
 sum est.

EUTOCIUS.

* Ἐπεὶ ἐν ἀντικείμεναι εἰσιν αἱ ZA, BE , ὧν ἀφ' ἧς
 μετροῦν ἡ AB , ἡ δὲ ἀφ' ἧς κέντρον ἡ $ZΓΕ$, καὶ ἐφα-
 πτομένη τὴν τομῆν αἱ $ZH, ΕΔ$. ὁμοειδής ἐστὶν ἡ
 $ΔΕ$ τῇ ZH .] Ἐπεὶ γὰρ ὑπερβολὴ ἐστὶν ἡ AZ , καὶ ἐφαπτο-
 μένη ἡ ZH , καὶ κατῆχθῶ ἡ ZO . ἴσον ἔστι τὸ ὑπὸ $ΟΓΗ$
 πρὸς τὸ $ΓΑ$, ἀφ' ἧς τὸ $ΛΖ$. διώρημα. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ὑπὸ
 $ΞΓΔ$ πρὸς τὸ $ΓΒ$ ἔστι ἴσον. ἔστι ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ $ΟΓΗ$
 πρὸς τὸ ὑπὸ $ΛΓ$ ἔσται τὸ ὑπὸ $ΞΓΔ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΒΓ$.
 καὶ ἐναλλάξ ὡς τὸ ὑπὸ $ΟΓΗ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΞΓΔ$ ἔσται
 τὸ ὑπὸ $ΛΓ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΓΒ$. ἴσον ἄρα τὸ ὑπὸ $ΟΓΗ$ πρὸς
 τὸ ὑπὸ $ΞΓΔ$. καὶ ἐστὶν ἡ $ΟΓ$ τῇ $ΓΞ$ ἴση. καὶ ἡ $ΗΓ$ ἄρα
 τῇ $ΓΔ$ ἔστι ἴση. ἐστὶ δὲ καὶ ἡ $ΖΓ$ ἴση τῇ $ΓΒ$, ἀφ' ἧς τὸ $Λ$.

* Itaque quoniam oppositæ sectiones sunt ZA ,
 BE , quarum diameter AB , & recta $Z\Gamma E$ per
 centrum ducitur, & $ZH, E\Delta$ sectiones contin-
 gunt; erit ΔE ipsi ZH parallela.] Quoniam enim
 hyperbola est AZ , rectaque ZH sectionem contingit,
 & applicata est ZO ; erit rectangulum $ΟΓΗ$ æquale
 quadrato ex ΓA , ex trigesimo septimo theoremate. &
 similiter rectangulum $\XiΓΔ$ quadrato ex ΓB æquale
 est: igitur ut rectangulum $ΟΓΗ$ ad quadratum ex ΓA
 ita rectangulum $\XiΓΔ$ ad quadratum ex ΓB ; & per-
 mutando, ut rectangulum $ΟΓΗ$ ad rectangulum $\XiΓΔ$
 ita quadratum ex ΓA ad quadratum ex ΓB ; quare
 rectangulum $ΟΓΗ$ æquale est rectangulo $\XiΓΔ$. estque
 linea $ΟΓ$ æqualis ipsi $\Gamma\Xi$, ergo & $ΗΓ$ ipsi $\Gamma\Delta$. sed $Z\Gamma$
 ipsi ΓE est æqualis, ex trigesimo theoremate: lineæ igitur

tur $Z\Gamma, \Gamma H$ æquales sunt ipsis $B\Gamma, \Gamma\Delta$, angulosque æquales continent ad Γ ; sunt enim ad verticem: quare & ZH ipsi $B\Delta$ est æqualis, & angulus $\Gamma H Z$ angulo $\Gamma\Delta E$. & alterni sunt: ergo ZH ipsi $E\Delta$ parallela est. Casus hujus theorematism duodecim sunt, quem admodum in hyperbola diximus in quadragesimo tertio theoremate, atque eadem est demonstratio.

PROP. XLV. Theor.

Si hyperbolam, vel ellipsim, vel circuli circumferentiam recta linea contingens cum secunda diametro conveniat; & à tactu ad eandem diametrum recta applicetur diametro alteri parallela, & per tactum & centrum ducta recta producat; sumpto autem in sectione quovis puncto, ad secundam diametrum ducantur duæ rectæ, quarum una contingenti, altera applicatæ sit parallela: triangulum quod ab ipsis constituitur, in hyperbola quidem, majus est quam triangulum abscissum ab applicata ad centrum, triangulo cujus basis est recta contingens & vertex centrum sectionis; in ellipsi vero & circuli circumferentia, unà cum triangulo abscisso, æquale est triangulo cujus basis recta contingens & vertex sectionis centrum.

SIT hyperbola, vel ellipsis, vel circuli circumferentia $AB\Gamma$, cujus diameter $A\Theta$, secunda diameter $\Delta\Theta\Lambda$, & centrum Θ ; recta vero $\Gamma M\Lambda$ sectionem contingat in Γ , ducaturque $\Gamma\Delta$ ipsi $A\Theta$ parallela, & juncta $\Gamma\Theta$ producat; sumpto deinde in sectione quovis puncto B , ducantur ad secundam diametrum rectæ BE, BZ , quæ ipsis $\Lambda\Gamma, \Gamma\Delta$ sint parallelæ: dico triangulum $B\Gamma Z$, in hyperbola quidem, majus esse quam triangulum $H\Theta Z$ triangulo $\Lambda\Gamma\Theta$; in ellipsi vero & circulo, triangulum $B\Gamma Z$ unà cum $ZH\Theta$ æquale esse triangulo $\Gamma\Lambda\Theta$.

Ducantur enim $\Gamma K, BN$ parallelæ ipsi $\Delta\Theta$. & quoniam recta $\Gamma\Lambda M$ sectionem contingit; atque applicata est ΓK ; habebit [per 39. huj.] ΓK ad $K\Theta$ rationem compositam ex ratione quam habet MK ac $K\Gamma$ & ex ea quam rectum figuræ latus habet ad transversum. ut autem MK ad $K\Gamma$ ita [per 4. 6.] $\Gamma\Delta$ ad $\Delta\Lambda$: ergo ΓK ad $K\Theta$ rationem compositam habet ex ratione $\Gamma\Delta$ ad $\Delta\Lambda$ & ex ratione recti lateris ad transversum. atque est triangulum $\Gamma\Delta\Lambda$ figura quæ fit ex $K\Theta$; & triangulum $\Gamma\Theta K$, hoc est $\Gamma\Delta\Theta$, figura quæ fit ex ΓK , hoc est ex $\Delta\Theta$: quare triangulum $\Gamma\Delta\Lambda$, in hyperbola quidem, majus est quam triangulum $\Gamma K\Theta$, triangulo factum ex $A\Theta$, simili ipsi $\Gamma\Delta\Lambda$; in ellipsi vero & circulo triangulum $\Gamma K\Theta$ una cum ipso $\Gamma\Delta\Lambda$ eidem triangulo est æquale. hoc enim in parallelogrammis triangulorum duplis, in quadragesimo primo theoremate, demonstratum est. itaque quoniam triangulum $\Gamma\Delta\Lambda$ à triangulo $\Gamma K\Theta$, vel $\Gamma\Delta\Theta$,

αὶ ἄρα $Z\Gamma, \Gamma H$ ἴσται εἰς τὰς $B\Gamma, \Gamma\Delta$. καὶ γωνίας ἴσας περιέχουσιν τὰς πρὸς τὸ Γ , κατὰ κορυφὴν γάρ· ὅτε καὶ ἡ ZH τῇ $E\Delta$ ὅσῃ ἴσῃ, καὶ ἡ ὑπὸ $\Gamma H Z$ γωνία τῇ ὑπὸ $\Gamma\Delta E$. καὶ εἰσιν ἐναλλάξ· παράλληλος ἄρα ὅσῃ ἡ ZH τῇ $E\Delta$. αἱ πλάσεις αὐτῶν B . εἰσὶ, καὶ ἀπὸ τοῦ ἐπὶ τῇ ὑπερβολῇ ἐν τῷ $μγ$. ἐλέχθη, καὶ ἡ ἀπόδειξις ἡ αὐτή.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ μεί.

Εάν ὑπερβολῇ, ἢ ἐλλείψει, ἢ κύκλῳ περιφύεται εὐθεῖα ὁριζώσασα συμπίπτῃ τῇ δευτέρᾳ διαμέτρῳ, καὶ ἀπὸ τῆς ἀφ᾽ ἧς καταχθῇ τις εὐθεῖα ὁριζὴ τῷ αὐτῷ διάμετρον παράλληλος τῇ εἰσῆς διαμέτρῳ, καὶ ἀπὸ τῆς ἀφ᾽ ἧς καὶ κέντρον εὐθεῖα ἐκβληθῇ, ληφθέντος δὲ ὅσῃ τυχὼν ἐπὶ τῇ τομῇ σημείῳ, ἀχθῶσι δύο εὐθεῖαι ἐπὶ τῇ δευτέρᾳ διάμετρον, ὅτι ἡ μὲν παρὰ τῇ ἐφαπτομένῃ, ἡ δὲ παρὰ τῷ κέντρῳ κατὰ τὴν ἰσότητα τῶν ἀπὸ τοῦ κέντρον εὐθεῖαν, ἐπὶ μὲν τῇ ὑπερβολῇ, τριγώνῳ, ὃ ἀποτείνεται ἡ κατὰ τὴν ἰσότητα πρὸς τὸ κέντρον, μείζον ὅσῃ τῷ τριγώνῳ, ὃ βάσις μὲν ἡ ἐφαπτομένη, κορυφὴ δὲ τὸ κέντρον τῆς τομῆς· ἐπὶ δὲ τῇ ἐλλείψει καὶ τῷ κύκλῳ, μιστὰ τῇ ἀποτομνομένην ἴσῃ ἑσῇ τῷ τριγώνῳ, ὃ βάσις μὲν ἡ ἐφαπτομένη, κορυφὴ δὲ τὸ κέντρον τῆς τομῆς.







ΕΣΤΩ ὑπερβολῇ, ἢ ἐλλείψει, ἢ κύκλῳ περιφύεται ἡ $AB\Gamma$, ἥς διάμετρος μὲν ἡ $A\Theta$, δευτέρᾳ δὲ $\Delta\Theta\Lambda$, κέντρον δὲ τὸ Θ , καὶ ἡ μὲν $\Gamma M\Lambda$ ἐφαπτομένη κατὰ τὸ Γ , ἡ δὲ $\Gamma\Delta$ ἡ ὁριζὴ πρὸς τὴν $A\Theta$, καὶ $\Gamma\Theta$ ἐκβληθῇ, καὶ εἰληφθῶσι ἐπὶ τῇ τομῇ τυχὼν σημείῳ τὸ B , ἐξ αὐτοῦ δὲ B ὁριζώσασαί BE, BZ , πρὸς τὰς $\Lambda\Gamma, \Gamma\Delta$, ὅτι τὴν δευτέραν διάμετρον· λέγω ὅτι, ὅτι μὲν τῇ ὑπερβολῇ, τὸ $B\Gamma Z$ τρίγωνον τοῦ $H\Theta Z$ μείζον ἐστὶ τῷ $\Lambda\Gamma\Theta$ · ὅτι ἡ ἐλλείψει καὶ τῷ κύκλῳ, τὸ $B\Gamma Z$ τρίγωνον μὲν τῷ $ZH\Theta$ ἴσον ἐστὶ τῷ $\Gamma\Delta\Theta$.

Ἡχθῶσιν γὰρ αἱ $\Gamma K, BN$ πρὸς τῷ $\Delta\Theta$. ἐπεὶ γὰρ ἐφαπτομένη ἡ $\Gamma\Lambda M$, κατὰ τὴν Γ · ἡ ΓK πρὸς $K\Theta$ τὴν συγκείμενον λόγον ἔχει, ὅτι ὅν ἔχει ἡ MK πρὸς $K\Gamma$ ἐστὶ τῷ ὅν ἔχει τῇ ὁριζῇ κατὰ τὴν $A\Theta$ πρὸς τῷ $\Delta\Lambda$. ὡς δὲ ἡ MK πρὸς $K\Gamma$ ὅσῃ ἡ $\Gamma\Delta$ πρὸς $\Delta\Lambda$ · ἡ ΓK ἄρα πρὸς $K\Theta$ λόγον ἔχει τὴν συγκείμενον, ὅτι ὅτι ἡ $\Gamma\Delta$ πρὸς $\Delta\Lambda$ ἐστὶ τῇ ὁριζῇ πρὸς τῷ $\Delta\Lambda$. καὶ ἐστὶ τὸ $\Gamma\Delta\Lambda$ τρίγωνον τὸ ἀπὸ τῆς $K\Theta$ εἰδος, τὸ δὲ $\Gamma K\Theta$, τὰς τῆς $\Delta\Theta$, τὸ ἀπὸ τῆς ΓK εἰδος, τὰς τῆς $\Delta\Theta$ · τὸ $\Gamma\Delta\Lambda$ ἄρα τρίγωνον τῷ $\Gamma K\Theta$, ὅτι μὲν τῇ ὑπερβολῇ, μείζον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς $A\Theta$ τριγώνῳ ὁμοίῳ τῷ $\Gamma\Delta\Lambda$ · ὅτι δὲ τῇ ἐλλείψει καὶ τῷ κύκλῳ, τὸ $\Gamma K\Theta$ μετὰ τῷ $\Gamma\Delta\Lambda$ ἴσον ἐστὶ τῷ αὐτῷ. καὶ γὰρ ὅτι τὸ διπλασίον αὐτῶν τῷ $\Gamma\Delta\Lambda$ ἐστὶ τῷ $\Gamma\Delta\Lambda$ πρὸς τὸ πρῶτον θεωρήματι. ἐπεὶ γὰρ τὸ $\Gamma\Delta\Lambda$ τρίγωνον τῷ $\Gamma K\Theta$, ἡτοι $\Gamma\Delta\Theta$, ἀφ᾽ ἧς

ἀφ᾽ ἧς

διαφέρει τῷ δὲ τῆς $\Lambda\Theta$ τριγώνου ὁμοίῳ τῷ $\Gamma\Delta\Lambda$, διαφέρει δὲ καὶ τῷ $\Gamma\Theta\Lambda$ τριγώνῳ ἴσῳ ἅρα τὸ $\Gamma\Theta\Lambda$ τριγώνον τῷ δὲ τῆς $\Lambda\Theta$ ὁμοίῳ τῷ $\Gamma\Delta\Lambda$ τριγώνῳ. ἐπεὶ ὅν τὸ μὲν BZE τριγώνον ὁμοίον ἐστὶ τῷ $\Gamma\Delta\Lambda$, τὸ δὲ HZE τῷ $\Gamma\Delta\Theta$. τὸν αὐτὸν ἅρα λόγον ἔχει. καὶ ἐστὶ τὸ μὲν BZE

differt triangulo quod fit ex $\Lambda\Theta$ ipsi $\Gamma\Delta\Lambda$ simili; differt autem & triangulo $\Gamma\Theta\Lambda$: erit $\Gamma\Theta\Lambda$ triangulum æquale ei quod fit ex $\Lambda\Theta$ simili ipsi $\Gamma\Delta\Lambda$. rursus quoniam [per 4. 6.] triangulum BZE simile est triangulo $\Gamma\Delta\Lambda$, & triangulum HZE triangulo $\Gamma\Delta\Theta$; ipsorum latera inter se eandem rationem habent. atque est triangulum



τὸ δὲ τῆς $N\Theta$ μεταξὺ τῆς κατηγμένης καὶ Γ κέντρου, τὸ δὲ HZE τὸ δὲ τῆς BN κατηγμένης, ταῦτα τῆς $Z\Theta$ καὶ Δ πρὸς τὴν διευκρίναι περὶ τὸ BZE τῆς HZE διαφέρει τῷ δὲ τῆς $\Lambda\Theta$ ὁμοίῳ τῷ $\Gamma\Delta\Lambda$, ὥστε καὶ τῷ $\Gamma\Delta\Theta$.

BZE , quod fit ex $N\Theta$ inter applicatam & centrum interjecta; triangulum vero HZE , quod fit ex applicata BN , hoc est ex $Z\Theta$: igitur ex iis, quæ prius [ad 41. huj.] ostensa sunt, triangulum BZE à triangulo HZE differt triangulo, quod fit ex $\Lambda\Theta$, simili ipsi $\Gamma\Delta\Lambda$; quare & triangulo $\Gamma\Delta\Theta$.

EUTOCIUS.

Εὐτοκίου γὰρ ἐστὶ τὸ θεωρήμα εἴκοσι πέντε ἔχει πλάσεις. ὅτι μὲν γὰρ ἡ ὑπερβολὴ ἔχει ἑκοσι. τὸ γὰρ ἀντὶ τῆς B λαμβανόμενον σημεῖον ἢ ταυτὸν εἶναι τῆς Γ , ἢ ταυτὸν τῆς Λ . καὶ τότε συμβαίνει τὸ δὲ τῆς $\Lambda\Theta$ τριγώνον ὁμοίον τῷ $\Delta\Gamma\Lambda$ ταυτὸν εἶναι τῷ δὲ τριγώνῳ ὁμοίῳ τῷ $\Delta\Gamma\Lambda$ ὁμοίῳ τῷ $\Delta\Gamma\Lambda$. ἔαν δὲ μεταξὺ λαμβῇ τὸ B σημεῖον τῆς Λ , Γ , καὶ τὰ Δ , Λ ἀνωτέρω εἶναι τῶν πρὸς τὴν Δ διαμέτρου, γίνονται πλάσεις πέντε. τὰ γὰρ Z , E ἢ ἀνωτέρω τῶν πρὸς τὴν Δ διαμέτρου, ἢ ἐν αὐτῇ, ἢ κατωτέρω. ἔαν δὲ τὰ Δ , Λ ἐπὶ τῇ πρὸς τὴν Δ διαμέτρου, τὰ Z , E κατωτέρω ἐν τῇ Δ διαμέτρου. ὁμοίως

Attendendum est hoc theorema plures habere casus: in hyperbola enim viginti habet. nam punctum quod pro B sumitur, vel idem est quod Γ , vel idem quod Λ ; & tunc contingit, triangulum factum ex $\Lambda\Theta$ simile ipsi $\Delta\Gamma\Lambda$ idem esse quod à lineis parallelis ipsi $\Delta\Lambda$, $\Lambda\Gamma$ abscinditur. si vero B sumatur inter Λ , Γ , & puncta Δ , Λ sint supra terminos secundæ diametri, fient tres casus: nam puncta Z , E vel supra terminos ferentur, vel in ipsos, vel infra. si vero Δ , Λ sint in terminis secundæ diametri, Z , E infra terminos erunt. Similiter si B sumatur

matur extra Γ ; & $\Theta\Gamma$ ad H producat, tres alios casus fieri contingit; nempe ipso Δ vel supra terminos secundæ diametri existente, vel in ipsis, vel infra, & similiter Z faciet tres casus. fin autem B sumatur ex altera parte sectionis, producat $\Gamma\Theta$ ad H , propter demonstrationem: & BZ , BE tres casus efficient, quoniam Z , E vel ad terminos secundæ diametri ferentur, vel supra, vel infra. Ellipsis vero & circuli circumferentiæ varios casus nunc non explicabimus, tot enim sunt quot in præcedenti theoremate sumuntur. erunt igitur hujus theorematism casus omnes centum. sed possunt hæc eadem etiam in oppositis sectionibus demonstrari.

Διὲς ἐὰν ἐξωτέρῳ λαβῶν Γ τὸ B , καὶ ἡ $\Theta\Gamma$ ἐπὶ τὸ H ἐκτεταθῇ, συμβαίνει ὅς τις γινώσκῃ ἄλλας πτάσεις πρὸς Γ ἢ Δ σημείῳ ἢ ἀνωτέρῳ περιεχόμενῳ τῷ πέρατος ἢ δευτέρῳ διαμέτρῳ, ἢ ἐπ' αὐτὸν ἢ κατωτέρῳ. καὶ τὸ Z ὁμοίως περιεχόμενον ποιεῖται τὰς τρεῖς πτάσεις. ἐὰν δὲ ἐπὶ τῷ ἑνὶ μέρει τῆς κοίτης λαβῶν τὸ B σημείον, ἢ Γ ἢ Θ ἐκτεταθῇ ἐπὶ τὸ H , ἀπὸ τῶν ἀποδείξεων αἱ δὲ BZ , BE ποιεῖται πτάσεις τρεῖς, ἐπειδὴ τὰ Z , E ἐπὶ τὸ πέρατος φέρεται ἢ δευτέρῳ διαμέτρῳ, ἢ ἀνωτέρῳ, ἢ κατωτέρῳ. ἡ ἐλλείψων καὶ τῆς τῷ κύκλῳ περιφερείας εἰς τὰ ποικίλα ἱσθμεν. ἐστὶ γὰρ ὅσα ἐν τῷ περιλαμβαντῷ διαστήματι λαβῶν. ὥς ἐστι τὰς πτάσεις τῷ διαστήματι τέτταρες. διὸ καὶ τὰς περιπτώσεις δέκα καὶ ἐπὶ ἀντικειμένῳ.

PROP. XLVI. Theor.


Si parabolam recta linea contingens cum diametro conveniat: quæ per tactum ducitur diametro parallela ad eandem partes sectionis, rectas in sectione ductas contingenti parallelas bifariam fecabit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ μς'.

Εὰν ὡς ἐκείνη ἐνθεῖα ἐπιφανύσῃ συμπίπτῃ τῇ ἀξίμετρῳ ἢ ἀξί τῆς ἀφῆς ὡς ἐκείνη ἀνομήν τῇ ἀξίμετρῳ ἐπὶ αὐτὰ ἢ τομῆς, τὰς ἀνομήνας ἐν τῇ τομῇ ὡς ἐπὶ ἐφαπτομένη διχα τέμνῃ.

SIT parabola, cujus diametar $AB\Delta$, & recta AG sectionem contingat; per Γ vero ducatur $\Theta\Gamma M$ parallela AD ; &, sumpto in sectione quovis puncto Λ , ducatur ΛNZ ipsi AG parallela: dico ΛN ipsi NZ æqualem esse.

Ducantur enim ordinatim $B\Theta$, KZH , $\Lambda M\Delta$. & quoniam ex iis, quæ in quadragesimo secundo theoremate demonstravimus, triangulum $E\Lambda\Delta$ æquale est parallelogrammo $B\Lambda M$, & triangulum BZH parallelogrammo BK : parallelogrammum igitur reliquum $H\Lambda M$ æquatur quadrilatero $\Lambda ZH\Delta$. commune auferatur $M\Delta HZN$ quinquelaterum: reliquum igitur triangulum KZN reliquo ΛMN erit æquale. sed KZ [ex hyp.] parallela est ipsi ΛM : ergo [per 4. 6. & 14. 5.] ZN ipsi ΛN æqualis erit.



ΕΣΤΩ ὡς ἐκείνη, ἥς ἀξίμετρος ἡ $AB\Delta$, καὶ ἐφαπτομένη ἡ AG , διὰ ἣς Γ τῇ AD ὡς ἐκείνη $\Theta\Gamma M$, καὶ ἐκείνη ΛNZ ἡ AG ὡς ἐκείνη $\Theta\Gamma M$, καὶ ἐκείνη ΛNZ ἡ AG ὡς ἐκείνη $\Theta\Gamma M$. λέγω ὅτι ἐστὶ ἴση ἡ ΛN τῇ ZN .


Ἡχθῶσιν πενταγώνως αἱ $B\Theta$, ZHK , $\Lambda M\Delta$. ἐπεὶ ἔν, διὰ τὰς διεδέγμενα ἐν τῷ $\mu\delta'$. διαστήματι, ἴσων ἐστὶ τὸ $E\Lambda\Delta$ τριγώνον τῷ $B\Lambda M$ ὡς ἐκείνῳ ὡς ἐκείνῳ BZH τῷ BK . λοιπὸν ἄρα τὸ $H\Lambda M$ ὡς ἐκείνῳ ὡς ἐκείνῳ $\Lambda ZH\Delta$ πενταγώνως.

πλευρῶν ἐστὶ ἴσων. κοινὸν ἀφαιρεθῶν τὸ $M\Delta HZN$ πενταπλευρον. λοιπὸν ἄρα τὸ KZN τρίγωνον τῷ ΛMN ἴσων ἐστὶ καὶ ὡς ἐκείνῳ ὡς ἐκείνῳ ἡ KZ τῇ ΛM , ἴση ἄρα ἡ ZN τῇ ΛN .

EUTOCIUS.

Hoc theorema plures casus habet. demonstrabimus autem habita ratione casuum quadragesimi secundi theorematism; ut exempli causa, si Z cadat in B , ita dicemus. Quoniam triangulum $B\Delta\Lambda$ [per 42. huj.] æquale est parallelogrammo $\Theta B\Delta M$, commune auferatur $N M \Delta B$; erit reliquum $\Lambda M N$ triangulo $\Theta N B$ æquale.

In reliquis autem sic. Quoniam triangulum $\Lambda E\Delta$ parallelogrammo $\Theta B\Delta M$ est æquale, & triangulum HZE parallelogrammo ΘBHK : erit reliquum $Z\Lambda\Delta H$ æquale reliquo $K H \Delta M$. commune auferatur $N M \Delta H Z$. ac reliquum $\Lambda N M$ triangulo $K Z N$ æquale est.



Τὸ τοῦ διαστήματος πλάτος ἔχει πλάτος. δεικνύμεν ὅς ἐστι ἴση ἡ ZN τῇ ΛN . ὡς ἐκείνη $\mu\delta'$. ἀποδείξεως δὲ ἔχειν, ἐὰν τὸ Z ἐπὶ τὸ B πίπτῃ, αὐτόθεν ἱσθμεν. ἐπεὶ τὸ $B\Lambda\Delta$ ἴσων ἐστὶ τῷ $\Theta B\Delta M$, κοινὸν ἀφαιρεθῶν τὸ $N M \Delta B$. λοιπὸν ἄρα τὸ $\Lambda M N$ τῷ $\Theta N B$ ἴσων ἐστὶ.

Επὶ δὲ τῶν λοιπῶν ἱσθμεν. ἐπειδὴ τὸ $\Lambda E\Delta$ τῷ $\Theta B\Delta M$ ἴσων ἐστὶ, καὶ τὸ HZE τῷ ΘBHK . λοιπὸν ἄρα τὸ $Z\Lambda\Delta H$ τοῦ $K H \Delta M$ ἴσων ἐστὶ. κοινὸν ἀφαιρεθῶν τὸ $N M \Delta H Z$. καὶ τὸ λοιπὸν τὸ $\Lambda N M$ τῷ $K Z N$ ἴσων ἐστὶ.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ μζ.


Εάν ὑπερβολῆς, ἢ ἐλλείψεως, ἢ κύκλου περιφερείας εὐθεῖα ὁπιφανέσθαι συμπίπτῃ τῇ διαμέτρῳ, καὶ διὰ τῆς ἀφ᾽ ἑκῆς κέντρου εὐθεῖα ἀχθῇ ὁπὶ τὰ αὐτὰ τὸ τομῆς· διχα πμεῖται ἀγμοδύας ἐν τῇ τομῇ καὶ πλὴν ἐφαπτομένη.

PROP. XLVII. Theor.

Si hyperbolam, vel ellipsum, vel circuli circumferentiam recta linea contingens cum diametro conveniat; & per tactum & centrum ducatur recta ad easdem partes ad quas sectio: rectas quæ in sectione ducuntur contingenti parallelas bifariam secabit.

ΕΣΤΩ ὑπερβολῆς, ἢ ἐλλείψεως, ἢ κύκλου περιφερείας, ἧς διάμετρος μὲν ἡ ΑΒ, κέντρον δὲ τὸ Γ, ἐφαπτομένη δὲ τομῆς ἡχθῇ ἡ ΔΕ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΓΕ ἐκκεντρώσθω, καὶ ἐληφθῶ τυχὸν σημεῖον ἐπὶ τῇ τομῇ τὸ Ν, καὶ διὰ τὸ Ν τῇ ΔΕ ὁμοεισέλευστος ἡχθῇ ἡ ΘΝΟΗ· λέγω ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΝΟ τῇ ΟΗ.

SIT hyperbola, vel ellipsis, vel circuli circumferentia, cujus diameter AB, centrum Γ, ducaturque ΔΕ sectionem contingens, & juncta ΓΕ producat; sumpto autem in sectione quovis puncto Ν, ducatur per Ν linea ΘΝΟΗ ipsi ΔΕ parallela: dico ΝΟ ipsi ΟΗ æqualem esse.




Κατήχθωσιν γὰρ πεταγμοδύας αἱ ΕΝΖ, ΒΛ, ΗΜΚ· διὰ τὰς δεδεδυγμένας ἄρα ἐν τῷ μγ'. θεωρήματι, ἴσον ἐστὶ τὸ μὲν ΘΝΖ τρίγωνον τῷ ΑΒΖΞ τετραπλεύρῳ, τὸ δὲ ΗΘΚ τρίγωνον τῷ ΑΒΚΜ· καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ ΝΗΚΖ τετραπλῦρον λοιπῷ τῷ ΜΚΖΞ ἐστὶν ἴσον. κοινὸν ἀφαιρήσθω τὸ ΟΝΖΚΜ πεντάπλευρον· λοιπὸν ἄρα τὸ ΟΜΗ τρίγωνον λοιπῷ τῷ ΝΞΟ ἐστὶν ἴσον. καὶ ἐστὶ ὁμοεισέλευστος ἡ ΜΗ τῇ ΝΞ· ἴση ἄρα ἡ ΝΟ τῇ ΟΗ.

Applicentur enim ordinatim ΕΝΖ, ΒΛ, ΗΜΚ: ergo, ex demonstratis in quadragesimo tertio theoremate, triangulum ΘΝΖ æquale erit quadrilatero ΑΒΖΞ, & ΗΘΚ triangulum quadrilatero ΑΒΚΜ: reliquum igitur ΝΗΚΖ quadrilaterum reliquo ΜΚΖΞ est æquale. commune auferatur ΟΝΖΚΜ quinquelaterum: atque erit reliquum triangulum ΟΜΗ æquale reliquo ΟΞΝ. atque est ΜΗ parallela ipsi ΝΞ: ergo [per 4.6. & 14.5.] ΝΟ ipsi ΟΗ est æqualis.

EUTOCIUS.

Τὸ τοῦ θεωρήματος ἐπὶ μὲν τῆς ὑπερβολῆς πτώσεως ἔχει ὅσους τὸ πρὸς αὐτῇ ἐπὶ τῇ παραβολῇ ὅχι· τὰς δὲ ἀποδείξεις αὐτῶν ποιήσονται τῷ μγ'. θεωρήματος· καὶ ἐπὶ τῇ ἐλλείψει τὰς ἀποδείξεις ἐκ τῆς πτώσεως τῷ μγ'. οἷον ἐπὶ τῆς ὑπερβολῆς κατασκευῆς, τῇ Η σημείῳ ἐκτὸς εὐκλειδῆς. ἐπειδὴ ἴσον ἐστὶ τὸ ΑΛΓ τρίγωνον τῷς ΘΗΩ, ΩΓΜ,



Hoc theorema in hyperbola tot habet casus quot habebat præcedens in parabola: demonstrationes autem eorum faciemus, attendentes ad casus quadragesimi tertii theorematis: pariterque in ellipsi, ut in subiecta figura, cum punctum Η extra sumitur. quoniam triangulum ΑΛΓ æquale est triangulis ΘΗΩ, ΩΓΜ, hoc est triangu-

lis $\Theta\Gamma$, ΘH ; atque est idem triangulum $\Lambda\text{A}\Gamma$ æquale triangulo $\pi\text{ΠΓ}$ & quadrilatero $\Lambda\text{A}\Pi\pi$, sive triangulo $\text{N}\Theta\text{Π}$, ex iis quæ demonstrata sunt in quadragesimo tertio theoremate: erunt igitur tria-
 $\pi\text{ΠΓ}$, $\text{N}\Theta\text{Π}$ æqualia triangulis $\Theta\Gamma$, ΘH . com-
 mune auferatur triangulum $\Theta\text{O}\Gamma$: reliquum igitur tri-
 angulum $\pi\text{O}\text{N}$ æquale est reliquo HOM . & est $\text{N}\pi$
 parallela ipsi MH ; ergo NO ipsi OH est æqualis.


τὸ $\pi\text{O}\text{N}$ τῶν $\Theta\Gamma, \Theta\text{H}$ περιώνυται, τὸ δὲ $\Lambda\text{A}\Gamma$ ἴσον ἐστὶ
 τῷ $\pi\text{ΠΓ}$ περιώνυτον καὶ τῷ $\Lambda\text{A}\Pi\pi$ πενταγώνῳ, τετάρ-
 τος $\text{N}\Theta\text{Π}$ περιώνυτος, ἀπὸ τῆς διδομένης ἐν τῷ μγ'. Διαφέ-
 ρεται καὶ τὰ $\pi\text{ΠΓ}, \text{N}\Theta\text{Π}$ ἀπὸ τῆς τετραγώνου ἴσου ἐστὶ τῶν $\Theta\Gamma,$
 ΘH περιώνυτον. κοινὸν ἀφαιρούμεν τὸ $\Theta\text{O}\Gamma$ περιώνυτον· λοι-
 πὸν ἴσον τὸ $\pi\text{O}\text{N}$ τῷ HOM ἴσον ἐστὶ. καὶ παράλληλος ἡ
 $\text{N}\pi$ τῇ MH · ἴση δὲ καὶ ἡ NO τῇ OH .

PROP. XLVIII. Theor.

Si unam oppositarum sectionum recta
 linea contingens cum diametro con-
 veniat, & per tactum & centrum
 producta recta secet alteram sec-
 tionem: quæ in altera sectione ducta
 fuerit contingenti parallela à recta
 producta bifariam secabitur.

SINT oppositæ sectiones, quarum diameter
 AB , centrumque Γ , & KA sectionem A contin-
 gat, junctaque $\text{A}\Gamma$
 producat; sum-
 pto autem in B se-
 ctione puncto N ,
 per N ducatur NH ,
 parallela ipsi AK :
 dico NO ipsi OH
 æqualem esse.

Ducatur enim
 per B sectionem
 contingens $\text{E}\Delta$, &
 erit [ex 30. huj.]
 $\text{E}\Delta$ ipsi AK paral-
 lela; quare & ipsi
 NH . quoniam igitur
 hyperbola est
 BEN , cujus centrum Γ , & ΔE sectionem con-
 tingit, & juncta est ΓE ; sumitur autem in se-
 ctione punctum N , per quod ipsi ΔB parallela
 ducta est NH : ex iis quæ in hyperbola [per
 propositionem præced.] ostendimus, erit NO ipsi
 OH æqualis.



ΠΡΟΤΑΣΙΣ μη'.

Εάν μίας τῶν ἀντικειμένων εὐθεῖα ἐπιφανέσθαι συμ-
 πίκτη τῇ ἀσμέτρῳ, καὶ διὰ τῆς ἀφῆς καὶ τῆς
 κέντρον εὐθεῖα ἐκβληθεῖσα τμήν τῆς ἐτέρας το-
 μῆς· ἥτις αὖ ἀρχὴ ἐν τῇ ἐτέρᾳ τομῇ παρὰ
 τῷ ἐφαπτομένῳ δίχα τμηθῇ, ὅτε καὶ
 ἐκβληθείης.

ΕΣΤΩΣΑΝ ἀντικείμεναι, ὧν ἀσμέτρος μὲν
 ἡ AB , κέντρον δὲ τὸ Γ , καὶ τῆς A τομῆς ἐφα-
 πτόν ἡ KA , καὶ
 ἐπιζεύχθω ἡ ΔE
 καὶ ἐκβληθείω, καὶ
 εἰληφθῶ π σημείον
 ἐπὶ τῇ B τομῇ τὸ N ,
 καὶ ἀπὸ τῆς N τῇ AK
 ὁμοπλάτος ἡχθῶ
 ἡ NH . λέγω ὅτι ἡ
 NO τῇ OH ἴση ἐστὶν ἴση.
 Ἡχθῶ γὰρ διὰ τῆς
 E ἐφαπτομένης τῆς το-
 μῆς ἡ $\text{E}\Delta$ · ἡ $\text{E}\Delta$
 ἄρα τῇ AK ὁμοπλά-
 τος ἐστὶν, ὥστε καὶ
 τῇ NH . ἐπεὶ γὰρ ὑπερβολὴ ἐστὶν ἡ BEN , ἥς κέντρον
 τὸ Γ καὶ ἐφαπτομένη ἡ ΔE , καὶ ἐπιζεύκται ἡ ΓE , καὶ
 εἰληφθῇ ἐπὶ τῇ τομῇ σημείον τὸ N , καὶ δι' αὐτὴν πε-
 ραχθῇ ἡ NH . διὰ τὸ ὁμοπλάτους ἐστὶν ὅτι
 τῇ ὑπερβολῇ, ἴση ἐστὶν ἡ NO τῇ OH .

EUTOCIUS.

Hujus etiam theorematism casus ita se habent, ut in
 quadragesimo septimo theoremate dictum est de hy-
 perbolæ descriptione.

Καὶ τότε αἱ πάλαι ὁμοπλάτους ἔχουσιν τοὺς ὁμοπλάτους
 ἐπὶ τῇ μζ'. κατὰ τὴν τῇ ὑπερβολῇ περιγραφῇ.

PROP. XLIX. Theor.

Si parabolam recta linea contingens cum
 diametro conveniat, & per tactum du-
 catur recta diametro parallela; à ver-
 tice vero ducatur parallela ordina-
 tim applicatæ; & fiat ut portio con-
 tingentis inter applicatam & tactum
 interjecta ad portionem parallelæ iti-
 dem inter tactum & applicatam in-
 terjectæ, ita quædam recta ad du-
 plam contingentis: quæ à sectione
 ducta fuerit parallela contingenti, ad

ΠΡΟΤΑΣΙΣ μθ'.

Εάν ὁμοπλάτης εὐθεῖα ἐπιφανέσθαι συμπίκτη τῇ
 ἀσμέτρῳ, καὶ διὰ τῆς ἀφῆς ἀρχὴν παράλληλος
 τῇ ἀσμέτρῳ, ἀπὸ δὲ τῆς κορυφῆς ἀρχὴν παρὰ
 τῇ ἀσμέτρῳ κατὰ τὴν ἀσμέτρῳ, καὶ ποιηθῶς τὸ τμή-
 μα τῆς ἐφαπτομένης τὸ μεταξὺ τῆς ἀσμέτρῳ καὶ
 τῆς ἀφῆς πρὸς τὸ τμήμα τῆς ὁμοπλάτης τὸ με-
 ταξὺ τῆς ἀφῆς καὶ τῆς ἀσμέτρῳ, ὅπως εὐθεῖα τις
 πρὸς τῇ διπλασίᾳ τῆς ἐφαπτομένης· ἥτις αὖ
 ἀπὸ τῆς τομῆς ἀρχὴν παράλληλος τῇ ἐφαπτο-
 μένῃ,

*

ἐκείνη, ὅτι τὸ διὰ τῆς ἀφῆς ἡγεμονία εὐθείαι παρ-
-άλληλοι τῇ διαμέτρῳ, διήσκει τὸ περιεχόμενον
ὀρθογώνιον ὑπὸ πεπορισμένης εὐθείας καὶ τὸ ὑπο-
-λαμβανόμενον ὑπὸ αὐτῆς πρὸς τῇ ἀφῇ.


ΕΣΤΩ παρὰβολή, ἥς διάμετρος ἡ ΜΒΓ, ἐφα-
-πτιμένη ἢ ἡ ΓΔ, καὶ διὰ τῆς ΒΓ παρὰβάλ-
-ληλος ἡ ΧΔΝ, πεπορισμένης ἢ ἀνήχθω ἡ
ΖΒ, ἢ πεπορισθῶ ὡς ἡ ΕΔ πρὸς ΔΖ ἕτως εὐθεί-
-ας ἡ Η πρὸς τὴν διπλασίαν τῆς ΓΔ, καὶ ἀνέχθω π-
-σημείον ὅπῃ τῆς πεμῆς τὸ Κ, ἢ ἀνέχθω διὰ τῆς Κ τῇ
ΓΔ παρὰβάλληλος ἡ ΚΑΠ· λέγω ὅτι τὸ διὰ τῆς ΚΑ
ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῆς Η ἢ τῆς ΔΑ, τετέστιν ὅτι, δι-
-αμέ-
-τρος ἡ ΔΑ, ὀρθία ἐστὶν ἡ Η.

Κατήχθωσαν γὰρ πεπορισμένης αἱ ΔΞ, ΚΝΜ.
καὶ ἐπεὶ ἡ ΓΔ ἐφάπτεται τῆς πεμῆς, πεπορισμένης δὲ
κατήχεται ἡ ΔΞ, ἴση ἐστὶν ἡ
ΓΒ τῇ ΒΞ. ἢ δὲ ΒΞ τῇ
ΖΔ ἴση ἐστὶν καὶ ἡ ΓΒ ἄρα
τῇ ΖΔ ἐστὶν ἴση ὡς καὶ τὸ
ΕΓΒ τρίγωνον τῷ ΕΖΔ
τρίγωνῳ. κοινὸν προσκείσθω
τὸ ΔΕΒΜΝ σχῆμα· τὸ
ἄρα ΔΓΜΝ πεπορισμένον
τῷ ΖΜ παρὰβάλλη-
-λογράμμῳ ἐστὶν ἴσον, τετέστι
τῷ ΚΠΜ τετράγωνῳ. κοι-
-νὸν ἀφαιρεθῶ τὸ ΑΠΜΝ
πετράπλευρον· λοιπὸν ἄρα
τὸ ΚΑΝ τρίγωνον τῷ ΓΑ

παρὰβάλληλογράμμῳ ἐστὶν ἴσον. καὶ ἐστὶν ἴση ἡ ὑπὸ
ΔΑΠ γωνία τῇ ὑπὸ ΚΑΝ· διπλασίαν ἄρα
ἐστὶ τὸ ὑπὸ ΚΑΝ τῷ ὑπὸ ΔΑΓ. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν
ὡς ἡ ΕΔ πρὸς ΔΖ ἕτως ἡ Η πρὸς τὴν δι-
-πλασίαν τῆς ΓΔ, ἐστὶ δὲ καὶ ὡς ἡ ΕΔ πρὸς ΔΖ
ἕτως ἡ ΚΑ πρὸς ΑΝ· καὶ ὡς ἄρα ἡ Η πρὸς
τὴν διπλασίαν τῆς ΓΔ ἕτως ἡ ΚΑ πρὸς ΑΝ.
ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΚΑ πρὸς ΑΝ ἕτως τὸ διὰ τῆς ΚΑ
πρὸς τὸ ὑπὸ ΚΑΝ, ὡς δὲ ἡ Η πρὸς τὴν δι-
-πλασίαν τῆς ΔΓ ἕτως τὸ ὑπὸ Η, ΔΑ πρὸς
τὸ δις ὑπὸ ΓΔΑ· ὡς ἄρα τὸ διὰ τῆς ΚΑ
πρὸς τὸ ὑπὸ ΚΑΝ ἕτως τὸ ὑπὸ Η, ΔΑ πρὸς
τὸ δις ὑπὸ ΓΔΑ, καὶ ἀναλλὰξ. ἴσον δὲ ἐστὶ τὸ
ΚΑΝ τῷ δις ὑπὸ ΓΔΑ· ἴσον ἄρα καὶ τὸ διὰ
τῆς ΚΑ τῷ ὑπὸ Η, ΔΑ.

EUTOCIUS.

Ἐπομένως ἄρα ΚΑΝ τρίγωνον τῷ ΔΑΠΓ παρὰβάλ-
-ληλογράμμῳ ἐστὶν ἴσον. καὶ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΔΑΠ γω-
-νία τῇ ὑπὸ ΚΑΝ γωνίᾳ· διπλασίαν ἄρα ἐστὶ τὸ ὑπὸ
ΚΑΝ τῷ ὑπὸ ΔΑΓ. [ἐκείνου γὰρ χωρὶς τὸ
ΚΑΝ τρίγωνον, καὶ
τὸ ΔΑΠΓ παρὰβάλ-
-λογράμμῳ. καὶ ἐπὶ
ἴσον ἐστὶ τὸ ΚΑΝ τρι-
-γωνον τῷ ΔΑΠ παρὰβάλληλογράμμῳ, ἡ ΧΔΝ διὰ τῆς Ν τῇ ΑΚ
παρὰβάλληλος ἢ ΝΡ, διὰ δὲ τῆς Ε τῇ ΑΝ ἢ ΚΡ· παρὰβάλ-
-λη-



rectam quæ per tactum ducitur dia-
metro parallelam, poterit rectangulum
contentum sub inventa linea & ea quæ
inter ipsam & tactum interjicitur.

SIT parabola cujus diameter MBG; & ΓΔ
sectionem contingat; per Δ vero ipsi ΒΓ
parallela ducatur ΖΔΝ; & ΖΒ ordinatim ap-
plicetur; fiatque ut ΕΔ ad ΔΖ ita quædam
recta Η ad duplam ipsius ΓΔ; & sumpto in
sectione puncto Κ, ducatur per Κ ipsi ΓΔ paral-
lela ΚΑΠ: dico quadratum ex ΚΑ æquale esse
rectangulo sub Η & ΔΑ; hoc est, diametro ex-
istente ΔΑ, lineam Η esse rectum latus.


Applicentur enim ordinatim ΔΞ, ΚΝΜ. &
quoniam ΓΔ sectionem contingit, ordinatim vero
applicata est ΔΞ; erit
[per 4.6.] ΓΒ æqualis ΒΞ.
sed [per 35. huj.] ΒΞ
est æqualis ΖΔ: ergo ΓΒ
ipsi ΖΔ æqualis erit; &
propterea [per 33. 1.] tri-
angulum ΕΓΒ æquale tri-
angulo ΕΖΔ. commune
addatur, figura scilicet
ΔΕΒΜΝ: quadrilaterum
igitur ΔΓΜΝ æquale est
parallelogrammō ΖΜ, hoc
est [per 42. huj.] triangulo
ΚΠΜ. commune aufera-
tur quadrilaterum ΑΠΜΝ:
ergo reliquum triangu-

lum ΚΑΝ parallelogrammō ΑΓ est æquale. an-
gulus autem ΔΑΠ [per 15. 1.] æqualis est angulo
ΚΑΝ: quare [per Pappi lem. 8.] rectangulum ΚΑΝ
duplum est rectanguli ΑΔΓ: quoniam igitur [ex
hyp.] ut ΕΔ ad ΔΖ ita est linea Η ad duplam
ipsius ΓΔ, & [per 4. 6.] ut ΕΔ ad ΔΖ ita ΚΑ
ad ΑΝ; erit ut Η ad duplam ΓΔ ita ΚΑ ad ΑΝ.
sed [per 1. 6.] ut ΚΑ ad ΑΝ ita quadratum ex
ΚΑ ad rectangulum ΚΑΝ; & ut Η ad duplam
ΓΔ ita rectangulum sub Η & ΔΑ ad duplum
rectanguli ΓΔΑ: quare ut quadratum ex ΚΑ ad
rectangulum ΚΑΝ ita rectangulum sub Η & ΔΑ
ad duplum ipsius ΓΔΑ rectanguli; & [per 16.
5.] permutando. est autem [ex modo ostensis]
ΚΑΝ rectangulum æquale duplo rectanguli ΓΔΑ:
ergo [per 14. 5.] quadratum ex ΚΑ rectangulo
sub Η & ΔΑ æquale erit.

Ergo reliquum triangulum ΚΑΝ parallelo-
grammō ΑΠΓ est æquale. angulus autem ΔΑΠ
æqualis est angulo ΚΑΝ: quare rectangulum
ΚΑΝ duplum est
rectanguli ΑΔΓ.]
Triangulum enim
ΚΑΝ seorsim de-
scribatur, itemque
parallelogrammum
ΑΠΓ. & quo-
niam triangulum ΚΑΝ æquale est parallelogrammō
ΑΠ, ducatur per Ν ipsi ΑΚ parallela ΝΡ, & per Κ
ducatur ΚΡ parallela ipsi ΑΝ: parallelogrammum igitur

tur est ΔP , & duplum trianguli ΔAN ; quare & parallelogrammi $\Delta \Pi$ duplum. producantur $\Delta \Gamma$, $\Delta \Pi$ ad puncta Σ , T , ponaturque ipsi $\Delta \Gamma$ æqualis $\Gamma \Sigma$, & ΠT æqualis ipsi $\Delta \Pi$, & jungatur ΣT : ergo ΔT parallelogrammum est duplum ipsius $\Delta \Pi$, & idcirco ΔP parallelogrammum æquale parallelogrammo $\Delta \Sigma$. est autem & æquiangulum, quoniam anguli ad Δ secundum verticem sunt æquales. sed [per 14.6.] æqualium & æquiangulorum parallelogrammorum latera quæ circa æquales angulos sunt reciproce proportionalia. ergo ut $\Delta \Lambda$ ad ΔT , hoc est ad $\Delta \Sigma$, ita $\Delta \Lambda$ ad ΔN ; proptereaque [per 16.6.] rectangulum $\Delta \Lambda N$ æquale est rectangulo $\Delta \Delta \Sigma$. & cum $\Delta \Sigma$ dupla sit ipsius $\Delta \Gamma$, rectangulum $\Delta \Lambda N$ rectanguli $\Delta \Delta \Gamma$ duplum erit.

At si recta quidem $\Delta \Gamma$ ipsi $\Delta \Pi$ sit parallela, $\Gamma \Pi$ vero non sit parallela ipsi $\Delta \Delta$; erit $\Delta \Gamma \Pi \Delta$ trapezium: & tunc dico rectangulum $\Delta \Lambda N$ æquale esse ei quod sub $\Delta \Delta$ & utraque ipsarum $\Gamma \Delta$, $\Delta \Pi$ continetur. si enim parallelogrammum ΔP compleatur sicuti prius, producanturque $\Delta \Gamma$, $\Delta \Pi$, ita ut ipsi $\Delta \Pi$ æqualis ponatur $\Gamma \Sigma$, & ipsi $\Delta \Gamma$ æqualis ΠT , & jungatur ΣT ; fiet ΔT parallelogrammum duplum ipsius $\Delta \Pi$, & eadem erit demonstratio. hoc autem utile est ad ea quæ sequuntur.



λόχαμμοι ἄρα ἐστὶ τὸ ΔP , καὶ διπλασίον $\Delta \Lambda N$ τριγώνου ὡς καὶ τὸ $\Delta \Pi$ ὁμοειδέος ἑστί. ἐκτείνουσι δὲ αἱ $\Delta \Gamma$, $\Delta \Pi$ ἐπὶ ταῖς Σ , T , καὶ κείδω τῇ $\Delta \Gamma$ ἴσην $\Gamma \Sigma$, τῇ δὲ $\Delta \Pi$ ἴσην ΠT , καὶ ἐπιεύχθω ΣT . παραλληλόγραμμοι ἄρα ἐστὶ τὸ ΔT διπλασίον $\Delta \Pi$. ὡς ἴσον τὸ ΔP τῷ $\Delta \Sigma$. ἐστὶ δὲ τὸ ΔT καὶ ἰσογώνιον, ἀφ' οὗ τὰς ὁμοίας τῶν Δ γωνίας κατὰ κορυφὴν ἴσους ἴσους εἶναι. τῶν δὲ ἴσων ἰσογώνιων παραλληλόγραμμοι ἀντιπαραπύδασιν αἱ ὑπὸ ταῖς ἴσας γωνίας περικλειόμεναι ἄρα ὡς $\Delta \Lambda$ ὁμοίας τῶν ΔT , τὸ $\Delta \Lambda$ ὁμοίας $\Delta \Sigma$, ὡς $\Delta \Lambda$ ὁμοίας ΔN , καὶ τὸ ὑπὸ $\Delta \Lambda N$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ $\Delta \Delta \Sigma$. καὶ ἐπεὶ διπλασίον ἐστὶ $\Delta \Sigma$ τῷ $\Delta \Gamma$, τὸ ὑπὸ $\Delta \Lambda N$ διπλασίον ἐστὶ τῷ $\Delta \Delta \Gamma$.

Ἐάν δὲ ἡ $\Delta \Gamma$ τῇ $\Delta \Pi$ ἐστὶ παράλληλος, ἡ δὲ $\Gamma \Pi$ τῇ $\Delta \Delta$ μὴ ἐστὶ παράλληλος, τραπέζιον μὲν διανοῦται ἐστὶ τὸ $\Delta \Gamma \Pi \Delta$. καὶ ὅτως δὲ ὅμιον, ὅτι τὸ ὑπὸ $\Delta \Lambda N$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ $\Delta \Delta$ καὶ συναμφοτέρω $\Gamma \Delta$, $\Delta \Pi$. ἔάν γὰρ τὸ ΔP ἀναπληρωθῇ, ὡς περιέγραψαμεν, ἐκτείνουσι δὲ καὶ $\Delta \Gamma$, $\Delta \Pi$, καὶ περὶ τῇ $\Delta \Gamma$ ἴσην $\Gamma \Sigma$, τῇ δὲ $\Delta \Pi$ ἴσην ΠT , καὶ ἐπιεύχθω ΣT . παραλληλόγραμμοι ἄρα ἐστὶ τὸ ΔT διπλασίον τῷ $\Delta \Pi$, καὶ ἡ ἀποδείξις ἡ αὐτή. ἀρμόσιον χρησίμως δὲ τὸ ΔT εἰς τὰ ἐξῆς.

PROP. L. Theor.

Si hyperbolam, vel ellipsum, vel circuli circumferentiam recta linea contingens cum diametro conveniat; & per tactum & centrum recta producat; à vertice autem ordinatim applicata conveniat cum ea quæ ducitur per tactum & centrum; fiatque ut portio contingentis inter tactum & applicatam interjecta ad portionem ductæ per tactum & centrum, quæ itidem inter tactum & applicatam interjicitur, ita quædam recta ad duplam contingentis: quæ à sectione ducitur contingenti parallela ad rectam per tactum & centrum ductam, poterit spatium rectangulum quod adjacet inventæ rectæ, latitudinem habens interjectam inter ipsam & tactum; in hyperbola quidem excedens figurâ simili contentæ sub duplâ ejus quæ est inter centrum & tactum & inventâ lineâ; in ellipsi vero & circulo, eadem deficiens.

SIT hyperbola, vel ellipsis, vel circuli circumferentia, cujus diameter AB , centrum Γ ; & ΔE sectionem contingat; juncta vero ΓE producat ad utraq; partes; ponaturque ΓK ipsi ΓE æqualis; & per B ordinatim applicetur BZH ; deinde per E ad rectos angulos ipsi ΓE ducatur $B\Theta$; fiatque ut ZE ad EH ita $E\Theta$ ad duplam ipsius $B\Delta$, & juncta ΘK

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Ι΄.

Εάν ὑπερβολῆς, ἢ ἐλλείψεως, ἢ κύκλου περιφερείας εὐθεῖα δῆμιανύσῃ συμπίπτῃ τῇ διαμέτρῳ, καὶ ἀφ' αὐτῆς καὶ ἐκέντρῳ εὐθεῖα ἐκβληθῇ, ἀπὸ δὲ τῆς κορυφῆς ἀναχθῆσῃ εὐθεῖα ὁμοειδέος τεταγμένης κατὰ τὴν συμπίπτῃ τῇ ἀφ' αὐτῆς καὶ ἐκέντρῳ ἡγεμένη εὐθείᾳ, καὶ περὶ δὲ ὡς τὸ τμήμα τῆς ἐφαπτομένης τὸ μεταξὺ τῆς ἀφ' αὐτῆς καὶ τῆς ἀντιγόμενης πρὸς τὸ τμήμα τῆς ἡγεμένης ἀφ' αὐτῆς καὶ ἐκέντρῳ τὸ μεταξὺ τῆς ἀφ' αὐτῆς καὶ τῆς ἀντιγόμενης, ὅπως εὐθεῖα τις πρὸς τὴν διπλασίαν τῆς ἐφαπτομένης ἢ πρὸς αὐτὴν τομῆς ἀχθῇ ὁμοειδέος τῇ ἐφαπτομένῃ, ὅτι τὸ διὰ τῆς ἀφ' αὐτῆς καὶ ἐκέντρῳ ἡγεμένης διωθήσεται τὸ χρεῖον ὀρθογώνιον ὁμοειδέος ὁμοειδέος τῇ ἐφαπτομένῃ, πλάτος ἔχον τὸ ἀπὸ τομῆς ἐφαπτομένης ὑπ' αὐτῆς πρὸς τῇ ἀφ' αὐτῆς, ὅτι μὲν τὸ ὑπερβολῆς, ὑπερέβαλλον εὐθεῖα ὁμοειδέος πρὸς τῇ ἐφαπτομένῃ ὑπὸ τῆς διπλασίας τῆς μεταξὺ τῆς ἀφ' αὐτῆς καὶ τῆς ἀντιγόμενης εὐθείας, ὅτι δὲ τὸ ἐλλείψεως καὶ ἐκ κύκλου, ἐλλείπει.


ΕΣΤΩ ὑπερβολῆς, ἢ ἐλλείψεως, ἢ κύκλου περιφερείας, ἥς διάμετρος ἡ AB , κέντρον δὲ τὸ Γ , ἐφαπτομένη δὲ ἡ ΔE , καὶ ἐκ τῆς ἀφ' αὐτῆς ἐκβληθῇ εὐθεῖα ἐκέντρῳ εὐθεῖα ἐκβληθῇ, ἀπὸ δὲ τῆς κορυφῆς ἀναχθῆσῃ εὐθεῖα ὁμοειδέος τεταγμένης κατὰ τὴν συμπίπτῃ τῇ ἀφ' αὐτῆς καὶ ἐκέντρῳ ἡγεμένη εὐθείᾳ, καὶ περὶ δὲ ὡς τὸ τμήμα τῆς ἐφαπτομένης τὸ μεταξὺ τῆς ἀφ' αὐτῆς καὶ τῆς ἀντιγόμενης πρὸς τὸ τμήμα τῆς ἡγεμένης ἀφ' αὐτῆς καὶ ἐκέντρῳ τὸ μεταξὺ τῆς ἀφ' αὐτῆς καὶ τῆς ἀντιγόμενης, ὅπως εὐθεῖα τις πρὸς τὴν διπλασίαν τῆς ἐφαπτομένης ἢ πρὸς αὐτὴν τομῆς ἀχθῇ ὁμοειδέος τῇ ἐφαπτομένῃ, ὅτι τὸ διὰ τῆς ἀφ' αὐτῆς καὶ ἐκέντρῳ ἡγεμένης διωθήσεται τὸ χρεῖον ὀρθογώνιον ὁμοειδέος ὁμοειδέος τῇ ἐφαπτομένῃ, πλάτος ἔχον τὸ ἀπὸ τομῆς ἐφαπτομένης ὑπ' αὐτῆς πρὸς τῇ ἀφ' αὐτῆς, ὅτι μὲν τὸ ὑπερβολῆς, ὑπερέβαλλον εὐθεῖα ὁμοειδέος πρὸς τῇ ἐφαπτομένῃ ὑπὸ τῆς διπλασίας τῆς μεταξὺ τῆς ἀφ' αὐτῆς καὶ τῆς ἀντιγόμενης εὐθείας, ὅτι δὲ τὸ ἐλλείψεως καὶ ἐκ κύκλου, ἐλλείπει.

ἵπτι δὲ ἄλλοις ἢ ΘΚ ἐκδοθέντων, καὶ εἰληφθῶσι π
ἵπτι τὴν περὶ σημείων τὸ Α, καὶ δι' αὐτῆς τῇ ΕΔ παρ-
άλληλος ἡχθῶσι ἡ ΑΜΞ, τῇ ΒΗ ἡ ΑΝΡ, τῇ δὲ
ΕΘ ἡ ΜΠ· λέγω ὅτι τὸ ἀπὸ ΑΜ ἴσον ἐστὶ τῷ
ὑπὸ ΕΜΠ.

Ἡχθῶσι γὰρ διὰ τῆς Γ τῇ ΚΠ ὁμογώνιος ἡ ΓΣΟ.
καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΕΓ τῇ ΚΓ, ὡς ἡ ΕΓ πρὸς ΚΓ
ἕτως ἡ ΕΣ πρὸς ΣΘ· ἴση ἄρα ἔστω ἡ ΕΣ τῇ ΣΘ.
καὶ ἐπεὶ ἴση ὡς ἡ ΖΕ πρὸς ΕΗ ἕτως ἡ ΘΕ πρὸς τὴν
διπλασίαν τὴν ΕΔ, ἔστι τὸ ΕΘ ἡμίση ἡ ΕΣ· ἔστι
ἄρα ὡς ἡ ΖΕ πρὸς ΕΗ ἕτως ἡ ΣΕ πρὸς ΕΔ. ὡς
ἡ ΖΕ πρὸς ΕΗ ἕτως ἡ ΑΜ πρὸς ΜΡ· ὡς ἄρα

producatur; sumpto denique in sectione puncto
Α, per ipsum ducatur ΑΜΞ ipsi quidem ΒΔ
parallela; ΑΝΡ vero parallela ipsi ΒΗ; ipsique
ΕΘ parallela ΜΠ: dico quadratum ex ΑΜ
rectangulo ΒΜΠ æquale esse.

Ducatur enim per Γ recta ΓΣΟ parallela ipsi
ΚΠ. itaque quoniam ΕΓ æqualis est ipsi ΚΓ, &
[per 2. 6.] ut ΕΓ ad ΓΚ ita ΕΣ ad ΣΘ; erit
ΒΣ ipsi ΣΘ æqualis. & quoniam [ex hyp.]
ut ΖΕ ad ΕΗ ita ΘΒ ad duplam ΕΔ, atque
est ipsius ΒΘ dimidia ΕΣ: erit ut ΖΒ ad ΕΗ
ita ΣΒ ad ΕΔ. ut autem ΖΕ ad ΕΗ ita [per
4. 6.] ΑΜ ad ΜΡ: ergo ut ΑΜ ad ΜΡ ita



ἡ ΑΜ πρὸς ΜΡ ἕτως ἡ ΣΕ πρὸς ΕΔ. καὶ ἐπεὶ τὸ
ΡΝΓ τριγώνον ἔστω ΗΒΓ τριγώνον, τεταῖσι δὲ ΓΔΕ,
ἵπτι μὲν τὸ ὑπερβολῆς μετὰ εὐθείᾳ, ἵπτι δὲ τὸ ἐλ-
λίψιος καὶ τὸ κύκλου ἔλασσαν τῷ ΑΝΞ· κοινῶν
ἀφαιρέντων, ἵπτι μὲν τὸ ὑπερβολῆς τὴν περὶ ΕΓΔ
τριγώνον καὶ τὸ ΝΡΜΞ τετραπλεύρου, ἵπτι δὲ τὸ ἐλ-
λίψιος ἔστω κύκλου ἔστω ΜΞΓ τριγώνον· τὸ ΑΜΡ
τριγώνον τῷ ΜΕΔΞ τετραπλεύρῳ ἐστὶν ἴσον. καὶ ἐπὶ
ὁμογώνιος ἡ ΜΞ τῇ ΔΕ, ἡ δὲ ὑπὸ ΑΜΡ γωνία
τῇ ὑπὸ ΕΜΞ ἐστὶν ἴση· ἴσον ἄρα ἐστὶ τὸ ὑπὸ ΑΜΡ
τῷ ὑπὸ ΕΜΞ καὶ συναμφοτέρω τὸ ΕΔ, ΜΞ. καὶ ἐπεὶ
ἐστὶν ὡς ἡ ΜΓ πρὸς ΓΕ ἕτως ἡ ΜΞ πρὸς ΔΕ καὶ
ἡ ΜΟ πρὸς ΕΣ· ὡς ἄρα ἡ ΜΟ πρὸς ΕΣ ἕτως
ἡ ΜΞ πρὸς ΔΕ· καὶ συνήντι, ὡς συναμφοτέροις ἡ
ΜΟ, ΕΣ πρὸς ΕΣ ἕτως συναμφοτέροις ἡ ΜΞ, ΕΔ
πρὸς ΕΔ· ἐναλλάξ ἄρα ὡς συναμφοτέρω ἡ
ΜΟ, ΣΕ πρὸς συναμφοτέρον τὸν ΞΜ, ΕΔ ἕτως
ἡ ΣΕ πρὸς ΕΔ. ἀλλ' ὡς μὲν συναμφοτέρω ἡ
ΜΟ, ΕΣ πρὸς συναμφοτέρον τὸ ΜΞ, ΔΕ ἕτως τὸ
ὑπὸ συναμφοτέρω τὸ ΜΟ, ΕΣ καὶ τὸ ΕΜ πρὸς τὸ ὑπὸ

ΣΒ ad ΕΔ. sed cum demonstratum sit [in 43. 1.
huj.] triangulum ΡΝΓ in hyperbola quidem ma-
jus esse quam triangulum ΗΒΓ, hoc est quam
triangulum ΓΔΒ; in ellipsi vero & circulo mi-
nus, ipso ΑΝΞ triangulo: communibus ablatiis,
in hyperbola scilicet triangulo ΕΓΔ & ΝΡΜΞ
quadrilatero, in ellipsi autem & circulo, trian-
gulo ΜΞΓ; erit ΑΜΡ triangulum quadrilatero
ΜΕΔΞ æquale. atque est [ex hyp.] ΜΞ paral-
lela ipsi ΔΕ, & [per 15. 1.] angulus ΑΜΡ æqua-
lis angulo ΒΜΞ; ergo [ex lem. Pappi 8.] rectan-
gulum ΑΜΡ æquale est rectangulo sub ΕΜ &
utraque ipsarum ΕΔ, ΜΞ contento. & quo-
niam [per 4. 6.] ut ΜΓ ad ΓΒ ita & ΜΞ ad ΔΒ
& ΜΟ ad ΕΣ: ut igitur ΜΟ ad ΕΣ ita ΜΞ
ad ΔΒ; & componendo [per 18. 5.] ut utra-
que ΜΟ, ΣΒ ad ΕΣ ita utraque ΜΞ, ΔΕ ad
ΕΔ: quare permutando, ut utraque ΜΟ, ΣΒ
ad utramque ΞΜ, ΕΔ ita ΣΒ ad ΕΔ. sed ut
utramque ΜΟ, ΣΒ ad utramque ΜΞ, ΔΕ ita
[per 1. 6.] rectangulum sub utraque ΜΟ,
ΣΒ & ipsa ΕΜ ad contentum sub utraque
ΜΞ,
Υ

$M\Xi$, $E\Delta$ & EM . ut autem ΣB ad $E\Delta$ ita [ut supra ostensum] ZB ad EH , hoc est [per 4. 6.] ΛM ad MP ; atque adeo [per 1. 6.] quadratum ex ΛM ad rectangulum ΛMP : quare ut rectangulum contentum sub utraque MO , $B\Sigma$ & ME ad contentum sub utraque $M\Xi$, ΔE & EM , ita quadratum ex ΛM ad rectangulum ΛMP ; & permutando, ut rectangulum contentum sub utraque MO , $B\Sigma$ & EM ad quadratum ex $M\Lambda$, ita contentum sub utraque $M\Xi$, ΔE & EM ad ΛMP rectangulum: est autem [ut supra ostensum] rectangulum ΛMP æquale rectangulo sub ME & utraque $M\Xi$, ΔE : ergo quadratum ex ΛM æquale est rectangulo sub EM & utraque MO , ΣE . est autem ΣB ipsi $\Sigma \Theta$ æqualis, & [per 33. 1.] $\Sigma \Theta$ ipsi $O\Pi$: quadratum igitur ex ΛM rectangulo $EM\Pi$ æquale erit.

EUTOCIUS.

Casus hujus theorematum ita se habent ut in quadragesimo tertio, sicut & casus subsequenti theorematum quinquagesimi primi.

συναμφοτέρῃς τῷ $M\Xi$, $E\Delta$ καὶ τῷ EM . ὡς δὲ ἡ ΣE πρὸς $E\Delta$ ὅτως ἡ ZB πρὸς EH , ταύτην ἡ ΛM πρὸς MP , ταύτην τὸ δὲ ΛM πρὸς τὸ ὑπὸ ΛMP ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ συναμφοτέρῃς τῷ MO , $E\Sigma$ καὶ τῆς ME πρὸς τὸ ὑπὸ συναμφοτέρῃς τῷ $M\Xi$, ΔE καὶ τῆς EM ὅτως τὸ δὲ ΛM πρὸς τὸ ὑπὸ ΛMP καὶ ἐναλλαξὶ ὡς τὸ ὑπὸ συναμφοτέρῃς τῆς MO , $E\Sigma$ καὶ τῆς ME πρὸς τὸ δὲ ΛM , ὅτως τὸ ὑπὸ συναμφοτέρῃς τῆς $M\Xi$, $E\Delta$ καὶ τῆς EM πρὸς τὸ ὑπὸ ΛMP . ἴσων δὲ τὸ ὑπὸ ΛMP τῷ ὑπὸ τῆς ME καὶ συναμφοτέρῃς τῷ $M\Xi$, $E\Delta$. ἴσων ἄρα καὶ τὸ δὲ ΛM τῷ ὑπὸ EM καὶ συναμφοτέρῃς τῆς MO , $E\Sigma$. καὶ ἔστιν ἡ μὲν ΣE τῇ $\Sigma \Theta$ ἴση, ἡ δὲ $\Sigma \Theta$ τῇ $O\Pi$. ἴσων ἄρα τὸ δὲ ΛM τῷ ὑπὸ $EM\Pi$.

PROP. LI. Theor.

Si quamlibet oppositarum sectionum recta linea contingens cum diametro conveniat, & per tactum & centrum recta producaturs usque ad alteram sectionem; à vertice vero ducatur recta parallela ordinatim applicatæ, conveniensque cum recta per tactum & centrum ducta; & fiat ut portio contingentis inter applicatam & tactum ad portionem ductæ per tactum & centrum quæ inter tactum & applicatam interjicitur, ita quædam recta ad duplam contingentis: quæ in altera sectione ducitur parallela contingenti ad rectam per tactum & centrum ductam, poterit rectangulum quod adjacet inventæ lineæ, latitudinem habens interceptam inter ipsam & tactum, excedens vero figura simili ei quæ sub linea inter oppositas sectiones interjectâ & inventâ rectâ continetur.

SINT oppositæ sectiones, quarum diameter AB , centrum E ; & ducatur $\Gamma\Delta$ sectionem B contingens, junctaque ΓE producaturs; ordinatim vero applicetur $B\Lambda H$, & fiat ut $\Lambda\Gamma$ ad ΓH ita quædam recta K ad duplam $\Gamma\Delta$: itaque perspicuum est [ex præced.] in sectione $B\Gamma$ lineas parallelas ipsi $\Gamma\Delta$, quæ ducuntur ad rectam $B\Gamma$ productam, posse spatia adjacentia rectæ K , latitudinemque habentia lineam quæ est inter ipsas & tactum, & excedentia figura simili contentæ sub linea ΓZ & K ; dupla est enim $Z\Gamma$ ipsius ΓE . dico igitur idem evenire in sectione $Z\Lambda$.

*


ΠΡΟΤΑΣΙΣ κα'.

Εάν ὁποτέρῃς τῶν ἀντικείμενων εὐθείᾳ ὁπιφαινομένη συμπίπτῃ τῇ διαμέτρῳ, καὶ διὰ τῆς ἀφῆς καὶ ἐκέντρης ἐκβληθῇ τις εὐθεῖα ὡς τῆς ἐτέρης τομῆς, ἀπὸ δὲ τῆς κορυφῆς εὐθείᾳ ἀναχθῇ ὡς τῆς πεταγμένης κατὰ τὴν ἐκέντρη, καὶ συμπίπτῃ τῇ διὰ τῆς ἀφῆς καὶ ἐκέντρης ἡγμένη εὐθείᾳ, καὶ γνηθῇ ὡς τὸ τμήμα τῆς ἐφαπτομένης τὸ μεταξὺ τῆς ἀνηγμένης καὶ τῆς ἀφῆς πρὸς τὸ τμήμα τῆς ἡγμένης διὰ τῆς ἀφῆς καὶ ἐκέντρης τὸ μεταξὺ τῆς ἀφῆς καὶ τῆς ἀνηγμένης, ὅτως εὐθείᾳ τις πρὸς τὴν διπλασίαν τῆς ἐφαπτομένης ἥτις ἐστὶν ἐν τῇ ἐτέρᾳ τῇ τομῇ ἀναχθῇ ὅπῃ τῆς ἀφῆς καὶ ἐκέντρης ἡγμένης εὐθείᾳ παρὰλληλος τῇ ἐφαπτομένῃ, διωθήσεται τὸ ὡς τῆς ἀντικείμενης ὁρθογώνιος παρὰ τὴν πρὸς πομαθῆσθαι, πλάτος ἔχον τὸ ἀπὸ λαμβανομένης ὑπὸ αὐτῆς πρὸς τῇ ἀφῇ, ὑπερβάλλοντι εἶδει ὁμοίῳ τῷ ὡς τῆς ἀντικείμενης ὁρθογώνιος πρὸς τὸ μεταξὺ τῆς ἀντικείμενης καὶ τῆς πρὸς πομαθῆσθαι εὐθείας.

ΕΣΤΩΣΑΝ ἀντικείμεναι, ὡς ἀξίμετρος ἡ AB , κέντρον δὲ τὸ E , καὶ ἡχθῶν τῷ B τομῇ ἐφαπτομένῃ ἡ $\Gamma\Delta$, ἐπεζεύχθω ἡ ΓE καὶ ἐκβληθῶν, καὶ ἡχθῶν πεταγμένης ἡ $B\Lambda H$, καὶ πεποιθῶν ὡς ἡ $\Lambda\Gamma$ πρὸς ΓH ὅτως εὐθεῖα τις ἡ K πρὸς τὴν διπλασίαν τῆς $\Gamma\Delta$. ὅπῃ μὲν ἐν αἱ ἐν τῇ $B\Gamma$ τομῇ ὡς τῆς ἀφῆς καὶ ἐκέντρης ἡγμένης εὐθείᾳ τῇ $\Gamma\Delta$ ὅπῃ τὴν ἐπ' εὐθείας τῇ $E\Gamma$ δύνανται τὸ ὡς τῆς K ὡς τῆς ἀντικείμενης χωρὶς, πλάτη ἔχοντα πρὸς ἀπὸ λαμβανομένης ὑπὸ αὐτῶν πρὸς τῇ ἀφῇ, ὑπερβάλλοντι εἶδει ὁμοίῳ τῷ ὑπὸ $\Gamma Z, K$, φανερόν· διπλασία γάρ ἐστιν ἡ $Z\Gamma$ τῇ ΓE . λέγω δὲ ὅτι ἐστὶν τῇ $Z\Lambda$ τομῇ τὸ αὐτὸ συμβῆσθαι.

ΗΧΘΩ

Ηχθω γὰρ διὰ τὴν Z ἐφαπτομένην τῆς AZ τμήτης ἡ MZ , ἐπεταγμένης ἀνέχθω ἡ AEN . καὶ ἐπεὶ ἀντικειμέναι εἰσιν αἱ BF , AZ , ἐφαπτομένης τῆς αὐτῶν αἱ $ΓΔ$, MZ ἴση ἄρα καὶ παράλληλος ἐστὶν ἡ $ΓΔ$ τῇ MZ . ἴση δὲ καὶ ἡ $ΓΕ$ τῇ EZ . καὶ ἡ $ΒΔ$ ἄρα τῇ $ΕΜ$ ἐστὶν ἴση. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ $ΑΓ$ πρὸς $ΓΗ$ ὅτως ἡ K πρὸς τὴν διπλασίαν τῆς $ΓΔ$, τετρίτη τῆς MZ . ὥς ἄρα ἡ EZ πρὸς ZN ὅτως ἡ K πρὸς τὴν διπλασίαν τῆς MZ . ἐπεὶ ὅν ὑπερβολὴ ἐστὶν ἡ AZ , ἥς ἀξίμετρος ἡ AB , ἐφαπτομένη δὲ ἡ MZ , καὶ πεταγμένης ἡ AN , καὶ ἐστὶν ὡς ἡ EZ πρὸς ZN ὅτως ἡ K πρὸς τὴν διπλασίαν τῆς ZM . ὅσαι ἀνὰ τὸ τῆς τμήτης $ωρὸς$ ἀλλήλοι τῇ ZM ἀχθῶσιν ὅτι τὴν ἐπ' εὐθείας τῇ EZ , διωκόντων τὸ πρὸς ἑαυτὸν ὀρθογώνιον ὑπὸ τῆς K εὐθείας καὶ τῆς ἀπολαμβανομένης ὑπὸ αὐτῶν πρὸς τῷ Z σημείῳ, ὑπερβαλλόν ἐκδίδῃ ὁμοίῳ τῷ ὑπὸ $ΓΖ$, K .



Ducatur per Z linea MZ quæ sectionem AZ contingat; ordinatimque applicetur AEN . & quoniam oppositæ sectiones sunt BF , AZ , atque ipsas contingunt $ΓΔ$, MZ ; erit [ex 30. huj.] $ΓΔ$ ipsi MZ æqualis & parallela. est autem $ΓΕ$ æqualis ipsi EZ : ergo & $ΒΔ$ ipsi $ΕΜ$. sed quoniam ut $ΑΓ$ ad $ΓΗ$ ita [ex hyp.] linea K ad du-

plam ipsius $ΓΔ$, sive MZ ; erit ut EZ ad ZN ita K ad duplam MZ . cum autem AZ hyperbola est, cujus diameter AB , & MZ ipsam contingit; ordinatim vero applicata est AN ; & ut EZ ad ZN ita K ad duplam ZM : ergo [per 50. huj.] quæcunque à sectione ducuntur parallele ipsi MZ ad BZ in directum productam, poterunt rectangulum contentum sub linea K &

interjecta inter ipsas & punctum Z , excedentque figura simili ei quæ sub $ΓΖ$ & K continetur.

Πόρισμα.

Δεδεγμένον δὲ τέτων συμφανές ὅτι ἐν μὲν τῇ ὀρθογώνῃ ἐκάστη τῶν $ωρὸς$ τῆς γενήσεως ἀξίμετρον ἀνομοιῶν εὐθειῶν ἀξίμετρος ἐστὶν ἐν δὲ τῇ ὑπερβολῇ, καὶ τῇ ἐλλείψει, καὶ τῇ ἀντικειμέναις ἐκάστη τῶν $ωρὸς$ τῆς κέντρου ἀνομοιῶν εὐθειῶν. ὁ δὲ ἐν μὲν τῇ ὀρθογώνῃ, αἱ καταγόμεναι ἐφ' ἐκάστην τῶν ἀξίμετρων $ωρὸς$ τῆς ἐφαπτομένης καὶ $ωρὸς$ τῆς αὐτῆς $ωρὸς$ ἀλλήλοις ὀρθογώνια διωκόντων. ἐν τῇ ὑπερβολῇ καὶ τῇ ἀντικειμέναις καὶ $ωρὸς$ τῆς αὐτῆς $ωρὸς$ ἀλλήλοις χωρεῖα ἐν ὑπερβάλλοντι τῷ αὐτῷ εἶδει ἐν τῇ ἐλλείψει καὶ $ωρὸς$ τῆς αὐτῆς $ωρὸς$ ἀλλήλοις καὶ ἐλλείποντι τῷ αὐτῷ εἶδει. ὁ δὲ ἐν παντὶ ὅσα $ωρὸς$ δέδεκαται $ωρὸς$ τῆς τομῆς συμβαίνοντα, συμπαρελαμβανομένη τῶν ἀρχαίων ἀξίμετρων, καὶ τῶν ἄλλων διαμέτρων $ωρὸς$ ἀπολαμβανομένων καὶ αὐτὰ συμβῆσθαι.

EUTOCIUS.

Τὴν ἐκ τῆς γενήσεως ἀξίμετρον λέγει τὴν γενόμενὴν ἐν τῇ κοίτῃ κοίτῃ τῶν τμήτων ὅτι τμήματος ὀρθογώνου καὶ τῆς ἀξίμετρος περιγόνου. ταύτῃ δὲ καὶ ἀρχαίαν ἀξίμετρον λέγει. καὶ φησὶν ὅτι πάντα τὰ δεδωγμένα συμπίπτουσι τῶν τομῶν ἐν τοῖς $ωρὸς$ ἀλλήλοις διατάσσονται, ὑποδιμενόντων τῶν ἀρχαίων ἀξίμετρων, συμβαίνοντα διωκόντων καὶ τῶν ἄλλων πασῶν διαμέτρων ὑποδιμενόντων.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ 6'.

Εὐθείας δεδομένης ἐν ὀρθογώνῳ καὶ ἐν σημείῳ πεπερασμένης, εὐρεῖν ἐν τῇ ὀρθογώνῳ καὶ τῇ τομῇ τῆς κατὰ μέτρον ὀρθογώνου, ἥς ἀξίμετρος ἡ δεδομένη εὐθεῖα, κορυφὴ δὲ τὸ πέρας τῆς εὐθείας ἥς δὲ ἀνὰ τὸ τῆς τομῆς κατὰ χθὲν ὀρθογώνῳ ἀξίμετρος ἐν δεδομένη γωνίᾳ, διωκόντων τὸ πε-

Corollarium.

Itaque his demonstratis perspicuum est [per 46. huj.] in parabola unamquamque rectarum, quæ diametro ex generatione ducuntur parallelæ, diametrum esse; in hyperbola vero, ellipti, & oppositis sectionibus, [per 47. & 48. huj.] unamquamque earum quæ per centrum ducuntur: ideoque in parabola quidem [per 49. huj.] applicatas ad unamquamque diametrum parallelas contingentibus posse rectangula ipsi adjacentia; in hyperbola & oppositis sectionibus [per 50. & 51. huj.] posse rectangula adjacentia ipsi quæ excedunt eadem figurâ; in ellipti autem [per 50. huj.] quæ eadem deficiunt: igitur quæcunque circa sectiones adhibitis principalibus diametris demonstrata sunt, & aliis diametris assumptis eadem quoque contingere.

PROP. LII. Probl.


Rectâ datâ in plano ad unum punctum terminatâ, invenire in plano conic sectionem quæ parabola appellatur, cujus diameter erit data recta & vertex rectæ terminus; quæ vero à sectione ad diametrum in dato angulo applicatur, poterit rectangulum

gulum contentum sub rectâ quæ est inter ipsam & verticem sectionis & alterâ quadam data rectâ.

SIT recta data positione AB ad A punctum terminata, altera autem magnitudine data sit ΓΔ; & datus angulus primum sit rectus: oporteat autem in subiecto plano invenire parabolam, ita ut ejus diameter sit AB; & vertex A, rectum autem figuræ latus ΓΔ, ordinatim ductis in recto angulo applicatis, hoc est, ut AB sit axis.

Producatur AB ad E, fumaturque ipsius ΓΔ quarta pars ΓΗ; & sit EA major quam ΓΗ, inter ipsas autem ΓΔ, EA media proportionalis sit Θ: est igitur [per cor. 20. 6.] ut ΓΔ ad EA ita quadratum ex Θ ad quadratum ex EA. sed ΓΔ est minor quam quadrupla ipsius EA: ergo & quadratum ex Θ quadrati ex EA minus est quam quadruplum; & propterea Θ minor quam dupla ipsius EA. cum igitur duæ rectæ EA majores sint quam Θ; fieri potest [per 22. 1.] ut ex Θ & duabus EA triangulum constituatur. igitur [per 22. 1.] super EA constituitur triangulum EAZ [per prop. 12. 11.] rectum ad subiectum planum, ita ut EA æqualis sit AZ & Θ æqualis ZE; ducaturque [per 31. 1.] AK parallela ipsi EZ, & ZK ipsi EA. deinde

intelligatur conus, cujus vertex Z punctum, basis autem circulus circa diametrum KA, rectus ad planum quod per AZK transit: erit igitur conus ille rectus, quoniam AZ æqualis est ZK. itaque secetur conus plano quod circulo KA æquidistat; faciatque [per 4. huj.] sectionem circulum MNΞ, rectum videlicet ad planum transiens per MZN: & sit circuli MNΞ & trianguli MZN communis sectio MN: quare MN circuli diameter est. communis autem sectio plani subiecti & circuli sit ΞΛ. quoniam igitur circulus MNΞ rectus est ad triangulum MNZ, rectumque est subiectum planum ad triangulum MZN; communis ipsorum sectio ΞΛ [per 19. 1.] ad triangulum MZN, hoc est ad KZA, perpendicularis erit: quare & ad omnes rectas lineas quæ in triangulo ipsam contingunt, adeoque ad utramque ipsarum MN, AB. rursus quoniam conus basim habens circulum MNΞ, verticem vero punctum Z, secatur plano ad triangulum MZN recto, quod sectionem facit circulum MNΞ; & secatur altero plano subiecto secante basim conii secundum rectam ΞΛ perpendicularem ipsi MN, quæ communis est sectio circuli MNΞ & trianguli MZN: communis autem sectio subiecti plani & trianguli MZN, videlicet AB, parallela est lateri conii ZKM: erit [per 11. huj.] conii sectio in subiecto plano facta parabola, cujus diameter AB, & rectæ à sectione



μεχόμενοι ὀρθογώνιοι ἐπὶ τῇ ἀπολαμβάνο-
μένης ὑπὸ αὐτῆς πρὸς τῇ κορυφῇ τῆ τομῆς
καὶ ἐπὶ τῆς πρὸς δοθείσης εὐθείας.

ΕΣΤΩ θύσει δοθεῖσα ἡ AB πεπερασμένη κατὰ
τὸ Α, ἐπὶ τῇ ἡ ΓΔ τῷ μεγέθει, ἡ δὲ δοθεῖσα γωνία
ἔσω πρότερον ὀρθή· δεῖ δὲ εὐρεῖν ἐν τῷ ὑποκείμενῳ ἐπι-
πέδῳ παραβολὴν, ἥς διάμετρος μὲν ἡ AB, κορυφὴ
δὲ τὸ Α, ὀρθὰ δὲ ἡ ΓΔ, αἱ δὲ καταγεόμεναι πεπε-
γμένως ἐν ὀρθῇ γωνίᾳ καταχθῶσιν, ταῦτα ἵνα
ᾄξων ἡ ἡ AB.

Εκτελέσθω ἡ AB ὅτι τὸ Ε, καὶ εἰλήφθω τῇ ΓΔ
τέταρτον μέρος ἡ ΓΗ, τῇ δὲ ΓΗ μέρει ἔσω ἡ ΕΑ, καὶ
τῇ ΓΔ, ΕΑ μέση ἀνάλογον εἰλήφθω ἡ Θ· ἔστω ἄρα
ὡς ἡ ΓΔ πρὸς ΕΑ ὡς τὸ δὲ Θ πρὸς τὸ δὲ ΕΑ.
ἡ δὲ ΓΔ τῇ ΕΑ ἐλάττω ἐστὶν ἡ τετραπλάσια,
καὶ τὸ δὲ Θ τῇ ΕΑ ἐλάττω ἐστὶν ἡ τετραπλάσιον·
ἡ Θ ἄρα τῇ ΕΑ ἐλάττω ἐστὶν ἡ διπλή. ἐπεὶ γὰρ δύο

αἱ ΕΑ τῇ Θ μείζονες εἰσι·
διωκτὸν ἄρα ἐστὶν ἡ Θ
καὶ δύο τῇ ΕΑ τριγώνων
συστάσθαι. συναστῶ τῷ
νῦν ὅτι τῇ ΕΑ τριγώνων
τὸ ΕΑΖ ὀρθὸν πρὸς τὸ
ὑποκείμενον ἐπίπεδον, ὥστε
ἴση εἶναι τῷ μὲν ΕΑ τῇ
ΑΖ, τῇ δὲ Θ τῇ ΖΕ· καὶ ἔχθω
τῇ μὲν ΖΕ ὁμοῦ ἄλλος
ἡ ΑΚ, τῇ δὲ ΕΑ ἡ ΖΚ.
νοστήσῃ κῶνος, ὃ κορυφὴ
τὸ Ζ σημεῖον, βάσις δὲ ὁ
περὶ ΑΚ μίτρον τῇ ΚΑ κύ-


κλος, ὀρθὸς ὦν πρὸς τὸ Διὰ τῶν ΑΖΚ ὀπίπεδον·
ἔστω δὲ ὀρθὸς ὁ κῶνος, ἴση γὰρ ἡ ΑΖ τῇ ΖΚ. πετμή-
σθω δὲ ὁ κῶνος ὀπίπεδῳ ὁμοῦ ἄλλῳ τῷ ΚΑ κύ-
κλῳ, καὶ ποιῶτω τομὴν τῇ ΜΝΞ κύκλῳ, ὀρθὸν
δηλονότι πρὸς τὸ Διὰ τῇ ΜΖΝ ὀπίπεδον, ὃ ἔσω
τῷ ΜΝΞ κύκλῳ καὶ τῇ ΜΖΝ τριγώνῳ κοινὴ το-
μὴ ἡ ΜΝ· διάμετρος ἄρα ἐστὶ τῇ ΜΝ. ἔσω δὲ
ὑποκείμενον ὀπίπεδον ὃ τῇ ΜΝΞ κύκλῳ κοινὴ τομὴ ἡ ΞΛ.
ἐπεὶ γὰρ ὁ ΜΝΞ κύκλος ὀρθὸς ἐστὶ πρὸς τὸ ΜΖΝ
τριγώνον, ὀρθὸν δὲ καὶ τὸ ὑποκείμενον ὀπίπεδον πρὸς
τὸ ΜΖΝ τριγώνον· ἡ κοινὴ ἄρα αὐτῶν τομὴ ἡ ΞΛ
ὀρθὴ ἐστὶ πρὸς τὸ ΜΖΝ τριγώνον, ταῦτα τὸ ΚΖΑ·
καὶ πρὸς πᾶσις ἄρα πᾶσις ἀπτομένης αὐτῆς εὐθείας,
καὶ ὥστε ἐν τῷ τριγώνῳ, ὀρθὴ ἐστὶν ὥστε καὶ πρὸς ἑκα-
τέρῳ τῇ ΜΝ, ΑΒ. πάλιν ἐπεὶ κῶνος, ὃ βάσις μὲν
ὁ ΜΝΞ κύκλος, κορυφὴ δὲ τὸ Ζ σημεῖον, τῇ ΜΝΞ ἐπι-
πέδῳ ὀρθῶ πρὸς τὸ ΜΖΝ τριγώνον, καὶ ποιεῖ τομὴν τῇ
ΜΝΞ κύκλῳ, τῇ ΜΝΞ ἐπὶ τῷ ὀπίπεδῳ τῷ ὑπο-
κειμένῳ τέμνοντι τῇ βάσιν ὃ κῶνος κατ' εὐθείαν τῇ
ΞΛ πρὸς ὀρθὴς ὥστε τῇ ΜΝ, ἡ κοινὴ ἐστὶ τομὴ τῇ
ΜΝΞ κύκλῳ καὶ τῇ ΜΖΝ τριγώνῳ· ἡ δὲ κοινὴ τομὴ
τῇ ὑποκείμενῳ ὀπίπεδῳ καὶ τῇ ΜΖΝ τριγώνῳ ἡ ΑΒ
ὁμοῦ ἄλλος ἐστὶ τῇ ΖΚΜ πλάττω ὃ κῶνος· ἡ ἄρα
γωνιμὴ ἐν τῷ ὑποκειμένῳ ὀπίπεδῳ τομὴ τῇ κῶνος
παραβολή ἐστὶ, διάμετρος δὲ αὐτῆς ἡ ΑΒ, αἱ δὲ κατὰ
γόμεναι

angulum quod adiaceat alteri rectæ, latitudinem habens rectam interjectam inter applicatam & verticem sectionis, excedens vero figura simili & similiter posita ei quæ datis à principio rectis continetur.

ὁρθώσιον παρὰ τὴν ἐπίπεδον εὐθεῖαν, πλάτος ἔχον τὴν ἀπολαμβανομένην ὑπὸ τῆς κατηγμένης πρὸς τῇ κορυφῇ, ὑπερέχοντος εὐθείας ὁμοίως καὶ ὁμοίως καμμένης πρὸς τὴν αὐτὴν ἀρχὴν εὐθεῖαν.

SINT datæ rectæ terminatæ AB, BG ad rectos inter se angulos, & producatæ AB ad Δ: oportet igitur in plano, quod per ABΓ transit, invenire hyperbolam; ita ut ejus diameter sit ABΔ, vertex B punctum, & rectum figuræ latus BG; quæ vero à sectione ad BΔ in dato angulo applicentur, possint rectangula adjacentia ipsi BG, quæ latitudines habeant lineas interjectas inter ipsas & punctum B, excedantque figura simili & similiter posita ei quæ sub rectis AB, BG continetur.

Sit datus angulus primum rectus, & super AB planum erigatur [ope 12. 11.] rectum ad subjectum planum, in quo circa AB circulus describatur AEBZ; ita ut pars diametri circuli, quæ in portione AEB comprehenditur ad partem comprehensam in portione AZB non majorem rationem habeat quam AB ad BG; & [per 30. 3.] secetur AEB circumferentia bifariam in E; ducaturque [per 10. 1.] à puncto B ad AB perpendicularis EK, quæ ad A producatæ: ergo EA diameter est circuli. quod si ut AB ad BG ita fuerit EK ad KA, usi essemus puncto A: sin minus, fiat [per 12. 6.] ut AB ad BG ita EK ad minorem ipsâ KA, quæ sit KM; & per M [per 31. 1.] ducatur MZ parallela ipsi AB; junctisque AZ, EZ, ZB, per B ducatur BZ ipsi ZB parallela. itaque quoniam angulus AZE æqualis est [per 27. 3.] angulo EZB; angulus autem AZE [per 29. 1.] angulo AEB, & EZB ipsi EBZ: erit & EBZ ipsi ZEB æqualis; quare [per 6. 1.] & ZB æqualis ipsi ZE. intelligatur conus cujus vertex Z, & basis circulus circa diametrum BZ, rectus ad ZBZ triangulum: erit itaque is conus rectus, quia ZB æqualis est ZE. producantur ZB, ZE, MZ; & secetur conus plano, quod circulo BZ æquidistet; erit igitur [per 4. huj.] ea sectio circulus, qui sit HΠΘP, cujus circuli diameter est HΘ. communis autem sectio circuli HΘ & subjecti plani sit ΠΔP: erit igitur ΠΔP ad utramque ipsarum HΘ, ΔB perpendicularis: (uterque enim circulorum EB, ΘH rectus est ad triangulum ZHΘ; sed & subjectum planum ad ZHΘ rectum est: ergo [per 19. 11.] communis ipsorum sectio ΠΔP erit & ad ZHΘ perpendicularis, ac proinde ad omnes rectas,



ΕΣΤΩΣΑΝ αἱ δοθεῖσαι δύο εὐθεῖαι πεπερασμέναι πρὸς ὀρθὰς ἀλλήλων αἱ AB, BG, καὶ ἐκτελεσθῶν ἡ AB ὥστε τὸ Δ· διὰ δὲ εὐθεῖαν ἐν τῷ Διὰ τῆς ABΓ ὀρθῶς ὑπερέχοντος, ἥς διὰ μέτρος μὲν ἐστὶ ἡ ABΔ, κορυφὴ δὲ τὸ B, ὀρθία δὲ ἡ BG, αἱ δὲ κατηγόμεναι ἀπὸ τῆς κορυφῆς πρὸς τὴν BΔ ἐν τῇ δοθείσῃ γωνίᾳ διωθήσονται πρὸς τὴν BG πρὸς καμμένην, πλάτη ἔχοντες τὰς ἀπολαμβανομένας ὑπ' αὐτῶν πρὸς τῷ B, ὑπερέχοντος εὐθείας ὁμοίως καὶ ὁμοίως καμμένης τῷ ὑπὸ τῆς AB, BG.

Εἰς ἡ δὲ δοθεῖσαι γωνία πρότερον ὀρθή, καὶ ἀνεστῶν ἀπὸ τῆς AB ὀρθῶς πρὸς τὸ ὑποκείμενον ὀρθῶς πρὸς τὸ AB κύκλος περιγράφῃται ὁ AEBZ, ὡς τὸ τμήμα τῆς διαμέτρου EA κύκλου, τὸ

ἐν τῷ AEB τμήματι, πρὸς τὸ τμήμα τῆς διαμέτρου, τὸ ἐν τῷ AZB, μὴ μείονα λόγον ἔχον ὅσον ἔχει ἡ AB πρὸς BG· καὶ πετμήσῃται ἡ AEB διὰ κατὰ τὸ E, καὶ ἦχθω ἀπὸ τῆς E ὁ πρὸς τῇ AB κάθετος ἡ EK, καὶ ἐκτελεσθῶν ὥστε τὸ A· διὰ μέτρος ἀρεῖς ἐστὶ ἡ EA. εἰ μὲν ὡς ἐστὶν ὡς ἡ AB πρὸς BG ὥστε ἡ EK πρὸς

KA, τῷ A ὡς ἐκτελεσθῶν· εἰ δὲ μὴ, γινέσθω ὡς ἡ AB πρὸς BG ὥστε ἡ EK πρὸς ἐλάσσονα τῆς KA τῆς KM, καὶ διὰ τῆς M τῇ AB πρὸς ἀλλήλους ἦχθω ἡ MZ, καὶ ἐπιτελεσθῶν αἱ AZ, EZ, ZB, καὶ διὰ τῆς Z τῇ ZB πρὸς ἀλλήλους ἡ BZ. ἐπεὶ ὅν ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ AZE γωνία τῇ ὑπὸ EZB, ἀλλ' ἡ μὲν ὑπὸ AZE τῇ ὑπὸ AEB ἐστὶν ἴση, ἡ δὲ ὑπὸ EZB τῇ EBZ ἐστὶν ἴση· καὶ ἡ ὑπὸ EBZ ἴση τῇ ὑπὸ ZEB ἐστὶν ἴση· καὶ ἄρα ἡ ZB τῇ ZE. νεκρῶν κῶνος, ὃ κορυφὴ μὲν τὸ Z σημεῖον, βάσις δὲ ὁ πρὸς τῷ BZ διὰ μέτρον κύκλος, ὀρθὸς ὡς πρὸς τὸ BZZ τριγώνον· ἐστὶ δὲ ὁ κῶνος ὀρθός, ἴση γὰρ ἡ ZB τῇ ZE. ἐκτελεσθῶσιν δὲ αἱ ZB, ZE, MZ, καὶ πετμήσῃται ὁ κῶνος ὀρθῶς πρὸς ἀλλήλους τῷ BZ κύκλῳ· ἐστὶ δὲ ἡ τομὴ κύκλος, ὡς ὁ HΠΘP ὡς δὲ διάμετρος ἐστὶ ὁ κύκλος ἡ HΘ· καὶ ἡ τῇ HΘ κύκλῳ ἐστὶ ὑποκείμενη ὀρθῶς πρὸς τῇ HΘ, ABΔ ὀρθή (ἐκάτερος γὰρ τῶν EB, ΘH κύκλος ὀρθός ἐστι πρὸς τὸ ZHΘ τριγώνον, ἐστὶ δὲ τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον ὀρθὸν πρὸς τὸ ZHΘ· ὁ δὲ καὶ ἄρα αὐτῶν τομὴ ἡ ΠΔP ὀρθή ἐστι πρὸς τὸ ZHΘ, ὁ δὲ πρὸς πᾶσις ἄρα

ἄρα πᾶς ἀπὸ μέρους αὐτῆς εὐθείας, καὶ ἕσται ἐν τῷ αὐτῷ ὀρθογώνῳ, ὁρθὰς ποιεῖ γωνίας τετμητῶν ἄρα ὀρθογώνῳ ὁρθῶς πρὸς τὸ $ZH\Theta$ τριγώνον, καὶ ποιεῖ τμήνην τὴν $H\Theta P$ κύκλον.) καὶ ἐπεὶ κώνος, ὃς βάσις μὲν ὁ $H\Theta$ κύκλος, κορυφὴ δὲ τὸ Z , τέτμηται καὶ ἐπὶ τῷ αὐτῷ ὑποκειμένῳ τμήνοντι τὴν βάσιν ὃς κώνος κατ' εὐθείαν τὴν $\Pi\Delta P$ πρὸς ὁρθὰς τῇ $H\Delta\Theta$, ἡ δὲ κοινὴ τμήνη τέτμηται ὑποκειμένην ὀρθογώνῳ καὶ $HZ\Theta$, τετμήσιν ἡ ΔB , ἐκβαλλομένη ἐπὶ τὸ B συμπίπτει τῇ HZ κατὰ τὸ A . ὑπερβολὴ ἄρα ἐστὶν, διὰ τὰς ἀποδείκνυμαι, ἡ τμήνη ἡ $\Pi B P$, ἥς κορυφὴ μὲν ἐστὶν τὸ B σημεῖον, αἱ δὲ καταγόμεναι ὅτι τὸ $B\Delta$ πλάγμενος ἐν ὁρθῇ γωνίᾳ καταχρήσιν, ὡς ἀλλήλοισι γὰρ εἰσι τῇ $\Pi\Delta P$.

Καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ AB πρὸς $B\Gamma$ ἕτως ἡ EK πρὸς KM , ὡς δὲ ἡ EK πρὸς KM ἕτως ἡ EN πρὸς NZ , τετμήσιν τὸ ὑπὸ ENZ πρὸς τὸ ὑπὸ NZ . ὡς ἄρα ἡ AB πρὸς $B\Gamma$ ἕτως τὸ ὑπὸ ENZ πρὸς τὸ ὑπὸ NZ . ἴσιν δὲ τὸ ὑπὸ ENZ τῷ ὑπὸ ANB . ὡς ἄρα ἡ AB πρὸς ΓB ἕτως τὸ ὑπὸ ANB πρὸς τὸ ὑπὸ NZ . τὸ δὲ ὑπὸ ANB πρὸς τὸ ὑπὸ NZ τὸν συγκείμενον ἔχει λόγον, ὅτι τῆς AN πρὸς NZ ὡς τῆς BN πρὸς NZ . ἀλλ' ὡς μὲν ἡ AN πρὸς NZ ἕτως ἡ AA πρὸς ΔH καὶ ἡ ZO πρὸς OH , ὡς δὲ ἡ BN πρὸς NZ ἕτως ἡ ZO πρὸς $O\Theta$. ἡ ἄρα AB πρὸς $B\Gamma$ τὸν συγκείμενον ἔχει λόγον, ὅτι τῆς ZO πρὸς OH καὶ ἡ ZO πρὸς $O\Theta$, τετμήσιν τὸ ὑπὸ ZO πρὸς τὸ ὑπὸ $H\Theta$. ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ AB πρὸς $B\Gamma$ ἕτως τὸ ὑπὸ ZO πρὸς τὸ ὑπὸ $H\Theta$. καὶ ἐστὶν ὡς ἀλλήλοισι ἡ ZO τῇ AA . πλαγία ἄρα πλαγία ἐστὶν ἡ AB , ὁρθία δὲ ἡ $B\Gamma$. ταῦτα γὰρ ἐν τῷ δωδεκάτῳ θεωρήματι δέδεικται.

ΜΗ ἐστὶν δὲ ἡ δεδομένη γωνία ὁρθή, καὶ ἐξωσται αἱ δοθεῖσαι εὐθεῖαι ἡ AB , AG , ἡ δὲ δοθεῖσα γωνία ἐξω ἴση τῇ ὑπὸ $\tau B A \Theta$. δεῖ δὲ γράψαι ὑπερβολήν, ἥς διάμετρος μὲν ἐστὶν ἡ AB , ὁρθία δὲ ἡ AG , αἱ δὲ καταγόμεναι ἐν τῇ ὑπὸ $\Theta A B$ γωνίᾳ πλάγμενος καταχρήσιν.

Τετμήσιν ἡ AB διχα κατὰ τὸ Δ , καὶ ὅτι τὸ AA γογγύσθω ἡμικύκλιον τὸ $AZ\Delta$, καὶ ἡχθῶ εἰς τὸ ἡμικύκλιον ὡς ἀλλήλος τῇ $A\Theta$ ἡ ZH , ποιεῖται τὸν τοῦ ὑπὸ ZH πρὸς τὸ ὑπὸ $\Delta H A$ λόγον τὸν αὐτὸν τῷ τῆς AG πρὸς AB , καὶ ἐπιζεύχθω ἡ $Z\Theta\Delta$ καὶ ἐκβεβλήσθω, καὶ τὸ $Z\Delta$, $\Delta\Theta$ μέση ἀνάλογον ἐξω ἡ ΔA , καὶ κείσθω τῇ AA ἴση ἡ ΔK , τὸ δὲ ὑπὸ AAZ ἴσιν ἐξω τῷ ὑπὸ AZM , καὶ ἐπιζεύχθω ἡ KM , καὶ ἀλγεῖται A πρὸς ὁρθὰς ἡχθῶ τῇ KZ ἡ AN , καὶ ἐκβεβλήσθω ὅτι τὰ O, Z . καὶ δύο δοθεῖσιν εὐθεῖαι


quæ ipsam contingunt atque in eodem plano consistunt, rectos facit angulos; secatur igitur plano triangulo $ZH\Theta$ recto, sectionemque facit circulum $H\Theta P$. quoniam vero conus, cujus basis est circulus $H\Theta$ & vertex Z , secatur plano subiecto secante basim coni secundum rectam lineam $\Pi\Delta P$ perpendicularem ad $H\Delta\Theta$: & communis sectio subiecti plani & trianguli $HZ\Theta$, videlicet ΔB , producta ad partes B convenit cum HZ in puncto A : erit ex iis, quæ [ad 12. huj.] demonstrata sunt, sectio $\Pi B P$ hyperbola, cujus vertex B , & ordinatim ductæ ad diametrum $B\Delta$ in recto angulo applicabuntur; parallelæ etenim sunt ipsi $\Pi\Delta P$.

Quoniam autem ut AB ad $B\Gamma$ ita [per constr.] est EK ad KM ; & [per 2. 6.] ut EK ad KM ita EN ad NZ , hoc est [per 1. 6.] rectangulum ENZ ad quadratum ex NZ : erit ut AB ad $B\Gamma$ ita ENZ rectangulum ad quadratum ex NZ . sed [per 35. 3.] ENZ rectangulum æquale est rectangulo ANB : ergo ut AB ad ΓB ita rectangulum ANB ad quadratum ex NZ . rectangulum autem ANB ad quadratum ex NZ rationem habet compositam ex ratione AN ad NZ & ex ratione BN ad NZ ; sed [per 4. 6.] ut AN ad NZ , ita AA ad ΔH ut & ZO ad OH ; & ut BN ad NZ ita ZO ad $O\Theta$: quare AB ad $B\Gamma$ rationem compositam habet ex ratione ZO ad OH & ex ratione ZO ad $O\Theta$; hoc est [per 23. 6.] ex ratione quadrati ex ZO ad rectangulum $H\Theta\Theta$: est igitur ut AB ad $B\Gamma$ ita quadratum ex ZO ad $H\Theta\Theta$ rectangulum. atque [per constr.] est ZO parallela ipsi AA : sequitur ergo AB esse transversum figuræ latus & $B\Gamma$ rectum; etenim hæc in duodecimo theoremate ostensa sunt.


NON sit autem datus angulus rectus, sintque rectæ datæ AB , AG ; & datus angulus æqualis sit angulo $B A \Theta$: oportet igitur describere hyperbolam, ita ut ejus diameter sit AB , & rectum latus AG , ductæ vero ordinatim ad diametrum in angulo $\Theta A B$ applicentur.

Secetur [per 10. 1.] AB bifariam in Δ : & super AA describatur semicirculus $AZ\Delta$, & ducatur quædam recta ZH ad semicirculum parallela ipsi $A\Theta$; ita ut fiat ratio quadrati ex ZH ad rectangulum $\Delta H A$ eadem quam habet recta AG ad rectam AB ; & juncta $Z\Theta\Delta$ producatur; inter ipsas autem $Z\Delta$, $\Delta\Theta$ media proportionalis sit [per 13. 6.] recta ΔA , ponaturque ipsi AA æqualis ΔK ; & [ope 11. 6.] quadrato ex AZ

æquale fiat rectangulum AZM , & jungatur KM ; deinde per A ad rectos angulos ipsi KZ ducatur AN ad quæ O, Z producatur: datis autem duabus rectis




rectis terminatis KA , AN , ad rectos inter se angulos, describatur [ex superius ostensis] hyperbola, cujus transversum quidem latus sit KA , rectum vero AN ; & à sectione ad diametrum ductæ in recto angulo applicentur, & possint rectangula adjacentia lineæ AN , quæ latitudines habeant interjectas inter ipsas & punctum A , excedantque figura simili ipsi KAN : transibit igitur sectio per A , cum [ex hyp.] quadratum ex AZ æquale sit rectangulo AZM ; & linea $A\Theta$ [per 37. huj.] sectionem continget, rectangulum enim $Z\Delta\Theta$ quadrato ex ΔA est æquale: ac propterea AB diameter est sectionis. quoniam vero [ex constr.] ut GA ad duplam AA , hoc est ad AB , ita quadratum ex ZH ad rectangulum ΔHA ; & GA ad duplam AA compositam rationem habet ex ratione GA ad duplam $A\Theta$ & ex ratione duplæ $A\Theta$ ad duplam ΔA , hoc est ex ratione $A\Theta$ ad ΔA five [per 4. 6.] ZH ad HA : habebit GA ad AB rationem compositam ex ratione GA ad duplam $A\Theta$ & ex ratione ZH ad HA . habet autem & quadratum ex ZH ad rectangulum ΔHA rationem compositam ex ratione ZH ad HA & ex ratione ZH ad HA : ratio igitur composita ex ratione GA ad duplam $A\Theta$ & ex ratione ZH ad HA , eadem est ac ratio composita ex ratione ZH ad HA & ex ratione ZH ad HA . communis auferatur ratio ZH ad HA : ergo ut GA ad duplam $A\Theta$ ita ZH ad HA , & [per 4. 6.] ut ZH ad HA ita OA ad AZ : ut igitur GA ad duplam $A\Theta$ ita OA ad AZ . quod cum ita sit, erit AG ea juxta quam possunt quæ à sectione ducuntur: hoc enim in quinquagesimo theoremate demonstratum est.



πεπερασμένον, πρὸς ὁρτὴς πὶ ἀλλήλαις, τὴν KA , AN , γεγραμμένων ὑπερβολῆς παραγὰς πλάτος ἔστω ἡ KA , ὁρθία δὲ ἡ AN , αἱ δὲ καταγόμεναι ἐπὶ τῷ Δ σημείωσαν δὲ τὴν τμήσιν ἐν ὁρθῇ γωνίᾳ καταχρήσονται, καὶ διωθήσονται πρὸς τὸ Δ τῷ AN ὡς καταγόμενα ὁρθογώνια, πλατὴν ἔχοντα πρὸς ἀπαστράσσοντες ὡς αὐτὸν πρὸς τὸ Δ , ὑπερβάλλοντα ὅθεν ὁμοίω τῷ Δ KAN . ἢ ἔτι δὲ ἡ τμήσιν Δ τῷ A , ἴσον γὰρ ἔστω τὸ δὲ AZ τῷ ΔZM , ἔστι φάσις αὐτῆς ἡ $A\Theta$, τὸ γὰρ ὑπὸ $Z\Delta\Theta$ ἴσον ἐστὶ τῷ Δ ΔA . ὥστε ἡ AB διπλάσιος ἐστὶ τῇ τμήσιν. καὶ ἐπὶ ἐστὶν ὡς ἡ GA πρὸς τῷ διπλάσιον τῇ AA , ταύτης τῷ AB , ὥτως τὸ δὲ ZH πρὸς τὸ ὑπὸ ΔHA . ἀλλ' ἡ μὲν GA πρὸς τῷ διπλάσιον τῇ AA τὸν συγκείμενον ἔχει λόγον, ὅς ἐστιν ὡς ἡ GA πρὸς τῷ διπλάσιον τῇ $A\Theta$ καὶ ὡς ἡ ZH πρὸς τῷ διπλάσιον τῇ HA , ταύτης ἡ ZH πρὸς HA . ἢ GA ὥς πρὸς AB τὸν συγκείμενον ἔχει λόγον, ὅς ἐστιν ὡς ἡ GA πρὸς τῇ $A\Theta$ καὶ ὡς ἡ ZH πρὸς HA . ὁ ἀπὸ συγκείμενος λόγος, ὅς ἐστιν ὡς ἡ GA πρὸς τῇ $A\Theta$ καὶ ὡς ἡ ZH πρὸς HA , ὁ αὐτὸς ἐστὶ τῷ συγκείμενῳ, ὅς ἐστιν ὡς ἡ ZH πρὸς HA καὶ ὡς ἡ ZH πρὸς HA . κλητὸς ἀφ' ἡρώδω ὁ τῇ ZH πρὸς HA λόγος. ἔστω ἄρα ὡς ἡ GA πρὸς τῇ διπλάσιον τῇ $A\Theta$ ὥτως ἡ ZH πρὸς HA . ὡς δὲ ἡ ZH πρὸς HA ὥτως ἡ OA πρὸς AZ . ὡς ἄρα ἡ GA πρὸς τῇ διπλάσιον τῇ $A\Theta$ ὥτως ἡ OA πρὸς AZ . ὅταν δὲ ταῦτα ᾖ, πρὸς τῷ διπλάσιον τῇ $A\Theta$ τῇ OA τῇ AZ ὡς ἡ GA πρὸς τῇ διπλάσιον τῇ $A\Theta$ ὥτως ἡ OA πρὸς AZ . ὅταν δὲ ταῦτα ᾖ, πρὸς τῷ διπλάσιον τῇ $A\Theta$ τῇ OA τῇ AZ ὡς ἡ GA πρὸς τῇ διπλάσιον τῇ $A\Theta$ ὥτως ἡ OA πρὸς AZ . ὅταν δὲ ταῦτα ᾖ, πρὸς τῷ διπλάσιον τῇ $A\Theta$ τῇ OA τῇ AZ ὡς ἡ GA πρὸς τῇ διπλάσιον τῇ $A\Theta$ ὥτως ἡ OA πρὸς AZ .

EUTOCIUS.

Et super AB planum erigatur, rectum ad subiectum planum, in quo circa AB describatur circulus $ABBZ$, ita ut pars diametri circuli, quæ in portione AEB comprehenditur, ad partem comprehensam in portione AZB non maiorem rationem habeat quam AB ad $B\Gamma$.] Sint duæ rectæ lineæ AB , $B\Gamma$, & oporteat circa AB circulum describere, cujus diameter à linea AB ita dividatur, ut pars ipsius, quæ est ad Γ , ad reliquam partem non maiorem rationem habeat, quam AB ad $B\Gamma$. ponatur jam eandem habere; seceturque AB bifariam in Δ , & per Δ ad rectos angulos ipsi AB ducatur $E\Delta Z$, & fiat ut AB ad $B\Gamma$ ita $E\Delta$ ad ΔZ ; atque EZ bifariam secetur: constat ergo, si




καὶ ἀνίσταται δὲ τὸ AB ἐπίπεδον ὁρθὸν πρὸς τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον, καὶ ἐν αὐτῷ περιττῇ AB γεγραμμένῳ κύκλῳ ὁ $AEBZ$, ὥστε τὸ Γ μῆμα τῇ διαμέτρῳ κύκλου, τὸ ἐν τῷ AEB τμήματι, πρὸς τὸ τμήμα τῇ διαμέτρῳ κύκλου, τὸ ἐν τῷ AZB μῆματι, μὴ μείζονα λόγον ἔχον ὅν ἔχει ἡ AB πρὸς $B\Gamma$.] Ἐστωσαν δύο κείσθαι αἱ AB , $B\Gamma$, καὶ δέον ἔστω εἶναι τὸν AB κύκλον γεγραμμένον, ὥστε τὸ διπλάσιον αὐτῶ τμήματις ὑπὸ τῇ AB ὥστε τὸ πρὸς τῇ Γ μέρει αὐτῆς πρὸς τὸ λοιπὸν μὴ μείζονα λόγον ἔχον τῇ AB πρὸς $B\Gamma$. ἐπιτεταθὲν μὲν γὰρ τῇ αὐτῇ ἔχον, καὶ πετμήσθαι ἡ AB δίχα κατὰ τὸ Δ , καὶ δι' αὐτὸ Δ πρὸς ὁρθὰς τῇ AB ἔχθαι ἡ $E\Delta Z$, καὶ γινώσκται ὡς ἡ AB πρὸς $B\Gamma$ ὥστε ἡ $E\Delta$ πρὸς ΔZ , καὶ δίχα τεμνέσθαι ἡ EZ . δι-

Δ Ζ Β. καὶ ἐπεὶ ἡ ὑπὸ Ε Ζ Α γωνία δύσσι τῆς ὑπὸ
 Ζ Α Δ, Ζ Δ Α ἐστὶν ἴση, ἀλλ' ἡ μὲν ὑπὸ Ζ Α Δ τῇ ὑπὸ
 Ζ Β Δ ἐστὶν ἴση, ἡ δὲ ὑπὸ Ζ Δ Α τῇ ὑπὸ Ζ Β Α· Ἐν ἡ
 ὑπὸ Ε Ζ Α ἄρα τῇ ὑπὸ Δ Β Α ἐστὶν ἴση, τετέστιν τῇ
 ὑπὸ Β Ζ Δ. ἐστὶ δὲ καὶ ὠρθόγωνος ἡ Δ Ε τῇ Λ Η· ἡ
 ἄρα ὑπὸ Ε Ζ Α τῇ ὑπὸ Ζ Η Θ ἐστὶν ἴση· ἡ δὲ ὑπὸ
 Δ Ζ Β τῇ ὑπὸ Ζ Θ Η· ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ Ζ Η Θ τῇ ὑπὸ
 Ζ Θ Η ἐστὶν ἴση, Ἐν ἡ Ζ Η τῇ Ζ Θ ἐστὶν ἴση. γινεσθῶ
 δι' ἡ περὶ τὴν Θ Η κύκλος ὁ Η Θ Ν ὁρθὸς πρὸς τὸ
 Θ Η Ζ τετέγωνον, καὶ νοσώτω κῶνος, ὃ βάσις μὲν ὁ
 Η Θ Ν κύκλος, κορυφὴ δὲ τὸ Ζ σημεῖον· ἔστω δὲ ὁ
 κῶνος ὁρθὸς διὰ τὸ ἴσην εἶναι τὴν Η Ζ τῇ Ζ Θ. καὶ ἐπεὶ
 ὁ Η Θ Ν κύκλος ὁρθὸς ἐστὶ πρὸς τὸ Θ Η Ζ ὀρθόπεδον,
 ἐστὶ δὲ καὶ τὸ ὑποκείμενον ὀρθόπεδον ὁρθὸν πρὸς τὸ διὰ
 Ε Η Θ Ζ ὀρθόπεδον· καὶ ἡ κοινὴ τομὴ αὐτῶν ἄρα πρὸς
 τὸ διὰ Ε Η Θ Ζ ὀρθόπεδον ὀρθή ἐστω. ἔστω δὲ ἡ κοινὴ
 τομὴ αὐτῶν ἡ Κ Μ· ἡ Κ Μ ἄρα ὀρθή ἐστὶ πρὸς ἐκα-
 πέραν τῶν Α Κ, Κ Η. καὶ ἐπεὶ κῶνος, ὃ βάσις μὲν ὁ
 Η Θ Ν κύκλος, κορυφὴ δὲ τὸ Ζ σημεῖον, τέτμηται
 ὀρθόπεδω διὰ Ε ἀξονος, καὶ ποιῇ πεμὴν τὸ Η Θ Ζ τετέ-
 γωνον, τέτμηται δὲ καὶ ἐτέρω ὀρθόπεδω τῷ διὰ τῶν Α Κ,
 Κ Μ, ὅ ἐστι τὸ ὑποκείμενον, κατ' εὐθείαν τὴν Κ Μ
 πρὸς ὁρθὰς ἔστω τῇ Η Κ, καὶ τὸ ὀρθόπεδον συμπίπτει
 τῇ Ζ Η, Ζ Θ πλατυαῖς Ε κῶνος· ἡ ἄρα γωνομετρία
 τομὴ ἑλλειψίδος ἐστίν, ἥς διάμετρος ἡ Α Β, αἱ δὲ κατὰ-
 γόμεναι κατὰ χῆρσιν ἐν ὀρθῇ γωνίᾳ, ὠρθόγωνοι
 γὰρ εἰσι τῇ Κ Μ. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ Δ Ε πρὸς Ε Ζ
 ὅτως τὸ ὑπὸ Δ Ε Ζ, τετέστι τὸ ὑπὸ Β Ε Α, πρὸς τὸ
 διὰ Ε Ζ· τὸ δὲ ὑπὸ Β Ε Α πρὸς τὸ διὰ Ε Ζ τὸ συγκεί-
 μενον ἔχει λόγον, ἔκπε δὲ τὸ Β Ε πρὸς Ε Ζ καὶ τὸ Α Ε
 πρὸς Ε Ζ· ἀλλ' ὡς μὲν ἡ Β Ε πρὸς Ε Ζ ὅτως ἡ Β Κ
 πρὸς Κ Θ, τετέστιν ἡ Ζ Α πρὸς Λ Θ, ὡς δὲ ἡ Α Ε
 πρὸς Ε Ζ ὅτως ἡ Α Κ πρὸς Κ Η, τετέστιν ἡ Ζ Α
 πρὸς Λ Η· ἡ Β Α ἄρα πρὸς Α Γ τὸ συγκείμενον ἔχει
 λόγον, ἔκπε δὲ τὸ Ζ Α πρὸς Λ Η καὶ τὸ Ζ Α πρὸς Λ Θ·
 ὅς ἐστιν ὁ αὐτὸς τῷ ὄν ἔχει τὸ διὰ Ζ Α πρὸς τὸ ὑπὸ
 Η Λ Θ. ὅταν δὲ τῆς ἡ, ὁρθαῖς Ε ἑδῆς πλατυαῖς ἐστὶν
 ἡ Α Γ, ὡς δεδεκται ἐν τῷ δεκάτῳ τρίτῳ γεω-
 ρηματι.

Τ Ω Ν αὐτῶν ὑποκειμένην, ἕως ἡ Α Β ἐλάστων
 ἤ Α Γ· καὶ διότι ἕως ὅτου διαμέτρουν τὴν
 Α Β ῥαβδὸν ἔλκευται, ὥστε ὁρθὴν εἶναι
 τὴν Α Γ.

Τετμήσιω ἡ ΑΒ ὄγκῳ κατὰ τὸ Δ,
 καὶ διπλὸν ἔστι τῇ ΑΒ πρὸς ὀρθῶς ἡχθῶ
 ἡ ΕΔΖ, καὶ τῷ ὑπὸ ΒΑΓ ἴσῳ ἔσῳ τὸ
 διπλὸν ΖΕ, ὥστε ἴσῃ εἶναι πλὴν ΖΔ τῇ
 ΔΕ, καὶ τῇ ΑΒ ὁμογώνιος ἡχθῶ ἡ
 ΖΗ· καὶ πεπιθήσιω ὥς ἡ ΑΓ πρὸς ΑΒ
 ἔσῳ ἡ ΕΖ πρὸς ΖΗ· μέγῳ ἄρα
 καὶ ἡ ΕΖ τῆς ΖΗ. καὶ ἐπεὶ ἴσῳ ἐστὶ τὸ
 ὑπὸ ΓΑΒ τῷ διπλῷ ΕΖ· ἔσῳ ὥς ἡ ΓΑ
 πρὸς ΑΒ ἔσῳ τὸ διπλὸν ΖΕ πρὸς τὸ
 διπλὸν ΑΒ, καὶ τὸ διπλὸν ΔΖ πρὸς τὸ
 διπλὸν ΔΑ. ὥς δὲ ἡ ΓΑ πρὸς ΑΒ
 ἔσῳ ἡ ΕΖ πρὸς ΖΗ· ὥς ἄρα ἡ ΕΖ πρὸς ΖΗ

ὥτως ἡ ΕΖ πρὸς ΖΗ· ὡς ἄρα ἡ ΕΖ πρὸς ΖΗ



niam angulus EZA æqualis est [per 32. 1.]
 duobus angulis ZAA , $Z\Delta A$; atque est [per 27.
 3.] ZAA angulus æqualis angulo ZBA , ut etiam
 ZAA ipsi ZBA : erit angulus EZA æqualis an-
 gulo ΔBA , hoc est [per 27. 3.] BZA . verum
 ΔE parallela est ipsi ΛH : igitur angulus EZA
 æqualis est [per 29. 1.] angulo $ZH\Theta$. at ΔZB
 ipsi $Z\Theta H$: quare sequitur $ZH\Theta$ angulum an-
 gulo $Z\Theta H$ esse æqualem, & [per 6. 1.] lineam
 ZH lineæ $Z\Theta$. itaque circa $H\Theta$ describatur cir-
 culus $H\Theta N$, rectus ad triangulum ΘHZ ; & in-
 telligatur conus, cujus basis circulus $H\Theta N$ & ver-
 tex punctum Z : erit igitur is conus rectus, ob
 HZ æqualem ipsi $Z\Theta$. & quoniam circulus $H\Theta N$
 rectus est ad ΘHZ planum; est autem & pla-
 num subiectum rectum ad planum quod per
 $H\Theta Z$ transit: ideo [per 19. 11.] commu-
 nis ipsorum sectio ad planum per $H\Theta Z$ per-
 pendicularis erit. communis autem sectio sit
 linea KM : ergo KM perpendicularis est ad
 utramque ipsarum AK , KH . rursus quoniam
 conus, cujus basis est circulus $H\Theta N$ & vertex
 Z , secatur plano per axem, quod facit sectio-
 nem triangulum $H\Theta Z$; secatur autem & altero
 plano per AK , KM transeunte, quod est subje-
 ctum planum, secundum rectam lineam KM per-
 pendicularem ad HK , & planum illud occurrit
 ipsis ZH , $Z\Theta$ lateribus coni: erit [per 13. huj.]
 sectio genita ellipsis, cujus diameter AB , ductæ
 vero à sectione ad AB in recto angulo applica-
 buntur; sunt enim [per 13. huj.] ipsi KM paral-
 lelæ. quoniam vero ut ΔE ad EZ ita [per 1. 6.]
 rectangulum ΔEZ , hoc est [per 36. 3.] BBA ,
 ad quadratum ex EZ ; rectangulum autem BEA
 [per 23. 6.] ad quadratum ex EZ compositam
 rationem habet ex ratione BE ad EZ & ex ra-
 tione AE ad EZ ; utque BE ad EZ ita [per
 4. 6.] BK ad $K\Theta$, hoc est $Z\Lambda$ ad $\Lambda\Theta$, & ut AE
 ad EZ ita AK ad KH , hoc est $Z\Lambda$ ad ΛH : habe-
 bit igitur BA ad $\Lambda\Gamma$ rationem compositam ex ra-
 tione $Z\Lambda$ ad ΛH & ex ratione $Z\Lambda$ ad $\Lambda\Theta$. quæ
 quidem ratio eadem est [per 23. 6.] quam habet
 quadratum ex $Z\Lambda$ ad $H\Lambda\Theta$ rectangulum: ergo
 ut BA ad $\Lambda\Gamma$ ita quadratum ex $Z\Lambda$ ad rectangu-
 lum $H\Lambda\Theta$. quod cum ita sit, $\Lambda\Gamma$ erit rectum
 figuræ latus, ut ostensum est in 13. theoremate.

I SDEM positis, sit linea AB minor ipsa
 AF: & oporteat circa diametrum
 AB ellipsum describere, ita ut AF sit
 rectum figuræ latus.

Secetur AB bifariam in Δ ; à quo
ad rectos angulos ipsi AB ducatur
 EDZ : & rectangulo BAG æquale sit
[ope 13.6.] quadratum ex ZE , & $Z\Delta$
æqualis sit ipsi ΔB ; ipsi vero AB paral-
lela ducatur ZH , & fiat [per 12.6.]
ut AG ad AB ita EZ ad ZH : ma-
jor est igitur BZ quam ZH . & quo-
niam rectangulum GAB æquale est
quadrato ex EZ ; ut GA ad AB ita
est [per cor. 20.6.] quadratum ex ZE
ad quadratum ex AB , & quadratum
ex ΔZ ad quadratum ex $A\Delta$. ut au-
tem GA ad AB ita EZ ad ZH : ergo ut EZ ad ZH
ita

PROP. LV. *Probl.*

Datis duabus rectis lineis terminatis, atque ad rectos inter se angulos: invenire oppositas sectiones, quarum diameter sit una datarum rectarum, & vertices ejusdem lineæ termini; ita ut applicatæ ab utraque sectione in dato angulo possint spatia adjacentia alteri rectæ, excedentia vero figurâ simili ei quæ sub datis rectis continetur.

SINT datæ rectæ terminatæ ad rectos inter se angulos BE , $B\Theta$, & datus angulus sit H : oportet utique circa unam rectarum BE , $B\Theta$ sectiones oppositas describere, ita ut ordinatim applicatæ in angulo H applicentur.

Datis igitur duabus rectis BE , $B\Theta$, describatur hyperbola $AB\Gamma$, cujus diameter transversa sit BE , & rectum figuræ latus ΘB ; ductæ vero ad illam quæ in directum ipsi BE constituitur, applicentur in angulo H . sit ea $B\Gamma$; quod quomodo fieri oporteat, jam [ad 53. huj.] dictum est; ducatur per E

recta EK ad rectos angulos ipsi BE , quæ sit æqualis $B\Theta$; & describatur similiter alia hyperbola ΔEZ , ita ut ejus diameter sit BE , rectum figuræ latus BK , & ductæ à sectione ordinatim applicentur in angulo qui angulo H æqualis sit: constat igitur B , E sectiones esse oppositas, quarum diameter una eademque est, atque latera recta inter se æqualia.

PROP. LVI. *Probl.*

Datis duabus rectis lineis sese bifariam secantibus: circa utramque ipsarum sectiones oppositas describere; ita ut rectæ datæ sint conjugatæ earum diametri, & ut quarumlibet oppositarum sectionum diameter possit figuram aliarum oppositarum.

SINT datæ duæ rectæ lineæ se invicem secantes AG , ΔE : oportet jam circa utramque ipsarum quasi diametrum oppositas sectiones describere, ita ut AG , ΔE conjugatæ sint inter se, nempe ut ΔE quidem possit figuram earum quæ circa AG sunt, AG vero figuram earum possit quæ circa ΔE .

Sit [ope 11.6.] quadrato ex ΔB æquale rectangulum $AG\Lambda$, sitque AG ipsi ΓA ad rectos angulos; & duabus datis rectis ad rectos inter se angulos constitutis AG , ΓA , describan-

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κ'.

Δύο δοθεισῶν εὐθειῶν πρὸς ὀρθὰς ἀλλήλας πεπερασμένον εὐρεῖν ἀντικειμένας, ὅτι ἀξίμετρος ὅτι μία τῶν εὐθειῶν, κορυφὴ δὲ τὰ πέρατα τῶν εὐθειῶν, αἱ δὲ καταγόμεναι ἐν ἑκατέρᾳ τῶν μὲν ἐν τῇ δοθείσῃ γωνίᾳ διωήσονται παρὰ τὴν ἑτέραν ὁμοκείμενα, καὶ ὑπερέαλλοντα εἶδει ὁμοίᾳ τῇ ὑπὸ τῶν δοθεισῶν εὐθειῶν περιεχομένη.

ΕΣΤΩΣΑΝ αἱ δοθείσαι δύο εὐθεῖαι πρὸς ὀρθὰς ἀλλήλας πεπερασμέναι, αἱ BE , $B\Theta$, ἡ δὲ δοθείσα γωνία ἔστω H : δεῖ γράψαι ἀντικείμενας πρὸς μίαν τῶν BE , $B\Theta$, ὥστε τὰς καταγόμενὰς κατὰ γωνίαν ἐν γωνίᾳ τῇ H .

Καὶ δύο δοθεισῶν εὐθειῶν τῶν BE , $B\Theta$, γεγράφθω ὑπερβολὴ $AB\Gamma$, ἥς ἀξίμετρος ἔστω πλαγία ἡ BE , ὀρθὰ δὲ τῇ εἰδὸς πλάτρεα ἡ ΘB , αἱ δὲ καταγόμεναι ὅτι τὴν ἐπὶ εὐθείας τῇ BE κατὰ γωνίαν ἐν γωνίᾳ τῇ H . καὶ ἔστω ἡ $AB\Gamma$, τῇ τὴν ὥς δεῖ γωνίαν προγεγραπταὶ ἡχθῶ δὲ ἀπὸ τῆς E

τῇ BE πρὸς ὀρθὰς ἡ EK , ἴση ἔστω τῇ $B\Theta$, καὶ γεγράφθω ὁμοίως ἄλλη ὑπερβολὴ ἡ ΔEZ , ἥς ἀξίμετρος μὲν ἡ BE , ὀρθὰ δὲ τῇ εἰδὸς πλάτρεα ἡ EK , αἱ δὲ καταγόμεναι ἀπὸ τῆς κορυφῆς πεπερασμένας κατὰ γωνίαν ἐν τῇ γωνίᾳ τῇ H . φανερόν δὲ ὅτι αἱ BE εἰσὶν ἀντικείμεναι, διαμέτρος δὲ αὐτῶν μία ἔστω, καὶ ὀρθὰς ἴση.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κς'.

Δύο δοθεισῶν εὐθειῶν δίχα πηγνύσιν ἀλλήλας γράψαι πρὸς ἑκατέραν αὐτῶν ἀντικείμενας τομαῖς, ὥστε εἶναι αὐτῶν συζυγεῖς διαμέτρους τὰς εὐθείας, καὶ τὴν δύο ἀντικείμενων ἀξίμετρον τὸ πῶν ἑτέραν ἀντικείμενον δύνασθαι εἶδος.

ΕΣΤΩΣΑΝ αἱ δοθείσαι δύο εὐθεῖαι, δίχα πηγνύσιν ἀλλήλας, αἱ AG , ΔE : δεῖ δὲ πρὸς ἑκατέραν αὐτῶν ἀξίμετρον γράψαι ἀντικείμενας, ἵνα ὥσπερ αἱ AG , ΔE συζυγεῖς ἐν αὐταῖς, καὶ ἡ μὲν ΔE τὸ τῶν πρὸς τῇ AG εἶδος διωήσεται, ἡ δὲ AG τὸ τῶν πρὸς τῇ ΔE .

Ἐστω τῶν ἀπὸ ΔE ἴσων τὸ ὑπὸ $AG\Lambda$, πρὸς ὀρθὰς δὲ ἔστω ἡ AG τῇ ΓA , καὶ δύο δοθεισῶν εὐθειῶν πρὸς ὀρθὰς ἀλλήλας τῶν AG , ΓA , γεγράφθω

& ellipseos: in quadagesimo secundo asserit triangulum in parabola ex contingente & applicata factum æquale esse parallelogrammo, quod cum eo æqualem altitudinem habet & in dimidia basi constituitur: in quadagesimo tertio inquit, in hyperbola & ellipfi, quomodo se habeant inter se triangula quæ à contingentibus & applicatis fiunt: in quadagesimo quarto idem inquit in oppositis sectionibus: in quadagesimo quinto idem in secunda diametro hyperbolæ & ellipseos: in quadagesimo sexto de aliis parabolæ diametris quæ sunt post diametrum principalem: in quadagesimo septimo de aliis diametris hyperbolæ & ellipseos: in quadagesimo octavo de aliis diametris oppositarum sectionum: in quadagesimo nono de rectis juxta quas possunt applicari ad alias parabolæ diametros: in quinquagesimo de iisdem in hyperbola & ellipfi: in quinquagesimo primo de iisdem in oppositis sectionibus. itaque his præmissis subjungit, ad instar epilogi cujusdam, in quinquagesimo secundo problema, quo ostendit quomodo parabola in plano describatur: in quinquagesimo tertio, quomodo describatur hyperbola: in quinquagesimo quarto, quomodo ellipseos: in quinquagesimo quinto, quomodo oppositæ sectiones: in quinquagesimo sexto de conjugatis sectionibus agit.

λοιψων· ἐν τῇ μζ'. ὅτι τὴν παραβολὴν λέγει ἴσον εἶναι τὸ ὑπὸ τῆς ἐκπυκνῆς καὶ τῆς ἐκτετακνῆς κατελκεσθῆναι τείχοντος πρὸς ἑαυτὴν αὐτῇ ὁμοειδέσῃ ἡμίσια ἔχοντι βάσει· ἐν τῇ μγ'. ὅτι τὴν ὑπερβολὴν καὶ τὴν ἐλλείψιν ζῆται πῶς ἔχουσιν πρὸς ἀλλήλας τὰ ὑπὸ τῶν ἐκπυκνῶν καὶ τῶν ἐκτετακνῶν ἀπολκεσθῆναι τείχοντος· ἐν τῇ μδ'. τὸ αὐτὸ ἐν ταῖς ἀντικειμέναις· ἐν τῇ με' τὸ αὐτὸ ὅτι τῆς δευτέρας διαμέτρου τῆς ὑπερβολῆς καὶ τῆς ἐλλείψεως· ἐν τῇ με'. πρὸς τῶν μετὰ πλεῖστον ἀρχικῶν ἀφαιρέσεων τῆς παραβολῆς ἑτέρας· ἐν τῇ μζ'. πρὸς τῶν ἑτέρας διαμέτρων τῆς ὑπερβολῆς καὶ τῆς ἐλλείψεως· ἐν τῇ μν'. πρὸς τῶν ἑτέρας διαμέτρων τῶν ἀντικειμένων· ἐν τῇ μδ'. πρὸς τῶν παρ' αὐτῶν διαικνῶν αἱ καταγόμεναι ὅτι τὰς ἑτέρας διαμέτρους τῆς παραβολῆς· ἐν τῇ ν'. πρὸς τὴν οὐδὲ τῆς ὑπερβολῆς καὶ τῆς ἐλλείψεως· ἐν τῇ να'. πρὸς τὴν αὐτὴν τῶν ἀντικειμένων. ταῦτα οἰπῶν καὶ συμπέει τῆς οἰρημάτων ὁρίωνος πρὸς αὐτὴν, ἐν τῇ νβ'. δοκνοῖ παραβλεψάμενος, ὡς δυνατὸν ἐν ὁμοειδέσῃ γράψαι πλεῖστον παραβολῶν· ἐν τῇ νγ'. λέγει πῶς δεῖ γράψαι πλεῖστον ὑπερβολῶν· ἐν τῇ νδ'. πῶς δεῖ γράψαι πλεῖστον ἐλλείψιν· ἐν τῇ νε'. λέγει πῶς δεῖ γράψαι ἀντικειμένας· ἐν τῇ νς'. πρὸς τὴν συζυγίαν ἀντικειμένων.


ΠΑΠΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ
ΛΗΜΜΑΤΑ
ΕΙΣ ΚΩΝΙΚΩΝ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΠΕΡΓΑΙΟΥ.

PAPPI ALEXANDRINI
LEMMA
IN SECUNDUM LIBRUM CONICORUM
APOLLONII PERGÆI.

ΛΗΜΜΑ α'.

Δύο δοθείσων τ' AB, BG , καὶ εὐθείας τ' AE εἰς τὰς AB, BG ἐναρμόσται εὐθείαν ἴσην τῇ AE καὶ ὁμοῦλη-
ληλον αὐτῇ.

ΤΟΤΤΟ Δὲ φανερὸν. ἔαν
καὶ $\alpha\beta$ τ' B τῇ AB παρ-
έλληλον ἀγάγωμεν τ' BF ,
καὶ $\alpha\beta$ τ' G τῇ BG παρ-
έλληλον ἀγάγῃ τ' GA . ἔσται, $\alpha\beta$ τὸ
παρὰλληλόγραμμον εἶναι τὸ $AFBA$,
ὃ AG ἴση τῇ BF καὶ ὁμοῦληλος,
καὶ ἰσόμετροι εἰς τὰς δοθείσας εὐ-
θείας τὰς AB, BG .



LEMMA I.


Datis duabus rectis lineis AB, BG , & data recta AE ; inter ipsas AB, BG coaptare rectam ipsi AE æqualem & parallelam.

HOC autem manifestum est. nam si per B ducatur BF parallela AE , & per G ipsi AE parallela GA ; erit, propter $AFBA$ parallelogrammum, [per 34. I.] AG ipsi BF æqualis & parallela, & inter datas rectas AB, BG coaptata est.

ΛΗΜΜΑ β'.

Ἐστω δύο τρίγωνα τὰ ABG, AEZ , καὶ ἔστω ὡς ἡ AB πρὸς τὴν BG ἔστω ἡ AE πρὸς EZ , καὶ ὁμοῦληλος ἡ μὲν AB τῇ AE , ἡ δὲ BG τῇ EZ ὅτι καὶ ἡ AG τῇ AZ ἐστὶ ὁμοῦληλος.

ΕΚΒΕΛΩΜΕΝ ἡ BG καὶ συμ-
πύτω τ' AE, AZ κατὰ
τὰ H, Θ . ἐπεὶ ἐν ἑστὶν ὅτι ἡ
 AB πρὸς τ' BG ἔστω ἡ AE
πρὸς EZ , καὶ εἰσὶν ἴσαι αἱ $B,$
 E γωνίαι, διὰ τὸ εἶναι δύο παρὰ
δύο ἴση ἀρα ἔστι καὶ ἡ G τῇ Z ,
τυτῆται τῇ Θ , καὶ τὸ ὁμοῦλη-
λος εἶναι τὰς $EZ, H\Theta$. παρὰ-
λληλος ἀρα ἔστιν ἡ AG τῇ $A\Theta$.



LEMMA II.

Sint duo triangula ABG, AEZ ; sitque ut AB ad BG ita AE ad EZ , & AB quidem sit parallela AE , BG vero ipsi EZ : dico & AG ipsi AZ parallelam esse.

PRODUCATUR BG ; & con-
veniat cum AE, AZ
in punctis H, Θ . itaque quo-
niam est ut AB ad BG ita
 AE ad EZ , & anguli ad
 B, E æquales, quia duæ re-
ctæ sunt duabus parallelæ;
erit [per 6.6.] angulus G æ-
qualis angulo Z , hoc est an-
gulo Θ , propter parallelas
 $EZ, H\Theta$: ergo AG ipsi $A\Theta$
est parallela.

ΛΗΜΜΑ γ'.

Ἐστω εὐθεία ἡ AB , καὶ ἔστωσαν ἴσαι αἱ AG, AB , καὶ
μεταξὺ τ' G, A ἀληφθῶ τυχὸν σημεῖον τὸ E
ὅτι τὸ ὑπὸ AAB μετὰ τὸ ὑπὸ GEA ἴσιν ἐστὶ
τὸ ὑπὸ AEB .


LEMMA III.

Sit recta AB , sintque æquales AG, AB , & inter G & A sumatur quodvis punctum E : dico rectangulum AAB una cum rectangulo GEA æquale esse rectangulo AEB .

C c

Secetur

Secetur enim recta $\Gamma\Delta$ bifariam in puncto Z , quomodocunque se habuerit punctum E . & quomiam [per 5.2.] rectangulum $\Lambda\Delta B$ una cum quadrato ex $Z\Delta$ æquale est quadrato ex ZB ; sed quadrato quidem ex $Z\Delta$ rectangulum $\Gamma E\Delta$ una cum quadrato ex $Z E$ est æquale, quadrato vero ex ZB æquale rectangulum $\Lambda E B$ una cum quadrato ex $Z E$: erit igitur rectangulum $\Lambda\Delta B$ una cum rectangulo $\Gamma E\Delta$ & quadrato ex $Z E$ æquale rectangulo $\Lambda E B$ & quadrato ex $Z E$. commune auferatur quadratum ex $Z E$: reliquum igitur $\Lambda\Delta B$ rectangulum una cum rectangulo $\Gamma E\Delta$ æquale est rectangulo $\Lambda E B$.



Τετμήτω $\Gamma\Delta$ δίχα, ὅπως ἀνέχῃ τὸ σπέρμα, καὶ τὸ Z . καὶ ἐπεὶ τὸ ὑπὸ $\Lambda\Delta B$ ῥητὸν ἔστι καὶ τὸ $Z\Delta$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ZB , ἀλλὰ καὶ τὸ $Z\Delta$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ $\Gamma E\Delta$ μετὰ τῷ ὑπὸ $Z E$, τῷ δὲ ὑπὸ ZB ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ $\Lambda E B$ μετὰ τῷ ὑπὸ $Z E$. τὸ ἄρα ὑπὸ $\Lambda\Delta B$ μετὰ τῷ ὑπὸ $\Gamma E\Delta$ καὶ τῷ ὑπὸ $Z E$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ $\Lambda E B$ μετὰ τῷ ὑπὸ $Z E$. κοινὸν ἀφαιρέσω τὸ ὑπὸ $Z E$. λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ $\Lambda\Delta B$ μετὰ τῷ ὑπὸ $\Gamma E\Delta$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ $\Lambda E B$. ἄρα τὸ ὑπὸ $\Lambda\Delta B$ ῥητὸν ἔστι καὶ τὸ ὑπὸ $\Gamma E\Delta$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ $\Lambda E B$.

LEMMA IV.

Sit recta AB , & æquales sint AG , DB , & inter Γ , Δ sumatur quodvis punctum E : dico rectangulum $AE B$ æquale esse rectangulo $\Gamma E\Delta$ una cum rectangulo $\Delta A\Gamma$.

ΛΗΜΜΑ Δ'.

Ἐστω εὐθεῖα ἡ AB , καὶ ἕξωσιν ἰσῶν αἱ AG , DB , ἔμετρήτω $\Gamma\Delta$ διήφιον τυχὸν σημείον τὸ E . ὅτι τὸ ὑπὸ $AE B$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ $\Gamma E\Delta$ καὶ τῷ ὑπὸ $\Delta A\Gamma$.

Secetur enim recta $\Gamma\Delta$ bifariam in puncto Z , quomodocunque se habuerit punctum E : quare tota AZ ipsi ZB est æqualis: rectangulum igitur $AE B$ una cum quadrato ex EZ æquale est [per 5.2.] quadrato ex AZ : rectangulum autem $AE B$ cum quadrato ex EZ æquale est rectangulo $\Delta A\Gamma$ una cum quadrato ex EZ . sed & quadratum ex EZ est æquale rectangulo $\Gamma E\Delta$ una cum quadrato ex EZ . auferatur commune quadratum ex EZ : erit igitur reliquum rectangulum $AE B$ æquale rectangulo $\Gamma E\Delta$ una cum rectangulo $\Delta A\Gamma$.



Τετμήτω δ $\Gamma\Delta$ δίχα, ὅπως ἀνέχῃ τὸ σπέρμα, καὶ τὸ Z . καὶ ὅλη ἄρα ἡ AZ τῇ ZB ἴση ἐστὶν. τὸ μὲν ἄρα ὑπὸ $AE B$ μετὰ τῷ ὑπὸ EZ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ AZ . ὅτι τὸ ὑπὸ $AE B$ μετὰ τῷ ὑπὸ EZ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ $\Delta A\Gamma$ καὶ τῷ ὑπὸ EZ . ἀλλὰ τὸ ὑπὸ ΓZ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ $\Gamma E\Delta$ καὶ τῷ ὑπὸ EZ . κοινὸν ἀφαιρέσω τὸ ὑπὸ EZ τυχόμενον. λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ $AE B$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ $\Delta E\Gamma$ καὶ τῷ ὑπὸ $\Delta A\Gamma$.



LEMMA V.

Sint duo triacula $AB\Gamma$, ΔBZ ; & sit angulus quidem Γ æqualis angulo Z , angulus vero B angulo E major: dico $B\Gamma$ ad ΓA minorem rationem habere quam EZ ad $Z\Delta$.

ΛΗΜΜΑ Ε'.

Ἐστω δύο τρίγωνα τὰ $AB\Gamma$, ΔEZ , καὶ ἕξωσιν ἡ μὲν Γ τῇ Z , μείζων δὲ ἡ B τῇ E . ὅτι ἡ $B\Gamma$ πρὸς ΓA ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς EZ πρὸς $Z\Delta$.

Constituatur enim angulus $\Gamma B H$ æqualis angulo E , & est angulus Γ angulo Z æqualis: ergo [per 4.6.] ut $B\Gamma$ ad ΓH ita EZ ad $Z\Delta$. sed [per 8.5.] $B\Gamma$ ad ΓA minorem habet rationem quam $B\Gamma$ ad ΓH : igitur $B\Gamma$ ad ΓA minorem rationem habet quam EZ ad $Z\Delta$.



Συνείτω τῇ B γωνίᾳ ἴση ἡ ὑπὸ $\Gamma B H$. ἐστὶ δὲ καὶ ἡ Γ τῇ Z ἴση ἔστι ἄρα ὅτι ἡ $B\Gamma$ πρὸς ΓH ὥστε ἡ EZ πρὸς $Z\Delta$. ἀλλὰ ἡ $B\Gamma$ πρὸς ΓA ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς ΓH . καὶ ἡ $B\Gamma$ πρὸς ΓA ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς EZ πρὸς $Z\Delta$.



LEMMA VI.

Habeat rursus $B\Gamma$ ad ΓA maiorem rationem quam EZ ad $Z\Delta$, & sit angulus Γ æqualis angulo Z : dico angulum B angulo E minorem esse.

ΛΗΜΜΑ ς'.

Ἐχέτω δὲ πάλιν ἡ $B\Gamma$ πρὸς ΓA μείζονα λόγον ἢ πρὸς EZ πρὸς $Z\Delta$, ἴση δὲ ἔστω ἡ Γ γωνία τῇ Z . ὅτι πάλιν γάνεπη ἐλάσσονα ἡ B γωνία τῇ E γωνίᾳ.

Quoniam enim $B\Gamma$ ad ΓA maiorem rationem habet quam EZ ad $Z\Delta$; si igitur fiat ut $B\Gamma$ ad ΓA ita EZ ad aliam quandam; erit ea [per 10.5.] minor quam $Z\Delta$. sit ea recta ZH , & $E H$ jungatur. cumque circa æquales angulos latera proportionalia sint, erit angulus ad B [per 6.6.] æqualis angulo $Z E H$, qui angulo $Z E\Delta$ minor est.



Επεὶ δὲ ἡ $B\Gamma$ πρὸς ΓA μείζονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς EZ πρὸς $Z\Delta$. ἴσων ἄρα ποιῶν ὅτι ἡ $B\Gamma$ πρὸς ΓA ὥστε ἡ EZ πρὸς πᾶσαν ἄλλην ἴσην πρὸς ἐλάσσονα τῇ $Z\Delta$. ἔστω πρὸς τῇ ZH . καὶ ἐπεὶ ὁμοῦν ἡ BH καὶ πρὸς ἴσων γωνίαι ἀνάλογόν εἰσιν αἱ πλάγιαι. ἔστι ἄρα ὅτι ἡ B γωνία τῇ ὑπὸ $Z E H$ ἐλάσσονα ἔστι τῇ $Z E\Delta$. ὅ. ἔ. δ.


ΛΗΜ-

ΛΗΜΜΑ Ζ.

Εἰς ὁμοία τετράγωνα τὰ $ABΓ$, $ΔΕΖ$, καὶ διήχθωσαν αἱ AH , $ΔΘ$ ὥστε εἶναι ὡς τὸ ὑπὸ $BΓH$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΓΑ$ ὥστε τὸ ὑπὸ $ΕΖΘ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ZΔ$. ὅτι γὰρ ὁμοίων καὶ τὸ $AHΓ$ τετράγωνον τῷ $ΔΘΖ$ τετράγωνῳ.

Εἰπεὶ γὰρ εἶναι ὡς τὸ ὑπὸ $BΓH$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΓΑ$ ὥστε τὸ ὑπὸ $ΕΖΘ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ZΔ$, ἀλλ' ὁ μὲν $Γ$ ὑπὸ $BΓH$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΓΑ$


λόγος συνίσταται ἐκ τῶν $ΒΓ$ καὶ $ΗΓ$ καὶ ὁ $Δ$ ὑπὸ $ΕΖΘ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ZΔ$ συνίσταται ἐκ τῶν $ΕΖ$ καὶ $ΘΖ$ πρὸς $ZΔ$, ὅν ὁ πῶς $BΓ$ πρὸς $ΓΑ$ λόγος ὁ αὐτὸς εἶναι τῷ $ΕΖ$ πρὸς $ZΔ$, καὶ ὁ $ΗΓ$ πρὸς $ΓΑ$ λόγος ὁ αὐτὸς εἶναι τῷ $ΘΖ$ πρὸς $ZΔ$. καὶ πάλιν ὅτι γωνίας ὁμοίων εἶναι εἰς τὸ $AHΓ$ τετράγωνον τῷ $ΔΘΖ$ τετράγωνῳ. ὁ. ἔ. δ.



LEMMA VII.

Sint triangula similia $ABΓ$, $ΔΕΖ$; & ita ducantur AH , $ΔΘ$, ut sit rectangulum $BΓH$ ad quadratum ex $ΓΑ$ sicut rectangulum $ΕΖΘ$ ad quadratum ex $ZΔ$: dico & triangulum $AHΓ$ triangulo $ΔΘΖ$ simile esse.

Quoniam enim [ex hyp.] est ut rectangulum $BΓH$ ad quadratum ex $ΓΑ$ ita rectangulum $ΕΖΘ$ ad quadratum ex $ZΔ$; sed [per 23. 6.] ratio quidem rectanguli $BΓH$ ad quadratum ex $ΓΑ$ composita est ex ratione quam habet $BΓ$ ad $ΓΑ$ & ratione $ΗΓ$ ad $ΓΑ$; ratio autem rectanguli $ΕΖΘ$ ad quadratum ex $ZΔ$ componitur ex ratione $ΕΖ$ ad $ZΔ$ & ratione $ΘΖ$ ad $ZΔ$; quarum quidem ratio $BΓ$ ad $ΓΑ$ eadem est quae $ΕΖ$ ad $ZΔ$, ob similitudinem triangulorum: erit igitur reliqua ratio $ΗΓ$ ad $ΓΑ$ eadem quae ipsius $ΘΖ$ ad $ZΔ$, & [ex hyp.] sunt circa aequales angulos: ergo [per 6. 6.] triangulum $AHΓ$ triangulo $ΔΘΖ$ simile erit.




ΛΗΜΜΑ Η.

Διὰ μὲν ἔν τ' συνημιμέρους λόγους, ὡς περιήραρχηται. ἔστω δ' ἐν νῦν ἀποδείξαι μὴ παραχρησαμένον τῷ συνημιμέρῳ λόγῳ.

Κεῖθεν τῷ $μ$ ὑπὸ $BΓH$ ἴσον τὸ ὑπὸ $ΑΓΚ$. ἔστω ἄρα ὡς ὁ $BΓ$ πρὸς $ΓΚ$ ὥστε ὁ $ΑΓ$ πρὸς $ΓΗ$. τῷ $ν$ ὑπὸ $ΕΖΘ$ ἴσον καὶ τὸ ὑπὸ $ΔΖΑ$. ἔστω ἄρα ὡς ὁ $ΕΖ$ πρὸς $ΖΑ$ ὥστε ὁ $ΔΖ$ πρὸς $ZΘ$. ὑποκείτω δὲ ὡς τὸ ὑπὸ $BΓH$, τῷ $εἰς$ τὸ ὑπὸ $ΑΓΚ$, ὥστε τὸ ὑπὸ $ΑΓ$, τῷ $εἰς$ τὸ ὑπὸ $ΚΓ$ ὥστε $ΓΑ$, ὥστε τὸ ὑπὸ $ΕΖΘ$, τῷ $εἰς$ τὸ ὑπὸ $ΔΖΑ$ ὥστε τὸ ὑπὸ $ΔΖ$, τῷ $εἰς$ τὸ ὑπὸ $ΑΖ$ ὥστε $ZΔ$.

ἀλλὰ καὶ ὡς ὁ $BΓ$ πρὸς $ΓΑ$ ὥστε ὁ $ΕΖ$ πρὸς $ZΔ$, καὶ ὡς ὁμοίωτα $τ$ τετράγωνα καὶ ὡς ἄρα ὁ $BΓ$ πρὸς $ΓΚ$ ὥστε ὁ $ΕΖ$ πρὸς $ZΑ$. ἀλλ' ὡς μὲν ὁ $BΓ$ πρὸς $ΓΚ$ ὥστε ὁ $ΑΓ$ πρὸς $ΓΗ$, ὡς δὲ ὁ $ΕΖ$ πρὸς $ZΑ$ ὥστε ὁ $ΔΖ$ πρὸς $ZΘ$. καὶ ὡς ἄρα ὁ $ΑΓ$ πρὸς $ΓΗ$ ὥστε ὁ $ΔΖ$ πρὸς $ZΘ$. καὶ πάλιν ὅτι γωνίας ὁμοίων εἶναι εἰς τὸ $AΓH$ τετράγωνον τῷ $ΔΖΘ$ τετράγωνῳ. ὁμοίως καὶ τὸ AHB τῷ $ΔΘΕ$. ὥστε καὶ τὸ $ΑΒΓ$ τῷ $ΔΕΖ$. ὁ. ἔ. δ.



LEMMA VIII.

Hoc igitur per rationem compositam, eo quem diximus modo, demonstratur. sed jam liceat idem aliter demonstrare absque composita ratione.

Ponatur enim rectangulo $BΓH$ aequale rectangulum $ΑΓΚ$: ergo [per 16. 6.] ut $BΓ$ ad $ΓΚ$ ita $ΑΓ$ ad $ΓΗ$. ipsi vero rectangulo $ΕΖΘ$ aequale ponatur rectangulum $ΔΖΑ$: erit igitur ut $ΕΖ$ ad $ZΑ$ ita $ΔΖ$ ad $ZΘ$. sed positum est ut rectangulum $BΓH$, hoc est rectangulum $ΑΓΚ$, ad quadratum ex $ΑΓ$, hoc est [per 1. 6.] ut $ΚΓ$ ad $ΓΑ$ ita rectangulum $ΕΖΘ$, hoc est ipsum $ΔΖΑ$

ad quadratum ex $ΔΖ$, videlicet ut $ΔΖ$ ad $ZΔ$. ut autem $BΓ$ ad $ΓΑ$ ita $ΕΖ$ ad $ZΔ$, ob similitudinem triangulorum: ergo [per 22. 5.] ut $BΓ$ ad $ΓΚ$ ita $BΖ$ ad $ZΑ$. sed ut $BΓ$ ad $ΓΚ$ ita ostensa est $ΑΓ$ ad $ΓΗ$; itemque ut $ΕΖ$ ad $ZΑ$ ita $ΔΖ$ ad $ZΘ$: ut igitur $ΑΓ$ ad $ΓΗ$ ita erit $ΔΖ$ ad $ZΘ$. & sunt circa aequales angulos: triangulum igitur $ΑΓΗ$ [per 6. 6.] simile est triangulo $ΔΖΘ$. & eadem ratione triangulum AHB simile est triangulo $ΔΘΕ$, sicut triangulum $ΑΒΓ$ ipsi $ΔΕΖ$ simile est.

ΛΗΜΜΑ Θ.

Εἰς ὁμοίων τὸ μὲν $ΑΒΓ$ τετράγωνον τῷ $ΔΕΖ$ τετράγωνῳ, τὸ δὲ AHB τῷ $ΔΕΘ$ ὅτι γίνεται ὡς τὸ ὑπὸ $BΓH$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΓΑ$ ὥστε τὸ ὑπὸ $ΕΖΘ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ZΔ$.



Εἰπεὶ γὰρ καὶ ὁμοίων τετράγωνα, ἴση εἶναι ὅλην μὲν ἡ $Α$ ὅλην τῇ $Δ$, καὶ ἡ $ΒΑΗ$ τῇ $ΕΔΘ$. λοιπὴ ἄρα ἡ $υἱὸ$ $ΗΑΓ$ λοιπὴ τῇ $υἱὸ$ $ΘΔΖ$ εἶναι ἴση. ἀλλὰ καὶ ἡ $Γ$

LEMMA IX.

Sit triangulum quidem $ΑΒΓ$ simile triangulo $ΔΕΖ$, uti & triangulum AHB triangulo $ΔΕΘ$ simile: dico ut rectangulum $BΓH$ ad quadratum ex $ΓΑ$ ita esse rectangulum $ΕΖΘ$ ad quadratum ex $ZΔ$.

Quoniam enim, propter similitudinem triangulorum, totus angulus A toti $Δ$ est aequalis; angulus autem $ΒΑΗ$ aequalis est angulo $ΕΔΘ$: erit igitur reliquus $ΗΑΓ$ reliquo $ΘΔΖ$ aequalis. sed & angulus

gulus Γ est æqualis angulo Z : est igitur [per 4. 6.] ut $H\Gamma$ ad ΓA ita ΘZ ad $Z A$. ut autem $B\Gamma$ ad ΓA ita $E Z$ ad $Z A$: ergo & composita ratio compositæ rationi eadem erit: ut igitur rectangulum $B\Gamma H$ est ad quadratum ex ΓA ita rectangulum $E Z \Theta$ ad quadratum ex $Z A$.





τῇ Z : ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ $H\Gamma$ πρὸς τὴν ΓA ἕτως ἡ ΘZ πρὸς τὴν $Z A$. ἀλλὰ καὶ ὡς ἡ $B\Gamma$ πρὸς τὴν ΓA ἕτως ἡ $E Z$ πρὸς τὴν $Z A$: καὶ ὁ συννημῶς ἄρα τῶν συννημῶν ὅσιν ὁ αὐτός: ἐστὶν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ $B\Gamma H$

πρὸς τὸ ὑπὸ ΓA ἕτως τὸ ὑπὸ $E Z \Theta$ πρὸς τὸ ὑπὸ $Z A$.

Aliter absque ratione composita.

Ponatur rectangulo $B\Gamma H$ æquale rectangulum $A\Gamma K$, & rectangulo $E Z \Theta$ æquale rectangulum $\Delta Z \Lambda$; erit rursus ut $B\Gamma$ ad ΓK ita $A\Gamma$ ad ΓH . ut autem $E Z$ ad $Z \Lambda$ ita ΔZ ad $Z \Theta$: & eadem ratione qua supra, demonstrabimus ut $A\Gamma$ ad ΓH ita esse ΔZ ad $Z \Theta$: ergo ut $B\Gamma$ ad ΓK ita $E Z$ ad $Z \Lambda$. sed & ut $B\Gamma$ ad ΓA ita $E Z$ ad $Z A$, ob triangulorum similitudinem: ex æquali igitur [per 22. 9.] ut $K\Gamma$ ad ΓA , hoc est [per 1. 6.] ut rectangulum $K\Gamma A$ five rectangulum $B\Gamma H$ ad quadratum ex ΓA ita ΛZ ad $Z A$, hoc est rectangulum $\Lambda Z \Delta$ five rectangulum $E Z \Theta$, ad quadratum ex $Z A$.



Κ Εἶδον τῶν ὑπὸ ὑπὸ $B\Gamma H$ ἴσον τὸ ὑπὸ $A\Gamma K$, τῶν δ' ὑπὸ $E Z \Theta$ ἴσον τὸ ὑπὸ $\Delta Z \Lambda$. ἔστω πάλιν ὡς ἡ $B\Gamma$ πρὸς ΓK ἕτως ἡ $A\Gamma$ πρὸς ΓH . ὡς δὲ ἡ $E Z$ πρὸς $Z \Lambda$ ἕτως ἡ ΔZ πρὸς $Z \Theta$. καὶ κατὰ τὰς αὐτὰς τῶν ἐπάνω δειξάντων ὅτι ὡς ἡ $A\Gamma$ πρὸς ΓH ἕτως ἡ ΔZ πρὸς $Z \Theta$: καὶ ὡς ἄρα ἡ $B\Gamma$ πρὸς ΓK ἕτως ἡ $E Z$ πρὸς $Z \Lambda$. ἀλλὰ καὶ ὡς ἡ $B\Gamma$ πρὸς ΓA ἕτως ἡ $E Z$ πρὸς $Z A$, διὰ τὴν ὁμοιότητα: δι' ἴσου ἄρα ὅτι ὡς $K\Gamma$ πρὸς ΓA , τῶν ἐστὶν ὡς τὸ ὑπὸ $K\Gamma A$, ὅ ἐστι τὸ ὑπὸ $B\Gamma H$, πρὸς τὸ ὑπὸ $A\Gamma$ ἕτως ἡ ΔZ πρὸς $Z A$, τῶν ἐστὶ τὸ ὑπὸ $\Lambda Z \Delta$, ὅ ἐστι τὸ ὑπὸ $E Z \Theta$, πρὸς τὸ ὑπὸ $Z A$.

LEMMA X.



Similiter demonstrabimus, si fuerit ut rectangulum $B\Gamma H$ ad quadratum ex ΓA ita rectangulum $E Z \Theta$ ad quadratum ex $Z A$, & triangulum $AB\Gamma$ simile triangulo ΔBZ : etiam triangulum ABH triangulo $\Delta B\Theta$ simile esse.

ΛΗΜΜΑ Ι.

Ὁμοίως δὲ δείξομεν, ἐὰν ᾖ ὡς τὸ ὑπὸ $B\Gamma H$ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓA ἕτως τὸ ὑπὸ $E Z \Theta$ πρὸς τὸ ὑπὸ $Z A$, καὶ ὁμοίον τὸ $AB\Gamma$ τριγώνων τῶν ΔBZ τριγώνων καὶ τὸ ABH τριγώνων τῶν $\Delta B\Theta$ τριγώνων ὁμοίον εἶναι.

LEMMA XI.

Sint duo trianguia similia $AB\Gamma$, ΔBZ , & ducantur perpendiculares AH , $\Delta\Theta$: dico ut rectangulum $B\Gamma H$ ad quadratum ex AH ita esse rectangulum $B\Theta Z$ ad quadratum ex $\Delta\Theta$.



HOC autem ex iis, quæ supra [ad lem. 8.] dicta sunt, perspicue constat.



ΤΟΤΤΟ φανερόν, ὅτι ὁμοίον γίνεται τῶς πρὸς αὐτῶν.

LEMMA XII.

Sit æqualis quidem angulus B angulo E , angulus vero A angulo Δ minor: dico ΓB ad BA minorem rationem habere quam $Z E$ ad $B \Delta$.

ΛΗΜΜΑ ΙΒ'.

Εἴω ἴση ἡ μὲν B γωνία τῇ E , ἐλάσσων δὲ ἡ A τῇ Δ : ὅτι ἡ ΓB πρὸς BA ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς ἡ $Z E$ πρὸς $B \Delta$.



QUoniam enim angulus A minor est angulo Δ , constituatur ipsi A æqualis $E \Delta H$: est igitur [per 4. 6.] ut ΓB ad BA ita $H E$ ad $E \Delta$. sed [per 8. 5.] $H E$ ad $E \Delta$ minorem habet rationem quam $Z E$ ad $E \Delta$: ergo & ΓB ad BA minorem rationem habet quam $Z E$ ad $E \Delta$. similiter & omnia alia ejusmodi ostendemus.


ΕΠΕΙ γὰρ ἐλάσσων ἡ A γωνία τῇ Δ , ἀρκεῖται αὐτῇ ἴση ἡ ὑπὸ $E \Delta H$. ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ ΓB πρὸς BA ἕτως ἡ $H E$ πρὸς $E \Delta$. ἀλλὰ καὶ ἡ $H E$ πρὸς $E \Delta$ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς ἡ $Z E$ πρὸς $E \Delta$: καὶ ἡ ΓB ἄρα πρὸς BA ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς ἡ $Z E$ πρὸς $E \Delta$. καὶ πάντα τὰ ταῦτα τῇ αὐτῇ ἀγωγῇ δείξομεν.

LEM-

ΛΗΜΜΑ ΙΓ'.

Εἴπω ὡς τὸ ὑπὸ ΒΗΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΗ ἔτω τὸ ὑπὸ ΕΘΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΘ· καὶ ἡ μὲν ΒΗ τῇ ΗΓ ἴσῃ, ἡ δὲ ΓΗ πρὸς ΗΑ ἐλάσσονα λόγον ἔχῃτω ἢ πρὸς ΖΘ πρὸς ΘΔ. ὅπ μείζων εἴη ἡ ΖΘ τῇ ΘΕ.


ΕΠΕΙ γὰρ τὸ ἀπὸ ΓΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΑ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς ΖΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘΔ, ἀλλὰ τὸ ἀπὸ ΓΗ ἴσῃ ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΒΗΓ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΒΗΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΗ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘΔ. ἀλλ' ὡς τὸ ὑπὸ ΒΗΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΗ ἔστι ἰσούμενον τὸ ὑπὸ ΕΘΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘΔ· καὶ τὸ ὑπὸ ΕΘΖ ἄρα πρὸς τὸ ἀπὸ ΘΔ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘΔ· μείζον ἄρα εἴη τὸ ἀπὸ ΖΘ τῷ ὑπὸ ΕΘΖ. ὥς μείζων εἴη ἡ ΖΘ τῇ ΘΕ. ὅ. ἰ. δ.



LEMMA XIII.

Sit ut rectangulum ΒΗΓ ad quadratum ex ΑΗ ita rectangulum ΕΘΖ ad quadratum ex ΔΘ, & sit ΒΗ quidem æqualis ΗΓ; ΓΗ vero ad ΗΑ minorem rationem habeat quam ΖΘ ad ΘΔ: dico ΖΘ majorem esse quam ΘΕ.

Quoniam enim quadratum ex ΓΗ ad quadratum ex ΗΑ minorem rationem habet quam quadratum ex ΖΘ ad quadratum ex ΘΔ; quadratum autem ex ΓΗ æquale est rectangulo ΒΗΓ; habebit ΒΗΓ rectangulum ad quadratum ex ΑΗ minorem rationem quam quadratum ex ΖΘ ad quadratum ex ΘΔ. sed ut ΒΗΓ rectangulum ad quadratum ex ΑΗ ita positum est rectangulum ΕΘΖ ad quadratum ex ΘΔ: ergo rectangulum ΕΘΖ ad quadratum ex ΘΔ minorem rationem habet quam quadratum ex ΖΘ ad quadratum ex ΘΔ: majus igitur est [per 8. 5.] quadratum ex ΖΘ rectangulo ΕΘΖ; quare & ΖΘ major erit quam ΘΕ.



Dd

ΑΠΟΛ-

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΠΕΡΓΑΙΟΥ
ΚΩΝΙΚΩΝ
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ,

ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΥΤΟΚΙΟΥ ΑΣΚΑΛΩΝΙΤΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ.

APOLLONII PERGÆI
CONICORUM
LIBER SECUNDUS,

CUM COMMENTARIIS EUTOCII ASCALONITÆ.

Apollonius Eudemo S. P.

ΣI vales bene est, ego quidem satis commode habeo. *Apollonio* filio meo dedi, ut ad te perferret, secundum librum Conicorum à nobis conscriptorum: quem tu diligenter percurrere, & communica cum illis, qui eo tibi digni videbuntur. *Philonida* etiam Geometræ, quo cum tibi *Erbesi* amicitiam conciliaui, si quando in isthac *Pergami* loca venerit, legendum trade: tu cura ut vales. Vale.

PROP. I. Theor.

Si hyperbolam recta linea ad verticem contingat, & ab ipso, ex utraque parte diametri, ponatur recta æqualis ei quæ potest quartam figuræ partem: rectæ quæ à sectionis centro ad sumptos terminos contingentis ducuntur cum sectione non convenient.

Απολλώνιος Εὐδήμῳ χαίρειν.

ΕΙ ὑγίαις ἔχει δι' χαλῶς, καὶ αὐτὸς δὲ μετέως ἔχω. Απολλώνιος τ' ἴσιν με πέπομφα πρὸς σε κομίζοντα τὸ δεύτερον βιβλίον τῆς συγγραμμῆς ἡμῶν κοινῶν. Δίελθε ἐν αὐτῷ ὅτι μελῶς, καὶ τοῖς ἀξίοις τῶν τοῖς τῶν κοινῶν μεταδίδω, καὶ Φιλονίδης δὲ ὁ γεωμέτρης, ὅτι καὶ σωέσποιά σοι ἐν Εφέσῳ, εἰ ποτε ὅτι βιάλλῃ εἰς τὴν κατὰ Πέργαμον τόπῳ, μετάδος αὐτῷ καὶ σπαντὶ ὅτι μελῶ ἵνα ὑγιάης. εὐτύχει.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ α'.

Εάν ὑπερβολῆς κατὰ κορυφὴν εὐθεῖα ἐφάπτη, καὶ ἀπ' αὐτῆς ἐφ' ἐκάτερα τ' διαμέτρῳ ἀποληφθῇ ἴση τῇ δυναμίδι τὸ τέταρτον ἔστω αἱ ἀπὸ τῆς κέντρῳ τ' τομῆς ὅτι τὰ ληφθέντα πέρατα τ' ἐφαπτομένης ἀγόμεναι εὐθεῖαι καὶ συμπίπτουσι τῇ τομῇ.

ΕΣΤΩ

ΕΣΤΩ ὑπερβολή, ἥς διάμετρος ἡ ΑΒ, κέντρον δὲ τὸ Γ, ὁρίζεται ἡ ΒΖ, ἢ ἐφαπτομένη τῆς κατὰ τὸ Β ἡ ΔΖ, καὶ τῶν περὶ τὴν ἑξ ὑπὸ τῶν ΑΒΖ ἑσθ' ἴσων ἔστω τὸ ἀφ' ἑκατέρω ΒΔ, ΒΕ, καὶ ἐπιζυγίζονται αἱ ΓΔ, ΓΕ ἐκτελεσθέντων λέγω ὅτι οὐ συμπεσύνταί τῇ τομῇ.

Εἰ γὰρ διωκτὸν, συμπεπλήστω ἡ ΓΔ τῇ τομῇ κατὰ τὸ Η, καὶ δὸς τῇ Η πεταγμένως κατήχθω ἡ ΗΘ· παρ' ἀλλήλους ἄρα ἐστὶ τῇ ΔΒ. ἐπεὶ δὲ ἔστω ὡς ΑΒ πρὸς ΒΖ ἕτως τὸ δὸς ΑΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΒΖ, ἀλλὰ τὸ μὲν δὸς ΑΒ πέταρτον μέρος ἐστὶ τὸ δὸς ΓΒ, τὸ δὲ ὑπὸ ΑΒΖ πέταρτον τὸ δὸς ΒΔ· ὡς ἄρα ἡ ΑΒ πρὸς ΒΖ ἕτως τὸ δὸς ΓΒ πρὸς τὸ δὸς ΔΒ, τετέστι τὸ δὸς ΓΘ πρὸς τὸ δὸς ΘΗ. ἐστὶ δὲ καὶ ὡς ἡ ΑΒ πρὸς ΒΖ ἕτως τὸ ὑπὸ ΑΘΒ πρὸς τὸ δὸς ΘΗ· ὡς ἄρα τὸ δὸς ΓΘ πρὸς τὸ δὸς ΘΗ ἕτως τὸ ὑπὸ ΑΘΒ πρὸς τὸ δὸς ΘΗ· ἴσων ἄρα τὸ ὑπὸ ΑΘΒ τῷ δὸς ΓΘ, ὅπερ ἄπο· ἐκ ἄρα ἡ ΓΔ συμπεσύνταί τῇ τομῇ. ὁμοίως δὲ δείξομεν ὅτι ἔσθ' ἡ ΓΕ· ΑΣΥΜΠΤΟΤΟΙ ἄρα εἰσὶ τῇ τομῇ αἱ ΓΔ, ΓΕ.



SIT hyperbola, cujus diameter AB, centrum G, & rectum figuræ latus BZ, recta vero ΔΒ sectionem contingat in B; & quartæ parti figuræ, quæ continetur sub ΑΒΖ, æquale sit quadratum utriusque ipsarum ΔΒ, ΒΕ, & junctæ ΓΔ, ΓΕ producantur: dico eas cum sectione non convenire.

Si enim fieri potest, conveniat ΓΔ cum sectione in Η, & ab Η ordinatim applicetur ΘΗ: ergo [per 17. I. huj.] ΗΘ parallela est ipsi ΔΒ. quoniam igitur ut ΑΒ ad ΒΖ ita [per 1.6.] est quadratum ex ΑΒ ad rectangulum ΑΒΖ; quadratum autem ΓΒ quarta pars est quadrati ex ΑΒ, & quadratum ex ΒΔ itidem quarta pars rectanguli ΑΒΖ: erit [per 15.5.] itaque ΑΒ ad ΒΖ ut quadratum ex ΓΒ ad quadratum ex ΒΔ, hoc est [per 4.6.] quadratum ex ΓΘ ad quadratum ex

ΘΗ. est vero [per 21. I. huj.] ut ΑΒ ad ΒΖ ita rectangulum ΑΘΒ ad quadratum ex ΘΗ: igitur ut quadratum ex ΓΘ ad quadratum ex ΘΗ ita rectangulum ΑΘΒ ad quadratum ex ΘΗ: rectangulum igitur ΑΘΒ [per 9.5.] quadrato ex ΓΘ æquale est; quod [per 6.2.] est absurdum: ergo ΓΔ cum sectione non conveniet. similiter demonstrabitur neque ipsam ΓΕ convenire cum sectione: sunt igitur ΓΔ, ΓΕ ΑΣΥΜΠΤΟΤΙ, hoc est, cum sectione non convenientes.

EUTOCIUS.

Ἀρχὴν τοῦ β' βιβλίου τῶν κωνικῶν, ὃ φησὶ τὸ μὲν ἀνδράσι, τὸ δὲ οἷμαι εἶναι ἀπορροήν, ὅτι ποσὶν μὲν εἰς αὐτὸ χέρον, ὡς ἀν' ἡν διωκτὸν ἀφ' ἧς ἐν τῷ πρῶτῳ βιβλίῳ νοθεύεται. τὸ πρῶτον διόραμα πῶς ἐκείναι, εἰ γὰρ μὴ, τότε ἐν τῇ κωνικῇ ἀπορροήν ἐκείναι· αἱ γὰρ ΓΔ, ΓΕ ἀσύμπτωτοι εἰσιν ἐν τῇ τομῇ, καὶ αὐταὶ ἀφ' ἑκατέρω καὶ πᾶσι διαμέτρον καὶ ἐφαπτομένην.

Explicaturus secundum librum Conicorum, amicissime *Antbemi*, illud præmittere oportere existimo, me ea tantummodo in ipsum conscribere, quæ ex primo libro intelligi possunt. Primum theorema casum non habet; nam diversitas schematum nullam hic facti diversitatem: rectæ enim ΔΓ, ΓΕ sectionis asymptoti cum sint, eædem manent in omni diametro & contingente.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Β'.

Τῶν αὐτῶν ὄντων, δεκτέον, ὅτι ἐτέρα ἀσύμπτωτος οὐκ ἔστι τέταρτος ἢ ὁμοειδὲς γωνίαν ὑπὸ τῇ ΔΓΕ.

PROP. II. Theor.

Isidem manentibus, demonstrandum est non esse aliam asymptoton, quæ angulum ΔΓΕ dividat.


Εἰ γὰρ διωκτὸν, ἔστω ἡ ΓΘ, καὶ ἀφ' ἧς Β τῇ ΓΔ ὁμοειδὲς γωνίαν ἔσθ' ἡ ΒΘ, καὶ συμπεπλήστω τῇ ΓΘ κατὰ τὸ Θ, ἢ τῇ ΒΘ ἰσὺν κείσθω ἡ ΔΗ, καὶ ἐπιζυγίζονται ἡ ΗΘ ἐκτελεσθέντων ὅτι τὰ Κ, Λ, Μ.

Επεὶ δὲ ἔστω ΒΘ, ΔΗ ἰσὺν καὶ ὁμοειδῆ, ἢ αἱ ΔΒ, ΗΘ ἰσὺν καὶ ὁμοειδῆ. ἢ ἐπεὶ ἡ ΑΒ διχαζομένη κατὰ τὸ Γ, καὶ πρὸς τὴν αὐτὴν πρὸς ΒΛ· τὸ ὑπὸ ΑΛΒ μετὰ τὸ δὸς ΓΒ ἴσων ἐστὶ τῷ δὸς ΓΛ. ὁμοίως δὲ ἐπειδὴ ὁμοειδῆς ἐστὶ ἡ ΗΜ τῇ ΔΕ, καὶ ἴσων ἡ ΔΒ τῇ ΒΕ· ἴσων ἄρα καὶ ἡ ΗΔ τῇ ΑΜ. καὶ ἐπεὶ ἴσων ἐστὶ ἡ ΗΘ τῇ ΔΒ, μετὰ ἄρα ἡ ΗΚ τῇ ΔΒ. ἐστὶ δὲ καὶ ΚΜ τῇ ΒΕ μείζων, ἐπεὶ καὶ τῇ

S I enim fieri potest, sit ΓΘ; & per Β ipsi ΓΔ parallela ducatur ΒΘ, quæ cum ΓΘ in Θ puncto conveniat; ipsi vero ΒΘ ponatur æqualis ΔΗ; & junctæ ΗΘ ad Κ, Λ, Μ producantur.

Quoniam igitur ΒΘ, ΔΗ æquales sunt & parallelæ; & ipsæ ΔΒ, ΗΘ [per 33. I.] æquales & parallelæ erunt. & quoniam ΑΒ bifariam secatur in Γ, & ipsi adjungitur quædam ΒΛ: ergo [per 6.2.] rectangulum ΑΛΒ una cum quadrato ex ΓΒ æquale est quadrato ex ΓΛ. similiter quoniam ΗΜ ipsi ΔΒ est parallela, atque est ΔΒ æqualis ΒΕ; & ΗΛ ipsi ΑΜ æqualis erit. & quoniam ΗΘ æqualis est ΔΒ; erit ΗΚ ipsa ΔΒ major. est vero & ΚΜ major ipsa ΒΕ, quia & ipsa

ipsa ΛM : rectangulum igitur MKH majus est rectangulo ΔBE , hoc est quadrato ex ΔB . quoniam igitur ut ΛB ad BZ ita est [ex demonstr. ad præc.] quadratum ex ΓB ad quadratum ex $B\Delta$; atque ut ΛB ad BZ ita [per 21. 1. huj.] $\Lambda \Lambda B$ rectangulum ad quadratum ex ΛK : erit igitur ut quadratum ex ΓB ad quadratum ex $B\Delta$ ita $\Lambda \Lambda B$ rectangulum ad quadratum ex ΛK . ut vero quadratum ex ΓB ad quadratum ex $B\Delta$ ita [per 4. & 22. 6.] quadratum ex $\Gamma \Lambda$ ad quadratum ex ΛH : ergo ut quadratum ex $\Gamma \Lambda$ ad quadratum ex ΛH ita $\Lambda \Lambda B$ rectangulum ad quadratum ex ΛK . quoniam itaque est ut totum quadratum ex $\Gamma \Lambda$ ad totum quadratum ex ΛH ita ablatum rectangulum $\Lambda \Lambda B$ ad ablatum quadratum ex ΛK ; erit reliquum, nempe [per 6. 2.] quadratum ex ΓB , ad reliquum [per eandem] rectangulum MKH ut quadratum ex $\Gamma \Lambda$ ad quadratum ex ΛH , hoc est ut quadratum ex ΓB ad quadratum ex $B\Delta$; ergo rectangulum MKH æquale est quadrato ex $B\Delta$. sed & ostensum est eo majus esse: quod absurdum. igitur $\Gamma \Theta$ non est asymptotos.



ΛM : τὸ ἄρα ὑπὸ MKH μείζον ἐστὶ τὸ ὑπὸ ΔBE , τῆς ΔB . ἐπεὶ ὅν ἐστιν ὡς ἡ ΛB πρὸς BZ ὅτως τὸ ὑπὸ ΓB πρὸς τὸ ὑπὸ $B\Delta$, ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΛB πρὸς BZ ὅτως τὸ ὑπὸ $\Lambda \Lambda B$ πρὸς τὸ ὑπὸ ΛK , καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ΓB πρὸς τὸ ἀπὸ $B\Delta$ ὅτως τὸ ὑπὸ $\Lambda \Lambda B$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΛK . ὡς δὲ τὸ ἀπὸ ΓB πρὸς τὸ ἀπὸ $B\Delta$ ὅτως τὸ ἀπὸ $\Gamma \Lambda$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΛH , καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ $\Gamma \Lambda$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΛH ὅτως τὸ ὑπὸ $\Lambda \Lambda B$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΛK . ἐπεὶ ὅν ἐστιν ὡς ὅλον τὸ ἀπὸ $\Gamma \Lambda$ πρὸς ὅλον τὸ ἀπὸ ΛH ὅτως ἀφαιρῶν τὸ ὑπὸ $\Lambda \Lambda B$ πρὸς ἀφαιρῶν τὸ ἀπὸ ΛK , καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ ἀπὸ ΓB πρὸς λοιπὸν τὸ ὑπὸ MKH ἐστὶν ὡς τὸ ἀπὸ $\Gamma \Lambda$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΛH , τῆς ΔB τὸ ἀπὸ ΓB πρὸς τὸ ἀπὸ ΔB . ἴσιν ἄρα τῶ ἀπὸ ΔB τὸ ὑπὸ MKH ἀλλὰ ἔ μείζον αὐτὸ δέδεικται, ὅπερ ἄπορον· ἐκ ἄρα ἡ $\Gamma \Theta$ ἀσύμπτωτός ἐστι τῇ τμῇ.

EUTOCIUS.

Hoc theorema casum non habet, siquidem $B\Theta$ sectionem omnino in duobus punctis secat. quoniam enim parallela est ipsi $\Gamma \Delta$, cum ipsa $\Gamma \Theta$ conveniet; ideoque prius cum sectione conveniet.


Τὸ τοῦ διαγράμματος πᾶσι ἐκ ἔχει, ἡ μὲν $B\Theta$ πάντα τμήματα καὶ τμήματα κατὰ δύο σημεία. ἐπεὶ γὰρ παράλληλος ἐστὶ τῇ $\Gamma \Delta$, συμπίπτει τῇ $\Gamma \Theta$, ὅσα ἐξέπτεται τῇ τμῇ συμπίπτει.

PROP. III. Theor.

Si hyperbolam contingat recta linea: cum utraque asymptoton conveniet, & ad tactum bifariam secabitur; quadratum vero utriusque ejus portionis æquale erit quartæ parti figuræ ad diametrum per tactum ductam constitutæ.

SIT hyperbola $AB\Gamma$, cujus centrum E , & asymptoti sint ZE, EH , quedam vero recta ΘK sectionem contingat in puncto B : dico ΘK productam cum ZE, EH convenire.

Si enim fieri potest, non conveniat, & juncta $B\Theta$ producatur, sitque ipsi $B\Theta$ æqualis $B\Delta$: diameter igitur [per 47. 1. huj.] est $B\Delta$. ponatur vero quartæ parti figuræ, quæ est ad $B\Delta$, æquale quadratum utriusque ipsarum $\Theta B, BK$, & jungantur $\Theta E, EK$: ergo [per 1. 2. huj.] $\Theta E, EK$ asymptoti sunt, quod [per 2. 2. huj.] fieri nequit: positum est enim asymptotos esse ZE, EH : igitur ΘK producta cum ipsis ZE, EH conveniet, puta in punctis Z, H .



ΠΡΟΤΑΣΙΣ γ'.
Εάν ὑπερβολὴς εὐθεῖα ἐφάπτηται, ἡ τμήματα τῆς ἀσυμπίπτου καὶ διὰ τμῆσιν κατὰ τὴν ἀφ' ἑκατέρας τῶν τμημάτων αὐτῆς τετραγώνων ἴσων ἵσιν τῷ τετάρτῳ γινόμενῳ εὐθείας πρὸς τῇ ΔB τῆς ἀφ' ἑκατέρου ΔB μέρους.

ΕΣΤΩ ὑπερβολὴ ἡ $AB\Gamma$, κέντρον δ' αὐτῆς τὸ E , ἐ ἀσύμπτωτοι αἱ ZE, EH , καὶ ἐφαπτιομένη τις αὐτῆς κατὰ τὸ B ἡ ΘK . λέγω ὅτι ἐκβαλλομένη ἡ ΘK συμπίπτει τῇ ZE, EH .
Εἰ γὰρ δυνατὸν, μὴ συμπίπτειν, καὶ ὅτι δὲ διελθῇ ἡ $B\Theta$ ἐκβαλλομένη, ἐκείνη τῇ $B\Theta$ ἴση ἡ $B\Delta$. διὰ τὴν ΔB ἴσιν ἵσιν τῷ τετάρτῳ τῆς πρὸς τῇ $B\Delta$ εὐθείας ἴσιν τὸ ἀφ' ἑκατέρου τῶν $\Theta B, BK$, καὶ ἐπέξελθουσιν αἱ $\Theta E, EK$ ἀσύμπτωτοι ἄρα εἰσιν, ὅπερ ἄπορον· ὑπεναντίας γὰρ ZE, EH ἀσύμπτωτοι· ἡ ἄρα $K\Theta$ ἐκβαλλομένη συμπίπτει τῇ ZE, EH ἀσύμπτωτοις κατὰ τὰ Z, H .

Λέγω

λέγω δὲ ὅτι καὶ τὸ ἀφ' ἑκατέρου τῶν BZ, BH ἴσον ἔσται τῷ τεταρτῷ ὅτι πρὸς τῇ BA ἴδως. μὴ γὰρ, ἀλλὰ, αἱ διωκόμεναι, ὅτι τῷ τεταρτῷ ἴδως ἴσων τὸ ἀφ' ἑκατέρου τῶν BZ, BH ἀσύμπτωτοι ἄρα εἰσὶν αἱ BE, BK , ὅπερ ἀπίκται· τὸ ἄρα ἀφ' ἑκατέρου τῶν BZ, BH ἴσον ἔσται τῷ τεταρτῷ ὅτι πρὸς τῇ BA ἴδως.

Dico quadratum utriusvis ipsarum BZ, BH æquale esse quartæ parti figuræ quæ fit ad BA ; non enim, sed si fieri potest, sit quartæ parti istius figuræ æquale quadratum utriusvis ipsarum BZ, BH : asymptoti igitur sunt [per 1. 2. huj.] BE, BK ; quod est absurdum: ergo quadratum utriusvis BZ, BH æquale est quartæ parti figuræ ad ipsam BA constitutæ.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Δ'.

Δύο δοθέντων εὐθεϊῶν γωνίας περιέχουσιν, καὶ σημείον ἐντὸς τῆς γωνίας· ῥαβδῶσαι αὐτὰς καὶ σημείον κέντρον καὶ καλουμένην ὑπερβολὴν, ὥστε ἀσυμπίπτουσιν εἰς αὐτὰς τὰς δοθείσας εὐθείας.*

ΕΣΤΩΣΑΝ δύο εὐθεῖαι αἱ AB, AG τυχούσων γωνίαν περιέχουσιν τὴν A , καὶ διδοῦσιν σημείον τι τὸ Δ , καὶ δύνανται διὰ τοῦ Δ εἰς ἀσυμπίπτουσας AB, AG ῥαβδῶσαι ὑπερβολὴν.

Επιζεύχθω ἡ AD , καὶ ἐκβεβλήθω ὅτι τὸ E , καὶ κείσθω τῇ AD ἴση ἡ AE , καὶ ἀγέτω τῇ AB ὁμοῦ καὶ ἡ AG ὁμοῦ ἡ AZ , καὶ κείσθω τῇ AZ ἴση ἡ ZG , καὶ ὅτι ζεύχθῃσι ἡ GD ἐκβεβλήθω ὅτι τὸ B , καὶ τῷ δὸτὸ τῶν GB ἴσων γωνόντων τὸ ὑπὸ DE, H · καὶ ἐκβληθείσης τῆς AD , ῥαβδῶσθαι περὶ αὐτῇ διὰ τοῦ Δ ὑπερβολήν, ὥστε πρὸς κατευθυνόμεναι διωκόμεναι τὴν H ὑπερβάλλοντα ἐπὶ ὁμοίῳ τῷ ὑπὸ DE, H .

Επεὶ δὲ ὁμοῦ καὶ ὁμοῦ ἔστιν ἡ AD τῇ BA , καὶ ἴση ἡ AG τῇ ZA · ἴση ἄρα ἔστι ἡ GD τῇ DB · ὥστε τὸ δὸτὸ τῶν GB περὶ ἀπλάσιον ἔστι τὸ δὸτὸ τῶν GD . καὶ ἐπὶ τὸ δὸτὸ τῶν GB ἴσων τῷ ὑπὸ DE, H · ἐκὰς πρὸν ἄρα τὸ δὸτὸ τῶν GD, DB πέταρτον μέρος ἐστὶν τοῦ ὑπὸ DE, H ἴδως· αἱ ἄρα AB, AG ἀσύμπτωτοι εἰσι τῇ ῥαβδῶσει ὑπερβολῆς.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Ε'.


Εάν ποδὲρ καὶ ἡ ὑπερβολὴ καὶ ἡ ἀφ' ἑκατέρου εὐθεῖαν πρὸς τὴν δὴ καὶ τὸ πέραν τῆς ἀφ' ἑκατέρου εὐθεῖας εὐθείας τὸ σημείον ποδὲρ καὶ ἡ δὴ καὶ τὸ πέραν τῆς ἀφ' ἑκατέρου εὐθείας εὐθείας.

ΕΣΤΩ ποδὲρ καὶ ἡ ὑπερβολὴ καὶ ἡ ἀφ' ἑκατέρου εὐθεῖαν πρὸς τὴν δὴ καὶ τὸ πέραν τῆς ἀφ' ἑκατέρου εὐθείας εὐθείας τὸ σημείον ποδὲρ καὶ ἡ δὴ καὶ τὸ πέραν τῆς ἀφ' ἑκατέρου εὐθείας εὐθείας.

PROP. IV. Probl.

Datis duabus rectis lineis angulum continentibus, & puncto intra angulum dato: describere per punctum comi sectionem quæ hyperbola appellatur, ita ut datæ rectæ ipsius asymptoti sint.

SIT duæ rectæ AB, AG angulum quemvis ad A continentes, sitque datum punctum Δ , & oporteat per Δ intra asymptotos AB, AG hyperbolam describere.



Jungatur AD , & ad E producat, & fiat AE æqualis AD , & per Δ ipsi AB parallela ducatur AZ , ponaturque AZ æqualis ZG , & juncta GD producat ad B , & quadrato ex GB æquale fiat [ope 12. 6.] rectangulum sub DE & H , & producta AD , circa ipsam per Δ hyperbola describatur [per 53. 1. huj.] ita ut applicatæ ad diametrum possint rectangula adjacentia rectæ H , excedentiaque figuræ sub ipsis DE, H contenta finiri.

Quoniam igitur parallela est AZ ipsi BA , & AG æqualis ZA ; erit [per 2. 6.] GD ipsi DB æqualis: ergo [per 2. 2.] quadratum ex GB quadruplum est quadrati ex GD . atque est [per constr.] quadratum ex GD æquale rectangulo sub DE, H : utrumque igitur quadratorum ex GD, DB quarta pars est figuræ quæ sub DE, H continetur: quare [per 1. 2. huj.] AB, AG descriptæ hyperbolæ asymptoti sunt.


PROP. V. Theor.

Si parabolæ vel hyperbolæ diameter rectam quandam bifariam secet; quæ ad terminum diametri contingit sectionem parallela est rectæ bifariam secitæ.

SIT parabola vel hyperbola ABG , cujus diameter AB , & ZBH sectionem contingat; ducatur autem quædam AEF in sectione, faciens AB æqualem ipsi EF : dico AE parallelam esse ipsi ZH .

* Vide Lemma II. Pappi in Librum quintum.

Nisi enim ita sit, ducatur per Γ ipsi ZH parallela $\Gamma\Theta$, & jungatur ΘA . quoniam igitur $AB\Gamma$ est parabola vel hyperbola, cujus diameter quidem ΔB , contingens autem ZH , atque ipsi ZH parallela est $\Gamma\Theta$: erit [per 46. vel 47. I. huj.] ΓK æqualis $K\Theta$. sed & ΓE [ex hyp.] ipsi EA est æqualis: ergo [per 2. 6.] $A\Theta$ parallela est ipsi KE ; quod fieri non potest: producta enim cum ipsa $B\Delta$ [per 22. I. huj.] convenit.




Εἰ γὰρ μὴ, ἦχθω $\Delta\Gamma\Theta$ τῇ ZH ὁμοειδὴς ἢ $\Gamma\Theta$, καὶ ἐπιζυγῶσθαι ἢ ΘA . ἐπεὶ ἔν τῷ $\Delta\Gamma\Theta$ ἡ ὑπερβολὴ ἢ ἡ παραβολὴ ἐστὶν ἢ $AB\Gamma$, ἥς $\Delta\Gamma\Theta$ μὲν ἢ ΔE , ἐφαπτομένη δὲ ἢ ZH , ἢ $\Gamma\Theta$ ὁμοειδὴς αὐτῇ ἢ $\Gamma\Theta$. ἴση ἄρα ἐστὶν ἢ ΓK τῇ $K\Theta$. ἀλλὰ ἢ ΓE τῇ EA . ἢ ἄρα $A\Theta$ τῇ KE ὁμοειδὴς ἐστὶν, ὅπερ ἀδυνάστει· συμπίπτει γὰρ ὁ Δ ἐφαπτομένη τῇ $B\Delta$.

PROP. VI. Theor.

Si ellipseos vel circuli circumferentiae diameter rectam quandam non per centrum transeuntem bifariam secet: quæ ad terminum diametri sectionem contingit parallela erit rectæ bifariam secæ.

SIT ellipsis vel circuli circumferentia, cujus diameter AB , & AB ipsam $\Gamma\Delta$ non transeuntem per centrum bifariam secet in E : dico rectam, quæ sectionem contingit ad A , ipsi $\Delta\Gamma$ parallelam esse.


Nam, si fieri potest, sit recta ΔZ sectionem contingenti in puncto A parallela: æqualis igitur est [per 47. I. huj.] ΔH ipsi ZH . est autem [ex hyp.] & ΔB æqualis $E\Gamma$: ergo [per 2. 6.] ΓZ ipsi HE est parallela, quod est absurdum. etenim si H fuerit centrum sectionis AB ; linea ΓZ [per 23. I. huj.] cum diametro AB occurret: si non sit, ponatur centrum K , junctaque ΔK producatur ad Θ , & jungatur $\Gamma\Theta$. quoniam igitur ΔK æqualis est $K\Theta$, & ΔB ipsi $E\Gamma$; erit [per 2. 6.] $\Gamma\Theta$ parallela ipsi AB . sed & ΓZ [ex hyp.] eidem est parallela, quod est absurdum: ergo quæ ad A sectionem contingit ipsi $\Gamma\Delta$ est parallela.



ΠΡΟΤΑΣΙΣ ε'.

Εάν ἑλλείψους ἢ κύκλου περιφέρειας ἢ ἀξίμετρος εὐθεΐαν πᾶσι διχοτμήσῃ μὴ ἀξίμετρον κέντρον ἔχουσαν ἢ κατὰ τὸ πῆγμα τῷ ἀξίμετρου ἐκτεταταῖς τῷ τομῆς ὁμοειδὴς ἔσται τῇ διχοτμήσει εὐθείᾳ.

ΕΣΤΩ ἑλλείψους ἢ κύκλου περιφέρεια, ἥς διάμετρος ἢ AB , ἢ AB τὴν $\Gamma\Delta$ μὴ διὰ τῷ κέντρῳ ἔχουσαν διχοτμήσῃ κατὰ τὸ E . λέγω ὅτι ἡ κατὰ τὸ A ἐφαπτομένη ὁμοειδὴς ἐστὶ τῇ $\Delta\Gamma$.



Εἰ γὰρ μὴ, ἔστω τῇ κατὰ τὸ A ἐφαπτομένη ὁμοειδὴς ἢ ΔZ . ἴση ἄρα ἐστὶν ἢ ΔH τῇ ZH . ἐστὶ δὲ καὶ ἢ ΔE τῇ $E\Gamma$. ἴση ὁμοειδὴς ἄρα ἐστὶν ἢ ΓZ τῇ HE , ὅπερ ἀδυνάστει· οἱ γὰρ τὸ H σημειῶν κέντρον ἐστὶ τῆς AB τομῆς, ἢ ΓZ συμ-

πίπτει τῇ AB . ἢ πᾶσι μὴ ἐστὶν, ὑποκίνομεν τὸ K , καὶ $\Delta\Gamma\Theta$ ὁμοειδὴς ἢ ΔK ἐκτετατῇ ὅτι τὸ Θ , καὶ ἐπιζυγῶσθαι ἢ $\Gamma\Theta$. ἐπεὶ ἔν ἴση ἐστὶν ἢ ΔK τῇ $K\Theta$, ἐστὶ δὲ καὶ ἢ ΔE τῇ $E\Gamma$. ὁμοειδὴς ἄρα ἐστὶν ἢ $\Gamma\Theta$ τῇ AB . ἐστὶ δὲ καὶ ἢ ΓZ τῇ αὐτῇ AB ὁμοειδὴς, ὅπερ ἀδυνάστει· ἢ ἄρα κατὰ τὸ A ἐφαπτομένη ὁμοειδὴς ἐστὶ τῇ $\Gamma\Delta$.

PROP. VII. Theor.

Si conic sectionem vel circuli circumferentiam recta linea contingat, & huic parallela ducatur in sectione, & bifariam dividatur: quæ tactum & punctum bisectionis recta connectit sectionis diameter erit.

SIT conic sectio vel circuli circumferentia $AB\Gamma$, quam contingat ZH , & ipsi ZH paral-

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ζ'.

Εάν κύκλου τομῆς ἢ κύκλου περιφέρειας εὐθεΐα ἐφαπτομένη, καὶ αὐτὴ περιέλλοιτο ἀχθῇ ἐν τῇ τομῇ, καὶ διχοτμήσῃ ἢ ἀπὸ τῷ ἀφῆς ἐκτετατῇ τῇ διχοτομίας ἐκτετατῇ εὐθείᾳ διάμετρος ἔσται τῇ τομῇ.


ΕΣΤΩ κύκλου τομῆς ἢ κύκλου περιφέρεια ἢ $AB\Gamma$, ἐφαπτομένη δὲ αὐτῆς ἢ ZH , καὶ τῇ ZH περιέλλοιτο

CONICORUM LIB. II.


III

ληλος ἡ ΑΓ, καὶ διχα πετμήσθω κατὰ τὸ Ε, καὶ ἐπιζεύχθω ἡ ΒΕ. λέγω ὅτι ἡ ΒΕ διάμετρος ἔσται τῆς τομῆς.

Μὴ γὰρ, ἀλλὰ, εἰ δυνατὸν, ἔστω διάμετρος τῆς τομῆς ἡ ΒΘ. ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΘ τῇ ΘΓ, ὅπερ ἄτοπον· ἢ γὰρ ΑΕ τῇ ΕΓ ἴση ἐστὶν· ἐκ ἁρᾶς ἡ ΒΘ διάμετρος ἔσται τῆς τομῆς. ὁμοίως δὲ δείξομεν, ὅτι οὐδε ἄλλη τις πλὴν τῆς ΒΕ.



lela ducatur ΑΓ, bifariamque in Ε dividatur, & jungatur ΒΕ: dico ΒΕ esse sectionis diametrum.



Non enim, sed, si fieri potest, sit diameter ΒΘ: ergo ΑΘ ipsi ΘΓ est æqualis, quod est absurdum; est enim ΑΕ æqualis ipsi ΕΓ: non est igitur ΒΘ diameter sectionis.


similiter demonstrabimus nullam aliam præter ipsam ΒΕ diametrum esse.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Η'.

Εάν ὑπερβολῇ εὐθεῖα συμπίπτῃ κατὰ δύο σημεῖα· ἐκβαλλομένη ἐφ' ἐκείνῃ συμπίπτει ἀσυμπίπτως, καὶ αἱ ἀπολαμβανόμεναι ἀπ' αὐτῆς ὑπερὶ τῆς τομῆς πρὸς ταῖς ἀσυμπίπτους ἴσαι ἔσονται.

ΕΣΤΩ ὑπερβολῇ ἡ ΑΒΓ, ἀσύμπτωτοι δὲ αἱ ΕΔ, ΔΖ, καὶ τῇ ΑΒΓ συμπίπτει κατὰ δύο σημεῖα τὰ Α, Γ ἢ ΑΓ. λέγω ὅτι ἐκβαλλομένη ἐφ' ἐκείνῃ συμπίπτει ἀσύμπτωτως.

Τετμήσθω ἡ ΑΓ διχα κατὰ τὸ Η, καὶ ἐπιζεύχθω ἡ ΔΗ. διάμετρος ἄρα ἐστὶ τῆς τομῆς· ἡ ἄρα κατὰ τὸ Β ἐφαπτομένη τῷ κύκλῳ ἡ ΑΓ. ἔστω ἔν ἐφαπτομένη ἡ ΘΒΚ· συμπίπτει δὲ τῆς ΕΔ, ΔΖ. ἐπεὶ ἔν παρ' ἀλλήλους ἐστὶν ἡ ΑΓ τῇ ΚΘ, καὶ ἡ ΚΘ συμπίπτει τῇ ΔΚ, ΔΘ· καὶ ἡ ΑΓ ἀρα συμπίπτει τῇ ΔΕ, ΔΖ. συμπίπτει κατὰ τὰ Ε, Ζ. καὶ ἔστω ἴση ἡ ΘΒ τῇ ΒΚ· ἴση ἄρα καὶ ἡ ΖΗ τῇ ΗΕ· ὥστε καὶ ἡ ΓΖ τῇ ΑΕ.



PROP. VIII. Theor.

Si hyperbolæ recta linea occurrat in duobus punctis: producta ab utraque parte asymptotis conveniet; & ex ipsâ abscissæ portiones inter sectionem & asymptotos interjectæ æquales erunt.

SIT hyperbola ΑΒΓ, cujus asymptoti ΕΔ, ΔΖ, & ipsi ΑΒΓ occurrat recta quædam ΑΓ in punctis Α, Γ: dico ΑΓ productam ex utraque parte cum asymptotis convenire.


Secetur enim ΑΓ bifariam in Η, & jungatur ΔΗ: hæc igitur [per cor. 5. 1. huj.] diameter est sectionis: quare [per 5. 2. huj.] recta ad Β contingens ipsi ΑΓ est parallela. sit autem contingens ΘΒΚ, quæ [per 3. 2. huj.] conveniet cum ipsis ΕΔ, ΔΖ. quoniam igitur ΑΓ est parallela ipsi ΚΘ, & ΚΘ convenit cum ΔΚ, ΔΘ; etiam ΑΓ cum ΔΕ, ΔΖ conveniet. conveniat autem in punctis Ε, Ζ; ac ob ΘΒ ipsi ΒΚ æqualem, erit [ex 4. 6. & 15. 5.] ΖΗ ipsi ΗΕ, & propterea ΓΖ ipsi ΑΕ æqualis.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Θ'.

Εάν εὐθεῖα συμπίπτουσα ταῖς ἀσυμπίπτους διχα τέτμηται ὑπερὶ τῆς τομῆς καὶ ἐν μόνον σημεῖον ἀπ' αὐτῆς τῆς τομῆς.

ΕΤΘΕΙΑ γὰρ ἡ ΓΔ συμπίπτει κατὰ τὰ Α, ΑΔ ἀσυμπίπτους διχα πετμήσθω ὑπὸ τῆς ὑπερβολῆς κατὰ τὸ Ε σημεῖον· λέγω ὅτι κατ' ἄλλο σημεῖον οὐχ ἀπ' αὐτῆς τῆς τομῆς.

Εἰ γὰρ δυνατὸν, ἀπ' αὐτῆς κατὰ τὸ Β· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΓΕ τῇ ΒΔ, ὅπερ ἄτοπον· ὑποτίθει γὰρ ἡ ΓΕ τῇ ΕΔ ἴση· ἐκ ἁρᾶς καὶ ἔπεται σημεῖον ἀπ' αὐτῆς ἡ ΓΔ τῆς τομῆς.



PROP. IX. Theor.

Si recta linea asymptotis occurrens ab hyperbola bifariam secetur; in uno tantum puncto cum sectione convenit.

RECTA enim ΓΔ occurrens asymptotis ΓΑ, ΑΔ secetur ab hyperbola bifariam in puncto Ε: dico rectam ΓΔ in alio puncto sectioni non occurrere.

Si enim fieri potest, occurrat in Β: ergo [per 8. 2. huj.] ΓΒ æqualis est ipsi ΒΔ, quod est absurdum; posuimus enim ΓΒ ipsi ΕΔ æqualem esse: igitur ΓΔ in alio puncto sectioni non occurrat.


PROP.

PROP. X. Theor.

Si recta quævis linea sectionem secans cum utraque asymptotōn conveniat; rectangulum contentum sub rectis lineis, quæ inter asymptotos & sectionem interjiciuntur, æquale est quartæ parti figuræ factæ ad diametrum illam quæ rectæ ductæ parallelas bifariam dividit.

SIT hyperbola $AB\Gamma$, cujus asymptoti ΔE , $E Z$, & ducatur quævis recta ΔZ sectionem & asymptotos secans, dividatur autem $\Delta \Gamma$ bifariam in H , junctaque $H E$, ponatur ipsi $B E$ æqualis $E \Theta$, & à puncto B ducatur $B M$ ad angulos rectos ipsi $\Theta E B$, deinde fiat ut rectangulum $\Theta H B$ ad quadratum ex $A H$ ita ΘB ad $B M$; diameter igitur est $B \Theta$, [per 7. 2. huj.] & [per 21. 1. huj.] $B M$ rectum figuræ, latus: dico rectangulum $\Delta A Z$ æquale esse quartæ parti figuræ quæ sub ΘB , $B M$ continetur, & similiter eidem esse æquale rectangulum $\Delta \Gamma Z$.

Ducatur enim $K B A$ per B sectionem contingens, quæ [per 5. 2. huj.] parallela erit ipsi ΔZ . jam quoniam demonstratum est [ad 1. 2. huj.] ut ΘB ad $B M$ ita esse quadratum ex $E B$ ad quadratum ex $B K$, hoc est [per 4. & 22. 6.] quadratum ex $E H$ ad quadratum ex $H \Delta$; atque etiam ut ΘB ad $B M$ ita [ex const. & 1. 6.] rectangulum $\Theta H B$ ad quadratum ex $A H$: erit igitur ut totum quadratum ex $E H$ ad totum quadratum ex $H \Delta$, ita ablatum rectangulum $\Theta H B$ ad ablatum quadratum ex $A H$: adcoque [per 5. 2.] reliquum quadratum ex $E B$ ad reliquum rectangulum $\Delta A Z$ est ut quadratum ex $E H$ ad quadratum ex $H \Delta$, hoc est ut quadratum ex $E B$ ad quadratum ex $B K$. æquale igitur est [per 9. 5.] rectangulum $Z A \Delta$ quadrato ex $B K$. similiter demonstrabitur & rectangulum $\Delta \Gamma Z$ quadrato ex $B A$ æquale. quadratum autem ex $K B$ [per 3. 2. huj.] æquale est quadrato ex $B A$: ergo & $Z A \Delta$ rectangulum rectangulo $Z \Gamma \Delta$ æquale erit.



ΠΡΟΤΑΣΙΣ ι.

Εάν εὐθεῖα τις τέμνῃται ὑπὸ τῆς συμπίπτειν ἐκείνης τῆς ἀσυμπίπτουσας τὸ ἀντιμέτωπον ὀρθογώνιον ὑπὸ τῆς ἀσυμπίπτουσας εὐθείας μεταξὺ τῆς ἀσυμπίπτουσας καὶ τῆς τμήσεως, ἴσον ὅτι τῆς τετάρτης μέρους ὅσων τῶν διχοτομήσῃ ἀφαιρέσῃ τὰς ἀντιμέτωπας παρὰ τῆς ἡμιμέτρου εὐθείας.

ΕΣΤΩ ὑπερβολὴ ἡ $AB\Gamma$, ἀσύμπτωται δὲ αὐτῆς αἱ ΔE , $E Z$, καὶ ἡχθῶ τις ἡ ΔZ τέμνουσα τὴν τμήσιν καὶ τὰς ἀσυμπτώτας, καὶ τὴν μὲν αἱ $\Delta \Gamma$ διχοτομῇ κατὰ τὸ H , καὶ ἐκτείνῃται ἡ $H E$, καὶ κείσθω τῇ $B E$ ἴση ἡ $E \Theta$, καὶ ἡχθῶ δὲ τῇ $B \Theta$ πρὸς ὀρθὴν ἡ $B M$, καὶ πεποιθῶ ὡς τὸ ὑπὸ τῇ $\Theta H B$ πρὸς τὸ δὲ τῇ $A H$ ὅπως ἡ ΘB πρὸς τὴν $B M$, διάμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ $B \Theta$, ὀρθία δὲ ἡ $B M$. λέγω ὅτι τὸ ὑπὸ $\Delta A Z$ ἴσον ἐστὶ τῷ τετάρτῳ ὅς ὑπὸ τῇ $\Theta B M$, ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν $\Delta \Gamma Z$.

ἡχθῶ γὰρ διὰ τῆς B ἐφαπτομένη τῇ τμήσει ἡ $K A$. ὡς ὅρα, ἄλλος ἄρα ἐστὶ τῇ ΔZ . καὶ ἐπεὶ δὲ δεικνύται ὡς ἡ ΘB πρὸς $B M$ ὅπως τὸ δὲ τῇ $E B$ πρὸς τὸ δὲ τῇ $B K$, τετίσι τὸ δὲ τῇ $E H$ πρὸς τὸ δὲ τῇ $H \Delta$. ὡς δὲ ἡ ΘB πρὸς $B M$ ὅπως τὸ ὑπὸ $\Theta H B$ πρὸς τὸ δὲ τῇ $H A$. ἐστὶν ἔν ὡς ὅλον τὸ δὲ τῇ $E H$ πρὸς ὅλον τὸ δὲ τῇ $H \Delta$ ὅπως ἀφαιρέσθαι τὸ ὑπὸ $\Theta H B$ πρὸς ἀφαιρέσθαι τὸ δὲ τῇ $A H$. καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ δὲ τῇ $E B$ πρὸς λοιπὸν τὸ ὑπὸ $\Delta A Z$ ἐστὶν ὡς τὸ δὲ τῇ $E H$ πρὸς τὸ δὲ τῇ $H \Delta$, τετίσι τὸ δὲ τῇ $E B$ πρὸς τὸ δὲ τῇ $B K$. ἴσον ἄρα τὸ ὑπὸ $Z A \Delta$ τῷ δὲ τῇ $B K$. ὁμοίως δευτέρῳ καὶ τὸ ὑπὸ $\Delta \Gamma Z$ τῷ δὲ τῇ $B A$. ἴσον δὲ τὸ ἀπὸ $K B$ τῷ ἀπὸ $B A$. ἴσον ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ $Z A \Delta$ τῷ ὑπὸ $Z \Gamma \Delta$.

& $Z A \Delta$ rectangulum rectangulo $Z \Gamma \Delta$ æquale erit.

PROP. XI. Theor.

Si utramque rectarum continentium angulum qui deinceps est angulo hyperbolam continenti secet recta linea: in uno tantum puncto cum sectione conveniet; & rectangulum contentum sub interjectis inter rectas angulum continentes & sectionem, æquale erit quartæ parti quadrati ex diametro quæ rectæ secanti parallela est.

SIT hyperbola cujus asymptoti ΓA , $A \Delta$; & producta ΔA ad E , per aliquod punctum E

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ια'.

Εάν ἐκαστέρῃ τῶν ἀντιμέτωπων ὑπὸ τῆς συμπίπτουσας τῇ τομῇ καὶ εἰ μόνον σημείῳ, καὶ τὸ ἀντιμέτωπον ὑπὸ τῶν ἀντιμέτωπων εὐθειῶν μεταξὺ τῆς ἀντιμέτωπων καὶ τῆς τμήσεως, ὅτι τῆς τετάρτης μέρους ὅσων τῶν διχοτομήσῃ ἀφαιρέσῃ τὰς ἀντιμέτωπας παρὰ τῆς ἡμιμέτρου εὐθείας.


ΕΣΤΩ ὑπερβολὴ ἡς ἀσύμπτωται αἱ ΓA , $A \Delta$, ἐκτείνῃται δὲ ἡ ΔA ὅπου τὸ E , καὶ διὰ πᾶν σημείον

PROP. XII. Theor.

Si ab aliquo puncto eorum, quæ sunt in sectione, ad asymptotos duæ rectæ lineæ in quibuscumque angulis ducantur, & ab alio quovis puncto in sectione sumpto ducantur aliæ rectæ his ipsis parallelæ: rectangulum sub parallelis contentum æquale erit contento sub rectis ipsis quibus ductæ fuerant parallelæ.

SIT hyperbola, cujus asymptoti AB , BC , & sumatur in sectione aliquod punctum Δ , atque ab eo ad AB , BC ducantur DE , DZ ; sumatur autem & alterum punctum H in sectione, per quod ducantur HE , HK ipsis DE , DZ parallelæ: dico rectangulum $E\Delta Z$ rectangulo ΘHK æquale esse.

Jungatur enim ΔH , & ad A , Γ producat. itaque quoniam [per 10. 2. huj.] rectangulum $A\Delta\Gamma$ æquatur rectangulo AHH ; erit [per 16. 6.] ut AH ad $A\Delta$ ita $\Delta\Gamma$ ad ΓH . sed [per 4. 6.] ut AH ad $A\Delta$ ita $H\Theta$ ad ED , & ut $\Delta\Gamma$ ad ΓH ita ΔZ ad HK ; quare [per 11. 5.] ut ΘH ad DE ita ΔZ ad HK : rectangulum igitur $E\Delta Z$ [per 16. 6.] rectangulo ΘHK est æquale.



ΠΡΟΤΑΣΙΣ 12.

Εάν ἐπὶ ταῖς ἀσύμπτωταις ἀπὸ πῶς σημείου τῆς τομῆς δύο εὐθεῖαι ἀχθῶσιν ἐν τυχαίαις καίαις, καὶ αὐταὶ παράλληλοι ἀχθῶσιν ἀπὸ πῶς σημείου τῆς τομῆς τὸ ὑπὸ τῶν ὁμοίων τετραγώνων ὁρθογώνιοι ἴσονται τῷ τετραγώνῳ ὑπὸ τῶν αἰσ αἰ παράλληλοι ἡχθῶσιν.

ΕΣΤΩ ὑπερβολή, ἥς ἀσύμπτωται αἱ AB , BC , καὶ εἰληφθῶσι σημεῖον ἐπὶ τῆς τομῆς τὸ Δ , καὶ ἀπ' αὐτοῦ ἐπὶ ταῖς AB , BC κατήχθωσιν αἱ DE , DZ . εἰληφθῶσι δὲ σημεῖον ἑτέρον ἐπὶ τῆς τομῆς τὸ H , καὶ ἀπ' αὐτοῦ εἰληφθῶσιν αἱ HE , HK ταῖς DE , DZ ὁμοίᾳ καὶ ἡχθῶσιν αἱ HE , HK . λέγω ὅτι ἴσονται τὸ ὑπὸ $E\Delta Z$ τῷ ὑπὸ ΘHK .

Ἐπεὶ εὐχθῶσι γὰρ ἡ ΔH , καὶ ἐκτελέσθωσιν ἐπὶ ταῖς A , Γ . ἐπεὶ γὰρ ἴσονται τὸ ὑπὸ $A\Delta\Gamma$ τῷ ὑπὸ AHH ἔστιν ὅρα ὡς ἡ AH πρὸς $A\Delta$ ὅπως ἡ $\Delta\Gamma$ πρὸς ΓH . ἀλλ' ὡς μὲν ἡ AH πρὸς $A\Delta$ ὅπως ἡ $H\Theta$ πρὸς ED , ὡς δὲ ἡ $\Delta\Gamma$ πρὸς ΓH ὅπως ἡ ΔZ πρὸς HK . ὡς ὅρα ἡ ΘH πρὸς DE ὅπως ἡ ΔZ πρὸς HK . ἴσονται ὅρα ἐπὶ τὸ ὑπὸ $E\Delta Z$ τῷ ὑπὸ ΘHK .

EUTOCIUS.

In aliquibus codicibus invenitur hoc Theorema demonstratum, ope duarum rectarum contingenti parallelarum, quarum altera per Δ , altera vero per H ducitur, demonstratione juxta rationes Syntheticas ostensa. elegimus autem hunc quem damus probandi modum, utpote eadem simplicius monstrantem. Casus autem habet sex, ductis enim sex rectis, vel punctum Θ erit inter E , B ; vel in puncto B , vel extra B ; qui tres sunt casus: pariterque tres sunt alii, juxta situm puncti Z .

Εὐρίδης ἐν πρῶτῳ ἀντιγράφῳ τῆς τομῆς δεικνύμενος διὰ δύο παραλλήλων ἀγορεύει τὴν ἐφαπτομένην, μὴ μὲν διὰ τῆς Δ , ἐπὶ ταῖς δὲ διὰ τῆς H . καὶ ἡ ἀπόδειξις διὰ συνδυαστικῶν λόγων. ἐπιτελεσάμεθα δὲ ταύτην πάλιν κατὰ σκοπὸν ὡς καὶ αὐτὰ δεικνύσαν ἀπλυστέρως. ἔχει δὲ καὶ πέντε ἐξ: τῶν γὰρ ἐξ εὐθειῶν ἀχθῶσιν, τὸ Θ σημεῖον ἢ μεταξὺ τῶν E , B , ἢ ἐπὶ τῇ B , ἢ ἐξω τῇ B , ὡς γίνονται τρεῖς: καὶ ὁμοίως ἐπὶ τῇ Z ἄλλαι τρεῖς.

PROP. XIII. Theor.

Si in loco ab asymptotis & sectione terminato quævis recta linea ducatur alteri asymptotōn parallelæ: in uno puncto tantum cum sectione conveniet.

SIT hyperbola, cujus asymptoti ΓA , AB , sumaturque aliquod punctum E , & per E ipsi AB parallelæ ducatur EZ : dico EZ cum sectione convenire.

Si enim fieri potest, non conveniat, & sumatur punctum quodvis in sectione, per quod ipsis ΓA , AB parallelæ ducantur $H\Theta$, $H\Gamma$; & rectangulo $\Gamma H\Theta$ æquale sit rectangulum $A EZ$; jungaturque AZ producat: hæc igitur cum sectione [per 2. 2. huj.] conveniet. conveniat autem in


ΠΡΟΤΑΣΙΣ 13.

Εάν ἐν τῷ ἀφορῶντι τόπῳ ὑπὸ τῶν ἀσύμπτωταις καὶ τῆς τομῆς παράλληλος ἀχθῇ τις εὐθεῖα τῇ ἐτέρᾳ τῇ ἀσύμπτωται· συμπίπτει τῇ τομῇ καὶ ἐν μόνῳ σημείῳ.

ΕΣΤΩ ὑπερβολή, ἥς ἀσύμπτωται αἱ ΓA , AB , καὶ εἰληφθῶσι σημεῖον τὸ E , καὶ δι' αὐτοῦ τῇ AB ὁμοίᾳ καὶ ἡχθῶσιν αἱ EZ . λέγω ὅτι συμπίπτει τῇ τομῇ.

Εἰ γὰρ δυνατὸν, μὴ συμπίπτειτω. καὶ εἰληφθῶσι σημεῖον ἑπὶ τῆς τομῆς τὸ H , καὶ ἀπ' αὐτοῦ εἰληφθῶσιν αἱ $H\Theta$, $H\Gamma$ καὶ τῷ ὑπὸ $\Gamma H\Theta$ ἴσων ἔστω τὸ ὑπὸ $A EZ$, καὶ ἐπεὶ εὐχθῶσιν αἱ AZ ἐκτελέσθωσιν ὡς συμπίπτει δὲ τῇ τομῇ. συμπίπτειτω κατὰ τὸ K , καὶ

Κ, καὶ διὰ τῆς Κ ὡς πρὸς ΑΒ, ΑΓ ἡχθῶσιν αἱ
ΚΑ, ΚΔ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΓΗΘ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ
ΑΚΔ. ὑποκείτω ὅτι καὶ τῷ ὑπὸ
ΑΕΖ ἴσον· τὸ ἄρα ὑπὸ ΔΚΑ,
καὶ τὸ ὑπὸ ΑΑΚ, ἴσον ἐστὶ
τῷ ὑπὸ ΑΕΖ, ὅπερ ἀδιύατον·
μεῖζων γάρ ἐστι καὶ ἡ ΚΑ τῇ ΕΖ,
καὶ ἡ ΑΑ τῇ ΑΕ· συμπίπτει ἄρα
ἡ ΕΖ τῇ τμήν. συμπίπτει
κατὰ τὸ Μ· λέγω δὲ κατ'
ἄλλο ἢ συμπίπτει. εἰ γὰρ δι-
υατὸν, συμπίπτει καὶ κατὰ τὸ
Ν, καὶ διὰ τῆς Μ, Ν τῇ ΓΑ παρ-
άλληλοι ἡχθῶσιν αἱ ΜΞ, ΝΒ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΕΜΞ
ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΕΝΒ, ὅπερ ἀδιύατον. ἐκ ἄρα
καθ' ἑπὶρον σημείον συμπίπτει τῇ τμήν.



puncto K, & per K ducantur ΚΑ, ΚΔ ἰσὺς ΑΒ,
ΑΓ parallelæ: ergo [per 12. 2. huj.] rectangu-
lum ΓΗΘ æquale est rectan-
gulo ΑΚΔ. ponitur autem &
rectangulo ΑΕΖ æquale: re-
ctangulum igitur ΔΚΑ, hoc
est ΑΑΚ, rectangulo ΑΕΖ
æquale erit, quod fieri non
potest; si quidem ΚΑ major
est quam ΕΖ; & ΑΑ major
quam ΑΕ: quare ΕΖ conve-
niet cum sectione. conveniat
in Μ: dico eam in alio puncto
non convenire. nam si fieri
potest, conveniat etiam in Ν;


& per Μ, Ν ἰσὺς ΓΑ parallelæ ducantur ΜΞ, ΝΒ:
ergo [per 12. 2. huj.] rectangulum ΕΜΞ rectan-
gulo ΕΝΒ est æquale, quod est absurdum. igitur
in alio puncto cum sectione non conveniet.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΔ'.

Αἱ ἀσύμπτωτοι καὶ ἡ τομὴ εἰς ἀπειρον ἐκβαλλόμεναι
ἐγγίον τε προσάγουσι ἑαυταῖς, καὶ παντὸς ὧς δόξεν
τος διαστήματος εἰς ἐλάττω ἀφικνῶνται διάστημα.

ΕΣΤΩ ὑπερβολή, ἥς ἀσύμπτωτοι αἱ ΑΒ, ΑΓ,
δοξεν δὲ διάστημα τὸ Κ· λέγω ὅτι αἱ ΑΒ,
ΑΓ καὶ ἡ τομὴ ἐκβαλλόμεναι ἐγγίον τε προσάγουσι
ἑαυταῖς καὶ εἰς ἐλάχιστον ἀφίξονται διάστημα τὸ Κ.

Ἡχθῶσιν γὰρ τῇ ἐφαπτομένῃ
τῇ ΟΠ ὡς πρὸς ΑΒ, ΑΓ, αἱ ΕΘ, Ζ,
ΓΗΔ, καὶ ἐπιζεύχθω ἡ ΑΘ, καὶ
ἐκβεβληθῶ ὅτι τὸ Ε. ἐπεὶ γὰρ
τὸ ὑπὸ ΓΗΔ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ
ΖΘΕ· ἔστω ἄρα ὡς ἡ ΔΗ πρὸς
ΖΘ ὅτως ἡ ΘΕ πρὸς ΓΗ. με-
ζὼν δὲ ἡ ΔΗ τῇ ΖΘ· με-
ζὼν ἄρα καὶ ἡ ΕΘ τῇ ΓΗ. ὁμοίως
δὲ δεικνύμεν ὅτι καὶ αἱ κατὰ τὸ
ἑξῆς ἐλάττωτες εἰσιν. εἰλήφθω
δὲ τὸ Κ διαστήματος ἐλάττω τὸ
ΕΛ, καὶ διὰ τῆς Α τῇ ΑΓ ὡς πρὸς ΑΒ ἡχθῶ ἡ ΑΝ·
συμπίπτει ἄρα τῇ τμήν. συμπίπτει κατὰ τὸ Ν,
καὶ διὰ τῆς Ν τῇ ΕΖ ὡς πρὸς ΑΒ ἡχθῶ ἡ ΜΝΒ· ἡ
ἄρα ΜΝ ἴση ἐστὶ τῇ ΕΛ, καὶ διὰ τούτου ἐλάττω
τῆς Κ.



PROP. XIV. Theor.

Asymptoti & sectio in infinitum pro-
ductæ ad seipsas propius accedunt;
& ad intervallum perveniunt minus
quolibet dato intervallo,

SIT hyperbola, cujus asymptoti ΑΒ, ΑΓ, &
datum intervallum sit Κ: dico asymptotos
ΑΒ, ΑΓ & sectionem productas ad sese pro-
pius accedere, & pervenire ad intervallum mi-
nus intervallo Κ.

Ducatur enim tangenti ΟΠ
parallelæ ΕΘ Ζ, ΓΗΔ; junga-
turque ΑΘ, & ad Ζ produca-
tur: quoniam ergo [per 10. 2.
huj.] rectangulum ΓΗΔ rectan-
gulo ΖΘΕ est æquale; erit [per
16. 6.] ut ΔΗ ad ΖΘ ita ΘΕ
ad ΓΗ. sed ΔΗ major est ipsa
ΖΘ: ergo & ΘΕ ipsa ΓΗ est ma-
jor. similiter demonstrabimus
eas, quæ deinceps sequuntur,
minores esse. itaque sumatur
[per 3. 1.] intervallum ΕΛ mi-
nus intervallo Κ, & per Α ἰσὺς ΑΓ parallela du-
catur ΑΝ. ergo [per 13. 2. huj.] ΑΝ cum se-
ctione conveniet. conveniat in Ν, perque Ν du-
catur ΜΝΒ parallela ἰσὺς ΕΖ: quare [per 34. 1.]
ΜΝ erit æqualis ΕΛ; & propterea intervallo Κ
minor erit.

Corollarium.

Ex hoc manifestum est rectas ΑΒ, ΑΓ ad se-
ctionem accedere propius quam aliæ quævis
asymptoti: & [ex 2. 2. huj.] angulum ΒΑΓ
minorem esse quolibet angulo, qui aliis rectis
sectioni non occurrentibus continetur.

EUTOCIUS.

Εν τῶν ἀντιγράφοις εὑρέθη ἄλλως δοκνύμενον· ὅτι,



Παντὸς ὧς δόξεντος διαστήματος εἰς ἐλάττω ἀφι-
κνῶνται διάστημα αἱ ἀσύμπτωτοι καὶ ἡ τομὴ

In aliquibus exemplaribus illud aliter demonstratum
invenitur: scilicet,

Asymptotos & sectionem pervenire ad
intervallum minus quolibet intervallo
dato.

Iisdem



gulus Γ est æqualis angulo Z : est igitur [per 4. 6.] ut $H\Gamma$ ad ΓA ita ΘZ ad $Z A$. ut autem $B\Gamma$ ad ΓA ita $E Z$ ad $Z A$: ergo & composita ratio compositæ rationi eadem erit: ut igitur rectangulum $B\Gamma H$ est ad quadratum ex ΓA ita rectangulum $E Z \Theta$ ad quadratum ex $Z A$.



τῇ Z . ἔστιν ἄρα ὡς ἡ $H\Gamma$ πρὸς τὴν ΓA ἔτι καὶ ὡς ἡ ΘZ πρὸς τὴν $Z A$. ἀλλὰ καὶ ὡς ἡ $B\Gamma$ πρὸς τὴν ΓA ἔτι καὶ ὡς ἡ $E Z$ πρὸς τὴν $Z A$. καὶ ὁ συννημῶν ἀπὸ τῶν συννημῶν ὅστιν ὁ αὐτός· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ $B\Gamma H$ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓA ἔτι καὶ ὡς τὸ ὑπὸ $E Z \Theta$ πρὸς τὸ ὑπὸ $Z A$.

Aliter absque ratione composita.

Ponatur rectangulo $B\Gamma H$ æquale rectangulum $A\Gamma K$, & rectangulo $E Z \Theta$ æquale rectangulum $A Z \Delta$; erit rursus ut $B\Gamma$ ad ΓK ita $A\Gamma$ ad ΓH . ut autem $E Z$ ad $Z A$ ita ΔZ ad $Z \Theta$: & eadem ratione qua supra, demonstrabimus ut $A\Gamma$ ad ΓH ita esse ΔZ ad $Z \Theta$: ergo ut $B\Gamma$ ad ΓK ita $E Z$ ad $Z A$. sed & ut $B\Gamma$ ad ΓA ita $E Z$ ad $Z A$, ob triangulorum similitudinem: ex æquali igitur [per 22. 7.] ut $K\Gamma$ ad ΓA , hoc est [per 1. 6.] ut rectangulum $K\Gamma A$ sive rectangulum $B\Gamma H$ ad quadratum ex ΓA ita ΔZ ad $Z A$, hoc est rectangulum $A Z \Delta$ sive rectangulum $E Z \Theta$, ad quadratum ex $Z A$.



Ἄλλως μὴ διὰ τῶν συνημμένων.
Κεῖδον τῶν μὲν ὑπὸ $B\Gamma H$ ἴσον τὸ ὑπὸ $A\Gamma K$, τῶν δὲ ὑπὸ $E Z \Theta$ ἴσον τὸ ὑπὸ $A Z \Delta$. ἔστω καὶ ὡς ἡ $B\Gamma$ πρὸς ΓK ἔτι καὶ ὡς ἡ $A\Gamma$ πρὸς ΓH . ὡς δὲ ἡ $E Z$ πρὸς $Z A$ ἔτι καὶ ὡς ἡ ΔZ πρὸς $Z \Theta$. καὶ κατὰ τὰς αὐτὰς τῶν ἐπάνω δεικνύμεν ὅτι ὡς ἡ $A\Gamma$ πρὸς ΓH ἔτι καὶ ὡς ἡ ΔZ πρὸς $Z \Theta$. καὶ ὡς ἄρα ἡ $B\Gamma$ πρὸς ΓK ἔτι καὶ ὡς ἡ $E Z$ πρὸς $Z A$. ἀλλὰ καὶ ὡς ἡ $B\Gamma$ πρὸς ΓA ἔτι καὶ ὡς ἡ $E Z$ πρὸς $Z A$, διὰ τὴν ὁμοιότητα δι' ἴσου ἄρα ὅστιν ὡς $K\Gamma$ πρὸς ΓA , τῶν ἔστιν ὡς τὸ ὑπὸ $K\Gamma A$, ὅ ἐστι τὸ ὑπὸ $B\Gamma H$, πρὸς τὸ ὑπὸ $A\Gamma$ ἔτι καὶ ὡς ΔZ πρὸς $Z A$, τῶν ἔστι τὸ ὑπὸ $A Z \Delta$, ὅ ἐστι τὸ ὑπὸ $E Z \Theta$, πρὸς τὸ ὑπὸ $Z A$.

LEMMA X.



Similiter demonstrabimus, si fuerit ut rectangulum $B\Gamma H$ ad quadratum ex $A\Gamma$ ita rectangulum $E Z \Theta$ ad quadratum ex $Z A$, & triangulum $AB\Gamma$ simile triangulo AEZ : etiam triangulum ABH triangulo $A E \Theta$ simile esse.

ΛΗΜΜΑ Ι.

Ομοίως δὲ δείξομεν, εἰ ἂν ὡς τὸ ὑπὸ $B\Gamma H$ πρὸς τὸ ὑπὸ $A\Gamma$ ἔτι καὶ ὡς τὸ ὑπὸ $E Z \Theta$ πρὸς τὸ ὑπὸ $Z A$, καὶ ὅμοιον τὸ $AB\Gamma$ τριγώνον τῷ AEZ τριγώνῳ· καὶ τὸ ABH τριγώνον τῷ $A E \Theta$ τριγώνῳ ὅμοιον εἶναι.

LEMMA XI.

Sint duo trianguia similia $AB\Gamma$, AEZ , & ducantur perpendiculares AH , $A\Theta$: dico ut rectangulum $BH\Gamma$ ad quadratum ex AH ita esse rectangulum $B\Theta Z$ ad quadratum ex $A\Theta$.





HOC autem ex iis, quæ supra [ad lem. 8.] dicta sunt, perspicue constat.

ΤΟΤΤΟ ὁφανερὸν, ὅτι ὅμοιον γίνεται τῶς πρὸς αὐτῶ.

LEMMA XII.

Sit æqualis quidem angulus B angulo E , angulus vero A angulo Δ minor: dico ΓB ad $B A$ minorem rationem habere quam $Z E$ ad $E \Delta$.



Quoniam enim angulus A minor est angulo Δ , constituatur ipsi A æqualis $E \Delta H$: est igitur [per 4. 6.] ut ΓB ad $B A$ ita $H E$ ad $E \Delta$. sed [per 8. 5.] $H E$ ad $E \Delta$ minorem habet rationem quam $Z E$ ad $E \Delta$: ergo & ΓB ad $B A$ minorem rationem habet quam $Z E$ ad $E \Delta$. similiter & omnia alia ejusmodi ostendemus.

Εστὼ ἴση ἡ μὲν B γωνία τῇ E , ἐλάσσων δὲ ἡ A τῇ Δ . ὅτι ἡ ΓB πρὸς $B A$ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς ἡ $Z E$ πρὸς $E \Delta$.


ΕΠΕΙ γὰρ ἐλάσσων ἡ A γωνία τῇ Δ , συνιστάτω αὐτῇ ἴση ἡ γωνία $E \Delta H$. ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΓB πρὸς $B A$ ἔτι καὶ ὡς ἡ $H E$ πρὸς $E \Delta$. ἀλλὰ καὶ ἡ $H E$ πρὸς $E \Delta$ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς ἡ $Z E$ πρὸς $E \Delta$. καὶ ἡ ΓB ἄρα πρὸς $B A$ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς ἡ $Z E$ πρὸς $E \Delta$. καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα τῇ αὐτῇ ἀναγῆναι δεῖξομεν.

LEM-

ΛΗΜΜΑ ΙΓ'.

Εἰς τὸ ὡς τὸ ὑπὸ ΒΗΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΗ ἔτω τὸ ὑπὸ ΕΘΖ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΘ· καὶ ἡ μὲν ΒΗ τῇ ΗΓ ἴση, ἡ δὲ ΓΗ πρὸς ΗΑ ἐλάσσονα λόγον ἔχουσα ἢ πρὸς ΖΘ πρὸς ΘΔ. ὅτι μείζων ἔστω ἡ ΖΘ ἢ ΘΕ.


Εἰπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ ΓΗ πρὸς τὸ ὑπὸ ΗΑ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς ΖΘ πρὸς τὸ ὑπὸ ΘΔ, ἀλλὰ τὸ ὑπὸ ΓΗ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΒΗΓ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΒΗΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΗ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς ΖΘ πρὸς τὸ ὑπὸ ΘΔ. ἀλλ' ὡς τὸ ὑπὸ ΒΗΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΗ ἔστω ὡς τὸ ὑπὸ ΕΘΖ πρὸς τὸ ὑπὸ ΘΔ· ἔστω δὲ τὸ ὑπὸ ΕΘΖ πρὸς τὸ ὑπὸ ΘΔ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς ΖΘ πρὸς τὸ ὑπὸ ΘΔ· μείζων ἄρα ἔστω τὸ ὑπὸ ΖΘ πρὸς τὸ ὑπὸ ΕΘΖ. ὡς μείζων ἔστω ἡ ΖΘ ἢ ΘΕ. ὅ. ἰ. δ.



LEMMA XIII.

Sit ut rectangulum ΒΗΓ ad quadratum ex ΑΗ ita rectangulum ΕΘΖ ad quadratum ex ΔΘ, & sit ΒΗ quidem æqualis ΗΓ; ΓΗ vero ad ΗΑ minorem rationem habeat quam ΖΘ ad ΘΔ: dico ΖΘ majorem esse quam ΘΕ.

Quoniam enim quadratum ex ΓΗ ad quadratum ex ΗΑ minorem rationem habet quam quadratum ex ΖΘ ad quadratum ex ΘΔ; quadratum autem ex ΓΗ æquale est rectangulo ΒΗΓ; habebit ΒΗΓ rectangulum ad quadratum ex ΑΗ minorem rationem quam quadratum ex ΖΘ ad quadratum ex ΘΔ. sed ut ΒΗΓ rectangulum ad quadratum ex ΑΗ ita positum est rectangulum ΕΘΖ ad quadratum ex ΘΔ: ergo rectangulum ΕΘΖ ad quadratum ex ΘΔ minorem rationem habet quam quadratum ex ΖΘ ad quadratum ex ΘΔ: majus igitur est [per 8. 5.] quadratum ex ΖΘ rectangulo ΕΘΖ; quare & ΖΘ major erit quam ΘΕ.



ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΠΕΡΓΑΙΟΥ
ΚΩΝΙΚΩΝ
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ,

ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΥΤΟΚΙΟΥ ΑΣΚΑΛΩΝΙΤΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ.

APOLLONII PERGÆI
CONICORUM
LIBER SECUNDUS,

CUM COMMENTARIIS EUTOCII ASCALONITÆ.

Apollonius Eudemo S. P.

Απολλώνιος Εὐδήμῳ χαιρεῖν.

ΣI vales bene est, ego quidem satis commode habeo. *Apollonio* filio meo dedi, ut ad te perferret, secundum librum Conicorum à nobis conscriptorum: quem tu diligenter percurre, & communica cum illis, qui eo tibi digni videbuntur. *Philonida* etiam Geometræ, quo cum tibi *Ephesi* amicitiam conciliaui, si quando in isthæc *Pergami* loca venerit, legendum trade: tu cura ut vales. Vale.

ΕΙ ὑγίαις ἔχει δι' χαλᾶς, καὶ αὐτὸς δὲ μετέως ἔχω. Απολλώνιος τ' ἴσιν μὲ πειρομὰ πρὸς σε κομίζονται τὸ δεύτερον βιβλίον τῆς συνοπταγμένης ἡμῶν κοινῆς. Δίελθε δι' αὐτὸ ὀκτιμελῶς, καὶ τοῖς ἀξίοις τῶν τοιούτων κοινοῦ μεταδίδω, καὶ Φιλονίδης δὲ ὁ γεωμέτρης, ὃν καὶ συνέτιστά σοι ἐν Εφέσῳ, εἰάν ποτε ὀκτιβάλλῃ εἰς τὰς κατὰ Πέργαμον τόπους, μετάδος αὐτῷ καὶ σπαντὶ ὀκτιμελῶς ἵνα ὑγιαίης. εὐτύχῃ.

PROP. I. Theor.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Α'.


Si hyperbolam recta linea ad verticem contingat, & ab ipso, ex utraque parte diametri, ponatur recta æqualis ei quæ potest quartam figuræ partem: rectæ quæ à sectionis centro ad sumptos terminos contingentis ducuntur cum sectione non convenient.

Εάν ὑπερβολὴς κατὰ κορυφὴν εὐθεῖα ἐφάπτη, καὶ ἀπ' αὐτῆς ἐφ' ἐκάτερα τ' διαμέτρους ἀποληφθῇ ἴση τῇ δυναμδμή τὸ τέταρτον ἔσδ' αἱ ἀπὸ τ' κέντρους τ' τομῆς ἐπὶ τὰ ληφθέντα πύσσεται τ' ἐφαπτομένης ἀγόμεναι εὐθεῖαι ἐ συμπίπτουται τῇ τομῇ.

ΕΣΤΩ

ΕΣΤΩ ὑπερβολή, ἥς ἀσύμμετρος ἡ ΑΒ, κέντρον δὲ τὸ Γ, ὁρθὰ δὲ ἡ ΒΖ, ἣ ἐφαπτομένη τῆς τομῆς κατὰ τὸ Β ἡ ΔΖ, καὶ τῶν περὶ τὴν ὑπερβολὴν ΑΒΖ εἰδὼς ἴσων ἔστω τὰ ἀφ' ἑκατέρας ΒΔ, ΒΕ, καὶ ἐπιζυγῶσθαι αἱ ΓΔ, ΓΕ ἐκτελεσθῶσιν· λέγω ὅτι οὐ συμπεσόνται τῇ τομῇ.

Εἰ γὰρ δυνατὸν, συμπεσόντων ἡ ΓΔ τῇ τομῇ κατὰ τὸ Η, καὶ δὸς τῇ Η πεταγμένως κατήχθω ἡ ΗΘ· παράλληλος ἄρα ἐστὶ τῇ ΔΒ. ἐπεὶ ἔν ἐστιν ὡς ΑΒ πρὸς ΒΖ ἕτως τὸ δὸς ΑΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΒΖ, ἀλλὰ τῇ μὲν δὸς ΑΒ πέτατον μέρος ἐστὶ τὸ δὸς ΓΒ, τῇ δὲ ὑπὸ ΑΒΖ πέτατον τὸ δὸς ΒΔ· ὡς ἄρα ἡ ΑΒ πρὸς ΒΖ ἕτως τὸ δὸς ΓΒ πρὸς τὸ δὸς ΔΒ, τετίσι τὸ δὸς ΓΘ πρὸς τὸ δὸς ΘΗ. ἐστὶ δὲ καὶ ὡς ἡ ΑΒ πρὸς ΒΖ ἕτως τὸ ὑπὸ ΑΘΒ πρὸς τὸ δὸς ΘΗ· ὡς ἄρα τὸ δὸς ΓΘ πρὸς τὸ δὸς ΘΗ ἕτως τὸ ὑπὸ ΑΘΒ πρὸς τὸ δὸς ΘΗ· ἴσων ἄρα τὸ ὑπὸ ΑΘΒ τῷ δὸς ΓΘ, ὅπερ ἀπορίᾳ· ἐκ ἄρα ἡ ΓΔ συμπίπτει τῇ τομῇ. ὁμοίως δὲ δεῖξαι ὅτι οὐδὲ ἡ ΓΕ· ΑΣΥΜΠΤΟΤΟΙ ἄρα εἰσὶ τῇ τομῇ αἱ ΓΔ, ΓΕ.



SIT hyperbola, cujus diameter ΑΒ, centrum Γ, & rectum figuræ latus ΒΖ, recta vero ΔΒ sectionem contingat in Β; & quartæ parti figuræ, quæ continetur sub ΑΒΖ, æquale sit quadratum utriusque ipsarum ΔΒ, ΒΕ, & junctæ ΓΔ, ΓΕ producantur: dico eas cum sectione non convenire.

Si enim fieri potest, conveniat ΓΔ cum sectione in Η, & ab Η ordinatim applicetur ΘΗ: ergo [per 17. 1. huj.] ΗΘ parallela est ipsi ΔΒ. quoniam igitur ut ΑΒ ad ΒΖ ita [per 1.6.] est quadratum ex ΑΒ ad rectangulum ΑΒΖ; quadratum autem ΓΒ quarta pars est quadrati ex ΑΒ, & quadratum ex ΒΔ itidem quarta pars rectanguli ΑΒΖ: erit [per 15.5.] itaque ΑΒ ad ΒΖ ut quadratum ex ΓΒ ad quadratum ex ΒΔ, hoc est [per 4.6.] quadratum ex ΓΘ ad quadratum ex

ΘΗ. est vero [per 21. 1. huj.] ut ΑΒ ad ΒΖ ita rectangulum ΑΘΒ ad quadratum ex ΘΗ: igitur ut quadratum ex ΓΘ ad quadratum ex ΘΗ ita rectangulum ΑΘΒ ad quadratum ex ΘΗ: rectangulum igitur ΑΘΒ [per 9. 5.] quadrato ex ΓΘ æquale est; quod [per 6.2.] est absurdum: ergo ΓΔ cum sectione non conveniet. similiter demonstrabitur neque ipsam ΓΕ convenire cum sectione: sunt igitur ΓΔ, ΓΕ ΑΣΥΜΠΤΟΤΟΙ, hoc est, cum sectione non convenientes.

EUTOCIUS.

Ἀρχόμενος τῶν δυνάμεων βιβλίου τῆς κανονικῆς, δὲ φίλτατέ μοι Ἀνδρέα, τωτὶ οἷμαι δὲν προσεσπῆναι, ὅτι ποσῶντα μὴ εἰς αὐτὸν γράφω, ὡς ἂν ἴν' δυνατὸν ἀφ' ἧς ἐν τῷ περὶ τῶν βιβλίων τωτὶ πρῶτον θεωρεῖται πᾶσι δὲ ἔχει, εἰ γὰρ μὴ, τότε ἐν τῇ περὶ τῶν ἀσυνεπῶν ἀποδείξει αἱ γὰρ ΓΔ, ΓΕ ἀσύμμετροι εἴησαν ἐν τῇ τομῇ, καὶ αὐτὰ ἀσυνεπῶν καὶ ἀσυνεπῶν καὶ ἐφαπτομένην.

Explicatur secundum librum Conicorum, amicissime Andreæ, illud præmittere oportere existimo, me ea tantummodo in ipsum conscribere, quæ ex primo libro intelligi possunt. Primum theorema casum non habet; nam diversitas schematum nullam hic facit diversitatem: rectæ enim ΔΓ, ΓΕ sectionis asymptoti cum sint, eædem manent in omni diametro & contingente.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Β'.

Τῶν αὐτῶν ὄντων, δευτέρου, ὅτι εἴτερά ἀσύμμετρος ἐκ ἑστὶ τμήματα τῆς περὶ τῶν ἀσυνεπῶν καὶ ἐφαπτομένην ΑΓΕ.

PROP. II. Theor.

Iisdem manentibus, demonstrandum est non esse aliam asymptoton, quæ angulum ΔΓΕ dividat.

Εἰ γὰρ δυνατὸν, ἔστω ἡ ΓΘ, καὶ ἀφ' ἧς Β τῇ ΓΔ ἐφαπτομένη ἡ ΒΘ, καὶ συμπεσόντων τῇ ΓΘ κατὰ τὸ Θ, ἣ τῇ ΒΘ ἰσὺν κατέσθω ἡ ΔΗ, καὶ ἐπιζυγῶσθαι ἡ ΗΘ ἐκτελεσθῶσιν ὅτι τὰ Κ, Λ, Μ.

Επεὶ ἔν αἱ ΒΘ, ΔΗ ἴσων καὶ ἐφαπτομένη, ἣ αἱ ΔΒ, ΗΘ ἴσων καὶ ἐφαπτομένη. ἣ ἐπεὶ ἡ ΑΒ ὁρθὰ πέμψω κατὰ τὸ Γ, καὶ πρὸς τὴν αὐτὴν πρὸς ἡ ΒΛ· τὸ ὑπὸ ΑΛΒ μετὰ τῷ δὸς ΓΒ ἴσων ἐστὶ τῷ δὸς ΓΛ. ὁμοίως δὲ ἐπειδὴ ἐφαπτομένη ἡ ΗΜ τῇ ΔΕ, καὶ ἰσὺν ἡ ΔΒ τῇ ΒΕ· ἰσὺν ἄρα καὶ ἡ ΗΔ τῇ ΔΜ. καὶ ἐπεὶ ἰσὺν ἐστὶν ἡ ΗΘ τῇ ΔΒ, μετὰ ἄρα ἡ ΗΚ τῇ ΔΒ. ἐστὶ δὲ καὶ ΚΜ τῇ ΒΕ μετὰ, ἐπεὶ καὶ τῇ

SI enim fieri potest, sit ΓΘ; & per Β ipsi ΓΔ parallela ducatur ΒΘ, quæ cum ΓΘ in Θ puncto conveniat; ipsi vero ΒΘ ponatur æqualis ΔΗ; & juncta ΗΘ ad Κ, Λ, Μ producat.

Quoniam igitur ΒΘ, ΔΗ æquales sunt & parallelæ; & ipsæ ΔΒ, ΗΘ [per 33.1.] æquales & parallelæ erunt. & quoniam ΑΒ bifariam secatur in Γ, & ipsi adjungitur quædam ΒΛ: ergo [per 6.2.] rectangulum ΑΛΒ una cum quadrato ex ΓΒ æquale est quadrato ex ΓΛ. similiter quoniam ΗΜ ipsi ΔΒ est parallela, atque est ΔΒ æqualis ΒΕ; & ΗΛ ipsi ΑΜ æqualis erit. & quoniam ΗΘ æqualis est ΔΒ; erit ΗΚ ipsa ΔΒ major. est vero & ΚΜ major ipsa ΒΕ, quia & ipsa

λέγω δὴ ἐπὶ τῇ ἀφ' ἑκατέρου τῶν BZ, BH ἴσων
ἑστῶν τῶν τετραγώνων ὅτι πρὸς τῇ BΔ ἴσους. μὴ γὰρ,
ἀλλὰ, αἱ διωκόμεναι, ὅτι τῶν τετραγώνων ἴσους ἴσων τὸ ἀφ'
ἑκατέρου τῶν BΘ, BK ἀσύμπτωτοι ἄρα εἰσὶν αἱ
ΘΕ, ΕΚ, ὅπερ ἀποφαντικὸν τὸ ἄρα ἀφ' ἑκατέρου τῶν BZ,
BH ἴσων ὅτι τῶν τετραγώνων ὅτι πρὸς τῇ BΔ ἴσους.

Dico quadratum utriusvis ipsarum BZ, BH æ-
quale esse quartæ parti figuræ quæ fit ad BΔ;
non enim, sed si fieri potest, sit quartæ parti istius
figuræ æquale quadratum utriusvis ipsarum ΘΒ,
BK: asymptoti igitur sunt [per 1. 2. huj.] ΘΕ,
ΕΚ; quod est absurdum: ergo quadratum utrius-
vis ZB, BH æquale est quartæ parti figuræ ad
ipsam BΔ constitutæ.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Δ'.

PROP. IV. Probl.


Δύο δαδυσῶν εὐθείων γωνίας περιέχουσιν, καὶ σημείον
ἐντὸς τῆς γωνίας γραψάτω ἀφ' οὗ σημείου κέντρον
τομῆς ἢ χαλουμενῆς ὑπερβολῆς, ὅτι ἀσυμ-
πτώτους εἶναι τοὺς ἀσπίλους εὐθείας.*

Datis duabus rectis lineis angulum con-
tinentibus, & puncto intra angulum
dato: describere per punctum con-
sectionem quæ hyperbola appellatur,
ita ut datæ rectæ ipsius asymptoti sint.

Εἰς τὸν ἄνθρωπον δύο εὐθείαι αἱ AB, AG περιέχουσιν
γωνίαν περιέχουσαν τὸν ἄνθρωπον, καὶ διδοῦσιν
σημείον πρὸς τὸν ἄνθρωπον, καὶ διὰ τοῦ σημείου ἀσπίλους
αἱ AB, AG γραψάτω ὑπερβολῆς.

SINT duæ rectæ AB, AG angulum quemvis
ad A continentes, sitque datum punctum Δ,
& oporteat per Δ intra asymptotos AB, AG hy-
perbolam describere.

Επιεύχεται ἡ AB, καὶ ἐκ-
τελεσθῶσιν ὅτι πρὸς Ε, καὶ κέντρον
τῇ AB ἴση ἡ AE, καὶ ἀφ' οὗ ὁ κύκλος
τῇ AB ὁμοειδής ἡ γωνία ἡ
ΔΖ, καὶ κέντρον τῇ AZ ἴση ἡ
ΖΓ, καὶ ὅτι ὁ κύκλος ὁμοειδής ἡ ΓΔ
ἐκτελεσθῶσιν ὅτι πρὸς Β, καὶ τῶν
δύο τῶν ΓΒ ἴσων γωνιῶν τὸ ὑπὸ
ΔΕ, Η· καὶ ἐκτελεσθῶσιν τῇ
AB, γεγραμμένη περὶ αὐτῶν διὰ
τοῦ Δ ὑπερβολῆς, ὅτι πρὸς κατε-
γομένης διὰ τοῦ πρὸς τὴν
H, ὑπερβαλλόντος ἐπὶ ὁμοίῳ τῶν
ὑπὸ ΔΕ, Η.



Jungatur AΔ, & ad E
producatur, & fiat AΔ æ-
qualis AE, & per Δ ipsi AB
parallela ducatur ΔΖ, ponaturque
AZ æqualis ZΓ, &
juncta ΓΔ producatur ad B,
& quadrato ex ΓΒ æquale
fiat [ope 12. 6.] rectangu-
lum sub ΔΕ & Η, & pro-
ducta AΔ, circa ipsam per Δ
hyperbola describatur [per
53. 1. huj.] ita ut applica-
tæ ad diametrum possint
rectangula adjacentia rectæ
H, excedentiaque figuræ sub
ipsis ΔΕ, Η contenta similia.

Επεὶ ἐν τῇ ἀσπίλῳ ἐστὶν ἡ
ΔΖ τῇ ΒΑ, καὶ ἴση ἡ ΓΖ τῇ ΖΑ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΓΔ
τῇ ΔΒ· ὅτι τὸ δὲ πρὸς ΓΒ περὶ ἀπλάσιον ἐστὶν ὅτι δὲ πρὸς
ΓΔ. καὶ ἐπὶ τὸ δὲ πρὸς ΓΒ ἴσων τῶν ὑπὸ ΔΕ, Η· ἐκά-
στην ἄρα τῇ δὲ πρὸς ΓΔ, ΔΒ τέταρτον μέρος ἐστὶν ὅτι δὲ πρὸς
ΔΕ, Η ἴσους· αἱ ἄρα AB, AG ἀσύμπτωτοι εἰσὶν τῇ
γεγραμμένης ὑπερβολῆς.

Quoniam igitur parallela
est ΔΖ ipsi ΒΑ, & ΓΖ æqualis ΖΑ; erit [per
2. 6.] ΓΔ ipsi ΔΒ æqualis: ergo [per 2. 2.]
quadratum ex ΓΒ quadruplum est quadrati ex
ΓΔ. atque est [per constr.] quadratum ex ΓΒ æ-
quale rectangulo sub ΔΕ, Η: utrumque igitur qua-
dratorum ex ΓΔ, ΔΒ quarta pars est figuræ quæ
sub ΔΕ, Η continetur: quare [per 1. 2. huj.] AB,
AG descriptæ hyperbolæ asymptoti sunt.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Ε'.

PROP. V. Theor.

Εάν τις εὐθεῖα ἢ ὑπερβολῆς ἢ ἀφ' ἑκατέρου τῶν
εὐθείων πᾶσι τμήμα διχαῖ· ἢ κατὰ τὸ πέραν τῆς
ἀφ' ἑκατέρου τῶν εὐθείων τῆς τομῆς ὁμοειδής
ἴσων τῇ διχαί τμητομένη εὐθεία.


Si parabolæ vel hyperbolæ diameter re-
ctam quandam bifariam secet; quæ
ad terminum diametri contingit se-
ctionem parallela est rectæ bifariam
sectæ.

Εἰς τὸν ἄνθρωπον εὐθεῖα ἢ ὑπερβολῆς ἡ ABΓ, ἥς διά-
μετρος ἡ ΔΒΕ, καὶ ἐφαπτόμενη τῆς τομῆς ἡ
ΖΒΗ· ἡ γωνία δὲ πρὸς εὐθεία ἐν τῇ τομῇ ἡ ΑΕΓ,
ἴσην ποιῶσα πρὸς ΑΕ τῇ ΕΓ· λέγω ὅτι ὁμοειδής
ἐστὶν ἡ ΑΓ τῇ ΖΗ.

SIT parabola vel hyperbola ABΓ, cujus dia-
meter ΔΒΕ, & ΖΒΗ sectionem contingat;
ducatur autem quædam ΑΕΓ in sectione, faciens
AB æqualem ipsi ΕΓ: dico ΑΓ parallelam esse
ipsi ΖΗ.

* Vide Lemma II. Pappi in Librum quintum.

Nisi enim ita sit, ducatur per Γ ipsi ZH parallela $\Gamma\Theta$, & jungatur ΘA . quoniam igitur $AB\Gamma$ est parabola vel hyperbola, cujus diameter quidem ΔB , contingens autem ZH , atque ipsi ZH parallela est $\Gamma\Theta$: erit [per 46. vel 47. I. huj.] ΓK æqualis $K\Theta$. sed & ΓE [ex hyp.] ipsi EA est æqualis: ergo [per 2. 6.] $A\Theta$ parallela est ipsi KE ; quod fieri non potest: producta enim cum ipsa BA [per 22. I. huj.] convenit.




Εἰ γὰρ μὴ, ἦχθω $\Delta\Gamma\Theta$ τῇ ZH ὁμοειδὴς ἢ $\Gamma\Theta$, καὶ ἐπιζώχθω ἡ ΘA . ἐπεὶ ἔν τῷ παραβολῇ ἢ ὑπερβολῇ ἐστὶν ἡ $AB\Gamma$, ἥς $\Delta\Gamma\Theta$ μὲν ἢ ΔE , ἐφαπτομένη δὲ ἡ ZH , ἔστω ὁμοειδὴς αὐτῇ ἡ $\Gamma\Theta$. ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΓK τῇ $K\Theta$. ἀλλὰ ἔστω ἡ ΓE τῇ EA . ἡ ἄρα $A\Theta$ τῇ KE ὁμοειδὴς ἐστὶν, ὅπερ ἀδυνάτου· συμπίπτει γὰρ ὁ καλλομένη τῇ BA .

PROP. VI. Theor.

Si ellipseos vel circuli circumferentiae diameter rectam quandam non per centrum transeuntem bifariam secet: quæ ad terminum diametri sectionem contingit parallela erit rectæ bifariam secetæ.

SIT ellipsis vel circuli circumferentia, cujus diameter AB , & AB ipsam $\Gamma\Delta$ non transeuntem per centrum bifariam secet in E : dico rectam, quæ sectionem contingit ad A , ipsi $\Delta\Gamma$ parallelam esse.


Nam, si fieri potest, sit recta ΔZ sectionem contingenti in puncto A parallela: æqualis igitur est [per 47. I. huj.] ΔH ipsi ZH . est autem [ex hyp.] & ΔB æqualis EG : ergo [per 2. 6.] ΓZ ipsi HE est parallela, quod est absurdum. etenim si-
ve H fuerit centrum sectionis AB ; linea ΓZ [per 23. I. huj.] cum diametro AB occurret: si-
ve non sit, ponatur centrum K , junctaque ΔK producatur ad Θ , & jungatur $\Gamma\Theta$. quoniam igitur ΔK æqualis est $K\Theta$, & ΔB ipsi EG : erit [per 2. 6.] $\Gamma\Theta$ parallela ipsi AB . sed & ΓZ [ex hyp.] eidem est parallela, quod est absurdum: ergo quæ ad A sectionem contingit ipsi $\Gamma\Delta$ est parallela.



ΠΡΟΤΑΣΙΣ 6.

Εάν ἑλλείψεως ἢ κύκλου περιφέρειας ἡ ἀφ' ἑμῆς πρὸς αὐτοῦ πᾶσι δὶχα τμήτη μὴ ἀφ' ἑ κέντρου ὕσαν ἢ κατὰ τὸ πῆμα τῷ ἀφ' ἑμέτρου ὁμοειδῆσαι τῷ τομῆς ὁμοειδῆσιν ἔσται τῇ δὶχα τμητομένη αὐτοῦ.

ΕΣΤΩ ἑλλείψις ἢ κύκλος περιφέρεια, ἥς διάμετρος ἡ AB , ἔστω AB τὴν $\Gamma\Delta$ μὴ διὰ τῷ κέντρου ὕσαν δὶχα τμητοῦ κατὰ τὸ E . λέγω ὅτι ἡ κατὰ τὸ A ἐφαπτομένη ὁμοειδῆσιν ἐστὶ τῇ $\Delta\Gamma$.



Εἰ γὰρ μὴ, ἔστω τῇ κατὰ τὸ A ἐφαπτομένη ὁμοειδῆσιν ἡ ΔZ . ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΔH τῇ ZH . ἐστὶ γὰρ καὶ ἡ ΔE τῇ EG ἴση· ὁμοειδῆσιν ἄρα ἐστὶν ἡ ΓZ τῇ HE , ὅπερ ἀδυνάτου· εἴ τι γὰρ τὸ H σημείου κέντρον ἐστὶ τῆς AB τομῆς, ἡ ΓZ συμ-

πίπτει τῇ AB . εἴ τι μὴ ἐστὶν, ὑποκεῖσθω τὸ K , καὶ ΔK ἐκτελεσθῶσι διὰ τὸ Θ , καὶ ἐπιζώχθω ἡ $\Gamma\Theta$. ἐπεὶ ἔν ἴση ἐστὶν ἡ ΔK τῇ $K\Theta$, ἐστὶ δὲ καὶ ἡ ΔE τῇ EG . ὁμοειδῆσιν ἄρα ἐστὶν ἡ $\Gamma\Theta$ τῇ AB . ἐστὶ γὰρ καὶ ἡ ΓZ τῇ αὐτῇ AB ὁμοειδῆσιν, ὅπερ ἀδυνάτου· ἡ ἄρα κατὰ τὸ A ἐφαπτομένη ὁμοειδῆσιν ἐστὶ τῇ $\Gamma\Delta$.

PROP. VII. Theor.

Si conic sectionem vel circuli circumferentiam recta linea contingat, & huic parallela ducatur in sectione, & bifariam dividatur: quæ tactum & punctum bisectionis recta connectit sectionis diameter erit.

SIT conic sectio vel circuli circumferentia $AB\Gamma$, quam contingat ZH , & ipsi ZH paral-

ΠΡΟΤΑΣΙΣ 7.

Εάν κόνις τομῆς ἢ κύκλος περιφέρειας αὐτοῦ ἐφάπτη, καὶ τῇ περὶ αὐτοῦ ἀχθῇ ἐν τῇ τομῇ, καὶ δὶχα τμηθῇ ἢ διὰ τῷ ἀφ' ἑ ἐφ' ἑ δὶχοτομῆσιν ὁμοειδῆσιν αὐτοῦ διάμετρος ἔσται τῷ τομῆς.


ΕΣΤΩ κόνις τομῆς ἢ κύκλος περιφέρεια ἡ $AB\Gamma$, ἐφαπτομένη τῇ αὐτῇ ἡ ZH , καὶ τῇ ZH περὶ αὐτοῦ

CONICORUM LIB. II.


III

ληλος ἡ ΑΓ, καὶ διχα πετμήσθω κατὰ τὸ Ε, καὶ ἐπιζεύχθω ἡ ΒΕ· λέγω ὅτι ἡ ΒΕ διάμετρος ἔσται τῆς τομῆς.

Μὴ γὰρ, ἀλλὰ, εἰ δυνατὸν, ἔσω διάμετρος τῆς τομῆς ἡ ΒΘ· ἴση ἄρα ἔστω ἡ ΑΘ τῇ ΘΓ, ὅπερ ἄτοπον· ἢ γὰρ ΑΕ τῇ ΕΓ ἴση ἔστω· ἐκ ἄρα ἡ ΒΘ διάμετρος ἔσται τῆς τομῆς. ὁμοίως δὲ δείξομεν, ὅτι ἐστὶ ἄλλη τις πλὴν τῆς ΒΕ.



lela ducatur ΑΓ, bifariamque in Ε dividatur, & jungatur ΒΕ: dico ΒΕ esse sectionis diametrum.



Non enim, sed, si fieri potest, sit diameter ΒΘ: ergo ΑΘ ipsi ΘΓ est æqualis, quod est absurdum; est enim ΑΕ æqualis ipsi ΕΓ: non est igitur ΒΘ diameter sectionis.


similiter demonstrabimus nullam aliam præter ipsam ΒΕ diametrum esse.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ 7.

Εὰν ὑπερβολῇ εὐθεῖα συμπίπτῃ κατὰ δύο σημεῖα· ἐκβαλλομένη ἐφ' ἐκάτερα συμπίπτει ἀσυμπλήτως, καὶ αἱ ἀπολαμβανόμεναι ἀπ' αὐτῆς ἑκάστου τῆς τομῆς τῶν ἀσυμπλήτων ἴσαι ἔσονται.

ΕΣΤΩ ὑπερβολῇ ἡ ΑΒΓ, ἀσύμπτωται δὲ αἱ ΕΔ, ΔΖ, καὶ τῇ ΑΒΓ συμπίπτω κατὰ δύο σημεῖα τὰ Α, Γ ἢ ΑΓ· λέγω ὅτι ἐκβαλλομένη ἐφ' ἐκάτερα συμπίπτει τῇ ἀσυμπτώτι.

Τετμήσθω ἡ ΑΓ διχα κατὰ τὸ Η, καὶ ἐπιζεύχθω ἡ ΔΗ· διάμετρος ἄρα ἔστω τῆς τομῆς· ἡ ἄρα κατὰ τὸ Β ἐφαπτομένη ὡς ἐκβαλλομένη ἐστὶ τῇ ΑΓ. ἔστω ἐν ἐφαπτομένη ἡ ΘΒΚ· συμπίπτει δὲ τῆς ΕΔ, ΔΖ. ἐπεὶ ἔν παρ' ἀλλήλους ἐστὶν ἡ ΑΓ τῇ ΚΘ, καὶ ἡ ΚΘ συμπίπτει τῇ ΔΚ, ΔΘ· καὶ ἡ ΑΓ ἄρα συμπίπτει τῇ ΔΕ, ΔΖ. συμπίπτει κατὰ τὰ Ε, Ζ. καὶ ἔστω ἴση ἡ ΘΒ τῇ ΒΚ· ἴση ἄρα καὶ ἡ ΖΗ τῇ ΗΕ· ὥστε καὶ ἡ ΓΖ τῇ ΑΕ.



Si hyperbolæ recta linea occurrat in duobus punctis: producta ab utraque parte asymptotis conveniet; & ex ipsâ abscissæ portiones inter sectionem & asymptotos interjectæ æquales erunt.

SIT hyperbola ΑΒΓ, cujus asymptoti ΕΔ, ΔΖ, & ipsi ΑΒΓ occurrat recta quædam ΑΓ in punctis Α, Γ: dico ΑΓ productam ex utraque parte cum asymptotis convenire.


Secetur enim ΑΓ bifariam in Η, & jungatur ΔΗ: hæc igitur [per cor. 5. 1. huj.] diameter est sectionis: quare [per 5. 2. huj.] recta ad Β contingens ipsi ΑΓ est parallela. sit autem contingens ΘΒΚ, quæ [per 3. 2. huj.] conveniet cum ipsis ΕΔ, ΔΖ. quoniam igitur ΑΓ est parallela ipsi ΚΘ, & ΚΘ conveniet cum ΔΚ, ΔΘ; etiam ΑΓ cum ΔΕ, ΔΖ conveniet. conveniat autem in punctis Ε, Ζ; ac ob ΘΒ ipsi ΒΚ æqualem, erit [ex 4. 6. & 15. 5.] ΖΗ ipsi ΗΕ, & propterea ΓΖ ipsi ΑΕ æqualis.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ 9.

Εὰν εὐθεῖα συμπίπτουσα τῆς ἀσυμπλήτως διχα τέτμηται ἑκάστου τῆς ὑπερβολῆς κατὰ εἰς μόνον σημεῖον ἄπλεον τῆς τομῆς.

ΕΥΘΕΙΑ γὰρ ἡ ΓΔ συμπίπτει κατὰ τὸ Α, ΑΔ ἀσυμπλήτως διχα πετμήσθω ὑπὸ τῆς ὑπερβολῆς κατὰ τὸ Ε σημεῖον· λέγω ὅτι κατ' ἄλλο σημεῖον ἐκ ἀπλεον τῆς τομῆς.

Εἰ γὰρ δυνατὸν, ἀπτεῖσθω κατὰ τὸ Β· ἴση ἄρα ἔστω ἡ ΓΕ τῇ ΒΔ, ὅπερ ἄτοπον· ὥστε γὰρ ἡ ΓΕ τῇ ΕΔ ἴση· ἐκ ἄρα κατὰ ἑπτα σημεῖον ἀπλεον ἡ ΓΔ τῆς τομῆς.



Si recta linea asymptotis occurrens ab hyperbola bifariam secetur; in uno tantum puncto cum sectione convenit.

RECTA enim ΓΔ occurrens asymptotis ΓΑ, ΑΔ secetur ab hyperbola bifariam in puncto Ε: dico rectam ΓΔ in alio puncto sectioni non occurrere.

Si enim fieri potest, occurrat in Β: ergo [per 8. 2. huj.] ΓΒ æqualis est ipsi ΒΔ, quod est absurdum; posuimus enim ΓΒ ipsi ΒΔ æqualem esse: igitur ΓΔ in alio puncto sectioni non occurrat.


PROP.

PROP. X. Theor.

Si recta quævis linea sectionem secans cum utraque asymptotōn conveniat; rectangulum contentum sub rectis lineis, quæ inter asymptotos & sectionem interjiciuntur, æquale est quartæ parti figuræ factæ ad diametrum illam quæ rectæ ductæ parallelas bifariam dividit.

SIT hyperbola $AB\Gamma$, cujus asymptoti ΔE , $E Z$, & ducatur quævis recta ΔZ sectionem & asymptotos secans, dividatur autem $A\Gamma$ bifariam in H , junctaque HE , ponatur ipsi BE æqualis EO , & à puncto B ducatur BM ad angulos rectos ipsi OE , deinde fiat ut rectangulum ΘHB ad quadratum ex AH ita ΘB ad BM ; diameter igitur est BO , [per 7. 2. huj.] & [per 21. 1. huj.] BM rectum figuræ, latus: dico rectangulum ΔAZ æquale esse quartæ parti figuræ quæ sub ΘB , BM continetur, & similiter eidem esse æquale rectangulum $\Delta \Gamma Z$.

Ducatur enim KBA per B sectionem contingens, quæ [per 5. 2. huj.] parallela erit ipsi ΔZ . jam quoniam demonstratum est [ad 1. 2. huj.] ut ΘB ad BM ita esse quadratum ex EB ad quadratum ex BK , hoc est [per 4. & 22. 6.] quadratum ex EH ad quadratum ex HA ; atque etiam ut ΘB ad BM ita [ex const. & 1. 6.] rectangulum ΘHB ad quadratum ex AH : erit igitur ut totum quadratum ex EH ad totum quadratum ex HA , ita ablatum rectangulum ΘHB ad ablatum quadratum ex AH : adeoque [per 5. 2.] reliquum quadratum ex EB ad reliquum rectangulum ΔAZ est ut quadratum ex EH ad quadratum ex HA , hoc est ut quadratum ex EB ad quadratum ex BK . æquale igitur est [per 9. 5.] rectangulum ZAA quadrato ex BK . similiter demonstrabitur & rectangulum $\Delta \Gamma Z$ quadrato ex BA æquale. quadratum autem ex KB [per 3. 2. huj.] æquale est quadrato ex BA : ergo



ΠΡΟΤΑΣΙΣ Ι.

Εάν εὐθεῖα τις τέμνῃται ὑπὸ τοῦ συμπίπτει ἐκ τῆς αἰ ΔΕ, ΕΖ, καὶ ἡχθῇ τις ἡ ΔΖ τέμνεται ὑπὸ τῆς ἀσυμπτώσεως καὶ τῆς τομῆς, ἴσον ὅτι τῆς τετάρτης μέρει ὅτι τῆς ἡμετέρας ἀφαιρέσει τὰς ἀφαιρέσεις παρὰ τῆς ἡμετέρας εὐθείας.

ΕΣΤΩ ὑπερβολὴ ἡ $AB\Gamma$, ἀσύμπτωται δὲ αὐτῆς αἰ ΔE , $E Z$, καὶ ἡχθῇ τις ἡ ΔZ τέμνεται ὑπὸ τῆς ἀσυμπτώσεως καὶ τῆς τομῆς ἡ $A\Gamma$ διχάζεται κατὰ τὸ H , καὶ ἐπιένχθῃ ἡ HE , καὶ κείσθω τῇ BE ἴση ἡ EO , καὶ ἡχθῇ δὲ BM τῇ OE πρὸς ὀρθὰς ἡ BM , καὶ πεποιηθῇ ὡς τὸ ὑπὸ τῆς ΘHB πρὸς τὸ δὲ ΔH ὅτως ἡ ΘB πρὸς πᾶν BM , διάμετρος ἀρα ἐστὶν ἡ BO , ὁρῶσα δὲ ἡ BM . λέγω ὅτι τὸ ὑπὸ ΔAZ ἴσον ἐστὶ τῷ τετάρτῳ ὅτι ὑπὸ τῆς ΘBM , ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν $\Delta \Gamma Z$.

ἡχθῇ γὰρ διὰ τῆς B ἐφαπτομένη τῆς τομῆς ἡ $K\Lambda$. ὁμοίως ὅλας ἀρα ἐστὶ τῇ ΔZ . καὶ ἐπεὶ δεικνύται ὡς ἡ ΘB πρὸς BM ὅτως τὸ δὲ EB πρὸς τὸ δὲ BK , τέτῃσι τὸ δὲ EH πρὸς τὸ δὲ HA . ὡς δὲ ἡ ΘB πρὸς BM ὅτως τὸ ὑπὸ ΘHB πρὸς τὸ δὲ HA . ἐστὶν ἔτι ὡς ὅλον τὸ δὲ EH πρὸς ὅλον τὸ δὲ HA ὅτως ἀφαιρέθην τὸ ὑπὸ ΘHB πρὸς ἀφαιρέθην τὸ δὲ HA . καὶ λοιπὸν ἀρα τὸ δὲ EB πρὸς λοιπὸν τὸ ὑπὸ ΔAZ ἐστὶν ὡς τὸ δὲ EH πρὸς τὸ δὲ HA , τέτῃσι τὸ δὲ EB πρὸς τὸ δὲ BK . ὁμοίως δεκνύσεται καὶ τὸ ὑπὸ $\Delta \Gamma Z$ τῷ δὲ BA . ἴσον δὲ τὸ ἀπὸ KB τῷ ἀπὸ BA . ἴσον ἀρα καὶ τὸ ὑπὸ ZAA τῷ ὑπὸ $Z\Gamma A$.

& ZAA rectangulum rectangulo $Z\Gamma A$ æquale erit.

PROP. XI. Theor.

Si utramque rectarum continentium angulum qui deinceps est angulo hyperbolam continenti secet recta linea: in uno tantum puncto cum sectione conveniet; & rectangulum contentum sub interjectis inter rectas angulum continentes & sectionem, æquale erit quartæ parti quadrati ex diametro quæ rectæ secanti parallela est.

SIT hyperbola cujus asymptoti ΓA , $A \Delta$; & producta ΔA ad B , per aliquod punctum E

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΑ'.

Εάν ἐκατέρῃ τῶν ἀσυχουσῶν ἡ ἐφεξῆς γωνία τῆς ἀσυχούσεως ὑπερβολῇ τέμνηται εὐθεῖα συμπεσῇται τῇ τομῇ καὶ ἂν μόνον σημείωσι, καὶ τὸ ἀσυχόμενον ὑπὸ τῶν ἀσυχουσῶν εὐθειῶν μεταξὺ τῆς ἀσυχούσεως καὶ τῆς τομῆς, ἴσον ὅτι τῆς τετάρτης μέρει ὅτι τῆς ἡμετέρας ἀφαιρέσει παρὰ τῆς τέμνουσας εὐθείας.

ΕΣΤΩ ὑπερβολὴ ἡς ἀσύμπτωται αἰ ΓA , $A \Delta$, & ἐκτελέσθῃ ἡ ΔA ὅπῃ τὸ E , καὶ διὰ πῶς σημείωσι

σημεία Ξ E διήχθω η EZ τέμνουσα τὰς EA , AG .
ὅτι μὴ ἐν συμπίπτει τῇ τομῇ καὶ ἐν μόνον σημείον,
φανερὸν. ἡ γὰρ $\Delta\alpha$ Ξ A τῇ EZ ὡς ἀλλήλος ἀγο-
μύνη, ὡς ἡ AB , περὶ τὸ ὑπὸ $\Gamma A \Delta$ γωνίαν, καὶ συμ-
πίπτει τῇ τομῇ, καὶ διάμετρος αὐτῆς ἐστὶ· ἡ EZ
ἄρα συμπίπτει τῇ τομῇ καὶ ἐν μόνον σημείον.
συμπίπτειτω κατὰ τὸ H . λέγω δὲ ὅτι ϵ τὸ ὑπὸ
τῷ $E H Z$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῷ AB .

Ἡχθῶ γὰρ $\Delta\alpha$ Ξ H τετα-
γμένως ἡ $\Theta H A K$. ἡ ἄρα
διὰ Ξ B ἐφαπτομένη ὡς ἀλ-
ληλός ἐστι τῇ $H \Theta$. ἐστὼ ἡ
 $\Gamma \Delta$. ἐπεὶ ἐν ἴσῃ ἐστὶν ἡ ΓB
τῇ $B \Delta$, τὸ ἄρα ὑπὸ ΓB ,
ταῦτι τὸ ὑπὸ $\Gamma B \Delta$, ὡς
τὸ ὑπὸ $B A$ λόγον ἔχει τὸν
συγκείμενον, ἐκ τῆς ΓB
πρὸς $B A$ καὶ τῆς ΔB πρὸς
 $B A$. ἀλλ' ὡς μὴ ἡ ΓB
πρὸς $B A$ ὅτως ἡ ΘH πρὸς
 $H Z$, ὡς δὲ ἡ ΔB πρὸς $B A$
ὅτως ἡ $K H$ πρὸς $H E$. ὁ
ἄρα Ξ ὑπὸ ΓB πρὸς τὸ ἀπὸ
 $B A$ λόγος συγκείμενος ἐκ Ξ τ
 ΘH πρὸς $H Z$ καὶ Ξ τ $K H$
πρὸς $H E$. ἀλλὰ καὶ ὁ Ξ ὑπὸ $K H \Theta$ πρὸς τὸ ὑπὸ
 $E H Z$ λόγος συγκείμενος ἐκ τῶν αὐτῶν ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ
 $K H \Theta$ πρὸς τὸ ὑπὸ $E H Z$ ὅτως τὸ ὑπὸ ΓB πρὸς
τὸ ἀπὸ $B A$, καὶ ἐναλλάξ ὡς τὸ ὑπὸ $K H \Theta$ πρὸς τὸ
ἀπὸ ΓB ὅτως τὸ ὑπὸ $E H Z$ πρὸς τὸ ἀπὸ $A B$. ἴσον
δὲ τὸ ὑπὸ $K H \Theta$ τῷ ἀπὸ ΓB εἰδείχθη· ἴσον ἄρα καὶ
τὸ ὑπὸ $E H Z$ τῷ ἀπὸ $A B$.

ducatur BZ , ipsas EA , AG secans: perspicuum
est EZ in uno tantum puncto cum sectione
convenire. nam quæ per A ipsi EZ parallela
ducitur, ut AB , secat angulum $\Gamma A \Delta$; propter-
eaque [per 2. 2. huj.] conveniet cum sectione, &
[per corol. 51. 1. huj.] ipsius diameter erit; quare
 EZ conveniet cum sectione in uno solo puncto.
conveniat autem ad H : dico rectangulum $E H Z$
quadrato ex AB æquale esse.

Ducatur enim per H or-
dinatim $\Theta H A K$: ergo [per
5. 2. huj.] quæ in puncto B
sectionem contingit paral-
lela est ipsi $H \Theta$. sit ea $\Gamma \Delta$.
itaque quoniam ΓB est æqua-
lis ipsi $B \Delta$; quadratum ex
 ΓB , hoc est rectangulum
 $\Gamma B \Delta$, ad quadratum ex $B A$
habet [per 23. 6.] rationem
compositam ex ratione ΓB
ad $B A$ & ex ratione ΔB
ad $B A$. sed [per 4. 6.] ut
 ΓB ad $B A$ ita ΘH ad $H Z$,
& ut ΔB ad $B A$ ita $K H$ ad
 $H E$: ergo ratio quadrati ex
 ΓB ad quadratum ex $B A$
composita est ex ratione
 ΘH ad $H Z$ & ratione $K H$

ad $H E$. ratio autem rectanguli $K H \Theta$ ad rectan-
gulum $E H Z$ [per 23. 6.] ex eisdem rationibus
componitur: quare ut rectangulum $K H \Theta$ ad
rectangulum $E H Z$ ita quadratum ex ΓB ad qua-
dratum ex $B A$; & permutando ut rectangulum
 $K H \Theta$ ad quadratum ex ΓB ita rectangulum $E H Z$
ad quadratum ex $A B$. sed [per 10. 2. huj.] rectan-
gulum $K H \Theta$ æquatur quadrato ex ΓB : ergo &
 $E H Z$ rectangulum quadrato ex $A B$ æquale erit.

EUTOCIUS.

Εν ποσιν ἀντιγράφοις τὸ θεώρημα τῷ ἄλλῳ δέκνεται.

* Εἰς ὑπερβολῇ, ἥς ἀσύμπτωτοι αἱ AB , $B \Gamma$, καὶ
ἐκτενέσθω ἐπ' εὐθείαν ἡ $\Gamma B \Delta$, καὶ ἡχθῶ τις ἡ EZ ,
ὡς ἐτυχεν, τέμνουσα τὰς $B \Delta$, $B A$.
λέγω ὅτι συμπίπτει τῇ τομῇ.

Εἰ γὰρ δυνατὸν μὴ συμπίπτειτω, ϵ
 $\Delta\alpha$ Ξ B τῇ EZ ὡς ἀλλήλος ἡχθῶ
ἡ $B H$. $\Delta\alpha$ μέτρος ἄρα ἐστὶ τῇ το-
μῇ. ϵ ὡς ἐκτενέσθω $\Delta\alpha$ πλὴν
 EZ τῷ ἀπὸ $B H$ ἴσον ὡς ἀλλήλο-
γραμμὸν ὑπερβάλλον εἶδει τετρα-
γώνῳ, καὶ ποιέτω τὸ ὑπὸ $E \Theta Z$, καὶ
ἐπέλχθω ἡ ΘB καὶ ἐκτενέσθω
συμπίπτειτω ἄρα τῇ τομῇ. συμ-
πίπτειτω κατὰ τὸ K , καὶ $\Delta\alpha$ Ξ K
τῇ $B H$ ὡς ἀλλήλος ἡχθῶ ἡ $K A \Delta$.
τὸ ἄρα ὑπὸ $\Delta K A$ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ
 $B H$, ὡς καὶ τῷ ὑπὸ $E \Theta Z$. ὅπερ
ἄτοπον. ἡ ἄρα EZ συμπίπτει τῇ τομῇ, ἐπεὶ περ συμ-
πίπτει αὐτῇ ἡ $A \Delta$. φανερὸν γὰρ ὅτι καὶ κατὰ ἐν μόνον
σημείον ὡς ἀλλήλος γὰρ ἐστὶ τῇ $B H$ $\Delta\alpha$ μέτρος.

* Hæc demonstratio vix satis integra videtur, ac tuto omitti poterat: nam, ex 26^a libri primi, res satis manifesta est.

F f

PROP.

In aliquibus exemplaribus hoc theorema aliter de-
monstratur.

Sit hyperbola, cujus asymptoti AB , $B \Gamma$, pro-
ducaturque $\Gamma B \Delta$ in directum, & ducatur EZ ,
utcunque, secans $B \Delta$, $B A$: dico
 BZ cum sectione convenire.


Si enim fieri potest, non con-
veniat, & per B ipsi EZ paralle-
la ducatur $B H$: ergo $B H$ est dia-
meter sectionis. applicetur [per
29. 6.] ad EZ parallelogrammum
quadrato ex $B H$ æquale ex-
cens figurâ quadratâ; quod sit
 $E \Theta Z$: & juncta ΘB producat. occurret igitur [per 2. 2. huj.]
cum sectione. occurrat in K , & per
 K ducatur $K A \Delta$ parallela ipsi $B H$:
ergo [per 11. 2. huj.] rectangu-
lum $\Delta K A$ quadrato ex $B H$ est æ-
quale; ideoque æquale rectan-
gulo $E \Theta Z$, quod est absurdum.

quare cum $A \Delta$ convenit cum sectione, mani-
festum est & EZ eidem convenire, idque in uno
tantum puncto; diametro enim $B H$ est parallela.

PROP. XII. Theor.

Si ab aliquo puncto eorum, quæ sunt in sectione, ad asymptotos duæ rectæ lineæ in quibuscumque angulis ducantur, & ab alio quovis puncto in sectione sumpto ducantur aliæ rectæ his ipsis parallelæ: rectangulum sub parallelis contentum æquale erit contento sub rectis ipsis quibus ductæ fuerant parallelæ.

SIT hyperbola, cujus asymptoti AB, BG, & sumatur in sectione aliquod punctum Δ, atque ab eo ad AB, BG ducantur ΔE, ΔZ; sumatur autem & alterum punctum H in sectione, per quod ducantur HΘ, HK ipsis ΔE, ΔZ parallelæ: dico rectangulum EΔZ rectangulo ΘHK æquale esse. Jungatur enim ΔH, & ad A, Γ producat. itaque quoniam [per 10. 2. huj.] rectangulum AΔΓ æquatur rectangulo AHΓ; erit [per 16. 6.] ut AH ad AΔ ita ΔΓ ad ΓH. sed [per 4. 6.] ut AH ad AΔ ita HΘ ad EΔ, & ut ΔΓ ad ΓH ita ΔZ ad HK; quare [per 11. 5.] ut ΘH ad ΔE ita ΔZ ad HK: rectangulum igitur EΔZ [per 16. 6.] rectangulo ΘHK est æquale.



ΠΡΟΤΑΣΙΣ 12.

Εάν ὅτι τὰς ἀσύμπτωτας ἀπὸ πῶς σημείῳ τῇ τομῆς δύο εὐθεῖαι ἀχθῶσιν ἐν τυχούσαις καίαις, καὶ ταύταις παράλληλοι ἀχθῶσιν ἀπὸ πῶς σημείου τῇ τομῆς τὸ ὑπὸ τῶν ὁμοεισέλκων ἀφασχόμενοι ὀρθογώνιοι ἴσονται τῷ ἀφασχόμενῳ ὑπὸ τῶν αἰς αἱ παράλληλοι ἡχθῶσιν.

ΕΣΤΩ ὑπερβολή, ἥς ἀσύμπτωται αἱ AB, BG, καὶ εἰληφθῶσι σημείον ὅπῃ τῇ τομῆς τὸ Δ, καὶ ἀπ' αὐτοῦ ἐπὶ τὰς AB, BG κατὰ χῆσιν αἱ ΔΕ, ΔΖ· εἰληφθῶσι δὲ πῶς σημείον ἕτερον ὅπῃ τῇ τομῆς τὸ Η, καὶ διὰ τῆς Η τὰς ΕΔ, ΔΖ ὁμοεισέλκων ἡχθῶσιν αἱ ΗΘ, ΗΚ· λέγω ὅτι ἴσων ἐστὶ τὸ ὑπὸ ΕΔΖ τῷ ὑπὸ ΘΗΚ. Ἐπεζεύχθω γὰρ ἡ ΔΗ, καὶ ἐκτελέσθω ὅπῃ τὰς Α, Γ. ἐπεὶ ἂν ἴσων ἐστὶ τὸ ὑπὸ ΑΔΓ τῷ ὑπὸ ΑΗΓ· ἔστω ἄρα ὡς ἡ ΑΗ πρὸς ΑΔ ἕτως ἡ ΔΓ πρὸς ΓΗ. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΑΗ πρὸς ΑΔ ἕτως ἡ ΗΘ πρὸς ΕΔ, ὡς δὲ ἡ ΔΓ πρὸς ΓΗ ἕτως ἡ ΔΖ πρὸς ΗΚ· ὡς ἄρα ἡ ΗΘ πρὸς ΕΔ ἕτως ἡ ΔΖ πρὸς ΗΚ· ἴσων ἄρα ἐστὶ τὸ ὑπὸ ΕΔΖ τῷ ὑπὸ ΘΗΚ.

EUTOCIUS.

In aliquibus codicibus invenitur hoc Theorema demonstratum, ope duarum rectarum contingenti parallelarum, quarum altera per Δ, altera vero per H ducitur, demonstratione juxta rationes Syntheticas ostensā. elegimus autem hunc quem damus probandi modum, utpote eadem simplicius monstrantem. Casus autem habet sex, ductis enim sex rectis, vel punctum Θ erit inter E, B; vel in puncto B, vel extra B; qui tres sunt casus: pariterque tres sunt alii, juxta situm puncti Z.

Εὐρίδης ἐν πρῶτῳ ἀντιγράφῳ τῆς τομῆς θεωρεῖται δεινῶς διὰ δύο παραλλήλων ἀφασχόμενων τῇ ἐφαπτομένῃ, μὴ μὲν διὰ τῆς Δ, ἐπὶ τῆς δὲ διὰ τῆς Η· καὶ ἡ ἀπόδειξις διὰ συνδυαστικῶν λόγων. ἐπιτελέσμεθα δὲ ταῦτ' ὡς πρὸς σκοπὸν ὡς τὰ αὐτὰ δεικνύσαν ἀπλυσίως. ἔχει δὲ καὶ πέντε ἐξ τῶν γὰρ ἐξ εὐθειῶν ἀχθῶσιν, τὸ Θ σημείον ἢ μεταξὺ ἢ ἐξ τῶν Ε, Β, ἢ ὅπῃ τῇ Β, ἢ ἐξ τῇ Β, ὡς γίνονται τρεῖς· καὶ ὁμοίως ὅπῃ τῇ Ζ ἀλλὰ τρεῖς.

PROP. XIII. Theor.

Si in loco ab asymptotis & sectione terminato quævis recta linea ducatur alteri asymptotōn parallelæ: in uno puncto tantum cum sectione conveniet.

SIT hyperbola, cujus asymptoti ΓΑ, ΑΒ, sumaturque aliquod punctum Ε, & per Ε ipsi ΑΒ parallelæ ducatur ΕΖ: dico ΕΖ cum sectione convenire.

Si enim fieri potest, non conveniat, & sumatur punctum quodvis in sectione, per quod ipsis ΓΑ, ΑΒ parallelæ ducantur ΗΘ, ΗΓ; & rectangulo ΓΗΘ æquale sit rectangulum ΑΕΖ; junctæque ΑΖ producat: hæc igitur cum sectione [per 2. 2. huj.] conveniet. conveniat autem in


ΠΡΟΤΑΣΙΣ 13.

Εάν ἐν τῷ ἀφασχόμενῳ τόπῳ ὑπὸ τῶν ἀσύμπτωτων καὶ τῇ τομῆς παράλληλος ἀχθῇ τις εὐθεῖα τῇ ἐπὶ τῇ ἀσύμπτωτῇ συμπεσῇται τῇ τομῇ καὶ εἰ μόνον σημείον.

ΕΣΤΩ ὑπερβολή, ἥς ἀσύμπτωται αἱ ΓΑ, ΑΒ, καὶ εἰληφθῶσι σημείον τὸ Ε, καὶ δι' αὐτοῦ τῇ ΑΒ ὁμοεισέλκων ἡχθῶ ἡ ΕΖ· λέγω ὅτι συμπεσῇται τῇ τομῇ.

Εἰ γὰρ διωκτὸν, μὴ συμπτῇται. καὶ εἰληφθῶσι σημείον ὅπῃ τῇ τομῆς τὸ Η, καὶ διὰ τῆς Η τὰς ΓΑ, ΑΒ ὁμοεισέλκων ἡχθῶσιν αἱ ΗΘ, ΗΓ· καὶ τῷ ὑπὸ ΓΗΘ ἴσων ἔστω τὸ ὑπὸ ΑΕΖ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΖ· ἐκτελέσθω δὲ τῇ ΑΖ συμπεσῇ δὴ τῇ τομῇ. συμπτῇται κατὰ τὸ Κ, καὶ

Κ, καὶ διὰ τῆς Κ ὡς πρὸς ΑΒ, ΑΓ ἡχθῶσιν αἱ
ΚΑ, ΚΔ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΓΗΘ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ
ΑΚΔ. ὑποκείτω ὅτι καὶ τῷ ὑπὸ
ΑΕΖ ἴσον· τὸ ἄρα ὑπὸ ΔΚΑ,
τετάρτον τὸ ὑπὸ ΑΔΚ, ἴσον ἐστὶ
τῷ ὑπὸ ΑΕΖ, ὅπερ ἀδιύνατον·
μεῖζων γάρ ἐστι καὶ ἡ ΚΑ τῇ ΕΖ,
καὶ ἡ ΑΑ τῇ ΑΕ· συμπίπτει ἄρα
ἡ ΕΖ τῇ τομῇ. συμπίπτει
κατὰ τὸ Μ· λέγω δὲ κατ'
ἄλλο ἢ συμπίπτει. εἰ γὰρ δυ-
νατόν, συμπίπτει καὶ κατὰ τὸ
Ν, καὶ διὰ τῆς Μ, Ν τῇ ΓΑ παρ-
άλληλοι ἡχθῶσιν αἱ ΜΞ, ΝΒ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΕΜΞ
ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΕΝΒ, ὅπερ ἀδιύνατον. ἐκ ἄρα
καθ' ἑπὶρον σημείον συμπίπτει τῇ τομῇ.




puncto K, & per K ducantur ΚΑ, ΚΔ ipsius ΑΒ,
ΑΓ parallelæ: ergo [per 12. 2. huj.] rectangu-
lum ΓΗΘ æquale est rectan-
gulo ΑΚΔ. ponitur autem &
rectangulo ΑΕΖ æquale: re-
ctangulum igitur ΔΚΑ, hoc
est ΑΔΚ, rectangulo ΑΕΖ
æquale erit, quod fieri non
potest; si quidem ΚΑ major
est quam ΕΖ; & ΑΑ major
est quam ΑΕ: quare ΕΖ con-
veniet cum sectione. conveniat
in Μ: dico eam in alio puncto
non convenire. nam si fieri
potest, conveniat etiam in Ν;
& per Μ, Ν ipsi ΓΑ parallelæ ducantur ΜΞ, ΝΒ:
ergo [per 12. 2. huj.] rectangulum ΕΜΞ rectan-
gulo ΕΝΒ est æquale, quod est absurdum. igitur
in alio puncto cum sectione non conveniet.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΔ'.

Αἱ ἀσύμπτωτοι καὶ ἡ τομὴ εἰς ἀπειρὸν ἐκβαλλόμεναι
ἐγγίον τε προσάγουσι ἑαυταῖς, καὶ παντὸς ὧς δοθέν-
τος διαστήματος εἰς ἐλάττω ἀφικνῶνται διάστημα.

ΕΣΤΩ ὑπερβολή, ἥς ἀσύμπτωτοι αἱ ΑΒ, ΑΓ,
δοθέν δὲ διάστημα τὸ Κ: λέγω ὅτι αἱ ΑΒ,
ΑΓ καὶ ἡ τομὴ ἐκβαλλόμεναι ἐγγίον τε προσάγουσι
ἑαυταῖς καὶ εἰς ἐλάττω ἀφικνῶνται διάστημα τὸ Κ.

Ἡχθῶσιν γὰρ τῇ ἐφαπτομένῃ
τῇ ΟΠ ὡς ἑταίροι αἱ ΕΘΖ,
ΓΗΔ, καὶ ἐπιζεύχθω ἡ ΑΘ, καὶ
ἐκθεσθῶσιν ὅτι τὸ Ξ. ἐπεὶ γὰρ
τὸ ὑπὸ ΓΗΔ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ
ΖΘΕ· ἔστω ἄρα ὡς ἡ ΔΗ πρὸς
ΖΘ ὅτως ἡ ΘΕ πρὸς ΓΗ. με-
ζίων δὲ ἡ ΔΗ τῇ ΖΘ· με-
ζίων ἄρα καὶ ἡ ΕΘ τῇ ΓΗ. ὁμοίως
δὲ δεικνύμεν ὅτι καὶ αἱ κατὰ τὸ
ἔξω ἐλάττω εἰσιν. εἰλήφθω
δὲ τὸ Κ διαστήματος ἐλάττω τὸ
ΕΛ, καὶ διὰ τῆς ΑΓ ὡς ἑταίρος ἡχθῶ ἡ ΑΝ·
συμπίπτει ἄρα τῇ τομῇ. συμπίπτει κατὰ τὸ Ν,
καὶ διὰ τῆς Ν τῇ ΕΖ ὡς ἑταίρος ἡχθῶ ἡ ΜΝΒ· ἡ
ἄρα ΜΝ ἴση ἐστὶ τῇ ΕΛ, καὶ διὰ τῶν ἐλάττων
τῆς Κ.



PROP. XIV. Theor.
Asymptoti & sectio in infinitum pro-
ductæ ad seipsas propius accedunt;
& ad intervallum perveniunt minus
quolibet dato intervallo,

SIT hyperbola, cujus asymptoti ΑΒ, ΑΓ, &
datum intervallum sit Κ: dico asymptotos
ΑΒ, ΑΓ & sectionem productas ad sese pro-
pius accedere, & pervenire ad intervallum mi-
nus intervallo Κ.

Ducatur enim tangenti ΟΠ
parallelæ ΕΘΖ, ΓΗΔ; junga-
turque ΑΘ, & ad Ξ produca-
tur: quoniam ergo [per 10. 2.
huj.] rectangulum ΓΗΔ rectan-
gulo ΖΘΕ est æquale; erit [per
16. 6.] ut ΔΗ ad ΖΘ ita ΘΕ
ad ΓΗ. sed ΔΗ major est ipsa
ΖΘ: ergo & ΘΕ ipsa ΓΗ est ma-
ior. similiter demonstrabimus
eas, quæ deinceps sequuntur,
minores esse. itaque sumatur
[per 3. 1.] intervallum ΕΛ mi-
nus intervallo Κ, & per Α ipsi ΑΓ parallela du-
catur ΑΝ. ergo [per 13. 2. huj.] ΑΝ cum se-
ctione conveniet. conveniat in Ν, perque Ν du-
catur ΜΝΒ parallela ipsi ΕΖ: quare [per 34. 1.]
ΜΝ erit æqualis ΕΛ; & propterea intervallo Κ
minor erit.

Corollarium.

Ex hoc manifestum est rectas ΑΒ, ΑΓ ad se-
ctionem accedere propius quam aliæ quævis
asymptoti: & [ex 2. 2. huj.] angulum ΒΑΓ
minorem esse quolibet angulo, qui aliis rectis
sectioni non occurrentibus continetur.

EUTOCIUS.

Εν πῶν ἀντιγράφοις εὐρέθην ἄλλως δεικνύμενον· ὅτι,


Παντὸς ὧς δοθέντος διαστήματος εἰς ἐλάττω ἀφι-
κνῶνται διάστημα αἱ ἀσύμπτωτοι καὶ ἡ τομὴ

In aliquibus exemplaribus illud aliter demonstratum
invenitur: scilicet,

Asymptotos & sectionem pervenire ad
intervallum minus quolibet intervallo
dato.

Idem

Hisdem enim manentibus, sumatur interval-
lum EK dato intervallo minus, fiatque ut KB
ad EΘ ita ΘΑ ad ΑΑ, &
per Α ipsi ΕΖ parallela du-
catur ΜΞ ΑΒ. quoniam igitur [per 8.5.] ΞΒ ad ΘΖ ma-
jorem rationem habet quam
ΑΒ ad ΘΖ; ut autem ΞΒ ad
ΘΖ ita [per 16.6.] ΘΕ ad
ΜΞ, propterea quod rectan-
gulum ΖΘΒ rectangulo ΒΞΜ
[per 10.2.huj.] est æquale:
habetit ΘΕ ad ΜΞ majorem
rationem quam ΑΒ ad ΘΖ.
sed ut ΑΒ quidem ad ΘΖ ita
[per 4.6.] ΑΑ ad ΑΘ; ut autem ΑΑ ad ΑΘ
ita ΘΕ ad ΕΚ: quare ΘΕ ad ΜΞ majorem ra-
tionem habet quam ΘΕ ad ΕΚ: minor igitur
[per 8.5.] est ΜΞ quam ΚΕ.



Τῶν γὰρ αὐτῶν ὑποκειμένων εἰλήφθω ἡ δοθέν-
τος διαστήματος ἐλαττόν τὸ ΕΚ, καὶ πεποιθῶμεν ὡς ἡ
ΚΕ πρὸς ΕΘ ὥτως ἡ ΘΑ πρὸς
ΑΑ, ὅτι διὰ τῆς ΕΖ ὁμογ-
ληλος ἔστω ἡ ΜΞ ΑΒ. ἐπεὶ γὰρ
ἡ ΞΒ πρὸς ΘΖ μείζονα λόγον
ἔχει ἢ περ ἡ ΑΒ πρὸς ΘΖ, ὡς
δὲ ἡ ΞΒ πρὸς ΘΖ ὥτως ἡ ΘΕ
πρὸς ΜΞ, διὰ τὸ ἴσον εἶναι τὸ
ὑπὸ ΖΘΕ τῷ ὑπὸ ΒΞΜ, καὶ
ἡ ΘΕ ἄρα πρὸς ΜΞ μείζονα
λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΑΒ πρὸς
ΘΖ. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΑΒ πρὸς
ΘΖ ὥτως ἡ ΑΑ πρὸς ΑΘ, ὡς δὲ ἡ ΑΑ πρὸς ΑΘ
ὥτως ἡ ΘΕ πρὸς ΕΚ. ὅτι ἡ ΘΕ ἄρα πρὸς ΜΞ μεί-
ζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΘΕ πρὸς ΕΚ. ἐλάσσων
ἄρα ἡ ΜΞ τῆς ΚΕ.

Inveniuntur in aliquibus codicibus etiam hæc theo-
remata, quæ à nobis tanquam supervacanea sublata
sunt. quoniam enim demonstratum est asymptotos
propius accedere ad sectionem, & ad intervallum
pervenire quolibet dato intervallo minus; superva-
cuum fuit hæc inquirere: neque demonstrationes
aliquas habent, sed tantum figurarum differentias.
verum ut iis qui in hæc inciderint sententiam nostram
approbemus, exponantur hoc loco ea quæ nos ut su-
pervacanea sustulimus


Asymptoti, de quibus dictum est, pro-
pius accedunt ad sectionem quam aliæ,
si quæ sint, asymptoti.

Sit hyperbola, cujus asymptoti ΓΑ, ΑΔ: dico
ΓΑ, ΑΔ ad sectionem propius accedere quam
aliæ asymptoti, si quæ sint. namque, ut in pri-

Εὐρίσκειν δὲ ἐν τοῖς καὶ ταῖς διαφάνειαις ἐγγραμ-
μίαις, ὅτι ὡς περὶ ἀσπόμενους ἡμῶν. διδεδυγμένον γὰρ τότε,
ὅτι αἱ ἀσύμπτωτοι ἐγγίοντες πρὸς τὴν τομήν, καὶ παντὸς ὅ-
που ἐλάττω ἀφικνῶνται, περὶ τὸν ὅτι ταῦτα ζητεῖν
ἀμέλει· ἐπεὶ ἀποδείξεως ἔχουσιν πᾶσι ἀλλὰ διαφορὰς καταγρα-
φῶν. ἵνα δὲ τῆς ἐνπελάγειας τῶν ἡμετέρων γνώμῃ διήλω-
ποιώμεν, ἐκείδω ἐνταῦθα τὰ ὡς περὶ ἀσπόμενους.

Εἴ τις εἴσιν ἀσύμπτωτοι τῇ τομῇ ἔτιραι ἢ ὁμο-
μηδύται, ἐγγίοντες αἱ ἀσπόμενους τῇ τομῇ.

Εἰς ὑπερβολήν, ἥς ἀσύμπτωτοι αἱ ΓΑ, ΑΔ. λέ-
γω ὅτι αἱ πᾶσι εἴσιν ἄλλαι ἀσύμπτωτοι τῇ τομῇ, ἐκεί-
νων ἐγγίοντες αἱ ΓΑ, ΑΔ. ὅτι μὲν γὰρ, ὡς ὅτι τῇ



ma figura, ipsas ΕΖ, ΖΗ asymptotos esse non
posse manifeste constat, ob ΕΖ parallelam ipsi ΓΑ,
& ΖΗ ipsi ΑΔ; demonstratum siquidem est [per
13.2.huj.] rectas, quæ in loco ab asymptotis & se-
ctione terminato ducuntur alteri asymptoto paral-
lelæ, cum sectione convenire. si vero, ut in
secunda figura apparet, ΕΖ, ΖΗ sint asymptoti,

πρώτης καταγραφῆς, καὶ δυνάμει αἱ ΕΖ, ΖΗ ἀσύμ-
πτωτοι εἶναι, φανερόν· ὡς εἶναι ὁμοειδή τὸ μὲν
ΕΖ τῇ ΓΑ, τὸ δὲ ΖΗ τῇ ΑΔ. δέδεικεν γὰρ ὅτι συμ-
πίπτει τῇ τομῇ· ἐν γὰρ τῷ ἀφοραζομένῳ τόπῳ ὑπὸ
τῶν ἀσπόμενων καὶ τῇ τομῇ εἴσιν. εἰ δὲ, ὡς ὅτι τῆς
δευτέρας πτώσεως, εἴσιν ἀσύμπτωτοι αἱ ΕΖ, ΖΗ
περιέλλονται


παράλληλοι ἔσονται $\Gamma\Lambda, \Lambda\Delta$, ἔχον μᾶλλον εἶναι αἰ $\Gamma\Lambda, \Lambda\Delta$ τῇ τομῇ ἢ περ αἰ BZ, ZH . εἰ δὲ ὡς ὅτι τῇ τρίτης πτώσεως, καὶ ἔτι αἰ μὲν $\Gamma\Lambda, \Lambda\Delta$, εἰν ἐκβληθῶσιν εἰς ἀπειρον, ἔχον εἶναι τῇ τομῇ, καὶ εἰς ἐλάχιστον διάστημα πάντος δ δοθέντος ἀφικνῶν. αἰ η EZ, ZH , κατὰ μὲν τὸ Z καὶ τὸ ἐγγὺς αὐτῶν, ὅπως ἔστι γωνίας συνεγγὺς εἰσι τῇ τομῇ, ἐκβληθῶσιν η ἀφίσταν. τῇ τομῇ μᾶλλον πάντος ἄρα δ δοθέντος ὁ νυνὶ ἀφίστασθαι ἐκ ἐν ἐλάχιστον. Ἐξωσαν δὲ πάλιν, ὡς ὅτι τῇ πέριττης κατὰ γραφῆς, ἀσύμπτωτοι αἰ EZ, ZH . φανερόν δὲ καὶ ἔτι αἰ μὲν $\Gamma\Lambda$ ἔχον εἶναι τῇ τομῇ ἢ περ EZ , εἰν τε EZ τῇ $\Gamma\Lambda$ ἀσύντλητος ἢ, εἰν τε συμπίπτει τῇ $\Gamma\Lambda$. καὶ εἰν μὲν ἢ σύμπτωσις κατώτερον ἢ τῇ διὰ Z ἐφαπτομένης τῇ τομῇ, πῦναι πῶς τομῇ. εἰν δὲ ἢ σύμπτωσις ἐν τῇ μεταξὺ τόπων ἢ τῇ ἐφαπτομένης καὶ τῇ γωνίας, κατὰ τὰ αὐτὰ πῶς ἐπάνω, ἢ Z E τῇ τομῇ ἐκ ἀφίστα ἐλάχιστον διάστημα πάντος δ δοθέντος. ὡς η $\Gamma\Lambda$ ἔχον εἶναι τῇ τομῇ ἢ περ EZ . ἢ $\Delta\Lambda$ ἔχον τῇ τομῇ ἢ περ ZH , διὰ τὰ αὐτὰ τῇ ἐπὶ β . κατὰ γραφῆς.

ipsis $\Gamma\Lambda, \Lambda\Delta$ parallelæ; tamen $\Gamma\Lambda, \Lambda\Delta$ ad sectionem propius accedunt quam EZ, ZH . quod si, ut in tertia figura, $\Gamma\Lambda, \Lambda\Delta$ in infinitum productæ ad sectionem propius accedunt & ad intervallum perveniunt minus quolibet dato intervallo; rectæ EZ, ZH , quanquam in puncto Z & intra angulum propinquiores sint sectioni, tamen productæ ab ipsa magis recedunt; intervallum itaque quo nunc distant non est quolibet dato intervallo minus. Rursus sint asymptoti EZ, ZH , ut in quarta figura: constat etiam hoc modo $\Gamma\Lambda$ propinquiorem esse sectioni quam EZ , sive EZ parallela sit $\Gamma\Lambda$, sive cum ipsa conveniat. & si quidem concursus sit infra eam quæ per Z sectionem contingit, secabit EZ sectionem ipsam: si vero concursus sit in loco intermedio inter contingentem & angulum, ut supra demonstratum est, non perveniet ad intervallum minus intervallo dato: quare $\Gamma\Lambda$ propinquior est sectioni quam BZ , & $\Delta\Lambda$ propinquior quam ZH , per ea quæ diximus in secundâ figurâ.

Οπὶ δὲ ἢ χαπαντῶν δ Z ἐφαπτομένης συμπίπτουσα τῇ $\Gamma\Lambda$ συμπίπτει καὶ τῇ τομῇ, ὅπως δὲ αὐτὰ.

At vero rectam, quæ convenit cum $A\Gamma$ infra eam quæ per Z ducta sectionem contingit, cum sectione ipsa convenire sic demonstrabitur.

Εφαπτόμενη ἢ EZ τῇ τομῇ κατὰ τὸ E , ἢ τῇ σύμπτωσις αὐτῇ τῇ $\Gamma\Lambda$ ἐξω ἀνώτερον δ ZH λέγω ὅτι ἐκβληθείσα συμπεσεῖ τῇ τομῇ. ἢ χαπαντῶν δὲ διὰ τῇ E ἀφίς τῇ ἀσύντλητος τῇ $\Gamma\Lambda$ ἀσύμπτωτος ἢ $E\Theta$. ἢ $E\Theta$ ἄρα κατὰ μόνον τὸ E συμπίπτει τῇ τομῇ. ἐπεὶ ἔν η $\Gamma\Lambda$ τῇ $E\Theta$ παράλληλος ἐστὶ καὶ τῇ $A\Gamma$ συμπίπτει ἢ ZH καὶ τῇ $E\Theta$ ἄρα συμπεσεῖται, ὡς καὶ τῇ τομῇ.




Contingat EZ sectionem in E , concurrat vero cum $\Gamma\Lambda$ supra ipsam ZH : dico ZH productam convenire cum sectione. ducatur enim per tactum E ipsi $\Gamma\Lambda$ asymptoto parallela $E\Theta$: ergo [per 13. 2. huj.] $E\Theta$ sectioni in unico puncto B occurrit. itaque quoniam $\Gamma\Lambda$ ipsi $E\Theta$ est parallela, & ZH convenit cum $A\Gamma$, etiam cum $E\Theta$ conveniat necesse est; quare & cum ipsa sectione.

Εἴπερ ὅστις εὐθύγραμμος γωνία περιέχουσα ἢ ὑπερβολὴν εἴτρε [τῇς ὑπὸ τῇ ἀσυνκτώσεως, ὅτι ἐκ ἐν ἐλάχιστον αὐτῇς.]

Si sit alius angulus rectilineus qui hyperbolam contineat, diversus ab angulo sub asymptotis contento, non minor erit eo.

Ἐξω ὑπερβολῆς ἀσύμπτωτοι αἰ $\Gamma\Lambda, \Lambda\Delta$, εἴτρεαι δὲ πῶς μὴ συμπίπτουσι τῇ τομῇ ἐξωσαν αἰ EZ ,

Sit hyperbola, cujus asymptoti $\Gamma\Lambda, \Lambda\Delta$; aliæ vero non occurrentes ei sint BZ, ZH : dico angu-



ZH λέγω ὅτι ἐκ ἐλάχιστον ἐστὶν ἢ περὶ τῇ Z γωνία δ πρὸς τῇ A . ἐξωσαν ἢ πρὸς αἰ EZ, ZH δ $\Gamma\Lambda, \Lambda\Delta$ παράλληλοι ἐκ ἐλάχιστον ἄρα ἐστὶν ἢ περὶ

lum ad Z non minorem esse angulo ad A . sint enim primum EZ, ZH ipsis $\Gamma\Lambda, \Lambda\Delta$ parallelæ: ergo angulus ad Z non est minor eo qui


qui ad A. si vero non sint parallelæ, ut in secunda figura, majorem esse angulum ad Z angulo $\Gamma A \Delta$ manifestum. In tertia figura, angulus $Z \Theta A$ [per 16. 1.] eo qui ad A major est; & qui ad Z æqualis est angulo $Z \Theta A$. denique in quarta figura, angulus qui ad verticem, major est angulo qui itidem ad verticem constituitur: quapropter angulus ad Z angulo ad A non minor erit.

PROP. XV. Theor.

Oppositarum sectionum asymptoti communes sunt.

SINT oppositæ sectiones, quarum diameter AB & centrum Γ : dico sectionum A, B asymptotos communes esse.

Ducantur per puncta A, B rectæ $\Delta A E$, $Z B H$, quæ sectiones contingant: parallelæ igitur sunt $\Delta A E$, $Z B H$. abscindantur ΔA , $A E$; $Z B$, $B H$, ita ut cujusque earum quadratum æquale sit quartæ parti figuræ quæ ad diametrum AB constituitur: ergo [per 14. 1. huj.] ΔA , $A E$; $Z B$, $B H$ inter se sunt æquales. jungantur $\Gamma \Delta$, ΓE , ΓZ , ΓH . perspicuum igitur est [per 14. 1.] $\Delta \Gamma$, ΓH in eadem esse recta; itemque $B \Gamma$, ΓZ ; propterea quod parallelæ sunt $\Delta A E$, $Z B H$. quoniam igitur [ex hyp.] hyperbola est cujus diameter AB, contingens autem ΔE ; & utraque ipsarum ΔA , $A E$ potest quartam partem figuræ quæ ad AB constituitur; erunt [per 1. 2. huj.] $\Delta \Gamma$, ΓE asymptoti: & eadem ratione ipsius B sectionis asymptoti erunt $Z \Gamma$, ΓH . oppositarum igitur sectionum asymptoti communes sunt.



ΠΡΟΤΑΣΙΣ κ'.

Τῶν ἀντικειμένων τομῶν κοινὰ εἰσι αἱ ἀσύμπτωτοι.

ΕΣΤΩΣΑΝ ἀντικείμεναι τομῆς, ὧν διάμετρος ἡ AB, κέντρον δὲ τὸ Γ . λέγω ὅτι τῶν A, B τομῶν κοινὰ εἰσι αἱ ἀσύμπτωτοι.

Ἡχθῶσιν διὰ τὰ A, B σημείων ἐφαπτόμεναι τὰ τομῶν αἱ $\Delta A E$, $Z B H$. ὁμοτέλειοι ἄρα εἰσιν. ἀπὸ λήψεως δὲ ἑκάστη τῶν ΔA , $A E$; $Z B$, $B H$ ἴσων διωκυμένη τῷ περὶ τὸ Γ ὀρθῶς τῶν AB ἑδῶς. ἴσων ἄρα αἱ ΔA , $A E$, $Z B$, $B H$. ἐπεζεύχθωσιν ἡ $\Gamma \Delta$, ΓE , ΓZ , ΓH . φανερόν δὲ ὅτι ἐπ' εὐθείας εἰσιν ἡ $\Delta \Gamma$ τῇ ΓH , καὶ ἡ ΓE τῇ $E Z$, διὰ τὴν ὁμοτέλειον.

ἐπεὶ ἡ ὑπερβολὴ ἐστὶν, ἥς ἀξίμετρος ἡ AB, ἐφαπτομένη δὲ ἡ ΔE , καὶ ἑκάστη τῶν ΔA , $A E$ διωκυμένη τὴν περὶ τὸ Γ ὀρθῶς τῶν AB ἑδῶς. ἀσύμπτωτοι ἄρα εἰσιν αἱ $\Delta \Gamma$, ΓE . ὁμοίως καὶ αὐτὰ δὲ καὶ τῇ B ἀσύμπτωτοι εἰσιν αἱ $Z \Gamma$, ΓH . τὰ ἀντικειμένων ἄρα κοινὰ εἰσι ἀσύμπτωτοι.

PROP. XVI. Theor.

Si in oppositis sectionibus quævis recta linea ducatur secans utramque rectarum continentium angulum qui deinceps est angulo sectiones continenti: cum utraque oppositarum in uno tantum puncto conveniet; & rectæ, quæ ex ipsa abscissæ inter asymptotos & sectiones interjiciuntur, æquales erunt.

SINT oppositæ sectiones A, B, quarum quidem centrum Γ , asymptoti vero $\Delta \Gamma H$, $E \Gamma Z$; & ducatur quævis recta ΘK , quæ utramque $\Delta \Gamma$, ΓZ secet: dico ΘK productam cum utraque sectione in uno tantum puncto convenire.

Quoniam enim sectionis A asymptoti sunt $\Delta \Gamma$, ΓE ; & ducta est quædam ΘK secans utramque continentium angulum $\Delta \Gamma Z$, qui deinceps est angulo sectionem continenti: producta

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ις'.


Εάν τις ἀντικειμέναις ἀχθῇ τις εὐθεῖα τέμνουσα ἑκάστην τῶν ἀντικειμένων τὴν ἐφεξῆς γωνίαν τῶν περὶ τὸν κοινὸν τομῶν σημείων συμπίπτει ἑκάτερα τῶν ἀντικειμένων καὶ εἰ μὴ σὲν σημείον, καὶ αἱ ἀπολαμβανόμεναι ἀπ' αὐτῆς ὑπὸ τῶν τομῶν τρεῖς αἱ ἀσύμπτωτοι ἴσων εἰσιν.

ΕΣΤΩΣΑΝ ἡ ἀντικείμεναι αἱ A, B, ὧν κέντρον μὲν τὸ Γ , ἀσύμπτωτοι αἱ $\Delta \Gamma H$, $E \Gamma Z$, καὶ ἡχθῶ τις εὐθεῖα τέμνουσα ἑκάστην τῶν $\Delta \Gamma$, ΓZ ἡ ΘK . λέγω ὅτι ἐκβαλλομένη συμπίπτει ἑκάτερα τῶν τομῶν καὶ εἰ σὲν σημείον μόνον.

Ἐπεὶ ἡ Δ τομῆς ἀσύμπτωτοι εἰσιν αἱ $\Delta \Gamma$, ΓE , καὶ διήκῃ τις εὐθεῖα ἡ ΘK τέμνει ἑκάτερα τῶν περὶ τὸν κοινὸν τομῶν σημείων τὴν ἐφεξῆς γωνίαν τῶν $\Delta \Gamma Z$. ἡ

KΘ

ΚΘ ἄρα ἰσὼσιν ἀλλήλους
 συμπεσεῖν) τῇ τομῇ τῇ Α,
 ὁμοίως δὴ καὶ τῇ Β. συμ-
 πτῖνται κατὰ τὰ Α, Μ,
 καὶ ἡχοῦ διὰ τῶν Γ τῇ Α Μ
 ὡς ἡ ἀλλήλους ἡ Α Γ Β· ἴσων
 ἄρα ἐπὶ τὸ μὲν ὑπὸ Κ Λ Θ
 τῶν δὲ Α Γ, τὸ δὲ ὑπὸ
 Θ Μ Κ τῶν δὲ Γ Β· ὥστε
 τὸ ὑπὸ τῶν Κ Λ Θ ὡς
 ἡχοῦ ὁρθογώνιον ἴσων ἔς
 ἡ Λ Θ ἄρα τῇ Κ Μ ἴση.




$\angle \Theta$ [per 11.2. huj.] cum
 sectione A conveniet, &
 similiter cum sectione B
 conveniat in punctis Λ ,
 M , & per Γ ipsi ΛM pa-
 rallela ducatur $\Lambda \Gamma B$: æ-
 quale igitur est [per 11.
 2. hujus] rectangulum
 $\angle \Lambda \Theta$ quadrato ex $\Lambda \Gamma$;
 & rectangulum $\Theta M \angle$
 quadrato ex ΓB : quare
 & $\angle \Lambda \Theta$ rectangulum
 $M \angle$; & idcirco $\Lambda \Theta$ ipsi

ΠΡΟΤΑΣΙΣ 12.

Τῷ κατὰ σύζυγόν ἀποκειμένον καινὰ εἰσι αἱ
ἀσύνκλιτοι.

ΕΣΤΩΣΑΝ συζυγῆς ἀντικείμεναι, ὥν αἱ διά-
μετροι συζυγῆς αἱ ΑΒ, ΓΔ, κέντρων δὲ τὸ
Ε· λέγω ὅτι κοινὰ αὐτῶν εἰσιν αἱ ἀσύμμελτοι.

Ηχθωσαν γὰρ ἐφαπτόμεναι ἑ τῶν $\Delta\lambda\theta$ τῶν Λ, B ,
 Γ, Δ σημείων αἱ $\text{ZAH}, \text{H}\Delta\Theta, \Theta\text{BK}, \text{K}\Gamma\text{Z}$ · πα-
 ραλληλόγραμμοι ἄρα εἰς τὸ $\text{ZH}\Theta\text{K}$. ἐπιζεύχθα-
 σαι ἔν αἱ $\text{ZE}\Theta, \text{KEH}$
 εὐθείαι ἄρα εἰσὶ καὶ διά-
 μετροι τοῦ ὠρθογώνιο-
 γραμμοῦ, καὶ διχα πέ-
 μνονται πᾶσαι κατὰ τὸ E
 σημεῖον. καὶ ἐπεὶ * τὸ πρὸς
 τῇ AB εἶδος ἴσιν ἐς τὴν
 διὰ τὸ $\Gamma\Delta$ περὶ αὐτῶν,
 ἴση δὲ ἡ ΓE τῇ $\text{B}\Delta$ · ἕκα-
 στεν ἄρα τὸ διὰ τὸ $\text{ZA}, \text{AH},$
 $\text{KB}, \text{B}\Theta$ τέταρτον ἐστὶ τῷ
 πρὸς τῇ AB εἶδους· ἀ-
 σύμπτωτοι ἄρα εἰσὶ τῶν Λ, B τῶν $\text{ZE}\Theta, \text{KEH}$.
 ὁμοίως δὲ δεῖξομεν ὅτι καὶ τῶν Γ, Δ τῶν αὐτῶν
 εἰσιν ἀσύμπτωτοι. τῶν ἄρα κατὰ συζυγίαν ἀντιει-
 μένων κεινὰ εἰσιν ἀσύμπτωτοι.




SINT oppositæ sectiones quæ conjugatæ appellatur, quarum diametri conjugatæ AB , $\Gamma\Delta$, & centrum E : dico earum asymptotos communes esse.

ΔH ; $K B$, $B \Theta$ erit [per 4.2.] quarta pars figuræ
 quæ constituitur ad $A B$: ergo [per 1. 2. huj.]
 $Z E \Theta$, $K E H$ sectionum A , B asymptoti sunt. simi-
 liter demonstrabimus sectionum Γ , Δ easdem esse
 asymptotos. oppositarum igitur sectionum, quas
 conjugatas dicimus, asymptoti communes sunt.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ m'.


Εὰν μὲν τῶν κατὰ σύζυγαν ἀνταμείβων συμ-
πίπτουσα εὐθεῖα ἐβαλ-
λομένη ἐφ' ἑκάτερα ἐκ-
τὸς πίπτῃ τ' ἰσότης συμ-
ποσῇ ἑκάτερα τ' ἐφε-
ξῆς τομῶν καὶ εἴ μὲν
τοὶ σημείωσι.

ΕΣΤΩΣΑΝ κατὰ
 συζυγίας ἀντικείμε-
 ναι τῶν αἱ Α, Β, Γ, Δ,
 καὶ τῇ Γ πρὸς εὐθύνῃ συμπεπίετω ἡ ΕΖ, ἢ ἐκβαλλο-
 μένῃ ἐφ' ἐκάστην ἐκτὸς πεπλίετω τ' ὁμοῦ λέγω



PROP. XVIII. *Theor.*

Si uni oppositarum sectionum conjugatarum conveniat recta linea, quæ producta ad utraq; partes extra sectionem cadat: cum utraque sectionum, quæ deinceps sunt, in uno tantum puncto conveniet.



SINT oppositæ sectiones, quæ conjugatæ dicuntur A, B, Γ, Δ ; & quævis EZ , quæ producta a sectionem cadat: dico

* Ex def. sect. conjugat. ad prop. ult. lib. I.

EZ cum utraque sectione A, B convenire in uno tantum puncto.


Sint enim HΘ, ΚΑ sectionum asymptoti: ergo EZ [per 3. 2. huj.] secabit utramque HΘ, ΚΑ. patet igitur [per 16. 2. huj.] quod cum sectionibus A, B in uno tantum puncto conveniet.

PROP. XIX. Theor.

Si in oppositis sectionibus, quæ conjugatæ appellantur, ducatur recta linea, quamvis ipsarum contingens: cum sectionibus, quæ deinceps sunt, conveniet; & ad tactum bifariam secabitur.

Sint oppositæ sectiones, quæ conjugatæ dicuntur, A, B, Γ, Δ; & sectionem Γ contingat recta quævis ΓΕΖ: dico EZ productam convenire cum sectionibus A, B; & ad punctum Γ bifariam secari.

Nam quod ipsa quidem conveniet cum sectionibus A, B [ex præc.] patet. conveniat in punctis H, Θ: dico ΓΗ ipsi ΓΘ esse æqualem. ducantur enim sectionum asymptoti ΚΑ, ΜΝ: æquales igitur sunt [per 17. 2. huj.] ΕΗ, ΖΘ, itemque [per 3. 2. huj.] ΓΕ, ΓΖ: ergo tota ΓΗ toti ΓΘ æqualis erit.



ὅτι συμπεσῶται ἐκάτερα τῇ Α, Β τομῶν καὶ ἐν μίᾳ σημείῳ.

Ἐσώσων γὰρ ἀσύμπτωτοι τῇ τομῶν αἱ ΗΘ, ΚΑ. ὥστε ἡ ΕΖ συμπίπτει ἐκάτερα τῇ ΗΘ, ΚΑ. φανερόν ὅτι καὶ τῆς Α, Β τομῶν συμπεσῶται καὶ ἐν μίᾳ σημείῳ.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΘ'.

Εὰν τῇ χτ' συζυγίαν ἀντακείμενη ἀχθῇ τις εὐθεῖα ὁποιαύνησιν ἢ ἐτυχε τῇ τομῶν συμπεσῶται ταῖς ἐφεξῆς τομῶν, καὶ δίχα τμηθῇ κατὰ τὴν ἀφίω.

ΕΣΤΩΣΑΝ κατὰ συζυγίαν ἀντακείμεναι αἱ Α, Β, Γ, Δ, καὶ τῇ Γ ἐφαπτόμενη τις εὐθεῖα ἡ ΓΕΖ: λέγω ὅτι ἐκβαλλομένη συμπεσῶται τῆς Α, Β τομῶν, καὶ δίχα τμηθῇ κατὰ τὸ Γ.

Οτι μὲν ἐν συμπεσῶται τῇ Α, Β τομῶν, φανερόν. συμπίπτει κατὰ τὰ Η, Θ: λέγω ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΓΗ τῇ ΓΘ. ἤχθωσαν γὰρ αἱ ἀσύμπτωτοι τῇ τομῶν αἱ ΚΑ, ΜΝ: ἴση ἄρα ἡ ΕΗ τῇ ΖΘ, καὶ ἡ ΓΕ τῇ ΓΖ ἴση: καὶ ὅλη ἄρα ἡ ΓΗ ὅλη τῇ ΓΘ ἐστὶν ἴση.

PROP. XX. Theor.

Si unam oppositarum sectionum, quæ conjugatæ appellantur, recta linea contingat, & per ipsarum centrum ducantur duæ rectæ, una quidem per tactum, altera vero contingenti parallela, quousque occurrat uni earum sectionum quæ deinceps sunt: quæ in occurſu earum sectionem contingit, parallela erit rectæ per priorem tactum & centrum ductæ; quæ vero per tactus & centrum ducuntur oppositarum sectionum conjugatæ diametri erunt.

Sint oppositæ sectiones, quæ conjugatæ appellantur, quarum diametri conjugatæ sint ΑΒ, ΓΔ, ac centrum Χ; & sectionem Α contingat recta ΕΖ, quæ producta conveniat cum ΓΔ in Τ, & juncta recta ΕΧ ad Χ producat; & per Χ ducatur ipsi ΕΖ parallela recta ΧΗ quæ producat ad Ο, & in Η contingat sectionem recta ΘΗ: dico quod contingens ΘΗ diametro ΧΕ parallela est, quodque rectæ ΗΟ, ΒΕ conjugatæ diametri sunt.

Applicentur enim ordinatim ΕΚ, ΗΑ, ΓΡΠ; illæ vero juxta quas possunt applicatæ, sint ΑΜ, ΓΝ. quoniam igitur ut ΒΑ ad ΑΜ ita est

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κ'.

Εὰν μιᾶς τῇ κατὰ συζυγίαν ἀντακείμενη εὐθεῖα ἐφαπτόται, καὶ ἀφ' ἧς κέντρον αὐτῆς ἀχθῶσι δύο εὐθεῖαι, ὅτι ἡ μὲν ἀφ' ἧς ἐφαπτόμενη, ὥστε ὅτι συμπίπτει μιᾶς τῇ ἐφεξῆς τομῶν. ἡ χτ' ὅτι σύμπτωση ἐφαπτομένη τῇ τομῶν εὐθεῖα ὁποιαύνησιν ἢ ἐτυχε τῇ ἀφ' ἧς καὶ κέντρον ἡγεμένη αἱ δὲ ἀφ' ἧς τῇ ἀφ' ἧς καὶ κέντρον συζυγίαι ἴσονται ἀφ' ἧς μετρεῖται τῶν ἀντακείμενων.

ΕΣΤΩΣΑΝ κατὰ συζυγίαν ἀντακείμεναι, ὅτι ἀφ' ἧς συζυγίαι αἱ ΑΒ, ΓΔ, κέντρον δὲ Χ, ἐτὶ Α τομῆς ἡχθῶ ἐφαπτομένη ἡ ΕΖ, καὶ ἐκβαλλομένη συμπίπτει τῇ ΓΔ κατὰ Τ, ἐπεξεύχθω ἡ ΕΧ καὶ ἐκτελέσθω ὅτι τὸ Ε, ἐτὶ ἀφ' ἧς Χ τῇ ΕΖ ὁποιαύνησιν ἢ ἐτυχε ἡ ΧΗ καὶ ἐκτελέσθω ὅτι τὸ Ο, καὶ διὰ τῆς Η ἐφαπτομένη τῇ τομῆς ἡχθῶ ἡ ΘΗ: λέγω ὅτι παραλλήλος ἐστὶν ἡ ΘΗ τῇ ΕΧ, αἱ δὲ ΗΟ, ΕΕ συζυγίαι εἰσι διαμέτρους.

Ἠχθῶσαν γὰρ παραγόμεναι αἱ ΕΚ, ΗΑ, ΓΡΠ: παρ' αἷς δὲ διώκοντες αἱ κατὰ γόμεναι ἔσωσαν αἱ ΑΜ, ΓΝ. ἐπεὶ ὅτι ἐστὶν ὡς ἡ ΒΑ πρὸς ΑΜ ὅτως ἡ ΝΓ

* ΝΓ πρὸς ΓΔ, ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΒΑ πρὸς ΑΜ ἕ-
τως τὸ ὑπὸ ΧΚΖ πρὸς τὸ δὸτὸ ΚΕ, ὡς δὲ ἡ ΝΓ
πρὸς ΓΔ ἕτως τὸ δὸτὸ ΗΛ πρὸς τὸ ὑπὸ ΧΛΘ.
καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ ΧΚΖ πρὸς τὸ δὸτὸ ΕΚ
ἕτως τὸ δὸτὸ ΗΛ πρὸς τὸ ὑπὸ ΧΛΘ. ἀλλὰ
τὸ μὲν ὑπὸ ΧΚΖ πρὸς τὸ δὸτὸ ΚΕ τὸν συγ-
κεῖμνον ἔχει λόγον ἐκ τῆς τῆς ΧΚ πρὸς ΚΕ
καὶ τῆς ΖΚ πρὸς ΚΕ, τὸ δὲ δὸτὸ ΗΛ πρὸς
τὸ ὑπὸ ΧΛΘ τὸν συγκεῖμνον ἔχει λόγον ἐκ
τῆς ὅν ἔχει ἡ ΗΛ πρὸς ΛΧ καὶ ἡ ΗΛ πρὸς ΛΘ.
ὁ ἄρα συγκεῖμνος λόγος, ἐκ τῆς τῆς ΧΚ πρὸς
ΚΕ καὶ τῆς ΖΚ πρὸς ΚΕ, ὁ αὐτός ἐστι
τῷ συγκεῖμνῳ λόγῳ ἐκ τῆς τῆς ΗΛ πρὸς ΛΧ
καὶ τῆς ΗΛ πρὸς ΛΘ, ὡν ὁ τῆς ΖΚ πρὸς
ΚΕ λόγος ὁ αὐτός ἐστι τῷ τῆς ΗΛ πρὸς ΛΧ
λόγῳ, ἐκαστὴ γὰρ τῶν ΕΚ, ΚΖ, ΖΕ ἐκαστὴ τῶν
ΧΛ, ΛΗ, ΗΧ ὡς ἀλλήλους ἐστὶ λοιπὸς ἄρα ὁ
τῆς ΧΚ πρὸς ΚΕ λόγος ὁ αὐτός ἐστι τῷ τῆς
ΗΛ πρὸς ΛΘ, καὶ περὶ ἴσους γωνίας τὰς πρὸς
πῶς Κ, Λ ἀνάλογον εἶναι αἱ πλάται' ὅμοιον ἄρα
ἐστὶν τὸ ΕΚΧ τρίγωνον τῷ ΗΘΛ, καὶ ἴσους εἶναι
πῶς γωνίας ὑφ' αἷ
αἱ ὁμόλογοι πλάται'
ὑποτένυσσι' ἴση ἄρα
ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΕΚΧ τῇ
ὑπὸ ΛΗΘ. ἐστὶ δὲ
καὶ ὅλη ἡ ὑπὸ ΚΧΗ
τῇ ὑπὸ ΛΗΧ ἴση.
καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ
ΕΧΗ τῇ ὑπὸ ΘΗΧ
ἐστὶν ἴση ὡς ἀλλήλους
ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΚΧ τῇ ΗΘ

Πεπιπύδω δὲ ὡς
ἡ ΠΗ πρὸς τὴν ΗΡ
ἕτως ἡ ΘΗ πρὸς Σ.
ἡ Σ ἄρα ἡμίση ἐστὶ τῇ παρ' ἣν διώαν' ὅτι τὴν ΗΘ
διάμετρον καταγόμεναι ἐν Γ, Δ τομῆς. Ἐπεὶ
τὸ Α, Β τομῶν δὲ πέρα διάμετρος ἐστὶν ἡ ΓΔ, καὶ συμ-
πίπτει αὐτῇ ἡ ΕΤ. τὸ ἄρα ὑπὸ τῇ ΤΧ καὶ τῇ ΕΚ ἴσον
ἐστὶ τῷ δὸτὸ ΓΧ. (εἰαν γὰρ δὸτὸ ΕΤ τῇ ΚΧ ὡς ἀλλή-
λων ἀγωμένῃ πῖνα, τὸ ὑπὸ τῆς ΤΧ καὶ τῆς δὸτὸ
λαμβανόμενης ὑπὸ τῇ ὡς ἀλλήλους πρὸς τὸ Χ, ἴσον
ἐστὶ τῷ δὸτὸ ΓΧ) διὰ δὲ τὸ ἐστὶν ὡς ἡ ΤΧ πρὸς
ΕΚ ἕτως τὸ δὸτὸ ΤΧ πρὸς τὸ δὸτὸ ΧΓ. ἀλλ' ὡς
μὲν ἡ ΤΧ πρὸς ΕΚ ἕτως ἡ ΤΖ πρὸς ΖΕ, τὰ τε
τὸ ΤΧΖ τρίγωνον πρὸς τὸ ΕΖΧ τρίγωνον, ὡς δὲ
τὸ δὸτὸ ΤΧ πρὸς τὸ δὸτὸ ΧΓ ἕτω τὸ ΤΧΖ τρίγω-
νον πρὸς τὸ ΧΓΠ, τὰ τε πρὸς τὸ ΗΘΧ. ὡς
ἄρα τὸ ΤΧΖ πρὸς τὸ ΕΖΧ ἕτως τὸ ΤΧΖ πρὸς
τὸ ΗΘΧ. ἴσον ἄρα τὸ ΗΘΧ τρίγωνον τῷ ΕΧΖ.
ἔχ' ὅτι ἔτ' ὑπὸ ΘΗΧ γωνίαν τῇ ΧΕΖ γωνίᾳ ἴσην,
ὡς ἀλλήλους γὰρ ἐστὶν ἡ μὲν ΕΧ τῇ ΗΘ, ἡ δὲ ΕΖ τῇ
ΗΧ. ἀντιπεπύδωσι ἄρα αἱ πλάται' αἱ περὶ πῶς
ἴσους γωνίας. ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ ΗΘ πρὸς τὴν ΕΧ
ἕτως ἡ ΕΖ πρὸς τὴν ΗΧ. ἴσον ἄρα τὸ ὑπὸ ΘΗΧ τῷ
ὑπὸ ΧΕΖ. Ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ Σ πρὸς τὴν ΘΗ ἕτως ἡ

* ΝΓ ad ΓΔ; & [per 37. 1. huj.] ut ΒΑ ad
ΑΜ ita rectangulum ΧΚΖ ad quadratum ex ΚΕ,
ut vero ΝΓ ad ΓΔ ita quadratum ex ΗΛ ad rect-
angulum ΧΛΘ: erit [per 11.5.] ut rectangulum
ΧΚΖ ad quadratum ex ΕΚ ita quadratum ex ΗΛ
ad rectangulum ΧΛΘ. sed [per 23.6.] rectangu-
lum ΧΚΖ ad quadratum ex ΚΒ rationem compo-
sitam habet ex ratione ΧΚ ad ΚΕ & ex ratione
ΖΚ ad ΚΕ, quadratum vero ex ΗΛ ad rectangu-
lum ΧΛΘ rationem habet compositam ex ratio-
ne ΗΛ ad ΛΧ & ratione ΗΛ ad ΛΘ: ratio igitur
composita ex ratione ΧΚ ad ΚΒ & ratione
ΖΚ ad ΚΒ eadem est cum illa quæ componitur ex
ratione ΗΛ ad ΛΧ & ratione ΗΛ ad ΛΘ; qua-
rum quidem ratio ΖΚ ad ΚΒ eadem est [per 4.6.]
quæ ΗΛ ad ΛΧ: ipsæ enim ΕΚ, ΚΖ, ΖΕ paral-
læ sunt ipsis ΧΛ, ΛΗ, ΗΧ respective: reliqua igitur
ratio ΧΚ ad ΚΒ eadem erit cum reliqua ΗΛ
ad ΛΘ; & latera sunt proportionalia circa æqua-
les angulos qui ad Κ, Λ; triangulum igitur ΕΚΧ
[per 6.6.] simile erit triangulo ΗΘΛ, & æquales
habebit angulos sub quibus homologa latera sub-
tenduntur: ergo æqualis est angulus ΕΚΧ angulo
ΛΗΘ. est autem [per 29.1.] & totus ΚΧΗ æ-

qualis toti ΛΗΧ:
quare reliquus ΒΧΗ
reliquo ΘΗΧ est æ-
qualis; ac propterea
[per 28. 1.] ΕΧ ipsi
ΗΘ parallela est.

Fiat ut ΠΗ ad ΗΡ
ita ΘΗ ad lineam Σ:
erit igitur [per 51. 1.
huj.] Σ dimidia ejus
juxta quam possunt
quæ ad diametrum
ΗΘ applicantur in
sectionibus Γ, Δ &
quoniam sectionum
Α, Β secunda diame-


ter est ΓΔ, & cum ea convenit ipsa ΒΤ: rectan-
gulum igitur sub ΤΧ & ΚΒ æquale erit [per 38. 1.
huj.] quadrato ex ΓΧ: (si enim à puncto Β ipsi
ΚΧ parallelam duxerimus: rectangulum, quod fit
sub ΤΧ & recta quæ inter Χ & parallelam in-
terjicitur, quadrato ex ΓΧ æquale erit) quare
[per 17. & 20. 6.] ut ΤΧ ad ΕΚ ita qua-
dratum ex ΤΧ ad quadratum ex ΧΓ. ut au-
tem ΤΧ ad ΕΚ ita [per 4. 6.] ΤΖ ad ΖΒ, hoc
est [per 1. 6.] triangulum ΤΧΖ ad triangulum
ΕΖΧ; & ut quadratum ΤΧ ad quadratum ΧΓ
ita [per 19. & 20. 6.] triangulum ΤΧΖ ad tri-
angulum ΧΓΠ, hoc est [per 43. 1. huj.] ad tri-
angulum ΗΘΧ: ut igitur triangulum ΤΧΖ ad
triangulum ΒΖΧ ita ΤΧΖ triangulum ad trian-
gulum ΗΘΧ; & ideo [per 9. 5.] triangulum
ΗΘΧ æquale est triangulo ΕΧΖ. habet autem
& angulum ΘΗΧ angulo ΧΕΖ [per 29. 1.] æ-
qualem, quia ΒΧ parallela est ipsi ΗΘ, &
ΕΖ ipsi ΗΧ; ergo [per 15. 6.] latera circa
æquales angulos sunt reciproce proportionalia;
est igitur ut ΗΘ ad ΕΧ ita ΕΖ ad ΗΧ: rectangu-
lum igitur ΘΗΧ [per 16. 6.] æquale est rectan-
gulo ΧΒΖ. & quoniam est ut Σ ad ΘΗ ita

* Nam ΝΓ : ΒΑ :: ΒΑ : ΓΔ. & ΒΑ : ΓΔ :: ΓΔ : ΑΜ.
H h

PH

PH ad HΠ, & ut PH ad HΠ ita [per 4.6.] XE ad BZ; parallelæ enim sunt: quare ut Σ ad ΘH ita XE ad BZ. ut autem Σ ad ΘH, sumptâ XH communi altitudine, ita est [per 1.6.] rectangulum sub Σ & XH ad rectangulum ΘHX: & ut XE ad BZ ita quadratum ex XE ad rectangulum XEZ: est igitur ut rectangulum sub Σ & XH ad rectangulum ΘHX ita XB quadratum ad rectangulum XEZ: & permutando ut rectangulum sub Σ & XH ad quadratum ex BX ita rectangulum ΘHX ad rectangulum XEZ. sed [ut modo ostensum] æquale est rectangulum ΘHX rectangulo XEZ: ergo rectangulum ex Σ & XH æquale est quadrato ex BX. & rectangulum ex Σ ad XH quarta pars est figuræ quæ ad HO constituitur;

nam & XH [per 30. 1. huj.] est dimidia ipsius HO, & [ex modo ostensis] Σ dimidia ejus juxta quam possunt; quadratum vero ex BX quarta pars est quadrati ex BZ, nam [per 30. 1. huj.] BX æqualis est XZ: ergo quadratum ex EZ æquale est figuræ ad HO constitutæ. similiter demonstrabimus & quadratum ex HO figuræ factæ ad BZ esse æquale: BZ, HO igitur sectionum oppositarum A, B, Γ, Δ diametri conjugatæ sunt.



PH πρὸς ΗΠ καὶ ἡ ΧΕ πρὸς ΕΖ, ἀλλήλοισι γὰρ καὶ ὡς ἄρα ἡ Σ πρὸς τὴν ΘΗ ἕτως ἡ ΧΕ πρὸς ΕΖ. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ Σ πρὸς ΘΗ, τῆς ΧΗ κοινῆ ὑψὺς λαμβανομένης, ἕτως τὸ ὑπὸ Σ, ΧΗ πρὸς τὸ ὑπὸ ΘΗΧ· ὡς δὲ ἡ ΧΕ πρὸς ΕΖ ἕτως τὸ δὸτὸ ΧΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΧΕΖ· καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ Σ, ΧΗ πρὸς τὸ ὑπὸ ΘΗΧ ἕτως τὸ δὸτὸ ΧΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΧΕΖ, καὶ ἀλλήλοισι ὡς τὸ ὑπὸ Σ, ΧΗ πρὸς τὸ δὸτὸ ΕΧ ἕτως τὸ ὑπὸ ΘΗΧ πρὸς τὸ ὑπὸ ΧΕΖ. ἴση δὲ τὸ ὑπὸ ΘΗΧ τῷ ὑπὸ ΧΕΖ· ἴση ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ Σ, ΧΗ τῷ δὸτὸ ΕΧ. καὶ ἐστὶ τὸ μὲν ὑπὸ Σ, ΧΗ τέταρτον τῆς ὅλης τῆς ΗΟ ἑξῆς, ἥτις γὰρ

ΗΧ τῆς ΗΟ ἐστὶν ἡμίση, καὶ ἡ Σ τῆς περὶ ἡν διώκεται ἡμίση· τὸ δὲ δὸτὸ ΕΧ τέταρτον τῆς δὸτὸ τῆς ΕΖ, ἴση γὰρ ἡ ΕΧ τῇ ΧΖ· τὸ ἄρα δὸτὸ τῆς ΕΖ ἴση ἐστὶν τῷ πρὸς τῇ ΗΟ ἑξῆς. ὁμοίως δὲ δεῖξομεν ὅτι καὶ ΗΟ διώκεται τὸ ὅλον τῆς ΕΖ ἑξῆς· αἱ ἄρα ΕΖ, ΗΟ συζυγεῖς εἰσι διαμέτρους τῶν Α, Β, Γ, Δ ἀντικείμενων.

PROP. XXI. Theor.


Iisdem positis, ostendendum est punctum in quo contingentes rectæ conveniant, ad unam asymptoton esse.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κα'.

Τῶν αὐτῶν ἀντικείμενων, δεκάτις ὅτι ἡ σύμπτωσις τῶν ἐκαστοῦ πρὸς μίαν τὴν ἀσύμπτωτον ἐστίν.

SINT oppositæ sectiones conjugatæ A, B, Γ, Δ, & earum diametri AB, ΓΔ: ducanturque contingentes AE, ΕΓ: dico punctum E ad asymptoton esse.

Est enim [ex def. sect. conjug.] quadratum ex ΓX æquale quartæ parti figuræ quæ ad AB constituitur; quadrato autem ex ΓX æquale est [per 33. 1.] quadratum ex AB: ergo quadratum ex AB quartæ parti dictæ figuræ erit æquale. jungatur BX: asymptotos igitur [per 1.2. huj.] est BX: punctum igitur E ad ipsam asymptoton est.



ΕΣΤΩΣΑΝ κατὰ συζυγίαν ἀντικείμεναι αἱ τμήται, ὧν αἱ διαμέτρους αἱ ΑΒ, ΓΔ, καὶ ἐφαπτόμεναι ἡχθώσιν αἱ ΑΕ, ΕΓ· λέγω ὅτι τὸ Ε σημεῖον πρὸς τὴν ἀσύμπτωτον ἐστίν.

Ἐπεὶ γὰρ τὸ δὸτὸ ΓΧ ἴση ἐστὶν τετάρτῳ τῷ πρὸς τῇ ΑΒ εἶδει, τῷ δὲ δὸτὸ ΓΧ ἴση ἐστὶν τὸ δὸτὸ ΑΕ· ἔ τὸ δὸτὸ ΑΕ ἄρα ἴση ἐστὶν τῷ τετάρτῳ μέρει τῆς πρὸς τῇ ΑΒ εἶδος. ἐπιζεύχθω ἡ ΕΧ· ἀσύμπτωτος ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΧ· τὸ ἄρα Ε σημεῖον πρὸς τὴν ἀσύμπτωτον ἐστίν.

PROP. XXII. Theor.

Si in oppositis sectionibus, quæ conjugatæ appellantur, ex centro ad quamvis sectionum ducatur recta linea;

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κα'.


Εὰν ἐν ταῖς κατὰ συζυγίαν ἀντικείμεναις ἐκ τῆς κέντρους εὐθείας ἀχθῇ πρὸς ὅποιανδήποτε τμήται,

καὶ αὕτη παράλληλος ἀχρῇ συμπύκνουσα
 μᾶ τ' ἐφείξῃς τομῶν ἔ τᾷς ἀσυμπλώτοις· τὸ
 ἀξείραδμοι ὑπὸ τ' ἰ ἀχρῆσις τμημά-
 τει, γινομένη μεταξὺ ἰ τομῆς ἔ τ' ἀσυμπλώ-
 τει, ἴσοι ὅτ' ἐκ ἑκέντου τῆς α-
 γώνφ.

& huic parallela altera ducatur, quæ cum una ex sectionibus quæ deinceps sunt & cum asymptotis conveniat: rectangulum contentum sub ductæ segmentis, inter sectionem & asymptotos interjectis, quadrato rectæ ex centro ductæ æquale erit.

ΕΣΤΩΣΑΝ κατὰ σύζυγίαν ἀντικείμενα το-
μῶν αἱ ΑΒΓΔ, αὐσμήπτωται ᾧ τ̄ τομῶν ἔσω-
σαι αἱ ΕΧΖ, ΗΧΘ, καὶ ἀπὸ ἑκέντρων Χ διήχθω τις
ὠθεῖα ἡ ΧΓΔ, ἥ παραλ-
ληλος αὐτῇ ἡΧΘα τέ-
μνειται πάλιν τὴν ἐφεξῆς το-
μὴν καὶ πᾶς αὐσμήπτωτος
ἡ ΘΕ· λέγω ὅτι τὸ ὑπὸ
ΕΚΘ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ ΓΧ.

Τετμήσθω διῆχα ἡ ΚΛ
 κατὰ τὸ Μ, καὶ ἐπιζυχθεῖ-
 σαι ἡ ΜΧ ἐκτεταλῆσθω
 διάμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΒ
 ᾧ Α, Β σημείων. καὶ ἐπεὶ ἡ
 κατὰ τὸ Α ἐφαπτομένη ὡς ἀλλήλως ἐπὶ τῇ ΕΘ· ἡ
 ἄρα ΕΘ ὅτι τὴν ΑΒ πεπαγμύτως ἐστὶ κατηγμύνη,
 καὶ κέντρον τὸ Χ· αἱ ΑΒ, ΓΔ ἄρα συζυγεῖς ἐπὶ διά-
 μετροι· τὰ ἄρα διὰ ΓΧ ἴσιν ἐπὶ τῷ πεπάρτῳ ᾧ ὡς ἀ-
 πλὴν ΑΒ εἶδως. τῷ δὲ πεπάρτῳ μέρει ᾧ ὡς ἀπὸ
 ΑΒ εἶδως ἴσιν ἐπὶ τὸ ὑπὸ ΘΚΕ· Ἐπὶ τὸ ὑπὸ ΘΚΕ
 ἄρα ἴσιν ἐπὶ τῷ διὰ ΓΧ.



SINT oppositæ sectiones, quæ conjugatæ ap-
pellantur, A, B, Γ, Δ, quarum asymptoti E X Z,
H X Θ, & ex centro X ducatur quævis recta X Γ Δ,
eique parallela B K Λ Θ,
quæ & sectionem quæ
deinceps est & asym-
ptotos secet : dico recti-
angulum E K Θ quadrato
ex Γ X æquale esse.

Secetur KA bifariam
in M & juncta MX pro-
ducatur : diameter itaq[ue]
est [per cor. 5 I. I. huj.]
AB ipsarum A, B sectio-
num. & quoniam [per
5. 2. huj.] recta, quæ in
puncto A sectionem contingit, parallela est ipsi
EO: erit EO ad diametrum AB ordinatim ap-
plicata. centrum autem est X: ergo [per 20. 2.
huj.] AB, ΓΔ conjugatæ sunt diametri: est igitur
quadratum ex ΓX æquale quartæ parti figuræ
quæ ad AB constituitur. sed [per 10. 2. huj.]
quartæ parti figuræ ad AB æquale est rectangu-
lum OKE: rectangulum igitur OKE quadrato
ex ΓX æquale erit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ $\kappa\gamma'$.


Εάν ἐν ταῖς χεῖρσι συζηταίη ἀπακρινόμενος ὁ καὶ κεί-
 τευ εὐδυνά τις ἀχθῇ πρὸς ὅποιαν ᾧ τῷ τομῶν,
 καὶ ζωὴ παρὰ ἄλλῳ ἀχθῇ συμπίπτουσα ταῖς
 ἐφεξῆς τρεσὶ τομῶν· τὸ ἀεμαχόμενοι ἔσονται τῷ
 καὶ ἀχθείσκει τμημάτω, τῷ γνωδρῶν μεταξὺ τῷ
 τρεσὶ τομῶν, διπλασίον ὅτι ὁ καὶ τὸ ἐκ τῷ
 κέντρῳ τετραγώνου.

PROP. XXIII. Theor.

Si in oppositis sectionibus, quæ conjugatæ appellantur, ex centro ducatur quævis recta linea ad quamvis sectionum; & huic parallela ducatur, quæ cum tribus, quæ deinceps sunt, sectionibus conveniat: rectangulum contentum sub segmentis ductæ inter tres sectiones interjectis, duplum erit quadrati ejus quæ ex centro.

ΕΣΤΩΣΑΝ κατὰ συζυγίαν ἀντικείμενα τομυαὶ Α, Β, Γ, Δ, κέντρον δὲ τῶν τομῶν ἔσω τὸ Χ, καὶ διὰ Χ παρὸς ὅποιαν-
 ἑν τῶν τομῶν περιπατήτω
 εὐθεῖα ἡ ΓΧ, καὶ τῇ ΓΧ
 ὡς ἀλλήλος ἡχθῶ πεί-
 μνασαι πὰς ἐφεξῆς τρεῖς
 τομὰς ἡ ΚΛ· λέγω ὅτι
 τὸ ὑπὸ ΚΜΔ διπλα-
 σίον ἐστὶ διὰ ΓΧ.

$\text{Η} \chi \theta \omega \sigma \alpha \nu \alpha \nu \mu \pi \omega$
 $\tau \iota \tau \pi \mu \omega \nu \alpha \iota \epsilon \zeta, \text{Η} \Theta$
 $\tau \circ \alpha \rho \alpha \delta \omega \tau \circ \Gamma \chi \iota \sigma \alpha \nu \epsilon \varsigma \iota$
 $\epsilon \kappa \alpha \pi \tau \rho \omega \tau \circ \pi \alpha \nu \Theta \text{ΜΕ}, \Theta \text{ΚΕ}.$ * $\tau \circ \gamma \circ \pi \alpha \nu \Theta \text{ΜΕ},$
 $\mu \gamma \circ \tau \circ \pi \alpha \nu \Theta \text{ΚΕ} \iota \sigma \alpha \nu \epsilon \varsigma \iota \tau \omega \pi \alpha \nu \Lambda \text{ΜΚ}, \alpha \rho \alpha \tau \circ$



SINT oppositæ sectiones, quæ conjugatæ ap-
pellantur, A, B, Γ, Δ, quarum centrum sit X,
& à puncto X ad quam-
vis sectionem ducatur
recta quævis ΓX, atque
huic parallela sit ΚΑ,
quæ cum tribus dein-
ceps sectionibus conve-
niat: dico rectangulum
ΚΜΑ quadrati ex ΓX
duplum esse.

Ducantur asymptoti
sectionum EZ, HE : er-
go [per II.& 22.2.huj.]
quadratum ex GX æ-
quale est utrilibet rectangulorum ΘME , ΘKE .
rectangulum autem ΘME una cum rectan-
gulo ΘKE æquale est rectangulo ΛMK ; propter

pter extremas [per 8. & 16.2.] æquales: rectangulum igitur $\Lambda M K$ quadrati ex ΓX duplum erit.

τὰς ἀκρας ἴσας εἶναι· ἔ τὸ ὑπὸ $\Lambda M K$ ἄρα διπλάσιον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΓX .


EUTOCIUS.

* Rectangulum autem $\Theta M E$ una cum rectangulo $\Theta K E$ æquale est rectangulo $\Lambda M K$, propter extremas æquales.] Sit recta ΛK , & sit $\Lambda \Theta$ æqualis $E K$, & ΘN ipsi $E M$; & ducantur à punctis M, K perpendiculares $M Z, K O$, ita ut $M Z$ sit æqualis $M K$, & $K O$ æqualis $K E$, & compleantur parallelogramma $\Xi \Theta, \Theta \Lambda$. quoniam igitur $M Z$ æqualis est $M K$, hoc est ΠO ; estque $\Lambda \Theta$ æqualis $E K$, hoc est $K O$: erit $\Theta \Lambda$ parallelogrammum ipsi $M O$ æquale. commune apponatur $\Xi \Theta$: totum igitur $\Lambda \Xi$ æquale est ipsis $\Xi \Theta$ & $M O$; hoc est ΘO & ΠP . & quidem $\Lambda \Xi$ est rectangulum $\Lambda M K$, & ΘO est rectangulum $\Theta K E$, & ΠP rectangulum $\Theta M E$.

Sed licet & aliter idem demonstrare. *

Secetur $M N$ bifariam in Σ : constat igitur & ΛK in Σ bifariam secari, & rectangulum $\Theta K E$

æquale esse rectangulo $\Lambda E K$, quia ΘK est æqualis ΛE . & quoniam ΛK secatur in partes quidem æquales in Σ , & in partes inæquales in E ; erit quidem [per 5.2.] rectangulum $\Lambda E K$ una cum quadrato ex ΣE æquale quadrato ex $K \Sigma$. quadratum autem ex ΣE rectangulo $\Theta M E$ una cum quadrato ex ΣM est æquale: ergo quadratum ex $K \Sigma$ æquale est rectangulo $\Lambda E K$, hoc est $\Theta K E$, & rectangulo $\Theta M E$ una cum quadrato ex ΣM . eadem ratione erit quadratum ex $K \Sigma$ æquale rectangulo $\Lambda M K$ & quadrato ex ΣM : adeoque rectangulum $\Theta K E$ una cum rectangulo $\Theta M E$ & quadrato ex ΣM æquale est rectangulo $\Lambda M K$ & quadrato ex ΣM . commune auferatur quadratum ex ΣM : reliquum igitur rectangulum $\Theta K E$ una cum rectangulo $\Theta M E$ est æquale rectangulo $\Lambda M K$.



* Τὸ δὲ ὑπὸ $\Theta M E$ μὲν ὃ ὑπὸ $\Theta K E$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ $\Lambda M K$, διὰ τὸ τὰς ἀκρας ἴσας εἶναι.] Ἐστω αὖτις ἡ ΛK , καὶ ἔστω ἡ $\Lambda \Theta$ ἴση τῇ $E K$, ἡ δὲ ΘN ἴση τῇ $E M$, καὶ ἡχθῶσιν ἀπὸ τῶν M, K ὀρθαὶ αἱ $M Z, K O$, καὶ κείδω τῇ $M K$ ἴση ἡ $M Z$, τῇ δὲ $K E$ ἡ $K O$, καὶ συμπληρώσω τὰ $\Xi \Theta, \Theta \Lambda$ παραλληλόγραμμα. ἐπεὶ ἔν ἴση ἔστιν ἡ $M K$ τῇ $M Z$, τυττέτι τῇ ΠO · ἐστὶ δὲ ἡ $\Lambda \Theta$ τῇ $E K$, τυττέτι τῇ $K O$.

ἴσων ἄρα τὸ $\Theta \Lambda$ τῷ $M O$. κοινὸν ἐκείδω τὸ $\Xi \Theta$ · ὅλον ἄρα τὸ $\Lambda \Xi$ ἴσον ἐστὶ τῷς $\Xi \Theta, M O$, τυττέτι τῷς $\Theta O, \Pi P$. καὶ ἐστὶ τὸ μὲν $\Lambda \Xi$ τὸ ὑπὸ τῷ $\Lambda M K$, τὸ δὲ ΘO τὸ ὑπὸ $\Theta K E$, καὶ τὸ ΠP τὸ ὑπὸ $\Theta M E$ ἔστι. Ἐστὶ δὲ καὶ ἄλλως δειξάμεν αὐτό. *


Τιτμήσω ἡ $M N$ διχα κατὰ τὸ Σ · φανερὸν δὲ ὅτι ἡ ΛK διχα τίτμηται κατὰ τὸ Σ , καὶ τὸ ὑπὸ $\Theta K E$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ $\Lambda E K$, ἴση γὰρ ἡ ΘK τῇ ΛE . καὶ ἐπεὶ ἡ ΛK τίτμηται εἰς μὲν ἴσα κατὰ τὸ Σ , εἰς δὲ ἀνίστα κατὰ τὸ E , τὸ ὑπὸ $\Lambda E K$ μετὰ τῷ ὑπὸ ΣE ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ $K \Sigma$. τὸ δὲ ὑπὸ ΣE ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ $\Theta M E$ καὶ τῷ ὑπὸ ΣM . ὥστε τὸ ὑπὸ $K \Sigma$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ $\Lambda E K$, τυττέτι τῷ ὑπὸ $\Theta K E$, καὶ τῷ ὑπὸ $\Theta M E$ καὶ τῷ ὑπὸ ΣM . διὰ ταῦτα δὲ τὸ ὑπὸ $K \Sigma$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ $\Lambda M K$ καὶ τῷ ὑπὸ ΣM . ὥστε τὸ ὑπὸ $\Theta K E$ μετὰ τῷ ὑπὸ $\Theta M E$ καὶ τῷ ὑπὸ ΣM ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ $\Lambda M K$ καὶ τῷ ὑπὸ ΣM . κοινὸν ἀφαιρέσω τὸ ἐπὶ ΣM · λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ $\Theta K E$ μετὰ τῷ ὑπὸ $\Theta M E$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ $\Lambda M K$.

PROP. XXIV. Theor.

Si parabolæ duæ rectæ lineæ occurrant, utraque in duobus punctis, & nullius ipsarum occurfus occurfibus alterius contineatur: convenient inter sese extra sectionem.

SIT parabola $\Lambda B \Gamma \Delta$, cui duæ rectæ $\Lambda B, \Gamma \Delta$ occurrant, ita ut nullius ipsarum occurfus alterius occurfibus contineatur: dico eas productas inter se convenire.

Ducantur per B, Γ diametri sectionis $E B Z, H \Gamma \Theta$: parallelæ igitur sunt [per cor. 46. I. huj.] & [per 26. I. huj.] utraque sectionem in uno tantum puncto secat. jungatur $B \Gamma$: anguli igitur $E B \Gamma, H \Gamma B$ [per 29. I.] duobus rectis sunt æquales. verum $B \Lambda, \Delta \Gamma$ productæ angulos duobus rectis minores efficiunt: ergo inter sese extra sectionem convenient.



ΠΡΟΤΑΣΙΣ καδ'.

Εὰν ὁμοβολῇ δύο εὐθεῖαι συμπίπτωσι, ἑκατέρα κατὰ δύο σημεία, μηδετέρα δὲ αὐτῶν ἢ σύμπτωσης ὑπὸ τῷ ἑτέρῳ συμπίπτωσι περὶ ἑξῆς συμπεσόντι ἀλλήλαις αἱ εὐθεῖαι ἐκτὸς τῆς τομῆς.

ΕΣΤΩ ὁμοβολῇ ἡ $\Lambda B \Gamma \Delta$, καὶ τῇ τομῇ δύο εὐθεῖαι συμπίπτωσιν αἱ $\Lambda B, \Gamma \Delta$, μηδετέρας δὲ αὐτῶν ἢ σύμπτωσης ὑπὸ τῷ ἑτέρῳ συμπίπτωσιν περὶ ἑξῆς συμπεσόντι ἀλλήλαις. λέγω ὅτι ἐκβαλλόμεναι συμπεσόντι ἀλλήλαις. ἡχθῶσιν διὰ τῶν B, Γ διαμέτροι τῆς τομῆς αἱ $E B Z, H \Gamma \Theta$. ὁμοβάλληλοι ἄρα εἰσὶ, καὶ ἐν μόνον σημείῳ ἐκπίπτει τὸ μέν τιμναι. ἐπεζεύχθω δὲ ἡ $B \Gamma$: αἱ ἄρα ὑπὸ $E B \Gamma, H \Gamma B$ γωνίαι δύο ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶν. αἱ δὲ $B \Lambda, \Delta \Gamma$ ἐκβαλλόμεναι ἐλάττωσιν πρὸς δύο ὀρθῶν· συμπεσόντι ἄρα ἀλλήλαις ἐκτὸς τῆς τομῆς.

● Est Lemma Pappi quantum.

EU-

EUTOCIUS.

Δεῖ σημειώσασθαι ὅτι συμπλάσεις καλεῖται τὰ σημεῖα καὶ δὲ συμβάλλουσι τῇ τμήτῃ αἱ $AB, \Gamma\Delta$ οὐδεῖσαι. καὶ δεῖ, φησὶ, παρατηρεῖν ὅτι ἐκτὸς εἰν ἀλλήλων τὰ σημεῖα, ἀλλὰ μὴ ὡς τὰ $A\Gamma, B\Delta$, δεῖ γὰρ εἶδέναι ὅτι καὶ ἐπ' ἐκαστοῦ τῶν αὐτῶν σημείων.

Animadvertendum est illum *occurfus* appellare puncta in quibus $AB, \Gamma\Delta$ sectioni occurrunt. &c, *inquirit*, observari oportere ut puncta extra sese ponantur, non ad modum ipsarum $A\Gamma, B\Delta$. &c sciendum est eadem etiam evenire in contingentibus.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κε'.

Εάν ὑπερβολῇ δύο εὐθεῖαι συμπίπτωσι, ἐκαστέρα καὶ δύο σημεῖα, μηδετέρα δὲ αὐτῶν ἢ σύμπτωσις ὑπὸ τῇ τῆς ἐτέρας συμπίπτουσας περιέχῃ· συμπίπτουσαι ἀλλήλαις αἱ εὐθεῖαι, ἐκτὸς μὲν τῆς τομῆς, ἐντὸς δὲ τῆς περιέχουσας τὴν τομὴν γωνίας.


PROP. XXV. Theor.

Si hyperbolæ occurrant duæ rectæ lineæ, utraque in duobus punctis; nullius autem ipsarum occurfus alterius occurfibus contineatur: convenient inter sese, extra sectionem quidem, sed tamen intra angulum qui hyperbolam continet.

ΕΣΤΩ ὑπερβολῇ, ἥς ἀσύμπτωται αἱ $AB, A\Gamma$, καὶ τμήνεται δύο εὐθεῖαι τὴν τομὴν αἱ $EZ, H\Theta$, καὶ μηδετέρας αὐτῶν ἢ σύμπτωσις ὑπὸ τῶν τῆς ἐτέρας περιέχουσας· λέγω ὅτι αἱ $EZ, H\Theta$ ἐκβαλλόμεναι συμπίπτουσιν ἐκτὸς μὲν τῆς τομῆς, ἐντὸς δὲ τῆς ὑπὸ ΓAB γωνίας.

Επιζυγίσθωμεν γὰρ AZ , $A\Theta$ ἐκτελέσθωσαν, καὶ ἐπιζεύχθω ἡ $Z\Theta$. καὶ ἐπεὶ αἱ $EZ, H\Theta$ ἐκβαλλόμεναι τέμνουσι πρὸς $AZ\Theta$, $A\Theta Z$ γωνίας, εἰσὶ δὲ αἱ ἐρημιδαί γωνίαί δύο ὁρθῶν ἐλάσσονες· αἱ $EZ, H\Theta$ ἐκβαλλόμεναι συμπίπτουσιν ἀλλήλαις, ἐκτὸς μὲν τῆς τομῆς, ἐντὸς δὲ τῆς ὑπὸ BAG γωνίας. ὁμοίως δὲ δείξομεν καὶ ἐφαπτόμεναι ὡς τῇ τομῇ αἱ $EZ, H\Theta$.

SIT hyperbola, cujus asymptoti $AB, A\Gamma$, & duæ rectæ ut $EZ, H\Theta$ sectioni occurrant, ita ut nullius ipsarum occurfus occurfibus alterius contineatur: dico $EZ, H\Theta$ productas extra sectionem quidem, sed tamen intra angulum ΓAB inter se convenire.



Junctæ enim $AZ, A\Theta$ producuntur, & jungatur $Z\Theta$. Et quoniam $EZ, H\Theta$ productæ secant angulos $AZ\Theta, A\Theta Z$, & [per 17. I.] sunt dicti anguli duobus rectis minores; rectæ $EZ, H\Theta$ convenient inter se extra sectionem quidem, sed tamen intra angulum BAG . similiter demonstrabimus, si $EZ, H\Theta$ fuerint contingentes.

venient inter se extra sectionem quidem, sed tamen intra angulum BAG . similiter demonstrabimus, si $EZ, H\Theta$ fuerint contingentes.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κα'.



Εάν ἐν ἐλλείψει ἢ κύκλῳ περιφερεία δύο εὐθεῖαι τμήνωσι ἀλλήλας μὴ διὰ τῆς κέντρους ἵσαι· ἢ τμήνωσι ἀλλήλας δίχα.

PROP. XXVI. Theor.

Si in ellipsi vel circuli circumferentia duæ rectæ lineæ non transeuntes per centrum se invicem secant; bifariam sese non secabunt.

Εἰ γὰρ διωατὸν, ἐν ἐλλείψει ἢ κύκλῳ περιφερεία, δύο εὐθεῖαι, αἱ $\Gamma\Delta, EZ$, μὴ διὰ τῆς κέντρους ἵσαι, τμήνωσιν ἀλλήλας δίχα κατὰ τὸ H , καὶ ἐξω κέντρον τῆς τομῆς τὸ Θ , καὶ ἐπιζυγίσθωμεν ἡ $H\Theta$ ἐκτελέσθω δὲ πρὸς τὰ A, B .

Επεὶ γὰρ διὰ μέτρος ἔστιν ἡ AB , τὴν EZ δίχα τμήνωσαι· ἢ ἀρα κατὰ τὸ A ἐφαπτόμεναι τῷ κύκλῳ ἔστι τῇ EZ . ὁμοίως δὲ δείξομεν ὅτι καὶ τῇ $\Gamma\Delta$. ὥστε καὶ ἡ EZ τῷ κύκλῳ ἔστι τῇ $\Gamma\Delta$, ὅπῃ ἀδιώκωνται. ἐκ ἀρα αἱ $\Gamma\Delta, EZ$ δίχα τμήνωσιν ἀλλήλας.



enim fieri potest, in ellipsi vel circuli circumferentia, duæ rectæ $\Gamma\Delta, EZ$ non transeuntes per centrum sese bifariam secant in H ; sitque Θ centrum sectionis, & juncta $H\Theta$ ad A, B puncta producat.

Quoniam igitur AB diameter est, ipsam EZ bifariam secans; quæ ad A sectionem continet [per 6. 2. huj.] parallela erit ipsi EZ . similiter demonstrabimus eandem etiam ipsi $\Gamma\Delta$ esse parallelam: ergo [per 30. I.] EZ est parallela ipsi $\Gamma\Delta$, quod est absurdum. non igitur $EZ, \Gamma\Delta$ sese bifariam secant.

I i


PROP.

PROP. XXVII. Theor.

Si ellipſim vel circuli circumferentiam duæ rectæ lineæ contingant: ſi quidem ea quæ tactus conjungit per centrum ſectionis tranſeat, contingentes rectæ ſibi ipſis erunt parallelæ; ſin minus, convenient inter ſefe ad eandem centri partes.

SIT ellipſis, vel circuli circumferentia AB, quam contingant duæ rectæ ΓΑΔ, ΕΒΖ, jungaturque AB, & primo tranſeat per centrum: dico ΓΔ ipſi ΕΖ parallelam eſſe.

Quoniam enim AB eſt diameter ſectionis, & ΓΔ ipſam in A contingit; erit [per 17.1.huj.] ΓΔ parallelæ rectis quæ ad diametrum AB ordinatim applicantur. ſimili ratione ΕΖ erit eiſdem parallelæ: ergo [per 30.1.] ΓΔ parallelæ eſt ipſi ΕΖ.




Sed AB per centrum non tranſeat, ut fit in ſecunda figura, & ducatur ΑΘ diameter, & per Θ contingens ΚΘΛ: parallelæ eſt igitur [per caſ. 1.] ΚΛ ipſi ΓΔ: ergo ΒΖ producta ad eandem partes centri, in quibus eſt AB, cum ΓΔ convenient.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κζ.

Εάν ἐλλείψως ἢ κύκλου περιφέρειας δύο εὐθείαι ὁπτεφαύωσιν· εἰ μὲν ἡ τὰς ἀφ'αὐτῶν ὁπτεζευγνύσασα διὰ τὸ κέντρον τῆς τομῆς ἢ, παράλληλοι εἶσιν· αἱ ἐφαπτόμεναι εἰ μὴ, συμπεσύνται ὁπτε τὰ αὐτὰ μέρη τῶν κέντρων.

ΕΣΤΩ ἑλλειψις, ἢ κύκλος περιφέρεια ἡ AB, ἐφαπτόμεναι αὐτῆς αἱ ΓΑΔ, ΕΒΖ, καὶ ἐπιζεύχθω ἡ AB, καὶ ἐς αὐτὸν διὰ τοῦ κέντρου λέγω ὅτι ὁμοσέληλος ἐστὶν ἡ ΓΔ τῇ ΕΖ.



Επειδὴ γὰρ διὰ μέτρος ἐστὶν ἡ AB τῇ τομῇ, καὶ ἐφαπτομένη αὐτῆς κατὰ τὸ Α ἡ ΓΔ· ἡ ΓΔ ἄρα ὁμοσέληλος ἐστὶ τῇ ὁπτε τὴν AB τεταγμένην κατηγμένην. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ΕΖ ὁμοσέληλος ἐστὶ αὐτῆς· καὶ ἡ ΓΔ ἄρα τῇ ΕΖ ὁμοσέληλος ἐστὶ.


Μὴ ἐρχομένη δὲ ἡ AB διὰ τὸ κέντρον, ὡς ἔχει ὁπτε τὸ δεύτερον καταγραφῆς, καὶ ἦχθω διὰ μέτρος ἡ ΑΘ, καὶ διὰ τὸ ἐφαπτομένη ἡ ΚΘΛ· ὁμοσέληλος ἄρα ἐστὶν ἡ ΚΛ τῇ ΓΔ· ἡ ἄρα ΕΖ ἐκβαλλομένη συμπεσύνται τῇ ΓΔ ὁπτε τὰ αὐτὰ μέρη τῶν κέντρων, ἐν οἷς ἐστὶν ἡ AB.

PROP. XXVIII. Theor.

Si in conſi ſectione vel circuli circumferentia, duas rectas parallelas recta linea bifariam ſecet: erit illa diameter ſectionis.

IN ſectione enim conſi duæ rectæ parallelæ AB, ΓΔ in punctis E, Ζ bifariam ſecentur, & juncta ΒΖ producatur: dico illam eſſe ſectionis diametrum.

Si enim non eſt, ſit ΗΘΖ diameter, ſi fieri poſſit: ergo [per 5. vel 6.2.huj.] quæ in Η contingit ſectionem parallelæ eſt ipſi AB: quare [per 30.1.] & ipſi ΓΔ. eſt autem ΗΘΖ diameter: ergo [per defin. 10.] ΓΘ, ΘΔ æquales ſunt, quod eſt abſurdum; poſuimus enim ΓΒ æqualem ΕΔ. non igitur ΗΘΖ diameter eſt ſectionis. ſimiliter demonſtrabimus neque aliam quampiam eſſe diametrum præter ipſam ΒΖ: ergo ΕΖ ſectionis diameter erit.



ΠΡΟΤΑΣΙΣ κη.

Εάν ἐν κώνου τομῇ ἢ κύκλου περιφέρειᾳ δύο παράλληλοι εὐθείαι εὐθεῖα τις διχα τμήτη· διάμετρος ἐστὶ τῆς τομῆς.

ΕΝ γὰρ κώνου τομῇ δύο εὐθείαι ὁμοσέληλοι αἱ AB, ΓΔ διχα τμήτωσαν κατὰ τὰ Ε, Ζ, καὶ ὁπτεζευγνύσασα ἡ ΕΖ ἐκβαλλομένη λέγω ὅτι διὰ μέτρος ἐστὶ τῆς τομῆς.

Εἰ γὰρ μὴ, ἐς αὐτὸν διωκτὸν, ἡ ΗΘΖ· ἡ ἄρα κατὰ τὸ Η ἐφαπτομένη ὁμοσέληλος ἐστὶ τῇ AB· ὡς ἡ αὐτὴ ὁμοσέληλος ἐστὶ τῇ ΓΔ. καὶ ἐστὶ διάμετρος ἡ ΗΘ· ἴση ἄρα ἡ ΓΘ τῇ ΘΔ, ὅπερ ἀποκιν· ὑπόκειται γὰρ ἡ ΓΕ τῇ ΕΔ ἴση. ἄρα διὰ μέτρος ἐστὶν ἡ ΗΘ. ὁμοίως δὲ δεῖξομεν ὅτι ἐστὶ ἄλλη τις πλεονεξία ΕΖ· ἡ ΕΖ ἄρα διάμετρος ἐστὶ τῆς τομῆς.


ἄρα διὰ μέτρος ἐστὶν ἡ ΗΘ. ὁμοίως δὲ δεῖξομεν ὅτι ἐστὶ ἄλλη τις πλεονεξία ΕΖ· ἡ ΕΖ ἄρα διάμετρος ἐστὶ τῆς τομῆς.

E U.

EUTOCIUS.

Αξιόν ἐστιν ἐκείνου πάλιν δεῖξαι ἐν ὁποίῳ καμπύλῳ γραμμῶν, πότερον κύκλος ἢ περιφέρεια, ἢ τις ἑτέρα τῶν προκείμενων τῶν κώνυ τομῶν, ἢ παρὰ ταύτας. ἔστω δὴ ἡ $ΑΒΓ$, καὶ περιέστω τὸ εἶδος αὐτῆς ὁποῖον ἔστιν εἰρημύον πρὸς τὸν. Εἰλήσθω πάλιν σημεῖα ἐπὶ τῇ γραμμῇ τὰ $Γ, Δ$, καὶ ἡχθῶσιν διὰ τῶν $Γ, Δ$ σημείων ὁποῖοι αὐτοὶ οὐδεὶς αἱ $ΓΒ, ΔΕ$, ἐν τῇ ἀπολαμβάνονται τῇ γραμμῇ. καὶ πάλιν ἀπὸ τῶν $Γ, Δ$ ἑτέρων παράλληλοι αἱ $ΓΗ, ΔΖ$, καὶ πετμήσθωσαν διχα αἱ $Μ$ τῶν $ΓΒ, ΔΕ$ καὶ τὰ $Θ, Κ$, αἱ δὲ $ΓΗ, ΔΖ$ καὶ τὰ $Λ, Μ$, καὶ ἐπιζεύχθῶσιν αἱ $ΘΚ, ΛΜ$. εἰ μὲν ὅν πᾶσαι αἱ τῇ $ΒΓ$ παράλληλοι ἀπὸ τῶν $ΘΚ$ διχοτομῶν, πᾶσαι δὲ αἱ τῇ $ΓΗ$ ἀπὸ τῶν

Non inutile erit, datā in plano curvā lineā, investigare utrum circuli circumferentia sit, vel una ē conī sectionibus, necne. sit ea $ΑΒΓ$, & oporteat speciem ejus investigare. Sumantur in proposita lineā puncta quævis $Γ, Δ$, per quæ ducantur intra lineam rectæ parallelæ $ΓΒ, ΔΕ$: & rursus ab iisdem punctis aliæ parallelæ ducantur $ΓΗ, ΔΖ$, bifariamque secentur $ΓΒ, ΔΕ$ quidem in $Θ, Κ$ punctis, $ΓΗ, ΔΖ$ vero in $Λ, Μ$; & jungantur $ΘΚ, ΛΜ$. si igitur omnes rectæ quæ ipsi $ΓΒ$ parallelæ sunt, à $ΘΚ$ bifariam dividantur; & quæ parallelæ sunt ipsi $ΓΗ$ à recta $ΜΛ$; erit $ΑΒΓ$ una ē conī sectionibus, cujus diametri $ΘΚ, ΜΛ$; sin minus, non erit. Rursus quænam sit ex quatuor se-



$ΜΛ$, μία ἐστὶ τῇ $ΒΓ$ κώνυ τομῶν ἡ $ΑΒΓ$, ἀλλήλως ἔχουσα τὰς $ΘΚ, ΜΛ$. εἰ γὰρ μὴ, ἔ. Πάλιν ἥτις τῶν τεσσάρων εἶναι εὐείσονται ἐκβάλλοντες εἰς ἀπὸ τῶν ἐπὶ ἑκάτερα τὰ μέρη τὰς $ΘΚ, ΛΜ$. ἥτοι γὰρ παράλληλοι εἰσιν, καὶ ἐστὶ παραβολή. ἢ δὴ τὰ $Θ, Λ$ μέρη συμπίπτουσιν καὶ ἐστὶ ἐλλείψις ἢ κύκλος. ἢ δὴ τὰ ἑτέρω, καὶ ἐστὶ ὑπερβολή. ἢ ἡ ἐλλείψις τῇ κύκλῳ διακρίνεται ἀπὸ τῆς $Ζ$ σημείου τῇ συμπίπτουσιν τῇ $ΚΘ, ΜΛ$, ὅπου κέντρον γίνεσθαι, εἰ γὰρ ἴσως εἴσιν αἱ ἀπ' αὐτοῦ πρὸς τῇ γραμμῇ ἀποσπίνουσαι, ἀλλοιότα κύκλος ἢ περιφέρεια ἡ $ΑΒΓ$. εἰ δὲ μὴ, ἐλλείψις.

Ἐστὶ δὲ αὐτὰς ἀσκεῖται καὶ ἄλλως, ἀπὸ τῆς πετμήσεως δὴ τῇ $ΒΓ$ ἀπὸ τῶν $Γ, Δ$ καὶ τῶν $Θ, Κ$. εἰ μὲν γὰρ εἴη ὡς τὸ ἀπὸ $ΓΘ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΔΚ$ ὅπως ἡ $ΘΑ$ πρὸς $ΑΚ$, παραβολή εἶναι. εἰ δὲ τὸ ἀπὸ $ΓΘ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΔΚ$ μείζονα λόγον ἔχῃ ἥτις ἡ $ΘΑ$ πρὸς $ΑΚ$, ὑπερβολή. εἰ δὲ ἴσους, ἐλλείψις.


Καὶ ἀπὸ τῆς ἐφαπτομένης δυνατὸν εἶναι αὐτὰς ἀσκεῖται ἀναμνησθέντας τῇ ἀνωτέρω εἰρημύῳ αὐτῆς ὑπάρχειν.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κθ'.

Εὰν ἐν κώνυ τομῇ ἡ κύκλος περιφέρεια δύο εὐθείαι ἐφαπτόμεναι συμπίπτωσιν. ἢ ἀπὸ τῆς συμπίπτουσιν αὐτῶν ὅπου τῇ διχοτομῇ τῇ τὰς ἀφ' ὁποῖου ἀπομύνη εὐθεία ἀλγεμετρός ἐστὶ τῇ τομῇ.

Ἐστὶ δὲ κώνυ τομῇ, ἡ κύκλος περιφέρεια, ἢς ἐφαπτόμεναι εὐθείαι ἡχθῶσιν αἱ $ΑΒ, ΑΓ$, συμπίπτουσιν κατὰ τὸ $Α$, καὶ ὅπου ζεύχθῃσιν ἡ $ΒΓ$ διχα πεμήσθω κατὰ τὸ $Δ$, καὶ ἐπιζεύχθω ἡ $ΑΔ$. λέγω ὅτι ἀλγεμετρός ἐστὶ τῇ τομῇ.

Εἰ γὰρ δυνατὸν, ἔστω ἀλγεμετρός ἡ $ΔΕ$, καὶ ἐπιζεύχθω ἡ $ΕΓ$. πρὸς δὲ τὴν τομῇ. πεμήσθω κατὰ τὸ $Ζ$, καὶ διὰ τῶν $Ζ$ τῇ $ΓΔΒ$ ὁποῖος ἡχθῇ ἡ $ΖΚΗ$, καὶ ἐπιζεύχθω ἡ $ΒΛΘΔ$. ἐπεὶ ὅν ἴση ἐστὶν ἡ $ΓΔ$ τῇ $ΔΒ$. ἴση ἄρα καὶ ἡ



PROP. XXIX. Theor.

Si duæ rectæ conī sectionem vel circuli circumferentiam contingentes occurrant inter se; recta connectens punctum concursus earundem & illud in quo ea quæ conjungit tactus bifariam dividitur sectionis diameter erit.

SIT conī sectio, vel circuli circumferentia, quam contingant $ΑΒ, ΑΓ$, in puncto $Α$ convenientes, & ducta $ΒΓ$ secetur bifariam in $Δ$, & jungatur $ΑΔ$: dico $ΑΔ$ esse diametrum sectionis.

Si enim fieri potest, sit $ΔΕ$ diameter, & jungatur $ΓΕ$, quæ [per 35. & 36. i. huj.] sectionem ipsam secabit. secet autem in $Ζ$, & per $Ζ$ ipsi $ΓΔΒ$ ducatur parallela $ΖΚΗ$, & jungatur $ΕΛΘΔ$: itaque quoniam $ΓΔ$ æqualis est ipsi $ΔΒ$, erit

erit [per 4. 6.] $Z\Theta$ quoque ipsi ΘH æqualis. & quoniam recta, quæ in Λ contingit sectionem, parallela est ipsi $B\Gamma$, & est ZH eidem parallela: ergo ZH parallela est rectæ sectionem in Λ tangenti: & idcirco [per 46 & 47. 1] $Z\Theta$ est æqualis ipsi ΘK , quod fieri minime potest: non igitur diameter est ΔE . similiter demonstrabimus nullam aliam esse diametrum præter $\Lambda\Delta$.


$Z\Theta$ τῇ ΘH . καὶ ἐπεὶ ἡ κατὰ τὸ Λ ἐφαπτομένη ὁμοῦς ἐστὶ τῇ $B\Gamma$, καὶ ἐστὶ δὲ ἡ ZH τῇ $B\Gamma$ ὁμοῦς· καὶ ἡ ZH ἄρα ὁμοῦς ἐστὶ τῇ κατὰ τὸ Λ ἐφαπτομένη· ἴση ἄρα ἡ $Z\Theta$ τῇ ΘK , ὅπερ ἀδυνάτον· οὐκ ἄρα διάμετρος ἐστὶν ἡ ΔE . ὁμοίως δὲ δεῖξομεν ὅτι καὶ ἄλλη τις, πλὴν τῆς $\Lambda\Delta$.

PROP. XXX. Theor.

Si duæ rectæ lineæ coni sectionem vel circuli circumferentiam contingentes concurrant: diameter, quæ à puncto concursus ducitur, rectam tactus conjungentem bifariam secabit.

ΣIT coni sectio, vel circuli circumferentia $B\Gamma$, & ducantur duæ rectæ BA , AG ipsam contingentes, quæ convenient in A , & jungatur $B\Gamma$, & per A ducatur sectionis diameter $\Lambda\Delta$: dico $B\Delta$ ipsi $\Delta\Gamma$ æqualem esse.

Non enim, sed, si fieri potest, sit BE æqualis $E\Gamma$, & jungatur AE : ergo [per præc.] AE diameter est sectionis. est autem & $\Lambda\Delta$, quod est absurdum. si enim sectio sit ellipsis, punctum A , in quo conveniunt diametri, centrum erit sectionis extra ipsam, quod fieri non potest: si sit parabola, diametri ipsius [contra corol. 51. 1. huj.] inter se convenient: si vero hyperbola sit, lineæ BA , AG sectioni occurrunt, & unius occursum alterius occursum non continetur, quare convenient inter sese [per 25. 2. huj.] intra angulum hyperbolam continentem. sed & in ipso angulo, (punctum enim A supponitur centrum, cum ΔA , ΛB diametri sint) quod est absurdum: non igitur $B E$ ipsi $E\Gamma$ æqualis erit.



ΠΡΟΤΑΣΙΣ λ'.

Εάν κόνυ τομῆς ἡ κύκλος περιφέρειας δύο εὐθεῖαι ἐφαπτόμεναι συμπίπτωσιν ἢ ἀπὸ τῆς συμπίπτουσας ἀγομένη διμέτρος δίχα τεμῆι τὰς ἀφ' αὐτῶν ἐκζυγίσκῃ εὐθεῖαι.

ΕΣΤΩ κόνυ τομῆς, ἡ κύκλος περιφέρεια ἡ $B\Gamma$, καὶ ἡχθῶσιν αὐτῆς δύο ἐφαπτόμεναι αἱ BA , AG συμπίπτουσαι κατὰ τὸ A , ἡ ἐπιζεύχθω ἡ $B\Gamma$, καὶ ἡχθῶ διὰ τὸ A διάμετρος τῆς τομῆς ἡ $\Lambda\Delta$. λέγω ὅτι ἐστὶ ἴση ἡ $B\Delta$ τῇ $\Delta\Gamma$.

Μὴ γὰρ, ἀλλ', εἰ διωατὸν, ἔστω ἴση ἡ BE τῇ $E\Gamma$, καὶ ἐπιζεύχθω ἡ AE . ἡ AE ἄρα διάμετρος ἐστὶ τῆς τομῆς. ἐστὶ δὲ καὶ ἡ $\Lambda\Delta$, ὅπερ ἀδυνάτον. ἐπεὶ γὰρ ἑλλειψὶς ἐστὶν ἡ τομῆς, τὸ A , καθ' ὃ συμβάλλουσιν ἀλλήλαις αἱ διαμέτροι, κέντρον ἔσται τῆς τομῆς· ὅπερ ἀδυνάτον· ἔτε παραβολὴ ἐστὶν ἡ τομῆς, συμπίπτουσιν ἀλλήλαις αἱ διαμέτροι· ἔτε

ὑπερβολὴ ἐστὶ, καὶ συμπίπτουσιν τῇ τομῇ αἱ BA , AG , μὴ περικύπτουσιν αὐτῶν συμπίπτουσιν. ἐντοῦς ἄρα ἔσται τῆς περικύπτουσιν τῇ ὑπερβολῇ γωνίας. ἀλλὰ καὶ ἐπ' αὐτῆς, (κέντρον γὰρ ὑποτίθεται τὸ A , διμέτρον ἔσται τῇ ΔA , ΛE) ὅπερ ἀδυνάτον· οὐκ ἄρα ἡ BE τῇ $E\Gamma$ ἐστὶ ἴση.

PROP. XXXI. Theor.

Si utramque oppositarum sectionum duæ rectæ lineæ contingant: si quidem recta tactus conjungens per centrum transeat, contingentes rectæ parallelæ erunt; sin minus, convenient inter se ad partes centri.

ΣINT oppositæ sectiones A, B , & ipsas contingant $\Gamma\Delta$, $E\Delta$ in A, B ; recta vero, quæ ex A ad B ducitur, primum transeat per centrum sectionum: dico $\Gamma\Delta$ ipsi $E\Delta$ parallelam esse.

Quoniam enim oppositæ sectiones sunt, quarum diameter ΛB , & unam earum contingit $\Gamma\Delta$ in puncto A : igitur quæ per B ipsi $\Gamma\Delta$ parallela ducitur, [per 48. & 50. 1. huj.] sectionem continget. contingit autem $E\Delta$: ergo $\Gamma\Delta$ ipsi $E\Delta$ est parallela.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ λα'.

Εάν ἐκαστὴς τῶν ἀντικείμενων δύο εὐθεῖαι ἐφάπτονται· εἰ μὲν ἡ τὰς ἀφ' αὐτῶν ἐκζυγίσκῃ διὰ τὸ κέντρον πέπῃ, ὁμοῦς ἔσονται αἱ ἐφαπτόμεναι· εἰ δὲ μὴ, συμπεσόνται ἐπὶ τῷ κέντρῳ.



ΕΣΤΩΣΑΝ ἀντικείμεναι τομαὶ αἱ A, B , καὶ ἐφαπτόμεναι αὐτῶν ἑσώπων αἱ $\Gamma\Delta$, $E\Delta$ κατὰ τὰς A, B , ἡ δὲ διὰ τὸ Λ ὁπὶ τὸ B ὁπὶ τὸ Λ ἀντικείμεναι πεπῇ περὶ τὸν κέντρον τῶν τομῶν· λέγω ὅτι ὁμοῦς ἔσονται αἱ $\Gamma\Delta$ τῇ $E\Delta$.

Ἐπεὶ γὰρ ἀντικείμεναι εἰσὶ τομαὶ, ὧν διάμετρος ἐστὶν ἡ ΛB , καὶ μίαν αὐτῶν ἐφάπτεται ἡ $\Gamma\Delta$ κατὰ τὸ A . ἡ ἄρα διὰ τὸ B τῇ $\Gamma\Delta$ ὁμοῦς ἀγομένη ἐφάπτεται τῇ τομῇ. ἐφάπτεται δὲ καὶ ἡ $E\Delta$. παρὰ τὸν κέντρον ἄρα ἡ $\Gamma\Delta$ τῇ $E\Delta$.

Μὴ

129

Sed non transeat per centrum sectionum quæ ex A ad B ducitur, ducaturque sectionum diameter AH, & OK sectionem in H contingens: ergo OK parallela est ipsi GA. & quoniam hy-




perbolam. duæ rectæ contingunt EZ , ΘK ; [per
25. 2. huj.] convenient inter sese. est autem ΘK
ipsi $\Gamma \Delta$ parallela: quare & $\Gamma \Delta$, EZ productæ in-
ter se convenient. & patet concurrere fieri ad
easdem partes rectæ EZ ad quas est centrum.

PROP. XXXII. Theor.

Si utrique oppositarum sectionum rectae lineae occurrant, ipsas vel in uno puncto contingentes, vel in duobus secantes, quae productae inter se conveniant: punctum, in quo conveniant, erit in angulo qui deinceps est angulo sectionem continenti.

SINT oppositæ sectiones, quas vel in uno puncto contingant, vel in duobus. secant rectas $AB, \Gamma A$; & productæ inter se conveniant: dico punctum, in quo conveniant, esse in angulo qui deinceps est angulo sectionem continent.



Sint sectionum a-
symptoti ZH , ΘA : et-
go [per 3. vel 8. 2.
huj.] AB producta a-
symptosis occurret. oc-
currit in Θ , H punctis. similiter FA occurret
asymptosis in Z , K . Et quoniam supponimus ZK ,
 ΘH inter se convenire, patet eas occursumas vel
in angulo ΘAZ , vel in $K \wedge H$: similiter idem
demonstrari potest, si AB , FA sectiones con-
tingant.


PROP. XXXIII. Theor.

Si uni oppositarum sectionum recta linea
occurrens ex utraque parte producta
K k extra

extra sectionem cadat: cum altera sectione non conveniet, sed transibit per tres locos; quorum unus quidem est sub angulo sectionem continente, duo vero reliqui sub iis angulis qui eidem sunt deinceps.

SINT oppositæ sectiones A, B: & sectionem A secet quævis recta ΓΔ, quæ producta ex utraque parte extra sectionem cadat: dico ΓΔ cum B sectione non convenire.

Ducantur enim asymptoti sectionum BZ, HΘ: ergo [per 8. 2. huj.] ΓΔ producta asymptotis occurrerit, non occurrerit autem in aliis punctis quam in E, Θ: ergo non conveniet cum sectione B. & patet eam per tres locos dictos transire. si enim cum utraque oppositarum sectionum conveniret, nulli ipsarum in duobus punctis occurreret: quod si in duobus punctis occurreret; oppositæ sectioni prorsus non occurreret, uti modo est ostensum.



μῆς· ὅς συμπεσῶται τῇ ἐτέρᾳ τομῇ, ἀλλὰ περὶ τῆς τριῶν τῶν τομῶν, ὅτι ὅτι εἰς μὲν οὐκ ὑπὸ τῆς ἀλλοτρίᾳς γωνίας τῆς τομῆς, δύο δὲ οἱ ὑπὸ τῶν γωνίας τῶν ἐφεξῆς τῆς ἀλλοτρίᾳς τῆς τομῆς γωνίας.

ΕΣΤΩΣΑΝ ἀντικείμεναι τομαὶ αἱ A, B, ἢ τῶν A πρὸς τῶν B εὐθείᾳ ἡ ΓΔ, ἢ ἐκβαλλομένη ἐφ' ἐκάτερα ἐκτὸς πηλείτω τῆς τομῆς· λέγω ὅτι ἡ ΓΔ ὅς συμπίπτει τῇ B τομῇ.


Ἡχθώσιν γὰρ ἀσύμπτωτοι τῶν τομῶν αἱ EZ, HΘ· ἡ ΓΔ ἄρα ἐκβαλλομένη συμπεσῶται τῇ ἀσύμπτωτος· ὅς συμπίπτει κατ' ἄλλα ἢ τὰ E, Θ· ὥστε ὅς συμπεσῶται ἐπὶ τῇ B τομῇ. καὶ φανερόν ὅτι διὰ τῶν τριῶν τῶν τομῶν περὶ τῆς. εἰ γὰρ ἐκάτερα τῶν ἀντικείμενων συμπίπτει τις εὐθείᾳ, ἐδεύεται τῇ ἀντικείμενῳ συμπεσῶται κατὰ δύο σημεῖα. εἰ γὰρ συμπεσῶται κατὰ δύο σημεῖα, διὰ τὸ περὶ δευτέρου, τῇ ἐτέρᾳ τομῇ ὅς συμπεσῶται.

PROP. XXXIV. Theor.

Si unam oppositarum sectionum recta quævis contingat, & huic parallela ducatur in altera sectione: quæ à tactu ad medium rectæ parallelæ ducitur, oppositarum sectionum diameter erit.

SINT oppositæ sectiones A, B, & earum unam A contingat in A puncto recta ΓΔ, ipsique ΓΔ parallela ducatur EZ in altera sectione, & secetur EZ in H bifariam, & jungatur AH: dico AH oppositarum sectionum diametrum esse.

Si enim fieri potest, sit AΘK diameter: ergo [per 31. 2. huj.] quæ in Θ sectionem contingit, parallela est ipsi ΓΔ. sed [ex hyp.] ΓΔ ipsi EZ est parallela: EK igitur ipsi KZ [per 47. 1. huj.] est æqualis, quod fieri non potest; est enim EH æqualis HZ. igitur AΘ non est diameter oppositarum sectionum: ergo ipsa AB ea est.



ΠΡΟΤΑΣΙΣ λδ'.

Εάν μίας τῶν ἀντικείμενων εὐθείᾳ πρὸς ἑκατέρᾳ, ὅς τῇ τῇ ἀλλοτρίᾳ ἀχθῇ ἐν τῇ ἐτέρᾳ τομῇ ἢ ἀπὸ τῆς ἀφ᾽ ἑκῆς ἐκτὸς μέση τῇ ἀλλοτρίᾳ ἀρμόδιᾳ εὐθείᾳ διχομετρηθῇ ἑστὶ τῶν ἀντικείμενων.

ΕΣΤΩΣΑΝ ἀντικείμεναι τομαὶ αἱ A, B, καὶ μίας αὐτῶν τῇ A ἐφαπτομένης εὐθείᾳ ἡ ΓΔ κατὰ τὸ A, καὶ τῇ ΓΔ παράλληλος ἡχθῶ ἐν τῇ ἐτέρᾳ τομῇ ἡ EZ, καὶ περμήδω διχα κατὰ τὸ H, καὶ ἐπέζεύχθω ἡ AH· λέγω ὅτι ἡ AH διχομετρεῖς ἐστὶ τῇ ἀντικείμενῳ.

Εἰ γὰρ διωσάτων, ἔστω ἡ AΘK· ἡ ἄρα κατὰ τὸ Θ ἐφαπτομένη παράλληλος ἐστὶ τῇ ΓΔ. ἀλλὰ ἡ ΓΔ παράλληλος ἐστὶ τῇ EZ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ EK τῇ KZ, ὅπερ ἀδυνάστον· ἡ γὰρ EH τῇ HZ ἐστὶν ἴση. ὅθεν ἄρα διχομετρεῖς ἐστὶν ἡ AΘ τῶν ἀντικείμενων· ἡ AB ἄρα.

PROP. XXXV. Theor.

Si diameter in una oppositarum sectionum rectam lineam bifariam secet: quæ in termino diametri contingit alteram sectionem, rectæ bifariam secetæ erit parallela.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ λε'.

Εάν ἡ διάμετρος ἐν μίᾳ τῇ ἀντικείμενῳ εὐθείᾳ πρὸς ἑκατέρᾳ τμήμα ἢ ἑκατέρᾳ τῇ ἐτέρᾳ τομῇ κατὰ τὸ πρὸς τῇ διχομετρεῖς παράλληλος ἔστω τῇ διχα τμητομένη εὐθείᾳ.

ΕΣΤΩ

ΕΣΤΩΣΑΝ ἀντικείμενα τομῇ αἱ Α, Β, ἡ
 διὰ διόμετρος αὐτῶν ἡ ΑΒ πυνέτω ἐν τῇ Β
 τομῇ διχα τὸ ΓΔ εὐθεῖαν
 κατὰ τὸ Ε' λέγω ὅτι ἡ
 κατὰ τὸ Α' ἐφαπτομένη τῆς
 τομῆς ἀρξάληλ' ἐστὶ
 τῇ ΓΔ.

Εἰ γὰρ δυνάστων, ἕως τῇ
κατὰ τὸ Α Ἐφαπτομένη τῇ
τομῆς ὡς ἡ ἀλλήλος ἡ Δ Ζ·
ἴση ἄρα ἡ Δ Η τῇ Η Ζ.
ἔστι δὲ καὶ ἡ Δ Ε τῇ Ε Γ ἴση·
ὡς ἡ ἀλλήλος ἡ ἄρα ἐστὶν ἡ
Γ Ζ τῇ Ε Η, ὅπερ ἀδυνά-
τον· ἐκβαλλομένη γὰρ αὐτῇ συμπίπτει. ἐκ ἄρα
παραλλήλος ἐστὶν ἡ Δ Ζ τῇ κατὰ τὸ Α Ἐφαπτομένη
τῇ τομῆς, ὅθεν ἄλλη τις διὰ τοῦ Α πλὴν τῇ Γ Δ.



SINT oppositæ sectiones A, B, quarum diameter A B, in B sectione, rectam $\Gamma \Delta$ bifariam fecerit in E: dico rectam, quæ in puncto A sectionem contingit, ipsi $\Gamma \Delta$ parallelam esse.

Si enim fieri potest,
sit recta sectionem in A
contingenti parallela Δ Z :
ergo [per 48. 1. huj.] Δ H
ipsi H Z est æqualis. sed
Δ E æqualis est ipsi E Γ :
parallela igitur [per 2.6.]
est Γ Z ipsi E H, quod ab-
furdum: producta enim
Γ Z [per 22. 1. huj.] cum
ipsa E H conveniet. quare neque Δ Z rectæ ad A
contingenti est parallela, neque alia quæpiam
per Δ ducta præter ipsam Γ Δ.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ 45'.


Εάν ἐν ἑκατέρᾳ πᾶσι ἀντικειμένῳ εὐθὺς αἰχρῶσι
παράλληλῳ ὄσῳ· ἢ τὰς διχοτομίας αὐτῶν
ὑπερδυναστεύει εὐθὺς ἀξίως ἔστι τὸ ἀν-
τικειμένον.

PROP. XXXVI. Theor.

Si in utraque oppositarum sectionum
rectæ lineæ inter se parallelæ ducan-
tur: ipsarum medium conjungens re-
cta oppositarum sectionum diameter
erit.

ΕΣΤΩ ΣΑΝ ἀντικείμενα τομαὶ αἱ ΑΒ, καὶ ἐν
ἐκάτερα αὐτῶν ἤχθωσαν εὐθεῖαι αἱ ΓΔ, ΕΖ,
καὶ ἕσωσαν παράλληλοι, καὶ
περμιθεῖν ἐκάτερα αὐτῶν
διχα κατὰ τὰ Η, Θ ση-
μεῖα, καὶ ἐπέσυχθω ἡ ΗΘ·
λέγω ὅτι ἡ ΗΘ διάμετρος
ἐστὶ τῶν ἀντικείμενων.

Εἰ γὰρ μὴ, ἔστω ἡ ΗΚ·
 ἡ ἄρα κατὰ τὸ Α εἰσάπλο-
 μένη παράλληλος ἐστὶ τῇ
 ΓΔ, ὥστε καὶ τῇ ΕΖ· ἴση
 ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΚ τῇ ΚΖ,
 ὅπερ ἀδιώματον, ἐπεὶ ἡ ΕΘ τῇ ΘΖ ἐστὶν ἴση. ἔκ-
 ἄρα ἡ ΗΚ διάμετρος ἐστὶ τῶν ἀντικειμένων· ἡ ΗΘ
 ἄρα.



SINT oppositæ sectiones A, B, & in earum
utraq; ducantur rectæ $\Gamma\Delta$, EZ inter se
parallelae, & in punctis
H, Θ bifariam secantur,
& jungatur H Θ : dico
H Θ diametrum esse op-
positarum sectionum.

Si enim non est, sit
 HK : ergo [per 5.2.huj.]
 quæ in A sectionem con-
 tingit ipsi $\Gamma\Delta$ est paral-
 lela; & idcirco ipsi EZ :
 æquales igitur [per 48.
 1. huj.] sunt BK , KZ ,
 quod fieri non potest, quoniam & $B\Theta$, ΘZ sunt
 æquales. ergo HK non est diameter oppositarum
 sectionum: quare $H\Theta$ ea est.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ λζ.

Εὰν ἀπαικιδύας εὐθεῖα τέμῃ μὴ διὰ τ' κέντρους·
ἢ ἀπὸ τ' διχοτομίας αὐτῶν ὅπῃ τὸ κέντρον ὅπῃ-
ζευγνυμένη διάμετρος ὅσῃ τ' ἀπαικιδύαν ἢ
λογωμένη ὀρθία· πλαγία δὲ συζυγῆς αὐτῇ ἢ
ἀπὸ τ' κέντρου ἀγνομένη παράλληλος τῇ δίχα
τεμνομένη.

PROP. XXXVII. Theor.


Si oppositas sectiones recta linea secet, non transiens per centrum: quæ à medio ipsius ad centrum ducitur oppositarum sectionum diameter erit ea quæ recta appellatur; transversa vero diameter ipsi conjugata est ea quæ à centro ducitur parallela rectæ bifariam sectæ.

ΕΣΤΩ ΣΑΝ ἀντικείμενα τομαίαι Α, Β, ἡ τὰς Α, Β περὶ τὴν εὐθείαν Γ Δ μὴ διὰ τὸ κέντρον ἔστω, ἔστω μὲν δὲ διὰ τὸ Ε, ἡ τὸ κέντρον ᾧ τομῶν ἔστω τὸ Χ, ἡ ἐπὶ τῇ εὐθείᾳ ἡ ΧΕ, ἡ διὰ τῆς

SINT oppositæ sectiones A, B, & ipsas secet
recta $\Gamma \Delta$ non transiens per centrum, quæ
bisariam in E dividatur, sitque sectionum cen-
trum x, & jungatur x E, & per x ipsi $\Gamma \Delta$ paral-
lela

lela ducatur AB : dico AB , EX diametros esse
conjugatas oppositarum sectionum.

Jungatur enim ΔX ,
& ad Z producatur, &
jungatur FZ : æqualis igitur
est [per 30. 1. huj.]
 ΔX ipsi XZ . est autem
[ex constr.] & ΔB æqualis
 BF : ergo [per 2. 6.]
 EX est parallela FZ , pro-
ducatur BA ad H . &
quoniam ΔX , XZ sunt
[per 30. 1. huj.] æqua-
les; & BX , ZH [per 4.
6.] æquales erunt; & propterea ipsæ ΓH , ZH :
ergo [per 5. 2. huj.] quæ ad A sectionem con-
tingit parallela est ipsi ΓZ , quare [per 30. 1.] &
ipsi EX . rectæ igitur AB , BX [per 16. 1. huj.]
oppositarum sectionum conjugatæ sunt diametri.



Χ τῇ Γ Δ παραλληλος ἤχθω ἡ Α Β· λέγω ὅτι αἱ
Α Β, Ε Χ σὲν εἰσὶ διὰ μέτροι τῶν τομῶν.

Επεξέωχθω ὅτι ἡ ΔΧ,
 ὁ ὁμοεισέλιγος ὅτι τὸ Ζ,
 καὶ ἐπεξέωχθω ἡ ΓΖ· ἴση
 ἄρα ἐστὶν ἡ ΔΧ τῇ ΧΖ.
 ἔστιν ὅτι καὶ ἡ ΔΕ τῇ ΕΓ ἴση·
 παραλλήλησθαι ἄρα ἐστὶν ἡ
 ΕΧ τῇ ΖΓ. ὁμοεισέλιγ-
 οῦσιν ἡ ΒΑ ὅτι τὸ Η. καὶ
 ἐπ' αὐτῇ ἴση ἐστὶν ἡ ΔΧ τῇ
 ΧΖ· ἴση ἄρα καὶ ἡ ΕΧ


τῇ ΖΗ. ὥς τε καὶ ἡ ΓΗ ἴση τῇ ΖΗ· ἡ ἄρα καὶ
τὸ Α ἐφαπτομένη πρὸς ἀλλήλους ἐστὶ τῇ ΓΖ, ὥς τε καὶ
τῇ ΕΧ. αἱ ΑΒ, ΕΧ ἄρα συζυγεῖς εἰσι διὰ μέ-
τρων.

PROP. XXXVIII. Theor.

Si duæ rectæ oppositas sectiones contingentes concurrant: quæ à puncto concursus ad medium rectæ tactus conjungentis ducitur, oppositarum sectionum diameter erit quæ recta vocatur; transversâ vero ipsi conjugata, quæ per centrum ducitur rectæ tactus conjungenti parallela.

SINT oppositae sectiones A, B; rectae sectiones contingentes FX, XΔ; & ducatur ΓΔ quae bifariam dividatur in E, & jungatur EX: dico EX diametrum rectam esse; transversam vero ipsique conjugatam, quae per centrum ducitur ipsi ΓΔ parallela.

Sit enim, si fieri potest, diameter BZ, & sumatur quodvis punctum Z: ergo ΔX ipsi BZ occurret. occurrat in Z puncto, & jungatur FZ: conveniet igitur FZ cum sectione. conveniat autem in A, & per A ducatur AB, rectæ FΔ parallela. itaque quoniam BZ diameter est & secat FΔ bifariam; etiam [per def. 15.] ipsi parallelas rectas bifariam secabit: quare AH ipsi HB est equalis. & quoniam FB est equalis BΔ; & est in triangulo FZΔ: ergo AH [per 4. 6. & 2. 5.] equalis est HE, unde & HE ipsi HB equalis est, quod fieri non potest. igitur BZ non est diameter.



ΕΣΤΩΣΑΝ ἀποκάμψαι πρὸς αἱ Δ, Β, ὅρα-
 πτόμεναι ὅτι τὴν πρὸς αἱ Γ Χ, Χ Δ, καὶ ἐκεί-
 νων ἡ Γ Δ, καὶ πτόμεναι ἄλλα κατὰ τὴν Ε, καὶ ἐκ-
 ζεύχων ἡ Ε Χ· λέγω ὅτι ἡ Ε Χ διὰ μέτρον ἐστὶ καὶ
 λογομένη ὁρθία· παλαιὰ ὅτι αὐτὴν αὐτὴ ἡ διὰ τὴν
 κέντρον τῇ Γ Δ περὶ ἄλλας ἀγαθῶν.

Εἶναι γὰρ αἱ διαμετροὶ
 διζήμετρος ἡ ΕΖ, καὶ εἰ-
 λεφθῶσι τοῦτοι σημεῖον τὸ
 Ζ· συμπεσῶσι ἀρα ἡ ΔΧ
 τῇ ΕΖ, συμπτύσσεται κατὰ
 τὸ Ζ, καὶ ἐπὶ ὧν ἡ ΓΖ·
 συμβαλεῖ ἀρα ἡ ΓΖ τῇ
 ταμῇ· συμβαλλέσθω κα-
 τὰ τὸ Α, ἔστι δὲ Α τῇ
 ΓΔ τοῦ ὅλλου ἡ χθῶν
 ἡ ΑΒ, ἐπεὶ οὖν διάμετρος

ἔστιν ἡ ΕΖ καὶ τῆ ΓΔ δὴ αὖτε πίμνοι, ἔτις ὡς ἀλλή-
 λως αὐτῇ δὴ αὖτε πίμνοι καὶ αὖτε ἐπὶ τῆ ΑΗ καὶ ΜΒ. καὶ
 ἐπὶ αὖτε ἐπὶ τῆ ΓΒ καὶ τῆ ΕΔ καὶ ἐπὶ αὖτε ἐπὶ τῆ ΕΔ καὶ τῆ
 ΓΖΔ. ἴση αὖτε ἡ ΑΗ καὶ τῆ ΗΚ, ὡς καὶ ἡ ΗΚ καὶ τῆ
 ΗΒ ἐπὶ ἴση ὅτι αὖτε αὖτε αὖτε. καὶ αὖτε ἡ ΕΖ διά-
 μετρος ἐπὶ.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ 19.


Εάν τ' ἀπαξιωθῇ δὴ οὐκ ἐλάττωσι συμπί-
πτουσιν ἢ διὰ τὸ κέντρον καὶ συμπίπτουσιν τ'
ἐκκεντρίκῃ ἀγαστῇ διχασθῇ τ' ἐκείνης
ἐκκεντρίκῃ ἀγαστῇ.

ΕΣΤΩ-

PROP. XXXIX. Theor.

Si duæ rectæ oppositas sectiones contin-
gentes concurrant : quæ per punctum
concursum & centrum ducitur, re-
ctam tactus conjungentem bifariam
secabit.

ΕΣΤΩΣΑΝ ἀντικείμεναι τμαὶ αἱ A, B , καὶ ἡ Γ Δ δύο εὐθεῖαι ἡχθώσων ἐφαπτόμεναι αἱ $\Gamma E, E \Delta$, ἔπεὶ εὐχθῶν ἡ $\Gamma \Delta$, ἔστω δὲ ΓZ τῆς $Z \Delta$. λέγω ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΓZ τῇ $Z \Delta$.
Εἰ γὰρ μὴ, περμῆσθω ἡ $\Gamma \Delta$ διχα κατὰ τὸ H , καὶ ἐπεὶ εὐχθῶν ἡ $H E$, ἡ $H E$ ἄρα διάμετρος ἐστίν. ἐστὶ δὲ καὶ ἡ $E Z$ κέντρον ἄρα ἐστὶ τὸ E , ἡ ἄρα σύμπτωσις τῆς ἐφαπτομένης ὅτι τῆς κέντρος ἐστὶ τῆς τμῶν, ὑπὲρ αὐτοῦ ἐστίν. ἡ ΓZ ἄρα τῇ $Z \Delta$ ἐστὶν ἴση.



SINT oppositæ sectiones A, B , & ipsas A, B duæ rectæ $\Gamma E, E \Delta$ contingant, & jungatur $\Gamma \Delta$, & ducatur diameter $E Z$: dico ΓZ ipsi $Z \Delta$ esse æqualem.


Si enim non ita sit, secetur $\Gamma \Delta$ bifariam in H , & jungatur $H E$: ergo [per præc.] $H E$ diameter est. sed & $E Z$ est diameter; punctum igitur E centrum erit: idcircoque rectæ, quæ contingunt sectiones, in centro ipsarum convenient, quod [per 31. 1. huj.] est absurdum. ergo ΓZ ipsi $Z \Delta$ æqualis est.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ μ'.

Εάν τ' ἀντικείμεναι δύο εὐθεῖαι ἐφαπτόμεναι συμπίπτωσι, καὶ ἀφ' ἧς συμπίπτουσιν εὐθεῖα ἀχθῇ παρὰ τῆς αἰσῆς ἀπὸ τοῦ ἐκκεντρώσεως συμπίπτουσα τῶν τμῶν· αἱ δὲ τῆς συμπίπτουσι ἀχθόμεναι ὅτι μὲν τῆς αἰσῆς ἀπὸ τοῦ ἐκκεντρώσεως ἐφαπτομένη τῆς τμῶν.

ΕΣΤΩΣΑΝ ἀντικείμεναι τμαὶ αἱ A, B , καὶ ἡ Γ Δ δύο εὐθεῖαι ἡχθώσων ἐφαπτόμεναι αἱ $\Gamma E, E \Delta$, ἔπεὶ εὐχθῶν ἡ $\Gamma \Delta$, ἔστω δὲ ΓZ τῆς $Z \Delta$ ὡς ἀλλήλος ἡχθῶν ἡ $Z E H$, ἐπερμῆσθω ἡ $\Gamma \Delta$ διχα κατὰ τὸ Θ , ἔπεὶ εὐχθῶσων αἱ $Z \Theta, \Theta H$: λέγω ὅτι αἱ $Z \Theta, \Theta H$ ἐφαπτομένη τῆς τμῶν.

Επεὶ εὐχθῶν ἡ $E \Theta$ διάμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ $E \Theta$ ὁρμή, πλαγίως δὲ συζυγῆς αὐτῇ ἡ διὰ τῆς κέντρος τῇ $\Gamma \Delta$ ὡς ἀλλήλος ἀχομένη. εἰλήφθω τὸ κέντρον τὸ X , καὶ τῇ $\Gamma \Delta$ ὡς ἀλλήλῃ ἡχθῶν ἡ $A X B$: αἱ $\Theta E, A B$ ἄρα συζυγεῖς εἰσι διαμέτροι, καὶ περὶ τὸν κέντρον ἡ $\Gamma \Theta$ ὅτι τῶν δὲ τμῶν διάμετρον, ἐφαπτομένη δὲ τῆς τμῆς ἡ ΓE συμπίπτουσα τῇ δὲ τμῆς ΔE ἀπὸ τοῦ κέντρον ἡ $E X \Theta$ ἴση ἐστὶ τῇ δὲ τμῆς ἡμισείας τῆς δὲ τμῆς διάμετρον. καὶ ἐπεὶ περὶ τὸν κέντρον ἡ $Z E$, ἐπερμῆσθω ἡ $Z \Theta$ διὰ τῆς ἐφαπτομένης ἡ $Z \Theta$ τῆς A τμῆς. ὁμοίως δὲ καὶ ἡ $H \Theta$ ἐφαπτομένη τῆς B τμῆς· αἱ $Z \Theta, \Theta H$ ἄρα ἐφαπτομένη τῆς A, B τμῶν.



PROP. XL. Theor.

Si duæ rectæ lineæ oppositas sectiones contingentes concurrant, & per punctum concursus recta ducatur, tactus conjungenti parallēla sectionibusque occurrens: quæ ab occurrentibus ejus ad medium tactus conjungentis ducuntur, sectiones ipsas contingunt.

SINT oppositæ sectiones A, B , & ducantur duæ rectæ $\Gamma E, E \Delta$ contingentes A & B , jungaturque $\Gamma \Delta$, & per E ducatur $Z E H$ ipsi $\Gamma \Delta$ parallela, & secetur $\Gamma \Delta$ bifariam in Θ , & jungantur $Z \Theta, \Theta H$: dico $Z \Theta, \Theta H$ sectiones contingere.

Ducatur enim $E \Theta$: ergo [per 38. 2. huj.] $E \Theta$ recta diameter est, transversa vero ipsi conjugata ea est quæ per centrum ducitur parallela ipsi $\Gamma \Delta$. fumatur centrum X , & ducatur $A X B$ ipsi $\Gamma \Delta$ parallela: ergo $\Theta E, A B$ conjugatæ diametri sunt, atque ordinatim applicata est $\Gamma \Theta$ ad secundam diametrum; & ΓE sectionem contingit secundæ diametro occurrens: rectangulum igitur $E X \Theta$ [per 38. 1. huj.] æquale est quadrato dimidiæ secundæ diametri. & quoniam $Z E$ ordinatim applicatur & jungitur $Z \Theta$; propterea [per 38. 1. huj.] $Z \Theta$ contingit sectionem A . similiter & $H \Theta$ contingit sectionem B : igitur $Z \Theta, \Theta H$ sectiones, A, B contingunt.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ μα'.

Εάν εἰ ταῖς ἀντικείμεναις δύο εὐθεῖαι τέμνουσιν ἀλλήλας, μὴ ἀφ' ἧς κέντρος· ὅ τμήνουσιν ἀλλήλας διχα.

ΕΣΤΩΣΑΝ ἀντικείμεναι τμαὶ αἱ A, B , ἐν Γ Δ δύο εὐθεῖαι τέμνουσιν ἀλλήλας αἱ


PROP. XLI. Theor.

Si in oppositis sectionibus duæ rectæ lineæ se invicem secant, non transeuntes per centrum: sese bifariam non secabunt.

SINT oppositæ sectiones A, B , in quibus duæ rectæ $\Gamma B, A \Delta$ per centrum non transeuntes,

tes, se invicem secant in E: dico eas bifariam sese non secare.

Si enim fieri potest, secant sese bifariam, sitque X sectionum centrum, & jungatur BX: ergo [per 37. 2. huj.] BX diameter est. ducatur per X ipsi BG parallela XZ: erit [per 37. 2. huj.] XZ diameter ipsi EX conjugata. quæ igitur in Z sectionem contingit [ex def.] est parallela ipsi EX. eadem ratione, si ducatur XΘ parallela ΑΔ, quæ in Θ contingit sectionem ipsi BX est parallela: ergo quæ contingit sectionem in Z parallela est rectæ in Θ contingenti, quod fieri non potest: conveniunt enim inter sese, ut modo demonstratum est [per 31. 2. huj.] igitur ΓΒ, ΑΔ, per centrum non transeuntes, sese bifariam non secant.



ΓΒ, ΑΔ κατὰ τὸ Ε, μὴ διὰ τὸ κέντρον ἔσται· λέγω ὅτι ἔτι τέμνουσιν ἀλλήλας δίχα.

Εἰ γὰρ δυνατὸν, τιμνέτωσαν, καὶ τὸ κέντρον τῶν τομῶν ἔστω τὸ Χ, ἔστω ἐπιεύχθω ἡ ΕΧ· διάμετρος ἄρα ἔστω ἡ ΕΧ. ἤχθω διὰ τὸ Χ τῇ ΒΓ παράλληλος ἡ ΧΖ· ἡ ΧΖ ἄρα διάμετρος ἔσται ἐκ συζυγείας τῇ ΕΧ· ἡ ἄρα κατὰ τὸ Ζ ἐφαπτομένη παράλληλος ἐστὶ τῇ ΕΧ. κατὰ τὴν αὐτὴν δὲ, παράλληλος ἀχθείσθω τῇ ΧΘ τῇ ΑΔ, ἡ κατὰ τὸ Θ ἐφαπτομένη παράλληλος ἐστὶ τῇ ΕΧ· ὥστε ἡ κατὰ τὸ Ζ

ἐφαπτομένη παράλληλος ἐστὶ τῇ κατὰ τὸ Θ ἐφαπτομένη, ὅπερ ἄπορον· ἐδείχθη γὰρ ὅτι συμπίπτουσι. ἐκ ἄρα αἱ ΓΒ, ΑΔ, μὴ διὰ τὸ κέντρον ἔσται, τέμνουσιν ἀλλήλας δίχα.

PROP. XLII. Theor.


Si in oppositis sectionibus conjugatis, duæ rectæ lineæ se invicem secant, non transeuntes per centrum: bifariam sese non secabunt.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ μβ'.

Εάν ἐν ταῖς κατὰ συζυγίαν ἀντικείμεναις δύο εὐθείαις τέμνουσιν ἀλλήλας, μὴ διὰ τὸ κέντρον ἔσται· ἔτι τέμνουσιν ἀλλήλας δίχα.

SINT oppositæ sectiones conjugatæ Α, Β, Γ, Δ, & in sectionibus Α, Β, Γ, Δ duæ rectæ EZ, ΗΘ, non transeuntes per centrum, se invicem secant in K: dico EZ, ΗΘ sese bifariam non secare.

Si enim fieri potest, secant se bifariam, & sit X sectionum centrum, & ducatur quidem AB parallela ipsi BZ, & ΓΔ ipsi ΗΘ parallela; & jungatur KX: ergo [per 37. 2. huj.] KX, AB conjugatæ diametri sunt. & similiter XK, ΓΔ sunt conjugatæ diametri; quare [per 30. 1.] recta contingens sectionem in A est parallela rectæ in Γ contingenti*, quod fieri non potest: conveniunt enim, quoniam [per 19. 2. huj.] contingens in Γ sectiones Α, Β secat, & contingens in Α secat ipsas Γ, Δ. ac patet [per 21. 2. huj.] earum concursum esse in loco qui est sub angulo ΑΧΓ: igitur EZ, ΗΘ, per centrum non transeuntes, sese bifariam non secant.



ΕΣΤΩΣΑΝ κατὰ συζυγίαν ἀντικείμεναις τομαῖς αἱ Α, Β, Γ, Δ, καὶ ἐν ταῖς Α, Β, Γ, Δ τομαῖς δύο εὐθείαις τιμνέτωσαν ἀλλήλας αἱ ΕΖ, ΗΘ κατὰ τὸ Κ, μὴ διὰ τὸ κέντρον ἔσται· λέγω ὅτι ἔτι τέμνουσιν ἀλλήλας δίχα.

Εἰ γὰρ δυνατὸν, τιμνέτωσαν, καὶ τὸ κέντρον τῶν τομῶν ἔστω τὸ Χ, ἔστω τῇ μὲν ΕΖ ἤχθω παράλληλος ἡ ΑΒ, τῇ δὲ ΗΘ ἡ ΓΔ, καὶ ἐπιεύχθω ἡ ΚΧ· αἱ ΚΧ, ΑΒ ἄρα συζυγεῖς

εἰσι διαμέτροι. ὁμοίως ἔσται καὶ αἱ ΧΚ, ΓΔ συζυγεῖς εἰσι διαμέτροι· ὥστε ἡ κατὰ τὸ Α ἐφαπτομένη τῇ κατὰ τὸ Γ ἐφαπτομένη παράλληλος ἐστὶν, ὅπερ ἀδιώκτον· συμπίπτει γὰρ, ἐπεὶ δὲ ἡ μὲν κατὰ τὸ Γ ἐφαπτομένη τέμνει τὰς Α, Β τομαῖς, ἡ δὲ κατὰ τὸ Α τὰς Δ, Γ. καὶ φανερόν ὅτι ἡ σύμπτωσις αὐτῶν ἐν τῷ ὑπὸ τῷ ΑΧΓ γωνίᾳ τόπῳ ἐστὶν· ἐκ ἄρα αἱ ΕΖ, ΗΘ, μὴ διὰ τὸ κέντρον ἔσται, τέμνουσιν ἀλλήλας δίχα.

PROP. XLIII. Theor.

Si unam oppositarum sectionum conjugatarum recta in duobus punctis secet; & à centro duæ rectæ ducantur, una quidem ad medium rectæ secantis, altera vero ipsi parallela: erunt oppositarum sectionum conjugatæ diametri.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ μγ'.

Εάν μία τῶν κατὰ συζυγίαν ἀντικείμεναις εὐθείαις τέμνηται κατὰ δύο σημεῖα, καὶ διὰ τὸ κέντρον ἡ μὲν ἑκείνη μέση τὴν τέμνουσιν ἀχθῇ, ἡ δὲ παρὰ τὴν τομὴν συζυγεῖς ἔσονται ἀμέστροι τῇ ἀντικείμενῃ.

* Cum ex definitione diametri conjugatæ [def. prim. 17.] utraque sit parallela ipsi KX.

ΕΣΤΩΣΑΝ κατὰ συζυγίαν ἀντικείμεναι το-
μαὶ αἱ A, B, Γ, Δ , καὶ πυνέτω τὸ A ἐκθεῖα πρὸς
κατὰ δύο σημεῖα τὰ E, Z ,
καὶ πετμήσθω διχα ἡ ZE τῷ
 H , ἢ τὸ κέντρον ἔστω τὸ X , καὶ
ἐπιζεύχθω ἡ XH , ὡς ὅτι ἀλ-
ληλος δὲ ἦχθω τῇ EZ ἡ
 ΓX . λέγω ὅτι αἱ $AX, X\Gamma$
συζυγεῖς εἰσι διαμέτροι.

Επεὶ γὰρ διάμετρος ἐστὶν
ἡ AX , καὶ τὸ EZ διχα τέμνῃ·
ἢ κατὰ τὸ A ἐφαπτομένη
ὡς ὅτι ἀλλήλος ἐστὶ τῇ EZ , ὥστε
καὶ τῇ ΓX . ἐπεὶ ἔν ἀντικεί-
μεναι εἰσι τομαὶ, καὶ μίας αὐτῶν τῆς A ἡ X ἐφαπτο-
μένη κατὰ τὸ A , διὸ τὸ X κέντρον ἔστω X ἡ μὲν δὲ πρὸς τὴν
ἀπὸ τὴν διζεύγνυται ἡ XA , ἡ δὲ ὡς ὅτι πρὸς ἐφαπτο-
μένην ἡ ΓX . αἱ $XA, \Gamma X$ ἄρα συζυγεῖς εἰσι
διαμέτροι. τὸτο γὰρ περὶ δέδεικται.



SINT oppositæ sectiones conjugatæ A, B, Γ, Δ ;
& sectionem A quædam recta secet in
duobus punctis E, Z , &
 ZE bifariam dividatur in
 H ; sit autem X centrum;
jungaturque XH , & ΓX
ipsi EZ parallela ducatur:
dico $AX, X\Gamma$ conjugatas
diametros esse.

Quoniam enim AX dia-
meter est & EZ bifariam
secat: quæ in A contingit
sectionem parallela est [per
5. 2. huj.] ipsi EZ ; quare
& ipsi ΓX , quoniam igitur
oppositæ sectiones sunt,
& unam ipsarum A quædam recta in A contin-
git; à centro vero X ducuntur duæ rectæ, una
quidem XA ad tactum, altera vero ΓX contin-
genti parallela: erunt $XA, \Gamma X$ conjugatæ dia-
metri: hoc enim superius [per 20. 2. huj.] de-
monstratum est.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ μδ'.


Τῆς δοθείσης κώνος τομῆς τὴν διάμετρον εὑρεῖν.

ΕΣΤΩ ἡ δοθεῖσα κώνος τομή, ἐφ' ἧς τὰ $A, B,$
 Γ, Δ, E · δεῖ δὲ αὐτῆς πλὴν διάμετρον εὑρεῖν.

Γιγνέτω, καὶ ἔστω ἡ $\Gamma\Theta Z$.
ἀρχαῖων δὲ πεταγμένων
τῶν $\Delta Z, E\Theta$ ἐκ ἐκλυσθαι-
σῶν, ἔσται ἴση ἡ μὲν ΔZ τῇ
 ZB , ἡ δὲ $E\Theta$ τῇ ΘA . εἰάν
ἔν ταῖς $B\Delta, EA$
θέσθαι ὥστε παραλλήλως, ἔσται
δοθέντα τὰ Θ, Z σημεῖα, B
ὥστε θέσει ἔσται ἡ $Z\Theta\Gamma$.

Συμπληρώσεται δὲ ὥτως.

Ἐστω ἡ δοθεῖσα κώνος τομή,
ἐφ' ἧς τὰ A, B, Γ, Δ, E ση-
μεῖα, καὶ ἡχθῶσιν ὡς ὅτι ἀλλήλοι αἱ $B\Delta, AE$, καὶ
πετμήσθωσιν διχα κατὰ τὰ Z, Θ , ἐπὶ ζεύχθω-
σαι ἡ $Z\Theta$ διάμετρος ἔσται τῆς τομῆς. τῷ δὲ αὐτῷ
τρόπῳ καὶ ἀπείρους εὐρήσονται διαμέτρους.



PROP. XLIV. Probl.

Datae coni sectionis diametrum invenire.

SIT data coni sectio in qua puncta $A, B, \Gamma, \Delta,$
 E ; oportet ipsius diametrum invenire.

Factum sit, & diame-
ter sit $\Gamma\Theta Z$: ductis ideo
ordinatim applicatis $\Delta Z,$
 $E\Theta$ & productis; erit
 ΔZ æqualis ZB , & $E\Theta$
ipsi ΘA . si igitur ordine-
mus $B\Delta, EA$, ut sint po-
sitione parallelæ: data e-
runt puncta Θ, Z ; quare
& $Z\Theta\Gamma$ positione data
erit.


Componetur itaque in
hunc modum. Sit data co-
ni sectio in qua $A, B, \Gamma, \Delta,$

E puncta, ducanturque $B\Delta, AE$ inter se parallelæ,
& in punctis Z, Θ bifariam dividantur: juncta
igitur $Z\Theta$ diameter erit sectionis. eadem ratione
& infinitas diametros inveniemus.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ με'.

Τῆς δοθείσης ἐλλείψεως ἢ ὑπερβολῆς τὸ κέντρον
εὑρεῖν.

ΤΟΤΤΟ δὲ φανερὸν. Εἰν γὰρ διαχθῶσι
δύο διαμέτροι τῆς τομῆς αἱ A, B, Γ, Δ , τὸ ση-




μεῖον, καὶ ὁ πύκνωσιν ἀλλήλας, ἔσται τῆς τομῆς τὸ
κέντρον, ὡς ὑπαινίσσεται.

PROP. XLV. Probl.

Datae ellipsos vel hyperbolæ centrum
invenire,

HOC itaque manifeste constat. Si enim duæ
sectionis diametri A, B, Γ, Δ ducantur; pun-



ctum in quo conveniunt [ex 25. dat.] erit datum,
centrumque sectionis, ut jam [in def. centri] posi-
tum est.

PROP.

PROP. XLVI. Probl.

Datæ conicæ sectionis axem invenire.

SIT conicæ sectio data primum PARABOLA, in qua puncta Z, Γ, E: itaque oportet ipsius axem invenire.

Ducatur enim diameter AB. & si quidem AB sit axis, factum erit quod proponebatur. sin minus, ponatur factum, & sit axis ΓΔ: ergo [per cor. 51. 1. huj.] axis ΓΔ ipsi AB est parallelus, & quæ ad ipsam ducuntur perpendiculares bifariam dividit. si igitur ordinemus EZ perpendicularem ad AB, erit ea [per 26. dat.] positione data, & idcirco BΔ æqualis ΔZ: quare [per 2. dat.] punctum Δ datum erit: dato igitur Δ puncto, & ducta ΔΓ ipsi AB positione datæ parallelæ, erit [per 29. dat.] & ipsa ΔΓ positione data.

Componetur autem in hunc modum. Sit data sectio Parabola, in qua puncta Z, A, E, ducaturque [per 44. 2. huj.] diameter AB, & [per 11. 1.] BE ad ipsam perpendicularis, quæ ad Z producat. si ergo BE sit æqualis BZ, constat AB axem esse. sin minus, [per 10. 1.] dividatur EZ in Δ bifariam, & [per 31. 1.] ipsi AB parallela ducatur ΓΔ, patet ΓΔ esse sectionis axem; est enim diametro parallela, adeoque [per cor. 51. 1. huj.] diameter est, & rectam EZ bifariam & ad rectos angulos secat: datæ igitur parabolæ axis inventus est ΓΔ.


Et patet unicum esse parabolæ axem. nam si alius axis sit, ut AB, erit hic ipsi ΓΔ parallelus; & secabit EZ, idque bifariam: ergo BE est æqualis BZ, quod fieri non potest.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ μς.

Τῆς διδύμου κέντρου τμήτης τῆς ἀξὸς εὐρεῖν.

ΕΣΤΩ ἡ δοθεῖσα κώνη τομῇ πλεονέκων ὡς ὁ βολή, ἐφ' ἧς τὰ Z, Γ, E: δεῖ δὲ αὐτῆς τὴν ἀξὸν εὐρεῖν.

Ἡχθῶ γὰρ αὐτῆς διάμετρος ἡ AB. εἰ μὲν ἔν ἡ AB ἀξὼν ἐστὶ, γενοῦντος αὐτοῦ ἐστὶ τὸ ὁριζήσασθαι· εἰ δὲ οὐκ, γενομένου, καὶ ἔσω ἀξὼν ὁ ΓΔ· ὁ ΓΔ ἀξὼν ἀξὼν παράλληλος ἐστὶ τῇ AB, καὶ τὰς ἀγομένους ἐπ' αὐτὴν καθεύτας ὁρθὰ τέμνει. εἰ μὲν ἔν τῇ EZ καθεύτου ὅππῃ τῷ AB, ἔσται ἴση καὶ διὰ τὴν ἴση ἐστὶν ἡ EΔ τῇ ΔZ· δοθέν ἄρα ἐστὶ τὸ Δ. δεδομένης ἄρα τῇ Δ, ὡς ἔστι ἴση τῷ AB ἡ κεντρὴ ἡ ΓΔ, ἴσεται ἄρα ἐστὶν ἡ ΓΔ.



Συμπληρώσας ὅτι ἔστιν. Ἐστω ἡ δοθεῖσα ὡς ὁ βολή, ἐφ' ἧς τὰ Z, A, E, καὶ ἡχθῶ αὐτῆς διάμετρος ἡ AB, καὶ ἐπ' αὐτὴν καθεύτας ἡ BE, καὶ ἐκβεβλήσας ὅππῃ τὸ Z. εἰ μὲν ἔν ἴση ἐστὶν ἡ EB τῇ BZ, φανερόν ὅτι ἡ AB ἀξὼν ἐστὶν. εἰ δὲ οὐκ, περμήσας ἡ EZ ὁρθὰ τῷ Δ, ἐστὶν ἡ AB παράλληλος ἡχθῶ ἡ ΓΔ. φανερόν δὲ ὅτι ἡ

ΓΔ ἀξὼν ἐστὶ τὴν τομῇ, ὡς ὁ βολή, καὶ ἡ AB διάμετρος, καὶ τῇ EZ ὁρθὰ τέμνει. τῆς ἄρα δοθείσης ὡς ὁ βολή ὁ ἀξὼν εὐρεῖται ὁ ΓΔ.


Καὶ φανερόν, ὅτι εἰς ἀξὸν ἐστὶ τὴν ὡς ὁ βολή. εἰ γὰρ ἄλλος ἔσται, ὡς ὁ AB, ἔσται τῇ ΓΔ παράλληλος, καὶ τῷ EZ τέμνει, ὡς καὶ ὁρθὰ. ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ BE τῇ BZ, ὅπερ ἄτοπον.

PROP. XLVII. Probl.

Datæ hyperbolæ vel ellipseos axem invenire.

SIT HYPERBOLA, vel ELLIPSIS ABΓ: oportet igitur ipsius axem invenire.

Pone jam inventum, & sit KΔ, centrum vero sectionis sit K: ergo KΔ rectas ad ipsam ordinatim applicatas bifariam & ad rectos angulos secat. ducatur perpendicularis ΓΔΑ, & jungantur ΚΑ, ΚΓ. quoniam igitur ΓΔ æqualis est ΔΑ; ergo & [per 4. 1.] ΓΚ ipsi ΚΑ est æqualis. ergo, si punctum Γ datum sit, erit ΓΚ data: adeoque circulus centro Κ & intervallo ΓΚ descriptus etiam per ipsum Α transibit, & [per 6. def. dat.] erit positione datus.




ΠΡΟΤΑΣΙΣ μς.

Τῆς διδύμου ὑπερβολῆς ἢ ἐλλείψεως τῆς ἀξὸς εὐρεῖν.

ΕΣΤΩ ΥΠΕΡΒΟΛΗ ἢ ΕΛΛΗΪΣ ABΓ· δεῖ δὲ αὐτῆς τὸν ἀξὸν εὐρεῖν.

Εὐρήσας, καὶ ἔσω ὁ ΚΔ, κέντρον ὅτι τὴν τομῇ τὸ Κ· ἡ ἄρα ΚΔ τὰς ἐπ' αὐτὴν πεπηγμένους καταγομένους ὁρθὰ καὶ πρὸς ὁρθὰς τέμνει. ἡχθῶ καθεύτος ἡ ΓΔΑ, ἐπεὶ ζεύχουσιν αἱ ΚΑ, ΚΓ.

ἐπὶ ἔν ἴση ἐστὶν ἡ ΓΔ τῇ ΔΑ· ἴση ἄρα ἡ ΓΚ τῇ ΚΑ. εἰ μὲν ἔν τῇ EZ μὲν δοθέν τὸ Γ, ἔσται δοθεῖσα ἡ ΓΚ· ὡς ὁ κέντρον τῷ Κ, διαστήματι δὲ τῷ ΚΓ, κύκλος γραφόμενος, ἥξει καὶ διὰ τῆς Α, ἐστὶν ἴση δὲ δοθέντος.





δοθέντες. ὅτι διὰ τὴν ἁβγ τομήν δοθένται ἴσους·
δοθέν ἄρα τὸ Α. ὅτι ἡ γὰρ τὸ γ δοθέν· ἴσους ἄρα ἡ
ΓΑ. καὶ ὅτι ἴση ἡ ΓΔ τῇ ΔΑ· δοθέν ἄρα ἐστὶ τὸ
Δ. ἀλλὰ καὶ τὸ Κ δοθέν· δοθένται ἄρα τῇ ἴ-
σους ἡ ΔΚ.

Συμπλήσειν ὅτι ἔστω. Ἐστω ἡ δοθέντων ὑπερβολὴ
ἢ ἑλλειψίς ἡ ΑΒΓ, καὶ εἰληφθῶ αὐτῆς κέντρον τὸ
Κ, εἰληφθῶ δὲ ὅτι τὴν τομὴν τοχὸν σημειῶν τὸ Γ, καὶ
κέντρον τῶ Κ, διαστήματι τῇ τῶ ΚΓ, κύκλῳ γε-
γραμμένῳ ὁ ΓΒΑ, καὶ ἐπιζεύχθω ἡ ΓΑ, καὶ δὴχα
πυκνῶσαι κατὰ τὸ Δ, καὶ ἐπιζεύχθωσαν αἱ ΚΓ, ΚΑ,
ἐδὴχθω ἡ ΚΔ ὅτι τὸ Β. ἐπεὶ ἂν ἴση ἐστὶν ἡ ΑΔ

est autem [ex hyp.] & sectio ΑΒΓ positione data :
ergo [per 25. dat.] & punctum Α. sed & Γ est
datum : [assumptum sc.] data igitur [per 26. dat.]
positione est ΓΑ. & est ΓΔ ipsi ΔΑ æqualis : ergo
[per 7. dat.] punctum Δ datur. sed & ipsum Ε :
igitur ΔΚ [per 26. dat.] positione data erit.

Componetur autem hoc modo. Sit data Hy-
perbola vel Ellipsis, ΑΒΓ, & sumpto [per 45. 2.
huj.] Κ ipsius centro, in sectione capiatur quod-
libet punctum Γ, & ex centro Κ, intervallo-
que ΚΓ circulus describatur ΓΒΑ, & jungatur
ΓΑ & [per 10. 1.] bifariam secetur in Δ, & jun-
gantur ΚΓ, ΚΑ & ΚΔ quæ ad Β producat. ita-
que quoniam ΑΔ est æqualis ΔΓ, & ΔΚ com-



τῇ ΔΓ, κοινὴ δὲ ἡ ΔΚ· δύο ἄρα αἱ ΓΔ, ΔΚ δυσὶ
ἴσας ΑΔ, ΔΚ ἴσας εἰσὶ καὶ βάσις ἄρα ἡ ΚΑ τῇ ΚΓ
ἴση· ἡ ἄρα ΚΒΔ τὴν ΑΔΓ δὴχα πὶ καὶ πρὸς ὁ-
ρθὰς πύμνει· ἄρα ἡ ἄρα ἐστὶν ἡ ΚΔ. ἡχθῶ δὴχα
Κ τῇ ΓΑ ὁμοεικέλης ἡ ΜΚΝ· ἡ ἄρα ΜΝ ἄρα
ἐστὶ τὴν τομὴν συζυγὴς τῇ ΒΚ.

munis: erunt duæ lineæ ΓΔ, ΔΚ duabus ΑΔ,
ΔΚ æquales : est igitur [per 4. 1.] basis ΚΑ æ-
qualis basi ΚΓ : quare recta ΚΒΔ ipsam ΑΔΓ
bifariam & ad rectos angulos secat : & idcirco
[per def 18.] ΚΔ est axis. ducatur per Κ ipsi
ΓΑ parallela ΜΚΝ : ergo ΜΝ est axis sectionis
ipsi ΒΚ conjugatus.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ μί.



Δεδειγμένον δὲ τίεται, ἔστιν ἔγωγε δείξαι ὅτι ἄλλοι
ἄξονες τῶ αὐτῶν τομῶν οὐκ εἰσὶν.

PROP. XLVIII. Theor.

His autem demonstratis, reliquum est
ut ostendamus non esse alios axes ipsa-
rum sectionum.

Εἰ γὰρ δυνατὸν, ἔστω καὶ ἕτερος ἄξων ὁ ΚΗ· κατὰ
τὴν αὐτὴν δὲ τῇς ἐμπροσθεν, ἀχθέσης κατὰ

SI enim fieri potest, sit axis alius ΚΗ : ergo
ducta perpendiculari ΑΘ, ex iis quæ su-



τῆς ΑΘ, ἴση ἐστὶν ἡ ΑΘ τῇ ΘΑ· ὥστε καὶ ἡ
ΑΚ τῇ ΚΑ ἴση. ἀλλὰ καὶ τῇ ΚΓ· ἴση ἄρα ἡ
ΚΑ τῇ ΚΓ, ὅπερ ἄτοπον. ὅτι μὲν ἂν καὶ ὁ ΑΕΓ
κύκλῳ κατ' ἄλλο σημειῶν μεταξὺ τῶν Α, Γ ὅ
συμβάλλει τῇ τομῇ, ὅτι μὲν τὴν ὑπερβολῆς φανερόν.
ὅτι ἡ τὴν ἑλλειψίως κάθεται ἡχθῶσαν αἱ ΓΡ, ΑΣ.

pra diximus, erit ΑΘ æqualis ΘΑ : quare [per
4. 1.] & ΑΚ ipsi ΚΑ, ut & ipsi ΚΓ æquatur :
sunt igitur ΚΑ, ΚΓ inter se æquales, quod est ab-
surdum. circulum autem ΑΕΓ non occurrere
sectioni in alio puncto inter Α, Γ, in hyper-
bola quidem perspicuum est. in ellipsi vero du-
cantur perpendiculares ΓΡ, ΑΣ : & quoniam
Μ m Κ Γ

λοις τὰ Α Ε, Γ Ζ καὶ τὰ Ε Β, Ζ Δ· ἴσον ἄρα τὸ Η Β τῷ Ζ Δ. ἀλλὰ καὶ τὸ Α Η τῷ Γ Ζ· τὸ Α Β ἄρα τῷ Γ Δ ὅτι ἴσον. Φανερὸν δὲ ὅτι, ἐὰν τὸ πρῶτον δευτέρῃ ὑπερέχη πάλιν καὶ τὸ τρίτον τετάρτῃ ὑπερέχη τῷ αὐτῷ, τὸ πρῶτον καὶ τὸ τετάρτον ἴσα ὅτι τῷ δευτέρῃ καὶ τῷ τρίτῳ, κατὰ τὴν καλὴν ἀριθμητικὴν μισότητά. ἐὰν γὰρ, τέτων ὑποκειμένων, ὑπάρχη ὡς τὸ πρῶτον πρὸς τὸ τρίτον ὅπως τὸ δεύτερον πρὸς τὸ τετάρτον, ἴσον ἔσται τὸ μὲν πρῶτον τῷ τρίτῳ, τὸ δὲ δεύτερον τῷ τετάρτῳ. δυνάτον δὲ εἶναι ἄλλων τῶν διειχθῆναι, ἀλλὰ τὸ δεῖχθαι ἐν τῷ εἰκοστῷ πέμπτῳ θεωρήματι τῇ πέμπτῃ βιβλίῃ τῆς Εὐκλείδους στοιχειώσεως, ἐὰν τρία ἢ περισσότερα ἀνάλογον ᾖ, τὸ πρῶτον καὶ τὸ τετάρτον δύο τῶν λοιπῶν μέγιστα ἔσται.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΜΘ'.

Κώνη τομῆς δοθείσης, καὶ σημείον μὴ ἐντὸς τῆς τομῆς· ἀγαγεῖν ἀπὸ τοῦ σημείου εὐθεΐαν καὶ ἐν ὅπῃ φαύλαται τῇ τομῇ.

ΕΣΤΩ ἡ δοθεῖσα κώνη τομὴ πρῶτον Παραβολή, ἥς ἄξων ἡ Β Δ· δεῖ δὲ ἀπὸ τοῦ δοθέντος σημείου, ὃ μὴ ἐστὶν ἐντὸς τῆς τομῆς, ἀγαγεῖν εὐθεΐαν ὡς παρὰκειται.

Τὸ δὲ δοθὲν σημεῖον, ἢ τὸ ὅτι τῆς γραμμῆς ἐστὶν, ἢ ὅτι τῆς ἄξωνος, ἢ ἐν τῷ λοιπῷ ὅπως τόπω.

Ἐστω γὰρ ὅτι τῆς γραμμῆς, καὶ ἔστω τὸ Α· καὶ γεγενητόν, καὶ ἔστω ἡ Α Ε, ἡ κάθετος ἡ Α Δ· ἔσται δὲ ἡ ἴση ἡ Β Ε τῇ Β Δ. καὶ ἐστὶ δοθεῖσα ἡ Β Δ· δοθεῖσα ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ Β Ε. καὶ ἐστὶ τὸ Β δοθὲν· δοθὲν ἄρα καὶ τὸ Ε. ἀλλὰ καὶ τὸ Α· γέσται ἄρα ἡ Α Ε.

Συμπληροῦται δὲ ὅτως. ἡχθὼς ἀπὸ τοῦ Α κάθετος ἡ Α Δ, καὶ κείσθω τῇ Β Δ ἴση ἡ Β Ε, ἡ ἐπιζεύχθω ἡ Α Ε· φανερὸν δὲ ὅτι ἐφάπτεται τῆς τομῆς ἡ Α Ε.

ΕΣΤΩ πάλιν τὸ δοθὲν σημεῖον ὅτι τῆς ἄξωνος τὸ Ε· καὶ γεγενητόν, καὶ ἡχθὼς ἐφαπτομένη ἡ Α Ε, καὶ κάθετος ἡ Α Δ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ Β Ε τῇ Β Δ. καὶ δοθεῖσα ἡ Β Ε· δοθεῖσα ἄρα καὶ ἡ Β Δ. καὶ ἐστὶ δοθὲν τὸ Β· δοθὲν ἄρα καὶ τὸ Δ. καὶ ἐστὶν ὁρθὴ ἡ Δ Α· γέσται ἄρα ἡ Δ Α· δοθὲν ἄρα τὸ Α. ἀλλὰ καὶ τὸ Ε· γέσται ἄρα ἡ Α Ε.

Συμπληροῦται δὲ ὅτως. κείσθω τῇ Β Ε ἴση ἡ Β Δ, ἡ ἀπὸ τοῦ Ε Δ τῇ Ε Δ ὁρθὴ ἡ Δ Α, καὶ ἐπιζεύχθω ἡ Α Ε· φανερὸν δὲ ὅτι ἐφάπτεται ἡ Α Ε. φανερὸν δὲ ὅτι, ἐὰν δοθὲν σημεῖον τὸ αὐτὸ ἢ τῷ Β, ὅτι ἢ ἀπὸ τοῦ Β ὁρθὴ ἀγομένη ἐφάπτεται τῆς τομῆς.

ΕΣΤΩ δὲ τὸ δοθὲν σημεῖον τὸ Γ· καὶ γεγενητόν, καὶ ἔστω ἡ Γ Α, καὶ ἀπὸ τοῦ Γ τῷ ἄξωνι, τέτρεται τῇ Β Δ, ὡς ὁμοῦ ἡχθὼς ἡ Γ Ζ· γέσται ἄρα ἐστὶν ἡ Γ Ζ. καὶ ἀπὸ τοῦ Α ὅτι τῇ Γ Ζ πταγμύτως ἡχθὼς ἡ Α Ζ· ἔσται δὲ ἴση ἡ Γ Η τῇ Ζ Η· καὶ ἐστὶ δοθὲν τὸ Η· δοθὲν ἄρα καὶ τὸ Ζ. καὶ ἀνήκει

supponuntur Α Ε, Γ Ζ, & Ε Β, Ζ Δ: æquales igitur sunt Η Β, Ζ Δ. sed est Α Η ipsi Γ Ζ æqualis: ergo Α Β ipsi Γ Δ æqualis erit. Perspicuum autem est, si prima excedat secundam magnitudine aliqua, & eadem magnitudine tertia quarram excedat: primam & quartam secundæ & tertiæ æquales esse, juxta arithmetice proportionem. Etenim si, his positis, sit ut prima ad tertiam ita secunda ad quartam: prima quidem tertiæ æqualis erit: secunda vero quartæ. potest etiam hoc aliter demonstrari, ex eo quod in vigesimo quinto theoremate quinti libri elementorum Euclidis demonstratum est, nempe, si quatuor magnitudines proportionales fuerint, primam & quartam reliquis duabus majores esse.

PROP. XLIX. Probl.

Data conic sectione, & puncto non intra sectionem dato; ab eo rectam ducere quæ sectionem contingat.

SIT data conic sectio primum Parabola, cujus axis Β Δ: oportet vero à puncto non intra sectionem dato rectam ducere, ut ante propositum est.

Itaque datum punctum vel est in linea parabolica, vel in axe, vel in loco quod extra relinquitur.

Sit primum in ipsa linea curva, sitque Α. puta factum, & sit Α Ε, ducaturque perpendicularis Α Δ, quæ [per 30.dat.] positione data erit, & erit [per 35.1.huj.] Β Ε æqualis Β Δ. at Β Δ est data: data igitur est Β Ε. estque punctum Β datum: ergo & punctum Ε. sed datum quoque est Α punctum: recta igitur Α Ε [per 26.dat.] positione data erit.

Componetur autem in hunc modum. Ducatur ex puncto Α perpendicularis Α Δ, ponaturque Β Ε ipsi Β Δ æqualis, & jungatur Α Ε: patet itaque [per 35. 1. huj.] Α Ε sectionem contingere.

SIT rursus punctum Ε in axe datum. factum sit, & ducatur recta Α Ε sectionem contingens, & perpendicularis ducatur Α Δ: ergo [per 35. 1. huj.] Β Ε est æqualis Β Δ. & data est Β Ε: igitur & Β Δ. at datum est Β punctum: ergo Δ datum erit. sed Δ Α est normalis, adeoque [per 30.dat.] positione datur: igitur & punctum Α datum est. sed & Ε datum: igitur Α Ε [per 26.dat.] datur positione.

Componetur itaque in hunc modum. Ponatur ipsi Β Ε æqualis Β Δ, & à puncto Δ ducatur Δ Α ipsi Ε Δ normalis, jungaturque Α Ε: manifestum igitur est [per 35. 1. huj.] rectam Α Ε contingere sectionem. constat etiam, si datum punctum sit idem quod Β, normalem ab eo ductam sectionem ipsam contingere.

SIT datum punctum Γ: & factum jam sit, sitque Γ Α contingens, & per Γ ducatur Γ Ζ parallela axi, hoc est ipsi Β Δ: ergo [per 28.dat.] Γ Ζ positione data est. à puncto Α ad Γ Ζ ordinatim applicetur Α Ζ: eritque [per 35. 1. huj.] Γ Η æqualis Ζ Η. & Η [per 25.dat.] est datum: datum igitur erit & Ζ. ordinatim autem applicetur Ζ Α,

ZA , five parallela est rectæ in H sectionem contingenti: data igitur est [per 28.dat.] ZA positione, & idcirco [per 25.dat.] punctum A datum. sed & [ex hyp.] punctum Γ : ergo [per 26.dat.] ΓA positione data erit.

Componetur autem hoc modo. Ducatur [per 31.1.] per Γ ipsi $B\Delta$ parallela ΓZ : ponaturque ZH æqualis ΓH , & rectæ in H contingenti sectionem [per modo dicta ductæ] parallela ducatur ZA , & jungatur $A\Gamma$: perspicuum igitur est illam problema conficere.

SIT rursus Hyperbola, cujus axis $\Gamma B\Delta$, centrum Θ , & asymptoti ΘE , ΘZ : punctum autem datum, vel in sectione erit, vel in axe, vel intra angulum $E\Theta Z$, vel in loco qui deinceps est, vel in una asymptoton continentium sectionem, vel in loco intermedio inter rectas continentes angulum ad verticem anguli $Z\Theta E$.


Sit primum in sectione, ut A : & factum sit, & AH sectionem contingat, ducaturque perpendicularis $A\Delta$, & $B\Gamma$ sit transversum figuræ latus: erit itaque [per 36.1.huj.] ut $\Gamma\Delta$ ad ΔB ita ΓH ad $H B$. sed [per 1.dat.] ratio $\Gamma\Delta$ ad ΔB est data, quia utraque data est: ratio igitur ΓH ad $H B$ erit data. & est data $B\Gamma$: quare punctum H datum est. sed & ipsum A : ergo [per 26.dat.] AH data erit positione.

Componetur autem sic. Ducatur à puncto A perpendicularis $A\Delta$, & fiat ΓH ad $H B$ sicut $\Gamma\Delta$ ad ΔB , & jungatur AH : patet igitur rectam AH contingere sectionem.

RURSUS sit datum punctum H in axe: & factum jam sit, ducaturque contingens AH , & $A\Delta$ perpendicularis. pari ratione erit [per 36.1.huj.] ut ΓH ad $H B$ ita $\Gamma\Delta$ ad ΔB . & data est ΓB : ergo [per 7.dat.] punctum Δ datum. & est ΔA perpendicularis: quare positione data erit. & est sectio data positione: datum igitur [per 25.dat.] est A punctum. sed & ipsum H : ergo AH positione datur.

Componetur autem hoc modo. Ponantur alia eadem, & fiat ratio $\Gamma\Delta$ ad ΔB eadem quæ est ΓH ad $H B$; & ducta ΔA perpendiculari, jungatur AH : constat igitur [per 34.1.huj.] ipsam AH problema conficere; & à puncto H rectam aliam duci posse, quæ sectionem ad alteras partes contingat.

ISDEM positis, sit datum punctum K in loco, qui intra angulum sub rectis $E\Theta Z$ conti-



ή ZA παραγόμεως, τέτοιον ὡς ἐγγρά-
ληλθῇ τῇ κατὰ τὸ H ἐφαπτο-
μένη· γέσσει ἄρα ἐστὶν ἡ ZA . δο-
θέν ἄρα καὶ τὸ A . ἀλλὰ καὶ
τὸ Γ . γέσσει ἄρα ἐστὶν ἡ ΓA .


Συμπληρῶσι δὲ ὕτως. ἤχθω διὰ
τῶν Γ ὡς ἐγγράληλθῇ τῇ $B\Delta$ ἡ ΓZ ,
καὶ κείτω τῇ ΓH ἡ ZH ἴση, καὶ
τῇ κατὰ τὸ H ἐφαπτομένη πα-
ράλληλος ἤχθω ἡ ZA , καὶ ἐπι-
ζεύχθω ἡ $A\Gamma$. φανερόν δὲ ὅτι
ποιήσει τὸ πρόβλημα.

ΕΣΤΩ πάλιν ὑπερβολή, ἥς ἄξων ἡ $\Gamma B\Delta$,
κέντρον δὲ τὸ Θ , ἀσύμπτωτοι δὲ αἱ ΘE , ΘZ : τὸ
ᾧ διδόμενον σημῆον ἢ τοῖ δ τῆς δοθείσης, ἢ δ τῆς
ἑξ ἄξωνος, ἢ ἐν τῷ δ ὑπὸ τῇ $E\Theta Z$ γωνίας, ἢ ἐν τῷ
ἐφαπτομένης τόπῳ, ἢ δ τῆς μίας τῶν ἀσύμπτωτων τῇ
περὶ τῶν δ τῆς μίας, ἢ ἐν τῷ μεταξὺ τῶν περὶ τῶν δ
κατὰ κορυφὴν τῇ ὑπὸ τῇ $Z\Theta E$ γωνίας.

Εἴσω περὶ τὸν δ τῆς μίας, ὡς τὸ A . ἔ-
ργον, καὶ εἴσω ἐφαπτομένη ἡ AH , ἣ ἤχθω κατὰ-
τος ἡ $A\Delta$, πλαγία δὲ ἔστω δ ἡ $B\Gamma$. ἔστω δὲ ὡς
ἡ $\Gamma\Delta$ πρὸς ΔB ὕτως ἡ ΓH πρὸς
 $H B$. λόγος γὰρ τῆς $\Gamma\Delta$ πρὸς ΔB
δοθείς, δοθείσι γὰρ ἐκατέρᾳ. λό-
γος ἄρα καὶ τῆς ΓH πρὸς $H B$ δο-
θείς. καὶ ἐστὶ δοθείσα ἡ $B\Gamma$: δοθέν
ἄρα τὸ H . ἀλλὰ καὶ τὸ A . γέσσει
ἄρα ἡ AH .

Συμπληρῶσι δὲ ὕτως. ἤχθω
διὰ τῶν Γ κατὰ τὸν δ ἡ $A\Delta$, καὶ τῷ
τῆς $\Gamma\Delta$ πρὸς ΔB λόγῳ ὁ αὐ-
τὸς εἴσω ὁ τῆς ΓH πρὸς $H B$, καὶ
ἐπιζεύχθω ἡ AH . φανερόν δὲ ὅτι
ἡ AH ἐφαπτομένη τῇ τῆς μίας.

ΠΑΛΙΝ δὲ εἴσω τὸ δοθέν σημῆον ὅτι δ ἑξ ἄ-
ξωνος τὸ H . καὶ ἐργον, καὶ ἤχθω ἡ AH ἐφαπτομένη,
καὶ κατὰ τὸν δ ἡ $A\Delta$, καὶ τῷ
τῆς $\Gamma\Delta$ πρὸς ΔB ὕτως ἡ ΓH πρὸς
 $H B$. λόγος γὰρ τῆς $\Gamma\Delta$ πρὸς ΔB ,
καὶ ἐστὶ δοθείσα ἡ $B\Gamma$: δοθέν ἄρα τὸ H . καὶ
ἐστὶν ὁρθὴ ἡ $A\Delta$. γέσσει ἄρα
ἐστὶν ἡ $A\Delta$. γέσσει δὲ καὶ ἡ
τῆς δ δοθέν ἄρα τὸ A . ἀλ-
λὰ ἔτι τὸ H . γέσσει ἄρα ἐστὶν
ἡ AH .



Συμπληρῶσι δὲ ὕτως. ὑπακείτω πᾶσι μὲν ἄλλα
πᾶσι αὐτὰ, καὶ τῷ τῆς ΓH πρὸς $H B$ λόγῳ ὁ αὐτὸς
παραγόμεως ὁ τῆς $\Gamma\Delta$ πρὸς ΔB , καὶ ὁρθὴ ἤχθω ἡ
 ΔA , καὶ ἐπιζεύχθω ἡ AH . φανερόν δὲ ὅτι ἡ
 AH ποιῇ τὸ πρόβλημα, καὶ ὅτι διὰ τῆς H ἀχθόμενης
ἐπὶ τῇ ἐφαπτομένη τῇ τῆς μίας πᾶσι ἐπὶ τῇ μέρει.

ΤΩΝ αὐτῶν ὑπακείμενων, εἴσω τὸ δοθέν ση-
μῆον, ἐν τῷ ὅτι δ ὑπὸ τῇ $E\Theta Z$ γωνίας τόπῳ, τὸ
 K , καὶ

fariam secetur in E, junctaque ΘE producat; & positione data erit, diameter scilicet ipsi $K \Theta$ conjugata. ponatur ΘH æqualis $B \Theta$, & per A ducatur $\Lambda \Lambda$ parallela BH . quoniam igitur $K \Lambda, BH$ conjugatæ diametri sunt, & ΛK sectionem contingit, ipsique BH parallela ducta est $\Lambda \Lambda$: erit [per 38. 1. huj.] $K \Theta \Lambda$ æquale quartæ parti figuræ quæ ad BH constituitur; quare & ipsum datum erit. est autem [per 26.dat.] $K \Theta$ data: ergo [per 57.dat.] & $\Theta \Lambda$. sed & positione, & est datum punctum Θ : ergo & Λ . & per Λ ducta est $\Lambda \Lambda$ parallela ipsi BH positione datæ: igitur [per 28. dat.] ipsa positione dabitur. sed & sectio etiam datur positione: quare [per 25. dat.] & Λ punctum. sed & punctum K datur: ergo [per 26.dat.] ΛK positione data erit.


Componetur autem sic. Ponantur alia eadem, sitque datum punctum K in loco supra descripto: & juncta $K \Theta$ producat, & sumpto in sectione puncto Γ ducatur $\Gamma \Delta$ ipsi $K \Theta$ parallela, & $\Gamma \Delta$ bifariam in B secetur, junctaque $E \Theta$ producat, & ipsi $B \Theta$ ponatur æqualis ΘH : ergo $H B$ transversa diameter est ipsi $K \Theta \Lambda$ conjugata. ponatur vero quartæ parti figuræ quæ est ad BH æquale rectangulum $K \Theta \Lambda$, perque Λ ipsi BH parallela ducatur $\Lambda \Lambda$, & jungatur $K \Lambda$. patet igitur $K \Lambda$ sectionem contingere, per conversam trigefimi octavi theorematismis primi libri.

$\Lambda \Gamma$ si datum punctum sit in loco inter $Z \Theta \Pi$ interjecto, problema erit impossibile. recta enim contingens secabit $H \Theta$, & utrique ipsarum $Z \Theta$, $\Theta \Pi$ occurret; quod est absurdum, ex iis quæ in trigefimo primo theoremate primi libri, & in tertio hujus demonstrata sunt.

ISDEM positus, sit sectio data Ellipsis, datum vero punctum in sectione Λ ; & oporteat ab ipso Λ ducere rectam quæ sectionem contingat. Ponatur factum; sitque ea recta ΛH , & ab Λ ad $B \Gamma$ axem ordinatim applicetur $\Lambda \Delta$: erit igitur [per 47.2. huj.] punctum Δ datum, & [per 36.1. huj.] ut $\Gamma \Delta$ ad ΔB ita erit ΓH ad $H B$. sed [per 1. dat.] ratio $\Gamma \Delta$ ad ΔB data est: ergo & ratio ΓH ad $H B$ data erit; & idcirco [per 2.dat.] punctum H . sed & Λ datur: quare & ΛH erit positione data.

Componetur autem hoc pacto. ducatur perpendicularis $\Lambda \Delta$, & ipsius ΓH ad $H B$ ratio eadem sit [per 10.6.] quæ ratio $\Gamma \Delta$ ad ΔB , jungaturque ΛH : constat igitur [per 34. 1. huj.] ΛH sectionem contingere, sicut in hyperbola.

SIT rursus datum punctum K , à quo oporteat rectam contingentem ducere. factum sit, & sit ea recta $K \Lambda$, ductaque $K \Lambda \Theta$ per Θ centrum



$\Gamma \Delta$ διχα κατὰ τὸ E , καὶ $\Pi \Gamma \Delta$ χθῆσαι ἡ ΘE ἐκβληθῇ καὶ ἐκείνη θύσει, διὰ μέτρος ἴσαι συζυγῆς

τῇ $K \Theta$. κείνῳ δὲ τῇ $B \Theta$ ἴση ἡ ΘH , καὶ διὰ Γ τῇ BH ὁμοῦ καὶ ἡ $\Lambda \Lambda$. ἔσται δὲ, διὰ τὸ εἶναι πᾶς $K \Lambda$, BH συζυγῆς διὰ μέτρος, καὶ ἐφαπτομένην τῇ ΛK , καὶ τῇ $\Lambda \Lambda$ ἀχθῆσαι ὁμοῦ τῇ BH , τὸ ὑπὸ τῇ $K \Theta \Lambda$ ἴσον τῷ πεντάκτῳ μέρει Γ πρὸς τῇ BH ἔδωκεν. δοθέν ἄρα τὸ ὑπὸ $K \Theta \Lambda$. καὶ ἔστι δοθῆσαι ἡ $K \Theta$, δοθῆσαι ἄρα καὶ ἡ $\Theta \Lambda$. ἀλλὰ καὶ τῇ θύσει, καὶ ἔστι δοθέν τὸ Θ .

δοθέν ἄρα καὶ τὸ Λ . καὶ διὰ τῆς Λ ὁμοῦ θύσει πρὸς BH ἡ $\Lambda \Lambda$, θύσει ἄρα ἡ $\Lambda \Lambda$. θύσει δὲ καὶ ἡ $\Gamma \Delta$. δοθέν ἄρα τὸ Δ . ἀλλὰ καὶ τὸ K . θύσει ἄρα ἡ ΛK .

Συμπληρῶν δὲ ἔτω. ὑποκείτω πρὸς μὲν ἄλλα πρὸς αὐτῶν, τὸ δὲ δοθέν σημῆσον τὸ K ἐν τῷ πεντάκτῳ μέρει τῷ Γ καὶ ἐπιζυγῆσαι ἡ $K \Theta$ ἐκβληθῇ, καὶ εἰληφθῇ πρὸς σημῆσον τὸ Γ , καὶ ὁμοῦ πρὸς τῇ $K \Theta$ ὁμοῦ καὶ ἡ $\Gamma \Delta$, καὶ πεντάκτῳ ἡ $\Gamma \Delta$ διχα τῷ E , καὶ ἐπιζυγῆσαι ἡ $E \Theta$ ἐκβληθῇ, καὶ τῇ $B \Theta$ ἴση κείνῳ ἡ ΘH . ἡ ἄρα $H B$ πλαγία διὰ μέτρος ἐστὶ συζυγῆς τῇ $K \Theta \Lambda$. κείνῳ δὲ τῷ πεντάκτῳ τῷ Γ πρὸς τῇ BH ἔδωκεν ἴσον τὸ ὑπὸ $K \Theta \Lambda$, καὶ διὰ Γ τῇ BH ὁμοῦ καὶ ἡ $\Lambda \Lambda$, καὶ ἐπιζυγῆσαι ἡ $\Lambda \Lambda$. φανερόν δὲ ὅτι ἡ $\Lambda \Lambda$ ἐφαπτομένη τῇ $\Gamma \Delta$, διὰ τὸ ἀντιστοίχῳ Γ ἴση. ἔ. πρώτης βιβλίας.

$E \Lambda N$ δὲ ἐν τῷ πεντάκτῳ τῷ $Z \Theta \Pi$ δοθῇ, ἀδιύατον ἔσται τὸ πεντάκτῳ. ἡ γὰρ ἐφαπτομένη πρὸς τὸ $H \Theta$. ὥστε συμπέσει ἐκείνῳ τῷ $Z \Theta$, $\Theta \Pi$, ὅπερ ἀδιύατον, διὰ τὸ δεικνύμεν ἐν τῷ Λ . ἔ. πρώτης, καὶ ἐν τῷ τρίτῳ τέταρτης βιβλίας.


$T \Omega N$ αὐτῶν ὑποκειμένων, ἔστω ἡ $\Gamma \Delta$ ἑλλειψις, τὸ δὲ δοθέν σημῆσον ὅτι τῇ $\Gamma \Delta$ καὶ δέον ἔστω

ὅτι $\Gamma \Delta$ ἀγαγεῖν ἐφαπτομένην τῇ $\Gamma \Delta$. γενοίτω, ἔ. ἔστω ἡ ΛH , ἔ. πεντάκτῳ πρὸς $\Gamma \Delta$ ὅτι τὸν $B \Gamma$ ἄξονα ἡχθῇ ἡ $\Lambda \Delta$. ἔσται δὲ δοθέν τὸ Δ , καὶ ἔσται ὡς ἡ $\Gamma \Delta$ πρὸς ΔB ἔστω ἡ ΓH πρὸς $H B$. καὶ ἔστι λόγος τῷ


$\Gamma \Delta$ πρὸς ΔB δοθείς. λόγος ἄρα ἔ. τῷ ΓH πρὸς $H B$ δοθείς. δοθέν ἄρα τὸ H . ἀλλὰ καὶ τὸ Λ . θύσει ἄρα ἔ. ἡ ΛH .

Συμπληρῶν δὲ ἔτω. κείνῳ ἡ $\Lambda \Delta$, καὶ τῷ $\Gamma \Delta$ πρὸς ΔB λόγῳ ὁ αὐτὸς ἔστω ὁ ΓH πρὸς $H B$, ἔ. ἐπιζυγῆσαι ἡ ΛH . φανερόν δὲ ὅτι ἡ ΛH ἐφαπτομένη, ὡς περὶ καὶ ὅτι τῇ ὑπερβολῇ.

$E \Sigma T \Omega$ δὲ πάλιν τὸ δοθέν σημῆσον τὸ K , καὶ δέον ἔστω ἀγαγεῖν ἐφαπτομένην. γενοίτω, ἔ. ἔστω ἡ $K \Lambda$, ἔ. ἐπιζυγῆσαι ἡ $K \Lambda \Theta$ ὅτι τὸ Θ κέντρον ἐκβληθῇ



ἐκτελέσθω δὴ τὸ Ν· ἔστω δὲ θύσει. καὶ εἰς αὐτὴν
ἀρχὴν ἡ ΑΜ πεπεγμένη, ἔστω ὡς ἡ ΝΚ πρὸς ΚΑ & si ΑΜ ordinatim applicetur, erit [per 36. 1. huj.] ut ΝΚ ad ΚΑ ita ΝΜ ad ΜΑ. ratio autem ΚΝ ad ΚΑ [per 1. dat.] est data: ergo & data est ratio ΜΝ ad ΑΜ; quare [per 7. dat.] & punctum Μ datur. & ordinatim applicatur ΜΑ, parallela nempe rectæ in Α continenti: ergo ΜΑ positione datur, & idcirco punctum Α. sed & ipsum Κ est datum: igitur ΚΑ positione datur. Compositio autem eadem est quæ supra.



producatur in Ν: erit igitur ea positione data. [per 36. 1. huj.] ut ΝΚ ad ΚΑ ita ΝΜ ad ΜΑ. ratio autem ΚΝ ad ΚΑ [per 1. dat.] est data: ergo & data est ratio ΜΝ ad ΑΜ; quare [per 7. dat.] & punctum Μ datur. & ordinatim applicatur ΜΑ, parallela nempe rectæ in Α continenti: ergo ΜΑ positione datur, & idcirco punctum Α. sed & ipsum Κ est datum: igitur ΚΑ positione datur. Compositio autem eadem est quæ supra.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Ι΄.


Τῆς δοθείσης καὶ τομῆς ἐφαπτομένη ἀγαγεῖν, ἥτις
πρὸς τῷ ἄξονι γωνίαν ποιήσει, ὅπῃ ταῦτα τῇ
τομῇ, ἴση τῇ δοθείσῃ ὀξείᾳ γωνίᾳ.

PROP. L. Probl.

Data coni sectione, contingentem ducere, quæ cum axe, versus partes sectionis, angulum faciat dato angulo acuto æqualem.


ΕΣΤΩ κώνυς τομὴ πρὸς τὸν Παραβόλῃ, ἥς ἄξων
ὁ ΑΒ· δὲ δὴ ἀγαγεῖν ἐφαπτομένην τῇ τομῇ,
ἥτις πρὸς τῷ ΑΒ ἄξονι γωνίαν ποιήσει, ὅπῃ ταῦτα τῇ
τομῇ, ἴση τῇ δοθείσῃ ὀξείᾳ γωνίᾳ.
γεγονέτω, καὶ ἔστω ἡ ΓΔ· δοθεί-
σαι ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΒΔΓ γωνία.
ἡχθὼ κάθετος ἡ ΒΓ· ἔστι δὲ καὶ
ἡ πρὸς τῷ Β δοθείσα· λόγος
ἄρα τῷ ΔΒ πρὸς ΒΓ δοθείς.
τῷ ΒΔ πρὸς ΒΑ λόγος ἐστὶ
δοθείς· καὶ τῷ ΑΒ ἄρα πρὸς
ΒΓ λόγος ἐστὶ δοθείς. καὶ ἐστὶ
δοθείσα ἡ πρὸς τὸ Β γωνία·
δοθείσα ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ ΒΑΓ. καὶ ἐστὶ πρὸς θύσει τῇ
ΒΑ καὶ δοθέντι τῷ Α· θύσει ἄρα ἡ ΓΑ. θύσει δὲ
καὶ ἡ τομὴ· δοθέν ἄρα τὸ Γ. ἐφαπτομένη ἡ ΓΔ·
θύσει ἄρα ἐστὶν ἡ ΓΔ.

SIT coni sectio primum Parabola, cujus axis Α Β: oporteat itaque rectam ducere quæ sectionem contingat, quæque cum Α Β faciat angulum ad partes sectionis dato angulo acuto æqualem. Ponatur factum esse, & sit Γ Δ: datus igitur est Β Δ Γ angulus. ducatur perpendicularis Β Γ: est igitur angulus ad Β datus; quare [per 40. dat.] data est ratio Δ Β ad Β Γ. sed [per 35. 1. huj.] ratio Δ Β ad Β Α est data: ratio igitur Α Β ad Β Γ [per 8. dat.] data erit. & datus est angulus qui ad Β: ergo & Β Α Γ angulus est datus. & est ad rectam Β Α positione datam & ad datum punctum Α: igitur Γ Α positione dabitur. at sectio data est positione: ergo punctum Γ datum. & Γ Δ sectionem contingit: quare & positione data erit.



Συμπληρώσεται δὲ πρὸς βλήμα ἕτως. Ἐστω ἡ δο-
θείσα κώνυς τομὴ πρὸς τὸν Παραβόλῃ, ἥς ἄξων ἡ
ΑΒ, ἡ δὲ δοθείσα γωνία ὀξεία ἡ ὑπὸ ΕΖΗ· καὶ
ἐκλήφθω σημείον ὅπῃ τῷ ΕΖ τὸ
Ε, καὶ κάθετος ἡχθὼ ἡ ΕΗ, καὶ
πετμήσθω δίχα ἡ ΖΗ τῷ Θ,
καὶ ἐπέσχευθω ἡ ΘΕ, ἐστὶ τῇ ὑπὸ
τῷ ΗΘΕ γωνίᾳ ἴση συνεστήτω
ἡ ὑπὸ τῷ ΒΑΓ, καὶ ἡχθὼ κάθε-
τος ἡ ΒΓ, ἐστὶ τῇ ΒΑ ἴση κείσθω
ἡ ΑΔ, καὶ ἐπέσχευθω ἡ ΓΔ·
ἐφαπτομένη ἄρα ἐστὶν ἡ ΓΔ τῆς
τομῆς. λέγω δὲ ὅτι ἡ ὑπὸ τῷ
ΓΔΒ τῇ ὑπὸ τῷ ΕΖΗ ἐστὶν ἴση.
ἐπεὶ γὰρ ἐστὶν ὡς ἡ ΖΗ πρὸς ΗΘ ἕτως ἡ ΔΒ πρὸς
ΒΑ, ἐστὶ δὲ καὶ ὡς ΘΗ πρὸς ΗΕ ἕτως ἡ ΑΒ πρὸς
ΒΓ· δι' ἴσιν ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ ΖΗ πρὸς ΗΕ ἕτως ἡ
ΔΒ πρὸς τὴν ΒΓ. καὶ ἐστὶν ὁρθαὶ αἱ πρὸς τῷ Η,
Β γωνίαι· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ Ζ γωνία τῇ Δ γωνίᾳ.

Componetur autem problema hoc modo. Sit data coni sectio primum Parabola, cujus axis Α Β, datus autem angulus acutus Ε Ζ Η, sumpto- que in Ε Ζ puncto Ε, ducatur perpendicularis Ε Η, & Ζ Η in Θ bifariam secetur, & jungatur Θ Ε, & angulo Η Θ Ε æqualis constitutur angulus Β Α Γ; & ducta perpendiculari Β Γ ipsi Β Α ponatur æqualis Α Δ, jungaturque Γ Δ: ergo [per 35. 1. huj.] Γ Δ sectionem contingit. dico itaque angulum Γ Δ Β angulo Ε Ζ Η æqualem esse. quoniam enim [per constr.] est ut Ζ Η ad Η Θ ita Α Β ad Β Α, & est ut Θ Η ad Η Ε ita Α Β ad Β Γ: erit ex æquali [per 22. 5.] ut Ζ Η ad Η Β ita Δ Β ad Β Γ. sed [per constr.] anguli qui ad Η, Β recti sunt: angulus igitur Ζ [per 6. 6.] angulo Δ est æqualis.




SIT

Si τ sectio Hyperbola, ponaturque factum, & recta $\Gamma\Delta$ sectionem contingat: sumptoque X sectionis centro jungatur ΓX , & ΓE perpendicularis ducatur: ergo data est ratio rectanguli $X E \Delta$ ad quadratum ex $E \Gamma$; eadem enim est [per 37.1.huj.] quæ transversû lateris ad rectum. ratio autem quadrati ex ΓE ad quadratum ex $E \Delta$ est data, quia datus est uterque angulorum $\Gamma \Delta E$, $\Delta E \Gamma$: quare & rectanguli $X E \Delta$ ad quadratum ex $E \Delta$ ratio data est, ideoque ratio $X E$ ad $E \Delta$ data. sed [per 40.dat.] datur ratio ΓE ad $E \Delta$; quare [per 8. dat.] & ratio $X E$ ad $E \Gamma$ data est. & angulus qui ad E est datus: ergo [per 2. dat.] & qui ad X . & ad rectam $X E$ positione datam, & ad datum in ea punctum X , ducta est $X \Gamma$ in dato angulo: ergo & ΓX positione dabitur. data est autem & ipsa sectio positione: quare & Γ punctum. & [per 49. 2.huj.] ducta est $\Gamma \Delta$ contingens: igitur $\Gamma \Delta$ est positione data. ducatur $Z X$ sectionis asymptotos: ergo [per 3. 2. huj.] $\Gamma \Delta$ producta asymptoto occurret. occurrat in Z : erit igitur $Z \Delta E$ angulus angulo $Z X \Delta$ major. & propterea, in compositione problematis, oportebit datum angulum acutum majorem esse quam est dimidius ejus qui ab asymptotis continetur.

Componetur itaque problema hoc modo. Sit data hyperbola, cujus axis quidem $A B$, asymptotos autem $X Z$, & datus angulus acutus sit $K \Theta H$, qui sit major angulo $A X Z$: fiatque [per 23.1.] angulo $A X Z$ æqualis angulus $K \Theta \Lambda$, & à puncto A ad rectos angulos ipsi $A B$ ducatur $A Z$, in $H \Theta$ vero sumatur aliquod punctum H , à quo ad ΘK perpendicularis ducatur $H K$. quoniam igitur angulus $Z X \Lambda$ angulo $\Lambda \Theta K$ est æqualis, & anguli ad A , K recti sunt; erit [per 4. 6.] ut $X A$ ad $A Z$ ita ΘK ad $K \Lambda$. sed [per 8.5.] ΘK ad $K \Lambda$ majorem rationem habet quam ΘK ad $K H$: ergo quadratum ex $X A$ ad quadratum ex $A Z$ majorem habet rationem quam quadratum ex ΘK ad quadratum ex $K H$. ut autem quadratum ex $X A$ ad quadratum ex $A Z$ ita [per 1. 2.huj.] transversum figuræ latus ad rectum: quare transversum figuræ latus ad rectum majorem rationem habet quam quadratum ex ΘK ad quadratum ex $K H$. itaque si fiat ut quadratum ex $X A$ ad quadratum ex $A Z$ ita aliud quoddam ad quadratum ex $K H$: erit illud quadrato ex ΘK majus. sit rectangulum $M K \Theta$, & jungatur $H M$. igitur quoniam quadratum ex $M K$ majus est rectangulo $M K \Theta$; habebit quadratum ex $M K$ ad quadratum ex $K H$ majorem rationem quam rectangulum


$E \Sigma \tau \Omega$ ή τομή Υπερβολή, & γερονέτω, & έξω εφαπτομένη ή Γ Δ, & ελήφθω το κέντρον τ' παρής το Χ, & επεζεύχθω ή Γ Χ, και κάθετος ήχθω ή Γ Ε· λόγος άρα τ'ε' ύπό τ' Χ Ε Δ πρως το άπό τ' Ε Γ δοθείς, ο αυτός γάρ έστι τ'ω τ' πλαγίας πρως τ'ω όρθίαν. & τ' άπό τ' Γ Ε πρως το άπό τ' Ε Δ λόγος έστι δοθείς, δοθείσαι γδ έκαστα τ' ύπό Γ Δ Ε,



$\Delta E \Gamma$ γωνιών· λόγος άρα & τ' ύπό Χ Ε Δ πρως το άπό τ' Ε Δ δοθείς· ώς & τ' Χ Ε πρως Ε Δ λόγος έστι δοθείς. τ' δ' Ε Γ Ε πρως τ'ω Ε Δ λόγος έστι δοθείς· ώς & τ' Χ Ε πρως Γ Ε λόγος έστι δοθείς. & δοθείσαι ή πρως το Ε· δοθείσαι άρα & ή πρως τ'ω Χ. προς δ' έτερι εύθεία τ'ή Χ Ε & δοθέντι τ'ω Χ διηκται τις ή Γ Χ εν δεδομένη γωνία· θέ-

σει άρα ή Γ Χ. θέσει & ή τομή· δοθέν άρα το Γ. & διηκ' εφαπτομένη ή Γ Δ· θέσει άρα ή Γ Δ· ήχθω ασύμπτωτος τ' τομής ή Ζ Χ· ή Γ Δ άρα & πλαγίως συμπίπτει τ'ή ασυμπτώτ'ω. συμπίπτειτω κατ' το Ζ· μείζων άρα έστω ή ύπό Ζ Δ Ε γωνία τ'ής ύπό Ζ Χ Δ. δείξει άρα, εις τ'ω σύνθεσιν, τ'ω δεδομένην όθειαν γωνίαν μείζονα είναι τ' ήμισίαις τ' πενταχομίδης ύπό τ' ασυμπτώτων.

Συμπληρώσεται δ' ή τ'ω πενταγώνια έτως. Εστω ή μ'εν δοθείσα ύπερβολή ής άξων Α Β, ασύμπτωτος ή Χ Ζ, ή δ' έ δοθείσα γωνία όθειά, μείζων έστω τ' ύπό τ' Α Χ Ζ, ή ύπό Κ Θ Η· και έστω τ'ή ύπό τ' Α Χ Ζ ίση ή ύπό Κ Θ Λ, & ήχθω άπό τ' Α τ'ή Α Β προς όρθας ή Α Ζ, ελήφθω δ' έπ' σημείον όπ'ι τ' Η Θ το Η, & ήχθω άπ' αὐτ'ό όπ'ι τ'ω Θ Κ κάθετος ή Η Κ. έπει έν ίση έστω ή ύπό Ζ Χ Α τ'ή ύπό Λ Θ Κ, εϊσ' δ' έ και αϊ πρως τοίς Α, Κ γωνίαί όρθαί· έστω άρα ως ή Χ Α πρως Α Ζ έτως ή Θ Κ προς Κ Λ. ή δ' έ Θ Κ προς Κ Λ μείζονα λόγον έχει ήπερ ή Θ Κ προ Κ Η· ώς & και το άπό Χ Α προς το άπό Α Ζ μείζονα λόγον έχ' ήπερ το άπό Θ Κ προς το άπό Κ Η. ως δ' έ το άπό Χ Α προς το άπό Α Ζ έτως ή πλαγία πρως τ'ω όρθίαν· ή πλαγία άρα πρως τ'ω όρθίαν μείζονα λόγον έχ' ήπερ το άπό Θ Κ προς το άπό Κ Η. εάν δ' ή ποιήσωμεν ως το άπό Χ Α προς το άπό Α Ζ έτως άλλό τι προς το άπό Κ Η, μείζον έστω τ'ω άπό Θ Κ· έστω τ'ό ύπό Μ Κ Θ, & επεζεύχθω ή Η Μ. έπει έν μείζον έστι το άπό Μ Κ τ'ε' ύπό Μ Κ Θ· το άρα άπό Μ Κ προς το άπό Κ Η μείζονα λόγον έχ' ήπερ τ'ό ύπό Μ Κ Θ πρως το άπό Κ Η.




ΚΗ, πῦσι τὸ ἀπὸ ΧΑ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΖ. καὶ εἰς ποιήσωμεν ὡς τὸ δοτὸς ΜΚ πρὸς τὸ ἀπὸ ΚΗ ἕτως τὸ ἀπὸ ΧΑ πρὸς ἄλλο πῖ. ἔστω πρὸς εἰλατήν τὴν ἀπὸ ΑΖ, καὶ ἡ ἀπὸ τῆς Χ ὅτι τὸ ληφθὲν σημῶν ὁπλίζοντι μὲν εὐθεία ὁμοία ποιήσεται τρίγωνον· καὶ διὰ τῆς μείζων ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΖΧΑ τῆς ὑπὸ ΗΜΚ. καὶ ὡς δὴ τῇ ὑπὸ ΗΜΚ ἴση ἡ ὑπὸ ΑΧΓ· ἡ ἄρα ΧΓ πῖσι τὴν πῖσι. πῖσι κατὰ τὸ Γ, καὶ ἀπὸ τῆς Γ ἐφαπτομένης τῆς πῖσις ἡ ΧΔ, ἡ ΓΔ, καὶ καὶ ἄρα ἡ ΓΕ· ὁμοίον ἄρα ἐστὶ τὸ ΓΧΕ τρίγωνον τῷ ΗΜΚ· ἐστὶν ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ ΧΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΓ ἕτως τὸ ἀπὸ ΜΚ πρὸς τὸ ἀπὸ ΚΗ. ἐστὶ δὲ καὶ ὡς ἡ παραγία πρὸς τὴν ὀρθίαν ἕτως πῖ πῖ ὑπὸ ΧΕΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΓ, καὶ τὸ ὑπὸ ΜΚΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΚΗ, καὶ ἀνάπαλιν ὡς τὸ ἀπὸ ΓΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΧΕΔ ἕτως τὸ ἀπὸ ΗΚ πρὸς τὸ ὑπὸ ΜΚΘ· δι' ἴσιν ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ ΧΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΧΕΔ ἕτως τὸ ἀπὸ ΜΚ πρὸς τὸ ὑπὸ ΜΚΘ· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΧΕ πρὸς ΕΔ ἕτως ἡ ΜΚ πρὸς ΚΘ. ἢ ὡς ἡ ΓΕ πρὸς ΕΧ ἕτως ἡ ΗΚ πρὸς ΚΜ· δι' ἴσιν ἄρα ὡς ἡ ΓΕ πρὸς ΕΔ ἕτως ἡ ΗΚ πρὸς ΚΘ. καὶ εἰσὶν ὀρθαὶ αἱ πρὸς τῶν Ε, Κ γωνίαι· ἴση ἄρα ἡ πρὸς τῷ Δ γωνία τῇ ὑπὸ ΗΘΚ.

ΕΣΤΩ ἡ τμήν Ελλείψις, ἥς ἄξων ὁ ΑΒ· δεῖ ὅτι ἐφαπτομένην ἀγαγεῖν τῆς τμήνης, ἥτις πρὸς τῷ ἄξωνι, ὅτι πάντα τῇ τμήνι, ἴσην γωνίαν περικλείει τῇ δοθείσῃ ὀθείᾳ γωνίᾳ. Γεγονέντω, καὶ ἔστω ἡ ΓΔ· δοθείσα ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῇ ΓΔΑ γωνία. ἡ ΧΔ καὶ ἄρα ἡ ΓΕ· λόγος ἄρα ὁ ἀπὸ τῆς ΔΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΓ δοθείς. ἔστω κέντρον τῆς τμήνης τὸ Χ, καὶ ἐπιζεύχτω ἡ ΓΧ· ὅτι ἀπὸ τῆς ΓΕ πρὸς τὸ ὑπὸ τῇ ΔΕΧ λόγος ἐστὶ δοθείς, ὁ γὰρ αὐτός ἐστι τῷ τῇ ὀρθίᾳ πρὸς τῇ παραγίᾳ· καὶ ὁ ἀπὸ τῆς ΔΕ ἄρα πρὸς τὸ ὑπὸ τῇ ΔΕΧ λόγος ἐστὶ δοθείς· καὶ τῆς ΓΕ ἄρα πρὸς ΕΧ λόγος ἐστὶ δοθείς. καὶ ἐστὶν ὀρθὴ πρὸς τῷ Ε· δοθείσα ἄρα ἡ πρὸς τῷ Χ γωνία. καὶ ἐστὶ πρὸς θέσει δοθείσα καὶ δοθέντι σημείῳ· δοθέν ἄρα ἐστὶ τὸ Γ σημῶν. καὶ δοτὸς δεδομένης τῆς Γ ἐφαπτομένης ἡ ΓΔ· θέσει ἄρα ἡ ΓΔ.

Συμπληρώσεται δὲ πρὸς ὅλημα ἕτως. ἔστω ἡ μὲν δοθείσα γωνία ὀθεία ἡ ὑπὸ τῇ ΖΗΘ, καὶ εἰληφθῶ ὅτι τῇ ΖΗ τὸ Ζ, καὶ καὶ ἄρα ἡ ΖΘ, καὶ πεποιθῶ ὡς ἡ ὀρθία πρὸς τὴν παραγίαν ἕτως τὸ δοτὸς τῇ ΖΘ πρὸς τὸ ὑπὸ τῇ ΗΘΚ, καὶ ἐπιζεύχτω ἡ ΚΖ. ἔστω κέντρον τῆς τμήνης τὸ Χ, καὶ τῇ ὑπὸ τῇ ΗΚΖ γωνία ἴση συνιστάτω ἡ ὑπὸ τῇ ΑΧΓ, καὶ καὶ ἄρα ἡ ΓΕ, ὅτι ἡ ΧΔ ἐφαπτομένη τῇ τμήνι ἡ ΓΔ· λέγω ὅτι ἡ ΓΔ ποιῇ τὸ πρόβλημα.

ΜΚΘ ad quadratum ex ΚΗ, hoc est maiorem quam quadratum ex ΧΑ ad quadratum ex ΑΖ. ac si fiat ut quadratum ex ΜΚ ad quadratum ex ΚΗ, ita quadratum ex ΧΑ ad aliud quoddam: erit id minus quadrato ex ΑΖ; & recta quæ à Χ ad sumptum punctum ducitur, triangula similia efficiet: ac propterea angulus ΖΧΑ angulo ΗΜΚ erit maior. ponatur itaque angulo ΗΜΚ æqualis angulus ΑΧΓ: ergo [per 2.2.huj.] ΧΓ sectionem secabit. secet in Γ, & [per 49.2.huj.] à Γ ducatur ΓΔ sectionem contingens, & ΓΕ ad axem ΑΒ perpendicularis: triangulum igitur ΓΧΕ [per 4. 6.] simile est triangulo ΗΜΚ: quare [per 22. 6.] ut quadratum ex ΧΕ ad quadratum ex ΒΓ ita quadratum ex ΜΚ ad quadratum ex ΚΗ. est autem ut transversum figuræ latus ad rectum ita [per 37. 1.huj.] rectangulum ΧΕΔ ad quadratum ex ΕΓ, & ita [per constr.] rectangulum ΜΚΘ ad quadratum ex ΚΗ, & invertendo ut quadratum ex ΓΒ ad rectangulum ΧΕΔ ita quadratum ex ΗΚ ad rectangulum ΜΚΘ: ex æquali igitur [per 22. 5.] ut quadratum ex ΧΕ ad rectangulum ΧΕΔ ita quadratum ex ΜΚ ad rectangulum ΜΚΘ: est igitur [per 1.6.] ut ΧΕ ad ΕΔ ita ΜΚ ad ΚΘ. sed ut ΓΒ ad ΕΧ ita erat [per constr.] ΗΚ ad ΚΜ: quare ex æquali ut ΓΒ ad ΒΔ ita ΗΚ ad ΚΘ. & sunt anguli ad Ε, Κ recti: angulus igitur ad Δ [per 6.6.] angulo ΗΘΚ est æqualis.

Si τ sectio Ellipsis cujus axis ΑΒ: & oporteat rectam ducere, quæ sectionem contingat, & cum axe ad partes sectionis faciat angulum dato angulo acuto æqualem. Factum sit, & sit ΓΔ: ergo angulus ΓΔΑ est datus. ducatur perpendicularis ΓΕ: ratio igitur quadrati ex ΔΕ ad quadratum ex ΕΓ [per 4. & 22. 6.] data est. sit sectionis centrum Χ, & jungatur ΓΧ: erit igitur [per 37. 1.huj.] ratio quadrati ex ΓΕ ad rectangulum ΔΕΧ data; eadem enim est quæ ratio recti lateris ad transversum: ergo dabitur [per 8. dat.] ratio quadrati ex ΔΕ ad rectangulum ΔΒΧ, & idcirco [per 1. 6.] ratio ΔΕ ad ΕΧ. ratio autem ΔΕ ad ΕΓ est data: data igitur est & ratio ΓΕ



ad ΕΧ. & angulus qui est ad Ε rectus est: ergo [per 41.dat.] datur angulus ad Χ. & est ad rectam positione datam, & ad datum punctum: quare [per 29. & 25. dat.] datum erit punctum Γ, & à dato puncto Γ ducitur ΓΔ sectionem contingens: ergo est positione data recta ΓΔ.



Componetur autem problema hoc modo. Sit datus angulus acutus ΖΗΘ, sumaturque in ΖΗ punctum Ζ, & [per 12. 1.] ΖΘ perpendicularis ducatur, & fiat ut rectum latus ad transversum ita quadratum ex ΖΘ ad rectangulum ΗΘΚ, & jungatur ΚΖ. sit sectionis centrum Χ, & [per 23. 1.] angulo ΗΚΖ æqualis constitutur angulus ΑΧΓ, & demittatur perpendicularis ΓΕ, & [per 49.2.huj.] ducatur ΓΔ sectionem contingens: dico rectam ΓΔ conficere proble-

Ο ο

ma;

δοτὸ ΓΗ. ἐκκεῖται δὲ τις εὐθεῖα δεδομένη ἡ ΖΘ, καὶ ἐπ' αὐτῆς γοηράφθω κύκλος τμήμα δεξιόμυον γωνίαν ἴσην τῇ Ω· ἐστὶν ἄρα μείζων ἡμικυκλίας. καὶ δοτὸ πῶς σημεία τ' ὅπῃ τ' ἀποφύγειας ἔκ Κ ἤχθω κάθετος ἡ ΚΛ, ποιῶσαι τ' ἔξ ὑπὸ ΖΛΘ πρὸς τὸ δοτὸ ΛΚ λόγον τ' αὐτὴν τῷ τ' παραγίως πρὸς τ' ὁρίαν, καὶ ἐπιζεύχθωσαι αἱ ΖΚ, ΚΘ. ἐπεὶ ἔν ἴση ἐστὶν ἡ

dratum ex ΓΗ. exponatur recta quævis data ΖΘ, & [per 33.3.] super ipsam circuli portio describatur capiens angulum æqualem angulo Ω; erit igitur semicirculo major. & ab aliquo puncto eorum quæ sunt in circumferentia, nempe Κ, ducatur perpendicularis ΚΛ, faciens rationem rectanguli ΖΛΘ ad quadratum ex ΛΚ, eandem quæ est transversæ lateris ad rectum, & jungan-





ὑπὸ ΖΚΘ γωνία τῇ ὑπὸ ΕΓΔ· ἀλλὰ καὶ ἐστὶν ὡς ἡ παραγίως πρὸς τὴν ὁρίαν ὥτως τὸ πρὸς ΕΗΔ πρὸς τὸ δοτὸ ΓΗ, καὶ τὸ ὑπὸ ΖΛΘ πρὸς τὸ δοτὸ ΛΚ· *ὁμοίον ἄρα τὸ ΚΖΛ τριγώνον τῷ ΓΕΗ τριγώνῳ, καὶ τὸ ΖΘΚ τῷ ΕΔΓ· ὥστε ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΚΖΘ γωνία τῇ ὑπὸ ΓΕΔ.

tur ΖΚ, ΚΘ. quoniam igitur angulus ΖΚΘ est æqualis angulo ΕΓΔ; est etiam ut transversum latus ad rectum ita [per 37.1. huj.] & rectangulum ΕΗΔ ad quadratum ex ΓΗ, & [ex hyp.] ita rectangulum ΖΛΘ ad quadratum ex ΛΚ: *erit triangulum ΚΖΛ triangulo ΓΕΗ simile; & triangulum ΖΘΚ simile triangulo ΕΔΓ: quare angulus ΚΖΘ angulo ΓΕΔ est æqualis.

Συμπληρῶσαι ἔτι. Ἐστω ἡ μὲν δοθεῖσα ὑπερβολὴ ἡ ΑΓ, ἀξὼν δὲ ὁ ΑΒ, κέντρον δὲ τὸ Ε, ἀσύμπτωτος δὲ ἡ ΕΤ· ἡ δὲ δοθεῖσα ὀξεία γωνία ἡ Ω, ὃ δὲ δοθεῖς λόγος τ' παραγίως πρὸς τὴν ὁρίαν ὃ αὐτὸς τῷ τ' ΨΧ πρὸς ΧΦ, καὶ δίχα πετμήθω ἡ ΨΦ κατὰ τὸ Γ. ἐκκεῖται δεδομένη εὐθεῖα ἡ ΖΘ, καὶ ἐπ' αὐτῆς γοηράφθω τμήμα κύκλος μεί-

Componetur autem hoc modo. Sit data hyperbola ΑΓ, cujus axis ΑΒ, centrum vero Ε, & asymptotos ΕΤ: datus autem angulus acutus sit Ω, & data ratio transversæ lateris ad rectum sit eadem quæ ΨΧ ad ΧΦ, & [per 10. 1.] ΨΦ in Γ bifariam secetur. exponatur data recta ΖΘ, & super ipsam circuli portio major semicirculo [per 33.3.] describatur, capiens angu-



ζων ἡμικυκλίας δεξιόμυον γωνίαν τῇ Ω ἴσην, καὶ ἔστω τὸ ΖΚΘ, καὶ εἰλήφθω τὸ κέντρον τῆς κύκλου τὸ Ν, καὶ δοτὸ ἔξ Ν ὅπῃ τὴν ΖΘ κάθετος ἤχθω ἡ ΝΟ, καὶ πετμήθω ἡ ΝΟ εἰς τὴν τῆς ΓΦ πρὸς ΦΧ λόγον κατὰ τὸ Π, ἔξ δὲ τῆς Π τῇ ΖΘ παράλληλος ἤχθω ἡ ΠΚ, καὶ δοτὸ τῆς Κ κάθετος ἤχθω ἡ ΚΛ ὅπῃ τὴν ΖΘ ἐκβληθεῖται, καὶ ἐπιζεύχθω-


lum æqualem angulo Ω, sitque ΖΚΘ; sumatur autem [per 1. 3.] circuli centrum Ν, à quo ad rectam ΖΘ perpendicularis demittatur ΝΟ, & [per 10. 6.] ΝΟ secetur in Π, ita ut ΝΠ ad ΠΟ eandem habeat rationem quam ΓΦ ad ΦΧ, & [per 30. 1.] per Π ipsi ΖΘ parallela ducatur ΠΚ, & à puncto Κ ad ΖΘ productam perpendicularis ΚΛ demittatur, & jungantur ΖΚ, ΚΘ,

* Per conversam Lemmatis 9. Pappi: & adhuc plenius per Lem. 3. in librum VI. quod sane huc pertinere videtur.

producaturque

producaturque $\Lambda\kappa$ ad M , & à N ad ipsam ducatur $N\Xi$ perpendicularis: parallela est igitur [per 28. 1.] $N\Xi$ ipsi $Z\Theta$, proptereaque ut $N\Pi$ ad ΠO , hoc est $\Gamma\Phi$ ad ΦX , ita ΞK ad $\kappa\Lambda$, & antecedentium dupla, ut $\Psi\Phi$ ad ΦX ita [per 3. 3.] $M\kappa$ ad $\kappa\Lambda$; componendoque [per 18. 5.] ut ΨX ad $X\Phi$ ita $M\Lambda$ ad $\Lambda\kappa$. sed ut $M\Lambda$ ad $\Lambda\kappa$ ita [per 1. 6.] rectangulum $M\Lambda\kappa$ ad quadratum ex $\Lambda\kappa$: ut igitur ΨX ad $X\Phi$ ita rectangulum $M\Lambda\kappa$ ad quadratum ex $\Lambda\kappa$; hoc est [per 36. 3.] rectangulum $Z\Lambda\Theta$ ad quadratum ex $\Lambda\kappa$. ut autem ΨX ad $X\Phi$ ita [per const.] transversum latus ad rectum: ergo ut rectangulum $Z\Lambda\Theta$ ad quadratum ex $\Lambda\kappa$ ita transversum latus ad rectum. ducatur à puncto Λ recta ΛT normalis ipsi ΛB . & quoniam [per 1. 2. huj.] ut quadra-

σαν αὐτὴ $Z\kappa$, $\kappa\Theta$, καὶ ἐκτελέσθω ἡ $\Lambda\kappa$ ὥστε τὸ M , καὶ δὸς τῷ N ἐπ' αὐτὴν κάθετος ἡ $\chi\theta$ ἢ $N\Xi$. ὡς ἀλλήλῃς ἄρα ἐστὶ τῇ $Z\Theta$ καὶ διὰ τούτου ὅτιν ὡς ἡ $N\Pi$ πρὸς ΠO , ταύτης ἡ $\Gamma\Phi$ πρὸς ΦX , ἕτως ἡ ΞK πρὸς $\kappa\Lambda$ καὶ τῶν ἡγεμνῶν τὰ διπλασία, ὡς ἡ $\Psi\Phi$ πρὸς ΦX ἕτως ἡ $M\kappa$ πρὸς $\kappa\Lambda$ καὶ συνθέντι ὡς ἡ ΨX πρὸς $X\Phi$ ἕτως ἡ $M\Lambda$ πρὸς $\Lambda\kappa$. ἀλλ' ὡς ἡ $M\Lambda$ πρὸς $\Lambda\kappa$ ἕτως τὸ ὑπὸ $M\Lambda\kappa$ πρὸς τὸ δὸς $\Lambda\kappa$ ὡς ἄρα ἡ $X\Psi$ πρὸς $X\Phi$ ἕτως τὸ ὑπὸ $M\Lambda\kappa$ πρὸς τὸ δὸς $\Lambda\kappa$, ταύτης τὸ ὑπὸ $Z\Lambda\Theta$ πρὸς τὸ δὸς $\Lambda\kappa$. ἀλλ' ὡς ἡ ΨX πρὸς $X\Phi$ ἕτως ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὀρθάν· καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ $Z\Lambda\Theta$ πρὸς τὸ δὸς $\Lambda\kappa$ ἕτως ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὀρθάν. ἡ $\chi\theta$



tum ex $E\Lambda$ ad quadratum ex ΛT ita est transversum latus ad rectum; & ut transversum latus ad rectum ita rectangulum $Z\Lambda\Theta$ ad quadratum ex $\Lambda\kappa$; quadratum autem ex $Z\Lambda$ ad quadratum ex $\Lambda\kappa$ maiorem rationem habet quam rectangulum $Z\Lambda\Theta$ ad quadratum ex $\Lambda\kappa$: habebit igitur quadratum ex $Z\Lambda$ ad quadratum ex $\Lambda\kappa$ maiorem rationem quam quadratum ex $E\Lambda$ ad quadratum ex ΛT . & sunt anguli ad Λ , Λ recti: angulus igitur Z [per 6. lem. 2.] angulo $\Lambda E T$ minor erit. itaque [per 23. 1.] constituatur angulus $\Lambda E \Gamma$ æqualis angulo $\Lambda Z \kappa$: ergo [per 2. 2. huj.] $E \Gamma$ sectioni occurret. occurrat in puncto Γ , & à Γ ducatur [per 49. 2. huj.] $\Gamma \Delta$ contingens sectionem, & ΓH perpendicularis: erit itaq; [per 37. 1. huj.] ut transversum latus ad rectum ita rectangulum $E H \Delta$ ad quadratum ex $H \Gamma$: ut igitur rectangulum $Z \Lambda \Theta$ ad quadratum ex $H \Gamma$: ita rectangulum $E H \Delta$ ad quadratum ex $H \Gamma$: ideoq; [per 7. lem. 2. & 3. lem. 6.] triangulum $\kappa Z \Lambda$ triangulo $\Gamma E H$ est simile, & triangulum $\kappa \Theta \Lambda$ simile triangulo $\Gamma \Delta H$, & $\kappa Z \Theta$ ipsi $\Gamma E \Delta$: quare angulus $E \Gamma \Delta$ angulo $Z \kappa \Theta$, hoc est [per const.] ipsi Ω , est æqualis. si vero transversum latus ad rectum ratio sit æqualis ad æquale; recta $\kappa \Lambda$ circumulum $Z \kappa \Theta$ continget, & recta coniungens centrum & punctum κ parallela erit ipsi $Z \Theta$, & hæc ipsa problema conficiet.

δὴ δὸς τῷ Λ τῇ ΛB πρὸς ὀρθὰς ἡ ΛT . ἐπεὶ ἔστιν ὡς τὸ δὸς $E\Lambda$ πρὸς τὸ δὸς ΛT ἕτως ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὀρθάν, ἐστὶ δὲ καὶ ὡς ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὀρθάν ἕτως τὸ ὑπὸ $Z\Lambda\Theta$ πρὸς τὸ δὸς $\Lambda\kappa$. τὸ δὲ δὸς $Z\Lambda$ πρὸς τὸ δὸς $\Lambda\kappa$ μείζονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς τὸ ὑπὸ $Z\Lambda\Theta$ πρὸς τὸ δὸς $\Lambda\kappa$. καὶ τὸ δὸς $Z\Lambda$ ἄρα πρὸς τὸ δὸς $\Lambda\kappa$ μείζονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς τὸ δὸς $E\Lambda$ πρὸς τὸ δὸς ΛT . καὶ εἰσιν αὐτὰ πρὸς Λ , Λ γωνία ὀρθαί· ἐλάσσων ἄρα ἐστὶν ἡ Z γωνία τῇ $\Lambda E T$. συνεκείτω ἐν τῇ ὑπὸ $\Lambda Z \kappa$ γωνίᾳ ἴση ἡ ὑπὸ $\Lambda E \Gamma$ συμπεσεῖται ἄρα ἡ $E \Gamma$ τῇ $\tau\mu\eta$. συμπίπτειτω κατὰ τὸ Γ , ἡ $\chi\theta$ δὲ δὸς Γ ἐφαπτομένη ἡ $\Gamma \Delta$, καὶ κάθετος ἡ ΓH . ἐστὶ δὴ ὡς ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὀρθάν ἕτως τὸ ὑπὸ $E H \Delta$ πρὸς τὸ δὸς $H \Gamma$ καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ $Z \Lambda \Theta$ πρὸς τὸ δὸς $\Lambda \kappa$ ἕτως τὸ ὑπὸ $E H \Delta$ πρὸς τὸ δὸς $H \Gamma$. ὁμοίον ἄρα ἐστὶ τὸ $\kappa Z \Lambda$ τρίγωνον τῷ $\Gamma E H$ τριγώνῳ, ὅτι τὸ $\kappa \Theta \Lambda$ τῷ $\Gamma \Delta H$, καὶ τὸ $\kappa Z \Theta$ τῷ $\Gamma E \Delta$. ὡς ἡ ὑπὸ $E \Gamma \Delta$ γωνία ἴση ἐστὶ τῇ ὑπὸ $Z \kappa \Theta$, ταύτης τῇ Ω . εἰν ὅτι ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὀρθάν λόγος ἴσος ἢ πρὸς ἴσον, ἡ $\kappa \Lambda$ ἐφάπτεται $\tau\mu\eta$ $Z \kappa \Theta$ κύκλου, καὶ ἡ δὸς Γ κέντρον ὅτι τὸ κ ἡ $\chi\theta$ ἀγνομένη ὡς ἀλλήλῃς ἐστὶ τῇ $Z \Theta$, ἐαυτῇ ποιήσει τὸ πρόβλημα.

PROP. LII. Theor.

Si ellipsum recta linea contingat: angulus, quem facit cum diametro per

ΠΡΟΤΑΣΙΣ 16.

Εὰν ἐλλείψους εὐθεῖα ἐκτελέσῃ ἢ ποιῇ γωνίαν πρὸς τῇ $\chi\theta$ τῇ ἀφ' ἧς ἀγνομένη ἀφαιρέσῃται, ἔστω

ἐκ ἐλάσσων ὅτι τὸ ἐφεξῆς τῇ ἀεὶ καμμένη ὑπὸ
τῷ πρὸς μέσση τὴν τομὴν κλωμύσῃ εὐθεύῃ.

tactum ducta, non est minor angulo
deinceps ei qui sub rectis ad mediam
sectionem inclinatis continetur.


ΕΣΤΩ ἑλλειψις, ἧς ἄξονες μὲν οἱ $AB, ΓΔ$, κέν-
τρον δὲ τὸ E , μείζων δὲ ἔστω τῶν ἄξόνων ἡ AB ,
καὶ ἐφαπτομένη τῇ περιφέρειᾳ ἡ HZA , καὶ
ἐπιζεύχωνται αἱ $ΑΓ, ΓΒ, ΖΕ$, καὶ
ἐκτελεσθῶσι αἱ $ΒΓ, ΖΑ$ πρὸς τὸ A . λέ-
γεται ὅτι ἐκ ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ὑπὸ $ΛΖΕ$
γωνία τῇ ὑπὸ $ΛΓΑ$.

Ἡ γὰρ $ΖΕ$ τῇ AB ἢτοι ὁμοειδέσθῃ
λόγος ἐστίν, ἢ ἔστω πρότερον ὁμοειδέ-
σθῃ, καὶ ἐστὶν ἰσὴ ἡ AE τῇ EB . ἰσὴ
ἄρα καὶ ἡ AE τῇ $ΘΓ$. καὶ ἐστὶ διζώ-
μετρος ἡ $ΖΕ$. ἡ ἄρα κατὰ τὸ Z
ἐφαπτομένη παράλληλος ἐστὶ τῇ $ΑΓ$.
ἐστὶ γὰρ ἡ $ΖΕ$ τῇ AB ὁμοειδέσθῃ
ὁμοειδέσθῃ ὁμοειδέσθῃ ἄρα ἐστὶ τὸ $ΖΘ$
 $ΓΑ$, ὅτι διὰ τούτου ἰσὴ ἐστὶν ἡ ὑπὸ $ΛΖΘ$
τῇ ὑπὸ $ΛΓΘ$. καὶ ἐπεὶ μείζων ἐστὶν ἑκάτερα τῶν AE ,
 EB τῶν EG , ἀμβλωτά ἐστὶν ἡ ὑπὸ $ΑΓΒ$. ὅθεν ἄρα ἡ
ὑπὸ $ΛΓΘ$, ὡς καὶ ἡ ὑπὸ $ΛΖΕ$ καὶ διὰ τούτου ἀμ-
βλωτά ἐστὶν ἡ ὑπὸ HZE .

Μὴ ἔστω δὲ ἡ EZ τῇ AB ὁμοειδέσθῃ, καὶ
ἡ EZ κάθετος ἡ ZK . ὅθεν ἄρα ἰσὴ ἐστὶν ἡ ὑπὸ
 ABE τῇ ὑπὸ $ΖΕΑ$. ὁρῶν δὲ ἡ πρὸς τὸ E ὁρ-
θὴ τῇ πρὸς τὸν K ἐστὶν ἰσὴ. ὅθεν ἄρα ὁμοίον ἐστὶ
τὸ $ΓΒΕ$ τριγώνον τῷ $ΖΕΚ$. ὅθεν ἄρα ἐστὶν ὡς
τὸ $ΒΕ$ πρὸς τὸ $ΒΓ$ ὡς τὸ $ΕΓ$ πρὸς τὸ $ΕΚ$
πρὸς τὸ $ΑΠ$. ἀλλ' ὡς τὸ $ΑΠ$ EB πρὸς τὸ
ἀπὸ EG , τετέστι τὸ
ὑπὸ $ΑΕΒ$ πρὸς
τὸ ἀπὸ EG , τετέστι
ἡ AB πρὸς
τὸ $ΕΓ$, ὡς τὸ
ὑπὸ HKE πρὸς τὸ
ἀπὸ KZ . ἐκ ἄρα
ἐστὶν ὡς τὸ ἀπὸ
 HKE πρὸς τὸ ἀπὸ
 KZ ὡς τὸ ἀπὸ
 KE πρὸς τὸ ἀπὸ
 KZ . ἐκ ἄρα ἰσὴ
ἐστὶν ἡ HK τῇ KE .
ἐκτελεσθῶσι κύκλου
τμήματα τὸ MTN ,
δεχόμενον γωνίαν



ἰσὴν τῇ ὑπὸ $ΑΓΒ$. ἀμβλωτά δὲ ἡ ὑπὸ $ΑΓΒ$
ἐλάσσων ἄρα ἡμικυκλίᾳ τμήμα ἐστὶ MTN . πε-
ποιήσθω δὲ ὡς ἡ HK πρὸς KE ὡς ἡ NE πρὸς
 EM , καὶ ἀπὸ E πρὸς ὁρθὰς ἡ EX , καὶ ἐπι-
ζεύχωνται αἱ MY, TN , καὶ πεποιησθῶσι δὴ καὶ ἡ MN
κατὰ τὸ T , καὶ πρὸς ὁρθὰς ἡ OT πρὸς τὸ $Π$. διάμε-
τρος ἄρα ἐστὶν. ἔστω κέντρον τὸ P , καὶ ἀπ' αὐτοῦ
κάθετος ἡ PS , καὶ ἐπιζεύχωνται αἱ MO, ON .
ἐπεὶ γὰρ ἡ ὑπὸ MON ἰσὴ ἐστὶ τῇ ὑπὸ $ΑΓΒ$,
καὶ δὴ καὶ τμήματα ἑκάτερα τῶν AB, MN κατὰ

SI T ellipsis, cujus axes $AB, ΓΔ$, centrum
vero E , & sit axium major AB , recta vero
 HZA sectionem contingat, &
junctis $ΑΓ, ΓΒ, ΖΕ$ producatur
 $ΒΓ$ ad A : dico angulum $ΛΖΕ$
non esse minorem angulo $ΛΓΑ$.



Nam recta ZE , vel est paral-
lela, vel non est parallela ipsi
 AB . sit primum parallela, &
est AB æqualis EB : ergo [per
2.6.] & AE ipsi $ΘΓ$ est æqua-
lis. sed ZE diameter est: recta
igitur, quæ in Z sectionem con-
tingit, ipsi $ΑΓ$ [per 6. 2. huj.] est
parallela. est autem & ZE paral-
lela ipsi AB : parallelogrammum
igitur est $ΖΘΓΑ$; & idcirco [per
34. 1.] angulus $ΛΖΘ$ æqualis est
angulo $ΛΓΘ$. & quoniam utraque ipsarum AE ,
 EB est major ipsâ EG , angulus $ΑΓΒ$ est obtusus:
ideoque anguli $ΛΓΘ$, $ΛΖΕ$ sunt acuti; & pro-
pterea angulus HZE obtusus erit.

Sed non sit EZ parallela ipsi AB , & duca-
tur ZK perpendicularis: igitur angulus ABE
non est æqualis ipsi ZBA . rectus autem angu-
lus ad E recto ad K est æqualis: ergo triangu-
lum $ΓΒΒ$ non est simile triangulo $ΖΕΚ$; adeo-
que quadratum ex BE ad quadratum ex EG non
est sicut quadratum ex EK ad quadratum ex KZ .
sed ut quadratum ex EB ad quadratum ex EG ,




hoc est ut rectan-
gulum $ΑΕΒ$ ad
quadratum ex EG ,
sive latus trans-
versum ad re-
ctum, ita [per 37.
1. huj.] rectangu-
lum HKE ad qua-
dratum ex KZ :
non est igitur re-
ctangulum HKE
ad quadratum ex
 KZ sicut quadra-
tum ex BE ad
quadratum ex KZ ;
ac proinde HK
non est ipsi KE
æqualis. expona-
tur circuli portio MTN , capiens angulum æqua-
lem angulo $ΑΓΒ$. angulus autem $ΑΓΒ$ est obtu-
sus: ergo [per 31. 3.] circuli portio MTN est se-
micirculo minor. fiat vero ut HK ad KE ita NZ
ad EM , & per Z ad rectos angulos ipsi MN du-
catur TZ, X , & jungantur MT, TN ; secetur au-
tem MN bifariam in T , & ad rectos angulos du-
catur $OT, Π$: erit igitur [per 3. 3.] hæc diame-
ter. sit P circuli centrum, à quo perpendicularis
ducatur PS & jungantur MO, ON . itaque quo-
niam angulus MON est æqualis angulo $ΑΓΒ$, &
utraque ipsarum AB, MN in punctis E, T bifa-
riam

ΕΣΤΩ ἡ δοθεῖσα ἑλλειψις, ἧς μείζων μὲν ἄξων ὁ ΑΒ, ἐλάσσων δὲ ὁ ΓΔ, κέντρον δὲ τὸ Ε, καὶ ἐπιζεύχθωσαν αἱ ΑΓ, ΓΒ, ἡ δὲ δοθεῖσα γωνία ἔστω ἡ Τ ἐκ ἐλάσσωνος ὑπὸ ΑΓΗ· ὥστε ἢ ὑπὸ ΑΓΒ ἐκ ἐλάσσωνος ἔστω ἡ Χ, ἢ Τ ἄρα τὸ ὑπὸ ΑΓΗ ἢ μείζων ἔστω, ἢ ἴση.

Εἰς ὡς περὶ ἴση, καὶ διὰ τὴν Ε τῇ ΒΓ παρὰλληλος ἡχθῶ ἡ ΕΚ, καὶ διὰ τὴν Κ ἐφαπτομένη τὴν τομῆς ἡχθῶ ἡ ΚΘ. ἐπεὶ ἔν ἴση ἔστω ἡ ΑΕ τῇ ΕΒ, καὶ ἔστιν ὡς ἡ ΑΕ πρὸς ΕΒ ἔστω ἡ ΑΖ πρὸς ΖΓ· ἴση ἄρα ἡ ΑΖ τῇ ΖΓ. καὶ ἐστὶ διάμετρος ἡ ΚΕ· ἡ ἄρα κατὰ τὸ Κ ἐφαπτομένη τὴν τομῆς, τετίστην ἡ ΘΚΗ, παρὰλληλος ἐστὶ τῇ ΓΑ. ἐστὶ δὲ καὶ ἡ ΕΚ τῇ ΗΒ παρὰλληλος· παρὰλληλόγραμμον ἄρα ἐστὶ τὸ ΚΖΓΗ, ὃ διὰ τὴν ἴση ἔστω ἡ ὑπὸ ΗΚΕ γωνία τῇ ὑπὸ ΗΓΖ γωνίᾳ. ἡ δὲ ὑπὸ ΗΓΖ τῇ δοθείσῃ, τετίστη τῇ Τ, ἴση ἔστω καὶ ἡ ὑπὸ ΗΚΕ ἄρα ἔστω ἴση τῇ Τ γωνία.



Εἰς ὡς δὲ μείζων ἡ Τ γωνία τὸ ὑπὸ ΑΓΗ· ἀντιπαλιν δὲ ἡ Χ τὸ ὑπὸ ΑΓΒ ἐλάσσων ἔστω. ἐκκεῖθεν κύκλος, καὶ ἀφηρῶσθαι ἀπ' αὐτοῦ τμήμα, καὶ ἔστω τὸ ΜΝΠ δεχόμενον γωνίαν ἴσην τῇ Χ, καὶ πετμήσθω ἡ ΜΠ διχα κατὰ τὸ Ο, καὶ ἀπὸ τοῦ Ο τῇ ΜΠ πρὸς ὁρθὰς ἡχθῶ ἡ ΝΟΡ, καὶ ἐπιζεύχθωσαν αἱ ΜΝ, ΝΠ· ἡ ἄρα ὑπὸ ΜΝΠ γωνία

SIT data ellipsis, cujus major axis AB, minor ΓΔ, & centrum E, & jungantur ΑΓ, ΓΒ; datus autem angulus sit Τ, non minor angulo ΑΓΗ; ita ut angulus ΑΓΒ non sit minor angulo Χ. angulus igitur Τ vel major est angulo ΑΓΗ, vel ipsi æqualis.



Sit primum æqualis, & [per 30. 1.] per E ducatur EK ipsi ΒΓ parallela, & [per 49. 2. huj.] per K contingens sectionem ΚΘ. quoniam igitur ΑΕ est æqualis ΕΒ, & ut ΑΕ ad ΕΒ ita [per 2. 6.] ΑΖ ad ΖΓ: erit ΑΖ ipsi ΖΓ æqualis. & est ΚΕ diameter: ergo [per 5. 2. huj.] quæ in Κ sectionem contingit, hoc est ΘΚΗ, parallela erit ipsi ΓΑ. sed & ΕΚ parallela est ΗΒ: parallelogrammum igitur est ΚΖΓΗ; & ob id [per 34. 1.] angulus ΗΚΕ angulo ΗΓΖ æqualis. angulus autem ΗΓΖ est æqualis angulo dato Τ: ergo & ΗΚΕ angulo Τ æqualis erit.

Sit verò angulus Τ major angulo ΑΓΗ: erit contra angulus Χ minor angulo ΑΓΒ. exponatur circulus, & [per 34. 3.] ab eo auferatur portio ΜΝΠ, capiens angulum æqualem angulo Χ, & [per 10. 1.] bifariam secetur ΜΠ in Ο, & per Ο [per 11. 1.] ducatur ΝΟΡ ad rectos angulos ipsi ΜΠ, & jungantur ΜΝ, ΝΠ: angulus igitur ΜΝΠ minor est angulo ΑΓΒ. anguli autem



μία τὸ ὑπὸ ΑΓΒ ἐλάσσων ἔστω. ἀλλὰ τὸ μὲν ὑπὸ ΜΝΠ ἡμίσειά ἐστω ἡ ὑπὸ ΜΝΟ, τῆς δὲ ὑπὸ ΑΓΒ ἡ ὑπὸ ΑΓΕ· ἐλάσσων ἄρα ἡ ὑπὸ ΜΝΟ τῆς ὑπὸ ΑΓΕ. ὃ ὁρθαὶ αἱ πρὸς τοῖς Ε, Ο· ἡ ἄρα ΑΕ πρὸς ΕΓ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περὶ ἡ ΜΟ πρὸς ΟΝ, ὥστε καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΕ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΕΓ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περὶ τὸ ἀπὸ ΜΟ πρὸς τὸ ἀπὸ ΟΝ. ἀλλὰ τὸ μὲν ἀπὸ ΑΕ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΑΕΒ, τὸ δὲ ἀπὸ ΜΟ ἴσον τῷ ὑπὸ ΜΟΠ, τετίστη τῷ ὑπὸ ΝΟΡ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΑΕΒ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΓ, τετίστη ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὀρθάν,

ΜΝΠ [per 4. 1.] dimidius est angulus ΜΝΟ, & anguli ΑΓΒ dimidius est ΑΓΕ: ergo ΜΝΟ angulus angulo ΑΓΒ est minor. & anguli ad Β & Ο recti sunt: quare ΑΕ ad ΕΓ majorem rationem habet quam ΜΟ ad ΟΝ; & ideo quadratum ex ΑΕ ad quadratum ex ΕΓ majorem habet rationem quam quadratum ex ΜΟ ad quadratum ex ΟΝ. sed quadratum ex ΑΕ æquale est rectangulo ΑΒΒ; & quadratum ex ΜΟ æquale rectangulo ΜΟΠ, hoc est [per 35. 3.] ipsi ΝΟΡ: ergo rectangulum ΑΒΒ ad quadratum ex ΕΓ, hoc est [per 21. 1. huj.] transversum latus ad rectum;

ΠΑΠΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ ΛΗΜΜΑΤΑ

ΕΙΣ ΚΩΝΙΚΩΝ ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΠΕΡΓΑΙΟΥ.


PAPPI ALEXANDRINI LEMMA TA

IN TERTIUM LIBRUM CONICORUM
APOLLONII PERGÆI.

ΛΗΜΜΑ α'.

Καταγραφὴ ἡ ΑΒΓΔΕΖΗ, ἔστω δὲ ἴση ἡ ΒΗ τῇ
ΗΓ. ὅτι ὁ ἀλλήλως ἐστὶν ἡ
ΕΖ τῇ ΒΓ.

Η ΧΘΝ ἀφ' Α τῇ ΒΓ ὁρθό-
γωνος ἡ ΘΚ, καὶ ἐκτεταγμένη
αἱ ΒΖ, ΓΕ ὅτι καὶ Κ, Θ
ὁμοεῖα. ἐπεὶ ἔν ἴση ἔστιν ἡ ΒΗ
τῇ ΗΓ. ἴση ἄρα ἔστι καὶ ἡ ΘΑ τῇ ΑΚ.
ἔστιν ἄρα ὅς ἡ ΒΓ ὥς τὴν πλὴν ΘΑ,
τυτῆται ὅς ἡ ΒΕ ὥς τὴν πλὴν ΕΑ,
ἔστιν ἡ ΒΓ ὥς τὴν πλὴν ΚΑ, τυτῆται ἡ
ΓΖ ὥς τὴν πλὴν ΖΑ. παρελλομένου ἄρα ἔστιν ἡ
ΕΖ τῇ ΒΓ.



LEMMA I.


Sit descripta figura ΑΒΓΔΕΖΗ; & sit ΒΗ æ-
qualis ipsi ΗΓ. dico ΒΖ ipsi ΒΓ
parallelam esse.

DUCATUR enim per Α
recta ΘΚ parallela ipsi ΒΓ, &
ΒΖ, ΓΕ ad puncta Κ, Θ pro-
ducantur. itaque quoniam ΒΗ
est æqualis ipsi ΗΓ; erit [propter æ-
quiangula triangula ΒΔΗ, ΚΔΑ, item
ΗΔΓ, ΑΔΘ] & ΘΑ ipsi ΑΚ æqualis:
ergo [propter æquiangula triangula
ΒΕΓ, ΑΕΘ, item ΒΖΓ, ΚΖΑ] ut ΒΓ
ad ΘΑ, hoc est ut ΒΕ ad ΕΑ, ita ΒΓ
ad ΚΑ, hoc est ΓΖ ad ΖΑ: quare ΕΖ
ipsi ΒΓ est parallela.

ΛΗΜΜΑ β'.

Ἐστω δύο τρίγωνα τὰ ΑΒΓ, ΔΕΖ ἴσως ἔχοντα
πρὸς Α, Δ γωνίας, ἴσων δὲ ἔστω τὸ ὑπὸ ΒΑΓ τῷ
ὑπὸ ΕΔΖ. ὅτι καὶ τὸ τρίγωνον τῶν τετραγώνων
ἐστὶν ἴσων.

Η Χθουσιν ὁρίσεται αἱ ΒΗ, ΕΘ. ἔστιν ἄρα ὅς ἡ ΒΗ ὥς
τὴν πλὴν ΒΑ ἔστιν ἡ ΕΘ ὥς τὴν πλὴν ΕΔ. καὶ ὅς ἡ ΒΗ
ὑπὸ ΒΗ, ΑΓ ὥς τὴν πλὴν
ΒΑΓ ἔστιν τὸ ὑπὸ ΕΘ, ΔΖ
ὥς τὸ ὑπὸ ΕΔΖ. ἴσων δὲ
ἔστι τὸ ὑπὸ ΒΑΓ τῷ ὑπὸ ΕΔΖ.
ἴσων ἄρα ἔστι καὶ τὸ ὑπὸ ΒΗ,
ΑΓ τῷ ὑπὸ ΕΘ, ΔΖ. ἀλλὰ
τὸ μὲν ὑπὸ ΒΗ, ΑΓ ἡμισυ ἔστι
τὸ ΑΒΓ τρίγωνον, τὸ δὲ ὑπὸ
ΕΘ, ΔΖ ἡμισυ ἔστι τὸ ΔΕΖ
τρίγωνον. καὶ τὸ ΑΒΓ ἄρα τρίγωνον τῷ ΔΕΖ τρίγωνῳ
ἴσων ἔστι. φανερόν δὲ ὅτι καὶ τὰ διπλασά αὐτῶν παρελλο-
γισμῶς ἴσα ἔστιν.



LEMMA II.

Sint duo triangula ΑΒΓ, ΔΕΖ angulos Α, Δ æ-
quales habentia; & sit rectangulum ΒΑΓ æ-
quale rectangulo ΕΔΖ. dico triangulum tri-
angulo æquale esse.

DUctis enim perpendicularibus ΒΗ, ΕΘ; erit
[per 4. 6.] ut ΗΒ ad ΒΑ ita ΕΘ ad ΕΑ: ergo
[per 1. 6.] ut rectangulum
sub ΒΗ & ΑΓ ad rectan-
gulum ΒΑΓ ita rectangulum
sub ΕΘ & ΔΖ ad rectan-
gulum ΕΔΖ. est autem [ex
hyp.] rectangulum ΒΑΓ
rectangulo ΕΔΖ æquale: er-
go [per 14. 5.] & rectan-
gulum sub ΒΗ & ΑΓ æquale
rectangulo sub ΕΘ & ΔΖ.
sed [per 41. 1.] rectanguli sub
ΒΗ & ΑΓ dimidium est
ΑΒΓ triangulum; & rectanguli sub ΕΘ & ΔΖ di-
midium triangulum ΔΕΖ: triangulum igitur ΑΒΓ tri-
angulo ΔΕΖ æquale erit. Perspicuum autem est &
parallelogramma ipsorum dupla inter se æqualia esse.


Qq

LEMMA

LEMMA III.

Sit triangulum $AB\Gamma$, & sit ΔE ipsi $B\Gamma$ parallela. dico ut quadratum ex BA ad quadratum ex AA ita esse triangulum $AB\Gamma$ ad triangulum AAE .

Quoniam enim triangulum $AB\Gamma$ simile est triangulo AAE , habebit [per 19.6.] $AB\Gamma$ triangulum ad ipsum AAE duplicatam rationem ejus quam habet BA ad AA . sed quadratum ex BA ad quadratum ex AA duplicatam rationem habet ejus quam habet BA ad AA : ergo ut quadratum ex BA ad quadratum ex AA , ita erit $AB\Gamma$ triangulum ad triangulum AAE .



ΛΗΜΜΑ γ'.


Τρίγωνον τὸ $AB\Gamma$, καὶ ὁμοῦλος ἡ ΔE τῇ $B\Gamma$. ὅτι ἔστιν ὡς τὸ ὑπὸ BA πρὸς τὸ ὑπὸ AA ἕτως τὸ $AB\Gamma$ τρίγωνον πρὸς τὸ AAE τρίγωνον.

Ἐπεὶ γὰρ ὁμοῖον ἔστι τὸ $AB\Gamma$ πρὸς τὸ AAE τρίγωνον, τὸ ἄρα $AB\Gamma$ τρίγωνον πρὸς τὸ AAE διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς τὸ BA πρὸς AA . ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὸ BA πρὸς τὸ ὑπὸ AA διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς τὸ BA πρὸς τὴν AA . ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ BA πρὸς τὸ ὑπὸ AA ἕτως τὸ $AB\Gamma$ τρίγωνον πρὸς τὸ AAE τρίγωνον.

LEMMA IV.

Sint lineæ $AB, \Gamma\Delta$ inter se æquales, & sumatur quodvis punctum E . dico rectangulum ΓEB superare rectangulum ΓAB rectangulo ΔEA .

Secetur enim $B\Gamma$ bifariam in Z : ergo punctum Z lineam quoque AA bifariam secat. & quoniam [per 6.2.] rectangulum ΓEB una cum quadrato ex BZ æquale est quadrato ex EZ : rectangulum autem ΔEA una cum quadrato ex AZ æquale est quadrato ex EZ , atque est quadratum ex AZ æquale rectangulo ΓAB una cum quadrato ex BZ ; commune subtrahatur quadratum ex BZ : reliquum igitur rectangulum ΓEB æquale est rectangulo ΓAB una cum rectangulo ΔEA : quare ΓEB rectangulum superat rectangulum ΓAB ipso ΔEA rectangulo. Q. E. D.




ΛΗΜΜΑ δ'.


Ἰσὴ αἱ $AB, \Gamma\Delta$, καὶ τυχὸν σημεῖον τὸ E . ὅτι τὸ ὑπὸ ΓEB ὑπερέχει τὸ ὑπὸ ΓAB τῷ ὑπὸ ΔEA .

Ἐγερμένῳ δὲ $B\Gamma$ δίχα τὸ Z . τὸ Z ἄρα διχοτομεῖ καὶ τὴν AA , καὶ ἔστω τὸ ὑπὸ ΓEB μὲν τὸ ὑπὸ BZ ἴσον ἔστι τῷ ὑπὸ EZ , ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὸ ΔEA μὲν τὸ ὑπὸ AZ ἴσον ἔστι τῷ ὑπὸ EZ , καὶ ἔστι τὸ ὑπὸ AZ ἴσον τῷ ὑπὸ ΓAB μὲν τὸ ὑπὸ BZ , καὶ τὸ BZ ἴσον τῷ ὑπὸ BZ . λοιπὸν ἔστι τὸ ὑπὸ ΓEB ἴσον τῷ ὑπὸ ΓAB καὶ τῷ ὑπὸ ΔEA . ὅτι καὶ τὸ ΓEB τὸ ὑπὸ ΓAB ὑπερέχει τῷ ὑπὸ ΔEA . ὅπου ἔ. δ.

Si vero punctum E sit inter A & B ; rectangulum ΓEB minus est quam rectangulum ΓAB , eodem ipso spatio, videlicet rectangulo ΔEA : quod simili ratione demonstrabitur.



Quod si punctum E sit inter B & Γ ; eadem ratione rectangulum ΓEB minus erit quam rectangulum ΔEA rectangulo ΔEA .




Ἐάν γ' τὸ E σημεῖον ᾖ μεταξὺ τῶν A, B σημείων, τὸ ὑπὸ ΓEB τὸ ὑπὸ ΓAB ἔλαττον ἔσται τῷ ὑπὸ ΔEA . ὅπου ἔ. δ. καὶ αὐτὸ ἡ ἀποδείξις.

Ἐάν δὲ τὸ E σημεῖον ᾖ μεταξὺ τῶν B, Γ , τὸ ὑπὸ ΓEB τὸ ὑπὸ ΔEA ἔλαττον ἔσται τῷ ὑπὸ ΔEA , τῇ αὐτῇ ἀγωγῇ.

LEMMA V.

Sit recta AB æqualis ipsi $B\Gamma$, & duo puncta Δ, E sumantur. dico quadratum ex AB quater sumptum æquale esse rectangulo $AA\Gamma$ bis, una cum rectangulo $AE\Gamma$ bis & quadratis ex BA, BE bis sumptis.

HOC autem perspicuum est, quadratum enim ex AB bis sumptum, propter bisectiones, æquale est [per 5.2.] rectangulo $AA\Gamma$ bis & quadrato ex AB bis: itemque quadratum ex AB bis est æquale rectangulo $AE\Gamma$ bis & bis quadrato ex BE .



ΛΗΜΜΑ ε'.

Ἰσὴ ἡ AB τῇ $B\Gamma$, καὶ δύο σημεῖα τὰ Δ, E . ὅτι τὸ τετραγώνον ὑπὸ τῇ AB τετραγώνον ἴσον ἔστι τῷ δις ὑπὸ $AA\Gamma$ μὲν τῷ δις ὑπὸ $AE\Gamma$ καὶ τῷ δις ὑπὸ BA, BE τετραγώνον.

Τὸτο δὲ φανερόν. τὸ μὲν γὰρ δις ὑπὸ AB , δις τῇ διχοτομίᾳ, ἴσον ἔστι τῷ δις ὑπὸ $AA\Gamma$ καὶ τῷ δις ὑπὸ BA . τὸ δὲ δις ὑπὸ AB ἴσον ἔστι τῷ δις ὑπὸ $AE\Gamma$ καὶ τῷ δις ὑπὸ BE τετραγώνον.

LEMMA VI.

Sit recta AB æqualis ipsi $\Gamma\Delta$, & sumatur punctum E . dico quadrata ex AE, BA æqualia esse quadratis ex $BE, E\Gamma$ & rectangulo sub $A\Gamma\Delta$ bis sumpto.


Secetur $B\Gamma$ bifariam in Z . & quoniam quadratum ex AZ bis sumptum æquale est [per 5.2.] rect.

ΛΗΜΜΑ ς'.

Ἰσὴ ἡ AB τῇ $\Gamma\Delta$, καὶ σημεῖον τὸ E . ὅτι τὸ ὑπὸ $AE, E\Delta$ τετραγώνον ἴσον τῷ δις ὑπὸ $BE, E\Gamma$ τετραγώνον καὶ τῷ δις ὑπὸ $A\Gamma\Delta$.

Ἐγερμένῳ δὲ $B\Gamma$ καὶ τὸ Z . ἔστω ἡ AE καὶ τὸ AE ἴσον τῷ δις ὑπὸ $A\Gamma\Delta$ καὶ τῷ δις ὑπὸ BE .

ὑπὸ ΓΖ, κοινὸν ἀφαιρούμεν τῷ
δὲ ὑπὸ ΕΖ, ἴσον ἐστὶ τὸ πρὸς
ὑπὸ ΑΓΔ καὶ τὰς δὲ ὑπὸ τῶν
ΓΖ, ΖΕ τοῖς δὲ ὑπὸ τῷ ΔΖ,
ΖΕ τετραγώνοις. ἀλλὰ τοῖς μὲν
δὲ ὑπὸ ΔΖ, ΖΕ ἴσα ἐστὶ τὰ ὑπὸ
τῷ ΑΕ, ΕΔ τετραγώνοις, τοῖς δὲ
δὲ ὑπὸ τῷ ΓΖ, ΖΕ ἴσα ἐστὶ τὰ ὑπὸ
τῷ ΒΕ, ΕΓ τετραγώνοις. τὰ δὲ ὑπὸ τῶν ΑΕ, ΕΔ τετραγώνοις ἴσα ἐστὶ τοῖς τὰ ὑπὸ τῷ ΒΕ, ΕΓ τετραγώνοις καὶ τὰς
δὲ ὑπὸ τῶν ΑΓΔ.




angulo ΑΓΔ bis & bis qua-
drato ex ΓΖ, addito com-
muni quadrato ex ΕΖ bis, e-
rit rectangulum ΑΓΔ bis
una cum quadratis ex ΓΖ, ΖΕ
bis æquale quadratis ex ΔΖ,
ΖΕ bis sumptis. sed [per 9.
vel 10.2.] quadratis ex ΔΖ,
ΖΕ bis sumptis æqualia sunt
quadrata ex ΑΕ, ΕΔ; quadratis
autem ex ΓΖ, ΖΕ bis sumptis æqualia sunt ex ΒΕ, ΕΓ
quadrata: quadrata igitur ex ΑΕ, ΕΔ æqualia sunt
quadratis ex ΒΕ, ΕΓ & rectangulo ΑΓΔ bis sumpto.

ΛΗΜΜΑ Ζ΄.

Ἐστω τὸ ὑπὸ ΒΑΓ μὲν τῷ δὲ ὑπὸ ΓΔ ἴσον τῷ δὲ ὑπὸ
ΔΑ. ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΓΔ τῇ ΔΒ.

Κοινὸν γάρ ἀφαιρούμεν τὸ ὑπὸ ΓΔ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΒΑΓ
ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΔΑ, ΔΓ ὑπολοίπῳ, τοῖς τε
ὑπὸ τῶν ΔΑΓ, ΑΓΔ. τὸ δὲ ὑπὸ
ΒΑΓ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΔΑΓ καὶ τῷ Α
ὑπὸ ΒΔ, ΑΓ. κοινὸν ἀφαιρούμεν τὸ ὑπὸ
ΔΑΓ· λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ ΑΓ, ΔΒ
ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΑΓΔ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΓΔ τῇ ΔΒ.



ΛΗΜΜΑ Η΄.

Ἐστω τὸ ὑπὸ ΑΓΒ μὲν τῷ δὲ ὑπὸ ΓΔ ἴσον τῷ δὲ ὑπὸ ΔΒ
τετραγώνοις. ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΑΔ τῇ ΔΒ.


Κεῖται τῇ ΓΔ ἴση ἡ ΔΕ· τὸ ἄρα
ὑπὸ ΓΒΕ μὲν τῷ ὑπὸ ΔΕ, τε-
τάρτῳ τῷ ΓΔ, ἴσον τῷ ὑπὸ ΔΒ, τε-
τάρτῳ τῷ ΑΓΒ μὲν τῷ ὑπὸ ΓΔ·
ὅτι τὸ ὑπὸ ΓΒΕ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΑΓΒ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ
ΑΓ τῇ ΕΒ, ἀλλὰ καὶ ΓΔ τῇ ΔΕ ἴση ἐστὶν· ὅλη ἄρα ἡ
ΑΔ ὅλη τῇ ΔΒ ἴση.



ΛΗΜΜΑ Θ΄.

Ἐστω πάλιν τὸ ὑπὸ ΒΑΓ μὲν τῷ δὲ ὑπὸ ΔΒ ἴσον τῷ
δὲ ὑπὸ ΑΔ. ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΓΔ τῇ ΔΒ.

Κεῖται τῇ ΔΒ ἴση ἡ ΑΕ· ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ ΒΑΓ
μετὰ τῷ ὑπὸ ΔΒ, τοῖς τε ὑπὸ ΕΑ, ἴσον ἐστὶ
τῷ ὑπὸ ΑΔ τετραγώνοις, κοινὸν
ἀφαιρούμεν τὸ ὑπὸ ΔΑΓ· λοιπὸν
ἄρα τὸ ὑπὸ ΒΔ, ΑΓ, τοῖς τε
τῷ ὑπὸ ΕΑΓ, μετὰ τῷ ὑπὸ ΕΑ,
ὅ ἐστι τὸ ὑπὸ ΓΕΑ, ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΑΔΓ· ἴση ἄρα ἐστὶν
ἡ ΕΑ, τοῖς τε ὑπὸ ΒΔ, τῇ ΔΓ. ὅ. ὅ. δ.



ΛΗΜΜΑ Ι΄.

Εὐθεία ἡ ΑΒ, ἐφ' ἧς τρία σημεῖα τὰ Γ, Δ, Ε, ἕτως
ὥς ἴση μὲν εἶναι τὴν ΒΕ τῇ ΕΓ, τὸ δὲ ὑπὸ
ΑΕΔ τῷ δὲ ὑπὸ ΕΓ ἴσον. ὅτι γίνεται ὥς ἡ ΒΑ
πρὸς ΑΓ ἕτως ἡ ΒΔ πρὸς ΔΓ.

Ἐπεὶ γάρ τὸ ὑπὸ ΑΕΔ ἴσον
ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΕΓ, ἀνάλογον καὶ
ἀναστρέψαντι καὶ δις τὰ ἡγεμόνια,
καὶ διαιρόντι· ἔστω ἄρα ὡς ἡ ΒΑ
πρὸς τὴν ΑΓ ἕτως ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΓ.



LEMMA VII.

Sit rectangulum ΒΑΓ una cum quadrato ex ΓΔ
æquale quadrato ex ΑΔ. dico ΔΓ ἰπσὶ ΔΒ
æqualem esse.

Commune enim auferatur quadratum ex ΓΔ:
& rectangulum ΒΑΓ æquale erit excessui qua-
drati ex ΑΔ supra quadratum ex ΔΓ, hoc est [per 2.
2.] utrique rectangulo sub ΔΑΓ
& ΑΓΔ. at rectangulum ΒΑΓ æ-
quale est rectangulis sub ΔΑΓ &
sub ΒΔ, ΑΓ. commune auferatur
ΔΑΓ: erit igitur reliquum, quod
continetur sub ΑΓ, ΔΒ, æquale rectangulo ΑΓΔ:
æqualis igitur est ΓΔ ἰπσὶ ΔΒ.

LEMMA VIII.

Sit rectangulum ΑΓΒ una cum quadrato ex ΓΔ
æquale quadrato ex ΔΒ. dico rectam ΑΔ
æqualem esse ἰπσὶ ΔΒ.

Posatur ἰπσὶ ΓΔ æqualis ΔΕ:
ergo [per 5.2.] rectangulum
ΓΒΕ una cum quadrato ex ΔΕ, hoc
est quadrato ex ΓΔ, æquale est qua-
drato ex ΔΒ; hoc est [ex hyp.]
rectangulo ΑΓΒ una cum quadrato ex ΓΔ: quare rect-
angulum ΓΒΕ est æquale rectangulo ΑΓΒ: est igitur
[per 1.6.] linea ΑΓ æqualis ἰπσὶ ΕΒ. sed & ΓΔ æ-
qualis est ΔΕ: tota igitur ΑΔ toti ΔΒ est æqualis.

LEMMA IX.

Sit rursus rectangulum ΒΑΓ una cum quadrato
ex ΔΒ æquale quadrato ex ΑΔ. dico lineam
ΓΔ æqualem esse ἰπσὶ ΔΒ.

Posatur enim ἰπσὶ ΔΒ æqualis ΑΕ. & quoniam rect-
angulum ΒΑΓ una cum quadrato ex ΔΒ, hoc est
cum quadrato ex ΕΑ, æquale
est quadrato ex ΑΔ; commune
auferatur rectangulum ΔΑΓ:
ergo reliquum, quod sub ΒΔ
& ΑΓ continetur, videlicet
rectangulum ΕΑΓ, una cum quadrato ex ΕΑ, quod
[per 3.2.] est rectangulum ΓΕΑ, æquale erit [per 2.2.]
ἰπσὶ ΑΔΓ rectangulo: quare recta ΕΑ, hoc est ΒΔ,
ἰπσὶ ΔΓ æqualis est.

LEMMA X.

Sit recta linea ΑΒ, in qua sumantur tria puncta
Γ, Δ, Ε, ita ut ΒΕ sit æqualis ΕΓ, & rectangu-
lum ΑΕΔ æquale quadrato ex ΓΕ. dico ut ΒΑ
ad ΑΓ ita esse ΒΔ ad ΔΓ.

Quoniam enim rectangu-
lum ΑΕΔ æquale est qua-
drato ex ΓΕ; erit [per 17.6.]
ut ΑΕ ad ΕΓ ita ΓΕ ad ΕΔ:
unde per conversionem ratio-
nis, antecedentibusque bis sumptis, & dividendo pro-
portionales erunt, nempe ΒΑ ad ΑΓ sicut ΒΔ ad ΔΓ.

Qq 2

LEMMA

156 PAPPI LEMMATA IN III. LIB. CONIC.

LEMMA XI.

Sit rursus rectangulum $B\Gamma\Delta$ æquale quadrato ex ΓE , & $A\Gamma$ ipsi ΓE æqualis. dico rectangulum $A B E$ æquale esse rectangulo $\Gamma B \Delta$.

Quoniam enim [ex hyp.] rectangulum $B\Gamma\Delta$ quadrato ex ΓE est æquale; ut $B\Gamma$ ad ΓE , hoc est [ex hyp.] ad ΓA , ita erit [per 17.6.] ΓE , hoc est ΓA , ad $\Gamma \Delta$, & tota ad totam, & per conversionem rationis; & spatium spatio æquale: ergo rectangulum $A B E$ æquale est $\Gamma B \Delta$ rectangulo.


Sed illud etiam constat, rectangulum nempe $A \Delta E$ ipsi $B \Delta \Gamma$ æquale esse: nam si à quadrato ex ΓE & à rectangulo $B \Gamma \Delta$ æqualibus auferatur commune quadratum ex $\Gamma \Delta$, quæ relinquentur æqualia erunt.

LEMMA XII.

In duas æquidistantes AB , $\Gamma \Delta$ per idem punctum E tres lineæ ducantur $A E \Delta$, $B E \Gamma$, $Z E H$. dico ut rectangulum $A E B$ ad rectangulum $A Z B$ ita esse rectangulum $\Gamma E \Delta$ ad $\Gamma H \Delta$ rectangulum.

Hoc per compositam rationem manifestum est. ut enim $A E$ ad $E \Delta$ ita [per 4.6.] est $A Z$ ad $H \Delta$; & ut $B E$ ad $E \Gamma$ ita $Z B$ ad $H \Gamma$; & rationes rectangulorum componuntur ex his rationibus†: proportionalia igitur sunt.

Sed licet & aliter demonstrare absque composita ratione hoc pacto. quoniam enim [per 4.6.] ut $A E$ ad $B E$ ita est ΔE ad $E \Gamma$; erit [per 1.6.] rectangulum $A E B$ ad quadratum ex $E B$ ut rectangulum $\Delta E \Gamma$ ad quadratum ex $E \Gamma$. ut autem quadratum $E B$ ad quadratum ex $B Z$ ita [per 1. & 22.6.] quadratum ex $E \Gamma$ ad quadratum ex ΓH : quare ex æquo [per 22.5.] ut rectangulum $A E B$ ad quadratum ex $B Z$ ita rectangulum $\Delta E \Gamma$ ad quadratum ex ΓH . sed ut quadratum ex $B Z$ ad rectangulum $B Z A$ ita quadratum ex ΓH ad rectangulum $\Gamma H \Delta$: ex æquo igitur, ut rectangulum $A E B$ ad rectangulum $A Z B$ ita rectangulum $\Gamma E \Delta$ ad rectangulum $\Gamma H \Delta$. Q. E. D.



LEMMA ια'.

Εἰς δύο παράλληλους τὸ ὑπὸ $B\Gamma\Delta$ ἴσον τῷ ἀπὸ ΓE , ἴση δὲ ἡ $A\Gamma$ τῇ ΓE . ὅτι τὸ ὑπὸ $A B E$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ $\Gamma B \Delta$.

ΕΠΕΙ γὰρ τὸ ὑπὸ $B\Gamma\Delta$ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ ΓE , ἀνάλογον ἔσται ὡς ἡ $B\Gamma$ πρὸς ΓE , τετάρτη πρὸς πλὴν ΓA , ὅπως ἡ ΓE , τετάρτη ἡ $A\Gamma$, πρὸς πλὴν $\Gamma \Delta$, καὶ ὅλη πρὸς ὅλην, καὶ ἀνατρέψαντες, καὶ χαίρειον χαίρειον τὸ ἀπὸ $A B E$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ $\Gamma B \Delta$.

Φανερὸν δὲ ὅτι καὶ τὸ ὑπὸ $A \Delta E$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ $B \Delta \Gamma$. ἰσὺν γὰρ ἀφαιρούμεν τὸ ἀπὸ $\Gamma \Delta$ καὶ ἀπὸ τῶν ὑπὸ ΓE πρὸς τὸ ὑπὸ $B\Gamma\Delta$ ἰσότητος, γίνεται τὰ λοιπὰ ἴσα.

LEMMA ιβ'.

Εἰς δύο παράλληλους πρὸς AB , $\Gamma \Delta$, διὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου E , τρεῖς διήχθωσαν αἱ $A E \Delta$, $B E \Gamma$, $Z E H$. ὅτι ἐστὶν ὡς τὸ ὑπὸ $A E B$ πρὸς τὸ ὑπὸ $A Z B$ ὅταν τὸ ὑπὸ $\Gamma E \Delta$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\Gamma H \Delta$.

ΔΙΑ τὴν συνημμένην φανερὸν. ὡς γὰρ ἡ $A E$ πρὸς πλὴν $E \Delta$ ὅπως ἡ $A Z$ πρὸς πλὴν $H \Delta$, ὡς δὲ ἡ $B E$ πρὸς πλὴν $E \Gamma$ ὅπως ἡ $Z B$ πρὸς πλὴν $H \Gamma$, καὶ σύγκειται ἐκ τούτων τὰ χαίρειον ἀνάλογον ἀπὸ ἐξ.

Εἰς δὲ καὶ ὅταν ἀποδείξαι μὴ ἀποσχεμαζόμενοι τὴν συνημμένην. ὅτι γὰρ ἐστὶν ὡς ἡ $A E$ πρὸς πλὴν $E B$ ὅπως ἡ ΔE πρὸς πλὴν $E \Gamma$, καὶ ὡς ἀπὸ τὸ ὑπὸ $A B E$ πρὸς τὸ ὑπὸ $E B B$ ὅπως τὸ ὑπὸ $\Delta E \Gamma$ πρὸς τὸ ὑπὸ $E \Gamma$. ἀλλὰ καὶ ὡς τὸ ὑπὸ $E B$ πρὸς τὸ ὑπὸ $B Z$ ὅπως τὸ ὑπὸ $B \Gamma$ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓH . δι' ἵσου ἀπὸ ἐξ ὡς τὸ ὑπὸ $A E B$ πρὸς τὸ ὑπὸ $B Z$ ὅπως τὸ ὑπὸ $\Delta E \Gamma$ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓH . ἀλλὰ καὶ ὡς τὸ ὑπὸ $B Z$ πρὸς τὸ ὑπὸ $B Z A$ ὅπως τὸ ὑπὸ ΓH πρὸς τὸ ὑπὸ $\Gamma H \Delta$. δι' ἵσου ἀπὸ ἐξ ὡς τὸ ὑπὸ $A E B$ πρὸς τὸ ὑπὸ $A Z B$ ὅπως τὸ ὑπὸ $\Gamma E \Delta$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\Gamma H \Delta$. ὅ. ὅ. δ.

* Hoc est, adhibendo 19am quinti, quæ sic incipit, & postea conversionem rationis, & demum [per 16.6.] æquando rectangulum sub extremis cum rectangulo sub mediis. † Nempe ratio rectanguli $A E B$ ad $\Gamma E \Delta$ componitur ex ratione $A E$ ad $E \Delta$, & ratione $B E$ ad $E \Gamma$: & ratio $A Z B$ ad $\Gamma H \Delta$ componitur ex ratione $A Z$ ad $H \Delta$, & ratione $Z B$ ad $H \Gamma$. Cumque componentæ rationes æquales sint, constat propositum.

ΑΠΟΛ-

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΠΕΡΓΑΙΟΥ ΚΩΝΙΚΩΝ

ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ,

ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΥΤΟΚΙΟΥ ΑΣΚΑΛΩΝΙΤΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ.

APOLLONII PERGÆI CONICORUM

LIBER TERTIUS,

CUM COMMENTARIIS EUTOCII ASCALONITÆ.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ α'.

Εάν κώνυς τομὴς ἢ κύκλος περιφέρειας εὐθείας ἐκτεταθείας συμπέσῃσι, ἀχθῶσι δὲ διὰ τῆς ἀφ' αὐτῆς διμέτρους συμπέσῃσι ταῖς ἐφαπτομέναις ἴσα ἔσται τὰ γινόμενα καὶ κορυφῶν τρίγωνων.


PROP. I. Theor.

Si conic sectionem vel circuli circumferentiam rectæ lineæ contingentes inter se conveniant; per tactus vero ducantur diametri, quæ contingentibus occurrant: triangula ad verticem facta sibi ipsis æqualia erunt.

ΕΣΤΩ κώνυς τομὴς ἢ κύκλος περιφέρειας ἡ ΑΒ, καὶ τὰ ΑΒ ἐφαπτομένων ἡ τε ΑΓ καὶ ἡ ΒΔ συμπέσῃσι κατὰ τὸ Ε, καὶ ἡχθῶσιν διὰ τῆς ΑΒ διάμετροι τῆς τομῆς αἱ ΓΒ, ΔΑ, συμπέσῃσι τῇ ἐφαπτομένῃ κατὰ τὸ Γ, Δ· λέγω ὅτι ἴσον ἐστὶ τὸ ΑΔΕ τρίγωνον τῷ ΕΒΓ.

Ἡχθῶ γὰρ ἀπὸ τοῦ Α εὐθεῖα τὴν ΒΔ ἢ ΑΖ, περιγεμνῶνς ἅρα καὶ τῇ. Ἐστὶ δὲ, ὅτι μὲν τῇ εὐθεῖᾳ Βολῆς, ἴσον τὸ ΑΔΒΖ εὐθυγράμμω τῷ ΑΓΖ τρίγωνῳ· ἔ, κοινὸν ἀφαιρέμεν τὸ ΑΒΒΖ, λοιπὸν τὸ ΑΔΕ τρίγωνον ἴσον ἐστὶ τῷ ΓΒΕ τρίγωνῳ.

Ἐπὶ δὲ τῇ λοιπῇ, συμπέσῃσι αἱ διμέτρους κατὰ τὸ Η κέντρον. ἐπὶ δὲ ἐν κατῆκται ἡ ΑΖ, καὶ



SIT conic sectio vel circuli circumferentia ΑΒ, quam contingant rectæ ΑΓ, ΒΔ convenientes in puncto Ε, & per tactus Α, Β diametri sectionis ΓΒ, ΔΑ ducantur, quæ contingentibus occurrant in punctis Γ, Δ: dico triangulum ΑΔΕ triangulo ΕΒΓ æquale esse.


Ducatur enim à puncto Α recta ΑΖ ipsi ΒΔ parallela, quæ propterea ordinatim applicata erit. Erit igitur, in parabola, parallelogrammum ΑΔΒΖ æquale [per 42.1.huj.] triangulo ΑΓΖ: quare, ablato communi ΑΒΒΖ, triangulum ΑΔΕ, quod relinquitur, æquale est triangulo ΓΒΕ.

In aliis vero, convenient diametri in centro Η. & quoniam ordinatim applicata est ΑΖ, &

R r Α Γ

ΑΓ sectionem contingit; rectangulum ZHΓ [per 37. I. huj.] æquale est quadrato ex BH: ut igitur ZH ad HB ita est [per 16. 6.] BH ad HΓ: quare [per 20. 6.] ut ZH ad HΓ ita quadratum ex ZH ad quadratum ex HB. sed [per 3. lem. huj.] ut quadratum ex ZH ad quadratum ex HB ita triangulum AHZ ad triangulum ΔHB, & ut ZH ad HΓ ita [per 1. 6.] triangulum AHZ ad triangulum

εφάπτεται ἡ ΑΓ, τὸ ὑπὸ ΖΗΓ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΒΗ· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΖΗ πρὸς ΗΒ ἕτως ἡ ΒΗ πρὸς ΗΓ· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΖΗ πρὸς ΗΓ ἕτως τὸ ὑπὸ ΖΗ πρὸς τὸ ὑπὸ ΗΒ. ἀλλ' ὡς τὸ ὑπὸ ΖΗ πρὸς τὸ ὑπὸ ΗΒ ἕτως τὸ ΔΗΖ τριγώνου πρὸς τὸ ΔΗΒ, ὡς δὲ ἡ ΖΗ πρὸς ΗΓ ἕτως τὸ ΔΗΖ πρὸς τὸ ΔΗΓ· ὥς ἄρα τὸ ΔΗΖ πρὸς τὸ ΔΗΓ



ΔΗΓ: ergo [per 11. 5.] ut triangulum AHZ ad triangulum ΔΗΓ ita triangulum AHZ ad triangulum ΔHB: & propterea [per 9. 5.] triangulum ΔΗΓ triangulo ΔHB est æquale. commune auferatur ΔHB, [in hyperbola HΔΕΓ:] reliquum igitur triangulum ΑΒΔ reliquo ΓΕΒ æquale erit.

ἕτως τὸ ΔΗΖ πρὸς τὸ ΔΗΒ· ἴσον ἄρα τὸ ΔΗΓ τῷ ΔΗΒ. κοινὸν ἀφαιρεθῶν τὸ ΔΗΒΕ· λοιπὸν ἄρα τὸ ΑΒΔ τρίγωνον ἴσον ἐστὶ τῷ ΓΕΒ.

EUTOCIUS.

Tertius conicorum liber, amicissime *Antiochus*, dignus ab antiquis existimatus est in quem multum studii ac diligentiae conferretur, quod variae ipsius editiones ostendunt, sed neque epistolam praefixam habet quemadmodum alii libri, neque commentarios in ipsum docti alicujus viri ex iis qui ante nos fuerunt, quanquam in eo multa sint contemplatione dignissima, ut ipse *Apollonius* in prooemio totius libri asserit. omnia autem à nobis manifeste explicata sunt ac demonstrata ex precedentibus libris & commentariis in eisdem.

Invenitur etiam alia demonstratio, in parabola quidem, hujusmodi.

Quoniam ΑΓ sectionem contingit, & ordinatim applicata est ΑΖ: erit [per 35. I. huj.] & ΓΒ æqualis ipsi ΒΖ, & [per 34. I.] ΒΖ ipsi ΑΔ: ergo ΑΔ, ΓΒ inter se æquales sunt. sed & [per 34. I.] parallelæ: triangulum igitur ΑΔΕ æquale est & simile triangulo ΕΒΓ.

In reliquis vero, junctis ΑΒ, ΓΔ, dicendum.

Quoniam [per 37. I. huj. & 16. 6.] ut ΖΗ ad ΗΒ ita est ΒΗ ad ΗΓ, ut vero ΖΗ ad ΗΒ ita ΑΗ ad ΗΔ, est enim ΑΖ ipsi ΔΒ parallelæ; ergo [per 11. 5.] ut ΒΗ ad ΗΓ ita ΑΗ ad ΗΔ, & propterea [per 2. 6.] ΑΒ parallelæ est ipsi ΓΔ: triangulum igitur ΑΔΓ æquale est [per 37. I.] triangulo ΒΓΔ. & communi ΓΔΒ ablato, relinquatur triangulum ΑΔΕ triangulo ΓΒΕ æquale.

Ad casus quod attinet, dicendum, in parabola quidem & hyperbola non dari casus; in ellipsi vero esse duos. vel enim contingentes rectæ in punctis tactuum diametris occurrentes productis etiam conveniunt, sicuti in textus figura: vel ad alteras partes ad quas est Β, quemadmodum in hyperbola.

Τὸ τρίτον ἔκαστον, ὃ φιλοτέμνει Ἀντίοχος πολλὰς μὲν φησὶν εἶναι τὰ παλαιὰ ἐξέσται, ὡς αἱ παλαιότεραι αὐτῶν ἐκδόσεις δηλοῦν. ἔτι δὲ δευτέραν ἔχει συγγραμμίδα, καὶ δὲ τὰ ἄλλα, ἐπὶ γὰρ οἷς αὐτὸ ἀξιόλογα ἔσθ' ἡμῶν εὐρίσκειται, καὶ τὰ τῶν ἐν αὐτῇ ἀξίων ὄντων διακρίσεις, ὡς καὶ αὐτὸς Ἀπολλώνιος ἐν τῇ προοίμῳ τῆς πρώτης βιβλίου φησὶν. πάντα δὲ ὑφ' ἡμῶν σαφῶς ἐκκεντρεῖται οὐ διακρίματα ἐκ τῆς ἀπολλωνίου βιβλίου καὶ τῶν πρὸς αὐτὸν γραμμάτων.

Ἐστὶ δὲ καὶ ἄλλη ἀπόδειξις, ὅτι μὲν τὸ παραβόλον.

Ἐπεὶ δὲ ἐφάπτεται ἡ ΑΓ, ἔκαστον ἡ ΑΒ, ἴση ἐστὶν ἡ ΓΒ τῇ ΒΖ. ἀλλὰ ἡ ΒΖ τῇ ΑΔ ἴση· καὶ ἡ ΑΔ ἄρα τῇ ΓΒ ἴση. ἔτι δὲ αὐτῇ ἔκαστον ἡ ΑΔΕ τριγώνου πρὸς τὸ ΕΒΓ τριγώνου.

Ἐπὶ δὲ τῇ λοιπῇ, δευτέρῃ συγγραμμίδι τῶν ΑΒ, ΓΔ, λέγεται.

Ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ ΖΗ πρὸς ΗΒ ἕτως ἡ ΒΗ πρὸς ΗΓ, ὡς καὶ ἡ ΖΗ πρὸς ΗΒ ἕτως ἡ ΑΗ πρὸς ΗΔ, ὡς καὶ ἡ ΑΖ τῇ ΔΒ· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΒΗ πρὸς ΗΓ ἕτως ἡ ΑΗ πρὸς ΗΔ· ὡς καὶ ἡ ΑΒ τῇ ΓΔ· ἴση ἄρα τὸ ΑΔΓ τρίγωνον τῷ ΒΓΔ, καὶ κοινὸν ἀφαιρεθῶν τὸ ΓΔΕ, λοιπὸν τὸ ΑΔΕ ἴσον ἐστὶ τῷ ΓΒΕ.

Περὶ δὲ τῶν πλάσεων λεγόντων ὅτι ὅτι τὸ παραβόλον καὶ ὑπερβολὴν ἐκ ἔχει, ὅτι δὲ τὸ ἐλλείψαντος ἔχει δύο. αἱ γὰρ ἐκαστὴν πλάσιν κατὰ τὰς ἀπὸς ἀντιθέτους πᾶσι διαμέτρους καὶ ἐκαστὰς αὐτὰς συμπίπτουσιν, ὡς ἐν τῇ ὑποκείμενῃ καὶ ὅτι τὰ ἑτέρα μέρη κατὰ τὸ Ε, ὡς καὶ ἔχει καὶ ὅτι τὸ ὑπερβολὴν.

ΠΡΟ-

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Β.




Τῶν αὐτῶν ἐπιμετρῶν, ἐάν ᾖ τὸ τομῆς ἢ τὸ
κύκλου περιφέρειας λαμβῇ τι σημεῖον, καὶ δι'
αὐτῶν ᾗ ἀλλήλαι ἀρχῶσι τὰς ἐφαπτομένης
αὐτῶν τὸ ἀξιομετρῶν τὸ γινόμενον περὶ ἀπλῶ-
ρον πρὸς τῇ μιᾷ τὴν ἐφαπτομένην καὶ μιᾷ τῶν
διαμέτρων ἴσον ἔσται καὶ γινόμενον περὶ ἀπλῶ-
ρον τῇ αὐτῇ ἐφαπτομένη καὶ τῇ ἑτέρᾳ τὴν διαμέτρων.

ΕΣΤΩ γὰρ κύκλος τὸν ἢ κύκλος περιφέρεια ἢ
AB, καὶ ἐφαπτομένη αὐτῶν AEG, BEA, ἀξιομε-

PROP. II. Theor.


In eisdem positis, si in conic sectione vel
circuli circumferentia sumatur ali-
quod punctum, & per ipsum paral-
lelae contingentibus usque ad diamet-
tros ducantur: quadrilaterum, factum
ad unam contingentium & ad unam
diametrorum, æquale erit triangulo
ad eandem contingentem & alteram
diametrum constituto.

SIT AB conic sectio vel circuli circumferentia,
quam contingant rectæ lineæ AEG, BEA, &c



τροι ὅ αὐτῶν AΔ, BΓ, ἐκλήθω
τι σημεῖον ὅτι τὸ τομῆς τὸ H,
καὶ ᾗ ἀλλήλαι ἀρχῶσι τὰς ἐφαπτο-
μένης αὐτῶν HKΛ, HMZ: λέγω
ὅτι ἴσον ἔσται τὸ AIM τρίγωνον
τῷ ΓΛΗΙ τετραπλεύρῳ.

Επειδὴ περὶ δεδεδεικται ἴσον τὸ
HKM τρίγωνον τῷ ΑΛ τετρα-
πλεύρῳ, κοινὸν προσκείσθω ἡ
ἀφαιρεθῶ τὸ ΙΚ τετράπλευ-
ρον, καὶ γίνεται τὸ AIM τρίγω-
νον ἴσον τῷ ΓΗ τετραπλεύρῳ.



diametri sint AΔ, BΓ; sumpto
autem in sectione puncto H,
ducantur HKΛ, HMZ contin-
gentibus parallelæ: dico trian-
gulum AIM æquale esse qua-
drilatero ΓΛΗΙ.

Quoniam enim ostensum est
[ad 42. & 43. I. huj.] HKM
triangulum æquale quadrila-
tero ΑΛ; commune appona-
tur vel auferatur quadrilate-
rum ΙΚ, & fiet triangulum
AIM quadrilatero ΓΗ æquale.

EUTOCIUS.

Τὰς πρῶτας τέττε διαγράμματα εὐχρηστικῶς ἀφ' ἑ μὲν, καὶ
μὲν, διαγράμματος τὸ πρῶτον βιβλίον, καὶ τὸ οἷον αὐτὰ γεγραμ-
μένων ὁρίων. ὅτι μὲν οὖν δεικνύσιν, ὅτι ἐάν τὸ H σημεῖον
μεταξὺ τῶν A, B λαμβῇ, ὅτι παραλλήλους εἶναι τὰς ΔΕΒ,
ΜΗΖ: ΑΕΓ, ΑΗΚ, ἐκλήθω δὲ ἡ ΑΚ μέχρι τὸ τομῆς
ὅτι καὶ τὸ N, καὶ ἀφ' ἑ N τῇ BΔ παραλλήλος ἀρχῇ ἡ ΝΖ:
ἔσται δὲ τὰ εἰρημύνα ἐν τῷ πρῶτῳ βιβλίῳ, καὶ τὸ μὲν, καὶ ν'.
διαγράμμα καὶ τὸ τέττον ὁρίων, τὸ ΚΝΖ τετράγωνον καὶ ΚΓ
τετραπλεύρῳ ἴσον. ἀλλὰ τὸ ΚΝΖ ὁμοίον ἐστὶ τῷ ΚΜΗ,
ὅτι παραλλήλους ἐστὶ ἡ ΜΗ τῇ ΝΖ. ἐστὶ δὲ αὐτῶν καὶ ἴσον,
ὅτι ἐφαπτομένη ἐστὶ ἡ ΑΓ, παραλλήλος δὲ αὐτῇ ἡ ΗΝ,
καὶ ἀξιομετρῶν ἡ ΜΖ, καὶ ἴση ἀρα ἡ ΝΚ τῇ ΚΗ. ὅτι
ἐν ἴσον ἐστὶ τὸ ΚΝΖ τρίγωνον καὶ ΚΓ τετραπλεύρῳ κοινὸν
προσθεστέον τῷ ΑΝ, γίνεται τὸ ΑΘΖ τρίγωνον τῷ ΝΓ
τετραπλεύρῳ ἴσον.

Casus hujus theorematism invenientur per quadragesim-
um secundum & quadragesimum tertium theore-
ma primi libri, & commentarios in ea conscri-
ptos. oportet autem scire, si punctum H inter A, B
sumatur, ita ut æquidistantes sint ΔΕΒ, ΜΗΖ, item-
que ΑΕΓ, ΑΗΚ, & producat A K usque ad sectio-
nem in N, & per N ducatur NZ ipsi BΔ æquidistans:
ex iis quæ tradita sunt in theoremate quadragesimo no-
no & quinquagesimo primi libri, & in ipsa commen-
tariis, erit triangulum ΚΝΖ æquale quadrilatero ΚΓ.
Sed triangulum ΚΝΖ simile est triangulo ΚΜΗ, cum
ΜΗ æquidistans sit ΝΖ. est autem & eidem æquale,
quoniam ΑΓ est recta contingens, cui æquidistat ΗΝ,
& ΜΖ est diameter, & ΝΚ æqualis ΚΗ. quoniam
igitur triangulum ΚΝΖ æquale est quadrilatero ΚΓ;
adjiciatur commune quadrilaterum ΑΝ, ac fiet trian-
gulum ΑΘΖ æquale quadrilatero ΝΓ.

PROP.

PROP. III. Theor.




Iisdem positis, si in conii sectione vel circuli circumferentia duo puncta sumantur; & per ipsa ducantur parallelæ contingentibus usque ad diametros: quadrilatera, quæ ab ipsis fiunt, diametrisque insunt, inter se æqualia erunt.

SIT enim conii sectio, vel circuli circumferentia, lineæque contingentēs & diametri, sicuti jam dictum est; & sumptis in sectione duo-

ΠΡΟΤΑΣΙΣ γ'.


Τῶν αὐτῶν ἐπιγεγραμμένων, ἐὰν ἐπὶ τῆς τομῆς ἢ τῆς περιφέρειας δύο σημεῖα ληφθῇ, καὶ δι' αὐτῶν παράλληλοι ἀχθῶσιν ὥς τῇ διαμέτρῳ ταῖς ἐφαπτομέναις καὶ γινόμενα ἐκ τῶν ἀχθουσῶν τετραγώνων, βεβαιότα δὲ ἐπὶ τῇ διαμέτρῳ, ἴσα ἔσται ἀλλήλοις.

ΕΣΤΩ γὰρ ἡ τομή, ἡ κύκλος περιφέρεια, καὶ ἐφαπτομένη καὶ αἱ διαμέτροι, ὡς προήρηται, καὶ ἐληφθῶσιν ἐπὶ τῆς τομῆς δύο τοχόντες σημεῖα καὶ Ζ, Η.



bus punctis Z, H, ducantur per Z quidem lineæ contingentibus parallelæ ZΘΚΑ, ΝΖΙΜ, per H vero ducantur NHΞΟ, ΗΘΠΡ: dico quadrilaterum ΑΗ quadrilaterο ΜΘ, & quadrilaterum ΑΝ ipsi PN æquale esse.

Quoniam enim antea [ad 2. 3. huj.] demonstratum est triangulum PΠΑ æquale quadrilaterο ΓΗ, & triangulum ΑΜΙ quadrilaterο ΓΖ; est autem ΑΡΠ triangulum majus quam triangulum ΑΜΙ quadrilaterο ΠΜ: erit & quadrilaterum ΓΗ majus quam ΓΖ eodem ΜΠ quadrilaterο: & propterea quadrilaterum ΓΗ æquale est quadrilateris ΓΖ, ΜΠ, hoc est ipsis ΓΘ, ΡΖ, commune auferatur ΓΘ: reliquum igitur quadrilaterum ΑΗ æquale est reliquo ΘΜ: quare & totum ΑΝ toti PN æquale erit.



καὶ διὰ μὲν τῶν Ζ, Η ἐφαπτομέναις παράλληλοι ἀχθῶσιν ἡ περὶ ΖΘΚΑ καὶ ἡ ΝΖΙΜ, διαμέτρῳ δὲ ΗΘΠΡ: λέγω ὅτι ἴσων ἐστὶ τὸ μὲν ΑΗ τετραγώνον τῷ ΜΘ, καὶ τὸ ΑΝ τῷ ΡΝ.

Επεὶ γὰρ προεδείκνυται ὅτι τὸ ΡΠΑ τρίγωνον τῷ ΓΗ περαπλεύρω, τὸ δὲ ΑΜΙ τῷ ΓΖ, τὸ δὲ ΑΡΠ τῷ ΑΜΙ μείζον ἐστὶ τῷ ΠΜ περαπλεύρω καὶ τὸ ΓΗ ἄρα τῷ ΓΖ μείζον ἐστὶ τῷ ΜΠ περαπλεύρω: ὥς τε τὸ

ΓΗ ἴσων ἐστὶ τῷ ΓΖ καὶ τῷ ΜΠ, ταῦτα τῷ ΓΘ ἐστὶ τῷ ΡΖ. κοινὸν ἀφαιρεθῶ τὸ ΓΘ: λοιπὸν ἄρα τὸ ΑΗ ἴσων ἐστὶ τῷ ΘΜ: καὶ ὅλον ἄρα τὸ ΑΝ τῷ ΡΝ ἴσων ἐστίν.

EUTOCIUS.

Hoc theorema plures casus habet, quos ut in antecedente invenimus. sed animadvertendum est duo puncta quæ sumuntur, vel esse inter duas diametros, vel extra & ad easdem partes. nam si alterum quidem extra sumatur, alterum vero inter diametros, non constituentur quadrilatera de quibus in propositione dictum est. sed neque ad utraque diametrorum partes constituentur.

Τὸ θεωρήμα τῷτο πλείους ἔχει πλάσεις, αἷ εὐρίσκωμεν ὁμοίως πρὸς αὐτὸ. εἴ μὲν γὰρ ἐπισημαίνωμεν ὅτι τὰ λαμβανόμενα δύο σημεῖα ἢ μεταξὺ εἰσι τῶν δύο διαμέτρων, ἢ τὰ δύο ἐκτὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη. εἰ γὰρ τὸ μὲν ἔστω ἐκτὸς λαμβανόμενον, τὸ δὲ ἔστω μεταξὺ τῶν διαμέτρων, ἢ ἀντίστανται τὰ ἐν τῇ προτάσει λαμβανόμενα τετραγώνων, ἀλλ' ἐπὶ ἑκάστης τῆς διαμέτρων.

ΠΡΟ-

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Δ'.

Εάν τ' ἀντικείμεναι δύο εὐθεῖαι ὁπιφάυσαι συμπίπτωσι ἀλλήλαις, ἀχθῶσι δὲ αἱ αὐτὲς ἀφ' ὧν αἱ ἀντικείμεναι συμπίπτουσιν ταῖς ἐφαπτομέναις ἴσα ἔσται τὰ περὶ ταῖς ἐφαπτομέναις τρίγωνα.


ΕΣΤΩΣΑΝ ἀντικείμεναι αἱ Α, Β, αἱ δὲ ἐφαπτομέναι αὐτῶν αἱ ΑΓ, ΒΓ συμπτέτωσαι κατὰ τὸ Γ, κέντρον δὲ ἔστω τ' τομῶν τὸ Δ, καὶ ἐπέλυσθω ἡ ΑΒ, καὶ ἡ ΓΔ, καὶ ἐκτελέσθω ἡ ΓΔ διὰ τὸ Ε, ἐπέλυσθω δὲ καὶ αἱ ΔΑ, ΒΔ, καὶ ἐκτελέσθωσαν διὰ τὰ Ζ, Η· λέγω ὅτι ἴσον ἐστὶ τὸ ΑΔΗ τρίγωνον τῷ ΒΔΖ, τὸ δὲ ΑΓΖ τῷ ΒΓΗ.

Ἐχθῶ γὰρ αἱ αὐτὲς ἐφαπτομένη τ' τομῆς ἡ ΘΛ· παράλληλος ἄρα ἐστὶ τῇ ΑΗ. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΑΔ τῇ ΔΘ, ἴσον ἂν εἴη τὸ ΑΗΔ τρίγωνον τῷ ΘΛΔ. ἀλλὰ τὸ ΔΘΛ τῷ ΒΔΖ ἐστὶν ἴσον· καὶ τὸ ΑΗΔ ἄρα τῷ ΒΔΖ ἐστὶν ἴσον· ὥστε καὶ τὸ ΑΓΖ τῷ ΒΓΗ ἴσον.

PROP. IV. Theor.

Si duæ rectæ lineæ oppositas sectiones contingentes inter se conveniant, & per tactus ducantur diametri contingentibus occurrentes: triangula, quæ ad contingentes constituuntur, æqualia erunt.

SINT oppositæ sectiones Α, Β, quas contingant rectæ lineæ ΑΓ, ΒΓ in puncto Γ convenientes; sitque sectionum centrum Δ; & junctis ΑΒ, ΓΔ, producaturs ΓΔ usque ad Β; jungantur etiam ΔΑ, ΒΔ; & ad Ζ, Η producantur: dico triangulum ΑΔΗ æquale esse triangulo ΒΔΖ; & ΑΓΖ triangulum triangulo ΒΓΗ.



Ducatur enim per Θ contingens sectionem ΘΛ, quæ

[per demonstrata ab Eutocio ad 44. I. huj.] ipsi ΑΗ parallela erit. & quoniam [per 30. I. huj.] ΑΔ æqualis est ΔΘ; erit [per 26. I.] ΑΗΔ triangulum æquale triangulo ΘΛΔ. sed [per 1. 3. huj.] & triangulum ΔΘΛ æquale est triangulo ΒΔΖ: igitur triangulum ΑΗΔ triangulo ΒΔΖ æquale: unde triangulum ΑΓΖ ipsi ΒΓΗ est æquale.

EUTOCIUS.

Εἰ τῇ θεωρήσει τύτῃ τ' διαρίμματος καὶ τ' ἐφεξὺς δι' ὁρίσται, ὅτι τ' ἀντικείμεναι λέγει ἀδιορίστως· καὶ πᾶσι μὲν τ' ἀντικείμεναι ταῖς δύο ἐφαπτομέναις ὅτι τ' μίας τομῆς ἔχουσιν, πᾶσι δὲ ἐκείναις ταῖς δύο ἐφαπτομέναις ὅτι τ' μίας, ἀλλ' ἐφ' ἑκατέρῃ αὐτῶν μίας συμπτέτωσαι ἀλλήλαις (ὡς εἴρηται ἐν τῷ δευτέρῳ βιβλίῳ) ἐν τῇ ἐφεξὺς γωνίᾳ τῶν ἀσυμπτῶτων. καὶ ὥστε δὴ κἀκοίνοι συμβαίνει τὰ τ' θεωρήματα. ἔστι δὲ τῶν βολομένων ἀσφαγέμενοι ὁποσύνεστι. καὶ δὴλον ὅτι, εἰ μὲν τῆς μίας τ' τομῆς δύο εὐθεῖαι ἐφαπτόντο, ἡ αὐτὴ τ' συμπτέτωσαι αὐτῶν καὶ τ' κέντρος ἡ πλαγία ἀφ' ἧς ἐστὶ τῶν ἀντικείμενων· εἰ δὲ ἐκατέρῃ μίᾳ ἔστιν ἐφαπτομένη, ἡ αὐτὴ τ' συμπτέτωσαι αὐτῶν καὶ τ' κέντρος ἡ ὁρδία διὰ μέσης ἔστι.

In propositione hujus theorematism & eorum quæ sequuntur, scire oportet Apollonium indeterminate dicere *oppositas sectiones*: & nonnulli quidem codices habent duas contingentes in una sectione: nonnulli vero non duas contingentes in una, sed singulas in utraque sectione contingentes, quæ inter se conveniunt (uti dictum est in secundo libro) in angulo qui deinceps est angulo asymptotōn; & ita eveniunt ea quæ in propositione dicuntur. licet autem iis, qui volunt, hoc descriptis figuris considerare, ac manifestum est, si unam sectionum duæ rectæ lineæ contingant; quæ per punctum concursus earum & centrum ducitur recta, oppositarum sectionum transversa diameter est: si vero utramque sectionem singulæ lineæ contingant; quæ per dictum punctum & centrum ducitur, est recta diameter sectionum.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Ε'.

Εάν τ' ἀντικείμεναι δύο εὐθεῖαι ὁπιφάυσαι συμπίπτωσι, καὶ λαβῶν ἐφ' ὁποτέρῃς τ' τομῶν σημείον π, καὶ ἀπ' αὐτοῦ ἀχθῶσι δύο εὐθεῖαι, ἡ μὲν παρὰ τὴν ἐφαπτομένην, ἡ δὲ παρὰ τὴν ταῖς ἀφ' ὧν ὁπιφάυσαντο τὸ γινόμενον ὑπ' αὐτῶν τρίγωνον, περὶ τῇ αἱ αὐτὲς συμπίπτουσιν ἡμέτεροι αἱ αὐτὲς, ὅτι λαμβανομένης τε γωνίας περὶ τῇ συμπίπτει τ' ἐφαπτομένη διαφέρει, καὶ ὅτι λαμβανομένης τε γωνίας περὶ τῇ ἐφαπτομένη καὶ τῇ αἱ αὐτὲς ἀφ' ὧν ἀντικείμεναι αἱ αὐτὲς.

ΕΣΤΩΣΑΝ ἀντικείμεναι αἱ Α, Β, ὧν κέντρον τὸ Γ, καὶ ἐφαπτομέναι αἱ ΕΔ, ΔΖ συμπτέ-

PROP. V. Theor.

Si duæ rectæ lineæ oppositas sectiones contingentes sibi ipsis occurrant; & in quavis sectionum aliquod punctum fumatur, à quo ducantur duæ lineæ, una quidem contingentī æquidistans, altera vero parallela ei quæ tactus conjungit: triangulum, quod ab ipsis constituitur ad diametrum per occursum ductam, à triangulo quod est ad occursum contingentium differt, triangulo facto ad contingentem & ad diametrum illam quæ per tactum ducitur.

SINT oppositæ sectiones Α, Β, quarum centrum Γ; & lineæ contingentes sint ΕΔ, ΔΖ, quæ


ΠΡΟΤΑΣΙΣ 6'.

PROP. VI. Theor.

Τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων, εἰς ὅτι μὴ τ' ἀντικειμένον ληφθῇ π σημῆον, καὶ ἀπ' αὐτῶν παράλληλοι ἀχθῶσι ταῖς ἐφαπτομέναις, συμπίπτουσαι ταῖς ἐφαπτομέναις καὶ ταῖς ἀφαιρέταις· τὸ γινόμενον ὑπὸ αὐτῶν τετραπλευροῦ, ὡς τῇ μὲν τ' ἐφαπτομένῃ καὶ τῇ μὲν τ' ἀφαιρέταις, ἴσον ἔσται πρὸς γινόμενῳ τετραγώνῳ, ὡς τῇ αὐτῇ ἐφαπτομένῃ καὶ τῇ ἐτέρᾳ τ' διαμέτρῳ.

Isidem positis, si in una oppositarum sectionum aliquod punctum sumatur, & ab eo ducantur rectæ lineæ contingentibus parallelæ, quæ & contingentibus & diametris occurrant: quadrilaterum ab ipsis factum, ad unam contingentium & ad unam diametrorum, æquale erit triangulo, quod ad eandem contingentem & ad alteram diametrum constituitur.

ΕΣΤΩΣΑΝ ἀντικείμενα, ὧν διαμέτροι αἱ ΑΕΓ, ΒΕΔ, καὶ τ' ΑΒ τομῆς ἐφαπτομένῃ αἱ ΑΖ, ΒΗ, συμπίπτουσαι ἀλλήλαις κατὰ τὸ Θ, εἰληφθῶ δὲ π σημῆον ὅτι τ' τομῆς τὸ Κ, καὶ ἀπ' αὐτῆς τ' ἐφαπτομένης ὡς ἀλλήλοις ἤχθωσαν αἱ ΚΑΜ, ΚΝΞ· λέγω ὅτι τὸ ΚΖ τετραπλευρον τῷ ΑΙΝ τριγώνῳ ἔσται ἴσον.




Επεὶ ἔν ἀντικείμενα αἱ ΑΒ, ΓΔ, καὶ τ' ΑΒ ἐφαπτομένη ἡ ΑΖ συμπίπτουσαι τῇ ΒΔ, καὶ ὡς ἀπὸ τῆς ΑΖ ἡ ΚΑ· ἴσον ἔστι τὸ ΑΙΝ τετράγωνον τῷ ΚΖ τετραπλευρῷ.

Quoniam enim oppositæ sectiones sunt ΑΒ, ΓΔ, & sectionem ΑΒ contingit recta linea ΑΖ ipsi ΒΔ occurrens, & ducta est ΚΑ parallela ipsi ΑΖ: triangulum ΑΙΝ [per 2. 3. huj.] quadrilatero ΚΖ æquale erit.

EUTOCIUS.

Αἱ πρὸς τὴν τ' ἀφαιρέταις καὶ τῶν ἐφαπτομένων, ὡς εἴρηται ἐν ταῖς τ' πρὸς τὴν ἀφαιρέταις, πολλὰ εἰσι· ὅτι πᾶσιν μὲν τοῖς αὐτοῖς συμβαίνει, ὑπὲρ δὲ πλείονος σαφέστερον, ὑποκαθάρσας μὴ ἐξ αὐτῶν, καὶ ἤχθωσαν ἀπὸ τῆς Γ ἐφαπτομένης τῆς τομῆς ἡ ΓΠΡ· φανερὸν δὲ ὅτι πρὸς ἀλλήλους ὡς τῇ ΑΖ καὶ τῇ ΜΑ. καὶ ἐπεὶ δὲ δεικνύει ἐν τῷ δευτέρῳ διαγράμματι, κατὰ τὴν τῆς ὑπερβολῆς καταγραφῆς, τὸ ΓΠΝ πρὸς ΑΚΠΡ τετραπλευρῷ ἴσον, κοινὸν προσκεῖσθαι τὸ ΜΠ· τὸ ἄρα ΜΚΝ τρίγωνον τῷ ΜΑΡΓ ἴσον ἔσται. κοινὸν προσκεῖσθαι τὸ ΓΡΒ, ὃ ἔστι ἴσον τῷ ΑΒΖ, διὰ τὰ ἐν τῇ μ.α. τῷ πρὸς βιβλίου· ὅλον ἄρα τὸ ΜΕΛ ἴσον ἔσται τῷ ΜΚΝ καὶ τῷ ΑΒΖ, καὶ τὸ ἀφαιρέταις τῶν ΚΜΝ, λοιπὸν τὸ ΑΒΖ πρὸς ΚΑΒΝ ἔστιν ἴσον. κοινὸν προσκεῖσθαι τὸ ΖΕΝΙ· ὅλον ἄρα τὸ ΑΙΝ τρίγωνον τῷ ΚΑΖΙ ἴσον ἔσται. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ΒΟΛ ἴσον ἔσται τῷ ΚΝΗΟ.



Casus hujus theorematiss, & quidem omnium sectionum, multi sunt; ut dictum est in scholiis ad quintam propositionem: eadem tamen eveniunt in singulis. Verum, majoris evidentie gratia, describatur eorum unus, & ducatur recta ΓΠΡ sectionem contingens in Γ: patet igitur eam ipsis ΑΖ, ΜΑ parallelam esse. Quoniam autem, per secundum theoremma hujus, in figura hyperbolæ, demonstratum est triangulum ΓΠΝ quadrilatero ΑΚΠΡ æquale, commune addatur quadrilaterum ΜΠ; ac triangulum ΜΚΝ quadrilatero ΜΑΡΓ æquale erit. commune adjiciatur triangulum ΓΡΒ, ipsi ΑΒΖ [per 41. primi huj.] æquale: erit igitur totum triangulum ΜΕΛ triangulis ΜΚΝ, ΑΒΖ simul æquale. utrinque auferatur commune triangulum ΚΜΝ; ac reliquum ΑΒΖ quadrilatero ΚΑΒΝ æquabitur. dein addatur commune quadrilaterum ΖΕΝΙ; totum igitur triangulum ΑΙΝ quadrilatero ΚΑΖΙ æquale est†. Pariter triangulum ΒΟΛ æquale erit quadrilatero ΚΝΗΟ.

† Ac si producat ΑΜ ad Α, ac ducatur ΑΑ ipsi ΒΗ parallela: erunt, ob ΚΜ ipsi ΜΑ æqualem, trianguλα ΚΜΝ, ΑΜΑ æqualia; ac proinde quadrilaterum ΙΝΑ parallelogrammo ΚΑ æquale. adjiciantur æqualia ΑΙΝ & ΚΑΖΙ, ac fiet triangulum ΑΑ quadrilatero ΑΑΖ æquale.


PROP.

PROP. VII. Theor.

Iisdem positis, si in utraque sectione aliqua puncta sumantur; & ab ipsis ducantur lineæ contingentibus parallelæ, quæ & contingentibus & diametris occurrant: quadrilatera à lineis ductis constituta & diametris insistentia inter se æqualia erunt.

PONANTUR enim eadem quæ supra; & in utraque sectione puncta K, Λ sumantur, per quæ ducantur $MKΠΡΧ$, $NΣΤΛ$ ipsi AZ parallelæ; & $NΙΟΚΞ$, $ΧΦΤΛ$ parallelæ ipsi BH : dico eadem evenire quæ in propositione dicta sunt.

Nam cum triangulum $ΛΟΙ$ [per 2.3. huj.] quadrilatero $ΡΟ$ æquale sit, commune apponatur $ΕΟ$; & erit totum triangulum $ΑΒΖ$ æquale quadrilatero $ΚΒ$. est autem [per *Eutoc.* 6.3. huj.] & $ΒΕΗ$ triangulum quadrilatero $ΑΒ$ æquale: & [per 1.3. huj.] triangulum $ΑΒΖ$ triangulo $ΒΗΕ$: ergo & quadrilaterum $ΛΕ$ æquale est quadrilatero $ΙΚΡΕ$. commune apponatur $ΝΕ$: totum igitur $ΤΚ$ toti $ΙΛ$; & $ΚΤ$ ipsi $ΡΛ$ æquale erit.



ΠΡΟΤΑΣΙΣ Ζ.

Τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων, εἰν ἐφ' ἑκατέρῃ τῇ τομῇ σημειᾶται λαμβάνῃ, καὶ ἀπ' αὐτῶν παράλληλοι ἀχθῶσι ταῖς ἐφαπτομέναις, συμπίπτουσαι ταῖς τε ἐφαπτομέναις καὶ ταῖς διαμέτροις· ταῖς γινόμεναις ὑπὸ τῶν ἀχθεισῶν τετράπλευρα, βεβηκότα δὲ ὅτι τῶν διαμέτρων, ἴσα ἔσται ἀλλήλοις.


ΥΠΟΚΕΙΣΘΩ γὰρ πᾶσι περιγεγραμμένοις, καὶ εἰληφθῶ ἐφ' ἑκατέρῃ τῇ τομῇ σημειᾶται τὰ K, Λ , καὶ δι' αὐτῶν ὡς δὲ πρὶν τῷ AZ ἡχθῶσιν ἡ $MKΠΡΧ$ καὶ ἡ $NΣΤΛ$, ὡς δὲ πρὶν τῷ BH ἡ $NΙΟΚΞ$ καὶ ἡ $ΧΦΤΛ$. λέγω ὅτι ἔσται πᾶσι τῆς περὶ τούτου.

Ἐπεὶ γὰρ τὸ $ΛΟΙ$ τριγώνον τῷ $ΡΟ$ τετραπλεύρῳ ἐστὶν ἴσον, κοινὸν προσκείσθω τὸ $ΕΟ$. ὅλον ἄρα τὸ $ΑΕΖ$ τριγώνον ἴσον ἐστὶ τῷ $ΚΒ$. ἐστὶ δὲ καὶ τὸ $ΒΕΗ$ τριγώνον ἴσον τῷ $ΑΕ$ τετραπλεύρῳ, ὅτι ἐστὶ τὸ $ΑΕΖ$ τριγώνον ἴσον τῷ $ΒΗΕ$. καὶ τὸ $ΑΕ$ ἄρα ἴσον ἐστὶ τῷ $ΙΚΡΕ$. κοινὸν προσκείσθω τὸ $ΝΕ$. ὅλον ἄρα τὸ $ΤΚ$ ἴσον ἐστὶ τῷ $ΙΛ$, καὶ τὸ $ΚΤ$ τῷ $ΡΛ$.

PROP. VIII. Theor.

Iisdem positis, pro punctis K, Λ sumantur Γ, Δ , in quibus diametri cum sectionibus conveniunt; & per ipsa contingentibus parallelæ ducantur: dico $ΞΕ$ quadrilaterum quadrilatero $ΕΤ$; & quadrilaterum $ΞΙ$ quadrilatero $ΤΟ$ æquale esse.

QUONIAM enim triangulum $ΑΗΘ$ ostensum est [per 1.3. huj.] æquale triangulo $ΘΒΖ$: & [per 1. lem.] linea quæ à puncto Λ ducitur ad B æquidistat lineæ à puncto H ad Z ductæ: erit [per 2.6.] ut $ΑΕ$ ad $ΒΗ$ ita $ΒΕ$ ad $ΒΖ$; & per conversionem rationis ut $ΒΑ$ ad $ΑΗ$ ita $ΕΒ$ ad $ΒΖ$. est autem ut $ΓΑ$ ad $ΑΒ$ ita $ΔΒ$ ad $ΒΒ$; utraque enim [per 30.1. huj.] utriusque est dupla: ergo ex æquali [per 22.5.] ut $ΓΑ$ ad $ΑΗ$ ita $ΔΒ$ ad $ΒΖ$. & sunt triangu-
la similia, propter lineas [ex hyp.] parallelas: ut igitur $ΓΤΑ$ trian-



ΠΡΟΤΑΣΙΣ Η.

Τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων, εἰληφθῶ ἀπὸ τῶν K, Λ τὰ Γ, Δ , καὶ ἀ' συμβάλλουσιν αἱ ἀξίμετροι ταῖς τομῇς, καὶ δι' αὐτῶν ἡχθῶσιν αἱ παράλληλοι ταῖς ἐφαπτομέναις λέγω ὅτι ἴσον ἔσται τὸ $ΞΕ$ τετράπλευρον τῷ $ΕΤ$, καὶ τὸ $ΞΙ$ τῷ $ΟΤ$.

ΕΠΕΙ γὰρ ἴσον ἐδείχθη τὸ $ΑΗΘ$ τριγώνον τῷ $ΘΒΖ$, καὶ ἡ ἀπὸ Γ ἀπὸ τὸ B ὡς δὲ πρὶν ἡ ἀπὸ Δ ἀπὸ τὸ Z ἀνάλογον ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ $ΑΕ$ πρὸς $ΕΗ$ ὥτως ἡ $ΒΕ$ πρὸς $ΕΖ$, καὶ ἀνατρέψαντι ὡς ἡ $ΕΑ$ πρὸς $ΑΗ$ ὥτως ἡ $ΕΒ$ πρὸς $ΒΖ$. ἐστὶ δὲ ὡς ἡ $ΓΑ$ πρὸς $ΑΕ$ ὥτως ἡ $ΔΒ$ πρὸς $ΒΕ$, ἑκατέρα γὰρ ἑκατέρας διπλή δι' ἴσα ἄρα ὡς ἡ $ΓΑ$ πρὸς $ΑΗ$ ὥτως ἡ $ΔΒ$ πρὸς $ΒΖ$. καὶ ἐστὶν ὅμοια τὰ τριγώνω, ἀπὸ τῶν ὡς δὲ πρὶν ἡ $ΓΤΑ$ τριγώνον πρὸς τὸ $ΑΘΗ$


ΑΘΗ ἄρα τὸ ΕΒΔ πρὸς τὸ ΘΒΖ, ὅτι ἀλλάξ.
ἴσιν δὲ τὸ ΑΗΘ τῷ ΘΖΒ· ἴσιν ἄρα καὶ τὸ ΤΑΓ
τῷ ΔΒΖ, ὡς τὸ ΑΗΘ ἴσιν ἐδείχθη τῷ ΒΘΖ·
λοιπὸν ἄρα τὸ ΔΘ περὶπλάττει ἴσιν τῷ ΓΘ·
ὥς καὶ τὸ ΕΕ τῷ ΕΤ. καὶ ἐπεὶ ὁμοειδὴς
ἔστι ἡ ΓΟ τῇ ΑΖ, ἴσιν ἐπὶ τὸ ΓΟΕ τρίγωνον
τῷ ΑΕΖ· ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ΔΕΙ τῷ ΒΕΗ. ἀλλὰ
τῷ ΒΕΗ τὸ ΑΕΖ ἴσιν· καὶ τὸ ΓΟΕ ἴσιν τῷ ΔΕΙ.
ἐπὶ δὲ καὶ τὸ ΕΕ περὶπλάττει ἴσιν τῷ ΕΤ· ὅλον
ἄρα τὸ ΕΙ ἴσιν ἐπὶ τῷ ΟΤ.

[per 1.3. huj.] ΒΒΗ triangulum triangulo ΑΕΖ est æquale : ergo & triangulum ΓΟΕ triangulo ΔΕΙ. estque ΕΒ quadrilaterum æquale quadrilatero ΕΤ : totum igitur ΕΙ toti ΟΤ æquale erit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ 9.

Τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων, εἰν τὸ μὲν ἕτερον τῶν σημείων μεταξὺ ἢ τῶν διαμέτρων, ὡς τὸ Κ, τὸ δὲ ἕτερον ἐπὶ τῇ Γ, Δ ταύτην, ὡς τὸ Γ, καὶ ἀχθῶσι αἱ παράλληλοι λέγω ὅτι ἴσιν ὅτι τὸ ΓΕΟ τρίγωνον πρὸς ΚΕ περὶπλάττει, καὶ τὸ ΑΟ πρὸς ΑΜ.

ΤΟΤΤΟ δὲ φανερόν. ἐπεὶ ἴσιν ἐδείχθη τὸ ΓΕΟ τρίγωνον τῷ ΑΕΖ, τὸ δὲ ΑΕΖ ἴσιν τῷ ΚΕ περὶπλάττει ὥς ὅτι τὸ ΓΡΜ ἴσιν ἐπὶ τῷ ΚΟ, καὶ τὸ ΑΜ τῷ ΑΟ.



ergo & triangulum ΓΡΜ quadrilatero ΚΟ; & quadrilaterum ΑΜ quadrilatero ΑΟ est æquale.

PROP. IX. Theor.


Iisdem positis, si alterum quidem punctum sit inter diametros, ut Κ; alterum vero sit idem quod unum punctorum Γ, Δ, ut Γ; & parallelæ ducantur : dico triangulum ΓΕΟ æquale esse quadrilatero ΚΕ; & quadrilaterum ΑΟ æquale ipsi ΑΜ.

ILLUD vero perspicue apparet. nam demonstratum est [per 4. 3. huj.] ΓΕΟ triangulum æquale triangulo ΑΒΖ; triangulumque ΑΒΖ [per corol. 2. 3. huj.] æquale est quadrilatero ΚΕ; ergo

ΠΡΟΤΑΣΙΣ 1.

Τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων αἱ λήθω τὰ Κ, Α σημεία, μὴ καὶ ὁμοειδὴς διαμέτροι τῶν τοιούτων δυοῦν δὲ ὅτι ἴσιν ὅτι τὸ ΑΤΡΧ περὶπλάττει τῷ ΩΧΚΙ περὶπλάττει.

ΕΠΕΙ γὰρ ἐφάνη αἱ ΑΖ, ΒΗ, καὶ διὰ τῶν αὐτῶν ἀξόνων ὡς αἱ ΑΕ, ΒΕ, καὶ ὡς αἱ ΑΤ, ΚΙ· μάλιστα ἐπὶ τὸ ΤΤΕΞ ΤΩΛ τῷ ΕΖΑ. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ΕΕΙ τῷ ΕΡΚ μάλιστα ἐπὶ τῷ ΒΕΗ. ἴσιν δὲ τὸ ΑΕΖ τῷ ΒΕΗ· τῷ αὐτῷ ἄρα ὑπερέχει τὸ ΠΤΕΤ τῷ ΤΩΛ, καὶ τὸ



dem excessu & triangulum ΤΕΤ excedit triangulum ΤΩΛ, quo triangulum ΕΕΙ excedit ipsum Τ : ΕΡΚ :

PROP. X. Theor.

Iisdem positis, sumantur Κ, Α, quæ non sint puncta in quibus diametri sectionibus occurrunt : demonstrandum est quadrilaterum ΑΤΡΧ quadrilatero ΩΧΚΙ æquale esse.

QUONIAM enim rectæ lineæ ΑΖ, ΒΗ sectionem contingunt; & per tactus diametri ΑΕ, ΒΒ ducuntur; & sunt ΑΤ, ΚΙ contingentibus parallelæ : triangulum ΤΤΕ majus est [per 43. 1. huj.] quam triangulum ΤΩΛ triangulo ΒΖΑ. similiter & triangulum ΕΕΙ majus est quam triangulum ΕΡΚ triangulo ΒΕΗ. sed [per 1. 3. huj.] triangulum ΑΕΖ æquale est triangulo ΒΕΗ : quare eodem

$\mathcal{E}PK$: triangulum igitur TTE una cum triangulo $\mathcal{E}PK$ æquale est triangulo $\mathcal{E}BI$ una cum triangulo $T\Omega\Lambda$. [vid. *Eut.* comment. in 48. 2. huj.] commune apponatur $K\mathcal{E}T\Lambda X$: ergo quadrilaterum ΛTPX quadrilatero ΩXKI est æquale.

PROP. XI. Theor.

Iisdem positis, si in qualibet sectione punctum sumatur, & ab ipso rectæ ducantur, una quidem contingenti parallela, altera vero parallela ei quæ tactus conjungit: triangulum, quod ab ipsis fit ad diametrum per occursum contingentium ductam, à triangulo contento linea contingente & diametro per tactum differt, triangulo quod ad contingentium occursum constituitur.


SINT sectiones oppositæ AB , $\Gamma\Delta$; & lineæ contingentes AE , ΔE , quæ in puncto E sibi ipsis occurrant; sit autem centrum Θ ; junganturque $\Lambda\Delta$ & $E\Theta H$; & sumpto in sectione AB quovis puncto B , ducatur $BZ\Lambda$ quidem ipsi ΛH parallela, BM vero parallela ipsi AE : dico triangulum BZM à triangulo $\Lambda K\Lambda$ differre triangulo $K\mathcal{E}Z$.

Lineam enim $\Lambda\Delta$ ab ipsa $E\Theta$ bifariam secari [ex 38, & 39. 2. huj.] perspicuum est; & $E\Theta$ diametrum esse conjugatam ei, quæ per Θ ducta ipsi $\Lambda\Delta$ æquidistat: quare ΛH applicata est ad $E H$, quoniam igitur $H E$ diameter est, lineæque ΛE sectionem contingit, & applicata est ΛH , à sumpto autem in sectione puncto B ad $E H$ applicatur BZ ipsi ΛH parallela, & BM parallela ipsi AE : patet triangulum $B M Z$ [per 45. 1. huj.] à triangulo $\Lambda\Theta Z$ differre triangulo $\Theta\Lambda B$: ergo BZM triangulum à triangulo $\Lambda K\Lambda$ differt triangulo KZE ; ac simul patet quadrilaterum $B K E M$ triangulo $\Lambda K\Lambda$ æquale esse.

PROP. XII. Theor.

Iisdem positis, si in una sectione sumantur duo puncta, & ab utrisque similiter æquidistantes ducantur: quadrilatera ab ipsis constituta inter se æqualia erunt.

SINT eadem quæ supra; & in sectione AB sumantur quævis puncta B, K , à quibus ducantur lineæ $\Lambda B M N$, $K\mathcal{E} O T \Pi$ ipsi $\Lambda\Delta$ parallela, itemque $B\mathcal{E} P$, $\Lambda K\Sigma$ parallela ipsi ΔE : dico quadrilaterum $B\Pi$ æquale esse quadrilatero $K P$.



$\mathcal{E}BI$ τῷ $\mathcal{E}PK$ τὸ TTE ἄρα μετὰ τῷ $\mathcal{E}PK$ ἴσον ἐστὶ τῷ $\mathcal{E}BI$ μετὰ τῷ $T\Omega\Lambda$. κοινὸν προσκείσθω τὸ $K\mathcal{E}T\Lambda X$ τὸ ΛTPX ἄρα περὶ πλάγρον ἴσον ἐστὶ τῷ ΩXKI περὶ πλάγρον.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΑ'.

Τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων, εἰ ἐν ὁποτέρῃ τῶν σημείων Λ ληφθῇ, καὶ ἀπ' αὐτῶν ὁδὸν ἄλλαν ἀχθῶσι, ἢ μὲν ὁδὸν τὴν ἐφαπτομένην, ἢ δὲ ὁδὸν τὴν ἀπὸ τοῦ κέντρου διελθούσαν· τὸ γινόμενον ὑπ' αὐτῶν τρίγωνον, ὡς τῇ $\mathcal{E}BI$ τὸ συμπίπτει τῷ ἐφαπτομένῳ ἢ γινόμενῳ διαμέτρῳ, διαφέρει τῷ ὁπολαμבאנומבא τριγώνῳ, ὡς τῇ τῇ ἐφαπτομένῃ καὶ τῇ $\mathcal{E}BI$ τὸ ἀπὸ τοῦ κέντρου διαμέτρῳ, καὶ ὁπολαμבאנומבא τριγώνῳ ὡς τῇ συμπίπτει τῷ ἐφαπτομένῳ.

ΕΣΤΩ $\Sigma\Lambda\Lambda$ ἀντικείμεναι αἱ AB , $\Gamma\Delta$, ἐφαπτομένη αἱ AE , ΔE συμπίπτουσιν κατὰ τὸ E , καὶ ἔστω κέντρον τὸ Θ , καὶ ἐπεξεύχθωσιν ἡ $\Lambda\Delta$ καὶ ἡ $E\Theta H$, εἰλήφθω δὲ \mathcal{E} ἐν τῇ AB τομῇ τυχρὸν σημῆον τὸ B , καὶ δι' αὐτὸ ἡχθῶσιν ὁδὸν μὲν τὴν ΛH ἢ $BZ\Lambda$, ὁδὸν δὲ τὴν AE ἢ BM . λέγω ὅτι τὸ BZM τριγώνον τῷ $\Lambda K\Lambda$ διαφέρει τῷ $K\mathcal{E}Z$.
Οτι μὲν γὰρ ἡ $\Lambda\Delta$ διχαίεται ἀπὸ τοῦ Θ φανερόν, καὶ ὅτι ἡ $E\Theta$ διάμετρος ἐστὶ συζυγὴς τῇ $\mathcal{E}BI$ τῇ $\mathcal{E}BI$ ὁδὸν τὴν $\Lambda\Delta$ ἀρρομένην· ὥστε κατηγμένη ἐστὶν ἡ ΛH ἐπὶ τὴν $E H$. ἐπεὶ δὲ $\mathcal{E}BI$ διάμετρος ἐστὶν ἡ HE , καὶ ἐφαπτομένη ἡ AE , κατηγμένη δὲ ἡ ΛH , καὶ ληφθέντος \mathcal{E} ἐν τῇ AB τομῇ κατὰ τὴν $E H$ ἢ μὲν BZ ὁδὸν τὴν ΛH , ἢ δὲ BM ὁδὸν τὴν AE · δῆλον ὅτι τὸ $B M Z$ τριγώνον τῷ $\Lambda\Theta Z$ διαφέρει τῷ $\Theta\Lambda E$ · ὥστε καὶ τὸ BZM τῷ $\Lambda K\Lambda$ διαφέρει τῷ KZE . καὶ συνεπαρδεδεῖται ὅτι τὸ $B K E M$ περὶ πλάγρον ἴσον ἐστὶ τῷ $\Lambda K\Lambda$ τριγώνῳ.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΒ'.

Τῶν αὐτῶν ὅπου, εἰ ἐν ἑκὶ μίᾳ τῶν τομῶν δύο σημεία ληφθῇ, καὶ ἀπ' ἑκαστέρου παράλληλῳ ἀχθῶσιν ὁμοίως· ἴσα ἐστὶ τὰ γινόμενα ὑπ' αὐτῶν τετράπλευρα.

ΕΣΤΩ γὰρ τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον, καὶ εἰλήφθω ἐν τῇ AB τομῇ τυχρὰ σημεία τὰ B, K , καὶ δι' αὐτῶν ἡχθῶσιν ὁδὸν ἄλλαν τῇ $\Lambda\Delta$ αἱ $\Lambda B M N$, $K\mathcal{E} O T \Pi$, τῇ δὲ ΔE αἱ $B\mathcal{E} P$, $\Lambda K\Sigma$. λέγω ὅτι ἴσον ἐστὶ τὸ $B\Pi$ τῷ $K P$.

Επεὶ

Επει γὰρ δὲ δεικνύται ἴσον τὸ μὲν ΑΟΠ τρίγωνον τῷ ΚΟΕΣ πετραπλεύρῳ, τὸ δὲ ΑΜΝ τῷ ΒΜΕΡ· λοιπὸν ἀρα τὸ ΚΕΡΣ, λείπον ἡ περισσὺν τὰ ΒΜΟΞ, ἴσον ἐστὶ τῷ ΜΝΠΟ, ἔκ τινος περισσέντος ἡ ἀφαιρέσειν δὲ ΒΜΞΟ, τὸ ΒΝΠΞ ἴσον ἐστὶ τῷ ΚΕΡΣ.

Quoniam enim demonstratum est [in præced.] triangulum ΑΟΠ æquale quadrilatero ΚΟΕΣ, ac triangulum ΑΜΝ æquale quadrilatero ΒΜΕΡ: erit reliquum ΚΕΡΣ, auctum vel minurum quadrilatero ΒΜΟΞ æquale, quadrilatero ΜΝΠΟ; & communi ΒΜΞΟ appolito vel ablato, quadrilaterum ΒΝΠΞ quadrilatero ΚΕΡΣ æquale erit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ γ'.

Εάν ἐν ταῖς χε' συζυγίαι ἀντικείμεναι τ' ἐφεξῆς τομῇ εὐθείᾳ ἐφαπτόμεναι συμπίπτωσι, καὶ διὰ τῆς αὐτῆς ἀφ' ἑαυτῶν ἀχθῶσιν ἴσα ᾖσιν τὰ τρίγωνα, ὅτι κορυφὴ κορυφῇ τὸ κέντρον ᾖσιν ἀντικείμεναι.


PROP. XIII. Theor.

Si in oppositis sectionibus conjugatis, rectæ eas contingentes quæ deinceps sunt in unum punctum conveniant; & per tactus diametri ducantur: triangula, quorum communis vertex est sectionum centrum, inter se æqualia erunt.

ΕΣΤΩΣΑΝ συζυγῆς ἀντικείμεναι, ἐφ' ὧν τὰ Α, Β, Γ, Δ σημεία, καὶ τὰ Α, Β τομῶν ἐφαπτόμεναι αἱ ΑΕ, ΒΕ, συμπίπτουσαι κατὰ τὸ Ε, ἔστω κέντρον τὸ Θ, καὶ διὰ τοῦ Θ αὐτῶν αἱ ΑΘ, ΒΘ ἐκτελεσθῶσιν ὥστε τὰ Δ, Γ· λέγω ὅτι ἴσον ἐστὶ τὸ ΒΖΘ τρίγωνον τῷ ΑΗΘ τρίγωνῳ.

Ἡχθῶσιν γὰρ διὰ τὸ Α, Θ αὐτῶν τὰ ΒΕ αἱ ΑΚ, ΘΛΜ. ἐπεὶ ἐν ἐφάπτεται τὸ Β τομῆς ἡ ΒΖΕ, καὶ διὰ τὸ Αφ' ἑαυτῶν διάμετρος ἐστὶν ἡ ΔΘΒ, ἔπαρξαι τὴν ΒΕ ἐστὶν ἡ ΑΜ· συζυγῆς ἐστὶν ἡ ΑΜ διάμετρος τῇ ΒΔ ἀφ' ἑαυτῶν, ἡ καλεσμένη δὲ πρὸς διάμετρος. διὰ τὴν τὴν κατὰ τὴν ἡ ΑΚ περὶ γωνίας ὅτι τὴν ΒΔ, ἔστω ἐφάπτεται ἡ ΑΗ· τὸ ἀρα ὑπὸ ΚΘΗ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΒΘ· ἐστὶν ἀρα ὡς ἡ ΚΘ πρὸς ΘΒ ὅπως ἡ ΒΘ πρὸς ΘΗ. ἀλλ' ὡς ἡ ΚΘ πρὸς ΘΒ ὅπως ἡ ΚΑ πρὸς ΒΖ καὶ ἡ ΑΘ πρὸς ΘΖ· καὶ ὡς ἀρα ἡ ΑΘ πρὸς ΘΖ ὅπως ἡ ΒΘ πρὸς ΘΗ. καὶ εἰσὶν αἱ ὑπὸ ΒΘΖ, ΗΘΖ δύο ὁρθογώνιοι ἴσοι· ἴσον ἀρα τὸ ΑΗΘ τρίγωνον τῷ ΒΘΖ τρίγωνῳ.

SINT oppositæ sectiones quæ conjugatæ appellantur Α, Β, Γ, Δ, & sectiones Α, Β contingant rectæ lineæ ΑΕ, ΒΕ in puncto Β convenientes; sit autem centrum Θ, & junctæ ΑΘ, ΒΘ ad Γ, Δ producantur: dico ΒΖΘ triangulum triangulo ΑΗΘ æquale esse.




Ducantur enim per Α, Θ lineæ ΑΚ, ΘΛΜ ipsi ΒΒ parallelæ. & quoniam ΒΖΕ sectionem Β contingit, & per tactum diameter est ΔΘΒ, duciturque ΑΜ parallela ipsi ΒΒ; erit [per 20. 2. huj.] ΑΜ diameter conjugata ipsi ΔΒ, quæ secunda diameter appellatur. propterea autem ΑΚ ad

ΒΔ ordinatim est applicata, contingitque ΑΗ: ergo [per 38. 1. huj.] rectangulum ΚΘΗ æquale est quadrato ΒΘ: & [per 17. 6.] ut ΚΘ ad ΘΒ ita ΒΘ ad ΘΗ. sed [per 4. 6.] ut ΚΘ ad ΘΒ ita ΚΑ ad ΒΖ & ΑΘ ad ΘΖ: ut igitur ΑΘ ad ΘΖ ita ΒΘ ad ΘΗ. & sunt anguli ΒΘΖ ΗΘΖ duobus rectis æquales: ergo ΑΗΘ triangulum triangulo ΒΘΖ æquale erit.

EUTOCIUS.


* Επει ἐστὶν ὡς ἡ ΑΘ πρὸς ΘΖ ὅπως ἡ ΒΘ πρὸς ΘΗ, καὶ εἰσὶν αἱ πρὸς τὸ Θ γωνίαι δύο ὁρθογώνιοι ἴσοι· ἴσον τὸ ΑΗΘ τρίγωνον τῷ ΒΘΖ τρίγωνῳ. Ἐκκείνου χυθείη ἡ καταγεγραμμένη τῶν τριγώνων, καὶ ἐκτελεσθῶσιν αἱ ΑΘ αἰετὶς τὸ Ζ, καὶ περὶ τοῦ Ζ αἰετὶς ὡς ἡ ΗΘ πρὸς ΘΒ ὅπως ἡ ΖΘ πρὸς ΘΖ. ἐπειδὴ ἔστιν ὡς ἡ ΒΘ πρὸς ΘΗ ὅπως ἡ ΑΘ πρὸς ΘΖ, καὶ ἡ ΖΘ πρὸς ΘΖ· ἴση ἀρα ἔστιν ἡ ΑΘ τῇ ΖΘ· ὅση καὶ τὸ ΑΗΘ τρίγωνον ἴσον ἔστι τῷ ΗΘΖ: καὶ ἐπειδὴ ἔστιν ὡς ἡ ΖΘ πρὸς ΘΖ ὅπως ἡ ΒΘ πρὸς ΘΗ, καὶ

* Quoniam ut ΑΘ ad ΘΖ ita ΒΘ ad ΘΗ, & sunt anguli ΒΘΖ, ΗΘΖ duobus rectis æquales: ergo ΑΗΘ triangulum triangulo ΒΘΖ æquale erit.] Describantur seorsum triangula; & producta ΑΘ ad Ζ, fiat ut ΗΘ ad ΘΒ ita ΖΘ ad ΘΖ. itaque quoniam ut ΒΘ ad ΘΗ ita est ΑΘ ad ΘΖ & ΖΘ ad ΘΖ: erit [per 9. 5.] ΑΘ ipsi ΘΖ æqualis: & propterea [per 1. 6.] triangulum ΑΗΘ æquale triangulo ΗΘΖ. sed ut ΖΘ ad ΘΖ ita ΒΘ ad ΘΗ, & circa æquales angulos,



gulos ad verticem Θ latera sunt reciproce proportionalia: triangulum igitur $Z\Theta B$ [per 15.6] triangulo $H\Theta E$ est æquale, & idcirco triangulo $AH\Theta$.

Sed & aliter demonstrare possumus triacula æqualia esse. quoniam enim ostensum est ut $K\Theta$ ad ΘB ita ΘB ad ΘH , & ut $K\Theta$ ad ΘB ita AK ad BZ ; erit ut AK ad BZ ita $B\Theta$ ad ΘH : quare rectangulum sub AK , ΘH æquale est rectangulo sub BZ , $B\Theta$. & quoniam anguli $H\Theta N$, ΘBZ [per 29.1.] sunt æquales, si parallelogramma rhomboidea describerimus iisdem lateribus contenta, quæ angulos ad B , Θ æquales habeant, etiam inter sese [per 14.6.] æqualia erunt: propterea quod latera sunt reciproce proportionalia. sed rhomboides $ZB\Theta A$ in angulo B trianguli ΘBZ duplum est; ejus namque diameter est $Z\Theta$: rhomboides autem quod continetur sub $H\Theta$ & linea æquali AK , videlicet ΘAN , in angulo $H\Theta N$, duplum est trianguli $AH\Theta$; sunt enim in eadem basi ΘH & sub eadem recta quæ à puncto A ducitur ipsi $H\Theta$ parallela: triangulum igitur $AH\Theta$ triangulo $ZB\Theta$ æquale est.



πρὸς ἴσους γωνίας τὰς κατὰ κορυφὴν ὡς τῇ Θ ἀντιπαρα-
στάσιν αἱ πλευραὶ ἴσων ἔσονται τὸ $Z\Theta B$ τεύχετον τῇ
 $H\Theta E$, ὅθεν καὶ τὸ $AH\Theta$.

Ἐστὶ δὲ καὶ ἄλλως δεῖξαι ἴσα τὰ τεύχη. ἐπεὶ γὰρ $\Delta\Delta\Delta$ -
κται ὡς ἡ $K\Theta$ ὡς ΘB ὥτως ἡ ΘB ὡς ΘH , ἀλλ' ὅς
ἡ $K\Theta$ ὡς ΘB ὥτως ἡ AK ὡς BZ : καὶ ὅς ἄρα ἡ AK
ὡς BZ ὥτως ἡ $B\Theta$ ὡς $H\Theta$: τὸ ἄρα ὑπὸ AK , ΘH
ὁρθογώνιον ἴσον ἔσται τῷ ὑπὸ BZ , $B\Theta$ ὁρθογώνιῳ. καὶ ἵσται
ἴσου εἶσιν αἱ ὑπὸ $H\Theta N$, ΘBZ , ἐὰν ἀνα-
γρῶμεν παρὰ $\Delta\Delta\Delta$ ῥαβδισμὸν
ὑπὸ τῶν αὐτῶν ἀκτῶν πλεονάζον τὰς
ὁρθογωνίας, ἴσους ἔχοντα ὡς τὰς Θ ,
 B γωνίας: ἴσα ἔσται καὶ αὐτὰ, ἀφ' ὧν τὸ
πλεονάζον ἀντιπαραστάσιν. ἔσται γὰρ τὸ ῥα-
βδισμὸν ῥαβδισμὸς ὑπὸ τῷ $ZB\Theta$ ἐν τῇ
 B γωνίᾳ διπλάσιον τῷ ΘBZ τεύχετι,
διὰ μέτρον γὰρ αὐτῶν ἐστὶν ἡ $Z\Theta$: τὸ δὲ
ῥαβδισμὸν ὑπὸ τῆς $H\Theta$ καὶ τῆς Θ
 AK , ὑπὸ τῆς ΘAN ἀναρῶμεν ἐν

τῇ ὑπὸ $H\Theta N$ γωνίᾳ, διπλάσιον ἔσται $AH\Theta$ τεύχετι: ὅτι
γὰρ αὐτῶν βάσεις εἰσι τῇ ΘH καὶ ὑπὸ τῇ αὐτῇ ἀκτὶ
καὶ FA παρὰ τῇ $H\Theta$ ἀγόμεναι ὅθεν ἴσων τὸ $AH\Theta$ τῷ $ZB\Theta$.

PROP. XIV. Theor.

Iisdem positis, si in quavis sectione pun-
ctum sumatur; & ab ipso ducantur
lineæ parallelæ contingentibus usque
ad diametros: triangulum, quod ad
centrum constituitur, à triangulo cir-
ca eundem angulum differt, triangulo
basim habente lineam contingentem
& verticem sectionum centrum.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΔ'.

Τῷ αὐτῷ ὑποκειμένῳ, ἐὰν ἐφ' ὁποτέρῃ τῶν το-
μῶν σημειῶν π ληφθῇ, καὶ ἀπ' αὐτῆς παράλλη-
λοι ἀχθῶσι τὰς ἐφαπτομένας ὥς τῇ διαμέ-
τρῳ τὸ γινόμενον ὡς τὸ κέντρον τεύχετος
ἔσται ὡς τὸ αὐτὸν γινόμενον τριγώνου δια-
σιν τριγώνου καὶ βάσιν μὲν ἔχοντι τῇ ἐφαπτομέ-
νῃ, κορυφῇ δὲ τὸ κέντρον.

SINT alia quidem eadem; sumatur autem
punctum in B sectione, quod sit π ; & per
ipsum ducatur $\pi P\pi$ parallela ipsi AH , & $O\pi T$
parallela ipsi BE : dico triangulum $O\Theta T$ à trian-
gulo $\pi\pi T$ differre triangulo ΘBZ .

ΕΣΤΩ καὶ μὲν ἄλλα τὰ αὐτὰ, εἰληφθῶ δὲ π
σημῖον ἐπὶ τῇ B τομῇ καὶ π , καὶ ἀπ' αὐτοῦ ὡς
μὲν τῷ AH ἡ $\pi P\pi$ καὶ ὡς τῇ BE ἡ $O\pi T$:
λέγω ὅτι τὸ $O\Theta T$ τεύχετον τῷ $\pi\pi T$.
ἀφαιρεῖται τῷ ΘBZ .

Ducatur enim à puncto
 A linea AT ipsi BZ paral-
lela. quoniam igitur ex iis
quæ dicta sunt [in præc.]
sectionis AA diameter est
 $\Lambda\Theta M$; conjugata autem
ipsi & secunda diameter
 $\Delta\Theta B$; atque à puncto A
ducitur AH sectionem con-
tingens; & applicata est
 AT quæ ipsi BZ parallela
est: habebit [per 40.1.
huj.] AT ad TH rationem
compositam ex ratione ΘT
ad TA & ex ratione trans-
versi lateris figuræ quæ fit
ad BZ ad latus rectum.
sed [per 4.6.] ut AT ad
 TH ita πT ad $T\pi$, & ut
 ΘT ad TA ita ΘT ad TO & ΘB ad BZ ; ut
autem figuræ, quæ ad ΛM , transversum latus ad
rectum, ita [ut ostensum in nota ad 20.2.] figuræ,
quæ ad $B\Delta$, rectum latus ad transversum: ergo
 πT ad $T\pi$ rationem habebit compositam ex



ΗΧΘΑ γὰρ ὑπὸ τῇ Λ ὡς
τῷ BZ ἡ AT . ἐπεὶ γὰρ
διὰ τὰ αὐτὰ πῶς περὶ τὸν
τῇ AA τομῇ διάμετρος μὲν
ἐστὶν ἡ $\Lambda\Theta M$, συζυγῆς γὰρ αὐ-
τῇ καὶ ὁ δεύτερος διάμετρος ἡ
 $\Delta\Theta B$, καὶ ὑπὸ τῇ Λ ἐφαπτομένη
ἡ AH , κατὰ τὴν γὰρ ὡς τῇ
 BZ ἡ AT : ἔστιν ἡ AT ὡς
τῷ TH τὸ συγκείμενον λό-
γον, ἐκ πῶς ὅν ἔχει ἡ ΘT
ὡς τῇ TA καὶ ὅν ἔχει ἡ Θ
ὡς τῇ ΛM ὁ δεύτερος πλα-
γία πλάγιά ὡς τῷ ὁρ-
θῶν. ἀλλ' ὡς ἡ AT ὡς
 TH ὥτως ἡ ET ὡς τῇ TS ,
ὡς γὰρ ἡ ΘT ὡς τῇ TA ὥτως ἡ ΘT ὡς τῇ TO ὡς
 ΘB ὡς τῇ BZ , ὡς δὲ ἡ TS ὡς τῇ ΛM ὁ δεύτερος
πλαγία ὡς τῇ ὁρθῶν ὥτως ἡ ET ὡς τῇ BA
ὁρθῶν ὡς τῷ πλαγίῳ: ἔστιν ἄρα ἡ ET ὡς
 TS τὸν συγκείμενον λόγον, ἐκ πῶς ὅν ἔχει ἡ ΘB
ὡς

[ex natura sec. diam.] quadratum ex αH est æquale rectangulo sub $T B$ & $M N$, & rectangulum sub $M \Pi, B \Theta$ quarta pars est rectanguli sub $T B$ & $M N$; quadratum vero ex $H \Theta$ est etiam quarta pars quadrati ex αH : ut igitur quadratum ex ΔB ad rectangulum $\Delta B E$ ita est quadratum ex $H \Theta$ ad rectangulum $\Gamma B \Theta$; & permutando, ut quadratum ex ΔB ad quadratum ex $H \Theta$ ita rectan-

gulum $\Delta B E$ ad $\Gamma B \Theta$ rectangulum. sed [per 19. & 20. 6.] ut quadratum ex ΔB ad quadratum ex $H \Theta$ ita triangulum $\Delta B E$ ad triangulum $H \Theta I$, similia enim sunt [per 4. 6.]; & ut rectangulum $\Delta B E$ ad rectangulum $\Gamma B \Theta$ ita $\Delta B E$ triangulum ad triangulum $\Gamma B \Theta$ *. ergo ut triangulum $\Delta B E$ ad triangulum $H \Theta I$ ita [per 11. 5.] triangulum $\Delta B E$ ad ipsum $\Gamma B \Theta$ triangulum: quare [per 9. 5.] triangulum $H \Theta I$ triangulo $\Gamma B \Theta$ est æquale: & idcirco triangulum $H \Theta K$ à triangulo $\Theta I K$ differt triangulo $H \Theta I$, hoc est triangulo $\Gamma B \Theta$. Rursus quoniam ΘB ad $B \Gamma$ compositam rationem habet ex ratione ΘB ad $M \Pi$ & ex ratione $M \Pi$ ad $B \Gamma$; & ut ΘB ad $M \Pi$ ita $T B$ ad $M N$, & ita latus rectum P [ut ostensum in nota ad 20. 2. huj.] ad αH ; ut autem $M \Pi$ ad $B \Gamma$ ita ΔB ad $B E$: habebit igitur ΘB ad $B \Gamma$ rationem compositam ex ratione ΔB ad $B E$ & ratione P ad αH . & quoniam parallelæ sunt $B \Gamma, \Sigma \Lambda$, triangulum $\Theta \Gamma B$ simile est triangulo $\Theta \Lambda Z$; & ob id ut ΘB ad $B \Gamma$ ita est $\Theta \Lambda$ ad ΛZ : quare $\Theta \Lambda$ ad ΛZ compositam rationem habet ex ratione ipsius P ad αH & ratione ΔB ad $B E$, hoc est $H \Theta$ ad ΘI . quoniam igitur $H \Sigma$ est hyperbola, cujus diameter quidem αH , rectum vero latus P ; & ab aliquo ipsius puncto Σ applicatur ΣO , describiturque ab ea quæ ex centro, videlicet à ΘH , figura $\Theta I H$; & ab applicata ΣO , vel $\Theta \Lambda$ ipsi [per 34. 1.] æquali, figura $\Theta \Lambda Z$; à ΘO autem, quæ est inter centrum & applicatam, vel à $\Sigma \Lambda$ ipsi ΘO æquali, describitur $\Sigma \Lambda T$ figura similis figuræ $\Theta I H$ quæ fit ab eâ quæ ex centro; & rationes habentur compositæ, prout dictum est †: erit [per 41. 1. huj.] triangulum $\Sigma \Lambda T$ majus [ut modo ostensum] triangulo $\Theta \Gamma B$.


* Quod autem rectangulum $\Delta B E$ ad rectangulum $\Gamma B \Theta$ sit ut triangulum $\Delta B E$ ad $\Gamma B \Theta$ triangulum, sic ostenditur. A punctis Δ & Γ in $B H$ demittantur normales $\Delta Y, \Gamma Z$: eritque ut ΔY ad ΔB ita ΓZ ad ΓB . ut autem ΔY ad ΔB ita rectangulum sub ΔY & $B E$ ad rectangulum $\Delta B E$; & ut ΓZ ad ΓB ita rectangulum sub ΓZ & $B \Theta$ ad rectangulum $\Gamma B \Theta$: est igitur ut rectangulum sub ΔY & $B E$ ad rectangulum $\Delta B E$ ita rectangulum sub ΓZ & $B \Theta$ ad rectangulum $\Gamma B \Theta$. Sed rectangulum sub ΔY & $B E$ æquale est duplo triangulo $\Delta B E$, & rectangulum sub ΓZ & $B \Theta$ æquale duplo triangulo $\Gamma B \Theta$: est igitur ut triangulum $\Delta B E$ ad rectangulum $\Delta B E$ ita triangulum $\Gamma B \Theta$ ad rectangulum $\Gamma B \Theta$, & permutando rectangulum $\Delta B E$ ad rectangulum $\Gamma B \Theta$ ut triangulum $\Delta B E$ ad $\Gamma B \Theta$ triangulum.

† Nempe triangulum $\Lambda \Theta Z$ est semissis parallelogrammi, cujus diameter est ΘZ , æquianguli parallelogrammis, quorum semisses sunt triangula $\Lambda Y \Sigma$, $\Theta I H$ & diametri $Y \Sigma$, $I H$; estque [ut modo ostensum] $\Theta \Lambda$ (hoc est $\Sigma \Theta$) ad ΛZ in ratione composita ex ratione ΘH ad ΘI & ratione P ad αH : ergo [per 41. 1. huj.] parallelogrammum, cujus dimidium $\Lambda Y \Sigma$ & $Y \Sigma$ diameter, erit æquale parallelogrammo simili, cujus dimidium est $I \Theta H$ & $I H$ diameter, simul & parallelogrammo æquiangulo, cujus dimidium $\Theta \Lambda Z$ cujusque diameter est ΘZ . & consequenter triangulum $\Lambda Y \Sigma$ æquale est triangulo $I \Theta H$, $\Theta \Lambda Z$ simul sumptis. Ac manifestum est quadrilaterum $\Theta Z, \Sigma Y$ triangulo $I \Theta H$, hoc est triangulo $\Theta \Gamma B$, æqualem esse.

διότι τὸ μὲν δὲ αH ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ $T B, M N$, καὶ τὸ μὲν ὑπὸ $M \Pi, B \Theta$ τέταρτον ἔστι τῷ $T B, M N$, τὸ δὲ $H \Theta$ τέταρτον ἔστι τῷ αH : ἔστι ἄρα ὡς τὸ δὲ ΔB πρὸς τὸ ὑπὸ $\Delta B E$ ὥς τὸ δὲ $H \Theta$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\Gamma B \Theta$, καὶ ἐναλλάξ ὡς τὸ δὲ ΔB πρὸς τὸ δὲ $H \Theta$ ὥς τὸ ὑπὸ $\Delta B E$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\Gamma B \Theta$. ἀλλ' ὡς μὲν τὸ δὲ ΔB πρὸς τὸ δὲ $H \Theta$ ὥς $\Delta B E$ πρὸς $\Gamma B \Theta$, ὁμοία γάρ· ὡς δὲ τὸ ὑπὸ $\Delta B E$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\Gamma B \Theta$ ὥς τὸ $\Delta B E$ πρὸς $\Gamma B \Theta$, ὡς ἄρα τὸ $\Delta B E$ πρὸς τὸ $H \Theta I$ ὥς τὸ $\Delta B E$ πρὸς τὸ $\Gamma B \Theta$, ἴσον ἄρα ἐστὶ τὸ $H \Theta I$ τῷ $\Gamma B \Theta$. τὸ ἄρα $H \Theta K$ πρὸς $\Theta I K$ διαφέρει τῷ $\Theta I H$, ταῦτι τῷ $\Gamma B \Theta$. Πάλιν ἐπεὶ ἡ ΘB πρὸς $B \Gamma$ τὴν συγκείμενὴν ἔχει λόγον, ἔκ τε ΘB πρὸς $M \Pi$ καὶ ἡ $M \Pi$ πρὸς $B \Gamma$, ἀλλ' ὡς ἡ ΘB πρὸς $M \Pi$ ὥς ἡ $T B$ πρὸς $M N$ καὶ ἡ P πρὸς αH , ὡς δὲ ἡ $M \Pi$ πρὸς $B \Gamma$ ὥς ἡ ΔB

πρὸς $B E$: ἔστι ἄρα ἡ ΘB πρὸς $B \Gamma$ τὴν συγκείμενὴν λόγον, ἔκ τε ΘB πρὸς $B E$ καὶ ἡ P πρὸς αH . καὶ ἐπεὶ ὁμοειδὲς ἐστὶν ἡ $B \Gamma$ τῇ $\Sigma \Lambda$, καὶ ὁμοιον τὸ $\Theta \Gamma B$ πρὸς τὸ $\Theta \Lambda Z$, καὶ ἔστι ὡς ἡ ΘB πρὸς $B \Gamma$ ὥς ἡ $\Theta \Lambda$ πρὸς ΛZ : ἔστι ἄρα ἡ $\Theta \Lambda$ πρὸς ΛZ τὴν συγκείμενὴν λόγον, ἔκ τε $\Theta \Lambda$ πρὸς αH καὶ ἡ ΔB πρὸς $B E$, ταῦτις τῇ $H \Theta$ πρὸς ΘI . ἐπεὶ ἔν ὑπερβολῇ ἐστὶν ἡ $H \Sigma$, διὰ μέτρον ἔχουσα τὴν αH ὀρθάν, δὲ τὴν P , καὶ δὲ πρὸς σημείοις τῇ Σ κατὰ τὴν $\Theta \Sigma$, ὅθεν ἀναγράφεται δὲ μὲν τὸ ἐκ τῆς κέντρος τῆς ΘH εἶδος τὸ $\Theta I H$, δὲ τὸ κατὰ τὴν $\Theta \Sigma$, ἥτις τῆς $\Theta \Lambda$ ἴσης αὐτῇ, τὸ $\Theta \Lambda Z$: δὲ τὸ $\Theta \Sigma$ μετὰ τῆς κέντρος καὶ τῆς κατὰ τὴν $\Theta \Sigma$, ἥτις τῆς $\Sigma \Lambda$ ἴσης αὐτῇ, τὸ $\Sigma \Lambda T$ εἶδος, ὁμοιον τῷ δὲ τῆς $\Theta I H$ καὶ ἔχει τὰς συγκείμενους λόγους, ὡς ἔρηται· τὸ ἄρα $\Sigma \Lambda T$ πρὸς $\Theta \Lambda Z$ μείζον ἐστὶ τῷ $\Theta \Gamma B$.

quoniam ΘB ad $B \Gamma$ compositam rationem habet ex ratione ΘB ad $M \Pi$ & ex ratione $M \Pi$ ad $B \Gamma$; & ut ΘB ad $M \Pi$ ita $T B$ ad $M N$, & ita latus rectum P [ut ostensum in nota ad 20. 2. huj.] ad αH ; ut autem $M \Pi$ ad $B \Gamma$ ita ΔB ad $B E$: habebit igitur ΘB ad $B \Gamma$ rationem compositam ex ratione ΔB ad $B E$ & ratione P ad αH . & quoniam parallelæ sunt $B \Gamma, \Sigma \Lambda$, triangulum $\Theta \Gamma B$ simile est triangulo $\Theta \Lambda Z$; & ob id ut ΘB ad $B \Gamma$ ita est $\Theta \Lambda$ ad ΛZ : quare $\Theta \Lambda$ ad ΛZ compositam rationem habet ex ratione ipsius P ad αH & ratione ΔB ad $B E$, hoc est $H \Theta$ ad ΘI . quoniam igitur $H \Sigma$ est hyperbola, cujus diameter quidem αH , rectum vero latus P ; & ab aliquo ipsius puncto Σ applicatur ΣO , describiturque ab ea quæ ex centro, videlicet à ΘH , figura $\Theta I H$; & ab applicata ΣO , vel $\Theta \Lambda$ ipsi [per 34. 1.] æquali, figura $\Theta \Lambda Z$; à ΘO autem, quæ est inter centrum & applicatam, vel à $\Sigma \Lambda$ ipsi ΘO æquali, describitur $\Sigma \Lambda T$ figura similis figuræ $\Theta I H$ quæ fit ab eâ quæ ex centro; & rationes habentur compositæ, prout dictum est †: erit [per 41. 1. huj.] triangulum $\Sigma \Lambda T$ majus [ut modo ostensum] triangulo $\Theta \Gamma B$.



ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΣ΄.

Εάν κώνυ τομῆς ἢ κύκλῳ περιφύεται, δύο εὐθεῖαι ὁριζώσονται συμπίπτουσαι, ἀπὸ δὲ πρὸς σημείον ἢ ὅτι τὸ τομῆς ἀχθῇ εὐθεῖα ὡς πᾶσι τῶν ἐφαπτομένων, τέμνουσα τὸ τομῆς καὶ ἑτέραι τῶν ἐφαπτομένων ἔσται ὡς τὰ ἀπὸ τῶν ἐφαπτομένων περὶ ἄλλα, ὅπως τὸ περιεχόμενον χωρίον ὑπὸ τῶν μεταξὺ τῶν τομῆς καὶ τῶν ἐφαπτομένων περὶ τὸ ἀπὸ τῶν ἀπαραμεινόμενων πρὸς τῇ ἀφ᾽ ἑνὸς περὶ ἄλλου.

ΕΣΤΩ κώνυ τομῆς ἢ κύκλῳ περιφύεται ἡ ΑΒ, καὶ ἐφαπτομένη αὐτῆς αἱ ΑΓ, ΓΒ συμπίπτουσαι κατὰ τὸ Γ, καὶ εὐθείᾳ πρὸς σημείον ὅπῃ τὸ ΑΒ τομῆς τὸ Δ, καὶ δι' αὐτὴν ἡχθῶ ὡς πᾶσι τῶν ΑΓ, ΕΔΖ. λέγω ὅτι ἔσται ὡς τὸ ἀπὸ ΒΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΓ, ὅπως τὸ ἀπὸ ΖΕΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΑ.




Ἡχθώσιν γὰρ διὰ τῶν Α, Β διὰ μέτρον ἡ ΑΗΘ καὶ ἡ ΒΚΛ, διὰ δὲ τῶν Δ τῇ ΑΑ παράλληλος ἡ ΔΜΝ. φανερόν δὲ αὐτόθεν ὅτι ἴση ἔσται ἡ ΔΚ τῇ ΚΖ, ὅτι τὸ ΑΕΗ τρίγωνον τῷ ΑΔ περὶ ἀπὸ τοῦ Α, καὶ τὸ ΒΛΓ τρίγωνον τῷ ΑΓΘ. ἐπεὶ γὰρ ἡ ΖΚ τῇ ΚΔ ἔσται ἴση, καὶ πρόσκειται ἡ ΔΕ· τὸ ἀπὸ ΖΕΔ μετὰ τῇ ἀπὸ ΔΚ ἴσον ἔσται τῷ ἀπὸ ΚΕ. καὶ ἐπεὶ ὁμοίον ἔστι τὸ ΕΛΚ τρίγωνον τῷ ΔΝΚ,

PROP. XVI. Theor.


Si quæ rectæ lineæ conic sectionem vel circuli circumferentiam contingentes in unum conveniant; & ab aliquo puncto eorum, quæ sunt in sectione, ducatur linea uni contingentium parallela, quæ & sectionem & alteram contingentium secet: ut quadrata contingentium inter sese, ita erit rectangulum, contentum lineis quæ interjiciuntur inter sectionem & contingentem, ad quadratum lineæ inter parallelam & tactum interjectæ.

SIT conic sectio vel circuli circumferentia ΑΒ, quam contingant rectæ lineæ ΑΓ, ΓΒ in puncto Γ convenientes; & sumpto in sectione aliquo puncto Δ, ab eo ducatur ΕΔΖ, quæ ipsi ΓΒ parallela sit: dico ut quadratum ex ΒΓ ad quadratum ex ΓΑ ita esse rectangulum ΖΕΔ ad quadratum ex ΕΑ.

Ducantur enim per Α, Β diametri ΑΗΘ, ΒΛΚ; & per Δ ducatur ΔΜΝ parallela ipsi ΑΑ: perspicuum est igitur [per 46. & 47. 1. huj.] rectam ΔΚ ipsi ΚΖ æqualem esse; triangulumque ΑΒΗ [per 2. 3. huj.] æquale quadrilatero ΑΔ; & triangulum ΒΛΓ [per 1. 3. huj.] triangulo ΑΓΘ. itaque quoniam ΖΚ æqualis est ΚΔ, & ipsi adjicitur ΔΕ; rectangulum ΖΕΔ una cum quadrato ex ΔΚ æquale erit [per 6. 2.] quadrato ex ΚΕ. &c.



ἔσται ὡς τὸ ἀπὸ ΕΚ πρὸς τὸ ἀπὸ ΚΔ ὅπως τὸ ΕΛΚ τρίγωνον πρὸς τὸ ΔΝΚ. καὶ ὁμοίως ὡς ὅλον τὸ ἀπὸ ΕΚ πρὸς ὅλον τὸ ΕΛΚ τρίγωνον ὅπως ἀφαιρεθῇ τὸ ἀπὸ ΔΚ πρὸς ἀφαιρεθῇ τὸ ΔΝΚ τρίγωνον· καὶ λοιπὸν ἔσται τὸ ἀπὸ ΖΕΔ πρὸς λοιπὸν τὸ ΑΔ ἔσται ὡς τὸ ἀπὸ ΕΚ πρὸς τὸ ΕΛΚ τρίγωνον. ἀλλ' ὡς τὸ ἀπὸ ΕΚ πρὸς τὸ ΕΛΚ ὅπως τὸ ἀπὸ ΓΒ πρὸς τὸ ΑΓΒ· καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ΖΕΔ πρὸς τὸ ΑΔ περὶ ἀπὸ τοῦ Α ὅπως quadratum ex ΓΒ ad triangulum ΑΓΒ: ut igitur ΖΕΔ rectangulum ad quadrilaterum ΑΔ ita quadratum



quoniam triangulum ΕΛΚ simile est triangulo ΔΝΚ: erit [per 3. lem. 3. huj.] ut quadratum ex ΒΚ ad quadratum ex ΚΔ ita triangulum ΕΛΚ ad triangulum ΔΝΚ; & permutando ut totum quadratum ex ΒΚ ad totum triangulum ΕΛΚ ita ablatum quadratum ex ΔΚ ad ablatum triangulum ΔΝΚ: ergo [per 19. 9.] est reliquum rectangulum ΖΕΔ ad reliquum quadrilaterum ΑΔ ut quadratum ex ΒΚ ad triangulum ΒΛΚ. sed [per 19. & 20. 6.] ut quadratum ex ΒΚ ad ΒΛΚ triangulum ita est quadratum

quadratum ex ΓB ad $\Lambda \Gamma B$ triangulum. est autem quadrilaterum $\Delta \Lambda$ triangulo $\Lambda E H$ æquale; & triangulum $\Lambda \Gamma B$ æquale triangulo $\Lambda \Theta \Gamma$: quare ut rectangulum $Z E \Delta$ ad triangulum $\Lambda E H$ ita quadratum ex ΓB ad $\Lambda \Theta \Gamma$ triangulum; & permutando ut rectangulum $Z E \Delta$ ad quadratum ΓB ita $\Lambda E H$ triangulum ad triangulum $\Lambda \Theta \Gamma$. sed [per 3.lem.3.huj.] ut triangulum $\Lambda H E$ ad triangulum $\Lambda \Theta \Gamma$ ita quadratum ex $E A$ ad quadratum ex $\Lambda \Gamma$: ergo ut rectangulum $Z E \Delta$ ad quadratum ex ΓB ita quadratum ex $E A$ ad quadratum ex $\Lambda \Gamma$, & permutando.



τὸ δὲ ΓB πρὸς τὸ $\Lambda \Gamma B$ τρίγωνον. ἴσον δὲ τὸ $\mu\delta\upsilon$ $\Delta \Lambda$ τῷ $\Lambda E H$ τριγώνῳ, τὸ δὲ $\Lambda \Gamma B$ τῷ $\Lambda \Theta \Gamma$ καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ $Z E \Delta$ πρὸς τὸ $\Lambda E H$ τριγώνον ἔτως τὸ ἀπὸ ΓB πρὸς τὸ $\Lambda \Theta \Gamma$, καὶ ἐναλλάξ ὡς τὸ ὑπὸ $Z E \Delta$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓB ἔτως τὸ $\Lambda E H$ τρίγωνον πρὸς τὸ $\Lambda \Theta \Gamma$. ὡς δὲ τὸ $\Lambda H E$ πρὸς τὸ $\Lambda \Theta \Gamma$ ἔτως τὸ ἀπὸ $E A$ πρὸς τὸ ἀπὸ $\Lambda \Gamma$ καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ $Z E \Delta$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓB ἔτως τὸ ἀπὸ $E A$ πρὸς τὸ ἀπὸ $\Lambda \Gamma$, ἐναλλάξ.

EUTOCIUS.

In aliquibus codicibus hoc theorema ut septimum decimum apponebatur. sed re vera casus est sexti decimi theorematum: eo enim tantum differt, quod lineæ contingentes $\Lambda \Gamma$, ΓB diametris parallelæ sint; cætera vero eadem esse patet. in commentariis igitur illud ponere oportebat, uti scripsimus in scholio ad decimum quartum theorema secundi libri.

Si in ellipsi & circulo diametri quæ transeunt per tactus contingentibus parallelæ sint, eadem prorsus evenient quæ in propositione dicuntur.

Quoniam [per 21. I. huj.] ut quadratum ex $B \Theta$ ad rectangulum $\Lambda \Theta \Lambda$ ita quadratum ex ΔH ad rectangulum $\Lambda H \Lambda$; atque est rectangulum quidem $\Lambda \Theta \Lambda$ quadrato ex $\Lambda \Theta$ æquale, rectangulum autem $\Lambda H \Lambda$ æquale rectangulo $I \Lambda H$; (recta enim $\Lambda \Theta$ æqualis est $\Theta \Lambda$ & ΔK ipsi $K Z$, ut & æqualis $H \Theta$ ipsi ΘI & ΛH ipsi $I \Lambda$) erit igitur ut quadratum ex $\Lambda \Theta$ ad quadratum ex ΘB , hoc est quadratum ex $B \Gamma$ ad quadratum ex $\Gamma \Lambda$, ita rectangulum $I \Lambda H$ ad quadratum ex ΔH , hoc est rectangulum $Z E \Delta$ ad quadratum ex $E \Lambda$.



Εάν ὅτι τὸ ἐλλείψους καὶ τοῦ κύκλου αἱ διὰ τῶν ἀφ' αὐτῶν διαμέτροι ἐξέλθοντες ὡς ἐν τῷ ἐφαπτομένῳ, καὶ ἔτως ἔσται τὸ δ πρὸς τὸ ϵ .

Επεὶ ὡς τὸ ἀπὸ $B \Theta$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\Lambda \Theta \Lambda$ ἔτως τὸ ἀπὸ ΔH πρὸς τὸ ὑπὸ $\Lambda H \Lambda$ καὶ ἔσται τὸ $\mu\delta\upsilon$ ὑπὸ $\Lambda \Theta \Lambda$ ἴσον τῷ ἀπὸ $\Theta \Lambda$, τὸ δὲ ὑπὸ $\Lambda H \Lambda$ ἴσον τῷ ὑπὸ $I \Lambda H$ (ἴση γὰρ ἡ $\Lambda \Theta$ τῇ $\Theta \Lambda$, καὶ ἡ ΔK τῇ $K Z$, καὶ ἡ $H \Theta$ τῇ ΘI , καὶ ἡ ΛH τῇ $I \Lambda$) ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ $\Lambda \Theta$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘB , ταύτην τὸ ἀπὸ $B \Gamma$ πρὸς τὸ ἀπὸ $\Gamma \Lambda$, ἔτω τὸ ὑπὸ $I \Lambda H$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔH , τοῦτέστι τὸ ὑπὸ $Z E \Delta$ πρὸς τὸ ἀπὸ $E \Lambda$.

PROP. XVII. Theor.

Si duæ rectæ lineæ coni sectionem vel circuli circumferentiam contingentes in unum convenient; sumantur autem in sectione duo quævis puncta, & ab iis ducantur lineæ contingentibus parallelæ, quæ & sibi ipsis & sectioni occurrant: ut quadrata contingentium inter sese, ita erunt inter se rectangula contenta sub rectis similiter sumptis.

SIT coni sectio vel circuli circumferentia AB , quam contingant rectæ lineæ $\Lambda \Gamma$, ΓB , in puncto Γ convenientes; sumanturque in sectione puncta Δ , E , & ab ipsis ducantur $E Z I K$, $\Delta Z H \Theta$, quæ lineis $\Lambda \Gamma$, ΓB parallelæ sint: dico ut quadratum ex $\Lambda \Gamma$ ad quadratum ex ΓB ita esse rectangulum $K Z E$ ad rectangulum $\Theta Z \Delta$.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΖ.


Εάν κόνε τομῆς ἡ κύκλου περιφέρειας δύο εὐθεῖαι ἐκτεταταὶ συμπίπτωσι, λαβῇ δὲ ἐπὶ τῇ τομῇ δύο τυχόντα σημεῖα, καὶ ἀπ' αὐτῶν ἀχθῶσιν εἰς τὴν τομὴν παρὰ ταῖς ἐφαπτομέναις τμήματα ἀλλήλας τε καὶ ἡ γραμμὴν ἔσται ὡς τὰ δ πρὸς τὸ ϵ ἐφαπτομένην περὶ ἄλλα ταῦτα ἄλλα, ἔσται τὰ ἀπὸ τῶν ὁμοίων λαμβανομένων εὐθεῖαν.

ΕΣΤΩ κόνε τομῆς ἡ κύκλου περιφέρεια ἡ AB , ἐπὶ τῇ AB ἐφαπτομέναις αἱ $\Lambda \Gamma$, ΓB συμπίπτωσιν κατὰ τὸ Γ , καὶ εἰλήφθω ἐπὶ τῇ τομῇ τυχόντα σημεῖα τὰ Δ , E , καὶ δι' αὐτῶν ἀχθῶσιν εἰς τὰς $\Lambda \Gamma$, ΓB ἡχθῶσιν αἱ $E Z I K$, $\Delta Z H \Theta$. λέγω ὅτι ἔσται ὡς τὸ δ πρὸς τὸ ϵ πρὸς τὸ δ πρὸς τὸ ϵ ἔσται τὸ ὑπὸ $K Z E$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\Theta Z \Delta$.

ΗΧΘΩΣΑΝ

Ἡχθῶσιν γὰρ διὰ τῶν Α, Β διζήμεναι αἱ
ΑΑΜΝ, ΒΟΞΠ, ἃ ἐκβεβλήθησαν αἱ πῖ ἐφα-
πόμεναι καὶ αἱ ἐξῆλθον μέχρι τῶν διζομέ-
νων, καὶ ἡχθῶσιν ἀπὸ τῶν Δ, Ε ἐξῆς πῖς
ἐφαπόμεναι αἱ ΔΞ, ΕΜ. Φανερὸν δὲ ὅτι ἡ
ΚΙ τῇ ΙΕ ἐστὶ ἴση, καὶ ἡ ΘΗ τῇ ΗΔ. ἐπεὶ
οὖν ἡ ΚΕ πύκνεται εἰς μὴ ἴση κατὰ τὸ Ι, οἷον
δὲ αἰεταὶ κατὰ τὸ Ζ· τὸ ὑπὸ ΚΖΒ μετὰ τῷ
ἀπὸ ΖΙ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ ΕΙ. καὶ ἐπεὶ ὁμοία
ἐστὶ τὰ τρίγωνα διὰ πῖς ἐξῆλθον, ὥς ὡς
ὅλον τὸ ἀπὸ ΕΙ πρὸς ὅλον τὸ ΙΜΕ τρίγωνον,

Ducantur enim per A, B diametri AAMN,
BOΞΠ, & producantur contingentes rectæ, ut &
ipsis parallelæ usque ad diametros; & à punctis
Δ, Ε parallelæ contingentibus ducantur ΔΞ, ΕΜ:
constat ideoque [per 46. & 47. I. huj.] KI æqua-
lem esse ipsi ΙΒ, & ΘΗ ipsi ΗΔ. quoniam igitur
ΚΒ secatur in partes æquales in puncto Ι, & in
partes inæquales in Ζ: rectangulum ΚΖΒ una-
cum quadrato ex ΖΙ æquale est [per 5. vel 6. 2.]
quadrato ex ΒΙ. & cum triacula similia sint,
ob lineas parallelas; erit [per 3. lem. 3. huj.] ut
totum quadratum ex ΕΙ ad totum triangulum
ΙΜΕ ita ablatum quadratum ex ΙΖ ad ablatum



ὥτως ἀφαιρέθην τὸ ἀπὸ ΙΖ πρὸς ἀφαιρέθην
τὸ ΖΙΑ τρίγωνον, καὶ λοιπὸν ἔσται τὸ ὑπὸ ΚΖΕ
πρὸς λοιπὸν τὸ ΖΜ περὶπλάρον ὥς ὅλον τὸ
ἀπὸ ΕΙ πρὸς ὅλον τὸ ΙΜΕ τρίγωνον. ἀλλ' ὡς
τὸ ἀπὸ ΕΙ πρὸς ΙΜΕ τρίγωνον ὥτως τὸ ἀπὸ
ΓΑ πρὸς τὸ ΓΑΝ· ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ ΚΖΒ
πρὸς τὸ ΖΜ περὶπλάρον ὥτως τὸ ἀπὸ ΑΓ
πρὸς τὸ ΓΑΝ. ἴσιν δὲ τὸ μὲν ΑΓΝ τῷ ΓΠΒ,
τὸ δὲ ΖΜ τῷ ΖΞ· ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ ΚΖΕ
πρὸς τὸ ΖΞ ὥτως τὸ ἀπὸ ΑΓ πρὸς τὸ ΓΒΠ.
Ὁμοίως δὲ δεξιήσεται, καὶ ὡς τὸ ὑπὸ ΘΖΔ
πρὸς τὸ ΖΞ ὥτως τὸ ἀπὸ ΓΒ πρὸς τὸ ΓΠΒ.
ἐπεὶ ὅν ἐστιν ὡς μὲν τὸ ὑπὸ ΚΖΕ πρὸς τὸ ΖΞ
περὶπλάρον ὥτως τὸ ἀπὸ ΑΓ πρὸς τὸ ΓΠΒ,
διὰ δὲ τὴν ἀνάπαλιν ὡς τὸ ΖΞ περὶπλάρον
πρὸς τὸ ὑπὸ ΘΖΔ ὥτως τὸ ΠΓΒ πρὸς τὸ
ἀπὸ ΓΒ· δι' ἴσιν ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ ΑΓ πρὸς τὸ
ἀπὸ ΓΒ ὥτως τὸ ὑπὸ ΚΖΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΘΖΔ.

triangulum ZIA: quare & reliquum ΚΖΒ re-
ctangulum ad reliquum quadrilaterum ΖΜ est
[per 19.5.] ut totum quadratum ex ΒΙ ad totum
ΙΜΕ triangulum. sed ut quadratum ex ΒΙ ad
triangulum ΙΜΕ ita quadratum ex ΓΑ ad trian-
gulum ΓΑΝ: ut igitur ΚΖΒ rectangulum ad
quadrilaterum ΖΜ ita quadratum ex ΑΓ ad
ΓΑΝ triangulum. atque [per 1. 3. huj.] est æ-
quale triangulum ΑΓΝ triangulo ΓΠΒ, & [per
3.3. huj.] quadrilaterum ΖΜ quadrilatero ΖΞ:
ergo ut rectangulum ΚΖΒ ad ΖΞ quadrilaterum
ita quadratum ex ΑΓ ad triangulum ΓΒΠ. Si-
militer demonstrabitur & ut rectangulum ΘΖΔ
ad quadrilaterum ΖΞ ita esse quadratum ex ΓΒ
ad triangulum ΓΠΒ. itaque quoniam ut rectan-
gulum ΚΖΒ ad quadrilaterum ΖΞ ita quadratum
ex ΑΓ ad ΓΠΒ triangulum; & invertendo ut
quadrilaterum ΖΞ ad rectangulum ΘΖΔ ita tri-
angulum ΠΓΒ ad quadratum ex ΓΒ: erit ex æ-
quali, ut quadratum ex ΑΓ ad quadratum ex
ΓΒ ita rectangulum ΚΖΒ ad rectangulum ΘΖΔ.

XX

EU.

Hoc etiam theorema similiter ac præcedens positum est: quod nos, quasi casum auferentes, hoc loco adscripsimus.

Si in ellipsi aut circuli circumferentia diametri quæ per tactus ducuntur parallelæ sint contingentibus $ΑΓ$, $ΓΒ$; erit itidem ut quadratum ex $ΑΓ$ ad quadratum ex $ΒΓ$ ita rectangulum $ΚΖΒ$ ad rectangulum $ΔΖΘ$.

Ducantur enim per $ΔΘ$ ordinatim applicatæ $ΔΠ$, $ΘΜ$. & quoniam ut quadratum ex $ΑΓ$ ad quadratum ex $ΓΒ$

ita quadratum ex $ΒΝ$ ad quadratum ex $ΝΑ$, hoc est ad rectangulum $ΑΝΑ$; ut autem quadratum ex $ΒΝ$ ad rectangulum $ΑΝΑ$ ita [per 21. 1. huj.] quadratum ex $ΔΠ$, hoc est quadratum ex $ΖΟ$, ad rectangulum $ΑΠΑ$;

& quadratum ex $ΕΟ$ ad rectangulum $ΑΟΑ$: & est reliquum ad reliquum ut totum ad totum. itaque si à quadrato ex $ΕΟ$ auferatur quadratum ex $ΔΠ$, hoc est quadratum ex $ΖΟ$, relinquitur [per 5.2.] rectangulum $ΚΖΕ$; est enim $ΚΟ$ ipsi $ΟΕ$ æqualis. rursus si à rectangulo $ΑΟΑ$ auferatur rectangulum $ΑΠΑ$, relinquitur [per Pappi lem. 3. in lib.2.] $ΜΟΠ$ rectangulum, hoc est rectangulum $ΘΖΔ$; namque $ΑΠ$ est æqualis $ΜΑ$, & $ΠΝ$ ipsi $ΝΜ$: ut igitur quadratum ex $ΑΓ$ ad quadratum ex $ΓΒ$ ita reliquum rectangulum $ΚΖΒ$ ad reliquum $ΔΖΘ$.

Quod si punctum Z extra sectionem cadat, additiones & ablationes contrario facere oportebit.

PROP. XVIII. Theor.

Si duæ rectæ lineæ oppositas sectiones contingentes in unum convenient; sumatur autem in quavis sectione aliquod punctum, & ab eo ducatur recta uni contingentium parallela quæ & sectionem & alteram contingentium fecit: ut quadrata contingentium inter sese; ita erit rectangulum, contentum rectis quæ interjiciuntur inter sectionem & contingentem, ad quadratum ejus quæ inter parallelam & tactum interjicitur.

SINT oppositæ sectiones $ΑΒ$, $ΜΝ$, & contingentes rectæ $ΑΓΑ$, $ΒΓΘ$, quæ in puncto $Γ$ convenient; per tactus autem ducantur diametri $ΑΜ$, $ΒΝ$, & sumatur in sectione $ΜΝ$ quodvis punctum $Δ$, à quo ducatur $ΖΔΒ$ ipsi $ΒΘ$ parallela: dico ut quadratum ex $ΒΓ$ ad quadratum ex $ΓΑ$ ita esse rectangulum $ΖΕΔ$ ad quadratum ex $ΑΕ$.

Καὶ τὸ τοιοῦτος πρὸς αὐτὴν ἔκκετο θεώρημα· ὅπερ ἡμῶς οὕτως πρὸς τὴν ἀφαιρέσιν ἐν ταύτῃ ἐγράψαμεν.

Εάν ᾧ τὴν ἑλλείψιος ἢ τὴν κύκλῳ περιφερείας αἱ διὰ τῶν ἀφῶν ἀγόμεναι διὰ μέτροι ὡς ἀλλήλοι ὡς τῆς ἐφαπτομένης τῶν $ΒΓ$, $ΓΑ$ · καὶ ἕτως ἐστὶν ὡς τὸ ἀπὸ $ΓΑ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΒΓ$ ἕτω τὸ ὑπὸ $ΚΖΕ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΔΖΘ$.

Ἡχθῶσαν διὰ τῶν $Δ$, $Θ$ παραγμῶς κατηγμέναι αἱ $ΔΠ$, $ΘΜ$. ἐπεὶ ἔν ἐστὶν ὡς τὸ ἀπὸ $ΑΓ$

πρὸς τὸ ἀπὸ $ΓΒ$ ἕτω τὸ ἀπὸ $ΒΝ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΑΝ$, τὰς τε πρὸς τὸ ὑπὸ $ΑΝΑ$ ὡς δὲ τὸ ἀπὸ $ΒΝ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΑΝΑ$ ἕτω τὸ ἀπὸ $ΔΠ$, τὰς τε πρὸς τὸ ὑπὸ $ΖΟ$, πρὸς τὸ ὑπὸ $ΑΠΑ$, καὶ τὸ ἀπὸ $ΕΟ$ πρὸς τὸ

ὑπὸ $ΑΟΑ$ · καὶ λοιπὸν πρὸς λοιπὸν ὡς ὅλον πρὸς ὅλον. εἰν ἄρα ἀπὸ μὲν τοῦ ἀπὸ $ΕΟ$ ἀφαιρέσῃ τὸ ἀπὸ $ΔΠ$, πυτῆσι τὸ ἀπὸ $ΖΟ$, καταλείπεται τὸ ὑπὸ $ΚΖΕ$. ἴση γὰρ ἡ $ΚΟ$ τῇ $ΟΕ$. εἰν δὲ ἀπὸ τῆς ὑπὸ $ΑΟΑ$ ἀφαιρέσῃ τὸ ὑπὸ $ΑΠΑ$, λείπεται τὸ ὑπὸ $ΜΟΠ$, τὰς τε τὸ ὑπὸ $ΘΖΔ$, ἴση γὰρ ἡ $ΑΠ$ τῇ $ΜΑ$ καὶ ἡ $ΠΝ$ τῇ $ΝΜ$. ἐστὶν ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ $ΑΓ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΓΒ$ ἕτω λοιπὸν τὸ ὑπὸ $ΚΖΕ$ πρὸς λοιπὸν τὸ ὑπὸ $ΔΖΘ$.

Ὅταν δὲ τὸ Z ἐκτὸς τῆς τομῆς, πρὸς προσθέσεως καὶ ἀφαιρέσεως ἀνάπαλιν ποιησίου.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ ιθ'.

Εάν τὴν ἀντικείμεναι δύο εὐθείαι ὁπερ φάσιν συμπίπτουσι, καὶ ληφθῇ π σημῆον ἐφ' ὅποιοι εἰσὶν τὴν τομῆν, καὶ ἀπ' αὐτῆς ἀχθῇ τις εὐθεῖα ὡς ἑταῖρα τῶν ἐφαπτομένων τέμνουσα τὴν τομῆν καὶ τῶν ἐπείρου ἐφαπτομένην· ἔσται ὡς τὰ ἀπὸ τῶν ἐφαπτομένων τετραγώνων πρὸς ἀλλήλα, ὥς τὸς τὸς ἀντιμέστοι ὑπὸ τῶν μεταξὺ τῶν τομῆς καὶ τῶν ἐφαπτομένων πρὸς τὸ ἀπὸ τῶν ἀπὸ ἀμφοτέρων πρὸς τῇ ἀφῇ τετραγώνων.

ΕΣΤΩΣΑΝ ἀντικείμεναι αἱ $ΑΒ$, $ΜΝ$, καὶ ἐφαπτομένη αἱ $ΑΓΑ$, $ΒΓΘ$ συμπίπτουσαι κατὰ τὸ $Γ$, καὶ διὰ τῶν ἀφῶν διὰ μέτροι αἱ $ΑΜ$, $ΒΝ$, καὶ εἰλήφθω ὅτι τὸ $ΜΝ$ τομῆς τυχὸν σημῆον τὸ $Δ$, καὶ δι' αὐτὸ ἡχθῶ ὡς ἑταῖρα τῇ $ΒΘ$ ἡ $ΖΔΕ$. λέγω ὅτι ἐστὶν ὡς τὸ ἀπὸ $ΒΓ$ πρὸς τὸ $ΓΑ$ ἕτως τὸ ὑπὸ $ΖΕΔ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΑΕ$.

Ἡχθῶ

Ηχθω γὰρ διὰ τῆς Δ τῆς AE ὁμοειδὴς ἡ ΔE .
ἐπεὶ ἐν ὑπερβολῇ ἐστὶν ἡ AB , καὶ διὰ μέτρος αὐτῆς
ἡ BN , καὶ ἐφαπτομένη ἡ $B\Theta$, καὶ τῇ $B\Theta$ ὁμοει-
δὴς ἡ ΔZ . ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ZO τῇ OD . καὶ
περὶσσεύεται ἡ ED . τὸ ἄρα ὑπὸ $ZE\Delta$ περὶ
τῆς ἀπὸ DO ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ EO . καὶ ἐπεὶ
ὁμοειδὴς ἐστὶν ἡ EA τῇ ΔE , ὁμοίον ἐστὶ τὸ
 $EO\Lambda$ τρίγωνον τῷ ΔZO . ἐστὶν
ἄρα ὡς ὅλον τὸ ΔZO πρὸς
τὸ $EO\Lambda$ ὅτως ἀφαι-
ρεθὲν τὸ ἀπὸ DO πρὸς ἀφαι-
ρεθὲν τὸ ΔZO τρίγωνον. ἔ-
λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ DEZ πρὸς
τὸ $\Delta\Lambda$ τετράπλευρον ἐστὶν ὡς
τὸ ἀπὸ EO πρὸς τὸ $EO\Lambda$. ἀλλ'
ὡς τὸ ἀπὸ EO πρὸς τὸ $EO\Lambda$
τρίγωνον ὅτως τὸ ΔZO πρὸς
τὸ $B\Gamma\Lambda$ τρίγωνον. ἔστι ἄρα τὸ
ὑπὸ $ZE\Delta$ πρὸς τὸ $\Delta\Lambda$ τετρά-
πλευρον ὅτως τὸ ἀπὸ $B\Gamma$
πρὸς τὸ $B\Gamma\Lambda$ τρίγωνον. ἴσον
δὲ τὸ $\Delta\Lambda$ τετράπλευρον τῷ
 AEH τρίγωνῳ, τὸ δὲ $B\Gamma\Lambda$
τῷ $AG\Theta$. ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ $ZE\Delta$ πρὸς τὸ AEH
ὅτως τὸ ἀπὸ $B\Gamma$ πρὸς τὸ $AG\Theta$. ἐστὶ δὲ καὶ
ὡς τὸ AEH πρὸς τὸ ἀπὸ EA ὅτως τὸ $AG\Theta$
πρὸς τὸ ἀπὸ AG . δι' ἴσου ἄρα ἐστὶν ὡς τὸ ἀπὸ
 $B\Gamma$ πρὸς τὸ ἀπὸ GA ὅτως τὸ ὑπὸ $ZE\Delta$ πρὸς
τὸ ἀπὸ EA .




Ducatur enim per Δ ipsi AE parallela ΔZ .
& quoniam AB est hyperbola, cujus diameter
 BN ; rectaque $B\Theta$ sectionem contingit, & ipsi $B\Theta$
parallela est ΔZ : erit [per 48.1.huj.] ZO æqua-
lis OD . adjungitur autem ED ; ergo [per 6.2.]
rectangulum $ZE\Delta$ una cum quadrato ex DO
æquale est quadrato ex OE . & cum EA paral-
lela sit ΔE , triangulum $EO\Lambda$ simile est triangulo
 ΔZO : est igitur [per 3. lem.
3. huj.] ut totum quadratum
ex EO ad triangulum $EO\Lambda$
ita ablatum quadratum ex DO
ad ablatum ΔZO triangulum:
quare & reliquum rectangu-
lum DEZ ad quadrilaterum
 $\Delta\Lambda$ est ut quadratum ex EO ad
triangulum $EO\Lambda$. sed ut qua-
dratum ex EO ad $EO\Lambda$ trian-
gulum ita [per 19. & 20. 6.]
quadratum ex $B\Gamma$ ad triangu-
 $B\Gamma\Lambda$: ut igitur rectangulum
 $ZE\Delta$ ad quadrilaterum $\Delta\Lambda$
ita quadratum ex $B\Gamma$ ad $B\Gamma\Lambda$
triangulum. æquale autem est
quadrilaterum $\Delta\Lambda$ [per 6.3.
huj.] triangulo AEH , & tri-
angulum $B\Gamma\Lambda$ [per 1. 3. huj.] triangulo $AG\Theta$:
ergo ut $ZE\Delta$ rectangulum ad triangulum AEH
ita quadratum ex $B\Gamma$ ad $AG\Theta$ triangulum. sed
ut triangulum AEH ad quadratum ex EA ita tri-
angulum $AG\Theta$ ad quadratum ex AG : ex æquali
igitur ut quadratum ex $B\Gamma$ ad quadratum ex GA
ita rectangulum $ZE\Delta$ ad quadratum ex EA .

EUTOCIUS.

Εν ποσὶ ἀντιθέτοις εὐρίσκειται ἡ ἀπόδειξις τῆς τοῦ
ῥήματος, ἐὰν ἐκαστὴς τῶν τομῶν ἐφαπτομένη εὐθεῖα συμ-
πίπτῃ, καὶ ὅπως ἔσται τὰ εἰρημένα.

Εἰσὼσιν γὰρ ἀντιθέμεναι αἱ A, B , καὶ ἐφαπτομένη
αὐτῶν αἱ AG, GB συμπίπτουσιν κατὰ τὸ G , καὶ
εἰληφθῶ ὅτι τῆς B τομῆς τὸ
 Δ , καὶ δι' αὐτῆς ὁμοειδὴς τῇ AG
ἡ ΔE . λέγω ὅτι ἐστὶν
ὡς τὸ ἀπὸ AG πρὸς τὸ ἀπὸ
 GB ὅτως τὸ ὑπὸ $EZ\Delta$ πρὸς τὸ
ἀπὸ ZB .

Ηχθω γὰρ διὰ τῆς A διαμέ-
τρος ἡ $A\Theta H$, διὰ δὲ τῶν B ,
 H παρὰ τὴν EZ αἱ HK, BL .
ἐπεὶ ἐν ἀπὸ τῆς B ἐφαπτομένης
τῆς ὑπερβολῆς ἡ $B\Theta$, τεταγμένης
δὲ ἡ BL . ἐστὶν ὡς ἡ AL
πρὸς AH ὅτως ἡ $A\Theta$ πρὸς ΘH .
ἀλλ' ὡς μὲν ἡ AL πρὸς AH
ὅτως ἡ GB πρὸς BK , ὡς δὲ ἡ
 $A\Theta$ πρὸς ΘH ὅτως ἡ AG πρὸς KH . καὶ ὡς
ἄρα ἡ GB πρὸς BK ὅτως ἡ AG πρὸς HK , καὶ
ἐναλλάξ ὡς ἡ AG πρὸς GB ὅτως ἡ HK πρὸς
 KB , καὶ ὡς τὸ ἀπὸ AG πρὸς τὸ ἀπὸ GB ὅτως
τὸ ἀπὸ HK πρὸς τὸ ἀπὸ KB . ὡς δὲ τὸ ἀπὸ
 HK πρὸς τὸ ἀπὸ KB ὅτως εἰληφθῇ τὸ ὑπὸ $EZ\Delta$
πρὸς τὸ ἀπὸ ZB . καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ AG πρὸς
τὸ ἀπὸ GB ὅτως τὸ ὑπὸ $EZ\Delta$ πρὸς τὸ ἀπὸ ZB .



In aliquibus exemplaribus alia demonstratio hujus
theorematis invenitur, cum rectæ lineæ utramque se-
ctionem contingentes conveniant.

Sint enim oppositæ sectiones A, B , quas contin-
gant rectæ AG, GB in puncto G concurrentes; fur-
maturque aliquod punctum Δ in
sectione B , & ab eo ducatur ΔEZ
ipsi AG parallela: dico ut qua-
dratum ex AG ad quadratum ex
 GB ita esse rectangulum $EZ\Delta$
ad quadratum ex ZB .


Ducatur enim per A diameter
 $A\Theta H$, & per B, H ducantur HK, BL
parallelæ ipsi BZ . quoniam igitur
 $B\Theta$ in puncto B hyperbolam
contingit, & ordinatim applicata
est BL : erit [per 36. 1.] ut AL
ad AH ita $A\Theta$ ad ΘH . sed [per
2.6.] ut AL quidem ad AH ita
 GB ad BK , ut vero $A\Theta$ ad ΘH
ita AG ad KH : quare ut GB ad
 BK ita AG ad HK , & permutando ut AG ad
 GB ita HK ad KB , & [per 22. 6.] ut qua-
dratum ex AG ad quadratum ex GB ita quadra-
tum ex HK ad quadratum ex KB . sed demon-
stratum est [per 16.3.huj.] rectangulum $EZ\Delta$ esse
ad quadratum ex ZB ut quadratum ex HK ad
quadratum ex KB : ergo ut quadratum ex AG ad
quadratum ex GB ita $EZ\Delta$ rectangulum ad qua-
dratum ex ZB .

P R O P.

ΓΠ τὴν τομὴν κατὰ Β, Γ. καὶ ἐπὶ κέντρον ἐστὶ τὸ Ε, ἴση ἐστὶ ἡ μὲν ΒΕ τῇ ΕΔ. ἡ δὲ ΑΕ τῇ ΕΓ. διὰ δὴ τούτων καὶ ὅτι ὁμοειδὴς ἐστὶν ἡ ΑΤΖ τῇ ΓΣΠ, ἴση ἐστὶ καὶ ἡ μὲν ΤΕ τῇ ΕΣ. ἡ δὲ ΔΣ τῇ ΤΒ. ὥστε καὶ ἡ ΒΣ τῇ ΤΔ. καὶ ἴση ἐστὶ τὸ ΒΠΣ τριγώνον τῷ ΔΤΖ τριγώνῳ. ἴση ἄρα καὶ ἡ ΒΠ τῇ ΔΖ. ὁμοίως δὲ δευτέρῃ καὶ ἡ ΓΠ τῇ ΑΖ ἴση. ὥς δὲ τὸ ἀπὸ ΒΠ πρὸς τὸ ἀπὸ ΠΓ ἔστω ἐστὶ τὸ ὑπὸ ΗΛΙ πρὸς τὸ ὑπὸ ΜΛΞ. καὶ ὥς ἄρα τὸ ἀπὸ ΔΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΑ ἔστω τὸ ὑπὸ ΗΛΙ πρὸς τὸ ὑπὸ ΜΛΞ.

Ἄλλως.

Ἡχθῶ πάλιν ἐκατέρᾳ τῶν ΗΘΚ, ΙΘΛ παραλλήλων τῇ ἐφαπτομένῃ, τέμνουσαι πλὴν ΔΓ τομὴν. δευτέρῃ ὅτι καὶ ὥς τὸ ἀπὸ ΔΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΑ ἔστω τὸ ὑπὸ ΙΘΛ πρὸς τὸ ὑπὸ ΗΘΚ. ἡχθῶ γὰρ διὰ τῆς Α ἀφῆς διάμετρος ἡ ΑΓ, ὥστε δὲ πλὴν ΑΖ ἡχθῶ ἡ ΓΜ. ἐφαπτομένη δὲ ἡ ΓΜ τῆς ΓΔ τομῆς κατὰ τὸ Γ, καὶ ἔστω ὥς τὸ ἀπὸ ΔΜ πρὸς τὸ ἀπὸ ΜΓ ἔστω τὸ ὑπὸ ΙΘΛ πρὸς τὸ ὑπὸ ΗΘΚ. ὥς δὲ τὸ ἀπὸ ΔΜ πρὸς τὸ ἀπὸ ΜΓ ἔστω τὸ ἀπὸ ΔΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΑ. ὥς ἄρα τὸ ἀπὸ ΔΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΑ ἔστω τὸ ὑπὸ ΙΘΛ πρὸς τὸ ὑπὸ ΗΘΚ.



ΠΡΟΤΑΣΙΣ κ'.

Εὰν τὴν ἀντικείμενον δύο εὐθείαι ἐφαπτομένηι συμπίπτωσι, καὶ διὰ τῆς συμπίπτουσας ἀχθῇ τις εὐθεῖα ὥστε τὰς ἀφῆς ὁμοειδῆσαι συμπίπτουσαι ἐκατέρᾳ τῶν τομῶν, ἀχθῇ δὲ τις ἐτέρα εὐθεῖα παρὰ τὴν αὐτὴν τέμνουσαι τὰς τομὰς καὶ τὰς ἐφαπτομένας. ἔστω ὥς τὸ ἀπὸ ΔΜ πρὸς τὸ ἀπὸ ΜΓ ἔστω τὸ ὑπὸ ΙΘΛ πρὸς τὸ ὑπὸ ΗΘΚ. ὥς δὲ τὸ ἀπὸ ΔΜ πρὸς τὸ ἀπὸ ΜΓ ἔστω τὸ ἀπὸ ΔΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΑ. ὥς ἄρα τὸ ἀπὸ ΔΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΑ ἔστω τὸ ὑπὸ ΙΘΛ πρὸς τὸ ὑπὸ ΗΘΚ.

ΕΣΤΩΣΑΝ ἀντικείμεναι αἱ ΑΒ, ΓΔ, ὧν κέντρον τὸ Ε, ἐφαπτομένηι δὲ αἱ ΑΖ, ΓΖ, καὶ

PROP. XX. Theor.

Si duæ rectæ lineæ oppositas sectiones contingentes sibi ipsis occurrant; & per occursum ducatur recta tactus conjungenti parallela, quæ secet utramque sectionem; ducatur autem alia recta parallela eidem, sectionesque & contingentes secans: erit ut rectangulum, contentum sub segmentis quæ inter occursum contingentium & sectiones interjiciuntur, ad quadratum ipsius contingentis; ita rectangulum, quod continetur sub rectis inter sectiones & contingentem interjectis, ad quadratum ejus quæ ad tactum intercipitur.

SINT oppositæ sectiones ΑΒ, ΓΔ, quarum centrum Ε, & ΑΖ, ΓΖ lineæ contingentes; jun-

* Per conversum ejus quod demonstrat Eutocius in 44. 1. huj.

† Junctâ enim ΖΕ & productâ donec cum ΓΜ concurrat in Ν, erit hæc [per 37 & 39.2 huj.] parallela ΓΔ, unde trianguλα ΔΜΓ, ΖΜΝ sunt æquiangula: quare ΖΜ est ad ΜΝ ut ΔΜ ad ΜΓ, & permutando, componendo, invertendoque, & rursus permutando ΔΜ erit ad ΜΓ ut ΔΖ ad ΓΝ. est autem ΑΖ æqualis ΓΝ, ut modo ostensum; est igitur ut ΔΜ ad ΜΓ ita ΔΖ ad ΖΑ, & [per 22. 6.] horum quadrata sunt proportionalia.


Y y

gantur

gantur autem $\Lambda\Gamma, EZ, \Lambda E$, quæ protrahantur; perque Z ducatur $BZ\Theta\Delta$ ipsi $\Lambda\Gamma$ parallela, & sumpto in sectione quovis puncto H ducatur $H\Lambda\Sigma N\Xi$ parallela ipsi $\Lambda\Gamma$: dico ut rectangulum $BZ\Delta$ ad quadratum ex $Z\Lambda$ ita esse rectangulum $H\Lambda\Xi$ ad quadratum ex $\Lambda\Lambda$.

Ducantur enim à punctis H, B lineæ $H\Pi, BP$ parallele ipsi ΛZ . & quoniam [per 19. & 20. 6.] ut quadratum ex BZ ad BZP triangulum ita quadratum ex $H\Sigma$ ad triangulum $H\Sigma\Pi$, & quadratum ex $\Lambda\Sigma$ ad triangulum $\Lambda\Sigma Z$: erit & reliquum rectangulum $H\Lambda\Xi$ ad quadrilaterum $H\Lambda Z\Pi$ ut quadratum ex BZ ad triangulum BZP . quadratum autem ex BZ æquale est rectangulo $BZ\Delta$; triangulumque BPZ [per 11. 3. huj.] triangulo $\Lambda Z\Theta$, & [per 5. 3. huj.] quadrilaterum $H\Lambda Z\Pi$ triangulo $\Lambda\Lambda N$: ergo

ut rectangulum $BZ\Delta$ ad triangulum $\Lambda Z\Theta$ ita $H\Lambda\Xi$ rectangulum ad triangulum $\Lambda\Lambda N$. sed [per 3. lem. 3. huj.] ut triangulum $\Lambda Z\Theta$ ad quadratum ex ΛZ ita triangulum $\Lambda\Lambda N$ ad quadratum ex $\Lambda\Lambda$: ex æquali igitur, ut rectangulum $BZ\Delta$ ad quadratum ex $Z\Lambda$ ita rectangulum $H\Lambda\Xi$ ad quadratum ex $\Lambda\Lambda$.



ἐπιζεύχθω ἡ $\Delta\Gamma$, καὶ αἱ $EZ, \Lambda E$. Ἐὰν ἐκτελέσῃται, ἡχθῶ δὲ διὰ τὸ Z πρὸς τὴν $\Lambda\Gamma$ ἢ $BZ\Theta\Delta$, καὶ ἐκτελέσῃται ὁ ἔτυχς σημεῖον τὸ H , καὶ δι' αὐτοῦ πρὸς τὴν $\Lambda\Gamma$ ἡχθῶ ἡ $H\Lambda\Sigma N\Xi$. λέγω ὅτι ἔστω ὡς τὸ ὑπὸ $BZ\Delta$ πρὸς τὸ ἀπὸ $Z\Lambda$ ἕτως τὸ ὑπὸ $H\Lambda\Xi$ πρὸς τὸ ἀπὸ $\Lambda\Lambda$.

Ἡχθῶσιν γὰρ ἀπὸ τῶν H, B πρὸς τὴν ΛZ αἱ $H\Pi, BP$. ἔπειδ' ἔν ἐστιν ὡς τὸ ἀπὸ BZ πρὸς τὸ BZP τριγώνου ἕτως τὸ ἀπὸ $H\Sigma$ πρὸς τὸ $H\Sigma\Pi$, καὶ τὸ ἀπὸ $\Lambda\Sigma$ πρὸς τὸ $\Lambda\Sigma Z$. καὶ λοιπὸν τὸ ὑπὸ $H\Lambda\Xi$ πρὸς τὸ $H\Lambda Z\Pi$ περὶ πλάγους ἔστιν ὡς τὸ ἀπὸ BZ πρὸς τὸ BZP . ἔστιν δὲ τὸ μὲν ἀπὸ BZ τῷ ὑπὸ $BZ\Delta$, τὸ δὲ BPZ τριγώνου τῷ $\Delta Z\Theta$, τὸ δὲ $H\Lambda Z\Pi$ περὶ πλάγους τῷ $\Lambda\Lambda N$ τριγώνῳ. ἔστι ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ $BZ\Delta$ πρὸς τὸ $\Delta Z\Theta$ τριγώνου ἕτως τὸ ὑπὸ $H\Lambda\Xi$ πρὸς τὸ $\Lambda\Lambda N$. ὡς δὲ τὸ $\Delta Z\Theta$

πρὸς τὸ ἀπὸ ΛZ ἕτως τὸ $\Lambda\Lambda N$ πρὸς τὸ ἀπὸ $\Lambda\Lambda$. δι' ἴσιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ $BZ\Delta$ πρὸς τὸ ἀπὸ $Z\Lambda$ ἕτως τὸ ὑπὸ $H\Lambda\Xi$ πρὸς τὸ ἀπὸ $\Lambda\Lambda$.

PROP. XXI. Theor.

Hisdem positis, si in sectione duo puncta sumantur, & per ipsa ducantur rectæ lineæ, una quidem contingenti parallela, altera vero lineæ tactus conjungenti, quæ & sibi ipsis & sectionibus occurrant: erit ut rectangulum, contentum lineis quæ interjiciuntur inter occursum contingentium & sectiones, ad quadratum contingentis; ita rectangulum, contentum segmentis inter sectiones & rectarum occursum interjectis, ad rectangulum sub rectis inter sectionem & occursum interjectis.

SINT eadem quæ supra; & sumptis in sectione punctis H, K , per ea ducantur $N\Xi H O P, K T, B T$ ipsi ΛZ parallele, & $H\Lambda M, K O \Psi \Omega$ parallele ipsi $\Lambda\Gamma$: dico ut rectangulum $BZ\Delta$ ad quadratum ex $Z\Lambda$ ita esse $K O \Omega$ rectangulum ad rectangulum $N O H$.

Quoniam enim est [per 3. lem. 3. huj.] ut quadratum ex ΛZ ad triangulum $\Lambda Z\Theta$ ita quadratum ex $\Lambda\Lambda$ ad $\Lambda\Lambda M$ triangulum, & quadratum ex ΞO ad triangulum $\Xi O \Psi$, & quadratum ex ΞH ad triangulum $\Xi H M$: erit ut totum quadratum ex ΞO ad totum triangulum $\Xi O \Psi$ ita quadratum ex ΞH ablatum ad ablatum triangulum $\Xi H M$: quare [per 19. 5.] & reliquum rectangulum $N O H$ ad reliquum quadrilate-


ΠΡΟΤΑΣΙΣ κα'.

Τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων, εἰν' ὅτι τὸ τομῆς δύο σημεία ληφθῇ, καὶ δι' αὐτῶν ἀχθῶσιν εὐθεῖαι, ἡ μὲν πρὸς τὴν ἐφαπτομένην, ἡ δὲ πρὸς τὴν τῆς ἀφ' ἑκτὸς ἐκτελέσθαι, τέμνουσαι ἀλλήλας τι καὶ τὰς τομὰς. ἔστιν ὡς τὸ ἀπὸ τῶν ἐφαπτομένων ὑπὸ τῷ Δ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ἐφαπτομένης περὶ πλάγους, ὅπως τὸ ἀπὸ τῶν ἐφαπτομένων ὑπὸ τῷ μ μεταξὺ τῶν τομῶν καὶ τῆς συμπίπτουσας εὐθεῖας πρὸς τὸ ἀπὸ τῶν ἐφαπτομένων ὑπὸ τῷ μ μεταξὺ τῶν τομῶν καὶ τῆς συμπίπτουσας.

ΕΣΤΩ γὰρ τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον, ἐκτελέσθω δὲ καὶ H, K σημεία, Ἐὰν αὐτῶν ἡχθῶσιν πρὸς τὴν ΛZ αἱ $N\Xi H O P, K T, B T$. πρὸς δὲ τὴν $\Lambda\Gamma$ αἱ $H\Lambda M, K O \Psi \Omega$. λέγω ὅτι ἔστω ὡς τὸ ὑπὸ $BZ\Delta$ πρὸς τὸ ἀπὸ $Z\Lambda$ ἕτως τὸ ὑπὸ $K O \Omega$ πρὸς τὸ ὑπὸ $N O H$.

Ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὡς τὸ ἀπὸ ΛZ πρὸς τὸ $\Lambda Z\Theta$ τριγώνου ἕτως τὸ ἀπὸ $\Lambda\Lambda$ πρὸς τὸ $\Lambda\Lambda M$, καὶ τὸ ἀπὸ ΞO πρὸς τὸ $\Xi O \Psi$, καὶ τὸ ἀπὸ ΞH πρὸς τὸ $\Xi H M$. ὡς ἄρα ὅλον τὸ ἀπὸ ΞO πρὸς ὅλον τὸ $\Xi O \Psi$ ἕτως ἀφαιρῶν τὸ ἀπὸ ΞH πρὸς ἀφαιρῶν τὸ $\Xi H M$. καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ $N O H$ πρὸς λοιπὸν τὸ $H O \Psi M$ περὶ πλάγους ἔστιν

ἔστω ὡς τὸ ἀπὸ ΑΖ πρὸς τὸ ΑΖΘ. ἴσων δὲ τὸ μὲν ΑΖΘ τῷ ΒΥΖ, τὸ δὲ ΗΟΨΜ τῷ ΚΟΡΤ. ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ΑΖ πρὸς τὸ ΒΥΖ ἕτως τὸ ὑπὸ ΝΟΗ πρὸς τὸ ΚΟΡΤ. ὡς ὅτι τὸ ΒΥΖ τρίγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ ΒΖ, τέτρεται τὸ ὑπὸ ΒΖΔ, ἕτως ἐδείχθη τὸ ΚΟΡΤ πρὸς τὸ ὑπὸ ΚΟΩ. δι' ἴσων ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ ΑΖ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΖΔ ἕτως τὸ ὑπὸ ΝΟΗ πρὸς τὸ ὑπὸ ΚΟΩ, καὶ ἀνάπαλιν ὡς τὸ ὑπὸ ΒΖΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΑ ἕτως τὸ ὑπὸ ΚΟΩ πρὸς τὸ ὑπὸ ΝΟΗ. Ὁρθὸν ΝΟΗ ad rectangulum ΚΟΩ; & [per 4. 5.] invertendo, ut rectangulum ΒΖΔ ad quadratum ex ΖΑ ita rectangulum ΚΟΩ ad rectangulum ΝΟΗ.



nam HOΨM est ut quadratum ex AZ ad AZΘ triangulum. sed [per 11. 3. huj.] triangulum AZΘ æquale est triangulo BTZ, & [per 12. 3. huj.] quadrilaterum HOΨM quadrilatero KOPT: ergo ut quadratum ex AZ ad triangulum BTZ ita rectangulum NOH ad quadrilaterum KOPT. ut autem triangulum BTZ ad quadratum ex BZ, hoc est ad rectangulum BZΔ, ita demonstratum est [in præced.] quadrilaterum KOPT ad rectangulum ΚΟΩ: ex æquali igitur, ut quadratum ex AZ ad rectangulum BZΔ ita re-


ΠΡΟΤΑΣΙΣ κβ'.

Εάν τ' ἀντικείμεναι δύο εὐθεῖαι παράλληλαι ὅππ' αὐαῖσι, ἀχθῶσι δὲ πρὸς εὐθεῖαν τέμνουσαν ἄλληλας καὶ ταῖς τομαῖς, ἡ μὲν παρὰ τ' ἐφαπτομένην, ἡ δὲ παρὰ τ' αὐὰς ὅππ' ἐκκεντρίκωσιν ἔσται ὡς τοῦ πρὸς τῇ ταῖς αὐὰς ὅππ' ἐκκεντρίκωσιν εὐθείας πλαγία πλοῦρά πρὸς τὴν ὀρθίαν, ἕτως τὸ ἀπὸ εὐθεῖας ὑπὸ πᾶσι μεταξὺ τῶν τομῶν καὶ τ' συμπέσους πρὸς τὸ ἀπὸ εὐθεῖας ὑπὸ πᾶσι μεταξὺ τ' τομῶν καὶ τῆς συμπέσους.

PROP. XXII. Theor.

Si oppositas sectiones contingant duæ rectæ lineæ inter se parallelæ; ducantur autem aliæ rectæ, quæ & sibi ipsis & sectionibus occurrant, una quidem contingenti parallela, altera vero parallela ei quæ tactus conjungit: erit ut transversum latus ad rectum figuræ, quæ ad lineam tactus conjungentem constituitur; ita rectangulum, contentum lineis inter sectiones & rectarum occursum interjectis, ad rectangulum sub rectis inter sectionem & occursum interjectis.

ΕΣΤΩΣΑΝ ἀντικείμεναι αἱ Α, Β, ἐφαπτομένην καὶ αὐτῶν αἱ ΑΓ, ΒΔ ὁμογενεῖς ἔσωσαν, καὶ ἐπέσχευθω ἡ ΑΒ, διήχθωσιν δὲ ἡ μὲν ΕΞΗ ὁμογενεῖς τῇ ΑΒ, ἡ δὲ ΕΚΛΜ ὁμογενεῖς τῇ ΑΓ. λέγω ὅτι ἔστω ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ὀρθίαν τῆ εὐθείας πλοῦραν ἕτως τὸ ὑπὸ ΗΕΖ πρὸς τὸ ὑπὸ ΚΕΜ.



ΗΧθωσιν δὲ τῇ Η, Ζ ὁμογενεῖς τῇ ΑΓ καὶ ΗΖ, ΕΝ.

ἐπεὶ γὰρ αἱ ΑΓ, ΒΔ ἐφαπτομένην τῶν τομῶν ὁμογενεῖς εἰσιν, ἔσται ἀνάμεικτος μὲν ἡ ΑΒ, πεπλεγμένη δὲ ἐπ' αὐτὴν κατηγμένη αἱ ΚΛ, ΕΝ, ΗΖ. ἔσται ἔν ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ὀρθίαν πλοῦραν ἕτως τὸ ὑπὸ ΒΛΑ πρὸς τὸ ὑπὸ

SINT oppositæ sectiones A, B, quas contingant rectæ lineæ ΑΓ, ΒΔ inter se parallelæ; & junctâ ΑΒ ducatur ΕΞΗ ἰπσὶ ΑΒ parallela, & ΚΕΛΜ parallela ἰπσὶ ΑΓ: dico ut ΑΒ ad rectum figuræ latus, ita esse ΗΕΖ rectangulum ad rectangulum ΚΕΜ.

Ducantur enim per H, Ζ rectæ ΗΖ, ΕΝ ἰπσὶ ΑΓ parallelæ. &

quoniam ΑΓ, ΒΔ parallelæ sunt inter se & sectiones contingunt, erit [per convers. 31. 2. huj.] & ΑΒ diameter, & rectæ ΚΛ, ΕΝ, ΗΖ ad ipsam ordinatim applicabuntur: ut igitur ΑΒ ad rectum latus ita [per 21. 1. huj.] ΒΛΑ rectangulum ad quadratum

τετράγωνον. ἴσον γὰρ τὸ μὲν ΕΦΛ τετράγωνον τῷ ΑΛΧ , τὸ δὲ ΤΝΞΣ πεντάγωνον τῷ ΞΡΤΟ . ἔστιν ἄρα ὡς τὸ δὸτὸ ΕΛ πρὸς τὸ ΑΛΧ ἕτως τὸ ὑπὸ ΘΞΣ πρὸς τὸ ΞΡΤΟ πεντάγωνον. ἔστι δὲ ὡς τὸ ΑΛΧ τετράγωνον πρὸς τὸ δὸτὸ ΑΛ ἕτως τὸ ΞΡΤΟ πρὸς τὸ ὑπὸ ΗΞΟ . δι' ἴσας ἄρα ὡς τὸ δὸτὸ ΕΛ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΛ ἕτως τὸ ὑπὸ ΘΞΣ πρὸς τὸ ὑπὸ ΗΞΟ .


fed [per 4. 3. huj.] ΕΦΛ triángulum æquale est triángulo ΑΛΧ ; & [ex 15. 3. huj.] quadrilaterum ΤΝΞΣ quadrilatero ΞΡΤΟ : ut igitur quadratum ex ΕΛ ad ΑΛΧ triángulum ita rectángulum ΘΞΣ ad quadrilaterum ΞΡΤΟ . ut autem triángulum ΑΛΧ ad quadratum ex ΑΛ ita quadrilaterum ΞΡΤΟ ad rectángulum ΗΞΟ [quod similiter probatur atque prius istud]: ergo ex æquali, ut quadratum ex ΕΛ ad quadratum ex ΑΛ ita est rectángulum ΘΞΣ ad rectángulum ΗΞΟ .

EUTOCIUS.

Τὸ διῳρίσμα τῆς πολλὰς ἔχει πτώσεις, ὡς καὶ καὶ τὰ ἄλλα· ἐπεὶ δὲ ἐν πολλῇ ἀντιγράφοις ἀπὸ διῳρισμάτων πτώσεως εὐρίσκονται ἐκταγμένα μὲν καὶ ἄλλαι πρὸς ἀποδείξεις, ἐδοκιμάσαμεν αὐτὰς σκεῖσθαι. ἵνα δὲ οἱ ἐντυγχάνοντες καὶ τὸ ἀλφειὸν παραδίδοιεν πειρώμενοι τὴν ἡμετέραν ὁπιοῖαι, ἐξιδέμεθα ταύτας ἐν ταῖς σχολαῖς.


Πιπείτωσαν δὲ αἱ ὥσθι τὰς ἐφαπτομένης αἱ ΗΚΟ , ΘΚΣ διὰ τῆς Κ κέντρου· λέγω ὅτι καὶ ἕτως ἔστω ὡς τὸ ἀπὸ ΕΛ πρὸς τὸ δὸτὸ ΑΛ ἕτω τὸ ὑπὸ ΘΚΣ πρὸς τὸ ὑπὸ ΗΚΟ . ἤχθωσαν δὲ τῶν Η , Θ παρά τὰς ἐφαπτομένης αἱ ΘΝ , ΗΜ · γίνεσθαι δὲ ἴσον τὸ μὲν ΗΚΜ τετράγωνον τῷ ΑΚΤ τετράγωνῳ, τὸ δὲ ΘΝΚ τετράγωνον τῷ ΕΚΠ τετράγωνῳ. ἴσον δὲ τὸ ΑΤΚ τῷ ΕΚΠ . ἴσον ἄρα καὶ τὸ ΗΚΜ τῷ ΚΘΝ . καὶ ἐπεὶ ἔστιν ὡς τὸ ἀπὸ ΑΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΕΤ τετράγωνον ἕτω τὸ ἀπὸ ΚΘ πρὸς τὸ ΘΚΝ τετράγωνον, καὶ ἐπὶ τὸ μὲν ΑΕΤ τετράγωνον ἴσον τῷ ΑΑΠ , τὸ δὲ ΘΚΝ τῷ ΚΗΜ . ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ ΕΛ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΠΑ τετράγωνον ἕτω τὸ ἀπὸ ΘΚ πρὸς τὸ ΗΚΜ τετράγωνον. ἔστι δὲ καὶ ὡς τὸ ὑπὸ ΑΠΑ τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΛ ἕτω τὸ ΗΚΜ πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΚ . καὶ δι' ἴσας ἄρα ἔστω ὡς τὸ ἀπὸ ΕΛ πρὸς τὸ δὸτὸ ΑΛ ἕτω τὸ δὸτὸ ΚΘ , τῆς τῆς τὸ ὑπὸ ΘΚΣ , πρὸς τὸ δὸτὸ ΗΚ , τῆς τῆς τὸ ὑπὸ ΗΚΟ .

Τῶν αὐτῶν ὄντων, εἰ μὲν ΘΚΠ , τῆς τῆς ἢ ὥσθι τὴν ΕΛ ἀγομένη, ἀλφειὸς τῆς Κ κέντρου· λέγω ὅτι ἕτως ἔστω ὡς τὸ δὸτὸ ΕΛ πρὸς τὸ δὸτὸ ΑΛ ἕτω τὸ ὑπὸ ΘΞΠ πρὸς τὸ ὑπὸ ΗΞΟ . ἤχθωσαν γὰρ ἀλφειὸς τῶν Ο , Π τῆς ἐφαπτομένης αἱ ΟΡ , ΠΣ . ἐπεὶ αὖτὸ τὸ ΜΟΡ τῆς ΜΝΚ τετράγωνου μείζον ἔστι τῷ ΑΚΤ , τὸ δὲ ΑΚΤ ἴσον τῷ ΚΣΠ . ἴσον ἄρα τὸ ΜΟΡ τῆς ΜΝΚ , ΚΣΠ τετράγωνοις· ὥς τοιούτων τὸ ΞΡ πεντάγωνον τῷ ΞΣ πεντάγωνῳ ἴσον. καὶ ἐπεὶ ἔστιν ὡς τὸ δὸτὸ ΕΛ πρὸς τὸ ΕΑΤ ἕς ἔστιν ἰσὺς.



Itaque per centrum Κ transeant rectæ ΗΚΟ , ΘΚΣ contingentibus parallelæ: dico sic quoque; ut quadratum ex ΕΛ ad quadratum ex ΑΛ ita etiam esse rectángulum ΘΚΣ ad rectángulum ΗΚΟ . ducantur enim per Η , Θ rectæ ΘΝ , ΗΜ contingentibus parallelæ: erit igitur [per 15. 3. huj.] triángulum ΗΚΜ triángulo ΑΚΤ æquale, triángulumq; ΘΝΚ æquale triángulo ΕΚΠ . sed [per 4. 3. huj.] triángulo ΕΚΠ æquale ΑΤΚ triángulum: ergo triángulum ΗΚΜ ipsi ΚΘΝ æquale erit. & quoniam ut quadratum ex ΑΕ ad triángulum ΑΕΤ ita [per 22. 6.] quadratum ex ΚΘ ad triángulum ΘΚΝ ; atque est triángulum ΑΕΤ æquale triángulo ΑΑΠ , triángulum vero ΘΚΝ triángulo ΚΗΜ : ut igitur quadratum ex ΕΛ ad triángulum ΑΠΑ ita quadratum ex ΘΚ ad triángulum ΗΚΜ . est vero ut triángulum ΑΠΑ ad quadratum ex ΑΛ ita triángulum ΗΚΜ ad quadratum ex ΗΚ : ergo ex æquali ut quadratum ex ΕΛ ad quadratum ex ΑΛ ita quadratum ex ΚΘ , hoc est rectángulum ΘΚΣ , ad quadratum ex ΗΚ , hoc est ad rectángulum ΗΚΟ .


Hisdem manentibus, si recta ΘΚΠ , hoc est ipsi ΕΛ parallela, transeat per Κ centrum, ΗΟ vero per centrum non transeat: dico similiter ut quadratum ex ΕΛ ad quadratum ex ΑΛ ita esse rectángulum ΘΞΠ ad rectángulum ΗΞΟ . ducantur enim per Ο , Π contingentibus parallelæ ΟΡ , ΠΣ . quoniam igitur [per 15. 3. huj.] triángulum ΜΟΡ excedit triángulum ΜΝΚ triángulo ΑΚΤ ; triángulum autem ΑΚΤ æquale est triángulo ΚΣΠ : erit ΜΟΡ triángulum æquale triángulis ΜΝΚ , ΚΣΠ : quare sublato communi, videlicet triángulo ΜΞΚ , reliquum quadrilaterum ΞΡ quadrilatero ΞΣ æquale. & quoniam [per 22. 6.] est ut quadratum



quadratum ex $ΕΛ$ ad triangulum $ΕΛΤ$ ita quadratum ex $ΠΚ$ ad triangulum $ΚΞΠ$, & ita quadratum ex $ΚΞ$ ad triangulum $ΚΞΝ$: erit [per 19. 5.] ut quadratum ex $ΕΛ$ ad $ΕΛΤ$ triangulum ita reliquum, rectangulum scilicet $ΘΞΠ$, per 5. 2^{di}, ad quadrilaterum $ΞΣ$. est autem triangulo $ΕΛΤ$ æquale triangulum $ΑΦΛ$, & quadrilaterum $ΞΡ$ quadrilatero $ΞΣ$: ergo ut quadratum ex $ΕΛ$ ad triangulum $ΑΛΦ$ ita rectangulum $ΘΞΠ$ ad quadrilaterum $ΞΣ$. ac pari argumento, ut triangulum $ΑΛΦ$ ad quadratum ex $ΑΑ$ ita quadrilaterum $ΞΣ$ ad rectangulum $ΗΞΟ$: ex equali igitur ut quadratum ex $ΕΛ$ ad quadratum ex $ΑΑ$ ita rectangulum $ΘΞΠ$ ad rectangulum $ΗΞΟ$.

Licet & hoc modo idem demonstrare.

Si recta ducatur sectionem EZ contingens in puncto quo eidem occurrit diameter AZ ; recta ducta ipsi AT parallela erit, & eandem rationem habet ad abscissam ab ipsa è recta $EΦ$ puncto E adjacentem, quam habet $ΑΑ$ ad $ΑΒ$. Eademque erunt reliqua ac in prop. XIX.



τετράγωνον ἕως τὸ πὶ δὲ $ΠΚ$ πρὸς τὸ $ΚΞΠ$, καὶ τὸ δὲ $ΚΞ$ πρὸς τὸ $ΚΞΝ$ τετράγωνον· ὡς ἄρα τὸ δὲ $ΕΛ$ πρὸς τὸ $ΕΛΤ$ τετράγωνον ἕως λοιπὸν τὸ ὑπὸ $ΘΞΠ$ πρὸς τὸ $ΞΣ$ πεντάγωνον. καὶ ἐπὶ τῷ μὲν $ΕΛΤ$ τετράγωνῳ ἴσον τὸ $ΑΦΛ$, τὸ δὲ $ΞΡ$ πεντάγωνον τῷ $ΞΣ$ · ὡς ἄρα τὸ δὲ $ΕΛ$ πρὸς τὸ $ΑΛΦ$ ἕως τὸ ὑπὸ $ΘΞΠ$ πρὸς τὸ $ΞΣ$. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὡς τὸ $ΑΛΦ$ πρὸς τὸ δὲ $ΑΑ$ ἕως τὸ $ΞΣ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΗΞΟ$ · καὶ δι' ἴσιν ἄρα ὡς τὸ δὲ $ΕΛ$ πρὸς τὸ δὲ $ΑΑ$ ἕως τὸ ὑπὸ $ΘΞΠ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΗΞΟ$.

Εἰ δὲ ἐν ὅποις δεῖξαι.

Εάν γάρ τ' EZ τομῆς ἀχθῇ διηκταῖα καὶ ὁ συμβαλλῇ ἡ AZ διάμετρος τῇ EZ τομῇ, γίνεται ὁρθόγωνος ἡ ἀχθῆσα τῇ AT , καὶ τὸν αὐτὸν λόγον ἔχει ἡ ἀχθῆσα πρὸς τὴν δὲ τομῇ ὡς ἡ $ΑΑ$ πρὸς τὴν $ΑΒ$. καὶ τὸν αὐτὸν λόγον ἔχει ἡ $ΑΑ$ πρὸς τὴν $ΑΒ$ πρὸς τὴν $ΑΕ$. καὶ τὰ λοιπὰ ὁμοίᾳ ἔργῳ τῷ 19'.

PROP. XXIV. Theor.

Si in oppositis sectionibus conjugatis à centro ad sectiones ducantur duæ rectæ, quarum una quidem appelletur transversa diameter, altera vero recta; & ducantur aliæ his diametris parallelæ, quæ & sibi ipsis & sectionibus occurrant, ita ut occurfus sit in loco inter quatuor sectiones intermedio: rectangulum contentum portionibus lineæ diametro transversæ parallelæ, una cum eo ad quod rectangulum sub portionibus lineæ rectæ diametro parallelæ rationem habet eandem quam diametri rectæ quadratum ad quadratum transversæ, æquale erit duplo quadrati quod fit è dimidia transversæ diametri.

Si in oppositis sectionibus conjugatis $A, B, Γ, Δ$, quarum centrum E ; perque E ducantur $ΑΒΓ$ transversa diameter & $ΔΕΒ$ recta; & ducantur $ΖΗΘΙΚΛ$, $ΜΝΞΟΠΡ$ parallelæ ipsis $ΑΓ$, $ΔΒ$, quæ in puncto $Ξ$ convenient, primum quidem intra angulum $ΣΕΦ$ vel $ΤΕΤ$: dico rectangulum $ΖΞΛ$, una cum eo ad quod rectangulum $ΜΞΡ$ rationem habet eandem quam quadratum ex $ΔΒ$ ad quadratum ex $ΑΓ$, æquale esse duplo quadrati ex $ΑΒ$.

Ducantur enim asymptoti sectionum $ΣΕΤ$, $ΤΕΦ$; & per A ducatur $ΣΗΑΦ$ sectionem con-

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κα'.

Εάν ἐν ταῖς κατὰ συζυγίαν ἀντικείμεναις δὲ κέντρῳ ἀχθῶσι πρὸς τὰς τομὰς δύο εὐθεῖαι, καὶ λέγεται αὐτῶν ἡ μὲν πλαγία ἀγόμενος, ἡ δὲ ὀρθία, ἀχθῶσι δὲ πρὸς παρὰ τὰς δύο ἀγόμενους συμπίπτουσαι ἀλλήλαις καὶ ταῖς τομῇς, ἡ δὲ σύμπτωση ἢ ἐν τῷ μεταξύ τόπῳ τῶν προτέρων τομῶν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τῶν τμημάτων τῆς παραλλήλου τῇ πλαγίᾳ, μετὰ τῷ πρὸς τὸ λόγον ἔχει τὸ ὑπὸ τῶν τμημάτων τῆς ὀρθῆς καὶ τῇ ὀρθίᾳ ὅτι τὸ δὲ πρὸς τῆς ὀρθῆς πρὸς τὸ δὲ τῆς πλαγίας τετραγώνον, ἴσον ὅτι τῷ δις ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς πλαγίας τετραγώνῳ.

Εἰς τὸ $ΣΑΝ$ κατὰ συζυγίαν ἀντικείμεναις αἱ $A, B, Γ, Δ$, ὧν κέντρον τὸ E , καὶ δὲ E διήχθωσαν ἢ πῃ $ΑΒΓ$ πλαγία καὶ ἢ $ΔΕΒ$ ὀρθία, καὶ παρὰ τὰς $ΑΓ$, $ΔΒ$ ἢ χθωσαν αἱ $ΖΗΘΙΚΛ$, $ΜΝΞΟΠΡ$ συμπίπτουσαι ἀλλήλαις κατὰ τὸ $Ξ$, πρῶτον μὲν κατὰ τὸ ἐντὸς τ' ὑπὸ $ΣΕΦ$ γωνίας ἢ τ' ὑπὸ $ΤΕΤ$. λέγω ὅτι τὸ ὑπὸ $ΖΞΛ$, μετὰ τῷ πρὸς τὸ λόγον ἔχει τὸ ὑπὸ $ΜΞΡ$ ὅν τὸ δὲ $ΔΒ$ πρὸς τὸ δὲ $ΑΓ$, ἴσον ἐστὶ τῷ δις δὲ $ΑΒ$.



Ἡχθωσαν γὰρ ἀσύμπτωτοι τῶν τομῶν αἱ $ΣΕΤ$, $ΤΕΦ$, καὶ διὰ τῆς A ἐφαπτομένης τῆς τομῆς ἢ $ΣΗΑΦ$.

ΣΗΛΦ. ἐπεὶ ὅτι τὸ ὑπὸ ΣΑΦ ἴσον ἐστὶ τῷ δὲ ΔΕ· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ ΣΑΦ πρὸς τὸ δὲ ΔΕ ΕΑ ἕτως τὸ δὲ ΔΕ πρὸς τὸ δὲ ΕΑ. τὸ δὲ ὑπὸ ΣΑΦ πρὸς τὸ δὲ ΔΕ λόγον ἔχει τὸ συγκείμενον ἐκ τῆς ΣΑ πρὸς ΑΕ καὶ τῆς ΦΑ πρὸς ΑΕ. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΣΑ πρὸς ΑΕ ἕτως ἡ ΝΞ πρὸς ΕΘ, ὡς δὲ ἡ ΦΑ πρὸς ΑΕ ἕτως ἡ ΠΞ πρὸς ΕΚ· ὁ ἄρα τῶν δὲ ΔΕ πρὸς τὸ δὲ ΔΕ λόγος σύγκειται ἐκ τῆς ΝΞ πρὸς ΕΘ καὶ τῆς ΠΞ πρὸς ΕΚ. σύγκειται δὲ ἐκ τῶν αὐτῶν ὁ τῶν ὑπὸ ΠΞΝ πρὸς τὸ ὑπὸ ΚΞΘ· ὡς ἄρα τὸ δὲ ΔΕ πρὸς τὸ δὲ ΑΕ ἕτως τὸ ὑπὸ ΠΞΝ πρὸς τὸ ὑπὸ ΚΞΘ· καὶ ὡς

ἄρα τὸ δὲ ΔΕ πρὸς τὸ δὲ ΑΕ ἕτως τὸ ἀπὸ ΔΕ μετὰ τῶν ὑπὸ ΠΞΝ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΕ μὲν ἔστι τὸ μὲν ἀπὸ ΔΕ τῶν ὑπὸ ΠΜΝ, τῆς τῶν ὑπὸ ΡΝΜ, τὸ δὲ ἀπὸ ΑΕ ἴσον ἐστὶ τῶν ὑπὸ ΚΖΘ, τῆς τῶν ὑπὸ ΛΘΖ· ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ΔΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΕ ἕτως τὸ ὑπὸ ΡΝΜ μετὰ τῶν ὑπὸ ΠΞΝ πρὸς τὸ ὑπὸ ΛΘΖ μὲν τῶν ὑπὸ ΚΞΘ. ἴσον δὲ τὸ ὑπὸ ΠΞΝ μετὰ τῶν ὑπὸ ΡΝΜ τῶν ὑπὸ ΡΞΜ· ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ΔΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΑ ἕτως τὸ ὑπὸ ΡΞΜ πρὸς τὸ ὑπὸ ΚΞΘ μετὰ τῶν ὑπὸ ΚΖΘ. δεκτικόν ὅτι τὸ ὑπὸ ΖΞΛ μετὰ τῶν ὑπὸ ΚΞΘ καὶ τῶν ὑπὸ ΚΖΘ ἴσον ἐστὶ τῶν δὲ ἀπὸ ΕΑ. κινὸν ἀφ' ἑαυτοῦ τὸ ἀπὸ ΑΕ, τῆς τῶν ὑπὸ ΚΖΘ· λοιπὸν ἄρα δεκτικόν, ὅτι τὸ ὑπὸ ΚΞΘ μετὰ τῶν ὑπὸ ΛΞΖ ἴσον ἐστὶ τῶν ἀπὸ ΑΕ. ἐστὶ δὲ τὸ γὰρ ὑπὸ ΚΞΘ μετὰ τῶν ὑπὸ ΛΞΖ ἴσον ἐστὶ τῶν ὑπὸ ΛΘΖ, τῆς τῶν ὑπὸ ΚΖΘ, τῆς τῶν ἀπὸ ΑΕ.

Συμπληρώσω δὲ αἱ ΖΛ, ΜΡ ὅτι μίαν τῶν ἀσυμπίπτων κατὰ τὸ Θ. ἴσον δὲ ἐστὶ τὸ ὑπὸ ΖΘΛ τῶν ἀπὸ ΑΕ, καὶ τὸ ὑπὸ ΜΘΡ τῶν ἀπὸ ΔΕ· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ ΔΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΑ ἕτως τὸ ὑπὸ ΜΘΡ πρὸς τὸ ὑπὸ ΖΘΛ· ὡς πὲρ δὲ ὑπὸ ΖΘΛ ἴσον ἔσται τῶν δὲ ἀπὸ ΑΕ. ἐστὶ δὲ.

Ἐστὼ δὲ τὸ Ε ἵσως τῆς ὑπὸ ΣΕΤ γωνίας, ἡ τῆς ὑπὸ ΦΕΤ· ἔσται δὲ ὁμοίως, διὰ τὴν συναφὴν τῶν λόγων, ὡς τὸ ἀπὸ ΔΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΑ ἕτως τὸ ὑπὸ ΠΞΝ πρὸς τὸ ὑπὸ ΚΞΘ. τῶν δὲ ἀπὸ ΔΕ ἴσον ἐστὶ τὸ ὑπὸ ΠΜΝ, τῆς



tingens. quoniam igitur [per 56. 1. & 1.2. huj.] rectangulum ΣΑΦ æquale est quadrato ex ΔΒ; erit ut rectangulum ΣΑΦ ad quadratum ex ΕΑ ita quadratum ex ΔΕ ad quadratum ex ΕΒ. rectangulum autem ΣΑΦ ad quadratum ex ΑΒ [per 23. 6.] rationem habet compositam ex ratione ΣΑ ad ΑΕ & ex ratione ΦΑ ad ΑΕ. sed ut ΣΑ ad ΑΕ ita ΝΞ ad ΕΘ; & ut ΦΑ ad ΑΕ


ita ΠΞ ad ΕΚ: quare ratio quadrati ex ΔΕ ad quadratum ex ΑΕ componitur ex ratione ΝΞ ad ΕΘ & ratione ΠΞ ad ΕΚ. ratio autem rectanguli ΠΞΝ ad rectangulum ΚΞΘ [per 23. 6.] composita est ex iisdem rationibus: ut igitur quadratum ex ΔΕ ad quadratum ex ΑΒ ita rectangulum ΠΞΝ ad rectangulum ΚΞΘ; &

propterea [per 12.5.] ut quadratum ex ΔΒ ad quadratum ex ΑΒ ita quadratum ex ΔΕ una cum rectangulo ΠΞΝ ad quadratum ex ΑΒ una cum rectangulo ΚΞΘ. atqui est [per 11.2. huj.] quadratum ex ΔΒ æquale rectangulo ΠΜΝ, hoc est rectangulo ΡΝΜ; & quadratum ex ΑΒ æquale rectangulo ΚΖΘ, hoc est ΛΘΖ: quare ut quadratum ex ΔΕ ad quadratum ex ΑΒ ita rectangulum ΡΝΜ una cum rectangulo ΠΞΝ ad rectangulum ΛΘΖ una cum rectangulo ΚΞΘ. rectangulum autem ΠΞΝ una cum rectangulo ΡΝΜ æquale est [per 4. lem. 3. huj.] rectangulo ΡΞΜ: ergo ut quadratum ex ΔΕ ad quadratum ex ΕΑ ita ΡΞΜ rectangulum ad rectangulum ΚΞΘ una cum rectangulo ΚΖΘ. itaque demonstrare oportet rectangulum ΖΞΛ una cum rectangulo ΚΞΘ & rectangulo ΚΖΘ æquale esse duplo quadrati ex ΕΑ. commune auferatur quadratum ex ΑΕ, hoc est [per 11.2. huj.] rectangulum ΚΖΘ: reliquum igitur, rectangulum nempe ΚΞΘ una cum rectangulo ΛΞΖ demonstrandum est æquale quadrato ex ΑΒ. quod quidem ita se habet: nam [per 4. lem. 3. huj.] rectangulum ΚΞΘ una cum rectangulo ΛΞΖ æquale est rectangulo ΛΘΖ sive ΚΖΘ, hoc est [per 11.2. huj.] quadrato ex ΑΒ.

Convenient deinde ΖΛ, ΜΡ in una asymptotōn ad punctum Θ. æquale autem est rectangulum ΖΘΛ quadrato ex ΑΕ; & rectangulum ΜΘΡ quadrato ex ΔΕ: quare ut quadratum ex ΔΕ ad quadratum ex ΕΑ ita rectangulum ΜΘΡ ad rectangulum ΖΘΛ. & propterea querimus duplum rectanguli ΖΘΛ æ-

quale duplo quadrati ex ΑΒ, quod quidem ita est. Sit postremo Ζ intra angulum ΣΕΤ vel ΦΕΤ: erit igitur similiter [atque in cas. 1.] per compositionem rationum, ut quadratum ex ΔΕ ad quadratum ex ΕΑ ita ΠΞΝ rectangulum ad rectangulum ΚΞΘ. sed [per 11.2. huj.] quadrato ex ΔΕ rectangulum ΠΜΝ, hoc est ΡΝΜ, est æquale;

le; & quadrato ex AE æquale est rectangulum $\Lambda\Theta Z$: ergo ut rectangulum PNM ad rectangulum $\Lambda\Theta Z$ ita ablatum $\Pi\Xi N$ rectangulum ad ablatum rectangulum $K\Xi\Theta$: reliquum igitur rectangulum [per 4. lem. 3. huj.] $P\Xi M$ ad reliquum, videlicet ad excessum quo quadratum ex AE excedit rectangulum $K\Xi\Theta$, est ut quadratum ex AE ad quadratum ex EA : itaque demonstrare oportet rectangulum $Z\Xi\Lambda$ una cum excessu quo quadratum ex AE excedit $K\Xi\Theta$ rectangulum, æquale esse duplo quadrati ex AE . commune auferatur quadratum ex AE , hoc est [ut hactenus ostensum] rectangulum $Z\Theta\Lambda$: ergo reliquum, nempe rectangulum [per 4. lem. 3. huj.] $K\Xi\Theta$, una cum excessu quo quadratum ex AE excedit rectangulum $K\Xi\Theta$, demonstrandum est quadrato ex AE æquale esse. quod quidem ita est: nam minus, nempe rectangulum $K\Xi\Theta$, una cum excessu est æquale majori, videlicet quadrato ex AE .



τὸ ὑπὸ PNM , τῷ δὲ ἀπὸ AE ἴσον ἐστὶ τὸ ὑπὸ $\Lambda\Theta Z$: ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ PNM πρὸς τὸ ὑπὸ $\Lambda\Theta Z$ ἔτιωσ ἀφαιρεθὲν τὸ ὑπὸ $\Pi\Xi N$ πρὸς ἀφαιρεθὲν τὸ ὑπὸ $K\Xi\Theta$ καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ $P\Xi M$ πρὸς λοιπὸν τὴν ὑπεροχὴν ἢ ὑπερέχει τὸ ἀπὸ AE ἢ ὑπὸ $K\Xi\Theta$ ἐστὶν ὡς τὸ δὸτὸ ΔE πρὸς τὸ ἀπὸ EA . δεικνύον ἄρα, ὅτι τὸ ὑπὸ $Z\Xi\Lambda$ περισσολαβὼν τὴν ὑπεροχὴν ἢ ὑπερέχει τὸ δὸτὸ AE τῷ ὑπὸ $K\Xi\Theta$, ἴσον ἐστὶ τῷ δις δὸτὸ AE . κοινὸν ἀφαιρεθὲν τὸ ἀπὸ AE , τετέστι τὸ ὑπὸ $Z\Theta\Lambda$: λοιπὸν ἄρα δεικνύον, ὅτι τὸ ὑπὸ $K\Xi\Theta$ μὲν ἢ ὑπερέχει τὸ ἀπὸ AE τῷ ὑπὸ $K\Xi\Theta$, ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ AE . ἐστὶ δὲ τὸ γὰρ ἑλκυσθὲν τὸ ὑπὸ $K\Xi\Theta$ περισσολαβὼν τὴν ὑπεροχὴν ἴσον ἐστὶ τῷ μείζονι τῷ ἀπὸ AE .


PROP. XXV. Theor.

Iisdem positis, sit rectarum ipsis AG, BD parallelarum occurfus intra unam sectionem B, Δ , atque, ut supponitur, in puncto Z : dico rectangulum contentum portionibus ejus quæ transversæ diametro parallela est, videlicet $O\Xi N$, majus esse quam illud ad quod rectangulum sub portionibus lineæ rectæ diametro parallelæ, sive ad $P\Xi M$, eandem rationem habet quam rectæ diametri quadratum ad quadratum transversæ, duplo quadrati è dimidia transversæ diametri.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κα΄.

Τῶν αὐτῶν ἐπακμύδων, ἔστι ἡ σύμπτωση τῶν ὁμολλήλων ταῖς AG, BD ἐπὶ τὴν μίαν τῶν B, Δ τομῶν, ὡς ἐπαύκεται, κατὰ τὸ ἔλεγε ὅτι τὸ ἀμεχόμενον ὑπὸ τῶν τμημάτων τῆς ὁμολλήλης τῇ πλαγίᾳ, τετέστι τὸ ὑπὸ $O\Xi N$, τῷ πρὸς τὸ λόγον ἔχει τὸ ἀμεχόμενον ὑπὸ τῶν τμημάτων τῆς ὁμολλήλης τῇ ὀρθίᾳ, τετέστι τὸ ὑπὸ $P\Xi M$, ὅτι τὸ ἀπὸ τῆς ὀρθίᾳ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς πλαγίας, μὲν ὅτι τῷ δις δὸτὸ τῆς ἡμισυᾶς τῆς πλαγίας τετραγώνου.

EST enim propter eandem rationem [atque in præc.] ut quadratum ex AE ad quadratum ex EA ita rectangulum $\Pi\Xi\Theta$ ad rectangulum $\Sigma\Xi\Lambda$. quadratum autem ex AE æquale est [per 11. 2. huj.] rectangulo $\Pi M\Theta$; & quadratum ex AE æquale rectangulo $\Lambda O\Sigma$: ergo ut quadratum ex AE ad quadratum ex EA ita $\Pi M\Theta$ rectangulum ad rectangulum $\Lambda O\Sigma$, itaque quoniam ut totum rectangulum $\Pi\Xi\Theta$ ad totum $\Lambda\Xi\Sigma$ ita ablatum rectangulum $\Pi M\Theta$ ad ablatum $\Lambda O\Sigma$, hoc est ad $\Sigma T\Lambda$; erit & reliquum [per 4. lem. 3. huj.] $P\Xi M$ ad reliquum [per 4. lem. part. ult.] $T\Xi K$ ut quadratum ex AE ad quadratum ex EA . ostendere




Δ ΙΑ γὰρ καὶ αὐταὶ ἐστὶν ὡς τὸ ἀπὸ AE τετραγώνου πρὸς τὸ ἀπὸ EA ἔτιωσ τὸ ὑπὸ $\Pi\Xi\Theta$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\Sigma\Xi\Lambda$. ἴσον δὲ τὸ μὲν δὸτὸ AE τῷ ὑπὸ $\Pi M\Theta$, τὸ δὲ δὸτὸ AE τῷ ὑπὸ $\Lambda O\Sigma$ καὶ ὡς ἄρα τὸ δὸτὸ AE πρὸς τὸ ἀπὸ AE ἔτιωσ τὸ ὑπὸ $\Pi M\Theta$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\Lambda O\Sigma$. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ὅλον τὸ ὑπὸ $\Pi\Xi\Theta$ πρὸς ὅλον τὸ ὑπὸ $\Lambda\Xi\Sigma$, ἔτιωσ ἀφαιρεθὲν τὸ ὑπὸ $\Pi M\Theta$ πρὸς ἀφαιρεθὲν τὸ ὑπὸ $\Lambda O\Sigma$, τετέστι τὸ ὑπὸ $\Sigma T\Lambda$. καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ $P\Xi M$ πρὸς λοιπὸν τὸ ὑπὸ $T\Xi K$ ἐστὶν ὡς τὸ ἀπὸ AE πρὸς τὸ ἀπὸ EA . δεικνύον ἄρα ὅτι τὸ ὑπὸ $O\Xi N$

SIT ellipsis vel circuli circumferentia $AB\Gamma\Delta$,
cujus centrum B ; ducanturque ipsius duæ
conjugatæ diametri, recta quidem $AB\Gamma$, trans-
versa vero $BE\Delta$; & ducantur $KZ\Lambda M, NZH\Theta$,
quæ ipsis AB , BE æquidistant: dico quadrata
ex NZ , $Z\Theta$, una cum figuris ex KZ , ZM si-
milibus & similiter descriptis ei quæ fit ad AB ,
quadrato ex BE æqualia esse.

Ducatur enim à puncto N recta NZ parallela
 AB ; ergo ad BE ordinatim applicata erit. &
 $B\Pi$ sit rectum figuræ latus. quoniam igitur ut
 $B\Pi$ ad AB ita est AB ad BE ; erit [per 20. &
22. 6.] ut $B\Pi$ ad BE ita quadratum ex AB ad
quadratum ex BE . quadratum autem ex BE
[per 17. 6. & 15. 1. huj.] est æquale figuræ quæ
ad AB constituitur: ergo ut $B\Pi$ ad BE ita qua-
dratum ex AB ad figuram quæ est ad AB . sed
[per 22. 6.] ut quadratum ex AB ad figuram
quæ ad AB ita quadratum ex NZ ad figuram
quæ fit ex NZ similem ei quæ ad AB : ergo
ut $B\Pi$ ad BE ita quadratum ex NZ ad figu-
ram quæ fit ex NZ similem ei quæ ad AB . est
autem [per 21. 1. huj.] & ut $B\Pi$ ad BE ita qua-
dratum ex NZ ad rectangulum $BZ\Delta$: quare [per

ΕΣΤΩ γὰρ ἑλλῖψις ἡ κύκλος περιφέρεια ἡ
 $AB\Gamma\Delta$, ἥς κέντρον τὸ E , καὶ ἡχοῦσται αὐτῆς
δύο συζυγεῖς διὰ μέτροι, ὁρθὰ μὲν ἡ $AB\Gamma$, πλά-
για δὲ ἡ $BE\Delta$, ἣ δὲ πρὸς AB , BE ἡχοῦσται αἱ
 $KZ\Lambda M, NZH\Theta$. λέγω ὅτι τὰ ἀπὸ τῶν $NZ, Z\Theta$ πε-
τεράγματα, προσλαβόντα τὰ ἀπὸ τῶν KZ, ZM ἑδὴ
ὁμοία ἢ ὁμοίως ἀναγεγραμμένα τῷ πρὸς τῇ AB
ἑίδει, ἴσιν ἔσται τῷ ἀπὸ τῆς BE τετραγώνου.

Ἡχοῦσται ἀπὸ τοῦ N ὡς πρὸς τὴν AB ἢ NE . πετε-
ργμῶν ἄρα κατῆκται ὁππὶ τὴν BE . καὶ ἔσται
ὁρθὰ ἡ $B\Pi$. ἐπεὶ ἔν ἐστιν ὡς ἡ $B\Pi$ πρὸς AB
ἔσται ἡ AB πρὸς BE . καὶ ὡς ἄρα ἡ $B\Pi$ πρὸς
 BE ἔσται τὸ ἀπὸ AB πρὸς τὸ ἀπὸ BE . τὸ
δὲ ἀπὸ BE ἴσιν ἐστὶ τῷ πρὸς τῇ AB εἶδει. ἔστιν
ἄρα ὡς ἡ $B\Pi$ πρὸς BE ἔσται τὸ ἀπὸ AB πε-
τεράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ AB εἶδος. ὡς δὲ τὸ ἀπὸ
 AB τετραγώνον πρὸς τὸ ἀπὸ AB εἶδος ἔσται τὸ ἀπὸ
 NE τετραγώνον πρὸς τὸ ἀπὸ NE εἶδος ὁμοίον τῷ
πρὸς τῇ AB εἶδει. καὶ ὡς ἄρα ἡ $B\Pi$ πρὸς BE ἔσται
τὸ ἀπὸ NE τετραγώνον πρὸς τὸ ἀπὸ NE εἶδος
ὁμοίον τῷ πρὸς τῇ AB εἶδει. ἔστι δὲ καὶ ὡς ἡ $B\Pi$ πρὸς
 BE ἔσται τὸ ἀπὸ NE πρὸς τὸ ὑπὸ $BZ\Delta$. ἴσιν ἄρα



9. 5.] figura quæ fit ex NZ , hoc est ex $Z\Lambda$, si-
milis ei quæ ad AB , rectangulo $BZ\Delta$ est æqua-
lis. eodem modo demonstrabimus figuram quæ
fit ex $K\Lambda$ similem illi quæ ad AB rectangulo
 $B\Lambda\Delta$ æqualem esse. & quoniam recta linea $N\Theta$
secatur in partes æquales in H & in partes inæ-
quales in Z ; quadrata ex $\Theta Z, ZN$ [per 9. 2.]
dupla sunt quadratorum ex $\Theta H, HZ$, hoc est
ex NH, HZ . eadem quoque ratione quadrata ex
 MZ, ZK quadratorum ex $K\Lambda, \Lambda Z$ sunt dupla;
& [per 22. 6.] figuræ quæ fiunt ex MZ, ZK simi-
les ei quæ ad AB duplæ sunt figurarum simi-
lium quæ ex $K\Lambda, \Lambda Z$. figuræ autem quæ fiunt
ex $K\Lambda, \Lambda Z$ rectangulis $B\Lambda\Delta, BZ\Delta$ [ut modo
ostensum] sunt æquales; & quadrata ex NH, HZ
æqualia sunt quadratis ex $EB, B\Lambda$: ergo qua-
drata ex $NZ, Z\Theta$, una cum figuris ex KZ, ZM
similibus ei quæ ad AB , dupla sunt rectangulo-
rum $BZ\Delta, B\Lambda\Delta$ & quadratorum ex $EB, B\Lambda$.
itaque quoniam recta BE secatur in partes æ-
quales in E & in inæquales in Z , rectangulum
 $BZ\Delta$ [per 5. 2.] una cum quadrato ex EB
æquale est quadrato ex BE : similiter & rectan-
gulum $B\Lambda\Delta$ una cum quadrato ex ΛE æquale
est quadrato ex BE : quare rectangula $BZ\Delta$,

ἐστὶ τὸ ἀπὸ NE εἶδος (τετρίσι τὸ ἀπὸ $Z\Lambda$) ὁμοίον τῷ
πρὸς τῇ AB εἶδει, τῷ ὑπὸ $BZ\Delta$. ὁμοίως δὲ δεῖξομεν
ὅτι τὸ ἀπὸ $K\Lambda$ εἶδος, ὁμοίον τῷ πρὸς τῇ AB εἶδει,
ἴσιν τῷ ὑπὸ $B\Lambda\Delta$. καὶ ἐπεὶ εὐθεία ἡ $N\Theta$
πέτμηται εἰς μὲν ἴσας κατὰ τὸ H , εἰς δὲ ἀνισας
κατὰ τὸ Z , τὰ ἀπὸ τῶν $\Theta Z, ZN$ τετράγματα δι-
πλάσια ἐστὶ τῶν ἀπὸ $\Theta H, HZ$, τετρίσι τῶν
ἀπὸ NH, HZ . διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ τὰ ἀπὸ
 MZ, ZK τετράγματα διπλάσια ἐστὶ τῶν ἀπὸ $K\Lambda$,
 ΛZ τετραγώνων, καὶ τὰ ἀπὸ MZ, ZK εἶδη (ὁ-
μοία τῷ πρὸς τῇ AB εἶδει) διπλάσια ἐστὶ τῶν
ἀπὸ $K\Lambda, \Lambda Z$ ὁμοίων εἰδῶν. ἴσιν δὲ ἐστὶ τὰ μὲν ἀπὸ
 $K\Lambda, \Lambda Z$ εἶδη πρὸς τὸ ὑπὸ $B\Lambda\Delta, BZ\Delta$, τὰ δὲ ἀπὸ
 NH, HZ τετράγματα πρὸς τὸ ἀπὸ $EB, B\Lambda$. τὰ ἄρα
ἀπὸ $NZ, Z\Theta$ τετράγματα μετὰ τῶν ἀπὸ KZ, ZM
εἰδῶν (ὁμοίων τῷ πρὸς τῇ AB εἶδει) διπλάσια ἐστὶ
τῶν ὑπὸ $BZ\Delta, B\Lambda\Delta$ καὶ τῶν ἀπὸ $EB, B\Lambda$. ἔπει-
α εὐθεία ἡ BE πέτμηται εἰς μὲν ἴσας κατὰ τὸ E , εἰς
δὲ ἀνισας κατὰ τὸ Z , τὸ ὑπὸ $BZ\Delta$ μετὰ τῶν ἀπὸ EB
ἴσιν ἐστὶ τῷ ἀπὸ BE . ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ὑπὸ $B\Lambda\Delta$
μετὰ τῶν ἀπὸ ΛE ἴσιν ἐστὶ τῷ ἀπὸ BE . * ὥστε τὰ
ὑπὸ $BZ\Delta$ καὶ ὑπὸ $B\Lambda\Delta$ ἔσται μετὰ τῶν $EB, \Lambda E$ ἴσιν
ἐστὶ

* Vide Lemma quintum Pappi in hunc librum.


ἀπὸ BE· τὰ ἄρα ἀπὸ NZ, ZO π-
επὶ τῶν ἀπὸ KZ, ZM εἰδῶν (ὁμοίων
ΑΓ εἶδει) διπλασιά ἐστι τὴν δις ἀπὸ
τὴν ἀπὸ ΒΔ διπλασίον τὴν δις ἀπὸ
ἀπὸ NZ, ZO τετράγωνον, ὡς ὁμοία
τὸ KZ, ZM εἰδῶν ὁμοία τῷ ὡς τῇ ΑΓ
αὖ τῷ ἀπὸ ΒΔ.

BΔΔ & quadrata ex ZE, AE æqualia sunt du-
plo quadrati ex BE: quadrata igitur ex NZ, ZO,
una cum figuris ex KZ, ZM similibus ei quæ ad
ΑΓ, dupli quadrati ex BE sunt dupla. atqui
quadratum ex BΔ duplum est dupli quadrati ex
BE: ergo quadrata ex NZ, ZO una cum figuris
ex KZ, ZM similibus ei quæ ad ΑΓ, quadrato
ex BΔ æqualia erunt.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κη'.

: χτ' συζυγίαν ἀντικείμεναι συζυγῆς
τῶν ἀχρῶσι, ἢ λέγειν αὐτῶν ἢ μὲ ὀρθία,
λαγία, ἀχρῶσι δὲ παρ' αὐταῖς δύο
συμπίπτουσαι ἀλλήλαις ἢ ταῖς τομῇς·
τὴν ἀπολαμβαίνουσαν εὐθειῶν, ἐπ' εὐ-
θεῖαν τὴν ὀρθίαν ἡγεμένης μεταξὺ τῶν συμ-
πτόντων ἢ τῶν τομῶν, τετράγωνον
αὐτὸ τὴν ἀπολαμβαίνουσαν εὐθειῶν,
ίας τὴν παρὰ τὴν πλαγίαν ἡγεμένης
τὴν συμπίπτουσαν τῇ εὐθειῶν ἢ τῇ τομῇ,
να λόγον ἔχει· ὅτι τὸ ἀπὸ τῆς ὀρθίας
ἐστιν ὡς τὸ ἀπὸ τῆς πλαγίας.

: AN κατὰ συζυγίαν ἀντικείμεναι αἱ
, Δ, ἀξίμετροι δὲ αὐτῶν ὀρθία μὲν ἢ
ία δὲ ἢ BE Δ,
ταῖς ἡχθῶσιν
ΛΗΜΝ Πί-
λας ἢ τὰς το-
πὶ τὰ ἀπὸ τῆς
τετράγωνον ὡς
ΗΚ λόγον ἔχει
τῆς ΑΓ ὡς



ν γὰρ ἀπὸ τῶν
εὐθειῶν αἱ ΛΞ,
ἀλλήλοις ἄρα εἰσὶ τῶν ΑΓ, ΒΔ. ἀπὸ τῆς
ρθίας τῆς ΒΔ ἢ ΒΠ· φανερόν δ' ὅτι ἐστὶν
πρὸς ΒΔ ὡς τὸ ἀπὸ ΑΓ ὡς τὸ
ἔστι τὸ ἀπὸ ΑΕ ὡς τὸ ἀπὸ ΕΒ, ἢ
ὡς τὸ ἀπὸ ΒΟΔ, καὶ τὸ ὡς
τὸ ἀπὸ ΛΞ· ἐστὶν ἄρα ὡς ἐν τῶν
ὡς ἐν τῶν ἐπιμέτρων ὡς ἀπαντα
καὶ ὡς ἀπαντα τὰ ἐπιμέτρα· ὡς ἄρα
ὡς τὸ ἀπὸ ΒΔ ὡς τὸ ὡς
τὸ ἀπὸ ΑΕ καὶ τὸ ἀπὸ ΟΖ, τετρί-
θ, ὡς τὸ ὡς ΔΟΒ μετὰ τῆς
αἱ τῆς ἀπὸ ΛΞ, τετρίθ τῆς ἀπὸ ΜΕ.
ὡς ὡς ΓΞΑ μετὰ τῆς ἀπὸ ΑΕ
ἀπὸ ΞΕ, τὸ δὲ ὡς ΔΟΒ μετὰ
Ε ἴσων ἐστὶ τῷ ἀπὸ ΟΕ· ὡς ἄρα
ὡς τὸ ἀπὸ ΒΔ ὡς τὸ ἀπὸ ΞΕ,
ἢ ἀπὸ ΟΕ, ΕΜ, τετρίθ τὸ ἀπὸ ΛΜ, ΜΗ
πρὸ ΖΘ, ΘΗ. ἢ ἐπὶ τῇ μὲν ἀπὸ ΛΜ,

PROP. XXVIII. Theor.

Si in oppositis sectionibus conjugatis
diametri conjugatæ ducantur, qua-
rum altera recta sit, altera transversa;
& ducantur duæ rectæ lineæ diame-
tris parallelæ, quæ & sibi ipsis & se-
ctionibus occurrant: quadrata ex
portionibus lineæ rectæ diametro pa-
rallelæ, quæ inter linearum occur-
sum & sectiones interjiciuntur, ad
quadrata ex portionibus alterius li-
neæ, quæ transversæ diametro æqui-
distat, inter sectiones & occursum li-
nearum interjectis, eandem rationem
habent quam rectæ diametri qua-
dratum ad quadratum transversæ.

SINT oppositæ sectiones conjugatæ AB, ΓΔ;
quarum diameter quidem, recta sit AEG,
transversa vero BED: &
ipsis parallelæ ducantur
ZHΘK, ΛΗΜΝ, quæ
& sibi ipsis & sectioni-
bus occurrant. dico qua-
drata ex ΛΗ, ΗΝ ad qua-
drata ex ΖΗ, ΗΚ eandem
rationem habere quam
quadratum ex ΑΓ ad qua-
dratum ex ΒΔ.


A punctis enim Λ, Ζ
ordinatim applicentur ΛΞ,
ΖΟ, quæ parallelæ erunt diametris ΑΓ, ΒΔ. &
à puncto Β ducatur ipsius ΒΔ rectum latus
ΒΠ: itaque constat [per 20. 6.] ut ΠΒ ad ΒΔ
ita esse quadratum ex ΑΓ ad quadratum ex ΒΔ,
& [per 15. 5.] quadratum ex ΑΕ ad quadratum
ex ΕΒ; & [per 21. 1. huj.] quadratum ex ΖΟ ad
ad rectangulum ΒΟΔ; & rectangulum ΓΖΑ ad
quadratum ex ΛΞ: est igitur [per 12. 5.] sicut
unum antecedentium ad unum consequentium
ita antecedentia omnia ad omnia consequentia:
quare ut quadratum ex ΑΓ ad quadratum ex ΒΔ
ita rectangulum ΓΖΑ una cum quadrato ex ΑΒ
& quadrato ex ΟΖ, hoc est quadrato ex ΕΘ, ad
rectangulum ΔΟΒ una cum quadrato ex ΒΕ &
quadrato ex ΛΞ, hoc est quadrato ex ΜΒ. sed
[per 6. 2.] rectangulum ΓΖΑ una cum quadrato ex
ΑΕ æquale est quadrato ex ΖΕ, & rectangulum
ΔΟΒ una cum quadrato ex ΒΕ æquale quadrato
ΟΕ: ergo ut quadratum ex ΑΓ ad quadratum ex
ΒΔ ita sunt quadrata ex ΖΕ, ΕΘ ad quadrata ex
ΟΒ, ΕΜ, hoc est quadrata ex ΛΜ, ΜΗ ad qua-
drata ex ΖΘ, ΘΗ. quadratorum autem ex ΛΜ;
ΜΗ

SIT ellipsis vel circuli circumferentia $AB\Gamma\Delta$,
cujus centrum B ; ducanturque ipsius duæ
conjugatæ diametri, recta quidem $AB\Gamma$, trans-
versa vero $BE\Delta$; & ducantur $KZ\Lambda M, NZH\Theta$,
quæ ipsis $AB, B\Delta$ æquidistant: dico quadrata
ex $NZ, Z\Theta$, una cum figuris ex KZ, ZM si-
milibus & similiter descriptis ei quæ fit ad AB ,
quadrato ex $B\Delta$ æqualia esse.

Ducatur enim à puncto N recta NZ parallela
 AB ; ergo ad $B\Delta$ ordinatim applicata erit. &
 $B\Pi$ sit rectum figuræ latus. quoniam igitur ut
 $B\Pi$ ad AB ita est AB ad $B\Delta$; erit [per 20. &
22. 6.] ut $B\Pi$ ad $B\Delta$ ita quadratum ex AB ad
quadratum ex $B\Delta$. quadratum autem ex $B\Delta$
[per 17. 6. & 15. 1. huj.] est æquale figuræ quæ
ad AB constituitur: ergo ut $B\Pi$ ad $B\Delta$ ita qua-
dratum ex AB ad figuram quæ est ad AB . sed
[per 22. 6.] ut quadratum ex AB ad figuram
quæ ad AB ita quadratum ex NZ ad figuram
quæ fit ex NZ similem ei quæ ad AB : ergo
ut ΠB ad $B\Delta$ ita quadratum ex NZ ad figu-
ram quæ fit ex NZ similem ei quæ ad AB . est
autem [per 21. 1. huj.] & ut ΠB ad $B\Delta$ ita qua-
dratum ex NZ ad rectangulum $BZ\Delta$: quare [per

ΕΣΤΩ γὰρ ἑλλῖψις ἡ κύκλος περιφέρεια ἡ
 $AB\Gamma\Delta$, ἥς κέντρον τὸ E , καὶ ἡχθῶσιν αὐτῆς
δύο συζυγεῖς διαμέτροι, ὀρθὰ μὲν ἡ $AB\Gamma$, πλά-
για δὲ ἡ $BE\Delta$, ἐκ δὲ τῶν $AB, B\Delta$ ἡχθῶσιν αἱ
 $KZ\Lambda M, NZH\Theta$. λέγω ὅτι τὰ ἀπὸ τῶν $NZ, Z\Theta$ πε-
τεράγματα, προσλαβόντα τὰ ἀπὸ τῶν KZ, ZM ἑδὴ
ὁμοία ἐὼς ὁμοίως ἀναγεγραμμένα τῷ πρὸς τῇ AB
ἑίδει, ἴσιν ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς $B\Delta$ τετραγώνου.

Ἡχθῶσιν ἀπὸ τοῦ N ὡς εἰς τὴν AB ἡ NZ πα-
ράλληλος ἄρα κατ'ἡκαστὴν τὴν $B\Delta$. καὶ ἔστω
ὀρθὴ ἡ $B\Pi$. ἐπεὶ ἔν ἐστιν ὡς ἡ $B\Pi$ πρὸς AB
ἔστω ἡ AB πρὸς $B\Delta$. καὶ ὡς ἄρα ἡ $B\Pi$ πρὸς
 $B\Delta$ ἔστω τὸ ἀπὸ AB πρὸς τὸ ἀπὸ $B\Delta$. τὸ
δὲ ἀπὸ $B\Delta$ ἴσιν ἐστὶ τῷ πρὸς τῇ AB ἑίδει. ἐστὶν
ἄρα ὡς ἡ $B\Pi$ πρὸς $B\Delta$ ἔστω τὸ ἀπὸ AB πε-
τεράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ AB ἑίδος. ὡς δὲ τὸ ἀπὸ
 AB τετραγώνον πρὸς τὸ ἀπὸ AB ἑίδος ἔστω τὸ ἀπὸ
 NZ τετραγώνον πρὸς τὸ ἀπὸ NZ ἑίδος ὁμοίον τῷ
πρὸς τῇ AB ἑίδει. καὶ ὡς ἄρα ἡ $B\Pi$ πρὸς $B\Delta$ ἔστω
τὸ ἀπὸ NZ τετραγώνον πρὸς τὸ ἀπὸ NZ ἑίδος
ὁμοίον τῷ πρὸς τῇ AB ἑίδει. ἐστὶ δὲ καὶ ὡς ἡ $B\Pi$ πρὸς
 $B\Delta$ ἔστω τὸ ἀπὸ NZ πρὸς τὸ ὑπὸ $BZ\Delta$. ἴσιν ἄρα



9. 5.] figura quæ fit ex NZ , hoc est ex $Z\Lambda$, si-
milis ei quæ ad AB , rectangulo $BZ\Delta$ est æqua-
lis. eodem modo demonstrabimus figuram quæ
fit ex $K\Lambda$ similem illi quæ ad AB rectangulo
 $B\Lambda\Delta$ æqualem esse. & quoniam recta linea $N\Theta$
secatur in partes æquales in H & in partes inæ-
quales in Z ; quadrata ex $\Theta Z, ZN$ [per 9. 2.]
dupla sunt quadratorum ex $\Theta H, HZ$, hoc est
ex NH, HZ . eadem quoque ratione quadrata ex
 MZ, ZK quadratorum ex $K\Lambda, \Lambda Z$ sunt dupla;
& [per 22. 6.] figuræ quæ fiunt ex MZ, ZK simi-
les ei quæ ad AB duplæ sunt figurarum simi-
lium quæ ex $K\Lambda, \Lambda Z$. figuræ autem quæ fiunt
ex $K\Lambda, \Lambda Z$ rectangulis $B\Lambda\Delta, BZ\Delta$ [ut modo
ostensum] sunt æquales; & quadrata ex NH, HZ
æqualia sunt quadratis ex $zB, B\Lambda$: ergo qua-
drata ex $NZ, Z\Theta$, una cum figuris ex KZ, ZM
similibus ei quæ ad AB , dupla sunt rectangulo-
rum $BZ\Delta, B\Lambda\Delta$ & quadratorum ex $zB, B\Lambda$.
itaque quoniam recta $B\Delta$ secatur in partes æ-
quales in E & in inæquales in z , rectangulum
 $Bz\Delta$ [per 5. 2.] una cum quadrato ex zB
æquale est quadrato ex BE : similiter & rectan-
gulum $B\Lambda\Delta$ una cum quadrato ex ΛB æquale
est quadrato ex BE : quare rectangula $Bz\Delta$,

ἐστὶ τὸ ἀπὸ NZ ἑίδος (τῆς $z\Lambda$) ὁμοίον τῷ
πρὸς τῇ AB ἑίδει, τῷ ὑπὸ $BZ\Delta$. ὁμοίως δὲ δεῖξομεν
ὅτι τὸ ἀπὸ $K\Lambda$ ἑίδος, ὁμοίον τῷ πρὸς τῇ AB ἑίδει,
ἴσιν τῷ ὑπὸ $B\Lambda\Delta$. καὶ ἐπεὶ εὐθεία ἡ $N\Theta$
τίμηται εἰς μὲν ἴσιν κατὰ τὸ H , εἰς δὲ ἀνίσιν
κατὰ τὸ Z , τὰ ἀπὸ τῶν $\Theta Z, ZN$ τετράγωνα δι-
πλασιά ἐστι τῶν ἀπὸ $\Theta H, HZ$, τῆς $z\Lambda$ τῶν
ἀπὸ NH, HZ . διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ τὰ ἀπὸ
 MZ, ZK τετράγωνα διπλασιά ἐστι τῶν ἀπὸ $K\Lambda$,
 ΛZ τετράγωνων, καὶ τὰ ἀπὸ MZ, ZK ἑδὴ (ὁ-
μοία τῷ πρὸς τῇ AB ἑίδει) διπλασιά ἐστι τῶν
ἀπὸ $K\Lambda, \Lambda Z$ ὁμοίων εἰδῶν. ἴσιν δὲ ἐστὶ τὰ μὲν ἀπὸ
 $K\Lambda, \Lambda Z$ ἑδὴ τῶν ὑπὸ $B\Lambda\Delta, BZ\Delta$, τὰ δὲ ἀπὸ
 NH, HZ τετράγωνα τῶν ἀπὸ $zE, E\Lambda$. τὰ ἄρα
ἀπὸ $NZ, Z\Theta$ τετράγωνα μετὰ τῶν ἀπὸ KZ, ZM
εἰδῶν (ὁμοίων τῷ πρὸς τῇ AB ἑίδει) διπλασιά ἐστι
τῶν ὑπὸ $BZ\Delta, B\Lambda\Delta$ καὶ τῶν ἀπὸ $zE, E\Lambda$. ἔπει-
εὐθεία ἡ $B\Delta$ τίμηται εἰς μὲν ἴσιν κατὰ τὸ E , εἰς
δὲ ἀνίσιν κατὰ τὸ z , τὸ ὑπὸ $Bz\Delta$ μετὰ τῶν ἀπὸ zE
ἴσιν ἐστὶ τῷ ἀπὸ BE . ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ὑπὸ $B\Lambda\Delta$
μετὰ τῶν ἀπὸ ΛE ἴσιν ἐστὶ τῷ ἀπὸ BE . * ὡς τε
ὑπὸ $Bz\Delta$ καὶ ὑπὸ $B\Lambda\Delta$ ἐστὶ τὰ ἀπὸ $zE, \Lambda E$ ἴσιν
ἐστὶ

* Vide Lemma quintum Pappi in hunc librum.

ἐστὶ τῷ δὲ ἀπὸ BE · τὰ ἄρα ἀπὸ NZ , $Z\Theta$ πε-
τεράγωνα μετὰ τῶν ἀπὸ KZ , ZM εἰδῶν (ὁμοίων
τῷ πρὸς τῇ AG εἶδει) διπλασιάσονται τῷ δὲ ἀπὸ
 BE · ἐστὶ δὲ καὶ τὸ ἀπὸ $B\Delta$ διπλασιάζει τῷ δὲ ἀπὸ
 BE · τὰ ἄρα ἀπὸ NZ , $Z\Theta$ πετεράγωνα, πρὸς λα-
βόντα τὰ ἀπὸ KZ , ZM εἰδῶν ὁμοία τῷ πρὸς τῇ AG
εἶδει, ἴσα ἔσονται τὰ ἀπὸ $B\Delta$.


$B\Delta$ & quadrata ex ZE , AE æqualia sunt du-
plo quadrati ex BE : quadrata igitur ex NZ , $Z\Theta$,
una cum figuris ex KZ , ZM similibus ei quæ ad
 AG , dupli quadrati ex BE sunt dupla. atqui
quadratum ex $B\Delta$ duplum est dupli quadrati ex
 BE : ergo quadrata ex NZ , $Z\Theta$ una cum figuris
ex KZ , ZM similibus ei quæ ad AG , quadrato
ex $B\Delta$ æqualia erunt.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κη'.

Εάν ἐν ταῖς $\chi\tau$ συζυγίαι ἀντικείμεναι συζυγεῖς
ἀφ' ἑαυτῶν ἀχθῶσι, καὶ λέγηται αὐτῶν ἡ μ ὀρθία,
ἡ δὲ πλαγία, ἀχθῶσι δὲ παρ' αὐταῖς δύο
εὐθείαι συμπίπτουσαι ἀλλήλαις καὶ ταῖς τομῇς·
τὰ ἀπὸ τῆς ἀπολαμβανομένης εὐθείας, ἐκ' εὐ-
θείας τῆς ὀρθίας ἡγεμένης μεταξὺ τῆς συμ-
πίπτουσας τῆς εὐθείας καὶ τῆς τομῆς, πετεράγωνα
πρὸς τὰ ἀπὸ τῆς ἀπολαμβανομένης εὐθείας,
ἐκ' εὐθείας τῆς παρὰ τῇ πλαγίᾳ ἡγεμένης
μεταξὺ τῆς συμπίπτουσας τῆς εὐθείας καὶ τῆς τομῆς,
πετεράγωνα λόγον ἔχει, ὅτι τὸ ἀπὸ τῆς ὀρθίας
πετεράγωνοι πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς πλαγίας.

ΕΣΤΩΣΑΝ κατὰ συζυγίαν ἀντικείμεναι αἱ
 A, B, Γ, Δ , ἀφ' ἑαυτῶν δὲ αὐτῶν ὀρθία $\mu\delta\eta$ ἡ
 $AE\Gamma$, πλαγία δὲ ἡ $BE\Delta$,
καὶ παρ' αὐταῖς ἡχθῶσαν
αἱ $ZH\Theta K$, $\Lambda H M N$ πῆ-
μυσται ἀλλήλαις καὶ ταῖς το-
μῇς· λέγω ὅτι τὰ ἀπὸ τῆς
 $\Lambda H, H N$ πετεράγωνα πρὸς
τὰ ἀπὸ $Z H, H K$ λόγον ἔχει
ὅτι τὸ ἀπὸ τῆς AG πρὸς
τὸ ἀπὸ $B\Delta$.

Ἡχθῶσαν γὰρ ἀπὸ τῶν
 Λ, Z πετεράγωνα αἱ ΛZ ,
 $Z O$ · ὁμοίᾳ ἄρα εἰσὶ τῇ $AG, B\Delta$. ἀπὸ τῆς
 B ἡχθῶσιν ὀρθία τῇ $B\Delta$ ἡ $B\Pi$. φανερόν δὲ ὅτι ἐστὶν
ὡς ἡ ΠB πρὸς $B\Delta$ ἔστω τὸ ἀπὸ AG πρὸς τὸ
ἀπὸ $B\Delta$, ὥς τὸ ἀπὸ AE πρὸς τὸ ἀπὸ EB , καὶ
τὸ ἀπὸ $Z O$ πρὸς τὸ ἀπὸ $B O \Delta$, καὶ τὸ ἀπὸ
 $\Gamma E A$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΛE . ἐστὶν ἄρα ὡς ἐν τῶν
ἡγεμένων πρὸς ἐν τῶν ἐπιμέτρων ἔστω ἀπαντα
τὰ ἡγεύμενα πρὸς ἀπαντα τὰ ἐπιμέτρα· ὡς ἄρα
τὸ ἀπὸ AG πρὸς τὸ ἀπὸ $B\Delta$ ἔστω τὸ ἀπὸ
 $\Gamma E A$ μετὰ τῆς ἀπὸ ΛE καὶ τῆς ἀπὸ $O Z$, τέστι
τῆς ἀπὸ $E \Theta$, πρὸς τὸ ἀπὸ $\Delta O B$ μετὰ τῆς
ἀπὸ $B E$ καὶ τῆς ἀπὸ ΛE , τέστι τῆς ἀπὸ $M E$.
ἀλλὰ τὸ μὲν ἀπὸ $\Gamma E A$ μετὰ τῆς ἀπὸ ΛE
ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ ΞE , τὸ δὲ ἀπὸ $\Delta O B$ μετὰ
τῆς ἀπὸ $B E$ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ $O E$. ὡς ἄρα
τὸ ἀπὸ AG πρὸς τὸ ἀπὸ $B\Delta$ ἔστω τὸ ἀπὸ ΞE ,
 $E \Theta$ πρὸς τὰ ἀπὸ $O E, E M$, τέστι τὰ ἀπὸ $\Lambda M, M H$
πρὸς τὰ ἀπὸ $Z \Theta, \Theta H$. καὶ ἐστὶ τὸ μὲν ἀπὸ ΛM ,



PROP. XXVIII. Theor.

Si in oppositis sectionibus conjugatis
diametri conjugatæ ducantur, qua-
rum altera recta sit, altera transversa;
& ducantur duæ rectæ lineæ diame-
tris parallelæ, quæ & sibi ipsis & se-
ctionibus occurrant: quadrata ex
portionibus lineæ rectæ diametro pa-
rallæ, quæ inter linearum occur-
sum & sectiones interjiciuntur, ad
quadrata ex portionibus alterius li-
neæ, quæ transversæ diametro æqui-
distat, inter sectiones & occursum li-
nearum interjectis, eandem rationem
habent quam rectæ diametri qua-
dratum ad quadratum transversæ.

SINT oppositæ sectiones conjugatæ $AB, \Gamma\Delta$,
quarum diameter quidem, recta sit $AE\Gamma$,
transversa vero $BE\Delta$: &
ipsis parallelæ ducantur
 $ZH\Theta K$, $\Lambda H M N$, quæ
& sibi ipsis & sectioni-
bus occurrant. dico qua-
drata ex $\Lambda H, H N$ ad qua-
drata ex $Z H, H K$ eandem
rationem habere quam
quadratum ex AG ad qua-
dratum ex $B\Delta$.

A punctis enim Λ, Z
ordinatim applicentur ΛZ ,


$Z O$, quæ parallelæ erunt diametris $AG, B\Delta$. &
à puncto B ducatur ipsius $B\Delta$ rectum latus
 $B\Pi$: itaque constat [per 20. 6.] ut ΠB ad $B\Delta$
ita esse quadratum ex AG ad quadratum ex $B\Delta$,
& [per 15. 5.] quadratum ex AE ad quadratum
ex EB ; & [per 21. 1. huj.] quadratum ex $Z O$ ad
ad rectangulum $B O \Delta$; & rectangulum $\Gamma Z A$ ad
quadratum ex ΛZ : est igitur [per 12. 5.] sicut
unum antecedentium ad unum consequentium
ita antecedentia omnia ad omnia consequentia:
quare ut quadratum ex AG ad quadratum ex $B\Delta$
ita rectangulum $\Gamma Z A$ una cum quadrato ex ΛB
& quadrato ex $O Z$, hoc est quadrato ex $E \Theta$, ad
rectangulum $\Delta O B$ una cum quadrato ex $B E$ &
quadrato ex ΛZ , hoc est quadrato ex $M B$. sed
[per 6.2.] rectangulum $\Gamma Z A$ una cum quadrato ex
 ΛE æquale est quadrato ex ZE , & rectangulum
 $\Delta O B$ una cum quadrato ex $B E$ æquale quadrato
 $O E$: ergo ut quadratum ex AG ad quadratum ex
 $B\Delta$ ita sunt quadrata ex $ZE, E \Theta$ ad quadrata ex
 $O B, E M$, hoc est quadrata ex $\Lambda M, M H$ ad qua-
drata ex $Z \Theta, \Theta H$. quadratorum autem ex ΛM ,
 $M H$

SIT ellipsis vel circuli circumferentia $AB\Gamma\Delta$,
cujus centrum B ; ducanturque ipsius duæ
conjugatæ diametri, recta quidem $AB\Gamma$, trans-
versa vero $BE\Delta$; & ducantur $KZ\Lambda M$, $NZH\Theta$,
quæ ipsis AB , BE æquidistant: dico quadrata
ex NZ , $Z\Theta$, una cum figuris ex KZ , ZM si-
milibus & similiter descriptis ei quæ fit ad AB ,
quadrato ex BE æqualia esse.

Ducatur enim à puncto N recta NZ parallela
 AB ; ergo ad BE ordinatim applicata erit. &
 $B\Pi$ sit rectum figuræ latus. quoniam igitur ut
 $B\Pi$ ad AB ita est AB ad BE ; erit [per 20. &
22. 6.] ut $B\Pi$ ad BE ita quadratum ex AB ad
quadratum ex BE . quadratum autem ex BE
[per 17. 6. & 15. 1. huj.] est æquale figuræ quæ
ad AB constituitur: ergo ut $B\Pi$ ad BE ita qua-
dratum ex AB ad figuram quæ est ad AB . sed
[per 22. 6.] ut quadratum ex AB ad figuram
quæ ad AB ita quadratum ex NZ ad figuram
quæ fit ex NZ similem ei quæ ad AB : ergo
ut ΠB ad BE ita quadratum ex NZ ad figu-
ram quæ fit ex NZ similem ei quæ ad AB . est
autem [per 21. 1. huj.] & ut ΠB ad BE ita qua-
dratum ex NZ ad rectangulum $BZ\Delta$: quare [per

ΕΣΤΩ γὰρ ἑλλῖψις ἡ κύκλος περιφέρεια ἡ
 $AB\Gamma\Delta$, ἥς κέντρον τὸ E , καὶ ἡχοῦσται αὐτῆς
δύο συζυγῆς διαμέτροι, ὀρθὰ μὲν ἡ $AB\Gamma$, πλά-
για δὲ ἡ $BE\Delta$, ἐκ δὲ τῆς AB , BE ἡχοῦσται αἱ
 $KZ\Lambda M$, $NZH\Theta$ λέγω ὅτι τὰ ἀπὸ τῶν NZ , $Z\Theta$ πε-
τράγματα, πρὸς λαβόντα τὰ ἀπὸ τῶν KZ , ZM εἰδῶν
ὁμοία ἐστὶν ὁμοίως ἀναγεγραμμένα τῷ πρὸς τῇ AB
εἶδει, ὡς ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς BE πετράγματι.

Ἡχοῦσται ἀπὸ τοῦ N ὡς πρὸς τὴν AB ἡ NZ πε-
τράγματι ἄρα κατ' ὁμοίωσιν τῷ πρὸς τῇ BE . καὶ ἐστὶν
ὀρθὴ ἡ $B\Pi$. ἐπεὶ γὰρ ὡς ἡ $B\Pi$ πρὸς AB
ὥτως ἡ AB πρὸς BE : καὶ ὡς ἄρα ἡ $B\Pi$ πρὸς
 BE ὥτως τὸ ἀπὸ AB πρὸς τὸ ἀπὸ BE . τὸ
δὲ ἀπὸ BE ἴσον ἐστὶ τῷ πρὸς τῇ AB εἶδει. ἐστὶν
ἄρα ὡς ἡ $B\Pi$ πρὸς BE ὥτως τὸ ἀπὸ AB πε-
τράγματι πρὸς τὸ ἀπὸ AB εἶδος. ὡς δὲ τὸ ἀπὸ
 AB πετράγματι πρὸς τὸ ἀπὸ AB εἶδος ὥτως τὸ ἀπὸ
 NZ πετράγματι πρὸς τὸ ἀπὸ NZ εἶδος ὁμοίον τῷ
πρὸς τῇ AB εἶδει. καὶ ὡς ἄρα ἡ $B\Pi$ πρὸς BE ὥτως
τὸ ἀπὸ NZ πετράγματι πρὸς τὸ ἀπὸ NZ εἶδος
ὁμοίον τῷ πρὸς τῇ AB εἶδει. ἐστὶ δὲ καὶ ὡς ἡ $B\Pi$ πρὸς
 BE ὥτως τὸ ἀπὸ NZ πρὸς τὸ ὑπὸ $BZ\Delta$ ἴσον ἄρα



9.5.] figura quæ fit ex NZ , hoc est ex $Z\Lambda$, si-
milis ei quæ ad AB , rectangulo $BZ\Delta$ est æqua-
lis. eodem modo demonstrabimus figuram quæ
fit ex KL similem illi quæ ad AB rectangulo
 $B\Lambda\Delta$ æqualem esse. & quoniam recta linea $N\Theta$
secatur in partes æquales in H & in partes inæ-
quales in Z ; quadrata ex ΘZ , ZN [per 9. 2.]
dupla sunt quadratorum ex ΘH , HZ , hoc est
ex NH , HZ . eadem quoque ratione quadrata ex
 MZ , ZK quadratorum ex KL , LZ sunt dupla;
& [per 22. 6.] figuræ quæ fiunt ex MZ , ZK simi-
les ei quæ ad AB duplæ sunt figurarum simi-
lium quæ ex KL , LZ . figuræ autem quæ fiunt
ex KL , LZ rectangulis $B\Lambda\Delta$, $BZ\Delta$ [ut modo
ostensum] sunt æquales; & quadrata ex NH , HZ
æqualia sunt quadratis ex zB , $B\Lambda$: ergo qua-
drata ex NZ , $Z\Theta$, una cum figuris ex KZ , ZM
similibus ei quæ ad AB , dupla sunt rectangulo-
rum $BZ\Delta$, $B\Lambda\Delta$ & quadratorum ex zB , $B\Lambda$.
itaque quoniam recta BE secatur in partes æ-
quales in E & in inæquales in z , rectangulum
 $Bz\Delta$ [per 5. 2.] una cum quadrato ex zB
æquale est quadrato ex BE : similiter & rectan-
gulum $B\Lambda\Delta$ una cum quadrato ex ΛE æquale
est quadrato ex BE : quare rectangula $BZ\Delta$,

ἐστὶ τὸ ἀπὸ NZ εἶδος (τῆς τῆς KL) ὁμοίον τῷ
πρὸς τῇ AB εἶδει, τῷ ὑπὸ $BZ\Delta$. ὁμοίως δὲ δεῖξομεν
ὅτι τὸ ἀπὸ KL εἶδος, ὁμοίον τῷ πρὸς τῇ AB εἶδει,
ἴσον τῷ ὑπὸ $B\Lambda\Delta$. καὶ ἐπεὶ εὐθεία ἡ $N\Theta$
τίτμηται εἰς μὲν ἴσα κατὰ τὸ H , εἰς δὲ ἀνίσαι
κατὰ τὸ Z , τὰ ἀπὸ τῶν ΘZ , ZN πετράγματα δι-
πλασιά ἐστι τῶν ἀπὸ ΘH , HZ , τῆς τῆς KL
ἀπὸ NH , HZ . διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ τὰ ἀπὸ
 MZ , ZK πετράγματα διπλασιά ἐστι τῶν ἀπὸ KL ,
 LZ πετράγματι, καὶ τὰ ἀπὸ MZ , ZK εἶδη (ὁ-
μοία τῷ πρὸς τῇ AB εἶδει) διπλασιά ἐστι τῶν
ἀπὸ KL , LZ ὁμοίων εἰδῶν. ἴσα δὲ ἐστὶ τὰ ἀπὸ
 KL , LZ εἶδη τῶν ὑπὸ $B\Lambda\Delta$, $BZ\Delta$, τὰ δὲ ἀπὸ
 NH , HZ πετράγματα τῶν ἀπὸ zE , $E\Lambda$ τὰ ἄρα
ἀπὸ NZ , $Z\Theta$ πετράγματα μετὰ τῶν ἀπὸ KZ , ZM
εἰδῶν (ὁμοίων τῷ πρὸς τῇ AB εἶδει) διπλασιά ἐστι
τῶν ὑπὸ $BZ\Delta$, $B\Lambda\Delta$ καὶ τῶν ἀπὸ zE , $E\Lambda$. ἔπει-
α εὐθεία ἡ BE τίτμηται εἰς μὲν ἴσα κατὰ τὸ E , εἰς
δὲ ἀνίσαι κατὰ τὸ z , τὸ ὑπὸ $Bz\Delta$ μετὰ τῶν ἀπὸ zE
ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ BE . ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ὑπὸ $B\Lambda\Delta$
μετὰ τῶν ἀπὸ ΛE ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ BE . * ὡς τὰ
ὑπὸ $BZ\Delta$ καὶ ὑπὸ $B\Lambda\Delta$ ἐστὶν ἴσα τῷ ἀπὸ zE , $E\Lambda$ ἴσα
ἐστὶ

* Vide Lemma quintum Pappi in hunc librum.

ἐστὶ τῷ δὲ ἀπὸ ΒΕ· τὰ ἄρα ἀπὸ ΝΖ, ΖΘ πε-
τεράγωνα μετὰ τῶν ἀπὸ ΚΖ, ΖΜ εἰδῶν (ὁμοίων
τῷ πρὸς τῇ ΑΓ εἶδει) διπλασιάει τὴν δὲ ἀπὸ
ΒΕ· ἐστὶ δὲ καὶ τὸ ἀπὸ ΒΔ διπλασίον τῆς δὲ ἀπὸ
ΒΕ· τὰ ἄρα ἀπὸ ΝΖ, ΖΘ πετεράγωνα, πρὸς λα-
βόντα τὰ ἀπὸ ΚΖ, ΖΜ εἶδη ὁμοία τῷ πρὸς τῇ ΑΓ
εἶδει, ἴσκι ἐστὶ τῷ ἀπὸ ΒΔ.

$ΒΔΔ$ & quadrata ex ZE , AE æqualia sunt du-
plo quadrati ex BE : quadrata igitur ex NZ, ZO ,
una cum figuris ex KZ, ZM similibus ei quæ ad
 AG , dupli quadrati ex BE sunt dupla. atqui
quadratum ex BD duplum est dupli quadrati ex
 BE : ergo quadrata ex NZ, ZO una cum figuris
ex KZ, ZM similibus ei quæ ad AG , quadrato
ex BD æqualia erunt.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ κη'.

Εἰάν ἐν ταῖς κτ' συζυγίαι ἀντικείμεναι συζυγεῖς
ἀξόμετροι ἀχθῶσι, καὶ λέγηται αὐτῶν ἡ μὲν ὀρθία,
ἡ δὲ πλαγία, ἀχθῶσι δὲ παρ' αὐταῖς δύο
εὐθείαι συμπίπτουσαι ἀλλήλαις καὶ ταῖς τομῇς
ταῖς ἀπὸ τῆς ἀπολαμβανομένης εὐθείας, ἐπ' εὐ-
θείας τῆς ὀρθίας ἡγεμένης μεταξὺ τῆς συμ-
πίπτουσας τῆς εὐθείας καὶ τῆς τομῆς, πετεράγωνα
πρὸς τὰ ἀπὸ τῆς ἀπολαμβανομένης εὐθείας,
ἐπ' εὐθείας τῆς πλαγίας ἡγεμένης
μεταξὺ τῆς συμπίπτουσας τῆς εὐθείας καὶ τῆς τομῆς,
πετεράγωνα λόγῳ ἔχει ὅτι τὸ ἀπὸ τῆς ὀρθίας
πετεράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς πλαγίας.

PROP. XXVIII. Theor.

Si in oppositis sectionibus conjugatis
diametri conjugatæ ducantur, qua-
rum altera recta sit, altera transversa;
& ducantur duæ rectæ lineæ diame-
tris parallelæ, quæ & sibi ipsis & se-
ctionibus occurrant: quadrata ex
portionibus lineæ rectæ diametro pa-
rallelæ, quæ inter linearum occur-
sum & sectiones interjiciuntur, ad
quadrata ex portionibus alterius li-
neæ, quæ transversæ diametro æqui-
distat, inter sectiones & occursum li-
nearum interjectis, eandem rationem
habent quam rectæ diametri qua-
dratum ad quadratum transversæ.

ΕΣΤΩΣΑΝ κατὰ συζυγίαν ἀντικείμεναι αἱ
ΑΒ, ΓΔ, ἀξόμετροι δὲ αὐτῶν ὀρθία μὲν ἡ
ΑΕΓ, πλαγία δὲ ἡ ΒΕΔ,
καὶ παρ' αὐταῖς ἡχθῶσαν
αἱ ΖΗΘΚ, ΛΗΜΝ τέ-
μνουσαι ἀλλήλαις καὶ τὰς το-
μὰς· λέγω ὅτι τὰ ἀπὸ τῆς
ΛΗ, ΗΝ πετεράγωνα πρὸς
τὰ ἀπὸ ΖΗ, ΗΚ λόγον ἔχει
ὅτι τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ πρὸς
τὸ ἀπὸ ΒΔ.



ἡχθῶσαν γὰρ ἀπὸ τῶν
Α, Ζ πεπεγμένως αἱ ΑΞ,
ΖΟ· ὡς ἀλλήλοισι ἄρα εἰσὶ τῆς ΑΓ, ΒΔ. ἀπὸ τῆς
Β ἡχθῶσιν ἡ ὀρθία τῆς ΒΔ ἡ ΒΠ· φανερόν δὲ ὅτι ἐστὶν
ὡς ἡ ΠΒ πρὸς ΒΔ ὅπως τὸ ἀπὸ ΑΓ πρὸς τὸ
ἀπὸ ΒΔ, ὥς τὸ ἀπὸ ΑΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΒ, καὶ
τὸ ἀπὸ ΖΟ πρὸς τὸ ἀπὸ ΒΟΔ, καὶ τὸ ἀπὸ
ΓΞΑ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΞ· ἐστὶν ἄρα ὡς ἐν τῶν
ἡγεμένων πρὸς ἐν τῶν ἐπομένων ὅπως ἀπαντα
τὰ ἡγεύμενα πρὸς ἀπαντα τὰ ἐπούμενα· ὡς ἄρα
τὸ ἀπὸ ΑΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΒΔ ὅπως τὸ ἀπὸ
ΓΞΑ μετὰ τῆς ἀπὸ ΑΕ καὶ τῆς ἀπὸ ΟΖ, τετέστι
τῆς ἀπὸ ΕΘ, πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΟΒ μετὰ τῆς
ἀπὸ ΒΕ καὶ τῆς ἀπὸ ΑΞ, τετέστι τῆς ἀπὸ ΜΕ.
ἀλλὰ τὸ μὲν ἀπὸ ΓΞΑ μετὰ τῆς ἀπὸ ΑΕ
ἴσκι ἐστὶ τῷ ἀπὸ ΞΕ, τὸ δὲ ἀπὸ ΔΟΒ μετὰ
τῆς ἀπὸ ΒΕ ἴσκι ἐστὶ τῷ ἀπὸ ΟΕ· ὡς ἄρα
τὸ ἀπὸ ΑΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΒΔ ὅπως τὰ ἀπὸ ΞΕ,
ΕΘ πρὸς τὰ ἀπὸ ΟΕ, ΕΜ, τετέστι τὰ ἀπὸ ΛΜ, ΜΗ
πρὸς τὰ ἀπὸ ΖΘ, ΘΗ· καὶ ἐστὶ τὸ μὲν ἀπὸ ΛΜ,

SINT oppositæ sectiones conjugatæ ΑΒ, ΓΔ,
quarum diameter quidem recta sit ΑΕΓ,
transversa vero ΒΕΔ: &
ipsis parallelæ ducantur
ΖΗΘΚ, ΛΗΜΝ, quæ
& sibi ipsis & sectioni-
bus occurrant. dico qua-
drata ex ΛΗ, ΗΝ ad qua-
drata ex ΖΗ, ΗΚ eandem
rationem habere quam
quadratum ex ΑΓ ad qua-
dratum ex ΒΔ.


A punctis enim Α, Ζ
ordinatim applicentur ΑΞ,
ΖΟ, quæ parallelæ erunt diametris ΑΓ, ΒΔ. &
à puncto Β ducatur ipsius ΒΔ rectum latus
ΒΠ: itaque constat [per 20. 6.] ut ΠΒ ad ΒΔ
ita esse quadratum ex ΑΓ ad quadratum ex ΒΔ,
& [per 15. 5.] quadratum ex ΑΕ ad quadratum
ex ΕΒ; & [per 21. 1. huj.] quadratum ex ΖΟ ad
ad rectangulum ΒΟΔ; & rectangulum ΓΞΑ ad
quadratum ex ΑΞ: est igitur [per 12. 5.] sicut
unum antecedentium ad unum consequentium
ita antecedentia omnia ad omnia consequentia:
quare ut quadratum ex ΑΓ ad quadratum ex ΒΔ
ita rectangulum ΓΞΑ una cum quadrato ex ΑΒ
& quadrato ex ΟΖ, hoc est quadrato ex ΕΘ, ad
rectangulum ΔΟΒ una cum quadrato ex ΒΕ &
quadrato ex ΑΞ, hoc est quadrato ex ΜΕ. sed
[per 6.2.] rectangulum ΓΞΑ una cum quadrato ex
ΑΕ æquale est quadrato ex ΞΕ, & rectangulum
ΔΟΒ una cum quadrato ex ΒΕ æquale quadrato
ΟΕ: ergo ut quadratum ex ΑΓ ad quadratum ex
ΒΔ ita sunt quadrata ex ΞΕ, ΕΘ ad quadrata ex
ΟΕ, ΕΜ, hoc est quadrata ex ΛΜ, ΜΗ ad qua-
drata ex ΖΘ, ΘΗ, quadratorum autem ex ΛΜ,
ΜΗ

SIT ellipsis vel circuli circumferentia $AB\Gamma\Delta$,
cujus centrum B ; ducanturque ipsius duæ
conjugatæ diametri, recta quidem $AE\Gamma$, trans-
versa vero $BE\Delta$; & ducantur $KZAM, NZH\Theta$,
quæ ipsis AE, BE æquidistant: dico quadrata
ex $NZ, Z\Theta$, una cum figuris ex KZ, ZM si-
milibus & similiter descriptis ei quæ fit ad AE ,
quadrato ex BE æqualia esse.

Ducatur enim à puncto N recta NZ parallela
 AE ; ergo ad BE ordinatim applicata erit. &
 $B\Pi$ sit rectum figuræ latus. quoniam igitur ut
 $B\Pi$ ad AE ita est AE ad BE ; erit [per 20. &
22. 6.] ut $B\Pi$ ad BE ita quadratum ex AE ad
quadratum ex BE . quadratum autem ex BE
[per 17. 6. & 15. 1. huj.] est æquale figuræ quæ
ad AE constituitur: ergo ut $B\Pi$ ad BE ita qua-
dratum ex AE ad figuram quæ est ad AE . sed
[per 22. 6.] ut quadratum ex AE ad figuram
quæ ad AE ita quadratum ex NZ ad figuram
quæ fit ex NZ similem ei quæ ad AE : ergo
ut $B\Pi$ ad BE ita quadratum ex NZ ad figu-
ram quæ fit ex NZ similem ei quæ ad AE . est
autem [per 21. 1. huj.] & ut $B\Pi$ ad BE ita qua-
dratum ex NZ ad rectangulum $B\Xi\Delta$: quare [per

ΕΣΤΩ γὰρ ἑλλίψις ἢ κύκλος περιφέρεια ἢ
 $AB\Gamma\Delta$, ἥς κέντρον τὸ E , καὶ ἡχθῶσιν αὐτῆς
δύο συζυγεῖς διμέτρηται, ὁρθὰ μὲν ἡ $AE\Gamma$, πλα-
γία δὲ ἡ $BE\Delta$, ἐκ τῶν δὲ τῶν AE, BE ἡχθῶσιν αἱ
 $KZAM, NZH\Theta$ λέγω ὅτι τὰ ἀπὸ τῶν $NZ, Z\Theta$ πε-
τράγματα, προσλαβόντα τὰ ἀπὸ τῶν KZ, ZM εἰδη
ὁμοία ἐστὶν ὁμοίως ἀναγεγραμμένα τῷ πρὸς τῇ AE
εἰδει, ἴσιν ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς BE πετράγωνον.

Ἠχθῶν ἀπὸ τοῦ N τῶν AE ἢ NZ πτε-
γμῶν ἄρα κατῆκται ὁπὶ τὸ BE . καὶ ἔστω
ὁρθὰ ἡ $B\Pi$. ἐπεὶ ὅν ἐστιν ὡς ἡ $B\Pi$ πρὸς AE
ἔστω ἡ AE πρὸς BE καὶ ὡς ἄρα ἡ $B\Pi$ πρὸς
 BE ἔστω τὸ ἀπὸ AE πρὸς τὸ ἀπὸ BE . τὸ
δὲ ἀπὸ BE ἴσιν ἐστὶ τῷ πρὸς τῇ AE εἰδει. ἐστὶν
ἄρα ὡς ἡ $B\Pi$ πρὸς BE ἔστω τὸ ἀπὸ AE πε-
τράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ AE εἶδος. ὡς δὲ τὸ ἀπὸ
 AE πετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ AE εἶδος ἔστω τὸ ἀπὸ
 NZ πετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ NZ εἶδος ὁμοίον τῷ
πρὸς τῇ AE εἰδει καὶ ὡς ἄρα ἡ $B\Pi$ πρὸς BE ἔστω
τὸ ἀπὸ NZ πετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ NZ εἶδος
ὁμοίον τῷ πρὸς τῇ AE εἰδει. ἐστὶ δὲ καὶ ὡς ἡ $B\Pi$ πρὸς
 BE ἔστω τὸ ἀπὸ NZ πρὸς τὸ ὑπὸ $B\Xi\Delta$ ἴσιν ἄρα



9.5.] figura quæ fit ex NZ , hoc est ex $Z\Lambda$, si-
milis ei quæ ad AE , rectangulo $B\Xi\Delta$ est æqua-
lis. eodem modo demonstrabimus figuram quæ
fit ex KA similem illi quæ ad AE rectangulo
 $B\Lambda\Delta$ æqualem esse. & quoniam recta linea $N\Theta$
secatur in partes æquales in H & in partes inæ-
quales in Z ; quadrata ex $\Theta Z, ZN$ [per 9. 2.]
dupla sunt quadratorum ex $\Theta H, HZ$, hoc est
ex NH, HZ . eadem quoque ratione quadrata ex
 MZ, ZK quadratorum ex KA, AZ sunt dupla;
& [per 22. 6.] figuræ quæ fiunt ex MZ, ZK simi-
les ei quæ ad AE duplæ sunt figurarum simi-
lium quæ ex KA, AZ . figuræ autem quæ fiunt
ex KA, AZ rectangulis $B\Lambda\Delta, B\Xi\Delta$ [ut modo
ostensum] sunt æquales; & quadrata ex NH, HZ
æqualia sunt quadratis ex $\Xi B, B\Lambda$: ergo qua-
drata ex $NZ, Z\Theta$, una cum figuris ex KZ, ZM
similibus ei quæ ad AE , dupla sunt rectangulo-
rum $B\Xi\Delta, B\Lambda\Delta$ & quadratorum ex $\Xi B, B\Lambda$.
itaque quoniam recta BD secatur in partes æ-
quales in E & in inæquales in Ξ , rectangulum
 $B\Xi\Delta$ [per 5. 2.] una cum quadrato ex ΞB
æquale est quadrato ex BE : similiter & rectan-
gulum $B\Lambda\Delta$ una cum quadrato ex ΛE æquale
est quadrato ex BE : quare rectangula $B\Xi\Delta$,

ἐστὶ τὸ ἀπὸ NZ εἶδος (τῆς περὶ τὸ ἀπὸ $Z\Lambda$) ὁμοίον τῷ
πρὸς τῇ AE εἰδει, τῷ ὑπὸ $B\Xi\Delta$. ὁμοίως δὲ εἴδομαι
ὅτι τὸ ἀπὸ KA εἶδος, ὁμοίον τῷ πρὸς τῇ AE εἰδει,
ἴσιν τῷ ὑπὸ $B\Lambda\Delta$. καὶ ἐπεὶ εὐθεία ἡ $N\Theta$
τίτμηται εἰς μὲν ἴσιν κατὰ τὸ H , εἰς δὲ ἀνίσιν
κατὰ τὸ Z , τὰ ἀπὸ τῶν $\Theta Z, ZN$ πετράγματα δι-
πλασιά ἐστι τῶν ἀπὸ $\Theta H, HZ$, τῆς περὶ τῶν
ἀπὸ NH, HZ . διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ τὰ ἀπὸ
 MZ, ZK πετράγματα διπλασιά ἐστι τῶν ἀπὸ KA, AZ
πετράγωνων, καὶ τὰ ἀπὸ MZ, ZK εἶδη (ὁ-
μοία τῷ πρὸς τῇ AE εἰδει) διπλασιά ἐστὶ τῶν
ἀπὸ KA, AZ ὁμοίων εἰδῶν. ἴσιν δὲ ἐστὶ τὰ μὲν ἀπὸ
 KA, AZ εἶδη πρὸς τὸ ὑπὸ $B\Lambda\Delta, B\Xi\Delta$, τὰ δὲ ἀπὸ
 NH, HZ πετράγματα πρὸς τὸ ἀπὸ $\Xi E, E\Lambda$. τὰ ἄρα
ἀπὸ $NZ, Z\Theta$ πετράγματα μετὰ τῶν ἀπὸ KZ, ZM
εἰδῶν (ὁμοίων τῷ πρὸς τῇ AE εἰδει) διπλασιά ἐστὶ
τῶν ὑπὸ $B\Xi\Delta, B\Lambda\Delta$ καὶ τῶν ἀπὸ $\Xi E, E\Lambda$. ἐπεὶ
εὐθεία ἡ BD τίτμηται εἰς μὲν ἴσιν κατὰ τὸ E , εἰς
δὲ ἀνίσιν κατὰ τὸ Ξ , τὸ ὑπὸ $B\Xi\Delta$ μετὰ τῶν ἀπὸ ΞE
ἴσιν ἐστὶ τῷ ἀπὸ BE . ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ὑπὸ $B\Lambda\Delta$
μετὰ τῶν ἀπὸ ΛE ἴσιν ἐστὶ τῷ ἀπὸ BE . * ὥστε τὰ
ὑπὸ $B\Xi\Delta$ καὶ ὑπὸ $B\Lambda\Delta$ ἐστὶν ὅσον $\Xi E, \Lambda E$ ἴσιν
ἐστὶ

* Vide Lemma quintum Pappi in hunc librum.

ἐστὶ τῷ δὲ ἀπὸ BE · τὰ ἄρα ἀπὸ NZ , $Z\Theta$ πε-
τεράγωνα μετὰ τῶν ἀπὸ KZ , ZM εἰδῶν (ὁμοίων
τῷ πρὸς τῇ AG εἶδει) διπλασιάσονται τῷ δὲ ἀπὸ
 BE · ἐστὶ δὲ καὶ τὸ ἀπὸ BA διπλασιασθὲν τῷ δὲ ἀπὸ
 BE · τὰ ἄρα ἀπὸ NZ , $Z\Theta$ πετεράγωνα, πρὸς λα-
βόντα τὰ ἀπὸ KZ , ZM εἰδῶν ὁμοία τῷ πρὸς τῇ AG
εἶδει, ἴσα ἔσται τὰ ἀπὸ BA .


$BA\Delta$ & quadrata ex ZE , AE æqualia sunt du-
plo quadrati ex BE : quadrata igitur ex NZ , $Z\Theta$,
una cum figuris ex KZ , ZM similibus ei quæ ad
 AG , dupli quadrati ex BE sunt dupla. atqui
quadratum ex BA duplum est dupli quadrati ex
 BE : ergo quadrata ex NZ , $Z\Theta$ una cum figuris
ex KZ , ZM similibus ei quæ ad AG , quadrato
ex BA æqualia erunt.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κη'.

Εἰάν ἐν ταῖς $\chi\tau$ συζυγίαι ἀντικείμεναι συζυγεῖς
ἀξόμετροι ἀχθῶσι, καὶ λέγηται αὐτῶν ἡ μὲν ὀρθία,
ἡ δὲ πλαγία, ἀχθῶσι δὲ παρ' αὐταῖς δύο
εὐθείαι συμπίπτουσαι ἀλλήλαις καὶ ταῖς τομῇς·
τὰ ἀπὸ τῆς ἀπολαμβανομένης εὐθείας, ἐπ' εὐ-
θείας, τὸ πρὸς τῇ ὀρθίᾳ ἡγεμένης μεταξὺ τῆς συμ-
πίπτουσας τῆς εὐθείας καὶ τῆς τομῆς, πετεράγωνα
πρὸς τὰ ἀπὸ τῆς ἀπολαμβανομένης εὐθείας,
ἐπ' εὐθείας, τὸ παρὰ τῇ πλαγίᾳ ἡγεμένης
μεταξὺ τῆς συμπίπτουσας τῆς εὐθείας καὶ τῆς τομῆς,
πετεράγωνα λόγον ἔχει, ὅτι τὸ ἀπὸ τῆς ὀρθίας
πετεράγωνοι πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς πλαγίας.

Εἰς τὸν $\Sigma\Lambda\Omega$ κατὰ συζυγίαν ἀντικείμεναι αἱ
 AB , GD , ἀξόμετροι δὲ αὐτῶν ὀρθία μὲν ἡ
 AE , GD , πλαγία δὲ ἡ BE , Δ ,
καὶ παρ' αὐταῖς ἡχθῶσιν
αἱ $ZH\Theta K$, $\Lambda H M N$ τι-
μύσαι ἀλλήλαις καὶ τὰς το-
μὰς· λέγω ὅτι τὰ ἀπὸ τῆς
 ΛH , $H N$ πετεράγωνα πρὸς
τὰ ἀπὸ $Z H$, $H K$ λόγον ἔχει
ὅτι τὸ ἀπὸ τῆς AG πρὸς
τὸ ἀπὸ BA .

ἡχθῶσιν γὰρ ἀπὸ τῶν
 Λ , Z τιμύσαι αἱ ΛZ ,
 $Z O$ · ὡς ἀλλήλοισι ἄρα εἰσὶ τῆς AG , BA . ἀπὸ τῆς
 B ἡχθῶσιν ἡ ὀρθία τῆς BA ἡ $B\Pi$ · φανερόν δὲ ὅτι ἐστὶν
ὡς ἡ ΠB πρὸς BA ὅπως τὸ ἀπὸ AG πρὸς τὸ
ἀπὸ BA , ὅτι τὸ ἀπὸ AE πρὸς τὸ ἀπὸ EB , καὶ
τὸ ἀπὸ $Z O$ πρὸς τὸ ἀπὸ $BO\Delta$, καὶ τὸ ἀπὸ
 $\Gamma Z A$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΛZ · ἐστὶν ἄρα ὡς ἐν τῶν
ἡγεμένων πρὸς ἐν τῶν ἐπομένων ὅπως ἀπαντα
τὰ ἡγεύμενα πρὸς ἀπαντα τὰ ἐπούμενα· ὡς ἄρα
τὸ ἀπὸ AG πρὸς τὸ ἀπὸ BA ὅπως τὸ ἀπὸ
 $\Gamma Z A$ μετὰ τῆς ἀπὸ AE καὶ τῆς ἀπὸ OZ , τετίστι
τῆς ἀπὸ $E\Theta$, πρὸς τὸ ἀπὸ $\Delta O B$ μετὰ τῆς
ἀπὸ BE καὶ τῆς ἀπὸ ΛZ , τετίστι τῆς ἀπὸ ME .
ἀλλὰ τὸ μὲν ἀπὸ $\Gamma Z A$ μετὰ τῆς ἀπὸ AE
ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ ZE , τὸ δὲ ἀπὸ $\Delta O B$ μετὰ
τῆς ἀπὸ BE ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ OE · ὡς ἄρα
τὸ ἀπὸ AG πρὸς τὸ ἀπὸ BA ὅπως τὸ ἀπὸ ZE ,
 $E\Theta$ πρὸς τὸ ἀπὸ OE , EM , τετίστι τὸ ἀπὸ ΛM , MH
πρὸς τὸ ἀπὸ $Z\Theta$, ΘH . καὶ ἔστι τὸ μὲν ἀπὸ ΛM ,



PROP. XXVIII. Theor.

Si in oppositis sectionibus conjugatis
diametri conjugatæ ducantur, qua-
rum altera recta sit, altera transversa;
& ducantur duæ rectæ lineæ diame-
tris parallelæ, quæ & sibi ipsis & se-
ctionibus occurrant: quadrata ex
portionibus lineæ rectæ diametro pa-
rallelæ, quæ inter linearum occur-
sum & sectiones interjiciuntur, ad
quadrata ex portionibus alterius li-
neæ, quæ transversæ diametro æqui-
distat, inter sectiones & occursum li-
nearum interjectis, eandem rationem
habent quam rectæ diametri qua-
dratum ad quadratum transversæ.

Sint oppositæ sectiones conjugatæ AB , GD ,
quarum diameter quidem, recta sit AE , GD ,
transversa vero BE , Δ : &
ipsis parallelæ ducantur
 $ZH\Theta K$, $\Lambda H M N$, quæ
& sibi ipsis & sectioni-
bus occurrant. dico qua-
drata ex ΛH , $H N$ ad qua-
drata ex $Z H$, $H K$ eandem
rationem habere quam
quadratum ex AG ad qua-
dratum ex BA .


A punctis enim Λ , Z
ordinatim applicentur ΛZ ,
 $Z O$, quæ parallelæ erunt diametris AG , BA . &
à puncto B ducatur ipsius BA rectum latus
 $B\Pi$: itaque constat [per 20. 6.] ut ΠB ad BA
ita esse quadratum ex AG ad quadratum ex BA ,
& [per 15. 5.] quadratum ex AE ad quadratum
ex EB ; & [per 21. 1. huj.] quadratum ex $Z O$ ad
ad rectangulum $BO\Delta$; & rectangulum $\Gamma Z A$ ad
quadratum ex ΛZ : est igitur [per 12. 5.] sicut
unum antecedentium ad unum consequentium
ita antecedentia omnia ad omnia consequentia:
quare ut quadratum ex AG ad quadratum ex BA
ita rectangulum $\Gamma Z A$ una cum quadrato ex AB
& quadrato ex OZ , hoc est quadrato ex $E\Theta$, ad
rectangulum $\Delta O B$ una cum quadrato ex BE &
quadrato ex ΛZ , hoc est quadrato ex ME . sed
[per 6.2.] rectangulum $\Gamma Z A$ una cum quadrato ex
 AE æquale est quadrato ex ZE , & rectangulum
 $\Delta O B$ una cum quadrato ex BE æquale quadrato
 OE : ergo ut quadratum ex AG ad quadratum ex
 BA ita sunt quadrata ex ZE , $E\Theta$ ad quadrata ex
 OE , EM , hoc est quadrata ex ΛM , MH ad qua-
drata ex $Z\Theta$, ΘH . quadratorum autem ex ΛM ,
 MH

SIT ellipsis vel circuli circumferentia $AB\Gamma\Delta$,
cujus centrum B ; ducanturque ipsius duæ
conjugatæ diametri, recta quidem $AE\Gamma$, tranf-
versa vero $BE\Delta$; & ducantur $KZAM, NZH\Theta$,
quæ ipsis $AE, B\Delta$ æquidistant: dico quadrata
ex $NZ, Z\Theta$, una cum figuris ex KZ, ZM si-
milibus & similiter descriptis ei quæ fit ad AE ,
quadrato ex $B\Delta$ æqualia esse.

Ducatur enim à puncto N recta NZ parallela
 AE ; ergo ad $B\Delta$ ordinatim applicata erit. &
 $B\Pi$ sit rectum figuræ latus. quoniam igitur ut
 $B\Pi$ ad AE ita est AE ad $B\Delta$; erit [per 20. &
22. 6.] ut $B\Pi$ ad $B\Delta$ ita quadratum ex AE ad
quadratum ex $B\Delta$. quadratum autem ex $B\Delta$
[per 17. 6. & 15. 1. huj.] est æquale figuræ quæ
ad AE constituitur: ergo ut $B\Pi$ ad $B\Delta$ ita qua-
dratum ex AE ad figuram quæ est ad AE . sed
[per 22. 6.] ut quadratum ex AE ad figuram
quæ ad AE ita quadratum ex NZ ad figuram
quæ fit ex NZ similem ei quæ ad AE : ergo
ut ΠB ad $B\Delta$ ita quadratum ex NZ ad figu-
ram quæ fit ex NZ similem ei quæ ad AE . est
autem [per 21. 1. huj.] & ut ΠB ad $B\Delta$ ita qua-
dratum ex NZ ad rectangulum $B\Xi\Delta$: quare [per

ΕΣΤΩ γὰρ ἑλλήψις ἡ κύκλος περιφέρεια ἡ
 $AB\Gamma\Delta$, ἥς κέντρον τὸ E , καὶ ἡχοῦσται αὐτῆς
δύο συζυγεῖς διαμέτροι, ὀρθὰ μὲν ἡ $AE\Gamma$, πλά-
για δὲ ἡ $BE\Delta$, ἐκ τῶν δὲ πᾶς $AE, B\Delta$ ἡχοῦσται αἱ
 $KZAM, NZH\Theta$ λέγω ὅτι τὰ ἀπὸ τῶν $NZ, Z\Theta$ τε-
τραγώνων, προσλαβόντα τὰ ἀπὸ τῶν KZ, ZM εἰδη
ὁμοία ἐστὶν ὁμοίως ἀναγεγραμμένα τῷ πρὸς τῇ AE
εἰδει, ἴσιν ἔσται τῷ ἀπὸ τῆς $B\Delta$ τετραγώνου.

Ἠχοῦσται ἀπὸ τοῦ N τῶν AE ἡ NZ . πτε-
γμῶντος ἄρα κατῆκται ὅπῃ τὸ $B\Delta$. καὶ ἔσται
ὀρθὰ ἡ $B\Pi$. ἐπεὶ ἔν ἐστιν ὡς ἡ $B\Pi$ πρὸς AE
ἔσται ἡ AE πρὸς $B\Delta$. καὶ ὡς ἄρα ἡ $B\Pi$ πρὸς
 $B\Delta$ ἔσται τὸ ἀπὸ AE πρὸς τὸ ἀπὸ $B\Delta$. τὸ
δὲ ἀπὸ $B\Delta$ ἴσιν ἐστὶ τῷ πρὸς τῇ AE εἰδει. ἔστιν
ἄρα ὡς ἡ $B\Pi$ πρὸς $B\Delta$ ἔσται τὸ ἀπὸ AE τε-
τραγώνων πρὸς τὸ ἀπὸ AE εἰδος. ὡς δὲ τὸ ἀπὸ
 AE τετραγώνων πρὸς τὸ ἀπὸ AE εἰδος ἔσται τὸ ἀπὸ
 NZ τετραγώνων πρὸς τὸ ἀπὸ NZ εἰδος ὁμοίον τῷ
πρὸς τῇ AE εἰδει. καὶ ὡς ἄρα ἡ ΠB πρὸς $B\Delta$ ἔσται
τὸ ἀπὸ NZ τετραγώνων πρὸς τὸ ἀπὸ NZ εἰδος
ὁμοίον τῷ πρὸς τῇ AE εἰδει. ἔστι δὲ καὶ ὡς ἡ ΠB πρὸς
 $B\Delta$ ἔσται τὸ ἀπὸ NZ πρὸς τὸ ὑπὸ $B\Xi\Delta$ ἴσιν ἄρα



9. 5.] figura quæ fit ex NZ , hoc est ex $Z\Lambda$, si-
milis ei quæ ad AE , rectangulo $B\Xi\Delta$ est æqua-
lis. eodem modo demonstrabimus figuram quæ
fit ex KL similem illi quæ ad AE rectangulo
 $B\Lambda\Delta$ æqualem esse. & quoniam recta linea $N\Theta$
secatur in partes æquales in H & in partes inæ-
quales in Z ; quadrata ex $\Theta Z, ZN$ [per 9. 2.]
dupla sunt quadratorum ex $\Theta H, HZ$, hoc est
ex NH, HZ . eadem quoque ratione quadrata ex
 MZ, ZK quadratorum ex KL, LZ sunt dupla;
& [per 22. 6.] figuræ quæ fiunt ex MZ, ZK simi-
les ei quæ ad AE duplæ sunt figurarum simi-
lium quæ ex KL, LZ . figuræ autem quæ fiunt
ex KL, LZ rectangulis $B\Lambda\Delta, B\Xi\Delta$ [ut modo
ostensum] sunt æquales; & quadrata ex NH, HZ
æqualia sunt quadratis ex $\Xi B, B\Lambda$: ergo qua-
drata ex $NZ, Z\Theta$, una cum figuris ex KZ, ZM
similibus ei quæ ad AE , dupla sunt rectangulo-
rum $B\Xi\Delta, B\Lambda\Delta$ & quadratorum ex $\Xi B, B\Lambda$.
itaque quoniam recta $B\Delta$ secatur in partes æ-
quales in E & in inæquales in Ξ , rectangulum
 $B\Xi\Delta$ [per 5. 2.] una cum quadrato ex ΞB
æquale est quadrato ex BE : similiter & rectan-
gulum $B\Lambda\Delta$ una cum quadrato ex ΛE æquale
est quadrato ex BE : quare rectangula $B\Xi\Delta$,

ἐστὶ τὸ ἀπὸ NZ εἰδος (τῆς περὶ τὸ ἀπὸ $Z\Lambda$) ὁμοίον τῷ
πρὸς τῇ AE εἰδει, τῷ ὑπὸ $B\Xi\Delta$. ὁμοίως δὲ δεῖξομεν
ὅτι τὸ ἀπὸ KL εἰδος, ὁμοίον τῷ πρὸς τῇ AE εἰδει,
ἴσιν τῷ ὑπὸ $B\Lambda\Delta$. καὶ ἐπεὶ εὐθεία ἡ $N\Theta$
πέτμηται εἰς μὲν ἴσιν κατὰ τὸ H , εἰς δὲ ἀνίσιν
κατὰ τὸ Z , τὰ ἀπὸ τῶν $\Theta Z, ZN$ τετραγώνων δι-
πλασία ἐστὶ τῶν ἀπὸ $\Theta H, HZ$, τῆς περὶ τῶν
ἀπὸ NH, HZ . διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ τὰ ἀπὸ
 MZ, ZK τετραγώνων διπλασία ἐστὶ τῶν ἀπὸ KL, LZ
τετραγώνων, καὶ τὰ ἀπὸ MZ, ZK εἰδη (ὁ-
μοία τῷ πρὸς τῇ AE εἰδει) διπλασία ἐστὶ τῶν
ἀπὸ KL, LZ ὁμοίων εἰδῶν. ἴσιν δὲ ἐστὶ τὰ μὲν ἀπὸ
 KL, LZ εἰδη τῆς ὑπὸ $B\Lambda\Delta, B\Xi\Delta$, τὰ δὲ ἀπὸ
 NH, HZ τετραγώνων τῆς ἀπὸ $\Xi B, B\Lambda$. τὰ ἄρα
ἀπὸ $NZ, Z\Theta$ τετραγώνων μετὰ τῶν ἀπὸ KZ, ZM
εἰδῶν (ὁμοίων τῷ πρὸς τῇ AE εἰδει) διπλασία ἐστὶ
τῶν ὑπὸ $B\Xi\Delta, B\Lambda\Delta$ καὶ τῶν ἀπὸ $\Xi B, B\Lambda$. ἔπει-
τα εὐθεία ἡ $B\Delta$ πέτμηται εἰς μὲν ἴσιν κατὰ τὸ E , εἰς
δὲ ἀνίσιν κατὰ τὸ Ξ , τὸ ὑπὸ $B\Xi\Delta$ μετὰ τῶν ἀπὸ ΞB
ἴσιν ἐστὶ τῷ ἀπὸ BE . ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ὑπὸ $B\Lambda\Delta$
μετὰ τῶν ἀπὸ ΛE ἴσιν ἐστὶ τῷ ἀπὸ BE . * ὥστε τὰ
ὑπὸ $B\Xi\Delta$ καὶ ὑπὸ $B\Lambda\Delta$ ἐστὶ τὰ ἀπὸ $\Xi B, B\Lambda$ ἴσιν
ἐστὶ

* Vide Lemma quintum Pappi in hunc librum.

ἐστὶ τῷ δὲ $\lambda\theta\omicron$ BE · τὰ ἄρα $\lambda\theta\omicron$ NZ , $Z\Theta$ πε-
τεράγωνα μετὰ τῶν ἀπὸ KZ , ZM εἰδῶν (ὁμοίων
τῷ πρὸς τῇ AG εἶδει) διπλασιάει τὴν δὲ ἀπὸ
 BE · ἐστὶ δὲ καὶ τὸ ἀπὸ BA διπλασίον τῆς δὲ ἀπὸ
 BE · τὰ ἄρα ἀπὸ NZ , $Z\Theta$ πετεράγωνα, πρὸς λα-
βόντα τὰ ἀπὸ KZ , ZM εἶδη ὁμοία τῷ πρὸς τῇ AG
εἶδει, ἴσα ἔσται τὰ ἀπὸ BA .

$BA\Delta$ & quadrata ex ZE , AE æqualia sunt du-
plo quadrati ex BE : quadrata igitur ex NZ , $Z\Theta$,
una cum figuris ex KZ , ZM similibus ei quæ ad
 AG , dupli quadrati ex BE sunt dupla. atqui
quadratum ex BA duplum est dupli quadrati ex
 BE : ergo quadrata ex NZ , $Z\Theta$ una cum figuris
ex KZ , ZM similibus ei quæ ad AG , quadrato
ex BA æqualia erunt.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ κη'.

Εἰάν ἐι ταῖς $\chi\epsilon'$ συζυγίαι ἀντικείμεναι συζυγεῖς
ἀξόμετροι ἀχθῶσι, καὶ λέγηται αὐτῶν ἡ μὲν ὀρθία,
ἡ δὲ πλαγία, ἀχθῶσι δὲ παρ' αὐταῖς δύο
εὐθείαι συμπίπτουσαι ἀλλήλαις καὶ ταῖς τομῇς·
τὰ $\lambda\theta\omicron$ τῶν $\lambda\theta\omicron$ ἀπολαμβανομένων εὐθειῶν, ἐπ' εὐ-
θείας τῶν $\lambda\theta\omicron$ ὀρθίαι ἡμεδύνει μεταξὺ τῶν συμ-
πίπτουσιν τῶν εὐθειῶν καὶ τῶν τομῶν, πετεράγωνα
πρὸς τὰ ἀπὸ τῶν $\lambda\theta\omicron$ ἀπολαμβανομένων εὐθειῶν,
ἐπ' εὐθείας τῶν $\lambda\theta\omicron$ παρὰ τὴν πλαγίαν ἡμεδύνει
μεταξὺ τῶν συμπίπτουσιν τῶν εὐθειῶν καὶ τῶν τομῶν,
πετεράγωνα λόγον ἔχει ὅτι τὸ ἀπὸ τῶν ὀρθίαι
πετεράγωνα πρὸς τὸ ἀπὸ τῶν πλαγίας.

PROP. XXVIII. Theor.

Si in oppositis sectionibus conjugatis
diametri conjugatæ ducantur, qua-
rum altera recta sit, altera transversa;
& ducantur duæ rectæ lineæ diame-
tris parallelæ, quæ & sibi ipsis & se-
ctionibus occurrant: quadrata ex
portionibus lineæ rectæ diametro pa-
rallæ, quæ inter linearum occur-
sum & sectiones interjiciuntur, ad
quadrata ex portionibus alterius li-
neæ, quæ transversæ diametro æqui-
distat, inter sectiones & occursum li-
nearum interjectis, eandem rationem
habent quam rectæ diametri qua-
dratum ad quadratum transversæ.

Εἰσὶ τῶν $\lambda\theta\omicron$ κατὰ συζυγίαν ἀντικείμεναι αἱ
 AB , GD , ἀξόμετροι δὲ αὐτῶν ὀρθία μὲν ἡ
 AE , GD , πλαγία δὲ ἡ BE , AD ,
καὶ παρ' αὐταῖς ἡχθῶσιν
αἱ $ZH\Theta K$, $\Lambda H M N$ τί-
μνυσαι ἀλλήλαις καὶ τὰς το-
μὰς· λέγω ὅτι τὰ ἀπὸ τῶν
 ΛH , $H N$ πετεράγωνα πρὸς
τὰ ἀπὸ $Z H$, $H K$ λόγον ἔχει
ὅτι τὸ ἀπὸ τῆς AG πρὸς
τὸ ἀπὸ BA .



ἡχθῶσιν γὰρ ἀπὸ τῶν
 Λ , Z πετεράγωνα αἱ ΛZ ,
 $Z O$ · ὡς ἀλλήλοις ἄρα εἰσὶ τῶν AG , BA . ἀπὸ τῶν
 B ἡχθῶσιν ἡ ὀρθία τῶν BA ἡ $B\Pi$ · φανερόν δὲ ὅτι ἐστὶν
ὡς ἡ ΠB πρὸς BA ἔστω τὸ ἀπὸ AG πρὸς τὸ
ἀπὸ BA , ἔστω τὸ ἀπὸ AE πρὸς τὸ ἀπὸ EB , καὶ
τὸ ἀπὸ $Z O$ πρὸς τὸ ἀπὸ $BO\Delta$, καὶ τὸ ἀπὸ
 $\Gamma Z A$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΛZ · ἐστὶν ἄρα ὡς ἐν τῶν
ἡμεδύνων πρὸς ἐν τῶν ἐπομένων ἔστω ἀπαντα
τὰ ἡμεδύμενα πρὸς ἀπαντα τὰ ἐποδύμενα· ὡς ἄρα
τὸ ἀπὸ AG πρὸς τὸ ἀπὸ BA ἔστω τὸ ἀπὸ
 $\Gamma Z A$ μετὰ τῆς ἀπὸ AE καὶ τῆς ἀπὸ OZ , τέστι
τῆς ἀπὸ $E\Theta$, πρὸς τὸ ἀπὸ $\Delta O B$ μετὰ τῆς
ἀπὸ BE καὶ τῆς ἀπὸ ΛZ , τέστι τῆς ἀπὸ $M E$.
ἀλλὰ τὸ μὲν ἀπὸ $\Gamma Z A$ μετὰ τῆς ἀπὸ AE
ἴσων ἐστὶ τῷ ἀπὸ ΞE , τὸ δὲ ἀπὸ $\Delta O B$ μετὰ
τῆς ἀπὸ BE ἴσων ἐστὶ τῷ ἀπὸ $O E$ · ὡς ἄρα
τὸ ἀπὸ AG πρὸς τὸ ἀπὸ BA ἔστω τὸ ἀπὸ ΞE ,
 $E\Theta$ πρὸς τὸ ἀπὸ $O E$, $E M$, τέστι τὸ ἀπὸ ΛM , $M H$
πρὸς τὸ ἀπὸ $Z\Theta$, ΘH . καὶ ἐστὶ τὸ μὲν ἀπὸ ΛM ,

SINT oppositæ sectiones conjugatæ AB , GD ,
quarum diameter quidem recta sit AE ,
transversa vero BE : & ipsis parallelæ ducantur
 $ZH\Theta K$, $\Lambda H M N$, quæ
& sibi ipsis & sectioni-
bus occurrant. dico qua-
drata ex ΛH , $H N$ ad qua-
drata ex $Z H$, $H K$ eandem
rationem habere quam
quadratum ex AG ad qua-
dratum ex BA .

A punctis enim Λ , Z
ordinatim applicentur ΛZ ,
 $Z O$, quæ parallelæ erunt diametris AG , BA . &
à puncto B ducatur ipsius BA rectum latus
 $B\Pi$: itaque constat [per 20. 6.] ut ΠB ad BA
ita esse quadratum ex AG ad quadratum ex BA ,
& [per 15. 5.] quadratum ex AE ad quadratum
ex EB ; & [per 21. 1. huj.] quadratum ex $Z O$ ad
ad rectangulum $BO\Delta$; & rectangulum $\Gamma Z A$ ad
quadratum ex ΛZ : est igitur [per 12. 5.] sicut
unum antecedentium ad unum consequentium
ita antecedentia omnia ad omnia consequentia:
quare ut quadratum ex AG ad quadratum ex BA
ita rectangulum $\Gamma Z A$ una cum quadrato ex ΛB
& quadrato ex OZ , hoc est quadrato ex $E\Theta$, ad
rectangulum $\Delta O B$ una cum quadrato ex BE &
quadrato ex ΛZ , hoc est quadrato ex $M E$. sed
[per 6.2.] rectangulum $\Gamma Z A$ una cum quadrato ex
 ΛE æquale est quadrato ex ZE , & rectangulum
 $\Delta O B$ una cum quadrato ex BE æquale quadrato
 $O E$: ergo ut quadratum ex AG ad quadratum ex
 BA ita sunt quadrata ex ZE , $E\Theta$ ad quadrata ex
 $O B$, $E M$, hoc est quadrata ex ΛM , $M H$ ad qua-
drata ex $Z\Theta$, ΘH . quadratorum autem ex ΛM ,
 $M H$

MM dupla sunt quadrata ex ΛH , HN , ut [ad 9. 2.] demonstratum est; & quadratorum ex $Z\Theta$, ΘH quadrata ex ZH , HK sunt dupla: ut igitur quadratum ex $\Lambda\Gamma$ ad quadratum ex $B\Delta$ ita quadrata ex ΛH , HN ad quadrata ex ZH , HK .

ΜΗ διπλάσια τὰ ἀπὸ ΛH , HN , ὡς δὲ δεικνύει· τὸ δὲ ἀπὸ $Z\Theta$, ΘH τὰ ἀπὸ ZH , HK · καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ $\Lambda\Gamma$ πρὸς τὸ ἀπὸ $B\Delta$ ἔτι καὶ τὰ ἀπὸ ΛH , HN πρὸς τὰ ἀπὸ ZH , HK .


PROP. XXIX. Theor.

Iisdem positis, si linea rectæ diametro parallela fecet asymptotos: quadrata ex portionibus ipsius quæ inter linearum occursum & asymptotos interjiciuntur, una cum dimidio quadrati facti è recta diametro, ad quadrata ex portionibus ejus quæ transversæ diametro æquidistant inter occursum linearum & sectiones interjectis, eandem rationem habent quam rectæ diametri quadratum ad quadratum transversæ.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κθ'.

Τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων, εἰν ἡ τῇ ὀρίᾳ παραλλήλος τέμνη τὰς ἀσυμπίπτους· τὰ ἀπὸ τῆς διπλάσιοις εὐθείᾳ, ἐπ' εὐθείας τὴν παρατὴ ὀρίαν ἡγμένης μεταξὺ τῆς συμπίπτουσας τῆς εὐθείας καὶ τῆς ἀσυμπίπτουσας, πρὸς λαβόντα τὸ ἡμῶν ἔστω ἀπὸ τῆς ὀρίας τετραγώνου, πρὸς τὰ ἀπὸ τῆς διπλάσιοις εὐθείας, ἐπ' εὐθείας τὴν παρατὴ πλαγίαν ἡγμένης μεταξὺ τῆς συμπίπτουσας τῆς εὐθείας καὶ τῆς τομῆς, τετράγωνον λόγῳ ἔχει ὅτι τὸ ἀπὸ τῆς ὀρίας τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς πλαγίας τετράγωνον.

SINT eadem quæ supra, & recta ΛN fecet asymptotos in punctis Z , O ; demonstrandum est quadrata ex ZH , HO , una cum dimidio quadrati ex $\Lambda\Gamma$ (hoc est duplo quadrati ex $E\Lambda$, hoc est [per 10.2.huj.] duplo rectanguli ΛZN) ad quadrata ex ZH , HK eandem rationem habere quam quadratum ex $\Lambda\Gamma$ ad quadratum ex $B\Delta$.




ΕΣΤΩ γὰρ τὰ αὐτὰ πῶς πρότερον, ἡ δὲ ΛN πηγάτω τὰς ἀσυμπίπτους κατὰ τὰς Z , O . δεικνύειν ὅτι τὰ ἀπὸ ZH , HO , πρὸς λαβόντα τὸ ἡμῶν τὴν ἀπὸ $\Lambda\Gamma$ (τετρίσι τὸ δις ἀπὸ $E\Lambda$, τετρίσι τὸ δις ὑπὸ ΛZN) πρὸς τὰ ἀπὸ ZH , HK λόγῳ ἔχει ὅτι τὸ ἀπὸ $\Lambda\Gamma$ πρὸς τὸ ἀπὸ $B\Delta$.

* Quoniam enim ΛZ [per 16.2.huj.] æqualis est ON , quadrata ex ΛH , HN superant [per 6.lem.3.huj.] quadrata ex ZH , HO duplo rectanguli ΛZN : ergo quadrata ex ZH , HO una cum duplo quadrati ex ΛE æqualia sunt quadratis ex ΛH , HN . sed [per 28.3.huj.] quadrata ex ΛH , HN ad quadrata ex ZH , HK eandem habent rationem quam quadratum ex $\Lambda\Gamma$ ad quadratum ex $B\Delta$: quadrata igitur ex ZH , HO una cum duplo quadrati ex $E\Lambda$ ad quadrata ex ZH , HK eandem rationem habent quam quadratum ex $\Lambda\Gamma$ ad quadratum ex $B\Delta$.

EUTOCIUS.

* Quoniam enim ΛZ æqualis est ON ; quadrata ex ΛH , HN superant quadrata ex ZH , HO , duplo rectanguli ΛZN . * Sit recta linea ΛN , auferanturque ab ipsa æquales ΛZ , NO , & figura describatur. manifestum est, ob similitudinem & propterea quod ΛZ est æqualis ipsi ON , quadrata $\Lambda\Gamma$, ΔN , ΛK , MB inter se æqualia esse. quoniam igitur quadrata quæ fiunt ex ΛH , HN sunt quadrata ΛZ , ZN , & quæ ex $H Z$, HO sunt $K Z$, $Z\Delta$; sequitur quod quadrata ex ΛH , HN superant quadrata ex ZH , HO gnomonibus $\Sigma P X$, $T\Theta Y$. & quoniam rectangulum $H\Delta$ est æquale rectangulo $M\Pi$, & rectangulum $E I$ ipsi $M\Theta$; erunt gnomones $\Sigma P X$, $T\Theta Y$ æquales rectangulis ΔM , ΔB . sed ΔM est æquale $\Delta\Delta$,



* Επει γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ ΛZ τῇ ON , τὰ ἀπὸ ΛH , HN τῇ ZH , HO ὑπερέχει τῷ δις ὑπὸ ΛZN .] Ἐστὶν οὖν εἰς ΛN , καὶ ἀφαιρέσας ἀπ' αὐτῆς ἴσας αἱ ΛZ , NO . καὶ γὰρ ἴσους τὸ ἄνωμα. φανερὸν δὲ ὅτι ἐκ τῆς ὁμοιότητος καὶ τῆς ἴσης εἶναι πλεονάζει τῇ ON , τὰ $\Lambda\Gamma$, $N\Delta$, ΛK , MB τετράγωνα ἴσα εἶναι ἀλλήλοις. ἐπει ἐν τῇ ΛH , HN τὰ ΛZ , ZN εἶναι, τὰ δὲ ὑπὸ ZH , HO εἶναι τὰ $K Z$, $Z\Delta$. τὰ ἄρα ὑπὸ ΛH , HN τῇ ZH , HO ὑπερέχει τῶς $\Sigma P X$, $T\Theta Y$ γνόμωνι. καὶ ἐπει ἴσους εἶναι τὸ $H\Delta$ τῷ $M\Pi$, τὸ δὲ $B I$ τῷ $M\Theta$, αἱ $\Sigma P X$, $T\Theta Y$ γνόμωνες ἴσαι εἶναι τῷ ΔM καὶ τῷ ΔB . τὸ δὲ ΔM τῷ $\Delta\Delta$ ἴσον, καὶ τὰ $\Delta\Delta$, ΔB ἴσα εἶναι τῷ $\Delta\Delta$.

* Vide aliam hujus rei demonstrationem ad VI. Pappi Lemma.

ἔστι ὑπὸ $\Lambda \Xi \text{N}$, τὸ αὐτὸ ὑπὸ $\Lambda \text{O} \text{N}$. καὶ ἄρα ὑπὸ $\Gamma \Lambda \text{H}$ ἢ HN , τὸ αὐτὸ τῷ ΛZ , ZN , ὅτι ὑπὸ ΞH , HO , τὸ αὐτὸ ΓKZ , $\text{Z}\Delta$, ὑπερέχει τῷ δ ὑπὸ $\Lambda \Xi \text{N}$, ἵτοι τῷ $\Lambda \Delta$, ΔB ἰσογώνως.


& rectangula $\Delta \Lambda$, ΔB simul sunt dupla contenti sub $\Lambda \Xi \text{N}$, hoc est sub $\Lambda \text{O} \text{N}$. ergo quadrata ex ΛH , HN , hoc est ΛZ , ZN , superant quadrata ex ΞH , HO , hoc est KZ , $\text{Z}\Delta$, duplo rectanguli $\Lambda \Xi \text{N}$, hoc est rectangulis $\Delta \Lambda$, ΔB .

ΠΡΟΤΑΣΙΣ λ'.

Εάν ὑπερβολῆς δύο εὐθεῖαι ἐφαπτόμεναι συμπίπτωσι, καὶ ἀλλὰ μὴ ἴσας εὐθεῖαι ἐκβληθῇ, ἀλλὰ δὲ τὴν συμπίπτουσαν ἀχθῇ εὐθεῖα ὁρῶντινα ἴσους ἐκτείνονται, τέμνεται τὴν περὶ τομῆν καὶ τὴν τὰς ἀφ' αὐτῶν ἐκτείνονται ἢ μεταξὺ τῶν συμπίπτουσιν καὶ τὴν τὰς ἀφ' αὐτῶν ἐκτείνονται δὲ τὰς τμήσεις αὐτῶν τὴν τομῆν.

ΕΣΤΩ ὑπερβολὴ ἡ $\text{AB}\Gamma$, καὶ ἐφαπτόμεναι μὲν αἱ $\Lambda \Delta$, $\Delta \Gamma$, ἀσύμπτωτοι δὲ αἱ EZ , ZH , καὶ ἐπιζεύχθω ἡ $\Lambda \Gamma$, καὶ ἀλλὰ τῷ Δ ὁρῶντι τὴν ZE ἢ ZH ἢ $\Delta \text{K}\Lambda$. λέγω ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΔK τῇ $\text{K}\Lambda$.

Επιζεύχθω γὰρ ἡ $\text{Z}\Delta \text{BM}$, ἡ ἐκτείνουσα ἐφ' ἐκείνῃ, καὶ κείνῃ τῇ BZ ἴση ἡ $\text{Z}\Theta$, καὶ ἀλλὰ τῶν B , K σημείων ὁρῶντι τὴν $\Lambda \Gamma$ ἢ ZH ὁρῶντι αἱ BE , KN . περὶ μὲν αὐτῶν καὶ ἡγησάμεθα ἐπὶ. Ἐπειὶ ὁμοίον ἐστὶ τὸ ZEB τριγώνον τῷ ΔKN , ἐστὶν ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ ΔN πρὸς τὸ ἀπὸ NK ἕως τὸ ἀπὸ BZ πρὸς τὸ ἀπὸ BE . ὡς δὲ τὸ ἀπὸ BZ πρὸς τὸ ἀπὸ BE ἕως ἡ ΘB πρὸς τὴν ὁρῶντι καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ΔN πρὸς τὸ ἀπὸ NK ἕως ἡ ΘB πρὸς τὴν ὁρῶντι. ἀλλὰ ὡς ἡ ΘB πρὸς τὴν ὁρῶντι ἕως τὸ ἀπὸ ΘNB πρὸς τὸ ἀπὸ NK καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ΔN πρὸς τὸ ἀπὸ NK ἕως τὸ ἀπὸ ΘNB πρὸς τὸ ἀπὸ NK ἵσον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ ΘNB τῷ ἀπὸ ΔN . ἐπὶ δὲ καὶ τὸ ἀπὸ $\text{MZ}\Delta$ ἵσον τῷ ἀπὸ ZB , διότι ἡ μὲν $\Lambda \Delta$ ἐφαπτομένη, ἡ δὲ ΛM κατὰ τὴν καὶ τὸ ἀπὸ ΘNB μετὰ τῷ ἀπὸ ZB ἵσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ $\text{MZ}\Delta$ μετὰ τῷ ἀπὸ ΔN . τὸ δὲ ἀπὸ ΘNB μετὰ τῷ ἀπὸ ZB ἵσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ ZN . καὶ τὸ ἀπὸ $\text{MZ}\Delta$ ἄρα μετὰ τῷ ἀπὸ ΔN ἵσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ ZN . * ἡ ἄρα ΔM διχα πύπτει κατὰ τὸ N , περὶ αὐτὴν ἔχουσα τὴν ΔZ . καὶ ὁρῶντι αἱ KN , ΛM ἴση ἄρα ἡ ΔK τῇ $\text{K}\Lambda$.



SIT hyperbola $\text{AB}\Gamma$, quam contingant rectæ lineæ $\Lambda \Delta$, $\Delta \Gamma$; asymptoti vero sint EZ , ZH ; & iuncta $\Lambda \Gamma$, ducatur per Δ recta $\Delta \text{K}\Lambda$ parallela ipsi ZE : dico ΔK ipsi $\text{K}\Lambda$ æqualem esse.

Jungatur enim $\text{Z}\Delta \text{BM}$ & ex utraque parte producat, ut sit $\text{Z}\Theta$ æqualis ipsi BZ ; & per B , K ducantur BE , KN parallelæ ipsi $\Lambda \Gamma$, quæ ordinatim applicatæ erunt. & quoniam triangulum ZEB simile est [per 4.6.] triangu-

lo ΔKN ; erit [per 22.6.] ut quadratum ex ΔN ad quadratum ex NK ita quadratum ex BZ ad quadratum ex BE . ut autem quadratum ex BZ ad quadratum ex BB ita [ex 1.2. huj.] est ΘB ad rectum latus: quare ut quadratum ex ΔN ad quadratum ex NK ita ΘB ad rectum latus. sed [per 21.1. huj.] ut ΘB ad rectum latus ita rectangulum ΘNB ad quadratum ex NK : ut igitur quadratum ex ΔN ad quadratum ex NK ita ΘNB rectangulum ad quadratum ex NK : ergo [per 9.5.] rectangulum ΘNB quadra-

to ex ΔN est æquale. est autem [per 37.1. huj.] rectangulum $\text{MZ}\Delta$ æquale quadrato ex ZB , propterea quod recta $\Lambda \Delta$ sectionem contingit, & ΛM ordinatim est applicata: quare rectangulum ΘNB una cum quadrato ex ZB æquale est rectangulo $\text{MZ}\Delta$ una cum quadrato ex ΔN . sed [per 6.2.] rectangulum ΘNB una cum quadrato ex ZB est æquale quadrato ex ZN : ergo & rectangulum $\text{MZ}\Delta$ una cum quadrato ex ΔN æquale est quadrato ex ZN : * & idcirco [per conv. 6.2.] recta ΔM ad punctum N bifariam secatur, adjunctam habens ΔZ . & parallelæ sunt KN , ΛM ; recta igitur ΔK [per 2.6.] ipsi $\text{K}\Lambda$ est æqualis.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ λα'.

Εάν ἴσας ἀντικειμέναι δύο εὐθεῖαι ἐφαπτόμεναι συμπίπτωσι, καὶ ἀλλὰ μὴ ἴσας εὐθεῖαι ἐκβληθῇ,

PROP. XXXI. Theor.

Si duæ rectæ oppositas sectiones contingentes sibi ipsis occurrant, & per

* Hic locus habet Lemma septimum Pappi.

B b b

tactus

tactus recta producat; per occursum vero ducatur recta asymptoto parallela, quæ sectionem & rectam tactus conjungentem secet: recta, inter occursum & eam quæ tactus conjungit interjecta, à sectione bifariam dividetur.

SINT oppositæ sectiones A, B, & rectæ contingentes AΓ, ΓΒ, junctaque AB producat; asymptotos vero sit ZE, & per Γ ducatur ΓΗΘ ipsi ZE parallela: dico ΓΗ æqualem esse ipsi ΗΘ.


Jungatur enim ΓΕ, & ad Δ producat: & per Ε, Η ducantur ΝΕΚΜ, ΗΞ ipsi AB parallelæ, & per Κ, Η ducantur ΚΖ, ΗΛ parallelæ ΓΔ. quoniam igitur triangulum ΚΖΒ simile est [per 4. 6.] triangulo ΜΛΗ, ut quadratum ex ΕΚ ad quadratum ex ΚΖ ita [per 22. 6.] quadratum ex ΜΛ ad quadratum ex ΛΗ. sed ut quadratum ex ΕΚ ad quadratum ex ΚΖ, ita demonstratum est [in antec.] ΝΛΚ rectangulum ad quadratum ex ΛΗ: ergo rectangulum ΝΛΚ quadrato ex ΜΛ est æquale.

commune apponatur quadratum ex ΚΕ: rectangulum igitur ΝΛΚ una cum quadrato ex ΚΕ, hoc est [per 6. 2.] quadratum ex ΛΕ, hoc est quadratum ex ΗΞ, æquale est quadratis ex ΜΛ, ΚΕ. ut autem quadratum ex ΗΞ ad quadrata ex ΜΛ, ΚΕ ita quadratum ex ΞΓ ad quadrata ex ΛΗ, ΚΖ, [propter similitudinem triangulorum ΓΞΗ, ΗΛΜ, ΖΚΕ.] ex quibus sequitur quadratum ex ΞΓ æquale esse quadratis ex ΗΛ, ΚΖ. atqui quadratum ex ΗΛ æquale est quadrato ex ΞΕ; & [per 1. 2. huj.] quadratum ex ΚΖ æquale quadrato ex dimidio secundæ diametri, hoc est [per 38. 1. huj.] rectangulo ΓΕΔ: quadratum igitur ex ΓΞ quadrato ex ΞΕ & rectangulo ΓΕΔ simul est æquale: *ac propterea [per convers. 5. 2.] recta ΓΔ in partes quidem æquales secatur ad punctum Ξ, in partes vero inæquales ad Ε. & ΔΘ parallela est ipsi ΗΞ; ergo [per 2. 6.] ΓΗ ipsi ΗΘ æqualis erit.

ΔΓ δὲ τὸ συμπύκνωσιν ἀχθῆναι εὐθεῖα πρὸς τὴν ἀσύμπτωτον, τέμνεται τὴν περὶ τομὴν καὶ τὰς ἀφ' αὐτῆς ἐκτεταγμένας. ἢ μεταξὺ τῶν συμπύκνωσιν καὶ τῶν ἀφ' αὐτῆς ἐκτεταγμένων διχα τμηθῆσθαι. ἔστω δὲ τὸ τομῆς.

ΕΣΤΩΣΑΝ ἀντικείμεναι αἱ Α, Β, ἐφαπτόμεναι τῇ ΑΒ ἐπὶ ΑΓ, ΓΒ, ὅθεν ἀχθῆσθαι ἡ ΑΒ ἐκτεταγμένη, ἀσύμπτωτος δὲ εἴω ἡ ΖΕ, καὶ ΔΓ δὲ ἔστω πρὸς τὴν ΖΕ ἡ ΓΗΘ ἡ ΓΗΘ. λέγω ὅτι ἴση εἴσιν ἡ ΓΗ τῇ ΗΘ.

Επιζεύξω ἡ ΓΕ, καὶ ἐκτεταγμένης ὅτι τὸ Δ, καὶ ΔΓ τῶν Ε, Η πρὸς τὴν ΑΒ ἡχθῶσιν



αἱ ΝΕΚΜ, ΗΞ, ΔΓ δὲ τῶν Κ, Η πρὸς τὴν ΑΒ αἱ ΚΖ, ΗΛ. ἐπεὶ ὅμοιον ἐστὶ τὸ ΚΖΕ τριγώνον τῷ ΜΛΗ, ἔστιν ὡς τὸ ΔΟΤ ΕΚ πρὸς τὸ ΔΟΤ ΚΖ ὅπως τὸ ΔΟΤ ΜΛ πρὸς τὸ ΔΟΤ ΛΗ. ὡς δὲ τὸ ΔΟΤ ΕΚ πρὸς τὸ ΔΟΤ ΚΖ δὲδεικται τὸ ὑπὸ

ΝΛΚ πρὸς τὸ ΔΟΤ ΛΗ* ἴσιν ἄρα τὸ ὑπὸ ΝΛΚ τῷ ΔΟΤ ΜΛ. κοινὸν προσκεκῶσθαι τὸ ἀπὸ ΚΕ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΝΛΚ μετὰ τῆς ἀπὸ ΚΕ, τετάρτη τὸ ἀπὸ ΛΕ, τετάρτη τὸ ΔΟΤ ΗΞ, ἴσιν ἐστὶ πῆς ἀπὸ ΜΛ, ΚΕ. ὡς δὲ τὸ ἀπὸ ΗΞ πρὸς τὰ ἀπὸ ΜΛ, ΚΕ ὅπως τὸ ΔΟΤ ΞΓ πρὸς τὰ ἀπὸ ΛΗ, ΚΖ· ἴσιν ἄρα τὸ ἀπὸ ΞΓ πῆς ἀπὸ ΗΛ, ΚΖ. ἴσιν δὲ τὸ μὲν ἀπὸ ΗΛ τῷ ἀπὸ ΞΕ, τὸ δὲ ἀπὸ ΚΖ τῷ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς δεύτερας διμέτρως, τετάρτη τῷ ὑπὸ ΓΕΔ· τὸ ἄρα ἀπὸ ΓΞ ἴσιν ἐστὶ τῷ π ἀπὸ ΞΕ καὶ τῷ ὑπὸ ΓΕΔ· * ἢ ἄρα ΓΔ διχα μὲν τέμνηται κατὰ τὸ Ξ, εἰς δὲ ἀνίστα κατὰ τὸ Ε. καὶ ὁμοειδὴς ἡ ΔΘ τῇ ΗΞ· ἴση ἄρα ἡ ΓΗ τῇ ΗΘ.

EUTOCIUS.

Potest etiam hoc theorema eodem modo demonstrari quo præcedens, cum duæ rectæ lineæ unam sectionem contingant. sed quoniam omnino idem est atque illud quod in una hyperbola demonstratum fuit, ipsa demonstratio ut superflua omiſſa est.

PROP. XXXII. Theor.

Si duæ rectæ hyperbolam contingentes sibi ipsis occurrant, & recta per tactus jungatur, & jungenti tactus recta parallela ducatur per contingentium occursum; perque punctum, quo bifecatur jungens tactus, ducatur


ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΛΓ'.

Εὰν ὑπερβολῆς δύο εὐθεῖαι ἐφαπτόμεναι συμπίπτουσιν, καὶ ἡ ΔΓ τὴν εὐθεῖαν ἐκτεταγμένην ἀχθῆναι, ΔΓ δὲ τὸ συμπύκνωσιν τὴν ἐφαπτομένην ἀχθῆναι εὐθεῖα παρὰ τὴν τὰς ἀφ' αὐτῆς ἐκτεταγμένας, ΔΓ δὲ τὸ διχοτομία καὶ τὰς ἀφ' αὐτῆς ἐκτεταγμένας

* Hic adhibetur Lemma Pappi octavum.

Ducantur ordinatim à punctis E, M rectæ EK, MZ parallelæ ipsi HΘ; & per M ducatur MΠ parallela ipsi ΛΔ. quoniam igitur, ex iis quæ ante demonstrata sunt, ut quadratum ex ΘΒ ad quadratum ex ΕΚ ita est rectangulum ΒΞΕ ad quadratum ex ΞΜ; erit [per 12. 5.] ut quadratum ex ΘΒ ad quadratum ex ΕΚ ita rectangulum ΒΞΕ una cum quadrato ex ΘΒ, hoc est [per 6.2.] quadratum ex

ΘΞ, ad quadrata ex ΚΕ, ΞΜ. quadratum autem ex ΚΕ ostensum est [ad 38. 1. huj.] æquale rectangulo HΘΛ, & quadratum ex ΞΜ æquale est quadrato ex ΘΠ: ut igitur quadratum ex ΘΒ ad quadratum ex ΕΚ ita quadratum ex ΘΞ, hoc est quadratum ex ΜΠ, ad rectangulum HΘΛ una cum quadrato ex ΘΠ. sed ut quadratum ex ΘΒ ad quadratum ex ΕΚ ita est [per 4. & 22. 6.] quadratum ex ΜΠ ad quadratum ex ΠΛ: quare ut quadratum ex ΜΠ ad quadratum ex ΠΛ ita quadratum ex ΜΠ ad rectangulum HΘΛ una cum quadrato ex ΘΠ; & propterea quadratum ex ΑΠ rectangulo HΘΛ una cum quadrato ex ΘΠ æquale erit: ergo [per conv. 5.2.] recta ΛΗ in partes æquales secatur ad Π & in partes inæquales ad Θ. & sunt quidem rectæ ΜΠ, ΗΝ parallelæ; est igitur ΑΜ [per 2.6.] ipsi ΜΝ æqualis.



Κατήχθωσαν γὰρ δὸτὸ ἤ Ε, Μ ὡς πρὶν πρὶν ΗΘ αἱ ΕΚ, ΜΞ, ἀλλὰ δὲ τὰς Μ ὡς πρὶν πρὶν ΑΔ ἡ ΜΠ. ἐπεὶ ἔν, ἀλλὰ πρὶν διδωμένη, ἔστιν ὡς τὸ δὸτὸ ΘΕ πρὸς τὸ δὸτὸ ΕΚ ὅπως τὸ ὑπὸ ΒΞΕ πρὸς τὸ δὸτὸ ΞΜ· ὡς ἄρα τὸ δὸτὸ ΘΕ πρὸς τὸ δὸτὸ ΕΚ ὅπως τὸ ὑπὸ ΒΞΕ μετὰ τὰς δὸτὸ ΘΕ, τέτληται τὸ δὸτὸ ΘΞ, πρὸς τὰς δὸτὸ ΚΕ, ΞΜ. πρὶν δὲ ἀπὸ ΚΕ ἴσων διδωμένη

τῶ ὑπὸ ΗΘΛ, καὶ τὸ ἀπὸ ΞΜ τῶ δὸτὸ ΘΠ· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ ΘΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΚ ὅπως τὸ ἀπὸ ΘΞ, τέτληται τὸ ἀπὸ ΜΠ, πρὸς τὸ ὑπὸ ΗΘΛ μετὰ τὰς δὸτὸ ΘΠ. ὡς δὲ τὸ ἀπὸ ΘΕ

πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΚ ὅπως τὸ ἀπὸ ΜΠ πρὸς τὸ ἀπὸ ΠΛ· ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ΜΠ πρὸς τὸ ἀπὸ ΠΛ ὅπως τὸ ἀπὸ ΜΠ πρὸς τὸ ὑπὸ ΗΘΛ μετὰ τὰς ἀπὸ ΘΠ· ἴσων ἄρα τὸ ἀπὸ ΑΠ τῶ ὑπὸ ΗΘΛ μετὰ τὰς ἀπὸ ΘΠ· ὡς ἔστιν ἄρα ἡ ΛΗ πέτμηται εἰς μὲν ἴσας κατὰ τὸ Π, εἰς δὲ ἄλλας κατὰ τὸ Θ. καὶ εἰσι ὁμοῦ καὶ αἱ ΜΠ, ΗΝ· ἴσων ἄρα ἡ ΑΜ τῇ ΜΝ.


πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΚ ὅπως τὸ ἀπὸ ΜΠ πρὸς τὸ ἀπὸ ΠΛ· ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ΜΠ πρὸς τὸ ἀπὸ ΠΛ ὅπως τὸ ἀπὸ ΜΠ πρὸς τὸ ὑπὸ ΗΘΛ μετὰ τὰς ἀπὸ ΘΠ· ἴσων ἄρα τὸ ἀπὸ ΑΠ τῶ ὑπὸ ΗΘΛ μετὰ τὰς ἀπὸ ΘΠ· ὡς ἔστιν ἄρα ἡ ΛΗ πέτμηται εἰς μὲν ἴσας κατὰ τὸ Π, εἰς δὲ ἄλλας κατὰ τὸ Θ. καὶ εἰσι ὁμοῦ καὶ αἱ ΜΠ, ΗΝ· ἴσων ἄρα ἡ ΑΜ τῇ ΜΝ.

PROP. XXXIV. Theor.

Si in una asymptotōn hyperbolæ aliquod punctum sumatur, ab eoque recta ducta sectionem contingat, & per tactum ducatur asymptoto parallela: quæ per dictum punctum tranfit, alteri asymptotōn parallela, à sectione bifariam dividetur.

SIT hyperbola AB, asymptoti vero ΓΔ, ΔΕ; & sumpto in recta ΓΔ quovis puncto Γ, per ipsum ducatur ΓΒΕ sectionem contingens; & per Β quidem ducatur ΖΒΗ parallela ipsi ΓΔ, per Γ autem ΓΑΗ quæ ipsi ΔΕ æquidistet: dico rectam ΓΑ æqualem esse ipsi ΑΗ.

Ducatur enim per Α recta ΑΘ parallela ipsi ΓΔ; & per Β recta ΒΚ parallela ipsi ΔΕ. itaque quoniam [per 3. 2. huj.] ΓΒ æqualis est ΒΕ; erit [per 2. 6.] & ΓΚ ipsi ΚΔ, & ΔΖ ipsi ΖΒ æqualis. & cum rectangulum ΚΒΖ æquale sit [per 12. 2. huj.] rectangulo ΓΑΘ, & recta ΒΖ æqualis ipsi ΔΚ five ΓΚ, & ΑΘ ipsi ΔΓ; rectangulum ΔΓΑ æquale erit rectangulo ΚΓΗ:



ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΑΔ.

Εὰν ὑπερβολῆς ἑπὶ μίας τῆς ἀσυμπίπτουσιν ληφθῇ π σημεῖον, καὶ ἀπ' αὐτοῦ εὐθεῖα ἐφάπτηται τῇ τομῇ, καὶ ἀπὸ τῆς ἐφάπτης ἀχθῇ παράλληλος τῇ ἀσυμπίπτουσιν ἡ ἀπὸ τῆς ληφθέντος σημείου ἀγόμενή παράλληλος τῇ ἐτέρᾳ τῇ ἀσυμπίπτουσιν ὑπὸ τῇ τομῇ εἰς ἴσα διαμερίζεται.

ΕΣΤΩ ὑπερβολῆς ἡ ΑΒ, ἀσύμπτωτοι δὲ αἱ ΓΔ, ΔΕ, καὶ ἐκλεχθῶσιν ἐπὶ τῇ ΓΔ τοῦτον σημεῖον τὸ Γ, καὶ δι' αὐτὸ ἡχθῶσιν ἐφάπτηται τῇ τομῇ ἡ ΓΒΕ, καὶ ἀπὸ τοῦ Β ἡ ΖΒΗ, ἀλλὰ δὲ τὰς Γ τῇ ΔΕ ἡ ΓΑΗ· λόγῳ ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΓΑ τῇ ΑΗ.

Ἠχθῶ γὰρ διὰ μὲν τὰς Α τῇ ΓΔ ὁμοῦ καὶ ἡ ΑΘ, ἀλλὰ δὲ τὰς Β τῇ ΔΕ ἡ ΒΚ. ἐπεὶ ἔν ἴση ἐστὶν ἡ ΓΒ τῇ ΒΕ· ἴση ἄρα καὶ ἡ ΓΚ τῇ ΚΔ, καὶ ἡ ΔΖ τῇ ΖΕ. καὶ ἐπεὶ τὸ ὑπὸ ΚΒΖ ἴσων ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΓΑΘ, ἴση δὲ ἡ ΒΖ τῇ ΔΚ, τέτληται τῇ ΓΚ, καὶ ἡ ΑΘ τῇ ΔΓ· τὰ ἄρα ὑπὸ ΔΓΑ ἴσων ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΚΓΗ· ἔστιν

ἔστω ἄρα ὡς ἡ $\Delta\Gamma$ πρὸς $\Gamma\kappa$ ἔτῳς ἡ ΓH πρὸς $\Lambda\Gamma$. διπλὴ δὲ ἡ $\Delta\Gamma$ τῇ $\Gamma\kappa$. διπλὴ ἄρα καὶ ἡ ΓH τῇ $\Lambda\Gamma$. ἴση ἄρα ἡ ΓA τῇ ΛH .


ut igitur $\Delta\Gamma$ ad $\Gamma\kappa$ ita [per 16.6.] ΓH ad $\Lambda\Gamma$. est autem $\Delta\Gamma$ ipsius $\Gamma\kappa$ dupla: ergo & ΓH dupla $\Lambda\Gamma$; idcircoque recta ΓA ipsi ΛH est æqualis.

EUTOCIUS.

Ἀλλως.

Ἐστω ὑπερβολὴ ἡ ΛB , καὶ ἀσυμπτῶται αἱ $\Gamma\Delta$, ΔE , ἐφαπτομένη ἡ ΓBE , καὶ ὁρθογώνιοι αἱ ΓAH , ZBH . λέγω ὅτι ἴση ἡ ΓA τῇ ΛH .

Ἐπιεύχθω γὰρ ἡ ΛB , καὶ ἐκβεβλήθω ὅστις πρὸς Θ , K . ἐπεὶ ἔν ἴση ἔστω ἡ ΓB τῇ BE . ἴση ἄρα καὶ ἡ KB τῇ BA . ἀλλὰ καὶ ἡ KB τῇ $\Lambda\Theta$ ἔστω ἴση. ὥστε καὶ ἡ ΓA τῇ ΛH .



Ἀλλως.

Sit hyperbola ΛB , cujus asymptoti $\Gamma\Delta$, ΔE , & contingens ΓBE ; parallelæ autem ΓAH , ZBH : dico ΓA ipsi ΛH æqualem esse.

Jungatur enim ΛB , & ad Θ , K producat. itaque quoniam ΓB [per 3.2.huj.] æqualis est ipsi BE ; erit & KB ipsi BA æqualis. sed & KB [per 8. 2. huj.] est æqualis $\Lambda\Theta$: ergo & ΓA ipsi ΛH æqualis erit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΛΕ΄.

Τῶν αὐτῶν ὅταν, εἰς τὸ τῷ ληφθέντος σημείου εὐθείᾳ πρὸς ἀρχὴν τέμνουσα τὴν κοίλῃ κατὰ δύο σημεία. ἔσται ὡς ἄλλη πρὸς τὴν ἐκτὸς ἀπολαμβανομένην, ἔστω τὰ τμήματα τῆς ἐντὸς ἀπολαμβανομένης εὐθείας πρὸς ἄλληλα.


PROP. XXXV. Theor.

Isdem positis, si à sumpto puncto recta ducatur, sectionem in duobus punctis secans; erit ut tota ad eam quæ extra sumitur, ita inter sese portiones illius quæ intra sectionem continetur.

Ἐστω γὰρ ἡ ΛB ὑπερβολή, καὶ αἱ $\Gamma\Delta$, ΔE ἀσυμπτῶται, καὶ ΓBE ἐφαπτομένη, καὶ ἡ ΘB παράλληλος τῇ $\Gamma\Delta$, ἐξ ἧς ΓZ διήχθω πρὸς εὐθείᾳ $\Gamma\text{A}\Lambda\text{ZH}$ τέμνουσα τὴν κοίλῃ κατὰ τὰ Λ , Z . λέγω ὅτι ἔστω ὡς ἡ $\text{Z}\Gamma$ πρὸς ΓA ἔτῳς ἡ $\text{Z}\Lambda$ πρὸς ΛA .

Ἠχθώσαν γὰρ διὰ τῶν Γ , Λ , B , Z ὁρθογώνιοι ΔE αἱ $\Gamma\text{N}\Xi$, $\text{KA}\Phi\text{M}$, OPBR , TZ , διὰ τῶν Γ , Λ , Z ὁρθογώνιοι $\Gamma\Delta$ αἱ $\Lambda\text{P}\Sigma$, $\text{TZPM}\Xi$. ἐπεὶ ἔν ἴση ἔστω ἡ $\Delta\Gamma$ τῇ ZH . ἴση ἄρα ἔστω ἡ KA τῇ TH . ἡ δὲ KA τῇ ΔZ ἴση. καὶ ἡ TH ἄρα τῇ ΔZ ἴση. ὥστε καὶ ἡ ΓK τῇ ΔY . καὶ ἐπεὶ ἴση ἔστω ἡ ΓK τῇ ΔY , ἴση καὶ ἡ ΔK τῇ ΓT . ὡς ἄρα ἡ ΔK πρὸς KT ἔτῳς ἡ $\text{T}\Gamma$ πρὸς ΓK . ὡς δὲ ἡ $\text{T}\Gamma$ πρὸς ΓK ἔτῳς ἡ $\text{Z}\Gamma$ πρὸς ΓA , ὡς γὰρ ἡ $\text{Z}\Gamma$ πρὸς ΓA ἔτῳς ἡ MK πρὸς KA , ὡς δὲ ἡ MK πρὸς KA ἔτῳς τὸ $\text{M}\Delta$ ὁρθογώνιο πρὸς τὸ ΔA , ὡς δὲ ἡ ΔK πρὸς KT ἔτῳς τὸ ΘK πρὸς τὸ KN ὁρθογώνιο πρὸς τὸ KN . ἴσων δὲ τὸ ΔA τῷ ΔB ὁρθογώνιο, τὰς τε τῶν ON . (ἴση γὰρ ἡ ΓB τῇ BE καὶ ἡ ΔO τῇ OG) ὡς ἄρα τὸ $\text{M}\Delta$ πρὸς τὸ ON ἔτῳς τὸ ΘK πρὸς τὸ KN , καὶ λοιπὸν τὸ

SIT ΛB hyperbola, cujus asymptoti $\Gamma\Delta$, ΔE ; contingensque ΓBE , & ΘB parallela ipsi $\Gamma\Delta$; ducatur autem per Γ recta linea $\Gamma\text{A}\Lambda\text{ZH}$, quæ sectionem in punctis Λ , Z secet: dico ut $\text{Z}\Gamma$ ad ΓA ita esse $\text{Z}\Lambda$ ad ΛA .



Ducantur enim per puncta Γ , Λ , B , Z rectæ $\Gamma\text{N}\Xi$, $\text{KA}\Phi\text{M}$, OPBR , TZ ipsi ΔB parallelæ, & per Λ , Z ducantur $\Lambda\text{P}\Sigma$, $\text{TZPM}\Xi$ parallelæ ipsi $\Gamma\Delta$. quoniam igitur [per 8. 2. huj.] æqualis est $\Delta\Gamma$ ipsi ZH , erit & KA [per 26.1.] æqualis TH . sed KA est æqualis ΔZ : ergo & TH ipsi ΔZ est æqualis; & pari modo ΓK ipsi ΔT . cumque ΓK æqualis est ipsi ΔT , & ΔK ipsi ΓT æqualis erit: ut igitur ΔK ad KT ita $\text{T}\Gamma$ ad ΓK . sed [per 2. 6.] ut $\text{T}\Gamma$ ad ΓK ita $\text{Z}\Gamma$ ad ΓA , & ut $\text{Z}\Gamma$ ad ΓA ita

MK ad KA , & ut MK ad KA ita [per 1. 6.] $\text{M}\Delta$ parallelogrammum ad parallelogrammum ΔA , & ut ΔK ad KT ita parallelogrammum ΘK ad parallelogrammum KN : ergo [per 11.5.] ut parallelogrammum $\text{M}\Delta$ ad ΔA ita ΘK ad ipsum KN . atqui [per 12.2.huj.] parallelogrammum ΔA est æquale parallelogrammo ΔB , hoc est [per 36.1.] ipsi ON : (est enim [per 3.2.huj.] recta ΓB æqualis BE , & [per 2. 6.] ΔO ipsi OG) quare ut parallelogrammum $\text{M}\Delta$ ad ON ita ΘK ad KN ; reliquum

C c c

liquum

liquum igitur $M\Theta$ ad reliquum BK est [per 19. 5.] ut totum ΔM ad totum ON . & quoniam parallelogrammum $K\Sigma$ æquale est ΘO , commune auferatur $\Delta\Pi$; eritque reliquum $K\Pi$ reliquo $\Pi\Theta$ æquale. commune apponatur AB : totum igitur KB æquale est ipsi $A\Theta$, ideoque ut $M\Delta$ ad ΔA ita $M\Theta$ ad ΘA . sed ut parallelogrammum $M\Delta$ ad parallelogrammum ΔA ita [per 1.6.] recta MK ad rectam KA , hoc est $Z\Gamma$ ad ΓA ; ut autem parallelogrammum $M\Theta$ ad parallelogrammum ΘA ita recta $M\Phi$ ad rectam ΦA , hoc est [per 2.6.] $Z\Lambda$ ad ΛA : ergo ut $Z\Gamma$ ad ΓA ita $Z\Lambda$ ad ΛA .


$M\Theta$ πρὸς λοιπὸν τὸ BK ἐστὶν ὡς ὅλον τὸ ΔM πρὸς ὅλον τὸ ON . καὶ ἐπεὶ ἴσιν ἐστὶ τὸ $K\Sigma$ τῷ ΘO , κοινὸν ἀφαιρέσω τὸ $\Delta\Pi$. λοιπὸν ἄρα τὸ $K\Pi$ ἴσιν ἐστὶ λοιπῶν τῷ $\Pi\Theta$. κοινὸν προσκείσω τὸ AB . ὅλον ἄρα τὸ KB ἴσιν ἐστὶ τῷ $A\Theta$. ἐστὶν ἄρα ὡς τὸ $M\Delta$ πρὸς τὸ ΔA ἕτως τὸ $M\Theta$ πρὸς τὸ ΘA . ἀλλ' ὡς μὲν τὸ $M\Delta$ πρὸς τὸ ΔA ἕτως ἡ MK πρὸς τὴν KA , τετίσιν ἡ $Z\Gamma$ πρὸς ΓA , ὡς δὲ τὸ $M\Theta$ πρὸς τὸ ΘA ἕτως ἡ $M\Phi$ πρὸς τὴν ΦA , τετίσιν ἡ $Z\Lambda$ πρὸς τὴν ΛA . καὶ ὡς ἄρα ἡ $Z\Gamma$ πρὸς τὴν ΓA ἕτως ἡ $Z\Lambda$ πρὸς τὴν ΛA .

EUTOCIUS.

Aliter.

Sit hyperbola AB , cujus asymptoti $\Gamma A, \Delta E$, & à puncto Γ recta quidem ΓBE ducta sectionem contingat, $\Gamma AH\Theta$ vero in duobus punctis A, H secet, & per B ducatur ZBK ipsi ΓA parallela: demonstrare oportet ut $H\Gamma$ ad ΓA ita esse HZ ad $Z A$.

Jungatur enim AB , atque ad A, M producat, & à puncto E ducatur EN parallela ipsi $\Gamma\Theta$. quoniam igitur [per 3. 2. huj.] ΓB æqualis est ipsi BE , erit ΓA ipsi EN æqualis, & AB ipsi BN ; unde NM differentia est ipsarum AB, BM . sed BM [per 8. 2. huj.] est æqualis ipsi ΛA ; erit igitur NM differentia ipsarum $\Lambda A, AB$. & quoniam in triangulo $AM\Theta$ ducta est EN ipsi $A\Theta$ parallela, ut AM ad NM ita erit $A\Theta$ ad NE . & est NE æqualis ipsi AG : ut igitur ΘA ad AG ita AM ad differentiam ipsarum AB, BM , hoc est AB ad differentiam ipsarum $\Lambda A, AB$. ut autem ΘA ad AG ita $H\Gamma$ ad ΓA : (est enim ΓA æqualis ipsi ΘH) ergo ut $H\Gamma$ ad ΓA ita AB ad differentiam ipsarum $\Lambda A, AB$, & ita ΓZ ad excessum ipsarum $\Gamma A, \Lambda Z$. quoniam autem quaestio est an sit ut $H\Gamma$ ad ΓA ita HZ ad $Z A$, demonstrare oportet ut tota $H\Gamma$ ad totam ΓA ita esse ablatam HZ ad ablatam AZ , & reliquam ΓZ ad reliquam, videlicet ad excessum ipsarum $\Gamma A, \Lambda Z$. demonstratum autem est $H\Gamma$ esse ad ΓA ita ut ΓZ ad excessum ipsarum $\Gamma A, \Lambda Z$. [propter similitudinem triangulorum $\Gamma A\Lambda, ZAB$.]



Αλλως.

Εἰς τὴν ὑπερβολὴν ἡ AB , ἀσύμπτωτοι δὲ αἱ $\Gamma A, \Delta E$, καὶ ἀπὸ τοῦ Γ ἡ GBE ἐφαπτόμενη, ἡ δὲ $\Gamma AH\Theta$ διχοτομῶν τὴν κοινὴν κατὰ τὰ A, H σημεία, καὶ διὰ τοῦ B ἡ ZBK τῇ ΓA ἡχθῶν ἡ ZBK . δεδεικνύον ἐπὶ ἐστὶν ὡς ἡ $H\Gamma$ πρὸς ΓA ἕτως ἡ HZ πρὸς $Z A$.

Επιζεύχου ἡ AB καὶ ἐκτελέσθω ὅτι τὰ A, M, C ἀπὸ τοῦ E ὡς τῷ $\Gamma\Theta$ ἡχθῶν ἡ EN . ἐπεὶ ἂν ἴσιν ἐστὶν ἡ ΓB τῇ BE , ἴση ἐστὶν καὶ ἡ ΓA τῇ EN , ἡ δὲ AB τῇ BN . ἡ ἄρα NM ὑπεροχὴ ἐστὶ τῇ AB, BM . ἴση δὲ ἡ BM τῇ ΛA . ἡ NM ἄρα ὑπεροχὴ ἐστὶ τῇ $\Lambda A, AB$. Ἐπεὶ δὲ ὅτι τριγώνων τῶν $AM\Theta$ ὡς τῷ $\Lambda\Theta$ ἐστὶν ἡ EN , ἐστὶν ὡς ἡ AM πρὸς NM ἕτως ἡ $A\Theta$ πρὸς NE . ἴση δὲ ἡ NE τῇ AG ὡς ἄρα ἡ ΘA πρὸς AG ἕτως ἡ AM πρὸς τὴν ὑπεροχὴν τῇ

AB, BM , τετίσιν ἡ AB πρὸς τὴν ὑπεροχὴν τῇ $\Lambda A, AB$. ὡς δὲ ἡ ΘA πρὸς AG ἕτως ἡ $H\Gamma$ πρὸς ΓA (ἴση γὰρ ἡ ΓA τῇ ΘH) καὶ ὡς ἄρα ἡ $H\Gamma$ πρὸς ΓA ἕτως ἡ AB πρὸς τὴν ὑπεροχὴν τῇ $\Lambda A, AB$, καὶ ἡ ΓZ πρὸς τὴν $\Gamma A, \Lambda Z$ ὑπεροχὴν. καὶ ἐπεὶ ζήτηται ἐστὶν ὡς ἡ $H\Gamma$ πρὸς ΓA ἕτως ἡ HZ πρὸς $Z A$, δεδεικνύον ἐπὶ ὡς ὅλη ἡ $H\Gamma$ πρὸς ὅλην τὴν ΓA ἕτως ἀφαιρεθῆσιν ἡ HZ πρὸς ἀφαιρεθῆσιν τὴν ΛZ , καὶ λοιπὴ ἡ ΓZ πρὸς λοιπὴν τὴν $\Gamma A, \Lambda Z$ ὑπεροχὴν. δεδεικται δὲ ὅτι ἐστὶν ὡς ἡ $H\Gamma$ πρὸς ΓA ἕτως ἡ ΓZ πρὸς τὴν $\Gamma A, \Lambda Z$ ὑπεροχὴν.

PROP. XXXVI. Theor.

Iisdem positis, si recta à puncto ducta neque sectionem in duobus punctis secet, neque parallela sit asymptoto; cum opposita quidem sectione conveniet: erit autem ut tota ad rectam quæ inter sectionem & parallelam per tactum ductam interjicitur, ita ea quæ est inter oppositam se-

ΠΡΟΤΑΣΙΣ 36.

Τῶν αὐτῶν ὅταν, εἰς τὴν ὑπερβολὴν ἀφαιρέσθω τὴν κοινὴν κατὰ δύο σημεία, καὶ διὰ τοῦ B ἡ ZBK τῇ ΓA ἡχθῶν ἡ ZBK . δεδεικνύον ἐπὶ ἐστὶν ὡς ἡ $H\Gamma$ πρὸς ΓA ἕτως ἡ HZ πρὸς $Z A$.

* Superius enim demonstraverat esse $M\Delta$ ad ON , hoc est ad $B\Delta$, hoc est ad ΔA , sicut $M\Theta$ ad $K\Phi$, hoc est ad $\Lambda\Theta$.

*


καὶ

ἢ τὸ ἀσύμπτωτον πρὸς τὴν μεταξὺ τὸ ἀσύμπτω-
τον καὶ τὸ ἐπὶ τῆς τομῆς.

ctionem & asymptoton ad eam quæ
inter asymptoton & alteram sectionem.

ΕΣΤΩΣΑΝ ἀντικείμεναι αἱ Α, Β, ὧν κέντρον
τὸ Γ, ἀσύμπτωτοι δὲ αἱ ΔΕ, ΖΗ, καὶ ὅτι τὸ
ΓΗ εἰλήφθω σημεῖον τὸ Η, ἔκ τῃ αὐτῇ ἡχθῶ ἡ
μὲν ΗΒΕ ἐφαπτομένη, ἡ δὲ ΗΘ μήτε ὠδὸς ἀλλήλος
ἔσται τῇ ΓΕ, μήτε τῇ ΓΕ τὴν τέρμαται κατὰ δύο ση-
μεῖα· ὅτι μὲν ἔν τῇ ΘΗ ἐκβαλλομένη συμπίπτει τῇ
πὶ ΓΔ, ἔκ τῆς τῆς Α τομῆς, δέδοται. συμ-
πίπτει κατὰ τὸ Α, καὶ ἡχθῶ διὰ τῆς Β τῇ ΓΗ πα-
ράλληλος ἡ ΚΒΛ. λέγω ὅτι ἔστω ὡς ἡ ΑΚ πρὸς
ΚΘ ἕτως ἡ ΑΗ πρὸς ΗΘ.

ἡχθῶσαν γὰρ ἀπὸ τῆς Α, Θ
σημείων ὠδὸς τῇ ΓΗ αἱ ΘΜ,
ΑΝ, ἀπὸ τῆς Β, Η, Θ ὠδὸς
τῇ ΔΕ αἱ ΒΞ, ΗΠ, ΡΘ ΣΝ.
ἐπεὶ ἔν τῇ ἴσῃ ἔστω ἡ ΑΔ τῇ ΗΘ,
ἔστω ὡς ἡ ΑΗ πρὸς ΗΘ ἕτως
ἡ ΔΘ πρὸς ΘΗ. ἔκ τῆς ἡ ΑΗ
πρὸς ΗΘ ἕτως ἡ ΝΣ πρὸς
ΣΘ, ὡς δὲ ἡ ΔΘ πρὸς ΘΗ
ἕτως ἡ ΓΣ πρὸς ΣΗ· καὶ
ὡς ἄρα ἡ ΝΣ πρὸς ΣΘ ἕ-
τως ἡ ΓΣ πρὸς ΣΗ. ἀλλ' ὡς
μὲν ἡ ΝΣ πρὸς ΣΘ ἕτως τὸ
ΝΓ πρὸς τὸ ΓΘ ὠδὸς ἀλλή-
λογραμμον, ὡς δὲ ἡ ΓΣ πρὸς
ΣΗ ἕτως τὸ ΓΡ ὠδὸς ἀλλή-
λογραμμον πρὸς τὸ ΡΗ· καὶ ὡς
ἄρα τὸ ΝΓ πρὸς τὸ ΓΘ ἕτως τὸ ΓΡ πρὸς τὸ ΡΗ.
καὶ ὡς ἔν τῇ ἴσῃ ἔστω ἡ ΑΒ τῇ ΒΗ, ἴση
ἔστι καὶ ἡ ΑΒ τῇ ΒΠ καὶ τὸ ΑΞ τῷ ΒΗ. τὸ γὰρ ΑΞ
ἴσων τῷ ΓΘ· καὶ τὸ ΒΗ ἄρα ἴσων τῷ ΓΘ· ἔστω ἄρα
ὡς τὸ ΝΓ πρὸς τὸ ΓΘ ἕτως ὅλον τὸ ΑΝ πρὸς
τὸ ΒΗ μὲν τῆς ΗΡ, τῆς τε πρὸς τὸ ΡΞ ὠδὸς ἀλλή-
λογραμμον. ἴσων δὲ τὸ ΡΞ τῷ ΑΘ, ἐπεὶ ἔκ τῆς ΓΘ
τῷ ΒΓ ἔκ τῆς ΜΒ τῷ ΞΘ ἴσων· ἔστω ἄρα ὡς τὸ ΝΓ
πρὸς τὸ ΓΘ ἕτως τὸ ΑΝ πρὸς τὸ ΑΘ. ἀλλ' ὡς μὲν
τὸ ΝΓ πρὸς τὸ ΓΘ ἕτως ἡ ΝΣ πρὸς ΣΘ, τῆς τε
ἡ ΑΗ πρὸς ΗΘ, ὡς δὲ τὸ ΑΝ πρὸς τὸ ΑΘ ἕ-
τως ἡ ΝΡ πρὸς τῇ ΡΘ, τῆς τε ἡ ΑΚ πρὸς ΚΘ·



omnia ad omnia; quare ut ΝΓ ad ΓΘ ita to-
tum ΝΑ ad ΓΘ & ΡΗ simul. & quoniam [per
3. 2. huj.] ΒΒ est æqualis ipsi ΒΗ; erit & ΑΒ
ipsi ΒΠ æqualis, & [per 36. 1.] parallelogram-
mum ΑΞ æquale ipsi ΒΗ. sed [per 12. 2. huj.] ΑΞ,
ΓΘ sunt æqualia; ergo & ΒΗ ipsi ΓΘ parallelo-
grammo: ut igitur ΝΓ ad ΓΘ ita totum ΑΝ ad
parallelogramma ΒΗ & ΗΡ simul, hoc est ad
ΡΞ. sed ΡΞ est æquale ipsi ΑΘ, quoniam & ΓΘ
ipsi ΒΓ atque ΜΒ ipsi ΞΘ: ergo ut ΝΓ ad
ΓΘ ita ΝΑ ad ΑΘ parallelogrammum. ut au-
tem ΝΓ ad ΓΘ parallelogrammum ita recta ΝΣ
ad ΣΘ rectam, hoc est ΑΗ ad ΗΘ; & ut ΝΑ
ad ΑΘ ita recta ΝΡ ad rectam ΡΘ, hoc est ΑΚ
ad ΚΘ; quare ut ΑΚ ad ΚΘ ita ΑΗ ad ΗΘ.

καὶ ὡς ἄρα ἡ ΑΚ πρὸς ΚΘ ἕτως ἡ ΑΗ πρὸς ΗΘ.

EUTOCIUS.

Ἄλλως.


Εἰσῶσαν ἀντικείμεναι αἱ Α, Α, καὶ ἀσύμπτωτοι αἱ
ΒΚ, ΔΓ, καὶ ἐφαπτομένη ἡ ΒΑΔ, καὶ διηγμένη ἡ
ΑΚΔΗΖ, καὶ τῇ ΓΔ ὠδὸς ἀλλήλος ἡ ΑΖ· δεκτικόν
ὅτι ἔστω ὡς ἡ ΑΖ πρὸς ΖΗ ἕτως ἡ ΑΔ πρὸς ΔΗ.
Επεξέυχθω ἡ ΑΗ καὶ ἐκβαλλομένη ὅτι πρὸς Ε,
Θ· φανερόν ἔν τῇ ἴσῃ ἔστω ἡ ΘΑ τῇ ΕΗ καὶ ἡ ΘΗ
τῇ ΑΕ. ἡχθῶ διὰ τῆς Δ ὠδὸς τῇ ΓΘ ἡ ΔΜ, ἴση
ἄρα ἡ ΒΑ τῇ ΑΔ καὶ ἡ ΘΑ τῇ ΑΜ· ἡ ἄρα ΜΗ

Aliter.

Sint oppositæ sectiones Α, Α, quarum asymp-
ptoti ΒΚ, ΔΓ & contingens ΒΑΔ; ducatur autem
ΑΚΔΗΖ, & sit ΑΖ ipsi ΓΔ parallela: demon-
strandum est ut ΑΖ ad ΖΗ ita esse ΑΔ ad ΔΗ.

Jungatur ΑΗ & ad Ε, Θ protrahatur: & erit
[per 8. 2. huj.] ΑΘ æqualis ΕΗ, & ΘΗ ipsi
ΑΕ. ducatur per Δ recta ΔΜ parallela ipsi ΓΘ;
ergo [per 3. 2. huj.] ΒΑ ipsi ΑΔ erit æ-
qualis, & ΘΑ ipsi ΑΜ: quare ΜΗ est dif-
ferentia


ferentia ipsarum $\Theta A, AH$, five ipsarum AH, HE . & quoniam BK parallela est ipsi ΔM , erit ut ΘH ad HM ita KH ad HA . atqui est AE æqualis ipsi ΘH & [per 16. 2. huj.] ΔA ipsi KH : ergo ut ΔA ad ΔH ita KB ad HM , hoc est ad differentiam ipsarum linearum AH, HE . sed ut AB ad differentiam ipsarum AH, HB ita ΔZ ad differentiam ipsarum $\Delta H, HZ$ [propter similitudinem triangulorum $\Delta HE, ZHA$]: ergo ut ΔA ad ΔH ita ΔZ ad differentiam ipsarum $\Delta H, HZ$. & ut unum ad unum ita omnia ad omnia: ut igitur ΔA ad ΔH ita tota ΔZ ad ΔH una cum differentia ipsarum $\Delta H, HZ$, hoc est ad HZ .



ὑπερχήσῃ τῇ $\Theta A, AH$, τὰς τῇ AH, HE . ἔπειδ' AE & quoniam BK παράλληλος ἐστὶν ἡ BK τῇ ΔM , ἔστιν ὅρα ὡς ἡ ΘH πρὸς HM ἕτως ἡ KH πρὸς HA · καὶ ἐστὶν ἰση ἡ AE τῇ ΘH ἢ ἡ ΔA τῇ KH · ὡς ὅρα ἡ ΔA πρὸς ΔH ἕτως ἡ AE πρὸς HM , τὰς τῇ $\Delta H, HE$ ὑπερχλή. ἀλλ' ὡς ἡ AE πρὸς τὴν ΔH , HE ὑπερχλή ἕτως ἡ ΔZ πρὸς τὴν $\Delta H, HZ$ ὑπερχλή· πρὸς δὲ ἐκεῖν ὅρα· ἐστὶν ὅρα ὡς ἡ ΔA πρὸς ΔH ἕτως ἡ ΔZ πρὸς τὴν ΔH , HZ ὑπερχλή. καὶ ὡς ἐν πρὸς ἐν ἕτως ἀπαντα πρὸς ἀπαντα· ὡς ὅρα ἡ ΔA πρὸς ΔH ἕτως ὅλη ἡ ΔZ πρὸς τὴν ΔH μὲν τῶν $\Delta H, HZ$ ὑπερχήσῃ, τὰς τῇ $\Delta H, HZ$.

Aliter.

Sint eadem quæ supra, & per A ducatur AM ipsi $B\Gamma$ parallela. quoniam igitur AB est æqualis ipsi AD , erit & KM æqualis ipsi MD . & cum parallelæ sint $\Theta K, AM$; erit ut HM ad MK ita HA ad AO , hoc est AH ad HE . ut autem AH ad HE ita ZH ad HA , & ut HM ad MK ita dupla ipsius HM ad duplam MK ; atque est AH dupla ipsius HM , (est enim [per 16. 2. huj.] AK ipsi ΔH æqualis & KM ipsi MD) & ΔK dupla ipsius KM : ut igitur AH ad HZ ita $K\Delta$ ad ΔH ; quare componendo ut AZ ad ZH ita KH ad HA , hoc est ΔA ad ΔH . HZ ἕτως ἡ $K\Delta$ πρὸς ΔH , ἔσονται ὡς ἡ AZ πρὸς ZH ἕτως ἡ KH πρὸς HA , τὰς τῇ ΔA πρὸς ΔH .



Ἄλλως.

Ἐστὼ πᾶσι αὐτὰς τὰς πρὸς πρὸν, καὶ διὰ Γ A ὡς τῇ $B\Gamma$ ἡ $χθω$ ἡ AM . ἐπεὶ ἔν ἰση ἐστὶν ἡ AB τῇ AD , ἰση ἐστὶ καὶ ἡ KM τῇ MD . ἔπειδ' ἀλλήλοισι εἰσὶν αἱ $\Theta K, AM$, ἔστιν ὡς ἡ HM πρὸς MK ἕτως ἡ HA πρὸς AO , τὰς τῇ AH πρὸς HE . ἀλλ' ὡς μὲν ἡ AH πρὸς HE ἕτως ἡ ZH πρὸς HA , ὡς ἡ HM πρὸς MK ἕτως ἡ διπλασία τῇ HM πρὸς τὴν διπλασίαν τῇ MK , καὶ ἐστὶ διπλασία τῇ HM ἡ AH (ἰση γὰρ ἡ AK τῇ ΔH καὶ ἡ KM τῇ MD) καὶ τῇ KM διπλασία ἡ ΔK · ὡς ὅρα ἡ AH πρὸς HZ ἕτως ἡ $K\Delta$ πρὸς ΔH , ἔσονται ὡς ἡ AZ πρὸς ZH ἕτως ἡ KH πρὸς HA , τὰς τῇ ΔA πρὸς ΔH .

PROP. XXXVII. Theor.

Si duæ rectæ coni sectionem vel circuli circumferentiam vel sectiones oppositas contingentes sibi ipsis occurrant, & per tactus recta jungatur; ab occurfu vero contingentium ducatur recta sectionem in duobus punctis secans: erit ut tota ad eam quæ extra sumitur, ita segmenta quæ à recta jungente tactus abscinduntur inter sese.

SIT coni sectio AB , contingentefque AG, GB ; &, junctâ AB , ducatur $\Gamma A E Z$: dico ut $Z\Gamma$ ad ΓA ita esse ZB ad EA .

Ducantur enim per Γ, A sectionis diametri $\Gamma\Theta, AK$, & per Z, Δ ducantur $\Delta\Pi, ZP$; $\Delta ZM, NAO$ parallelæ ipsi $\Gamma A, AB$. quoniam igitur

ΠΡΟΤΑΣΙΣ αζ.





Εάν κώνη τομῆς ἢ κύκλος περιφέρειας ἢ τῇ ἀντικειμένην δύο εὐθείαι ἐφαπτόμεναι συμπίπτωσι, καὶ ὅτι μὲν τὰς ἀφ' αὐτῶν ὁρίζονται εὐθεῖαι, ἀπὸ δὲ τῆς συμπίπτουσας τῆς ἐφαπτομένης διαχθῆναι τὴν τμήματα τὴν γραμμὴν καὶ δύο σημεῖα· ἔσται ὡς ὅλη πρὸς τὴν ἐκτὸς ἀπολαμβανομένην, ἕτως τὰ γινόμενα τμήματα ὑπὸ τῆς ἀφ' αὐτῶν ὁρίζοντος πρὸς ἀλλήλα.

ΕΣΤΩ κώνη τομῆς ἢ AB , καὶ ἐφαπτόμεναι αἱ AG, GB , ἔπειδ' ἐκείνη AB , καὶ διήχθω ἡ $\Gamma A E Z$ · λέγω ὅτι ἐστὶν ὡς ἡ $Z\Gamma$ πρὸς τὴν ΓA ἕτως ἡ ZB πρὸς τὴν EA .

Ἡχθωσιν διὰ τῶν Γ, A διαμέτροι τῆς τομῆς αἱ $\Gamma\Theta, AK$ διὰ δὲ τῶν Z, Δ ὡς τῇ AG, AB , αἱ $\Delta\Pi, ZP$ · $\Delta ZM, NAO$. ἐπεὶ ἔν παρὰ ἀλλήλοισι

197.

ΔZM parallela est ipsi $z\Delta O$, erit [per 4.6.] ut $Z\Gamma$ ad $\Gamma\Delta$ ita ΔZ ad $z\Delta$, & ita ZM ad ΔO , & ΔM ad zO : ergo ut quadratum ex ΔM ad quadratum ex zO ita quadratum ex ZM ad quadratum ex ΔO . sed [per 22.6.] ut quadratum ex ΔM ad quadratum ex zO ita $\Delta M\Gamma$ triangulum ad triangulum $zO\Gamma$, & ut quadratum ex ZM ad quadratum ex $O\Delta$ ita triangulum ZPM ad trian-



gulum $\Delta \Pi O$: quare [per 11. 5.] ut triangulum $\Lambda \Gamma M$ ad triangulum $\approx O \Gamma$ ita $Z P M$ triangulum ad triangulum $\Delta \Pi O$, & [per 19. 5.] ita reliquum quadrilaterum $\Lambda \Gamma P Z$ ad reliquum $\approx \Gamma \Pi \Delta$. est autem [per 49. & 50. 1. huj. & 11. 3. huj.] $\Lambda \Gamma P Z$ quadrilaterum triangulo $\Lambda \Lambda K$ æquale, & quadrilaterum $\approx \Gamma \Pi \Delta$ æquale triangulo $\Lambda N \approx$: ut igitur quadratum ex ΛM ad quadratum ex $\approx O$ ita $\Lambda \Lambda K$ triangulum ad triangulum $\Lambda N \approx$. sed ut quadratum ex ΛM ad quadratum ex $\approx O$ ita quadratum ex $Z \Gamma$ ad quadratum ex $\Gamma \Delta$, & ut triangulum $\Lambda \Lambda K$ ad triangulum $\Lambda N \approx$ ita quadratum ex $\Lambda \Lambda$ ad quadratum ex $\Lambda \approx$, & quadratum ex $Z B$ ad quadratum ex $E \Delta$: ergo ut quadratum ex $Z \Gamma$ ad quadratum ex $\Gamma \Delta$ ita quadratum ex $Z E$ ad quadratum ex $E \Delta$: & ideo [per 22. 6.] ut recta $Z \Gamma$ ad $\Gamma \Delta$ ita $Z B$ ad $E \Delta$.

PROP.

PROP. XXXVIII. Theor.





Hisdem positis, si per contingentium occursum ducatur recta tactus conjungenti parallela; & per punctum, quo jungens tactus bifariam dividitur, ducatur recta secans & sectionem ipsam in duobus punctis & rectam parallelam per occursum ductam: ut tota ad eam quæ extra sumitur inter sectionem & rectam parallelam, ita erunt portiones, quæ à recta tactus jungente fiunt, inter se.

SIT sectio AB, quam contingant rectæ AG, GB; sitque AB connectens tactus, & diametri NAK, ΓM: manifestum igitur est [ex 30. & 39. 2. huj.] rectam AB ad punctum E bifariam secari. ducatur autem à puncto Γ recta ΓO ipsi AB parallela; & per E ducatur ZEO: dico ut ZO ad OΔ ita esse ZB ad EΔ.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ λη.

Τῶν αὐτῶν ὅταν, εἰν ἀφ' ἧς τὸ συμπέσους τ' ἐφαπτόμενοι ἀχθῇ τις εὐθεῖα πρὸς τὴν τὰς ἀφὰς ἐπιζυγνύσασιν, καὶ ἀφ' ἧς μέσης τὴν τὰς ἀφὰς ἐπιζυγνύσας ἀχθῇ εὐθεῖα τμήτη τὴν τομῇ καὶ δύο σημεία καὶ τὴν ἀφ' ἧς τὸ συμπέσους παρὰ ἄλληλοι τῇ τὰς ἀφὰς ἐπιζυγνύσῃ. ἔστω ὡς ὅλη ἡ δυνημένη πρὸς τὸ ἐκτὸς ἀπολαμβάνουμένη μετὰ τὸ τὸ τομῆς καὶ τὸ πρὸς ἀλλήλους, ὅταν τὰ γινόμενα τμήματα ἔστω τὸ δὲ τὰς ἀφὰς ἐπιζυγνύσας πρὸς ἀλλήλα.


ΕΣΤΩ ἡ AB τομή, καὶ αἱ AG, GB ἐφαπτόμεναι, καὶ ἡ AB ἡ τὰς ἀφὰς ἐπιζυγνύσας, καὶ αἱ NAK, ΓM ἀμέμετροι. φανερόν δὲ ὅτι ἡ AB διχαπύττει τὸ E. ἡχθὼ δὲ ἡ ΓO τῇ AB πρὸς ἀλλήλους ἡ ΓO, ὅς διήχθῃ ἀφ' ἧς τὸ E ἡ ZEO. λέγω ὅτι ἔστω ὡς ἡ ZO πρὸς ὅΔ ἔστω ἡ ZE πρὸς EΔ.



Ducantur enim à punctis Z, Δ rectæ ΛZKM, ΔΘHΞN parallelæ ipsi AB; & per Z, H ducantur ZP, HP, ipsi AG parallelæ. * & eodem modo quo in præcedente, demonstrabimus † ut quadratum ex ΛM ad quadratum ex HΘ ita esse quadratum ex ΛA ad quadratum ex AΞ. est au-

ἡχθῶσαν γὰρ δὲ τῶν Z, Δ πρὸς τὴν AB αἱ ΛZKM, ΔΘHΞN, διὰ δὲ τῶν Z, H παρὰ τὴν AG αἱ ZP, HP. ὁμοίως δὲ τῶν πρότερον διαχρήσασθαι ὅτι ἔστω ὡς τὸ δὲ ΛM πρὸς τὸ δὲ HΘ ἔστω τὸ δὲ ΛA πρὸς τὸ δὲ AΞ. ἔστω ὡς

ΣM . ut autem quadratum ex $E\Theta$ ad quadratum
 ex MZ ita [per 22.6.] $E\Theta\Pi$ triangulum ad tri-
 angulum ZPM ; & ut
 quadratum ex $\Theta\Sigma$ ad
 quadratum ex ΣM ita
 triangulum $\Delta\Theta\Sigma$ ad
 $\Sigma M\Delta$ triangulum; er-
 go ut triangulum $E\Theta\Pi$
 ad triangulum ZPM ita
 triangulum $\Delta\Theta\Sigma$ ad tri-
 angulum $\Sigma M\Delta$. sed [per
 11. 3. huj.] triangulum
 $E\Theta\Pi$ triangulis $\Lambda\Sigma K$,
 $\Theta\Delta\Sigma$ est æquale; &
 triangulum ZPM æquale
 triangulis $\Lambda\Sigma N$, $\Delta M\Sigma$:
 ut igitur triangulum $\Delta\Theta\Sigma$
 ad triangulum $\Sigma M\Delta$ ita
 triangu- $\Lambda\Sigma K$, $\Delta\Theta\Sigma$
 simul ad triangulum
 $\Lambda\Sigma N$ una cum triangulo
 $\Sigma M\Delta$: quare reliquum
 triangulum $\Lambda\Sigma K$ ad re-
 liquum $\Lambda\Sigma N$ erit ut tri-
 angulum $\Delta\Theta\Sigma$ ad ipsum
 $\Delta M\Sigma$. ut autem trian-
 gulum $\Lambda\Sigma K$ ad $\Lambda\Sigma N$
 ita quadratum ex KA ad
 quadratum ex AN , hoc est [per 4. & 22. 6.]
 quadratum ex EH ad quadratum ex ZH ; & ut
 triangulum $\Delta\Theta\Sigma$ ad triangulum $\Delta M\Sigma$ ita qua-
 dratum ex $\Theta\Delta$ ad quadratum ex ΔM , hoc est
 quadratum ex $E\Delta$ ad quadratum ex ΔZ : ergo
 ut BH ad HZ ita $E\Delta$ ad ΔZ .



ΣM . ἀλλ' ὡς μὲν τὸ ἀπὸ $E\Theta$ πρὸς τὸ ἀπὸ
 MZ ὅτως τὸ $E\Theta\Pi$ τρίγωνον πρὸς τὸ ZPM ,
 ὡς δὲ τὸ ἀπὸ $\Theta\Sigma$ πρὸς
 τὸ ἀπὸ ΣM ὅτως τὸ
 $\Delta\Theta\Sigma$ τρίγωνον πρὸς τὸ
 $\Sigma M\Delta$ · καὶ ὡς ἄρα τὸ
 $E\Theta\Pi$ τρίγωνον πρὸς τὸ
 ZPM ὅτως τὸ $\Delta\Theta\Sigma$
 πρὸς τὸ $\Sigma M\Delta$. ἴσιν δὲ
 τὸ μὲν $E\Theta\Pi$ τοῖς $\Lambda\Sigma K$,
 $\Theta\Delta\Sigma$, τὸ δὲ ZPM τοῖς
 $\Lambda\Sigma N$, $\Delta M\Sigma$ τριγώ-
 νοις· ὡς ἄρα τὸ $\Delta\Theta\Sigma$
 πρὸς τὸ $\Sigma M\Delta$ ὅτως τὸ
 $\Lambda\Sigma K$ μετὰ τῶν $\Delta\Theta\Sigma$
 πρὸς τὸ $\Lambda\Sigma N$ μετὰ τῶν
 $\Sigma M\Delta$ · καὶ λοιπὸν ἄρα
 τὸ $\Lambda\Sigma K$ πρὸς λοιπὸν
 τὸ $\Lambda\Sigma N$ ἔστιν ὡς τὸ $\Delta\Theta\Sigma$
 πρὸς τὸ $\Delta M\Sigma$. ἀλλ' ὡς
 μὲν τὸ $\Lambda\Sigma K$ πρὸς τὸ
 $\Lambda\Sigma N$ ὅτως τὸ ἀπὸ KA
 πρὸς τὸ ἀπὸ AN , τέστι
 τὸ ἀπὸ EH πρὸς τὸ ἀπὸ
 ZH · ὡς δὲ τὸ $\Delta\Theta\Sigma$ τρίγωνον πρὸς τὸ $\Delta M\Sigma$
 ὅτως τὸ ἀπὸ $\Theta\Delta$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔM , τέστι τὰ
 ἀπὸ $E\Delta$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔZ · καὶ ὡς ἄρα ἡ EH πρὸς
 HZ ὅτως ἡ $E\Delta$ πρὸς ΔZ .

PROP. XL. Theor.

Iisdem positis, si per occursum contingen-
 tium ducatur recta linea tactus jun-
 genti parallela; & à puncto, quod
 jungentem tactus bifariam dividit, du-
 catur recta utrique sectioni atque pa-
 rallelæ ei quæ tactus conjungit oc-
 currens: sicut tota ducta ad eam par-
 tem quæ extra sumitur inter paralle-
 lam & sectionem, ita erunt portiones
 ejusdem, inter sectiones & jungentem
 tactus interjectæ, inter se.

SINT oppositæ sectiones A, B , quarum cen-
 trum Γ ; sintque contingentes $\Lambda\Delta, \Delta B$, &
 jungantur $\Lambda B, \Gamma\Delta E$: erit itaque [per 39. 2. huj.]
 ΛE ipsi $B B$ æqualis. ducatur per Δ recta $Z\Delta H\Lambda$
 parallela ipsi ΛB , & per E recta ad libitum $\Theta E K \Lambda$:
 dico ut $\Theta \Lambda$ ad ΛK ita esse ΘE ad $E K$.

Ducantur enim à punctis Θ, K rectæ $N M \Theta \Sigma$,
 $K O T \Pi$ ipsi ΛB parallelæ, & $\Theta P, K \Sigma$ parallelæ
 ipsi $\Lambda \Delta$; & ducatur $\Sigma A \Gamma T$. itaque quoniam in
 rectas parallelas $\Sigma M, K \Pi$ cadunt $\Sigma A T, M A \Pi$;
 erit [per 4.6.] ut ΣA ad $A T$ ita $M A$ ad $A \Pi$. ut
 autem ΣA ad $A T$ ita [per 34. 1.] ΘE ad $E K$;
 & ut ΘE ad $E K$ ita ΘN ad $K O$, propter simi-

*

ΠΡΟΤΑΣΙΣ μ'.


Τῶν αὐτῶν ὅταν, εἰν Λ, Γ τὸ συμπίπτειν τῶν ἐφα-
 πτομένων ἀχθῆναι εὐθεῖα $\Lambda\Gamma$ τὰς ἀφ' ἑκά-
 στες γινώσκων, καὶ ἀπὸ μέσης τὰς ἀφ' ἑκά-
 στες γινώσκων ἀχθῆναι εὐθεῖα $\Gamma\Delta$ ἐκαστὴν ἐκαστὴν
 τομῶν καὶ τῶν $\Lambda\Gamma$ τὰς ἀφ' ἑκά-
 στες γινώσκων ἑκάς ὅλην ἢ διηγεῖται τὴν
 ἐκαστὴν μετὰ τὴν $\Gamma\Delta$ καὶ τὴν τομῶν,
 ὅτως τὰ γινόμενα τμήματα τῶν εὐθειῶν ὑπὸ τῶν το-
 μῶν καὶ τῶν ἀφ' ἑκά-
 στες γινώσκων τὴν ἀλλήλα.

ΕΣΤΩΣΑΝ ἀντικείμεναι αἱ Λ, B , ὧν κέντρον
 τὸ Γ , ἐφαπτόμεναι τῇ αἱ $\Lambda\Delta, \Delta B$, καὶ ἐπέξτε-
 χθῶν αἱ ΛB καὶ ἡ $\Gamma\Delta E$ ἴση ἄρα ἡ ΛE τῇ $E B$. καὶ
 ἀπὸ μὲν Σ Δ ὡς πρὸς τὴν ΛB ἡ $Z\Delta H\Lambda$, ἀπὸ
 τῆς E , ὡς ἐπύχεν, ἡ $\Theta E K \Lambda$. λέγω ὅτι ἔστιν ὡς ἡ
 $\Theta \Lambda$ πρὸς ΛK ὅτως ἡ ΘE πρὸς $E K$.

Ηχθῶσαν ἀπὸ τῶν Θ, K ὡς πρὸς μὲν τὴν ΛB αἱ
 $N M \Theta \Sigma, K O \Gamma \Pi$, ὡς πρὸς δὲ τὴν $\Lambda\Delta$ αἱ $\Theta P, K \Sigma$,
 καὶ διηγεῖται ἡ $\Sigma A \Gamma T$. ἐπεὶ ἔν τις ὡς πρὸς ἀλλήλας τὰς
 $\Sigma M, K \Pi$ διηγεῖται εἰσὶν αἱ $\Sigma A T, M A \Pi$, ἔστιν ὡς
 ἡ ΣA πρὸς τὴν $A T$ ὅτως ἡ $M A$ πρὸς $A \Pi$. ἀλλ' ὡς
 ἡ ΣA πρὸς $A T$ ὅτως ἡ ΘE πρὸς $E K$, ὡς δὲ ἡ ΘE
 πρὸς $E K$ ὅτως ἡ ΘN πρὸς $K O$, διὰ τὴν ὁμοιότητα

τῶν

ἘΘΕΝ, ΚΕΟ τρίγωνον· ὡς ἄρα ἡ ΘΝ πρὸς ΚΟ ὥτως ἡ ΜΑ πρὸς ΑΠ· ἔστω ἄρα τὸ δῶτ' ΘΝ πρὸς τὸ δῶτ' ΚΟ ὥτως τὸ δῶτ' ΜΑ πρὸς τὸ δῶτ' ΑΠ. ἀλλ' ὡς μὲν τὸ δῶτ' ΘΝ πρὸς τὸ δῶτ' ΚΟ ὥτως τὸ ΘΡΝ τρίγωνον πρὸς τὸ ΚΣΟ, ὡς δὲ τὸ δῶτ' ΜΑ πρὸς τὸ δῶτ' ΑΠ ὥτως τὸ ΞΜΑ τρίγωνον πρὸς τὸ ΑΤΠ· ἔστω ἄρα τὸ ΘΡΝ πρὸς τὸ ΚΣΟ τρίγωνον ὥτως τὸ ΞΜΑ πρὸς τὸ ΑΤΠ τρίγωνον. ἴσων ὅ τὸ ΘΡΝ πρὸς ΞΑΜ, ΜΝΔ τρίγωνοις, τὸ δὲ ΚΣΟ πρὸς ΑΤΠ, ΔΟΠ· ἔστω ἄρα τὸ ΞΜΑ μετὰ τῶν ΜΝΔ τριγώνων πρὸς τὸ ΑΤΠ τρίγωνον μετὰ τῶν ΔΟΠ τριγώνων ὥτως τὸ ΞΜΑ τρίγωνον πρὸς τὸ ΑΤΠ τρίγωνον καὶ λοιπὸν ἄρα ΜΝΔ πρὸς λοιπὸν τὸ ΔΟΠ τρίγωνον ὥς ὅλον πρὸς ὅλον. ἀλλ' ὡς τὸ ΞΜΑ τρίγωνον πρὸς τὸ ΑΤΠ τρίγωνον ὥτως τὸ δῶτ' ΞΑ πρὸς τὸ δῶτ' ΑΤ, ὡς δὲ τὸ ΜΝΔ τρίγωνον πρὸς τὸ ΔΟΠ ὥτως τὸ δῶτ' ΜΝ πρὸς τὸ ἀπὸ ΠΟ· καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ΜΝ πρὸς τὸ ἀπὸ ΠΟ ὥτως τὸ ἀπὸ ΞΑ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΤ. ὡς δὲ τὸ ἀπὸ ΜΝ πρὸς τὸ ἀπὸ ΠΟ ὥτως τὸ ἀπὸ ΝΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΟ, καὶ ὡς τὸ ἀπὸ ΞΑ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΤ ὥτως τὸ ἀπὸ ΘΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΚ, ὡς δὲ τὸ ἀπὸ ΝΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΟ ὥτως τὸ ἀπὸ ΘΑ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΚ· καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ΘΑ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΚ ὥτως τὸ ἀπὸ ΘΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΚ· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΘΑ πρὸς ΑΚ ὥτως ἡ ΘΕ πρὸς ΕΚ.



litudinem triangulorum ΘΒΝ, ΚΕΟ: quare ut ΘΝ ad ΚΟ ita ΜΑ ad ΑΠ; & idcirco ut quadratum ex ΘΝ ad quadratum ex ΚΟ ita quadratum ex ΜΑ ad quadratum ex ΑΠ. sed [per 22. 6.] ut quadratum ex ΘΝ ad quadratum ex ΚΟ ita triangulum ΘΡΝ ad triangulum ΚΣΟ; & ut quadratum ex ΜΑ ad quadratum ex ΑΠ ita ΞΜΑ triangulum ad triangulum ΑΤΠ: ut igitur trian-

gulum ΘΡΝ ad triangulum ΚΣΟ ita triangulum ΞΜΑ ad triangulum ΑΤΠ. triangulum autem ΘΡΝ [per 11. 3. huj.] triangulis ΞΑΜ, ΜΝΔ est æquale; & triangulum ΚΣΟ æquale triangulis ΑΤΠ, ΔΟΠ: ergo ut triangulum ΞΜΑ una cum triangulo ΜΝΔ ad triangulum ΑΤΠ una cum triangulo ΔΟΠ ita ΞΜΑ triangulum ad triangulum ΑΤΠ: quare & reliquum triangulum ΜΝΔ ad reliquum ΔΟΠ est ut totum ad totum. sed ut triangulum ΞΜΑ ad triangulum ΑΤΠ ita quadratum ex ΞΑ ad quadratum ex ΑΤ; & ut triangulum ΜΝΔ ad triangulum ΔΟΠ ita quadratum ex ΜΝ ad quadratum ex ΠΟ: ergo [per 11. 5.] ut quadratum ex ΜΝ ad quadratum ex ΠΟ ita quadratum ex ΞΑ ad quadratum ex ΑΤ. ut autem quadratum ex ΜΝ ad quadratum ex ΠΟ ita quadratum ex ΝΔ ad quadratum ex ΔΟ, & ut quadratum ex ΞΑ ad quadratum ex ΑΤ ita quadratum ex ΘΕ ad quadratum ex ΕΚ, & ut quadratum ex ΝΔ ad quadratum ex ΔΟ ita quadratum ex ΘΑ ad quadratum ex ΑΚ: ut igitur quadratum ex ΘΑ ad quadratum ex ΑΚ ita quadratum ex ΘΕ ad quadratum ex ΕΚ; & propterea ut ΘΑ ad ΑΚ ita ΘΕ ad ΕΚ.

Divisio hæc rectæ ad conicas sectiones ductæ, de qua in sex ultimis propositionibus agitur, ea est quæ *Harmonica* dicitur: qua fit ut rectangulum sub tota & parte media æquale sit rectangulo sub partibus extremis: ac datis tribus quibuscvis e quatuor punctis, facile est quartum invenire, per eam quæ tradit *Pappus* in Lemmatis X. & XI. in hunc Librum. Postulatur autem hæc divisio *Harmonica* ad demonstrationes Libri quarti.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ μα'.

Εάν τρεῖς παραβολὴς πρὸς εὐθείαν ἐφαπτόμεναι συμπίπτωσι ἀλλήλαις ἐν τῇ αὐτῇ λόγῳ τμήσει.

ΕΣΤΩ παραβολὴ ἡ ΑΒΓ, ἐφαπτόμεναι ὅττι ΑΔΕ, ΕΖΓ, ΔΒΖ· λέγω ὅτι ἐστὶν ὡς ἡ ΓΖ πρὸς ΖΒ ὥτως ἡ ΕΔ πρὸς ΔΑ, καὶ ἡ ΖΒ πρὸς ΒΔ.

PROP. XLI. Theor.


Si parabolam contingentes tres rectæ inter se convenient; in eadem ratione secabuntur.

SIT parabola ΑΒΓ, quam rectæ ΑΔΕ, ΕΖΓ, ΔΒΖ contingant: dico ut ΓΖ ad ΖΒ ita esse ΕΔ ad ΔΑ, & ΖΒ ad ΒΔ.


E c c

Conjunctur

Επιζεύχθω γὰρ ἡ ΑΓ, ἔπεμψθω δὲ καὶ
τὸ Η· ὅτι μὲν ἐν ἡ ἀπὸ Εἰς Πλὴτὸ Η Διμέτρως ἐστὶ
τὴ περὶ Φανερὸν. εἰ μὲν ἂν Δι-
εἰς Β ἐρχεται ἡ ΕΗ, ὡς ἀληθὺς
ἐστὶν ἡ ΔΖ τῇ ΑΓ, καὶ δὲ τμη-
θῇσεται κατὰ τὸ Β ἀπὸ τῆ ΕΗ· καὶ
Δι-εἰς τὸ ἴση ἐστὶν ἡ ΑΔ τῇ ΔΕ,
καὶ ἡ ΓΖ τῇ ΖΕ· ἔστι Φανερὸν τὸ
ζητούμενον.





Μὴ ἐρχομαι δὲ εἰς Β, ἀλλὰ εἰς Θ, καὶ
ἔρχομαι διὰ τοῦ Θ εἰς τὴν πλὴν ΑΓ ἢ ΚΘΛ. ἐφάπτεται
αὖτε τοῦ πεντηκάθετου τῶν ΑΓ, ΒΕ, ΕΔ, ΔΑ, ΑΚ, ΚΕ,
καὶ ἡ ΑΓ τῇ ΚΕ, καὶ ἡ ΑΓ τῇ ΛΕ. ἔρχομαι εἰς Β
εἰς Β εἰς τὴν πλὴν ΕΗ ἢ ΜΝΒΞ, εἰς τὴν Α, Γ εἰς τὴν
πλὴν ΔΖ αἰ ΑΟ, ΓΠ. ἐπεὶ οὖν εἰς ἀλλήλους ἔσονται
ΜΒ τῇ ΕΘ, διάμετρος ἔσονται ἡ ΜΒ, καὶ ἐφάπτεται



καὶ τὸ Β ἢ Δ Ζ· κατη-
γυρμαί ἄρα εἰσὶν αἱ Α Ο,
Γ Π. καὶ ἐπεὶ διάμετρος
ἐστὶ ἡ Μ Β, ἐφαπτομένη δὲ
ἡ Γ Μ, κατηγυρμένη δὲ ἡ
Γ Π· ἴση ἐστὶ ἡ Μ Β τῇ
Β Π, ὥστε καὶ ἡ Μ Ζ τῇ Ζ Γ.
καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶ ἡ Μ Ζ τῇ
Ζ Γ Ἐ ἡ Ε Α τῇ Α Γ, ἐστὶ
ὡς ἡ Μ Γ πρὸς Γ Ζ ὅπως
ἡ Ε Γ πρὸς Γ Α, Ἐ συναλ-
λαξὺς ὡς ἡ Μ Γ πρὸς Γ Ε
ὅπως ἡ Ζ Γ πρὸς Γ Α. ἀλλ'
ὡς ἡ Μ Γ πρὸς Γ Ε ὅπως
ἡ Ξ Γ πρὸς Γ Η· καὶ ὡς
ἄρα ἡ Ζ Γ πρὸς Γ Α ὅπως
ἡ Ξ Γ πρὸς Γ Η. ὡς δὲ ἡ
Α Γ πρὸς Γ Ε ὅπως ἡ Η Γ
πρὸς Γ Α· (διπλασία γὰρ
ἑκατέρω) δι' ἴσων ἄρα ὡς ἡ
Ε Γ πρὸς Γ Ζ ὅπως ἡ Α Γ
πρὸς Γ Ξ, καὶ ἀναστρέψαντι
ὡς ἡ Γ Ε πρὸς Ε Ζ ὅπως ἡ
Γ Α πρὸς Α Ξ, Ἐ διπλόνη
ὡς ἡ Γ Ζ πρὸς Ζ Ε ὅπως ἡ

ΓΞ πρὸς τῷ ΖΑ. πάλιν ἐπεὶ διάμετρος ἐστὶν ἡ
ΜΒ, καὶ ἐφαπτομένη ἡ ΑΝ, ἔστι κατὰ γωνίαν ἡ ΑΟ,
ἴση ἐστὶν ἡ ΝΒ τῇ ΒΟ, ἔστι ἡ ΝΔ τῇ ΔΑ. ἔστι δὲ καὶ
ἡ ΕΚ τῇ ΚΑ ἴση· ὥς ἄρα ἡ ΕΑ πρὸς ΔΚ ἕτως
ἡ ΝΑ πρὸς ΔΔ, καὶ ὡς ἡ ΕΑ πρὸς ΑΝ
ἕτως ἡ ΚΑ πρὸς ΑΔ. ἀλλ' ὥς ἡ ΗΑ πρὸς ΑΞ
ἕτως ἡ ΕΑ πρὸς ΑΝ· ὥς ἄρα ἡ ΗΑ πρὸς ΑΞ
ἕτως ἡ ΚΑ πρὸς ΑΔ. ἔστι ὅτι καὶ ὡς ἡ ΓΑ πρὸς
ΔΗ ἕτως ἡ ΕΑ πρὸς ΔΚ· (διπλασία γὰρ κατέρχεται
ἐκαστὴς)· δι' ἴσην ἄρα ὥς ἡ ΓΑ πρὸς ΑΞ ἕτως
ἡ ΕΑ πρὸς ΑΔ, καὶ διελόντι ὥς ἡ ΓΞ πρὸς ΞΑ ἕ-
τως ἡ ΕΔ πρὸς ΔΑ. ἐδείχθη ὅτι καὶ ὡς ἡ ΓΞ πρὸς
ΞΑ ἕτως ἡ ΓΖ πρὸς ΖΕ· ὥς ἄρα ἡ ΓΖ πρὸς
ΖΕ πρὸς ΞΑ ἕτως ἡ ΓΠ πρὸς ΑΟ, καὶ ἔστιν ἡ μὲν ΓΠ
τῆς

quare invertendo, ut BZ ad ZK ita ΛA ad ΛK ; παλιν ἄρα ὡς ἡ BZ πρὸς ZK ἕτως ἡ ΛA πρὸς
componendoque vel dividendo, ut BK ad KZ ΛK , καὶ συνθέντι ἡ διελόντι ὡς ἡ BK πρὸς KZ ἕ-



ita ΛK ad $K\Lambda$: ergo ut ΔB ad $Z\Theta$ ita $E\Lambda$ ad $E\Lambda$; & propterea [per 16.6.] rectangulum contentum sub $\Delta B, \Gamma A$ æquale est ei quod sub $Z\Theta, E\Lambda$ continetur, hoc est rectangulo ΘZM . rectangulum autem ΘZM [per 38.1. huj.] est æquale quadrato ex ZH , hoc est quartæ parti figuræ quæ ad ΛB : rectangulum igitur sub $\Delta B, \Gamma A$ æquale est quartæ parti figuræ quæ ad diametrum ΛB constituitur.

τὼς ἡ ΛK πρὸς $K\Lambda$ ὡς ἄρα ἡ ΔB πρὸς $Z\Theta$ ἕτως ἡ $E\Lambda$ πρὸς $E\Lambda$ · τὸ ἄρα ὑπὸ $\Delta B, \Gamma A$ ἴσων ἐστὶ τῷ ὑπὸ $Z\Theta, E\Lambda$, καὶ τὸ ὑπὸ ΘZM . τὸ δὲ ὑπὸ ΘZM ἴσων ἐστὶ τῷ ἀπὸ ZH , καὶ τὸ πτεράριον τῆς πρὸς τῇ ΛB εὐθείας· ἔπεὶ τὸ ὑπὸ $\Delta B, \Gamma A$ ἄρα ἴσων ἐστὶ τῷ πτεράριον τῆς πρὸς τῇ ΛB εὐθείας.

PROP. XLIII. Theor.

Si hyperbolam recta quævis contingat; abscindet ex asymptotis, ad sectionis centrum, rectas continentes rectangulum æquale ei quod continetur sub rectis ab altera contingente abscissis, ad verticem sectionis qui est ad axem.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ μγ'.

Εάν ὑπερβολῆς εὐθεῖα πρὸς ὅτι πλάτῃς ἀποτιμῇ ἀπὸ τῆς ἀσυμπίπτου, πρὸς τὴν κέντρον τῆς τομῆς, εὐθείας ἴσων περιεχόμενης πρὸς περιεχόμενῳ ὑπὸ τῆς ἀποτιμωμένης εὐθείας ὑπὸ τῆς ἐφαπτομένης τῆς κατὰ τὴν πρὸς τῇ ἀξὶ κορυφῇ τῆς τομῆς.

SIT hyperbola ΛB , cuius asymptoti $\Gamma A, \Delta E$, & axis $B A$; ducatur autem per B recta $Z B H$ sectionem contingens, & alia quæpiam utcunque contingens ducatur $\Gamma A \Theta$: dico rectangulum $Z \Delta H$ rectangulo $\Gamma \Delta \Theta$ æquale esse.

ΕΣΤΩ ὑπερβολῆς ἡ ΛB , ἀσύμπτωτοι δὲ ἡ $\Gamma A, \Delta E$, ἀξὺς δὲ ὁ $B A$, καὶ ἡχθῶ διὰ τῆς B ἐφαπτομένης ἡ $Z B H$, ἄλλη δὲ πρὸς ὅτι πλάτῃς ἐφαπτομένη ἡ $\Gamma A \Theta$. λέγω ὅτι τὸ ὑπὸ $Z \Delta H$ ἴσων ἐστὶ τῷ ὑπὸ $\Gamma \Delta \Theta$.

Ducantur enim à punctis Λ, B rectæ $\Lambda K, B \Lambda$ ipsi ΔH parallelæ, ut & rectæ $\Lambda M, B N$ ipsi ΓA . quoniam igitur $\Gamma A \Theta$ sectionem contingit; erit [per 3.2. huj.] ΓA æqualis ipsi $\Lambda \Theta$: quare $\Gamma \Theta$ dupla est ipsius $\Theta \Lambda$, & $\Gamma \Delta$ ipsius ΛM , & $\Delta \Theta$ ipsius ΛK dupla: ergo rectangulum $\Gamma \Delta \Theta$ quadruplum est rectanguli ΛM . eodem modo demonstrabitur rectangulum $Z \Delta H$ rectanguli $\Lambda B N$ quadruplum. sed [per 12.2. huj.] rectangulum ΛM est æquale rectangulo $\Lambda B N$: rectangulum igitur $\Gamma \Delta \Theta$ rectangulo $Z \Delta H$ æquale erit. similiter demonstrabitur etiam si ΔB sit alia quæpiam diameter, & non axis.




ἡχθῶσαν γὰρ ἀπὸ τῆς Λ, B πρὸς τὴν ΔH αἱ $\Lambda K, B \Lambda$, πρὸς δὲ τὴν ΓA αἱ $\Lambda M, B N$. ἐπεὶ ἔν ἐφαπτομένης ἡ $\Gamma A \Theta$, ἴση ἡ ΓA τῇ $\Lambda \Theta$. ὥστε ἡ $\Gamma \Theta$ τῆς $\Theta \Lambda$ διπλῆ, καὶ ἡ $\Gamma \Delta$ τῆς ΛM , ἔπεὶ ἡ $\Delta \Theta$ τῆς ΛK . τὸ ἄρα ὑπὸ $\Gamma \Delta \Theta$ πτεράριον ἴσων ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΛM . ὁμοίως δὲ δευχθήσεται τὸ ὑπὸ $Z \Delta H$ πτεράριον τῷ ὑπὸ $\Lambda B N$. ἴσων δὲ τὸ ὑπὸ ΛM τῷ ὑπὸ $\Lambda B N$ · ἴσων ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ $\Gamma \Delta \Theta$ τῷ ὑπὸ $Z \Delta H$. ὁμοίως δὲ δευχθήσεται καὶ ἡ ΔB εἴτρα πρὸς τὴν διάμετρον, καὶ μὴ ἀξὺς.

ΗΡΟ-

EUTOCIUS.

Επί δὲ τῆς ἀντικειμένης
καὶ ἐν τῇ ΑΒ μὴ ὀρθῇ
ἀλλὰ τῇ Δ κέντρῳ, ἔχου
ἀλλὰ τῇ Δ σκεδαινωμένης τῇ
ΕΓ ἢ ΑΔΚ, καὶ ἀλλὰ τῇ
Κ, Α ἐφαπτομένης τῶν το-
μῶν αὐτῶν ΜΚΝ, ΕΔΟ.
ὅπως γὰρ δὴ γινώσκονται ὅτι
τὸ ὑπὸ ΕΔΟ ἴσον ὅτι
καὶ ὑπὸ ΜΔΝ. ἀλλὰ
τὸ μὲν ὑπὸ ΕΔΟ καὶ
ὑπὸ ΕΔΗ ἴσον, τὸ
δὲ ὑπὸ ΜΔΝ καὶ ὑπὸ ΓΔΖ· τὸ δὲ ὑπὸ ΕΔΗ ἴσον
καὶ ὑπὸ ΓΔΖ.



In oppositis vero se-
ctionibus, si recta AB
per centrum Δ non
transeat, ducatur per
Δ ipsi EG parallela
ΔΔΚ, & per Κ, Α
ducantur ΜΚΝ, ΕΔΟ
quæ sectiones contingant.
sic enim fiet
rectangulum ΕΔΟ æ-
quale rectangulo ΜΔΝ.
rectangulum autem
ΕΔΟ [per 43. 3. huj.]
rectangulo ΕΔΗ est

æquale, & rectangulum ΜΔΝ æquale rectangulo
ΓΔΖ: proinde rectangulum ΕΔΗ rectangulo ΓΔΖ
æquale erit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ μδ'.


Εάν ὑπερβολῆς ἢ τῆς ἀντικειμένης δύο εὐθεῖαι ἐφα-
πτομένης συμπίπτωσι ταῖς ἀσυμπίπτουσιν αὐ-
τῶν ταῖς συμπίπτουσιν ἀρμόνιαι τῶν ὁμοίων
ἔσονται τῇ ταῖς ἀφ' αὐτῶν ὁμοιότητες.

ΕΣΤΩ γὰρ ἡ ὑπερβολή, ἢ ἀντικειμένη αὐτῶν Α, Β,
ἀσυμπίπτουσι δὲ αὐτῶν ΓΔ, ΔΕ, ἐφαπτομένης
αὐτῶν ΓΑΘΖ, ΕΒΘΗ, καὶ ἐπιζεύχουσιν αὐτῶν ΑΒ, ΖΗ,
ΓΕ· λέγω ὅτι τῶν ὁμοίων ἔσονται.

PROP. XLIV. Theor.

Si duæ rectæ hyperbolam vel oppositas
sectiones contingentes asymptotis oc-
currant; quæ ad occursum ducuntur
rectæ tactus conjungenti parallelæ
erunt.

SIT hyperbola, vel oppositæ sectiones Α, Β;
asymptoti vero ΓΔ, ΔΕ, & contingentes
ΓΑΘΖ, ΕΒΘΗ; junganturque ΑΒ, ΖΗ, ΓΕ:
dico eas inter se parallelas esse.



Επει γὰρ τὸ ὑπὸ ΓΔΖ ἴσον τῷ ὑπὸ ΗΔΕ, ἔσται
ὡς ἡ ΓΔ πρὸς ΔΕ ὅπως ἡ ΗΔ πρὸς ΔΖ· πα-
ράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ ΓΕ τῇ ΖΗ· ἔτι δὲ τῶν
ὡς ἡ ΘΗ πρὸς ΗΕ ὅπως ἡ ΘΖ πρὸς ΖΓ. ὡς δὲ
ἡ ΕΗ πρὸς ΗΒ ὅπως ἡ ΓΖ πρὸς ΖΑ, δι-
πλάσι γὰρ ἑκάστη· δι' ἴσιν ἄρα ὡς ἡ ΘΗ πρὸς
ΗΒ ὅπως ἡ ΘΖ πρὸς ΖΑ· παράλληλος ἄρα ἐστὶν
ἡ ΖΗ τῇ ΑΒ.

Quoniam enim [per 43. 3. huj.] rectangulum
ΓΔΖ æquale est rectangulo ΗΔΕ; ut ΓΔ ad
ΔΕ ita erit ΗΔ ad ΔΖ: parallela est igitur [per
2.6.] ΓΕ ipsi ΖΗ; & ideo [per 4. 6.] ut ΘΗ ad
ΗΕ ita ΘΖ ad ΖΓ. ut autem ΕΗ ad ΗΒ ita
ΓΖ ad ΖΑ; utraque enim utriusque est dupla:
ergo ex æquali, ut ΘΗ ad ΗΒ ita ΘΖ ad ΖΑ:
recta igitur ΖΗ ipsi ΑΒ est parallela.

EUTOCIUS.

Αποδείκνυται γὰρ τῇ ΓΕ, ΖΗ παραλλήλων, ἐπιζεύχου-
σαν αὐτῶν ΗΑ, ΖΒ. ἐπεὶ παραλλήλῳ ἐστὶν ἡ ΖΗ τῇ ΓΕ, ἴσον
τὸ ΓΗΖ τριγώνον τῷ ΕΗΖ τριγώνῳ. καὶ ἐστὶ τὸ μὲν ΓΗΖ
τῷ ΑΗΖ διπλάσιον, ἐπεὶ καὶ ἡ ΓΖ τῇ ΖΑ, τὸ δὲ ΕΗΖ
τῷ ΒΗΖ διπλάσιον· ἴσον ἄρα τὸ ΑΗΖ τῷ ΒΗΖ, ὁμοί-
ωτος ἄρα ἐστὶν ἡ ΖΗ τῇ ΑΒ.

Demonstrato rectas ΓΕ, ΖΗ inter se parallelas,
conjungantur ΗΑ, ΖΒ. quoniam parallelæ sunt ΖΗ,
ΓΕ, erit triangulum ΓΗΖ triangulo ΕΗΖ æquale.
atque est triangulum quidem ΓΗΖ duplum trianguli
ΑΗΖ, quia recta ΓΖ ipsius ΖΑ est dupla; triangu-
lum vero ΕΗΖ duplum trianguli ΒΗΖ: ergo triangu-
lum ΑΗΖ triangulo ΒΗΖ est æquale, & propterea
recta ΖΗ ipsi ΑΒ parallela.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ με'.


Εάν ἐν ὑπερβολῇ, ἢ ἐλλείψει, ἢ κύκλῳ περιφέρεια, ἢ
ταῖς ἀντικειμέναις, ἀπ' ἀκρῶν ὁμοίων ἀχθῶσι
εὐθεῖαι πρὸς ὁμοίους, καὶ τὰ τετάρτω μέρει τῶν ὁμοίων

PROP. XLV. Theor.

Si in hyperbola, vel ellipfi, vel circuli
circumferentia, vel oppositis sectio-
nibus, ab extremo axis rectæ ad re-
ctos angulos ducantur, & rectangu-
lum
F f f

lum æquale quartæ parti figuræ applicetur ad axem ab utraque parte, in hyperbola quidem & sectionibus oppositis excedens figura quadrata, in ellipsi vero deficiens; & ducatur recta sectionem contingens, occurrentisque eis quæ sunt ad rectos angulos: rectæ quæ ab occurribus ducuntur ad puncta ex applicatione facta angulos rectos ad dicta puncta efficient.

SIT aliqua dictarum sectionum, cujus axis AB; & rectæ AG, BD ad rectos angulos ducantur; tangat autem ΓΕΔ, & rectangulum quartæ parti figuræ æquale applicetur ab utraque parte, sicuti dictum est, videlicet rectangulum AZB, & AHB; & jungantur ΓΖ, ΓΗ, ΔΖ, ΔΗ: dico angulum ΓΖΔ, & angulum ΓΗΔ rectum esse.



Quoniam enim [ad 42. 3. huj.] ostensum est rectangulum sub AG, BD æquale esse quartæ parti figuræ quæ ad AB fit; atque est rectangulum AZB æquale quartæ parti ejusdem figuræ; rectangulum sub AG, BD rectangulo AZB æquale erit: ergo [per 16. 6.] ut ΓΑ ad ΑΖ ita ΖΒ ad ΒΔ. & sunt anguli qui ad A, B recti: angulus igitur ΑΓΖ [per 6. 6.] angulo ΒΖΔ est æqualis; angulusque ΑΖΓ æqualis angulo ΖΔΒ. & quoniam angulus ΓΑΖ est rectus, anguli ΑΓΖ, ΑΖΓ [per 32. 1.] uni recto æquales erunt. demonstratum autem est angulum ΑΓΖ æqualem esse angulo ΖΔΒ: ergo ΓΖΑ, ΔΖΒ anguli uni recto sunt æquales: angulus igitur ΔΖΓ rectus est. similiter & angulus ΓΗΔ rectus demonstrabitur.


PROP. XLVI. Theor.

Isdem positis, rectæ dicto modo junctæ æquales facient angulos ad contingentes.

ISDEM namque positis; dico angulum ΑΓΖ angulo ΔΓΗ, & angulum ΓΔΖ angulo ΒΔΗ æqualem esse.

δύς ἴσον ὡς τὸν ἀξὸνα ὡς ἐκλινῆς ἐφ' ἐκείνῃ, ὅτι μὲν ἡ ὑπερβολῆς καὶ τῆ ἀπαικιδίου ὑπερβάλλοι εἶδει πετραγῶν, ὅτι δὲ ἡ ἐλλείψως ἐλλείπει, ἀχθῆ δὲ τις εὐθεῖα ἐφαπτομένη τῇ τομῇ, συμπίπτουσα ταῖς πρὸς ὀρθὰς εὐθείαις· αὐτὴ δὲ τῇ συμπίπτει ἀγόμεναι εὐθείαι, ὅτι τὰ ἐκ τῆ ὑπερβολῆς γινώσκονται ἀμῶς, ὅρῳ ποιῶσι γωνίας πρὸς τοῖς ἐφαπτομένοις σημείοις.

ΕΣΤΩ μία τῶν ἐφημερίων τομῶν ἥς ἄξων ὁ ΑΒ, πρὸς ὀρθὰς δὲ αἱ ΑΓ, ΒΔ, ἐφαπτομένη δὲ ἡ ΓΕΔ, ἐπὶ τῷ πετρίῳ μέρει τῆς εἰδῆς ἴσον ὡς ἐκλινῆς ἐφ' ἐκείνῃ, ὡς εἴρηται, πρὸς ΑΖΒ, καὶ πρὸς ΑΗΒ, ἐπὶ τῇ εὐθείᾳ αἱ ΓΖ, ΓΗ, ΔΖ, ΔΗ· λέγω ὅτι ἡ πρὸς ΓΖΔ, καὶ ἡ πρὸς ΓΗΔ γωνία ὀρθή ἐστιν.



Ἐπεὶ γὰρ τὸ πρὸς ΑΓ, ΒΔ ἴσον εἰδείχθη τῷ πετρίῳ μέρει τῆς πρὸς τῇ ΑΒ εἰδῆς, ἐστὶ δὲ καὶ τὸ πρὸς ΑΖΒ ἴσον τῷ πετρίῳ μέρει τῆς εἰδῆς· πρὸς ΑΓ, ΒΔ ἴσον ἐστὶ τῷ πρὸς ΑΖΒ· ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ ΓΑ πρὸς ΑΖ ὥτως ἡ ΖΒ πρὸς ΒΔ. καὶ ὀρθαὶ αἱ πρὸς τοῖς Α, Β σημείοις γωνίαι· ἴση ἄρα ἡ μὲν πρὸς ΑΓΖ γωνία τῇ πρὸς ΒΖΔ, ἡ δὲ πρὸς ΑΖΓ τῇ πρὸς ΖΔΒ. καὶ ἐπεὶ ἡ πρὸς ΓΑΖ ὀρθή ἐστιν, αἱ ἄρα πρὸς ΑΓΖ, ΑΖΓ μιᾷ ὀρθῇ ἴσαι εἰσὶν. εἰδείχθη δὲ καὶ ἡ πρὸς ΑΓΖ ἴση τῇ πρὸς ΔΖΒ· αἱ ἄρα πρὸς ΓΖΑ, ΔΖΒ μιᾷ ὀρθῇ ἴσαι εἰσὶν· ἡ πρὸς ΔΖΓ ἄρα ὀρθή ἐστιν. ὁμοίως δὲ δεῖχθήσεται καὶ ἡ πρὸς ΓΗΔ ὀρθή.



ΠΡΟΤΑΣΙΣ μς'.

Τῶν αὐτῶν ὅταν, αἱ ἐκτὸς γινόμεναι ἴσας ποιῶσι γωνίας πρὸς ταῖς ἐφαπτομέναις.

ΤΩΝ γὰρ αὐτῶν ἐφαπτομένων· λέγω ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ μὲν πρὸς ΑΓΖ γωνία τῇ πρὸς ΔΓΗ, ἡ δὲ πρὸς ΓΔΖ τῇ πρὸς ΒΔΗ.

Ἐπεὶ

Επει γὰρ εἰδείχθη ὁρθὴ ἑκατέρω τῷ ὑπὸ $\Gamma Z \Delta$, $\Gamma H \Delta$ γωνιών, ὁ ποῦ δὲ ἀμετρον τῷ $\Gamma \Delta$ γωνίᾳ $\Phi \Theta \Delta$ κύκλος ἦξει διὰ τῶν Z , H σημείων· ἴση ἀρα ἔστιν ἡ ὑπὸ $\Delta \Gamma H$ τῇ ὑπὸ $\Delta Z H$ γωνία· ἐν γὰρ τῷ αὐτῷ τμήματι τὰ κύκλα εἰσιν. ἡ γὰρ ὑπὸ $E \Delta Z H$ εἰδείχθη ἴση τῇ ὑπὸ $\Lambda \Gamma Z$ γωνίᾳ· ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ $\Delta \Gamma H$ τῇ ὑπὸ $\Lambda \Gamma Z$ γωνία ἔστι ἴση. ὁμοίως δὲ καὶ ἡ ὑπὸ $\Gamma \Delta Z$ τῇ ὑπὸ $B \Delta H$ γωνία ἴση.



Quoniam enim ostendimus [in præced.] utrumque angulorum $\Gamma Z \Delta$, $\Gamma H \Delta$ rectum esse, si circa diametrum $\Gamma \Delta$ circulus describatur [per conv. 31. 3.] per puncta Z , H transibit: quare [per 21. 3.] angulus $\Delta \Gamma H$ æqualis est angulo $\Delta Z H$, quia sunt in eadem circuli portione. angulus autem $\Delta Z H$ angulo $\Lambda \Gamma Z$ est æqualis, ut [in præced.] demonstratum fuit: ergo & $\Delta \Gamma H$ angulus æqualis erit angulo $\Lambda \Gamma Z$. eodem modo & angulus $\Gamma \Delta Z$ angulo $B \Delta H$ æqualis ostendetur.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ μζ'.

PROP. XLVII. Theor.


Τῶν αὐτῶν ὄντων, ἡ ἀπὸ τῆς συμπέσεως τῆς ἐπιζεύχουσιν ὅτι τὴν ἀπὸ ἀγνοίας πρὸς ὁρθὰς ἐστὶ τῇ ἐφαπτομένῃ.

Iisdem positis, recta ab occurfu junctarum ad tactum ducta perpendicularis erit super contingentem.

ΥΠΟΚΕΙΣΘΩ γὰρ τὰ αὐτὰ πῶς πρότερον, καὶ συμπιπτεύσων ἀλλήλαις αἱ μὲν ΓH , $Z \Delta$ κατὰ τὸ Θ , αἱ δὲ $\Gamma \Delta$, $B \Lambda$ ἐκβαλλόμεναι κατὰ τὸ K , καὶ ἐπιζεύχουσαι ἡ $E \Theta$. λέγω ὅτι κάθετὸς ἐστὶν ἡ $E \Theta$ ἐπὶ τῇ $\Gamma \Delta$.

Si enim non ita sit; ducatur à puncto Θ ad $\Gamma \Delta$ perpendicularis $\Theta \Lambda$. quoniam igitur angulus $\Gamma \Delta Z$ æqualis est [per præced.] angulo $H \Delta B$, & angulus $\Delta B H$ rectus æqualis recto $\Delta \Lambda \Theta$; triangulum $\Delta H B$ triangulo $\Lambda \Theta \Delta$ simile erit: quare [per 4. 6.] ut $H \Delta$ ad $\Delta \Theta$ ita $B \Delta$ ad $\Delta \Lambda$. sed ut $H \Delta$ ad $\Delta \Theta$ ita $Z \Gamma$ ad $\Gamma \Theta$, propterea quod [ex præc.] anguli ad Z , H recti, & qui ad Θ æquales sunt. est autem ut $Z \Gamma$ ad $\Gamma \Theta$ ita $\Lambda \Gamma$ ad $\Gamma \Lambda$, ob similitudinem triangulorum $A Z \Gamma$, $\Lambda \Gamma \Theta$: ut igitur $B \Delta$ ad $\Delta \Lambda$ ita [per 11. 5.] $\Lambda \Gamma$ ad $\Gamma \Lambda$: & permutando

Εἰ γὰρ μὴ, ἦρχθω ἀπὸ τῆς Θ πρὸς τὴν $\Gamma \Delta$ κάθετὸς ἡ $\Theta \Lambda$. ἐπεὶ γὰρ ἴση ἡ ὑπὸ $\Gamma \Delta Z$ τῇ ὑπὸ $H \Delta B$, ἐστὶ δὲ καὶ ὁρθὴ ἡ ὑπὸ $\Delta B H$ ὁρθὴ τῇ ὑπὸ $\Delta \Lambda \Theta$ ἴση· ὁμοίον ἀρα τὸ $\Delta H B$ τριγώνον τῷ $\Lambda \Theta \Delta$. ὥς ἀρα ἡ $H \Delta$ πρὸς $\Delta \Theta$ ὅτως ἡ $B \Delta$ πρὸς $\Delta \Lambda$. ἀλλ' ὥς ἡ $H \Delta$ πρὸς $\Delta \Theta$ ὅτως ἡ $Z \Gamma$ πρὸς $\Gamma \Theta$, διὰ τὸ ὁρθὰς εἶναι πᾶς πρὸς πᾶς Z , H γωνίας, καὶ πᾶς πρὸς τῷ Θ ἴσας. ὥς δὲ ἡ $Z \Gamma$ πρὸς $\Gamma \Theta$ ὅτως ἡ $\Lambda \Gamma$ πρὸς $\Gamma \Lambda$, διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν $A Z \Gamma$, $\Lambda \Gamma \Theta$ τριγώνων· καὶ ὥς ἀρα ἡ $B \Delta$ πρὸς $\Delta \Lambda$ ὅτως ἡ $\Lambda \Gamma$ πρὸς $\Gamma \Lambda$, καὶ ἐναλλάξ ὥς ἡ ΔB πρὸς $\Gamma \Lambda$ ὅτως ἡ $\Delta \Lambda$ πρὸς $\Lambda \Gamma$. ἀλλ' ὥς ἡ ΔB πρὸς $\Gamma \Lambda$ ὅτως ἡ $B K$ πρὸς $K \Lambda$. καὶ ὥς ἀρα ἡ $\Delta \Lambda$ πρὸς $\Lambda \Gamma$ ὅτως ἡ $B K$ πρὸς $K \Lambda$. ἦρχθω δὲ ἀπὸ τῆς E πρὸς τὴν $\Lambda \Gamma$ ἡ $E M$. πεπαγμένως ἀρα ἐστὶ κατηγμένη πρὸς τὴν ΛB , καὶ ἐστὶ ὥς ἡ $B K$ πρὸς $K \Lambda$ ὅτως ἡ $B M$ πρὸς $M \Lambda$. ὥς δὲ ἡ $B M$ πρὸς $M \Lambda$ ὅτως ἡ ΔE πρὸς $E \Gamma$, καὶ ὥς



ut ΔB ad $\Gamma \Lambda$ ita $\Delta \Lambda$ ad $\Lambda \Gamma$. ut autem ΔB ad $\Gamma \Lambda$ ita $B K$ ad $K \Lambda$: ergo ut $\Delta \Lambda$ ad $\Lambda \Gamma$ ita $B K$ ad $K \Lambda$. à puncto B ducatur recta $B M$ ipsi $\Lambda \Gamma$ parallela, quæ proinde ad ΛB ordinatim applicata erit; & ut $B K$ ad $K \Lambda$ ita erit [per 36. 1. huj.] $B M$ ad $M \Lambda$. sed [per 4. 6.] ut $B M$ ad $M \Lambda$ ita ΔB ad $E \Gamma$: quare [per 11. 5.] ut $\Delta \Lambda$

Επειδὴ ὁρθὴ ἡ ὑπὸ ΔΒΗ καὶ ἡ ὑπὸ ΔΘΗ, ὁ
 παρὰ διάμετρον πρὸς ΔΗ γραφομένου κύκλος ἤξει
 διὰ τῶν Θ, Β, καὶ ἴση ἔσται ἡ ὑπὸ ΗΘΒ γωνία τῇ
 ὑπὸ ΒΔΗ. ἡ δὲ ὑπὸ ΑΗΓ τῇ ὑπὸ ΒΔΗ ἐδεί-
 χθη ἴση· καὶ ἡ ὑπὸ ΗΘΒ ἄρα τῇ ὑπὸ ΑΗΓ,
 γὰρ τῇ τῇ ὑπὸ ΑΘΓ ἐστὶν ἴση· ὥστε ἢ ὑπὸ ΓΘΗ
 τῇ ὑπὸ ΑΘΒ. ὁρθὴ δὲ ἡ ὑπὸ ΓΘΗ· ὁρθὴ ἄρα
 καὶ ἡ ὑπὸ ΑΘΒ.

Quoniam enim angulus $\triangle B\Theta H$ & $\triangle \Theta H$ est re-
ctus; si circa diametrum ΔH circulus describa-
tur, transibit per puncta Θ, B , & [per 21.3.] an-
gulus $H\Theta B$ angulo $B\Delta H$ æqualis erit. angu-
lus autem $\Lambda H\Gamma$ ostensus est [per 45. 3. huj.] æ-
qualis angulo $B\Delta H$: ergo $H\Theta B$ angulus æqua-
lis est angulo $\Lambda H\Gamma$, hoc est angulo $\Lambda\Theta\Gamma$: &
propterea angulus $\Gamma\Theta H$ angulo $\Lambda\Theta B$. sed re-
ctus est [ex hyp.] angulus $\Gamma\Theta H$: ergo & $\Lambda\Theta B$
rectus erit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ν'.


Τῶν αὐτῶν ὄντων, ἐὰν ἐκ ὧ κέντησ' ἡ τομῆς παρο-
πσοῇ τις τῇ ἐπαπινομῇ, καθ' ἑλληλος ὕστα τῇ
ἀφ' ἧς ἡ ἀφῆς ἔς ἐνός τῇ σημείωσι ἐκ τῇ καθ' ἑ-
λλῆς ἡ ἡγεμονία ἐνδεῖα ἴση ἔσται τῇ ἡμισείᾳ τῇ
ἁλῶνος.

ΕΣΤΩ ἡ πρὸς αὐτὰς τῆς πρότερον, καὶ κέντρον τὸ
Θ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΕΖ, καὶ αἱ ΔΓ, ΒΑ συμ-
πιπτεύωσιν κατὰ τὸ Κ, καὶ διὰ τοῦ Κ ὁρθῶς πλὴν
ΕΖ ἡχθω ἡ Θ· Α· λέγω ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ Θ· Α τῇ Θ· Β.

PROP. L. Theor.

Iisdem positis, si à centro sectionis du-
 catur recta contingenti occurrens, ac
 parallela ei quæ per tactum & per
 alterutrum punctorum ex applicatio-
 ne ducitur: erit ea dimidio axis æ-
 qualis.

SINT eadem quæ supra, & centrum sit Θ ; jungatur autem BZ , & rectæ $\Delta\Gamma$, BA inter se conveniant in K ; & per Θ ducatur $\Theta\Lambda$ parallela ipsi BZ : dico $\Theta\Lambda$ ipsi ΘB æqualem esse.



Επεὶ εὐχθίσουν ἥ αἱ ΕΗ, ΑΛ, ΛΗ, ΛΒ, καὶ
διὰ ΕΗ ὡς πῦρ πῦρ ΕΖ ἥ χθίσω ἡ ΗΜ. ἐπεὶ ἐν τῷ
ὑπὸ ΑΖΒ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΑΗΒ· ἴση ἄρα ἡ ΑΖ
τῇ ΗΒ. ἐστὶ δὲ καὶ ἡ ΑΘ τῇ ΘΒ ἴση· Ἐ ἡ ΖΘ
ἄρα τῇ ΘΗ ἴση, ὥς τε χὴ ἡ ΕΛ τῇ ΛΜ ἴση. καὶ ἐπεὶ
ἐδείχθη ἡ ὑπὸ ΓΕΖ γωνία τῇ ὑπὸ ΔΕΗ ἴση, ἡ
δὲ ὑπὸ ΓΕΖ ἴση ἐστὶ τῇ ὑπὸ ΕΜΗ· ἴση ἄρα καὶ ἡ
ὑπὸ ΕΜΗ τῇ ὑπὸ ΜΕΗ· ἴση ἄρα καὶ ἡ ΕΗ τῇ
ΗΜ. ἀλλὰ καὶ ἡ ΕΛ τῇ ΛΜ ἐδείχθη ἴση· κάλειτος
ἄρα ἡ ΗΛ ὅτι πῦρ ΕΜ. ἐστὶ δὲ, διὰ τὸ περθε-
χθιν, ὅρθε ἡ ὑπὸ ΑΛΒ γωνία· καὶ ὁ ἄρα περθε
Διείμετρον πῦρ ΑΒ γεαφόμενον κύκλος ἥξει διὰ
τῆς Α. Ἐ εἰν ἴση ἡ ΘΑ τῇ ΘΒ· καὶ ἡ ΘΛ ἄρα,
ὅτι τῆς κέντρος ὅσα τῆς ἡμικυκλίας, ἴση ἐστὶ τῇ ΘΒ.

Jungantur enim EH, AL, AH, AB ; & per H ducatur HM parallela ipsi EZ . quoniam igitur rectangulum AZB est æquale rectangulo AHB , recta AZ ipsi HB æqualis erit. est autem & $A\Theta$ æqualis ΘB : ergo & $Z\Theta$ ipsi ΘH ; & propterea $E\Lambda$ ipsi ΛM est æqualis. itaque quoniam demonstratum est [ad 48. 3. huj.] angulum ΓEZ angulo ΔBH æqualem esse; estque angulus ΓEZ [per 29. 1.] æqualis angulo EMH : erit & angulus EMH ipsi MEH æqualis, & recta EH ipsi HM . sed & $E\Lambda$ est æqualis ipsi ΛM , uti demonstravimus: recta igitur $H\Lambda$ ad EM perpendicularis est. est autem [per 49. 3. huj.] & angulus ΛAB rectus: quare si circa diametrum AB circulus describatur, per Λ transibit. atque est ΘA æqualis ipsi ΘB : ergo & $\Theta \Lambda$, quæ est ex centro circuli, ipsi ΘB æqualis erit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ 1α'.

Εὰν ὑπερβολῆς, ἢ τῷ ἀπαικιδύοντι ποῦναι τὸν ἄξονα
ἴσκι ἐφ' ἐχάτερα ποῦναι βληθῇ καὶ τετάρτῳ μέ-
ρει τῷ εἰδῶς ὑπερβάλλοι εἶδει πεπραγώφῃ, ὅ


PROP. LI. Theor.:

Si in hyperbola, vel oppositis sectionibus applicetur ad axem rectangulum æquale quartæ parti figuræ excedens figurâ quadratâ;

drata; & à punctis ex applicatione factis ad alterutram sectionum rectæ lineæ inclinentur: major minorem quantitate axis superabit.

SIT hyperbola, vel oppositæ sectiones, quarum axis AB, centrumque Γ; & quartæ parti figuræ æquale sit utrumque rectangulorum AΔB, AEB; & à punctis E, Δ ad sectionem inclinentur EZ, ZΔ: dico EZ ipsam ZΔ superare quantitate AB.

Ducatur enim per Z recta ZKΘ sectionem contingens, & per Γ ducatur ΗΓΘ parallela ipsi ZΔ: erit igitur angulus KΘH angulo KZΔ æqualis; alterni enim sunt. angulus vero KZΔ [per 48.3.huj.] æqualis est angulo HZΘ: ergo & HZΘ ipsi HΘZ, rectaque HZ ipsi HΘ. sed [per 2.6.] recta ZH ipsi HB æqualis est; quia AB æqualis est ΔB, & ΑΓ ipsi ΓB, & ΕΓ ipsi ΓΔ: est igitur recta HΘ æqualis ipsi EH; & ob id ZE ipsius HΘ dupla. itaque quoniam demonstrata est [ad 50.3.huj.] ΓΘ ipsi ΓB æqualis; erit EZ utriusque ΗΓ, ΓB dupla. sed ipsius quidem ΗΓ dupla est ZΔ; ipsius vero ΓB dupla AB: recta igitur EZ utriusque ZΔ, AB est æqualis; & propterea EZ ipsam ZΔ superat quantitate AB.



ἀπὸ τῆς γειομένης ἐκ τῆς ὀρθογωνίας σημείων κλασθῶσι εὐθεῖαι πρὸς ὁποτέραι τῆς τομῆς ἢ μείζον τῆς ἐλάσσονος ὑπερέχει τῷ ἀξόνι.

ΕΣΤΩ γὰρ ὑπερβολή, ἢ ἀντικείμεναι, ὣν ἄξων ὁ AB, κέντρον δὲ τὸ Γ, καὶ τῷ τετάρτῳ μέρει τῶν εὐθεῶν ἴσων ἐκάτερον τῶν ὑπὸ AΔB, AEB, καὶ ἀπὸ τῶν E, Δ σημείων κακλάσθωσιν πρὸς τὴν γραμμὴν αἱ EZ, ZΔ. λέγω ὅτι ἡ EZ τῆς ZΔ ὑπερέχει τῇ AB.

Ἡχθῶ δὲ διὰ τῆς Z ἐφαπτομένη ἡ ZKΘ, διὰ δὲ τῆς Γ πρὸς τὴν ZΔ ἡ ΗΓΘ. ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ KΘH τῇ ὑπὸ KZΔ, ἐναλλάξ γάρ. ἡ δὲ ὑπὸ KZΔ ἴση τῇ ὑπὸ HZΘ. καὶ ἡ ὑπὸ HZΘ ἄρα ἴση ἐστὶ τῇ ὑπὸ HΘZ. ἴση ἄρα ἡ HZ τῇ HΘ. ἡ δὲ ZH τῇ HE ἴση, ἐπεὶ γὰρ ἡ AE τῇ ΒΔ καὶ ἡ ΑΓ τῇ ΓΒ καὶ ἡ ΕΓ τῇ ΓΔ ἐστὶν ἴση· καὶ ἡ ΗΘ ἄρα τῇ EH ἐστὶν ἴση· ὥστε ἡ ZE τῇ HΘ ἐστὶ δι-


πλή. καὶ ἐπεὶ ἡ ΓΘ ἴση δέδοται τῇ ΓΒ, ἡ EZ ἄρα διπλὴ ἐστὶ συναμφοτέρω τῇ ΗΓ, ΓΒ. ἀλλὰ τῆς ΗΓ διπλὴ ἡ ZΔ, τῆς δὲ ΓΒ διπλὴ ἡ AB. ἡ EZ ἄρα ἴση ἐστὶ συναμφοτέρω τῇ ZΔ, AB, ὥστε ἡ EZ τῆς ZΔ ὑπερέχει τῇ AB.

PROP. LII. Theor.

Si in ellipsi ad maiorem axem ab utraque parte applicetur rectangulum æquale quartæ parti figuræ deficiens figura quadrata; & à punctis ex applicatione factis ad sectionem rectæ lineæ inclinentur: ipsi axi æquales erunt.

SIT ellipsis, cujus major axis AB; & sit utrumque rectangulorum AΓB, AΔB æquale quartæ parti figuræ; & à punctis Γ, Δ ad sectionem inclinentur rectæ lineæ ΓE, EΔ: dico ΓE, EΔ axi AB æquales esse.

Ducatur enim contingens ZEΘ; & per centrum, quod sit H, ducatur ΗΚΘ ipsi ΓE parallela. quoniam igitur angulus ΓEZ [per 48.3.huj.] est æqualis angulo ΘEK, & [per 29.1.] angulus ZEG angulo EΘK; erit angulus EΘK ipsi ΘEK æqualis, & [per 6.1.] recta ΘK æqualis ipsi KE. & quoniam AH est æqualis ipsi HB, & ΓA ipsi ΔB; erit & ΓH ipsi ΗΔ æqualis: ergo [per 2.6.] & EK æqualis ipsi ΚΔ. & ob id EΔ quidem dupla est ipsius ΘK; ut & ΕΓ [per 4.6.] dupla ipsius ΚΗ: utraque igitur ΓE, EΔ ipsius ΗΘ est dupla. sed AB [per 50.3.huj.] dupla est ipsius ΗΘ: quare AB ipsis ΓE, EΔ æqualis erit.



ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙϚ.

Εάν ἐλλείψως ὀρθῶς τὸν μείζονα τῆς ἀξὸνος τῷ τετάρτῳ μέρει τῶν εὐθεῶν ἴσων ἐφ' ἐκάτερα ὀρθογωνία ἐλλείπονι εὐδιτετραγώνω, καὶ ἀπὸ τῶν γειομένων ἐκ τῆς ὀρθογωνίας σημείων κλασθῶσι εὐθεῖαι πρὸς τὴν γραμμὴν ἴσαι ἔσονται τῷ ἀξόνι.

ΕΣΤΩ ἐλλειψίς, ἥς μείζων τῆς ἀξὸνος ὁ AB, καὶ τῷ τετάρτῳ μέρει τῶν εὐθεῶν ἴσων ἐκάτερον ἴσων ἐστὶ τῶν ὑπὸ AΓB, AΔB, καὶ ἀπὸ τῶν Γ, Δ κακλάσθωσιν πρὸς τὴν γραμμὴν αἱ ΓE, EΔ. λέγω ὅτι αἱ ΓE, EΔ ἴσαι εἰσι τῇ AB.

Ἡχθῶ ἐφαπτομένη ἡ ZEΘ, ἐξ αὐτῆς δὲ κέντρον εἴη Η πρὸς τὴν ΓE ἡ ΗΚΘ. ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΓEZ τῇ ὑπὸ ΘEK, ἡ δὲ ὑπὸ ZEG τῇ ὑπὸ EΘK. καὶ ἡ ὑπὸ BEO ἄρα τῇ ὑπὸ ΘEK ἐστὶν ἴση· ἴση ἄρα καὶ ἡ ΘΚ τῇ KE. Ἐπεὶ ἡ AH τῇ HB ἴση, καὶ ἡ ΓA τῇ ΔB καὶ ἡ ΓH ἄρα τῇ ΗΔ ἴση, ὥστε καὶ ἡ EK τῇ ΚΔ.


καὶ διὰ τὴν ΕΚ διπλὴ ἐστὶν ἡ μὲν EΔ τῆς ΘΚ, ἡ δὲ ΕΓ τῆς ΚΗ. καὶ συναμφοτέρως ἄρα ἡ ΓE, EΔ διπλὴ ἐστὶ τῇ ΗΘ. ἀλλὰ καὶ ἡ AB διπλὴ τῇ ΗΘ. ἴση ἄρα ἡ AB τῇ ΓE, EΔ.

ΠΡΟ-

ΠΡΟΤΑΣΙΣ η'.

Εάν ἐν ὑπερβολῇ, ἢ ἐλλείψει, ἢ κύκλῳ περιφύει, ἢ ταῖς ἀντικειμέναις, ἀπ' ἀκρῶς τ' διαμέτρων ἀχθῶσι εὐθεῖαι ὡς τεταγμένως καταγυμένῃ, καὶ ἀπὸ τῶν αὐτῶν περάσῃι ὡς τὸ αὐτὸ σημεῖον τ' γραμμῆς ἀχθῶσι εὐθεῖαι τέμνουσαι τὰς παραλλήλους· τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τῶν ἀποτεμνομένων ἴσον ἔστί τῷ ὅριον τῇ αὐτῇ ἀφαιρέσει εἶδει.

ΕΣΤΩ μία τῶν εἰρημένων τομῶν ἡ ΑΒΓ, ἥς διάμετρος ἡ ΑΓ, καὶ ὡς τεταγμένως καταγυμένην ἤχθωσιν αἱ ΑΔ, ΓΕ, καὶ διήχθωσιν αἱ ΑΒΕ, ΓΒΔ· λέγω ὅτι τὸ ὑπὸ ΑΔ, ΕΓ ἴσον ἔστί τῷ εἶδει τῷ ὅριον τῇ ΑΓ.



Ἠχθῶ γὰρ ἀπὸ τῆς Β ὡς τεταγμένως καταγυμένην ἡ ΒΖ· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ ΑΖΓ ὅριον τῇ ΒΖ ὥς τὸ ὑπὸ ΖΒ ὅριον τῇ ΒΖ, καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ περάσῃι πρὸς τὸ εἶδος. ὁ δὲ ὅριον τῇ ΑΖΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΒΖ λόγος σύγκειται ἐκ τῶν ΑΖ πρὸς ΖΒ καὶ ΖΓ πρὸς ΖΒ· ὁ ἄρα τῆς εἰδὸς πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ περάσῃι λόγος σύγκειται ἐκ τῶν ΖΒ πρὸς ΑΖ καὶ ΒΖ πρὸς ΖΓ. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΖΒ πρὸς ΑΖ ὥς τὸ ΕΓ πρὸς ΓΑ, ὡς δὲ ἡ ΒΖ πρὸς ΖΓ ὥς τὸ ΔΑ πρὸς ΑΓ· ὁ ἄρα τῆς εἰδὸς πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ περάσῃι λόγος σύγκειται ἐκ τῶν ΓΕ πρὸς ΓΑ καὶ ΑΔ πρὸς ΓΑ. σύγκειται δὲ καὶ ὁ ὅριον τῇ ΑΔ, ΓΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΓ περάσῃι ἐκ τῶν αὐτῶν· ὡς ἄρα τὸ εἶδος πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ περάσῃι ὥς τὸ ὑπὸ ΑΔ, ΓΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΓ περάσῃι· ἴσον ἄρα τὸ ὑπὸ ΑΔ, ΓΕ τῷ ὅριον τῇ ΑΓ εἶδει.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ ιδ'.

Εάν κώνυς τομῆς ἢ κύκλῳ περιφύειας δύο εὐθεῖαι ἐφαπτόμεναι συμπίπτωσι, καὶ δὲ τῶν ἀφῶν περάσῃι ἀχθῶσι ταῖς ἐφαπτομέναις, καὶ ἀπὸ τῶν ἀφῶν ὡς τὸ αὐτὸ σημεῖον τ' γραμμῆς ἀχθῶσι εὐθεῖαι τέμνουσαι ὡς παραλλήλους· τὸ περιεχόμενον ὀρθογώνιον ὑπὸ τῶν ἀποτεμνομένων ὡς τὸ ἀπὸ τῆς ἐκτετραγμένης πρὸς ἀφῶν τετραγώνον λόγῳ ἔχει τὸν συγκείμενον, ἐκ τῶν

PROP. LIII. Theor.

Si in hyperbola, vel ellipfi, vel circuli circumferentia, vel sectionibus oppositis, ab extremis diametri ducantur rectæ ordinatim applicatis parallelæ; & ab iisdem terminis ad idem sectionis punctum rectæ ductæ occurrant parallelis: rectangulum sub abscissis factum æquale erit figuræ quæ ad eandem diametrum constituitur.

SIT quævis dictarum sectionum ΑΒΓ, cujus diameter ΑΓ; ducanturque ΑΔ, ΓΕ ordinatim applicatis parallelæ, & ΑΒΕ, ΓΒΔ producantur: dico rectangulum contentum sub ΑΔ, ΕΓ figuræ quæ fit ad ΑΓ æquale esse.



A puncto enim B ordinatim applicetur recta BZ: ergo [per 21. 1. huj.] ut rectangulum AZΓ ad quadratum ex ZB ita transversum figuræ latus ad rectum; & [per 1. 6.] ita quadratum ex ΑΓ ad ipsius figuram. sed [per 23. 6.] rectanguli ΑΖΓ ad quadratum ex BZ ratio componitur ex ratione ΑΖ ad ΖΒ & ratione ΓΖ ad ΖΒ: ergo ratio figuræ ad quadratum ex ΑΓ componitur ex ratione ΖΒ ad ΑΖ & ratione ΒΖ ad ΖΓ. sed ut ΖΒ ad ΑΖ ita ΕΓ [per 4. 6.] ad ΓΑ, & ut ΒΖ ad ΖΓ ita ΔΑ ad ΑΓ: ratio igitur figuræ ad quadratum ex ΑΓ componitur ex ratione ΓΕ ad ΓΑ & ratione ΑΔ ad ΓΑ. sed [per 23. 6.] rectangulum contentum sub ΑΔ, ΓΕ ad quadratum ex ΑΓ ex eisdem rationibus componitur: ergo ut figura ad quadratum ex ΑΓ ita est rectangulum contentum sub ΑΔ, ΓΕ ad quadratum ex ΑΓ: rectangulum igitur contentum sub ΑΔ, ΓΕ æquale erit figuræ quæ fit ad ΑΓ.

PROP. LIV. Theor.

Si duæ rectæ lineæ coni sectionem vel circuli circumferentiam contingentes sibi ipsis occurrant, & per tactus ducantur contingentibus parallelæ; a tactibus vero ad idem sectionis punctum ductæ rectæ parallelis occurrant: rectangulum sub abscissis ad quadratum rectæ tactus jungentis rationem habebit compositam, ex ratione quam habet quadratum portionis rectæ


rectæ ab occurſu contingentium ad punctum medium jungentis tactus ductæ quæ est intra ſectionem ad reliquæ portionis quadratum, & ex ratione quam habet rectangulum ſub contingentibus contentum ad quartam partem quadrati ejus quæ tactus conjungit.

SIT conſi ſectio, vel circuli circumſerentia $\Lambda B\Gamma$, quam contingant rectæ lineæ $\Lambda\Delta$, $\Gamma\Delta$; & juncta $\Lambda\Gamma$ bifariam in puncto E dividatur, jungaturque $\Delta B E$; à puncto autem Λ ducatur recta ΛZ ipſi $\Gamma\Delta$ parallela, & à puncto Γ recta ΓH parallela ipſi $\Lambda\Delta$; denique ſumpto in ſectione quovis puncto Θ , jungantur $\Lambda\Theta$, $\Gamma\Theta$, & ad puncta H , Z producantur: dico rectangulum contentum ſub ΛZ , ΓH ad quadratum ex $\Lambda\Gamma$ rationem habere compoſitam, ex ratione quadrati ex $E B$ ad quadratum ex $B\Delta$ & ratione rectanguli $\Lambda\Delta\Gamma$ ad quartam partem quadrati ex $\Lambda\Gamma$, hoc eſt ad rectangulum $\Lambda E\Gamma$.

Ducatur enim à puncto quidem Θ recta $\Theta K \Lambda Z O$; à puncto autem B recta $B M N$, quæ ipſi $\Lambda\Gamma$ parallelæ ſint: perſpicuum eſt [per 32. 1. huj.] rectam $M N$ ſectionem contingere. & cum ΛE ſit æqualis ipſi $E\Gamma$; erit & $M B$ ipſi $B N$ æqualis, & $K O$ ipſi $O \Lambda$, & [per 46. & 47. 1. huj.] ΘO ipſi $O E$, & $K \Theta$ ipſi $Z \Lambda$. itaque quoniam $M B$, $M A$ ſectionem contingunt, & ipſi $M B$ parallela ducta eſt $K \Theta \Lambda$; erit [per 16. 3. huj.] ut quadratum ex ΛM ad quadratum ex $M B$, hoc eſt ad rectangulum $N B M$, ita quadratum ex ΛK ad rectangulum $Z K \Theta$, hoc eſt ad rectangulum $\Lambda \Theta K$. ut autem $N\Gamma$ ad ΛM ita $\Lambda\Gamma$ ad $K \Lambda$: ut igitur rectangulum ſub $N\Gamma$, $M A$ ad quadratum ex ΛM ita rectangulum ſub $\Lambda\Gamma$, $K \Lambda$ ad quadratum ex ΛK : ergo ex æquali ut rectangulum ſub $N\Gamma$, $M A$ ad rectangulum $N B M$ ita rectangulum ſub $\Lambda\Gamma$, $K \Lambda$ ad rectangulum $\Lambda \Theta K$. ſed [per 23. 6.] rectangulum ſub $\Lambda\Gamma$, $K \Lambda$ ad rectangulum $\Lambda \Theta K$ rationem habet compoſitam ex ratione $\Gamma\Lambda$ ad $\Lambda \Theta$, hoc eſt [per 4. 6.] $Z \Lambda$ ad $\Lambda\Gamma$, & ratione ΛK ad $K \Theta$, hoc eſt $H\Gamma$ ad $\Gamma\Lambda$, atque hæc eadem eſt ratio quæ rectanguli ſub $H\Gamma$, $Z \Lambda$ ad quadratum ex $\Gamma\Lambda$: ut igitur rectangulum ſub $N\Gamma$, $M A$ ad rectangulum $N B M$ ita rectangulum ſub $H\Gamma$, $Z \Lambda$ ad quadratum ex $\Gamma\Lambda$. rectangulum vero ſub $N\Gamma$, $M A$ ad rectangulum $N B M$, (ſumpto medio rectangulo $N \Delta M$) habet rationem compoſitam, ex ratione rectanguli ſub $N\Gamma$, $M A$ ad rectangulum $N \Delta M$ & ratione rectanguli $N \Delta M$ ad rectangulum $N B M$: ergo & rectangulum ſub $H\Gamma$, $Z \Lambda$ ad quadratum ex $\Gamma\Lambda$ habet rationem compoſitam ex ratione rectanguli ſub $N\Gamma$, $M A$ ad rectangulum $N \Delta M$ & ratione re-

ctæ ab occurſu contingentium ad punctum medium jungentis tactus ductæ quæ est intra ſectionem ad reliquæ portionis quadratum, & ex ratione quam habet rectangulum ſub contingentibus contentum ad quartam partem quadrati ejus quæ tactus conjungit.

ΕΣΤΩ κώνυς τμή ή κύκλῳ περιφέρεια ή $\Lambda B\Gamma$, & εφαπτόμεναι αὐτῇ $\Lambda\Delta$, $\Gamma\Delta$, & ἐπιζευχθεῖσαι ή $\Lambda\Gamma$ διχα πετμήσθω κατὰ τὸ E , & ἐπιζεύχθω ή $\Delta B E$, & ήχθῶ δὲ τὸ μὲν τῷ Λ πρὸς τὴν $\Gamma\Delta$ ή ΛZ , δὲ τὸ δὲ Γ πρὸς τὴν $\Lambda\Delta$ ή ΓH , & εἰλήθῃω π σημείον ὅπῃ τῇ γραμμῇ τὸ Θ , & ἐπιζευχθεῖσαι αὐτῶν $\Lambda\Theta$, $\Gamma\Theta$ & ἐκτελεσθῶσιν ὅπῃ τὰ H , Z . λέγω ὅπῃ τὸ ὑπὸ ΛZ , ΓH πρὸς τὸ δὲ $\Lambda\Gamma$ τὴν συγκείμενον ἔχει λόγον, ὅτι ὅν ἔχει τὸ δὲ $E B$ πρὸς τὸ δὲ $B\Delta$ καὶ ἐκ τῶν ὅν ἔχει τὸ ὑπὸ $\Lambda\Delta\Gamma$ πρὸς τὸ τέταρτον & δὲ $\Lambda\Gamma$, τῆς τῇ $\Lambda E\Gamma$.



ήχθῶ δὲ τὸ μὲν τῷ Λ πρὸς τὴν $\Gamma\Delta$ ή ΛZ , & ἐπιζεύχθω ή $\Delta B E$, & ήχθῶ δὲ τὸ δὲ Γ πρὸς τὴν $\Lambda\Delta$ ή ΓH , & εἰλήθῃω π σημείον ὅπῃ τῇ γραμμῇ τὸ Θ , & ἐπιζευχθεῖσαι αὐτῶν $\Lambda\Theta$, $\Gamma\Theta$ & ἐκτελεσθῶσιν ὅπῃ τὰ H , Z . λέγω ὅπῃ τὸ ὑπὸ ΛZ , ΓH πρὸς τὸ δὲ $\Lambda\Gamma$ τὴν συγκείμενον ἔχει λόγον, ὅτι ὅν ἔχει τὸ δὲ $E B$ πρὸς τὸ δὲ $B\Delta$ καὶ ἐκ τῶν ὅν ἔχει τὸ ὑπὸ $\Lambda\Delta\Gamma$ πρὸς τὸ τέταρτον & δὲ $\Lambda\Gamma$, τῆς τῇ $\Lambda E\Gamma$.

δὲ $M B$, τῆς τῇ $N B M$, ὅπως τὸ δὲ ΛK πρὸς τὸ ὑπὸ $Z K \Theta$, τῆς τῇ $\Lambda \Theta K$. ὡς δὲ ή $N\Gamma$ πρὸς ΛM ὅπως ή $\Lambda\Gamma$ πρὸς τὴν $K \Lambda$: ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ $N\Gamma$, $M A$ πρὸς τὸ δὲ ΛM ὅπως τὸ ὑπὸ $\Lambda\Gamma$, $K \Lambda$ πρὸς τὸ δὲ $K \Lambda$ δι' ἴσιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ $N\Gamma$, $M A$ πρὸς τὸ ὑπὸ $N B M$ ὅπως τὸ ὑπὸ $\Lambda\Gamma$, $K \Lambda$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\Lambda \Theta K$. τὸ δὲ ὑπὸ $\Lambda\Gamma$, $K \Lambda$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\Lambda \Theta K$ τὴν συγκείμενον ἔχει λόγον, ἐκ τῆς τῇ $\Gamma\Lambda$ πρὸς $\Lambda \Theta$, τῆς τῇ $Z \Lambda$ πρὸς $\Lambda\Gamma$, καὶ τῆς τῇ ΛK πρὸς $K \Theta$, τῆς τῇ $H\Gamma$ πρὸς $\Gamma\Lambda$, ὅς ἐστιν ὁ αὐτὸς τῶν ὅν ἔχει τὸ ὑπὸ $H\Gamma$, $Z \Lambda$ πρὸς τὸ δὲ $\Gamma\Lambda$: ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ $N\Gamma$, $M A$ πρὸς τὸ ὑπὸ $N B M$ ὅπως τὸ ὑπὸ $H\Gamma$, $Z \Lambda$ πρὸς τὸ δὲ $\Gamma\Lambda$. τὸ δὲ ὑπὸ $N\Gamma$, $M A$ πρὸς τὸ ὑπὸ $N B M$ (τῷ ὑπὸ $N \Delta M$ μέσῳ λαμβανομένῳ) τὴν συγκείμενον ἔχει λόγον, ὅτι τῶν ὅν ἔχει τὸ $N\Gamma$, $M A$ πρὸς τὸ ὑπὸ $N \Delta M$ καὶ τὸ ὑπὸ $N \Delta M$ πρὸς τὸ ὑπὸ $N B M$: τὸ ἄρα ὑπὸ $H\Gamma$, $Z \Lambda$ πρὸς τὸ δὲ $\Gamma\Lambda$ τὴν συγκείμενον ἔχει λόγον, ὅτι τῶν ὅν ἔχει τὸ $N\Gamma$, $M A$ πρὸς τὸ ὑπὸ $N \Delta M$ καὶ τῶν ὅν ἔχει τὸ $N \Delta M$ πρὸς τὸ ὑπὸ $N B M$.

πρὸς τὸ ὑπὸ ΝΒΜ. ^β ἀλλ' ὡς μὲν τὸ ὑπὸ ΝΓ, ΜΑ πρὸς τὸ ὑπὸ ΝΔΜ ἕτως τὸ ὑπὸ ΕΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΔ, ^γ ὡς δὲ τὸ ὑπὸ ΝΔΜ πρὸς τὸ ὑπὸ ΝΒΜ ἕτως τὸ ὑπὸ ΓΔΑ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΕΑ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΗΓ, ΑΖ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΓ ἔσται συγκείμενον ἔχει λόγον, ἐκ τῶν δὲ ὑπὸ ΕΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΔ καὶ τῶν ὑπὸ ΓΔΑ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΕΑ.

anguli ΝΔΜ ad rectangulum ΝΒΜ: ^β sed ut rectangulum sub ΝΓ, ΜΑ ad rectangulum ΝΔΜ ita quadratum ex ΕΒ ad quadratum ex ΒΔ; ^γ & ut rectangulum ΝΔΜ ad rectangulum ΝΒΜ ita rectangulum ΓΔΑ ad rectangulum ΓΕΑ: rectangulum igitur sub ΗΓ, ΑΖ ad quadratum ex ΑΓ compositam rationem habet ex ratione quadrati ex ΕΒ ad quadratum ex ΒΔ & ratione rectanguli ΓΔΑ ad rectangulum ΓΕΑ.

EUTOCIUS.

^α Ὡς δὲ τὸ ὑπὸ ΝΓ, ΜΑ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΜ ἕτως τὸ ὑπὸ ΑΓ, ΚΑ πρὸς τὸ ὑπὸ ΚΑ.] Ἐπεὶ γάρ ἔστιν ὡς ἡ ΑΔ πρὸς ΔΜ ἕτως ἡ ΓΔ πρὸς ΔΝ, ἀναστροφῶς ὡς ἡ ΔΑ πρὸς ΑΜ ἕτως ἡ ΔΓ πρὸς ΓΝ· ἀλλὰ ταῦτα δὴ καὶ τὸ ἀνάπαλιν ἔστιν ὡς ἡ ΚΑ πρὸς ΑΔ ἕτως ἡ ΑΓ πρὸς ΓΔ· δι' ἴσου ἄρα ὡς ἡ ΜΑ πρὸς ΑΚ ἕτως ἡ ΝΓ πρὸς ΓΛ, ἐκάλει δὲ ὡς ἡ ΜΑ πρὸς ΝΓ ἕτως ἡ ΚΑ πρὸς ΓΛ· καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ ΝΓ, ΜΑ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΜ ἕτως τὸ ὑπὸ ΑΓ, ΚΑ πρὸς τὸ ὑπὸ ΚΑ.

^β Ἀλλ' ὡς μὲν τὸ ὑπὸ ΝΓ, ΜΑ πρὸς τὸ ὑπὸ ΝΔΜ ἕτως τὸ ὑπὸ ΕΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΔ.] Ἐπεὶ γάρ τὸ ὑπὸ ΑΜ, ΓΝ πρὸς τὸ ὑπὸ ΝΔΜ ἔσται συγκείμενον ἔχει λόγον, ἐκ τῶν δὲ ΑΜ πρὸς ΜΔ καὶ ΓΝ πρὸς ΝΔ. ἀλλ' ὡς ἡ ΑΜ πρὸς ΜΔ ἕτως ἡ ΕΒ πρὸς ΒΔ, ὡς δὲ ἡ ΓΝ πρὸς ΝΔ ἕτως ἡ ΕΒ πρὸς ΒΔ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΑΜ, ΓΝ πρὸς τὸ ὑπὸ ΝΔΜ διπλασίονα λόγον ἔχει τῷ ὑπὸ ΕΒ πρὸς ΒΔ. ἔχει δὲ τὸ ὑπὸ ΕΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΔ διπλασίονα λόγον τῷ ΕΒ πρὸς ΒΔ· ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ ΑΜ, ΓΝ πρὸς τὸ ὑπὸ ΝΔΜ ἕτως τὸ ὑπὸ ΕΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΔ.

^γ Ὡς δὲ τὸ ὑπὸ ΝΔΜ πρὸς τὸ ὑπὸ ΝΒΜ ἕτως τὸ ὑπὸ ΓΔΑ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΕΑ.] Ἐπεὶ γάρ τὸ ὑπὸ ΝΔΜ πρὸς τὸ ὑπὸ ΝΒΜ ἔσται συγκείμενον ἔχει λόγον ἐκ τῶν δὲ ΔΝ πρὸς ΝΒ καὶ ΔΜ πρὸς ΜΒ, ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΔΝ πρὸς ΝΒ ἕτως ἡ ΔΓ πρὸς ΓΕ, ὡς δὲ ἡ ΔΜ πρὸς ΜΒ ἕτως ἡ ΔΑ πρὸς ΑΕ· ἔξει ἄρα τὸν συγκείμενον ἐκ τῶν ΔΓ πρὸς ΓΕ καὶ ΔΑ πρὸς ΑΕ, ὅς ἐστιν ὁ αὐτὸς τῷ ὑπὸ ΕΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΕΑ· ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ ΝΔΜ πρὸς τὸ ὑπὸ ΝΒΜ ἕτως τὸ ὑπὸ ΓΔΑ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΕΑ.

^α Ut autem rectangulum sub ΝΓ, ΜΑ ad quadratum ex ΑΜ ita rectangulum sub ΑΓ, ΚΑ ad quadratum ex ΚΑ.] Quoniam enim ut ΑΔ ad ΔΜ ita ΓΔ ad ΔΝ, erit per conversionem rationis ut ΔΑ ad ΑΜ ita ΔΓ ad ΓΝ; eadem quoque ratione & invertendo demonstrabitur ut ΚΑ ad ΑΔ ita ΑΓ ad ΓΔ: ergo ex æquali ut ΜΑ ad ΑΚ ita ΝΓ ad ΓΛ, & permutando ut ΜΑ ad ΝΓ ita ΚΑ ad ΓΛ: ut igitur rectangulum sub ΝΓ, ΜΑ ad quadratum ex ΑΜ ita rectangulum sub ΑΓ, ΚΑ ad quadratum ex ΚΑ.

^β Sed ut rectangulum sub ΝΓ, ΜΑ ad rectangulum ΝΔΜ ita quadratum ex ΕΒ ad quadratum ex ΒΔ.] Nam cum rectangulum sub ΑΜ, ΓΝ ad rectangulum ΝΔΜ compositam rationem habeat ex ratione ΑΜ ad ΜΔ & ratione ΓΝ ad ΝΔ; ut autem ΑΜ ad ΜΔ ita ΕΒ ad ΒΔ, ut vero ΓΝ ad ΝΔ ita ΕΒ ad ΒΔ: habebit igitur rectangulum sub ΑΜ, ΓΝ ad rectangulum ΝΔΜ rationem duplicatam ejus quam habet ΕΒ ad ΒΔ. sed quadratum ex ΕΒ ad quadratum ex ΒΔ duplicatam habet rationem ipsius ΕΒ ad ΒΔ: quare ut rectangulum sub ΑΜ, ΓΝ ad rectangulum ΝΔΜ ita quadratum ex ΕΒ ad quadratum ex ΒΔ.

^γ Et ut rectangulum ΝΔΜ ad rectangulum ΝΒΜ ita rectangulum ΓΔΑ ad rectangulum ΓΕΑ.] Quoniam enim rectangulum ΝΔΜ ad rectangulum ΝΒΜ rationem habet compositam ex ratione ΔΝ ad ΝΒ & ratione ΔΜ ad ΜΒ; ut autem ΔΝ ad ΝΒ ita ΔΓ ad ΓΕ, & ut ΔΜ ad ΜΒ ita ΔΑ ad ΑΕ: habebit igitur rationem compositam ex ratione ΔΓ ad ΓΕ & ratione ΔΑ ad ΑΕ; quæ quidem ratio eadem est quam rectangulum ΓΔΑ habet ad rectangulum ΓΕΑ: ut igitur rectangulum ΝΔΜ ad rectangulum ΝΒΜ ita rectangulum ΓΔΑ ad rectangulum ΓΕΑ.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ η'.

Εὰν τὴν ἀντικείμενην δύο εὐθείαι ἐφαπτόμεναι συμπίπτουσιν, καὶ ἀλλήλῃς τὴν συμπίπτουσαν ἀχθῇ εὐθεῖα παρὰ τὴν ταῖς ἀφὰς ἐπιζευγνύσασιν, ἀπὸ δὲ τῶν ἀφῶν διαχθῶσι παράλληλαι ταῖς ἐφαπτομέναις, περὶ τὰς ἀφῶν δὲ ἀπὸ τῶν ἀφῶν πρὸς τὸ αὐτὸ σημεῖον ἔτι πλείους τομῆς τίμνηται ταῖς ἀλλήλῃς· τὸ πλεονέχον ὑπὸ τῶν ἀποτεμνομένων πρὸς τὸ ἀπὸ τῶν ἀφῶν ἐπιζευγνύσας περὶ ἀγνοίᾳ λόγον ἔχει, ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν ἐφαπτομένων πλεονέχον πρὸς τὸ ἀπὸ τῶν ἡγμένων ἀπὸ τῶν συμπίπτουσιν παρὰ τὴν ταῖς ἀφὰς ἐπιζευγνύσασιν ἕως τῶν τομῶν.

ΕΣΤΩΣΑΝ ἀντικείμεναι αἱ ΑΒΓ, ΔΕΖ, ἐφαπτόμεναι τῇ αὐτῇ αἱ ΑΗ, ΗΔ, ἢ ἐπιζευγνύω ἡ ΑΔ, καὶ ἀπὸ μὲν τῆς Α πρὸς τὴν ΑΔ ἡ ΓΗΕ, ἀπὸ δὲ τῆς Δ πρὸς τὴν ΔΗ ἡ ΑΜ,

PROP. LV. Theor.

Si duæ rectæ lineæ oppositas sectiones contingentes sibi ipsis occurrant, & per occursum ducatur recta jungenti tactus parallela; per tactus vero ducantur contingentibus parallelæ, & à tactibus ad idem alterutræ sectionis punctum ducantur rectæ quæ parallelas fecerint: rectangulum sub abscissis contentum ad quadratum ejus quæ tactus jungit eandem rationem habebit, quam rectangulum sub contingentibus factum ad quadratum rectæ ab occurfu ad sectionem ductæ jungentique tactus parallelæ.

SINT oppositæ sectiones ΑΒΓ, ΔΕΖ, quas contingant rectæ ΑΗ, ΗΔ; & junctâ ΑΔ ducatur per Η recta ΓΗΒ ipsi ΑΔ parallela; & à puncto Α ducatur ΑΜ parallela ipsi ΔΗ, atque

H h h

atque


πρὸς τὸ τέταρτον μέρος ἢ ἀπὸ τῆς ἀφ' ἑαυτῆς ὑπερβολῆς.

gentibus factum ad quartam partem quadrati tactus jungentis.

ΕΣΤΩΣΑΝ ἀντιμέμναι αἱ $AB, ΓΔ$, ὧν κέντρον τὸ O , ἐφαπτόμεναι ἢ αἱ $AEZH, BEΘK$, καὶ ἐπιζεύξω ἡ AB , καὶ διχα τεμήσθω κατὰ τὸ $Λ$, καὶ ἐπιζεύξω ἡ AE διήχθω δὲ τὸ $Δ$, καὶ ἡχθῶ ἀπὸ $Δ$ πρὸς τὴν BE ἡ AM , ἀπὸ δὲ $Δ$ πρὸς τὴν AE ἡ BN , εἰλήφθω δὲ π σημείον ἐπὶ τῇ $ΓΔ$ τμήσθω τὸ $Γ$, καὶ ἐπιζεύξω αἱ $ΓBM, ΓAN$. λέγω ὅτι τὸ ὑπὸ BN, AM πρὸς τὸ ἀπὸ AB λόγος ἔχει τὸ συγκείμενον, ἐκ τῶν ὅν ἔχει τὸ ἀπὸ $ΑΔ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΔΕ$ καὶ τὸ ὅν ἔχει τὸ ὑπὸ $ΑΕΒ$ πρὸς τὸ τέταρτον τῆς ἀπὸ AB , τετάρτη τὸ ὑπὸ $ΑΔΒ$.

Sint oppositæ sectiones $AB, ΓΔ$, quarum centrum O , & contingentes $AEZH, BEΘK$; & juncta AB dividatur bifariam in $Λ$, & jungatur AB & ad $Δ$ producat; à puncto autem A ducatur AM ipsi BE parallela, & à puncto B recta BN parallela ipsi AE ; denique sumpto in sectione $ΓΔ$ quovis puncto $Γ$, jungantur $ΓBM, ΓAN$: dico rectangulum sub BN, AM ad quadratum ex AB rationem habere compositam, ex ratione quadrati ex $ΑΔ$ ad quadratum ex $ΔΕ$ & ratione rectanguli $ΑΕΒ$ ad quartam partem quadrati ex AB , sive ad rectangulum $ΑΔΒ$.

Ηχθῶσιν γὰρ ἀπὸ τῶν $Γ, Δ$ πρὸς τὴν AB αἱ $ΗΓΚ, ΖΔΘ$. φανερόν δ' ἡ, ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ $ΑΛ$ τῇ $ΛΒ$, ὅτι ἴση ἡ $ΔΘ$ τῇ $ΔΖ$ καὶ ἡ $ΚΖ$ τῇ $ΖΗ$. ἔτι δὲ καὶ ἡ $ΞΓ$ τῇ $ΞΠ$ ἴση, ὥστε καὶ ἡ $ΓΚ$ τῇ $ΗΠ$. καὶ ἐπεὶ ἀντιμέμναι εἰσιν αἱ $AB, ΔΓ$, ἐφαπτόμεναι δὲ αἱ $BEΘ, ΘΔ$, καὶ πρὸς τὴν $ΔΘ$ ἡ $ΚΗ$. ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ $ΒΘ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΘΔ$ ὅτως τὸ ἀπὸ $ΒΚ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΠΚΓ$. ἴσων δὲ τὸ μὲν ἀπὸ $ΘΔ$ τῷ ὑπὸ $ΘΔΖ$, τὸ δὲ ὑπὸ $ΠΚΓ$ τῷ ὑπὸ $ΚΓΗ$. ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ $ΒΘ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΘΔΖ$ ὅτως τὸ ἀπὸ $ΒΚ$



Ducantur enim à punctis $Γ, Δ$ rectæ $ΗΓΚ, ΖΔΘ$ paralleles ipsi AB : patet igitur, ob $ΑΛ$ æqualem ipsi $ΛΒ$, quod $ΔΘ$ ipsi $ΔΖ$ æqualis sit & $ΚΞ$ ipsi $ΞΗ$. sed [per 47. r. huj.] $ΞΓ$ est æqualis ipsi $ΞΠ$: ergo & $ΓΚ$ ipsi $ΗΠ$ & quoniam $AB, ΔΓ$ oppositæ sectiones sunt, contingentesque $BEΘ, ΘΔ$, & ducta est $ΚΗ$ ipsi $ΘΔ$ parallela; erit [per 18.3. huj.] ut quadratum ex $ΒΘ$ ad quadratum ex $ΘΔ$ ita quadratum ex $ΒΚ$ ad rectangulum $ΠΚΓ$. quadratum autem ex $ΘΔ$ est æquale rectangulo $ΘΔΖ$, & rectangulum $ΠΚΓ$ rectangulo $ΚΓΗ$; ergo ut quadratum ex $ΒΘ$ ad re-

πρὸς τὸ ὑπὸ $ΚΓΗ$. ἔτι δὲ καὶ ὡς τὸ ὑπὸ $ΖΑ$, $ΘΒ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΘΒ$ ὅτως τὸ ἀπὸ $ΗΑ$, $ΚΒ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΚΒ$. δι' ἴσων ἄρα ἐστὶν ὡς τὸ ὑπὸ $ΑΖ$, $ΘΒ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΘΔΖ$ ὅτως τὸ ὑπὸ $ΑΗ$, $ΚΒ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΚΓΗ$. ὁ δὲ τῶν ὑπὸ $ΑΖ$, $ΘΒ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΘΔΖ$ λόγος (τῶν ὑπὸ $ΘΕΖ$ μέσων λαμβανόμενος) συγκείμενος ἐκ τῶν ὑπὸ $ΑΖ$, $ΘΒ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΘΕΖ$ καὶ τῶν ὑπὸ $ΘΕΖ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΘΔΖ$. καὶ ἔστιν ὡς μὲν τὸ ὑπὸ $ΑΖ$, $ΘΒ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΘΕΖ$ ὅτως τὸ ἀπὸ $ΑΔ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΔΕ$, ὡς ἡ τὸ ὑπὸ $ΘΕΖ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΘΔΖ$ ὅτως τὸ ὑπὸ


dratum ex $ΒΚ$ ad rectangulum $ΚΓΗ$. sed ut rectangulum sub $ΖΑ$, $ΘΒ$ ad quadratum ex $ΘΒ$ ita rectangulum sub $ΗΑ$, $ΚΒ$ ad quadratum ex $ΚΒ$ *: ex æquali igitur ut rectangulum sub $ΑΖ$, $ΘΒ$ ad rectangulum $ΘΔΖ$ ita rectangulum ex $ΑΗ$, $ΚΒ$ ad rectangulum sub $ΚΓΗ$. ratio autem rectanguli sub $ΑΖ$, $ΘΒ$ ad rectangulum $ΘΔΖ$ (sumpto medio rectangulo $ΘΕΖ$) componitur ex ratione rectanguli sub $ΑΖ$, $ΘΒ$ ad rectangulum $ΘΕΖ$ & ratione rectanguli $ΘΕΖ$ ad rectangulum $ΘΔΖ$. sed ut rectangulum sub $ΑΖ$, $ΘΒ$ ad rectangulum $ΘΕΖ$ ita quadratum ex $ΑΔ$ ad quadratum ex $ΔΕ$ †. & ut rectangulum $ΘΕΖ$ ad rectangulum $ΘΔΖ$ ita [per 12. lem. 3. huj.] rectangulum

* Quoniam enim similia sunt triangula $ΑΕΒ, ΘΕΖ, ΚΕΗ$, erit $ΖΕ$ ad $ΕΑ$ ut $ΘΕ$ ad $ΕΒ$; & ideo componendo, ut $ΖΑ$ ad $ΑΕ$ ita $ΘΒ$ ad $ΒΕ$. Pari modo constat esse $ΗΑ$ ad $ΑΕ$ ut $ΚΒ$ ad $ΒΕ$; & invertendo, ut $ΑΕ$ ad $ΑΗ$ ita $ΒΕ$ ad $ΒΚ$: quare, ex æquali, est $ΖΑ$ ad $ΑΗ$ sicut $ΘΒ$ ad $ΒΚ$; adeoque $ΖΑ$ ad $ΘΒ$ ut $ΑΗ$ ad $ΒΚ$. sed ut $ΖΑ$ ad $ΘΒ$ ita rectangulum sub $ΖΑ$, $ΘΒ$ ad quadratum ex $ΘΒ$; & ut $ΑΗ$ ad $ΒΚ$ ita rectangulum sub $ΗΑ$, $ΚΒ$ ad quadratum ex $ΚΒ$: est igitur ut rectangulum sub $ΖΑ$, $ΘΒ$ ad quadratum ex $ΘΒ$ ita rectangulum sub $ΗΑ$, $ΚΒ$ ad quadratum ex $ΚΒ$.

† Nam ratio rectanguli sub $ΑΖ$, $ΘΒ$ ad rectangulum $ΘΕΖ$ componitur ex ratione $ΑΖ$ ad $ΖΕ$ & ratione $ΒΘ$ ad $ΘΕ$. sed tam ratio $ΑΖ$ ad $ΖΕ$ quam ratio $ΒΘ$ ad $ΘΕ$ eadem est cum ratione $ΑΔ$ ad $ΔΕ$: ergo ratio ex illis composita (hoc est ratio rectanguli sub $ΑΖ$, $ΘΒ$ ad rectangulum $ΘΕΖ$) eadem est cum ratione quadrati ex $ΑΔ$ ad quadratum ex $ΔΕ$.

ΑΕΒ

$\triangle AEB$ ad rectangulum $\triangle AAB$; ergo ratio rectan-
 guli sub AH , BK ad rectangulum $K\Gamma H$ compo-
 sita est ex ratione qua-
 drati ex $\triangle A\Delta$ ad qua-
 dratum ex $\triangle AB$ & ra-
 tione rectanguli $\triangle AEB$
 ad rectangulum $\triangle AAB$.
 habet autem rectangu-
 lum sub AH , BK ad re-
 ctangulum $K\Gamma H$ ratio-
 nem compositam ex ra-
 tione BK ad $K\Gamma$ & ra-
 tione AH ad $H\Gamma$. at-
 qui ut BK ad $K\Gamma$ ita
 est [per 4. 6.] MA ad
 AB , & ut AH ad $H\Gamma$
 ita NB ad BA : ratio
 igitur composita ex ra-
 tione MA ad AB &
 ratione NB ad BA , quæ
 quidem eadem est quam
 habet rectangulum sub
 AM , BN ad quadra-
 tum ex AB , componi-
 tur ex ratione quadrati
 ex $\triangle A\Delta$ ad quadratum
 ex $\triangle AB$ & ratione rectanguli $\triangle AEB$ ad rectangu-
 lum $\triangle AAB$.



$\triangle AEB$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\triangle AAB$: ὁ ἄρα τῶ ὑπὸ AH ,
 BK πρὸς τὸ ὑπὸ $K\Gamma H$ λόγος σύγκειται ἐκ τῶ
 ἑξ ἀπὸ $\triangle A\Delta$ πρὸς τὸ ἀπὸ
 $\triangle AB$ καὶ τῶ ὑπὸ $\triangle AEB$
 πρὸς τὸ ὑπὸ $\triangle AAB$.
 ἔχει δὲ τὸ ὑπὸ AH ,
 BK πρὸς τὸ ὑπὸ $K\Gamma H$
 τὸν συγκείμενον λόγον,
 ἐκ τῶ τῆς BK πρὸς
 $K\Gamma$ καὶ τῶ τῆς AH
 πρὸς $H\Gamma$. ἀλλ' ὡς μὲν
 ἡ BK πρὸς $K\Gamma$ ἕσσας
 ἡ MA πρὸς AB , ὡς
 δὲ ἡ AH πρὸς $H\Gamma$ ἕ-
 τως ἡ NB πρὸς BA .
 ὁ ἄρα συγκείμενος λό-
 γος ἐκ τῶ τῆς MA
 πρὸς AB καὶ τῶ τῆς
 NB πρὸς BA , ὅς ἐστιν
 ὁ αὐτὸς τῶ ὃν ἔχει τὸ
 ὑπὸ $\triangle AM$, BN πρὸς
 τὸ ἀπὸ $\triangle AB$, σύγκειται
 ἐκ τῶ ἑξ ἀπὸ $\triangle A\Delta$ πρὸς τὸ ἀπὸ $\triangle AB$ καὶ τῶ ὑπὸ
 $\triangle AEB$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\triangle AAB$.

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΠΕΡΓΑΙΟΥ
ΚΩΝΙΚΩΝ
ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟΝ,

ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΥΤΟΚΙΟΥ ΑΣΚΑΛΩΝΙΤΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ.

APOLLONII PERGÆI
CONICORUM
LIBER QUARTUS,
CUM COMMENTARIIS EUTOCII ASCALONITÆ.

Απολλώνιος Ἀττάλῳ χαίρειν.

Apollonius Attalo S. P.

ΠΡΟΤΕΡΟΝ μὲν ἐξέδωκα, γράψας
πρὸς Εὐδῆμον τὸν Περγαμῶν, ὅτι σπι-
ταγμῶσι ἡμῖν Κωνικῶν ἐν οὐκτώ βι-
βλίαις τὰ πρῶτα τρία μεταλλαχόντος δὲ ἐκείνου,
τὰ λοιπὰ διαγοσκότες πρὸς σε γράψαι, διὰ τὸ
φιλοτιμῶσάι σε μεταλαμβάνειν τὰ ὑφ' ἡμῶν
παραγματούδεια, πεπόμενα ὅτι ἔπαρτος
οὐ τὸ τέταρτον. περὶ δὲ τῶτο καὶ πόσα ση-
μεῖα πλεῖστα δυνατὰ ὅτι ταῖς τῶν κόνων τομαῖς
ἀλλήλαις τε καὶ τῇ ἑκάστη κύκλῳ περιφέρειᾳ συμβάλ-
λουν, εἴη περ μὴ ὅλα ὅτι ὅλας ἐφαρμόζωσι· ἐπὶ
κόνων τομῇ καὶ κύκλῳ περιφέρειᾳ ταῖς ἀντικειμέναις
κατὰ πόσα σημεῖα πλεῖστα συμβάλλουσι, καὶ ἐπὶ
ἀντικείμεναις ἀντικειμέναις· καὶ ἐκτὸς τούτων ἄλλα
ἐκ ὀλίγα ὅμοια τούτοις. τούτων δὲ τὸ μὲν πρῶτον
ρημῶν Κόνων ὁ Σάμιος ἐξέδωκε πρὸς Θερασίδαιον,
ἐκ ὁρῶς ἐν ταῖς ἀποδείξεσιν ἀναγραφείς· διὸ καὶ
μετρίως αὐτῷ ἀνδράγατο Νικοτέλης ὁ Κυρηναῖος.
ὡς δὲ ἔδωκεν μετὰ μόνον πεποιθὲς ὁ Νικοτέ-

ΑΝΤΕΑ quidem ex octo libris,
quos de Conicis composuimus,
tres priores ad *Eudemum Perga-*
menum scriptos edidimus. Verum eo mor-
tuo, cum reliquos ad Te mittere decre-
verimus, quartum hunc, quod scripto-
rum nostrorum desiderio teneris, in præ-
sentia ad Te mittimus. Ostendit autem
ad quot puncta, ut plurimum, Coni-
sectiones inter se & circuli circumfe-
rentiæ occurrant, nisi totæ totis con-
gruant: præterea ad quot puncta, ut
plurimum, Coni sectio & circuli cir-
cumferentia oppositis sectionibus con-
veniant; itemque oppositæ sectiones
oppositis sectionibus: atque ad hæc alia
non pauca his similia. Horum autem
primum *Conon Samius* ad *Thrasydæum*
scribens explicavit, non ritè confectis
demonstrationibus: quamobrem *Nicoteles*
Cyrenæus eum nonnihil reprehendit. Ve-
rum secundi mentionem tantum fecit Ni-

I ii

coteles

coteles in libro contra *Cononem*, tanquam ejus quod facile demonstrari posset: quod tamen nos neque ab illo neque ab alio quopiam demonstratum invenimus. At tertium cæteraque id genus plane nemini in mentem venisse comperimus. Ex dictis autem quotquot ab aliis non demonstrata deprehendimus multa atque varia postulant Theoremata nova; quorum plurima in tribus prioribus libris, reliqua autem in hoc ipso exposuimus. Hæc vero probe perspecta non parum utilitatis afferunt tam ad problematum compositiones quam ad eorundem determinationes. Verum *Nicoteles* quidem, ob dissensionem quæ illi cum *Conone* erat, nihil ex iis quæ à *Conone* inventa sunt ad problematum *διορισμους* commodi provenire asserit: quod plane falsum. Nam etiamsi omnino absque his determinationes dare liceret; eorum tamen ope nonnulla facilius percipiuntur: veluti quod problema pluribus modis construi possit, vel quot modis, vel etiam quod nullo modo fiat. Hujusmodi autem præcognitio satis idoneam solutiones quærendi præbet ansam; & ad *analyses διαρισμῶν* Theoremata hæc admodum utilia sunt. Verum & absque hac utilitate, propter ipsas demonstrationes digna erunt quæ recipiantur: multa enim alia in Mathematicis disciplinis ob hoc ipsum, nec ob aliquid aliud, recipere consuevimus.

EUTOCIUS.

Quartus liber, *Antiboni* amicissime, inquit, quot modis conorum sectiones inter se & circuli circumferentiæ convenient, siue contingentes fuerint siue secantes. Est autem & elegans & legentibus perspicuus, præsertim ex editione nostra: ac ne commentariis quidem ullis indiget, quod enim necessarium est explet ipse textus. In eo autem omnia demonstrantur argumentatione ducente ad impossibile; sicut & *Euclides* fecit in iis quæ de intersectionibus & tactionibus circuli conscripsit. quæ sanè ratio & ad usum accommodata & necessaria *Aristoteli* ac *Geometris*, præcipue vero *Archimedi*, visa est. Itaque tibi quatuor libros perlegenti licebit, adhibitis Conicis, resolvere & componere quodcunque propositum fuerit: quocirca & ipse *Apollonius* in principio libri dixit quatuor libros ad hujus disciplinæ elementa sufficere, reliquos autem quatuor ad abundantiorē scientiam pertinere. Perlege igitur eos diligenter, & si tibi placuerit reliquos ad eandem formam à nobis edi, id quoque Deo duce fiet. *Vale.*

PROP. I. Theor.

Si in coni sectione, vel circuli circumferentia, aliquod punctum extra sumatur; atque ab eo ad sectionem ducantur duæ rectæ lineæ, una quidem contingens, altera vero in duobus punctis secans; & quam rationem habet

λῆς ἐν τῇ πρὸς τὸν Κόωνα ἀπὸ γραφῇ, ὡς δυναμὸς δεχθῆναι. θεωρούμεθα δὲ ὅτι ὑπ' αὐτῷ τῷ τῷ ὅδ' ὑπ' ἄλλῃ πρὸς ἐντετύχαται. τὸ μὲν τοι τρίτον, καὶ τὰ ἄλλα τὰ ὁμογενῆ τέτοις, ἀπλῶς ὑπὸ ὁμογενῶς γενημένα εἴρηκα. πάντα δὲ τὰ λεχθέντα, ὅσως ἐκ ἐντετύχα, πολλῶν ἔχουσιν ἀπὸ τοῦ ξενίζοντος θεωρημάτων. ὅτι τὰ μὲν πλεῖστα τυγχάνουσιν ἐν τοῖς θεωρηματικῇ βιβλίοις ἐκτεθεαῖς, τὰ δὲ λοιπὰ ἐν τῷ τῷ. ταῦτα δὲ θεωρηθέντα χρειαῖν ἰκανῶς παρέχεται πρὸς τε τὰς τὰς θεωρηματικῇ συλλήσεις καὶ τὰς διορισμούς. Ναικατέλῃς μὲν γὰρ, ἔπειτα τὸ πρὸς τὸν Κόωνα ἀναφορῆς, ὁδὸς μίας ἐκ τῇ ὑπὸ ὁ Κόωνος εὐρήμειται εἰς τοὺς διορισμούς φησι ἔρχομαι χρειαῖν, ἐκ ἀληθῆ λέγον. καὶ ὅς ἐστιν ὅσως ἀπὸ τῷ τῷ διὰ τοὺς διορισμούς ἀποδιδόσθαι, ἀλλὰ τοῖς δι' αὐτῶν ὅτι κατενοῶν θεωρημάτων εἶναι. οἷον ὅτι πλεοναχῶς ἢ ποσυνταχῶς αἰ γένοιτο, καὶ πάλιν ὅτι ἐκ αἰ γένοιτο. ἡ δὲ τοιαύτη πρόγνῳσις ἰκανῶς ἀφορμὴν συμβάλλει πρὸς τὰς ζητήσεις. καὶ πρὸς τὰς ἀναλύσεις τῶν διορισμῶν εὐχρηστα τὰ θεωρηματικά ἐστὶ ταῦτα. χρειαῖς δὲ τῆς τοιαύτης εὐχρησίας, καὶ δι' αὐτὰς τὰς ἀποδείξεις ἀξία ἐστὶν ἀποδοχῆς. καὶ ὅς ἄλλα πολλὰ τῶν ἐν τοῖς μαθηματικῇ ἀφ' ὅτῳ, καὶ ἐν δὲ ἄλλοις, ἀποδοχόμενα.

Τὸ τίμαρτον βιβλίον, ὃ οἶμαι ἐπὶ ταῖς Λυδίαις, ζήτησιν μὲν ἔχει, ποσυχῶς αἱ τὴν κωνῆν τοιαύτῃ ἀλλήλαις τε καὶ τῇ τῇ κύκλῳ περιφερίᾳ συμβάλλουσιν, ὅτι ἐκτελεσθῆναι ἢ τίμαρται. ἐστὶ δὲ πρὸς αὐτὴν καὶ σφαιρῆς τοῖς ἐντετύχαται καὶ μάλα καὶ ὑπὸ τῇ ἰσότητι ἐκδοσῆς. καὶ ὅς ἐκτελεσθῆναι δέεται, τὸ ὅς ἐν δὲ αἱ ὁδὸς γραφαὶ πληροῦσι. Ναικατέλῃς δὲ τὰ ἐν αὐτῷ πάντα διὰ τὸ εἰς ἀδυνατῆς ἀπαγωγῆς, ὡς καὶ *Εὐκλείδης* ἔδειξε τὰ περὶ τῶν τοιῶν τῇ κύκλῳ καὶ τῇ ἐπαρῶν. εὐχρηστος δὲ καὶ ἀναγκαῖος ὁ πρὸς τοῖς καὶ τῇ *Λευστοῦ* δοκεῖ καὶ τοῖς γεωμετρίας, καὶ μάλα τῇ *Αρχιμήδους*. ἀναγκαῖον ἐστὶν οὖν τὰ τῶν βιβλίων, δυνατὸν ἐστὶν ἀφ' ὅτῳ τῇ κωνικῇ θεωρηματικῇ ἀναλύσει καὶ συντιθῆναι τὸ θεωρηματικόν. διὸ καὶ αὐτὸς ὁ *Απολλώνιος*, ἐν ἀρχῇ τῇ βιβλίου, φησὶ τὰ τῶν βιβλίων ἀρκεῖν πρὸς τὴν ἀγωγὴν τῶν συλλήσεων, τὰ δὲ λοιπὰ εἶναι θεωρηματικῶν ἀναγκαῖον ἐν αὐτῇ ὁδηγῶν, καὶ εἰ σὺ καὶ θυμὸν γίνῃ καὶ τὰ λοιπὰ κατὰ τῶν τῇ τύποι ὑπ' ἐμῶ ἐκτελεσθῆναι, καὶ τῷ Θεῷ ἰσχυρῶς γινώσκῃ. ἔξωστο.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ α'.

Εάν κωνῆς τομῆς, ἢ κύκλῳ περιφερίᾳ ληφθῇ π σημῆσι ἐκτὸς, καὶ ἀπ' αὐτῇ τῇ τομῇ θεωρηματικῇ δύο εὐθεῖαι, ὅτι ἡ μὲν ἐφάπτη ἡ δὲ τέμνη κατὰ δύο σημῆα, καὶ ὅς ἔχει λόγον ὅλη ἡ τέμνη-
στα

στα πρὸς τὴν ἐκτὸς ἀπολαμβανομένην μεταξὺ τῶν σημείων καὶ τῆς γραμμῆς, εἰς τὴν τμηθῇ ἢ ἐντὸς ἀπολαμβανομένην εὐθεῖαν, ὅταν ταῖς ὁμολόγους εὐθείαις πρὸς αὐτὰς σημείω ἴσων ἢ ἀπὸ τῆς αἰσῆς ὅτι τὴν διαίρεσιν ἀγομένην εὐθεῖαν συμπεσῇται τῇ γραμμῇ, καὶ ἢ ἀπὸ τῆς συμπίπτουσας ὅτι τὸ ἐκτὸς σημῆος ἀγομένην εὐθεῖαν ἐφάπτεται τῆς γραμμῆς.

ΕΣΤΩ γὰρ κύκλος τμηθῇ ἢ κύκλος περιφέρεια ἢ $AB\Gamma$, καὶ εἰλήφθω τὰ σημείων ἐκτὸς τὸ Δ , καὶ ἀπ' αὐτοῦ ἢ μὲν ΔB ἐφαπτομένη κατὰ τὸ B , ἢ δὲ $\Delta E\Gamma$ περνεύει τὴν περιφέρειαν κατὰ τὰ E, Γ , [περιέχοντες πρὸς τὸν κύκλον κατὰ τὸ B ἀφ' ὧν,] ἔστι δὲ ἔχει λόγον ἢ $\Gamma \Delta$ πρὸς ΔE , τῶν ἐχέτω ἢ ΓZ πρὸς $Z E$. λέγω ὅτι ἢ ἀπὸ τῆς B ὅτι τὸ ἀγομένην συμπίπτει τῇ τμηθῇ, καὶ ἢ ἀπὸ τῆς συμπίπτουσας ὅτι τὸ Δ ἐφάπτεται τῆς τμηθῆς.


Ἐπεὶ γὰρ ἢ $\Delta \Gamma$ περνεύει τὴν περιφέρειαν κατὰ δύο σημεία, οὐκ ἔστι διάμετρος αὐτοῦ. διωκτὸν ἀρα εἰς Δ καὶ Δ διάμετρον ἀγαγόν, ὥστε καὶ ἐφαπτομένην. ἔχθω γὰρ ἀπὸ Δ ἐφαπτομένη τῆς τμηθῆς ἢ ΔA , καὶ ὅτι Δ ὁρίζεται ἢ $B A$ περνεύει τὴν $E\Gamma$, εἰ δυνατὸν, μὴ κατὰ τὸ Z , ἀλλὰ κατὰ τὸ H . ἐπεὶ γὰρ ἐφάπτεται αἱ $B \Delta, \Delta A$, καὶ ὅτι τὰς ἀφ' αὐτῶν ἢ $B A$, καὶ διήκται ἢ $\Gamma \Delta$ περνεύει τὴν μὲν περιφέρειαν κατὰ τὰ Γ, E , τὴν δὲ $A B$ κατὰ τὸ H . ἔστω ὡς ἢ $\Gamma \Delta$ πρὸς ΔE ὥστε ἢ ΓH πρὸς $H E$, ὅπερ ἄπορον, ὑπάρκειται γὰρ ὡς ἢ $\Gamma \Delta$ πρὸς ΔE ὥστε ἢ ΓZ πρὸς $Z E$. ἀκ' ἀρα ἢ $B A$ καὶ ἔπειρον σημῆον περνεύει τὴν ΓE κατὰ τὸ Z ἀρα.

Ταῦτα μὲν κοινῶς ὅτι πᾶσιν τῇ τμηθῇ δείκνυται ὅτι τὴν ὑπερβολῆς μόνον, εἰ μὲν ΔB ἐφάπτεται, ἢ δὲ $\Delta \Gamma$ περνεύει κατὰ δύο σημεία τὰ E, Γ , τὰ E, Γ περιέχῃ τὴν κατὰ τὸ B ἀφ' ὧν, ἔστι τὸ Δ σημῆον ἐντὸς ἢ τὸ ὑπὸ τῆς ἀσυμπίπτουσας περιεχομένης γωνίας, ὁμοίως ἢ ἀπὸ τῆς γενήσεως.

Δυνατὸν γὰρ ἀπὸ Δ σημῆος ἄλλην ἐφαπτομένην ἀγαγεῖν εὐθεῖαν τὴν ΔA , ἔστι τὰ λοιπὰ τῆς ἀποδείξεως ὁμοίως ποιῇν.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Β'.

ΤΩΝ αὐτῶν ὄντων, τὰ E, Γ σημεία μὴ περιέχοντες τὴν κατὰ τὸ B ἀφ' ὧν μεταξὺ αὐτῶν [ὅτι τὴν ὑπερβολῆς,] τὸ Δ σημῆον ἐντὸς ἔστω τὸ ὑπὸ τῶν ἀσυμπίπτουσας περιεχομένης γωνίας διωκτὸν ἀρα ἀπὸ Δ ἐπὶ τὴν ἐφαπτομένην ἀγαγεῖν τὴν ΔA , καὶ τὰ λοιπὰ ὁμοίως ἀποδείκνυσθαι.



* Nam si Ellipseos diameter fuerit, res manifesta est ex 34. primi.

tota secans ad partem ejusdem quæ extra sumitur, inter punctum & sectionem interjecta, in eandem dividatur ea pars quæ est intra, ita ut rectæ eandem rationem habentes ad idem punctum conveniant: quæ à tactu ad divisionem ducitur, occurret sectioni; & quæ ab occurfu ducitur ad punctum extra sumptum, sectionem continget.

ΣΙΤ conic section, vel circuli circuli circumferentia $AB\Gamma$; & puncto extra sectionem sumpto, quod sit Δ , ab eo ducatur recta ΔB quidem contingens sectionem in B ; $\Delta E\Gamma$ vero in punctis E, Γ secans, [quæ primum contineant punctum tactus B ;] & quam rationem habet $\Gamma \Delta$ ad ΔE , eandem habeat ΓZ ad $Z E$: dico rectam, quæ à puncto B ad Z ducitur occurrere sectioni; & quæ ab occurfu ducitur ad Δ , sectionem contingere.

Quoniam enim recta $\Delta \Gamma$ sectionem in duobus punctis secat, cum non sit ipsius diameter, licebit per Δ diametrum & ideo contingentem ducere. ducatur [per 49.2. huj.] à puncto Δ recta ΔA sectionem contingens; & juncta $B A$ secet ipsam $E\Gamma$ non in Z , sed in alio puncto H , si fieri possit. itaque quoniam rectæ $B \Delta, \Delta A$ sectionem contingunt; & tactus jungit recta $B A$;

recta vero $\Gamma \Delta$ sectionem in punctis Γ, E secat, ipsamque $A B$ secat in H : erit [per 37. 3. huj.] ut $\Gamma \Delta$ ad ΔE ita ΓH ad $H E$, quod est absurdum; posuimus enim, ut $\Gamma \Delta$ ad ΔE ita esse ΓZ ad $Z E$: igitur $B A$ non secat ΓE in alio puncto; quare in ipso Z secet necesse est.

Hæc quidem communiter in omnibus sectionibus demonstrata sunt: at in hyperbola tantum, si recta ΔB sectionem contingat, & $\Delta \Gamma$ in punctis B, Γ secet, puncta vero E, Γ contineant tactum ad B , & punctum Δ sit intra angulum asymptotis comprehensum, similiter fiet demonstratio.

Possumus enim tunc solum à puncto Δ aliam ducere contingentem ΔA , & quæ reliqua sunt ad demonstrationem perficere.

PROP. II. Theor.


IS D E M existentibus, puncta B, Γ tactum ad B non contineant; at, si fuerit hyperbola, sit punctum Δ intra angulum asymptotis comprehensum; possumus igitur [per 49. 2. huj.] à puncto Δ alteram contingentem ducere, quæ sit ΔA , & reliqua similiter demonstrare.

* P R O P.

*PROP. III. Theor.

SI vero sectio AB fuerit Parabola, quam contingat ΓΑ, secet autem ΓΒ in uno tantum puncto, ac fiat EZ æqualis ipsi ΓΒ: dico rectam à puncto A ad Z ductam ordinatim esse applicatam, & quæ ab occurſu ejus cum ſectione ad punctum Γ ducitur ſectionem contingere.

Quoniam enim ſectio parabola est, ac ΓΕ in uno tantum puncto occurrit ſectioni, erit ΓΒΖ ſectionis diameter. nam ſi non ſit diameter, fiat ΕΔ diametro parallela, & [per 46.



1. huj.] erit ΕΔ diameter ſectionis. & quoniam ΓΕΖ occurrit diametro, producta etiam occurrit ſectioni [per 27. 1. huj.] in alio puncto; quod est abſurdum. poſuimus enim eam in uno tantum puncto occurrere: adeoq; ΓΕΖ est ſectionis diameter. cumque ΓΒ æqualis ſit ipſi ΕΖ, erit [per 33. 1. huj.] ΑΖ ordinatim applicata, ac producta occurrit ſectioni. occurrat ad Β, ac [per eandem 33^{am}] juncta ΓΒ continget ſectionem, ob ΓΕ ipſi ΕΖ æqualem, ac ΒΖ ordinatim applicatam.

* Tam in Codice Armachano quam in Epitome ejus per Abdolmelec, præcedens Propositio pro ſecundâ habetur, quæ in Græcis quidem MSS. non reperitur. Quoniam vero in Græcis ſecunda propositio primæ tantum particula ſit, & propositio vix dici mereatur, nos eam primæ ſubjecimus, & hanc Arabum ſecundam (quæ vix alia est quam converſa 33^æ primi) tertiam fecimus, ne Propoſitionum ordo in citationibus turbaretur.


PROP. IV. Theor.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Δ'.

SI in Hyperbola occurſus Ε, Γ contineant tactum ad Β, & punctum Δ ſit in angulo qui deinceps est angulo aſymptotis comprehenſio: recta, quæ à tactu ad diviſionem ducitur, occurrit oppoſitæ ſectioni, & quæ ab occurſu ejus ad punctum Δ ducitur eandem ſectionem continget.

Sint oppoſitæ ſectiones Β, Θ, quarum aſymptoti ΚΑ, ΜΞΝ; & punctum Δ ſit in angulo ΑΞΝ; ab eo autem ducta recta ΔΒ ſectionem contingat, & ΔΓ ſecet, ita ut occurſus Ε, Γ tactum ad Β contineant; & quam rationem habet ΓΔ ad ΔΕ eandem habeat ΓΖ ad ΖΕ. demonſtrandum eſt rectam, quæ à puncto Β ad Ζ ducitur, occurrere ſectioni Θ; & quæ ab occurſu ducitur ad Δ ſectionem contingere.

Ducatur enim à puncto Δ recta ΔΘ ſectionem contingens; & juncta ΘΒ, ſi fieri poſſit, non tranſeat per Ζ, ſed per aliud punctum Η: eſt igitur [per 37. 3. huj.] ut ΓΔ ad ΔΒ ita ΓΗ ad ΗΕ, quod eſt abſurdum; poſuimus enim ut ΓΔ ad ΔΕ ita eſſe ΓΖ ad ΖΕ.



ΕΑΝ ἐν τῇ ὑπερβολῇ αἱ μὲν Ε, Γ συμπίπτουσιν πρὸς τὸ Β ἀφ' ὧν ἀπέχωνται, τὸ δὲ Δ σημεῖον ᾗ ἐν τῇ ἐφεξῆς γωνίᾳ τ' ὑπὸ τ' ἀσυμπίπτων ἀπεκρίνεται· ἡ δὲ τ' ἀφ' ἧς ἐπὶ τῷ διαίρεισιν ἀγομένη εὐθεία συμπίπτει τῇ ἀντικείμενῇ τμήνῃ, καὶ ἡ δὲ τ' ἀπὸ τ' ἀσυμπίπτουσιν ἀγομένη εὐθεία ἐφαπταμένη τ' ἀντικείμενης.

Εἰσωσαν ἀντικείμεναι αἱ Β, Θ, καὶ ἀσύμπτωτοι αἱ ΚΑ, ΜΞΝ, ἐπὶ τὸ Δ σημεῖον ἐν τῇ ὑπὸ ΑΞΝ γωνίᾳ, καὶ ἀπ' αὐτῶν ἐφαπτόμεναι μὲν ἡ ΔΒ, πηνέτω δὲ ἡ ΔΓ, καὶ αἱ Ε, Γ συμπίπτουσιν ἀπέχωνται πρὸς τὸ Β ἀφ' ὧν, ἐν ἧς ἔχει λόγον ἡ ΓΔ πρὸς ΔΕ ἔχεται ἡ ΓΖ πρὸς ΖΕ. δεῖξαι ὅτι ἡ ἀπὸ Β πρὸς τὸ Ζ ἀγόμενη συμπίπτει τῇ Θ, καὶ ἡ ἀπὸ τ' ἀσυμπίπτουσιν πρὸς τὸ Δ ἐφαπταμένη τ' ἀντικείμενης.

Ἡχθῶ γὰρ ἀπὸ Β ἐφαπτομένη τ' ἀντικείμενης ἡ ΔΘ, καὶ πηνέτω ἡ ΘΒ πηνέτω, εἰ δυνατὸν, μὴ ἀλλὰ Ζ ἀλλὰ ΖΗ· ἐπεὶ ὅρα ὡς ἡ ΓΔ πρὸς ΔΕ ἔστω ἡ ΓΗ πρὸς ΗΕ, ὅπερ ἀποκρίνεται γὰρ ὡς ἡ ΓΔ πρὸς ΔΕ ἔστω ἡ ΓΖ πρὸς ΖΕ.

PROP. V. Theor.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Ε'.


ISDEM poſitis, ſi punctum Δ ſit in una aſymptotōn; quæ à puncto Β ad Ζ ducitur eidem aſymptoto parallela erit.

ΤΩΝ αὐτῶν ὄντων, εἰ τὸ Δ σημεῖον ἐπὶ πρὸς ἡ τ' ἀσυμπίπτων, ἡ ἀπὸ Β ἐπὶ τὸ Ζ ἀγομένη εὐθεία ἴση τῇ αὐτῇ ἀσυμπίπτω.

ἴση τῇ αὐτῇ ἀσυμπίπτω.

Γποκείτω γδ τὰ αὐ-
τὰ, καὶ τὸ Δ σημεῖον ἐξω
ᾧ μιᾶς τῆς ἀσυμπίπτου-
σαν τῆς MN· δεκτέον
ὅτι ἡ ἀπὸ B τῇ MN
παράλληλος ἀγνομένη
ᾧ τὸ Z πεσεῖται.

Μὴ γδ, ἀλλ', εἰ δυνα-
τὸν, ἔστω ἡ BH· ἔστω δὲ
ὡς ἡ ΓΔ πρὸς ΔΕ
ἕτως ἡ ΓΗ πρὸς ΗΕ,
ὅπερ ἀδύνατον.



Ponantur enim ea-
dem; & punctum Δ
sit in altera asymp-
tōn, videlicet in MN:
demonstrandum est re-
ctam, quæ à puncto
B ipsi MN parallela
ducitur, in punctum
Z cadere.

Non enim, sed, si
fieri potest, sit ea BH:
erit igitur [per 35. 3.
huj.] ut ΓΔ ad ΔΕ ita
ΓΗ ad ΗΕ; quod fieri
non potest.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Ε΄.


Εὰν ὑπερβολῆς ληφθῇ τι σημεῖον ἐκτὸς, καὶ ἀπ' αὐ-
τοῦ πρὸς τὴν τομὴν διαχθῶσι δύο εὐθεῖαι, αἱ
ἡ μὲν ἐφάπτεται, ἡ δὲ παράλληλος ἢ μιᾶ τῶν
ἀσυμπίπτων, καὶ τῇ ἀπαλαμβανομένη ὅτι τὸ
παράλληλον μεταξὺ τῶν τομῶν καὶ τῶν σημείων ἴση
ἐκ' εὐθείας ἐκτὸς τῶν τομῶν τεθῇ· ἡ δὲ ἀπὸ τῆς ἀφῆς
ὅτι τὸ γινόμενον σημεῖον ὅτι ἀγνομένη εὐθεῖα
συμπίπτει τῇ τομῇ, καὶ ἡ ἀπὸ τῆς συμπίπτουσας
ὅτι τὸ ἐκτὸς σημεῖον ἀγνομένη ἐφάπτεται τῇ τομῇ.

PROP. VI. Theor.

Si in hyperbola aliquod punctum extra
sumatur, à quo ad sectionem ducan-
tur duæ rectæ lineæ, altera quidem
contingens, altera vero parallela uni
asymptotōn; & portio parallelæ inter
sectionem & punctum interjecta æ-
qualis sit ei quæ intra sectionem con-
tinetur: recta, quæ à tactu ad inventum
punctum ducitur, occurret sectioni;
& quæ ab occurſu ducitur ad punctum
extra sumptum, sectionem continget.

ΕΣΤΩ ὑπερβολὴ ἡ ΑΒΒ, καὶ εἰληφθῶσι τι σημεῖον
ἐκτὸς τῆς Δ, καὶ ἐξω πρὸς τὸν ἐκτὸς τῆς
ἀσυμπίπτων παρὰ τὴν γωνί-
αν τῆς Δ, καὶ ἀπ' αὐτῆς ἡ μὲν
ΒΔ ἐφάπτεται, ἡ δὲ ΔΕΖ πα-
ράλληλος ἐξω τῇ ἐτέρᾳ τῶν ἀσυμ-
πίπτων, καὶ κείνη τῇ ΔΕ ἴση ἢ
ΕΖ· λέγω ὅτι ἡ ἀπὸ B τῇ MN
τὸ Z ὅτι ἀγνομένη συμπίπτει
τῇ τομῇ, καὶ ἡ ἀπὸ τῆς συμπί-
πτουσας ὅτι τὸ Δ ἐφάπτεται τῆς
τομῆς.

SIT hyperbola ΑΒΒ, & sumatur aliquod pun-
ctum extra, quod sit Δ; sit autem primo Δ
intra angulum sub asymp-
tōis contentum, & ab ipso Δ
recta quidem ΔΒ ducta sectio-
nem contingat, ΔΕΖ vero pa-
rallela sit alteri asymptotōn,
ponaturque ipsi ΔΕ æqualis
ΕΖ: dico rectam, quæ à pun-
cto B ad Z ducitur, occurrere
sectioni; & quæ ab occurſu
ducitur ad Δ, sectionem con-
tingere.



Ηχθῶ γδ ἐφαπτομένη τῇ το-
μῇ ἡ ΔΑ, καὶ ἐπιζυγισθῶσι ἡ
ΒΑ πινέτω τὴν ΔΕ, εἰ δυνατὸν, μὴ κατὰ τὸ Z,
ἀλλὰ κατὰ τὸ H· ἔστω δὲ ἡ ἴση ἡ ΔΕ τῇ ΕΗ,
ὅπερ ἀδύνατον· ὑπόκειται γδ ἡ ΔΕ τῇ ΕΖ ἴση.

Ducatur enim ΔΑ, quæ se-
ctionem contingat; & juncta
ΒΑ fecet ipsam ΔΕ, si fieri potest, non in Z,
sed in alio puncto H: erit itaque [per 30. 3. huj.]
ΔΒ æqualis ipsi ΒΗ, quod est absurdum; suppo-
nebatur enim ΔΒ ipsi ΕΖ æqualis.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ Ζ΄.

ΤΩΝ αὐτῶν ὄντων, τὸ
Δ σημεῖον ἐξω ἐν τῇ
ἐφεξῆς γωνίᾳ τῆς ἀπὸ τῆς ἀ-
συμπίπτων παρὰ τὴν γωνί-
αν λέγω ὅτι καὶ ἕτως τὰ αὐτὰ
συμβῇσι).
Ηχθῶ γδ ἐφαπτομένη ἡ
ΔΘ, καὶ ἐπιζυγισθῶσι ἡ ΘΒΘ
πινέτω, εἰ δυνατὸν, μὴ δὲ
ΕΖ, ἀλλὰ διὰ τῆς Η· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΔΕ τῇ ΕΗ,
ὅπερ ἀδύνατον· ὑπόκειται γδ ἡ ΔΕ τῇ ΕΖ ἴση.

PROP. VII. Theor.

ISDEM positis, sit pun-
ctum Δ in angulo deim-
ceps ei qui sub asymp-
tōis continetur: dico etiam
sic eadem evenire.

Ducatur enim ΔΘ se-
ctionem contingens; &
juncta ΘΒ, si fieri potest,
non cadat in Z, sed in
aliud punctum H: ergo



[per 31. 3. huj.] ΔΒ est æqualis ipsi ΒΗ, quod est
absurdum; supponitur enim ΔΒ æqualis ipsi ΕΖ.

K k k

PROP.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Ἀ

Ταῦτα μὲν κοινῶς· ὅτι δὲ τὸ ὑπερβολῆς μόνον, ἐὰν
τὰ μὲν ἄλλα ὑπαρχῇ τὰ αὐτὰ, αἱ δὲ τὸ μᾶλλον
εὐθείας συμπιόσεις παύειν τὰς τὸ ἑτέρως
συμπιόσεις, καὶ τὸ Δ σημῶνι ἐντός ἢ τὸ ὑπὸ τῷ
ἀσυμπιόσει παύειν καὶ τὴν κατὰ τὴν αὐτὰ
συμπίεσιν τῶν παρρησιῶν, ὡς παρρησιῶν
ἐν τῷ παρρησιῶν καὶ τῷ παρρησιῶν.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ια'.

Τῶν αὐτῶν ὄντων, ἐὰν ᾖ μίᾳ συμπλήσεως μὴ ἀεὶ-
 χουσι τὰς ᾗ ἐτέρας συμπλήσεις, τὸ δὲ Δ σημεῖον
 ἐντὸς ἢ ᾗ ᾗ ἀπὸ τῆ ἀσυμπλήτου ἀεὶ ἀρχομένης
 γωνίας καὶ ἢ ἀπὸ τῆς ἀπὸ τῆς ἀπὸ τῆς ἀπὸ τῆς ἀπὸ τῆς
 αὐτῆς τῆς ἐντάτω.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ 6'.

Τῶν αὐτῶν ὄντων, ἐὰν παρέλθωσι αἱ τ' μᾶς εὐθείας
 συμπώσεις τὰς τ' ἐπίρας, καὶ ἡ τὸ ληφθῇ σημεῖον
 ἐν τῇ ἐφεξῆς γωνίᾳ τ' ἔστω τ' ἀσυμπώτων πε-
 ριελχομένης· ἡ δ' αὖ τ' διαμέσται ἀγρόθυμῃ εὐ-
 θείᾳ ἐκβαλλομένη τῇ ἀνταμεῖστῃ τομῇ συμπε-
 σῶται, καὶ αἱ ἀπὸ τ' συμπώσεων ὅτι τὸ Δ ση-
 μεῖον ἀγρόθυμῃ εὐθείᾳ ἐφάλοισι τ' ἀνταμεῖστων.

ΕΣΤΩ ὑπερβολὴ ἡ ΕΗ, ἀσύμπτωται ᾧ αἱ ΝΞ,
ΟΠ, καὶ κέντρον τὸ Ρ, καὶ τὸ Δ σημεῖον ἐξω ἐν
τῇ ΕΡΗ γωνίᾳ, καὶ ἡχθῶσιν αἱ ΔΕ, ΔΖ πύκνωται
πρὸς ὑπερβολῶν, ἐκατέρω κατὰ δύο σημεῖα, καὶ ὡς ἐκ-
χῶσιν πρὸς Ε, Θ ὑπὸ τῷ Ζ, Η, καὶ ἐξω ὡς μὲν ἡ ΕΔ
πρὸς ΔΘ ἔστω ἡ ΕΚ πρὸς ΚΘ, ὡς ᾧ ἡ ΖΔ πρὸς
ΔΗ ἔστω ἡ ΖΛ πρὸς ΛΗ· δεκτικόν ὅτι ἡ ΖΛ τῇ
Κ, Λ συμπίπτει τῇ πρὸς
ΕΖ πρὸς Ε τῇ ἀντικει-
μένη, καὶ αἱ ἀπὸ τῇ συμ-
πτώσεων ὅτι τὸ Δ ἐφά-
ψον τῇ πρὸς.

Εἶω δὲ ἡ ἀντικειμένη
 ἡ Μ, καὶ ἀπὸ τῆς Δ ἡ χθω-
 σαν ἐφαπτόμεναι τῇ το-
 μῶν αἱ Δ Μ, Δ Σ, καὶ
 ἐπιζυγαίωσαι ἡ Μ Σ, εἰ
 διωγατὸν, μὴ ἐρχέσθω
 διὰ τῶν Κ, Λ, ἀλλ' ἡτοι-
 μάτω τῆς ἐπὶ αὐτῶν, ἡ
 δι' ἐκείτης. ἐρχέσθω περὶ τὴν διὰ τῆς Κ, καὶ περὶ τὴν
 πρὸς Ζ Η κατὰ τὸ Χ· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ Ζ Δ πρὸς Δ Η
 ὅτως ἡ Ζ Χ πρὸς Χ Η, ὅπερ ἄποβη· ὑποκείμεται γὰρ
 ὡς ἡ Ζ Δ πρὸς Δ Η ὅτως ἡ Ζ Λ πρὸς Λ Η. ἐὰν οὖν
 μηδὲ δι' ἐπὶ τῆς Κ, Λ ἐρχῇ ἡ Μ Σ, ἐφ' ἐκείτης
 τῆς Ε Δ, Δ Ζ τὸ ἀδιώγατον συμβαίνει.

PROP. X. Theor.

Hæc quidem communiter in omnibus :
at in hyperbola tantum, si cætera qui-
dem eadem sint, unius autem rectæ
linæ occurſus contineant occurſus al-
terius, & punctum Δ fit intra angu-
lum ſub aſymptotis comprehenſum,
evenient illa quæ dicta ſunt ut in
primo theoremate tradidimus.


PROP. XI. Theor.

lisdem positis, si occurfus unius rectæ
alterius occurfus non contineant, &
punctum Δ fit intra angulum sub a-
symptotis comprehensum; & figurâ
& demonstratio eadem erit, quæ in
nono theoremate.

PROP. XII. Theor.

Iisdem positis, si unius rectæ occurfus
 alterius occurfus contineant, & pun-
 ctum sumptum sit in angulo deinceps
 ei qui sub asymptotis comprehenditur:
 recta per divisiones ducta, si
 producat, occurreret oppositæ sectioni;
 & quæ ab occurfibus ducuntur ad
 punctum Δ , oppositas sectiones contingant.

SIT hyperbola EH, cujus asymptoti NΞ, OΠ, & centrum P; punctum vero Δ sit in angulo ΞΠΠ; & ducantur ΔE, ΔZ, quarum utraque hyperbolam in duobus punctis secet; & puncta E, Θ à punctis Z, H contineantur; sitque ut EΔ ad ΔΘ ita EK ad KΘ, & ut ZΔ ad ΔH ita ZΛ ad ΛH: demonstrandum est rectam per K, Λ ductam occurrere & sectioni EZ &



ei quæ ipsi opponitur;
ac rectas quæ ab occur-
sibus ducuntur ad pun-
ctum Δ , sectiones con-
tingere.

Sit itaq; sectio opposi-
ta M; & à puncto Δ du-
cantur ΔM , $\Delta \Sigma$, quæ
sectiones contingant;
junctaque M Σ , si fieri
possit, non transeat per
 κ , Λ ; sed vel per alte-
rum ipsorum, vel per
neutrum. transeat pri-
mum per κ , & fecerit

ZH in X: est igitur [per 37.3.huj.] ut $Z\Delta$ ad ΔH ita ZX ad XH , quod est absurdum; supponitur enim ut $Z\Delta$ ad ΔH ita $Z\Lambda$ ad ΛH . si vero $M\Sigma$ per neutrum punctorum K , Λ transeat, in utraque ipfarum $E\Delta$, ΔZ impossibile istud eveniet.


PROP.

PROP. XIII. Theor.

Isdem positis, si punctum Δ sit in una asymptotōn, & reliqua eadem existant: quæ per divisiones transit recta asymptoto in qua est punctum parallela erit, & producta occurret sectioni; quæ vero ab occurſu ad punctum ducitur, sectionem continget.

SIT hyperbola, & asymptoti; sumptoque in una asymptotōn puncto Δ , ducantur rectæ lineæ, & dividantur, ut dictum est; & ab ipso Δ recta ΔB sectionem contingat; dico eam, quæ à puncto B ducitur ipsi OP parallela, per puncta K , Λ transire.

Si enim non, vel per unum ipsorum transibit, vel per neutrum. transeat primo per K tantum: quare [per 35.3.huj.] ut $Z\Delta$ ad ΔH ita ZK ad XH , quod est absurdum*: recta igitur à puncto B ducta parallela ipsi PO per unum tantum eorum non transibit; ergo per utrumque transeat necesse est.



ΠΡΟΤΑΣΙΣ ιγ'.

Τῶν αὐτῶν ὄντων, εἰν τὸ Δ σημῖον ὅτι μίας τῆς ἀσυμπίπτων ἢ, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ αὐτὰ ὑπάρχῃ ἢ Δ τῆς διὰ μέσης ἀγομένης ὁ ἄλλος ἐκ τῆς ἀσυμπίπτων ἐφ' ἧς ἐπὶ τὸ σημῖον, καὶ ἐκβαλλομένη συμπίπτει τῇ τομῇ, καὶ ὁ ἀπὸ τῆς συμπίπτων ἐκ τῆς ἀγομένης ἐφάπτεται τῆς τομῆς.

ΕΣΤΩ γὰρ ὑπερβολή, ἐκ ἀσυμπίπτων, καὶ εὐθείων ὅτι μίας τῆς ἀσυμπίπτων τὸ Δ , καὶ διήχθωσαν αἱ εὐθεῖαι, καὶ διαμεσώσωσαν ὡς ἀγομένη καὶ ἔχθω ἀπὸ τῆς Δ ἐφαπτομένη τῆς τομῆς ἢ ΔB . λέγω ὅτι ἡ ἀπὸ τῆς B ὡς τὴν PO ἀγομένη ἢ $K\Lambda$ τῆς K, Λ .


Εἰ γὰρ μὴ, ἢτοι ΔB ἔνός αὐτῶν ἐλεύσεται, ἢ δι' ἀμφοτέρων ἐρχομένη ΔB μόνος ΔK . ἐπὶ ἀεὶ ὡς ἡ $Z\Delta$ πρὸς ΔH ὅπως ἡ ZK πρὸς XH , ὅπερ ἄπειν. ἐκ ἀρα ἡ ἀπὸ τῆς B ὡς τὴν PO ἀγομένη ΔB μόνος τῆς K ἐλεύσεται δι' ἀμφοτέρων ἀεὶ.

PROP. XIV. Theor.

Isdem positis, si punctum Δ sit in una asymptotōn, & recta quidem ΔE sectionem in duobus punctis fecet, ΔH vero alteri asymptoto parallela illam secet in uno tantum, quod sit H ; fiatque ut ΔE ad $\Delta \Theta$ ita $E K$ ad $K \Theta$, & ipsi ΔH ponatur æqualis & in directo $H \Lambda$: quæ per puncta K , Λ transit recta & asymptoto parallela erit, & sectioni occurret; quæ vero ab occurſu ducitur ad Δ , sectionem continget.

Similiter enim ut in superioribus, ducta recta ΔB contingente: dico eam, quæ à puncto B ducitur asymptoto PO parallela, per puncta K , Λ transire.

Si enim per K solum transeat; non erit ΔH ipsi $H \Lambda$ æqualis, quod [per 34.3.huj.] est absurdum. si vero per Δ solum, non erit ut $E \Delta$ ad $\Delta \Theta$ ita $E K$ ad $K \Theta$ †. quod si neque per K transeat, neque per Λ , in utrisque absurdum sequetur: ergo per utrumque punctum transire necesse est.



ΠΡΟΤΑΣΙΣ ιδ'.

Τῶν αὐτῶν ὄντων, εἰν τὸ Δ σημῖον ὅτι μίας ἢ τῆς ἀσυμπίπτων, καὶ ἡ μὲν ΔE τέμνει τὴν τομὴν κατὰ δύο σημεία, ἡ δὲ ΔH κατὰ μόνον τὸ H , ὁ ἄλλος ἐκ τῆς ἐπὶ τῆς ἀσυμπίπτων, καὶ φένηται ὡς ἡ ΔE πρὸς $\Delta \Theta$ ὅπως ἡ $E K$ πρὸς $K \Theta$, τῇ δὲ ΔH ἴση ἐπ' εὐθείας περὶ τῆς $H \Lambda$. ἢ ΔB τῆς K, Λ σημῖον ἀγομένης παρεκκλινούσης πρὸς τὴν ἀσυμπίπτων καὶ συμπίπτει τῇ τομῇ, ἐκ τῆς ἀπὸ τῆς συμπίπτων ὅτι τὸ Δ ἐφάπτεται τῆς τομῆς.

Ομοίως γὰρ τῶν προσημασμένων, ἀραγὼν τὴν ΔB ἐφαπτομένην. λέγω ὅτι ἡ ἀπὸ τῆς B ὡς τὴν PO ἀσυμπίπτων ἀγομένη ἢ $K\Lambda$ τῆς K, Λ σημῖων.

Εἰ γὰρ ΔB τῆς K μόνος ἦεν, ὅτε ἔσται ἡ ΔH τῇ $H \Lambda$ ἴση, ὅπερ ἄπειν. εἰ δὲ διὰ τῆς Λ μόνος, ὅτε ἔσται ὡς ἡ $E \Delta$ πρὸς $\Delta \Theta$ ὅπως ἡ $E K$ πρὸς $K \Theta$. εἰ δὲ μήτε διὰ τῆς K , μήτε διὰ τῆς Λ , κατ' ἀμφοτέρων συμπίπτει τὸ ἄπειν δι' ἀμφοτέρων ἀεὶ ἐλεύσεται.

* Ponitur enim $Z\Delta$ ad ΔH sicut $Z\Delta$ ad ΔH . † Quod est absurdum per 35.3.huj.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ 14.


Εάν ἐν ἀντικειμέναις ληφθῇ τι σημεῖον μεταξὺ τῶν δύο τομῶν, καὶ ἀπ' αὐτοῦ ἢ μὴ ἐφάπτηται μιᾶς τῶν ἀντικειμένων, ἢ δὲ τὴν ἐκείνην τῶν ἀντικειμένων, καὶ ὡς ἔχει ἢ μεταξὺ τῶν ἐτέρων τομῶν, ἢ ἐκ ἐφάπτης ἢ εὐθείας, καὶ ἔσθ' σημείον, πρὸς τὴν μεταξὺ τῶν σημείων καὶ τῶν ἐτέρων τομῶν, ὅπως ἔχει μείζονα πρὸς εὐθείαν καὶ μεταξὺ τῶν τομῶν πρὸς τὴν ὑπεροχὴν αὐτῆς κεκλίνῃ ἐπ' εὐθείας πρὸς τὴν πρὸ αὐτῆς πέρατι τῆς ὁμολόγου ἢ δὲ πρὸς τὴν πέρατος καὶ μείζονος εὐθείας ὅτι τὴν ἀφ' ἧς ἀγομένη συμπεσῇται τῇ τομῇ, καὶ ἢ δὲ τῆς συμπίπτουσας ὅτι τὸ ληφθῆναι σημεῖον ἀγομένη ἐφάπτεται τῆς τομῆς.

ΕΣΤΩΣΑΝ ἀντικείμεναι αἱ A, B , καὶ εἰλήφθω τι σημεῖον μεταξὺ τῶν τομῶν τὸ Δ , ὅπως τὸ ὑπὸ τῶν ἀσυμπτῶτων περιεχομένης γωνίας, καὶ ἀπ' αὐτοῦ ἢ μὴ ΔZ διήχθω ἐφαπτομένη, ἢ $\Delta A B$ τέμνουσα τὰς τομὰς, καὶ ὅν ἔχει λόγον ἢ $A \Delta$ πρὸς ΔB ἔχεται ἢ $A \Gamma$ πρὸς ΓB . δευτέρῳ ὅτι ἢ δὲ ΔZ ὅτι τὸ Γ ὁμοειδὲς ἀγομένη συμπεσῇται τῇ τομῇ, καὶ ἢ δὲ τῆς συμπίπτουσας ἐπὶ τὸ Δ ἀγομένη ἐφάπτεται τῆς τομῆς.

Επεὶ γὰρ τὸ Δ σημεῖον ἐντὸς ἐστὶ τῆς περιεχομένης πλὴν τομῶν γωνίας, δυνατὸν ἐστὶ ἐπ' ἐκείνῃ ἐφαπτομένην ἀγαγεῖν δὲ ΔZ . ἢ γὰρ ΔE , ἢ ΔH ἀγχοῦται ἢ $Z E$ ἐρχέσθω, εἰ δυνατὸν, μὴ ΔH τὴν Γ , ἀλλὰ διὰ ΓH ἔστω δὲ ὡς ἢ $A \Delta$ πρὸς ΔB ὅπως ἢ $A H$ πρὸς $H B$, ὅπερ ἄπαινον, ὡς αὖτε γὰρ ὡς ἢ $A \Delta$ πρὸς ΔB ὅπως ἢ $A \Gamma$ πρὸς ΓB .

ΠΡΟΤΑΣΙΣ 15.

Τὸν αὐτὸν ὄντων, ἔστω τὸ Δ σημεῖον ἐν τῇ ἐφ' ἧς γωνίᾳ δὲ ἀπὸ τῶν ἀσυμπτῶτων περιεχομένης, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ αὐτὰ γινέσθω· λέγω ὅτι ἢ



δὲ τὴν Z ὅτι τὸ Γ ὁμοειδὲς ἀγομένη συμπεσῇται τῇ ἀντικειμένῃ τομῇ, ἢ δὲ τῆς συμπίπτουσας ὅτι τὸ Δ ἐφάπτεται τῆς ἀντικειμένης τομῆς.

PROP. XV. Theor.

Si in sectionibus oppositis inter duas sectiones sumatur aliquod punctum, & ab ipso duæ rectæ ducantur, altera quidem contingens unam oppositarum, altera vero utramque secans; & quam rationem habet ea quæ inter sectionem quam non contingit recta & punctum interjicitur ad rectam quæ est inter punctum & alteram sectionem, eandem habeat recta quædam major ea quæ inter sectiones interjicitur ad excessum ipsius in eadem recta & ad eundem terminum cum ea quæ in eadem est ratione: quæ à termino majoris rectæ ad tactum ducitur, occurret sectioni; & quæ ab occurſu ad sumptum punctum, sectionem continget.

SINT sectiones oppositæ A, B ; sumptoque inter sectiones aliquo puncto Δ intra angulum sub asymptotis contentum, ab ipso ducatur recta quidem ΔZ contingens sectionem, $\Delta A B$ vero sectiones secans; & quam rationem habet $A \Delta$ ad ΔB eandem habeat $A \Gamma$ ad ΓB : demonstrandum est rectam à puncto Z ad Γ productam occurrere sectioni; & eam quæ ab occurſu ducitur ad Δ , sectionem contingere.

Quoniam enim punctum Δ est intra angulum qui sectionem continet, poterimus [per 49. 2. huj.] ab ipso Δ aliam contingentem ducere, quæ sit ΔE ; & juncta $Z E$, si fieri potest, per Γ non transeat, sed per aliud punctum H : erit igitur [per 37. 3. huj.] ut $A \Delta$ ad ΔB ita $A H$ ad $H B$, quod est absurdum; posuimus enim ut $A \Delta$ ad ΔB ita esse $A \Gamma$ ad ΓB .

PROP. XVI. Theor.

ISDEM positis, sit punctum Δ in angulo deinceps ei qui sub asymptotis continetur, & reliqua eadem fiant: dico rectam à puncto Z ad


Γ productam occurrere oppositæ sectioni; & quæ ab occurſu ducitur ad Δ , eandem oppositam sectionem contingere.

L 11

Sint

Sint enim eadem quæ supra, & punctum Δ sit in angulo deinceps ei qui sub asymptotis continetur; atque à puncto Δ ducatur ΔE sectionem A contingens; juncta autem EZ & pro-

Εἰς αὐτὴν τὰ αὐτὰ, καὶ τὸ Δ σημεῖον ἐν τῇ ἐφ' ἑκτῆς γωνίᾳ τῆς ὑπὸ τῶν ἀσυμπτῶτων περιεχομένης, καὶ ἵκθω δὴ τὸ Δ ἐφαπτομένη τῆς A τμήτης ἢ ΔE , καὶ




ducta, si fieri potest, non transeat per Γ , sed per aliud punctum H : erit igitur [per 39.3. huj.] ut AH ad HB ita ΔA ad ΔB , quod est absurdum; supponebatur enim ut ΔA ad ΔB ita $\Delta \Gamma$ ad ΓB .

ἐπιζεύχθω ἡ EZ , καὶ ἐκβαλλομένη, εἰ δυνατὸν, μὴ ἵκθω δὴ τὸ Γ , ἀλλ' ὅτι τὸ H . ἔστω δὲ ὡς ἡ AH πρὸς HB ἕτως ἡ ΔA πρὸς ΔB , ὅπερ ἄτοπον, ὑπόκειται γὰρ ὡς ἡ ΔA πρὸς ΔB ἕτως ἡ $\Delta \Gamma$ πρὸς ΓB .

PROP. XVII. Theor.

ISDEM positis sit punctum Δ in una asymptotōn: dico rectam, quæ à Z ad Γ ducitur, asymptoto, in qua est punctum, esse parallelam.

Sint eadem quæ supra, & punctum Δ in una asymptotōn; ductaque per Z eidem asymptoto parallela non transeat per Γ , si fieri potest, sed per H ; erit igitur [per 36.3. huj.] ut ΔA ad ΔB ita AH ad HB , quod est absurdum*: ergo quæ à puncto Z ducitur asymptoto parallela per punctum Γ transibit.



ΠΡΟΤΑΣΙΣ κ'.

ΤΩΝ αὐτῶν ὄντων, εἰς αὐτὸ Δ σημεῖον ὅτι πινος τῆς ἀσυμπτῶτος λέγω ὅτι ἡ δὴ τὸ Δ ὅτι τὸ Γ ἀγομένη ἐφ' ἑκτῆς γωνίᾳ τῆς ὑπὸ τῶν ἀσυμπτῶτων ἐφ' ἧς ἐστὶ τὸ σημεῖον.

Εἰς αὐτὴν τὰ αὐτὰ τοῖς ἑμπροσθεν, τὸ Δ σημεῖον ὅτι μίας τῆς ἀσυμπτῶτων, καὶ ἵκθω δὴ τὸ Z ἐφ' ἑκτῆς γωνίᾳ τῆς ὑπὸ τῶν ἀσυμπτῶτων ἐφ' ἧς ἐστὶ τὸ σημεῖον, καὶ εἰ δυνατὸν, μὴ πίπτει τὸ Γ , ἀλλ' ὅτι τὸ H . ἔστω

ὅτι ὡς ἡ ΔA πρὸς ΔB ἕτως ἡ AH πρὸς HB , ὅπερ ἄτοπον. ἢ ἄρα δὴ τὸ Z ἐφ' ἑκτῆς γωνίᾳ τῆς ὑπὸ τῶν ἀσυμπτῶτων ἐφ' ἧς ἐστὶ τὸ σημεῖον, καὶ πίπτει.

PROP. XVIII. Theor.

Si in sectionibus oppositis aliquod punctum sumatur inter duas sectiones, & ab ipso duæ rectæ ducantur utramque sectionem secantes; & quas rationes habent interjectæ inter unam sectionem & punctum ad eas quæ inter idem punctum & alteram sectionem interjiciuntur, easdem habeant rectæ majores iis quæ sunt inter sectiones oppositas ad excessus ipsarum: quæ per terminos majorum rectorum transeunt, occurrent sectionibus; & quæ ab occurribus ad sumptum punctum ducuntur, sectiones contingent.

SINT oppositæ sectiones A, B , & punctum Δ inter sectiones, quod quidem primum ponatur in angulo sub asymptotis contento, & per Δ rectæ $\Delta A, B, \Gamma \Delta \Theta$ ducantur; major igitur

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ιθ'.


Εάν ἐν ἀντικειμέναις ληφθῇ τι σημεῖον μεταξὺ τῶν δύο τομῶν, καὶ ἀπ' αὐτοῦ δύο εὐθεῖαι διαχθῶσι τμήσεσιν ἐκείναις τῶν τομῶν, καὶ ὡς ἔχουσιν αἱ μεταξὺ τῶν μᾶλλον τομῶν πρὸς τὰς μεταξὺ τῶν ἐκείναις καὶ αὐτῶν σημείων ἕτως ἔχουσιν αἱ μείζους τῶν ἀπαραμεινόμενων μεταξὺ τῶν ἀντικειμένων πρὸς τὰς ὑπερχειλῆς αὐτῶν ἢ ἀπ' αὐτῶν περὶ τὴν ἀγομένην εὐθεῖαν τῶν μείζονων εὐθειῶν τῶν τομῶν συμπίπτει, καὶ αἱ δὴ τὸ τῶν συμπίπτουσιν ἐπὶ τὸ ληφθῆν σημεῖον ἀγομένην εὐθεῖαν, ἐφ' ἧς τῶν τομῶν.

ΕΣΤΩσαν ἀντικείμεναι αἱ A, B , ἐπὶ δὲ τὸ σημεῖον μεταξὺ τῶν τομῶν περὶ τὸν ὑποκείμενον ἐν τῇ ὑπὸ τῶν ἀσυμπτῶτων περιεχομένη γωνίᾳ, ἐπὶ δὴ τὸ Δ διήχθωσιν αἱ $\Delta A, B, \Gamma \Delta \Theta$. μείζον ἄρα ἐστὶν ἡ μείν

* Est enim, [ex hyp.] ut ΔA ad ΔB ita $\Delta \Gamma$ ad ΓB .

ἢ μὲν $\Delta\Delta$ ὅτι $\Delta\Delta$, ἢ $\Gamma\Delta$ ὅτι $\Delta\Theta$, διότι ἴση ἐστὶν ἡ BN τῇ AM , καὶ ὅν μὲν ἔχει λόγον ἡ $\Delta\Delta$ πρὸς ΔB ἔχει τὴν ἡ AK πρὸς KB , ὅν δὲ ἔχει λόγον ἡ $\Gamma\Delta$ πρὸς $\Delta\Theta$ ἔχει τὴν ἡ ΓH πρὸς $H\Theta$. λέγω ὅτι ἡ διὰ Γ, H συμπεσέτω τῇ τομῇ, καὶ αἱ διὰ Δ ὅτι τὰς συμπληρώσεις τῆς τομῆς ἐφάπτονται.

Ἐπεὶ γὰρ τὸ Δ ἐστὶν ἐπὶ τῇ $\Delta\Delta$ ἀσυμπτῶτι, ὡς ἐλεγχόμενης γωνίας, διωκτὸν δὲ τὸ Δ δύο ἐφαπτόμεναι ἀγαγεῖν. ἤχθωσαν αἱ $\Delta E, \Delta Z$, καὶ ἐπιζεύχθω ἡ EZ . ἐλεύσεται δὲ διὰ Γ, H σημείων. εἰ γὰρ μὴ, ἡ διὰ Δ ἐνὸς αὐτῶν ἐλεύσεται μόνον, ἡ δὲ ἑτέρα. εἰ μὲν γὰρ διὰ ἐνὸς αὐτῶν μόνον, ἡ ἑτέρα τῶν ἐφάπτον ἐπὶ τὴν αὐτὴν λόγον τμηθήσεται καὶ ἑπὶ ἑπὶ ἀδιώατον· εἰ δὲ ἑτέρας, ἐπ' ἀμφοτέρων τὸ ἀδιώατον συμβήσεται.



est $\Delta\Delta$ quam ΔB , & $\Gamma\Delta$ major quam $\Delta\Theta$, quoniam [per 16. 2. huj.] BN est æqualis AM ; quam vero rationem habet $\Delta\Delta$ ad ΔB eandem habeat AK ad KB , & quam $\Gamma\Delta$ habet ad $\Delta\Theta$ eandem habeat ΓH ad $H\Theta$: dico rectam quæ per K, H transit, occurrere sectioni; & quæ à puncto Δ ad occursum ducuntur, sectionem contingere.


Quoniam enim punctum Δ est in angulo sub asymptotis contento, possumus [per 49. 2. huj.] ab eo duas rectas contingentes ducere. ducantur $\Delta E, \Delta Z$; & EZ jungatur; quæ igitur per puncta K, H transibit. si enim non, vel transibit per unum ipsorum tantum, vel per neutrum. & si quidem per unum tantum, altera rectarum [per 37. 3. huj.] in eadem ratione ad aliud punctum secabitur; quod fieri non potest: si vero per neutrum, in utrique impossibile eveniet.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Θ'.

Εἰληφθὼν δὲ τὸ Δ σημεῖον ἐν τῇ ἐφάπτης γωνίᾳ τῇ $\Delta\Delta$ ἀσυμπτῶτι, ὡς ἐλεγχόμενης, καὶ διήχθωσαν αἱ ἐφάπται τμησάτω τὰς τομὰς, καὶ διαιρέθωσαν ὡς ἔρη. λέγω ὅτι ἡ διὰ Γ, H ἐκβαλλομένη συμπεσέτω ἐκάτερα τὰ ἀντικείμενα, καὶ αἱ διὰ Δ συμπτῶσαι ὅτι τὸ Δ ἐφάπτον τῇ τομῇ.

PROP. XIX. Theor.

SUMATUR itaque punctum Δ in angulo deinceps ei qui sub asymptotis continetur, ducanturque rectæ sectiones secantes, & modo dicto dividantur: dico eam quæ per K, H producitur, occurrere utrique sectionum; & quæ ab occurribus ducuntur ad Δ , sectiones contingere.



ἤχθωσαν γὰρ διὰ Δ ἐφαπτόμεναι ἐκάτερας τῇ τομῇ αἱ $\Delta E, \Delta Z$. ἡ ἄρα διὰ E, Z ἐστὶν ἡ EZ (διὰ Γ, H ἐλεύσεται). εἰ γὰρ μὴ, ἡ διὰ Δ ἐπὶ αὐτῶν ἢ ἑπὶ ἢ διὰ ἑτέρας καὶ πάλιν ὁμοίως συναχθήσεται τὸ αὐτόν.

Ducantur enim à puncto Δ rectæ $\Delta E, \Delta Z$, quæ utramque sectionem contingant: ergo quæ ducitur per E, Z etiam per K, H transibit. si enim non; vel transibit per alterum ipsarum, vel per neutrum: & rursus eodem modo absurdum concludetur.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κ'.

Εάν δὲ τὸ λαβῇ σημεῖον ὅτι πῶς ἢ τῇ ἀσυμπτῶτι, καὶ τὰ λοιπὰ γένηται αὐτὰ. ἡ $\Delta\Delta$ τῶν περὶ τὴν Δ ὑπερῶν ἀνομήν ἐν τῇ $\Delta\Delta$ ἄλλος ἐστὶ τῇ ἀσυμπτῶτι ἐφ' ἧς ἐστὶ τὸ σημείον, καὶ ἡ ἀπὸ Δ σημείου ὅτι τὸ Δ συμπίπτει.


PROP. XX. Theor.

Si sumptum punctum fit in una asymptoto, & reliqua eadem fiant: recta, quæ transit per terminos excessuum, asymptoto in qua est punctum parallela erit; & quæ à puncto ducitur ad occursum sectionis & rectæ per

per terminos transeuntis, sectionem continget.

τομῆς καὶ τῆς ἀφ' ἧς περάσεται ἡ γινόμενη εὐθεία ἐφάπτεται τῆς τομῆς.

SINT oppositæ sectiones A, B; & punctum Δ sit in una asymptotōn, & reliqua eadem fiant: dico rectam quæ per K, H transit, occurrere sectioni; [& parallelam esse asymptoto in quâ punctum Δ;] & quæ ab occurſu ad Δ ducitur, sectionem contingere.




Ducatur enim à puncto Δ recta contingens ΔZ, & à Z ducatur parallela asymptoto in qua est punctum Δ: transibit igitur ea per puncta K, H, si enim non, vel per alterum tantum transibit, vel per neutrum; & ita eadem absurda sequentur ac in præmissis.

ΕΣΤΩΣΑΝ ἀντικείμεναι αἱ A, B, καὶ τὸ Δ σημεῖον ἐν τῇ μιᾷ τῶν ἀσυμπτωτῶν, καὶ τὰ λοιπὰ καὶ αὐτὰ γινέσθω. λέγω ὅτι ἡ διὰ τῶν K, H συμπεσέτω τῇ τομῇ, [ὅτι ὁ ὁμοῦς ἐστὶ τῇ ἀσυμπτωτῇ ἐφ' ἧς τὸ Δ σημεῖον,] καὶ ἡ διὰ τῶν Γ, Δ συμπτώσεται τῇ τομῇ. Ἡχθὼ δὲ διὰ τῶν Δ, Z ἐφαπτομένη ἡ ΔZ, καὶ διὰ τῶν Z, ὁμοῦς τῇ ἀσυμπτωτῇ ἐφ' ἧς ἐστὶ τὸ Δ, ἡχθὼ εὐθεῖα. ἢ ἔστω δὲ διὰ τῶν K, H. εἰ γὰρ μὴ, ἡ διὰ τῶν ἐτέρων αὐτῶν ἢ ἔστω ἡ διὰ τῶν ἄλλων. καὶ τὰ αὐτὰ αὐτοπα συμβέσονται τοῖς προτέροις.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κα'.

PROP. XXI. Theor.

SINT rursus oppositæ sectiones A, B, sitque punctum Δ in una asymptotōn; & recta quidam ΔBK, alteri asymptoto parallela, in uno tantum puncto B occurrat sectioni; recta vero ΓΔΘH utrique sectioni occurrat; & ut ΓΔ ad ΔΘ ita sit ΓH ad HΘ, & ipsi ΔB æqualis sit BK: dico rectam, quæ per puncta K, H transit, occurrere sectioni, & asymptoto in qua est punctum Δ parallelam esse; & quæ ab occurſu ad punctum Δ ducitur, sectionem contingere.




Ducatur enim recta contingens ΔZ; & à Z ducatur parallela ei asymptoto in qua est Δ: transibit igitur ea per puncta K, H, nam si non ita sit, eadem absurda sequantur necesse est.

ΕΣΤΩΣΑΝ πάλιν ἀντικείμεναι αἱ A, B, καὶ τὸ Δ σημεῖον ἐν τῇ μιᾷ τῶν ἀσυμπτωτῶν, καὶ ἡ μὲν ΔBK τῇ τομῇ καὶ τὸ μόνον σημεῖον συμβαλλέτω πρὸς B, ὁμοῦς ὁμοῦς ὅσοι τῇ ἐτέρᾳ τῇ ἀσυμπτωτῇ, ἡ δὲ ΓΔΘH καὶ ἑκατέρᾳ τῶν τομῶν συμβαλλέτω, καὶ ὥς ἡ ΓΔ πρὸς ΔΘ ὅσως ἡ ΓH πρὸς HΘ, τῇ δὲ ΔB ἴση ὥς ἡ BK. λέγω ὅτι ἡ διὰ τῶν K, H σημεῖον συμπεσέτω τῇ τομῇ, ὅτι ὁμοῦς ἐστὶ τῇ ἀσυμπτωτῇ ἐφ' ἧς ἐστὶ τὸ Δ σημεῖον, ὅτι ἡ διὰ τῶν Γ, Δ συμπτώσεται τῇ τομῇ.

Ἡχθὼ γὰρ ἐφαπτομένη ἡ ΔZ, ἐκ δὲ τῶν Z, ὁμοῦς τῇ ἀσυμπτωτῇ ἐφ' ἧς ἐστὶ τὸ Δ, ἡχθὼ εὐθεῖα. ἢ ἔστω δὲ διὰ τῶν K, H. εἰ γὰρ μὴ, τὰ προτέροις εἰρημένα αὐτοπα συμβέσονται.

PROP. XXII. Theor.

SIMILITER autem sint oppositæ sectiones, asymptotique; & punctum Δ sumatur in angulo deinceps ei qui sub asymptotis continetur; recta vero ΓΔΘ secet utramque sectionem, & ΔB alteri asymptoto parallela sit; sitque ut ΓΔ ad ΔΘ ita ΓH ad HΘ, & ipsi ΔB æqualis ponatur BK: dico rectam quæ per puncta K, H transit, occurrere utrique oppositarum sectionum; & quæ ab occurſibus ducuntur ad punctum Δ, sectiones easdem contingere.



ΕΣΤΩΣΑΝ δὲ ὁμοίως αἱ ἀντικείμεναι, καὶ αἱ ἀσυμπτῶται, καὶ τὸ Δ σημεῖον ἐν τῇ ἐφεξῆς γωνίᾳ τῇ ὑπὸ τῶν ἀσυμπτωτῶν περιεχομένης, ὁμοῦς εὐθείᾳ καὶ ἡ μὲν ΓΔΘ τέμνεται πρὸς τομᾶς, ἡ δὲ ΔB ὁμοῦς τῇ ἀσυμπτωτῇ, καὶ ὥς ἡ ΓΔ πρὸς ΔΘ ὅσως ἡ ΓH πρὸς HΘ, τῇ δὲ ΔB ἴση ὥς ἡ BK. λέγω ὅτι ἡ διὰ τῶν K, H σημεῖον συμπεσέτω καὶ ἑκατέρᾳ τῶν ἀντικείμενων, ὅτι ὁμοῦς ἐστὶ τῇ ἀσυμπτωτῇ ἐφ' ἧς ἐστὶ τὸ Δ σημεῖον, ὅτι ἡ διὰ τῶν Γ, Δ συμπτώσεται τῇ τομῇ. Ἡχθὼ γὰρ ἐφαπτομένη ἡ ΔZ, ἐκ δὲ τῶν Z, ὁμοῦς τῇ ἀσυμπτωτῇ ἐφ' ἧς ἐστὶ τὸ Δ, ἡχθὼ εὐθεῖα. ἢ ἔστω δὲ διὰ τῶν K, H. εἰ γὰρ μὴ, τὰ προτέροις εἰρημένα αὐτοπα συμβέσονται.

Ἡχθὼ

Ηχθωσαν ἐφαπτόμεναι αἱ $\Delta E, \Delta Z$, καὶ ἐπιζεύχθω ἡ EZ , ἥ ἐστι διωατὸν μὴ ἐρχέσθω διὰ τῆς K , H , ἀλλ' ἥτοι διὰ τῶν ἑτέρων, ἢ δι' ἑδτέρων ἤξει. εἰ μὲν διὰ τῆς H μόνον, ἔκ ἐστι ἡ ΔB τῇ BK ἴση, ἀλλ' ἑτέρα. ὅπερ ἄτοπον. εἰ δὲ διὰ μόνον τῆς K , ἔκ ἐστι ὡς ἡ $\Gamma \Delta$ πρὸς $\Delta \Theta$ ὅτως ἡ ΓH πρὸς $H \Theta$, ἀλλ' ἄλλη τις πρὸς ἄλλην. εἰ δὲ δι' ἑδτέρων τῶν H, K , ἀμφοτέρω παρὰ ἀδιώαται συμπίπτει.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κγ'.


ΕΣΤΩΣΑΝ πάλιν ἀντικείμεναι αἱ A, B , καὶ τὸ Δ σημειὸν ἐν τῇ ἐφεξῆς γωνίᾳ τῇ ὑπὸ τῶν ἀσυμπίπτων περικομμένης, ἥ ἔχθω ἡ μὲν $B \Delta$ τὴν B τορμὴν κατὰ τὸν μόνον τέμνουσαν, τῇ δὲ ἑτέρα τῶν ἀσυμπίπτων περικομμένης ἡ ΔA τὴν A τορμὴν ὁμοίως τέμνει. ἔξω ἴση ἡ μὲν ΔB τῇ BH , ἡ δὲ ΔA τῇ AK . λέγω ὅτι ἡ διὰ τῶν K, H συμβάλλει τὴν τορμὴν, καὶ αἱ ἀπὸ τῶν συμπίπτων ὅτι τὸ Δ ἀντικείμεναι ἐφαπτόνται τῶν τορμῶν.

Ηχθωσαν ἐφαπτόμεναι αἱ $\Delta E, \Delta Z$, καὶ ἐπιζεύχθω ἡ EZ , εἰ διωατὸν, μὴ ἐρχέσθω διὰ τῶν K, H , ἥτοι δὴ διὰ τῶν ἑτέρων αὐτῶν ἐλεύσεται, ἢ δι' ἑδτέρων. καὶ ἥτοι ἡ ΔA οὐκ ἔστι ἴση τῇ AK , ἀλλ' ἄλλη τις, ὅπερ ἄτοπον. ἢ ἡ ΔB τῇ BH ἔκ ἴση, ἢ ἑδτέρω ἑδτέρω. καὶ πάλιν ἐπ' ἀμφοτέρων τὸ αὐτὸ ἄτοπον συμβαίνει. ἥξει ἄρα ἡ EZ διὰ τῶν K, H .

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κδ'.

Κῶνς τορμὴ καὶ τορμὴ ἡ κύκλος περιφέρειᾳ ἢ συμβάλλει ὅτως, ὥστε μέρος μὲν πῶς ταύτων, μέρος δὲ μὴ πῶς κοινόν.

Εἰ διωατὸν, κῶνς τορμὴ ἡ $\Delta A B \Gamma$ κύκλος περιφέρειᾳ ἢ κῶνς τορμὴ τῇ $E A B \Gamma$ συμβαλλέτω, καὶ ἔξω αὐτῶν κοινὸν μέρος τὸ αὐτὸ τὸ $A B \Gamma$, μὴ κοινὸν δὲ τὸ ΔA καὶ τὸ ΔE , καὶ εἰλήφθω ἐπ' αὐτῶν σημείον τὸ Θ , καὶ ἐπιζεύχθω ἡ ΘA , ἥ διὰ τυχόντος σημείου Ξ τῇ $A \Theta$ ὁμοίωτος ἡ $\chi \theta \omega$ ἡ $\Delta E \Gamma$, καὶ περμύσθω ἡ $A \Theta$ διχα κατὰ τὸ H , ἥ διὰ τῆς H διάμετρος ἡ $\chi \theta \omega$ ἡ $B H Z$. ἢ ἄρα διὰ τῆς B τὴν $A \Theta$ ἐφαπτομένην ἐκατέρωθεν τῶν τορμῶν, καὶ ὁμοίωτος ἔστι τῇ $\Delta E \Gamma$, καὶ ἔστι ἐν μὲν τῇ ἑτέρᾳ τορμῇ ἡ ΔZ τῇ $Z \Gamma$ ἴση, ἐν δὲ τῇ ἑτέρᾳ ἡ $E Z$ τῇ $Z \Gamma$ ἴση. ὥστε ἡ ΔZ τῇ $Z E$ ἴση, ὅπερ ἀδιώατον.



EUTOCIUS.

Ἄλλως.

Εστωσαν αἱ $E A B \Gamma, \Delta A B \Gamma$ τορμῆς, ὡς εἶρη, ἥ διήχθω ὡς ἐτυχεν ἡ $\Delta E \Gamma$, καὶ διὰ τῆς A τῇ $\Delta E \Gamma$

Ducantur enim $\Delta E, \Delta Z$, quæ sectiones contingant; & juncta EZ , si fieri possit, non transeat per K, H , sed vel per alterum ipsorum tantum, vel per neutrum. si enim per H tantum transeat, recta ΔB non erit æqualis ipsi BK , sed alii cuidam; quod [per 31. 3. huj.] est absurdum. si vero tantum per K , non erit ut $\Gamma \Delta$ ad $\Delta \Theta$ ita ΓH ad $H \Theta$, sed [per 37. 3. huj.] alia quædam ad aliam. quod si per neutrum ipsorum K, H transeat, utraque absurda sequentur.

PROP. XXIII. Theor.

SINT itidem oppositæ sectiones A, B , punctumque Δ sit in angulo deinceps ei qui sub asymptotis continetur, & recta quidem $B \Delta$ sectionem B in uno puncto tantum secet, & sit alteri asymptoto parallela, recta vero ΔA similiter secet sectionem A , sitque ΔB ipsi BH æqualis, & ΔA ipsi AK : dico rectam quæ transit per K, H occurrere sectionibus; & quæ ab occurrentibus ad Δ ducuntur sectiones contingere.

Ducantur enim $\Delta E, \Delta Z$ quæ contingant sectiones; & juncta EZ , si fieri potest, non transeat per K, H ; vel igitur per alterum ipsorum, vel per neutrum transibit. unde vel ΔA non erit æqualis AK , sed alii cuiquam, quod [per 31. 3. huj.] est absurdum: vel ΔB non erit æqualis ipsi BH ; vel neutra neutra. & rursus in utrisque idem continget absurdum: recta igitur EZ per puncta K, H necessario transibit.

PROP. XXIV. Theor.


Coni sectio coni sectioni vel circuli circumferentiæ non ita occurrit, ut pars quidem eadem sit, pars vero non sit communis.

SIT enim fieri potest, coni sectio $\Delta A B \Gamma$ coni sectioni aut circuli circumferentiæ $E A B \Gamma$ occurrat, atque ipsarum communis pars sit eadem $A B \Gamma$, non communis autem $\Delta A, \Delta E$; & sumpto in ipsis puncto Θ jungatur ΘA , & per quodvis punctum E ducatur $\Delta E \Gamma$ parallela ipsi $A \Theta$, sectaque $A \Theta$ bifariam in H , ducatur per H diameter $B H Z$: ergo [per 32. 1. huj.] quæ per B ipsi $A \Theta$ parallela ducitur, utramque sectionem continget, & parallela erit ipsi $\Delta B \Gamma$; eritque [per 46. vel 47. 1. huj.] in altera quidem sectione ΔZ æqualis $Z \Gamma$, in altera vero $E Z$ æqualis $Z \Gamma$: quare & ΔZ ipsi $Z B$ æqualis erit, quod fieri non potest.

Aliter.

Sint sectiones $E A B \Gamma, \Delta A B \Gamma$, ducaturque utunque recta $\Delta E \Gamma$, & per A ipsi $\Delta E \Gamma$ parallela
M m m ducatur

ἀδιώκτον, ὥστε καὶ τὸ ἐξ ἀρχῆς. Εἰ δὲ αἱ $AB, \Delta \Gamma$ ὡς ἀλλήλοι ὦσιν, ἔσονται μὲν αἱ τομαὶ ἐλλείψεις, ἢ κύκλοι περιφύματα. περὶ ὧν αἱ $AB, \Gamma \Delta$ διχῶς κατὰ τὰ O, Π , καὶ ἐπιζεύχθω ἡ ΠO , καὶ ἐκβεβλήθω ἐφ' ἐκάπερα συμπίπτει δὲ ἡ Γ τομαὶς. συμπίπτει δὲ κατὰ τὰ Θ, P ἔσται δὲ διμέτρος τῶν τομῶν ἡ ΘP , περὶ ὧν δὲ ἐπ' αὐτὴν κατηγμέναι αἱ $AB, \Gamma \Delta$. ἡχθῶ δὲ τὰ B ὡς πρὸς $AB, \Gamma \Delta$ ἡ $ENMH$ περὶ ὧν αἱ EMH τῶν ΘP καὶ ἐκατέρωθεν τῶν γραμμῶν, διότι ἐτέρωθεν συμπέσεις ἐκ ἐστὶ περὶ τὰς A, B, Γ, Δ . ἔσται δὲ διὰ τούτων ἐν μὲν τῇ ἐτέρω τομῇ ἡ NM ἴση τῇ EN , ἐν δὲ τῇ ἐτέρω ἡ NE τῇ NH ἴση. ὥστε καὶ ἡ NM τῇ NH ἴση, ὅπερ ἀδιώκτον.



quare neque illud quod à principio supponebatur. Si vero $AB, \Delta \Gamma$ parallelæ sint, sectiones erunt ellipses, vel circuli circumferentia. dividantur $AB, \Gamma \Delta$ bifariam in O, Π ; & juncta ΠO ad utraq; partes producat: sectionibus igitur occurret. occurrat in Θ, P : erit igitur [per 28. 2. huj.] ΘP diameter sectionum, & $AB, \Gamma \Delta$ ad ipsam ordinatim applicatæ. à puncto E ducatur $ENMH$ ipsis $AB, \Gamma \Delta$ parallela: secabit igitur rectam ΘP & utramq; sectionem, propterea quod alius occurfus non est præter A, B, Γ, Δ : ergo, per jam dicta, in altera quidem sectione erit ipsi EN æqualis NM ; in altera vero EN æqualis NH ; quare NM erit æqualis ipsi NH , quod fieri non potest.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κς'.

Εἰ τὶ εἰρημόνων γραμμῶν πρὸς κατὰ τὴν ἐφάπτην σημείων ἀλλήλων ἔσονται συμπέσεις αὐταῖς κατὰ ἑτέρα σημεία πλείονα ἢ δύο.

Εφαπτόμεναι γὰρ ἀλλήλων πρὸς δύο τὶ εἰρημόνων γραμμῶν κατὰ τὸ A σημείον. λέγω ὅτι ἔσονται συμπέσεις κατὰ ἄλλα σημεία πλείονα ἢ δύο.


Εἰ γὰρ διωκτὶν συμπέσεις αὐτὰς κατὰ τὰ B, Γ, Δ , καὶ ἐξωσθῶν αἱ συμπέσεις ἐφεξῆς ἀλλήλαις μηδεμίαν μεταξὺ παρελείψουσιν, καὶ ἐπιζεύχθω ἡ $B \Gamma$ καὶ ἐκβεβλήθω, καὶ δὲ τὰ A ἐφαπτομένη ἡχθῶ ἡ AA' ἐφάπτεται δὲ τῶν δύο τομῶν, καὶ συμπίπτει τῇ $B \Gamma$. συμπίπτει κατὰ τὸ A , καὶ γινώσκω ὡς ἡ $\Gamma \Delta$ πρὸς AB ὥτως ἡ $\Gamma \Pi$ πρὸς ΠB , ἔσται δὲ ἐπιζεύχθω ἡ $A \Pi$ καὶ ἐκβεβλήθω. συμπίπτει δὲ ἡ Γ τομαὶς, ἔσται δὲ τὸ Γ συμπίπτει δὲ τὸ A ἐφάπτην τῶν τομῶν. συμπίπτει κατὰ τὰ Θ, P , ἔσται δὲ ἐπιζεύχθω αἱ $\Theta A, \Lambda P$ ἐφάπτην δὲ αὐτὰς τῶν τομῶν ἡ $\alpha \epsilon$ δὲ τὸ Δ τῇ Λ τῇ $\alpha \gamma$ γινώσκω τέμνει ἐκατέρωθεν τῶν τομῶν, καὶ συμπίπτει τὰ πρὸς τὸν εἰρημόνιον ἀποπαι. ἐκ $\alpha \epsilon$ τέμνουν ἀλλήλας κατὰ πλείονα σημεία ἢ δύο. Εἰ δὲ τῇ $\alpha \gamma$ ἐλλείψεως, ἢ τῇ $\alpha \delta$ κύκλου περιφύματος ἡ ΓB παράλληλος ἢ τῇ $A \Lambda$, ὁμοίως τῷ περὶ εἰρημόνιον ποιούμενῳ τὸ δὲ δειξέιν, διὰ μέτρον δείξαντες τὴν $A \Theta$.

PROP. XXVI. Theor.

Si dictarum curvarum aliquæ in uno puncto sese contingant; non occurrent sibi ipsis ad alia puncta plura quam duo.

Contingant enim sese duæ quæpiam dictarum curvarum in puncto A : dico eas non occurrere sibi ipsis ad alia puncta plura quam duo.

Nam, si fieri potest, occurrant ad puncta B, Γ, Δ ; sintque occurfus deinceps, nullum intermedium relinquentes; & juncta $B \Gamma$ producat: à puncto autem A ducatur contingens AA' , quæ quidem continget duas sectiones & cum recta ΓB conveniet. conveniat in A , & fiat ut ΓA ad AB ita $\Gamma \Pi$ ad ΠB ; jungaturque $A \Pi$, & producat: occurret igitur ea [per 9. 4. huj.] sectionibus; & quæ ab occurfibus ad punctum A ducuntur, sectiones contingent. itaque occurrat in punctis Θ, P , & jungantur $\Theta A, \Lambda P$; contingent igitur sectiones: ergo quæ à puncto A ad A ducitur utram-



que sectionem secabit; & eadem quæ dicta sunt [in præced.] absurda sequentur: non igitur se secant ad plura puncta quam duo. Si vero in ellipsi & circuli circumferentia ΓB ipsi AA parallela sit; pari modo [atque in præced.] demonstrationem faciemus, rectam $A \Theta$ diametrum esse ostendentes.

PROP.

PROP. XXVII. Theor.

Si prædictarum curvarum aliquæ in duobus punctis sese contingant, in alio puncto sibi ipsis non occurrant.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κζ'.

Εάν τὴ περιμετρὶον γραμμῶν πῶς καὶ δύο σημεία ἐφάπτονται ἀλλήλων, ἢ συμβάλλουσιν ἀλλήλων καὶ ἄλλοι.




PRÆDICTARUM enim curvarum duæ sese contingant in duobus punctis A, B : dico eas ad aliud punctum sibi ipsis non occurrere.

Nam, si fieri potest, occurrant etiam ad punctum Γ ; sitque primum Γ extra A, B tactus ; & ab ipsis A, B ducantur rectæ contingentes, quæ in punctum Λ convenient, ut in prima figura apparet : contingant igitur hæ utramque sectionem ; & juncta Γ Λ utramque secabit. secet ea in punctis H, M, & jungatur A N B : ergo in altera quidem sectione erit ut Γ Λ ad Λ H ita Γ N ad N H ; in altera vero ut Γ Λ ad Λ M ita Γ N ad N M ; quod est absurdum [ut ad 25. ostensum est.]

At si Γ H parallela sit rectis ad puncta A, B contingentibus, ut in ellipsi in secunda figura ; jungemus lineam A B, quæ [per convers. 27. 2. huj.] sectionum diameter erit ; ergo utraque rectarum Γ H, Γ M in puncto N bifariam secabitur ; quod est absurdum : igitur sectiones ad aliud punctum sibi ipsis non occurrunt, sed ad A, B tantum.

Sit deinde Γ inter tactus, ut in tertia figura : perspicuum est igitur sectiones non contingere sese ad punctum Γ, quia ad duo tantum puncta contingere ponebantur. secant igitur seipsas in Γ, & à punctis A, B ducantur A Λ, Λ B, quæ sectiones contingant ; jungaturque A B, quæ in Z bifariam dividatur : ergo [per 29. 2. huj.] à puncto Λ ad Z ducta diameter erit ; quæ quidem per Γ non transibit. si enim transeat, quæ per Γ ipsi A B parallela ducitur [per convers. 5, & 6. 2. huj.] continget utramque sectionem, quod fieri non potest. itaque ducatur à puncto Γ recta Γ K H M parallela ipsi A B : erit igitur in altera quidem sectione Γ K æqualis ipsi K H, in altera vero ipsi K Γ æqualis K M ; quare K M ipsi K H erit æqualis, quod fieri non potest. eodemque modo si contingentes inter se parallelæ sint, ex iis quæ diximus idem concludetur absurdum.

Δ ΤΟ γὰρ τὴ περιμετρὶον γραμμῶν ἐφαπτόμεναι ἀλλήλων κατὰ δύο σημεία τὰ Α, Β· λέγω ὅτι ἀλλήλων κατ' ἄλλο σημείον ἢ συμβάλλουσιν.




Εἰ γὰρ δυνατὸν, συμβαλλέμεναι κατὰ τὸ Γ, καὶ ἔτι περὶ τὸ Γ ἐκπῶς τὰ Α, Β, ἢ ἡχθῶσιν ἐκ τὰ Α, Β ἐφαπτόμεναι ἐφ' ἑαυτὴν ἄρα ἀμφοτέρων τὴ γραμμῶν. ἐφαπτόμεναι καὶ συμπίπτουσιν κατὰ τὸ Λ, ὡς ὅτι τὴ πρώτης καταγραφῆς, ἢ ἐπιζεύχθω ἡ Γ Λ· τὴ δὲ ἑκατέρω τὴ τομῶν. τὴν τε καὶ τὰ Η, Μ, καὶ ἐπιζεύχθω ἡ Α Ν Β· ἔσται ἄρα ἐν μὲν τῇ ἐτέρᾳ τομῇ ὡς ἡ Γ Λ πρὸς Λ Η ἔσται ἡ Γ Ν πρὸς Ν Η, ἐν δὲ τῇ ἐτέρᾳ ὡς ἡ Γ Λ πρὸς Λ Μ ἔσται ἡ Γ Ν πρὸς Ν Μ, ὅπερ ἀπίπν.

Εάν ὅ γὰρ Γ Η ὁρθὸς ἡ ἴσῃ καὶ τὰ Α, Β σημεία ἐφαπτόμεναι, ὡς ὅτι τὴ ἐλλείψεως ἐν τῇ δότῃ καταγραφῇ, ὅτι ζεύσαντες τὰ Α Β ἐρεῖται ὅτι διάμετρος ἔσται τὴ τομῶν ὡς δὲ τὰ τμήματα ἑκατέρω τὴ Γ Η, Γ Μ κατὰ τὸ Ν, ὅπερ ἀπίπν. ὅκα ἄρα κατ' ἑτέρον σημείον συμβαλλουσιν γραμμῶν ἀλλήλων, ἀλλὰ κατὰ μίαν τὰ Α, Β.

Εἰ δὲ τὸ Γ μεταξὺ τὰ ἁφῶν, ὡς ὅτι τὴ τρίτης καταγραφῆς· φανερόν δὲ ὅτι ἐκ ἐφάπτονται αἱ γραμμῶν ἀλλήλων κατὰ τὸ Γ, κατὰ δύο γὰρ μόνον ὑπὸ κατὰ ἐφαπτόμεναι. τὴν τε καὶ τὰ Γ, καὶ ἡχθῶσιν ἀπὸ τὰ Α, Β ἐφαπτόμεναι αἱ Α Λ, Λ Β, καὶ ἐπιζεύχθω ἡ Α Β, καὶ δὲ τὰ τμήματα κατὰ τὸ Ζ· ἡ ἄρα ἀπὸ τὸ Λ ὅτι τὸ Ζ διάμετρος ἔσται, διὰ μὲν ἐν τῇ Γ ἐκ ἐλεύσε. εἰ γὰρ ἦν ἡ Α Β ὁρθὸς τὴν Α Β ἀνομῶς ἐφάπτεται ἀμφοτέρων τὴ τομῶν. τὰ το δὲ ἀδυνατῶν. ἡχθῶ δὲ ἀπὸ τὸ Γ ὁρθὸς τὴν Α Β ἡ Γ Κ Η Μ· ἔσται δὲ ἐν μὲν τῇ ἐτέρᾳ τομῇ ἡ Γ Κ ἴση τῇ Κ Η, ἐν δὲ τῇ ἐτέρᾳ ἡ Κ Μ τῇ Κ Γ ἴση· ὡς καὶ ἡ Κ Μ τῇ Κ Η, ὅπερ ἀδυνατῶν. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ ὁρθὸς ἡ Α Β ὡς αἱ ἐφαπτόμεναι, κατὰ τὰ αὐτὰ τοῖς ἐπείναι τὸ ἀδυνατῶν δεχθήσεται.

ΠΡΟ-

ducantur rectæ contingentes sectiones, quæ convenient in punctum Δ ; junctaque AB secetur in Z bifariam, & jungatur ΔZ : fecabit igitur ΔZ utramque sectionem in alio atque alio puncto, uti dictum est. secet in H, M ; & producat ΔZ usque ad Δ centrum ellipseos vel circuli: ergo propter ellipsim & circumulum erit [per 37.1.huj.] ut $\Delta\Delta$ ad ΔH ita $H\Delta$ ad ΔZ , & ita reliqua ΔH ad HZ . est autem $\Delta\Delta$ major quam HZ ; ergo & ΔH major quam HZ . sed & propter parabolam erit [per 35.1. huj.] ΔM æqualis ipsi MZ ; quod fieri non potest.



ἐφαπτόμεναι τῶν τομῶν συμπιέσασθαι κατὰ τὸ Δ , καὶ ἐπεζεύχθω ἡ AB καὶ διχα πετμήθω κατὰ τὸ Z , ἔπειτα ἐπεζεύχθω ἡ ΔZ . περὶ δὲ ἑκατέραν τῶν τομῶν κατ' ἄλλο καὶ ἄλλο, ὡς εἶρη. περνεύω κατὰ τὰ H, M , καὶ ἐκτελέθω ἡ ΔZ ὅπῃ τὸ Δ , καὶ ἔστω τὸ Δ κέντρον τῆς ἐλλείψεως ἢ τοῦ κύκλου· ἔστιν ἄρα διὰ τὴν ἐλλείψιν καὶ τὸν κύκλον ὡς ἡ $\Delta\Delta$ πρὸς ΔH ὅτως ἡ ΔH πρὸς ΔZ , καὶ λοιπὴ ἡ ΔH πρὸς HZ . μείζων γὰρ ἡ $\Delta\Delta$ τῇ ΔH · μείζων ἄρα καὶ ΔH τῇ HZ . διὰ γὰρ τὴν παραβολὴν ἴση ἡ ΔM τῇ MZ · ὅπερ ἀδύνατον.


PROP. XXXI. Theor.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ λα'.

Hyperbola hyperbolam idem centrum habentem in duobus punctis non continget.

Ὑπερβολὴ ὑπερβολῆς τὸ αὐτὸ κέντρον ἔχουσα ἐκ ἐφάπτης κατὰ δύο σημεῖα.

HYPERBOLÆ enim AHB , AMB idem habentes centrum Δ , si fieri potest, in punctis A, B sese contingant; & ducantur ab ipsis rectæ contingentes, quæ inter se convenient, ut $\Delta A, \Delta B$; junctaque ΔA producat ΔZ , & jungatur AB : ergo [per 35.2.huj.] $\Delta\Delta$ Z secat bifariam rectam AB in Z , utraque autem sectiones in H, M secabit; quare [per 37.1. huj.] propter hyperbolam AHB , rectangulum $Z\Delta A$ est æquale quadrato ex ΔH ; & propter hyperbolam AMB rectangulum $Z\Delta A$ æquale est quadrato ex ΔM : quadratum igitur ex $M\Delta$ quadrato ex ΔH æquale erit; quod fieri non potest.



ΥΠΕΡΒΟΛΑΙ γάρ αἱ AHB , AMB τὸ αὐτὸ κέντρον ἔχουσαι τὸ Δ , εἰ δυνατὸν, ἐφαπτόμεναι κατὰ τὰ A, B , ἤχθωσαν γὰρ ἀπὸ τοῦ Δ , B ἐφαπτόμεναι αὐτῶν. ἔσονται πρὸς ἀλλήλας αἱ $\Delta A, \Delta B$, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΔA , ἔκτελέθω δὲ ὅπῃ τὸ Z , ἐπεζεύχθω καὶ ἡ AB . ἡ ἄρα $\Delta\Delta$ Z τὴν AB διχα πέμνει κατὰ τὸ Z , περὶ γὰρ ἡ $\Delta\Delta$ Z τὰς τομὰς κατὰ τὰ H, M . ἔστι δὲ διὰ τὴν AHB ὑπερβολὴν, ἴσον τὸ ὑπὸ $Z\Delta A$ τῷ ἀπὸ ΔH , διὰ γὰρ τὴν AMB , τὸ ὑπὸ $Z\Delta A$ ἴσον τῷ ἀπὸ ΔM . τὸ ἄρα ἀπὸ $M\Delta$ ἴσον τῷ ἀπὸ ΔH , ὅπερ ἀδύνατον.


PROP. XXXII. Theor.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ λβ'.

Si ellipsis ellipsim vel circuli circumferentiam idem centrum habentem in duobus punctis contingat; recta conjungens tactus per centrum transibit.

Εἰς ἑλλειψὶς ἐλλείψεως ἢ κύκλου περιφέρειας κατὰ δύο σημεῖα ἐφάπτης, τὸ αὐτὸ κέντρον ἔχουσα ἢ τὰς ἀφὰς ἐπιζευγνύσασθαι διὰ τὸ κέντρον πιύεται.

CONTINGANT enim sese dictæ lineæ in punctis A, B ; & junctâ AB , per A, B puncta ducantur rectæ sectiones contingentes, quæ, si fieri possit, convenient in Δ ; & recta AB in Z bifariam dividatur, & jungatur ΔZ : ergo [per 29.2. huj.] ΔZ diameter erit sectionum. sit centrum Δ , si fieri potest: rectangu-




ΕΦΑΠΤΕΣΘΩΣΑΝ γὰρ ἀλλήλων αἱ εἰρημόναι γραμμαὶ κατὰ τὰ A, B σημεῖα, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ AB , ἔστω δὲ τὰ A, B ἐφαπτόμεναι τῶν τομῶν ἤχθωσαν, καὶ εἰ δυνατὸν συμπιέσασθαι κατὰ τὸ Δ , καὶ ἡ AB διχα πετμήθω κατὰ τὸ Z , καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΔZ . διάμετρος ἄρα ἔστω ἡ ΔZ τῶν τομῶν. ἔστω, εἰ δυνατὸν, κέντρον

τρον τὸ Δ· ἔστι ἄρα τὸ ὑπὸ ΑΔΖ διὰ μὲν τὴν
ἐπερὶ τοῦ ἴσου τῷ ΔΗ, διὰ δὲ τὴν ἐπερὶ
ἴσου τῷ ΔΜ· ὥστε τὸ ΔΗ Δ ἴσον τῷ ΔΜ,
ὅπερ ἀδυνατῶν· ἐκ ἄρα αἱ δὲ ΑΒ, ΒΓ ἐφαπτόμεναι
συμπίπτουσιν· ὡς ἀλλήλοι· ἄρα εἰσὶν καὶ διὰ τὸ
διὰ μέτρος ἡ ΑΒ· ὥστε διὰ δὲ κέντρος πίπτει· ὅπερ
ἔδει δεῖξαι.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Λγ'.

Κόνυ τομὴ, ἢ κύκλῳ περιφέρεια κόνυ τομὴ ἢ κύ-
κλῳ περιφέρεια, μὴ ἔπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τὰ
κοίλα ἔχουσα, ὅ συμπίπτουσιν κατὰ πλείονα
σημεῖα ἢ δύο.

Εἰ δὲ δυνατὸν, κόνυ τομὴ ἢ κύκλῳ περιφέρεια
ἢ ΑΒΓ κόνυ τομὴ ἢ κύκλῳ περιφέρεια τῇ
ΑΔΒΕΓ συμβαλλέτω κατὰ
πλείονα σημεῖα ἢ δύο, μὴ ὅτι
τὰ αὐτὰ μέρη τὰ κοίλα ἔχου-
σαι τὰ ΑΒΓ τῇ γραμμῇ· εἰ-
λήφθω τρεῖς σημεῖα τὰ Α,
Β, Γ ἐπὶ τῷ ὑποκείμενῳ ΑΒ,
ΒΓ· γυνάσκωμεν ὅτι ἔστι
ὅτι τὰ αὐτὰ πῶς κείλοισι τῇ ΑΒΓ γραμμῇ· διὰ
τὰ αὐτὰ δὲ αἱ ΑΒ, ΒΓ τὴν αὐτὴν γωνίαν περιέχου-
σιν ὅτι τὰ αὐτὰ πῶς κείλοισι τῇ ΑΔΒΕΓ γραμμῇ·
αἱ ἐφαπτόμεναι ἄρα γραμμαὶ ὅτι τὰ αὐτὰ μέρη ἔχου-
σι τὰ κοίλα, ὅπερ ἀδυνατῶν· ὑπόκειται γὰρ ὅτι τὰ
ἐπερὶ μέρη.



lum igitur $\Delta \Delta Z$ [per 37.1.huj.] propter alteram
quidem sectionem est æquale quadrato ex ΔH ,
propter alteram vero æquale quadrato ex ΔM :
quare quadratum ex $H \Delta$ quadrato ex ΔM æquale
erit, quod fieri non potest: igitur rectæ con-
tingentes à punctis A, B ductæ non conveniunt:
ergo parallelæ sunt inter sese: & idcirco recta
 AB diameter est; adeoque per centrum transibit.
quod erat demonstrandum.

PROP. XXXIII. Theor.

Coni sectio vel circuli circumferentia
coni sectioni vel circuli circumferen-
tiæ, ad easdem partes concava non
habens, ad plura puncta quam duo
non occurret.


Si enim fieri potest, coni sectio vel circuli
circumferentia ABG coni sectioni vel cir-
culi circumferentiæ $ADEG$
occurrat ad plura puncta
quam duo, non habens con-
vexa ABG ad easdem par-
tes ad quas altera. suman-
tur tria puncta A, B, G ; &
 AB, BG jungantur: conti-
nent igitur angulum ad eas-
dem partes, ad quas sunt concava sectionis ABG .
pari modo rectæ AB, BG eundem angulum conti-
nent ad eas partes ad quas sunt concava se-
ctionis $ADEG$: ergo dictæ curvæ ad easdem
partes habent concava sua, quod fieri non po-
test; posuimus enim ea ad contrarias partes
fita.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Λδ'.

Εὰν κόνυ τομὴ ἢ κύκλῳ περιφέρεια συμπίπτῃ
μὲν τῇ ἀντικείμενῃ κατὰ δύο σημεῖα, καὶ αἱ με-
ταξὺ τῇ συμπίπτουσιν γραμμαὶ ἔπὶ τὰ αὐτὰ
μέρη τὰ κοίλα ἔχουσι· προσκαλλομένη ἢ
γραμμὴ κατὰ τὰς συμπίπτουσιν ὅ συμπίπτουσιν
τῇ ἐπὶ τῇ ἀντικείμενῃ.

Εἰς τὸν ἄντικειμενῃ αἱ $\Delta, \Lambda \Gamma Z$, καὶ
ἔσω κόνυ τομὴ ἢ κύκλῳ περιφέρεια ἢ ABZ ,
συμπίπτουσιν τῇ ἐπὶ τῇ ἀν-
τικείμενῃ κατὰ δύο σημεῖα τὰ
 Δ, Z , καὶ ἔχουσιν αἱ ABZ ,
 $\Lambda \Gamma Z$ τομὰς ὅτι τὰ αὐτὰ μέρη
τὰ κοίλα· λέγω ὅτι ἡ ABZ
γραμμὴ ἐκβαλλομένη ὅ συμ-
πίπτουσιν τῇ Δ .

Επιζεύχθω γὰρ ἡ AZ ,
καὶ ἐπεὶ ἀντικείμεναι εἰσιν αἱ
 $\Delta, \Lambda \Gamma Z$, καὶ ἡ AZ ὑπερβο-
λῇ, ὅ συμπίπτουσιν ἐκβαλλομένη τῇ Δ ἀντικεί-
μενῃ· καὶ ἔστι ἄρα ἡ ABZ γραμμὴ συμπίπτει τῇ Δ .



PROP. XXXIV. Theor.

Si coni sectio vel circuli circumferen-
tia occurrat uni oppositarum sectio-
num in duobus punctis; & curvæ,
quæ inter occurfus interjiciuntur, ad
easdem partes concava habeant: pro-
ducta curva ultra occurfus alteri op-
positarum sectionum non occurret.

Si oppositæ sectiones $\Delta, \Lambda \Gamma Z$; & coni
sectio vel circuli circumferentia ABZ oc-
currat alteri oppositarum se-
ctionum in duobus punctis
 A, Z ; habeantque $ABZ, \Lambda \Gamma Z$
concava ad easdem partes:
dico curvam ABZ productam
sectioni Δ non occurrere.

Jungatur enim AZ ; &
quoniam $\Delta, \Lambda \Gamma Z$ oppositæ se-
ctiones sunt, & recta AZ in
duobus punctis hyperbolam
secat, producta [per 32.2.huj.]
non occurret oppositæ sectio-
ni Δ : quare neque curva ABZ eidem oc-
curret.


PROP.

PROP. XXXV. Theor.

Si conicæ sectio vel circuli circumferentia uni oppositarum sectionum occurrat; alteri ipsarum non occurret ad plura puncta quam duo.

SINT oppositæ sectiones A, B ; & ipsi A occurrat conicæ sectio vel circuli circumferentia $AB\Gamma$, secetque B in punctis Γ, Δ : dico ad aliud punctum ipsi $B\Gamma$ non occurrere.

Si enim fieri possit, occurrat in Δ : ergo sectio $B\Gamma\Delta$ sectioni $B\Gamma$ occurrat ad plura puncta quam duo, non habens concava ad easdem partes; quod [per 33.4. huj.] fieri non potest. similiter demonstrabitur si recta $AB\Gamma$ oppositam sectionem contingat.



ΠΡΟΤΑΣΙΣ λε'.

Εάν κώνυς τομή ή κύκλῳ περιφέρεια μιᾶς τῆς ἀντικειμένης συμπίπτῃ, τῇ λοιπῇ αὐτῶν ἔσονται συμπίπτουσα κατὰ πλείονα σημεία ή δύο.

ΕΣΤΩΣΑΝ ἀντικείμεναι αἱ A, B , & συμβαλλέτω τῇ A ή τῇ κώνυς τομή ή κύκλῳ περιφέρεια ή $AB\Gamma$, & τινεύτω τῇ B ἀντικειμένη κατὰ τὰ Γ, Δ λέγω ὅτι κατ' ἀλλοσημίαν ἔσονται συμπίπτουσα τῇ $B\Gamma$.

Εἰ γάρ διωκόντων, συμπίπτουσα κατὰ τὸ Δ ή ἄρα $B\Gamma\Delta$ τῇ $B\Gamma$ τομῇ συμβαλλέτω κατὰ πλείονα ή δύο, μὴ ὅτι τὰ αὐτὰ ἔχουσιν τὰ κῶνυα· ὅπερ ἀδύνατον. ὁμοίως δὲ δευτέρῳ.

οὔτω & εἰν ή $AB\Gamma$ χεαμμένη τῇ ἀντικειμένης ἐφάπτηται.

PROP. XXXVI. Theor.

Conicæ sectio vel circuli circumferentia oppositis sectionibus ad plura puncta quam quatuor non occurret.

HOC autem perspicue constat ex eo, quod sectio occurrens uni oppositarum sectionum reliquæ non occurrat ad plura puncta quam duo.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ λς'.

Κώνυς τομή ή κύκλῳ περιφέρεια τῶν ἀντικειμένων ἔσονται συμπίπτουσα κατὰ πλείονα σημεία ή τέσσαρες.


ΦΑΝΕΡΟΝ ὅτι τῆτο, ὅτι εἰ τῶν μιᾶς τῆς ἀντικειμένης συμπίπτουσα τῇ λοιπῇ κατὰ πλείονα δύοιν μὴ συμπίπτουσιν.

PROP. XXXVII. Theor.

Si conicæ sectio vel circuli circumferentia unam oppositarum sectionum concava sui parte contingat; alteri oppositarum non occurret.

SINT oppositæ sectiones A, B ; & sectionem A contingat alia $\Gamma A \Delta$: dico sectionem $\Gamma A \Delta$ sectioni B non occurrere.

Ducatur enim per punctum A recta contingens $E A Z$: utramque igitur sectionem continget in A : quare * non occurret sectioni B ; & propterea neque curva $\Gamma A \Delta$ eidem occurret.



ΠΡΟΤΑΣΙΣ λς'.

Εάν κώνυς τομή ή κύκλῳ περιφέρεια μιᾶς τῆς ἀντικειμένης ἐφάπτηται τοῖς κῶνυσι αὐτῶν· τῇ ἐτέρῃ τῇ ἀντικειμένης ἔσονται συμπίπτουσα.

ΕΣΤΩΣΑΝ ἀντικείμεναι αἱ A, B , & τῇ A τομῇ ἐφάπτεται ή $\Gamma A \Delta$. λέγω ὅτι ή $\Gamma A \Delta$ τῇ B ἔσονται συμπίπτουσα.

Ηχθῶ δὲ τῇ $E A Z$ ἐφάπτομένη ή $E A Z$ ἐκατέρως δὴ τῇ χεαμμῶν ὁπταύει κατὰ τὸ A · ὥστε ἔσονται συμπίπτουσα τῇ B , ὥστε ἔστι ή $\Gamma A \Delta$.

PROP. XXXVIII. Theor.

Si conicæ sectio vel circuli circumferentia utramque oppositarum sectionum contingat in uno puncto; oppositis sectionibus in alio puncto non occurret.

* Non enim potest transire per loca quæ sunt κατὰ κορυφὴν angulo sub asymptotis sectionis.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ λς'.

Εάν κώνυς τομή ή κύκλῳ περιφέρεια ἐκατέρως τῶν ἀντικειμένων κατ' εἰς ἐφάπτηται σημείῳ κατ' ἑτέρον αὐτῶν συμπίπτουσιν τῶν ἀντικειμένων.

ΕΣΤΩ

ΕΣΤΩ ΣΑΝ ἀντικείμεναι αἱ A, B , καὶ κώνη τομὴ ἢ κύκλος περιφέρεια ἐφαπτόμενος ἑκατέρας τῶν A, B κατὰ τὰ A, B · λέγω ὅτι ἡ $ABΓ$ γραμμὴ καὶ ἕτερον ἐ συμπίπτει τῶν A, B τμημάτων.

Ἐπεὶ ἔν ἡ $ABΓ$ γραμμὴ τῆς A τομῆς ἐφάπτεται καὶ ἐν, συμπίπτει καὶ τῇ B · τὸ A ἄρα τομῆς οὐκ ἐφάπτεται κατὰ τὰ κείλα. ὁμοίως δὲ δευχρήσεται ὅτι ἐδὲ τῇ B . ἤχθουσιν τῶν A, B τμημάτων ἐφαπτόμεναι αἱ $ΔΑΚ, ΒΕ$, καὶ αὐταὶ ἐφάπτονται τῇ $ABΓ$ γραμμῆς. εἰ γὰρ διωκόν, τμημάτων ἢ ἐπὶ αὐτῶν, καὶ ἔσω ἡ AZ μεταξὺ ἄρα τῶν $ΔΑΖ$ ἐφαπτόμενης καὶ τῇ A τομῆς ἐφαπτόμενην εὐθείαν ἢ AK , ὅπερ ἀδιώκον· ἐφάπτονται ἄρα τῇ $ABΓ$. καὶ διὰ τὸ φανερόν ὅτι ἡ $ABΓ$ καὶ ἕτερον ἐ συμβάλλει τῶν A, B ἀντικειμένων. ἔστω καὶ φανερόν ὅτι εἰ ἡ $ΓAB$ γραμμὴ συμπίπτει τῇ B ἀντικειμένη, ἐκ ἐφάπτεται τῆς A τομῆς καὶ τοῖς κείλοις αὐτῆς· δευχρήσεται δὲ ἀντιστροφῶς τῇ λέει.



SINT oppositæ sectiones A, B ; conī autem sectio vel circuli circumferentia $ABΓ$ utramque ipsarum in punctis A, B contingat: dico lineam $ABΓ$ oppositis sectionibus A, B in alio puncto non occurrere.

Quoniam igitur $ABΓ$ sectionem A in uno puncto contingit, sectioni B occurrens; non continget sectionem A concava sui parte. similiter demonstrabitur, neque ita contingere sectionem B . ducantur rectæ $ΔΑΚ, ΒΕ$ contingentes sectiones A, B ; quæ & curvam $ABΓ$ contingent. si enim fieri potest, altera ipsarum secet; sitque ea AZ : ergo inter rectam $ΔΑΖ$ contingentem & sectionem A cadit recta intermedia AK ; quod [per 32. I. huj.] est absurdum: rectæ igitur $ΔΑ, ΒΕ$


ipsam quoque $ABΓ$ contingent. ex quo apparet curvam $ABΓ$ ad aliud punctum oppositis sectionibus non occurrere. sic etiam manifestum est quod, si curva $ΓAB$ occurrat oppositæ sectioni B , non continget sectionem A partibus ejus concavis: è converso autem 35^{te} demonstrabitur.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΛΘ'.

Εάν ὑπεβολὴ μιᾶς τῶν ἀντικειμένων κατὰ δύο σημεία συμπίπτει, ἀντιγραμμὴν καὶ κυρτὰ ἔχουσα ἢ ἀντικειμένη αὐτῇ ἐ συμπίπτει τῇ ἐπὶ αὐτῇ τῇ ἀντικειμένη,

ΕΣΤΩ ΣΑΝ ἀντικείμεναι αἱ $ABΔ, Z$, ἐ ὑπεβολὴ ἡ $ABΓ$ τῇ $ABΔ$ συμβάλλεται κατὰ τὰ A, B σημεία, ἀντιγραμμὴν ἔχουσα καὶ κυρτὰ τοῖς κείλοις, καὶ τῇ $ABΓ$ ἔσω ἀντικειμένη ἢ E · λέγω ὅτι ἡ E ἐ συμπίπτει τῇ Z .

Ἐπιεύχθω ἡ AB , ἐ ἐκτελέσθω δὲ τὸ H . ἐπεὶ ἔν ὑπεβολὴν τὴν $ABΔ$ εὐθεία τμήμα ἢ ABH , ἐκβαλλομένη δὲ ἐφ' ἑκάτερα ἐκ τῶν πίπτει τῇ τομῇ· ὥστε ἐ συμπίπτει τῇ Z τομῇ. ὁμοίως δὲ, διὰ τὴν $ABΓ$ ὑπεβολὴν, ἐδὲ τῇ E ἀντικειμένη συμπίπτει· ἐδὲ ἡ E ἄρα τῇ Z συμπίπτει.



PROP. XXXIX. Theor.

Si hyperbola uni oppositarum sectionum in duobus punctis occurrat, convexa habens è regione sita; quæ ipsi opponitur sectio alteri oppositarum non occurret.

SINT oppositæ sectiones $ABΔ, Z$; & hyperbola $ABΓ$ sectioni $ABΔ$ occurrat in punctis A, B , habens convexa è regione sita; sitque sectioni $ABΓ$ opposita sectio E : dico ipsam E sectioni Z non occurrere.

Jungatur enim AB & ad H producat. quoniam igitur ABH recta secat hyperbolam $ABΔ$, producta vero ex utraque parte extra sectionem cadit; ideo [per 33. 2. huj.]

non occurret sectioni Z . similiter, propter hyperbolam $ABΓ$, neque occurret oppositæ sectioni E : ergo sectio E sectioni Z non occurret.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Μ'.

Εάν ὑπεβολὴ ἑκατέρα τῶν ἀντικειμένων συμπίπτει ἢ ἀντικειμένη αὐτῇ τῇ ἀντικειμένη ἑδὲ ἑτέρα συμπίπτει κατὰ δύο σημεία.

ΕΣΤΩ ΣΑΝ ἀντικείμεναι αἱ A, B , ὑπεβολὴ δὲ $ABΓ$ συμπίπτει ἑκατέρα τῇ ἀντικειμένη.

PROP. XL. Theor.

Si hyperbola occurrat utrique oppositarum sectionum: quæ ipsi opponitur sectio nulli oppositarum in duobus punctis occurret.

SINT oppositæ sectiones A, B ; & $ABΓ$ hyperbola utrique occurrat: dico sectionem, quæ

ooo

quæ ipsi $ΑΓΒ$ opponitur, nulli sectionum A, B occurrere in duobus punctis.

Si enim fieri potest, occurrat in punctis Δ, E ; & juncta ΔE producat: ergo quidem [per 33. 2. huj.] propter sectionem $\Delta E H$ recta ΔE sectioni $ΑΓΒ$ non occurrerit; & propter sectionem $A B \Delta$ non occurrerit ipsi B ; (per tres enim locos [per 33. 2. huj.] transibit) quod fieri non potest*. similiter demonstrabitur neque sectioni B in duobus punctis occurrere.

Eadem etiam ratione neutram ipsarum continget. ducatur enim recta contingens ΘE , quæ quidem continget utramque sectionem: ergo propter sectionem $H E$, ΘE ipsi $A \Gamma$ non occurrerit; & propter sectionem $A E$, ΘE non occurrerit sectioni B : quare neque $A \Gamma$ sectioni B occurrerit, contra hypothesein.

PROP. XLI. Theor.

Si hyperbola utramque oppositarum sectionum in duobus punctis secet, convexa habens è regione utrique sita; quæ ipsi opponitur sectio nulli oppositarum occurrerit.

SINT oppositæ sectiones A, B ; & hyperbola $\Gamma A B \Delta$ utramque secet in duobus punctis, convexa habens è regione utrisque sita: dico sectionem $B Z$ huic oppositam nulli ipsarum A, B occurrere.

Si enim fieri potest, occurrat sectioni A in puncto E ; & junctæ $\Gamma A, \Delta B$ producantur. convenient igitur hæ inter sese. convenient autem in Θ : erit igitur [per 25. 2. huj.] Θ intra angulum contentum sub asymptotis sectionis $\Gamma A B \Delta$ cui opponitur sectio $E Z$: ergo quæ à puncto E ad Θ ducitur, cadet intra angulum contentum sub ipsis $A \Theta, \Theta B$. rursus quoniam $\Gamma A E, \Delta B$ oppositæ sectiones sunt, recta $\Delta B \Theta$ producta [per 33. 2. huj.] non conveniet sectioni $\Gamma A E$: quare si jungatur $E \Theta$, cadet ea extra angulum $A \Theta B$, quod quidem absurdum; cadebat enim ea ipsa $E \Theta$ intra angulum $A \Theta B$: quocirca sectio $E Z$ neutri sectionum A, B conveniet.

* Scilicet fieri non potest ut recta $\Delta E \Theta$, transiens per tres locos [ad 33. 2. huj.] definitos, secet $\Delta \Gamma B$ vel B . Sed & fieri non potest ut $A \Gamma B$ secet B , & tamen $\Delta E \Theta$ harum neutri occurrat.

λέγω ὅτι ἡ τῇ $A \Gamma B$ ἀντικείμενη & συμβάλλει τῇς A, B τομαῖς κατὰ δύο σημεῖα.

Εἰ γὰρ διωκτὴν, συμβαλλέτω κατὰ τὰ Δ, E , & ὁπλὺζομένης ἡ ΔE ἐκβεβλήσῃ διὰ μὲν δὴ τὴν $\Delta E H$ τομὴν & συμπεσέτω ἡ ΔE εὐθεῖα τῇ $A B$ τομῇ, διὰ δὲ τῇ $A E \Delta$ & συμπεσέτω τῇ B τομῇ* (διὰ γὰρ τῶν τριῶν πόνων ἐλεύσεται) ὅπερ ἀδιώκτον. ὁμοίως δὲ δευτέρῃ σέτω ὅτι ἐστὶ τῇ B τομῇ κατὰ δύο σημεῖα συμπεσέτω.

Διὰ τὰ αὐτὰ δὲ ἐστὶ ἐφάνη ἑκατέρας αὐτῶν ἀρχόντες γὰρ ὁπλὺζομένης τὴν ΘE , ἐφάνη μὲν αὐτῇ ἑκατέρω τῶν τομῶν ὥστε διὰ μὲν τὴν $H E$ τομὴν & συμπεσέτω ἡ ΘE τῇ $A \Gamma$, διὰ δὲ τὴν $A E$ & συμβάλλει τῇ B ὥστε ἐστὶ ἡ $A \Gamma$ τῇ B συμβάλλει, ὅπερ ἐκ ὑποθέσεως.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ μα'.

Εάν ὑπερβαλὴ ἑκατέρω τῶν ἀντικείμενων τμήτη χτὶ δύο σημεῖα, ἀντισυμμετρικά ἔχοντα πρὸς ἑκατέρω τὰ κυρτά· ἡ ἀντικείμενη αὐτῇ ἐδεμνῇ τῇ ἀντικείμενῃ συμπεσέτω.


ΕΣΤΩσαν ἀντικείμεναι αἱ A, B , & ὑπερβολὴ ἡ $\Gamma A B \Delta$ ἑκατέρω τῶν A, B πινέτω κατὰ δύο σημεῖα, ἀντισυμμετρικά ἔχοντα τὰ κυρτά· λέγω ὅτι ἡ ἀντικείμενη αὐτῇ ἡ $E Z$ ἐδεμνῇ τῇ A, B συμπεσέτω.

Εἰ γὰρ διωκτὴν, συμπίπτει τῇ $A \Gamma$ κατὰ τὸ E , & ἐπεξέχθῃ αἱ $\Gamma A, \Delta B$, καὶ ἐκβεβλήσῃ συμπεσέτω δὴ ἀλλήλαις. συμπίπτεισαν κατὰ τὸ Θ · ἔστω δὲ τὸ Θ ἐν τῇ παρεχόμενῃ γωνίᾳ ὑπὸ τῶν ἀσυμπτῶτων τῇ $\Gamma A B \Delta$ τομῇ, &

ἔστω αὐτῇ ἀντικείμενη ἡ $E Z$ · ἡ ἀρα διὰ τοῦ E ὁπλὺζομένη [εἰς ἐκβεβλήθη] ἐντὸς πεσέτω τῇ $A \Theta B$ παρεχόμενῃ γωνίᾳ. πάλιν ἐπεὶ ἀντικείμεναι εἰσι αἱ $\Gamma A E, \Delta B$, ἡ $\Delta B \Theta$ ἐκβεβλήσῃ & συμπίπτει τῇ $\Gamma A E$ τμήτῃ· ἡ ἀρα $E \Theta$ ὁπλὺζομένη ἐντὸς πεσέτω τῇ $A \Theta B$ γωνίᾳ, ὅπερ ἀποκρίνεται· ἐπιπτε γὰρ αὐτῇ ἡ $E \Theta$ ἐντὸς τῇ $A \Theta B$ · ἐκ ἀρα ἡ $E Z$ μηδεμνῇ τῇ A, B συμπεσέτω.

Ἀλλως.

Εἰσὼσαν ἀντικείμεναι αἱ A, B , καὶ ὑπερβολὴ ἡ $\Gamma A B \Delta$ ἐκατέραν αὐτῶν πινύτω κατὰ τὰ Γ, A, B, Δ , καὶ ἐξω ἀντικείμενη αὐτῇ ἡ EZ . λέγω ὅτι ἡ EZ οὐδεμίαν τῶν ἀντικείμενων συμπεσεῖται. Πι-
 ζομένη γὰρ αἱ $\Delta B, \Gamma A$ ἐκβεβλή-
 θωσαν καὶ συμπίπτω-
 τωσαν κατὰ τὸ Θ .
 ἔστω ἄρα τὸ Θ μετα-
 ξυ τῶν ἀσυμπίπτων τῶν
 $\Gamma A B \Delta$ τμήων. εἰσ-
 ωσαν αἱ τῶν $\Gamma A B \Delta$ ἀ-
 σύμπτωτοι αἱ $KH \Lambda$,
 MHN . φανερόν δὲ ὅτι
 αἱ $NH, H\Lambda$ τὴν
 EZ περιέχουσιν. ἡ δὲ $\Gamma A \Theta$ τέμνει τὴν $\Gamma A \Xi$ κα-
 τὰ δύο καὶ Γ, A . ἐκβεβλήθωσαν ἄρα ἐφ' ἐκάστην ἐ-
 συμπεσεῖται τῇ $\Delta B O$ ἀντικείμενῃ, ἀλλ' ἔσται μετα-
 ξυ τῶν $B O$ καὶ τῆς $H \Lambda$ εὐθείας. ὁμοίως δὲ καὶ ἡ $\Delta B \Theta$
 ἐκβεβλήθωσαν τῇ $\Gamma A \Xi$ τμήῳ ἐ συμπεσεῖται, ἀλλ' ἔσται
 μεταξυ τῶν $A \Xi, H N$. ἐπεὶ ἔναι αἱ $\Pi \Theta, \Theta P$, μὴ συμ-
 βάλλουσαι τὰ A, B τμήων, περιέχουσιν τὰς $NH, H \Lambda$
 ἀσυμπίπτους, καὶ πολλῷ μᾶλλον τὴν EZ περιέχουσιν. ἡ
 EZ ἄρα οὐδεμίαν τῶν ἀντικείμενων συμπεσεῖται.



Ἀλλως.

Sint oppositæ sectiones A, B , & hyperbola $\Gamma A B \Delta$ utramque ipsarum in punctis Γ, A, B, Δ secet, & fit sectio ipsi opposita EZ : dico EZ nulli oppositarum sectionum occurrere. jun-
 ctæ enim $\Delta B, \Gamma A$ producantur, & con-
 veniant inter se in puncto Θ : erit igitur [per 25. 2. huj.] Θ inter asymptotos sectionis $\Gamma A B \Delta$. sint sectionis $\Gamma A B \Delta$ as-
 ymptoti $KH \Lambda$, MHN : perspicuum est igitur rectas NH , $H \Lambda$ sectionem EZ continere. $\Gamma A \Theta$ au-
 tem sectionem $\Gamma A \Xi$ in duobus punctis Γ, A secat: ergo [per 33. 2. huj.] producta ex utraque parte non occurrerit oppositæ sectioni $\Delta B O$, sed erit inter $B O$ & rectam $H \Lambda$. similiter & $\Delta B \Theta$ pro-
 ducta sectioni $\Gamma A \Xi$ non occurrerit, sed erit inter $A \Xi$ & $H N$. quoniam igitur $\Pi \Theta, \Theta P$, non oc-
 currentes sectionibus A, B , continent asymptotos $NH, H \Lambda$, & multo magis sectionem EZ ; se-
 quitur EZ nulli oppositarum sectionum occurrere.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ μβ'.


Εἰ ὑπερβολὴ μία τῶν ἀντικείμενων κατὰ τὰς ἑκατέρω-
 τμήων σημείων ἡ ἀντικείμενὴ αὐτῇ ἐ συμπε-
 σεῖται τῇ ἑτέρᾳ τῶν ἀντικείμενων.

PROP. XLII. Theor.

Si hyperbola unam oppositarum sectionum in quatuor punctis secet; quæ ipsi opponitur sectio non occurrerit alteri oppositarum.

Εἰσὼσαν ἀντικείμε-
 ναὶ αἱ $AB \Gamma \Delta, E$, καὶ π-
 νύτω ὑπερβολὴ τὴν $AB \Gamma \Delta$
 κατὰ τὰς ἑκατέρω σημείων
 τὰς A, B, Γ, Δ , καὶ ἐξω αὐτῇ ἀντικεί-
 μενὴ ἡ K . λέγω ὅτι ἡ K ἐ
 συμπεσεῖται τῇ E .

Εἰ γὰρ δυνατόν, συμπίπτω-
 κατὰ τὸ K , καὶ ἐπιζυγώθωσαν
 αἱ $AB, \Gamma \Delta$, καὶ ἐκβεβλήθω-
 σαι συμπεσεῖται δὲ ἀλλή-
 λαις. συμπίπτωσαν κατὰ
 τὸ Λ , καὶ ὅν μὲν ἔχει λόγον
 ἡ $\Lambda \Lambda$ πρὸς ΔB ἔχεται ἡ
 $\Lambda \Pi$ πρὸς ΠB , ὅν δὲ ἡ $\Delta \Lambda$
 πρὸς $\Lambda \Gamma$ ἡ ΔP πρὸς $P \Gamma$. ἡ
 ἄρα $\Delta \Lambda$ τῶν Π, P ἐκβαλλομένη
 συμπεσεῖται ἐκατέρω τῶν τμήων,
 καὶ αἱ ἀπὸ Λ ἐπὶ τὰς ἀσυμπίπτους εὐθείας (ἐπὶ-
 ζυγώθω δὲ ἡ $K \Lambda$, ἐκβεβλήθωσαν τμήων δὲ τὴν



Sint oppositæ sectiones $AB \Gamma \Delta, E$; & hyperbola ipsam $AB \Gamma \Delta$ secet in quatuor punctis A, B, Γ, Δ ; sitque ei opposita sectio K : dico K sectioni E non occurrere.

Si enim fieri potest, occurrat in K : & junctæ $AB, \Delta \Gamma$ producantur: convenient igitur [per 25. 2. huj.] inter se. convenient in Λ ; & quam rationem habet $\Lambda \Lambda$ ad ΔB habeat $\Lambda \Pi$ ad ΠB ; quam vero habet $\Delta \Lambda$ ad $\Lambda \Gamma$ habeat ΔP ad $P \Gamma$: ergo [per 9. 4. huj.] recta, quæ per Π, P producitur, utrique sectioni occurrerit; & quæ ab Λ ad occurfus ducuntur sectionem contingent. jun-
 gatur itaque $K \Lambda$, & producat: secabit igitur
 angulum

angulum $B\Lambda\Gamma$ & sectiones in alio atque alio puncto. secet eas in ZM : ergo [per 39.3. huj. & 16. 5.] propter oppositas sectiones $A\Theta ZH$, K , erit ut NK ad $K\Lambda$ ita NZ ad $Z\Lambda$; & propter sectiones $AB\Gamma\Delta$, B ut NK ad $K\Lambda$ ita erit NM ad $M\Lambda$, quod fieri non potest: igitur sectiones E, K sibi ipsis non occurrunt.

ὑπὸ $B\Lambda\Gamma$ γωνίαν, καὶ τὰς τοιαύτας κατ' ἄλλο καὶ ἄλλο σημεῖον. πινέτω κατὰ τὰ Z, M ἕσται δὴ $\Delta\lambda\theta$ μὲν τὰς $A\Theta ZH$, K ἀντικειμένης, ὡς ἡ NK πρὸς $K\Lambda$ ὥτως ἡ NZ πρὸς $Z\Lambda$, $\Delta\lambda\theta$ ἢ τὰς $AB\Gamma\Delta$, E , ὡς ἡ NK πρὸς $K\Lambda$ ὥτως ἡ NM πρὸς $M\Lambda$, ὅπερ ἀδυνάτων· ἐκ ἧς αἱ E, K συμπίπτουσιν ἀλλήλαις.

PROP. XLIII. Theor.

Si hyperbola alteri oppositarum sectionum in duobus punctis occurrat, concava habens ad easdem partes; alteri vero occurrat in uno puncto: quæ ipsi opponitur sectio nulli oppositarum occurret.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ μγ'.

Εάν ὑπεβολὴ τῇ μὲ ἀντικειμένῃ συμπίπτῃ κατὰ δύο σημεῖα, ὅπῃ τὰ αὐτὰ ἔχουσιν αὐτῇ τὰ κοῖλα, τῇ δὲ κατ' ἓν σημεῖον ἡ ἀντικειμένη αὐτῇ ἐνδότερα τῇ ἀντικειμένῃ συμπίπτειται.

SINT oppositæ sectiones AB, Γ ; & hyperbola $AB\Gamma$ sectioni quidem A in punctis A, B occurrat, sectioni vero Γ occurrat in uno puncto Γ ; sitque ipsi $AB\Gamma$ opposita sectio Δ : dico Δ nulli sectionum AB, Γ occurrere.

ΕΣΤΩΣΑΝ ἀντικείμεναι αἱ AB, Γ , καὶ ὑπεβολὴ ἡ $AB\Gamma$ τῇ μὲν AB συμπίπτει κατὰ τὰ A, B , τῇ δὲ Γ κατ' ἓν τὸ Γ , καὶ ἔστω τῇ $AB\Gamma$ ἀντικειμένη ἡ Δ . λέγω ὅτι ἡ Δ ἐνδότερα τῶν AB, Γ συμπίπτει.

Jungantur enim AB, Γ , & producantur: rectæ igitur AB, Γ [per 33. 2. huj.] sectioni Δ non occurrunt; sed neque occurrunt sectioni Γ præterquam in uno puncto Γ . si enim in alio puncto; oppositæ sectioni AB [per 33. 2. huj.] non occurrunt. positum autem est AB, Γ occurrere sectioni AB : quare sequitur, AB, Γ sectioni Γ in solo puncto Γ occurrere; sectioni vero Δ nullo modo: ergo Δ erit intra angulum $B\Gamma Z$; & propterea sectionibus oppositis AB, Γ minime occurret.



Ἐπεὶ εὐχόμενοι γάρ αἱ AB, Γ , καὶ ἐκτελεσθήσονται· αἱ ἄρα AB, Γ τῇ Δ τμήν ἐ συμπίπτει· ἀλλ' ἐπεὶ τῇ Γ τμήν κατ' ἄλλο σημεῖον ἐ συμπίπτει πλὴν κατὰ τὸ Γ . εἰ γὰρ συμβάλλωσι καὶ κατ' ἕτερον, τῇ AB ἀντικειμένη ἐ συμπίπτει. ὑπόκειται ἢ συμπίπτει αἱ AB, Γ ἄρα ἐνδότερα τῇ μὲν Γ τμήν κατὰ ἓν συμβάλλωσι τὸ Γ , τῇ δὲ Δ τμήν ἐπὶ ὅλως συμβάλλωσι· ἡ Δ ἄρα ἔσται ὑπὸ τῷ γωνίαν τῷ ὑπὸ $E\Gamma Z$ ὡς ἡ Δ τμήν ἐ συμπίπτει τῇ AB, Γ ἀντικειμένης.

PROP. XLIV. Theor.

Si hyperbola uni oppositarum sectionum occurrat in tribus punctis; quæ ipsi opponitur, alteri oppositarum, præterquam in uno puncto, non occurret.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ μδ'.

Εάν ὑπεβολὴ μιᾷ τῇ ἀντικειμένῃ κατὰ τρία σημεῖα συμβάλλῃ ἡ ἀντικειμένη αὐτῇ τῇ ἐτέρᾳ τῇ ἀντικειμένῃ ἐ συμπίπτει πλὴν κατὰ ἓν.

SINT oppositæ sectiones $AB\Gamma, \Delta EZ$; & hyperbola $AB\Gamma$ occurrat sectioni $AB\Gamma$ in tribus punctis A, B, Γ ; sit autem sectioni $AB\Gamma$ opposita sectio ΔEZ : dico sectionem ΔEZ præterquam in uno puncto.

ΕΣΤΩΣΑΝ ἀντικείμεναι αἱ $AB\Gamma, \Delta EZ$, καὶ ὑπεβολὴ ἡ $AB\Gamma$ συμβάλλει τῇ $AB\Gamma$ κατὰ τρία σημεῖα τὰ A, B, Γ , ἔστω δὲ τῇ $AB\Gamma$ ἀντικειμένη ἡ ΔEZ . λέγω ὅτι ἡ ΔEZ τῇ ΔEZ ἐ συμβάλλει κατὰ πλείονα ἢ ἓν.

Si enim fieri potest, in punctis Δ, E occurrat: & jungantur $AB, \Delta E$; quæ vel parallelæ erunt inter se, vel non.


Εἰ γὰρ δυνατὸν, συμβάλλει κατὰ τὰ Δ, E · ἔστω δὲ ΔEZ αἱ $AB, \Delta E$ ἢτοι ὁμοῦ καὶ ἑῶν, ἢ ἕκ.

Sint primum parallelæ; secanturque $AB, \Delta E$ bifariam in punctis H, Θ , & jungatur $H\Theta$: est igitur [per 36. 2. huj.] $H\Theta$ diameter omnium se-

Ἐσώσων ὡς ἄλλοι, καὶ περὶ τῶν αἱ $AB, \Delta E$ διχα κατὰ τὰ H, Θ , καὶ ἐπεὶ εὐχόμενοι ἡ $H\Theta$. $\Delta\lambda\theta$ μὲν τῇ ΔEZ αἱ $AB, \Delta E$ ἐπὶ πᾶσι τῶν τμήνων, καὶ

καὶ παραγόμεναι ἐπ' αὐτὴν κατηγόμεναι αἱ $AB, \Delta E$.
 ἡλθὼν δὲ διὰ τοῦ Γ ὡς πρὸς τὴν AB ἢ ΓNO · ἔσται
 δὴ ἐκ αὐτῆς παραγόμεναι δὴ τὴν διάμετρον κατη-
 γόμεναι, (συμπιπείτω) τῇ $παραγόμεναι κατ' ἄλλο ἐκ ἄλλο.$
 οἱ γὰρ κατὰ τὸ αὐτὸ, ἐκείνη κατὰ τρία συμβάλλουσιν,
 ἀλλὰ πέντε· ἔσται δὲ ἐν μὲν τῇ AMB τμήμα ἴση ἢ
 ΓN τῇ NZ , ἐν δὲ τῇ LAB ἢ ΓN τῇ NO · καὶ ἢ
 ON ἄρα τῇ NZ ἴση, ὅπερ ἀδυνάτων.

tionum, atque ad eam applicantur ordinatim
 $AB, \Delta E$. ducatur à puncto Γ recta ΓNO \parallel pa-
 rallela AB : erit igitur & ipsa ad diametrum
 ordinatim applicata; & sectionibus in alio at-
 que alio puncto occurret. si enim in eodem
 puncto, non occurrerent sectiones sibi ipsis in
 tribus punctis, sed in quatuor: ergo in sectione
 AMB erit ΓN ipsi NZ æqualis, & in LAB se-
 ctione ΓN æqualis ipsi NO ; quare ON est æ-
 qualis ipsi NZ , quod fieri non potest.



Μὴ ἔσονται δὲ ὁμοειδῆ αἱ $AB, \Delta E$, ἀλλ' ἐκ-
 βαλλόμεναι συμπιπείτωσαν κατὰ τὸ Π , καὶ ἢ ΓO
 ἡλθὼν ὡς πρὸς τὴν AB , καὶ συμπιπείτω τῇ $\Delta \Pi$ ἐκ-
 βαλλέσθαι κατὰ τὸ P , καὶ περὶ τὴν αἱ $AB, \Delta E$ δι-
 χα κατὰ τὰ H, Θ , καὶ διὰ τοῦ H, Θ διὰ μέτρον ἡλθὼ-
 σαν αἱ $HN, \Sigma I, \Theta \Lambda, M \Sigma$, διὰ τοῦ Γ τῇ N, I, Λ, M
 ἐφαπτόμεναι τῇ $παραγόμεναι$ αἱ TI, NT, MT, AT . ἔσται
 δὴ αἱ μὲν TI, NT ὡς πρὸς τὴν $\Delta \Pi$, αἱ δὲ AT, MT
 ὡς πρὸς τὴν AB, OP . καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς τὸ διὰ τοῦ MT
 πρὸς τὸ διὰ τοῦ TI ὅπως τὸ ὑπὸ APB πρὸς τὸ
 ὑπὸ ΔPE , καὶ ὡς τὸ διὰ τοῦ AT πρὸς τὸ διὰ τοῦ
 TN ὅπως τὸ ὑπὸ APB πρὸς τὸ ὑπὸ ΔPE .
 ὡς ἄρα τὸ διὰ τοῦ MT πρὸς τὸ διὰ τοῦ TI ὅπως τὸ
 διὰ τοῦ AT πρὸς τὸ διὰ τοῦ TN . διὰ τοῦ αὐτοῦ ἔσται,
 ὡς μὲν τὸ διὰ τοῦ MT πρὸς τὸ διὰ τοῦ TI ὅπως τὸ
 ὑπὸ EPF πρὸς τὸ ὑπὸ ΔPE , ὡς δὲ τὸ διὰ τοῦ
 AT πρὸς τὸ διὰ τοῦ TN ὅπως τὸ ὑπὸ OPF πρὸς
 τὸ ὑπὸ ΔPE . ἴσων ἄρα τὸ ὑπὸ OPF τῷ ὑπὸ
 EPF , ὅπερ ἀδυνάτων.

Sed non sint parallelæ $AB, \Delta E$; producantur-
 que & conveniant in Π , & ducatur ΓO ipsi AP
 parallela, quæ cum $\Delta \Pi$ producta conveniat in P .
 secantur autem $AB, \Delta E$ bifariam in H, Θ ; & per
 H, Θ ducantur diametri $HN, \Sigma I$; $\Theta \Lambda, M \Sigma$; & in
 punctis N, I, Λ, M rectæ TI, NT, MT, AT sectio-
 nes contingant: erunt igitur [per 5. 2. huj.] TI ,
 NT parallelæ ipsi $\Delta \Pi$; & AT, MT ipsis AP, OP
 parallelæ. & quoniam ut quadratum ex MT ad
 quadratum ex TI ita [per 19. 3. huj.] rectangulum
 APB ad rectangulum ΔPE , ac (per eandem) ut
 quadratum ex AT ad quadratum ex TN ita re-
 ctangulum APB ad rectangulum ΔPE : ut igitur
 quadratum ex MT ad quadratum ex TI ita qua-
 dratum ex AT ad quadratum ex TN . eadem ra-
 tione ut quadratum ex MT ad quadratum ex TI
 ita erit rectangulum EPF ad rectangulum ΔPE ,
 & ut quadratum ex AT ad quadratum ex TN
 ita OPF rectangulum ad rectangulum ΔPE : er-
 go rectangulum OPF rectangulo EPF est æquale,
 quod impossibile est*.

* Hanc propositionem fide depravatam integritati suæ restituimus.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ με'.

Εὰν ὑπερβολὴ καὶ ἢ ἐκείνη τῇ ἀντικειμένη, τὴν
 δι' ἑκτὰ δύο σημεία τμήσῃ ἢ ἀντικειμένη αὐτῇ
 τῇ ἀντικειμένη ἐδμήσῃ συμπιπείτω.

Εἰς τὸ $\Omega \Sigma \Lambda N$ ἀντικείμεναι αἱ AB, Δ , καὶ ὑπερ-
 βολὴ πρὸς ἢ AB, Δ τὴν μὲν AB τμήσῃ κα-

PROP. XLV. Theor.

Si hyperbola unam oppositarum sectio-
 num contingat, alteram vero secet in
 duobus punctis; quæ ipsi opponitur
 sectio nulli oppositarum occurret.

Sint oppositæ sectiones AB, Δ ; & hyper-
 bola AB, Δ sectionem quidem AB in pun-
 ctis
 P P P

ΕΗ πρὸς ΗΖ, ὅτι ἀδιώαται· ἐκ αὐτοῦ ἡ ἀντικειμένη συμπίπτει τῇ ἀντικειμένη.

EH ad HZ, quod fieri non potest*: opposita igitur sectio alteri oppositarum non occurret.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ μζ'.

Εάν ὑπερβολὴ μίας τῆς ἀντικειμένων ἐφαπτομένη καὶ ἑτέρα αὐτῇ σημῶσι συμπίπτῃ ἡ ἀντικειμένη αὐτῇ τῇ ἐτέρᾳ τῆς ἀντικειμένων ὅς συμπίπτειται καὶ πλείονα σημῶσι ἢ ἓν.

ΕΣΤΩΣΑΝ ἀντικείμεναι αἱ ΑΒΓ, ΕΖΗ, καὶ ὑπερβολὴ τις ἡ ΔΑΓ ἐφαπτομένη μὲν κατὰ τὸ Α, πινέτω δὲ κατὰ τὸ Γ, καὶ ἔστω τῇ ΔΑΓ ἀντικείμενη ἡ ΕΖΘ· λέγω ὅτι ὅς συμπίπτειται τῇ ἐτέρᾳ ἀντικειμένη κατὰ πλείονα σημῶσι ἢ ἓν.



Εἰ γὰρ διωκτὸν, συμβαλλέτω κατὰ δύο, τὰ Ε, Ζ, καὶ ἐπιζεύχθω ἡ ΕΖ, ἢ διὰ τῆς Α ἐφαπτομένη τῶν τομῶν ἡχθῶ ἡ ΑΚ· ἢτοι δὲ ὁμοτέλειοι εἴσιν, ἢ ὅ· ἔσονται πρὸς πρὸς ὁμοτέλειοι, καὶ ἡχθῶ ἡ διχοτομοῦσαι διμέτρος τῶν ΕΖ. ἢ ἔσται αὖτε διὰ τῆς Α, καὶ ἔσται διμέτρος τῶν δύο συζυγῶν. ἡχθῶ δὲ διὰ τῆς Γ ὁμοτέλειος ΑΚ, ΕΖ ἡ ΓΑΔΒ· πρὸς αὖτε τὰς τομὰς κατ' ἄλλο ἢ ἄλλο σημῶσι· ἔσται δὲ ἐν μὲν τῇ ἐτέρᾳ ἡ ΓΑ τῇ ΑΔ, ἐν δὲ τῇ λοιπῇ ἡ ΓΑ τῇ ΑΒ. τὸτο δὲ ἀδιώαται.

PROP. XLVII. Theor.

Si hyperbola unam oppositarum sectionum contingens in alio puncto secet; quæ ipsi opponitur sectio alteri oppositarum non occurret præterquam in uno puncto.

SINT oppositæ sectiones ABΓ, EZH; & hyperbola quædam ΔΑΓ contingat ABΓ in Α, & in Γ secet; opponaturque ipsi ΔΑΓ sectio EZΘ: dico eam alteri oppositarum non occurrere præterquam in uno puncto.

Si enim fieri potest, occurrat in duobus punctis E, Z: jungaturque EZ, & per Α ducatur sectiones contingens AK: vel igitur AK, EZ parallelæ sunt inter se, vel non. sint primum parallelæ, & ducatur diameter bifariam secans ipsam BZ: quæ [per 34. 2. huj.] per Α igitur transibit; atque erit diameter duarum conjugarum. ducatur etiam per Γ recta ΓΑΔΒ parallelā ipsis AK, BZ: secabit igitur ea sectiones in alio atque alio puncto: & in altera quidem erit ΓΑ æqualis ipsi ΑΔ, in altera vero ΓΑ æqualis ipsi ΑΒ. hoc vero fieri non potest.



Μὴ ἔσονται δὲ ὁμοτέλειοι αἱ ΑΚ, ΕΖ, ἀλλὰ συμπίπτουσιν κατὰ τὸ Κ, καὶ ἡ ΓΑ ὁμοτέλειος ΑΚ ἡγμένη συμπίπτει τῇ ΕΖ κατὰ τὸ Ν, αἱ δὲ διμέτροι διχοτομοῦσαι τῇ ΕΖ κατὰ τὸ Μ πινέτωσαν τὰς τομὰς κατὰ τὰ Ε, Ο, ὅς ἐφαπτομένη ἡχθῶσαν τῶν τομῶν διὰ τῆς Ζ, Ο αἱ ΕΠ, ΟΡ ἔσονται αὖτε ὡς τὸ διὰ ΑΠ πρὸς τὸ διὰ ΠΕ ὅτις τὸ διὰ ΑΡ πρὸς τὸ διὰ ΡΟ, καὶ διὰ τὸτο ὡς τὸ διὰ ΔΝΓ

At non sint parallelæ AK, EZ, sed convēniant in K; recta vero ΓΑ ipsi AK parallelā ducta convēniant cum EZ in N; & diametri bifariam dividentes BZ in puncto M sectiones in punctis E, O secant; atque à E, O ducantur EP, OP sectiones contingentes: erit igitur [ut in 44. 4. huj.] quadratum ex ΑΠ ad quadratum ex ΠΕ sicut quadratum ex ΑΡ ad quadratum ex ΡΟ; & propterea [per 19. 3. huj.] ut rectangulum

* Est enim, [per 11. 5.] EH ad HZ ut EK ad KZ. & ideo, [per 14. 5.] quando EH major est quam EK, erit HZ major quam KZ. quod fieri non potest.

ΔΝΓ

$\Delta N\Gamma$ ad rectangulum ENZ ita rectangulum $BN\Gamma$ ad rectangulum BNZ : ergo [per 9. 5.] rectangulum $\Delta N\Gamma$ rectangulo $BN\Gamma$ est æquale, quod fieri non potest.

πρὸς τὸ ὑπὸ ENZ ὅτως τὸ ὑπὸ $BN\Gamma$ πρὸς τὸ ὑπὸ BNZ : ἴσιν ἄρα τὸ ὑπὸ $\Delta N\Gamma$ τῷ ὑπὸ $BN\Gamma$, ὅπερ ἀδύνατον.

PROP. XLVIII. Theor.

Si hyperbola unam oppositarum sectionum in uno puncto contingat; quæ ipsi opponitur sectio alteri oppositarum non occurret ad plura puncta quam duo.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ μή.

Εὰν ὑπερβολὴ μιᾶς τῆς ἀντικειμένης καὶ ἡ ἀντικειμένη αὐτῇ τῇ ἐπὶ τῇ ἀντικειμένης ὑ συμπίπτῃ κατὰ πλείονα σημεῖα ἢ δύο.

SINT oppositæ sectiones AB , $E\Delta H$; & hyperbola AG sectionem AB in puncto A contingat; sitque ipsi AG opposita sectio ΔEZ : dico ΔEZ non occurrere sectioni ΔBH ad plura puncta quam duo.

ΕΣΤΩΣΑΝ ἀντικείμεναι αἱ AB , $E\Delta H$, καὶ ὑπερβολὴ ἡ AG τῇ AB ἐφαπτόμενη κατὰ τὸ A , καὶ ἔστω τῆς AG ἀντικείμενη ἡ ΔEZ : λέγω ὅτι ἡ ΔEZ τῇ ΔEH ὑ συμπίπτῃ κατὰ πλείονα σημεῖα ἢ δύο.


Si enim fieri potest, occurrat ad puncta tria Δ , E , Θ ; & ducatur recta AK sectiones AB , AG contingens: juncta vero ΔE producat. & sint primum AK , ΔE inter se parallelæ; seceturque ΔE bifariam in Λ , & jungatur AA : erit igitur [per 34. 2. huj.] AA diameter duarum conjugatarum, quæ sectiones inter puncta Δ , E secabit in M , N ; propter ΔAE in puncto A bifariam sectam. ducatur per Θ recta ΘZH parallela ΔE : erit igitur in altera sectione ΘZ æqualis ipsi πZ , in altera vero $\Theta \pi$ ipsi πH æqualis; quare πZ ipsi πH est æqualis, quod fieri non potest.



Εἰ γὰρ δυνατὸν, συμβαλλέτω κατὰ τρία τὰ Δ , E , Θ , καὶ ἴστω τῶν AB , AG ἐφαπτομένη ἡ AK , καὶ ὁπλὺσθῃ ἡ ΔE ὡς ἐπὶ πρὸν ὁρᾶσθαι αἱ AK , ΔE , καὶ περὶ τὸ ΔE διχα κατὰ τὸ Λ , ἐπιζεύξθω ἡ AA : ἔστω δὲ διάμετρος ἡ AA τῇ δύο συζυγίᾳ, καὶ πρὸς τὰς τομὰς

μεταξὺ τῶν Δ , E , κατὰ τὰ M , N , ἐπὶ ἡ ΔAE διχα πέτμῃ κατὰ τὸ Λ . ἤχθω δὲ τῇ Θ ὁρᾶσθαι τὴν ΔE ἡ ΘZH : ἔστω δὲ ἐν μὲν τῇ ἐπὶ τῇ τομῇ ἴση ἡ ΘZ τῇ πZ , ἐν δὲ ἐπὶ τῇ $\Theta \pi$ τῇ πH : ὥς ἐστι ἡ πZ τῇ πH ἴση, ὅπερ ἀδύνατον.

Sed non sint AK , ΔE parallelæ, convenientque in K , & reliqua eadem fiant: producta vero AK occurrat ipsi $Z\Theta$ in P . similiter ac in iis quæ jam dicta sunt, demonstrabimus, ut rectangulum ΔKE ad quadratum ex PA in sectione $Z\Delta E$; & in sectione $H\Delta E$ ita rectangulum $HP\Theta$ ad quadratum ex PA : rectangulum igitur $HP\Theta$ æquale est rectangulo $ZP\Theta$, quod fieri non potest: ergo $E\Delta Z$ ipsi $E\Delta H$ ad plura puncta quam duo non occurret.



Μὴ ἔστωσαν δὲ αἱ AK , ΔE ὁρᾶσθαι, ἀλλὰ συμπτέτωσαν κατὰ τὸ K , καὶ τὰ λοιπὰ τὰ αὐτὰ γοησάτω, ἐκ δὲ λαβῆσαι ἡ AK συμπτέτω τῇ $Z\Theta$ κατὰ τὸ P . ὁμοίως δὲ δείξωμεν τοῖς πρὶν, ἐπὶ ἴσιν ὡς τὸ ὑπὸ ΔKE πρὸς τὸ δὲ PA , ἐν μὲν τῇ $Z\Delta E$ τομῇ, ὅτως τὸ ὑπὸ $ZP\Theta$ πρὸς τὸ δὲ


PA , ἐν δὲ τῇ $H\Delta E$, ὅτως τὸ δὲ $HP\Theta$ πρὸς τὸ δὲ PA : τὸ ἄρα ὑπὸ $HP\Theta$ ἴσιν τῷ ὑπὸ $ZP\Theta$, ὅπερ ἀδύνατον: ἐκ ἄρα ἡ $E\Delta Z$ τῇ $E\Delta H$ κατὰ πλείονα σημεῖα συμβαλλεῖ ἢ δύο.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Μ΄.

Εάν υπερβολὴ κατέρας τ' ἀντικειμένη ἐφάπτηται
ἢ ἀντικειμένη αὐτῇ τ' ἀντικειμένη ἐδιδίμει
συμπίπτειται.

ΕΣΤΩΣΑΝ ἀντικείμεναι αἱ $\Lambda\Delta$, BH , ἡ υπερβολὴ
ἢ AB κατέρας αὐτῶν ἐφάπτεται κατὰ τὰ
 A , B . ἀντικειμένη ᾗ αὐτῇ ἔστω ἡ E . λέγω ὅτι ἡ
 E ἐδιδίμει τὰ $\Lambda\Delta$, BH συμπίπτειται.

Εἰ γὰρ δυνατὸν,
συμπίπτειται τῇ $\Lambda\Delta$
κατὰ τὸ Δ , καὶ ἔχθω-
σαν δὲ τὸ Γ , B ἐφ-
απτόμεναι τῶν
συμπίπτειται δὴ ἀλ-
λῆλαις ἐν τῇ Γ ἀ-
συμπίπτειται τ' AB
τομῆς. συμπίπτει-
ται κατὰ τὸ Γ , καὶ
ἐπ' αὐτῇ ἡ $\Gamma\Delta$.
ἢ ἄρα $\Gamma\Delta$ ἐκβλη-
θῆσιν ἐν τῷ μεταξὺ
τῶν $\Lambda\Gamma$,
 ΓB . ἀλλὰ καὶ μεταξὺ τῶν $B\Gamma$, ΓZ , ὅπου ἄπτονται ἐν
ἄρα ἡ E συμπίπτειται τὰ $\Lambda\Delta$, BH .



PROP. XLIX. Theor.

Si hyperbola contingat utramque oppo-
sitarum sectionum; quæ ipsi opponi-
tur sectio, neutri oppositarum occurret.

SINT oppositæ sectiones $\Lambda\Delta$, BH , & hyperbola
 AB utramque ipsarum in punctis A , B con-
tingat; opponaturque ei sectio E : dico quod
 E neutri sectionum $\Lambda\Delta$, BH occurret.

Si enim fieri po-
test, occurrat se-
ctioni $\Lambda\Delta$ in Δ ; &
à punctis A , B du-
cantur rectæ con-
tingentes sectio-
nes, quæ quidem
[per 36.1. huj.] in-
tra asymptotos se-
ctionis AB conve-
niant. conveniant
in Γ , & jungatur
 $\Gamma\Delta$: ergo [ob se-
ctionem ΔE] recta
 $\Gamma\Delta$ producta cadet
in loco intermediis

inter $\Lambda\Gamma$, ΓB . sed [propter sectionem $\Lambda\Delta$] cadet ea-
dem inter $B\Gamma$, ΓZ , quod fieri non potest: igitur se-
ctio E sectionibus oppositis $\Lambda\Delta$, BH non occurret.

EUTOCIUS.

λέγω ὅτι ἡ E ἐδιδίμει τὰ $\Lambda\Delta$, BH συμπίπτειται.]
Ἐχθῶσαν δὲ τὰ A , B ἐφάπτεσθαι τῶν
ἀλλῆλαις κατὰ τὸ Γ , ἐν τῇ Γ ἀσυσπύπτειται τ' AB
τομῆς. φανερὸν δὲ ὅτι αἱ $\Lambda\Gamma$, ΓB ἐκβληθῆσιν ἐν
τῇ Γ ἀσυσπύπτειται τ' E τομῆς, ἀλλὰ ἀσυσπύπτειται
ἐν τῷ μεταξὺ τῶν $\Lambda\Gamma$,
 ΓB . ἀλλὰ καὶ μεταξὺ τῶν $B\Gamma$, ΓZ , ὅπου ἄπτονται ἐν
ἄρα ἡ E συμπίπτειται τὰ $\Lambda\Delta$, BH τομῆς συμπίπτειται.


• Dico E neutri sectionum $\Lambda\Delta$, BH occurrere.]
Ducantur enim à punctis A , B rectæ contingentes se-
ctiones, atque conveniant inter se in puncto Γ , intra
angulum [per 25.2. huj.] sectionem AB continentem:
itaque constat rectas $\Lambda\Gamma$, ΓB productas asymptotos se-
ctionis E non occurrere, sed ipsas continere & intra
magis sectionem E . & quoniam $\Lambda\Gamma$ sectionem $\Lambda\Delta$
contingit, [per 33.2. huj.] non occurret ipsi BH . simi-
liter ostendemus rectam $B\Gamma$ sectioni $\Lambda\Delta$ non occur-
rere: ergo sectio E neutri ipsarum sectionum $\Lambda\Delta$, BH
occurret.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Ι΄.

Εάν ἑκατέρω τ' ἀντικειμένη ἑκατέρω τ' ἀντικει-
μένη καὶ ἐν ἐφάπτηται, ὅτι καὶ αὐτὰ καὶ κα-
λὰ ἔχουσι: ἢ συμπίπτειται καὶ ἐπὶ σημείοι.

ΕΦΑΠΤΕΣΘΩΣΑΝ καὶ
ἀλλήλων ἀντικείμεναι
κατὰ τὰ A , Δ σημεία. λέγω
ὅτι καὶ ἐπὶ σημείοι ἐν συμ-
πίπτειται.

Εἰ γὰρ δυνατὸν, συνεκβλη-
θῶσιν κατὰ τὸ E . ἐπὶ δὲ ἡ ὑ-
περβολὴ, μιᾶς τ' ἀντικειμένη
ἐφάπτεται κατὰ τὸ Δ , συμ-
πίπτειται κατὰ τὸ A . ἢ ἄρα
 ΛE τῇ $\Lambda\Gamma$ ἐκβληθῆσιν κα-
τὰ τὸ αὐτὸν σημεῖον ἢ ἐν ἑχθῶ-



PROP. L. Theor.


Si utraque oppositarum sectionum op-
positarum utramque in uno puncto
contingat, ad eandem partes concavæ
habens; in alio puncto non occurret.

CONTINGANT enim sese
oppositæ sectiones in
punctis A , Δ : dico eas in
alio puncto sibi ipsæ non oc-
currere.

Si enim fieri potest, oc-
currant in E . & quoniam
hyperbola unam opposita-
rum sectionum in Δ contin-
gens eandem secas in B :
sectio ΛB [per 47.4. huj.]
ipsi $\Lambda\Gamma$ præterquam in uno
puncto non occurret. du-
cantur

Q 9 9

cantur à punctis A, Δ rectæ
AΘ, ΘΔ, quæ sectiones
contingant; junctæque AΔ,
per E ducatur EBF ipsi AΔ
parallela; & per Θ ducatur
oppositarum sectionum
secunda diameter ΘΚΛ,
quæ [per 39. 2. huj.] secabit
AΔ bifariam in K: ergo [ex
natura 2^æ diam.] utraque
EB, EF in puncto A bifa-
riam secabitur; & propterea
BΛ æqualis erit ipsi AΓ, quod
fieri non potest: igitur in alio
puncto sibi ipsis non occurrunt.



συν ἀπὸ τῆς Α, Δ τῆς τοῦ ὀψοῦ
ἐκείνου αἱ ΑΘ, ΘΔ, καὶ ἐπι-
ζεύξωμεν ἡ ΑΔ, καὶ διὰ τῆς Ε
παράλληλῃ ΑΔ ἤχθω ἡ ΕΒΓ,
καὶ διὰ τῆς Θ δεύτερῃ διὰ μέ-
τρος ἤχθω τῇ ἀντιμετρῇ ἡ
ΘΚΛ· πρὸς δὲ τῇ ΑΔ δι-
χα κατὰ τὸ Κ· καὶ ἐκαστὴν ἀρὰ
τῇ ΕΒ, ΕΓ διχα τέτμηται κατὰ
τὸ Α· ἴση ἀρὰ ἡ ΒΛ τῇ ΑΓ,
ὅπερ ἀδυνάτου· ἐκ ἀρα συμ-
πίπτει κατ' ἄλλο σημεῖον.

PROP. LI. Theor.


Si hyperbola unam oppositarum sectionum contingat in duobus punctis; quæ ipsi opponitur sectio, alteri oppositarum non occurrit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κα'.

Εὰν ὑπερβολὴ μίας τῆς ἀντικείμενης ἔχῃ δύο σημεῖα ἐφάπτη· ἡ ἀντικείμενη αὐτῇ τῇ ἐτέρᾳ τῶν ἀντικείμενων ἔσ' συμπίπτουσα.

SINT oppositæ sectiones AΔB, B; & hyperbola AΓ sectionem AΔB in duobus punctis A, B contingat; opponaturque ipsi AΓ sectio Z: dico Z ipsi B non occurrere.

Si enim fieri potest, occurrat in B; & à punctis A, B ducantur contingentes sectiones AH, HB; junganturque AB, EH & producaturs EH: secabit igitur sectiones in alio atque alio puncto. sit autem ea EHΓΔΘ. itaque quoniam AH, HB sectiones contingunt, & AB conjungit tactus; erit [per 37. 3. huj.] in altera quidem conjugatione ut ΘB ad BH ita ΘΔ ad ΔH; in altera vero [ut ΘB ad EH] ita ΘΓ ad ΓH; quod fieri non potest: igitur sectio Z sectioni B non occurrit.



ΕΣΤΩΕΑΝ ἀντικείμεναι αἱ ΑΔΒ, Β, καὶ ὑπερβολὴ ἡ ΑΓ τῇ ΑΔΒ ἐφάπτεσθαι κατὰ δύο σημεῖα Α, Β, καὶ ἕως ἀντικείμενῃ τῇ ΑΓ ἡ Ζ· λέγω ὅτι ἡ Ζ τῇ Β ἔσ' συμπίπτουσα.

Εἰ γὰρ δυνατὸν, συμπίπτει κατὰ τὸ Β, καὶ ἤχθωσαν διὰ τῶν Α, Β ἐφαπτόμεναι τῇ τοῦ ὀψοῦ αἱ ΑΗ, ΗΒ, καὶ ἐπιζεύξωμεν αἱ ΑΒ, ΕΗ, καὶ ἐκτελέσθω ἡ ΕΗ· πρὸς δὲ κατ' ἄλλο ἔσ' ἄλλο σημεῖον τὰς τομὰς. ἕως δὲ αὖς ἡ ΕΗΓΔΘ. ἐπεὶ γὰρ ἐφάπτηται αἱ ΑΗ, ΗΒ καὶ ἡ ΑΒ τὰς ἐφ' ἑαυτὰς ἐπιζεύξωμεν, ἴση ἐν μὲν τῇ ἐτέρᾳ σύζυγι αὖς ἡ ΘΒ πρὸς ΕΗ ὥτως ἡ ΘΔ πρὸς ΔΗ, ἐν δὲ τῇ ἐτέρᾳ ὥτως ἡ ΘΓ πρὸς ΓΗ, ὅπερ ἀδυνάτου· ἐκ ἀρα ἡ Ζ τῇ Β συμπίπτει.

PROP. LII. Theor.


Si hyperbola unam oppositarum sectionum contingat, convexa habens è regione sita; quæ ipsi opponitur sectio alteri oppositarum non occurrit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ λβ'.

Εὰν ὑπερβολὴ μίας τῶν ἀντικείμενων ἐπιφανῇ, ἀντικείμενα τὰ κυρτὰ ἔχουσα· ἡ ἀντικείμενη αὐτῇ τῇ ἐτέρᾳ τῶν ἀντικείμενων ἔσ' συμπίπτουσα.

SINT oppositæ sectiones AΔ, B; & hyperbola quædam AH sectionem AΔ in puncto A contingat; ipsi autem AH opponatur Z: dico Z sectioni B non occurrere.

Ducatur enim à puncto A recta AΓ sectionem contingens: ergo [per 33. 2. huj.] AΓ, ob sectionem AH, se-



ΕΣΤΩΕΑΝ ἀντικείμεναι ΑΔ, Β, καὶ τῇ ΑΔ τομῇ ἐφάπτεσθαι ὑπερβολὴ τις ἡ ΑΗ κατὰ τὸ Α, ἀντικείμενῃ δὲ τῇ ΑΗ ἕως ἡ Ζ· λέγω ὅτι ἡ Ζ τῇ Β ἔσ' συμπίπτουσα.

Ἤχθω διὰ τῆς Α ἐφαπτόμενη τῇ τοῦ ὀψοῦ ἡ ΑΓ· ἡ ἀρὰ ΑΓ, διὰ μὲν τῇ ΑΗ τομῇ, ἔσ' συμπίπτουσα.

την τῇ Z, διὰ δὲ τῇ A Δ, τμήμα, ὃ συμπίπτει τῇ B·
ὥστε ἡ A Γ μεταξύ πειστέται τῇ B, Z τμήμα· καὶ φανερόν
ὅτι ἡ B τῇ Z ὃ συμπίπτει.

sectioni Z non occurret; & ob A Δ sectionem,
non occurret sectioni B: quare A Γ inter B, Z se-
ctiones cadat necesse est: & idcirco sectionem
B sectioni Z non occurrere manifesto constat.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ηγ.


Ἀντικείμεναι ἀντικείμεναι ὡς τινὲς κατὰ πλείονα
σημεῖα ἢ τέσσαρα.

PROP. LIII. Theor.

Oppositæ sectiones oppositas non secant
in pluribus punctis quam quatuor.

ΕΣΤΩΣΑΝ ὅδ ἀντικείμεναι αἱ A B, Γ Δ, καὶ
ἑτέρα ἀντικείμεναι αἱ A B Γ Δ, E Z, καὶ τμήμα-
τω πειστέται ἡ A B Γ Δ τμήμα ἑκάστην τῇ A B, Γ Δ
κατὰ πλείονα σημεῖα πᾶσι A, B, Γ, Δ, ἀντιστραμμένα
πᾶσι κυρτὰ ἔχουσι, ὥς ὅτι τῇ πρώτης καταγραφῆς
ἡ ἄρα τῇ A B Γ Δ τμήμα ἀντικείμεναι ἡ E Z ὡς δὲ
τῇ ἀντικείμεναι τῇ A B, Γ Δ ὃ συμπίπτει.

SINT oppositæ sectiones A B, Γ Δ, & aliæ op-
positæ A B Γ Δ, E Z; & secet primo A B Γ Δ
sectio ipsas A B, Γ Δ in quatuor punctis A, B,
Γ, Δ, convexa habens è regione sita, at in
prima figura apparet: ergo [per 41. 4. huj.]
quæ sectioni A B Γ Δ opponitur, hoc est sectio
E Z, neutri ipsarum A B, Γ Δ occurret.



Ἀλλὰ δὲ ἡ A B Γ τὴν μὲν A B E τμήμα κατὰ
πᾶσι A, B, τὴν δὲ Γ Δ κατὰ ἓν τῇ Γ, ὥς ἔχει ὅτι τῇ
δευτέρῃ καταγραφῇ· ἡ E Z ἄρα τῇ Γ Δ ὃ συμ-
πίπτει· εἰ δὲ τῇ A B συμβάλλει ἡ E Z, κατὰ ἓν
μόνον συμβάλλει· εἰ ὅδ κατὰ δύο συμβάλλει τῇ
A B, ἡ ἀντικείμεναι αὐτῇ ἡ A B Γ τῇ ἑτέρα ἀντικεί-
μεναι τῇ Γ Δ ὃ συμπίπτει. ὡς δὲ τῇ κατὰ ἓν
τῇ Γ συμβάλλει.

Sed A B Γ sectionem quidem A B E secet in
punctis A, B, ipsam vero Γ Δ in uno puncto Γ, ut
in secunda figura: quare [per 39. 4. huj.] E Z
non occurret sectioni Γ Δ. si autem sectioni
A B occurrat E Z, in uno tantum puncto occur-
rit: nam si occurrat in duobus punctis, sectio
A B Γ quæ [per 41. 1. 4. huj.] ipsi opponitur, non
occurret alteri Γ Δ. atqui in uno puncto Γ oc-
currere supponitur.

Εἰ δὲ, ὥς ἔχει ὅτι τῇ τρίτης καταγραφῇ, ἡ
A B Γ τὴν μὲν A B E τμήμα κατὰ δύο τὰ A, B, τῇ
δὲ A B E συμβάλλει ἡ E Z· τῇ μὲν Δ ὃ συμπίπτει,
τῇ δὲ A B E συμπίπτει καὶ συμπίπτει κατὰ
πλείονα σημεῖα ἢ δύο*.

Quod si sectio A B Γ sectionem A B E in duo-
bus punctis A, B secet, ut in tertia figura; oc-
currat autem E Z sectioni A B B: sectioni quidem
Δ [per 39. 4. huj.] non occurret; atque ipsi A B E
occurrens [per 35. 4. huj.] non occurret ad plurā
puncta quam duo*.


* In figura tertia supponitur parallelismus asymptotōn sectionum A B E & E Z, quo in casu, eoque solo, op-
positæ sectiones oppositis sectionibus ad tria tantum puncta A, B, E occurrere possunt: nam si non parallelæ
sint, sed vel tantillum inclinent versus partes E, Z, habebitur casus primus, occurrente sectione E Z sectioni A B E
in alio puncto ultra E. Si vero in alteras partes sive versus Γ, Δ inclinent asymptoti, conveniet sectio A B Γ
cum sectione Δ, eritque casus secundus. Neque alius modus quo sibi conveniant ad quatuor puncta oppositæ
hyperbolæ, convexa sua sibi invicem obvertentes, excogitari potest. Idem concipe de figuris propositionis
proxime sequentis.

Si vero $AB\Gamma\Delta$ utramque secet in uno puncto, ut in quarta figura; sectio EZ [per 40. 4. huj.] nulli ipsarum in duobus punctis occurret: ergo, propter ea quæ dicta sunt & ipsorum conversa, sectiones oppositæ $AB\Gamma\Delta$, EZ sectionibus BB , ΓZ non occurrent ad plura puncta quam quatuor.

At si sectiones ad easdem partes concava habeant, atque altera alteram in quatuor punctis secet, ut in quinta figura; EZ neutri oppositarum occurret: neque enim EZ occurret ipsi AK hyperbolæ; sic enim hyperbola AK oppositis sectionibus $AB\Gamma\Delta$, EZ occurret [contra 36. 4. huj.] ad plura puncta quam quatuor. sed [per 42. 4. huj.] neque $H\Theta$ occurret ipsi EZ .

Εἰ δὲ, ὡς ἔχει ὅτι τὴν πλάγιαν καταγραφήν, ἡ $AB\Gamma\Delta$ ἐκάτερον τέμνει κατὰ δύο σημεῖα, καὶ ἡ EZ ὑδετέρα συμπίπτει κατὰ δύο σημεῖα· ὥστε, διὰ τὰ εἰρημένα καὶ τὰ ἀντίστροφα αὐτῶν, αἱ $AB\Gamma\Delta$, EZ ἀντικειμένα ἢ BB , ΓZ τμήμας ὑποσυνπίπτουσιν κατὰ πλείονα σημεῖα ἢ τέσσαρα.

Εάν δὲ τμήμα ὅτι τὰ αὐτὰ τὰ κοίλα ἔχουσιν, καὶ ἑτέρα τὴν ἐπὶ τὴν τέμνει κατὰ τέσσαρα τὰ A , B , Γ , Δ , ὡς ὅτι τὴν πέμπτην καταγραφήν, ἡ EZ ἐκάτερον ὑποσυνπίπτει· ὑδὲ μὲν ἡ EZ ὑποσυνπίπτει τῇ AK . ὥστε γὰρ ἔσται ἡ AK ἢ $AB\Gamma\Delta$, EZ ἀντικειμένα συμπίπτουσι κατὰ πλείονα σημεῖα ἢ τέσσαρα. ἀλλ' ὑδὲ ἡ $H\Theta$ τῇ EZ συμπίπτει.



Si autem, ut in sexta figura, sectio $AB\Gamma$ oppositarum alteri occurrat in tribus punctis, EZ [per 44. 4. huj.] alteri in uno tantum puncto occurret. & eodem modo in reliquis dicemus. Quoniam igitur in omni diversitate casuum constat propositum, oppositæ sectiones oppositis sectionibus ad plura puncta quam quatuor non occurrent.

Εἰ γὰρ, ὡς ἔχει ὅτι τὴν ἑκτὴν καταγραφήν, ἡ $AB\Gamma$ τῇ ἐπὶ τὴν τμήμα συμπίπτει κατὰ τρία σημεῖα, ἡ EZ τῇ ἐπὶ τὴν κατὰ ἓν μόνον συμπίπτει. Ἐπὶ τὴν λοιπὴν τὰ αὐτὰ τὰς περὶ τοὺς ἐκείνων εἶναι. ἐπεὶ γὰρ κατὰ πάσης τὰς ἐνδεχόμενας διατάξεις δὴλόν ἐστι τὸ περὶ τὴν ἀντικειμένην ἀντικειμένην ὑποσυνπίπτει κατὰ πλείονα σημεῖα ἢ τέσσαρα.

PROP. LIV. Theor.

Si oppositæ sectiones oppositas in uno puncto contingant; non occurrent sibi ipsis ad alia puncta plura quam duo.

SINT oppositæ sectiones $AB\Gamma\Delta$; aliæ vero $B\Gamma$, EZ ; & sectio $B\Gamma$ contingat AB in puncto B , & convexa habeant ἐ regione sita; occurratque primum $B\Gamma\Delta$ sectio ipsi $\Gamma\Delta$ in duobus punctis Γ , Δ , ut in prima figura. quoniam igitur $B\Gamma\Delta$ in duobus punctis secat, convexa habens ἐ regione sita; sectio EZ [per 39. 4. huj.] ipsi AB non occurret. rursus quoniam $B\Gamma\Delta$ contingit AB in B , convexa habens ἐ regione sita; non occurret [per 52. 4. huj.] EZ sectioni $\Gamma\Delta$; quare EZ neutri sectionum $AB\Gamma\Delta$ occurret: occurrunt igitur sibi ipsis ad duo tantum puncta Γ , Δ .


ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΔ'.

Εάν ἀντικειμένη ἀντικειμένη κατὰ ἓν σημεῖον ὅταν ἴσως, ὑποσυνπίπτουσιν κατὰ ἄλλα σημεῖα πλείονα ἢ δύο.

ΕΣΤΩΣΑΝ ἀντικειμένη αἱ $AB\Gamma\Delta$, ἢ ἐπὶ τὴν αἱ $B\Gamma$, EZ , ἢ ἡ $B\Gamma$ τὴν AB ἐφάπτεται κατὰ τὸ B , ἢ ἔχουσιν ἀντιστραμμένα τὰ κοίλα, καὶ συμπίπτει πρῶτον ἡ $B\Gamma\Delta$ τῇ $\Gamma\Delta$ κατὰ δύο σημεῖα τὰ Γ , Δ , ὡς ὅτι ἔστω πρώτος σχήματος. ἐπεὶ γὰρ ἡ $B\Gamma\Delta$ κατὰ δύο σημεῖα τέμνει, ἀντιστραμμένα ἔχουσιν τὰ κοίλα, ἡ EZ τῇ AB ὑποσυνπίπτει. πάλιν ἐπεὶ ἡ $B\Gamma\Delta$ τὴν AB ἐφάπτεται κατὰ τὸ B , ἀντιστραμμένα ἔχουσιν τὰ κοίλα, ἡ EZ τῇ $\Gamma\Delta$ ὑποσυνπίπτει· ἢ ἄρα EZ ὑδετέρα τῶν $AB\Gamma\Delta$ τμήμα συμπίπτει μόνον ἄρα κατὰ δύο τὰ Γ , Δ συμβάλλουσιν. Ἀλλὰ

Αλλὰ δὲ τὰ Γ Δ ἢ Β Γ πρὸς τὸν καὶ τὸν σημῶν
τὸ Γ, ὡς δὲ τὸ δὲ ἄλλοι σχήματος· ἢ τὰ Ε Ζ τῇ
ρὸν Γ Δ ἢ συμπίπτει, τῇ ὅ Α Β συμπίπτει καὶ
ἐν μέσῳ. εἰ δὲ κατὰ δύο συμβάλλῃ ἢ Ε Ζ τῇ Α Β,
ἢ Β Γ τῇ Γ Δ ἢ συμπίπτει. ὡς δὲ τὸ συμβάλλει
λατὸ καὶ ἐν.

Sed si secet Γ Δ in uno puncto Γ, ut in se-
cunda figura: ergo [per 52. 4. huj.] Ε Ζ sectioni
quidem Γ Δ non occurrat; ipsi vero Α Β occur-
ret in uno puncto tantum. si enim in duobus
punctis occurrat Ε Ζ ipsi Α Β, [per 39. 4. huj.]
non occurrat Β Γ ipsi Γ Δ. atqui in uno puncto
occurrere supponebatur.




Εἰ δὲ ἢ Β Γ τῇ Δ πρὸς μὴ συμπίπτει, ὡς δὲ τὸ
τρίτον σχήματος. ἀλλὰ μὲν καὶ περὶ τὴν Ε Ζ
τῇ Δ ἢ συμπίπτει, ἢ ὅ Ε Ζ τῇ Α Β ἢ συμπίπτει
κατὰ πλείονα σημῶν ἢ δύο.

Εἰ δὲ αἱ τμήται δὲ τὰ αὐτὰ καὶ καὶ ἄλλα ἔχουσιν,
[ὡς δὲ τὸ τρίτον καὶ πέμπτον σχήματος] αἱ αὐταὶ

Quod si Β Γ non occurrat sectioni Δ, ut in
tertia figura, propter ea, quæ [ad 52. 4. huj.] di-
cta sunt, Ε Ζ ipsi Δ non occurrat: & [per 35.
4. huj.] non occurrat Ε Ζ ipsi Α Β ad plura puncta
quam duo.

At vero si sectiones ad easdem partes concava
habeant, [ut in figuris quarta & quinta] demon-
strations eadem accommodabuntur. quare, juxta
omnes possibles diversitates, ex jam demonstra-
tis manifesto constabit propositum.



ἀποδείξεις ἀμύθητοι. κατὰ πλείους ἢ τὰς ἐνδε-
χομένας ἀλλαγὰς δὲ ἄλλοι ἐστὶν ὅτι τὸ διδωμένον τὸ
πρῶτον.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κ'.

Εἰ ἀντικείμεναι ἀντικείμεναι καὶ δύο ὁμοειδέσιν,
καὶ ἔτιση σημῶν ἢ συμπίπτει.

ΕΣΤΩΣΑΝ ἀντικείμεναι αἱ Α Β, Γ Δ, καὶ ἔτι-
σαι αἱ Α Γ, Ε Ζ, καὶ ἐφαπτόμεναι πρῶτον, ὡς

PROP. LV. Theor.

Si sectiones oppositæ oppositas contin-
gant in duobus punctis; in alio pun-
cto sibi ipsis non occurrent.

SIN T oppositæ sectiones Α Β, Γ Δ, & aliæ Α Γ,
Ε Ζ; & primum in punctis Α, Γ sese contin-
gant,

gant, ut in prima figura. quoniam enim $ΑΓ$ utramque $ΑΒ$, $ΓΔ$ contingit in punctis $Α$, $Γ$: sectio igitur $ΕΖ$ [per 49.4. huj.] neutri ipsarum $ΑΒ$, $ΓΔ$ occurret.


Contingant autem sese, ut in secunda figura. pari modo demonstrabitur [per 51. 4. huj.] $ΓΔ$ ipsi $ΕΖ$ non occurrere.

* [Sed contingant, ut in — figura, sectio quidem $ΓΑ$ sectionem $ΑΒ$ in $Α$: sectio vero $Δ$ ipsam $ΕΖ$ in $Ζ$. quoniam igitur $ΑΓ$ contingit $ΑΒ$, convexa habens è regione sita; $ΕΖ$ sectioni $ΑΒ$ non occurret. rursus quoniam $ΖΔ$ contingit $ΕΖ$, non occurret sectio $ΓΑ$ sectioni $ΔΖ$.]

ὅτι ἡ πρώτη σχήματος, κατὰ τὰ $Α, Γ$. ἐπεὶ ἔν ἡ $ΑΓ$ ἐκείρας τῶν $ΑΒ, ΓΔ$ ἐφάπτεται κατὰ τὰ $Α, Γ$ σημεία· ἡ $ΕΖ$ ἄρα ἐδέτερά τῶν $ΑΒ, ΓΔ$ συμπεσεῖ.

Εφαπτόσασιν δὲ, ὡς ὅτι ἡ δεύτερη. ὁμοίως δὲ δεχθήσεται, ὅτι ἡ $ΓΔ$ τῇ $ΕΖ$ ἔσ συμπεσεῖ.

* [Εφαπτόσασιν ἡ, ὡς ὅτι ἡ — σχήματος. ἡ μὲν $ΓΑ$ τῇ $ΑΒ$ κατὰ τὸ $Α$, ἡ δὲ $Δ$ τῇ $ΕΖ$ κατὰ τὸ $Ζ$. ἐπεὶ ἔν ἡ $ΑΓ$ τῇ $ΑΒ$ ἐφάπτεται, ἀντιγραμμένα τὰ κυρτὰ ἔχουσα, ἡ $ΕΖ$ τῇ $ΑΒ$ ἔσ συμπεσεῖ. πάλιν ἐπεὶ ἡ $ΖΔ$ τῇ $ΕΖ$ ἐφάπτεται, ἡ $ΓΑ$ τῇ $ΔΖ$ ἔσ συμπεσεῖται.]



Denique si $ΑΓ$ contingat $ΑΒ$ in $Α$, & $ΕΖ$ contingat $ΕΔ$ in $Ε$, habentes concava ad easdem partes, ut in tertia figura; in alio puncto sibi ipsis [per 50.4. huj.] non occurrent: neque quidem $ΒΖ$ occurret ipsi $ΑΒ$. juxta omnes igitur diversitates, ex jam demonstratis constabit illud quod proponebatur.

Εἰ δὲ ἡ μὲν $ΑΓ$ τῇ $ΑΒ$ ἐφάπτεται κατὰ τὸ $Α$, ἡ δὲ $ΕΖ$ τῇ $ΕΔ$ κατὰ τὸ $Ε$, καὶ ἔχουσιν ὅτι τὰ αὐτὰ τὰ κυρτὰ, ὡς ὅτι ἡ πρώτη σχήματος· καὶ ἔτι ὅτι ἔσ συμπεσεῖν. ἐπεὶ μὲν ἡ $ΕΖ$ τῇ $ΑΒ$ συμπεσεῖται, κατὰ πάντας ἔν τὰς ἐνδεχομένας ἀξιοτάτας δὴλόν ἐστιν ἐκ τῶν δεδομένων τὸ πρῶτον.

* Nescio cujus interpolatoris vitio factum est, ut in omnibus Codicibus tam *Græcis* & *Latinis* quam *Arabici*, reperiat casus ille tertius, quem uncis inclusum ut spurium & *Apollonio* nostro indignum abolendum censemus, nec schemate dignumur. Propositione enim LII^{da} hujus liquido patet, impossibile esse, si hyperbolæ duæ sese extrinsecus contingant, ut sectiones iidem oppositæ vel convenient vel sese contingant.

**APOLLONII PERGÆI
CONICORUM**

LIBRI TRES POSTERIORES

(*Sc. V^{tus}. VI^{tus}. & VII^{tus}.*)

EX

ARABICO SERMONE

IN

LATINUM CONVERSI,

CUM

PAPPI ALEXANDRINI

LEMMATIS.

SUBJICITUR

LIBER CONICORUM OCTAVUS

RESTITUTUS.

*Opera & studio EDMUNDI HALLEII apud Oxonienses
Geometriæ Professoris Saviliani.*

100-443887-111

IN COLLO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1940

100

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*) and *Chlorophyll b* (Chl *b*) were determined using the method of Lichtenthaler and Whistler (1973). The total chlorophyll content was determined using the method of Lichtenthaler and Whistler (1973). The total chlorophyll content was determined using the method of Lichtenthaler and Whistler (1973).

•

100-443881-15-100

• 1970 •

the 1990s, the number of people in the world who are undernourished has declined from 1.1 billion to 800 million. The number of people who are malnourished has declined from 1.5 billion to 1 billion. The number of people who are obese has increased from 100 million to 300 million. The number of people who are overweight has increased from 100 million to 300 million. The number of people who are obese and overweight has increased from 100 million to 300 million. The number of people who are obese and overweight has increased from 100 million to 300 million.

MAXIME REVERENDO
IN CHRISTO PATRI AC DOMINO
D. NARCISSE MARSH,
ARCHIEPISCOPO *ARMACHANO*
ET
TOTIUS *HIBERNIÆ* PRIMATI,
ARTIUM MATHEMATICARUM
FAUTORI SUMMO,
SUIQUE ORDINIS PROPE UNICO,
HANC
QUINTI, SEXTI ET SEPTIMI LIBRI.
CONICORUM APOLLONII
VERSIONEM,
E CODICE SUO ARABICO PRÆSTANTISSIMO
ADORNATAM,

Ea qua par est reverentia & observantia
Humillime offert

EDM. HALLEIUS.

a

ON THE HISTORY OF THE

REPUBLIC OF

THE UNITED STATES OF AMERICA

BY

JOHN F. MILLER

1

LECTORI S.

Prestantissimus ille Codex Armachanus, ex quo sequentem Versionem adornavimus, in orâ libri charactere majusculo hunc titulum pra se fert.

كتب المخرطات لنصير الدين الطوسي

"Liber Conicorum juxta Nasir-eddîn Tufæum." Et tam in principio quam fine libb. V^{ti}. VI^{ti}. & VII^{mi}. occurrunt hæc verba.

كتب ابلوديوس في المخرطات اخراج ثابت بن قرة واصلاح بني موسى

"Liber Apollonii de Conicis. Traduxit Thebit ben Corah, emendavit vero Beni "Moses." In calce autem legitur Epiloge, quæ quasi Historiola est, quâ manu, quo loco & tempore descriptus fuit ille Codex: atque hoc modo se habet, Interprete D^{no} Sike LL. D. viro omnigenâ literaturâ perpolito, Linguarum Orientalium peritissimo, & Hebraicæ apud Cantabrigienses Professore dignissimo.

"Hæc est narratio, quam in fine hujus libri scripsit Muley maximus Nasir-eddîn" (hic dictus نصير الدين). "Absolvit scriptor harum linearum Mohammed "Ebn Mohammed Ebn Al-Hafan Tufæus complere hunc librum & corrigere hoc exemplar, auxilio Dei & optimo adjutorio ejus, die 21. mensis Dhilhajje anni 645, "(anno Chr. 1248. Mart. 9.) Inceperat eo describendo occupari die 12^{mo} mensis Rabiae prioris ejusdem anni, (Chr. 1247. Aug. 16.) nec tamen ei vacavit amplius quam duas tertias partes ejus intervalli. Absolvit autem scribere Scholia in hoc exemplar, ac dispo- nere & corrigere figuras ejus, Achmed Ebn Aly Abu'lfaraj Mohammed, qui cogno- minatur Ebno' lbawwâb Bagdadensis (Deus fortunet statum ejus) mense Moharram anni 662. (Chr. 1263. Octob.) laudans Deum pro beneficiis ejus, & orans pro propheta ejus electo Mohammede & familia ejus. Laus Deo, & pax super servis ejus electis: fiducia nostra est Deus & optimus protector.

"Absolutum est exemplar hoc, in urbe Marâga, feria secunda, die decimo mensis Shaa- bân anno 702, (Chr. 1303. Mart. 30.) mensis Persici Chordâd die Asmôn.

Ad marginem autem paginae ultimæ ascribuntur hæc verba,

وجدت مكتوبا علي اخر دستخت الذي دستخت منه هذه النسخة واما المقاتل الثامنت من الكتاب لم تنقل الي العربي فلم توجد في اليوناني hoc est,

"Scriptum legitur in calce exemplaris unde descriptum est hoc exemplar. Partem octa- vam hujus libri in Arabicum non traductam fuisse, quia etiam in Græco non reperta est." Adeo ut de octavo libro recuperando vix ulla spes sit.

Porro urbs Marâga, in qua ante quadringentos annos nobile hoc Conicorum exemplar scriptum dicitur, est in confiniis Mediæ & Assyriæ, sub Long. 32^{or}. & Lat. 37^{is}. Urbs autem Tûs, unde ortus Nasir-eddîn, in eadem fere Latitudine ac Marâga sita, Longi- tudinem habet 92^{is}. civitate Bagdâd habente 30^{or}. juxta Tabulas Persicas Geographicas à Gravio nostro editas.

Benigne igitur velim accipias hoc quicquid est operis, ab oriente ad nos advectum & hoc unico (quod scimus) exemplari feliciter conservatum; & nostris quæso in eo interpretando & luce donando conatibus faveas. Errata quæ operarum incuriâ irrepsērunt, aut nobis forsân quandoque minus perspicacibus exciderunt, ne ægre feras hoc modo corrigere.

Pag. 4. lin. 13. lege, pro ΓΖ, ΓΣ. p. 14. l. 48. pro HZK, ZHK. p. 92. l. 13. pro quatr. ex ΓΔΑ, restan- ΓΣΠ, ΓΖΠ. p. 16. l. 13. pro quadratum igitur ex ΓΔ, leg. gulum ΓΔΑ. p. 97. l. 13. pro majorum, minorem. p. Excessus igitur quadrati ex ΓΔ supra quadratum ex ΓΔ. 100. l. 17. pro 12am, 21am. p. 108. l. 38. pro latera ejus rectum, latere ejus recto. p. 112. l. 4. pro ΑΒ, ΑΓ. p. Prop. 25. in Schem. Hyperb. fiat Α pro Δ. p. 24. l. 4. 123. l. penult. pro recti datur: ab, leg. recti: datur ab. p. pro ΒΖ, ΒΕ. p. 42. l. 12. pro 11am, 10am. p. 66. l. 38. 126. l. 43. pro major, minor. p. pro ΑΖ, ΑΖ. p. 77. l. 7. pro ΜΖ, ΜΖ. p. 91. l. 5. pro

ΠΑΠΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ

ΛΗΜΜΑΤΑ

ΕΙΣ ΚΩΝΙΚΩΝ ΤΟ ΠΕΜΠΤΟΝ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΠΕΡΓΑΙΟΥ.

PAPPI ALEXANDRINI

LEMMA TA

IN QUINTUM LIBRUM CONICORUM

APOLLONII PERGÆI.

ΛΗΜΜΑ Α΄.


Τρίγωνον τὸ $ABΓ$, ἐκάθετος ἦχθω ἡ AA . λέγω ὅτι εἰ μὴ ἴσων εἶναι τὸ ὑπὸ $BΔΓ$ τῷ διπλῷ AA τετραγώνῳ, γίνεται ὀρθή ἡ A γωνία· εἰ δὲ μείζον, ἀμβλύα· εἰ δὲ ἐλάσσον, ὀξεία.

ΕΣΤΩ σφίσις ἴση, ἀνάλογον ἄρα καὶ πάλιν ἴσας γωνίας, ἴση ἄρα εἶναι ἡ A γωνία τῇ σφίσι τὸ $Δ$ · ὅση ἴσθαι εἶναι ἡ σφίς τὸ A γωνία, ἀλλὰ ἴση μείζον, καὶ αὐτῇ ἴσων καίδω τὸ ὑπὸ $ΔΕ$ · καὶ ἐπὶ $Δ$ χθῶσαι αἱ BE, EG . ἴση ἄρα ἴσθαι ἡ ὑπὸ BEG γωνία, καὶ αὐτῇ

LEMMA I.

Sit $ABΓ$ triangulum, ac ducatur cathetus AA . Dico quod si rectangulum $BΔΓ$ æquale sit quadrato ex AA , erit angulus ad A rectus; si majus fuerit eo, obtusus; sin minus, acutus.

PRIMO fit æquale, ac BA erit ad AA sicut AA ad $ΔΓ$, &c sunt circa æquales angulos, quare angulus ad A æqualis est angulo ad $Δ$: ac propterea angulus ad A rectus est. Sed fit majus, eique æquale fiat quadratum ex $ΔE$, &c jungantur BE, EG ; erit igitur angulus BEG rectus, adeoque



μείζον ἡ A γωνία, ἀλλὰ ἴση πάλιν ἐλάσσον καὶ αὐτῇ ἴσων καίδω τὸ ὑπὸ $ΔZ$, καὶ ἐπὶ $Δ$ χθῶσαι αἱ $BZ, ZΓ$. ἴση δὲ ἴσθαι ἡ ὑπὸ $BZΓ$ γωνία, καὶ αὐτῇ ἐλάσσον ἡ σφίς τὸ A γωνία· ὅση ἄρα εἶναι ἡ A γωνία.

angulus ad A obtusus five recto major est. Si vero minus fuerit, ipsi æquale ponatur quadratum ex $ΔZ$, &c jungantur $BZ, ZΓ$; ac angulus $BZΓ$ rectus erit, eoque minor est angulus ad A : ac proinde angulus ad A acutus. Q. E. D.

ΛΗΜΜΑ Β.

Θείσιν ἑσῶν [πρὸς ὀρθάς] δύο ὀρθῶν AB, BG . ἐ σημείῳ δοθέντι $Δ$ · γράψαι διὰ $Δ$ ὑπερβολὴν περὶ ἀσυμπτώτους πρὸς AB, BG .

ΓΕΓΟΝΕΤΩ· κέντρον ἄρα αὐτῆς εἶναι τὸ B . ἐπὶ $Δ$ χθῶσαι ἡ $ΔB$ καὶ ἐκτελέσθω, ἀφ' ἧς αὐτῆς καίδω τῇ $ΔB$ ἴση ἡ BE . διδοῖσα ἄρα εἶναι, ὅση δίδιν εἶναι τὸ B καὶ πρὸς $Δ$ ἀφ' ἧς. ἦχθω ὑπὸ $Δ$ εἰς τὴν BG καὶ εἰς τὴν $ΔZ$. δίδιν ἄρα εἶναι τὸ Z , καὶ καίδω τῇ BZ ἴση ἡ $ZΓ$. δίδιν ἄρα εἶναι καὶ τὸ $Γ$, καὶ ἐπὶ $Δ$ χθῶσαι ἡ $ΓΔ$ ἐκτελέσθω, ὅση τὸ A . δίδιν ἄρα εἶναι. δίδιν δὲ καὶ ἡ AB , δίδιν ἄρα εἶναι τὸ A . ἴση δὲ καὶ τὸ $Γ$ δίδιν, δίδιν ἄρα ἡ $ΑΓ$ τῇ $μ$ μέσῃ. καὶ ἴση ἴση ἡ AA τῇ $ΔΓ$, ἀφ' ἧς καὶ τῇ BZ τῇ $ZΓ$ ἴση εἶναι. ἴση δὲ ὀρθία τῇ σφίσι τῇ BA εἶναι ἡ $ΔH$, ἐπὶ $Δ$ ἄρα $AA, ΔΓ$ διωκόμεναι εἶναι τὸ τέταρτον πρὸς ὑπὸ BAH ;

LEMMA II.

Duabus rectis AB, BG invicem normalibus positione datis, ac dato puncto $Δ$, describere per $Δ$ hyperbolam circa asymptotos AB, BG .

PUta factum: ac centrum ejus erit B . Jungatur igitur recta BA producaturque, quæ proinde diameter erit. Ponatur BE ipsi BA æqualis, quare data est; unde &c datum punctum E diametri terminus est. De $Δ$ super rectam $BΓ$ demittatur cathetus $ΔZ$, ac fiat $ZΓ$ ipsi BZ æqualis, ac datum erit punctum $Γ$. junctâ autem &c productâ rectâ $ΓΔ$ ad punctum A , recta $ΓA$ data erit positione; ac recta AB datur positione, quare punctum A datur. Datur etiam punctum E , adeoque recta AE datur magnitudine. erit quoque AA ipsi $ΔΓ$ æqualis, ob BZ ipsi $ZΓ$ æqualem. Sit jam $ΔH$ latus rectum figuræ diametri $ΔE$; poterit igitur utraque $AA, ΔΓ$ quartam partem recti anguli

PAPPI LEMMATA IN V. LIB. CONIC.

anguli $E\Delta H$. sed & eadem possunt quartam partem quadrati ex $A\Gamma$, quare rectangulum sub $E\Delta H$ æquale est quadrato ex $A\Gamma$. Datum autem est quadratum ex $A\Gamma$, datum igitur rectangulum $E\Delta H$; unde data recta $E\Delta$ data quoque est $H\Delta$, ac punctum H datum. ^a datis autem positione duabus rectis $E\Delta, \Delta H$ in eodem plano ad angulos rectos inter se constitutis, per datum punctum Δ & sub angulo $A\Delta B$ fit hyperbola, cujus diameter est $E\Delta$, vertex vero Δ , ordinatim autem applicatæ ducuntur sub angulo dato $A\Delta B$, ac possunt spatia ipsi ΔH adjacentia, latitudinesque habentia eas quas puncto Δ conterminas ipsæ ordinatim applicatæ è diametro producta abscindunt, excedentia vero figuris similibus figuræ $E\Delta H$, data est igitur positione sectio hyperbolica.

^b Componetur autem problema hoc modo. Sint duæ rectæ positione datæ $AB, B\Gamma$; punctum autem datum Δ ; ac juncta $B\Delta$ producat ad E ; ipsique $B\Delta$ æqualis fiat BE ; & demittatur normalis ΔZ , ac fiat ΓZ ipsi BZ æqualis. jungatur $\Gamma\Delta$ & producat ad A , ipsique ΔE appetur ΔH , ita ut quadratum ex $A\Gamma$ æquale sit rectangulo $E\Delta H$; & diametro ΔE describatur hyperbola, modo in analysi dicto. Dico hanc sectionem problema efficere. Quoniam enim BZ ipsi ΓZ æqualis est, erunt etiam $A\Delta, \Delta\Gamma$ æquales: utraque igitur $A\Delta, \Delta\Gamma$, potens quartam partem quadrati ex $A\Gamma$, poterit quartam partem rectanguli $E\Delta H$, nempe figuræ super diametrum ΔE factæ. Hoc autem ita se habente, demonstratum, est in secundo libro Conicorum, hyperbolæ asymptotos esse rectas $AB, B\Gamma$.

LEMMA III.

Sit recta AB positione data, ac punctum Γ datum; ac, ducta recta $B\Gamma$, sit recta $B\Delta$ data: & erigatur normalis ΔE . Dico punctum E contingere hyperbolam per punctum Γ transcurrentem.

SIT ΓZ normalis, ipsique $B\Delta$ æqualis ponatur $Z\Delta$; datur itaque punctum A : & erecta normali ΔH , dabitur positione recta AH , occurrens ipsi $B\Gamma$ productæ ad punctum H : datis igitur positione rectis AB, AH , hyperbola, per datum punctum Γ asymptotis AB, AH descripta, transibit per punctum E ; quia EH ipsi $B\Gamma$ æqualis est, ob totam BE toti $H\Gamma$ æqualem. Hoc autem ex præcedente manifestum est.

Componetur autem hoc modo. Sit AB recta positione data, & punctum datum Γ ; sitque $B\Gamma$ recta ducta, data autem recta sit Θ . demissa normali ΓZ , ipsi Θ æqualis fiat $Z\Delta$; & ad angulos rectos erigatur ΔH occurrens rectæ $B\Gamma$ productæ in H : dein asymptotis HA, AB , per punctum Γ intra datum, describatur hyperbola. Dico eam problemati satisfacere, hoc est, si demittatur cathetus aliqua $E\Delta$, semper fiet $B\Delta$ ipsi Θ æqualis. Hoc autem manifestum est propter asymptotos; æquales enim sunt $EH, \Gamma B$, adeoque $A\Delta$ ipsi ZB æqualis: tota igitur AZ , hoc est recta Θ , æqualis est toti $B\Delta$.

^a Vide Prop. LIII. Lib. primi.


^b Vide Prop. IV. Lib. secundi.

^c Vide Prop. I. Lib. secundi.

b

LEMMA δ'.

ἀλλὰ καὶ ὅτι ἀπὸ $A\Gamma$, ὅπου ἄρα ὄρεται τὸ ὑπὸ $E\Delta H$ τῆς ἀπὸ $A\Gamma$ τετραγώνου. δοθέν δὲ τὸ ἀπὸ $A\Gamma$ τετραγώνον, δοθέν ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ $E\Delta H$. καὶ ἐστὶ δοθείσα ἡ $E\Delta$, δοθείσα ἄρα καὶ ἡ $H\Delta$, ὥστε δοθέν τὸ H . ^a ἐπεὶ ἔν τῷ δόσει δεδομένων δύο εὐθεϊῶν ἐν ὁμοπλάτῳ τῇ $E\Delta, \Delta H$ ὁρθῶν ἀλλήλαις κειμέναν, καὶ ἀπὸ δοθέντος τῇ Δ ὑπὸ τῆς $A\Delta B$ γωνίας γίνεται ὑπερβολὴ, ἥς ἀξίμετρος μὲν ἡ $E\Delta$, κορυφὴ δὲ τὸ Δ , αἱ δὲ καταγόμεναι κατὰ γωνίαν ἐν τῇ δοθείσῃ γωνίᾳ τῇ ὑπὸ $A\Delta B$, δυνάμεναι τὰ ὅσα πλεονάζουσιν τῇ ΔH παρεκκείμενα, πλάττειν ἔχοντα ἃ ταυτὰ ἀφαιρῶσιν ἀπὸ τῆς ἐκδοθείσας τῇ ἀξίμετρος τοῦ Δ , ὑπερεκκείμενα εἶδει ὁμοίᾳ τῇ ὑπὸ $E\Delta H$. δόσει ἄρα ὄρεται ἡ τομή.



^b Σωτηρίζεται δὲ τὸ πρόβλημα ὕτως. Ἐστωσαν αἱ τῇ δόσει δύο δοθεῖσαι αἱ $AB, B\Gamma$, τὸ δὲ δοθέν τὸ Δ , καὶ ἐπιτελέσθω ἡ $B\Delta$ καὶ ἐκτελέσθω ὅτι τὸ E , καὶ αὐτῇ ἴσῃ κείσθω ἡ BE . καὶ ἔχθω κείσθω ἡ ΔZ , καὶ τῇ BZ ἴσῃ κείσθω ἡ ΓZ , καὶ ἐπιτελέσθω ἡ $\Gamma\Delta$ καὶ ἐκτελέσθω ὅτι τὸ A . καὶ τῇ ΔE προσανατέχθω ἡ ΔH , καὶ τῇ ἀπὸ $A\Gamma$ ἴσῃ κείσθω τὸ ὑπὸ $E\Delta H$. καὶ γράψω, ὥς ἐν τῇ ἀναλύσει λέγομεν, περὶ ἀξίμετρον ΔE ὑπερβολή. λέγω ὅτι ποιῇ τὸ πρόβλημα.

Ἐπεὶ γὰρ ἴση ὄρεται ἡ BZ τῇ ΓZ , ἴση ἄρα ὄρεται καὶ ἡ $A\Delta$ τῇ $\Delta\Gamma$. ἐκαστὴ ἄρα τῶν ἀπὸ $A\Delta, \Delta\Gamma$ δυνάμει τὸ τέταρτον ὄρεται τῇ ἀπὸ $A\Gamma$ τετραγώνῳ, καὶ ἐστὶ τῇ ὑπὸ $E\Delta H$, τοῦτ' ἐστὶ τῇ $E\Delta$ ἀξίμετρος εἶδους. Ἐὰν δὲ ἢ ὕψος, ^c δέδεικται ἐν τῇ διευτήρῃ ὅτι ἀσύμπτωτοί εἰσιν αἱ $AB, B\Gamma$ τῇ ὑπερβολῇ.

LEMMA γ'.

Θέσθ' εὐθεία ἡ AB , καὶ δοθέν τὸ Γ . διήχθω ἡ $B\Gamma$, καὶ κείσθω δοθείσα ἡ $B\Delta$, ὁρθὴ δὲ ἀντέχθω ἡ ΔE . ὅτι τὸ E ἀπείταται ὅσῃ κωνία τομῇς ὑπερβολῆς ἐκκομίδης ἀπὸ τῆς Γ .

HΧθω κείσθω ἡ ΓZ , καὶ τῇ $B\Delta$ ἴσῃ κείσθω ἡ $Z\Delta$. δοθέν ἄρα ὄρεται τὸ A . ἀντέχθω ὁρθὴ ἡ AH . δόσει ἄρα ὄρεται ἡ AH συμπίπτουσα τῇ $B\Gamma$, ὥστε ἐκτελέσθω καὶ τὸ H . καὶ δόσει δοθέντων τῇ $B\Delta, AH$, καὶ σημείῳ δοθέντος τῇ Γ , ὑπερβολὴ καὶ ἀσύμπτωτος HA, AB ἐκδοθείσῃ ἄρα καὶ ἀπὸ τῆς Γ καὶ τῆς ἴσῃς τῇ $B\Gamma$ τῇ EH , ἐπεὶ καὶ ὅλη BE τῇ $H\Gamma$, καὶ ἴσῃς ἀπὸ τῆς Γ ἀφαιρῶσιν.

Σωτηρίζεται δὲ ὕτως.

Ἐστω ἡ μ τῇ δόσει δεδομένη εὐθεία ἡ AB , τὸ δὲ δοθέν τὸ Γ , ἡ δὲ διηγμένη ἡ $B\Gamma$, ἡ δὲ δοθείσα ἡ Θ . καὶ αὐτῇ ἴσῃ ἔστω, κείσθω ἀντέχθω τῇ ΓZ , καὶ $Z\Delta$. καὶ ὁρθὴ ἀντέχθω ἡ AH . συμπίπτω δὲ τῇ $B\Gamma$ ἐκτελέσθω καὶ τὸ H . καὶ καὶ ἀσύμπτωτος τῆς HA, AB ἀπὸ τῆς Γ καὶ γράψω ὑπερβολή. λέγω ὅτι ποιῇ τὸ πρόβλημα, τοῦτ' ἐστὶν


ὅτι, οἷα ἂν κείσθω ἀντέχθω ἡ $E\Delta$, ἴση γίνεται ἡ $B\Delta$ τῇ Θ . τῷτ' ἐστὶν ἀπὸ τῆς Γ ἀφαιρῶσιν τῆς ἀσύμπτωτος, ἴση γὰρ ἡ EH τῇ ΓB , ὥστε καὶ ἡ $A\Delta$ τῇ ZB . καὶ ὅλη ἄρα ἡ AZ , τοῦτ' ἐστὶν ἡ Θ , ἴση ὄρεται τῇ $B\Delta$.

PAPPI LEMMATA

ΛΗΜΜΑ Δ'.

Εἰς ὥς ἡ ΒΑ πρὸς τὴν ΑΓ ὥς τὸ ΒΔ πρὸς τὸ ΔΓ. ὅτι ἡ ΒΑ, ΑΓ μέση ἀνάλογον ἔστω ἡ ΑΔ.

Κ Εἶδον τὴν ΓΔ ἴσην ἡ ΔΕ. καὶ διαιρέσω ἄρα γίνεται ὥς ἡ ΒΓ πρὸς ἡ ΓΑ, τὴν ἔστω ὡς τὸ ὑπὸ ΓΒΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΓ, ΕΒ, ὥς τὸ ὑπὸ ΓΒΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΕΔ. ἴσων ἄρα ἔστω τὸ ὑπὸ ΑΓ, ΕΒ τῷ ὑπὸ ΔΕ, τῷ τῷ ὑπὸ ΓΔΕ. ἀνάλογον καὶ συν. ὅθεν ἄρα ἔστω ὡς ἡ ΒΔ πρὸς ἡ ΔΓ ὥς ἡ ΔΑ πρὸς ΑΓ. ὅλη ἄρα πρὸς ὅλην ἔστω ὡς ἡ ΒΑ πρὸς τὴν ΑΔ ὥς ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΑΓ. ὥς τὴν ΒΑ, ΑΓ μέση ἀνάλογον ἔστω ἡ ΑΔ.



LEMMA IV.


Sit ut BA ad AG ita quadratum ex BA ad quadratum ex AG. Dico AD mediam esse proportionalem inter BA & AG.

F lat AE ipsi GA æqualis; ac dividendo erit ut BG ad GA, hoc est, ut rectangulum GBE ad rectangulum sub AG, EB ita (per sextam II. Elem.) rectangulum GBE ad quadratum ex ED: quare rectangulum sub AG, EB æquale est quadrato ex DE, hoc est rectangulo GDE. ob proportionales igitur & componendo, erit ut BA ad DE five AG, ita AD ad AG: quapropter tota BA ad totam AD erit in eadem ratione AD ad AG; ita ut AD media proportionalis sit inter BA, AG.

ΛΗΜΜΑ Ε'.

Εἰς τὸ ὑπὸ ΑΒΓ ἴσων τῷ δὲ ΔΓ. ὅτι ἴση ἔστω ἡ ΑΓ τῇ ΓΒ.

Κ Εἶδον τὴν ΑΓ ἴσην ἡ ΑΔ. ἔστω ἄρα τὸ ὑπὸ ΔΓΑ ἴσων τῷ ὑπὸ ΑΒΓ. καὶ ὅτι τὸ αὐτὸ ἴσων ἄρα ἔστω ἡ ΑΔ, τῇ τῇ ΓΒ.



LEMMA V.


Sit rectangulum ABΓ duplum quadrati ex AG. Dico AG ipsi GB æqualem esse.

F lat AD ipsi AG æqualis: erit itaque rectangulum GDA æquale rectangulo ABΓ. & applicato utroque ad eandem rectam AG, erit AD ipsi AG æqualis etiam rectæ GB æqualis.

ΛΗΜΜΑ ς'.

Περὶ τὰς αὐταῖς ἀσυμπίπτουσιν ΑΒ, ΒΓ ὑπερβολαῖς γεγραμμέναις αἱ ΔΕ, ΔΖ λέγω ὅτι ἔσονται ἀλλήλαις.

Εἰ δὲ δυνατὸν συμπέσωσιν ἀλλήλαις καὶ τὸ Δ. καὶ ὑπὸ τῷ Δ διήχθω οἱς τιμαῖς εὐθείαις ἡ ΑΔΕΖΓ. ἔστω δὲ, αἱ δὲ ἡ ΔΖ τμήτων, ἴση ἡ ΑΔ τῇ ΖΓ. αἱ δὲ ἡ ΔΕ τμήτων, ἴση ἡ ΑΔ τῇ ΕΓ. ὥς ἡ ΓΖ τῇ ΓΒ ἴση ἔστω, ὅπου ἀδυνατοῦν εἶναι ἀλλήλαις.




LEMMA VI.

Circa easdem asymptotas AB, BG describantur hyperbolæ DE, DZ. Dico eas non occurrere invicem.

N AM si fieri possit, convellantur in puncto Δ, & per Δ ducatur ad sectiones rectæ ΑΔΕΖΓ; erit igitur, propter sectionem ΔΖ, recta ΑΔ ipsi ΖΓ æqualis. verum, propter sectionem ΔΕ, eadem ΑΔ ipsi ΕΓ æqualis erit, adeoque ΓΖ ipsi ΓΕ æqualis: quod impossibile est. hæc sectiones igitur non concurrunt inter se.

Dico quoque quod eadem in infinitum productæ semper invicem propiores fiunt, & ad minorem procedunt distantiam. Ducatur enim alia hyperbola ΘΝΚ, sitque diameter ejus MN, cujus terminus M; ac sit ΗΠ diameter hyperbolæ ΑΠΖ: erit igitur rectangulum ΜΑΝ ad quadratum ex ΑΖ, ut diameter transversa ad latus rectum; & ut rectangulum ΗΟΠ ad quadratum ex ΟΡ ita diameter transversa ad latus rectum: quare rectangulum ΜΑΝ est ad quadratum ex ΑΖ ut rectangulum ΗΟΠ ad quadratum ex ΟΡ, ac permutando. sed rectangulum ΜΑΝ majus est rectangulo ΗΟΠ, quare ΖΖ major est quam ΘΘ: ac propter sectiones, rectangulum ΖΖΔ rectangulo ΣΘΡ æquale est [utrumque enim quadrato ex ΠΤ æquale] quapropter ΖΔ minor est quam ΘΡ. semper igitur sectiones accedunt invicem ad minora intervalla, fibique adjacent. nam si utraque earum asymptotis semper propius accedit, manifestum est & sibi ipsis semper appropinquare.



Λέγω δὲ ὅτι καὶ οἱς ἀπειροῦς ἀντιθέτως ἔχοντες πρὸς αὐτὰς, καὶ εἰς ἐκείνην ἀφικνύνται ἀμέτρητα. ἔχον γὰρ πρὸς αὐτὰς ἡ ΘΝΚ, καὶ ἔστω ἡ ἀμέτρητος ΜΝ, ἡς πῆρας τὸ Μ [ἔστω καὶ τὸ ΔΠΖ ἀμέτρητος ἡ ΠΗ] ἔστω ἄρα ὡς μὲν τὸ ὑπὸ ΜΑΝ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΖ ὥς ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὀρθάν, ὡς δὲ τὸ ὑπὸ ΗΟΠ πρὸς τὸ ὑπὸ ΟΡ ὥς ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὀρθάν. ὥς ἔστι ὡς τὸ ὑπὸ ΜΑΝ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΖ ὥς τὸ ὑπὸ ΗΟΠ πρὸς τὸ ὑπὸ ΟΡ, καὶ ἐκείνη. μάλιστα δὲ ἔστι τὸ ὑπὸ ΜΑΝ πρὸς τὸ ὑπὸ ΗΟΠ, * μάλιστα ἄρα ἔστι ἡ ΖΖ τὸ ΘΘ. καὶ αἱ τῶν τιμῶν, ἴσων ἔστι τὸ ὑπὸ ΖΖΔ τῷ ὑπὸ ΣΘΡ, [ἔχοντες γὰρ τὸ ὑπὸ ΠΤ ἴσων.] ἐλάσσον ἄρα ἔστι ἡ ΖΔ τῇ ΘΡ. ὥς δὲ αἱ οἱς ἐκείνην ἀφικνύνται ἀμέτρητα. ἀλλὰ καὶ παρέρχεται, οἱ γὰρ ἐκείνην αὐτῶν τῶν ἀσυμπίπτουσιν ἔχοντες πρὸς αὐτὰς, διόλου καὶ ἐκείνην.

* Manca

IN V. LIB. CONICORUM.

* *Manca est hæc demonstratio: placuit igitur aliam hic subicere, ab antiquâ & integrâ Pappi, ut ex vestigiis ejus conficere licet, non multum diversam.*

Quoniam enim sectiones sunt circa easdem asymptotas, erit ut rectangulum MAN ad quadratum ex AN ita rectangulum HAN ad quadratum ex AN . pariterque ut rectangulum MON ad quadratum ex ON ita rectangulum HON ad quadratum ex ON , sunt enim omnia in ratione lateris transversi ad latus rectum: reliquum igitur ad reliquum erit in eadem ratione. quare ut latus transversum ad rectum ita differentia rectangulorum MAN , HAN ad differentiam quadratorum ex AN , AN , hoc est [per 6. II. El.] ad

rectangulum ZZA ; & ita differentia rectangulorum MON , HON ad differentiam quadratorum ex ON , ON , five rectangulum $ΣΘΡ$. Sed differentia rectangulorum MAN , HAN æqualis est differentiæ rectangulorum MON , HON ; semper enim [per Pappi Lem. 4. in Lib. III.] æqualis est rectangulo MIN : est igitur rectangulum ZZA æquale rectangulo $ΣΘΡ$. Verum ZZ major est quam $ΣΘ$, adeoque ZA minor est quam $ΘΡ$. Quapropter hæ sectiones semper accedunt invicem ad minora intervalla.

Aliter & brevius.

Propter Hyperbolas, AP æqualis est ipsi $ΣΓ$ [per 8. II. huj.] ac AO ipsi $KΓ$; ac proinde reliqua OP reliquæ $ΣK$ æqualis est, quocunque modo duxeris rectam AG . Est autem [per 10. II. huj.] rectangulum $ΣAP$ semper æquale rectangulo ZYA , ac rectangula KAO , EYZ sunt ubique æqualia, quare & eorundem differentiæ semper æquales sunt. Sed [per Pappi Lem. 4. in III. huj.] differentia rectangulorum

$ΣAP$, KAO æqualis est rectangulo $ΣΘΡ$, & differentia rectangulorum ZYA , EYZ æqualis est rectangulo ZZA , adeoque rectangula $ΣΘΡ$, ZZA sunt ubique æqualia: unde patet ZA minorem esse quam $ΘΡ$. Ac manifestum est hyperbolam $ΔΠΖ$ ubique intra hyperbolam $ΖNE$ constitui, quia rectangulum $AOΓ$ ubique minus est rectangulo $APΓ$.

LEMMA VII.

Sit ut AB ad $BΓ$ ita $ΔE$ ad EZ , & ut BA ad AH ita EA ad $ΔΘ$. Dico ut solidum basin habens quadratum ex AG , altitudinem vero AB , ad solidum basin habens quadratum ex $ΔZ$ altitudinemque $ΔE$, ita cubus ex AH una cum eo quod est ad cubum ex HB in ratione quadrati ex AG ad quadratum ex $ΓB$, ad cubum ex $ΔΘ$ una cum eo quod est ad cubum ex $ΘE$ in ratione quadrati ex $ΔZ$ ad quadratum ex ZE .

Quoniam enim ut $ΓA$ est ad AB ita $ZΔ$ ad $ΔE$, erit etiam ut quadratum ex $ΓA$ ad quadratum ex AB ita quadratum ex $ZΔ$ ad quadratum ex $ΔE$. sed ut quadratum ex $ΓA$ est ad quadratum ex AB , sumptâ communi altitudine AB , ita solidum basin habens quadratum ex AG & altitudinem AB ad cubum ex AB . ut autem quadratum ex $ZΔ$ ad quadratum ex $ΔE$, ob communem altitudinem $ΔE$; ita erit solidum basin habens quadratum ex $ZΔ$ & altitudinem $ΔE$ ad cubum ex $ΔE$. Hæc igitur proportionalia sunt; ac permutando. Sed ut cubus ex AB est ad cubum ex $ΔE$ ita cubus ex AH ad cubum ex $ΔΘ$, & ita cubus ex HB ad cubum ex $ΘE$. verum ut cubus ex HB ad cubum ex $ΘE$ ita solidum quod est ad cubum ex HB in ratione quadrati ex AG ad quadratum ex $ΓB$, ad solidum quod est ad cubum ex $ΘE$ in ratione quadrati ex $ΔZ$ ad quadratum ex ZE . ut vero unus antecedentium est ad unum consequentium ita omnes ad omnes; quare erit, ut solidum basin habens quadratum ex AG & altitudinem AB , ad solidum basin habens quadratum ex $ΔZ$ altitudinemque $ΔE$, ita cubus ex AH una cum eo quod est ad cubum ex HB rationem habet quadrati ex AG ad quadratum ex $ΓB$, ad cubum ex $ΔΘ$ una cum eo quod est ad cubum ex $ΘE$ rationem habet quadrati ex $ΔZ$ ad quadratum ex ZE . Q. E. D.


LEMMA VIII.

Si sint A & B simul æqualia ipsis $Γ$ & $Δ$ simul. Dico A excedere $Γ$ eodem excessu quo $Δ$ majus est quam B .

ΛΗΜΜΑ Ζ'.

Εἰς ὧς μὲν ἡ AB πρὸς τὴν $BΓ$ ὥτως ἡ $ΔE$ πρὸς τὴν EZ , ὡς δὲ ἡ BA πρὸς τὴν AH ὥτως ἡ EA πρὸς τὴν $ΔΘ$. ὅπῃ γίνεται ὡς τὸ σφαιρὸν τὸ βάσις μὲν ἔχον τὸ διπλὸν AG περὶ ἄνωγαν ὕψος δὲ πλὴν AB , πρὸς τὸ σφαιρὸν τὸ βάσις μὲν ἔχον τὸ διπλὸν $ΔZ$ περὶ ἄνωγαν ὕψος δὲ πλὴν $ΔE$, ὥτως ὁ διπλὸς τῆς AH κύβος μὲν ἔσθ' ὁ λόγος ἔχοντος πρὸς τὸ διπλὸν τῆς HB κύβου ὃν τὸ διπλὸν AG πρὸς τὸ διπλὸν $ΓB$, πρὸς τὸ διπλὸν τῆς $ΘE$ κύβου μὲν ἔσθ' ὁ λόγος ἔχοντος πρὸς τὸ διπλὸν τῆς $ΘE$ κύβου ὃν τὸ διπλὸν $ΔZ$ πρὸς τὸ διπλὸν ZE .

Ἐπεὶ γὰρ ὅτι ὡς ἡ $ΓA$ πρὸς πλὴν AB ὥτως ἡ $ZΔ$ πρὸς πλὴν $ΔE$, καὶ ὡς ἂρα τὸ διπλὸν $ΓA$ πρὸς τὸ διπλὸν AB ὥτως τὸ διπλὸν $ZΔ$ πρὸς τὸ διπλὸν $ΔE$. ἀλλ' ὡς μὲν τὸ διπλὸν $ΓA$ πρὸς τὸ διπλὸν AB , κοινὸν ὕψος ἡ AB , ὥτως τὸ σφαιρὸν τὸ βάσις μὲν ἔχον τὸ διπλὸν AG περὶ ἄνωγαν ὕψος δὲ πλὴν AB , πρὸς τὸ διπλὸν τῆς AB κύβου. ὡς δὲ τὸ διπλὸν $ZΔ$ πρὸς τὸ διπλὸν $ΔE$, κοινὸν ὕψος ἡ $ΔE$, ὥτως τὸ σφαιρὸν τὸ βάσις μὲν ἔχον τὸ διπλὸν $ΔZ$ περὶ ἄνωγαν ὕψος δὲ πλὴν $ΔE$, πρὸς τὸ διπλὸν τῆς $ΔE$ κύβου. καὶ ταῦτα ἂρα ἀνάλογον καὶ ἐναλλάξ ὄντι. ὅτι ὡς ὁ διπλὸς τῆς AB κύβος πρὸς τὸ διπλὸν τῆς $ΔE$ κύβου, ὥτως ὁ διπλὸς τῆς AH κύβος πρὸς τὸ διπλὸν τῆς $ΘE$ κύβου, καὶ ὁ διπλὸς τῆς HB κύβος πρὸς τὸ διπλὸν τῆς $ΘE$ κύβου. ἀλλ' ὡς ὁ διπλὸς τῆς HB κύβος πρὸς τὸ διπλὸν τῆς $ΘE$ κύβου, ὥτως τὸ λόγον ἔχον πρὸς τὸ διπλὸν τῆς HB κύβου ὃν τὸ διπλὸν AG πρὸς τὸ διπλὸν $ΓB$, πρὸς τὸ λόγον ἔχον πρὸς τὸ διπλὸν τῆς $ΘE$ κύβου ὃν τὸ διπλὸν $ΔZ$ πρὸς τὸ διπλὸν ZE . καὶ ὡς ἂρα ἐν τῷ ἰσχυρισμῷ πρὸς ἐν τῷ ἰσχυρισμῷ, ὥτως ἅπαντα πρὸς ἅπαντα. ὅτι ἂρα ὡς τὸ σφαιρὸν βάσις μὲν ἔχον τὸ διπλὸν τῆς AG περὶ ἄνωγαν ὕψος δὲ πλὴν AB , πρὸς τὸ σφαιρὸν τὸ βάσις μὲν ἔχον τὸ διπλὸν τῆς $ΔZ$ περὶ ἄνωγαν ὕψος δὲ πλὴν $ΔE$, ὥτως ὁ διπλὸς τῆς AH κύβος μὲν ἔσθ' ὁ λόγος ἔχοντος πρὸς τὸ διπλὸν τῆς HB κύβου ὃν τὸ διπλὸν AG πρὸς τὸ διπλὸν $ΓB$, πρὸς τὸ διπλὸν τῆς $ΘE$ κύβου μὲν ἔσθ' ὁ λόγος ἔχοντος πρὸς τὸ διπλὸν τῆς $ΘE$ κύβου ὃν τὸ διπλὸν $ΔZ$ πρὸς τὸ διπλὸν ZE .




ΛΗΜΜΑ Η'.

Εἰς ὧς τὸ A μὲν ἔσθ' ἰσὺν τῷ $Γ$ μὲν ἔσθ' $Δ$. ὅπῃ ὡς ὑπερέχει τὸ A τὸ $Γ$, τὴν ὑπερέχει καὶ τὸ $Δ$ τὸ B .

Εἰς

PAPPA LEMMATA IN V. LIB. CONIC.

ΕΣΤΩ ὃ ᾧ ὑπερέχει τὸ Α τῷ Γ τὸ Ε, τὸ ἄρα Α ἴσον ἔσθι τῷ Γ, Ε. κοινὸν προσποιώμεθα τὸ Β· τὰ Α, Β ἄρα ἴσα ἔσθι τῷ Γ, Ε, Β. ἀλλὰ τὰ Α, Β τῷ Γ, Δ ἴσα ἔσθι τῷ Γ, Ε, Β ἴσα. κοινὸν ἀφαιρώμεθα τὸ Γ, λοιπὸν ἄρα τὸ Δ ἴσον τῷ Ε, Β· ὅτε τὸ Δ πρὸ Β ὑπερέχει τῷ Ε. ὃ ἄρα ὑπερέχει τὸ Α τῷ Γ, τότε ὑπερέχει καὶ τὸ Δ τῷ Ε. ὁμοίως δὲ δείξομεν ὅτι ἐὰν ᾧ ὑπερέχει τὸ Α τῷ Γ τότε ὑπερέχει καὶ τὸ Δ τῷ Ε, ὅπ τὰ Α, Β ἴσα ἔσθι τῷ Γ, Δ.




SIT E excessus quo A majus est quam Γ; A igitur æquale est utrisque Γ, Ε. commune adjiciatur Β, & Α, Β simul æqualia erunt ipsis Γ, Ε, Β simul. sed ex hypothesi Α, Β simul æqualia sunt ipsis Γ, Δ simul; quare Γ, Δ ipsis Γ, Ε, Β sequantur. commune auferatur Γ, ac reliquum Δ reliquis Β, Ε æquale erit; ac Δ majus erit quam Β excessu ipsius Ε: quo igitur excessu Α superat Γ eodem & Δ superabit Β. Pari modo demonstrari potest, quod si Α superat Γ eodem excessu quo Δ superat Β, utraque Α, Β simul utrisque Γ, Δ simul æqualia esse.

ΛΗΜΜΑ 9.

Εἰς δύο μεγέθη τὰ ΑΒ, ΓΒ. ὅπ ἐὰν ὑπερέχει τὸ ΑΒ τῷ ΑΓ, ὑπερέχει καὶ τὸ λόγον ἔχον πρὸς τὸ ΑΒ τῷ λόγον ἔχοντος πρὸς τὸ ΑΓ τὸ αὐτόν, τῷ λόγον ἔχοντι πρὸς τὸ ΓΒ τὸ αὐτόν.

ΕΣΤΩ γάρ τὸ μὲν πρὸς τὸ ΑΒ λόγον πρὸς ἔχον τὸ ΔΕ, τὸ δὲ πρὸς τὸ ΑΓ τὸν αὐτὸν λόγον ἔχον τὸ Ζ· λοιπὸν ἄρα τὸ ΕΖ πρὸς τὸ ΒΓ λόγον ἔχει τὸ αὐτόν. καὶ ἐὰν τὸ ΕΖ ὑπερέχει τὸ ΔΕ τῷ ΔΖ, τότε τὸ λόγον ἔχον πρὸς τὸ ΑΒ τῷ λόγον ἔχοντος πρὸς τὸ ΑΓ τὸν αὐτόν.



LEMMA IX.


Sint duæ magnitudines ΑΒ, ΓΒ. Dico quod si majus fuerit ΑΒ quam ΑΓ, illud quod ad ΑΒ rationem aliquam habet superabit quod ad ΑΓ eandem habet rationem, excessu qui eandem ipsam rationem ad ΓΒ habebit.

Habeat enim ΔΕ rationem aliquam ad ΑΒ, & sit ΔΖ ad ΑΓ in eadem ratione; reliquum itaque ΕΖ eandem ipsam rationem habebit ad ΒΓ. est autem ΕΖ excessus quo ΔΕ superat ΔΖ, sive quo id quod ad ΑΒ rationem habet excedit illud quod ad ΑΓ eandem habet rationem.

ΛΗΜΜΑ 10.

Τὸ Α ἔσθι ἑλάσσονι ὑπερεχέτω ἥπερ τὸ Δ τῷ Β. ὅπ τὰ Α, Β ἐλάσσονά ἐστι τῶν Γ, Δ.

ΕΣΤΩ ὃ ᾧ ὑπερέχει τὸ Α τῷ Γ τὸ Ε, τὰ Α, Β ἄρα ἴσα ἔσθι τῷ Γ, Ε, Β. ἐπὶ δὲ τὸ Α τῷ Γ ἐλάσσονι ὑπερέχει ἥπερ τὸ Δ τῷ Β· τὰ Α τῷ Γ ὑπερέχει τῷ Ε, τὸ Ε ἄρα ἐλάσσονι ἔσθι τῷ Δ, Β ὑπερέχει. ὅτε τὰ Ε, Β ἐλάσσονα ἔσθι τῷ Δ.



ἐλάσσονά ἐστι τῷ Δ. κοινὸν προσποιώμεθα τὸ Γ, τὰ Γ, Ε, Β ἄρα ἐλάσσονα ἔσθι τῷ Γ, Δ. ἀλλὰ τὰ Γ, Ε, Β ἴσα ἔσθι τῷ Α, Β· τὰ Α, Β ἄρα ἐλάσσονα ἔσθι τῷ Γ, Δ, ὁμοίως καὶ τὸ ἀναστρέψον· καὶ τὰ δὲ ἐλλείψεις ὁμοίως.

LEMMA X.

Excedat Α ipsum Γ minore differentia quam qua Δ superat Β. Dico Α, Β simul minora esse quam Γ, Δ simul sumpta.

SIT enim Ε excessus ipsius Α supra Γ, unde Α, Β simul ipsis Γ, Ε, Β simul sumptis æqualia erunt. superat autem Α ipsum Γ minore quam quo Δ superat Β: est autem Ε excessus quo Α superat Γ: igitur Ε minor est differentia ipsarum Α, Β; adeoque Ε, Β

minora sunt quam Δ. commune addatur Γ, ac Γ, Ε, Β simul minora erunt quam Γ, Δ. Sed demonstratum est Γ, Ε, Β æqualia esse ipsis Α, Β simul: quare Α, Β minora sunt quam Γ, Δ simul. Pari modo constabit hujus conversæ, & quid accidat ubi Α minus fuerit quam Γ.

APOLLONII PERGÆI

CONICORUM

LIBER QUINTUS.

Apollonius Attalo S. P.

— *Conscriptas à nobis sunt hoc Libro quinto propositiones de Maximis & Minimis. Sciendum autem eos qui vel ante nos vel nostro tempore vixerunt, Minimarum doctrinam leviter tantum attigisse: ideoque demonstrarunt tantum quædam Rectæ contingant Sectiones, & vicissim, nempe quidnam iis accidat propterea quod Sectionum Tangentes sint. Ac quidem de hisce egimus Libro primo, nisi quod in eorum expositione prætermisimus Minimarum doctrinam. Constitueramus autem eum in his quoque demonstrandis servare ordinem, quem in præmissis trium Sectionum Elementis sequuti sumus, relatione habitâ ad quamlibet Sectionum diametrum: quoniam vero innumera sunt quæ hisce accidunt, id solum in præsentia conati sumus, ut ostenderemus quomodo se res habeat respectu Axium sive diametrorum principalium. Has autem Propositiones de Minimis accurate admodum divisimus & distinximus in suas Classes: iisque adjunximus illas quæ ad præfatam Maximarum doctrinam spectant. Id namque scientiæ hujus studiosis in primis necessarium est, tam ad Divisiones & doctores Problematum, tum ad eorundem Compositiones: præterquam quod hæc ipsa res de earum numero sit, quæ per se contemplatione non indignæ videantur. Vale.*

A


PROPO-

PROPOSITIO I.

S*I in Hyperbola vel Ellipsi ad Verticem principalem Sectionis erigatur Axi normalis, quæ sit dimidio Lateris recti æqualis; & ab ejus extremitate ducatur recta ad centrum sectionis, ut & à quovis in sectione puncto Axi ordinatim applicata: poterit ea duplum quadrilateri sub rectis hoc modo ductis & lateris recti dimidio contenti.*

Sit AB Hyperbola vel Ellipsis, cujus Axis BF ac centrum Δ : & sit latus rectum Sectionis BE , ipsiusque BE dimidium sit BH . Jungatur ΔH , & ducatur ordinatim applicata quævis AZ , quæ parallela erit ipsi BE ; & producat ad Θ . Dico quadratum ex AZ duplum esse quadrilateri $BZH\Theta$.


Ducatur è puncto E recta EF , quæ parallela erit ipsi ΔH ; ac producat $Z\Theta$ ad K : erit igitur ΘK parallela & æqualis ipsi HE , hoc est ipsi BH . Adjiciatur communis $Z\Theta$, ac ZK æqualis erit utrisque BH , $Z\Theta$ simul sumptis; adeoque quod sit sub ZK & BZ æquale erit ei quod sit sub BH , $Z\Theta$ simul sumptis & BZ . Sed rectangulum sub ZK , BZ æquale est quadrato ipsius AZ : (per 12^m & 13^m 1^{mi}.) Igitur rectangulum sub BH , $Z\Theta$ simul sumptis & BZ æquale est quadrato ex AZ . Verum rectangulum sub utrisque $Z\Theta$, BH & BZ duplum est quadrilateri $BZH\Theta$. Quocirca quadratum ex AZ duplum est quadrilateri $BZH\Theta$. Q. E. D.



PROPOSITIO II.

CAdat autem ordinatim applicata super centrum Ellipseos Δ ; fiat BZ dimidium ipsius BE : ac jungatur ΔZ . Dico quadratum ex $\Delta\Delta$ duplum esse trianguli $BZ\Delta$.


Connectatur recta FE . Quoniam enim BZ ipsi ZE æqualis est, atque etiam ZE ipsi ΔH æqualis, quæ parallela est ipsi BE , ideo rectangulum sub ΔH , ΔB duplum est trianguli ΔZB . Sed rectangulum sub ΔH , ΔB æquale est quadrato ex $\Delta\Delta$ (per 13^m 1^{mi}.) Igitur quadratum ex $\Delta\Delta$ duplum est trianguli ΔZB . Q. E. D.



PROPOSITIO III.

CAdat jam ordinatim applicata ab altera parte puncti Δ , five ultra centrum Ellipseos, ut AZ ; ac fiat BH dimidium lateris recti BE , ac jungatur $H\Delta$ quæ producat in directum. Per punctum Z ipsi BE parallela, ad occursum ipsius $H\Delta$, ducatur $Z\Theta$. Dico quadratum ex AZ duplum esse differentie triangulorum $B\Delta H$, $Z\Delta\Theta$.

Per punctum Γ ducatur ΓK ipsi BE parallela, quæ occurrat ipsi $H\Delta$ in puncto K : ac completa Sectione AB , producat AZ ad Λ . erit igitur (per primam hujus) quadratum ex $Z\Lambda$ duplum plani $\Gamma K\Theta Z$. Est autem $Z\Lambda$ ipsi $Z\Delta$ æqualis, adeoque quadratum ex AZ æquale est quadrilatero $\Gamma K\Theta Z$. Planum autem hoc $\Gamma K\Theta Z$ æquale est differentie triangulorum $\Gamma\Delta K$, $Z\Delta\Theta$; quorum triangulum $\Gamma\Delta K$ æquale est triangulo $B\Delta H$, ob $B\Delta$ ipsi $\Delta\Gamma$ æqualem. Quadratum igitur ex AZ duplum est differentie triangulorum $B\Delta H$, $Z\Delta\Theta$. Quod erat demonstrandum.




PROPO-

PROPOSITIO IV.

SI capiatur in Axe Parabolæ punctum cuius distantia à Vertice Sectionis æquetur dimidio Lateris recti, & ab eo ducantur rectæ quælibet ad Sectionem; earundem Minima erit ea quæ ad Verticem Sectionis ducitur, atque huic propiores minores erunt remotioribus: cujuscunque vero alterius ductæ quadratum superabit quadratum hujus, excessu quadrato interceptæ inter verticem & normalem ad axem ab extremitate ejus demissam æquali.

Sit Axis Parabolæ ΓE , in quo sit ΓZ æqualis dimidio lateris recti; & è puncto Z educantur ad Sectionem $AB\Gamma$ rectæ $AZ, BZ, \Theta Z, HZ$, quarum BZ sit Axi normalis. Dico quod ΓZ , quæ ad verticem Sectionis de puncto Z ducitur, minor est quavis aliâ ad Sectionem $AB\Gamma$ ductâ; eidemque propiores minores sunt remotioribus: quodque unaquæque earum potest simul quadratum ipsius ΓZ , una cum quadrato interceptæ inter Verticem Γ & normalem ad axem demissam.



Demittantur normales $HK, \Theta A, AE$; ac sit ΓM dimidium Lateris recti, adeoque ΓZ æqualis est ipsi ΓM : & (per 11^m primi) duplum rectangulum sub $\Gamma M, \Gamma K$ æquale est quadrato ex HK . Sed duplum rectangulum sub $\Gamma M, \Gamma K$ æquale est duplo rectangulo sub $\Gamma Z, \Gamma K$; igitur quadratum ex HK æquale est duplo rectangulo sub $\Gamma Z, \Gamma K$: ac duplum rectangulum sub $\Gamma Z, \Gamma K$ una cum quadrato ex KZ æquale erit quadratis ex HK & KZ simul, hoc est, quadrato ex HZ . Quoniam vero duplum rectangulum sub $\Gamma Z, \Gamma K$ una cum quadrato ex ZK (per 7. II^{di} Elem.) æquale est quadratis ex $\Gamma Z, \Gamma K$ simul; æqualia erunt quadrata ex $\Gamma Z, \Gamma K$ quadrato ex ZH . Quadratum igitur ex ZH excedit quadratum ex ΓZ quadrato ipsius ΓK . Ac pari argumento probabitur quadratum ex $Z\Theta$, & ex AZ excedere quadratum ex ΓZ quadratis interceptarum $\Gamma A, \Gamma E$, respectiva. Si vero BZ fuerit ordinatim applicata ad Axem ΓZ , erit duplum rectangulum ΓM in ΓZ , hoc est, duplum quadratum ex ΓZ , æquale quadrato ex BZ ; adeoque quadratum ex BZ excedit quadratum ex ΓZ ipso quadrato ex ΓZ . Hinc manifestum est AZ majorem esse quam BZ , & BZ quam ΘZ , & ΘZ quam HZ , ac HZ majorem esse quam ΓZ ; omniumque Minimam esse ΓZ : rectasque eidem propiores minores esse remotioribus. Patet etiam excessum quadrati cujuscunque alterius ductæ supra quadratum Minimæ, æqualem esse quadrato interceptæ inter normalem ab extremitate ejus ad Axem demissam & Sectionis Verticem. Q. E. D.

PROPOSITIO V.

SI vero detur in Axe Hyperbolæ punctum, quod à Vertice Sectionis distet dimidio Lateris recti; eadem evenient in hac quæ in Parabolâ: præterquam quod excessus quadratorum ductarum supra quadratum Minimæ æquales erunt rectangulis factis super interceptas inter ordinatim applicatas & Sectionis Verticem, similibusque contento sub Axe transverso & eodem Axe unâ cum latere ejus recto simul, ita ut in singulis Axi transverso respondeat intercepta inter ordinatim applicatam & Sectionis Verticem.

Sit $AB\Gamma$ Hyperbola, cujus Axis $\Delta \Gamma E$; ac fiat ΓZ æqualis dimidio lateris recti: & è puncto Z educantur ad sectionem rectæ quotcunque $ZA, ZB, ZH, Z\Theta$. Dico quod recta ΓZ minor est quavis aliâ de Z ad sectionem ducendâ; eidemque propior minor est remotiore: quodque ductæ cujuscunque $ZA, ZB, ZH, Z\Theta$ quadratum excedit

PROPOSITIO VI.

I Idem positis quæ prius, nisi quod jam Sectio sit Ellipsis, & Axis sit Axis major ejus; erit Minima omnium de puncto dato ductarum, ea quæ æqualis est semilateri recto; Maxima vero residua pars Axis; è reliquis vero, quæ propiores Minimæ sunt minores erunt remotioribus ab eâ: Quadratum autem cujusunque alterius ductæ excedet quadratum Minimæ rectangulo factio super interceptam inter ordinatim applicatam & Sectionis Verticem, quod simile sit contento sub Axe transverso & excessu ejusdem Axis supra Latus ejus rectum, ita ut Axis transversus respondeat interceptæ inter ordinatim applicatam & Sectionis Verticem.


Sit $\Delta B \Gamma$ Ellipsis, & Axis ejus major $\Delta \Gamma$; fitque $\Gamma \Delta$ æqualis semilateri recto: & è puncto Δ educantur ad Sectionem rectæ $\Delta Z, \Delta E, \Delta B, \Delta H$. Dico quod $\Delta \Gamma$ Minima est è rectis per Δ ducendis; quodque ΔA earundem Maxima est; quodque eæ quæ minus distant à $\Delta \Gamma$ minores sunt remotioribus ab eâdem: quodque quadratum ex ΔZ majus est quadrato ex $\Delta \Gamma$, spatio æquali rectangulo facto super interceptam inter ordinatim applicatam & verticem Γ , simili contento sub Axe $\Gamma \Delta$ & excessu ejusdem supra Latus rectum ejus.

Fiat $\Gamma\Theta$ dimidium Lateris recti, sitque centrum I , & ducantur normales ad Axem ZKN , EA , BAX : & per punctum A iisdem parallela sit recta ΔZ , Axique ΓA parallelae duae ξT , $N\tau$. Jam quadratum ex ZK (per primam hujus) duplum est quadrilateri $\Gamma\Theta NK$; quadratum vero ex ΔK duplum est trianguli $K\Delta\xi$, quia $K\Delta$ ipsi $K\xi$ æqualis est, ob æqualitatem ipsarum $\Delta\Gamma$, $\Gamma\Theta$. Quadratum igitur ex ΔZ duplum est triangulorum $\Delta\Gamma\Theta$, $\Theta\xi N$. Sed quadratum ex $\Delta\Gamma$ duplum est trianguli $\Delta\Gamma\Theta$, & rectangulum $\xi NT\tau$ duplum est trianguli $\xi\Theta N$: quadratum itaque ex ΔZ excedit quadratum ex $\Delta\Gamma$ rectangulo $\xi NT\tau$. Est autem $I\Gamma$ ad ΓA five $\Gamma\Theta$ sicut $\Delta\Gamma$ ad Latus rectum, & $N\tau$ est ad $\tau\Theta$ in eadem ratione; quare $N\tau$ est ad $\tau\Theta$ sicut $\Delta\Gamma$ ad Latus rectum. Sed $N\tau$ ipsi ΘT æqualis est, unde $\Delta\Gamma$ est ad Latus rectum sicut ΘT ad $\tau\Theta$; ac per conversionem rationis ΓA erit ad excessum ejus supra Latus rectum ut ΘT est ad $\tau\tau$. Sed ΘT ipsi ξT æqualis est, ob æquales $\Gamma\Delta$, $\Gamma\Theta$; adeoque $\tau\xi$ est ad $\tau\tau$ five ξN sicut $\Delta\Gamma$ ad excessum ejusdem supra Latus rectum: Axi vero $\Delta\Gamma$ respondet ipsa $\tau\xi$, quæ æqualis est interceptæ ΓK : rectangulum igitur $\xi NT\tau$ æquale est facto super $K\Gamma$, quod simile sit contento sub $\Delta\Gamma$ & excessu ejusdem supra Latus rectum. Quadratum igitur ex ΔZ excedit quadratum ex $\Delta\Gamma$ spatio æquali rectangulo facto super ΓK similique rectangulo dicto. Eodem modo constabit quadratum ex $E\Delta$ excedere quadratum ex $\Delta\Gamma$ rectangulo simili super interceptam ΓA facto.

Dico quoque quadratum ex ΔB eodem modo se habere. Quadratum enim ex ΔB duplum est quadrilateri $\Gamma \Delta X \Theta$; quadratum vero ex $\Gamma \Delta$ duplum est trianguli $\Gamma \Delta \Theta$: igitur differentia inter quadratum ex ΔB & ex $\Delta \Gamma$ æquale est duplo trianguli $\Delta \Theta X$. Sed rectangulum factum super $\Delta \Gamma$ jam descripto simile, duplum est trianguli $\Delta \Theta X$; quare differentia inter quadrata ex $B \Delta$ & $\Delta \Gamma$ æqualis est rectangulo facto super $\Delta \Gamma$, quod descripto simile sit. Dico etiam quadratum ex ΔH majus esse quam quadratum ex $\Gamma \Delta$ rectangulo facto super $M \Gamma$ similique præmonstrato. Est enim quadratum ex $H M$ (per primam hujus) duplum quadrilateri $M A O \Pi$: quadratum vero ex $M \Delta$ duplum est trianguli $\Delta M P$; quia ΔM ipsi $M P$ æqualis est, ob æquales $\Delta \Gamma, \Gamma \Theta$. Quadratum igitur ex ΔH duplum est utriusque, trianguli $A I O$ & trapezii $I \Delta P \Pi$ simul.


B

Tri-



Triangulum autem ΔIO æquale est triangulo $IO\Gamma$, quare quadratum ex ΔH duplum est trianguli ΓOI & spatii $IO\Delta P\Pi$; hoc est, duplum triangulorum $\Delta\Gamma O$ & $P O\Pi$. Sed quadratum ex $\Gamma\Delta$ duplum est trianguli $\Delta\Gamma O$: igitur differentia quadratorum ex $\Delta\Gamma$ & ΔH duplum est trianguli $P O\Pi$. Sed rectangulum factum super ΓM descripto simile duplum est trianguli $P O\Pi$: quare excessus quadrati ex ΔH supra quadratum ex $\Delta\Gamma$ æqualis est rectangulo præmonstratis simili super ΓM facto.

Similiter quadratum ex ΔA duplum est trianguli $\Delta A\Delta$; triangulum autem OIA æquale est triangulo OIG : igitur quadratum ex ΔA duplum est triangulorum $\Delta O O$, $\Delta\Gamma O$. Sed quadratum ex $\Gamma\Delta$ duplum est trianguli $\Delta\Gamma O$; differentia igitur quadratorum ex ΔA & $\Delta\Gamma$ duplum est trianguli $\Delta O O$. Rectangulum autem super $A\Gamma$ factum descriptoque simile est etiam duplum trianguli $\Delta O O$. Quocirca quadratum ex ΔA excedit quadratum ex $\Delta\Gamma$ rectangulo contento sub $A\Gamma$ & excessu ejusdem supra latus rectum figuræ. Est autem rectangulum factum super ΓA majus facto super ΓM , & quod super ΓM majus facto super $\Gamma\Delta$, & quod super $\Gamma\Delta$ facto super ΓA , & quod super ΓA facto super ΓK . Recta igitur $\Gamma\Delta$ Minima est e rectis per punctum Δ ad Sectionem ductis, & ΔA est earundem Maxima. Quoad cæteras vero, quæ propior est Minimæ minor est remotiore ab eadem. Excessus vero quadrati cujuscunque earum supra quadratum Minimæ rectangulum est rectangulo præmonstrato simile. Q. E. D.




PROPOSITIO VII.

Si sumatur punctum in Minimâ jam descriptâ, in quavis è tribus Sectionibus, à quo ducantur rectæ quælibet ad Sectionem: Earundem Minima erit recta jungens punctum illud & Sectionis Verticem. Cæterarum vero ad idem Axis latus ductarum, quæ propior est Minimæ minor erit remotiore.

Sit $AB\Gamma\Delta$ sectio Conica, cujus Axis ΔH , ac in eo recta Minima ΔE : inter Δ & E capiatur punctum aliquod ut Z , à quo ducantur ad Sectionem rectæ quælibet $Z\Gamma$, ZB , ZA . Dico quod ΔZ earundem Minima est, quodque huic propior minor est remotiore.

Jungatur enim ΓE , quæ proinde major erit quam ΔE ; unde angulus $\Gamma\Delta E$ major erit angulo $\Delta\Gamma E$; ac angulus $Z\Delta\Gamma$ multo major erit angulo $\Delta\Gamma Z$; adeoque ΓZ major erit quam $Z\Delta$. Pariter quoniam BE major est quam ΓE , angulus $B\Gamma E$ major erit angulo $\Gamma B E$, unde & multo major est angulus $B\Gamma Z$ angulo $ZB\Gamma$: quare BZ major est quam $Z\Gamma$. Eodemque modo demonstrabitur ΔZ majorem esse quam BZ . Ipsa igitur ΔZ Minima est rectarum de puncto Z ad Sectionem ductarum: è cæteris vero quæ eidem ΔZ propior est minor erit remotiore. Q. E. D.



PROPOSITIO VIII.


Si capiatur in Axe Parabolæ punctum, quod à vertice Sectionis plus distet dimidio Lateris recti; & à puncto illo versus Sectionis Verticem ponatur Axis segmentum æquale dimidio lateris recti; à cujus extremitate erigatur Axi normalis ad occursum Sectionis

onis producenda: & ducatur recta jungens punctum hujus occursum & punctum prius datum. Hæc recta Minima erit omnium de puncto illo in Axe dato ad sectionem ducendarum. E reliquis vero quæ ab utrâque parte eidem propior est minor erit remotiore. Excessus autem quadrati cujuscunque ductæ supra quadratum Minimæ æqualis erit quadrato partis interceptæ inter ordinatim applicatas, ab earundem extremitatibus ad Axem demissas.

Sit $AB\Gamma$ Parabola, cujus Axis $\Gamma\Delta$; in quo capiatur ΓE major dimidio Lateris recti; ac fiat ZE dimidio lateris recti æqualis, ipsique ΓE normalis ducatur ZH , & jungatur EH . Dico EH Minimam esse è rectis per punctum E ad Sectionem ductis: è cæteris vero ad puncta quævis ut A, B, Γ ductis, quæ eidem EH propior est minor erit remotiore, ab utroque ejus latere. Eductis etiam è puncto E ad Sectionem rectis $EK, EA, E\Lambda$, dico quadratum cujuscunque earum excedere quadratum ex EH , spatio æquali quadrato interceptæ inter ordinatim applicatam & punctum Z .

Ducantur ordinatim applicatæ, sitque BE Axi normalis, ac fiat ΓN dimidium Lateris recti. Erit igitur (per 11^{am} primi) duplum rectangulum sub $\Gamma N, \Gamma Z$ æquale quadrato ex KZ , eidemque æquale est duplum rectangulum sub $EZ, \Gamma Z$. Duplum autem rectangulum sub $EZ, Z\Xi$, una cum quadratis ex EZ & $Z\Xi$ simul, æquale est quadrato ex $E\Xi$; quare duplum rectangulum sub EZ & utrâque $\Gamma Z, Z\Xi$ simul sumptâ, una cum quadratis ex $EZ, Z\Xi$ simul, æquale est quadratis ex $K\Xi$ & ΞE ; hoc est quadrato ex KE . Sed duplum rectangulum sub EZ & utraque $\Gamma Z, Z\Xi$ simul duplum est rectanguli sub $EZ, Z\Gamma$: Quadratum igitur ex KE æquale est duplo rectangulo sub $EZ, Z\Gamma$ una cum quadratis ex $Z\Xi, EZ$. Quod autem fit sub $EZ, Z\Gamma$ bis, æquale est quadrato ex ZH , ob ZE ipsi ΓN æqualem: quare quadrata ex ZH, ZE & $Z\Xi$ simul sumpta æqualia sunt quadrato ex EK . Sed quadrata ex ZH, ZE æquantur quadrato ex EH ; unde quadratum ex EK æquale est quadratis ex $EH, Z\Xi$; adeoque excessus quadrati ex EK supra quadratum ex EH æqualis est quadrato ex $Z\Xi$. Eodem modo demonstrabitur quadratum ex $E\Lambda$ excedere quadratum ex EH quadrato ipsius ZM . Quoniam vero duplum rectanguli sub $\Gamma Z, ZE$ æquale est quadrato ex ZH , ob ZE ipsi ΓN æqualem: erit etiam excessus quadrati ex ΓE supra quadratum ex EH æqualis quadrato ex ΓZ . Est autem $Z\Xi$ minor quam ZM , & ZM quam $Z\Gamma$: recta igitur EH minor est quavis recta per E ad Sectionem ductâ inter punctum H & Verticem Γ .

Pariter quadratum ex BE æquale est duplo rectangulo sub $\Gamma N, \Gamma E$; hoc est sub $EZ, \Gamma E$ bis: quod autem fit sub $\Gamma Z, ZE$ bis æquale est quadrato ex ZH : quadratum igitur ex BE æquale est quadratis ex EH & EZ simul sumptis. Unde quadratum ex BE excedit quadratum ex EH quadrato ipsius EZ . Quinetiam quadratum ex $\gamma\theta$ æquale est rectangulo sub $\Gamma\gamma, ZE$ bis, ob ZE ipsi ΓN æqualem. Quadratum autem ex γE excessus est quadratorum ex utraque $\gamma Z, ZE$ supra duplum rectangulum sub $\gamma Z, ZE$; quapropter rectangulum ΓZ in ZE bis, una cum quadratis ex $\gamma Z, ZE$ simul æquantur quadrato ex θE . Sed ΓZ in ZE bis una cum quadrato ex ZE , æquale est quadrato ex EH : excessus igitur quadrati ex θE supra quadratum ex EH æquale est quadrato ex γZ . Simili argumento differentia quadratorum ex AE & EH æqualis erit quadrato ex ΔZ . Est autem ΔZ major quam γZ , & γZ quam ZE . Recta igitur EH minor est quavis recta per punctum E ad Sectionem ducta; & quæ illi propior est minor est remotiore: & excessus quadrati alterius cujuscunque supra quadratum ejus æqualis est quadrato interceptæ inter ordinatim applicatam & punctum Z . Q. E. D.



ceptæ ZE . Quapropter differentia inter quadrata ex $E\Theta$ & EK æqualis est rectangulo facto super ZE , similique rectangulo descripto, ita ut ZE respondeat diametro transversæ. Pari modo demonstrabitur quadratum ex EA excedere quadratum ex $E\Theta$ rectangulo facto super ZN , similique prædicto; ita ut diameter transversa interceptæ ZN respondeat. Quinetiam quadratum ex FE duplum est trianguli FET , & quadratum ex $E\Theta$ duplum est quadrilateri $FEIX$; adeoque excessus quadrati ex FE supra quadratum ex $E\Theta$ duplum est trianguli IXT : quod æquale est rectangulo super FZ facto & prædescripto simili. Excessus igitur quadrati ex FE supra quadratum ex $E\Theta$ æqualis est rectangulo facto super FZ similique prædicto. Sed ZE minor est quam ZN , & ZN quam ZF ; adeoque recta $E\Theta$ minor est quam EK , & EK minor est quam EA , & EA quam EF . Recta igitur $E\Theta$ minor est quavis recta per punctum E inter Θ & Verticem F ad Sectionem ducta.

Verum etiam quadratum ex BE æquale est duplo quadrilateri $FEIT$, unde excessus quadrati ex EB supra quadratum ex $E\Theta$ erit duplum trianguli EXT : duplum autem hujus trianguli rectangulum est super ZE factum, simileque rectangulo jam dicto. Est quoque quadratum ex $M\xi$ (per primam hujus) duplum quadrilateri $FI\xi\gamma$, & quadratum ex $E\xi$ duplum trianguli $E\xi T$: quadratum igitur ex ME duplum est trianguli $TX\gamma$ & quadrilateri $FEIX$ simul sumpti. Sed demonstratum est quadratum ex ΘE duplum esse quadrilateri $FEIX$: quocirca rectangulum super $Z\xi$ factum & prædicto simile, cum scilicet duplum sit trianguli $TX\gamma$, excessus est quo quadratum ex EM superat quadratum ex $E\Theta$. Pari modo constabit quadratum ex EA excedere quadratum ex ΘE rectangulo super ZA facto prædictisque simili. Jam EZ minor est quam $Z\xi$, & $Z\xi$ quam ZA : quare ΘE minor est quam EB , & EB quam EM , & EM quam EA . Est igitur recta $E\Theta$ Minima omnium per punctum E ad Sectionem ductarum; & quæ ab utraque parte ipsi ΘE propior est minor est remotiore: & excessus quadrati cujuscunque earum supra quadratum ipsius ΘE æqualis est rectangulo facto super interceptam inter ordinatim applicatas & præmonstrato rectangulo simili. Q. E. D.

PROPOSITIO X.

SI sumatur in Axe majore Ellipseos punctum quod distet à Vertice Sectionis plusquam dimidio lateris recti; ac dividatur intercepta inter Verticem Sectionis & punctum illud, ita ut segmentum, quod interjacet Sectionis centrum & punctum divisionis, sit ad distantiam ejusdem puncti ab illo in Axe prius sumpto in ratione diametri transversæ ad latus rectum; & à puncto divisionis erigatur Axi normalis Sectioni occurrens; & ab occurso ducatur recta ad punctum in Axe sumptum: erit hæc Minima è rectis quæ per punctum illud ad Sectionem duci poterunt; & è cæteris quæ eidem propior est minor erit remotiore: excessus autem quadrati cujuscunque earum supra quadratum Minimæ æqualis erit rectangulo facto super interceptam inter ordinatim applicatas ab iisdem demissas, simili vero contento sub diametro transversa & excessu diametri transversæ supra latus rectum.

Sit ABF Ellipsis cujus Axis major AF , & centrum Δ ; ac sit EF major dimidio lateris recti, & fiat ΔZ ad ZE ut AF ad Latus rectum. Ad punctum Z erigatur normalis ZH quæ producat, ac jungatur EH . Dico EH Minimam esse è rectis ad Sectionem per punctum E ducendis; eidemque propiorem minorem esse remotiore ab eadem: excessum etiam, quo quadratum alterius cujuscunque ductæ superat quadratum ejus, æqualem esse rectangulo facto super interceptam inter punctum Z & ordinatim applicatam, quod simile sit contento sub Axe AF & excessu quo Axis ille superat latus rectum, ita ut Axi AF respondeat intercepta inter ordinatam & punctum Z .

C

Ducantur

Q. E. D.

PROPOSITIO XI.

Minima rectarum de centro Ellipseos ad Sectionem ductarum dimidium est Axis minoris; Maxima vero dimidium est axis majoris; Maximæque propior major est remotiore. Excessus autem quadrati cujuscunque ductæ supra quadratum Minimæ æqualis est rectangulo facto super interceptam inter ordinatim applicatam & Sectionis centrum, simili vero contento sub diametro transversâ & excessu ejusdem supra latus rectum.

Sit $AB\Gamma$ Ellipsis, cujus axis major $A\Gamma$, & minor BA ; centrumque E . Dico quod *Maxima* è rectis per centrum E ad Sectionem ductis est ipsa EF , *Minima* vero est EB ; quodque recta quæcunque ipsi EF propior major est remotiore ab eadem: quodque excessus quadrati cujuscunque earum supra quadratum ex BE æqualis est rectangulo facto super interceptam inter ordinatam applicatam & centrum E in axe $A\Gamma$ sumendam, quod vero simile sit rectangulo contento sub $A\Gamma$ & excessu ejusdem supra latus rectum ejus.

A geometric diagram featuring a circle with center \$E\$. A vertical diameter \$AB\$ passes through \$E\$, with \$A\$ at the bottom and \$B\$ at the top. A horizontal chord \$Z\Delta\$ intersects the vertical diameter at point \$M\$. Point \$N\$ lies on the right side of the circle's circumference. Several other points are labeled: \$\Gamma\$ at the very top, \$\Theta\$ near the top right, and \$\kappa\$ further right. Lines connect \$E\$ to \$H\$, \$I\$, \$A\$, and \$M\$. A line segment \$GQ\$ extends from the upper right towards the right edge. The diagram illustrates relationships between these points and lines within the circular geometry.


Pari argumento quadratum ex EF duplum est trianguli FEK , & quadratum ex BE duplum est trianguli $FE\Theta$; differentia igitur quadratorum ex FE & EB duplum est trianguli ΘEK . Hujus vero trianguli duplum æquale est rectangulo facto super FE similique descripto. Jam FE major est quam EP , & EP major quam EH , adeoque EF major est quam EH , & EH major quam EZ , & EZ quam EB . *Maxima* igitur è rectis per punctum E ductis est EF , *Minima* vero EB ; è cæteris vero, inter ipsas EF , EB ductis, quæ propius distat ab EF major est remotiore: & excessus quadrati cujuscunque ductæ supra quadratum ex EB æqualis est rectangulo facto super interceptam inter ordinatim ad axem AF applicatam & centrum Sectionis, simili vero rectangulo prædicto. Q. E. D.

PROPOSITIO XII.

S*I sumatur punctum quodlibet in rectâ aliquâ Minimâ ab Axe Sectionis ad Curvam ductâ, juxta jam demonstrata; à quo ducantur rectæ ad Sectionem ab uno ejus latere: earundem Minima erit pars illa hujus Minimæ quæ adjacet Sectioni, eidemque propior minor erit remotiore.*

Sit AB Sectio quævis Conica, cujus Axis BF ; sitque FA Minima aliqua ad Sectionem ducta: ac sumatur in ea punctum Δ inter ipsa F, A situm. Dico rectam ΔA Minimam esse è rectis ad hanc Sectionis partem de puncto Δ ducendis.

Ducantur enim $\Delta E, \Delta Z, \Delta B$, ac jungantur ZF, FE , ut & rectæ AE, EZ, ZB . Jam BF major est quam FA , quare angulus FAE major est angulo FEA . Angulus vero FBA major est angulo FEA , adeoque angulus EAA multo major erit angulo AEA , ac proinde EA major erit quam ΔA . Pariter cum ZF major est quam FE , erit angulus ZEF major angulo FZE ; unde angulus AEZ multo major erit quam EZA : ZA igitur major erit quam ΔE . Ac eodem modo demonstrabitur ΔB majorem esse quam ΔZ . Est itaque ΔA Minima rectarum ad hanc partem Sectionis ductarum, eidemque propior minor est remotiore. Idem quoque constabit de rectis ad alteram Sectionis partem ductis. Q. E. D.




PROPOSITIO XIII.

S*I à quovis puncto in Axe Parabolæ ducatur ad Sectionem recta Minima quæ contineat cum Axe angulum; erit angulus ille acutus: Demissâque ab extremitate ejus normali ad Axem, abscindet illa Segmentum ejus æquale dimidio Lateris recti.*

Sit AB Parabola, cujus Axis BF ; sitque Minima ad Parabolam ducta AF ; Dico quod angulus ad F est acutus, quodque normalis ab A ad BF demissa abscindit ab ea rectam æqualem dimidio lateris recti.

Quoniam recta AF Minima est, BF major erit dimidio lateris recti. Nam si non major fuerit eâ, vel æqualis erit ei vel minor eâ. quod si æqualis fuerit dimidio lateris recti, erit ipsa BF (per 4^m hujus) Minima; vel etiam si BF minor fuerit dimidio lateris recti, erit quoque (per 7^m hujus) Minima: adeoque BF minor esset quam FA , quod est contra Hypothesin. quare BF non est minor dimidio lateris recti, neque etiam æqualis ei, ergo major est eâ. Sit itaque FA æqualis dimidio lateris recti. Dico Axi normalem è puncto Δ erectam transire per A . Nam si aliter fuerit, sit normalis illa recta ΔE ; & FE (per octavam hujus) Minima erit è rectis de puncto F ad Sectionem ducendis: hoc autem absurdum est, nam AF minor est eâ. Igitur perpendicularis ad punctum Δ erecta transibit per A , ac ΔF dimidium erit lateris recti: erit quoque angulus AFB acutus, ob angulum BAA rectum Q. E. D.



PROPOSITIO XIV.


S*I ducatur à puncto in Axe Hyperbolæ recta Minima, quæ contineat cum Axe angulos deinceps: erit angulus ille, qui respicit Verticem Sectionis, acutus. Ac si ab extremitate Minimæ ducatur normalis ad Axem, dividet illa interceptam inter centrum Sectionis*

☉

& punctum unde educitur Minima in Segmenta, quorum quod adjacet centro erit ad alterum in ratione diametri transversæ ad Latus rectum.

Sit AB Hyperbola, cujus Axis BF ; sitque AF Minima de puncto F educta, ac sit centrum Δ . Dico angulum AFB acutum esse, ac normalem de puncto A ad axem BF demissam dividere ipsam FA in ratione axis transversæ ad Latus rectum.

Est enim recta BF (ut constat ex quinto hujus) major dimidio lateris recti, & recta BA dimidium est lateris transversæ; ratio itaque AB ad BF , minor est ratione lateris transversæ ad latus rectum. Dividatur AF in puncto E , ita ut segmenta sint in ratione lateris transversæ ad latus rectum: Dico normalem super ipsam AF




ad punctum E erectam transire per punctum A . Nam si hoc non ita sit, illi normalis sit EZ , ac jungatur FZ . Erit itaque FZ (per nonam hujus) Minima rectarum quæ duci possint per punctum F . Hoc autem absurdum est: posuimus enim AF Minimam esse. Transit igitur normalis è puncto E excitata per punctum Sectionis A ; & angulus AFB acutus est: ac normalis de puncto A demissa dividit rectam FA , ita ut segmentum AE sit ad EF in ratione lateris transversæ ad latus rectum Q. E. D.

PROPOSITIO XV.

Educta de puncto dato in Axe majore Ellipseos recta aliquâ Minima, si hæc Minima transeat per Centrum Sectionis, normalis erit super Axem majorem. Si vero transeat per aliud punctum, continebit cum Axe majore angulum obtusum versus centrum: & normalis ab extremitate Minimæ cadet inter punctum undeeducta est & Sectionis Verticem: ita ut intercepta inter normalem & centrum sit ad interceptam inter eandem normalem & punctum illud, in ratione diametri transversæ ad latus rectum.

Sit ABF Ellipsis, cujus Axis major AF & centrum I : educatur primum è puncto I ad Sectionem recta Minima IB . Dico rectam IB normalem esse super ipsam AF . Nam si non ita sit, sit IA normalis super AF ; adeoque (per 11^{am} hujus) IA foret minima recta de puncto I ducenda, contra Hypothesin; posuimus enim IB Minimam esse. Recta igitur IB normalis est super AF .

Porro si capiatur punctum aliud in Axe ut H , ac sit HZ Minima ab eodem H ducta: Dico angulum ZHI obtusum esse; ac si normalis de puncto Z ad AF demittatur, interceptam inter ordinatim applicatam & punctum I esse ad interceptam inter eandem ordinatam & punctum H , in ratione lateris transversæ ad latus rectum.



Quoniam enim ZH Minima est de puncto H ducta, erit HF (per septimam hujus) major dimidio lateris recti; ac recta FI dimidium est lateris transversæ: quare ratio IF ad HF minor erit ratione lateris transversæ ad latus rectum. Dividatur itaque HF in puncto K , ita ut IK sit ad KH ut latus transversum ad latus rectum: Dico normalem è puncto K occurrere Sectioni in puncto Z . Nam si hoc non ita sit, sit ea recta KA , ac proinde HA (per decimam hujus) minima erit è rectis per punctum H ducendis. Est autem HZ recta illa Minima: quod absurdum. Occurrit igitur normalis è puncto K Sectioni ad punctum Z , & angulus IHZ obtusus est; ac demissa de puncto Z super Axem AF normali ZK , IK erit ad KH sicut latus transversum ad latus rectum. Q. E. D.

D


PROPO

duplum æquale est rectangulo super AR facto, similique descripto. Quapropter Δr Maxima est è rectis ad Sectionem de puncto Δ ducendis; $\Delta\Delta$ vero earundem Minima est. E reliquis autem quæ propior est ipsi $r\Delta$ major est remotiore, & excessus quadrati ipsius $r\Delta$ supra quadratum alterius cujuscvis ductæ, æqualis est rectangulo facto super interceptam inter ordinatim applicatam & Verticem r , quod simile sit descripto. Q. E. D.

PROPOSITIO XVII.

SIT jam $\Delta \Gamma$ Axis minor Ellipseos, eique æquale sit dimidium lateris recti, ac sit centrum O . Dico quoque quod $\Delta \Gamma$ *Maxima* est è rectis de puncto A ad Sectionem ductis; quodque eidem propior major est remotiore: quodque excessus quadrati ejus supra quadratum cujusvis alterius ductæ, æqualis est rectangulo facto super interceptam inter ordinatim applicatam & Verticem r , quod simile sit rectangulo in præcedente Propositione descripto


Ordinetur hæc propositio ad modum præcedentis; eodemque omnino modo probabitur quadratum ex $\Lambda\Gamma$ majus esse quadrato ex ΛE rectangulo facto super $\Gamma\Theta$ descriptoque simili: pariterque quadratum ex $\Lambda\Gamma$ majus esse quadrato ex $\Lambda\Delta$ rectangulo facto super ΓH , similique rectangulo prædicto. Quinetiam quadratum ex BZ (per tertiam hujus) duplum est plani $\Lambda Z \times K$, & quadratum ex $Z\Lambda$ duplum est trianguli $\Lambda Z Z$, ut quadratum ex $\Lambda\Gamma$ duplum est trianguli $\Lambda\Gamma\Delta$, ob $\Lambda\Gamma$ ipsi $\Gamma\Delta$ æqualem. Triangulum vero $\Gamma O\Delta$ æquale est triangulo $K O \Lambda$: differentia igitur quadratorum ex $\Lambda\Gamma$ & ΛB æqualis est duplo triangulo $\Delta X Z$; duplum autem hujus trianguli æquale est rectangulo facto super ΓZ similique descripto: quod quidem eodem omnino modo demonstratur ac præcedentia. Recta



igitur AF major est quam AE , & AE quam AA , & AA quam AB . Proinde AF maxima est inter eductas de puncto A : quæque eidem propior est major est remotiore: & excessus quadrati ipsius AF supra quadratum alicujus alterius ductæ, æqualis est rectangulo facto super interceptam inter ordinatim applicatam & Verticem r , quod simile sit rectangulo contento sub *Axe minori* & excessu quo *latus rectum* superat eundem *Axem*. Q. E. D.

PROPOSITIO XVIII.

SI vero fuerit $\Gamma\Gamma$ Axis minor Ellipseos, cujus centrum N : ac fiat $\Gamma\Delta$ æqualis dimidio lateris recti. Dico $\Gamma\Delta$ *Maximam* esse è rectis de puncto Δ ad Sectionem ducendis, ΔA vero earundem *Minimam*: propiorem autem ipsi $\Gamma\Delta$, è rectis Sectionem secantibus, majorem esse remotiore: ex iis vero quæ extrinsecus Sectioni occurrunt, propiorem ipsi ΔA minorem esse remotiore: & excessum quadrati ipsius $\Gamma\Delta$ supra quadratum cujusvis alterius ductæ, æqualem esse rectangulo facto super interceptam inter punctum Γ & ordinatim applicatam, quod simile sit prædicto, nempe rectangulo sub Axe minore & excessu lateris ejus recti supra eundem Axem.




Ducantur rectæ $\Delta Z, \Delta E, \Delta B$, cæteræque ut in figura præcedente: ac pari argu-
mento patebit quadratum ex $\Gamma \Delta$, majus esse quadrato ex $Z \Delta$ rectangulo facto su-
per $\Gamma \Delta$ similique prædicto; & quadratum ex $\Gamma \Delta$ majus esse quadrato ex $E \Delta$,
D 2 rectan-

rectangulo priori simili, facto super interceptam $\Gamma\Theta$; quadratumque ex $\Gamma\Delta$ majus esse quadrato ex $\Delta\Lambda$ rectangulo ejusdem speciei super ipsam $\Gamma\Lambda$ formato.

Quadratum autem ex $\Lambda\Delta$, duplum est trianguli $\Lambda\Delta P$, ob ΓM , $\Gamma\Lambda$ æquales; quadratum etiam ex $\Gamma\Delta$ duplum est trianguli $\Delta\Gamma M$: cumque triangulum $M\Gamma N$ æquale est triangulo $\Lambda N Z$, erit igitur excessus quadrati ex $\Gamma\Delta$ supra quadratum ex $\Lambda\Delta$ æqualis duplo triangulo $\Xi M P$, cujus trianguli duplum æquale est rectangulo facto super $\Lambda\Gamma$ ejusdem speciei cum prædicto. Quare $\Delta\Gamma$ major est quam ΔZ , & ΔZ quam ΔE , & ΔE quam ΔB , & ΔB quam ΔA .


Quinetiam quadratum ex $\Pi\Xi$ (per tertiam hujus) duplum est quadrilateri $\Xi O \Pi A$, & quadratum ex $\Delta\Pi$ duplum est trianguli $\Delta\Pi K$; quare quadratum ex $\Xi\Delta$ duplum est utriusque, Trapezii $\Xi O \Pi A$ & trianguli $\Pi\Delta K$ simul sumpti. Quadratum autem ex $\Gamma\Delta$ duplum est trianguli $\Gamma M \Delta$, & triangulum $\Gamma M N$ triangulo $\Lambda N Z$ æquale est. quadratum igitur ex $\Xi\Delta$ æquale est duplo triangulo $O M K$, hoc est, rectangulo facto super $\Gamma\Pi$, ejusdem speciei cum jam descriptis in præcedentibus duabus propositionibus. Pari argumento demonstratur quadratum ex $\Gamma\Delta$, excedere quadratum ex $\Delta\tau$, rectangulo simili super $\Gamma\tau$ facto. Nec aliter constabit quadratum ex $\Gamma\Delta$ majus esse quadrato ex $\Delta\Sigma$, rectangulo ejusdem speciei super $\Gamma\gamma$ formato. Est autem excessus quadrati ex $\Delta\Gamma$ supra quadratum ex ΔA æqualis rectangulo descripto simili, super ΓA facto; quare ΔA minor est quam $\Delta\Xi$, & $\Delta\Xi$ quam $\Delta\tau$, & $\Delta\tau$ quam $\Delta\Sigma$. Est igitur $\Delta\Gamma$ Maxima è ductis per punctum Δ , earundem vero minima est ΔA ; & inter eas quæ Sectionem intersecant, quæ propior est ipsi $\Delta\Gamma$ major est remotiore: ex iis vero quæ Sectioni extrinsecus occurrunt, quæ ipsi ΔA propiores sunt minores sunt remotioribus. Quadratum etiam ex $\Gamma\Delta$ excedit quadratum cujusvis alterius ductæ, rectangulo facto super interceptam inter punctum Γ & ordinatim applicatam, quod simile sit descripto. Q. E. D.



PROPOSITIO XIX.

S*I capiatur in Axe minore Ellipseos punctum, quod à Vertice Sectionis majori intervallo distet quam dimidio Lateris recti: erit illa Maxima rectarum de puncto illo ad Sectionem ducendarum, quæ ad Verticem Sectionis ducitur. Reliquarum vero quæ huic propior est major erit remotiore.*

Sit $AB\Gamma$ Ellipsis, cujus Axis minor sit $\Lambda\Gamma$: & in eo capiatur punctum Δ , ita ut $\Gamma\Delta$ major sit semilatere recto. Dico $\Gamma\Delta$ maximam esse è rectis per punctum Δ ad Sectionem ductis, eidemque propiorem majorem esse remotiore. Sit autem ΓH dimidium lateris recti, & ducantur è puncto Δ rectæ ΔZ , ΔE , ΔB , ac jungantur $H Z$, $H E$, $H B$, atque etiam rectæ ΓZ , $Z E$, $E B$. Recta igitur ΓH (per tres proximas propositiones) major est quam $Z H$; adeoque angulus $\Gamma Z H$ major erit angulo $Z \Gamma H$: unde angulus $\Gamma Z \Delta$ multo major erit angulo $Z \Gamma \Delta$. Recta itaque $\Gamma\Delta$ major est quam $Z\Delta$. Similiter cum $H Z$ major est quam $H E$, angulus $Z E H$ major erit angulo $E Z H$, ac angulus $Z E \Delta$ multo major erit angulo $E Z \Delta$: quocirca ΔZ major est quam ΔE . Eodemque argumento probabitur rectam ΔE majorem esse quam ΔB . $\Delta\Gamma$ itaque maxima est rectarum per punctum Δ ad Sectionem ductarum, eidemque propior major est remotiore. Q. E. D.




PROPO-

PROPOSITIO XX.

SI sumatur punctum in Axe minore Ellipseos, cujus distantia à Vertice Sectionis minor fuerit dimidio lateris recti, major vero Semiaxe minore; ac dividatur intercepta inter Verticem & centrum Sectionis, ita ut pars illa quæ est inter punctum divisionis & centrum sit ad distantiam ejusdem puncti à puncto prius sumpto, in ratione diametri transversæ ad latus rectum; & è puncto sic invento erigatur normalis ad Axem occurrens Sectioni, ac jungatur punctum prius sumptum cum puncto hujus occursus: erit juncta hæc rectarum omnium de puncto illo ducendarum Maxima; è reliquis vero quæ eidem propior est major erit remotiore; & quadratum ejus superabit quadratum cujuscunque alterius ductæ, rectangulo facto super interceptam inter punctum inventum & ordinatim applicatam ab extremitate ductæ demissam, quod simile sit contento sub diametro transversâ & differentiâ ejusdem & Lateris ejus recti.

Sit $AB\Gamma$ Ellipsis, ejusque Axis minor AT , & in eo capiatur punctum Δ , ita ut $\Gamma\Delta$ major sit dimidio ipsius AT sive diametri transversæ, minor autem dimidio lateris recti; & sit centrum E , & dividatur ET in puncto M , ita ut EM sit ad $M\Delta$ ut diameter transversa AT ad latus ejus rectum; (hoc autem fieri potest, quia dimidium lateris recti majus est quam AT) & erigatur è puncto M normalis ad AT ut ZM , & jungatur $Z\Delta$. Dico quod recta $Z\Delta$ Maxima est rectarum per punctum Δ ad Sectionem ductarum; quodque eidem ab utrâque parte propior major est remotiore; quodque excessus quadrati ipsius $Z\Delta$ supra quadratum alterius cujuscunque ductæ æqualis est rectangulo facto super interceptam inter punctum M & ordinatim applicatam, quod simile sit rectangulo in præcedentibus descripto.




Ducantur rectæ quælibet aliæ $\Delta\Theta$, ΔH , ΔZ , $\Delta\Lambda$, ac sit ΔB axi perpendicularis; & fiat ΓT æqualis dimidio lateris recti, & demittantur normales ΘN , $H K$, ΛE : jungatur etiam ET producatque, & agantur ipsi AT parallelæ, ut fecimus in præcedentibus. Quoniam vero ME est ad AM ut latus transversum ad latus rectum, & in eadem est ratione ET ad TT ; ut autem ET ad TT ita ME ad MT ; recta igitur $M\Delta$ æqualis est ipsi MT , & quadratum ex $M\Delta$ duplum est trianguli $M\Delta T$; quadratum autem ex MZ (per primam hujus) æquale est duplo Trápézio $\Gamma T M$: quadratum igitur ex ΔZ æquale est duplo trianguli $M\Delta T$ una cum duplo plani

E

 $\Gamma T M$

$\Gamma\tau\epsilon\mu$. Jam vero quadratum ex HK duplum est plani $K\Gamma T X$, & quadratum ex ΔK duplum est trianguli $K\Delta I$; quadratum igitur ex ΔH duplum est trianguli $K\Delta I$ una cum duplo quadrilateri $K\Gamma T X$: adeoque differentia quadratorum ex ΔZ & ΔH æqualis est duplo trianguli $XI\tau$. Duplum autem hujus trianguli æquale est rectangulo facto super KM , quod simile sit descripto. Hoc autem constabit eodem modo quo demonstravimus decimam sextam hujus. Pariter probabitur quadratum ex $Z\Delta$ excedere quadratum ex $\Delta\Theta$ rectangulo facto super MN , ejusdem speciei cum prædicto. Eodemque argumento, quadratum ex $\Gamma\Delta$ duplum est trianguli $\Delta\Gamma\xi$; unde differentia inter quadrata ex ΔZ & $\Delta\Gamma$ duplum erit trianguli $\xi\tau\tau$: quod quidem æquale est rectangulo facto super ΓM , speciei prædictæ. Recta igitur ΔZ major est quam ΔH , & ΔH quam $\Delta\Theta$, & $\Delta\Theta$ quam $\Delta\Gamma$.

Præterea quadratum ex ΔB (per tertiam hujus) duplum est quadrilateri $\Pi\Delta\Delta P$; quadratum autem ex $Z\Delta$ duplum est triangulorum $E\Gamma T$, $\Delta E\tau$; & triangulum $E\Gamma T$



æquale est triangulo ΠEA : igitur differentia inter quadrata ex ΔZ & ΔB duplum est trianguli $P\Delta\tau$, quod quidem æquale est rectangulo facto super ΔM speciei jam descriptæ. Hæc autem eodem modo demonstrantur ac propositio 16^{ma}. Parique argumento differentia quadratorum ex ΔZ & ΔA æqualis est rectangulo simili super MZ facto.

ΔZ igitur Maxima est rectarum per punctum Δ ad Sectionem ducendarum; è quibus etiam quæ eidem propior est major erit remotiore, & excessus quadrati ipsius ΔZ supra quadratum alterius cujuscvis ductæ æqualis est rectangulo speciei descriptæ, facto super interceptam inter punctum M & ordinatim applicatam. Hæc autem omnia ita se habent, siue Axis minor æqualis fuerit dimidio lateris recti, siue major, siue minor eo. Nam siue major fuerit eo, ac ducantur rectæ à puncto Δ ad modum figuræ primæ; vel à puncto A , ut in figura secunda; vel etiam à puncto exteriori, ut Δ in figura tertia; Maxima erit ea quam descripsimus: coincidente demonstrationis modo, in figuris secunda ac tertia, cum ea quam in prima jam exposuimus. Q. E. D.


PROPOSITIO XXI.

SI capiatur in aliquâ Maximâ, in Ellipsi juxta propositionem præcedentem ductâ ac ultra Axem minorem productâ, punctum aliquod: erit quoque Maxima omnium de puncto illo ad eandem Sectionis partem ducendarum, recta ea cujus Maxima est pars; & ab utroque ejus latere quæ eidem propior est major erit remotiore.

Sit $AB\Gamma$ Ellipsis, cujus Axis $A\Gamma$; sitque BA recta Maxima de puncto Δ ad Sectionem ducta, modo in Prop. præcedente descripto. In BA capiatur punctum aliquod

quod E, ita ut EB major sit quam BA. Dico EB Maximam esse è rectis per punctum E ad Sectionem ductis, eidemque utrinque propiorē maiorem esse remotiore.

Ducantur rectæ EZ, EH, EF, ac jungantur ΔZ, ΔH, ΔΓ, ut & ipsæ ΓH, HZ, ZB. Quoniam vero ΔB major est quam ΔZ, angulus BZΔ major erit angulo ZBΔ, & multo major erit angulus BZE angulo ZBE: quocirca BE major est quam EZ. Pariter cum ΔZ major est quam ΔH, angulus ΔHZ major erit angulo ΔZH, adeoque angulus ZHE multo major erit quam EZH; ac proinde recta ZE major erit quam EH. Eodem modo patebit EH maiorem esse quam EF. Recta igitur EB maxima est omnium de puncto E ad eandem Sectionis partem ductarum, quæque eidem EB propior est major erit remotiore. Idem autem eodem modo demonstrabitur si Maxima ducta fuerit per punctum A, vel per aliud quodvis punctum in Axe AΓ producto capiendum.




PROPOSITIO XXII.

SI ducatur à puncto in Axe minore Ellipseos sumpto, recta quæ contineat cum eodem Axe angulum; ac fuerit recta hæc Maxima quæ de puncto illo ad Sectionem duci possit: erit Maxima illa super Axem minorem normaliter erecta, si fuerit punctum illud Sectionis Centrum. Si vero non fuerit centrum, erit angulus quem cum Axe continet acutus versus centrum: ac si ab extremitate ejus demittatur normalis ad Axem, erit intercepta inter normalem illam & centrum Sectionis ad interceptam inter normalem & punctum in Axe sumptum, in ratione diametri transversæ ad latus rectum.

Sit ABΓ Ellipsis cujus Axis minor AΓ; transeat autem imprimis recta Maxima per centrum ut BA. Dico BA esse ad angulos rectos super AΓ. Nam si non ita sit, sit normalis illa ΔE. erit igitur ΔE (per 11^{am} hujus) Maxima ductarum de puncto Δ: quod est contra hypothefin; posuimus enim ΔB maximam esse. Quare recta ΔB est ad angulos rectos super AΓ.

Educatur jam recta quævis maxima ZH de puncto alio Z. Dico angulum ΓZH acutum esse; demissâque normali de puncto H ad Axem AΓ, erit intercepta inter ordinatim applicatam & centrum Δ, ad interceptam inter eandem ordinatim applicatam & punctum Z, in ratione diametri transversæ ad latus rectum.

Erit enim recta ZΓ vel major dimidio lateris recti, vel minor eo, vel eidem æqualis. Non autem æqualis est ei, tunc enim (per 16^{am}. 17^{am}. 18^{am}. hujus) foret maxima: neque major est eo, quia sic etiam (per 19^{am} hujus) foret Maxima: Est igitur ZΓ minor dimidio lateris recti. Quare si fiat intercepta ad rectam compositam ex intercepta & ZΔ simul sumptis, sicut diameter transversa ad Latus rectum, erit intercepta illa minor quam ΓΔ, quia ΔZ minor est excessu dimidii lateris recti supra dimidium lateris transversæ; adeoque ratio ejus ad ΓΔ minor erit ratione excessus lateris recti supra diametrum transversam ad diametrum transversam: est igitur in ea ratione ad minorem quam ΓΔ. Sit ea ΔK, ut sit KΔ ad ZK in ratione diametri transversæ ad latus rectum. Dico normalem super Axem AΓ ad punctum K erectam transire per punctum H. Nam si non eo transeat, cadat ad modum rectæ KΘ: & erit ΘZ (per demonstrata in 20^{ma} hujus) Maxima. Hoc autem fieri nequit, quia ex Hypothefi ZH est illa Maxima. Transsit igitur normalis de puncto H demissa per punctum K, ita ut ΔK sit ad KZ ut diameter transversa ad latus rectum. Manifestum autem est ΓZH angulum esse acutum, ob ZKH rectum. Q. E. D.



PROPO-


rectangulum sub HZ , HE æquale est quadrato ex AH . Angulus autem AHZ rectus est; quocirca (per Pappi Lemma I.) rectus est angulus $ZA E$. Q. E. D.

PROPOSITIO XXIX.

Idem autem aliter demonstrari potest hoc modo.

Sit AF aliqua è Sectionibus Conicis, cujus axis BA ; ac sit Minima recta AB , tangens vero AA . Dico angulum $BA B$ rectum esse.

Nam si non ita sit, normalis sit ipsi AA recta BE , adeoque AB major erit quam BE ; ac propterea AB multo major erit quam BZ : quod absurdum est. Posuimus enim AB Minimam esse. Quocirca si AB Minima sit, erit angulus $BA B$ rectus.




PROPOSITIO XXX.

Si ab extremitate Maximæ alicujus ad Ellipsin ductæ recta ducatur quæ Sectionem tangat. Dico Tangentem illam super Maximam normaliter insistere.

Sit ABF Ellipsis cujus Axis minor AF , & ab Axe ad Sectionem ducatur Maxima quædam ut OB ; tangat autem sectionem recta BA ad punctum B . Dico angulum BAO rectum esse.

Ducatur è centro ad Sectionem Axi normalis EK , quæ occurrat Maximæ OB in A ; quæque dimidium erit Axis majoris. Quoniam vero AF Axis minor est, & Axis EK occurrat Maximæ, erit (per 23^{am} hujus) pars ejus intercepta inter Sectionem & Axem majorem recta Minima; quare BA Minima est. Tangit autem Sectionem recta BA : BA igitur (per tres proximas Prop.) normaliter insistit super ipsam BA ; hoc est super Maximam BO . Q. E. D.




PROPOSITIO XXXI.

Si in qualibet trium Coni sectionum, ab eâ Minimæ alicujus extremitate quæ ad Sectionem est, erigatur recta eidem Minimæ ad angulos rectos: erit recta illa Sectionis Tangens.

Sit enim Sectio Conica AB , & in eâ recta Minima FB . Dico rectam è puncto B ductam, ipsique FB normalem, Sectionem tangere.

Nam si fieri possit ut non tangat, interfecet eam, ut recta $EB\Theta$: ac ducatur è puncto quodam Z , extra Sectionem quidem sumpto sed inter eam & ipsam $B\Theta$, recta alia ut BZ : & demittatur in BZ de puncto F normalis FHZ . Erit igitur angulus $F B Z$ acutus, ob angulum $F Z B$ rectum; adeoque FZ minor erit quam FB , ac FH multo minor quam FB : quod absurdum est. Posuimus enim FB Minimam esse. Recta igitur per punctum B ipsi BF normalis tanget Sectionem. Q. E. D.




PROPOSITIO XXXII.

Si recta tangat aliquam è Sectionibus Conicis, & erigatur è puncto contactus Tangenti normalis, quæ occurrat Axi: erit hæc recta Minima quæ per punctum illud ad Axem ducitur.

Sit

Sit enim $AB\Gamma$ Sectio Conica, Tangens vero ΔE , & de puncto contactus B erigatur tangenti normalis BZ , quæ producat ad occursum Axis. Dico BZ Minimam esse.

Nam si non ita fit, transeat Minima BH per punctum B ; ac angulus ΔBH (per 27^{am} & 28^{am} hujus) rectus erit: quod quidem absurdum est. Posuimus enim angulum ΔBZ rectum esse. Quocirca recta BZ Minima est. Quod erat demonstrandum.




PROPOSITIO XXXIII.

S*I à Maximæ alicujus extremitate illà quæ ad Sectionem est erigatur perpendicularis; erit ea Sectionis Tangens.*

Sit enim AB Sectio Conica, sitque $B\Gamma$ Maxima aliqua. Dico rectam per punctum B ductam, ipsique $B\Gamma$ normalem, sectionem tangere.

Nam si non ita sit, interfecet eam ad modum rectæ $B\Delta E$; & ducatur è puncto Γ recta $\Gamma\Delta A$, occurrens ipsi BE in Δ , Sectioni autem in A . Cum autem $\Gamma\Delta$ subtendit angulum rectum, ΓB vero angulum acutum, erit $\Gamma\Delta$ major quam ΓB . Sed $A\Gamma$ major est quam $\Delta\Gamma$; adeoque $A\Gamma$ multo major erit quam ΓB . Hoc autem absurdum est: posuimus enim ΓB Maximam esse. Quapropter recta per punctum B ducta, ipsique ΓB normalis, tanget sectionem. Q. E. D.




PROPOSITIO XXXIV.

S*I sumatur punctum in aliquâ vel è Maximis vel Minimis, extra Sectionem Conicam productis: erit portio ejus, quæ interjacet punctum illud & Sectionem, Minima rectarum de puncto illo ad utrumvis latus Sectionis egredientium, modo non produci sed in uno tantum puncto Sectioni occurrere concipiantur: è cæteris vero quæ eidem propinquior minor erit remotiore.*

Sit AB Sectio Conica, & $B\Gamma$ aliqua è Maximis vel Minimis, quæ producat; & in producta capiatur punctum quodvis Δ , à quo ducantur ad sectionem rectæ ΔA , ΔH , ΔE , quæ singulæ occurrant sectioni in uno tantum puncto. Dico $B\Delta$ Minimam esse rectarum de puncto Δ ad sectionem ducendarum, eidemque propiorem minorem esse remotiore.

Nam si ducatur BZ sectionem tangens in B , erit (per 27^{am} & 28^{am} ac 30^{am} hujus) angulus ZBA rectus; adeoque ΔZ major erit quam ΔB , ac ducta ΔE multo major quam ΔB . Jungantur rectæ HB , HE ; atque angulus ΔEH obtusus erit, angulus vero ΔHZ acutus: quapropter ΔH major erit quam ΔE . Ac pari argumento probabitur ΔA majorem esse quam ΔH . Possumus etiam idem demonstrare de rectis ab alterâ parte ipsius $B\Delta$ ducendis. Constat ergo Propositio.




PROPOSITIO XXXV.

I*N omni Sectione Conicâ, si ducantur plures Minimæ; erunt anguli comprehensi sub Axe & Minimis à Vertice Sectionis remotioribus majores comprehensis sub Axe & eidem Vertici propinquioribus.*

Sit autem imprimis Sectio Parabola ut $AB\Gamma$, cujus Axis $\Gamma\Delta$: sintque rectæ $A\Delta$, BE Minimæ. Dico angulum $A\Delta\Gamma$ majorem esse angulo $B\Gamma E$.


Demittantur normales AZ , BH : cumque BZ Minima est, erit (per 13^m hujus) EH dimidium lateris recti; ac (per eandem) erit etiam ΔZ æqualis dimidio lateris recti, ita ut EH æqualis sit ipsi ΔZ . Cathetus vero AZ major est Catheto BH : quare angulus $A\Delta Z$ major est angulo $B\Gamma H$. Q. E. D.



PROPOSITIO XXXVI.

SIT jam Sectio Hyperbola vel Ellipsis, cujus Axis AE & centrum Δ ; & sint AE , BZ Minimæ. Dico angulum $A\Delta E$ majorem esse angulo $BZ\Lambda$.

Demittantur normales $B\Theta$, AH ; & jungatur ΔKB . Erit igitur ΔH ad HE (per 14^m & 15^m hujus) sicut diameter transversa ad latus rectum; ac (per eandem) erit $\Delta\Theta$ ad ΘZ in eadem ratione: proinde ΔH erit ad HE ut $\Delta\Theta$ ad ΘZ ; ac permutando erit ΔH ad $\Delta\Theta$ sicut HE ad ΘZ . Sed ΔH est ad $\Delta\Theta$ ut KH ad $B\Theta$: quapropter HE est ad ΘZ sicut KH ad $B\Theta$. Anguli autem AHE , $B\Theta Z$ recti sunt, adeoque triangula KEH , $BZ\Theta$ similia sunt, & anguli KEH , $BZ\Theta$ æquales; angulus igitur $A\Delta E$ major est angulo $BZ\Lambda$. Q. E. D.




tando erit ΔH ad $\Delta\Theta$ sicut HE ad ΘZ . Sed ΔH est ad $\Delta\Theta$ ut KH ad $B\Theta$: quapropter HE est ad ΘZ sicut KH ad $B\Theta$. Anguli autem AHE , $B\Theta Z$ recti sunt, adeoque triangula KEH , $BZ\Theta$ similia sunt, & anguli KEH , $BZ\Theta$ æquales; angulus igitur $A\Delta E$ major est angulo $BZ\Lambda$. Q. E. D.

PROPOSITIO XXXVII.

SI in Hyperbola ducatur recta aliqua Minima quæ contineat cum Axe angulum: erit angulus ille minor angulo comprehenso sub alterutro Asymptotorum & rectâ quæ per Verticem Sectionis ducta Axi normalis est.

Sit Hyperbolæ AB Axis $\Gamma\Delta$, Asymptoti autem $Z\Gamma$, ΓH ; sitque recta quædam Minima $A\Delta$: & è puncto B erigatur Axi normalis ZBH . Dico angulum $A\Delta\Gamma$ minorem esse angulo ΓZH .

Fiat $B\Theta$ dimidium lateris recti, sive cadat punctum Θ super H , vel inter B , H , vel extra ea; ac jungatur $A\Gamma$. Jam ΓB est ad $B\Theta$, sicut axis transversus ad latus rectum; est autem ΓE ad $E\Delta$ (per 14^m hujus) sicut axis transversus ad latus rectum: quare ΓB est ad $B\Theta$ ut ΓE ad $E\Delta$. Sed KB est ad $B\Gamma$ ut AE ad $E\Gamma$, adeoque ex æquo erit KB ad $B\Theta$ sicut AE ad $E\Delta$. Ratio autem KB ad $B\Theta$ minor est ratione ZB ad $B\Theta$; & ZB est ad $B\Theta$ (per 3^m II^{di}) ut ΓB ad BZ . Quapropter ratio AE ad $E\Delta$ minor est ratione ΓB ad BZ . Hæc vero latera continent angulos rectos: unde manifestum est angulum $A\Delta\Gamma$ minorem esse angulo ΓZB . Q. E. D.




PROPOSITIO XXXVIII.

SI ducantur à Sectione aliqua Conica rectæ duæ Minimæ ad idem Axis latus; occurrent illæ productæ ad oppositam Sectionis partem, sive ultra Axem.

Sit

Sit sectio Conica AB super Axe $\Gamma\Delta$; sintque $A\Delta$, BE duæ Minimæ à sectione ad Axem ductæ. Dico rectas $A\Delta$, BE productas, ad alterum sectionis latus invicem occursuras.

Quoniam enim (per 35^m & 36^m hujus) angulus $A\Delta\Gamma$ major est angulo $B\Gamma E$, erunt anguli $A\Delta E$, $\Delta E B$ majores duobus rectis: erunt igitur anguli iisdem deinceps minores duobus rectis: sunt autem $A\Delta$, BE duæ Minimæ; occurrunt igitur productæ, ad alteram sectionis partem. Q. E. D.




PROPOSITIO XXXIX.

Rectæ Maximæ à Sectione ad Axem Ellipseos minorem ductæ occurrunt invicem ad eandem Sectionis partem.

Sit $AB\Gamma$ Ellipsis, cujus Axis minor $A\Delta$. Dico Maximas à Sectione $AB\Gamma$ ductas occurrere inter se ad partes Semi-Ellipseos $AB\Delta$.

Nam si possibile sit, ut non sese interfecent; sint eæ duæ rectæ Maximæ BE , ΓZ , & ducantur normales BH , $\Gamma\Theta$, ac sit centrum K . Erit igitur $K\Theta$ ad ΘZ ut diameter transversa ad latus rectum (per 22^m hujus) similiterque KH erit ad HE in eadem ratione: quare per conversionem rationis KH erit ad KE ut $K\Theta$ ad KZ ; ac permutando KH erit ad $K\Theta$ ut KE ad KZ . Sed KZ minor est quam KE : igitur $K\Theta$ minor erit quam KH , quod est contra Hypothesin. Minimæ igitur BE , ΓZ occurrunt invicem: cumque $K\Theta$ minor est quam KZ , occurrunt ad easdem partes Axis ad quas puncta Γ , B . Quod erat demonstrandum.




PROPOSITIO XL.

Concursus rectarum Minimarum in Ellipsi fiunt intra angulum comprehensum sub Semiaxe ad quem ducuntur Minimæ & sub Axe minore.

Sit $\Delta E\Gamma$ Ellipsis, cujus Axis minor $\Delta B O$; sintque Minimæ duæ $E\Theta$, ZH . Dico rectas $E\Theta$, ZH productas concurrere intra angulum $\Gamma B O$.

Producantur enim hæ rectæ ab H & Θ ad occursum ipsius $\Delta B O$, in punctis K , Λ . Quoniam vero $E\Theta$ Minima est, erit quoque $E\Lambda$ (per conversam Prop. XXIII. hujus) Maxima. Pariter cum ZH producta occurrat ipsi $B O$ in puncto K , erit etiam ZK Maxima. Occurrunt autem inter se $E\Theta$, ZH productæ (per 38^m hujus) ad alteram partem Axis. Sed rectæ $E\Lambda$, ZK , cum Maximæ sint, occurrunt invicem (per 39^m hujus) ad eandem Axis minoris partem. Situm est igitur punctum occursum intra angulum rectis ΓB , $B O$ comprehensum. Q. E. D.




PROPOSITIO XLI.

Rectæ Minimæ in Parabola vel Ellipsi de Sectione ad Axem ductæ & productæ occurrent etiam Sectioni ad alterum ejus latus.

Res quidem in Ellipfi per se satis manifesta est.

Sin autem sectio $AB\Gamma$ Parabola fuerit axe BA , sit recta aliqua Minima AA . Dico AA productam occurrere alteri sectionis parti $B\Gamma$.

Quoniam enim sectio Parabola est, ac ducitur ad diametrum ejus recta AA ; producta ea (per 27^{am} primi) conveniet cum sectione $B\Gamma$. Q. E. D.




PROPOSITIO XLII.

IN Hyperbola, si diameter transversa non major fuerit latere ejus recto, nulla Minima de Sectione ad Axem duci potest, quæ occurrat alteri Sectionis lateri. Si vero diameter transversa major fuerit latere ejus recto, pars Minimorum producta occurret alteri Sectionis lateri: altera vero pars non item.

Sit Hyperbolæ $AB\Gamma$ Axis AE , ac centrum Δ ; sitque recta aliqua Minima AE ; nec sit diameter transversa major latere recto. Dico quod AE producta non occurret sectioni.

Sint Asymptoti duæ $\Delta Z, \Delta H$; ac sit ZBH ipsi AB ad angulos rectos: ac fiat $B\Theta$ dimidium lateris recti. Quoniam vero diameter transversa non major est latere recto, ΔB non major erit quam $B\Theta$; ac ΔB est ad $B\Theta$ (per tertiam II^{di}) sicut quadratum ex BA ad quadratum ex BZ ; quadratum igitur ex BA non majus erit quadrato ex BZ , adeoque BA non major quam BZ : unde & angulus BZA non major erit angulo ZAB . Sed (per 37^{am} hujus) angulus BZA major est angulo AEB ; quare angulus ZAB major est angulo AEB . Angulus autem ZAB æqualis est angulo $B\Delta H$: quare angulus $B\Delta H$ major est angulo AEB . Jam angulus qui ipsi AEB deinceps est una cum angulo AEB æqualis est duobus rectis; adeoque angulus $E\Delta H$ una cum angulo ipsi AEB deinceps major est duobus rectis; rectæ igitur $AE, \Delta H$ productæ ad partes E & H non occurrent inter se. Sed & recta AE non occurret sectionis parti $B\Gamma$ (per octavam II^{di}) quia non occurrit Asymptoto ΔH . Q. E. D.




PROPOSITIO XLIII.

QUOD si fuerit diameter transversa major latere recto. Dico Minimorum aliquas à Sectione $AB\Gamma$ ductas & productas occurrere Sectioni ab altera ejus parte; aliquas vero eidem non occurrere.

Sint duæ Sectionis Asymptoti $\Delta Z, \Delta H$; cumque diameter transversa major est latere recto, erit ΔB major dimidio lateris recti $B\Theta$; adeoque ratio ipsius ZB ad $B\Theta$ major erit ratione ZB ad BA . Fiat KB ad $B\Theta$ sicut ZB ad BA ; & jungatur ΔK , quæ producta (per 2^{am} II^{di}) occurret sectioni. Occurrat autem in puncto A ; & ab A demittatur Axi ΔE normalis AA ; ac fiat ΔA ad ΔE sicut ΔB ad $B\Theta$, five ut diameter transversa ad latus rectum. Quoniam vero normalis est AA , erit intercepta AE (per nonam hujus) aliqua è Minimis.

Cum autem BK est ad BA sicut AA ad ΔA , atque etiam ΔB est ad $B\Theta$ sicut ΔA ad ΔE ; erit ex æquo AA ad ΔE sicut BK ad $B\Theta$. Sed BK est ad $B\Theta$ ut ZB ad BA ; quare AA est ad ΔE sicut ZB ad BA . Anguli autem ZBA, AAE sunt æquales, quia recti; atque adeo triangula ZBA, AAE similia, & angulus ZAB angulo AEA æqualis:



qualis: unde & angulus $\angle BAH$ eidem angulo $\angle AEA$ æqualis est. Quocirca rectæ ΔH & ΔE non occurrent inter se, atque ΔE producta non occurret sectioni nisi in puncto Δ ; quia (per octavam II^{di}) non occurrit utrique Asymptoto ΔH , ΔZ : est enim ΔE ipsi ΔH parallela. Recta igitur ΔE non occurrit sectioni nisi in solo puncto Δ .


At vero Minimæ illæ, quæ occurrunt axi inter puncta B , E , (per 36^{am} hujus) minores angulos cum Axe comprehendunt quam $\angle BAH$: (etenim angulus $\angle AEB$ æqualis est angulo $\angle BAH$, & anguli Minimarum istarum inter B & E transeuntium minores sunt angulo $\angle AEB$, hæc est angulo $\angle BAH$) adeoque productæ non occurrent ipsi ΔH ; ac proinde non interfecabunt sectionem $B\Gamma$, ob causam jam dictam, nempe Prop. 8^{am} II^{di}. Cæteras vero Minimas comprehendentes cum Axe angulos majores angulo $\angle AEB$, quia ipsi ΔH occurrunt, etiam interpositæ sectioni $B\Gamma$ occurrere necesse est. Q. E. D.

PROPOSITIO XLIV.

SI ad Axem alicujus Sectionis Conicæ ducantur duæ Minimæ, quæ ad occursum producantur; & de puncto occursum earundem ducatur alia quævis recta, quæ Axem secans Sectioni conveniat: portio ejus inter Sectionem & Axem intercepta non erit Minima. Ac si hæc ducta non fuerit intermedia inter duas Minimas, & agatur ab ea extremitate ejus quæ est ad Sectionem Minima; abscindet hæc Minima portionem Axis Vertici Sectionis adjacentem, quæ major erit portione ejusdem ab ipsa ducta abscissâ. Si vero ducta intermedia fuerit inter duas Minimas, ea Minima, quæ ab extremitate ejus ad Axem ducitur, auferet portionem Axis Vertici Sectionis adjacentem minorem portione ab ipsa ducta abscissâ. Quod si Sectio fuerit Ellipsis, oportebit & duas Minimas & tertiam ductam occurrere eidem majori Semi-axi Sectionis.

Imprimis autem sit Sectio Parabola ut $AB\Gamma$, cujus Axis ΔH ; ac sint duæ Minimæ ab eadem ductæ BZ , ΓE , quæ occurrant inter se in puncto O : & educatur è puncto O recta KL , primum extra ipsas OG , OB . Dico KL non esse aliquam è Minimis, Minimamque per punctum K ductam abscindere ab Axe majorem portionem, Vertici sectionis Δ conterminam, quam est ΔA .

Demittantur normales OH , BP , GN , KM ; ac sit OH dimidium lateris recti. Quoniam vero BZ Minima est, & BP normalis, erit (per 13^{am} hujus) PZ æqualis dimidio lateris recti; adeoque PZ æqualis est ipsi OH : unde & PO ipsi ZH æqualis erit, ac HO erit ad OP sicut PZ ad ZH . Sed PZ est ad ZH ut PB ad OH ; unde rectangulum sub OH , HO æquale erit rectangulo sub BP , PO . Eodemque modo demonstratur rectangulum sub GN , NO æquale esse rectangulo sub OH , HO : æquale est igitur rectangulum sub PB , PO rectangulo GN , NO ; ac proinde PB est ad GN ut NO ad OP . Jungatur $B\Gamma$ ac producat ad occursum Axis ΔH in puncto γ ; producat etiam normalis KM ad Σ . Erit igitur PB ad GN sicut $P\gamma$ ad γN , adeoque $P\gamma$ est ad γN sicut NO ad OP , ac dividendo PN est




est ad γN sicut ΠN ad $\Theta \Pi$: æqualis est igitur recta γN ipsi $\Pi \Theta$. Est igitur γM minor quam $\Pi \Theta$, unde ratio ΠM ad $M \gamma$ major est ratione ΠM ad $\Pi \Theta$; & componendo ratio $\Pi \gamma$ ad γM , hoc est ΠB ad $M \Sigma$, major erit ratione $M \Theta$ ad $\Theta \Pi$: adeoque rectangulum sub $B \Pi$, $\Pi \Theta$ majus erit rectangulo sub ΣM , $M \Theta$, ac proinde multo majus rectangulo sub $K M$, $M \Theta$. Demonstravimus autem rectangulum sub $B \Pi$, $\Pi \Theta$ æquale esse rectangulo sub $O H$, $H \Theta$: adeoque rectangulum $O H \Theta$ majus est rectangulo $K M \Theta$; ac ratio $O H$ ad $K M$, sive $H A$ ad $A M$, major est ratione $M \Theta$ ad ΘH : quocirca $H \Theta$ major est quam $M A$. Sed $H \Theta$ æqualis est dimidio lateris recti, ergo $M A$ minor est dimidio lateris recti: Minima igitur à puncto K ducenda auferet ab Axe segmentum majus quam $A \Delta$: unde patet (per 24^{am} hujus) $K A$ non esse Minimam.

Jam si ducatur ad alterum latus ipsarum $B O$, $O \Gamma$, etiam extra eas, alia quævis recta ut $O A$. Dico partem ejus $A \tau$ non esse Minimam: Minimam vero è puncto A ductâ auferre ab Axe portionem majorem quam $A \tau$. Sit $A X$ normalis ipsi ΔH , & (per jam demonstrata) recta $\Pi \Theta$ æqualis est ipsi γN ; unde γX major erit quam $\Pi \Theta$; ac ratio ΠX ad $X \gamma$ minor erit ratione $X \Pi$ ad $\Pi \Theta$. Dividendo autem ratio $X \Pi$ ad $\Pi \gamma$ minor erit ratione ejusdem ad $X \Theta$; ac componendo ratio $X \gamma$ ad $\gamma \Pi$, hoc est $X P$ ad ΠB , minor erit ratione $\Pi \Theta$ ad ΘX : quare ratio $X P$ ad ΠB minor est ratione $\Pi \Theta$ ad ΘX ; ac rectangulum $\Theta X P$ minus erit rectangulo $B \Pi \Theta$; adeoque rectangulum $A X \Theta$ multo minus erit rectangulo $B \Pi \Theta$. Sed $B \Pi \Theta$ æquale est rectangulo $O H \Theta$, quocirca $A X \Theta$ minus est rectangulo $O H \Theta$; ad proinde ratio $A X$ ad $O H$, hoc est $X \tau$ ad τH , minor erit ratione $H \Theta$ ad ΘX : erit igitur $H \Theta$ major quam $X \tau$. Sed ΘH dimidium est lateris recti, quare $X \tau$ minor est dimidio lateris recti. Minima itaque de puncto A ducenda auferet rectam majorem quam $X \tau$; adeoque majus erit segmentum Axis, à sectionis Vertice Δ sumptum, quam segmentum $A \tau$ rectâ $A \tau$ abscissum: ac propterea (per 24^{am} hujus) recta $A \tau$ non est aliqua è Minimis.

Quinetiam si capiatur recta aliqua ut $O \Gamma$ inter ipsas $O B$, $O \Gamma$ intermedia: Dico quod ΓT non est Minima, quodque Minima de puncto Γ ducta abscindet segmentum Axis, vertici Δ adjacens, minus portione ejus ΔT . Demittatur enim normalis $\Gamma \xi$. Cumque jam probatum sit $\Pi \Theta$ æqualem esse ipsi γN , erit $\xi \gamma$ major quam $\Pi \Theta$; adeoque ratio $\Pi \xi$ ad $\xi \gamma$ minor ratione ejusdem ad $\Pi \Theta$: & componendo ratio $\Pi \gamma$ ad $\gamma \xi$ minor erit ratione $\xi \Theta$ ad $\Theta \Pi$. Sed $\Pi \gamma$ est ad $\gamma \xi$ ut $B \Pi$ ad $\xi \xi$; unde ratio $B \Pi$ ad $\xi \xi$ minor est ratione $\xi \Theta$ ad $\Theta \Pi$: ac rectangulum $B \Pi \Theta$ minus rectangulo $\xi \xi \Theta$, multoque minus rectangulo $\tau \xi \Theta$. Rectangulum autem $O H \Theta$ æquale est rectangulo $B \Pi \Theta$; quare rectangulum $O H \Theta$ minus est facto sub $\tau \xi$, $\xi \Theta$: unde & ratio $O H$ ad $\tau \xi$ minor erit ratione $\xi \Theta$ ad ΘH . Sed $O H$ est ad $\tau \xi$ sicut $H T$ ad $\tau \xi$; quare $H T$ est ad $\tau \xi$ in minore ratione quam $\xi \Theta$ ad ΘH : recta igitur $H \Theta$ minor est quam $\tau \xi$. Verum $H \Theta$ dimidium est lateris recti; quapropter recta Minima de puncto Γ ducenda auferet portionem minorem quam $\xi \tau$: ac segmentum Axis Vertici Sectionis adjacens minus erit quam ΔT : unde ΓT non est Minima, sed Minima de puncto Γ ducenda auferet Axis portionem minorem quam ΔT . Q. E. D.

PROPOSITIO XLV.

SI vero sectio fuerit Hyperbola vel Ellipsis ut $A B \Gamma \Delta$, Axe $M \Delta$ centro vero N ; & ducantur in sectione duæ Minimæ, ut $B E$, ΓZ ; à quarum concursu in puncto Θ agatur




agatur recta $\Theta\Lambda\kappa$. Dico portionem ejus inter sectionem & Axem interceptam non esse aliquam è *Minimis*: sed *Minimam* de puncto κ ductam abscindere segmentum Axis majus quam $\Delta\Lambda$.

De puncto Θ demittatur ad Axem normalis recta ΘM , ac per centrum N ipsi $M\Theta$ parallela ducatur recta $N\Sigma$, ac per punctum Θ ipsi MN parallela sit ΘZ , & producatur $N\Sigma$ ad occursum ipsarum $\Theta\Gamma$, ΘB : iis autem occurrat in punctis β , θ . Fiat

etiam utraque $Z\P$ ad ΠN & NO ad OM in ratione diametri transversæ ad latus rectum, ac ducantur Axi normales OP , $B\Sigma$, ΓH , $\kappa\tau$; junctaq; ΓB producat ad τ , ubi occurrat rectæ ΠX axi ΔN parallelæ per punctum Π ductæ. Quoniam vero BE , ΓZ sunt *Minimæ*, ac $B\Sigma$ Axi normalis est, erit $N\Sigma$ ad ΣE (per 9^{am} & 10^{am} hujus) sicut diameter transversa ad latus rectum; quare NO erit ad OM sicut $N\Sigma$ ad ΣE : ac componendo in Hyperbola vel dividendo in Ellipsi MN erit ad NO sicut EN ad $N\Sigma$. Dein auferendo duas minores à duabus majoribus erit ME ad $O\Sigma$ sicut MN ad NO . Est autem $O\Sigma$ ipsi $\xi\tau$ æqualis, adeoque EM est ad $\xi\tau$ sicut MN ad NO . Quoniam

vero $Z\P$ est ad ΠN sicut diameter transversa ad latus rectum, erit $Z\P$ ad ΠN ut $N\Sigma$ ad ΣE ; quare componendo in Hyperbola vel dividendo in Ellipsi erit ZN ad $N\P$ sive $\Sigma\tau$, sicut NE ad $E\Sigma$; hoc est, ut $N\theta$ ad $B\Sigma$, ob similia triangula: & addendo terminos in Hyperbola, vel auferendo minores è majoribus in Ellipsi, erit



$\Sigma\theta$ ad $B\tau$ sicut NE ad $E\Sigma$, vel sicut ZN ad $N\P$. Jam ratio rectanguli ZNM ad rectangulum ΠNO componitur ex ratione ZN ad $N\P$ & MN ad NO : demonstravimus autem ZN esse ad $N\P$ sicut $\Sigma\theta$ ad $B\tau$, & MN esse ad NO ut EM ad $\xi\tau$, ratio igitur rectanguli $NM\Theta$ ad rectangulum $N\P\xi$ componitur ex ratione $\Sigma\theta$ ad $B\tau$ & ratione EM ad $\xi\tau$. Sed rectangulum $NM\Theta$ æquale est facto sub $\Sigma\theta$ & EM , quia $\Sigma\theta$ est ad ΘZ sicut ΘM ad ME : rectangulum igitur $N\P\xi$ æquale est contento sub $B\tau$, $\tau\xi$. Eodem modo demonstrabitur rectangulum $N\P\xi$ æquale esse rectangulo $\Gamma\delta\xi$; atque adeo rectangulum sub $B\tau$, $\tau\xi$ æquale esse rectangulo sub $\Gamma\delta$, $\delta\xi$: unde $B\tau$ est ad $\Gamma\delta$ ut $\delta\xi$ est ad $\xi\tau$. Sed $B\tau$ est ad $\Gamma\delta$ sicut $\tau\tau$ ad $\tau\delta$; quare $\tau\tau$ est ad $\tau\delta$ sicut $\delta\xi$ ad $\xi\tau$; ac dividendo $\tau\delta$ est ad $\delta\tau$ sicut $\tau\delta$ ad $\xi\tau$: unde patet $\xi\tau$ ipsi $\tau\delta$ æquari.

Hinc constabit $\tau\xi$ majorem esse quam $\tau\gamma$; ratio itaque $\gamma\tau$ ad $\tau\gamma$ major erit ratione ejusdem ad $\tau\xi$, ac componendo erit ratio $\tau\tau$ ad $\tau\gamma$ major ratione $\gamma\xi$ ad $\xi\tau$.


H

 $\xi\tau$.

$\xi\tau$. Sed $\tau\tau$ est ad $\tau\gamma$ sicut $\beta\tau$ ad $\epsilon\gamma$; ratio igitur $\beta\tau$ ad $\epsilon\gamma$ major est ratione $\gamma\xi$ ad $\xi\tau$: atque adeo rectangulum sub $\beta\tau, \tau\xi$ majus erit rectangulo sub $\epsilon\gamma, \gamma\xi$, ac multo majus rectangulo $\kappa\gamma\xi$. Rectangulum autem sub $\beta\tau, \tau\xi$ æquale est rectangulo $\nu\pi\xi$, quare rectangulum $\nu\pi\xi$ majus est rectangulo $\kappa\gamma\xi$. Rectangulum vero $\nu\pi\xi$ æquale est rectangulo $x\theta\phi$, quia $\nu\theta$ est ad $\theta\mu$ sicut θx ad $x\mu$; ergo rectangulum $x\theta\phi$ majus est rectangulo $\kappa\gamma\xi$. Continetur autem rectangulum $x\theta\phi$

sub ipsis $\theta x, x\xi$; quapropter rectangulum sub $\theta x, x\xi$ majus erit contento sub $\kappa\gamma, \gamma\xi$; ac ratio θx ad $\kappa\gamma$ major ratione $\gamma\xi$ ad ξx . Sed θx est ad $\kappa\gamma$ sicut $x\xi$ ad $\xi\gamma$, unde ratio $x\xi$ ad $\xi\gamma$ major erit ratione $\gamma\xi$ ad ξx ; & componendo $x\gamma$ erit ad $\xi\gamma$ in maiore ratione quam $x\gamma$ ad ξx : unde recta ξx major erit quam $\xi\gamma$, ac ratio $z\theta$ ad ξx minor erit ratione $z\theta$ ad $\xi\gamma$. Verum $z\theta$ (ob similia triangula) est ad $\xi\gamma$ ut $z\eta$ ad $\kappa\gamma$: ratio itaque $z\theta$ ad $x\xi$ minor est ratione $z\eta$ ad $\kappa\gamma$. θz autem æqualis est ipsi $\mu\nu$, & $x\xi$ ipsi $\mu\theta$; quare ratio $\mu\nu$ ad $\mu\theta$ minor est ratione $z\eta$ ad $\kappa\gamma$: ac $\mu\nu$ est ad $\mu\theta$ sicut $z\eta$ ad $\nu\pi$, quia fecimus utramque $\nu\theta$ ad $\theta\mu$ &

$z\pi$ ad $\pi\nu$ in ratione diametri transversæ ad latus rectum. Ratio igitur $z\eta$ ad $\nu\pi$ minor est ratione $z\eta$ ad $\kappa\gamma$; & auferendo duas minores à majoribus in Hyperbola, vel componendo eas in Ellipsi, fiet ratio $\nu\eta$ ad $\kappa\tau$ major ratione $z\eta$ ad $\nu\pi$, ob $\nu\pi$ ipsi $\gamma\tau$ æqualem. Atqui $\nu\eta$ est ad $\kappa\tau$ (ob similia triangula) sicut



$\nu\lambda$ ad $\lambda\tau$; adeoque ratio $\nu\lambda$ ad $\lambda\tau$ major est ratione $z\eta$ ad $\nu\pi$: ac dividendo in Hyperbola vel componendo in Ellipsi ratio $\nu\tau$ ad $\tau\lambda$ major erit ratione $z\eta$ ad $\pi\nu$, hoc est ratione diametri transversæ ad latus rectum. Jam si faciamus $\nu\tau$ ad rectam aliam sicut diameter transversa ad latus rectum; erit hæc alia major quam $\lambda\tau$, adeoque recta Minima de puncto κ ducenda (per 9^{am}, 10^{am} & 25^{am} hujus) abscindet segmentum Axis Vertici Δ adjacens, quod majus erit quam $\Delta\lambda$.

Porro si ducatur recta alia ad modum ipsius $\theta\lambda\lambda\alpha$: dico rectam $\lambda\lambda$ non esse Minimam, Minimamque per punctum λ ductam abscindere ab Axe segmentum majus quam $\Delta\lambda$. Demittatur enim ad Axem normalis $\lambda\sigma$, quæ producat ad ν & τ . Jam quoniam $\tau\delta$ æqualis est ipsi $\tau\xi$, erit $\tau\delta$ major quam $\xi\iota$, ac ratio ipsius $\delta\iota$ ad $\iota\xi$ major ratione ejusdem ad $\tau\delta$; ac componendo vel dividendo ratio $\delta\xi$ ad $\xi\iota$ major erit ratione $\iota\tau$ ad $\tau\delta$. Sed $\iota\tau$ est ad $\tau\delta$ sicut $\iota\nu$ ad $\tau\delta$; adeoque ratio $\delta\xi$ ad $\xi\iota$ major

major est ratione $\iota\nu$ ad $\Gamma\delta$, ac multo major ratione $\iota\Lambda$ ad $\Gamma\delta$; & rectangulum sub $\Gamma\delta$, $\delta\xi$ majus erit contento sub $\Lambda\iota$, $\iota\xi$. Rectangulum vero sub $\Gamma\delta$, $\delta\xi$ æquale est rectangulo $\Pi\Nu$; quare rectangulum $\Pi\Nu$ majus est rectangulo $\Lambda\iota\xi$. Rectangulum autem $\Pi\Nu$ æquale est rectangulo $X\Theta P$, quia \Nu est ad OM , hoc est $\Pi\xi$ ad ξX , sicut $\Xi\P$ ad ΠN sive $P\xi$ ad ξO : rectangulum igitur $X\Theta P$ majus est rectangulo $\Lambda\iota\xi$. Sed rectangulum $X\Theta P$ fit sub $X\Theta$, $X\xi$, quare $\Theta X\xi$ majus est rectangulo $\Lambda\iota\xi$, ac ratio ΘX ad $\Lambda\iota$ major erit ratione $\iota\xi$ ad ξX . Sed ΘX est ad $\Lambda\iota$ sicut $X\kappa$ ad $\kappa\iota$; ratio igitur $X\kappa$ ad $\kappa\iota$ major est ratione $\iota\xi$ ad ξX ; ac componendo ratio ιX ad $X\kappa$ minor erit ratione ιX ad $\iota\xi$: recta igitur $X\kappa$ major est quam $\iota\xi$, & applicatâ utrinque communi $\xi\kappa$, erit $X\xi$ major quam $\iota\kappa$; unde ratio $\Xi\Theta$ ad $X\xi$ minor erit ratione $\Xi\Theta$ ad $\iota\kappa$. Sed $\Xi\Theta$ est ad $\iota\kappa$ sicut $\Xi\alpha$ ad $\Lambda\iota$; quare ratio $\Xi\alpha$ ad $\Lambda\iota$ major est ratione $\Xi\Theta$ ad $X\xi$. Verum $\Xi\Theta$ æqualis est ipsi NM , ac $X\xi$ ipsi MO ; quare ratio $\Xi\alpha$

ad $\Lambda\iota$ major est ratione NM ad MO :

& NM est ad MO sicut ΞN ad $N\Pi$; quare

auferendo duas minores à duabus majoribus in Hyperbola, vel componendo easdem in Ellipsi, erit ratio

αN ad $\Lambda\sigma$ major ratione ΞN ad $N\Pi$.

Sed αN est ad $\Lambda\sigma$ sicut $N\lambda$ ad $\lambda\sigma$; quare ratio $N\lambda$ ad


$\lambda\sigma$ major est ratione ΞN ad $N\Pi$: ac dividendo in Hyperbola vel componendo in Ellipsi,

erit ratio $N\sigma$ ad $\sigma\lambda$ major ratione $\Xi\P$ ad ΠN . Sed $\Xi\P$ est ad ΠN

ut diameter transversa ad latus rectum; adeoque si fiat $N\sigma$ ad aliam quandam in ratione diametri transversæ ad latus rectum,

erit hæc alia major quam $\sigma\lambda$: ac proinde Minima de puncto Λ du-
cenda abscindet ab Axe segmentum majus quam $\Delta\lambda$, per demon-
strata in nona & decima hujus.

Quod si ducatur alia recta ut $\Theta\omega\phi$ inter Minimas BE , ΓZ in-
termedia: dico rectam $\omega\phi$ non esse aliquam è Minimis, ac Minimam
de puncto ϕ ductam abscindere ab Axe segmentum minus quam
 $\Delta\omega$. Demittatur ad Axem normalis $\phi\mu\nu$. Cumque $\tau\delta$, uti de-
monstravimus, æqualis sit ipsi $\tau\xi$, erit $\tau\delta$ minor quam $\nu\xi$, ac ra-
tio $\nu\delta$ ad $\delta\tau$ major erit ratione $\nu\delta$ ad $\nu\xi$: & componendo ratio
 $\nu\tau$ ad $\tau\delta$ major erit ratione $\delta\xi$ ad $\xi\nu$. Sed $\nu\tau$ est ad $\tau\delta$ sicut $\pi\nu$
ad $\Gamma\delta$; quare ratio $\pi\nu$ ad $\Gamma\delta$ major erit ratione $\delta\xi$ ad $\xi\nu$: adeo-
que rectangulum sub $\pi\nu$, $\nu\xi$ majus erit rectangulo sub $\Gamma\delta$, $\delta\xi$.
At $\phi\nu$ major est quam $\pi\nu$, ac proinde rectangulum $\phi\nu\xi$ multo majus erit quam
rectangulum $\Gamma\delta\xi$. Est autem rectangulum $\Gamma\delta\xi$ (per jam demonstrata) æquale
rectangulo $N\Pi\xi$, quod quidem æquale est rectangulo $X\Theta P$: quare rectangulum
sub $\phi\nu$, $\nu\xi$ majus est rectangulo $X\Theta P$. Sed rectangulum $X\Theta P$ fit sub ΘX , $X\xi$: quare
rectangulum $\phi\nu\xi$ majus est rectangulo $\Theta X\xi$; ac ratio $\phi\nu$ ad ΘX major est ratione
 $X\xi$ ad $\xi\nu$. Est autem $\phi\nu$ ad ΘX sicut $\nu\epsilon$ ad ϵX , quare ratio $\nu\epsilon$ ad ϵX major est ra-
tione $X\xi$ ad $\xi\nu$; ac componendo ratio νX ad $X\xi$ major est ratione νX ad $\nu\epsilon$: unde
constat $X\xi$ minorem esse quam $\nu\epsilon$, ac rationem $\Xi\Theta$ ad $X\xi$ majorem esse ratione $\Xi\Theta$
ad $\nu\epsilon$. Sed (ob similia triangula) $\Xi\Theta$ est ad $\nu\epsilon$ sicut $\Xi\alpha$ ad $\phi\nu$: ratio igitur $\Xi\Theta$ ad
 $X\xi$ major est ratione $\Xi\alpha$ ad $\phi\nu$. Cum autem $\Xi\Theta$ ipsi NM , ac $X\xi$ ipsi MO æqualis
est,



est, ratio MN ad MO major erit ratione EN ad EV : cumque MN est ad MO sicut EN ad NP , erit ratio EN ad NP major ratione EN ad EV . Auferendo igitur duas minores à duabus majoribus in Hyperbola, vel componendo easdem in Ellipsi, erit ratio EN ad NP major ratione EN ad EV . Sed (ob similia triangula) EN est ad EV sicut NW ad WV ; quare ratio EN ad NP major est ratione NW ad WV : ac dividendo in Hyperbola vel componendo in Ellipsi, erit ratio EN ad NP major ratione NW ad WV . Verum EN est ad NP sicut diameter transversa ad latus rectum, adeoque ratio illa major erit ratione NW ad WV . Propterea si faciamus NW ad rectam aliam in ratione diametri transversæ ad latus rectum, minor erit illa quam WV ; atque adeo Minima de puncto N ducenda (per 9^m & 10^m hujus) auferet ab Axe segmentum minus quam WV : unde (per 25^m hujus) manifestum est WV non esse aliquam è Minimis. Q. E. D.


PROPOSITIO XLVI.

Si duæ Minimæ in alterutro Ellipseos quadrante ducantur ad Axem majorem, quarum altera transeat per centrum; ac producantur ad occursum: non duci poterit à puncto occursum ad eundem Sectionis quadrantem alia recta, è qua abscindat Axis Minimam. Ac si rectæ quælibet egrediantur ex illo puncto ad Sectionem inter Minimam & Verticem Axis majoris: Minimæ ab earundem extremitatibus ad Axem ductæ abscindent Axis segmenta Vertici contermina, majora quidem quam segmenta ejusdem ab ipsis egressis abscissa; minora vero si ductæ fuerint ad alteras partes five versus Axem minorem.

Sit Ellipseos $AB\Gamma$ Axis major ΔE centrumque Z ; & è centro erigatur normalis ad Axem ZA , quæ producat ad occursum Minimæ alicujus BH etiam productæ in puncto K : ac ducatur alia recta ut $K\Theta$. Dico quod $\Theta\Gamma$ non est Minima, quodque Minima è puncto Γ ad ΔE ducenda abscindet ab Axe portionem majorem quam $\Delta\Theta$.

Si enim recta $K\Theta$ foret Minima, producta occurreret Minimæ BH intra angulum ΔZK , juxta 40^m hujus: sed occurrit ei recta $K\Theta$ non nisi in puncto K ; adeoque $\Theta\Gamma$ non est Minima. Quod vero Minima è puncto Γ ad Axem ΔE educta abscindat ex eodem segmentum majus quam $\Delta\Theta$, hinc patet; quia (per 40^m hujus) recta Minima per punctum Γ ducta occurrit ipsi BH , quæ etiam Minima est, intra angulum HZK : unde manifestum est illam abscindere majorem Axis portionem quam $\Delta\Theta$.

At si ducatur alia ut ΔMK ad alteram partem Minimæ BH ; consimili argumento patebit ΔM non esse Minimam, Minimamque de puncto Λ ad Axem ducendam (per eandem 40^m) abscindere minorem Axis portionem quam ΔM : quia occurrat Minimæ BH intra angulum HZK . Q. E. D.



PROPOSITIO XLVII.


Quatuor rectæ Minimæ in eadem Semi-ellipsi ductæ, & ab Axe majore abscissæ, non conveniunt in eodem puncto.

Sit $AB\Gamma\Delta$ Ellipsis cujus Axis major $\Lambda\Delta$. Dico quod si ducantur ab Axe $\Lambda\Delta$ ad Sectionem $AB\Gamma\Delta$ quatuor Minimæ, non convenient inter se in eodem puncto. Nam, si fieri possit, ducantur rectæ $K\Gamma$, ΛE , $M Z$, ΘB quæ convenient inter se in puncto H . Jam vel aliqua ex his rectis normalis erit super Axem $\Lambda\Delta$, vel nulla earum normalis erit. Sit autem imprimis una earum $B\Theta$ Axi normalis.

Quoniam vero recta $B\Theta$ Minima est, atque etiam Axi $\Lambda\Delta$ normalis, erit (per 15^m hujus) punctum Θ centrum Sectionis: occurrat autem eidem recta Minima $K\Gamma$

KΓ

$\kappa\Gamma$ in puncto H , & ducatur recta alia EH ; ac (per 46^m hujus) pars ejus EA non erit Minima. Posuimus autem Minimam esse; quod absurdum.




Quod si nulla ipsarum $B\Theta$, $\kappa\Gamma$, ΔE , MZ normalis fuerit super Axem $\Delta\Delta$, sit centrum N inter rectas $B\Theta$, $\kappa\Gamma$ positum; ac oportebit ducere tres Minimas ad eundem Sectionis Semiaxem, quæ concurrant in eodem puncto. Hoc autem fieri nequit, ut (ex 45^m hujus) manifestum est. Si vero Centrum N intermedium fuerit inter $\kappa\Gamma$, ΔE ; axi $\Delta\Delta$ normaliter erigatur recta NX , & (per 40^m hujus) concursus ipsarum EA , ZM erit intra angulum ΔNX . Pariterque constabit Minimas $B\Theta$, $\kappa\Gamma$ concursuras intra angulum ΔNX . Debent autem omnes concurrere in puncto H : hoc autem absurdum. Quatuor igitur Minimæ ad Sectionem ductæ non conveniunt in eodem puncto. Q. E. D.

PROPOSITIO XLVIII.

Tres Maximæ ad eundem Ellipseos quadrantem ductæ non concurrunt in eodem puncto.

Sit Ellipseos $AB\Gamma$ Axis major $\Delta\Gamma$, minor $B\Delta$. Dico tres Maximas, ad eundem Ellipseos quadrantem $AB\Gamma$ ductas, non occurrere inter se in eodem puncto. Nam si fieri possit ducantur rectæ EA , ZK , $H\Theta$ concurrentes in eodem puncto M . Quoniam vero EA , ZK , $H\Theta$ Maximæ sunt, erunt etiam EN , $Z\Xi$, OH (per 23^m hujus) tres Minimæ. Tres igitur Minimæ ad eundem Sectionis quadrantem ductæ concurrere debent in eodem puncto: id quod (per 45^m & 46^m hujus) absurdum est. Quapropter tres Maximæ ad eundem quadrantem Sectionis $AB\Gamma$ ductæ non concurrere possunt in eodem puncto M . Q. E. D.




PROPOSITIO XLIX.

In omni Sectione Conicâ: si erigatur super Axem normalis, ad punctum ejus quodlibet, modo non longius distet à Vertice Sectionis quam dimidio Lateris recti; ac capiatur punctum aliquod in eadem normali, unde egrediatur recta quævis ad alterum Sectionis latus, inter normalem & Verticem Sectionis: Recta Minima ab extremitate ejusdem ducta non erit pars ejus; sed abscindet ex Axe portionem Vertici Sectionis adjacentem, majorem eâ quæ à rectâ de sumpto punctoeductâ abscinditur.

Imprimis Parabolæ AB sit Axis $B\Gamma$; normalis vero sit $E\Delta$; ita ut EB , segmentum Axis à normali illâ abscissum, non majus sit dimidio lateris recti; & in ipsa ΔE capiatur punctum quoddam Δ extra Axem; & agatur recta $\Delta\Theta A$. Dico rectam $\Delta\Theta A$ non esse Minimam.

Demittatur enim normalis ΔH . Cumque EB non est major semilatore recto, erit EH minor semilatore recto. Fiat $H\Gamma$ æqualis semilateri recto, ac ducatur $\Delta\Gamma$: erit itaque $\Delta\Gamma$ (per 8^m hujus) Minima, adeoque $\Delta\Theta$ (per 24^m hujus) non erit Minima. Abscindit enim recta Minima à puncto A ducta segmentum Axis majus quam BE : cadit igitur remotius à Sectionis Vertice quam $\Delta\Theta$.





I

PROPO-

PROPOSITIO L.

SIT jam AB Hyperbola vel Ellipsis, cujus axis BG centrumque Γ; & Axi normalis erigatur ΔE, ita ut BE non major sit semilatore recto: & è capto in recta ΔE puncto quovis Δ educatur recta aliqua, ut ΔZA. Dico rectam AZ non esse Minimam, Minimamque de puncto A egressam abscindere portionem Axis majorem quam BZ. Oportet autem in Ellipsi normalem cadere in Axem majorem; e ductamque occurrere eidem dimidio Axis in quem cadit normalis.



Demittatur enim normalis AH. Cum-

que BE non est major semilatore recto, ac ΓB semidiameter est transversa, erit ratio diametri transversæ ad latus rectum non major ratione ΓB ad BE. Sed ratio ΓH ad HE major est ratione ΓB ad BE: ratio igitur ΓH ad HE major est ratione diametri transversæ ad latus rectum. Fiat ideo HΓ ad HΘ ut diameter transversa ad latus rectum; ac recta AΘ (per 9^{am} & 10^{am} hujus) erit Minima. Recta itaque AZ (per 25^{am} hujus) non est Minima, sed Minima de puncto A ducta abscindit portionem axis majorem quam BZ. Q. E. D.


PROPOSITIO LI.

QUOD si normalis dicta abscindat Axis segmentum majus semilatore recto: Dico rectam assignari posse, cum quâ comparatione factâ, si puncti sumpti ab Axe distantia, sive longitudo normalis, major fuerit assignatâ, nulla omnino recta ab extremitate normalis ad Sectionem duci potest, è qua abscindat Axis Minimam: sed Minima, ab extremitate cujuscunque rectæ ad Sectionem ex eo puncto egressæ, abscindet ex Axe Segmentum Vertici sectionis terminum, majus quam ipsa egressa. Quod si normalis æqualis fuerit assignatæ, duci potest ab extremitate ejus una sola recta è qua abscindatur Minima: Minimæ vero, ab extremitatibus cæterarum omnium ab eodem puncto egredientium ductæ, abscindent segmenta Axis vertici adjacentia, majora quam ab ipsis egressis abscissa. Si vero normalis minor fuerit assignatâ, duæ tantum rectæ duci possunt è quibus abscindat Axis Minimas: Minimæque ab extremitatibus egredientium ductæ, dictasque duas Minimas interjacentes, abscindent ab Axe portiones Vertici Sectionis terminas, minores quam quæ ab ipsis egressis abscinduntur: Quæ vero ducuntur ab extremitatibus cæterarum egredientium, inter duas illas Minimas non intermediarum, abscindent portiones Axis majores quam ab ipsis egressis abscissæ. Oportet autem in Ellipsi normalem in Axem majorem demitti.

Imprimis autem sit ABΓ Parabola, cujus Axis ΓZ; super quem erigatur EZ normaliter: & sit segmentum Axis ΓZ majus dimidio lateris recti. Dico quod si capiantur puncta in ipsa EZ, à quibus egrediantur ad Sectionem rectæ, ea omnia necessario eventura, prout declaravimus in hac Propositione.

Quoniam

Quoniam ΓZ major est dimidio lateris recti, sit ZH dimidium lateris recti, ac dividatur ΓH in puncto Θ , ita ut segmentum ΘH duplum sit ipsius $\Theta \Gamma$; & erigatur normalis ΘB , ac fiat recta quædam K ad ΘB sicut ΘH ad HZ : sumptoque in recta $E Z$ puncto E , sit primum $Z E$ major quam K . Dico quod non duci possit è puncto E recta aliqua è qua abscindat Axis Minimam: exempli gratia, ductâ rectâ $E A B$, dico $B A$ non esse Minimam. Etenim K est ad ΘB ut ΘH ad HZ , & K minor est quam $Z E$; quare ratio $Z E$ ad $B \Theta$, hoc est $Z \Lambda$ ad $\Lambda \Theta$ major est ratione ΘH ad HZ , ac componendo ratio $Z \Theta$ ad $\Theta \Lambda$ major erit ratione ΘZ ad $Z H$: adeoque $Z H$, quæ æqualis est dimidio lateris recti, major est quam $\Theta \Lambda$, & $\Theta \Lambda$ minor est dimidio lateris recti. Igitur Minima de puncto B ducta (per 8^{am} hujus) cadet propius puncto Z , ac proinde recta $B A$ (per 24^{am} hujus) non erit Minima. Ac si ducatur alia recta ut $E I M$: Dico quoque $I M$ non esse aliquam è Minimis. Ducatur enim per punctum B Tangens Sectionis $B O$; demissaque normalis $M N$ producat ad z . Ob Parabolam vero erit (per 35^{am} primi) ΓO ipsi $\Gamma \Theta$ æqualis; adeoque ΘO dupla erit ipsius $\Theta \Gamma$. ΘH autem dupla est ipsius $\Theta \Gamma$, quare ΘO æqualis est ipsi ΘH . Hinc consequitur ΘH majorem esse quam $O N$, ac rationem ΘN ad $N O$ majorem esse ratione $N \Theta$ ad ΘH : ac componendo ratio ΘO ad $O N$, hoc est $B \Theta$ ad $N z$ major erit ratione $N H$ ad $H \Theta$, adeoque rectangulum sub $B \Theta$, ΘH majus erit contento sub $z N$, $N H$, ac multo majus contento sub $M N$, $N H$. Rectangulum vero sub $E Z$, $Z H$ majus est contento sub $B \Theta$, ΘH ; quoniam (per nuper demonstrata) ratio $E Z$ ad $B \Theta$ major est ratione ΘH ad $Z H$; adeoque rectangulum sub $E Z$, $Z H$ majus est contento sub $M N$, $N H$; unde ratio $Z E$ ad $M N$, sive $Z I$ ad $I N$, major est ratione $N H$ ad $H Z$: ac componendo ratio $Z N$ ad $N I$ major ratione $N Z$ ad $Z H$. Quocirca $H Z$ major erit quam $N I$. Sed $H Z$ æqualis est dimidio lateris recti; quare $N I$ minor est dimidio lateris recti, ac proinde $M I$ non est aliqua è Minimis; sed Minima de puncto M ad Axem ducta (per 8^{am} & 24^{am} hujus) propior erit puncto Z .




Jam si ducatur alia ut AXE ; dico quod AX non est Minima. Demittatur enim normalis AP quæ producatur ad Π . Quoniam vero EO æqualis est ipsi OH , ut nuper diximus, consequitur rectam EO majorem esse quam PH ; adeoque ratio PE ad EO minor erit ratione PE ad PH ; ac componendo ratio PO ad OE minor erit ratione OH ad PH . Sed PO est ad OE ut $P\Pi$ ad BO ; quare ratio $P\Pi$ ad BO minor est ratione OH ad PH : unde rectangulum sub $P\Pi$, PH minus erit rectangulo sub BO , OH , ac rectangulum sub AP , PH multo minus erit contento sub BO , OH . Demonstravimus autem rectangulum sub EZ , ZH majus esse contento sub BO , OH ; quapropter rectangulum sub AP , PH minus erit rectangulo sub EZ , ZH . Ratio igitur AP ad EZ minor est ratione ZH ad HP . Sed AP est ad EZ ut PX ad XZ , adeoque ratio PX ad XZ minor est ratione ZH ad HP ; ac invertendo ratio ZX ad XP major erit ratione PH ad HZ : dein componendo ratio ZP ad PX major erit ratione PZ ad ZH . Hinc liquet ZH majorem esse quam PX . Sed ZH æqualis est dimidio lateris recti, ergo PX minor est dimidio lateris recti. Recta igitur AX non est aliqua è Minimis, sed Minima de puncto A ducta (per 8^{am} & 24^{am} hujus) propius puncto Z cadet. Igitur si normalis EZ major fuerit quam recta K , nulla duci potest ad Sectionem recta per punctum E è qua abscindat Axis Minimam.

Quod si ZE æqualis fuerit ipsi K . Dico quod non nisi una sola recta, è qua abscindatur Minima, de puncto E ad sectionem duci poterit: quodque Minimæ ab

Quoniam enim ΘH est ad $H Z$ sicut K , vel eidem æqualis $E Z$, ad $B \Theta$, & $Z A$ est ad $\Lambda \Theta$ in eadem ratione, erit ΘH ad $H Z$ ut $Z A$ ad $\Lambda \Theta$; ac componendo ΘZ erit ad $H Z$ ut ΘZ ad $\Lambda \Theta$: quare $Z H$ æqualis est ipsi $\Lambda \Theta$. Sed $Z H$ æqualis est dimidio lateris recti, adeoque & $\Lambda \Theta$ dimidium est lateris recti; ac proinde ΛB (per 8^{am} hujus) Minima est: Dico quoque quod non duci poterit per punctum E alia recta è qua abscindat Axis Minimam. Ducatur enim recta aliqua alia ut $M E$, & normalis sit $M N$ ad π producenda; sitque $B O$ Tangens Sectionis: & juxta modum præmonstratum constabit, rectangulum sub $B \Theta$, ΘH quod æquale est rectangulo sub $E Z$, $Z H$ majus esse rectangulo sub $M N$, $N H$. Hinc iisdem argumentis, quibus præcedentia, probabitur $Z H$ æqualem dimidio lateris recti majorem esse quam $I N$: adeoque $I M$ non esse Minimam; sed Minimam de puncto M ductam cadere versus Z . Pariter si ducatur alia ut $A X E$, $A X$ non erit Minima; sed Minima de puncto A ducta cadet quoque versus Z . Demissa enim normali $A P$ & ad π producta, eodem modo demonstrabitur rectangulum sub $A P$, $P H$ minus esse rectangulo sub $B \Theta$, ΘH ; quod æquale est rectangulo sub $E Z$, $Z H$: unde constabit, juxta nuper ostensa, rectam $x P$ minorem esse quam $H Z$, hoc est dimidio lateris recti. Proinde $A x$ non erit aliqua è Minimis, sed Minima per A ducta cadet versus Z .

Sit jam EZ minor quam K .
Dico duci posse de puncto E ad
sectionem $AB\Gamma$ duas rectas ϵ
quibus abscindat Axis Minimas:
ac, si ab extremitatibus rectarum
inter has duas intermediarum
ducantur Minimæ, abscindere
illas segmenta Axis minora quam
quæ abscindunt ipsæ rectæ ex E
eductæ. Cæteræ vero rectæ ex-
teriores auferent segmenta Axis
majora segmentis quæ à Mini-
mis ab earundem extremitatibus
ad axemeductis abscinduntur.

Nam cum ZE minor est quam K , erit ratio EZ ad ΘB minor ratione ipsius K ad ΘB , hoc est ratione ΘH ad HZ ; adeoque rectangulum sub EZ, HZ minus erit rectangulo sub $\Theta B, \Theta H$. Fiat igitur rectangulum sub $\tau \Theta, \Theta H$ æquale rectangulo sub EZ, ZH ; & sit ξH normalis ipsi ZH : & per datum punctum τ , Asymptotis $\xi H, H\Gamma$: (per quartam secundi) describatur Hyperbola, quæ quidem sectio occurrat Parabolæ in punctis A, M . Jungantur rectæ EA, EM , ac demittantur normales AP, MN . Quoniam vero sectio ATM Hyperbola est, cujus Asymptoti $\xi H, H\Gamma$; ac ducuntur à sectione illa ad angulos rectos $AP, MN, \tau \Theta$: propterea (per 12^{am} II^{di}) rectangulum sub MN, NH æquale erit contento sub $\tau \Theta, \Theta H$, quod quidem æquale est rectangulo sub EZ, ZH . Hinc MN erit ad EZ sicut ZH ad HN . Sed MN est ad EZ sicut NI ad IZ , quare ZH est ad HN sicut NI ad IZ ; ac componendo ZN est ad HZ sicut NZ ad NI : unde NI ipsi ZH five dimidio lateris recti æqualis est. Recta igitur MI (per 8^{am} hujus) Minima est. Pari modo constabit ipsam AX Minimam esse. Sunt itaque MI, AX duæ Minimæ concurrentes inter se in puncto E . Ac si educatur ex E ad Sectionem recta quævis alia inter AE & EM , & ab ejusdem extremitate ducatur Minima, cadet ea propius Vertici Sectionis. Quod si educatur recta aliqua extra ipsas AE, EM , cadet Minima ejus versus partes à Vertice Sectionis remotiores. Hæc autem omnia demonstrantur ex 44^a hujus libri. Q. E. D.




PROPO-

PROPOSITIO LII.

SI vero Sectio propofita $\Delta B \Gamma$ fuerit Hyperbola vel Ellipsis, Axe $E \Gamma \Delta$ centroque Δ descripta; ac fit ZE Axi normalis, ita ut $E \Gamma$ major fit dimidio lateris recti. Dico eadem omnia in his consequi, quæ in Parabola.

Quoniam $\Delta \Gamma$ semidiameter transversa est, ac $E \Gamma$ major est semisse lateris recti, erit ratio $\Delta \Gamma$ ad $E \Gamma$ minor ratione diametri transversæ ad latus rectum: atque adeo, si faciamus ΔH ad $H E$ sicut diametri transversæ ad latus rectum, cadet punctum H inter Γ & E . Inter ipsas ΔH , $\Delta \Gamma$ inveniuntur duæ mediæ proportionales ut $\Delta \Theta$, ΔK ; & Axi normalis fit $K B$: ac fiat recta quædam Λ ad ipsam $K B$ in ratione composita ex ratione ΔE ad $E H$ & ratione $H K$ ad $K \Delta$.

Primum autem fit $E Z$ major quam Λ . Dico impossibile esse ducere, de puncto Z ad Sectionem, rectam aliquam è qua abscindat Axis Minimam; sed Minimas, ab extremitatibus quarumcunque rectarum de Z ad sectionem egredientium, abscindere Axis segmenta, sectionis Vertici contermina, majora abscissis ab ipsis rectis de Z eductis. Jungatur enim $Z M B$: Dico $B M$ non esse Minimam. Fiat $Z N$ ad $N E$ sicut diametri transversæ ad latus rectum, ac ducantur duæ $Z \sigma O$, $N \Sigma Z$ Axi $E \Gamma \Delta$ parallelæ, aliæque duæ $H \Sigma \sigma$, ΔO ipsi $E Z$ parallelæ. Quoniam vero $E Z$ major est quam Λ , erit ratio $E Z$ ad $K B$ major ratione ipsius Λ ad $K B$: componitur autem ratio $E Z$ ad $K B$ ex ratione $Z E$ ad $E N$ & ratione $K \gamma$ ad $K B$, ob $K \gamma$ ipsi $E N$ æqualem. Ratio vero ipsius



Λ ad $B K$, ex hypothesi, componitur ex ratione ΔE ad $E H$ & ratione $H K$ ad $K \Delta$: adeoque ratio composita ex rationibus $Z E$ ad $E N$ & $K \gamma$ ad $K B$ major est composita ex rationibus ΔE ad $E H$ & $H K$ ad $K \Delta$. Sed $Z E$ est ad $E N$ sicut ΔE ad $E H$, quia utraque $Z N$ ad $N E$ & ΔH ad $H E$ est in ratione diametri transversæ ad latus rectum. Reliqua igitur ratio $K \gamma$ ad $K B$ major est ratione $H K$ ad $K \Delta$: unde rectangulum sub $K \gamma$, $K \Delta$ majus erit contento sub $K B$, $H K$. Rectangulum autem sub $K \gamma$, $K \Delta$ est rectangulum $\Delta K \gamma$, adeoque rectangulum sub $K B$, $H K$ minus est rectangulo $\Delta K \gamma$. Fiat rectangulum $\gamma K H$, nempe quod continetur sub $K \gamma$, $\gamma \Sigma$, commune: ac rectangulum sub $B \gamma$, $\gamma \Sigma$ minus erit rectangulo $\Delta H \Sigma$. Est vero rectangulum $\Delta \Sigma$ æquale rectangulo σN , quia $Z N$ est ad $N E$ sicut ΔH ad $H E$; quare rectangulum sub $B \gamma$, $\gamma \Sigma$ minus est rectangulo σN . Probavimus autem, in demonstrandâ 45^a hujus, quod eidem æquale esse debuit, adeoque $B M$ non est aliqua è Minimis; sed Minima de puncto B educta abscindet portionem Axis Vertici sectionis adjacentem majorem quam ΓM .


Jam vero si ducatur recta alia ut $Z T X$, extra punctum B : dico ipsam quoque $X T$ non esse Minimam, sed Minimam de puncto X ductam abscindere Axis segmentum Vertici sectionis conterminum, majus quam ΓT . Ducatur sectionis Tangens ad punctum B ut $B \xi$, & Axi normalis $X \Pi$, quæ producat ad P . Quoniam vero ratio $K \gamma$ ad $K B$ major est ratione $H K$ ad $K \Delta$, fiat $T K$ ad $K B$ sicut $H K$ ad $K \Delta$, ac per T Axi $B \Gamma \Delta$ parallela ducatur $\xi T \tau$. Cum autem recta $B \nu \xi$ tangit sectionem, ac $B K$ Axi $\Delta \nu K$ normalis est; erit rectangulum sub $K \Delta$, $\Delta \nu$ (per 37^m primi) æquale quadrato ex $\Delta \Gamma$. Est igitur $K \Delta$ ad $\Delta \Gamma$ sicut $\Delta \Gamma$ ad $\Delta \nu$, ac tertia proportionalis ipsis $K \Delta$, $\Delta \Gamma$ est $\Delta \nu$, uti tertia proportionalis ipsis $H \Delta$, $\Delta \Theta$ est recta $K \Delta$: ac $K \Delta$ est ad $\Delta \Gamma$ sicut ΔH ad $\Delta \Theta$, quia ΔK , $\Delta \Theta$ sunt duæ mediæ proportionales inter ipsas ΔH , $\Delta \Gamma$; quapropter $H \Delta$ est ad ΔK sicut ΔK ad $\Delta \nu$: & auferendo duas minores à duabus majoribus

K

joribus

ioribus, reliqua HK ad reliquam KV erit ut HA ad ΔK . Sed HA est ad ΔK sicut TV ad BK , quia fecimus TK ad KV sicut HK ad $K\Delta$; adeoque HK erit ad KV sicut TV ad BK . Verum TV est ad BK sicut $T\xi$ ad KV ; quare HK est ad KV ut $T\xi$ ad KV ; unde HK ipsi $T\xi$ æqualis est. Sed HK æqualis est ipsi Tr ; adeoque Tr æqualis est ipsi $T\xi$. Hinc fiet recta $\xi\beta$ minor quam Tr , ac ratio $T\beta$ ad $\beta\xi$ major erit ratione ipsius $T\beta$ ad Tr ; & componendo ratio $T\xi$ ad $\xi\beta$ major erit ratione βr ad Tr . Sed $T\xi$ est ad

$\xi\beta$ ut BT ad $P\beta$, ac proinde ratio TV ad $P\beta$ major est ratione βr ad Tr . Rectangulum igitur sub BT , Tr majus est rectangulo sub $P\beta$, βr ; adeoque multo majus rectangulo sub $x\beta r$. Quinetiam cum HK est ad $K\Delta$ sicut TK ad KV , erit contentum sub HK , KV æquale rectangulo sub $K\Delta$, TK ; & facto rectangulo sub TK , KH communi, erit rectangulum sub BT , Tr æquale rectangulo $\Delta H r$. Est autem rectangulum sub BT , Tr majus contento sub $x\beta$,



βr ; adeoque rectangulum $\Delta H r$ majus est rectangulo sub $x\beta$, βr : ac facto rectangulo sub βr , $r\Sigma$ communi, erit in Hyperbola rectangulum sub $x\eta$, $\eta\Sigma$ minus utroque rectangulo $\Delta H r$, $\beta r\Sigma$ simul sumpto: vel in Ellipsi, sublato rectangulo $B\eta\Sigma$, erit differentia rectangulorum $\Delta H r$, $B\eta\Sigma$ major contento sub $x\eta\Sigma$, unde rectangulum $x\eta\Sigma$ multo minus erit rectangulo $\Delta H\Sigma$. Sed rectangulum $\Delta H\Sigma$ æquale est rectangulo ΣNZ , quia ZN est ad NE sicut ΔH ad HE ; rectangulum itaque sub $x\eta$, $\eta\Sigma$ minus est rectangulo ΣNZ . Ostendimus autem in demonstratione Propositionis 45^æ hujus, quod eidem æquale esse debuit; adeoque recta xr non est Minima: ac Minima de puncto x ducta abscindet ab Axe portionem Vertici conterminam, majorem quam Tr .

Præterea si ducatur alia recta ut zA : Dico quod A non est Minima, quodque Minima de puncto A ducta abscindet Axis portionem majorem quam Tr . Demittatur enim normalis $A\theta$, quæ producatur ad δ . Demonstravimus autem rectam Tr æqualem esse ipsi $T\xi$, adeoque $r\zeta$ minorem esse quam $T\xi$; unde ratio $T\zeta$ ad ζr major erit ratione ζT ad $T\xi$; ac componendo ratio Tr ad $r\zeta$ major ratione $\zeta\xi$ ad $T\xi$. Sed $\zeta\xi$ est ad $T\xi$ sicut $\delta\zeta$ ad BT ; adeoque ratio Tr ad $r\zeta$ major est ratione $\delta\zeta$ ad BT : ac rectangulum sub BT , Tr majus erit rectangulo sub $\delta\zeta$, ζr . Unde argumento nuper usurpato simili, demonstrabitur rectangulum sub $A\theta$, θz minus esse rectangulo ΣNZ ; ac propterea (per 45^{am} hujus) constabit A non esse Minimam; sed Minimam de puncto A eductam abscindere portionem Axis majorem quam Tr .

Ponamus jam normalem ZE æqualem esse ipsi A . Dico quod una sola recta duci possit de puncto Z , è quâ abscindatur Minima: quodque Minime ab extremitatibus reliquarum omnium ab eodem puncto eductarum abscindant ex Axe portiones majores quam quæ auferuntur ab ipsis eductis.




Ad modum superius dictum ducatur recta BK , & jungatur ZB : & erit ZE ad BK sicut A ad BK . Ratio autem ZE ad BK componitur ex ratione ZE ad EN & ratione KY , ipsi EN æqualis, ad BK : ratio vero ipsius A ad BK componitur ex ratione ΔE ad EH & ratione HK ad $K\Delta$, per constructionem superius traditam. Ratio igitur composita ex rationibus ZE ad EN & KY ad BK æqualis est compositæ ex rationibus ΔE ad EH & HK ad $K\Delta$. Sed ratio ZE ad EN æqualis est rationi ΔE ad EH ; adeoque ratio KY ad BK eadem est ac ratio HK ad $K\Delta$; ac proinde rectangulum sub KY , $K\Delta$ æquale erit contento sub $K\beta$, HK : & rectangulo sub $K\gamma$, KH communi

muni facto, erit in Hyperbola summa vel in Ellipfi differentia, hoc est rectangulum sub $\gamma\gamma, \gamma\gamma$, æqualis rectangulo $\Delta H \Sigma$, quod rectangulo $\Sigma N \Sigma$ etiam æquale est; quare rectangulum $\Sigma N \Sigma$

æquale est rectangulo sub $\gamma\gamma, \gamma\gamma$. Probavimus autem (in demonstratione Prop. 45^a hujus) hoc ita se habere in Minimis: recta igitur BM Minima est. Dico quoque quod non duci possit de puncto Z recta alia è qua abscindat Axis Minimam. Ducta enim alià ut zrx , ac demissa normali $x\pi$, modo superius monstrato patebit rectam $\gamma\gamma$ æqualem esse ipsi $\gamma\gamma$. Sed $z\eta$ minor est quam

$\gamma\gamma$; adeoque ratio $\eta\gamma$ ad $z\eta$ major est ratione ejusdem ad $\gamma\gamma$; ac componendo $\gamma\gamma$ ad $z\eta$ major erit ratione $\eta\gamma$ ad $\Sigma\gamma$. Verum $\gamma\gamma$ est ad $z\eta$ sicut $\gamma\gamma$ ad $\gamma\gamma$; quare ratio $\gamma\gamma$ ad $\gamma\gamma$ major est ratione $\eta\gamma$ ad $\Sigma\gamma$: proinde rectangulum sub $\gamma\gamma, \gamma\gamma$ majus erit rectangulo sub $\gamma\gamma, \eta\gamma$, ac multo majus rectangulo sub $x\eta, \eta\gamma$. Demonstratum autem est rectangulum sub $\gamma\gamma, \gamma\gamma$ æquale esse rectangulo $\Sigma N \Sigma$; propterea rectangulum sub $x\eta, \eta\gamma$ minus erit rectangulo $\Sigma N \Sigma$. At (per 45^{am} hujus) eidem æquale esse debuit, adeoque recta xr non est Minima. Minima vero de puncto x educta abscindet ex Axe segmentum Sectionis Vertici adjacens ipsa $\gamma\gamma$ majus. Ac pari argumento demonstrabitur Δ non esse Minimam; sed Minimam de puncto Δ ductam abscindere Axis portionem majorem quam $\gamma\gamma$.


Denique sit $z\epsilon$ ipsa Δ minor: Dico duci posse de puncto Z duas tantum rectas è quibus abscindat Axis Minimam; Minimas autem de punctis in Sectione, inter illas duas eductas intermediarias, abscindere portiones Axis minores abscissis à rectis è puncto Z egredientibus: Minimas vero, ab extremitatibus cæterarum extra istas duas è puncto Z egredientium, abscindere segmenta Axis Vertici adjacentia, majora quam quæ ex eodem abscindant ipsæ egressæ.



K 2


Quoniam

Quoniam enim ratio ZE ad BK minor est ratione Λ ad BK ; per superius demonstrata, constabit rationem $K\gamma$ ad KB minorem esse ratione HK ad $K\Delta$, ac rectangulum ΣNZ minus esse rectangulo sub $B\gamma, \gamma\Sigma$. Fiat igitur rectangulum sub $\gamma I, \gamma\Sigma$ æquale rectangulo ΣNZ , & per punctum I describatur Hyperbola Asymptotis $\Sigma\Sigma, \Sigma H\Phi$; quod quidem fiet juxta 4^{am} secundi. Sit Hyperbola illa $\Lambda I X$, demissisque normalibus $\Lambda\theta, X\eta$, erit utrumque rectangulum sub $\Lambda\theta, \theta\Sigma$ ac sub $X\eta, \eta\Sigma$ æquale rectangulo ΣNZ ; ac proinde (juxta præmissa in hac Propositione) constabit rectas $\Lambda\epsilon, X\tau$ esse duas Minimas, quæ productæ occurrent in puncto Z . Demonstravimus autem (in 45^a hujus) quod, si hoc ita se habeat, ac si ducatur recta aliqua alia è puncto Z , non abscindi possit ex eadem Minima. Nam si è puncto Z egrediatur recta inter ipsas $\Lambda\epsilon, X\tau$, & ab extremitate ejus ducatur ad Axem Minima; abscindet illa Axis portionem Vertici conterminam, minorem segmento à rectâ per Z ductâ abscisso. Contrarium autem fiet in Minimis ab extremitatibus reliquarum eductarum, quæ abscindent Axis portiones majores. Quæ vero dicta sunt de Axe Ellipseos intelligi debent de Axe majori. Q. E. D.



INTERPRETIS ARABIS SCHOLION.

In sequentibus hujus libri requiritur inventio duarum mediarum proportionalium inter duas rectas datas, idemque postulat Apollonius in hac Propositione. Modus autem sectionis hic est. Sint due rectæ AB, BF ; ac si æquales fuerint, manifestum est terminos interpositos etiam iisdem æquales esse. Quod si inæquales fuerint, sit AB major; & convenient ad angulos rectos in B , ac producantur indefinitè. Completo autem parallelogrammo $AB\Gamma\Delta$, jungatur AF quæ bisecetur in puncto E ; ac centro E describatur Circulus $AB\Gamma\Delta$ parallelogrammo circumscriptus; & per Δ agatur recta $Z\Delta H$ ipsi AF parallela, quæ divisa erit bisariam in puncto Δ , ob æquales AE, EF ; interfecabit vero arcum $\Delta\Gamma$, quia $\Gamma\Delta$ major est quam ΔA : occurrat autem ei in puncto N . Describatur (juxta quartam II^{di}) per punctum Δ Asymptotus, BZ, BH Hyperbola $\Theta\Delta M$; & erit ZH (per nonam II^{di}) Tangens ejusdem, ob æquales $Z\Delta, \Delta H$. Ac manifestum est Sectionem illam Circulo occurrere inter puncta Δ, N ; aliter enim caderet segmentum arcus ΔN & subtensa ejusdem inter sectionem Tangentemque ejus, quod (per 32^{am} primi) fieri non potest. Neque erunt intersectiones cum circulo $AB\Gamma\Delta$ (per 33^{am} II^{di}) plures quam duæ. Occurrat igitur in punctis Δ, Θ ; ac juncta $\Delta\Theta$ producatur utrinque ad K, Λ ; ipseque $\Delta K, \Theta\Lambda$ (per 8^{am} II^{di}) æquales erunt. Dico quod inter rectas AB, BF duæ proportionales sunt $\Lambda\Gamma, KA$.




Quoniam ΔK ipsi $\Theta\Lambda$ æqualis est, erit rectangulum sub $\Delta\Lambda, \Lambda\Theta$, hoc est (ob Circulum) rectangulum sub $BA, \Lambda\Gamma$, æquale rectangulo sub $\Theta K, K\Delta$, sive sub BK, KA ; adeoque $\Lambda\Gamma$ erit ad KA sicut BK ad BA . Sed BK est ad BA sicut $\Delta\Gamma$, hoc est AB ad $\Lambda\Gamma$; atque etiam in eadem est ratione KA ad $\Lambda\Delta$, hoc est $B\Gamma$. Hoc autem fit ob similitudinem triangulorum $\Lambda BK, \Lambda\Gamma\Delta, \Delta AK$. Proinde AB erit ad $\Lambda\Gamma$ sicut $\Lambda\Gamma$ ad KA ac KA ad $B\Gamma$; quare $\Lambda\Gamma, KA$ sunt duæ mediæ proportionales inter $AB, B\Gamma$. Q. E. D.

PROPO-

PROPOSITIO LIII.

S*I capiatur, extra dimidium Ellipsis ab Axe majore divisæ, punctum quoddam, à quo normalis ad Axem demissa cadat super centrum Sectionis; ac fuerit ratio hujus normalis semiaxe minore auctæ ad semiaxem minorem, non minor ratione diametri transversæ ad latus rectum: Ex hoc puncto egredi nequit recta aliqua ad Sectionem, cujus portio intercepta inter Axem & Sectionem sit Minima; sed Minima ab extremitate alicujus ductæ cadet ad eas partes ejus quæ à Vertice Axis majoris remotiores sunt.*

Sit BAG femi-ellipsis, Axe majore BF ; & detur extra illam punctum quodvis Δ , unde demissa normalis cadat super Sectionis centrum; hoc est, ducta ΔE ad angulos rectos ipsi FB , sit punctum E , super quod cadit, centrum Sectionis: & sit ratio ΔA ad AE non minor ratione diametri transversæ ad latus rectum. Dico non duci posse de puncto Δ rectam aliquam, cujus portio intercepta inter Sectionem & Axem BF Minima sit; ac si educatur ex eo recta quælibet ΔK , Minima è puncto K ducta cadet versus E , respectu ipsius ΔK .




Ducantur normales KH, KZ , ac sit ratio ΔA ad AE non minor ratione diametri transversæ ad latus rectum; erit autem ratio ΔA ad AE minor ratione ΔZ ad ZE ; adeoque ratio ΔZ ad ZE five EH ad HE major erit ratione diametri transversæ ad latus rectum. Fiat itaque EH ad HA sicut diameter transversa ad latus rectum; ac recta KA (per decimam hujus) Minima erit, adeoque recta KE (per 25^{am} hujus) non est Minima: sed recta Minima per K ducta cadet propius centro E quam recta KA . Q. E. D.

PROPOSITIO LIV.

S*I capiatur punctum quodvis extra dimidium Ellipseos ab Axe majore divisæ, à quo demissa normalis super centrum cadat; ac sit ratio hujus normalis una cum semiaxe minore simul sumptæ ad semiaxem minorem, minor ratione diametri transversæ ad latus rectum: non potest exire ab hoc puncto, ad alterutrum Quadrantem Ellipseos, nisi una sola recta, cujus portio intercepta inter Axem majorem & sectionem sit Minima: è nullâ vero reliquarum ad idem latus eductarum abscindi potest Minima. Sed si propior fuerit Vertici sectionis quam Minima illa, Minima ab ejusdem extremitate ducta remotior erit à Vertice; è contra vero, si remotior à Vertice fuerit, Minima ab extremitate ejus educta cadet Vertici propius.*

Sit BAG femi-ellipsis, Axe majore BF ; & detur extra illam punctum aliquod Δ , à quo normalis cadat super centrum; ut ΔE cadens super centrum Sectionis E , ad angulos rectos Axi FB : sitque ratio ΔA ad AE minor ratione diametri transversæ ad latus rectum. Dico quod ad eundem sectionis quadrantem non nisi una recta duci possit de puncto Δ , cujus portio inter Curvam BAG & Axem BF intercepta sit aliqua è Minimis. In reliquis vero de puncto Δ eductis; si ab extremitatibus earum quæ Vertici B propiores sunt, agantur Mi-




L

nimæ,

nimæ, cadent eæ remotiores à puncto B: Minimæ vero, ab extremitatibus rectarum ex Δ exeuntium punctoque B remotiorum, propiores erunt Vertici quam ipsæ eductæ.

Quoniam enim ratio ΔA ad AE minor est ratione diametri transversæ ad latus rectum; fiat ΔH ad HE ut diameter transversa ad latus rectum, & ducantur $H\Theta$, ΘK ipsis $B\Gamma$, AE parallelæ; & jungatur $\Theta A \Delta$. Dico ΘA , partem interceptam ipsius $\Theta \Delta$, esse Minimam. Nam ΔH est ad HE sicut EK ad KA , quare EK est ad KA ut diameter transversa ad latus rectum; punctum autem E est centrum sectionis: quare (per 11^m hujus) ΘA Minima est. Occurrit autem Axi minori in puncto Δ ; adeoque si exeat de puncto Δ recta alia præter $\Delta \Theta$, quæ remotior fuerit eâ à Vertice B, Minima ab extremitate ejus ducenda propior erit puncto B quam recta ipsa. Quod si minus distet à Vertice B quam $\Delta \Theta$, Minima ab ejus extremitate ducta (per 46^m hujus) occurret Axi majori in puncto à Vertice B remotiori.




PROPOSITIO LV.

Si sumatur punctum aliquod extra dimidium Ellipseos ab Axe majore bisectæ, à quo demissa normalis non cadat super centrum: Duci poterit ab eodem recta occurrens alteri semissi Axis majoris in quem non cadit normalis, cujus portio intercepta inter sectionem & Axem majorem sit Minima; nec ab eodem puncto duci potest alia recta occurrens eidem reliquo semiaxi, è qua abscindatur Minima.

Sit $AB\Gamma$ Ellipsis, Axe majore $A\Gamma$ ac centro Δ ; & sit datum punctum E , è quo demittatur Axi $A\Gamma$ normalis EZ ; nec sit centrum in puncto Z . Dico quod duci possit ex E recta occurrens ipsi $\Delta\Gamma$, ita ut inter sectionem $AB\Gamma$ & semiaxem $\Delta\Gamma$ interceptetur Minima. Fiat EH ad HZ sicut diameter transversa ad latus rectum; atque etiam in eadem ratione fiat $\Delta\Theta$ ad ΘZ : ac per H ipsi $A\Gamma$ parallela ducatur KA , uti per Θ ipsi EZ parallela recta $M\Theta A$: dein per datum punctum E , Asymptotis MA , AK (per 4^m secundi) describatur Hyperbola. Sit Hyperbola illa EN , occurrens Ellipsi in puncto N , jungaturque NZE . Dico NZ Minimam esse.

Producatur EN ad occursum utriusque Asymptoti MA , AK ; conveniat autem iis in punctis M , K , ac demittantur ad $A\Gamma$ normales NO , $K\Pi$: & erit (per 8^m secundi) ME ipsi KN æqualis; adeoque $z\Theta$ ipsi ΠO æqualis est. Est autem EH ad HZ sicut diameter transversa ad latus rectum, & ut EH est ad HZ ita $z\Pi$ ad Πz ; adeoque $z\Pi$ est ad Πz ut diameter transversa ad latus rectum. Sed $\Delta\Theta$ est ad ΘZ in eadem ratione diametri transversæ ad latus rectum; quare $z\Pi$ est ad Πz ut $\Delta\Theta$ ad ΘZ . Recta vero ΘZ ipsi ΠO æqualis est, uti $\Delta\Theta$ utrisque ΠO , ΔZ simul sumptis. Auferendo igitur ab ipsa $z\Pi$ utrasque $z\Delta$, ΠO , & ab ipsa Πz rectam ΠO , erit residuum ΔO ad residuum Oz ut totum Πz ad totum Πz ; hoc est ut diameter transversa ad latus rectum. Verum NO normalis est, & Δ est sectionis centrum; ergo (per 10^m hujus) recta NZ Minima est. Q. E. D.



PROPO-

PROPOSITIO LVI.


Diximus autem in præcedente Propositione Hyperbolam Ellipsi concursuram : quod hoc modo demonstratur. Ducatur rs tangens Ellipsin in Vertice r .

Quoniam vero $\Delta\Theta$ est ad ΘZ sicut diameter transversa ad latus rectum, ac ratio $\Delta\Theta$ ad ΘZ minor est ratione $\Gamma\Theta$ ad ΘZ ; erit ratio $\Gamma\Theta$ ad ΘZ major ratione diametri transversæ ad latus rectum, nempe ratione HE ad HZ . Cum autem ratio $\Gamma\Theta$ ad ΘZ major est ratione HE ad HZ , rectangulum igitur sub $\Gamma\Theta, HZ$ majus erit rectangulo sub $\Theta Z, HE$. Sed HZ æqualis est ipsi $\Gamma\Sigma$, uti $Z\Theta$ ipsi HA : quapropter rectangulum sub $\Theta\Gamma, \Gamma\Sigma$ majus erit contento sub EH, HA . Sectio igitur Hyperbolica per punctum E transiens, ac Asymptotis $MA, \Lambda\Sigma$ descripta (per conversam duodecimi secundi) occurret rectæ $\Gamma\Sigma$. Est autem $\Gamma\Sigma$ Tangens Sectionis $AB\Gamma$, ac proinde Hyperbola illa occurret semi-ellipsi $AB\Gamma$. Q. E. D.

PROPOSITIO LVII.

HOC demonstrato, jam restat probandum nullam aliam rectam eidem Sectionis quadranti occurrentem, ab eodem puncto duci posse, è qua abscindat Axis Minimam.

Sit $\Delta B\Gamma$ Ellipsis, Axe majore ΓA & centro E ; & à dato infra Axem puncto Δ demittatur normalis ΔZ , ac ex eodem Δ ducatur recta $\Delta H\beta$, è qua abscissa sit Minima $H\beta$. Ducantur etiam ΔK , $\Delta \Theta$, occurrentes Axi in punctis Π , Ξ . Dico neque ΘZ , nec $K\Pi$ Minimas esse.





E centro Sectionis ϵ ducatur ϵN ipsi ΔZ parallela, occurrens rectæ $\text{BH}\Delta$ in puncto N ; ac jungatur $\text{N}\Theta$. Quoniam vero BH Minima est, occurrens Minimæ per centrum Sectionis ductæ in puncto N , intra angulum $\text{HZ}\Delta$; portio rectæ $\text{N}\Theta$ inter Axem & Sectionem intercepta non erit Minima; sed Minima de puncto Θ ducta (per 46^{am} hujus) propior erit Vertici Γ ; ac proinde recta ΘZ à Vertice adhuc remotior (per 25^{am} hujus) non erit Minima. Pari modo demonstrabitur rectam $\text{K}\Pi$ non esse Minimam, Minimamque per punctum K ductam longius à Vertice Γ cum Axe concurrere quam $\text{K}\Pi$. Q. E. D.

PROPOSITIO LVIII.

Dato quovis puncto extra ambitum Sectionis posito, quod nec sit in Axe ejus, neque in eodem producto: possumus educere ex eo rectam, cujus intercepta inter Sectionem & Axem sit Minima.

Sit autem sectio imprimis Parabola, ut AB; & sit Axis productus rz: detur
vero extra sectionem & ad latus Axis punctum Δ. Dico
quod è puncto Δ egredi potest recta, cujus portio in-
tercepta inter sectionem & Axem ejus Minima sit.



Demittatur normalis ΔE ad Axem ΓZ , & fiat EZ dimidium lateris recti; fitque ZH normalis in ipsam $Z\Gamma$. Dein per punctum Δ , Asymptotis HZ , $Z\Gamma$ describatur Hyperbola $\Lambda\Delta\Theta$, quæ occurrat Parabolæ in puncto Λ . Jungatur ΔA , ac producatur ad H, Γ : *Dico $\Delta\Gamma$ Minimam esse.*

Ex A demittatur ad ΓZ cathetus AK; cumque ΔH
(per 3^{am} secundi) ipsi ΔΓ æqualis est; erit quoque recta ZE ipsi ΚΓ æqualis. Sed
ZE dimidium est lateris recti; adeoque & ΚΓ æqualis est dimidio lateris recti. Est
autem ΚΑ normalis, ac proinde (per 3^{am} hujus) recta ΑΓ Minima est. Q. E. D.


L 2

PROPO-

PROPOSITIO LIX.

SI vero sectio fuerit Hyperbola vel Ellipsis ut AB , Axe BA & centro Γ ; ac demittatur punctum quoddam E extra sectionem, nec in Axe, neque in Axe producto; à quo demittatur ad Axem BA normalis EZ . Imprimis autem non cadat super Centrum. Dico quod possumus ducere per punctum E rectam, è quâ portio abscissa inter Curvam AB & Axem BA sit Minima.

Fiat ΓH ad HZ sicut diameter transversa ad latus rectum, & ducatur ad angulos rectos normalis HM . Fiat etiam $E\Theta$ ad ΘZ in eadem ratione diametri transversæ ad latus rectum, & agatur recta $K\Lambda$ per punctum Θ ipsi $Z\Delta$ parallela; & per punctum datum E describatur (per 4^m secundi) Hyperbola Asymptotis $MK, K\Lambda$; quæ quidem occurret sectioni AB . Sit autem Hyperbola illa $E\Lambda Z$ conveniens sectioni AB in puncto A ; & jungatur EA producatque utrinque ad M, Λ ; occurrat autem Axi ad Δ . Dico rectam $A\Delta$ Minimam esse. Demittatur normalis AN .




Quoniam vero recta ME (per 8^m secundi) æqualis est ipsi AA ; erit quoque $K\Theta$ ipsi OA , ac proinde OK ipsi OA æqualis, cui etiam æqualis est NH . Est autem $Z\Delta$ ad ΘA five NH , ut ZE ad $E\Theta$; hoc est ut $Z\Gamma$ ad ΓH : quare alternando $Z\Delta$ est ad $Z\Gamma$ sicut NH ad $H\Gamma$. Ac componendo in Hyperbola, vel dividendo in Ellipsi erit $\Delta\Gamma$ ad ΓN sicut $Z\Gamma$ ad ΓH ; quare per conversionem rationis in Ellipsi, vel dividendo in Hyperbola, ΓN erit ad $N\Delta$, sicut ΓH ad HZ , hoc est, ut diameter transversa ad latus rectum. Verum AN normalis est in Axem BA , adeoque (per 9^m & 10^m hujus) $A\Delta$ Minima est. Pari modo demonstrabitur, si cadat normalis ZE ad alteram partem verticis B .

PROPOSITIO LX.

Quod si in Hyperbola normalis, à puncto Γ extra sectionem dato demissa, cadat super centrum, ut ΓA . Fiat ΓE ad $E\Delta$ sicut diameter transversa ad latus rectum, & ducatur AE Axi ΔZ parallela, & producat ad occursum sectionis in A . Jungatur ΓA conveniens Axi in Z . Dico AZ Minimam esse.

De puncto A ducatur ad Axem normalis AH . Quoniam vero ΓE est ad $E\Delta$ sicut diameter transversa ad latus rectum; ΓA ad AZ erit in eadem ratione. Sed ut ΓA ad AZ ita ΔH ad HZ : quare ΔH est ad HZ ut diameter transversa ad latus rectum. Est autem AH normalis in Axem; adeoque (per nonam hujus) AZ Minima est. Q. E. D.




PROPOSITIO LXI.

AT vero si normalis de puncto dato demissa cadat ab altera parte, five ultra centrum Hyperbolæ ad modum rectæ ΓA . Sit E centrum Hyperbolæ, ac fiat EZ ad $Z\Delta$ sicut diameter transversa ad latus rectum, ac in eadem ratione fiat ΓH ad $H\Delta$; & ducatur $H\Theta$ Axi ΔE parallela, ut & ZK, EM ipsi ΓA parallelæ. Per punctum B Asymptotis $\Theta K, KZ$ describatur Hyperbola quæ occurret sectioni AB .

Occurrat

Occurrat autem in puncto A , ac sit Hyperbola illa AE . Jungatur GA quæ producatur ad Λ . Dico ΛA Minimam esse.

Demittatur recta $\Theta A O$ normalis super Axem ΔO . Jam fecimus GH ad HA sicut EZ ad ZA ; adeoque rectangulum sub GH & HK (hoc est ZA) æquale est rectangulo sub KM (sive EZ) & ME , hoc est HA . Sed rectangulum sub KM , MB (per 12^m secundi) æquale est rectangulo sub $K\Theta$, ΘA , quia sunt inter Asymptotos; quare rectangulum sub GH , HK æquale est rectangulo sub $K\Theta$, ΘA ; unde $A\Theta$ est ad GH sicut HK ad $K\Theta$. Verum $A\Theta$ est ad GH sicut ΘN ad NH ; ac propterea HK est ad $K\Theta$ sicut ΘN ad NH , ac componendo $H\Theta$ est ad ΘK sicut ΘH ad HN , adeoque ΘK æqualis est ipsi HN . Est autem ΘK ipsi ZO æqualis, ac proinde ZO , NH æquales sunt. Hinc ΛA est ad NH sicut eadem ΛA ad ZO , quare ΛA est ad ZO sicut $\Delta \Gamma$ ad ΓN ; ac $\Delta \Gamma$ est ad ΓN sicut $\Delta \Gamma$ ad GH ; quapropter ΛA est ad ZO sicut $\Delta \Gamma$ ad GH . Sed $\Delta \Gamma$ est ad GH sicut ΔE ad EZ ; adeoque permutando ΛA est ad ΔE sicut OZ ad ZE . Residuum itaque ΛE ad residuum EO est ut ΔE ad EZ : ac dividendo, EO ad OA erit ut EZ ad ZA , hoc est ut diameter transversa ad latus rectum. Cum autem EO est ad OA ut diameter transversa ad latus rectum, erit (per nonam hujus) ΛA Minima. Q. E. D.




PROPOSITIO LXII.

Dato quovis puncto intra ambitum Sectionis Conicæ quod non sit in Axe: possumus Minimam ducere per idem punctum.



Sit autem imprimis Sectio Parabola, ut AB , Axe BH : ac detur punctum Γ intra ambitum Sectionis. Dico possibile esse ducere per punctum Γ rectam Minimam.

De puncto Γ demittatur ad Axem normalis ΓA , & sit ΔE dimidium lateris recti: ipsi autem BH per E erigatur ad angulos rectos recta $E\Theta$; & per punctum Γ Asymptotis ΘE , EH describatur Hyperbola $\Lambda \Gamma$, quæ quidem occurreret Parabolæ: occurrat autem in puncto A , ac juncta recta $\Lambda \Gamma$ producatur ad H , Θ . Dico rectam ΛH esse Minimam. Demittatur normalis AZ : cumque GH (per 8^{am} secundi) ipsi ΘA æqualis est, erit ΔH ipsi EZ æqualis; ac proinde $E\Delta$ ipsi ZH æqualis. Sed $E\Delta$ est dimidium lateris recti, adeoque & ZH dimidium est lateris recti. Quocirca ΛH (per 8^{am} hujus) Minima est. Q. E. D.




PROPOSITIO LXIII.

SI vero Sectio AB fuerit Hyperbola vel Ellipsis, Axe BA ac centro Γ : ac detur punctum aliquod Δ , in situ superius descripto. Dico quod possumus ducere per punctum Δ Minimam.



Demittatur enim normalis ΔE ; ac fiat $\Gamma \Theta$ ad ΘE , ut & ΔZ ad ZE , sicut diameter transversa ad latus rectum; & per punctum Z ducatur HK Axi BA parallela, ipsi

ipſi vero ΔE parallela ſit recta $H\Theta Z$: Deſcribatur per punctum Δ Aſymptotis HZ, HK , Hyperbola $\Lambda\Delta$, quæ quidem occurret datæ Hyperbolæ vel Ellipſi. Sit autem punctum occuſus Λ , ac juncta $\Lambda\Delta$ producat ad Λ, Z . Dico rectam $\Lambda\Delta$ Minimam eſſe.



Quoniam enim $Z\Lambda, \Delta K$ (per 8^m ſecundi) æquales ſunt, erunt etiam $H\Pi$ five ΘM & KZ æquales: eſt autem ZK ad KO differentiam inter ZK & $E\Lambda$, ſicut ΔZ ad ZE ; ac ΔZ eſt ad ZE ſicut $\Gamma\Theta$ ad ΘE ; quare ΘM eſt ad differentiam inter ΘM & $E\Lambda$ ut $\Gamma\Theta$ ad ΘE ; adeoque per converſionem rationis ac permutando $M\Theta$ eſt ad $\Theta\Gamma$ ſicut ΛE ad $E\Gamma$; unde dividendo in Ellipſi vel componendo in Hyperbola erit ΓM ad $M\Lambda$ ſicut $\Gamma\Theta$ ad ΘE . Sed $\Gamma\Theta$ eſt ad ΘE ut diameter tranſverſa ad latus rectum, ac $M\Lambda$ Axi $\Theta\Gamma$ normalis eſt. Quapropter recta $\Lambda\Delta$ (per 9^m & 10^m hujus) Minima eſt. Q. E. D.

PROPOSITIO LXIV.

SI detur punctum infra Axem Parabolæ vel Hyperbolæ, à quo recta ad Sectionis Verticem ducta contineat cum Axe angulum acutum; impoſſibile autem ſit ut ducatur è puncto illo recta aliqua cujus portio inter Axem & Sectionem intercepta ſit Minima; vel in Ellipſi, ſi una tantum fuerit recta, ex dato puncto exeuns ad partes Sectionis contrarias illis ad quas jacet datum punctum, è qua abſcindat Axis Minimam: erit recta, quæ de puncto illo ad Verticem Sectionis ducitur, Minima omnium ad illam Sectionis partem ab eodem ducendarum, atque huic propior minor erit remotiore.

Sit autem imprimis ſectio Parabola ut $\Delta B\Gamma$, Axe ΛE ; ſitque datum punctum Z infra Axem, ita ut angulus $Z\Lambda E$, qui continetur à recta per punctum illud ad Verticem ſectionis ducta & Axe ΛE , acutus fuerit. Primum autem non ſit poſſibile, ut ducatur ad ſectionem recta aliqua cujus portio inter Curvam & Axem intercepta ſit Minima. Dico quod Minima omnium, quæ duci poſſint ad ſectionem $\Lambda\Gamma$ de puncto Z , eſt ipſa ΛZ ; quodque eidem propiores ductæ minores ſunt remotioribus. Hoc autem manifeſtum erit ex eo quod, rectis quibuſlibet è puncto Z eductis & ad ſectionem continuatis, ab earundem extremitatibus non duci poſſint rectæ Minimæ, quæ non occurrant Axi remotius à Vertice Λ quam ipſæ rectæ è puncto Z eductæ.


Demonſtrabitur autem hoc modo. Demittatur normalis ZE ; ac recta ΛE vel erit æqualis ſemilateri recto, vel major eo vel minor. Sit autem imprimis æqualis ei vel minor eo; ac è cunctis rectis per Z ad ſectionem ductis, non erit ulla cujus portio inter Sectionem & Axem intercepta Minima eſt; ſed Minimæ, ab earundem in Sectione extremitatibus ad Axem ductæ, cadent verſus partes ab Λ remotiores quam rectæ quæ ex Z prodeunt, juxta 49^m hujus.

Si vero ΛE major fuerit ſemilateri recto, ſit $E\Theta$ dimidium lateris recti; ac ſit ΘH duplum ipſius ΛH ; & ad punctum H ipſi ΛE normalis ſit $H B$: ac fiat $E\Lambda$ ad $H B$ ſicut ΘH ad ΘE . Erit autem ZE vel æqualis ipſi $E\Lambda$, vel minor eâ, vel major. At non erit æqualis ipſi $E\Lambda$, quia (per 51^m hujus) ſi ZE fuerit ipſi $E\Lambda$ æqualis, duci poſſit una recta de puncto Z è qua abſcinderetur Minima: ZE igitur non erit ipſi $E\Lambda$ æqualis. Pari modi conſtabit $E Z$ minorem eſſe non poſſe quam recta $E\Lambda$. Nam

*

(per

(per eandem 51^{am} hujus) si EZ minor fuerit quam EA , duci possint duæ rectæ, quarum utriusque portio inter Sectionem & Axem intercepta sit Minima; contra Hypothesin. Posuimus enim non duci posse de puncto Z aliquam rectam è quâ interciperetur Minima: adeoque ZE non est minor quam EA , neque etiam eidem æqualis est, ac propterea major erit eâ. Per eandem autem 51^{am} constat, quod si ZE major fuerit quam EA , non duci possit de puncto Z recta ulla cujus portio intercepta inter sectionem & Axem fuerit Minima: quodque rectis quibuscvis de puncto Z ad sectionemeductis, si ab extremitatibus earum agantur Minimæ ad Axem, convenirent illæ Axi ultra occursum rectarum è Z egredientium, sive remotius à Vertice A . Quapropter, sive AE æqualis fuerit dimidio lateris recti, sive minor eo; vel etiam si AE major fuerit dimidio lateris recti, simulq; ZE major quam EA ; rectæ omnes de puncto Z ad sectionem prodeuntes occurrent Axi propius puncto Verticis A quam Minimæ ab extremitatibus earundem ductæ. Hoc posito: Dico rectam ZA Minimam esse rectarum de puncto Z ad sectionem prodeuntium, eidemque propiorem minorem esse remotiore.



Ducantur rectæ ZB , $ZΓ$; ac primum si fieri possit, sit AZ ipsi BZ æqualis, & ad A tangat sectionem recta AK ; & erit (per 17^{am} primi) AK Axi AE normalis, quia ordinatim ad Axem applicatis parallela est; unde angulus ZAK obtusus est. Ductâ autem ipsi AZ normali ut AN , cadet ea intra sectionem, quia (per 32^{am} primi) impossibile est ducere inter Tangentem & Sectionem rectam aliquam. Ducatur etiam per punctum B Tangens Sectionis $BΣ$, ac Minima de puncto B ad Axem ducta remotior erit à puncto A quam BZ , per nuper demonstrata; comprehendit autem Minima (per 27^{am} hujus) cum Tangente $BΣ$ angulum rectum, adeoque angulus $ZBΣ$ acutus erit. Ac si centro Z radio BZ describatur arcus circuli, occurreret ille Tangenti $BΣ$; recta vero NA erit tota extra illum, quia angulus $ZBΣ$ acutus est, angulus vero ZAN rectus. Quare si sit circulus ille curva $BEOA$, necesse est ut occurrat sectioni; sitque punctum occursum O . Jungatur OZ , ac tangat sectionem recta $OΠ$ cadens necessariò extra circulum. Cum autem Minima de puncto O ad Axem ducta remotior est à Vertice A quam recta OZ , ac Minima illa cum Tangente $OΠ$ (per 27^{am} hujus) comprehendit angulum rectum: angulus igitur $ZOΠ$ acutus erit; ac proinde recta $OΠ$ circulo occurrere debet. Eadem autem cadit extra illum. Hoc autem absurdum est, adeoque AZ non est ipsi BZ æqualis.

Si vero fieri possit, sit AZ major quam BZ ; ac centro Z radio ZB describatur circulus, qui quidem occurreret ipsi AZ : portio autem aliqua Tangentis $BΣ$ erit intra circulum, per nuper demonstrata: occurreret igitur circulus sectioni necessariò, quia rectæ AZ occurrit. Sit circulus ille $Bγσ$, ac jungatur $Zγ$; ducaturque per punctum $γ$ sectionis Tangens $γP$, quæ quidem cadet intra circulum; quia Minima inter punctum $γ$ & Axem intercepta cadit versus partes remotiores à puncto A quam recta $γZ$: unde angulus $ZγP$ acutus est. Recta itaque $γP$ occurrere debet circulo. Manifestum autem est debere eandem totam extra reperiri: quod absurdum. Recta igitur AZ non est major quam BZ , neque eidem æqualis; est ergo minor eâ.

Dico quoque rectas ipsi AZ propiores remotioribus minores esse. Producat Tangens $BΣ$ ad $Σ$; cumque recta $BΣ$ tangit sectionem in puncto B , & angulus $ZBΣ$ acutus est, erit angulus deinceps, nempe $ZBΣ$, obtusus; & per B ipsi BZ normalis sit BM ; quæ proinde cadet intra sectionem. De puncto $Γ$ ducatur sectionis


M 2

Tangens

Pari argumento, si ponamus ZB majorem esse quam $Z\Gamma$, demonstrabitur absurditas, ac in rectis AZ, ZB ; ubi supposuimus AZ majorem esse quam BZ . Est igitur AZ recta Minima quæ duci possit de puncto Z ad sectionem $AB\Gamma$, eidemque propior minor est remotiore.

PROPOSITIO LXV.

Hoc autem manifestum erit, si recta quaelibet Minima, à quovis in sectione $AB\Gamma$ puncto ad Axem AE ducta, cadat versus partes remotiores à Vertice A quam quæ jungit punctum illud & Z . Demittatur ad Axem de puncto Z normalis ZE , & AE vel æqualis erit dimidio lateris recti, vel erit major eo, vel minor. Si vero eidem vel æqualis fuerit vel minor eo, ac rectæ de puncto Z ad sectionem $AB\Gamma$ egrediantur; quæ ab earundem extremitatibus ducuntur ad Axem Minimæ (per 45^m hujus) remotiores erunt ipsis à Vertice A . Si vero AE major fuerit dimidio lateris recti, fiat $\Delta\Theta$ ad ΘE sicut diameter transversa ad latus rectum: ac inter ipsas $\Theta\Delta$, ΔA capiantur duæ mediæ proportionales ΔH , ΔK ; & de puncto K ipsi AE normalis erigatur KB ; & fiat EA ad KB in ratione rectanguli sub ΔE , ΘK ad rectangulum sub ΔK , ΘE . Dico quod ZE major esse debet quam recta EA . Nam si possibile sit ut non sit major eâ, ponamus imprimis eas æquales esse: ac (per 52^{dum} hujus) demonstratum est rectam unam duci posse de puncto Z è qua abscindat Axis Minimam. Cum autem hoc non ita se habeat, recta EZ non æqualis erit ipsi EA . Per eandem etiam probatur



rectam ZE non minorem esse quam EA , quia si minor fuerit eâ, non impossibile esset ducere de puncto Z duas rectas, quarum portiones inter Sectionem & Axem interceptæ forent Minimæ: recta igitur ZE major erit quam EA . Verum (per § 2^{dam} hujus) demonstratum est quod, si ZE major fuerit quam EA , non duci possit e puncto Z recta aliqua e qua abscindat Axis Minimam; quodque Minimæ, à terminis rectarum de puncto Z prodeuntium ductæ, longius distent à Vertice A quam ipsæ prodeuntes. Quapropter rectis quibuscunque de puncto Z ad sectionem ductis, Minimæ ab earundem extremitatibus ad Axem emissæ remotiores erunt ipsis à puncto A : adeoque iisdem argumentis, quibus in præcedente propositione rem demonstravimus in Parabolâ, manifestum erit rectam AZ minorem esse quavis aliâ per punctum Z ad sectionem ABF ductâ, eidemque propiorem minorem esse remotiore.

PROPO.

PROPOSITIO LXVI.

QUinetiam si sectio fuerit Ellipsis, ut $AB\Gamma$, cujus Axis major $A\Gamma$ & centrum Δ ; ac sumatur infra Axem majorem punctum Z , ita ut angulus $ZA\Gamma$ sit acutus: & è centro Δ erigatur Axi normalis $\Delta\Sigma$: sit autem punctum Z tale, ut ab eo non duci poterit ad quadrantem sectionis $A\Sigma$ recta aliqua, cujus portio inter Sectionem & Axem intercepta sit Minima. Dico AZ minorem esse rectâ quavis aliâ de Z ad sectionis partem $A\Sigma$ ducendâ, eidemque viciniorem minorem esse remotiore.

Oportet autem normalem de Z ad axem demissam cadere inter puncta A, Δ : non potest enim cadere inter Δ, Γ , quin possibile esset ducere ad sectionem de Z (per 55^{am} hujus) rectam, cujus pars intercepta inter Axem & Sectionem foret aliqua è Minimis. Posuimus vero hoc non fieri posse, adeoque normalis non cadet inter puncta Δ, Γ . Neque cadet super centrum Δ ; quia si cadat super Δ , ac producatur ad sectionem, portio ejus inter Sectionem & Axem intercepta (per 11^{am} hujus) foret Minima. Occurret igitur ipsi $\Delta\Delta$ ad modum normalis ZE : ac AE vel æqualis erit dimidio lateris recti, vel minor erit eo, vel major.

Jam si minor fuerit eo vel eidem æqualis, patet quod è rectis quibuscumque de Z ad sectionem $A\Sigma$ prodeuntibus non fieri possit ut abscindantur Minimæ: sed Minimæ à prodeuntium extremitatibus ad Axem ductæ (per 52^{am} hujus) longius aberunt à Vertice A quam ipsæ prodeunt. Quod si AE major fuerit dimidio lateris recti; fiat $\Delta\Theta$ ad ΘE sicut diameter transversa ad latus rectum, ac capiantur inter ipsas $A\Delta$, $\Delta\Theta$ duæ mediæ proportionales $H\Delta$, ΔK ; & per H ducatur Axi ad angulos rectos ordinatim applicata HB : dein fiat EA ad HB in ratione rectanguli sub ΔE , ΘH ad rectangulum sub ΔH , ΘE ; ac ZE vel æqualis erit ipsi EA , vel major erit eâ, vel minor. Si vero EZ ipsi EA æqualis fuerit, una quidem recta duci potest (per 52^{am} hujus) de Z ad sectionem $A\Sigma$, è qua abscindat Axis Minimam. Sed aliter fieri oportet; adeoque EZ non est recta EA æqualis. Neque EZ minor esse potest quam EA , tum enim duci poterunt duæ rectæ è quibus (per eandem) abscinderentur Minimæ. Quapropter EZ major esse debet quam EA ; quo in casu nulla recta duci potest de puncto Z ad sectionem $A\Sigma$, cujus portio intercepta sit Minima: ac si ducatur à tali puncto Z ad sectionem recta quælibet, Minima inter ejusdem extremitatem & Axem interjecta (per 52^{am} hujus) longius aberit à Vertice A quam ipsa recta de Z educta.


Jam si quovis modo Minimæ, à quolibet sectionis $A\Sigma$ puncto ad Axemeductæ, remotiores fuerint à Vertice A quam rectæ de sumpto puncto Z prodeunt; pari quo in Parabola argumento, probabitur AZ minorem esse quavis aliâ de Z ad sectionem $A\Sigma$ ducendâ, eidemque propior minorem esse remotiore. Demonstratio enim una eademque est in omnibus tribus sectionibus, quoties in data sectione rectæ Minimæ, de punctis ejus ad Axem ductæ, occurrunt eidem Axi remotius à Vertice quam rectæ jungentes hæc puncta & sumptum Z .

PROPOSITIO LXVII.

SIT jam sectio $AB\Gamma$ Parabola vel Hyperbola, cujus Axis ΔE ; & detur punctum infra Axem ut Z ; sitque angulus ZAE acutus: possibile autem sit ut prodeat de puncto Z una sola recta cujus portio intercepta sit Minima. Dico quod, etiam hoc in casu, AZ minor est quavis alia recta de puncto Z ad sectionem $AB\Gamma$ eductâ, quodque eidem propior minor est remotiore.

De Z ad Axem demittatur normalis ZE ; ac dico quod, rectâ quavis de puncto Z ad sectionem $AB\Gamma$ egrediente, Minima ab ejusdem extremitate ad Axem ducta longius aberit à Vertice A quam ipsa egressa, si unam solam excipias: adeoque AE in Parabola vel Hyperbola major erit dimidio lateris recti. Nam si non major fuerit eo, impossibile esset ducere de puncto Z rectam aliquam è qua interciperetur Minima, uti constat ex 49^{as} & 52^{da} hujus. Est itaque AE major semilatre recto.

N



recto. Jam si Parabola fuerit, auferatur ab AE , à parte puncti E , recta dimidio lateris recti æqualis: ac fiat, modo (in Prop. 64^a hujus) monstrato, usque dum inveniatur recta BA , cum qua comparanda est recta BZ ; & BZ eidem æqualis erit. Non enim potest esse minor eâ, quia tum duci poterint de puncto Z ad sectionem duæ rectæ è quibus abscindat Axis Minimas (per 51^m hujus) contra Hypothesin: neque erit ZE major illa, quia hac conditione (per eandem 51^m) non duci poterit ulla recta de puncto Z cujus portio intercepta sit aliqua è Minimis. Hoc autem aliter se habet: quare recta ZE ipsi æqualis erit. Quo posito, ex eadem 51^m, manifestum est unam singularem rectam duci posse de puncto Z , cujus portio inter Sectionem & Axem intercepta Minima sit; cæterasque omnes Minimas à terminis rectarum de puncto Z prodeuntium ductas remotiores esse à Vertice A quam ipsæ prodeuntes.


Idem etiam demonstrabitur si sectio fuerit Hyperbola, cujus centrum Δ . Dividatur ΔE ita ut segmenta sint inter se in ratione diametri transversæ ad latus rectum; ac fiant reliqua ad modum Prop. 65^m hujus, usque dum inveniatur recta EA cum normali ZE comparanda. Et, si recta ZE æqualis fuerit inventæ EA , pari ac in Parabola argumento constabit punctum Z tale esse, ut una tantum recta ab eodem duci possit è qua abscindatur Minima: ductisque ad sectionem de Z rectis quibuscunque, Minimas ab earundem extremitatibus ad Axem emissas longius abesse à Vertice A quam ipsæ ductæ, per 52^m hujus manifestum est. Hinc consequuntur eadem omnia quæ in Parabola.

Sit jam ZB unica illa recta per Z ad sectionem ABF ducta, è qua abscindit Axis Minimam; ac ducantur ad sectionem inter A & B duæ aliæ, ut ZO , $Z\Pi$; & eodem modo quo demonstravimus Propositionem LXIV^m hujus, constabit AZ Minimam esse è rectis de puncto Z ad sectionem ductis. Prodeuntibusq; ad sectionem rectis quibuscunque ZO , $Z\Pi$, inter puncta A & B ; quæ eidem AZ vicinior est minor erit remotiore.

Dico quoque quod $Z\Pi$ minor est quam ZB . Nam si non sit minor eâ, primum sit æqualis ei, ac ducatur inter eas recta ZK ; erit igitur ZK major quam $Z\Pi$, per nuper demonstrata: quare in ZK capiatur recta major quam ZB , minor vero quam ZK , ut $Z\tau$; & centro Z , radio $Z\tau$ describatur circulus occurrens rectæ ZK in τ , sectioni autem ad N inter K & B , ad modum circuli $N\tau$; & jungatur ZN . Est autem recta KZ ipsi AZ propior quam ZN ; recta igitur ZK minor est quam ZN , hoc est quam $Z\tau$, quod absurdum est: quare absurda est positio ZK majorem esse quam ZB ; adeoque $Z\Pi$, ZB non sunt æquales.

Ponamus jam, si fieri possit, $Z\Pi$ majorem esse quam ZB ; ac capiatur recta aliqua in $Z\Pi$ quæ major sit quam ZB , minor vero quam $Z\Pi$, ut $Z\tau$; & centro Z , radio $Z\tau$ describatur circulus occurrens rectæ $Z\Pi$, sectioni vero necessario inter Π & E . Occurrat autem iis ad modum arcus $\tau\iota A$, & jungatur $Z\iota$; ideoque recta $Z\Pi$ minor erit quam $Z\iota$, quia propior est ipsi AZ quam $Z\iota$. Sed $Z\iota$ ipsi $Z\tau$ æqualis est, adeoque $Z\Pi$ minor est quam $Z\tau$, quod absurdum. Recta igitur $Z\Pi$ non est major quam ZB ; neque eidem æqualis, per nuper demonstrata: ac proinde minor est ea. Constat itaque rectas omnes de puncto Z ad sectionem inter A , B ductas minores esse quam ZB .

Ducantur



CONICORUM LIB. V.

11


Ducantur jam ad reliquam sectionem BT , ab altera parte ipsius ZB , rectæ $z\sigma$, $z\sigma$. Dico ZB minorem esse quam $z\sigma$, ac $z\sigma$ quam $z\sigma$. Agantur sectionis Tangentes $z\delta$, $z\gamma$; & erunt anguli $z\delta\sigma$, $z\sigma\gamma$ obtusi, quia rectæ Minime de puncto z , & ad Axem ductæ remotiores sunt à Vertice A quam rectæ ad utrumque punctum ab ipso z eductæ. Ipsi $z\sigma$ ad punctum σ normalis sit $\sigma\tau$, quæ quidem cadet intra sectionem, unde patebit, eodem quo Prop. 64^{im} demonstravimus modo, rectam $z\sigma$ minorem esse quam $z\sigma$; adeoque etiam ab altera parte ipsius BZ , rectæ per z ductæ, quæ propiores sunt Vertici A , minores erunt remotioribus. Dico quoque quod ZB minor est illis omnibus. Quoniam enim Axis abscindit e recta ZB Minimam; erit angulus comprehensus à Tangente per punctum B ductâ & ipsâ ZB rectus. Jam si fieri possit, fiat imprimis ZB ipsi $z\sigma$ æqualis, & ducatur inter eas recta ZX ; & ZX minor erit quam $z\sigma$, quia propior est ipsi AZ , hoc est quam ZB . Capiatur igitur recta $Z\epsilon$ minor quam ZB , sed major quam ZX ; ac centro Z , radio $Z\epsilon$ circinetur circulus, quæ propterea occurret sectioni inter puncta B , κ . Sit autem circulus ille $M\xi$ & occurrens sectioni in ξ , & jungatur $Z\xi$; ideo $Z\xi$ minor erit quam ZX , quia propior est ipsi AZ : adeoque ZM ipsi $Z\xi$ æqualis minor erit quam ZX . absurdum est igitur $Z\epsilon$ majorem esse quam ZX : quare recta $z\sigma$ non est ipsi ZB æqualis. Si vero fieri possit, sit minor ea; ac fiat $Z\epsilon$ major quam $z\sigma$, minor vero quam ZB ; & centro Z , radio $Z\epsilon$ describatur circulus occurrens sectioni inter puncta B , σ . Occurrat autem in τ , & sit circulus ille $\pi\tau\theta$; & jungatur τZ : adeoque erit τZ minor quam $z\sigma$, quia propior est ipsi AZ . Sed τZ æqualis est ipsi $z\sigma$, ideoque $z\theta$ minor est quam $z\sigma$. Eadem vero ex hypothese major est ea; quod absurdum: recta igitur $z\sigma$ non minor est quam ZB . Probavimus autem eas non esse æquales: adeoque ZB minor est quam $z\sigma$. Quapropter recta BZ minor est quavis recta de puncto z ad sectionis partem BT ducibilem. Unde & ex præmissis patet, AZ minorem esse omnibus rectis ad sectionem ABT ducendis, eidemque propiorem minorem esse remotiore. Q. E. D.

PROPOSITIO LXVIII.

SI duæ rectæ Sectionem Conicam contingant; erit intercepta inter punctum concursus earundem, & punctum contactus in Tangente Vertici Sectionis propiore, minor interceptâ in Tangente à Vertice remotiore.

Sit Sectio AB imprimis Parabola, cujus Axis BT : & Sectionem tangant duæ rectæ ΔA , ΔE . Dico ΔB minorem esse quam ΔA .


Junge rectam AB ; & per Δ , ipsi BT parallela, ducatur AH : ideoque (per 30^{am} secundi) AH æqualis erit ipsi EH . De puncto A demittatur normalis ad Axem ut AT , & erit angulus $A\theta A$ rectus; ac proinde angulus AHA obtusus. Est verò ΔH utrique triangulo ΔAH , $E\Delta H$ communis; ac duo latera AH , $H\Delta$ æqualia sunt duobus lateribus EH , $H\Delta$: angulos autem BHA minor est angulo AHA : Basis igitur ΔE minor est basi ΔA . Q. E. D.



PROPOSITIO LXIX.

SIT jam Sectio Hyperbola ut AB , cujus Axis ΔE , centrum E : sintque duæ Tangentes ZH , HA . Dico quod ZH minor est quam HA .

Junge HE , quæ producat in directum; jungatur etiam ATZ , occurrens ipsi HE in Γ : ideoque AT (per 30^{am} secundi) æqualis erit ipsi ΓZ . Demittatur normalis AD , & producat ET ad θ ; & ob angulum $A\Delta E$ rectum, angulus $A\theta E$ major eo obtusus erit; unde & angulus ATH obtusus: ac propterea $H\Gamma Z$ eidem deinceps minor erit eo, utpote acutus. Sed recta AT ipsi ΓZ æqualis est, & $H\Gamma$ utrique triangulo ATH , $H\Gamma Z$ communis: Basis igitur ZH minor est Basi HA . Q. E. D.




N 2

PROPO-

PROPOSITIO LXX.

SIT autem Sectio $AB\Gamma\Delta$ Ellipsis, cujus Axis major AG , minor BD , & centrum Z ; & ducantur inter puncta B, Γ , sive ad eundem sectionis quadrantem Tangentes duæ $XH, H\Theta$. Dico Axi propiorem minorem esse remotiore.


Jungantur rectæ $\Theta X, HEZ$; & erit XZ (per 30^{am} secundi) ipsi $E\Theta$ æqualis. Cumque recta ZX propior est Semi-axi minori ZB quam ZE , & recta ZE propior est Semi-axi majori quam ZX ; erit (per 11^{am} hujus) ZE major quam ZX . Latera autem $ZE, E\Theta$ æqualia sunt lateribus ZE, EX ; angulus igitur ΘEZ major est angulo XEZ , ac propterea angulus XEH major angulo $HE\Theta$. Sed latera XE, EH æqualia sunt lateribus $\Theta E, EH$: adeoque Basis XH major est Basi ΘH . Q. E. D.



PROPOSITIO LXXI.

SIT $AB\Gamma$ Ellipsis, cujus Axis major AG , minor $B\gamma$, ac centrum Δ ; sintque $HE, \Theta\tau$ normales super Axem majorem, ita ut HE major sit quam $\Theta\tau$: tangant autem sectionem rectæ duæ $HT, T\Theta$, quæ proinde (per 27^{am} secundi) convenient inter se ad easdem partes centri. Dico HT majorem esse quam $\Theta\tau$.

Jungantur $HK\Theta, \Delta KT$, & producat HE ad Λ , ac juncta $\Lambda\Delta$ producat $ad O$: ideoque erit $\Lambda\Delta$ (per 30^{am} primi) ipsi ΔO æqualis. Cumque ΛE ipsi EH æqualis est, ac ΔE super ΛH normalis, erit $\Lambda\Delta$ ipsi ΔH æqualis. Sed $\Lambda\Delta$ ipsi ΔO est æqualis: quare etiam $H\Delta, \Delta O$ sunt æquales; junctaque HO ipsi $E\tau$ parallela erit. Demittatur normalis OP , quæ proinde ipsi HE parallela & æqualis erit. Sed HE major est quam $\Theta\tau$; unde & OP major est quam $\Theta\tau$, ac recta $\Delta\Theta$ propior est Axi majori $\Delta\Gamma$ quam ΔO : quocirca $\Delta\Theta$ (per 11^{am} hujus) major est quam ΔO , hoc est quam ΔH . Est autem ΘK (per 30^{am} secundi) ipsi KH æqualis. Unde, ob ΔK communem, angulus $\Delta K\Theta$ major est angulo HKA ; ac proinde angulus TKH major erit angulo $TK\Theta$. Latera vero duo HK, KT æqualia sunt duobus $TK, K\Theta$: Basis igitur HT major erit Basi $T\Theta$. Q. E. D.




PROPOSITIO LXXII.

SI sumatur punctum infra Axem Parabolæ vel Hyperbolæ, à quo possibile sit educere duas rectas, ita ut in utrâque portio intercepta inter Sectionem & Axem sit Minima: erit ea, quæ ex his duabus Vertici Sectionis propius adjacet, omnium rectarum, de sumpto puncto ad eam Sectionis partem quæ interjacet Verticem & rectam alteram ductarum, Maxima: è cæteris vero ad eandem partem ductis, quæ Maximæ utrinque propior est major erit remotiore: altera vero recta minor erit cæteris omnibus ab eodem puncto ad reliquam istius partis Sectionem, sive ad ejusdem lateris complementum: quæque eidem propior est, è rectis ad reliquam Sectionem ductis, minor erit remotiore.

Sit Sectio $AB\Gamma$, cujus Axis FE ; sub quo sumptum est punctum Δ : ac sint $\Delta A, \Delta B$, rectæ duæ ad sectionem ductæ, è quibus abscindit Axis Minimas. Dico quod ΔB major est omnibus rectis è puncto Δ ad sectionis partem $AB\Gamma$ ducendis; quodque
* rectæ

rectæ utrinque eidem BA propiores majores sunt remotioribus: quodque AA minor est quavis recta de puncto A ad reliquam sectionem AX ducibili: quodque eidem propior minor est remotiore.

De puncto Δ Axī ΓE demittatur normalis ΔE ; & inquiretur, modo in 64^a & 65^a hujus usurpato, recta $E\Lambda$ cum recta ΔE comparanda, qua minor esse debet ΔE . Non enim potest esse major eā, quia sic impossibile esset aliquam rectam ducere per punctum Δ , è qua abscinderetur Minima. Neque eidem æqualis est, quia hāc conditione (per 51^{am} & 52^{am} hujus) non nisi una sola Minima daretur. Erit igitur ΔE minor rectā quæsitā $E\Lambda$. quo in casu duci poterunt duæ rectæ, quarum portiones interceptæ Minimæ sint; ac Minimæ à terminis rectarum inter ipsas ΔA , ΔB intermediarum propiores erunt Vertici Γ quam ipsæ intermediæ: Minimæ vero de cæterarum ductarum extremitatibus emissæ (per easdem 51^{am} & 52^{am} hujus) remotiores erunt ab eodem. Unde, eodem modo quo demonstravimus 64^{am} hujus, patebit, rectam ΔB majorem esse quāvis rectā per Δ ad sectionis partem $B\Gamma$ ductā; eidemque ΔB propiores à parte Verticis Γ majores esse remotioribus: simulq; rectam ΔB majorem esse quācunque alia ad sectionis partem AB ductā;



eidemque propius adjacentem majorem esse remotiore. Demonstrabitur autem hoc modo. Ducantur rectæ ΔM , ΔN , & ad puncta B, M tangant sectionem rectæ BZ , $ZM\Theta$; & ob $B\Pi$ Minimam, & BZ sectionis Tangentem, erit (per 27^{mam} & 28^{viam} hujus) angulus $ZB\Pi$ rectus: angulus autem $ZM\Delta$ obtusus est, quia Minima de puncto M ad Axem ΓE ducta (per 51^{mam} & 52^{dam} hujus) propinquior est Vertici Γ quam recta $M\Delta$. Cum autem angulus $ZB\Delta$ rectus est, ac angulus $ZM\Delta$ obtusus, erunt quadrata ex ZB & $B\Delta$ simul sumpta majora quadratis ex ZM , $M\Delta$. Sed (per 68^{viam} & 69^{niam} hujus) BZ minor est quam ZM , quare $B\Delta$ major est quam ΔM . Pari modo demonstrabitur rectam $M\Delta$ majorem esse quam ΔN , quia angulus $\Theta M\Delta$ acutus est; ac ductâ $N\Theta$ sectionis Tangente, erit angulus $\Theta N\Delta$ obtusus. Similiter probabitur rectam $N\Delta$ majorem esse quam ΔA . Recta igitur $B\Delta$ Maxima est è rectis de puncto Δ ad partem sectionis $A\Gamma$ ductis, eidemque propior major est remotiore. Quod vero ΔA minor est quavis rectâ de puncto Δ ad reliquam sectionem $A X$ ductâ, eodem argumento constabit quo usi sumus in demonstrandâ 64^{ta} hujus. Pariterque patebit rectam ipsi $A\Delta$ propiorem, inter eas quæ prodeunt è puncto Δ ad sectionem $A X$, majorem esse remotiore ab eadem.

PROPOSITIO LXXIII.

S*I capiatur punctum infra majorem Ellipseos Axem, quod non sit in Axe minore producto; ac inter rectas à puncto illo ad Sectionem ducendas non sit nisi una sola è qua abscindat Axis Minimam: erit hæc recta major quâvis aliâ; eidemque propior major erit remotiore: Minima vero quæ duci possit de puncto illo ad eandem semi-ellipsin, ad quam ducitur Maxima, erit recta jungens punctum datum & Sectionis Verticem puncto illi vicinior.*


Sit $AB\Gamma$ Ellipsis, cujus Axis $A\Gamma$ & centrum Δ ; & ad Δ erigatur Axi normalis BAE : fumatur etiam sub Axe punctum Z , è quo non nisi una sola recta ad sectionem $AB\Gamma$ duci potest, cujus portio intercepta fit Minima. Hæc igitur recta, è qua abscinditur Minima, talis esse debet, ut præter eam non alia duci possit ad sectionem de puncto sumpto. Semper autem possibile est unam rectam ducere de puncto Z , cujus intercepta fit Minima, quæque occurrat alteri semi-axi, siue semissi illi

O

Axis

Axis in quàm non cadit normalis de puncto z , per demonstrata in 55^a hujus. Recta igitur illa de z ad sectionem $AB\Gamma$ ducta, è qua abscinditur Minima, occurret reliquo semi-axi $\Gamma\Delta$. Sit autem ea recta zHe , & jungatur zA . Dico $z\Theta$ Maximam esse è rectis de puncto z ad sectionem $AB\Gamma$ ducendis, eidemque ab utraque parte propiorem majorem esse remotiore; Az vero Minimam esse omnium.

Quoniam enim sectio $AB\Gamma$ Ellipsis est; ac sumitur sub Axe majore punctum, à quo non duci potest ad sectionem nisi una sola recta, cujus portio intercepta sit Minima: demonstratum est (per 52^{am} hujus) cæteras Minimas, à quibuscumque sectionis punctis ad Axem ductas, longius abesse à Verticibus A vel Γ , quam rectæ jungentes puncta illa & z . Educantur de puncto z ad sectionem rectæ zK , zA , zM ; tangat autem Az sectionem in puncto A : erit igitur angulus $zA\Xi$ obtusus. Ipsi vero Az ad punctum A perpendicularis sit AO , quæ (per 32^{am} primi) cadet intra sectionem. Ducatur etiam per K sectionis Tangens $\Pi K X$. Quoniam vero Minima de puncto K ad Axem ducta remotior est ab A quam recta Kz , erit (per 57^{am} hujus) angulus $\Pi K Z$ acutus. Sed angulus $OA Z$ rectus est; adeoque demissâ de puncto z normali, eodem argumento, quo in demonstrandâ 64^a hujus usi su-



mus, constabit rectam Az non majorem esse quam zK , neque eidem æqualem: adeoque Az minor est quam zK . Similiter cum $\Pi K X$ tangit sectionem, angulus XKZ obtusus erit; ac $K\Upsilon$, ipsi Kz ad angulos rectos, cadet intra sectionem; quia (per 32^{am} primi) nulla recta duci potest quæ cadat inter sectionem & Tangentem. Agatur jam per punctum A sectionis Tangens $\xi A \Upsilon$, & Minima per A ducta remotior erit à Vertice A quam Az ; unde, juxta demonstratâ in 64^a hujus, recta zK minor erit quam zA . Ac si jungatur zB & per B ducatur Tangens sectionis $\gamma B \delta$, ob angulum $\gamma B \Delta$ rectum erit angulus $\gamma B Z$ acutus; adeoque Az (juxta eandem 64^{am}) minor erit quam zB .

Dico quoque zB minorem esse quam zM . Sectionem tangat recta $\delta M \sigma$ ad punctum M . Quoniam vero $AB\Gamma$ Ellipsis est, atque transit normalis $B\Delta E$ per centrum sectionis Δ , ac $B\delta$, δM sunt duæ Tangentes; erit $B\delta$ major quam δM (per 70^{am} hujus). Quadrata autem ex δB , BZ simul minora erunt quadratis ex δM , MZ simul,

simul, quia angulus δBZ obtusus est, angulus vero δMZ acutus; adeoque recta ZB minor erit quam ZM . Similiter demonstrabitur ZM minorem esse quam ZN , ductâ scilicet Tangente σNI . Hinc manifestum est rectas ipsi θZ propiores majores esse remotioribus.

Dico quoque θZ majorem esse quam ZN . Ducatur per θ sectionis Tangens θI , & erit angulus $\iota \theta Z$ rectus (per 28^{am} hujus) & angulus ιNZ obtusus est, Tangens autem NI (per 70^{am} hujus) major est quam $\iota \theta$. Quapropter θZ major erit quam ZN ; ac proinde major quavis recta de puncto Z ad sectionis partem $A \theta$ ducenda, eidemque propior major erit remotiore.

Porro recta rZ Minima est è rectis ad sectionis partem θr ducendis; puta $z\zeta$, $z\eta$. Tangat sectionem recta $r\zeta$ in puncto r , ipsique rZ normalis sit $r\theta$, quæ (per 32^{am} primi) cadet intra sectionem; & ad punctum ζ sectionem tangat ζr . Minima autem de puncto ζ ad Axem ducta remotior erit à Vertice r quam ipsa $z\zeta$, adeoque angulus $r\zeta Z$ acutus erit; proptereaque recta zr minor erit quam $z\zeta$, juxta demonstrata in 64^{ta} hujus. Eodemque modo probabitur quod è rectis ad sectionis partem θr de puncto Z ducendis, quæ propior est ipsi zr minor erit remotiore. Recta igitur $z\zeta$ minor est quam $z\theta$. Dico quoque quod $z\theta$ minor est quam $z\theta$. Vel enim minor erit eâ, vel æqualis ei, vel major. Ac si fieri possit, sit major eâ, & capiatur ZP major quam $z\theta$, minor vero quam $z\theta$; ac centro Z , radio ZP describatur circulus $\rho a \beta$, qui proinde occurret sectioni inter θ & θ , puta ad a . Jungatur za : cumque za remotior est à zr quam $z\theta$, major erit za quam $z\theta$. Verum za æqualis est ipsi ZP ex Hypothesi: recta igitur ZP major erit quam $z\theta$. Sed manifesto minor est eâ; quod absurdum: quare $z\theta$ non major est quam $z\theta$. Si vero fieri possit, sit æqualis ei, & ducatur inter eas intermedia aliqua ut $z\eta$: recta igitur $z\eta$ major erit quam $z\theta$, ac proinde major quam $z\theta$. Fiat igitur $z\epsilon$ major quam $z\theta$, minor vero quam $z\eta$; ac centro Z , radio $z\epsilon$ describatur circulus $\epsilon \kappa \nu$ occurrens sectioni inter θ & θ . Occurrat autem ad κ : adeoque juncta $z\kappa$ major erit quam $z\eta$, utpote remotior à zr . Eadem autem æqualis est ipsi $z\epsilon$: quare $z\epsilon$ major est quam $z\eta$. Posuimus autem eam minorem esse: quod absurdum. Recta igitur $z\theta$ minor est quam $z\theta$. Quapropter $z\theta$ major est quavis aliâ de puncto Z ad sectionem $A \theta r$ ducendâ, eidemque propior major est remotiore. Recta vero zr Minima est rectarum de puncto Z ad sectionis partem $r\theta$ ductarum, uti zA . Minima est ductarum ad alteram ejus partem $A\theta$; atque zr major est quam zA : igitur zA minor est quavis recta quæ de puncto Z ad totam sectionem $A \theta r$ duci potest, quemadmodum $z\theta$ earundem Maxima est. Q. E. D.


PROPOSITIO LXXIV.

SI detur punctum sub Axe majore Ellipseos, de quo possibile sit duas tantum rectas, è quibus abscindat Axis Minimas, ad oppositam sectionem ducere: erit Maxima rectarum, de puncto illo ad latus istud Sectionis ducendarum, altera ex duabus illis quæ occurrit Axi minori; eidemque ab utroque latere propior major erit remotiore: earundem vero Minima erit ea quæ à dato puncto ad Verticem Sectionis propiorem ducitur.

Sit ABF Ellipsis, cujus Axis major AF , & sit punctum datum Z sub Axe majore; de centro vero sectionis A erigatur Axi normalis BAE : ac possibile sit de puncto Z duas tantum rectas ducere, quarum portiones inter sectionem ABF & Axem interceptæ sint Minimæ. Ponamus autem has rectas de Z ductas esse ZH , $Z\theta$; neque duci posse aliam præter has duas à qua abscindatur Minima. Dico rectam $Z\theta$, quæ occurrit Axi minori, majorem esse qualibet aliâ de Z ad sectionem ABF ducendâ; eidemque $Z\theta$ ab utroque latere propiorem majorem esse remotiore: rectam vero ZA minorem esse quavis aliâ.

De puncto Z demittatur normalis ZN , ac manifestum est ZN non cadere posse
O 2
super

super centrum Sectionis. Nam si caderet super centrum; vel impossibile esset ducere de z rectam aliam è qua abscinderetur Minima, præter ipsam zN ad sectionem productam; vel possibile esset ducere duas alias rectas æquales (per 53^{am} & 54^{am} hujus) è quarum utrâque abscinderetur Minima. Hoc autem est contra hypothesin. Cadat igitur normalis zN inter puncta A, Δ ; ac recta AN major erit femilatore recto; quia si non major fuerit eo, impossibile foret (per 50^{am} hujus) ducere de z inter A & B rectam aliquam cujus portio intercepta sit Minima. Itaque AN , uti diximus, major esse debet dimidio lateris recti. Fiat ΔK ad KN sicut diameter transversa ad latus rectum, & inveniantur inter $A\Delta, \Delta K$ duæ mediæ proportionales; & erigatur normalis, quemadmodum fecimus in Prop. 64^a hujus; cæteraque peragantur, usque dum inveniatur recta illa quæ cum recta zN conferenda est. Huic autem sic inventæ æqualis esse debet recta zN : nam si major fuerit eâ, nulla duci potest recta de z ad sectionis partem AB , è qua abscindatur Minima. Neque minor erit ea: tunc enim poterimus ducere duas rectas ad sectionem AB , è quarum utraque (per 52^{am} hujus) intercipiatur Minima; possumus etiam (per 55^{am} hujus) rectam tertiam educere de z ad sectionis partem BF . Recta igitur zN æqualis erit rectæ inventæ.



Jam si duci possit, de z ad sectionem AB , una tantum recta è qua abscindatur Minima; erunt Minimæ, à terminis cæterarum ad sectionem AB ductarum emissæ, remotiores à Vertice A quam ipsæ rectæ de z ductæ. Ducantur igitur per z rectæ $ZA, ZO, ZΠ$; ac, modo in demonstrandis Propositionibus 72^a & 73^{ia} usitato, manifestum erit rectam ZA minorem esse quam ZO , ac ZO quam $ZΠ$. Dico quoque quod $ZΠ$ minor est quam ZH . Nam si non sit minor ea, sit major ea, vel æqualis ei. Imprimis autem sit æqualis ei, & ducatur inter eas alia recta ZT quæ major erit quam $ZΠ$, utpote remotior ab AZ : cumque $ZΠ$ ipsi ZH æqualis est, erit ZT major quam ZH . Capiatur in ZT recta aliqua minor quam ZT , major vero quam ZH , ut ZI ; ac centro Z , radio ZI describatur circulus $I\Lambda M$; qui necessario occurreret sectioni TH . Occurrat autem in Λ , & jungatur $Z\Lambda$, quæ, cum remotior sit ab AZ , major erit quam ZT . Verum $Z\Lambda$ ipsi ZI æqualis est, quare ZI major erit quam ZT , sed eadem minor est, quod absurdum: adeoque $ZΠ$ ipsi ZH non est æqualis. Parique argumento constabit ZH non esse minorem quam $ZΠ$; ac proinde major erit ea. Quapropter ZH major est quavis recta de z ad sectionis partem AH ducibili; eidemque propior major est remotiore: earundem vero Minima est ZA .

Simili autem methodo, qua rem demonstravimus in rectis inter A & H ductis, probabitur ipsam zB majorem esse quavis recta inter H & B ab eodem puncto z ducendâ; eidemque propiorem majorem esse remotiore. Dico quoque quod ZH minor est quavis recta inter H, B ducta. Ducatur enim alia ut ZP ; ac, si fieri possit ut non sit major quam ZH , sit æqualis ei, vel minor eâ. Sit autem primo æqualis ei, & inter ipsas ZH, ZP ducatur intermedia ut $ZΞ$; quæ proinde minor erit quam ZP : adeoque minor quam ZH . Fiat $ZΣ$ major quam $ZΞ$, minor vero quam ZH ;

ac

ac centro z radio $z\Xi$ circinetur circulus $\Sigma X\Xi$, occurrens sectioni inter Ξ & H , puta ad x : & juncta recta zx minor erit quam $z\Xi$, quia longius abest ab ipsa zB . Hæc autem æqualis est ipsi $z\Xi$; adeoque $z\Xi$ minor erit ipsa $z\Xi$: eandem autem supposuimus majorem eâ: quod absurdum. Quare recta zP non est æqualis ipsi zH . Pariterque demonstrari potest zP non esse minorem eâ. Recta igitur zB Maxima est rectarum de puncto z ad sectionis partem AB ductarum, eidemque propior major est remotiore, zH vero minor est quavis recta ad sectionis partem HB ductâ.

Quoniam vero $AB\Gamma$ Ellipsis est, cujus Axis major AF , ac minor BAE ; punctum autem z situm est intra angulum AAE , si ab eodem ad sectionis partem $B\Gamma$ ducatur recta altera $z\Theta$, cujus intercepta ΘA sit Minima: constabit, modo in proximâ Propositione usurpato, rectam $z\Theta$ Maximam esse omnium de puncto z ad sectionis partem $B\Gamma$ ductarum, eidemque propiorem majorem esse remotiore. Demonstratum autem est zB majorem esse quavis recta ad sectionis partem AB ductâ, eidemque propiorem majorem esse remotiore. Quocirca $z\Theta$ major est quavis ductâ de puncto z ad totam sectionem $AB\Gamma$, eidemque utrinque propiores majores sunt remotioribus: Omnium vero Minima est recta zA . Q. E. D.


PROPOSITIO LXXV.

Si detur punctum infra Axem majorem Ellipseos, tale ut ab eodem duci possint ad Sectionem tres rectæ, è quibus abscindat Axis Minimas; quarum duæ quidem ad easdem partes Axis minoris ad quas situm est punctum, tertia vero ad contrarias: erit tertia illa, quæ ad partes contrarias ducitur, major quavis alia ductâ quæ mediam trium & Sectionis Verticem à puncto dato remotiorem interjacet, eidemque propior major erit remotiore; è cæteris vero, inter mediam trium & Sectionis Verticem puncto dato viciniorem interjectis, Maxima erit illa quæ Vertici puncto dato adjacenti adjacet, eidemque utrinque propior major erit remotiore; ex his autem duabus Maximis, major erit ea, quæ ducitur ad partes contrarias iis ad quas situm est punctum datum.

Sit $AB\Gamma$ Ellipsis, cujus Axis major AF & centrum Ξ ; & sit $B\Xi$ normalis super Axem ad centrum sectionis, sub quo sit punctum datum E : ducantur autem ex eodem tres rectæ è quibus abscindat Axis Minimas, ut EH , EZ , $E\Delta$; quarum duæ, ut EZ , $E\Delta$, erunt ad easdem partes ad quas situm est E ; tertia vero EH ad contrarias. Dico EH Maximam esse rectarum de puncto E ad totam sectionem $AB\Gamma$ ductarum; eidemque utrinque propiorem, è rectis ad sectionis partem inter Δ & A ductis, majorem esse remotiore.

Quoniam enim rectæ ΔA , $z\Theta$ sunt Minimæ, constabit, eo quo in Parabola demonstravimus modo (Prop. 72^a hujus) quod recta EZ Maxima est ex iis quæ de puncto E ad sectionis partem $\Gamma\Delta$ duci possint; quodque eidem propior major est remotiore. Pariter cum ΔA & HK sunt Minimæ, eodem modo ac in Propositione præcedente, probabitur rectam EH majorem esse quavis rectâ de puncto E ad partem AA ductâ.

Dico quoque quod EH major est quam EZ . De punctis z, H, E demittantur normales ZM, HN, EO ; & MZ erit ad $M\Theta$ (per 15^{am} hujus) sicut diameter transversa ad latus rectum: ac (per eandem) $N\Xi$ erit ad NK sicut diameter transversa ad latus rectum: quare EM erit ad $M\Theta$ sicut EN ad NK . Ratio autem OM ad $M\Theta$ minor est ratione EM ad $M\Theta$, ac proinde ratio OM ad $M\Theta$ minor est ratione EN ad NK ;



P

ac


ac multo minor ratione ON ad NK : dividendo autem ratio OO ad OM minor erit ratione OK ad KN . Sed OO est ad OM sicut EO ad ZM : & OK est ad KN sicut EO ad HN : ratio igitur EO ad ZM minor est ratione ejusdem ad HN . unde patet ZM majorem esse quam HN ; adeoque recta per punctum Z Axi AG parallela remotior erit à puncto A quam punctum H . Sit hæc parallela recta $ZP\pi$, & producat normalis EO ad X ; & ob ZP ipsi $P\pi$ æqualem, recta PX major erit quam XZ . Recta vero EX , utrique triangulo EXZ , $EX\pi$ communis, normalis est super $Z\pi$: quapropter $E\pi$ major est quam EZ , & EH major est quam $E\pi$; atque adeo major est quam EZ . Igitur EH Maxima est è rectis ad sectionem $AB\Gamma$ de puncto E ducendis, ac quæ propiores vel remotiores sunt ab eadem ita se habebunt quemadmodum in Propositione descriptum est. Q. E. D.

PROPOSITIO LXXVI.

Si normalis de puncto dato ad Ellipseos Axem majorem demissa cadat super centrum Sectionis; ac si nulla alia recta, è qua abscindat Axis Minimam, duci possit de puncto illo ad oppositos Ellipseos quadrantes: erit Maxima rectarum de puncto dato ad Sectionem ducendarum ipsa normalis producta; eidemque propior major erit remotiore.

Sit $AB\Gamma$ Ellipsis, cujus Axis major AG & centrum Δ ; & sit datum punctum E ; normalis autem ab E ad centrum demissa sit $E\Delta$, quæ producat ad B : nec possibile sit de puncto E ad sectionem $B\Gamma$ rectam aliquam ducere, cujus portio intercepta sit Minima, præter ipsam $B\Delta$. Dico EB Maximam esse rectarum quæ de puncto E ad sectionem duci possunt.

Nam si non duci possit de puncto E ad sectionem $B\Gamma$ recta aliqua è qua abscindatur Minima; rectæ Minimæ, ab extremitatibus rectarum de puncto E educarum (per 53^m hujus) remotiores erunt à Vertice Γ quam ipsæ educæ. Ductis autem Tangentibus, eo quo demonstrata est Prop. 72^a modo, constabit EB majorem esse quavis aliâ rectâ de puncto E ad sectionem ductâ; eidemque propiorem majorem esse remotiore. Q. E. D.




PROPOSITIO LXXVII.

Si normalis ad Axem majorem Ellipseos demissa cadat super centrum Sectionis; possibile autem sit ad quadrantem alterutrum Sectionis ducere rectam aliquam è qua abscindat Axis Minimam: erit recta hæc Maxima omnium de puncto dato ad eundem quadrantem ductarum, eidemque propior major erit remotiore.

Sit $AB\Gamma$ Ellipsis, cujus Axis major AG , ac centrum Δ ; sit autem E punctum infra Axem AG datum, unde demissa normalis $E\Delta$: ac possibile sit ab E ad sectionis quadrantem ΓB educere rectam aliam è qua abscindatur Minima, puta EHZ . Dico EZ majorem esse quavis alia de puncto E ad ΓB ducenda, eidemque ab utraque parte propiorem majorem esse remotiore.

Quoniam enim $B\Delta$, ZH sunt duæ Minimæ, quæ productæ conveniunt in E ; rectæ Minimæ prodeuntès è punctis quibuscvis sectionis inter Γ & Z (per 46^m hujus) occurrent Axi remotius à Vertice Γ quam rectæ connectentes eadem puncta & E , Minimæ vero de punctis sectionis inter B & Z ductæ (per eandem 46^m) propiores erunt Vertici Γ quam rectæ de puncto dato E ad eadem in sectione puncta prodeuntès. Quibus positis, ad modum demonstrationis Prop. 72^a, ope Tangentium, probabitur rectam EZ majorem esse quavis alia de puncto E ad sectionem $B\Gamma$ ductâ, eidemque propiorem majorem esse remotiore. Q. E. D.



ΠΑΠΠΟΥ

ΠΑΠΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ ΛΗΜΜΑΤΑ

ΕΙΣ ΚΩΝΙΚΩΝ ΤΟ ΕΚΤΟΝ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΠΕΡΓΑΙΟΥ.

PAPPI ALEXANDRINI LEMMA TA

IN SEXTUM LIBRUM CONICORUM

APOLLONII PERGÆI.

ΛΗΜΜΑ α'.


Εξω δύο τρίγωνα ἀμβλυγώνια τὰ $\triangle AB\Gamma$, $\triangle EZ$, ἀμβλείας έχοντα τὰς Γ , Z γωνίας, καὶ ἴσας τὰς A , Δ ὀξείας. ὁρθαὶ τὰς $B\Gamma$, EZ ἤχθωσαν αἱ ΓH , $Z\Theta$. ἔξω δὲ ὡς τὸ ὑπὸ τ $\triangle BAH$ πρὸς τὸ δὸπὸ τ $\triangle A\Gamma$ τετραγώνον, ἔτω τὸ ὑπὸ τῶν $E\Delta\Theta$ πρὸς τὸ δὸπὸ τ $\triangle Z$. λέγω ὅτι ὁμοίον ἐστὶ τὸ $\triangle AB\Gamma$ τρίγωνον τῷ $\triangle EZ$ τρίγωνῳ.

ΓΕΓΡΑΦΘΩ $\gamma\delta$ ὅτι τ $H\Theta$, $E\Theta$ ἡμικύκλια, ἐκεί-
σθ' $\delta\eta$ καὶ $\alpha\lambda\phi$ τ Γ , Z . ἐρχέσθω καὶ ἔξω τὰ $H\Gamma B$,
 $EZ\Theta$. ἦτοι $\delta\eta$ ἐφάπτονται αἱ $A\Gamma$, ΔZ τ ἡμικυ-
κλίων, ἢ γ' δ . εἰ μὴ $\delta\eta$ ἐφάπτονται, φανερόν ὅτι γί-
νεται ὁμοία τὰ $\triangle AB\Gamma$, $\triangle EZ$ τρίγωνα. ἔαν $\gamma\delta$ λάβω τὰ κέντρα
τὰ M , N , καὶ ὁρίζω τὰς $M\Gamma$, NZ , ἔσονται ὁρθαὶ αἱ

LEMMA I.

Sint duo triacula obtusangula $\triangle AB\Gamma$, $\triangle EZ$, angulos habentia obtusos Γ , Z ; acutos vero & æquales angulos A , Δ . ipsis $B\Gamma$, EZ ad angulos rectos sint ΓH , $Z\Theta$: rectangulum autem BAH sit ad quadratum ex $A\Gamma$ in eadem ratione quam habet rectangulum $E\Delta\Theta$ ad quadratum ex ΔZ . Dico triaculum $AB\Gamma$ simile esse triaculo $\triangle EZ$.

DIAMETRIS HB , $E\Theta$ describantur semicirculi, quæ proinde tranfibunt per puncta Γ , Z ; atque sint semicirculi $B\Gamma H$, $EZ\Theta$, quos vel tangunt rectæ $A\Gamma$, ΔZ , vel non. Si vero tangant, manifestum est similia esse triacula $\triangle AB\Gamma$, $\triangle EZ$. Nam si capiantur centra M , N ac jungantur $M\Gamma$, NZ , erunt anguli $M\Gamma A$, $NZ\Delta$ recti.



ὑπὸ $M\Gamma A$, $NZ\Delta$ γωνίαι, καὶ εἴη αἱ A , Δ γωνίαι ἴσαι· καὶ ἡ ὑπὸ $\Lambda M\Gamma$ ἂρα τῇ ὑπὸ $\Delta N Z$ γωνίᾳ, καὶ τὰ ἡμίση· ἡ B ἂρα γωνία τῇ E ὅσιν ἴση. ἀλλὰ καὶ ἡ Λ τῇ Δ ὁμοία ἂρα ὅτι τὰ τρίγωνα.

Ἀλλὰ ὅ μὴ ἐφάπτονται, ἀλλὰ τιμνέτωσαν τὰ ἡμικύκλια κατὰ πτα σημεία τὰ K , Λ , καὶ ἤχθωσαν κείναι αἱ $M\Xi$, $N\Theta$. ἴση ἂρα ὅσιν ἡ $\beta\epsilon$ $K\Xi$ τῇ $\Xi\Gamma$, ἡ $\gamma\delta$ $\Lambda\Theta$ τῇ ΘZ . ὁμοίον δὲ τὸ $\triangle AM\Xi$ τῷ $\triangle N\Theta$ τρίγωνῳ· ἔστιν ἂρα ὡς ἡ $\Xi\Lambda$ πρὸς ΛM ὅτως ἡ $\Theta\Delta$ πρὸς ΔN . ἐπειδὴ ὅσιν ὡς τὸ ὑπὸ BAH πρὸς τὸ ὑπὸ $A\Gamma$ ἔτω τὸ ὑπὸ $E\Delta\Theta$ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔZ . καὶ οἱ ἂρα τὸ ὑπὸ $K\Lambda\Gamma$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\Lambda\Gamma$, τυττέται ὡς ἡ $K\Lambda$

& anguli Λ , Δ sunt æquales: angulus igitur $\Lambda M\Gamma$ angulo $\Delta N Z$ æqualis est, unde & eorundem semiffes, nempe anguli $\Lambda B\Gamma$, ΔEZ sunt æquales. Sed anguli ad Λ & Δ sunt æquales: quocirca triacula sunt similia.

Sed non tangant, sed occurrant semicirculis in punctis K , Λ , ac ducantur normales $M\Xi$, $N\Theta$: est igitur $K\Xi$ ipsi $\Xi\Gamma$ æqualis, ut & $\Lambda\Theta$ ipsi ΘZ . Simile autem est triaculum $\triangle AM\Xi$ triaculo $\triangle N\Theta$, adeoque $\Xi\Lambda$ est ad ΛM sicut $\Theta\Delta$ ad ΔN . Cum vero rectangulum BAH est ad quadratum ex $A\Gamma$ sicut rectangulum $E\Delta\Theta$ ad quadratum ex ΔZ , erit etiam rectangulum $K\Lambda\Gamma$ ad quadratum ex $A\Gamma$, sive $K\Lambda$ ad

ΒΑΓ, ΕΔΖ τμήματα γωνίας· γίνεται ὅς ἡ ΒΜ ὡς ΜΟ, τοῦτέστιν ὡς ἡ ΑΜ ὡς ΜΟ, ὥτως ἡ ΕΝ ὡς ΝΡ, τοῦτέστιν ἡ ΔΝ ὡς ΝΡ. ἔστι δὲ ὡς ἡ ΑΜ ὡς ΜΣ, ὥτως ἡ ΔΝ ὡς ΝΤ. δι' ἵσου ἀρα ἔστιν ὡς ἡ ΜΟ ὡς ΜΣ, ὥτως ἡ ΠΝ ὡς ΝΤ. καὶ εἰσὶν ὁρθαὶ αἱ Ο, Ρ γωνίαι, ὁρθεὶα δ' ἐκαστέρα τῶν Σ, Τ. ἴση ἀρα ἔστιν ἡ ὑπὸ τῶν ΟΜΣ γωνία τῇ ὑπὸ τῶν ΠΝΤ γωνίᾳ. ἀλλὰ καὶ ἡ ὑπὸ τῶν ΒΜΟ τῇ ὑπὸ τῶν ΕΝΡ ἴση ἔστιν καὶ ἡ ὑπὸ τῶν ΒΜΣ ἀρα τῇ ὑπὸ τῶν ΕΝΤ ἔστιν ἴση· ὥστε καὶ ἡ Γ γωνία τῇ Ζ ἔστιν ἴση. ὁμοίαι ἀρα ἔστι πάντα παῖσι.


Διὸ καὶ ὅ, καὶ τὸ μὲν γωνίας, ἢ τὸ ἀμβλεῖον ἢ ὀξεῖον, παραγχαμμόμενος τὸ δείξαι, τὸ λοιπὸν ἀποδείξαι ὥτως. ὑποκείδω γὰρ ἀποδείξαι, ὅσον ἴσων ἀμβλεῖον τὴν γωνίαν τὸ πρότερον, κατὰ τὸ παραγχαμμόμενον πρῶτον, καὶ ὥς δὲ ὁρίν, ὁρθεῖον ὅσον ἴσων τῶν ΒΑΓ, ΕΔΖ, δείξαι, ὅτι ὁμοίαι τὰ τρίγωνα. πάλιν παραγχαμμόμενος οἱ κύκλοι, καὶ ἐκτετακταμένων τῶν ΑΗ, ΔΘ ἐπὶ τὰ Κ, Λ, ὁπρὸς ὧν ὡς αἱ ΒΚ, ΚΓ, ΕΛ, ΑΖ. ἴσαι ἀρα εἰσὶν καὶ αἱ ὑπὸ ΒΚΓ, ΕΛΖ γωνίαι ἀμβλείαι. καὶ ἐπὶ ἔστιν ὡς τὸ ὑπὸ ΒΗΓ, τοῦτέστι τὸ ὑπὸ ΑΗΚ ὡς τὸ ὑπὸ ΑΗ, τοῦτέστι ἡ ΚΗ ὡς ΗΑ, ὥτω τὸ ὑπὸ ΕΘΖ, τοῦτέστι τὸ ὑπὸ ΔΘΛ, ὡς τὸ ὑπὸ ΔΘ, τοῦτέστι ἡ ΛΘ ὡς ΘΔ. καὶ ὥς ἀρα τὸ ὑπὸ ΑΗ πρὸς τὸ ὑπὸ ΗΚ, ὥτω τὸ ὑπὸ ΔΘ πρὸς τὸ ὑπὸ ΘΛ. ἔστι δὲ καὶ ὡς τὸ ὑπὸ ΒΗΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΗ, ὥτως τὸ ὑπὸ ΕΘΖ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΘ. δι' ἵσου ἀρα ἔστιν ὡς τὸ ὑπὸ ΒΗΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΗΚ, ὥτω τὸ ὑπὸ ΕΘΖ πρὸς τὸ ὑπὸ ΘΛ. καὶ εἰσὶν ἴσαι ἀμβλείαι αἱ ὑπὸ τῶν ΒΚΓ, ΕΛΖ γωνίαι, καὶ ὁρθαὶ αἱ ΚΗ, ΛΘ. ἀλλὰ δὴ τὸ παραγχαμμόμενον, ὁμοίον ἔστι τὸ ΒΚΗ τρίγωνον πρὸς ΕΛΘ τρίγωνον, τὸ δὲ ΓΚΗ πρὸς ΖΛΘ. ὥστε καὶ τὸ μὲν ΑΒΗ τρίγωνον πρὸς ΔΕΘ τρίγωνον ἔστιν ὁμοίον, τὸ δὲ ΑΗΓ πρὸς ΔΘΖ. ὥστε καὶ ὅλον τὸ ΑΒΓ ὅλον πρὸς ΔΕΖ ἔστιν ὁμοίον.

Α Η Μ Μ Α ς'.

Θέσει δειδομένην τὴν ΑΒ, ΑΓ ἐνθεῖαν, ἀγαγῶν παράρθεϊται τὴν ΔΕ, καὶ ποιῶν δοθεῖσαν τὴν ΔΕ.

ΓΕΓΟΝΕΤΩ, καὶ ἀλλὰ τῷ Α τῇ ΔΕ παράλληλῳ ἥχθω ἡ ΑΖ. παρὰ θέσει ἀρα ἔστι. καὶ ἔστι δοθεῖν τὸ Α. θέσει ἀρα ἔστιν ἡ ΑΖ. ἀλλὰ δὴ τῷ Ε τῇ ΑΒ παράλληλῳ ἥχθω ἡ ΕΖ. ἴση ἀρα ἔστιν ἡ ΑΖ τῇ ΔΕ, καὶ δοθεῖσα ἔστιν ἡ ΔΕ. δοθεῖσα ἀρα ἔστιν καὶ ἡ ΑΖ. ἀλλὰ καὶ θέσει, καὶ δοθεῖν ἔστι τὸ Α. δοθεῖν ἀρα ἔστι καὶ τὸ Ζ. ἀλλὰ δὴ δειδομένην τῷ Ζ παρὰ θέσει τῇ ΑΒ ἥκται ἡ ΖΕ. θέσει ἀρα ἔστιν ἡ ΖΕ, θέσει δὲ ἡ ΑΓ. δοθεῖν ἀρα τὸ Ε, καὶ δι' αὐτῆς παρὰ θέσει ἥκται ἡ ΔΕ. θέσει ἀρα ἔστιν ἡ ΔΕ.

Συμπείσεται δὲ τὸ πρόβλημα ὥτως. ἔστωσαν αἱ μὲν τῇ θέσει δειδομένην δύο εὐθεῖαι αἱ ΑΒ, ΑΓ, ἢ τῇ δοθεῖσιν πρὸς μὲν ἔστω ἡ Η, παρὰ ἣν τὸ ἀγαγῶν δέῃ ἔστω ἡ ΑΖ, καὶ τῇ Η ἴση κείδω ἡ ΑΖ, καὶ δὴ μὲν τῇ ΑΒ παράλληλος ἥχθω ἡ ΖΕ, δὴ δὲ τῇ Ε τῇ ΑΖ ἥχθω ἡ ΕΔ. λέγω ὅτι ἡ ΔΕ ποιεῖ τὸ πρόβλημα. ἐπεὶ γὰρ ἴση ἔστι ἡ ΔΕ τῇ ΑΖ, ἀλλὰ ἡ ΑΖ τῇ Η ἔστιν ἴση, τοῦτέστι τῇ δοθεῖσιν καὶ ἡ ΔΕ ἀρα ἴση ἔστι τῇ Η τῇ δοθεῖσιν ἡ ΔΕ ἀρα ποιεῖ τὸ πρόβλημα. καὶ φανερόν ὅτι μόνον, αἱ γὰρ ἡ ἑγγὺς τῇ Α τὴν ἀπώτερὴν ἔστω ἐλάσσων.



qualibus ΒΑΓ, ΕΔΖ: est igitur sicut ΒΜ ad ΜΟ five ΑΜ ad ΜΟ ita ΕΝ five ΔΝ ad ΝΡ. sed ΑΜ est ad ΜΣ sicut ΔΝ ad ΝΤ: ex æquo igitur ΜΟ est ad ΜΣ sicut ΡΝ ad ΝΤ. anguli autem ad Ο, Ρ sunt recti, quare uterque angulus ad Σ, Τ acutus est; adeoque angulus ΟΜΣ angulo ΡΝΤ æqualis est. sed angulus ΒΜΟ angulo ΕΝΡ æqualis est: angulus itaque ΒΜΣ angulo ΕΝΤ æquatur; ac proinde angulus Γ angulo Ζ æqualis est. unde patet triangula esse quoad omnia similia.

Absoluta autem demonstratione in altero angulorum, five obtuso five acuto, in reliquo etiam hoc modo absolvi potest. ponatur enim demonstratum esse modo jam descripto, rem ita se habere, existentibus angulis obtusis, ac probandum est quod, si fuerint anguli ΒΑΓ, ΕΔΖ acuti, triangula quoque similia essent. circumscriptis circulis & productis ΑΗ, ΔΘ ad Κ, Λ, jungantur ΒΚ, ΚΓ; ΕΛ, ΑΖ: æquales igitur sunt anguli obtusi ΒΚΓ, ΕΛΖ. cum autem rectangulum ΒΗΓ five ΑΗΚ est ad quadratum ex ΑΗ, hoc est ΚΗ ad ΗΑ, sicut rectangulum ΕΘΖ five ΔΘΔ ad quadratum ex ΔΘ, hoc est ut ΔΘ ad ΘΔ;

erit igitur quadratum ex ΑΗ ad quadratum ex ΗΚ sicut quadratum ex ΔΘ ad quadratum ex ΘΔ. sed rectangulum ΒΗΓ est ad quadratum ex ΑΗ sicut rectangulum ΕΘΖ ad quadratum ex ΔΘ: ex æquo igitur rectangulum sub ΒΗΓ erit ad quadratum ex ΗΚ sicut rectangulum ΕΘΖ ad quadratum ex ΘΔ. æquales autem sunt anguli obtusi ΒΚΓ, ΕΛΖ, ac normales sunt ΚΗ, ΛΘ; unde per jam dicta simile erit triangulum ΒΚΗ triangulo ΕΛΘ, triangulumque ΓΚΗ triangulo ΖΛΘ. Quapropter triangulum ΑΒΗ triangulo ΔΕΘ simile est, uti triangulum ΑΗΓ triangulo ΔΘΖ: adeoque totum ΑΒΓ toti ΔΕΖ simile est.

LEMMA VI.

Datis duabus rectis ΑΒ, ΑΓ, ducere rectam ΔΕ positione datæ parallelam, quæ magnitudine datæ æqualis sit.

PUTA factum, & per Α ipsi ΔΕ parallela ducatur ΑΖ; ΑΖ igitur positione datæ parallela est: datum autem punctum Α, adeoque ΑΖ positione datur. per Ε ipsi ΑΒ parallela ducatur ΕΖ: æqualis est igitur ΑΖ ipsi ΔΕ. ac data est ΔΕ, quare ΑΖ etiam data est. sed & positione datur, & datum est punctum Α; unde punctum Ζ quoque datur. per datum autem punctum Ζ positione datæ ΑΒ parallela ducta est recta ΖΕ; datur igitur positione ΖΕ. ac datur positione recta ΑΓ: datum est igitur punctum Ε, ac per ipsum ducta est ΔΕ positione datæ parallela: datur itaque positione recta ΔΕ.

Componetur autem problema hoc modo. sint rectæ duæ positione datæ ΑΒ, ΑΓ, magnitudine autem data sit recta Η; ac sit ΑΖ ea cui parallela ducenda est. ipsi Η æqualis fiat ΑΖ, & per Ζ ipsi ΑΒ parallela ducatur ΖΕ; per Ε autem ipsi ΑΖ parallela ducatur ΕΔ. dico rectam ΕΔ satisfacere problemati. quoniam enim ΔΕ æqualis est ipsi ΑΖ, ac ΑΖ rectæ datæ Η facta est æqualis; recta igitur ΔΕ solvit problema. ac manifestum est quod ea sola rem præstat, semper enim puncto Α propior minor est remotiore.


Q2

LEMMA

LEMMA VII.

Sint duo plana $AB\Gamma$, EBZ , secundum eandem rectam $B\Gamma$ super idem planum subjectum normaliter erecta. dico rectas AB , BE , $B\Gamma$ esse in eodem plano.

UCATUR enim ϵ puncto B in (subjecto) plano recta BH ipsi $B\Gamma$ ad angulos rectos: quæ proinde plano EBZ normalis erit; adeoque & rectæ BE . pari argumento ipsi etiam AB normalis est. sed & rectæ $B\Gamma$ normalis est eadem BH : tribus igitur rectis AB , BE , $B\Gamma$ ad angulos rectos insit recta BH ad ipsarum concursus in B : quare [per quintam undecimi El.] rectæ AB , BE , $B\Gamma$ sunt in eodem plano. Q. E. D.




HΧΘΝ γὰρ ὑπὸ ΓB τῇ $B\Gamma$ ἐν τῷ ὑποκειμένῳ ὀρθή-
δω ὀρθὴ ἡ BH · καὶ τῇ EBZ ἀρα
ὀρθήδω ἔσται ὀρθὴ ἡ BH , ὥστε
καὶ τῇ BE ὀρθὴ ὀρθή. καὶ τὴν
αὐτὴν καὶ τῇ AB . ὥστ' οὖν καὶ τῇ
 $B\Gamma$ ὀρθή ἡ BH ὀρθή· ἡ BH
ἀρα πρὸς τὰς αὐτὰς τὰς AB ,
 BE , $B\Gamma$ ὀρθὴ ὅπῃ τῆς ἀπὸ Γ
 B ἐπέστηκεν· ἀλλ' ἀρα τὸ διὰ
τὴν πρὸς τὴν συγχωρεῖν ἐν ἐνὶ εἰσὶν
ὀρθήδω αἱ AB , BE , $B\Gamma$ ὀ-
ρθαί.

LEMMA VIII.

Sint duo triacula $AB\Gamma$, ΔEZ rectos habentia angulos A & Δ , ac ducantur rectæ AH , $\Delta\Theta$ sub æqualibus angulis AHB , $\Delta\Theta E$; sit autem ut BH ad $H\Gamma$ ita $E\Theta$ ad ΘZ . dico triangulum ABH triangulo $\Delta E\Theta$ simile esse, & triangulum $AH\Gamma$ triangulo $\Delta\Theta Z$, totumque toti.


PRODUCATUR AH , ac fiat ut $\Delta\Theta$ ad ΘE ita ΓH ad HK , ac jungantur BK , $K\Gamma$: est igitur angulus $\Delta E\Theta$ angulo ΓKH æqualis. quoniam vero BH est ad $H\Gamma$ sicut $E\Theta$ ad ΘZ , facta autem est ΓH ad HK sicut $\Delta\Theta$ ad ΘE ; erit ex æquo perturbatè ut BH ad HK ita $\Delta\Theta$ ad ΘZ ; & sunt circa angulos æquales: angulus igitur BKH angulo ad Z æqualis est. demonstratum autem est angulum ΓKH angulo ad E æqualem esse, ac anguli duo ad Z & E æquales sunt recto: adeoque angulus BKH



rectus est. sed ex hypothesi angulus BAG rectus est: unde puncta A , B , Γ , K sunt in circulo; ac proinde angulus $AK\Gamma$, hoc est ΔEZ , angulo $AB\Gamma$ æqualis est. ex hypothesi autem angulus AHB angulo $\Delta\Theta E$ æqualis est: simile igitur est triangulum ABH triangulo $\Delta E\Theta$, pariterque triangulum $AH\Gamma$ triangulo $\Delta\Theta Z$ simile est, totumque toti.

Aliter & melius.


BISECENTUR in punctis K , Λ rectæ $B\Gamma$, EZ , ac jungantur AK , $\Delta\Lambda$. jam quoniam BH est ad $H\Gamma$ sicut $E\Theta$ ad ΘZ , componendo ac dimidiando antecedentes, deinde per conversionem rationis, fiet ΓK five AK ad KH sicut ΛZ five $\Delta\Lambda$ ad $\Lambda\Theta$. anguli autem ad puncta H , Θ sunt æquales, & uterque angulus KAH , $\Lambda\Delta\Theta$ acutus est: angulus igitur AKH angulo $\Lambda\Delta\Theta$ est æqualis; eorundemque semisses, nempe anguli ad B & E , sunt æquales. sed angulus ad H angulo ad Θ æqualis est: simile est igitur triangulum ABH triangulo $\Delta E\Theta$. pari argumento triangulum $AH\Gamma$ triangulo $\Delta\Theta Z$ simile est, ac totum toti. Q. E. D.



ΛΗΜΜΑ Η'.

Εἰς δύο τετραγώνων $AB\Gamma$, ΔEZ ὁμοίους ἔχοντων τὰς A , Δ γωνίας, ἔδῃ δὲ ὁμοίως αἱ AH , $\Delta\Theta$ ἐν ἰσῶς γωνίαις Γ ὑπὸ AHB , $\Delta\Theta E$: εἰς δὲ ὡς ἡ BH πρὸς τὴν $H\Gamma$ ὥτως ἡ $E\Theta$ πρὸς τὴν ΘZ . λέγω ὅτι ὁμοίον ἐστὶ τὸ μὲν ABH τρίγωνον τῷ $\Delta E\Theta$ τρίγωνῳ, [τὸ δὲ $AH\Gamma$ τῷ $\Delta\Theta Z$, ὅλον ὅλῳ.]


EΚΒΒΒΑΝΧΘΝ ἡ AH , καὶ πεποιδὼ ὡς ἡ $\Delta\Theta$ πρὸς ΘE ὥτως ἡ ΓH πρὸς HK , καὶ ἐκτελέσας αἱ BK , $K\Gamma$: ἴση ἀρα ἔσται ἡ ὑπὸ $\Delta E\Theta$ τῇ ὑπὸ ΓKH γωνία. ἐπειδὴ ἔστιν ὡς μ ἡ BH πρὸς $H\Gamma$ ὥτως ἡ $E\Theta$ πρὸς ΘZ , ὡς δὲ ἡ ΓH πρὸς HK ὥτως ἡ $\Delta\Theta$ πρὸς ΘE : δι' οὗ ἀρα ἔστιν ἐν τῇ τετραπλευρῇ ἀναλογίᾳ ὡς ἡ BH πρὸς HK ὥτως ἡ $\Delta\Theta$ πρὸς ΘZ . καὶ οὕτως γωνίαις ἴση ἀρα ἔσται ἡ ὑπὸ ΓKH γωνία τῇ Z γωνίᾳ. ἔδῃ δὲ ὡς ἡ BH πρὸς $H\Gamma$ ὥτως ἡ $E\Theta$ πρὸς ΘZ καὶ εἰσὶν αἱ E , Z ὀρθῆς



ἴση· ἡ ἀρα ὑπὸ BKH γωνία ἔσται ὀρθή. ἀλλὰ καὶ ὑπὸ $\Delta E\Theta$ καὶ ἡ ὑπὸ BAG γωνία ὀρθή· ἐν κύκλῳ ἀρα ἔσται τὰ A , B , Γ , K συμμῆται· ἴση ἀρα ἔσται καὶ ἡ ὑπὸ $AK\Gamma$, τὴν τῇ ΔEZ τῇ ὑπὸ $AB\Gamma$. καὶ ἡ ὑπὸ AHB γωνία καὶ ἡ ὑπὸ $\Delta E\Theta$ ἴση ἔσται τῇ ὑπὸ $\Delta\Theta E$ γωνίᾳ· ὁμοίον ἀρα ἔσται τὸ ABH τρίγωνον τῷ $\Delta E\Theta$ τρίγωνῳ, καὶ τὰ αὐτὰ καὶ τὸ $AH\Gamma$ τρίγωνον τῷ $\Delta\Theta Z$ τρίγωνῳ ὁμοίον, [καὶ ὅλον ὅλῳ.]

Ἄλλως καὶ ἄλλοι.

TΕΤΜΗΣΘΩΝΣΑΝ δὲ τὰς K , Λ σημείους αἱ $B\Gamma$, EZ : καὶ ἐκτελέσας αἱ AK , $\Delta\Lambda$. ἐπὶ τῷ Θ ἔσται ὡς ἡ BH πρὸς $H\Gamma$ ὥτως ἡ $E\Theta$ πρὸς ΘZ , συνδίδωται, καὶ τὰ ἡμῶν τῶν ἡγεμενῶν, καὶ ἀναστρέψαντι γινέσθαι ὡς ἡ ΓK πρὸς ΘE ὥτως ἡ ΛZ πρὸς $\Delta\Lambda$. καὶ οὕτως ἴση ἔσται αἱ πρὸς τοῖς H , Θ σημείοις γωνίαις, αἱ δὲ ὑπὸ KAH , $\Lambda\Delta\Theta$ ἑκατέρωθεν ἴση ἔσται· ἴση ἀρα ἔσται καὶ ἡ ὑπὸ AKH γωνία τῇ ὑπὸ $\Delta\Lambda\Theta$ γωνίᾳ, καὶ τὰ ἡμῶν καὶ ἡ B ἴση γωνία ἴση ἔσται τῇ E . ἀλλὰ καὶ ἡ H γωνία τῇ Θ ἴση ἔσται· ὁμοίον ἀρα ἔσται τὸ ABH τρίγωνον τῷ $\Delta E\Theta$ τρίγωνῳ. καὶ τὰ αὐτὰ καὶ τὸ $AH\Gamma$ τρίγωνον τῷ $\Delta\Theta Z$ τρίγωνῳ ὁμοίον ἔσται ὁμοίον, καὶ ὅλον ὅλῳ.



APOL-

APOLLONII PERGÆI CONICORUM LIBER SEXTUS.

Apollonius Attalo S. P.

MITTO tibi Sextum Conicorum librum: qui complectitur Propositiones de Sectionibus Conicis & Sectionum Segmentis æqualibus & inæqualibus, similibus & dissimilibus; ut & alia nonnulla prætermissa ab iis qui nos præcesserunt. Nam specialiter in hoc libro invenies quomodo Sectio Sectioni datæ æqualis in dato Cono recto sit secunda: & quomodo designandus sit Conus rectus Cono dato similis qui contineat datam Sectionem Conicam. Quæ quidem uberius aliquanto ac dilucidius tractavimus quam qui ante nos his de rebus scripserunt. Vale.

DEFINITIONES.

I. Sectiones Conicæ dicantur *æquales*, si applicari possit altera super alteram; ita ut ubique convenient, nec occurrant inter se. *Inæquales* autem sunt quæ non ita se habent.

II. *Similes* vero dicantur Sectiones, in quibus, ductis ad utriusque Axem ordinatim applicatis, ipsæ ordinatim applicatæ ad portiones Axis ab iisdem abscissas Verticique conterminas fuerint respectivè proportionales: diviso scilicet utroque Axe in partes numero æquales, vel eandem inter se rationem servantes. *Dissimiles* vero sint Sectiones, quibus modo dicta non competunt.

III. Recta subtendens segmentum aliquod circumferentiæ Circuli vel Sectionis Conicæ, *Basis* Segmenti vocetur.

IV. Recta autem quæ occurrens rectis Basi segmenti parallelis eas omnes bifariam dividit, dicatur segmenti *Diameter*.

V. Dicatur etiam punctum in Sectione per quod ducitur Diameter, segmenti *Vertex*.

VI. Segmenta vocentur *æqualia*, si, Basibus æqualibus existentibus, fieri possit ut unum super alterum ita applicetur ut nusquam occurrant inter se, sed utrobique congruant. *Inæqualia* vero sint, quæ aliter se habent.

R

VII. Seg-

VII. Segmenta vero *similia* dicantur, quorum bases cum diametris æquales continent angulos, & in quorum singulis, ductis rectis Basi parallelis numeroque æqualibus, ipsæ parallelæ, ut & Bases ad abscissas diametrorum portiones verticibus conterminas, sunt in iisdem rationibus respectivè. Divisâ scilicet ab ipsis parallelis utriusque diametro in partes invicem proportionales.

VIII. Dicatur *Sectio Conica in Cono poni*, vel *Conus à Sectione Conicâ contineri*, si vel tota sectio comprehensa fuerit in superficie Conicâ inter Verticem & Basim Coni interceptâ: Vel si, eadem superficie infra Basim Coni productâ, tota Sectio fuerit in ea superficie parte quæ est infra Basim: Vel etiam si fuerit partim in hac partim in altera superficie.

IX. Coni vero recti dicantur *similes*, si eorundem Axes ad diametros Basium sint in eadem ratione.

X. Dicatur etiam *Figura Sectionis super Axem vel diametrum aliquam facta*, rectangulum contentum sub Axe vel diametro illâ & Latere ejusdem recto.


PROPOSITIO I.

S*I in duabus Parabolis latera recta fuerint æqualia, erunt ipsæ Sectiones æquales. Ac si fuerint Sectiones æquales, erunt quoque earundem latera recta æqualia.*

Sint duæ Parabolæ quarum Axes AA , $z\theta$: sintque earundem latera recta AE , zM æqualia. Dico ipsas sectiones esse æquales.

Nam si applicetur Axis AA super Axem $z\theta$, sectio coincidet cum sectione & cum eadem ubique congruet. Si enim fieri possit ut non congruant, sit pars aliqua sectionis AB quæ non congruat cum zH , & capiatur punctum quoddam B , in parte cum ipsâ zH non congruente, à quo demittatur normalis ad Axem BK , ac compleatur parallelogrammum rectangulum KE : & factâ zA ipsi AK æquali, erigatur normalis ad Axem recta HA , ac compleatur parallelogrammum rectangulum AM . Quoniam vero latera KA , AB æqualia sunt lateribus zA , zM , utraque inter se congruent, ac proinde rectangulum KE æquale erit rectangulo AM . Sed recta KB potest rectangulum KE (per 11^m primi) ac (per eandem) AH poterit rectangulum AM ; adeoque ipsæ KB , AH sunt æquales. Posito igitur Axe super Axem, ita ut coincidat recta AK cum zA , recta BK cadet super AH , punctumque B super punctum H . Posuimus autem non debere coincidere punctum B cum sectione zH : quod absurdum. Unde patet fieri non posse ut sectio sectioni non sit æqualis.

Porro si sectio fuerit æqualis sectioni, capiatur AK ipsi zA æqualis, & è punctis K , A erigantur normales BK , HA ; ac compleantur rectangula parallelogramma KE , AM . Congruente autem sectione AB cum sectione zH , Axis quoque AK cum Axe zA congruet; aliter enim Parabola zH duos haberet Axes, quod fieri non potest: coincidat igitur punctum K cum puncto A , ob AK , zA æquales. Cadente autem puncto B super H , erit recta BK ipsi AH æqualis; ac proinde (per 11^m primi) rectangula KE , AM æqualia erunt. Sed AK ipsi zA facta est æqualis. Latus igitur rectum AE Lateri recto zM æquale est. Q. E. D.




PROPO-

PROPOSITIO II.

SI Figuræ factæ super Axes transversos Hyperbolarum vel Ellipsium fuerint æquales ac similes inter se, erunt ipsæ Sectiones æquales. Ac si fuerint Sectiones æquales, erunt quoque Figuræ, factæ super Axes earundem transversos, æquales ac similes similiterque sitæ.


Sint AB, GH duæ Hyperbolæ vel Ellipses, quarum Axes $AK, \Gamma\Theta$; sintque figuræ super Axes transversos factæ æquales ac similes, ut $\Delta E, NA$. Dico sectiones AB, GH æquales esse.

Applicetur Axis AK super Axem $\Gamma\Theta$, ac coincidet sectio cum sectione. Nam si aliter fuerit, sit pars aliqua sectionis AB extra sectionem GH ; & in hac parte capiatur punctum aliquod B , à quo demittatur ad Axem normalis BK , ac compleatur rectangulum ΔZ . Capiatur etiam in Axe $\Gamma\Theta$ recta $\Gamma\Theta$ ipsi AK æqualis, ac erecta normali super Axem $\Gamma\Theta$ ad punctum Θ , ut $H\Theta M$, compleatur rectangulum NM . Quoniam vero rectæ $\Delta E, AK$ æquales sunt ipsis $\Delta\Gamma, \Gamma\Theta$; rectangula $EK, \Delta\Theta$ erunt æqualia. Rectangula autem $\Delta M, EZ$ similia sunt similiterque sita, quia similia sunt rectangulis similibus $\Delta E, NA$. Sed rectæ $AK, \Gamma\Theta$ æquales sunt, adeoque rectangula $EZ, \Delta M$ sunt etiam æqualia. Verum rectangula $KE, \Theta\Delta$ æqualia sunt, ac proinde rectangulum ΔZ rectangulo



ΓM æquale erit. Possunt autem hæc rectangula (per 12^{am} & 13^{am} primi) ordinatim applicatæ $BK, H\Theta$: applicato igitur Axe super Axem, cadet recta BK super ΘH , ac punctum B super punctum H . Absurde igitur posuimus punctum B cadere extra sectionem GH : ac propterea tota sectio AB coincidet cum sectione GH .

Quinetiam si fuerint sectiones æquales; fiant $AK, \Gamma\Theta$ æquales, ac erigantur normales $KB, \Theta H$, compleanturque parallelogramma rectangula $\Delta E, \Delta Z$; NA, NM , & applicetur sectio AB super sectionem GH : cadet igitur Axis AK super Axem $\Gamma\Theta$ necessario.



Nam si non cadat super eum, in Hyperbola forent duo Axes, & in Ellipsi tres: quod quidem impossibile est. Cadente autem AK super $\Gamma\Theta$ quæ eidem æqualis est, cadet punctum K super Θ : coincidentibusque rectis $KB, \Theta H$ punctum B cadet super H ; ac proinde $KB, \Theta H$ æquales sunt. Hinc consequitur (per 12^{am} & 13^{am} primi) rectangula $\Delta Z, \Gamma M$ æqualia esse. Sed AK ipsi $\Gamma\Theta$ æqualis est, adeoque KZ ipsi ΘM . Simili modo, si ponatur ΔZ ipsi $\Gamma\Theta$ æqualis, demonstrabitur ΔZ ipsi $\Gamma\Theta$ æqualem esse; quare & PZ ipsi MT & PZ ipsi TY æquales erunt: unde & rectangula $Z\Xi, MY$ æqualia & similia, ac (per 24^{am} VI. Elem.) rectangula $\Delta Z, NM$ erunt quoque similia. Sed $KZ, \Theta M$ sunt æquales; quare etiam $\Delta K, \Theta N$ sunt æquales: & ob æquales $AK, \Gamma\Theta$, ipsæ quoque $\Delta\Delta, \Gamma N$ erunt æquales. Rectangula autem $\Delta E, NA$ similia sunt, adeoque rectæ $\Delta E, \Gamma\Delta$ æquales. Quapropter rectangula $\Delta E, NA$ similia & æqualia sunt; quæ quidem sunt Figuræ æqualium sectionum super Axes factæ. Q. E. D.

R 2

Similiter

Similiter si sectiones fuerint Parabolæ, & occurrant ordinatim applicatæ diametris quibuscunque in utrâque sectione sub æqualibus angulis; ac sint harum diametrorum Latera recta æqualia; erunt quoque Sectiones æquales.


Ac si fuerint sectiones Hyperbolæ vel Ellipses, & ordinatim applicatæ occurrant diametris sub angulis æqualibus; fuerintque Figuræ factæ super has diametros æquales & similes inter se; erunt etiam sectiones æquales. Hoc autem eodem modo constabit, quo rem ita se habere quoad Axes jam demonstratum est.

PROPOSITIO III.

Manifestum est Ellipsin non posse æqualem esse duabus reliquis sectionibus, quia terminata est; hæ vero in infinitum prodeunt. Dico quoque nullam Parabolam æqualem esse Hyperbolæ.

Sit $AB\Gamma$ Parabola, Hyperbola vero $HIKN$; ac si fieri possit, sint inter se æquales. Sint autem sectionum Axes BZ , KM , ac $K\Theta$ diameter transversa Hyperbolæ: & factis BE , BZ ipsis KA , KM æqualibus, ducantur ad Axes normales AE , ΔZ ; IA , HM .

Jam si fuerint æquales, sectio applicari potest super sectionem; & cadent puncta E , Z , A , Δ super puncta A , M , I , H . Verum ZB est ad BE (per 20^m primi) ut quadratum ex ΔZ ad quadratum ex EA : erit igitur MK ad KA ut quadratum ex MH , ad quadratum ex AI . Hoc autem fieri nequit, quia quadratum ex MH est ad quadratum ex IA sicut rectangulum sub ΘM , MK ad rectangulum sub ΘA , AK , per 21^m primi. Parabola igitur Hyperbolæ non est æqualis.




PROPOSITIO IV.

Si in Ellipsi de centro ducatur recta quælibet utrinque ad Sectionem terminata: dividet hæc sectionem in duas partes æquales; itemque Area ejus divisa erit bifariam.

Sit $AB\Gamma$ Ellipsis, cujus centrum Θ ; & per centrum ducatur recta AB , quæ primò sit alter Axium sectionis. Dico applicari posse Curvam $A\Gamma B$ super Curvam AEB , ita ut tota Area $A\Gamma B$ super totam Aream AEB superposita ubique coincidat cum eadem.


Nam, si fieri possit ut non coincidat Curva $A\Gamma B$ cum Curva AEB , capiatur in parte non coincidente punctum Γ ; & demissa ad Axem AB , normalis $\Gamma\Delta$ producat ad E . Recta igitur $\Gamma\Delta$ cadet super rectam ΔE , ob angulos ad punctum Δ rectos: $\Gamma\Delta$ autem ipsi ΔE æqualis est, atque adeo punctum Γ cadet super punctum E . Absurda est igitur positio punctum illud non cadere in sectione AEB . Curva igitur $A\Gamma B$ cadet super Curvam AEB , ubique coincidens cum eâ, uti superficies $A\Gamma B$ coincidit cum superficie AEB . Quocirca Curva æqualis est Curvæ, & Area Areæ. Q. E. D.



PROPOSITIO V.

Si vero AB non fuerit alter Axium, sint Axes $\Gamma\Delta$, KA ; & demittantur normales AE , BH : & applicatâ Curvâ $\Gamma\Delta\Delta$ super Curvam $\Gamma Z\Delta$, eo quo factum est modo in Propositione præcedente, cadet punctum Z super punctum A , ac Area $A\Gamma E$ super Aream ΓZE . Similiter $K\Gamma\Delta$ cadet super $K\Delta\Delta$, & $E\Theta$ super ΘH ; ut & EZ super BH , ob $E\Theta$ ipsi ΘH & EZ ipsi BH æquales. Cadet igitur Area ΓEZ super

per Aream $\Delta H B$, ac proinde Area $\Delta F E$ coincidit cum Area $B \Delta H$, eidemque æqualis est, ut & Curva ΔF Curvæ ΔB æqualis. Triangulum autem $\Delta E \Theta$ æquale est triangulo $B H \Theta$: Area igitur $\Delta F \Theta$ Area $B \Delta \Theta$ æqualis est, ac area residua $\Delta \Theta K$ residua $B \Theta \Delta$, ut & Curva ΔK Curvæ $B \Delta$ æqualis. Quapropter Curva $\Delta K \Delta$ Curvæ $\Gamma \Delta B$ æqualis est, totaque Area $\Delta K \Delta B$ toti $\Delta F \Delta B$, totaque Curva $\Delta K \Delta B$ Curvæ $\Delta F \Delta B$ etiam æqualis. Q. E. D.




PROPOSITIO VI.

SI portio aliqua Sectionis Conicæ, applicata super portionem aliquam alterius cujusdam Sectionis, coincidat cum eadem: erit tota Sectio toti Sectioni æqualis.

Sit ΔB segmentum sectionis alicujus $H \Delta B$, quod applicatum congruat cum $\Gamma \Delta$ segmento sectionis $\Gamma \Delta E$. Dico sectionem $H \Delta B$ æqualem esse sectioni $\Gamma \Delta E$.


Nam, si fieri possit, congruat pars ΔB cum parte $\Gamma \Delta$; non autem congruat sectionis pars reliqua ΔH cum ΓN reliqua parte sectionis alterius: sint autem ad modum sectionum $\Delta \Gamma M$, $\Delta \Gamma N$. Capiatur in ΓM punctum aliquod Θ , junctaque $\Delta \Theta$ ducatur in sectione $\Gamma \Delta E$ diameter $K \Delta$ bifariam dividens ipsam $\Delta \Theta$: erit igitur recta, quæ sectionem $\Gamma \Delta E$ tangit in puncto K , ipsi $\Delta \Theta$ parallela. Diameter autem $K \Delta$ omnes rectas ipsi $\Delta \Theta$ parallelas bifariam dividit; quare, ducta ΓZ ipsi $\Delta \Theta$ parallela, $K \Delta$ eam bifariam dividet; adeoque ΓZ parallela est rectæ sectionem $\Delta \Gamma M$ tangenti in puncto K . Sed & eadem recta Tangens est sectionis $\Delta \Gamma N$; ac proinde (per 7^m secundi) recta $K \Delta$ diameter est sectionis $\Delta \Gamma N$, dividetque ipsam ΔN bifariam in puncto Λ . Eadem autem dividit rectam $\Delta \Theta$ bifariam in puncto Λ : quod absurdum est. Tota igitur sectio $B \Delta H$ super totam $\Delta \Gamma N$ applicata ubique congruit, eidemque æqualis est. Q. E. D.



PROPOSITIO VII.


IN Parabolâ vel Hyperbolâ, si ductæ ad Axem ordinatim applicatæ ad alteram Sectionis partem producantur: abscinduntur è Sectione ab utroque Axis latere segmenta, quæ applicatæ congruent inter se; sed quæ neutiquam coincident cum aliâ quâvis Sectionis parte, si eidem imponantur.

Sit $\Delta B \Gamma$ Parabola vel Hyperbola, cujus Axis ΓH ; & capiatur segmentum aliquod sectionis $B \Delta$; & demittantur ad Axem ΓH ordinatim applicatæ, quæ ad alterum sectionis latus productæ, ut $B Z \Delta$, $\Delta H E$, abscindant è sectione segmenta $B \Gamma \Delta$, $\Delta \Gamma E$. Dico Curvam $B \Gamma$ congruere cum Curva $\Gamma \Delta$, & Curvam $B \Delta$ cum Curva ΔE , itemque Aream $\Delta \Gamma H$ cum Area $H \Gamma E$, segmentumque $\Delta B \Gamma$ cum segmento $E \Delta \Gamma$.



Hoc autem constabit ad modum præcedentium; quia omnes ordinatim applicatæ, à segmento $\Delta B \Gamma$ ad Axem ΓH ductæ, poterunt rectangula æqualia rectangulis quæ possunt

possunt ordinatim applicatæ à segmento $\Gamma\Delta E$ ad eandem ΓH ductæ; adeoque, continuatis ipsis ordinatim applicatis, erit BZ ipsi $Z\Delta$ & AH ipsi EH æquales. Anguli autem ad puncta Z, H recti sunt: segmentum igitur ΓB applicatum super segmentum $\Gamma\Delta$ coincidit cum eo; coincidit etiam segmentum ΔB cum segmento ΔE , aræque areis congruent.




Sit jam ΘK segmentum aliquod aliud his duabus normalibus non interceptum. Dico, quod si segmentum ΔE super illud applicetur, non coincidit cum eo. Nam si non ita sit, ac fieri possit ut congruant inter se, superimponatur ΔE coincidatque cum $K\Theta$; coincidit igitur (per Prop. proximè præcedentem) Curva $\Gamma\Delta$ cum eâ sectionis parte quæ cum $K\Theta$ continuatur. Cadet vero punctum Γ in segmento $\Gamma\Delta E$ in diverso situ ac in segmento $K\Theta\Gamma$; quia segmentum $K\Theta\Gamma$ non est æqualis segmento $\Gamma\Delta E$: ac proinde Axis $H\Gamma$ diversas haberet positiones, ac Parabola vel Hyperbola plures haberet Axes; quod (per 48^{am} secundi) absurdum est. Quapropter segmentum ΔE cum segmento ΘK congruere non potest. Q. E. D.

PROPOSITIO VIII.

S*I in Ellipsi demissæ ad Axem normales producantur ad alterum Sectionis latus: segmenta ab utrâque Axis parte abscissa, unum super alterum applicata, congruent inter se. Si vero imponantur super segmenta à normalibus ad easdem à centro distantias, sed ab alterâ ejus parte abscissa: coincident etiam cum iisdem, congruent autem cum nullo alio Sectionis segmento.*

Sit $AB\Gamma\Delta$ Ellipsis, cujus Axes $AB, K\Lambda$, & ad AB demittantur normales duæ quæ occurrant utrinque sectioni ut $\Gamma E, \Delta Z$: ducantur etiam in sectione aliæ duæ normales ad easdem à centro distantias ac priores, ut $M\Xi, N\Theta$. Jam si segmentum $\Gamma\Delta$ ipsi EZ superimponatur, congruent inter se, juxta demonstrata in Prop. proximè præcedente. Eodemque modo constabit segmentum MN cum ipso $\Xi\Theta$ congruiturum. Area autem $K\Lambda\Lambda$ super aream KBA applicata (per quartam hujus) coincidit; ac recta ΓE cadet super ipsam $N\Theta$, quia eadem est utriusque à centro distantia; cadet etiam ΔZ super $M\Xi$, adeoque cadet segmentum $\Gamma\Delta$ super segmentum MN ; ac proinde congruet $\Gamma\Delta$ cum segmento $\Xi\Theta$, quia $MN, \Xi\Theta$ congruunt inter se. Idem quoque manifestum est de segmento EZ .



Si vero capiatur in sectione segmentum aliquod aliud præter hæc quatuor, ut ΓX .

Dico illud congruere non posse cum prædictis segmentis. Nam si fieri possit, coincidat cum segmento MN ; ac, per demonstrata in præcedentibus, invenietur Ellipsis plures quam duos habitura Axes. Hoc autem (per 48^{am} secundi) absurdum est. Quocirca segmentum MN non congruet cum segmento ΓX . Q. E. D.


PROPO-

PROPOSITIO IX.

IN Sectionibus æqualibus, segmenta, quæ æqualiter à Verticibus earundem distant, superposita coincident inter se: quæ vero non distant æqualiter à Verticibus, non congruent inter se.

Sectionum duarum æqualium sint Axes $\Gamma\Delta$, $\text{K}\Lambda$, ac sit distantia segmenti AB à puncto Γ æqualis distantiae segmenti EH à puncto K . Dico AB congruere cum EH .

Imponatur enim sectio $\Gamma\Lambda$ super sectionem KE , ac punctum B cadet super punctum H , quia distantiae earundem à Vertice utriusque sectionis æquales sunt: cadet etiam punctum A super punctum E , adeoque & segmentum AB super segmentum EH . Dico quoque, si superimponatur super aliud quodvis segmentum,




non congruet cum illo: Nam, si fieri potest, cadat super segmentum ZE . Demonstravimus autem AB congruere cum segmento EH , ac proinde congruet ZE cum ipso EH . Segmenta vero ZE , EH non sunt abscissa à duabus normalibus, neque ad easdem à centro distantias. Absurdum est igitur ea congruere posse, per demonstrata in duabus Propositionibus præcedentibus. Q. E. D.

PROPOSITIO X.

SI Sectiones fuerint inæquales, fieri non potest ut pars aliqua unius congruat cum ulla parte alterius.

Sint $\text{AB}\Gamma$, $\Delta\text{E}\text{Z}$ sectiones duæ inæquales. Dico nullam partem unius coincidere posse cum parte aliquâ alterius.

Nam, si fieri possit, congruat pars AB cum parte ΔE ; ac tota sectio $\text{AB}\Gamma$ (per sextam hujus) congruere deberet cum ipsâ $\Delta\text{E}\text{Z}$: atque adeo sectio $\text{AB}\Gamma$ æqualis esset sectioni $\Delta\text{E}\text{Z}$. Hoc autem est contra hypothesim. Quapropter non coincidet pars ulla sectionis $\text{AB}\Gamma$ cum parte aliquâ ipsius $\Delta\text{E}\text{Z}$. Q. E. D.




PROPOSITIO XI.

Parabolæ omnes similes sunt inter se.

Sint AB , $\Gamma\Delta$ duæ Parabolæ, quarum Axes AK , ΓO . Dico sectiones inter se similes esse.

Sint earundem latera recta AP , ΓX , ac fiat AK ad ad AP sicut ΓO ad ΓX ; ac dividatur AK in punctis Z , Θ utcumque, & in iisdem rationibus dividatur etiam ΓO in punctis M , E ; & ad Axes AK , ΓO erigantur normales ZE , ΘH , KB ; MA , NE , ΔO .





S 2

Quoniam

Quoniam vero ΠA est ad ΔK sicut ΓX ad ΓO ; & $K B$ media est proportionalis inter ipsas ΠA , ΔK , (per 1^{am} primi) uti ΔO media est inter ΓX , ΓO : erit igitur

$K B$ ad $K A$ sicut ΔO ad $O \Gamma$; cumque $B \xi$ dupla est ipsius $B K$, uti $\Delta \gamma$ dupla ipsius ΔO ; erit $B \xi$ ad ΔK sicut $\Delta \gamma$ ad ΓO . Pariter cum ΠA est ad ΔK sicut ΓX ad ΓO , ac ΔK est ad $\Delta \Theta$ sicut ΓO ad ΓZ : erit ex æquo ΠA ad $\Delta \Theta$ sicut ΓX ad ΓZ . Patebit igitur modo nuper ostenso, $P H$ esse



ad $\Delta \Theta$ sicut $N T$ ad ΓZ ; ac simili argumento $E I$ erit ad ΔZ sicut $\tau \Lambda$ ad ΓM . Rationes igitur normalium ad Axem, $B \xi$, $H P$, $E I$, ad abscissas ΔK , $\Delta \Theta$, ΔZ , eadem sunt ac rationes normalium $\Delta \gamma$, $N T$, $\Lambda \tau$ ad abscissas ΓO , $\Xi \Gamma$, ΓM respectivé. Segmenta autem ex uno Axium abscissa proportionalia sunt segmentis alterius Axis. Quocirca (per Definitionem secundam) sectio $A B$ similis est sectioni $\Gamma \Delta$. Q. E. D.





PROPOSITIO XII.

Si Hyperbolarum vel Ellipsium figuræ super Axes factæ fuerint similes; ipsæ etiam Sectiones similes erunt. Ac si sectiones fuerint similes; figuræ super Axes factæ erunt quoque similes.

Sint $A B$, $\Gamma \Delta$ duæ Hyperbolæ vel Ellipses, quarum figuræ super Axes factæ sunt similes. Sint autem earum Axes ΔK , ΓO , diametri vero transversæ $\Delta \Pi$, ΓX ; & capiuntur Axium

segmenta ΔK , ΓO , ita ut ΔK sit ad $\Delta \Pi$ sicut ΓO ad ΓX . Dividatur ΔK utcumque in punctis Z , Θ ; & in iisdem rationibus quoque recta ΓO in punctis M , Ξ : ac per puncta Z , Θ , K ; M , Ξ , O erigantur super Axes normales $B K$, ΘH , $Z E$; $O \Delta$, ΞN , $M \Lambda$.

Quoniam autem figuræ sectionum sunt similes, erit (per 21^{am} primi) quadratum ex $B K$ ad rectangulum sub $\Pi K A$ sicut quadratum ex ΔO ad rectangulum sub $X O \Gamma$. Rect-



angulum vero sub $\Pi K A$ est ad quadratum ex $K A$, sicut rectangulum sub $X O \Gamma$ ad quadratum ex $O \Gamma$, quia ΠK est ad $K A$ sicut $X O$ ad $O \Gamma$. Erit igitur $B K$ ad $K A$ sicut ΔO ad $O \Gamma$, & $B \xi$ erit ad $K A$ sicut $\Delta \gamma$ ad ΓO . Jam $K A$ est ad $\Delta \Theta$ sicut $O \Gamma$ ad ΓZ , ac ΠA est ad ΔK sicut $X \Gamma$ ad ΓO : quare ex æquo ΠA est ad $\Delta \Theta$ sicut $X \Gamma$ ad ΓZ . Constat igitur per jam demonstrata $H P$ esse $\Delta \Theta$ sicut $N T$ ad ΓZ : ac pari argumento


argumento EI esse ad AZ sicut τA ad ΓM . Normales itaque $B\xi$, HP , EI sunt ad segmenta Axis AK , $A\Theta$, AZ in iisdem rationibus ac normales $\Delta\gamma$, NT , τA ad segmenta Axis OG , ΓE , ΓM *respectivè*: atque segmenta ipsius AK Axis sectionis AB à normalibus abscissa, ad segmenta ipsius ΓO Axis sectionis ΓA à normalibus abscissa, sunt in eadem ratione. Quare (*per Definit. 2^{dam}*) sectio AB similis est sectioni ΓA .

Quod si sectio AB similis fuerit sectioni ΓA : Dico *Figuras* utriusque sectionis esse similes inter se. Demittantur enim à sectione AB normales quotlibet ad Axem AK , ut $B\xi$, HP , EI : & à sectione ΓA normales $\Delta\gamma$, NT , τA ; ita ut normales ad abscissas in utroque Axe sint *respectivè* in iisdem rationibus, uti & abscissæ in uno Axium ad abscissas in altero sint in eadem ratione; nempe sit BK ad AK sicut ΔO ad OG , ac KA ad $A\Theta$ sicut OG ad ΓE , ac $A\Theta$ ad ΘH sicut ΓE ad EN . Erit igitur BK ad ΘH sicut ΔO ad NE , adeoque quadratum ex BK ad quadratum ex ΘH erit ut quadratum ex ΔO ad quadratum ex NE ; unde (*per 21^{am} primi*) rectangulum ΠKA erit ad rectangulum $\Pi \Theta A$ sicut rectangulum XOG ad rectangulum XEG . Sed KA est ad $A\Theta$ sicut OG ad ΓE : erit igitur $K\Pi$ ad $\Pi\Theta$ sicut OX ad XE ; atque adeo $\Pi\Theta$ erit ad ΘK sicut XE ad EO . Sed ΘK est ad EO sicut $A\Theta$ ad ΓE ; igitur $\Pi\Theta$ est ad ΘA sicut XE ad EG , ac rectangulum $\Pi\Theta A$ est ad quadratum ex ΘA , sicut rectangulum XEG ad quadratum ex EG . Quoniam vero $A\Theta$ est ad ΘH sicut ΓE ad EN , erit rectangulum $\Pi\Theta A$ ad quadratum ex ΘH sicut rectangulum XEG ad quadratum ex EN . Sed rectangulum $\Pi\Theta A$ est ad quadratum ex ΘH (*per 21^{am} primi*) sicut diameter $\Lambda\Pi$ ad Latus ejus rectum, & rectangulum XEG est ad quadratum ex EN sicut diameter $X\Gamma$ ad Latus ejus rectum. Figuræ igitur utriusque sectionis super ΠA , ΓX factæ sunt similes.

PROPOSITIO XIII.

S*I fuerint Hyperbolarum vel Ellipsium figuræ, super alios diametros præter Axes factæ, similes inter se; ac ordinatim applicatæ ad has diametros contineant cum ipsis angulos æquales: erunt hæ sectiones inter se similes.*


Sint Hyperbolarum vel Ellipsium duarum centra Z, I , diametri vero quævis ΓA , EM ; sintque anguli quos continent diametri hæ cum ordinatim applicatis suis inter se æquales; Figuræ autem quæ fiunt super diametros ΓA , EM sint similes. Dico sectiones illas similes esse.



Ducantur enim è punctis Γ, E rectæ duæ quæ sectiones contingant, ut $\Gamma\Theta$, EO , quæque proinde parallelæ erunt ordinatim applicatis ad has diametros: adeoque anguli qui fiunt ad puncta Γ, E cum diametris ΓA , EM erunt æquales: sint etiam AB , EM sectionum Axes, occurrentes Tangentibus in punctis Θ, O . Erit igitur angulus

gulus $\Theta\Gamma Z$ angulo ΘEI æqualis, ob Tangentes ordinatim ductis parallelas. Per puncta A, Δ erigantur normales ad Axes occurrentes diametris $\Gamma\Lambda, EM$ in punctis H & X , nempe rectæ $AH, \Delta X$; & circumscribantur circuli triangulis $ZAH, I\Delta X$: & agantur per Vertices A, Δ Tangentibus $\Gamma\Theta, EO$ parallelæ $A\xi T, \Delta\tau\gamma$.

Quoniam vero Figuræ super $\Gamma\Lambda, EM$ factæ similes sunt; ac rectæ $AH, \Delta X$ contingunt sectiones; & rectæ $A\xi, \Delta\tau$ sunt ordinatim applicatæ ad diametros $\Gamma\Lambda, EM$: erit (per 37^m primi) rectangulum sub $Z\xi, \xi H$ ad quadratum ex $A\xi$ ut rectangulum sub $I\tau, \tau X$ ad quadratum ex $\Delta\tau$; utraque enim harum rationum eadem est, nempe diametri transversæ ad latus rectum utrique diametro competens. Rectangulum autem sub $Z\xi, \xi H$ æquale est rectangulo $T\xi A$, ac rectangulum $I\tau X$ æquale est rectangulo $\Delta\tau\gamma$; adeoque rectangulum $T\xi A$ erit ad quadratum ex ξA sicut rectangulum $\Delta\tau\gamma$ ad quadratum ex $\Delta\tau$: ac proinde $T\xi$ erit ad ξA ut $\tau\gamma$ ad $\Delta\tau$. Ve-




rum anguli duo ad puncta ξ, τ sunt æquales, sed non recti, quia diametri $\Gamma\Lambda, EM$ non sunt Axes sectionum, ac circulorum diametri sunt rectæ HZ, XI : quare (et per Lemmata priora Pappi) erit angulus ad Z angulo ad I æqualis. Anguli autem $Z\Gamma\Theta, IEO$ sunt æquales, ac propterea triangula $Z\Gamma\Theta, IEO$ sunt similia. De punctis Γ, E demittantur ad Axes normales $\Gamma N, EE$; & erit rectangulum $ZN\Theta$ ad quadratum ex ΓN (per conversas Lemmatum) ut rectangulum $I\epsilon O$ ad quadratum ex EE . Sed (per 37^m primi) rectangulum $ZN\Theta$ est ad quadratum ex ΓN sicut Axis transversus AB ad latus ejus rectum; & rectangulum $I\epsilon O$ est ad quadratum ex EE ut Axis ΔK ad latus ejus rectum. Ipsæ igitur sectiones (per præcedentem 12^{mam}) similes sunt. Oportet autem in Ellipsis utrumque Axem $AB, K\Delta$ esse Axem majorem vel minorem, quia ratio ipsius BA ad latus ejus rectum eadem debet esse cum ratione Axis $K\Delta$ ad latus rectum ejusdem $K\Delta$. Perinde autem est si uterque Axis vel major vel minor fuerit. Q. E. D.

PROPOSITIO XIV.

Parabola nec Hyperbolæ neque Ellipsi similis est.

Sint duæ sectiones, nempe Parabola AB Axe AH descripta; ac Hyperbola vel Ellipsis, si fieri possit, eidem similis, ut $\Gamma\Delta$. Sit sectionis $\Gamma\Delta$ Axis $\Gamma\Lambda$, ac sit latus transversum figuræ sive diameter transversa $M\Gamma$. In utrâque sectione ducantur normales, ut BI, ZN ; $\Delta E, KO$; & sint rationes earum ad abscissas in uno Axium, eadem ac rationes normalium ad abscissas in altero respectivè; simulque divisus sit uterque Axis in segmenta eandem inter se rationem habentia, nempe sit ZH ad HA ut KA ad $\Delta\Gamma$, ac HA ad ΔE ut $\Delta\Gamma$ ad $\Gamma\Theta$, ac ΔE ad EB sicut $\Gamma\Theta$ ad $\Theta\Delta$: erit igitur ZH ad EB sicut KA ad $\Delta\Theta$, adeoque quadratum ex ZH ad quadratum ex EB ut quadratum ex KA ad quadratum ex $\Delta\Theta$. Sed quadratum ex ZH est ad quadratum


quadratum ex BB (per 20^m primi) sicut HA ad AE , ac HA est ad AB sicut AG ad GO : quadratum igitur ex KA est ad quadratum ex AO sicut AG ad GO . Verum (per 21^m primi) quadratum ex KA est ad quadratum ex AO ut rectangulum $MA\Gamma$ ad rectangulum $MO\Gamma$, ac proinde MA ipsi MO æqualis: quod absurdum. Parabola itaque non potest esse similis alterutri reliquarum sectionum.



PROPOSITIO XV.

Hyperbola non est similis Ellipsi.


Sit AB Hyperbola ac ΓA Ellipsis, axibus AK , ΓM , *diametrus vero transversis* EA , ΓA descriptæ: ac si sint sectiones similes, ducantur in utrâque normales, ut BN , ΘZ ; ZO , $\Delta\Pi$; ita ut earundem rationes ad abscissas in utroque Axe sint respectivè eadem, uti & abscissæ ad abscissas in eadem ratione. Eodem igitur modo, quo præcedentem demonstravimus, constabit quadratum ex ΘK esse ad quadratum ex BH sicut quadratum ex ΔM ad quadratum ex ZI . Sed ut quadratum ex ΘK ad quadratum ex BH ita rectangulum EKA ad rectangulum EHA ; & ut quadratum ex ΔM ad quadratum ex ZI ita rectangulum ΓMA ad rectangulum ΓIA : quare rectangulum EKA est ad rectangulum EHA ut rectangulum ΓMA ad rectangulum ΓIA . Sed, ex hypothese, KA est ad AH sicut MA ad AI ; foret igitur KE ad EH sicut MA ad AI . Hoc autem absurdum est. Sectio itaque AB non est similis sectioni ΓA . Q. E. D.



PROPOSITIO XVI.

Hyperbolæ oppositæ sunt similes inter se & æquales.

Sint A , B sectiones oppositæ, quarum Axis AB . Dico eas & similes & æquales esse. Quoniam enim latera recta Sectionum A , B (per 14^m primi) sunt æqualia, recta vero AB est latus transversum commune figuræ utriusque sectionis; erunt igitur figuræ, quæ fiunt super eundem Axem AB , inter se similes & æquales: ac proinde sectio A (per 12^m hujus) similis & æqualis est sectioni B . Q. E. D.




PROPOSITIO XVII.

Ductis ad similes Sectiones Conicas Tangentibus, quæ Axibus occurrentes cum iisdem contineant angulos æquales; eductisque de punctis contactuum diametris sectionum, in quarum utrâque capiantur puncta, ita ut interceptæ inter hæc puncta & diametrorum Vertices sint ad ipsas Tangentes in eadem ratione: si per puncta sumpta ducantur rectæ Tangentibus parallelæ, abscindant hæc ab utrâque sectione segmenta similia & similiter posita. Ac si segmenta fuerint similia & similiter posita, eadem erunt rationes diamet-

diametrorum ad Tangentes in utraque sectione, angulique sub diametris & Tangentibus contenti erunt æquales.

Sint imprimis sectiones similes Parabolæ duæ, ut $AB\Gamma$, $K\Lambda M$; quarum Axes AZ , KO ; Tangentes vero ΓZ , MO , cum Axibus æquales continentes angulos $AZ\Gamma$, KOM ; ac per Γ , M , ducantur sectionum diametri ΓE , $M\Xi$; ac fiat $E\Gamma$ ad ΓZ sicut ΞM ad MO ; perque E , Ξ ipsis ΓZ , MO parallelæ agantur ΔB , $N\Lambda$. Dico segmenta $B\Gamma\Delta$, ΛMN esse similia similiterque posita.

E punctis A , K erigantur AH , KX normales ad Axes; ac producantur diametri $E\Gamma$, $M\Xi$ usque ad occursum earundem in punctis H , X : ac fiat $P\Gamma$ ad duplam ipsius ΓZ sicut $\Theta\Gamma$ ad ΓH , atque etiam ξM ad duplam ipsius MO sicut πM ad MX . Erunt igitur (per 49^{am} primi) $P\Gamma$, ξM latera recta ad diametros ΓE , $M\Xi$; ac proinde quadratum ex ΔE æquale erit rectangulo $P\Gamma E$, uti quadratum ex $N\Xi$ rectangulo $\xi M \Xi$. Anguli autem KOM , $AZ\Gamma$ sunt æquales inter se, adeoque & ipsæ XMO , $H\Gamma Z$ æquales; quia rectæ $X\Xi$, HE (per 46^{am} primi) parallelæ sunt ipsis OK , ZA . Quoniam vero anguli XMO , $H\Gamma Z$ sunt æquales, & anguli ad H & X recti ideoque æquales, erunt trianguia $\Theta H\Gamma$, $\pi X M$ similia; ac $\Theta\Gamma$ erit ad ΓH sicut πM ad MX ; unde $P\Gamma$ erit ad ΓZ sicut ξM ad MO . Fecimus autem ΓZ ad ΓE sicut MO ad $M\Xi$; quare ex æquo $P\Gamma$ erit ad ΓE sicut ξM ad $M\Xi$. Pari igitur argumento, quo Prop. XI^{ma} hujus demonstravimus, constabit quod, si ducantur ad diametrum ΓE rectæ ipsi $B\Delta$ parallelæ; & ad $M\Xi$ ipsi ΛN parallelæ, ad intervalla ipsis ΓE , $M\Xi$ proportionalia, erunt hæ rectæ basibus $B\Delta$, ΛN parallelæ, ad intercepta segmenta utriusque diametri, Verticibus Γ , M termina, in eadem ratione respectivè; anguli autem contenti sub ordinatim applicatis utrique basi parallelis & diametris utriusque segmenti sunt utrobique æquales, ob angulos ad Γ & M æquales. Quapropter segmentum $B\Gamma\Delta$ simile est segmento ΛMN similiterque situm. Q. E. D.



At vero si fuerit segmentum $\Delta\Gamma B$ in unâ sectionum simile segmento $N\Lambda M$ in alterâ, ac sint eorundem diametri ΓE , $M\Xi$, Bases vero ΔB , ΛN , ac Vertices puncta Γ , M , ad quæ tangunt sectiones rectæ ΓZ , MO . Dico angulos $AZ\Gamma$, KOM esse æquales, ac $E\Gamma$ esse ad ΓZ sicut ΞM ad MO .


Maneant rectæ nuper descriptæ. Quoniam vero segmenta sunt similia, erit angulus contentus sub Base $B\Delta$ & diametro ΓE æqualis contento sub ΛN & $M\Xi$; ac rectæ $Z\Gamma$, OM parallelæ sunt ipsis $B\Delta$, ΛN ; adeoque anguli ad puncta Γ , E ; M , Ξ sunt æquales. Anguli itaque obtusi $Z\Gamma E$, $OM\Xi$ sunt inter se æquales; unde, ob parallelas, angulus ad punctum Z æqualis est angulo ad punctum O . Porro quoniam ΔB est ad $E\Gamma$ sicut $N\Lambda$ ad ΞM , ob similia segmenta; ΔE erit ad $E\Gamma$ sicut $N\Xi$ ad ΞM . At vero $P\Gamma$ est ad ΔE sicut ΔE ad $E\Gamma$, & ξM ad $N\Xi$ sicut ΞN ad ΞM , propter Parabolæ: quare $P\Gamma$ est ad ΔE sicut ξM ad $N\Xi$. Sed ΔE ad $E\Gamma$ sicut $N\Xi$ ad ΞM ; ex æquo igitur $P\Gamma$ erit ad $E\Gamma$ sicut ξM ad $M\Xi$. Jam $P\Gamma$ est ad duplam ipsius ΓZ (per 49. primi) sicut $\Theta\Gamma$ ad ΓH , & ξM est ad duplam ipsius MO ut πM ad MX . Sed $\Theta\Gamma$ est ad ΓH sicut πM ad MX , propter similia trianguia $\Gamma\Theta H$, $\pi M X$; quare $P\Gamma$ est ad ΓZ sicut ξM ad MO . Cumque $P\Gamma$ est ad ΓE sicut ξM ad $M\Xi$, ut jam dictum est; erit ex æquo $E\Gamma$ ad ΓZ sicut $M\Xi$ ad MO . Anguli autem $AZ\Gamma$, KOM per nuper demonstrata æquales sunt: ergo constat Propositio.

PROPO-

PROPOSITIO XVIII.

Sint jam sectiones, de quibus agitur, Hyperbolæ vel Ellipses; ac sint omnia descripta ut in figurâ præcedente, & producantur diametri ΓE , $M Z$ ad centra sectionum I , T : habeat autem abscissa ΓE ad Tangentem ΓZ eandem rationem ac $z M$ ad $M O$. Dico segmenta $\Delta \Gamma B$, $\Lambda M N$ similia esse.

Fiat $\Gamma \Gamma$ ad duplum Tangentis ΓZ sicut $\Theta \Gamma$ ad ΓH ; ac ξM ad duplum Tangentis $M O$ sicut ΠM ad $M Z$: erunt igitur (per 50^{am} primi) $\Gamma \Gamma$ & ξM latera recta ad diametros ΓE , $M Z$. De punctis A , K , Γ , M ducantur ad Axes normales ΛH , $K X$, $\Gamma \tau$, $M \gamma$. Jam quoniam sectiones similes sunt, erunt earum figuræ super Axes factæ (per 12^{am} hujus) etiam similes; ac si figuræ super Axes factæ fuerint similes, erit (per 37^{am} primi) rectangulum $\Gamma \tau Z$ ad quadratum ex $\Gamma \tau$ sicut rectangulum $\tau \gamma O$ ad quadratum ex γM . Anguli autem ad puncta Z , O ex hypothese sunt æquales, & anguli ad τ & γ sunt etiam æquales, utpote recti: triangulum igitur $\Gamma \tau Z$ triangulo $M \gamma O$ simile est. Manifestum autem est (per Lemmata 3^{um} & 5^{um} Pappi) quod, si rectangulum $\Gamma \tau Z$ sit ad quadratum ex $\Gamma \tau$ sicut rectangulum $\tau \gamma O$ ad quadratum ex γM , triangu-
la $\Gamma \tau I$, $M \tau \gamma$ erunt similia, ac proinde anguli ad centra I , T æquales. Anguli igitur $z \Gamma I$, $\tau M O$ sunt æquales, quibus etiam æquales sunt anguli ad E & Z , propter ordinatim applicatas Tangentibus parallelas. Ob æquales autem angulos ad I & T , necesse est etiam angulos ad H & X æquales esse. Sed anguli




$z \Gamma I$, $\tau M O$ sunt æquales; quare triangu-
la $\Theta \Gamma H$, $\Pi M X$ sunt similia, ac $\Theta \Gamma$ est ad ΓH
sicut ΠM ad $M X$. Fecimus autem $\Gamma \Gamma$ ad duplum ipsius ΓZ sicut $\Theta \Gamma$ ad ΓH , & ξM ad
duplum ipsius $M O$ sicut ΠM ad $M X$; erit igitur $\Gamma \Gamma$ ad ΓZ sicut $M \xi$ ad $M O$; & (ob si-
milia triangu-
la) ΓZ est ad ΓI sicut $O M$ ad $M T$: quare ex æquo $\Gamma \Gamma$ est ad ΓI sicut
 $M \xi$ ad $M T$; adeoque $\Gamma \Gamma$ est ad $\Gamma \delta$ sicut $M \xi$ ad $M \Sigma$. Figuræ igitur contentæ sub
ipsis $\Gamma \Gamma$, $\Gamma \delta$, & sub $M \xi$, $M \Sigma$ sunt similes. Quinetiam cum $\Gamma \Gamma$ est ad ΓZ sicut $M \xi$ ad
 $M O$, & ΓZ ad ΓE ut $M O$ ad $M Z$, erit ex æquo $\Gamma \Gamma$ ad ΓE ut $M \xi$ ad $M Z$. Hoc autem
cum ita sit, ac figura contenta sub $\Gamma \Gamma$, $\Gamma \delta$ similis sit contentæ sub $M \xi$, $M \Sigma$; si jam
secetur ΓE utcumque, ac per punctum divisionis ducatur recta ipsi $B \Delta$ basi segmenti
parallela, ac dividatur diameter $M Z$ in eadem ratione qua divisa est ΓE , ac per
punctum divisionis agatur parallela basi segmenti ΛN : erunt (per demonstrata in
12^{ma} hujus) parallelæ diametro $M Z$ occurrentes ad abscissas ex eadem Vertici M
conterminas, in eadem ratione ac basi $B \Delta$ parallela ad portiones ab iisdem in diametro
 ΓE abscissas verticique Γ conterminas. Angulus autem quem comprehendit basis $B \Delta$
cum ΓE æqualis est angulo comprehenso sub basi ΛN & ipsâ $M Z$; quia hi an-
guli æquales sunt æqualibus angulis ad puncta Γ , M sub Tangentibus & diametris
contentis. Segmenta igitur $\Delta \Gamma B$, $\Lambda M N$ similia sunt & similiter posita. Q. E. D.

V

Verum

Verum si fuerint segmenta similia. Dico angulos $\Gamma Z A$, $M O K$ æquales esse, ac ΓE esse ad ΓZ ut ΣM ad $M O$. Positis igitur segmentis duabus similibus, ducantur in iisdem utrunque rectæ ipsi ΔB , $N A$ parallelæ numeroque æquales, occurrentes ipsi ΓE , $M Z$ sub angulis æqualibus: & erunt ipsæ, ut & bases ΔB , $N A$, ad abscissas è diametris in iisdem rationibus respectivè; ac abscissæ in ipsâ ΓE ad abscissas in diametro $M Z$ (per Definit. septimam) proportionales erunt. Poterunt autem rectæ in segmento $\Delta \Gamma B$ ipsi ΔB parallelæ & ad ΓE ductæ (per 50^m primi) rectangula lateri recto $\Gamma \Gamma$ adjacentia, & excedentia vel deficientia figuris rectangulis similibus contentæ sub $\Gamma \Gamma$, $\Gamma \delta$: pariterque poterunt rectæ in segmento $N M A$ ad rectam $M Z$ ductæ, ipsique $N A$ parallelæ, rectangula ipsi ΣM adjacentia, & excedentia vel deficientia figuris rectangulis rectangulo sub ΣM , $M Z$ contento similibus. Hoc autem cum ita sit, erit (per 12^m hujus) $\Gamma \Gamma$ ad $\Gamma \delta$ sicut $M \Sigma$ ad $M Z$; occurruntque ordinatim applicatæ diametris sub iisdem angulis: quare (per 13^m hujus) *sectiones similes sunt, ac figure Axium similes*. Unde (per 37^m primi) rectangulum $\Gamma \Gamma Z$ erit ad quadratum ex $\Gamma \Gamma$ sicut rectangulum $\Gamma \gamma O$ ad quadratum ex $M \gamma$. Verum anguli ad γ , γ sunt recti, & anguli $Z \Gamma I$, $O M T$ æquales, ac proinde triangu-
la $\Gamma \Gamma Z$, $\Gamma M O$ (per Pappi Lemmata 3^m & 5^m) sunt similia: adeoque angulus $\Gamma Z A$ angulo $M O K$ æqualis est. Atque hoc in Hyperbola universim constat, in Ellipsi vero opus est ut uterque Axis $A I$, $K T$ sit Axis major vel minor.



Quoniam vero $P \Gamma$ est ad $\Gamma \delta$ sicut ΣM ad $M Z$; & rectangulum $\delta E \Gamma$ est (per 21^m primi) ad quadratum ex ΔB ut $\delta \Gamma$ ad $\Gamma \Gamma$, quemadmodum rectangulum $M \Sigma Z$ est ad quadratum ex $N Z$ sicut ΣM ad $M \Sigma$; erit rectangulum $\delta E \Gamma$ ad quadratum ex ΔE sicut rectangulum $M \Sigma Z$ ad quadratum ex $N Z$. Quadratum autem ex ΔE est ad quadratum ex $E \Gamma$ sicut quadratum ex $N Z$ ad quadratum ex $M Z$; ex æquo igitur rectangulum $\delta E \Gamma$ erit ad quadratum ex $E \Gamma$ sicut rectangulum $M \Sigma Z$ ad quadratum ex ΣM ; hoc est δE ad $E \Gamma$ sicut ΣZ ad ΣM : & dividendo vel componendo $\delta \Gamma$ erit ad ΓE sicut ΣM ad $M Z$. Ob similia autem triangu-
la $\Gamma \Gamma Z$, $\Gamma M O$, $\Gamma \Gamma$ erit ad ΓZ sicut ΓM ad $M O$: At vero $\delta \Gamma$, ΣM duplæ sunt ipsarum $\Gamma \Gamma$, ΓM ; quare $\delta \Gamma$ est ad ΓZ sicut ΣM ad $M O$; ac proinde ΓB est ad ΓZ sicut $M Z$ ad $M O$, anguli autem ad Z , O sunt æquales: ergo constat *Propositio*.


PROPOSITIO XIX.

Ductis ad Axem Parabolæ vel Hyperbolæ normalibus, erunt segmenta à duabus quibuscvis normalibus, ab utroque Axis latere abscissa, similia & æqualia; segmentum autem quodvis aliud ejusdem sectionis non erit iisdem simile.

Sit

Sit $\Gamma A K$ Parabola vel Hyperbola, cujus Axis $A A$; & ducantur in sectione rectæ duæ ad Axem normales, puta $B \Theta$, ΓK , abscindentes è sectione segmenta $B \Gamma$, ΘK : sint autem segmenta ΔE , ΘK à diversis normalibus abscissa. Dico segmenta $B \Gamma$, ΘK esse similia, quia (per 7^{am} hujus) æqualia sunt, ac superimposita unum super alterum congruunt inter se: segmenta vero ΔE , ΘK non esse similia.

Nam, si fieri possit, sint segmenta ΔE , ΘK similia. Segmentum autem ΘK segmento $B \Gamma$ (per eandem 7^{am}) simile est: segmentum igitur ΔE simile erit segmento $B \Gamma$; atque adeo bases $B \Gamma$, ΔE productæ (per duas Prop. præcedentes) occurrant Axi sub æqualibus angulis $A H B$, $A Z E$: unde rectæ ΓB , ΔE erunt parallelæ. Ducatur recta $M Z$ dividens ipsas ΓB , ΔE bifariam in Z & N , & per punctum M ipsi $\Delta E Z$ parallela sit $M I$. Erit igitur $M Z$ (per 28^{am} secundi) sectionis diameter, ac $M I$ ordinatim applicatis parallela tanget sectionem. Jam si segmenta ΓB , ΔE sint similia, erit (per duas proximè præcedentes) $M I$ ad $M Z$ ficut $M I$ ad $M N$. Hoc autem absurdum est, ac proinde segmentum $\Delta M E$ non potest esse simile segmento ΘK . Q. E. D.




PROPOSITIO XX.

DUctis ad Axem Ellipseos normalibus; erunt segmenta à duabus quibuscvis normalibus ab utroque Axis latere abscissa, similia & æqualia inter se, ut & segmentis, à normalibus ab altera parte centri ad easdem ab eo distantias ductis, abscissis: positio quoque horum quatuor segmentorum similis erit; neque ullum aliud segmentum ejusdem sectionis his simile esse potest.

Sit Ellipseos Axis $A A$, & ad rectos angulos occurrant Axi rectæ duæ $B \Theta$, ΓK ; ut & ab altera parte centri aliæ duæ ad easdem à centro distantias ut $Z I$, $H O$: Dico segmenta $B \Gamma$, ΘK , $Z H$, $I O$ esse similia, neque aliud dari segmentum in sectione quod iisdem simile sit.

Quod autem segmenta hæc $B \Gamma$, ΘK , $Z H$, $I O$ similia sint ac similiter posita, hinc manifestum est; quia (per 8^{am} hujus) æqualia sunt, ac applicatæ coincident inter se. Verum quod nulum aliud segmentum his simile sit hoc modo probabitur. Si fieri possit, simile sit iis segmentum ΔE , ac jungantur rectæ ΔE , $B \Gamma$; quas productas ad occursum Axis eidem (per 18^{am} hujus) convenire oportet sub æqualibus angulis. Rectæ igitur ΔE , ΓB erunt parallelæ; ductaque recta $M Z N$ parallelas has bifariam dividente in punctis N , Z , erit $M Z N$ (per 28^{am} II^{di}) segmentorum diameter. Jam si segmenta ΔE , ΓB sint similia, foret ΓB ad $Z M$ ficut ΔE ad $M N$. Hoc autem absurdum est: nam si hoc ita sit, transirent rectæ $M B$, $M \Gamma$ junctæ & productæ per puncta E , Δ . Segmentum igitur ΔE non esse potest simile segmento ΓB . Q. E. D.





PROPOSITIO XXI.

SI ducantur ad Axes duarum Parabolarum normales, ita ut Axium portiones interceptæ Verticibusque conterminæ fuerint in eadem ratione ac latera recta utriusque sectionis: erunt segmenta à normalibus abscissa in una sectionum similia segmentis alterius, simili-

similiterque posita; neque in iisdem sectionibus reperietur segmentum aliud quodcunque prædictis simile.

Sint AB, EZ duæ Parabolæ quarum Axes $AZ, E\delta$, latera vero recta AP, EP ; & in alterâ sectionum ducantur normales $BM, \Delta Z$, in alterâ vero normales $Z\tau, X\delta$: fiat autem ut AM ad AP ita $E\tau$ ad EP , & ut EA ad AP ita $E\delta$ ad EP . Dico segmentum BAO simile esse segmento ZES ; ac segmentum ΔA simile segmento XE , atque etiam segmentum BA segmento ZX .

Segmentum autem BAO simile esse segmento ZES (in 11^m hujus) demonstratum est. Quod autem segmenta BA, ZX sint similia, hoc modo demonstrabitur. Junctæ rectæ BA, ZX producantur ad puncta K, σ ; ac dividantur ipsæ BA, ZX bifariam in punctis Θ, ξ , per quæ ducantur Axibus parallelæ $\Gamma\Theta\Lambda, H\xi T$; & de punctis Γ, H demittantur ad Axes normales $\Gamma N, H\sigma$. Quoniam vero AP est ad utramque AM, AZ ut EP ad utramque ex ipsis $E\tau, E\delta$; manifestum est AZ esse ad AM sicut $E\delta$ ad $E\tau$, ac proinde (per 20^m primi) erit quadratum ex ΔZ ad quadratum ex BM ut quadratum ex $X\delta$ ad quadratum ex $Z\tau$; quapropter ΔZ est ad BM ut $X\delta$ ad $Z\tau$; atque adeo $E\kappa$ ad KM sicut $\delta\sigma$ ad $\sigma\tau$: per conversionem autem rationis erit KZ ad EM sicut $\delta\sigma$ ad $\delta\tau$. Cum autem AZ est ad AM sicut δE ad $E\tau$; per conversionem rationis AZ erit ad EM sicut δE ad $\delta\tau$. Sed jam constat KZ esse ad EM sicut $\sigma\delta$ ad $\delta\tau$; erit itaque KZ ad EA sicut $\sigma\delta$ ad δE . Verum (per 11^m hujus) EA est ad EA sicut $E\delta$ ad δX ; adeoque KZ ad EA sicut $\sigma\delta$ ad δX . Anguli autem ad puncta Z, δ sunt recti, adeoque trianguia $KZ\Delta, \sigma\delta X$ similia sunt, ac proinde anguli ad puncta K, σ æquales. Jam propter similia trianguia, ΔK est ad KB sicut $X\sigma$ ad σZ ; ac per conversionem rationis $K\Delta$ est ad ΔB sicut $X\sigma$ ad XZ . Bifecatur autem BA in Θ , uti XZ in ξ ; quare $K\Delta$ est ad $\Delta\Theta$ sicut $X\sigma$ ad $X\xi$: ac ΔZ erit ad EA sicut $X\delta$ ad $\delta\tau$. Sed EA æqualis est ipsi ΓN , ac $\delta\tau$ ipsi $H\sigma$; quare ΔZ erit ad ΓN sicut $X\delta$ ad $H\sigma$, ac (per 20^m primi) EA erit ad AN sicut δE ad $E\sigma$; ac per conversionem rationis EA ad EN sicut δE ad $\delta\sigma$. Demonstravimus autem KZ esse ad EA sicut $\sigma\delta$ ad δE , unde ex æquo KZ erit ad EN sicut $\sigma\delta$ ad $\delta\sigma$; atque adeo $K\Delta$ erit ad ΔI sicut σX ad $X\tau$. Verum $K\Theta$ est ad $\Theta\Delta$ ut $\sigma\xi$ ad ξX , unde $K\Theta$ est ad ΘI sicut $\sigma\xi$ ad $\xi\tau$: ob similia autem trianguia $\Theta\Gamma, \tau\xi H$; erit ΘI ad $\Theta\Gamma$ sicut $\tau\xi$ ad ξH ; quare ex æquo $K\Theta$ erit ad $\Theta\Gamma$ sicut $\sigma\xi$ ad ξH . Recta autem ΘK æqualis est Tangenti sectionis ad punctum Γ ad Axem terminatæ, quia eidem ΘK parallela est ac inter duas parallelas. Pariter $\sigma\xi$ æqualis erit Tangenti per punctum H ductæ ad Axem: quare Tangens per H ducta est ad $H\xi$ sicut Tangens per Γ ducta est ad $\Gamma\Theta$. Quod si hoc ita se habeat ac æquales sint anguli quos continent Tangentes hæc cum suis Axibus, manifestum est (per 17^m hujus) fore segmenta similia de quorum verticibus Tangentes ducuntur: adeoque segmentum $\Delta\Gamma B$ segmento XHZ esse simile.



Quinetiam si capiatur aliud segmentum ut θ , quod non intercipiatur à prædictis normalibus. Dico illud non esse simile segmento $\Delta\Gamma B$. Nam segmentum $\Delta\Gamma B$ simile est segmento XHZ , & segmentum XHZ (per 19^m hujus) non est simile segmento θ , quia non intercipitur ab iisdem normaliter applicatis. Segmentum igitur θ non est simile segmento $\Delta\Gamma B$.

:


PROPO-

PROPOSITIO XXII.

Iisdem positis in Hyperbolis & Ellipsis similibus, eadem evenient quæ in Parabola evenire, in Propositione præcedente, demonstravimus.

Iisdem factis quæ prius in Parabola fecimus, producantur diametri segmentorum $\Gamma\Theta$, $H\xi$ ad centra Λ , T ; & ad puncta Γ , H tangant sectiones rectæ $\Gamma\gamma$, $H\theta$, quæ parallelæ erunt ipsis $\Delta\kappa$, $X\sigma$. Sint autem AM , $A\xi$ ad latus rectum $\Lambda\Pi$ sicut $E\tau$, $E\delta$ ad latus rectum alterius sectionis EP .

Quoniam vero sectiones sunt similes, erunt etiam (per 12^{mam} hujus) earundem figuræ similes, ac Axis transversus unius erit ad latus ejus rectum sicut Axis alterius ad latus ejus rectum. Supponimus autem AM , $E\tau$ esse in ratione laterum rectorum; quare, per demonstrata in 12^{ma} hujus, si ducantur in segmento BAO rectæ ipsi BO parallelæ, & in segmento $ZE\Sigma$ rectæ ipsi $Z\Sigma$ parallelæ, sitque numerus harum parallelarum in utroque segmento æqualis; erunt parallelæ in segmento $ZE\Sigma$ & ipsa Basis $Z\Sigma$, ad portiones Axis $E\tau$, ab iisdem abscissas verticique E conterminas, in eisdem rationibus quas habent parallelæ in segmento BAO & ipsa BO ad abscissas in Axe AM vertici A adjacentes, *respective*: erunt quoque abscissæ Axis AM ad abscissas Axis $E\tau$ in eadem ratione. Quocirca (per Definit. septimam) segmenta BAO , $ZE\Sigma$ similia sunt.




Quoniam autem AM est ad latus rectum $\Lambda\Pi$ sicut $E\tau$ ad latus rectum EP , ac $A\xi$ est ad $\Lambda\Pi$ sicut δE ad EP ; erunt (propter similes sectiones) AM ad MB sicut $E\tau$ ad τZ , & ξA est ad AM sicut δE ad $E\tau$: unde *ex æquo* ξA est ad BM sicut δE ad τZ . Sed & $\Delta\xi$ est ad ξA sicut $X\delta$ ad δE ; quare *iterum ex æquo* $\Delta\xi$ erit ad BM sicut δX ad τZ ; ac proinde ξK ad KM sicut $\delta\sigma$ ad $\sigma\tau$: per conversionem autem rationis $K\xi$ erit ad ξM sicut $\delta\sigma$ ad $\delta\tau$. Verum ξM est ad ξA ut $\delta\tau$ ad δE (ob ξA ad AM sicut δE ad $E\tau$) quare $K\xi$ est ad ξA ut $\sigma\delta$ ad δE . Est autem ξA ad $\Delta\xi$ sicut $E\delta$ ad δX ; quare *ex æquo* $K\xi$ est ad $\Delta\xi$ sicut $\sigma\delta$ ad δX . Anguli autem ad puncta ξ , δ sunt recti, adeoque triangula $K\xi\delta$, $\sigma X\delta$ sunt similia & anguli ad κ , σ æquales. Jam sectionum similibus figuræ sunt similes, ac rectæ $\Gamma\gamma$, $H\theta$ sunt Tangentes; erit igitur (per 37^{mam} primi) rectangulum $\Lambda N\gamma$ ad quadratum ex ΓN sicut rectangulum $T\theta$ ad quadratum ex $H\theta$. Sed quadratum ex ΓN est ad quadratum ex $N\gamma$ ut quadratum ex $H\theta$ ad quadratum ex θH , ob similia triangula $\Gamma N\gamma$, $H\theta H$: quare *ex æquo* rectangulum $\Lambda N\gamma$ est ad quadratum ex $N\gamma$ sicut rectangulum $T\theta$ ad quadratum ex θH ; ac propterea ΛN erit ad $N\gamma$ sicut $T\theta$ ad θH . Sed $N\gamma$ est ad ΓN sicut $\theta\delta$ ad θH ; adeoque ΛN erit ad ΓN sicut $T\theta$ ad θH . Anguli autem ad N & θ sunt

X

sunt

funt recti, ac triangula $\Gamma\gamma N$, $H\theta\sigma$ sunt similia; quare anguli ad Λ , τ ut & ad γ , θ sunt æquales: quocirca triangula $\Gamma\gamma\Lambda$, $H\theta\tau$ sunt similia, ac $\gamma\Lambda$ est ad $\Gamma\Lambda$ sicut $\theta\tau$ est ad τH . Est autem γK ad $\Gamma\Theta$ sicut $\sigma\theta$ ad $H\xi$, propter parallelas $\gamma\Gamma$ ipsi ΘK ac $H\theta$ ipsi $\sigma\xi$. Porro ob similitudinem sectionum ΛM est ad MB sicut ET ad τZ ; & MB est ad MK sicut $Z\tau$ ad $\tau\sigma$; unde ex æquo ΛM est ad MK sicut ET ad $\tau\sigma$, ac componendo vel dividendo ΛM est ad AK sicut ET ad $E\sigma$. Est autem $\Lambda\Lambda$ ad ΛM sicut ET ad τE (quia ratio composita ex ratione $\Lambda\Lambda$ ad $\Lambda\Pi$ & $\Lambda\Pi$ ad ΛM eadem est ac ratio composita ex ratione ET ad EP & EP ad τE) ex æquo igitur $\Lambda\Lambda$ est ad AK sicut τE ad $E\sigma$, ac proinde $\Lambda\Lambda$ est ad AK sicut ET ad $\tau\sigma$. Ob similia autem triangula, ΛN est ad $\Lambda\gamma$ sicut $\sigma\tau$ ad $\tau\theta$; & $\Lambda\Lambda$ est ad $\Lambda\gamma$ (per 37^{am} primi) sicut quadratum ex $\Lambda\Lambda$ ad quadratum ex $\Lambda\gamma$, quemadmodum $\sigma\tau$ est ad $\tau\theta$ sicut quadratum ex ET ad quadratum ex $\tau\theta$: quadratum igitur ex $\Lambda\Lambda$ est ad quadratum ex $\Lambda\gamma$ sicut quadratum ex ET est ad quadratum ex $\tau\theta$; adeoque $\Lambda\Lambda$ est ad $\Lambda\gamma$ sicut ET ad $\tau\theta$. Verum jam demonstravimus $\Lambda\Lambda$ esse ad AK sicut ET ad $\tau\sigma$; quare $\Lambda\gamma$ est ad AK sicut $\tau\theta$ ad $\tau\sigma$, ac proinde $\Lambda\gamma$ est ad γK sicut $\tau\theta$ ad $\theta\sigma$. Sed $\Gamma\gamma$ est ad $\gamma\Lambda$ sicut θH ad $\theta\tau$, ob similia triangula $\gamma\Lambda\Gamma$, $\theta\tau H$: erit igitur ex æquo $\Gamma\gamma$ ad γK sicut θH ad $\theta\sigma$. Nuper autem ostensum est γK esse ad $\Gamma\Theta$ sicut $\sigma\theta$ ad $H\xi$; quare ex æquo $\Gamma\gamma$ est ad $\Gamma\Theta$ sicut θH ad $H\xi$. Anguli autem ad puncta γ , θ sunt æquales: segmenta igitur $\Gamma\Lambda$, ZHX similia sunt similiterque posita, juxta ea quæ demonstrata dedimus in 18^{va} hujus.



Quod si capiatur segmentum aliquod aliud ut $I\epsilon$, quod non sit interceptum sub iisdem ordinatim applicatis, nec in Ellipsi sub ordinatis æqualiter ab altera parte centri distantibus: Dico illud non esse simile segmento $\Delta\Gamma B$. Nam si fieri possit, sit illi simile. Cumque segmentum $B\Delta$ simile est segmento ZX , erit quoque segmentum $I\epsilon$ ipsi ZX simile. Non autem interceptum est sub iisdem ad Axem normalibus, neque sub iis quæ sunt ad easdem à centro distantias. Itaque (per 19^{am} & 20^{am} hujus) posuimus absurdum. Segmentum igitur $I\epsilon$ non potest esse simile segmento XZ , adeoque nec segmento $\Delta\Gamma B$. Q. E. D.

PROPOSITIO XXIII.


IN sectionibus dissimilibus, nulla portio unius similis est alicui alterius portioni.

Sint AB , $\Gamma\Delta$ sectiones dissimiles, ac primum sint ambæ Hyperbolæ vel Ellipses. Dico nullum segmentum sectionis AB simile esse segmento alicui ex $\Gamma\Delta$.

Nam si fieri possit, sint BE , ΔZ segmenta similia. Jungantur BE , ΔZ ac dividantur bifariam in punctis Θ , H ; ac per centra sectionum, K , Λ ducantur rectæ HMK , $\Theta N\Lambda$: quæ (per 47^{am} primi) diametri erunt sectionum. Hæ vero vel erunt sectionum

onum Axes, vel non erunt. Quod si Axes fuerint, ac segmenta $BE, \Delta Z$ sint similia; demissæ ad Axes normales parallelæ erunt ipsis $EB, \Delta Z$; & erunt normales ad abscissas Axis vertici conterminas in unâ sectionum sicut normales ad abscissas Axis in alterâ in iisdem rationibus *respective*: atque etiam abscissæ in uno Axe erunt ad abscissas in altero in eadem ratione. At hæ parallelæ normales sunt super Axes sectionum; quare sectiones ipsæ erunt similes. Hoc autem absurdum est. Posuimus enim eas dissimiles esse.


Si vero $HMK, \Theta NA$ non fuerint Axes, sint sectionum Axes $AK, \Gamma A$, & de punctis M, N demittantur ad Axes normales MP, NX , & ab iisdem ducantur tangentes MP, NZ : ac (per demonstrata in 18^{ta} hujus) manifestum erit tri- angula MPK, NZA similia esse; quorum perpendicularia sunt MP, NX : quare (per



Conversas Lemmatum Pappi tertii & quinti) rectangulum KPP erit ad quadratum ex MP sicut rectangulum ΔXZ ad quadratum ex NX . Sed rectangulum KPP est ad quadratum ex MP (per 37^{am} primi) sicut Axis transversus sectionis AB ad latus ejus rectum; ac (per eandem) rectangulum ΔXZ erit ad quadratum ex NX sicut Axis transversus sectionis ΓA ad latus ejus rectum. Quapropter Axis sectionis AB est ad latus ejus rectum sicut Axis sectionis ΓA ad ejus latus rectum. Figuræ igitur sectionum $AB, \Gamma A$ sunt similes, ac proinde (per 12^{am} hujus) sectiones ipsæ sunt similes. Sectiones itaque $AB, \Gamma A$ sunt similes, quas tamen dissimiles esse supposuimus. Absurdum est igitur segmentum BE simile esse segmento ΔZ . Q. E. D.

PROPOSITIO XXIV.

SI vero sectio ABE fuerit Parabola, $\Gamma A Z$ vero Hyperbola aut Ellipsis; demonstravimus quidem (per 14^{am} hujus) sectionem sectioni non esse similem. Dico quoque segmenta earum non posse similia esse. Nam, si possibile sit ut sint similia, duci poterunt in iisdem (per *Definit. septimam*) rectæ numero æquales, ipsis $BE, \Delta Z$ parallelæ, ita ut portiones diametri MH vertici M conterminæ à parallelis abscissæ, fuerint ad ipsas parallelas in segmento BE , in iisdem rationibus ac abscissæ diametri $N\Theta$ vertici N conterminæ ad parallelas in altera segmento ΔZ ductas: simulque Basis unius erit ad diametrum ejus sicut Basis alterius ad diametrum ejus; ac portiones in unâ diametrorum abscissæ erunt ad abscissas in alterâ ubique in eadem ratione. Hoc autem fieri non posse, eodem modo quo rem in integris sectionibus (per Prop. 14^{am}) demonstravimus, facile constabit. Q. E. D.




Quod si una sectionum fuerit Hyperbola, altera vero Ellipsis, patebit absurditas juxta argumentum Propositionis 15^{te} hujus.

PROPOSITIO XXV.

Trium sectionum Conicarum nulla portio est arcus Circuli.

Sit $AB\Gamma E$ sectio aliqua. Dico quod fieri nequit ut pars aliqua ejus sit arcus circularis.

Nam, si fieri possit, sit $AB\Gamma$ arcus Circuli, & in eâ ducantur utcunque rectæ duæ non parallelæ ut $AB, \Gamma E$; atque etiam altera ut ZH iisdem non parallela; ducantur quoque $Z\Theta$ ipsi AB parallela, ut HK ipsi ΓE , ac EA ipsi ZH ; biscentur omnes hæ rectæ in punctis M, N ; O, Ξ ; Π, X : ac junctæ rectæ $MN, O\Xi, \Pi X$ diametri erunt Circuli, ac proinde dividentes chordas parallelas bifariam (per 3. III. *Element.*) iisdem normales erunt. Eadem vero sunt diametri sectionis (per 28^{um} secundi) & ob angulos ipsi parallelis rectos, $MN, \Xi O, \Pi X$ erunt quoque sectionis Axes. Neque coincidunt in eandem rectam, quia tres chordas prius ductas non esse parallelas supponitur. Hoc autem absurdum est, quia (per 48^{um} secundi) in nullâ sectione habentur plures quam duo Axes. Fieri igitur nequit ut pars aliqua cujuslibet sectionis Conicæ sit arcus Circuli. Q. E. D.




PROPOSITIO XXVI.

Si secetur Conus planis æquidistantibus, quæ producta supra Coni verticem subtendantur angulo ejus exteriori: Sectiones Hyperbolicæ hinc genitæ similes erunt inter se, sed inæquales.

Sit Conus $AB\Gamma\Delta$; ac secetur planis æquidistantibus quorum communes sectiones cum plano Basis Coni sint $\Theta M, KN$; & per centrum Basis ad has rectas demittatur Cathetus $BAH\Gamma$: secetur etiam Conus alio plano per Axem ejus, secundum rectam $B\Gamma$, quod Conicæ superficiei occurrat in rectis $AB, \Gamma\Gamma$; ac sint communes intersectiones hujus plani cum duobus prædictis planis parallelis, rectæ $\Delta A, ZH$, quæ producantur ad O, E . Dico sectionem ΘZM similem esse sectioni KAN , sed tamen non illi æqualem.

De puncto A ipsis $\Delta A, ZH$ parallela ducatur $A\Pi$; ac fiat $O\Delta$ ad ΔZ ut quadratum ex $A\Pi$ ad rectangulum $B\Pi\Gamma$: fiat etiam EZ ad ZI ut quadratum ex $A\Pi$ ad rectangulum $B\Pi\Gamma$: adeoque EZ erit ad ZI sicut $O\Delta$ ad ΔZ . Jam recta BA normalis est ipsi KN , adeoque cæteræ in sectione Hyperbolica KAN ad rectam ΔA ductæ ipsique ΔN parallelæ (per 12^{um} primi) poterunt plana lateri recto ΔZ adjacentia, excedentia vero rectangulis similibus contento sub $O\Delta, \Delta Z$. Pariter, quia recta BH normalis est ipsi $M\Theta$, rectæ eodem modo ductæ in Hyperbola ΘZM poterunt rectangula lateri recto ZI adjacentia, excedentia autem figuris rectangulis similibus contenta sub EZ, ZI . Verum angulus quem continent rectæ $\Delta A, KN$ æqualis est angulo contento sub $ZH, \Theta M$; quia parallelæ sunt inter se. Figura autem EZI similis est figuræ $O\Delta Z$: Sectiones igitur (per 12^{um} hujus) sunt similes. Quoniam vero rectangulum $O\Delta Z$ majus est rectangulo EZI , sectiones (per secundam hujus) non erunt æquales. Q. E. D.




PROPOSITIO XXVII.

Si secetur Conus planis inter se parallelis occurrentibusque utrique lateri trianguli per verticem, neque Basi Coni parallelis, neque eidem subcontrariè positis; erunt sectiones genitæ Ellipses similes, verum non æquales.

Secent

Secent Conum $AB\Gamma$ plana duo æquidistantia, sintque communes eorum intersectiones cum plano Basis Coni rectæ $\Theta M, KN$. De centro Basis Coni ad ipsas $\Theta M, KN$ demittatur normalis $B\Gamma H\Lambda$; ac secetur Conus plano juxta hanc rectam Conique Axem designato: sint autem communes horum planorum intersectiones rectæ $Z E H, \Delta O \Lambda$. Dico sectiones $Z P E, \Delta X O$ similes esse, sed inæquales.

Ducatur de vertice Coni A recta ipsis $Z H, \Delta \Lambda$ parallela, ut $A \Pi$; & erit diameter $O \Delta$ ad latus rectum $\Delta \Xi$ sicut diameter $E Z$ ad latus rectum $Z I$, quia utraque ratio est ut quadratum ex $A \Pi$ ad rectangulum $B \Pi \Gamma$. Est autem recta $B \Gamma \Lambda$ ipsi KN normalis; ac proinde rectæ, ordinatim ad Axem ΔO




ductæ in sectione Elliptica $\Delta X O$, ipsi KN parallelæ erunt; poteruntque rectangula lateri recto $\Delta \Xi$ adjacentia, deficientia vero figuris (per 13^{am} primi) similibus contentæ sub ipsis $\Xi \Delta, \Delta O$. Simili ratione ordinatim ductæ ad diametrum $Z E$, in Ellipsi $Z P E$, ipsi ΘM parallelæ erunt; ac poterunt rectangula lateri recto $Z I$ adjacentia, deficientia autem figuris similibus factæ sub $E Z, Z I$. Verum angulus $K \Lambda \Delta$ æqualis est angulo $\Theta H Z$, quia rectæ $K \Lambda, \Lambda \Delta$ ipsis $\Theta H, H Z$ parallelæ sunt. Cumque $O \Delta$ est ad $\Delta \Xi$ sicut $E Z$ ad $Z I$, figura contenta sub $O \Delta, \Delta \Xi$ similis erit contentæ sub $E Z, Z I$. Quod si hoc ita se habeat, sectiones ipsæ (per 12^{am} hujus) similes erunt, adeoque sectiones $Z P E, \Delta X O$ sunt similes. Non possunt autem æquales esse, quia rectangulum $E Z I$ majus est contento sub $O \Delta, \Delta \Xi$; ac proinde (juxta demonstrata in secundâ hujus) sectiones quoque sunt inæquales.

PROPOSITIO XXVIII. PROBL.

IN Cono recto dato invenire sectionem datæ Parabolæ æqualem.

Sit Conus rectus datus, cujus sectio per Axem est triangulum $AB\Gamma$: Parabola autem data sit ΔE , cujus Axis $\Delta \Lambda$ & latus rectum ΔZ : fiat ΔZ ad ΛH sicut quadratum ex ΓB ad rectangulum sub $\Lambda B, \Lambda \Gamma$; ac ducatur recta $H \Theta$ ipsi $\Lambda \Gamma$ parallela: dein secetur Conus plano transeunte per rectam $H \Theta$ & ad angulos rectos super planum $AB\Gamma$, ac genita erit sectio $K H M$ super Axem $H \Theta$. Dico sectionem $K H M$ æqualem esse sectioni ΔE .

Quoniam normales in sectione $K H$, ad Axem $H \Theta$ ductæ, possunt rectangula lateri ejus recto adjacentia; quod quidem est ad ΛH (per 11^{am} primi) sicut quadratum ex ΓB ad rectangulum sub $\Lambda B, \Lambda \Gamma$: fecimus autem ΔZ ad ΛH in eadem ratione quadrati ex ΓB ad rectangulum $\Lambda B \Gamma$; recta igitur ΔZ æqualis est lateri recto sectionis $K H M$. Sed, si ita fuerit, manifestum est (per primam hujus) sectiones esse æquales; ac proinde sectio ΔE sectioni $H K$ æqualis est.




Dico quoque quod non reperietur in hoc Cono alia Parabola datæ æqualis, cujus vertex sive Axis extremitas sit in recta AB , præter hanc solam. Nam si fieri possit ut reperiat alia Parabola æqualis sectioni ΔE , planum ejus secabit triangulum per Coni Axem ad angulos rectos; & erit Axis sectionis in plano trianguli

Y

$AB\Gamma$,

ABΓ, ob Conum rectum: in Cono enim recto omnium sectionum Axes ita se habent. At si possibile sit ut alia sectio æqualis sectioni ΔE Verticem habeat in recta AB, erit Axis ejus parallela ipsi AΓ, & punctum Verticis diversum erit à puncto H: erit autem latus ejus rectum ad interceptam in recta AB, inter sectionis illius & Coni Verticem A, ut quadratum ex BΓ ad rectangulum B A Γ. Hæc autem eadem est ratio ipsius ΔZ ad A H; quare ΔZ non est æqualis lateri recto hujus alterius sectionis, quæ proinde sectioni ΔE non est æqualis. Posuimus autem sectiones æquales esse: quod absurdum est, uti constat ex primâ hujus. Non igitur reperietur in recta AB Vertex Axis alicujus alterius sectionis sectioni ΔE æqualis.




PROPOSITIO XXIX. PROBL.

IN Cono recto dato invenire sectionem Hyperbolæ datæ æqualem. Oportet autem rationem quadrati Axis Coni ad quadratum semidiametri Basis non majorem esse ratione quam habet diameter transversa, sive Axis datæ sectionis, ad latus ejus rectum.

Sit Conus rectus propositus, in quo triangulum per Axem est ABΓ, Axis vero AΘ: sit quoque Hyperbola data ΔE, cujus Axis HΔΣ; figura vero rectangulum contentum sub HΔ, ΔZ. Primum autem sit quadratum ex AΘ ad quadratum ex BΘ in ratione HΔ ad ΔZ; ac ducatur (per Lemma VI. Pappi) recta ipsi AΘ parallela ipsique HΔ æqualis, quæ subtendat angulum B A Π, ad modum rectæ NΠ; & per NΠ, ad angulos rectos super planum trianguli ABΓ, erigatur planum Conicæ superficiei occurrens. Dico Hyperbolam sectione ejus genitam, cujus Axis est INΠ, æqualem esse Hyperbolæ datæ ΔE.

Quoniam enim AΘ parallela est ipsi ΠN, erit ΠN, sive diameter transversa, ad latus rectum sectionis (per 12^m primi) ut quadratum ex AΘ ad rectangulum sub ΓΘ, ΘB; & HΔ est ad ΔZ in eadem ratione; ΠN autem ipsi HΔ facta est æqualis: quare ΔZ æqualis erit lateri recto sectionis cujus Axis est ΠNI. Figura igitur sectionis cujus Axis est ΠNI æqualis est figuræ sectionis ΔE, ac proinde (per secundam hujus) sectiones ipsæ sunt æquales.

Neque reperietur alia sectio sectioni ΔE æqualis, cujus punctum Axis verticale sit in recta AB. Nam, si fieri possit, erit quoque Axis hujus sectionis in plano trianguli ABΓ (ut demonstratum est in Propositione præcedente) ac planum hujus alterius sectionis erit ad angulos rectos super planum trianguli ABΓ. Cum autem sectio altera Hyperbola est & æqualis sectioni ΔE, occurret Axis ejus lateri AΓ ultra apicem Coni A producto, ita ut portio intercepta inter latus trianguli AB & occursum cum AΓ productâ (per 2^{dam} hujus) æqualis sit ipsi ΔH. At vero non est ipsa ΠN, neque eidem parallela; quia si rectæ




ΠN

Circulus; ac fiat ΔM ad MZ sicut ΔH ad ΔZ (quod quidem nullo negotio fieri potest) ac in triangulo $AB\Gamma$ ducatur recta OP ipsi AM parallela rectæque ΔH æqualis: erigatur autem normaliter super planum trianguli $AB\Gamma$, secundum rectam OP , planum quod Conicæ superficiei occurrens producat Ellipsin. *Dico hanc Ellipsin, cujus Axis est OP , æqualem esse Ellipsi datæ ΔE .*

Est enim OP ad latus ejus rectum (per 13^m primi) ut quadratum ex AM ad rectangulum $BM\Gamma$. Sed rectangulum $BM\Gamma$ æquale est rectangulo AMZ ; quare Axis transversus OP erit ad latus rectum sectionis hujus, ut quadratum ex AM ad rectangulum AMZ , hoc est ut AM ad MZ . Fecimus autem AM ad MZ sicut ΔH ad ΔZ ; quapropter OP est ad latus rectum sectionis cujus Axis est OP , sicut ΔH ad ΔZ : figura igitur sectionis ΔE & ejus cujus Axis est OP sunt æquales; adeoque (per secundam hujus) & ipsæ sectiones sunt æquales.

Dico quoque non reperiri in hoc Cono sectionem aliam ipsi ΔE æqualem, cujus Vertex apici Coni vicinior fuerit in recta AB . Nam, si fieri possit, (juxta demonstrata in 28^o hujus) constabit Axem ejus esse in plano trianguli $AB\Gamma$, planumque ejus normaliter insistere eidem plano $AB\Gamma$. Quoniam vero hæc sectio Ellipsis est, occurret Axis ejus productus rectæ $B\Gamma$, & erit ipsi ΔH æqualis (per 2^{am} hujus) ac Vertex ejus puncto A propior erit in recta AB . Verum non cadet Axis ille super rectam OP , neque eidem parallela esse potest. Ducatur igitur de puncto A



huic Axi parallela, quæ non coincidat cum recta AM , sicut $A\Sigma T$; hæc autem occurreret arcui $A\Gamma$, quia non est ipsi $B\Gamma$ parallela. Verum est Axis transversus hujus sectionis ad latus ejus rectum (per 13^m primi) ut quadratum ex AT ad rectangulum $BT\Gamma$, ac in eadem debet esse ratione ΔH ad ΔZ . Sed rectangulum $BT\Gamma$ æquale est rectangulo $AT\Sigma$; erit igitur ΔH ad ΔZ ut quadratum ex AT ad rectangulum $AT\Sigma$, hoc est ut AT ad $T\Sigma$. Verum ΔH est ad ΔZ ut quadratum ex AM ad rectangulum AMZ , five ut AM ad MZ ; quare AT ad $T\Sigma$ erit ut AM ad MZ , quod absurdum & impossibile est. Quapropter non reperietur in hoc Cono sectio alia æqualis sectioni ΔE , cujus Vertex apici Coni propior fuerit in recta AB , præter solam sectionem cujus Axis major est OP . Q. E. D.

PROPOSITIO XXXI. PROBLEMA.

Invenire Conum rectum Cono recto dato similem, qui contineatur à Parabolâ datâ.


Sit sectio $AB\Gamma$ Parabola, cujus Axis AA , latus vero rectum ejus AA ; sitque Conus datus & triangulum per Axem ejusdem EZK : & secundum AA erigatur normaliter, super planum sectionis $AB\Gamma$, planum aliud, ut ΘAA ; & in hoc plano ducatur recta AM quæ contineat cum recta AA angulum æqualem angulo EZK : ac fiat ΔA ad AM sicut KZ ad ZE : & super basim AM describatur triangulum $A\Theta M$ simile triangulo EZK , ac ducantur rectæ ΘA , ΘM de punctis A , M ; ac fiat Conus cujus Vertex Θ , ac Basis circulus, cujus diameter AM , super planum $A\Theta M$ normaliter erectus. *Dico Conum $A\Theta M$ Cono EZK similem contineri à Parabolâ datâ $AB\Gamma$.*

Est enim angulus MAA æqualis angulo EZK , & angulus EZK æqualis est angulo ΘMA

$\Theta M A$; angulus igitur $M A A$ æqualis est angulo $\Theta M A$, adeoque $A A$ ipsi ΘM parallela est. Sed ΘM latus est trianguli per Axem Coni; adeoque planum sectionis propositæ producit in superficie Conicâ Parabolam. Jam vero ΔA est ad $A M$ sicut $K Z$ ad $Z E$, hoc est ut $A M$ ad $M \Theta$; quare ΔA est ad $A M$ sicut $A M$ ad $A \Theta$ (ob $A \Theta$ ipsi $M \Theta$ æqualem) quocirca quadratum ex $A M$ rectangulo $\Delta A \Theta$ æquale, est ad rectangulum $A \Theta M$ sicut ΔA ad $A \Theta$: est igitur latus rectum sectionis in Cono genitæ (per 11^m primi) ipsa recta ΔA . Eadem autem est latus rectum sectionis $B A \Gamma$: cumque utraque Parabola est, quarum latera recta sunt æqualia, ipsæ sectiones (per primam hujus) sunt etiam æquales. Posita itaque est sectio $A B \Gamma$ in Cono jam invento, qui quidem similis est Cono $Z E K$, quia similia sunt triangula $E Z K$, $\Theta M A$.

Dico quoque hanc sectionem non reperiri in alio Cono simili Cono $E Z K$, ita ut Apex ejus respiciat idem latus plani in quo est sectio, præter hunc Conum solum.

Nam, si fieri possit, sit alter ille Conus qui contineat hanc sectionem, similisque sit Cono $E Z K$, Conus cujus Apex est I ; & per Axem ejus transeat planum super planum sectionis normaliter erectum, eidem occurrens secundum Axem sectionis, nempe in recta $A A$: erit igitur $A A$ communis intersectio planorum. Planum autem $\Theta A A$ erigitur ad angulos rectos super planum sectionis, juxta eandem rectam $A A$; quare punctum I (per Lemma VII.) erit in plano $\Theta A A$. Jam sint $A I$, $I N$



latera Coni, ac erit $I N$ ipsi $A A$ parallela, & angulus $Z E K$ angulo $A I N$ æqualis, ut & angulo $A \Theta M$: recta igitur $A I$ est in directo ipsius ΘA . Producat recta $A M$ ad Z ; ac si foret sectio $B A \Gamma$ in Cono cujus Apex est I , & caperetur recta quædam ad $A I$ in ratione quadrati ex $A Z$ ad rectangulum $A I Z$; esset recta illa latus rectum sectionis $B A \Gamma$. Sed ΔA est latus rectum sectionis $B A \Gamma$; quare quadratum ex $A Z$ esset ad rectangulum $A I Z$ sicut ΔA ad $A I$: quadratum autem ex $A M$ est ad rectangulum $A \Theta M$ sicut ΔA ad $A \Theta$. Est vero quadratum ex $A M$ ad rectangulum $A \Theta M$ sicut quadratum ex $A Z$ ad rectangulum $A I Z$; adeoque ΔA erit ad $A \Theta$ in eadem ratione ac ad $A I$. Hoc autem absurdum est. Non itaque inveniri potest Conus alius Cono dato $Z E K$ similis, qui contineat sectionem $A B \Gamma$, ita ut Apex ejus respiciat idem latus plani sectionis. Q. E. D.

PROPOSITIO XXXII. PROBL.

Invenire Conum rectum Cono recto dato similem ab Hyperbolâ datâ contentum. Oportet autem rationem quadrati Axis Coni ad quadratum semidiametri Basis ejus non majorem esse ratione lateris transversi, in figurâ sectionis super Axem factâ, ad latus rectum ejusdem.

Sit $A B \Gamma$ Hyperbola data, cujus Axis $A A$, diameter transversa $A N$ ac latus rectum $A \Delta$; ita ut figura super Axem facta sit rectangulum $N A \Delta$: sit etiam Conus datus Conus ille in quo triangulum per Axem est triangulum $E Z K$. Producat recta $K E$ ad δ ; & secundum Axem sectionis $A A$ erigatur planum $\Theta A A$, ad angulos rectos super planum sectionis; in hoc autem plano super rectam $N A$ describatur segmentum circuli $N \Theta A$ (per 33^m III. Elem.) quod capiat angulum æqualem angulo $\delta E Z$: ac completo circulo dividatur arcus $A \Theta N$ bifariam in puncto Θ , & per Θ ipsi $A N$ normalis ducatur $\Theta E P$.

Imprimis autem sit quadratum ex Axe Coni, five ex $E H$, ad quadratum ex $Z H$ in ratione $A N$ ad ΔA ; & producat recta $N \Theta$ ultra punctum Θ , ut $M N$, cui occur-

Z

rat

venire licet Conum alium Cono EZK similem, qui à sectione $AB\Gamma$ contineatur, præter Conum ΘAM jam descriptum.

Jam si fuerit ratio quadrati ex EH ad quadratum ex HZ minor ratione NA ad AA : fiant eadem quæ in priori casu, & erit quadratum ex EH ad rectangulum HZK ut quadratum ex $\Theta\Pi$ (per Lemma quintum) ad rectangulum $M\Pi A$, ob similia triangula. Rectangulum autem $M\Pi A$ æquale est quadrato ex ΠA , hoc est quadrato ex ΘE , & quadratum ex $\Theta\Pi$ æquale est quadrato ex $A E$; quare quadratum ex EH est ad rectangulum HZK ut quadratum ex $A E$ est ad quadratum ex ΘE . Sed quadratum ex $A E$ æquale est rectangulo $P E \Theta$; quare quadratum ex EH est ad rectangulum HZK , hoc est ad quadratum ex ZH , sicut rectangulum $P E \Theta$ ad quadratum ex $E \Theta$, sive ut $P E$ ad $E \Theta$. Posuimus autem rationem quadrati ex HE ad quadratum ex ZH minorem esse ratione NA ad AA ; ratio igitur $P E$ ad $E \Theta$ minor erit ratione NA ad AA . Fiat itaque $P E$ ad $E \gamma$ sicut NA ad AA , & per punctum γ ipsi NA parallela ducatur recta $I \gamma \Sigma \xi$, ac jungantur IN , IA , IP & per A ipsi IP parallela sit AO .

Manifestum quidem est ex præmissis triangula æquicrura OIA , ZEK esse similia; ac si fiat Conus cujus Apex est I , ac Basis circulus cujus diameter AO , cujusque planum super planum ΘAA normaliter erectum sit, planum in quo est sectio $AB\Gamma$ huic Cono occurrere, Hyperbolamque producere cujus Axis est recta AA ac diameter transversa AN . Fecimus autem $P E$ ad $E \gamma$, sive $P X$ ad XI , sicut AN ad AA . Sed $P X$ est ad XI ut rectangulum PXI ad quadratum ex XI , ac rectangulum PXI æquale est rectangulo NXA ; quare rectangulum NXA est ad quadratum ex IX sicut NA ad AA . Sed & rectangulum NXA est ad quadratum ex IX sicut quadratum ex $I \xi$ ad rectangulum $O \xi A$, (nam ob parallelogrammum $A \xi IX$, XA est ad IX sicut $I \xi$ ad ξA ; ac XN est ad XI sicut $I \xi$ ad ξO , & componendo) quapropter NA est ad AA sicut quadratum ex $I \xi$ ad rectangulum $A \xi O$: recta igitur AA est latus rectum sectionis in Cono AIO genitæ. Unde & per ea quæ in hac Propositione demonstrata sunt, manifestum erit Conum cujus Apex est punctum I contineri ab hac sectione $AB\Gamma$. Continebitur etiam ab eadem sectione Conus alter cujus Apex est punctum Σ , junctis rectis $N\Sigma$, ΣA , ac productâ ipsâ $N\Sigma$; ac Conus uterque similis erit Cono dato EZK .

Dico quoque non contineri ab eadem Conum aliquem tertium Cono EZK similem, cujus Apex fuerit ad easdem partes plani sectionis $BA\Gamma$ ad quas situm est punctum I . Apex enim ejus erit, per præmissa, in arcu AIN . Sit autem ille in puncto T , ac jungatur recta $T P$; & è conversâ præcedentis demonstrationis consequetur AN esse ad AA sicut $P T$ ad $T P$: quod quidem absurdum est, cum scilicet $P E$ sit ad $E \gamma$ in illâ ratione. Sectio igitur $BA\Gamma$ non continet tertium Conum similem Cono EZK .

Quod si ratio quadrati ex EH ad quadratum ex ZH major fuerit ratione AN ad AA , impossibile erit ut Conus Cono EZK similis contineatur à sectione $AB\Gamma$. Nam, si fieri possit, contineatur ab ea Conica superficies cujus Apex est I ; & modo in præcedentibus usurpato, constabit $P X$ esse ad XI sicut AN ad AA . Sed ratio AN ad AA minor est ratione quadrati ex EH ad quadratum ex ZH , quam demonstravimus esse sicut $P E$ ad $E \Theta$; erit igitur ratio $P X$ ad XI minor ratione $P E$ ad $E \Theta$. Hoc autem absurdum est: ac proinde nullus Conus Cono dato EZK similis contineri potest à sectione $BA\Gamma$. Q. E. D.

PROPOSITIO XXXIII. PROBL.

Invenire Conum rectum Cono recto dato similem qui contineatur ab Ellipsi data.

Sit $AB\Gamma$ data Ellipsis, cujus Axis major $A\Gamma$ & latus rectum AA . Conus autem rectus datus sit EZK ; & secundum rectam $A\Gamma$ normaliter, super planum in quo est sectio $AB\Gamma$, erigatur planum, & in eo super basin $A\Gamma$ describatur arcus circuli qui capiat angulum æqualem angulo ZEK , ut arcus $A \Theta \Gamma$: & bisecetur hic arcus in puncto Θ , & è puncto Θ educatur recta ΘIA , ita producenda ut ΘA sit ad AI sicut $A\Gamma$ ad AA . Pari modo ducatur recta ΘE in eadem ratione dividenda in puncto N . Jungantur AI , $I\Gamma$, ac ipsi $A\Gamma$ parallela ducatur $I\Pi$; ipsique ΘA parallela sit $A\Pi$, occurr-

ΠΑΠΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ

ΛΗΜΜΑΤΑ

ΕΙΣ ΚΩΝΙΚΩΝ ΤΟ Ζ'. ΚΑΙ Η'.

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΠΕΡΓΑΙΟΥ.

PAPPI ALEXANDRINI

LEMMA TA


IN VII. ET VIII. LIBRUM CONICORUM

APOLLONII PERGÆI.

ΛΗΜΜΑ α'.

Παράλληλογράμμον ὀρθογώνιον τὸ ΑΓ, καὶ διήχθω ἡ ΕΖΑ. ὅτι τὸ ὑπὸ ΕΑΖ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΖΒΓ ὅτι τῷ ὑπὸ ΓΔΕ.

ΕΠΕΙ γὰρ τὸ ὑπὸ τῆς ΕΖ ἴσον ἐστὶ τοῖς ὑπὸ τῶν ΕΓ, ΓΖ, καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΕΑ, ΑΖ πεπλεγμένα ἴσα ἐστὶ τοῖς ὑπὸ τῶν ΕΔ, ΔΑ, τῶν τε τοῖς ὑπὸ τῶν ΕΔ, ΒΓ, καὶ τοῖς ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΖ, τῶν τε τοῖς ὑπὸ τῶν ΓΔ, ΒΖ πεπλεγμένοις. [ἀλλὰ τὸ μὲν ὑπὸ ΕΖ μὲν τὸ δὲ ὑπὸ ΕΑΖ ἴσον ἐστὶ τοῖς ὑπὸ ΕΑ, ΑΖ, τὸ δ' ὑπὸ ΓΕ, ΓΖ μὲν τὸ δὲ ὑπὸ ΕΔΓ καὶ τὸ δὲ ὑπὸ ΖΒΓ ἴσα ἐστὶ τοῖς ὑπὸ ΕΔ, ΒΓ καὶ τοῖς ὑπὸ ΓΔ, ΒΖ πεπλεγμένοις.] λοιπὸν ἄρα τὸ δὲ ὑπὸ τῶν ΕΑΖ ἴσον ἐστὶ τῷ δὲ ὑπὸ τῶν ΕΔ, ΔΓ καὶ τῷ δὲ ὑπὸ τῶν ΖΒ, ΒΓ. καὶ τὸ ἀπὸ αὐτῶν ὑπὸ Γ ΕΑΖ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ Γ ΕΔΓ καὶ τῷ ὑπὸ ΖΒΓ.



LEMMA I.


Sit ΑΓ parallelogrammum rectangulum, ac ducatur recta ΕΖ Α. dico rectangulum ΕΑΖ æquale esse utrique rectangulo ΖΒΓ & ΓΔΕ simul.

QUONIAM enim quadratum ex ΕΖ æquale est quadratis ex ΕΓ, ΓΖ simul, ac quadrata ex ΕΑ, ΑΖ simul æqualia sunt quadratis ex ΕΔ, ΔΑ, hoc est, quadratis ex ΕΔ, ΒΓ, una cum quadratis ex ΑΒ, ΒΖ simul, hoc est quadratis ex ΓΔ, ΒΖ. [Sed quadratum ex ΕΖ (per 7. 2^{di} El.) una cum duplo rectangulo sub ΕΑΖ æquale est utrique quadrato ex ΕΑ, ΑΖ; quadrata vero ex ΓΕ, ΓΖ una cum duplo rectanguli sub ΕΔΓ & duplo rectanguli ΖΒΓ æqualia sunt quadratis ex ΕΔ, ΒΓ & ex ΓΔ, ΒΖ.] reliquum igitur nempe duplum rectanguli ΕΑΖ æquale erit duplo rectanguli ΕΔΓ una cum duplo rectanguli ΖΒΓ: quare rectangulum ΕΑΖ æquale est rectangulis ΕΔΓ, ΖΒΓ simul sumptis.

ΛΗΜΜΑ β'.

Παράλληλογράμμον ὀρθογώνιον τὸ ΑΓ, καὶ διήχθω ἡ ΕΑΖ. ὅτι τὸ ὑπὸ Γ ΕΔ, ΔΓ μὲν τῷ ὑπὸ Γ ΒΖ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΕΑΖ.

ΕΠΕΙ γὰρ τὸ ὑπὸ τῆς ΕΖ ἴσον ἐστὶ τοῖς ὑπὸ τῶν ΕΓ, ΓΖ, ὅτι δὲ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΕΑ, ΑΖ πεπλεγμένα ἴσα τοῖς ὑπὸ τῶν ΕΔ, ΔΓ, ΓΒ, ΒΖ. καὶ τὸ δὲ ὑπὸ τῶν ΕΑΖ ἄρα ἴσον ἐστὶ τῷ δὲ ὑπὸ τῶν ΕΔΓ μετὰ τοῦ δὲ ὑπὸ τῶν ΖΒΓ. καὶ τὸ ἀπὸ αὐτῶν ὑπὸ Γ ΕΑΖ.



LEMMA II.

Sit ΑΓ parallelogrammum rectangulum ac ducatur ΕΑΖ. dico rectangulum ΕΔΓ una cum rectangulo ΓΒΖ æquale esse rectangulo ΕΑΖ.

QUONIAM enim quadratum ex ΕΖ æquale est quadratis ex ΕΓ, ΓΖ simul, quadrata vero ex ΕΑ, ΑΖ simul æqualia sunt quadratis ex ΕΔ, ΔΓ, ΓΒ, ΒΖ simul: duplum igitur rectanguli ΕΑΖ æquale erit duplo rectanguli ΕΔΓ una cum duplo rectanguli ΖΒΓ; ac proinde rectangulum ΕΑΖ semel æquale est utrique rectangulo ΕΔΓ, ΖΒΓ.

ΛΗΜΜΑ γ'.

Εἴω μέγαν ἢ ΑΒ τὸ ΓΔ, καὶ ἴσον τὸ ὑπὸ Α Ε Β τῷ ὑπὸ Γ Ζ Δ, ὅτι εἴω μέγαν τμήματα αἱ Α Ε, Γ Ζ, ὅτι μέγαν ἐστὶ ἡ Α Ε τὸ Γ Ζ.


LEMMA III.

Sit ΑΒ major quam ΓΔ, & rectangulum Α Ε Β æquale rectangulo Γ Ζ Δ, ac sint Α Ε, Γ Ζ utriusque portiones majores. dico majorem esse Α Ε quam Γ Ζ.

Α α

Β β


BISECENTUR totae AB, ΓΔ in punctis H, Θ: HB majus quadrato ex ΔΘ, ac quadratum ex rectangulo ΓΖΔ; majus igitur est quadratum ex HE quadrato ex ΘΖ, ac proinde HE major quam ΘΖ, est autem AH major quam ΓΘ; tota igitur AE tota ΓΖ major est.



ΤΕΤΜΗΣΘΩΣΑΝ ὅλαι αἱ AB, ΓΔ δίχα πῶς Η, Θ σημείοις· μείζον ἄρα ἐστὶ ἡ HB τῆς ΔΘ· ὥστε καὶ τὸ ἀπὸ τῆς HB μείζον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΔΘ τετραγώνον. ἔστι δὲ καὶ τὸ ὑπὸ ΑΕΒ ἴσον τῷ ὑπὸ ΓΖΔ· καὶ τὸ ἀπὸ ΗΕ ἄρα μείζον ἐστὶ τὸ ἀπὸ ΘΖ· μείζον ἄρα ἐστὶν ἡ HE τῆς ΘΖ. ἔστι δὲ καὶ ἡ AH μείζον τῆς ΓΘ· ὅλη ἄρα ἡ AE ὅλη τῆς ΓΖ μείζον ἐστὶ.

L E M M A I V.

Sit rectangulum ABB æquale rectangulo ΓΖΔ, æqualibus existentibus rectis AB, ΓΔ. dico majora segmenta AE, ΓΖ esse æqualia.



ΛΗΜΜΑ Δ'.
Ἴσον τὸ ὑπὸ ΑΕΒ τῷ ὑπὸ ΓΖΔ, ἴσων ὡσὺν τῶν AB, ΓΔ. ὅπῃ πῶς μείζονα τμήματα πᾶς AE, ΓΖ ἴσα ἐστὶ.

HOC autem eodem modo manifestum erit, bisectis rectis AB, ΓΔ in punctis H, Θ, &c.


ΤΕΤΜΗΣΘΩΣΑΝ γὰρ αἱ AB, ΓΔ δίχα πῶς Η, Θ, καὶ τὰ ἑκείνη.

L E M M A V.

Sit AB major quam ΓΔ; BE vero minor quam ΔΖ; existente AB majore quam BE, ac ΓΔ quam ΔΖ. dico excessum quo AB superat BE majorem esse excessu quo ΓΔ superat ΔΖ.

Εξω μὲν μείζον ἡ AB τῆς ΓΔ, ἐλάσσων δὲ ἡ BE τῆς ΔΖ, ὥστε μείζονος τῆς μὲν AB τῆς BE, τῆς δὲ ΓΔ τῆς ΔΖ· ὅπῃ ἡ τῆς AB, BE ὑπεροχὴ μείζων ἐστὶ τῆς τῆς ΓΔ, ΔΖ ὑπεροχῆς.

QUONIAM enim AB major est quam ΓΔ, major erit excessus ipsius AB supra BE excessu quo ΓΔ superat eandem BE. major autem est excessus ipsius ΓΔ supra EB quam supra ΔΖ, quia EB minor est quam ΔΖ: quocirca excessus ipsius AB supra BE multo major erit excessu quo ΓΔ superat ΔΖ.




ΕΠΕΙ γὰρ μείζον ἐστὶ ἡ AB τῆς ΓΔ· μείζον ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ τῆς AB, BE ὑπεροχὴ πῶς τῆς ΓΔ, BE ὑπεροχῆς. ἀλλὰ ἡ τῆς ΓΔ, BE μείζων τῆς τῆς ΓΔ, ΔΖ ὑπεροχῆς, ἐλάσσων γὰρ ἐστὶν ἡ BE τῆς ΔΖ· ὥστε ἡ τῆς AB, BE ὑπεροχὴ πολλὰ μείζων ἐστὶ τῆς τῆς ΓΔ, ΔΖ ὑπεροχῆς.

L E M M A VI.

Sit AB ipsi BG æqualis, uti ΔΚ ipsi ΚΖ: dico rectangulum sub AΓ, ΔΖ quadruplum esse rectanguli sub AB, ΔΚ.

Εξω ἴση ἡ μὲν AB τῇ BG, ἡ δὲ ΔΚ τῇ ΚΖ· ὅπῃ τὸ ὑπὸ ΑΓ, ΔΖ τετραπλάσιον ἐστὶ τοῦ ὑπὸ AB, ΔΚ.

QUONIAM enim ΓΑ dupla est ipsius AB, sumpta in communem altitudinem ΔΚ, erit rectangulum sub ΓΑ, ΔΚ duplum rectanguli sub AB, ΔΚ. rursum quoniam ΔΖ dupla est ipsius ΖΚ, sub communi altitudine ΑΓ, fiet rectangulum sub ΑΓ, ΔΖ duplum rectanguli sub ΑΓ, ΔΚ: sed & rectangulum sub ΑΓ, ΔΚ duplum est rectanguli sub AB, ΔΚ: proinde rectangulum sub ΑΓ, ΔΖ quadruplum est facti sub AB, ΔΚ.



ΕΠΕΙ γὰρ διπλὴ ἐστὶ ἡ ΓΑ τῆς AB, κοινὸν ὄψος ἡ ΔΚ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΓΑ, ΔΚ διπλάσιον ἐστὶ τοῦ ὑπὸ AB, ΔΚ. πάλιν ἐπειδὴ διπλὴ ἐστὶ ἡ ΔΖ τῆς ΖΚ, κοινὸν ὄψος ἡ ΑΓ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΑΓ, ΔΖ διπλάσιον ἐστὶ τοῦ ὑπὸ ΑΓ, ΔΚ. ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὸ ΑΓ, ΔΚ τὸ ὑπὸ AB, ΔΚ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΑΓ, ΔΖ τετραπλάσιον ἐστὶ τοῦ ὑπὸ AB, ΔΚ.

L E M M A VII.

Sit ut AB ad BG ita ΔΚ ad ΚΖ, & ut AB ad BH ita ΔΚ ad ΚΘ. dico rectangulum sub ABH esse ad rectangulum sub AHΓ sicut rectangulum ΔΚΘ ad rectangulum ΖΘΔ.

Εξω ὡς μὲν ἡ AB πρὸς τὴν BG ὥτως ἡ ΔΚ πρὸς τὴν ΚΖ, ὡς δὲ ἡ AB πρὸς τὴν BH ὥτως ἡ ΔΚ πρὸς τὴν ΚΘ. ὅπῃ γίνεται ὡς τὸ ὑπὸ τῆς ABH πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς AHΓ ὥτω τὸ ὑπὸ τῆς ΔΚΘ πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς ΖΘΔ.


NAM cum AB est ad BH sicut ΔΚ ad ΚΘ, per conversionem rationis BA erit ad AH sicut ΚΔ ad ΔΘ; adeoque quadratum ex BA ad quadratum ex AH sicut quadratum ex ΔΚ ad quadratum ex ΔΘ. sed ut quadratum ex AB ad rectangulum ABH ita quadratum ex ΔΚ ad rectangulum ΔΚΘ: erit igitur ut quadratum ex AH ad rectangulum ABH

ΕΠΕΙ γὰρ ἐστὶ ὡς ἡ AB πρὸς τὴν BH ὥτως ἡ ΔΚ πρὸς τὴν ΚΘ, ἀνατρέψαντες ἐστὶ ὡς ἡ BA πρὸς τὴν AH ὥτως ἡ ΚΔ πρὸς τὴν ΔΘ· ὥστε καὶ ὡς τὸ ὑπὸ BA πρὸς τὸ ὑπὸ AH ὥτω τὸ ὑπὸ ΔΚ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΘ. ἀλλὰ καὶ ὡς τὸ ὑπὸ AB πρὸς τὸ ὑπὸ ABH ὥτω τὸ ὑπὸ ΔΚ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΚΘ· καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ AH πρὸς τὸ ὑπὸ ABH ὥτω

A D VII. ET VIII. CONICORUM. 95

ἔτω τὸ ὑπὸ ΔΘ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΚΘ. ἐπεὶ δὲ ὑποκείμε-
ται ὡς ἢ ΑΒ πρὸς πλὴν ΒΓ ἕτως ἢ ΔΚ πρὸς ΚΖ, ἀνά-
παλιν καὶ συνθέντι ὡς ἄρα ἢ ΓΑ πρὸς πλὴν ΑΒ ἕτως ἢ
ΔΖ πρὸς πλὴν ΔΚ. ἔστι δὲ καὶ
ὡς ἢ ΒΑ πρὸς πλὴν ΑΗ ἕτως ἢ Α
ΚΔ πρὸς πλὴν ΔΘ. δι' ἴσου ἄρα
ἔστιν ὡς ἢ ΓΑ πρὸς ΑΗ ἕτως ἢ
ΖΔ πρὸς ΔΘ. καὶ ὡς ἄρα ἢ ΓΗ
πρὸς πλὴν ΑΗ ἕτως ἢ ΖΘ πρὸς
ΘΔ, καὶ ὡς τὸ ὑπὸ ΑΗΓ πρὸς
τὸ ὑπὸ ΑΗ ἕτως τὸ ὑπὸ ΖΘΔ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΘ. ἀλλὰ καὶ
ὡς τὸ ὑπὸ ΑΗ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΒΗ ἕτως τὸ ὑπὸ ΔΘ πρὸς τὸ
ὑπὸ ΔΚΘ. δι' ἴσου ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ ΑΒΗ πρὸς τὸ ὑπὸ
ΑΗΓ ἕτως τὸ ὑπὸ ΔΚΘ πρὸς τὸ ὑπὸ ΖΘΔ.

ita quadratum ex ΔΘ ad rectangulum ΔΚΘ. quo-
niam vero ponitur ΑΒ esse ad ΒΓ sicut ΔΚ ad ΚΖ,
componendo inverse erit ΓΑ ad ΑΒ sicut ΔΖ ad
ΔΚ. est autem ΒΑ ad ΑΗ
sicut ΚΔ ad ΔΘ: ex æquo igitur
ΓΑ est ad ΑΗ sicut ΖΔ ad
ΔΘ, ac proinde dividendo ΓΗ
erit ad ΗΑ sicut ΖΘ ad ΘΔ:
rectangulum igitur ΑΗΓ erit
ad quadratum ex ΑΗ sicut rectan-
gulum ΖΘΔ ad quadratum
ex ΔΘ. sed [per jam ostensā]
quadratum ex ΑΗ est ad rectangulum ΑΒΗ ut quadra-
tum ex ΔΘ ad rectangulum ΔΚΘ; ex æquo igitur
rectangulum ΑΒΗ erit ad rectangulum ΑΗΓ sicut
rectangulum ΔΚΘ ad rectangulum ΖΘΔ.



ΛΗΜΜΑ Η'.


Ἐς ὁμογενεῖς συναμφοτέρω καὶ δοτὶ ᾤ ΑΒ, ΒΓ, καὶ
δοθείσας ἢ ᾤ αὐτῶν ὑπεροχή. ὅτι δοθείσας ἔστιν
ἐκατέρω ᾤ ΑΒ, ΒΓ.

LEMMA VIII.

Data summa quadratorum ex ΑΒ & ΒΓ, una
cum differentia eorundem. dico utramque ex
ipsis ΑΒ, ΒΓ datam esse.

ΚΕΙΣΘΗ γὰρ τῇ ΓΒ ἴση ἢ
ΒΔ. διδόν ἄρα ἔστιν καὶ τὸ
ὑπὸ ΓΓΑΔ. ὑπεροχὴ γὰρ ἔστι τῶν
ὑπὸ ΑΒ, ΒΓ πρὸς ἑαυτὰς. ἐπεὶ
δὲ τὸ ὑπὸ ΓΑΔ δοθέν ἔστι, καὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν ΓΑΔ διδόν
ἔστι. διδόν ἄρα ἔστι καὶ τὸ ὑπὸ συναμφοτέρω ᾤ ΓΑ, ΑΔ, ὥστε
διδοῦσά ἔστι συναμφοτέρω ἢ ΓΑ, ΑΔ. καὶ ἔστι αὐτῆς ἡμισυα
ἢ ΒΑ. διδοῦσα ἄρα ἔστι ἢ ΒΑ. ὥστε καὶ ἢ ΒΓ διδοῦ-
σά ἔστι.

PONATUR enim ΒΔ ipsi
ΓΒ æqualis, ac datum erit
rectangulum ΓΑΔ, quod nem-
pe [per 6. 2.] differentia est
quadratorum ex ΑΒ, ΒΓ; dato autem rectangulo ΓΑΔ
eiusdem duplum quoque datur, ac proinde (per 10. 2.)
datum est quadratum ex ΓΑ, ΑΔ simul sumptā. adeo-
que & summa ipsarum ΓΑ, ΑΔ data est. hujus vero
dimidia est recta ΒΑ; quare ΒΑ data est, ac proinde
ΒΓ quoque datur.



ΛΗΜΜΑ Θ'.


Ἐς ὁμογενεῖς ἢ ΑΒ τῇ ΒΓ ἴση, ἢ δὲ ΔΚ τῇ ΚΖ, ἔπι
δὲ ἔς ὡς ἢ ΓΒ πρὸς ΒΗ ἕτως ἢ ΖΚ πρὸς
ΚΘ. ὅτι γίνεται ὡς τὸ ὑπὸ ΑΗΒ πρὸς τὸ ὑπὸ
ΒΓΗ ἕτως τὸ ὑπὸ ΔΘΚ πρὸς τὸ ὑπὸ ΚΖΘ.

LEMMA IX.

Sit ΑΒ ipsi ΒΓ æqualis, ut & ΔΚ ipsi ΚΖ; sit
etiam ut ΓΒ ad ΒΗ ita ΖΚ ad ΚΘ. dico
rectangulum ΑΗΒ esse ad rectangulum ΒΓΗ
sicut rectangulum ΔΘΚ ad rectangulum ΚΖΘ.

ΕΠΕΙ γὰρ ἔστιν ὡς ἢ ΓΒ πρὸς ΒΑ ἕτως ἢ ΖΚ πρὸς ΚΔ,
ἀλλὰ καὶ ὡς ἢ ΓΒ πρὸς ΒΗ ἕτως ἢ ΖΚ πρὸς ΚΘ.
ἔσται ἄρα καὶ ὡς τὸ ὑπὸ ΑΗ
πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΗΒ ἕτως
τὸ ὑπὸ ΔΘ πρὸς τὸ ὑπὸ
ΔΘΚ. ἀλλὰ καὶ ὡς ἢ ΑΗ
πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΗ πρὸς τὸ
ὑπὸ ΒΓ ἕτως τὸ ὑπὸ ΔΘ πρὸς
τὸ ὑπὸ ΚΖ. ὡς δὲ τὸ ὑπὸ
ΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΓΗ ἕτως τὸ ὑπὸ ΚΖ πρὸς τὸ ὑπὸ ΚΖΘ.
ἔσται ἄρα δι' ἴσου ὡς τὸ ὑπὸ ΑΗΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΓΗ ἕτως
τὸ ὑπὸ ΔΘΚ πρὸς τὸ ὑπὸ ΚΖΘ.

QUONIAM enim ΓΒ est ad ΒΑ sicut ΖΚ ad ΚΔ,
atque etiam ΓΒ est ad ΒΗ sicut ΖΚ ad ΚΘ;
erit igitur ut quadratum
ex ΑΗ ad rectangulum
ΑΗΒ ita quadratum ex
ΔΘ ad rectangulum ΔΘΚ.
sed ut quadratum ex ΑΗ
ad quadratum ex ΒΓ ita
quadratum ex ΔΘ ad
quadratum ex ΚΖ; &
ut quadratum ex ΒΓ ad rectangulum ΒΓΗ ita qua-
dratum ex ΚΖ ad rectangulum ΚΖΘ: ex æquo igitur
erit ut rectangulum ΑΗΒ ad rectangulum ΒΓΗ ita
rectangulum ΔΘΚ ad rectangulum ΚΖΘ.



ΛΗΜΜΑ Ι'.


Ἐς ὁμογενεῖς ἢ ΑΒ τῇ ΒΓ, ἐλάσσων ἢ ΒΔ ᾤ ΒΚ.
ὅτι τὸ ὑπὸ ᾤ ΑΔΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ᾤ ΒΓΔ ἐλάσ-
σον λόγον ἔχει ἢ περ τὸ ὑπὸ ᾤ ΓΚΒ πρὸς τὸ ὑπὸ
τῶν ΒΑΚ.

LEMMA X.

Sit ΑΒ ipsi ΒΓ æqualis, minor vero sit ΒΔ quam
ΒΚ. dico rectangulum ΑΔΒ ad rectangulum
ΒΓΔ minorem habere rationem quam habet
rectangulum ΓΚΒ ad rectangulum ΒΑΚ.

ΕΠΕΙ γὰρ ἴση ἢ ΑΒ τῇ ΒΓ, ἐλάσσων δὲ ἢ ΒΔ
ᾤ ΒΚ. ἢ ΓΔ ἄρα μείζων ἔστι ᾤ ΑΚ. ὥστε καὶ ἢ ΓΚ
μείζων ἔστι τῇ ΑΔ. ἐλασ-
σον ἄρα ἔστι τὸ ὑπὸ ΑΔΒ
τὸ ὑπὸ ΓΚΒ. μείζων δὲ
τὸ ὑπὸ ᾤ ΒΓΔ ᾤ ὑπὸ
ΒΑΚ. τὸ ἄρα ὑπὸ ΑΔΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΓΔ ἐλάσσων λό-
γον ἔχει ἢ περ τὸ ὑπὸ ΓΚΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΑΚ.

NAM cum ΑΒ æqualis est ipsi ΒΓ, ac ΒΔ mi-
nor quam ΒΚ, ΓΔ major erit quam ΑΚ, quem-
admodum ΓΚ major est
quam ΑΔ: minus igitur
est rectangulum ΑΔΒ
rectangulo ΓΚΒ, majus
vero rectangulum ΒΓΔ
rectangulo ΒΑΚ. quocirca rectangulum ΑΔΒ ad
rectangulum ΒΓΔ minorem habet rationem quam
rectangulum ΓΚΒ ad rectangulum ΒΑΚ.




LEMMA XI.

Restat jam præcedentium conversam demonstrare. nempe existentibus æqualibus AB, BG ; $\Delta E, EZ$; ac rectangulo AHB eandem rationem habente ad BGH quam habet rectangulum $\Delta\Theta E$ ad rectangulum $EZ\Theta$: fieri ut GB ad BH ita ZE ad $E\Theta$.

PONATUR rectangulum sub GH , AK æquale rectangulo sub AHB , & rectangulum sub $Z\Theta$, $\Delta\Lambda$ æquale rectangulo $\Delta\Theta E$: est igitur ut rectangulum sub AK, GH ad rectangulum BGH , hoc est AK ad BG , ita rectangulum sub $\Delta\Lambda, Z\Theta$ ad rectangulum $EZ\Theta$, hoc est $\Delta\Lambda$ ad EZ . sed ut GB ad BA ita ZE ad EA , quare rectæ AB, BG, GK ipsæ $\Delta E, EZ, Z\Lambda$ eandem inter se servant rationem & ordinem, nempe BG est ad GK sicut EZ ad $Z\Lambda$, ac proinde BG est ad BK sicut ZE ad $E\Lambda$.

quoniam vero rectangulum AHB æquale est rectangulo sub AK, GH , auferatur utrumque è rectangulo sub AK, HB , ac residuum rectangulum sub HK , HB æquale erit rectangulo sub AK, BG : erit igitur ut rectangulum sub AK, BG ad quadratum ex BK ita rectangulum BHK ad idem quadratum ex BK . simili argumento rectangulum sub $\Delta\Lambda, EZ$ erit ad quadratum ex $E\Lambda$ sicut rectangulum $E\Theta\Lambda$ ad quadratum ex $E\Lambda$. est autem rectangulum sub AK, BG ad quadratum ex BK , sicut rectangulum sub $\Delta\Lambda, EZ$ ad quadratum ex $E\Lambda$, ob proportionalitatem partium pari ordine dispositarum: ut igitur rectangulum BHK ad quadratum ex BK ita rectangulum $E\Theta\Lambda$ ad quadratum ex $E\Lambda$. eadem autem sunt portiones $BH, E\Theta$: erit igitur ut KB ad BH ita ΛE ad $E\Theta$. sed prius ostensum est BG esse ad BK sicut ZE ad $E\Lambda$; ex æquo igitur BG est ad BH sicut ZE ad $E\Theta$.



ΛΗΜΜΑ ια'.

Εἰς δὲ νῦν τὸ πῶς προσηγορευμένοις ἀντίστροφον δεῖξαι. ὅσης ἴσης ἔστω μὲν AB τῇ BG , ἢ δὲ ΔE τῇ EZ , καὶ ἐπὶ ὧς τὸ ὑπὸ AHB πρὸς τὸ ὑπὸ BGH ὅπως τὸ ὑπὸ $\Delta\Theta E$ πρὸς τὸ ὑπὸ $EZ\Theta$. δεῖξαι ὅτι γίνεται ὡς ἡ GB πρὸς BH ὅπως ἡ ZE πρὸς $E\Theta$.


ΚΕΙΣΘΩ τῇ μὲν ὑπὸ AHB ἴσον τὸ ὑπὸ τῶν GH, AK , τῇ δὲ ὑπὸ $\Delta\Theta E$ ἴσον ἔστω τὸ ὑπὸ $Z\Theta, \Delta\Lambda$. εἰσι ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ AK, GH πρὸς τὸ ὑπὸ BGH , τυτίσιν ἡ AK πρὸς BG , ὅπως τὸ ὑπὸ $\Delta\Lambda, Z\Theta$ πρὸς τὸ ὑπὸ $EZ\Theta$, τυτίσιν ἡ $\Delta\Lambda$ πρὸς EZ . ἀλλὰ καὶ ὡς ἡ GB πρὸς BA ὅπως ἡ ZE πρὸς EA . αἱ ἄρα AB, BG, GK τῶς $\Delta E, EZ, Z\Lambda$ ὁμοταγῆς εἰσιν ἐν τῇ αὐτῇ λόγῳ, τυτίσιν ὡς ἡ BG πρὸς GK ὅπως ἡ EZ πρὸς $Z\Lambda$. [καὶ ὡς ἄρα ἡ BG πρὸς πλὴν BK ὅπως ἡ ZE πρὸς πλὴν $E\Lambda$.] ἐπεὶ δὲ τὸ ὑπὸ τῶν AHB

ἴσον ἐστὶ τῇ ὑπὸ AK, GH , ἀμφοτέρων ἀφαιρέσω ἀπὸ τῶν $\Gamma AK, HB$ λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν HK, HB ἴσον ἐστὶ τῇ ὑπὸ τῶν AK, BG . εἰσι ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ τῶν AK, BG πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν BK ὅπως τὸ ὑπὸ τῶν BHK πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν BK . ἂν ταῦτα δὴ ὡς τὸ ὑπὸ τῶν $\Delta\Lambda, EZ$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $E\Lambda$, ὅπως ἐστὶ τὸ ὑπὸ $E\Theta\Lambda$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $E\Lambda$. καὶ εἰσι ὡς τὸ ὑπὸ τῶν AK, BG πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν BK ὅπως τὸ ὑπὸ τῶν $\Delta\Lambda, EZ$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $E\Lambda$, ἂν πλὴν ἀναλογίαν τῶν ὁμοιοταγῶν τμημάτων· καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ BHK πρὸς τὸ ὑπὸ BK ὅπως τὸ ὑπὸ $E\Theta\Lambda$ πρὸς τὸ ὑπὸ $E\Lambda$. καὶ εἰσι τὰ αὐτὰ τμήματα τὰ $BH, E\Theta$. εἰσι ἄρα ὡς ἡ KB πρὸς BH ὅπως ἡ ΛE πρὸς $E\Theta$. [ἀλλ' ἐδείχθη ὡς ἡ BG πρὸς BK ὅπως ἡ ZE πρὸς $E\Lambda$. δι' ἴσιν] ἄρα ὡς ἡ BG πρὸς BH ὅπως ἡ ZE πρὸς $E\Theta$.

LEMMA XII.

Sit AB ipsi BG uti & ΔK ipsi KZ æqualis; habeat autem BG ad GH maiorem rationem quam KZ ad $Z\Theta$. dico quod in primo casu AH maiorem habet rationem ad BG quam $\Delta\Theta$ ad KZ : in secundo vero minorem.

QUONIAM enim BG maiorem habet rationem ad GH quam KZ ad $Z\Theta$; in primo casu GB ad BH minorem habet rationem quam ZK ad $K\Theta$; in secundo vero, maiorem. adeoque AB ad BH minorem habet rationem quam ΔK ad $K\Theta$: in secundo vero casu maiorem. quare HA in primo casu maiorem habet rationem ad AB quam $\Theta\Delta$ ad ΔK , in secundo vero minorem. sed ut AB ad BG ita ΔK ad KZ ; ex æquo igitur, in primo casu, AH maiorem habet rationem ad BG quam $\Delta\Theta$ ad KZ : in secundo vero casu minorem.



ΛΗΜΜΑ ιβ'.

Εἰς δὲ ἴση ἡ μὲν AB τῇ BG , ἢ δὲ ΔK τῇ KZ , ἐπὶ δὲ ἡ BG πρὸς GH μείζονα λόγον ἔχεται ἢ πρὸς ἡ KZ πρὸς πλὴν $Z\Theta$. ὅτι ὅτι μὲν τῇ πρώτης πτώσεως, ἡ AH πρὸς πλὴν BG μείζονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς ἡ $\Delta\Theta$ πρὸς πλὴν KZ . ὅτι δὲ τῇ δευτέρᾳ, ἐλάσσονα.

ΕΠΕΙ δὲ BG πρὸς GH μείζονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς [ἡ KZ πρὸς $Z\Theta$, ὅτι μὲν τῇ πρώτης πτώσεως ἡ BG πρὸς BH ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς] ἡ ZK πρὸς $K\Theta$, ὅτι δὲ τῇ δευτέρᾳ μείζονα· ὡς καὶ ἡ AB πρὸς πλὴν BH ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς ἡ ΔK πρὸς $K\Theta$, ἐπὶ δὲ τῇ δευτέρᾳ μείζονα· καὶ ἡ HA ἄρα πρὸς πλὴν AB , ὅτι μὲν τῇ πρώτης πτώσεως μείζονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς ἡ $\Theta\Delta$ πρὸς ΔK , ὅτι δὲ τῇ δευτέρᾳ ἐλάσσονα. καὶ εἰσι ὡς ἡ AB πρὸς BG ὅπως ἡ ΔK πρὸς KZ . δι' ἴσιν ἄρα, ὅτι μὲν τῇ πρώτης πτώσεως, ἡ AH πρὸς πλὴν BG μείζονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς $\Delta\Theta$ πρὸς πλὴν KZ . ὅτι δὲ τῇ δευτέρᾳ ἐλάσσονα.

LEMMA XIII.


Sint rursus AB, BG æquales, ut & $\Delta K, KZ$; habeat autem AH ad BH minorem rationem quam $\Delta\Theta$ ad ΘK . dico BG maiorem habere rationem ad GH quam KZ ad $Z\Theta$.

ΛΗΜΜΑ ιγ'.

Εἰς δὲ πάλιν ἴση ἡ μὲν AB τῇ BG , ἢ δὲ ΔK τῇ KZ , ἐπὶ δὲ ἡ AH πρὸς πλὴν BH ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς ἡ $\Delta\Theta$ πρὸς πλὴν ΘK . ὅτι ἡ BG πρὸς πλὴν GH μείζονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς ἡ KZ πρὸς πλὴν $Z\Theta$.

ΕΠΕΙ

ΕΠΕΙ ὅ κατ' ἀναφορὰν καὶ
διάρθρωσιν ἡ HB ὡς πρὸς
BA, τοῦτοι δὲ BG, μείζονα λόγον
ἔχει ἢ περὶ ὁ K ὡς πρὸς τὴν KA,
τοῦτοι ὡς πρὸς KZ· ἀναστροφὰς
καὶ διελόντες, ἡ BG ὡς πρὸς ΓΗ
μείζονα λόγον ἔχει ἢ περὶ ὁ KZ
ὡς πρὸς ΖΘ.



QUONIAM enim per con-
versionem rationis & di-
videndo HB ad BA five
BG majorem habet rationem
quam OK ad KA, hoc est
ad KZ: per conversionem ra-
tionis & dividendo, BG ma-
jorem habet rationem ad ΓH
quam KZ ad ZΘ.


ΛΗΜΜΑ ΙΔ'.

Εἴω ἴση ἡ μὲν AB τῇ BG, ἡ δὲ ΔE τῇ EZ, καὶ ἡ
AH ὡς πρὸς πρὸς HB μείζονα λόγον ἔχει ἢ περὶ ἡ
ΔΘ ὡς πρὸς πρὸς ZE· ὅτι ἡ BH ὡς πρὸς πρὸς HΓ
ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περὶ ἡ EΘ ὡς πρὸς πρὸς Ζ.

LEMMA XIV.

Sint AB, BG æquales, uti & ΔE, EZ; habeat
autem AH ad HB majorem rationem quam
ΔΘ ad ΘE. dico BH majorem habere ratio-
nem ad HΓ quam EΘ ad ΘZ.

ΕΠΕΙ ὅ κατ' ἀναφορὰν καὶ
διάρθρωσιν ἡ AB, τοῦτοι δὲ BG, ὡς πρὸς πρὸς BH
μείζονα λόγον ἔχει ἢ περὶ ὁ ΔE, τοῦτοι ὡς πρὸς πρὸς EZ, ὡς πρὸς πρὸς EΘ· ἀνα-
στροφὰς καὶ διελόντες, ἡ BG ὡς πρὸς πρὸς BH
ὡς πρὸς πρὸς HΓ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περὶ ὁ EΘ ὡς πρὸς πρὸς Ζ.




DIVIDENDO enim AB
five BG majorem ha-
bet rationem ad BH quam
ΔE five EZ ad EΘ: per con-
versionem rationis igitur ac
dividendo BH ad HΓ mino-
rem habet rationem quam
EΘ ad ΘZ.

*His subjungere liceat Lemmata nonnulla manifestè assumpta in demonstrationibus hujus
Libri septimi, quæ propterea eidem præfixit Abdolmelec Schirazita Author Epito-
mes Conicorum Apollonii Arabicè scripta.*

LEMMA I.


Si dividatur AB utcunque in punctis Γ, Δ; erit quadratum ex AB, BG simul æquale
quadruplo rectanguli sub AB, ΓΔ simul sumptis & BΔ, una cum quadrato ex AΔ,
ΔΓ simul.



FIAT BK ipsi BG æqualis, ac ΔZ ipsi ΔΓ, & erit ZK duplum ipsius BΔ. Bifecetur KZ
in H, ac erit [per 8. II. El.] quadratum ex AK
five ex AB, BG simul, æquale quadruplo rectan-
guli AHZ, hoc est quadruplo rectanguli sub AB,
ΔΓ simul & BΔ, una cum quadrato ex AZ,
hoc est quadrato ex AΔ, ΔΓ simul.

LEMMA II.


Si dividatur recta AB utcunque in punctis Γ, Δ; erunt quadrata ex AB, BG simul
sumpta æqualia quadratis ex AΔ, ΔΓ simul, una cum duplo rectangulo sub AB,
ΔΓ simul & BΔ.



QUONIAM quadrata ex AB, BG [per 7.
II. El.] æqualia sunt duplo rectangulo ABΓ
una cum quadrato ex AΓ, ac quadrata ex AΔ,
ΔΓ [per eandem] æqualia sunt duplo rectangulo
AΔΓ cum quadrato ex AΓ: ob utrinque com-
mune quadratum ex AΓ, erit excessus quadrato-
rum ex AB, BG supra quadrata ex AΔ, ΔΓ æqua-
lis excessui dupli rectanguli ABΓ supra duplum
rectangulum AΔΓ. Bifecetur AΓ in Z, ac fiat
AK ipsi ΔΓ æqualis, & erit [per 6. II.] excessus
dupli rectanguli ABΓ supra duplum rectangulum
AΔΓ æqualis excessui quo duplum quadrati ex
BZ superat duplum quadrati ex ΔZ, hoc est, du-
plo rectanguli KBΔ. sed KB æqualis est utrif-
que AB, ΓΔ: quare quadrata ex AB, BG æqua-
lia sunt quadratis ex AΔ, ΔΓ una cum duplo
rectangulo sub AB, ΓΔ simul & BΔ.

LEMMA III.

Divisa recta AB in punctis Γ, Δ, ita ut AΓ, ΔB fuerint æquales; si sumatur in f Δ
punctum K, erunt quadrata ex AΔ, ΔB æqualia quadratis ex AK, KB una cum du-
plo rectanguli ΓKΔ.




SI dividatur ΔΓ bifariam in K, res manifesta
est. Sin secus fuerit, dividatur bifariam in Z.
Quoniam vero AB divisa est inæqualiter in Δ,
æqualiter vero in Z; erunt quadrata ex AΔ, ΔB
[per 9. II.] æqualia duplo quadratorum ex AZ,
ZΔ. Sed duplum quadrati ex ZΔ [per 5. II.] æ-
quale
B b

98 LEMMATA AD VII. CONICORUM.

quale est duplo rectangulo $\Gamma K \Delta$ una cum duplo quadrato ex ZK , ob $\Gamma \Delta$ æqualiter divisum in Z & inæqualiter in K : quadrata igitur ex $\Lambda \Delta$, ΔB æqualia sunt duplo quadratorum ex ΛZ , ZK una cum duplo rectangulo $\Gamma K \Delta$. Sed duplum quadratorum ex ΛZ , ZK [per 9. II.] æquale est quadratis ex ΛK , KB : quadrata igitur ex $\Lambda \Delta$, ΔB æqualia sunt quadratis ex ΛK , KB una cum duplo rectangulo $\Gamma K \Delta$.

LEMMA IV.

Si dividatur recta AB in punctis Γ , Δ ita ut $\Lambda \Gamma$, $B \Delta$ sint æquales, ac bisecetur $\Gamma \Delta$ in Z , fecetur autem utcumque in K ; secta vero sit $Z \Delta$ in H ita ut KZ major sit quam ZH : erunt quadrata ex ΛH , $H B$ una cum rectangulo sub KH & dupla differentia ipsarum $H B$, $K \Lambda$ æqualia quadratis ex ΛK , $K B$.



F IAT ΘZ ipsi ZH æqualis, & erit $\Theta \Lambda$ ipsi BH æqualis, ac ΘK erit differentia inter $H Z$, $Z K$; eademque differentia est ipsarum $H B$, $K \Lambda$: erit igitur excessus quadratorum ex ΛK & $K B$ supra quadrata ex ΛH , $H B$ [per 9. II.] æqualis duplæ differentiæ quadratorum ex $K Z$, $Z H$.

Hæc autem [per 6. II.] æqualis est duplo rectangulo sub $H K$, $K \Theta$, ob $H Z$ ipsi $Z \Theta$ æqualem & ΘK adjectam: quadrata igitur ex ΛH , $H B$ una cum duplo rectanguli sub $H K$, $K \Theta$ æqualia sunt quadratis ex ΛK , $K B$.

LEMMA V.

Iisdem positis, erit quadruplum rectanguli $BZ\Theta$, una cum duplo rectangulo $K\Theta B$ & quadruplo quadrati ex ΘZ , æquale duplo rectanguli sub KZ , $Z\Theta$ simul & ΘB .

QUADRUPlum enim rectanguli $BZ\Theta$ una cum quatuor quadratis ex $Z\Theta$ [per 3. II.] æquale est quadruplo rectanguli $B\Theta Z$: adjiciatur utrinque duplum rectanguli $K\Theta B$; fiet summa

æqualis duplo rectangulo sub ZK , ΘB una cum duplo rectanguli $B\Theta Z$, hoc est, rectangulo sub KZ , $Z\Theta$ simul & duplo ipsius ΘB .

LEMMA VI.

Iisdem positis, erit etiam duplum rectanguli $\Lambda\Theta B$ una cum quadruplo quadrati ex ΘZ æquale quadratis ex $\Lambda\Theta$, ΘB .

QUONIAM enim $\Lambda\Theta$ ipsi $H B$ æqualis est, erit rectangulum $\Lambda\Theta B$ æquale rectangulo $\Theta B H$; ac quadruplum quadrati ex ΘZ æquale est quadrato ex $H\Theta$, ob ΘZ ipsi ZH æqualem:

duplum igitur rectanguli sub ΘB , BH , hoc est rectangulum $\Lambda\Theta B$ una cum quadrato ex $H\Theta$, æquale est [per 7. II.] quadratis ex ΘB & BH , hoc est quadratis ex $\Lambda\Theta$, ΘB .

LEMMA VII.


Erit etiam duplum rectanguli sub ΛB , ΓZ æquale differentie quadratorum ex $\Lambda \Gamma$, ΓB .

QUONIAM duplum rectanguli ΛB , ΓZ æquale est duplo rectanguli sub $B \Gamma$, ΓZ , sive rectangulo $B \Gamma \Delta$ (ob ΓZ ipsi $Z \Delta$ æqualem) una cum duplo rectanguli $\Lambda \Gamma Z$ sive rectangulo $B \Delta \Gamma$; erit rectangulum $B \Gamma \Delta$ una cum rectangulo $B \Delta \Gamma$,

sive duplum rectanguli $B \Delta \Gamma$ una cum quadrato ex $\Delta \Gamma$, æquale rectangulo sub $B \Lambda$, ΓZ : rectangulum igitur sub $B \Lambda$, ΓZ [per 4. II.] æquale est excessui quo quadratum ex $B \Gamma$ superat quadratum ex $B \Delta$, sive ex $\Lambda \Gamma$.

LEMMA VIII.

Si ratio ipsius ΛB ad $B \Gamma$ major fuerit ratione ΔK ad $K Z$, [existente ΛB majore quam $B \Gamma$ & ΔK quam $K Z$] erit ratio quadrati ex $\Lambda \Gamma$ ad quadrata ex ΛB & $B \Gamma$ simul minor ratione quadrati ex ΔZ ad quadrata ex ΔK , $K Z$ simul.



F IAT ΛH ad $H \Gamma$ sicut ΔK ad $K Z$, & erit $\Lambda \Gamma$ ad ΓH sicut ΔZ ad $Z K$; pariterque $\Lambda \Gamma$ erit ad ΛH sicut ΔZ ad ΔK : quocirca quadratum ex $\Lambda \Gamma$ erit ad quadrata ex ΛH & ΓH sicut quadratum ex ΔZ ad quadrata ex ΔK , $K Z$ simul sumpta. Sed ratio quadrati ex $\Lambda \Gamma$ ad quadrata ex ΛB , $B \Gamma$

minor est ratione quadrati ex $\Lambda \Gamma$ ad quadrata ex ΛH , $H \Gamma$; quia quadrata ex ΛB , $B \Gamma$ majora sunt quadratis ex ΛH , $H \Gamma$: erit igitur ratio quadrati ex $\Lambda \Gamma$ ad quadrata ex ΛB , $B \Gamma$ minor ratione quadrati ex ΔZ ad quadrata ex ΔK , $K Z$.

APOL-

APOLLONII PERGÆI CONICORUM

LIBER SEPTIMUS.

Apollonius Attalo S. P.


MITTO tibi una cum his librum Septimum de Conicis Sectionibus. In hoc autem libro insunt plurimæ Propositiones novæ, diametros Sectionum figurasque super eas factas spectantes: quæ quidem omnes utilitatem suam habent in multis Problematum generibus, præcipueque in eorum discussionibus. Horum autem plura occurrunt exempla in Problematis Conicis determinatis, à nobis resolutis & demonstratis in Octavo libro; qui loco appendicis est, quemque tibi quantocyus fieri possit mittendum curabo. Vale.

PROPOSITIO I.

SI in Axe Parabolæ supra verticem Sectionis producto ponatur recta æqualis lateri recto; ac ducatur recta quælibet à Vertice ad Sectionem, de cuius extremitate demissa sit normalis ad Axem: poterit recta sic ducta rectangulum contentum sub interceptâ inter Verticem & normalem & interceptâ inter normalem & punctum ad quod productus est Axis.

Sit AB Parabola cujus Axis AΓ, & producat AΓ ad Δ, ita ut AΔ æqualis sit lateri recto: & de puncto A ducatur utcumque ad sectionem recta AB, & sit BΓ Axi normalis. Dico quadratum ex AB æquale esse rectangulo ΔΓA.

Quoniam enim AΓ est Axis sectionis, & BΓ eadem normalis est, ac AΔ æqualis est lateri recto; erit quadratum ex BΓ (per 1^{am} primi) æquale rectangulo ΔAΓ. Huic autem si adjiciatur quadratum ex AΓ, erunt quadrata ex AΓ, ΓB simul sumpta æqualia rectangulo ΔAΓ una cum quadrato ex AΓ, hoc est rectangulo ΔΓA. Sed quadrata ex AΓ, ΓB simul æqualia sunt quadrato ex AB: quocirca quadratum ex AB æquale est rectangulo ΔΓA. Q. E. D.




Bb 2

PROPO-

PROPOSITIO II.

S*I dividatur Axis transversus Hyperbolæ in ratione ejusdem Axis ad latus ejus rectum, ita ut portio ea, quæ Axis termino alterutri adjacet, respondeat lateri recto; ac si ab eodem Axis termino ducatur recta ad punctum quodlibet in Sectione, à quo demittatur Axi normalis: erit quadratum rectæ sic ductæ ad rectangulum sub interceptis inter normalem & utramque Axis portionis lateri recto respondentis extremitatem, sicut Axis transversus ad residuam Axis partem. Vocetur autem Axis portio lateri recto respondens recta Homologa.*

Sit Hyperbolæ Axis productus AGE , figura autem sectionis sit $\Gamma\Delta$; ac dividatur Axis AG in Θ , ita ut $\Gamma\Theta$ sit ad ΘA sicut ΓA ad AA five ad latus rectum: & ab A ducatur utcumque recta AB , & demittatur BE normalis ad Axem. Dico quadratum ex AB esse ad rectangulum ΘEA sicut AG ad $\Gamma\Theta$.



Fiat rectangulum $A EZ$ æquale quadrato ex BE , ac erit rectangulum $A EZ$ ad rectangulum $A E \Gamma$ sicut quadratum ex BE ad rectangulum $A E \Gamma$. At vero quadratum ex BE est ad rectangulum $A E \Gamma$ (per 12^m primi) sicut latus rectum AA ad Axem transversum AG : quare rectangulum $A EZ$ est ad rectangulum $A E \Gamma$ sicut AA ad AG ; ac proinde ZE est ad $E \Gamma$ sicut AA ad AG , hoc est sicut $A \Theta$ ad $\Theta \Gamma$; ac componendo $Z \Gamma$ erit ad ΓE sicut AG ad $\Gamma \Theta$: unde consequitur ZA esse ad ΘE sicut AG ad $\Gamma \Theta$. Sumptâ autem in communem altitudinem AE , erit rectangulum ZAE ad rectangulum ΘEA in eadem ratione, five ut AG ad $\Gamma \Theta$. Sed rectangulum ZAE æquale est quadrato ex AB ; adeoque quadratum ex AB est ad rectangulum ΘEA ut AG ad $\Gamma \Theta$. Q. E. D.

PROPOSITIO III.

S*I Axis alteruter Ellipseos producat extra sectionem, ita ut Axis auctus ejusdemque pars extra sectionem fuerint inter se ut Axis ipse & latus ejus rectum inter se; & ab eo Vertice, cui contermina est portio illa quæ lateri recto respondet, ducatur recta ad punctum quodlibet in sectione, de quo demittatur ad Axem normalis: erit quadratum ductæ ad rectangulum sub interceptis inter normalem & utramque lateri recto respondentis rectæ extremitatem, sicut Axis sectionis ad portionem illam quæ Axi proportionalis est. Vocetur autem ea quæ lateri recto respondet recta Homologa.*

Sit sectio Ellipsis, cujus Axis AG ac figura $\Gamma\Delta$; sitque $A \Theta$ recta in Axe producta, ita ut $\Gamma \Theta$ sit ad ΘA sicut ΓA ad AA : & ductâ utcumque rectâ AB , demittatur ad Axem normalis BE . Dico quadratum ex AB esse ad rectangulum $A E \Theta$ ut AG ad $\Gamma \Theta$.

Fiat rectangulum $A EZ$ æquale quadrato ex BE : erit igitur rectangulum $A EZ$ ad

ad rectangulum $AB\Gamma$ ut quadratum ex BE ad rectangulum $A\Gamma\Theta$. Quadratum autem ex BE est ad rectangulum $A\Gamma\Theta$ (per 21^m primi) ut latus rectum $\Lambda\Delta$ ad


latus transversum $A\Gamma$. Est igitur rectangulum $A\Gamma\Theta$ ad rectangulum $A\Gamma\Theta$ sicut $\Delta\Lambda$ ad $A\Gamma$, unde etiam ZE est ad $E\Gamma$ sicut $\Lambda\Delta$ ad $A\Gamma$ five ut $A\Theta$ ad $\Theta\Gamma$; ac dividendo $Z\Gamma$ erit ad ΓE sicut $A\Gamma$ ad $\Gamma\Theta$. Summa autem

vel differentia antecedentium est ad summam vel differentiam consequentium in eadem ratione; quare ZA erit ad $E\Theta$ sicut $A\Gamma$ ad $\Gamma\Theta$; ac sumpta AE in communem altitudinem, erit ut ZA ad $E\Theta$ ita rectangulum $ZA\Theta$ ad rectangulum $A\Theta\Theta$: est itaque $A\Gamma$ ad $\Gamma\Theta$ ut rectangulum $ZA\Theta$ ad rectangulum $A\Theta\Theta$. Sed rectangulum $ZA\Theta$ æquale est quadrato ex AB . Quapropter quadratum ex AB est ad rectangulum $A\Theta\Theta$ sicut $A\Gamma$ ad $\Gamma\Theta$. Q. E. D.

PROPOSITIO IV.

SI tangat Hyperbolam vel Ellipsin recta quælibet sectionis axi occurrens, ac si à puncto contactus ducatur ordinatim applicata, ut Θ è centro recta Tangenti parallela, æqualis vero semidiametro conjugatæ cum diametro illà quæ per punctum contactus ducitur: erit quadratum Tangentis ad quadratum semidiametri eidem parallelæ, sicut intercepta inter ordinatim applicatam & punctum occursus axis & Tangentis, ad interceptam inter eandem ordinatim applicatam & centrum sectionis.

Sit $A\Gamma$ Axis Hyperbolæ vel Ellipseos, cuius centrum Θ ; tangat autem sectionem recta BA in puncto B , & sit BE ordinatim applicata ad diametrum $\Gamma A E$; ac sit ΘH ipsi BA parallela, æqualis vero semidiametro conjugatæ cum diametro illà quæ per punctum contactus B ducitur. Dico quadratum ex BA esse ad quadratum ex ΘH sicut ΔE ad $E\Theta$.




Per punctum B ducatur diameter $B\Theta Z$, ac sint rectæ AA , ΔK ipsi BE parallelæ, & fiat recta quædam M ad BA sicut OB ad BA : erit igitur recta M dimidium lateris recti, five illius juxta quam possunt ordinatim ductæ ad diametrum $B\Theta$; rectangulis, quæ eidem adjacent, excedentibus quidem in Hyperbolâ, deficientibus vero in Ellipsi, figuris similibus contentæ sub duplo ipsius M & diametro ZB (uti constat ex 50^m primi). Recta autem ΘH dimidium est diametri conjugatæ cum diametro ZB : erit igitur rectangulum sub ΘB & M (per 15^m primi & 20^m secundi) æquale quadrato ex ΘH . Verum OB est ad BA sicut M ad BA , hoc est ut BA ad BK ; quare rectangulum sub M & BK æquale est quadrato ex BA . Sed rectangulum sub M & BK est ad rectangulum sub M & $B\Theta$ ut BK ad $B\Theta$: est igitur quadratum ex BA ad rectangulum sub $B\Theta$ & M sicut BK ad $B\Theta$; hoc est sicut

C C

E A

metri conjugatæ ZH, BK ; ipsique ZH parallela sit AA , & ad Axem AM demittatur normalis AM . Dico quadratum diametri transversæ BK esse ad quadratum diametri *ordinis* sive secundæ ZH sicut EM ad MN .

Jungatur $ΓA$ & è puncto B demittatur normalis BE , & ex eodem ducatur recta BA ipsi ZH parallela, quæ proinde sectionem continget. Quoniam vero $ΓO$ ipsi OA æqualis est, & AO ipsi OA ; erit $ΓA$ ipsi BO parallela: adeoque ob similia triangula, $ΔE$ erit ad $EΘ$ sicut AM ad MG . Sed & $ΔB$ est ad $EΘ$ (per 4^{am} hujus) sicut quadratum ex $ΔB$ ad quadratum ex $ΘH$. Cum autem, ob similia triangula, quadratum ex $ΘB$ est ad quadratum ex BA ut quadratum ex $ΓA$ ad quadratum ex AA ; ac quadratum ex BA est ad quadratum ex $ΘH$ sicut AM ad MG ; componetur ratio quadrati ex $ΘB$ ad quadratum ex $ΘH$ ex ratione quadrati ex $ΓA$ ad quadratum ex AA & ratione AM ad MG . Sed ratio quadrati ex $ΓA$ ad quadratum ex AA componitur ex rationibus quadrati ex $ΓA$ ad rectangulum $ΓMΞ$, & rectanguli $ΓMΞ$ ad rectangulum AMN , & rectanguli AMN ad quadratum ex AA . Composita est igitur ratio quadrati ex $ΘB$ ad quadratum ex $ΘH$ ex rationibus quadrati ex $ΓA$ ad rectangulum $ΓMΞ$, & rectanguli $ΓMΞ$ ad rectangulum AMN , & rectanguli AMN ad quadratum ex AA & ratione ipsius AM ad MG . Quadratum autem ex $ΓA$ (per 2^{am} hujus) est ad rectangulum $ΓMΞ$ sicut AG ad $AΞ$; &, per ean-



dem, rectangulum AMN est ad quadratum ex AA sicut $ΓN$ ad AG . Verum ratio rectanguli $ΓMΞ$ ad rectangulum AMN componitur ex ratione $MΞ$ ad MN & ratione $ΓM$ ad MA : ratio igitur quadrati ex $ΘB$ ad quadratum ex $ΘH$ componitur ex rationibus AG ad $AΞ$, $ΓN$ ad AG , $MΞ$ ad MN , $ΓM$ ad MA , & ratione AM ad MG . Ratio autem ex his omnibus conflata æqualis est rationi $MΞ$ ad MN . Nam ratio $ΓN$ ad AG conjuncta cum ratione AG ad $AΞ$ fit ratio $ΓN$ ad $AΞ$; ac $ΓN$ æqualis est ipsi $AΞ$: Ratio autem $ΓM$ ad MA composita cum ratione AM ad MG , fit ratio ipsius MG ad seipsam. Quare ratio ex his omnibus composita æqualis erit rationi reliquæ, nempe rationi $MΞ$ ad MN . Est igitur quadratum ex $ΘB$ ad quadratum ex $ΘH$ sicut $MΞ$ ad MN ; adeoque quadratum ex BK ad quadratum ex ZH est ut $MΞ$ ad MN . Porro quadratum ex BK (per 21^{am} primi) est ad quadratum ex ZH , sicut KB ad rectam juxta quam possunt ductæ à sectione ad diametrum KB , ipsi ZH parallelæ: erit igitur KB ad latus rectum ejus, sive ad eam juxta quam possunt ordinatim ad eandem applicatæ, sicut $MΞ$ ad MN . Q. E. D.


PROPOSITIO VII.

SI adjaceant utrique Axis Ellipseos Vertici rectæ æquales illi quam Homologam diximus, & habeantur in sectione quælibet diametri duæ conjugatæ; & si ducatur de sectionis Vertice recta alteri conjugatarum parallela, & ab occurſu ejus cum sectione demittatur normalis ad Axem: erit potentiâ diameter ea cui non ducitur parallela ad alteram quæ ejusdem conjugata est, sicut inter-

cepta inter normalem & terminum rectæ Homologæ Vertici alteri adjacentis ad interceptam inter eandem normalem & terminum Homologæ Vertici, à quo ducta est parallela, adjacentis: sive fuerint Homologæ in Axe majore extra sectionem, sive in Axe minore super Axem ipsum. Erit quoque diameter ista ad eam juxta quam possunt ordinatim ductæ, sive alteri diametro parallelæ, in ratione dictarum interceptarum.

Sit Ellipseos Axis AG , ac rectæ duæ Homologæ $AN, \Gamma Z$; sintque diametri duæ conjugatæ BK, ZH . Ducatur recta AA diametro ZH parallela, & de puncto in sectione A demittatur normalis ad Axem, ut AM . Dico quadratum ex BK esse ad quadratum ex ZH sicut MZ ad MN : & in eadem esse ratione KB ad rectam juxta quam possunt ordinatim applicatæ ad diametrum KB sive ipsi ZH parallelæ; nempe KB ad latus ejus rectum esse ut MZ ad MN .

Jungatur GA & de puncto B demittatur cathetus ad Axem BE , & per idem B ducatur BA ipsi ZH parallela, quæ proinde sectionem continget. Quoniam autem ΓO ipsi OA æqualis est, & AO ipsi OA æqualis, erit GA ipsi BO parallela: unde, ob similia triangula, ΔE erit ad $E\Theta$ sicut AM ad $M\Gamma$. Sed & ΔE est ad $E\Theta$ (per 4^{am} hujus) sicut quadratum ex BA ad quadratum ex ΘH ; adeoque AM est ad $M\Gamma$ sicut quadratum ex BA ad quadratum ex ΘH . Quoniam vero, ob similia triangula, quadratum ex BO est ad quadratum ex BA sicut quadratum ex GA ad quadratum ex AA ; ac quadratum ex BA est ad quadratum ex ΘH sicut AM ad $M\Gamma$



erit quadratum ex BO ad quadratum ex ΘH in ratione compositâ ex ratione quadrati ex GA ad quadratum ex AA & ratione AM ad $M\Gamma$. Ratio autem quadrati ex GA ad quadratum ex AA componitur ex ratione quadrati ex GA ad rectangulum ΓMZ , & ratione rectanguli ΓMZ ad rectangulum AMN , & ratione rectanguli AMN ad quadratum ex AA : quare ratio quadrati ex BO ad quadratum ex ΘH componitur ex rationibus quadrati ex GA ad rectangulum ΓMZ , & rectanguli ΓMZ ad rectangulum AMN , & rectanguli AMN ad quadratum ex AA , una cum ratione AM ad $M\Gamma$. Est autem quadratum ex GA ad rectangulum ΓMZ (per tertiam hujus) sicut AG ad AZ ; ac, per eandem, rectangulum AMN est ad quadratum ex AA sicut GN ad AG . Ratio autem rectanguli ΓMZ ad rectangulum AMN componitur ex ratione ΓM ad AM & MZ ad MN : quapropter ratio quadrati ex BO ad quadratum ex ΘH componitur ex rationibus AG ad AZ , GN ad AG , ΓM ad AM & MZ ad MN , & ex ratione AM ad $M\Gamma$. Est autem ratio ex his omnibus composita eadem ac ratio MZ ad MN : nam ratio GN ad AG conjuncta cum ratione AG ad AZ fit ratio GN ad AZ , quæ quidem æqualitatis est; ac ratio composita ex ratione ΓM ad AM & ratione AM ad $M\Gamma$ fit ratio ipsius ΓM ad seipsam: ratio igitur ex his omnibus composita erit ratio reliqua, nempe MZ ad MN . Quocirca quadratum ex BO est ad quadratum ex ΘH ut MZ ad MN . Quinetiam cum quadratum ex BK est ad quadratum ex ZH sicut BK ad illam juxta quam possunt rectæ ipsi ZH parallelæ, à sectione ad diametrum BK ductæ; erit BK ad rectam illam, nempe ad latus rectum ejus, sicut MZ ad MN . Q. E. D.


Hinc manifestum est, quod si normalis de puncto A cadat super centrum sectionis, diameter KB æqualis erit diametro ZH , quæ MZ ipsi MN æqualis est.

PROPO.

PROPOSITIO VIII.

Idem positis quæ in Propositionibus sextâ & septimâ præcedentibus, tam in Hyperbolâ quam in Ellipsi. Dico quadratum Axis transversæ AG esse ad quadratum ex utraque BK, ZH simul sumptâ & in directum productâ, ut rectangulum sub GN, MZ ad quadratum ex utrâque MZ & eâ quæ potest rectangulum NMZ simul sumptâ.

Fiat ZI media proportionalis inter ipsas MN, MZ . Jam quadratum ex AG est ad quadratum ex BK sicut quadratum ex AO ad quadratum ex OB ; quadratum autem ex AO (per 37^m primi) æquale est rectangulo AOE : quare quadratum ex AG est ad quadratum ex BK sicut rectangulum AOE ad quadratum ex OB . Rectangulum autem AOE est ad quadratum ex OB sicut rectangulum AGM ad quadratum ex GA , propter rectas AB, BO ipsi AA, AG parallelas, per Lemma IX. in Lib. secundum: quapropter rectangulum AGM est ad quadratum ex GA ut quadratum ex AG ad quadratum ex BK . Sumatur GM in communem altitudinem, ac erit ut GA ad GN ita rectangulum AGM ad rectangulum MGN . Quadratum autem ex GA est ad rectangulum EMG (per 2^{dam} & 3^{am} hujus) sicut AG ad AZ ; ac GN ipsi AZ est æqualis, quia rectæ sunt Homologæ: rectangulum igitur AGM est ad rectangulum MGN sicut quadratum ex GA ad rectangulum EMG , ac permutando rectangulum AGM erit ad quadratum ex GA ut rectangulum MGN ad rectangulum GMZ :



Demonstravimus autem rectangulum AGM esse ad quadratum ex GA ut quadratum ex AG ad quadratum ex BK ; quare quadratum ex AG est ad quadratum ex BK sicut rectangulum MGN ad rectangulum GMZ sive ut GN ad MZ . At vero ut GN ad MZ ita rectangulum sub GN, MZ ad quadratum ex MZ ; adeoque quadratum ex AG est ad quadratum ex BK ut rectangulum sub GN, MZ ad quadratum ex MZ . Jam ex duabus Propositionibus præcedentibus constat quadratum ex BK esse ad quadratum ex ZH ut EM ad MN ; adeoque BK est ad ZH sicut EM ad MI sive MZ, ZI simul; ac quadratum ex BK erit ad quadratum ex BK, ZH simul sumptis ut quadratum ex MZ ad quadratum ex MI . Verum jam ostensum est quadratum ex AG esse ad quadratum ex BK sicut rectangulum sub GN, MZ ad quadratum ex EM : ex æquo igitur quadratum ex AG erit ad quadratum ex BK, ZH simul ut rectangulum sub GN, EM ad quadratum ex MI . Sed MI æqualis est ipsi MZ una cum ea quæ potest rectangulum NMZ : quadratum igitur Axis AG est ad quadratum summae duarum diametrorum conjugatarum BK, ZH simul, sicut rectangulum sub GN, MZ ad quadratum ex MI ; quæ scilicet æqualis est utrique MZ & ZI simul, quarum ZI potest rectangulum NMZ . Q. E. D.

PROPOSITIO IX.

Idem manentibus ac in sextâ & septimâ præcedentibus. Dico quadratum ex AG esse ad quadratum differentia inter BK, ZH sicut rectangulum sub NG, MZ ad quadratum differentia inter MZ & ZI , sive illam quæ potest rectangulum NMZ .

D d


Quoniam

Quoniam KB est ad ZH sicut MZ ad ZI , uti patet ex demonstratione Propositionis ultimæ; erit quadratum ex KB ad quadratum differentiæ inter BK & ZH ut quadratum ex MZ ad quadratum differentiæ ipsarum MZ , ZI . Quadratum autem ex AG est ad quadratum ex BK sicut rectangulum sub FN , MZ ad quadratum ex MZ , per eandem præcedentis octavæ demonstrationem: quare ex æquo quadratum ex AG erit ad quadratum differentiæ ipsarum BK , ZH sicut rectangulum sub FN , MZ ad quadratum differentiæ inter ipsas MZ , ZI . Sed recta ZI potest rectangulum NMZ : quadratum igitur ex AG est ad quadratum differentiæ inter conjugatas diametros BK , ZH ut rectangulum sub FN , MZ ad quadratum differentiæ inter MZ & illam quæ potest rectangulum NMZ , hoc est ZI . Q. E. D.

PROPOSITIO X.

Idem manentibus. Dico quadratum ex AG esse ad rectangulum sub BK , ZH sicut FN ad illam quæ potest rectangulum NMZ .

Quoniam enim quadratum ex AG est ad quadratum ex BK (per demonstrata in 8^{va} hujus) sicut FN ad MZ ; & ex eadem constat quadratum ex BK esse ad rectangulum sub BK , ZH sicut MZ ad ZI , quia MZ est ad ZI sicut BK ad ZH : ex æquo igitur quadratum ex AG erit ad rectangulum sub BK , ZH sicut FN ad ZI quæ



potest rectangulum NMZ : quocirca quadratum ex AG est ad rectangulum sub diametris conjugatis BK , ZH sicut FN ad illam quæ potest rectangulum NMZ . Q. E. D.

PROPOSITIO XI.

Idem manentibus quæ in Hyperbolâ descripsimus ad Propositionem sextam hujus. Dico quadratum ex AG esse ad quadrata ex BK & ZH simul ut FN ad utramque NM , MZ simul sumptam.

Quoniam enim (per 8^{am} hujus) quadratum ex AG est ad quadratum ex BK sicut FN ad MZ , ac quadratum ex BK est ad quadrata ex BK , ZH simul sicut MZ ad utramque MZ , MN simul; per sextam enim hujus constat quadratum ex BK esse ad quadratum ex ZH sicut MZ ad MN : ex æquo igitur quadratum ex AG erit ad summam quadratorum ex diametris conjugatis BK , ZH sicut FN ad utramque NM , MZ simul sumptam. Q. E. D.

PROPOSITIO XII.

In omni Ellipsi quadrata ex quibuscumque diametris conjugatis simul sumpta æqualia sunt quadratis Axium simul sumptis.

Adhibeatur Schema quo usi sumus in Propositione septima hujus, & sit alter Axiom AG , ac diametri conjugatæ BK , ZH ; rectæ autem duæ Homologæ sint AN , $ΓZ$.

Quoniam quadratum ex AG est ad quadratum Axis alterius Ellipseos (per 15^{am} primi) sicut Axis transversus AG ad latus ejus rectum; & AG est ad latus ejus rectum sicut FN ad NA , quia recta AN Homologa est; & AN ipsi $ΓZ$ æqualis est: quadratum igitur ex AG est ad quadratum alterius Axis sicut FN ad $ΓZ$, unde componendo quadratum ex AG erit ad quadratum ex AG una cum quadrato alterius Axis sicut FN ad NZ . Sed quadratum ex AG est ad quadratum ex BK (per demonstrata in 8^{va} hujus) sicut FN ad MZ : ac quadratum ex BK est ad quadrata ex BK , ZH simul sicut


sicut MZ ad MZ , MN simul sumptas, quia (in septima hujus) ostendimus quadratum ex BK esse ad quadratum ex ZH sicut MZ ad MN ; atque sunt MZ , MN simul sumptæ æquales ipsi NZ : quare ex æquo quadratum ex AT est ad quadrata ex BK , ZH simul sicut NT ad NZ . Sed jam demonstratum est NT esse ad NZ ut quadratum Axis AT ad quadrata ex utroque Axe simul: quadrata igitur Axium æqualia sunt quadratis quarumvis diametrorum conjugatarum Ellipseos, BK , ZH . Q. E. D.

PROPOSITIO XIII.

IN omni Hyperbola differentia inter quadrata Axium æqualis est differentiæ inter quadrata ex diametris quibuscvis conjugatis sectionis.

Adhibeatur figura Hyperbolæ quâ usi sumus in sextâ hujus, in quâ AT est alter Axium, ac BK , ZH diametri conjugatæ, rectæque duæ Homologæ sunt AN , TE .

Quoniam quadratum ex Axe AT est ad quadratum alterius Axis Hyperbolæ (per 16^{am} primi) sicut AT ad latus ejus rectum; & AT est ad latus rectum ejus sicut TN ad NA , quia AN Homologa est; eadem autem est ipsi TE æqualis: erit igitur quadratum ex AT ad differentiam quadratorum utriusque Axis sicut TN ad NE . Quadratum autem ex AT est ad quadratum ex BK (per 8^{am} hujus) sicut TN ad ME ,



ac (per 6^{am} hujus) quadratum ex BK est ad quadratum ex ZH sicut ME ad MN ; adeoque per conversionem rationis quadratum ex BK est ad differentiam quadratorum ex BK & ZH sicut ME ad EN : ex æquo igitur quadratum ex AT est ad differentiam quadratorum ex BK , ZH sicut TN ad NE . Sed jam demonstratum est quadratum ex AT esse ad differentiam quadratorum utriusque Axis sectionis in eadem ratione ac TN ad NE : quapropter differentia inter quadrata Axium sectionis æqualis est differentiæ quadratorum diametrorum quarumvis conjugatarum BK , ZH . Q. E. D.

PROPOSITIO XIV.

Quinetiam manente figura Ellipseos quâ in Propositione septimâ hujus usi sumus. Dico quadratum Axis AT esse ad differentiam quadratorum diametrorum conjugatarum BK , ZH sicut NT ad duplam ipsius MO ; posito quod AA fuerit diametro ZH parallela, ac AM normalis ad Axem demissa.

Quoniam enim (per octavam hujus) quadratum ex AT est ad quadratum ex BK sicut TN ad ME , ac (per hujus septimam) quadratum ex BK est ad quadratum ex ZH sicut ME ad MN ; unde, per conversionem rationis, quadratum ex BK erit ad differentiam quadratorum ex BK & ZH sicut ME ad differentiam inter ME & MN . Differentia autem ipsarum ME , MN dupla est rectæ MO : ex æquo igitur quadratum ex AT erit ad differentiam quadratorum ex BK , ZH sicut TN ad duplam ipsius MO . Q. E. D.

PROPOSITIO XV.


Manentibus Schematis tum Hyperbolæ tum Ellipseos in Prop. sexta & septima hujus descriptis. Dico quadratum ex AF esse ad quadratum ejus quæ cum BK continet figuram sectionis, hoc est ad quadratum lateris recti ad diametrum BK , sicut rectangulum sub NG, MZ ad quadratum ex MN .

Fiat BK ad ξ sicut MZ ad MN . Cumque MZ est ad MN (per 6^{am} & 7^{am} hujus) sicut KB ad latus ejus rectum: recta ξ continebit cum diametro KB figuram sectionis. Est autem quadratum ex AF ad quadratum ex KB sicut rectangulum sub GN, MZ ad quadratum ex MZ , per demonstrata in octava hujus; & quadratum ex BK est ad quadratum lateris recti ξ sicut quadratum ex MZ ad quadratum ex MN : erit igitur ex æquo quadratum ex AF ad quadratum lateris recti ξ sicut rectangulum sub NG, MZ ad quadratum ex MN . Q. E. D.

PROPOSITIO XVI.

Iisdem manentibus ac in sextâ & septimâ hujus, sit ξ latus rectum diametri BK . Dico quadratum ex AF esse ad quadratum differentiæ inter ipsas BK & ξ ut rectangulum sub NG, MZ ad quadratum differentiæ inter ipsas MN, MZ .

Quoniam enim (per 6^{am} & 7^{am} hujus) BK est ad ξ sicut MZ ad MN ; erit, per conversionem rationis, BK ad differentiam inter BK & ξ sicut MZ ad differentiam



inter eam & MN , ac proinde earundem quadrata: nempe quadratum ex BK erit ad quadratum differentiæ inter BK & ξ sicut quadratum ex MZ ad quadratum differentiæ inter MZ, MN . Sed quadratum ex AF est ad quadratum ex BK (per 8^{am} hujus) sicut rectangulum sub NG, MZ ad quadratum ex MZ : est igitur ex æquo quadratum ex AF ad quadratum differentiæ inter BK & ξ sicut rectangulum sub NG, MZ ad quadratum differentiæ inter MZ & MN . Q. E. D.

PROPOSITIO XVII.

Iisdem manentibus quæ in sextâ & septimâ hujus descripsimus. Dico quadratum ex AF esse ad quadratum summæ diametri BK & lateris ejus recti ξ sicut rectangulum sub GN, MZ ad quadratum summæ ipsarum MZ, MN simul sumptarum.

Quoniam enim (per dictas 6^{am} & 7^{am}) BK est ad ξ sicut MZ ad MN , erit componendo quadratum ex BK ad quadratum utriusque BK & ξ simul sumptæ, sicut quadratum ex MZ ad quadratum ex ipsis MZ, MN simul sumptis. Est autem quadratum ex AF (per 8^{am} hujus) ad quadratum ex BK ut rectangulum sub GN, MZ ad quadratum ex MZ : quocirca ex æquo quadratum ex AF erit ad quadratum summæ ipsarum BK & ξ sicut rectangulum sub GN, MZ ad quadratum ex ipsis MZ, MN simul sumptis. Q. E. D.

PROPOSITIO XVIII.

Iisdem etiam manentibus. Dico quadratum Axis AF esse ad rectangulum sub diametro BK & latus ejus rectum ξ sicut NG ad MN .



Quoniam enim quadratum ex AF (per 8^{am} hujus) est ad quadratum ex BK sicut NG ad MZ ; & quadratum ex BK est ad rectangulum sub BK & ξ sicut BK ad ξ , hoc est (per 6^{am} & 7^{am} hujus) sicut MZ ad MN : erit ex æquo quadratum ex AF ad rectangulum sub BK, ξ sicut NG ad MN . Q. E. D.

PROPO-

PROPOSITIO XIX.

Idem etiam manentibus. Dico quadratum ex AG esse ad quadrata ex utraque BK & ξ simul sumpta sicut rectangulum sub NG , MZ ad quadrata ex utraque MN , MZ simul sumpta.

Quoniam enim quadratum ex AG est ad quadratum ex BK (per 8^{am} hujus) sicut rectangulum sub NG , MZ ad quadratum ex MZ ; & quadratum ex BK est ad summam quadratorum ex BK & ξ sicut quadratum ex MZ ad quadrata ex utraque MN , MZ simul sumpta; nam per demonstrata in sexta & septima hujus, BK est ad ξ ut MZ ad MN : erit igitur ex æquo quadratum ex AG ad utrumque quadratum ex BK & ξ simul sicut rectangulum sub NG , MZ ad quadrata ex utraque MN , MZ simul sumpta. Q. E. D.



PROPOSITIO XX.

Idem etiam manentibus. Dico quadratum ex AG esse ad differentiam quadratorum ex BK & ξ sicut rectangulum sub NG , MZ ad differentiam quadratorum ex MN , MZ .

Quoniam enim (per 8^{am} hujus) quadratum ex AG est ad quadratum ex BK sicut rectangulum sub NG , MZ ad quadratum ex MZ ; ac (per sextam & septimam hujus) BK est ad ξ sicut MZ ad MN : erit quadratum ex BK ad differentiam quadratorum ex BK & ξ sicut quadratum ex MZ ad differentiam quadratorum ex MZ & MN . Ex æquo igitur erit quadratum ex AG ad differentiam quadratorum ex BK & ξ ut rectangulum sub NG , MZ ad differentiam quadratorum ex MN , MZ . Q. E. D.

PROPOSITIO XXI.


In Hyperbola si fuerit Axis transversus major Axe recto: diameter omnis transversa, è diametris conjugatis sectionis, major erit diametro ejus *ὀρθῆς*: & ratio Axis majoris ad minorem major erit ratione cujusvis alterius diametri transversæ ad diametrum *ὀρθῆς* conjugatam: ac ratio cujusvis diametri transversæ Axi majori propioris, ad diametrum cum eâ conjugatam major erit ratione diametri transversæ ab Axe remotioris ad diametrum *ὀρθῆς* cum eadem conjugatam.

Sint Hyperbolæ Axes AG , IO , ac sint diametri duæ transversæ BK , ZH : sit autem AG major quam IO . Dico diametrum BK majorem esse diametro *ὀρθῆς* cum eadem conjugatâ, pariterque ZH majorem esse diametro ejus *ὀρθῆς*: rationem autem AG ad IO majorem esse ratione BK ad diametrum *ὀρθῆς* cum eâ conjugatam, vel ratione ZH ad conjugatam ejus: denique rationem diametri BK Axi propioris ad conjugatam ejus majorem esse ratione diametri ZH ad *ὀρθῆς* cum eadem conjugatam.

E c

Fiat

Fiat utraque ΓN ad AN & AZ ad ΓZ sicut Axis AF ad latus ejus rectum: & proinde $AN, \Gamma Z$ erunt rectæ quas Homologas voco. Ducatur AA parallela rectæ quæ contingit sectionem in puncto Δ , ac sit AA parallela tangenti sectionem in puncto Z , & demittantur normales ad Axem majorem ut $\Delta E, AM$: erit igitur quadratum ex BK (per 6^{am} hujus) ad quadratum diametri $\rho\sigma\theta\iota\alpha$ cum eadem conjugatæ sicut ZE ad EN ; pariterque quadratum ex ZH erit ad quadratum conjugatæ ejus ut EM ad MN . Quapropter BK major est $\rho\sigma\theta\iota\alpha$ ejus conjugatâ, ut & ZH major conjugatâ cum eadem. Est autem AF ad latus ejus rectum sicut ΓN ad AN , vel AZ ad ΓZ ; quia $\Gamma N, AZ$ æquales sunt, & ratio utriusque ad AN eadem est: ratio autem ZE ad EN minor est ratione EA ad AN ; ac proinde ratio EA ad ΓZ major est ratione ZE ad EN . Ac pari modo probabitur rationem EA ad ΓZ majorem esse ratione EM ad MN . Verum EA est ad ΓZ ut quadratum ex AF ad quadratum ex IO , quia utraque ratio (per 16^{am} primi) eadem est ac ratio ipsius AF ad latus ejus rectum: ratio igitur quadrati ex AF ad quadratum ex IO major est ratione ZE ad EN , vel ratione EM ad MN . Est autem ZE ad EN ut quadratum ex BK ad quadratum diametri $\rho\sigma\theta\iota\alpha$ cum eadem conjugatæ, & ME est ad MN ut quadratum ex ZH ad quadratum ex conjugatâ illius: quapropter ratio quadrati ex AF ad quadratum ex IO major est ratione quadrati ex BK ad quadratum diametri cum eadem conjugatæ; ac major ratione quadrati ex ZH ad quadratum conjugatæ cum eadem: unde & laterum, sive ratio AF ad IO major est ratione BK ad suam conjugatam, vel ratione ZH ad suam. Cum autem ratio ZE ad EN , sive quadrati ex BK ad quadratum conjugatæ ejus, major sit ratione EM ad MN , sive quadrati ex ZH ad quadratum conjugatæ ejus; erit ratio diametri BK ad ejusdem conjugatam major ratione diametri ZH ad conjugatam ejus. Q. E. D.




PROPOSITIO XXII.

SI vero Axis transversus Hyperbolæ minor sit Axe $\rho\sigma\theta\iota\alpha$: erit quælibet diameter transversa minor diametro $\rho\sigma\theta\iota\alpha$ cum eadem conjugatâ; ac ratio axis minoris ad majorem minor erit ratione cujusvis diametri transversæ ad suam $\rho\sigma\theta\iota\alpha$ conjugatam; & ratio diametri Axi minori propioris ad suam conjugatam minor erit ratione diametri remotioris ab eadem ad suam conjugatam.

Sint Hyperbolæ Axes AF, OI , & centrum O ; sintque BK, ZH duæ quælibet diametri: minor autem sit AF quam IO . Dico utramque BK, ZH minorem esse diametro $\rho\sigma\theta\iota\alpha$ cum illis respective conjugatâ; ac rationem AF ad IO minorem esse ratione BK ad diametrum cum illâ conjugatam, ut & ratione ZH ad conjugatam suam: & rationem ipsius BK ad suam conjugatam minorem esse ratione diametri ZH ad suam conjugatam.

Fiat ΓN ad NA sicut Axis AF ad latus ejus rectum, & in eadem ratione capiat AZ ad ΓZ ; & erunt $\Gamma Z, AN$ rectæ quas Homologas vocamus: ducatur etiam AA parallela rectæ quæ contingit sectionem in puncto B , ut & AA parallela tangenti sectionis in puncto Z ; & de punctis Δ, A Axi normales sint $\Delta E, AM$. Jam quadratum diametri BK est ad quadratum diametri $\rho\sigma\theta\iota\alpha$ cum eadem conjugatæ (per 6^{am} hujus) sicut ZE ad EN ; pariterque quadratum ex ZH ad quadratum conjugatæ ejus est ut EM ad MN : unde manifestum est diametrum BK minorem esse diametro $\rho\sigma\theta\iota\alpha$ cum eadem conjugatâ, ac diametrum ZH minorem esse conjugatâ ejus. Quinetiam quia FA est ad latus ejus rectum sicut ΓN ad NA , ac EA est ad ΓZ in eadem ratione; erit ΓN ipsi AZ æqualis, eademque erit utriusque ratio ad rectam

rectam AN. Ratio autem ZE ad EN major est ratione ZA ad AN, adeoque ratio
 ZE ad EN major est ratione GN ad NA. Sed ZE est ad EN (per 6^{am} hujus) ut
 quadratum ex BK ad quadratum conjugatæ ejus;
 ac GN est ad NA (per 16^{am} primi) ut quadratum
 Axis transversæ AG ad quadratum Axis *conjugatæ*:
 ratio igitur ipsius AG ad Axem *conjugatam*
 minor est ratione diametri BK ad diametrum
 cum eadem conjugatam; ac pari argumento mi-
 nor erit ratione ZH ad diametrum rectam cum
 eadem conjugatam. Quoniam vero ratio ZE ad
 EN minor est ratione EM ad MN; ac ZE est ad
 EN ut quadratum ex BK ad quadratum conju-
 gatæ ejus; & EM est ad MN ut quadratum ex
 ZH ad quadratum diametri cum eadem conju-
 gatæ: erit ratio diametri KB ad suam *conjugatam*
 minor ratione diametri ZH ad conju-
 gatam ejus. Q. E. D.



P R O P O S I T I O XXIII.


S*I vero Axes Hyperbolæ fuerint æquales, diametri quoque omnes conjugatæ erunt inter se æquales.*

Manente enim Schemate Propositionis 21^{me}, si fuerit AG ipsi OE æqualis, erit etiam AG (per 16^{am} primi) æqualis lateri recto. Est autem AO ipsi OG æqualis, quarum quoque utraque recta est Homologa, quia sunt inter se sicut diameter transversa AG ad latus ejus rectum: quadratum vero ex BK est ad quadratum diametri *oppositas* cum eadem conjugatæ sicut OE ad EO , sive ut æqualis ad æqualem; quadratum quoque ex ZH est ad quadratum conjugatæ ejus ut OM ad MO . Utraque igitur diameter BK , ZH æqualis est conjugatæ suæ, ac proinde lateri ejus recto. Q. E. D.

PROPOSITIO XXIV.

S*I ducantur diametri quævis conjugatæ in Ellipsi: erit ratio diametri majoris ad conjugatam suam minorem, minor ratione Axis longioris ad Axem minorem; ac ratio diametri majoris, Axisectionis longiori propioris, ad diametrum conjugatam ejus minorem, major erit ratione diametri majoris ab Axe longiore remotioris ad conjugatam suam.*

Sit AB Axis longior Ellipseos, ac $\Gamma\Delta$ Axis minor; ac sint sectionis diametri conjugatæ EZ , HK ; ΣN , ΠO , quarum BZ major fit conjugatâ ejus HK , ac ΣN major conjugatâ ΠO : & de punctis E , N ad Axem AB demittantur normales EA , NX ; & de punctis H , O ducantur ad Axem $\Gamma\Delta$ normales HM , OP . Jam rectangulum $A\Theta B$ (per 21^m primi) est ad quadratum ex $\Theta\Gamma$ sicut rectangulum $A\Lambda B$ ad quadratum ex ΛE ; rectangulum autem $A\Theta B$ majus est quadrato ex $\Theta\Gamma$: adeoque rectangulum $A\Lambda B$ majus est quadrato ex ΛE ; unde $A\Theta$ major erit quam ΘE . [*Nam si fiat quadratum ex $\Theta\Lambda$ commune, rectangulum $A\Lambda B$ una cum quadrato ex $\Theta\Lambda$, hoc est quadratum ex ΘA , majus erit quadratis ex $E\Lambda$, $\Lambda\Theta$ simul sumptis, sive quadrato ex ΘE ,*] ac AB major erit quam ZE . Rectangulum etiam $\Gamma\Theta\Delta$ est ad quadratum ex ΘB sicut rectangulum $\Gamma M\Delta$ ad quadratum ex MH , & rectangulum $\Gamma\Theta\Delta$ minus est quadrato ex ΘB ; quare




E e 2

rectan-

conjugatâ simul sumpta, minor est diametro quavis transversa ab Axe magis remotâ una cum conjugata ejus simul sumptâ.

Sit Hyperbolæ Axis transversus AF , & centrum Θ : aliæ vero diametri conjugatæ sint BK, HZ ; $T\zeta, IO$. Axis autem AB vel æqualis erit Axi $\Theta\Gamma$, vel non erit eidem æqualis. Si vero æqualis fuerit ei, erunt (per 23^m hujus) diametri KB, HZ æquales, pariterque diameter $T\zeta$ æqualis erit diametro IO . Sed diameter KB major est Axe ΓA , ac diameter $T\zeta$ major diametro KB . Ergo constat Propositio.

Si vero Axis AF non fuerit æqualis alteri sectionis Axi, erit differentia quadratorum Axis AF & alterius Axis sectionis æqualis differentiæ quadratorum ex diametris conjugatis KB, HZ , per 13^m hujus: recta igitur utrique Axi æqualis minor erit rectâ utrisque KB, HZ æquali. Quoniam autem differentia quadratorum ex BK, ZH æqualis est differentiæ quadratorum ex $T\zeta, IO$, ac $T\zeta$ major est quam BK ; erit recta æqualis utrique diametro BK, ZH minor rectâ utrique diametro $T\zeta, IO$ æquali. Q. E. D.




PROPOSITIO XXVI.

IN Ellipsi axes duo simul sumpti minores sunt quibuscvis aliis duabus diametris conjugatis sectionis simul sumptis: diametrique duæ conjugatæ Axibus propiores simul sumptæ minores sunt diametris conjugatis ab iisdem remotioribus simul: diametri autem conjugatæ, quæ sunt inter se æquales, simul sumptæ majorem efficiunt summam quam diametri quævis aliæ conjugatæ.

Sit Ellipseos Axis major AB , minor ΓA : sint etiam ZE, KH ; $N\Xi, OP$; $T\zeta, XP$ diametri conjugatæ; ac sit EZ major quam KH , & $N\Xi$ major quam OP ; XP vero æqualis sit diametro $T\zeta$. Dico rectam utrique Axi $AB, \Gamma A$ æqualem minorem esse rectâ diametris EZ, HK æquali; ut & rectâ utrisque $N\Xi, OP$ æquali: omnium autem maximam summam esse diametrorum æqualium $XP, T\zeta$.

Quoniam enim ratio AB ad ΓA (per 24^m hujus) major est ratione EZ ad KH , erit ratio summæ quadratorum ex ipsis $AB, \Gamma A$ ad quadratum rectæ compositæ ex utraqve $AB, \Gamma A$ (per Lemm. VIII. Abol.) major ratione summæ quadratorum ex EZ, KH ad quadratum ipsarum EZ, KH simul sumptarum. Quadrata autem ex EZ, KH simul sumpta (per 12^m hujus) æqualia sunt utrique quadrato ex $AB, \Gamma A$ simul: quadratum igitur compositæ ex $AB, \Gamma A$ simul minus est quadrato compositæ ex ipsis ZE, KH . Summa igitur Axium $AB, \Gamma A$ minor est rectâ æquali diametris EZ, KH simul sumptis. Pari modo demonstrabitur summam ipsarum EZ, KH minorem esse diametris $N\Xi, OP$ simul sumptis; ipsasque $N\Xi, OP$ simul minores esse diametris æqualibus conjugatis $XP, T\zeta$ simul sumptis. Q. E. D.



PROPOSITIO XXVII.

IN omni Ellipsi vel Hyperbola, cujus Axes sunt inæquales, excessus Axis majoris supra minorem major est excessu cujusvis alterius diametri supra conjugatam suam: & excessus diametri


F f

Axi

Axi majori propioris supra suam conjugatam major est excessu remotioris ab eadem supra diametrum cum eadem conjugatâ.

Hoc autem in Ellipsi manifestum est per demonstrata in 24^a hujus. In Hyperbola vero hunc in modum probabitur. Sit $\Lambda\Gamma$ Axis Hyperbolæ in qua sint diametri conjugatæ $\kappa\beta$, $z\eta$; $\xi\tau$, $\iota\omicron$. Dico differentiam inter $\Lambda\Gamma$ & Axem alterum sectionis majorem esse differentia inter $\kappa\beta$ & $z\eta$; & differentiam inter $\kappa\beta$, $z\eta$ majorem esse differentia inter $\xi\tau$ & $\iota\omicron$.

Quoniam enim differentia inter quadratum ex $\Lambda\Gamma$ & quadratum alterius Axis sectionis (per 13^{am} hujus) æqualis est differentia inter quadrata ex $\kappa\beta$ & $z\eta$, ac diameter $\kappa\beta$ major est Axe: erit differentia inter $\Lambda\Gamma$ & Axem cum eodem conjugatam major differentia inter $\kappa\beta$ & $z\eta$. Eodemque modo probabitur differentiam inter $\kappa\beta$ & $z\eta$ majorem esse differentia inter $\xi\tau$ & $\iota\omicron$. Q. E. D.




PROPOSITIO XXVIII.

I*N omni Hyperbola vel Ellipsi, rectangulum sub Axibus contentum minus erit contento sub quibuscumque aliis diametris conjugatis: contentaque sub diametris conjugatis, quæ propiores sunt sectionis Axibus, minora erunt contentis sub conjugatis remotioribus ab iisdem.*

Hoc autem in Hyperbola ex præcedentibus manifestum est; nam Axis uterque minor est qualibet aliâ diametro eidem adjacente: In Ellipsi vero hunc in modum demonstrabitur. Sit $\Lambda\beta$ Axis major & $\Gamma\Delta$ Axis minor sectionis; sintque diametri ejus conjugatæ ez , $\kappa\eta$; nz , $o\pi$; conjugate vero æquales $x\tau$, $t\xi$. Dico rectangulum sub $\Lambda\beta$, $\Gamma\Delta$ minus esse rectangulo sub ez , $\kappa\eta$; & rectangulum sub ez , $\kappa\eta$ minus esse rectangulo contento sub $x\tau$, $t\xi$.

Quoniam enim Axes $\Lambda\beta$, $\Gamma\Delta$ simul sumpti (per 26^{am} hujus) minores sunt diametris conjugatis ez , $\kappa\eta$ simul; quadratum etiam summae ipsarum $\Lambda\beta$, $\Gamma\Delta$ minus erit quadrato ex ez , $\kappa\eta$ simul sumptis. Quadrata autem ex $\Lambda\beta$ & $\Gamma\Delta$ simul (per 12^{am} hujus) æqualia sunt summae quadratorum ex ez , $\kappa\eta$: quibus utrinque sublatis, duplum rectangulum sub $\Lambda\beta$, $\Gamma\Delta$ minus erit duplo rectangulo sub ez , $\kappa\eta$; adeoque rectangulum sub $\Lambda\beta$, $\Gamma\Delta$ minus est rectangulo sub ez , $\kappa\eta$. Pari argumento constabit rectangulum sub ez , $\kappa\eta$ minus esse contento sub nz , $o\pi$, ac rectangulum sub nz , $o\pi$ minus esse rectangulo sub æqualibus conjugatis $x\tau$, $t\xi$ contento; quod proinde rectangulum maximum est. Q. E. D.



PROPOSITIO XXIX.

I*N Hyperbola, differentia inter figuram sectionis super diametrum quamlibet factam & ejusdem diametri quadratum ubique æqualis est. Vide figuram Prop. XXVII.*

Sit Hyperbolæ Axis $\Lambda\Gamma$ & centrum θ ; sint autem in ea diametri conjugatæ $\beta\kappa$, $z\eta$; $\xi\tau$, $\omicron\iota$. Dico differentiam inter figuram sectionis super $\Lambda\Gamma$ factam & quadratum ex $\Lambda\Gamma$ æqualem esse differentia inter figuram sectionis super $\beta\kappa$ factam &

&

& quadratum ex BK; ut & differentia inter quadratum ex ξT & figuram super ξT factam.


Quoniam enim differentia inter quadratum ex AT & quadratum alterius Axis sectionis æqualis est differentia inter quadrata ex KB & ZH ; atque etiam (per 13^{am} hujus) differentia inter quadrata ex ξT & OI ; ac figura sectionis super AT facta æqualis est quadrato alterius Axis (per 16^{am} primi) sicut figura sectionis super KB facta æqualis est quadrato ex ZH ; & figura sectionis super ξT æqualis est quadrato ex OI ; differentia igitur inter figuram sectionis super AT factam & quadratum ejusdem AT æqualis est differentia inter figuram sectionis super BK factam & quadratum ex BK ; eademque æqualis est differentia inter figuram super ξT factam & quadratum ipsius ξT . Q. E. D.

PROPOSITIO XXX.

IN Ellipsi vero, si adjiciatur figuræ super quamvis diametrum factæ quadratum ejusdem diametri, fiet summa semper æqualis.

Sit centrum Ellipseos Θ , & diametri ejus conjugatæ BK , ZH ; ξT , OI . Dico figuram sectionis super BK factam una cum quadrato ex BK æqualem esse figuræ sectionis super ξT factæ una cum quadrato ex ξT .



Quoniam enim quadratum ex BK una cum quadrato ex ZH (per 12^{am} hujus) æquale est quadrato ex ξT una cum quadrato ex OI ; ac figura sectionis super BK facta æqualis est quadrato ex ZH , uti & quadratum ex OI (per 15^{am} primi) æqualis est figuræ sectionis super ξT factæ: figura igitur super BK facta una cum quadrato ex BK æqualis est figuræ super ξT factæ una cum quadrato ex ξT . Q. E. D.



PROPOSITIO XXXI.

SI ducantur diametri quævis conjugatæ in Ellipsi, vel inter sectiones oppositas conjugatas; erit parallelogrammum contentum sub his diametris æquale rectangulo sub ipsis Axibus facto: modo anguli ejus æquales sint angulis ad centrum sectionis à diametris conjugatis comprehensis.


Sit Ellipseos vel Sectionum oppositarum conjugatarum centrum Θ , Axes autem sint AB , $\Gamma\Delta$, ac diametri quævis conjugatæ ZA , ΞN . Per puncta Z , A ; Ξ , N ducantur tangentes HX , KM ; HK , XM ; erunt igitur HX , KM diametro ΞN parallelæ, ut rectæ HK , XM (per 6^{am} & 20^{am} secundi) diametro ZA parallelæ sunt.: erit quoque HM parallelogrammum, cujus anguli æquales sunt angulis à diametris conjugatis ZA , ΞN ad centrum Θ contentis. Dico ideo parallelogrammum HM æquale esse rectangulo sub Axibus AB , $\Gamma\Delta$ contento.



Occurrant Axi transverso AB parallelæ HX , HK in punctis E & ξ ; & de puncto Z demittatur ad Axem $A\Theta B$ normalis $Z\Pi$; ac fiat ΠO media proportionalis inter ipsas

Ff 2

ipsas $\epsilon\pi$, $\pi\theta$: & erit (per 37^m primi) quadratum ex $\Lambda\theta$ ad quadratum ex $\theta\Gamma$ sicut rectangulum $\theta\pi\epsilon$ ad quadratum ex $z\pi$. Rectangulum autem $\theta\pi\epsilon$ æquale est quadrato ex $\theta\pi$; quare quadratum ex $\Lambda\theta$ est ad quadratum ex $\theta\Gamma$ ut quadratum ex $\pi\theta$ ad quadratum ex $z\pi$: unde etiam $\Lambda\theta$ est ad $\theta\Gamma$ sicut $\pi\theta$ ad $z\pi$. Sed $\Lambda\theta$ est ad $\theta\Gamma$ ut quadratum ex $\Lambda\theta$ ad rectangulum $\Lambda\theta\Gamma$; ac $\theta\pi$ est ad πz sicut rectangulum sub $\theta\pi$, $\theta\epsilon$ ad rectangulum sub πz , $\theta\epsilon$: quadratum igitur ex $\Lambda\theta$ est ad rectangulum $\Lambda\theta\Gamma$ ut rectangulum sub $\theta\pi$, $\theta\epsilon$ ad rectangulum sub πz , $\theta\epsilon$; ac permutando erit quadratum ex $\Lambda\theta$ ad rectangulum sub $\theta\pi$, $\theta\epsilon$ sicut rectangulum $\Lambda\theta\Gamma$ ad rectangulum sub $z\pi$, $\theta\epsilon$. Quadratum autem ex $\Lambda\theta$ (per trigessimam septimam primi) æquale est rectangulo $\epsilon\theta\pi$; quare rectangulum $\epsilon\theta\pi$ est ad rectangulum sub $\theta\pi$, $\theta\epsilon$ ut rectangulum $\Lambda\theta\Gamma$ ad rectangulum sub $z\pi$, $\theta\epsilon$. Verum recta θz parallela est ipsi $z\epsilon$, adeoque (per quartam hujus) quadratum ex $z\epsilon$ est ad quadratum ex θz sicut $\epsilon\pi$ ad $\pi\theta$: atque triangulum $\theta z\epsilon$ est ad triangulum $\theta z\zeta$ ut quadratum ex $z\epsilon$ ad quadratum ex θz , ob similia triangu-
la; adeoque triangulum $\theta z\epsilon$ est ad triangulum $\theta z\zeta$, atque eorundem dupla, in ratione $\epsilon\pi$ ad $\pi\theta$. Parallelogrammum autem $z\theta z\eta$ medium proportionale est inter duplum trianguli $\theta z\epsilon$ & duplum trianguli $z\theta\zeta$: [duplum enim trianguli $\theta z\epsilon$ ad planum $\theta\eta$ est ut ϵz ad $z\eta$, five ut $\epsilon\theta$ ad $\theta\zeta$; ac



planum $\theta\eta$ est ad duplum trianguli $z\theta\zeta$ sicut ηz ad $z\zeta$, five ut $\theta\epsilon$ ad $\theta\zeta$.] Porro cum $\theta\pi$ media proportionalis sit inter $\epsilon\pi$ & $\pi\theta$; erit duplum trianguli $\theta z\epsilon$ ad parallelogrammum $\theta\eta$ ut $\theta\pi$ ad $\pi\theta$. Verum $\theta\pi$ est ad $\pi\theta$ ut rectangulum sub $\theta\pi$, $\theta\epsilon$ ad rectangulum $\pi\theta\epsilon$: ac jam demonstravimus rectangulum sub $\theta\pi$, $\theta\epsilon$ esse ad rectangulum $\pi\theta\epsilon$ sicut rectangulum sub πz , $\theta\epsilon$ ad rectangulum $\Lambda\theta\Gamma$: duplum igitur trianguli $\theta z\epsilon$ est ad parallelogrammum $\theta\eta$ sicut rectangulum sub $z\pi$, $\theta\epsilon$ ad rectangulum $\Lambda\theta\Gamma$. Sed duplum trianguli $\theta z\epsilon$ æquale est rectangulo sub $z\pi$, $\theta\epsilon$: quapropter parallelogrammum $\theta\eta$ æquale est rectangulo $\Lambda\theta\Gamma$; ac quadruplum plani $\theta\eta$, nempe parallelogrammum $\eta\mu$, æquale est quadruplo rectanguli $\Lambda\theta\Gamma$, hoc est rectangulo contento sub Axibus $\Lambda\alpha$, $\Gamma\Delta$. Q. E. D.

Demonstravimus itaque, in præcedentibus Propositionibus, quod in omni Hyperbola quadrata Axium simul sumpta minora sunt quadratis ex quibusvis aliis diametris conjugatis sectionis: quodque quadrata diametrorum conjugatarum Axibus propiorum minora sunt quadratis diametrorum conjugatarum ab Axibus remotiorum: quodque in omni Ellipfi differentia inter quadrata Axium major est differentia quadratorum quarumvis diametrorum conjugatarum: quodque differentia inter quadrata diametrorum conjugatarum Axibus propiorum major est differentia quadratorum ex diametris conjugatis ab iisdem remotioribus: quodque in Hyperbola, si Axis, five latus transversum figuræ sectionis super Axem factæ, major fuerit latere ejus recto, latus transversum figuræ super diametrum quamvis aliam factæ majus erit latere recto ejusdem: quodque ratio Axis transversi ad ejusdem latus rectum major erit ratione cujusvis alterius diametri transversæ ad latus rectum ejusdem: quodque ratio hæc, in figuris super diametros Axi propiores factis, major est ratione eâ in figuris super remotiores ab Axe factis. Si vero Axis, five latus transversum figuræ sectionis, minor fuerit latere ejus recto; cæteræ diametri transversæ minores erunt earundem lateribus rectis; ac ratio Axis transversi

versum ad latus ejus rectum minor erit ratione cujusvis alterius diametri transversæ ad latus rectum figuræ super eandem diametrum factæ: atque hæc ratio, in figuris super diametros transversas Axi propiores factis, *minor* erit eâ quam habet latus transversum ad latus rectum in figuris super diametros ab Axe remotiores factis. Quod si figura sectionis super Axem facta æquilatera fuerit, figuræ cæteræ super reliquas diametros factæ erunt quoque æquilateræ.


Demonstratum etiam est, quod in omni Ellipsi, latus transversum figuræ sectionis, super diametrum quamlibet inter Axem majorem & diametros conjugatas æquales intermediam factæ, majus est latere recto ejusdem diametri: ac ratio quam habet diameter ad latus ejus rectum major est in iis quæ Axi majori propius adjacent, quam in iis quæ ab eodem longius absunt. E contrario vero latus transversum figuræ sectionis factæ super diametrum quamlibet, inter Axem minorem & diametros conjugatas æquales jacentem, minus est latere ejus recto: ac diametri quæ propiores sunt Axi minori, minores habent rationes ad latera sua recta, quam quæ remotiores sunt ab eodem. Hæc autem Corollaria sunt ad ea quæ demonstravimus in Propositionibus de diametris & figuris Sectionum.

PROPOSITIO XXXII.

IN omni Parabola latus rectum, sive ea juxta quam possunt ordinatim ad Axem applicatæ, minus est latere recto cujusvis alterius diametri; ac diametri sectionis quæ Axi propiores sunt minora habent latera recta quam quæ longius distant ab eodem.

Sit AB Parabola, cujus Axis AZ, diametri autem aliæ sint BΘ, ΓH; latera vero recta, sive juxta quas possunt ordinatim ad eas applicatæ, sint AK, ΓΛ, BM. Dico AK minorem esse quam ΓΛ, ac ΓΛ minorem quam BM.

De punctis B, Γ demittantur ad Axem normales BΔ, ΓE; & recta ΓΛ (per quintam hujus) æqualis erit ipsi AK una cum quadruplo ipsius AΔ. Pariter BM æqualis erit ipsi AK cum quadruplo ipsius AΔ. Quare AK minor est quam ΓΛ, ac ΓΛ quam BM. Q. E. D.



PROPOSITIO XXXIII.


IN Hyperbola, si latus transversum figuræ sectionis super Axem factæ non sit minus latere ejus recto; erit latus illud rectum figuræ super Axem minus latere recto cujusvis alterius figuræ super aliam quamvis diametrum sectionis factæ: & latus rectum figuræ super diametrum Axi propiorem factæ minus erit latere recto figuræ super remotiorem ab Axe factæ.

Sit Hyperbolæ Axis AΓ & centrum Θ; diametri autem aliæ sint KB, TΞ. Dico latus rectum figuræ sectionis super AΓ factæ minus esse latere recto figuræ super BK factæ; & latus rectum super BK factæ minus esse latere recto figuræ sectionis super TΞ factæ.

Ponatur imprimis Axis AΓ æqualis lateri recto figuræ sectionis super AΓ factæ; & erit BK æqualis lateri recto figuræ super illam factæ, per 23^{am} hujus & 16^{am} primi. Sed AΓ minor est quam BK: latus igitur rectum Axis AΓ minus est latere recto diametri BK. Quoniam etiam diameter TΞ æqualis est lateri recto figuræ super eam factæ; ac diameter KB minor est diametro TΞ: latus rectum diametri KB minus erit latere recto ad diametrum TΞ.

G g

Si




minor est ratione quadrati ex EN ad quadratum ex MN . Permutando autem ratio rectanguli sub FN, EE ad quadratum ex EN minor est ratione rectanguli sub FN, EM ad quadratum ex MN . Verum rectangulum sub FN, EE (per 15^m hujus) eandem habet rationem ad quadratum ex EN quam habet quadratum ex AX ad quadratum lateris recti diametri ET ; ac, per eandem, rectangulum sub FN, ME est ad quadratum ex MN ut idem quadratum ex AX ad quadratum lateris recti diametri ET . Ratio igitur quadrati ex AX ad quadratum lateris recti diametri ET minor est ratione ejusdem ad quadratum lateris recti diametri ET : proinde latus rectum diametri ET minus est latere recto diametri ET , uti latus rectum Axis AX minus est latere recto diametri ET . Q. E. D.

PROPOSITIO XXXV.


SI vero Axis Hyperbolæ minor fuerit dimidio lateris recti figuræ super Axem factæ. Dico ab utraque Axis parte reperiri diametrum, cujus latus rectum diametri duplum est; atque hoc latus rectum minus esse quovis alio latere recto cujuscunque diametri ad idem sectionis latus ductæ; latera etiam recta diametrorum reliquarum his duabus utrinque propiorum minora esse lateribus rectis remotiorum ab iisdem.

Dividatur recta AX in punctis E, N , ita ut AE sit ad EN sicut Axis AX ad latus ejus rectum; ac sit FN ad NA in eadem ratione. Cum autem Axis AX minor est dimidio lateris ejus recti, erit AN major duplo ipsius AE ; unde & NE major erit quam EA . Fiat EM ipsi EN æqualis, & sit AM normalis super Axem, occurrens sectioni in puncto A ; & jungatur FA , ipsique FA parallela ducatur diameter KB : erit igitur EM ad MN (per sextam hujus) sicut KB ad latus rectum figuræ super eam factæ. Inter puncta A, B ducantur diametri $AE, T\xi$; & per punctum F diametro AE parallela agatur recta FX ; diametroque $T\xi$ parallela sit FO ; & de punctis X & O demittantur ad Axem normales XO, OP .



Quoniam vero ME æqualis est ipsi EN , erit rectangulum ME minor quadrato ex EN ; ac adjecto utrinque communi rectangulo sub NE, EN simul sumptis & OE , erit rectangulum sub ME, NE simul & OE minus quadrato ex NE , per 6. II. Elem. Est igitur ratio rectanguli sub ME, NE simul & OE ad rectangulum sub ME, NE simul & OE major ratione rectanguli sub ME, NE simul & OE ad quadratum ex NE . Sed rectangulum sub ME, NE simul & OE est ad rectangulum sub ME, NE simul & OE sicut

sicut $M\theta$ ad $\varepsilon\theta$; quare ratio $M\theta$ ad $\varepsilon\theta$ major est ratione rectanguli sub MN , $N\theta$ simul & $M\theta$ ad quadratum ex $N\theta$; ac componendo ratio $M\varepsilon$ ad $\varepsilon\theta$ major erit ratione rectanguli sub MN , $N\theta$ simul & $M\theta$ una cum quadrato ex $N\theta$ ad quadratum ex $N\theta$. Verum (per 6. II.) rectangulum sub MN , $N\theta$ simul & $M\theta$ una cum quadrato ex $N\theta$ æquale est quadrato ex MN ; quare $M\varepsilon$ est ad $\varepsilon\theta$ in majori ratione quam quadratum ex MN ad quadratum ex $N\theta$. Est autem $M\varepsilon$ ad $\varepsilon\theta$ sicut rectangulum sub ΓN , $M\varepsilon$ ad rectangulum sub ΓN , $\varepsilon\theta$; adeoque ratio rectanguli sub ΓN , $M\varepsilon$ ad rectangulum ΓN , $\varepsilon\theta$ major erit ratione quadrati ex MN ad quadratum ex $N\theta$: permutando autem ratio rectanguli sub ΓN , $M\varepsilon$ ad quadratum ex MN major erit ratione rectanguli sub ΓN , $\varepsilon\theta$ ad quadratum ex $N\theta$. Sed rectangulum sub ΓN , $M\varepsilon$ est ad quadratum ex MN (per 15^m hujus) sicut quadratum ex $\Lambda\Gamma$ ad quadratum lateris recti figuræ super κB factæ: ac, per eandem, rectangulum sub ΓN , $\varepsilon\theta$ est ad quadratum ex $N\theta$ ut quadratum ex $\Lambda\Gamma$ ad quadratum lateris recti figuræ super ΔE factæ: ratio igitur quadrati ex $\Lambda\Gamma$ ad quadratum lateris recti diametri κB major est ratione ejusdem ad quadratum lateris recti diametri ΔE ;



adeoque latus rectum diametri κB minus est latere recto diametri ΔE . Pari modo probabitur latus rectum diametri ΔE minus esse latere recto diametri ξT ; cum scilicet rectangulum $\theta\varepsilon\pi$ minus sit quadrato ex εN : ac, ob rectangulum $\pi\varepsilon A$ minus quadrato ex εN , eodem argumento constabit latus rectum diametri ξT minus esse latere recto Axis $\Lambda\Gamma$.

Porro si ducantur diametri ZH , $\tau\gamma$ remotiores ab Axe quam κB . Dico latus rectum diametri κB minus esse latere recto diametri ZH ; ac latus rectum diametri ZH minus esse latere recto diametri $\tau\gamma$. Per punctum Γ ducantur ipsis ZH , $\tau\gamma$ parallelæ, ut $\Gamma\Sigma$, $\Gamma\delta$; & de punctis Σ , δ demittantur normales ad Axem ΣP , $\delta\sigma$: erit igitur rectangulum $P\varepsilon M$ majus quadrato ex $N\varepsilon$; ac, procedendo juxta modum nuper traditum, demonstrabitur rationem rectanguli sub ΓN , εP ad quadratum ex $N P$ minorem esse ratione rectanguli sub ΓN , εM ad quadratum ex $N M$; unde manifestum est latus rectum diametri ZH majus esse latere recto diametri κB . Cumque rectangulum $\sigma\varepsilon P$ majus est quadrato ex εN , erit latus rectum diametri $\tau\gamma$ majus latere recto diametri ZH . Q. E. D.


PROPOSITIO XXXVI.

Si in Hyperbola latera figuræ sectionis super Axem factæ fuerint inæqualia; differentia laterum figuræ Axis major erit differentiâ laterum figuræ super quamvis aliam diametrum factæ: ac differentia hæc laterum figuræ major est in diametris Axi propioribus quam in remotioribus.

Sit

Sit Hyperbolæ Axis AF , ac centrum Θ ; ac sint aliæ quælibet diametri ΔE , BK . Dico differentiam inter latera figuræ Axis AF majorem esse differentiâ inter latera figuræ diametri ΔE ; ac differentiam laterum figuræ diametri ΔE majorem esse differentiâ inter latera figuræ diametri BK .

Ducantur ΓZ , ΓA ipsis ΔE , BK parallelæ; & de punctis Z , A cadant normales $Z\Pi$, $A\Lambda$ ad Axem: ac fiant ΓN ad NA ; $A\varepsilon$ ad $\varepsilon\Gamma$ in ratione Axis AF ad latus rectum figuræ ejus. Hinc quadratum ex AF erit ad quadratum differentiæ inter AF & latus ejus rectum ut rectangulum sub ΓN , $A\varepsilon$ ad quadratum ex εN . Recta vero ΓZ parallela est diametro ΔE , ac $Z\Pi$ normalis est super Axem; erit igitur rectangulum sub ΓN , $\varepsilon\Pi$ ad quadratum differentiæ inter $\varepsilon\Pi$ & ΠN (per 16^m hujus) ut quadratum ex AF ad quadratum differentiæ inter ΔE & latus rectum figuræ super ΔE factæ. Differentia autem inter $\varepsilon\Pi$, ΠN est recta εN ; quare quadratum



ex AF est ad quadratum differentiæ inter diametrum ΔE & latus rectum ejus, ut rectangulum sub ΓN , $\varepsilon\Pi$ ad quadratum ex εN . Ratio autem rectanguli sub ΓN , $\varepsilon\Pi$ ad quadratum ex εN major est ratione rectanguli sub ΓN , $A\varepsilon$ ad quadratum ex εN ; quare ratio quadrati Axis AF ad quadratum differentiæ inter ΔE & latus ejus rectum major est ratione ejusdem quadrati ex AF ad quadratum differentiæ inter AF & latus ejus rectum: ac proinde differentia inter ΔE & latus ejus rectum minor est differentiâ inter AF & latus rectum figuræ ejus.

Pari modo cum ΓA parallela sit diametro BK , ac $A\Lambda$ normalis sit super Axem, rectangulum sub ΓN , εM erit ad quadratum differentiæ inter $M\varepsilon$, MN (sive ad quadratum ex εN) sicut quadratum ex AF ad quadratum differentiæ inter BK & latus rectum ejus, per 16^m hujus. Sed ratio rectanguli sub ΓN , $M\varepsilon$ ad quadratum ex εN major est ratione rectanguli sub ΓN , $\varepsilon\Pi$ ad idem quadratum ex εN ; quare ratio quadrati ex AF ad quadratum differentiæ inter BK & ejus latus rectum major est ratione quadrati ex AF ad quadratum differentiæ inter ΔE & latus ejus rectum. Quapropter differentia inter BK & latus ejus rectum minor est differentiâ inter ΔE & latus ejus rectum; & differentia inter ΔE & latus ejus rectum minor est differentia inter AF & latus ejus rectum. Q. E. D.

PROPOSITIO XXXVII.

IN omni Ellipsi, si figuræ sectionis fiant super diametros lateribus suis rectis majores: erit differentia laterum figuræ super Axem majorem factæ major differentiâ laterum figuræ super quamvis aliam ex diametris illis factæ; ac differentia hæc in diametris Axi propioribus major erit quam in remotioribus: differentia autem laterum figuræ, in diametris lateribus suis rectis minoribus, maxima fit inter Axem minorem & latus ejus rectum: quæque Axi minori propiores sunt diametri majorem habent hanc differentiam quam ab eodem remotiores: differentia etiam inter latera figuræ Axis minoris major est quam inter latera figuræ Axis majoris.

Sit Ellipseos Axis major AF , minor vero ΔE ; ac sint diametri aliæ BK , ZH , quarum utraque major sit latere suo recto. Dico differentiam inter AF & latus ejus rectum majorem esse differentia inter BK & latus ejus rectum; differentiam

Hh

vero


vero inter BK & latus ejus rectum majorem esse differentia inter ZH & latus ejus rectum.

Quoniam enim AG major est latere ejus recto, & KB major latere ejus recto; ac latus rectum diametri KB (per 24^m hujus) majus est latere recto figuræ Axis AG ; erit differentia inter AG & latus ejus rectum major differentiâ inter BK & latus ejus rectum. Eodem modo probabitur differentiam inter BK & latus ejus rectum majorem esse differentiâ inter ZH & latus rectum ejus.

Similiter si utraq; BK, ZH minores fuerint quam latera sua recta. Dico differentiam inter AE & latus ejus rectum majorem esse differentiâ inter ZH & latus rectum ejus: ac differentiam inter ZH & latus ejus rectum majorem esse differentia inter BK & latus ejus rectum.

Quia Axis AE minor est quam ZH , ac latus ejus rectum majus est latere recto diametri ZH , per 24^m hujus; erit differentia inter AE & latus ejus rectum major differentia inter ZH & latus ejus rectum: ac pari argumento differentia inter ZH & latus ejus rectum major erit differentia inter KB & latus ejus rectum.

Porro cum latus rectum figuræ Axis minoris AE (per 15^m primi) sit ad AE sicut AG ad latus rectum figuræ Axis AG ; ac, per eandem, latus rectum figuræ Axis AE majus sit quam AG ; erit differentia inter AE & latus ejus rectum major differentia inter AG & latus ejus rectum. [Per conversionem enim rationis latus rectum Axis AE est ad differentiam inter AE & latus ejus rectum sicut AG ad differentiam inter latera figuræ Axis AG , ac permutando.] Q. E. D.




PROPOSITIO XXXVIII.

SI in Hyperbolâ latus transversum figuræ Axis non minus fuerit tertiâ parte lateris ejus recti: summa utriusque lateris figuræ sectionis, super quamlibet diametrum præter Axem factæ, major erit summâ laterum figuræ Axis simul sumptorum; ac summa laterum figuræ super diametrum Axi propiorem factæ minor erit quam latera figuræ diametri remotioris simul sumpta.

Sit AG Hyperbolæ Axis, qui non sit minor tertiâ parte lateris ejus recti; ac sint $KB, \xi T$ diametri duæ quævis aliæ. Dico quod latera duo figuræ Axis AG simul sumpta minora sunt lateribus figuræ diametri KB simul sumptis, quodque latera figuræ ipsius KB minora sunt lateribus figuræ diametri ξT .

Primum sit AG non minor latere ejus recto: & diameter KB major erit Axe AG , & diameter ξT major diametro KB ; latus etiam rectum diametri ξT (per 33^m hujus) majus erit latere recto diametri KB ; & latus rectum diametri KB majus erit latere recto Axis AG : diameter igitur ξT una cum latere ejus recto major erit diametro KB unâ cum latere ejus recto: ac diameter KB unâ cum latere ejus recto major erit Axe AG unâ cum latere ejus recto. Latera igitur, figuram super diametrum ξT factam continentia, simul sumpta majora sunt lateribus figuræ diametri KB : atque hæc latera majora sunt utroque latere figuræ super AG factæ simul sumpto. Q. E. D.




PROPO-

sumpta minorem efficiunt summam quam latera figuræ cujuscvis alterius diametri ad eandem Axem partem ductæ; latera quoque figuræ, super diametrum huic utrinque propiorem factæ, simul sumpta minora sunt lateribus figuræ super remotiorem ab eâdem factæ.

Repetatur figura in Propositione 35^a adhibita, ac sit AZ jam minor tertiâ parte ipsius AN , unde & minor erit dimidio ipsius EN . Fiat MZ æqualis dimidio ipsius EN ; & erectâ MA normali super Axem jungatur $ΓA$, ipsique $ΓA$ parallela ducatur sectionis diameter KB . Est autem (per 6^{am} hujus) MZ ad MN sicut KB ad latus rectum figuræ ejus, ac MZ est pars tertia ipsius MN ; quare & KB tertia pars est lateris ejus recti. Ducantur inter A & B diametri quælibet ut $ΔE$, $ΞT$, iidemque parallelæ $ΓX$, $ΓO$; ac demittantur normales ad Axem $κo$, $οπ$.


Jam MZ quarta pars est ipsarum MN , MZ simul; quadratum vero ex MN , MZ simul majus erit rectangulo sub MN , $εo$ simul & quater MZ ; ac utrinque sublato communi rectangulo sub MN , $εo$ simul & quater MZ , remanebit quadratum ex NZ , $οε$ simul majus rectangulo sub NM , $εo$ simul & quater $εo$: ratio igitur rectanguli sub MN , $εo$ simul & quater MZ ad rectangulum sub NM , $εo$ simul & quater $εo$ major est ratione ejusdem ad quadratum ex NZ , $οε$ simul. Sed rectangulum sub NM , $εo$ simul & quater MZ est ad rectangulum sub NM , $εo$ simul &



quater $εo$ sicut MZ ad $οε$: quare ratio MZ ad $οε$ major est ratione rectanguli sub NM , $εo$ & quater MZ ad quadratum ex NZ , $οε$ simul: igitur componendo erit ratio MZ ad $εo$ major ratione rectanguli sub MN , $εo$ simul & quater MZ , unâ cum quadrato ex NZ , $οε$ simul, ad quadratum ejusdem NZ , $οε$. Rectangulum autem sub MN ,

$εo$ simul & quater MZ una cum quadrato ex NZ , $οε$ simul (per Lemma 1. *Abdol.*) æquale est quadrato ex NM , MZ simul; quare ratio MZ ad $εo$ major est ratione quadrati ex NM , MZ simul ad quadratum ex NZ , $οε$ simul. Verum MZ est ad $εo$ sicut rectangulum sub $ΓN$, MZ ad rectangulum sub $ΓN$, $εo$; quare ratio rectanguli sub $ΓN$, MZ ad rectangulum sub $ΓN$, $εo$ major est ratione quadrati ex MN , MZ simul ad quadratum ex NZ , $οε$: ac permutando ratio rectanguli sub $ΓN$, MZ ad quadratum ex MN , MZ simul major est ratione rectanguli sub $ΓN$, $εo$ ad quadratum ex NZ , $οε$ simul. Est autem rectangulum sub $ΓN$, MZ ad quadratum ex MN , MZ simul (per 17^{am} hujus) sicut quadratum ex $ΑΓ$ ad quadratum summæ laterum figuræ diametri KB : ac (per eandem 17^{am}) rectangulum sub $ΓN$, $εo$ est ad quadratum ex NZ , $οε$ simul sicut quadratum ex $ΑΓ$ ad quadratum summæ laterum figuræ diametri sectionis $ΔE$. Ratio igitur quadrati ex $ΑΓ$ ad quadratum summæ
diametri

ad quadratum ex NZ ut quadratum ex AG ad quadratum diametri KB una cum latere ejus recto; ac rectangulum NG , ZO est ad quadratum ex NZ (per eandem 17^m) sicut quadratum ex AG ad quadratum diametri ZH una cum latere ejus recto simul: erit igitur ratio AG ad KB una cum latere ejus recto major ratione ejusdem ad ZH una cum latere ejus recto: proinde latera figuræ diametri KB simul minora sunt lateribus figuræ diametri ZH . Quoniam vero rectangulum sub GN , ZO est ad quadratum ex NZ ut quadratum ex AG ad quadratum diametri ZH una cum latere ejus recto; ac, per nuper demonstrata, rectangulum sub NG , IZ est ad quadratum ex NZ ut quadratum ex AG ad quadratum Axis minoris AE una cum latere ejus recto simul; erit ratio AG ad ZH & latus ejus rectum simul major ratione ejusdem ad AE una cum latere ejus recto. Unde latera figuræ diametri ZH simul minora sunt lateribus figuræ Axis AE simul sumptis. Q. E. D.




PROPOSITIO XLII.

Figura Axis, in sectione Hyperbolica, minor est figura cujusvis alterius diametri; ac diametri Axi propiores minores habent figuras quam quæ ab eodem remotiores sunt.

Sit Hyperbolæ Axis AG , diametri autem quævis aliæ KB , ET . Dico figuram super AG factam minorem esse factâ super quamlibet aliam diametrum præter Axem: ac figuram diametri KB minorem esse figura diametri ET .

Ducantur rectæ GA , GA diametris KB , ET parallelæ; ac demittantur normales ad Axem AM , AE ; ac fiat GN ad NA sicut AG ad latus rectum figuræ super AG factæ: erit igitur GN ad NA ut quadratum ex AG ad figuram sectionis super Axem factam; ac GN est ad NM (per 18^m hujus) sicut quadratum ex AG ad figuram diametri KB . Ratio autem GN ad NA major est ratione ejusdem ad NM ; quare ratio quadrati ex AG ad figuram super AG factam major est ratione ejusdem ad figuram super KB factam: adeoque figura Axis AG minor est figura diametri KB . Porro (per 18^m hujus) GN est ad NE sicut quadratum ex AG ad figuram super ET factam, ac GN est ad NM sicut quadratum ex AG ad figuram diametri KB ; ratio autem GN ad NM major est ratione ejusdem ad NE : erit igitur ratio quadrati ex AG ad figuram diametri KB major ratione ejusdem ad figuram diametri ET ; ac proinde figura super KB facta major est factâ super ET . Q. E. D.



PROPOSITIO XLIII.

Figura Axis majoris in Ellipsi minor est figurâ cujuslibet alterius diametri; maxîma autem figura ea est quæ fit super Axem minorem: figura quoque diametri Axi majori propioris minor est factâ super remotiorem ab eodem. Vide figuram Prop. XLI.

Sit Ellipseos Axis major AT , minor AE , ac aliæ quævis diametri KB , ZH . Dico figuram Axis AG minorem esse figurâ diametri KB ; ac figuram ipsius KB minorem esse factâ super diametrum ZH : denique figuram ipsius ZH minorem esse figurâ super Axem minorem AE factâ.

*

Ducantur


Ducantur ΓA , ΓI ipsi $K B$, $Z H$ parallelæ, ac demittantur ad Axem normales ΔM , IO ; fiat etiam ΓN ad NA sicut $A\Gamma$ ad latus ejus rectum: unde quadratum ex Axe $A\Gamma$ erit ad figuram super Axe factam sicut ΓN ad NA . Sed quadratum ex $A\Gamma$ (per 15^m primi) æquale est figuræ Axis minoris ΔE ; quare figura Axis $A\Gamma$ minor est facta super Axe minore ΔE . Quoniam vero ΓN est ad NM (per 18^m hujus) sicut quadratum ex $A\Gamma$ ad figuram diametri $K B$; pariterque ΓN est ad NO ut quadratum ex $A\Gamma$ ad figuram diametri $Z H$; ut est ΓN ad $N\Gamma$ sicut quadratum ex $A\Gamma$ ad figuram Axis ΔE : AN autem minor est quam NM , ac NM quam NO , ac NO quam $N\Gamma$: erit igitur figura Axis $A\Gamma$ minor figura diametri $K B$; & figura super $K B$ facta minor erit figura diametri $Z H$; ac figura diametri $Z H$ minor erit figura Axis ΔE . Q. E. D.

PROPOSITIO XLIV.

IN Hyperbola, si vel latus transversum figuræ Axis non minus fuerit latere ejus recto; vel si minus fuerit eo, quadratum vero ejus non minus fuerit dimidio quadrati differentiæ inter latera figuræ: erunt quadrata à lateribus figuræ Axis simul sumpta minora quadratis laterum figuræ, super quamlibet aliam sectionis diametrum factæ, simul sumptis.

Sit Hyperbolæ Axis $A\Gamma$, ac quælibet aliæ diametri $K B$, ξT ; ac siue $A\Gamma$ non minor fuerit latere ejus recto, vel si minor fuerit eo, modo quadratum ex $A\Gamma$ non minus fuerit dimidio quadrati differentiæ inter Axem & latus ejus rectum. Dico summam quadratorum laterum figuræ Axis minorem esse quadratis laterum figuræ diametri $K B$ simul sumptis; quadrata vero laterum figuræ super $K B$ factæ simul minora esse quadratis laterum figuræ diametri ξT .

Imprimis autem sit $A\Gamma$ non minor latere ejus recto; ac (per 33^m hujus) erit latus rectum diametri $K B$ majus latere recto Axis $A\Gamma$; & (per eandem) latus rectum diametri ξT majus erit latere recto diametri $K B$; $A\Gamma$ autem minor est quam $K B$, ac $K B$ quam ξT : proinde quadrata laterum figuræ Axis $A\Gamma$ minora sunt quadratis laterum figuræ diametri $K B$; ac quadrata laterum figuræ diametri $K B$ minora sunt quadratis laterum figuræ ξT simul sumptis. Q. E. D.




PROPOSITIO XLV.

SI vero Axis minor fuerit quam latus ejus rectum, quadratum autem ejus non minus dimidio quadrati differentiæ inter Axem & latus ejus rectum. Dico eadem etiam consequi quæ in proximâ Propositione demonstravimus.

Maneat figura Propositionis XLII. præcedentis; ac fiat ΓN ad NA ut & $A\Xi$ ad $\Xi\Gamma$ in ratione ipsius $A\Gamma$ ad latus ejus rectum: duplum igitur quadrati ex $A\Xi$ non minus erit quadrato ex $N\Xi$ (quia $A\Xi$ ipsi ΓN æqualis est, ac $A\Gamma$ est ad latus ejus rectum sicut $A\Xi$ ad $\Xi\Gamma$; ac quadratum ex $A\Gamma$ non minus est dimidio quadrati differentiæ inter $A\Gamma$ & latus ejus rectum.) Ductis autem sectionis diametris $K B$, ξT , parallelæ agantur rectæ ΓA , ΓI ; & demittantur ad Axem normales ΔE , ΔM .

Quoniam vero $A\Gamma$ est ad latus ejus rectum sicut ΓN ad NA , atque etiam ut $A\Xi$ ad $\Xi\Gamma$; ac duplum quadrati ex $A\Xi$ non minus est quadrato ex $N\Xi$: duplum rectangulum sub $M\Xi$, $A\Xi$ majus erit quadrato ex $N\Xi$. Adjiciatur utrinque duplum rectangulum sub NA , $A\Xi$; & duplum rectangulum sub MN , $A\Xi$ simul & $A\Xi$ majus erit duplo rectangulo sub NA , $A\Xi$ una cum quadrato ex $N\Xi$ simul: hoc est, majus erit quadratis ex NA , $A\Xi$ simul, per 7. II. Et. Quocirca ratio dupli rectanguli sub NM , $A\Xi$

figuræ diametri KB minora esse quadratis laterum figuræ diametri ΔE . Cumque duplum rectangulum sub $\sigma \varepsilon$, $\varepsilon \pi$ minus est quadrato ex εN , facto duplo rectangulo $N \pi \varepsilon$ communi; erit *duplum* rectangulum sub σN , $\varepsilon \pi$ simul & $\varepsilon \pi$ minus quadratis ex $N \pi$, $\pi \varepsilon$ simul sumptis: unde pari argumento constabit quadrata laterum figuræ diametri ΔE minora esse quadratis laterum figuræ diametri ξT . Quinetiam quoniam duplum rectangulum sub $\pi \varepsilon$, εA minus est quadrato ex εN , simili modo probabitur quadrata laterum figuræ diametri ξT minora esse quadratis laterum figuræ Axis AT simul sumptis.



Quod si ducantur diametri aliæ remotiores ab Axe quam KB , ut diametri ZH , $\tau \gamma$; iisdem parallelæ sint $\Gamma \Sigma$, $\Gamma \delta$; ac demittantur ad Axem normales ΣP , $\delta \sigma$. Quoniam enim *duplum* rectangulum sub $P \varepsilon M$ majus est quadrato ex εN , pari processu patebit quadrata laterum figuræ diametri ZH esse majora quadratis laterum figuræ

diametri KB . Denique cum *duplum* rectangulum $\sigma \varepsilon P$ majus est quadrato ex εN , eodem modo demonstrabitur quadrata laterum figuræ diametri $\tau \gamma$ majora esse quadratis laterum figuræ diametri ZH . Q. E. D.

PROPOSITIO XLVII.

IN Ellipsi, si quadratum lateris transversi figuræ Axis majoris non majus fuerit dimidio quadrati summæ laterum figuræ ejus: erunt quadrata laterum figuræ Axis majoris simul sumpta minora quadratis laterum figuræ cujuscunque alterius diametri; ac quadrata laterum figuræ diametri Axi propioris simul sumpta minora erunt quadratis laterum figuræ diametri remotioris ab eodem; maxima autem quadratorum summa fiet ex lateribus figuræ Axis minoris.

Sit Ellipseos Axis major AT , minor vero ΔE ; fitque quadratum Axis AT non majus dimidio quadrati summæ laterum figuræ ejus: sint etiam aliæ sectionis diametri KB , ξT , quibus ducantur parallelæ ΓA , ΓI ; ac demittantur ad Axem normales ΔM , IO .

Fiat ΓN ad NA & $A \varepsilon$ ad $\varepsilon \Gamma$ in ratione Axis AT ad latus ejus rectum; ac rectangulum sub $N \Gamma$, $A \varepsilon$, sive quadratum ex $A \varepsilon$, erit ad quadrata ex $N \Gamma$, $\Gamma \varepsilon$ simul ut quadratum ex AT ad quadrata laterum figuræ super AT factæ. Latus autem rectum figuræ Axis minoris ΔE est ad ΔE sicut ΓN ad $\Gamma \varepsilon$: quia ΓN est ad $\Gamma \varepsilon$, sicut AT ad latus ejus rectum, ac AT est ad latus ejus rectum (per 15^m primi) ut


Kk

latus

latus rectum Axis ΔE ad ipsam ΔE . Verum latus rectum Axis ΔE (per eandem 15^{am} primi) est ad ipsam ΔE sicut quadratum ex $\Lambda \Gamma$ ad quadratum ex ΔE ; ac $N\Gamma$ est ad ΓE sicut rectangulum $N\Gamma E$ ad quadratum ex ΓE : erit igitur rectangulum $N\Gamma E$ ad quadratum ex ΓE sicut quadratum ex $\Lambda \Gamma$ ad quadratum ex ΔE . Quadratum autem ex ΓE est ad summam quadratorum ex $N\Gamma$ & ΓE sicut quadratum Axis ΔE ad summam quadratorum ex lateribus figuræ super ΔE factæ: ex æquo igitur rectangulum $N\Gamma E$ erit ad summam quadratorum ex $N\Gamma$ & ΓE sicut quadratum ex $\Lambda \Gamma$ ad summam quadratorum laterum figuræ super ΔE factæ. Rectangulum autem sub $N\Gamma$ & ΛE est ad quadrata ex $N\Gamma$, ΓE simul sicut quadratum ex $\Lambda \Gamma$ ad quadrata laterum figuræ ipsius $\Lambda \Gamma$.

Quadratum autem ex $\Lambda \Gamma$ non majus est dimidio quadrati summæ laterum figuræ ejus: duplum igitur rectanguli sub $N\Gamma$, ΛE non erit majus quadrato ex $N E$; ac proinde quod fit sub $N\Gamma$, $M E$ bis minus erit quadrato ex $N E$. Sublato itaque utrinque communi rectangulo $N M$, $M E$ bis; erit residuum rectangulum sub $M \Gamma$, $M E$ bis minus quadratis ex $N M$, $M E$ simul: ratio igitur dupli rectanguli sub ΛM , $M \Gamma$ ad duplum rectangulum sub $M \Gamma$, $M E$, sive ratio ΛM ad $M E$, major erit ratione rectanguli dupli sub ΛM , $M \Gamma$ ad quadrata ex $N M$, $M E$ simul. Sed duplum rectangulum sub ΛM , $M \Gamma$ una cum quadratis ex $N M$, $M E$ simul (per Lemma III. *Abdolm.*)

æqualia sunt quadratis ex $N\Gamma$, ΓE , ob æquales ΛN , ΓE : quare componendo erit ratio ΛE ad $E M$ major ratione quadratorum ex $N\Gamma$ & ΓE ad quadrata ex $N M$, $M E$ simul; adeoque ratio rectanguli sub $N\Gamma$, ΛE ad rectangulum sub $N\Gamma$, $E M$ major e-



rit ratione quadratorum ex $N\Gamma$, ΓE ad quadrata ex $N M$, $M E$. Permutando autem ratio rectanguli sub $N\Gamma$, ΛE ad quadrata ex $N\Gamma$, ΓE simul major erit ratione rectanguli sub $N\Gamma$, $M E$ ad quadrata ex $N M$, $M E$ simul: atque supra demonstratum est rectangulum sub $N\Gamma$, ΛE esse ad quadrata ex $N\Gamma$, ΓE simul sicut quadratum ex $\Lambda \Gamma$ ad summam quadratorum laterum figuræ ejus. Sed & (per 19^{am} hujus) rectangulum sub ΓN , $M E$ est ad summam quadratorum ex $N M$, $M E$, sicut quadratum ex $\Lambda \Gamma$ ad summam quadratorum laterum figuræ diametri $K B$: ratio igitur quadrati ex $\Lambda \Gamma$ ad quadrata laterum figuræ ejus simul major est ratione ejusdem ad quadrata laterum figuræ diametri $K B$; adeoque quadrata laterum figuræ Axis majoris $\Lambda \Gamma$ minora sunt quadratis laterum figuræ diametri $K B$ simul sumptis.

Jam vero $M N$ vel minor erit quam $O E$, vel non minor erit eâ. Imprimis autem fit minor eâ. Unde quadrata ex $M N$, $M E$ simul majora erunt quadratis ex $N O$, $O E$ simul; ac quadrata ex $N O$, $O E$ simul majora sunt rectangulo sub $O E$ & dupla differentia ipsarum $O E$, $M N$; quare ratio rectanguli sub $M O$ & dupla differentia inter $O E$ & $M N$ ad rectangulum sub $O E$ & dupla differentia inter $O E$ & $M N$ major est ratione ejusdem ad summam quadratorum ex $N O$, $O E$; ac proinde ratio $M O$ ad $O E$ major erit ratione rectanguli sub $M O$ & dupla differentia ipsarum $O E$, $M N$ ad quadrata ex $N O$, $O E$ simul. Sed rectangulum sub $M O$ & dupla differentia ipsarum $O E$, $M N$ unâ cum quadratis ex $N O$, $O E$ simul (per Lemma IV. *Abdolm.*) æquale est quadratis ex $M N$, $M E$ simul; quia differentia inter quadrata ex $M N$, $M E$ & quadrata ex $N O$, $O E$ simul æqualis est duplæ differentiæ inter quadrata ex $M O$, $O O$: componendo igitur ratio $M E$ ad $E O$ major erit ratione quadratorum ex $M N$ & $M E$ simul ad quadrata ex $N O$ & $O E$ simul. Sed ut $M E$ ad $E O$ ita rectangulum sub ΓN , $M E$ ad rectangulum sub ΓN , $E O$; quare ratio rectanguli sub ΓN , $M E$ ad rectangulum ΓN , $E O$ major est ratione summæ quadratorum ex $M N$, $M E$ ad summam quadratorum ex $N O$, $O E$: ac permutando ratio rectanguli sub $N\Gamma$, $M E$ ad summam quadratorum ex $M N$, $M E$ major est ratione rectanguli

guli NR, ZO ad summam quadratorum ex NO, OZ . Sed rectangulum sub NR, MZ est ad summam quadratorum ex MN, MZ (per 19^{am} hujus) sicut quadratum ex AR ad summam quadratorum laterum figuræ diametri KB ; ac, per eandem, rectangulum sub NR, ZO est ad quadrata ex NO, OZ simul ut quadratum ex AR ad summam quadratorum laterum figuræ diametri ξT : ratio itaque quadrati ex AR ad summam quadratorum laterum figuræ diametri KB major est ratione ejusdem ad summam quadratorum laterum figuræ diametri ξT ; ac proinde quadrata laterum figuræ diametri KB minora sunt quadratis laterum figuræ diametri ξT .

Si vero MN non minor fuerit quam ZO , summa quadratorum ex MN, MZ non major erit summa quadratorum ex NO, OZ ; ac proveniet ratio rectanguli sub NR, MZ ad quadrata ex NM, MZ simul major ratione rectanguli sub NR, ZO ad summam quadratorum ex NO, OZ : unde, modo nuper ostenso, manifestum erit quadrata laterum figuræ diametri KB minora esse quadratis laterum figuræ diametri ξT . Hæc autem ita se habebunt, siue cadat normalis de puncto I demissa inter puncta Θ & M , vel super ipsum Θ , vel etiam inter Θ, Γ ; modo segmentum MN minus fuerit intercepta NO . Est autem rectangulum sub $NR, \Gamma Z$ ad quadrata ex $NR, \Gamma Z$ simul ut quadratum ex AR ad summam quadratorum laterum figuræ Axis minoris ΔE , per demonstrata in principio hujus Propositionis; ac rectangulum sub NR, OZ est ad quadrata ex NO & OZ simul (per 19^{am} hujus) ut quadratum ex AR ad summam quadratorum laterum figuræ diametri ξT : unde, consimili argumento, probabitur summam quadratorum laterum figuræ diametri cujuscunque ξT minorem esse quadratis laterum figuræ Axis ΔE simul sumptis. Q. E. D.

PROPOSITIO XLVIII.

SI vero in Ellipsi quadratum Axis majoris majus fuerit dimidio quadrati summæ laterum figuræ Axis: dabitur ab utraque Axis parte diameter, cujus quadratum æquale est dimidio quadrati summæ laterum figuræ ejus: ac summa quadratorum laterum figuræ hujus diametri minor erit summa quadratorum laterum figuræ cujuscunque alterius diametri ad eundem sectionis quadrantem ducendæ: quadrata etiam laterum figuræ diametri huic utrinque propioris minora sunt quadratis laterum figuræ super diametrum remotiorem factæ.

Describatur Schema præcedenti simile: ac eodem modo constabit duplum quadratum ex AZ majus esse quadrato ex NZ . Fiat duplum quadrati ex MZ æquale quadrato ex NZ , & ad punctum M erigatur Axis normalis AM occurrens sectioni in A ; & jungatur TA , eidemque parallela ducatur sectionis diameter KB : erit igitur MZ ad ZN (per 7^{am} hujus) sicut diameter KB ad latera figuræ ejus simul sumpta; ac proinde quadratum ex MZ ad quadratum ex ZN sicut quadratum ipsius KB ad quadratum summæ laterum figuræ ejus. Sed quadratum ex MZ dimidium est quadrati ex ZN ; quare quadratum ex KB dimidium est quadrati summæ laterum figuræ ejus.


Ducantur jam diametri $\Delta E, \xi T$ inter A & B ; & per punctum Γ iisdem parallelæ sint $\Gamma O, \Gamma T$; ac demittantur ad Axem normales $O\Theta, T\Pi$. Quoniam vero quadratum ex MZ dimidium est quadrati ex ZN , ac rectangulum sub NZ, ZO etiam dimidium est quadrati ex ZN ; erit rectangulum sub NZ, ZO æquale quadrato ex MZ : unde NZ erit ad MZ sicut MZ ad ZO ; ac auferendo antecedentes à consequentibus, erit residuum MN ad residuum $M\Theta$ sicut NZ ad MZ . Hinc rectangulum sub $NZ, M\Theta$ æquale erit rectangulo sub MN, MZ . Est igitur rectangulum sub $NZ, M\Theta$ majus rectangulo sub NO, MZ ; ac duplum rectanguli sub $NZ, M\Theta$ majus rectangulo duplo sub NO, MZ : rectangulum igitur sub $M\Theta, \Theta Z$ quater majus est duplo rectangulo sub NO, MZ : Adjiciatur commune duplum rectangulum sub MO, MZ ; & quadruplum rectangulum sub $M\Theta, \Theta Z$ unà cum duplo rectangulo sub MO, MZ majus erit duplo rectangulo sub MN, MZ . Addatur insuper quater quadratum ex ΘM

K k 2

utrinque

utrinque; & erit quadruplum rectangulum sub $M\Theta$, ΘZ , unà cum duplo rectangulo sub $M\Theta$, MZ & quater quadrato ex ΘM simul, majus quam duplum rectangulum sub MN , MZ unà cum quadruplo quadrato ex ΘM . Verum quadruplum rectangulum sub $M\Theta$, ΘZ , unà cum duplo rectangulo sub $M\Theta$, MZ & quater quadrato ex ΘM simul (per Lemma V. *Abdolm.*) æquale est duplo rectangulo sub $\Theta\Theta$, ΘM simul & MZ ; ac duplum rectangulum sub NM , MZ unà cum quadrato ex ΘM quater (per Lemma VI. *Abdolm.*) æquale est quadratis ex NM , MZ simul: rectangulum igitur duplum sub $\Theta\Theta$, ΘM simul & MZ majus est quadratis ex NM , MZ simul. Unde ratio dupli rectanguli sub $\Theta\Theta$, ΘM simul & $M\Theta$ ad duplum rectangulum sub $\Theta\Theta$, ΘM simul & MZ minor est ratione dupli rectanguli sub $\Theta\Theta$, ΘM simul & $M\Theta$ ad summam quadratorum ex MN , MZ : id est, ratio $M\Theta$ ad MZ minor est ratione dupli rectanguli sub $\Theta\Theta$, ΘM & $M\Theta$ ad summam quadratorum ex MN , MZ . Quadrata autem ex $N\Theta$ & ΘZ simul majora sunt quadratis ex MN , MZ , excessu rectanguli dupli sub $M\Theta$ & $\Theta\Theta$, ΘM simul, per Lemma IV. *Abdolm.* componendo igitur ratio ΘZ ad MZ minor erit ratione quadratorum ex $N\Theta$ & ΘZ simul ad quadrata ex MN , MZ simul. Hinc, modo in Propositione præcedente usurpato, demonstrabitur quadrata laterum figuræ diametri KB minora esse quadratis laterum figuræ diametri ΔE . Cumque duplum rectangulum sub NZ , $\Theta\Theta$ majus est duplo rectangulo sub $N\Pi$, ΘZ ; eodem argumento probabitur quadrata laterum figuræ diametri ΔE minora esse quadratis laterum figuræ diametri ξT .

Quoniam etiam duplum rectangulum sub NZ , $\Pi\Theta$ majus est duplo rectangulo sub NA , ΠZ ; pari modo patebit rationem ΔZ ad $\Xi\Pi$ minorem esse ratione quadratorum ex NA & ΔZ simul ad quadrata ex $N\Pi$, ΠZ simul sumpta: unde pari ratiocinio constabit quadrata laterum figuræ ξT minora esse quadratis laterum figuræ Axis AG .



Ducantur jam, in iisdem Ellipseos quadrantibus, diametri aliæ remotiores ab Axe majore quam KB , ut ZH , $\tau\gamma$; & per punctum r his diametris parallelæ sint ΓX , $\Gamma\delta$: ac demittantur ad Axem normales XP , $\delta\sigma$. Et, argumento prædictis consimili, manifestum fiet quadrata laterum figuræ diametri KB minora esse quadratis laterum figuræ diametri ZH : atque hæc quoque minora esse quadratis laterum figuræ diametri $\tau\gamma$; sive puncta P , σ ceciderint utraque inter Θ & M , sive eorum unum fuerit in centro & alterum inter Θ & M vel inter Θ & r ; vel denique si utrumque fuerit inter Θ & r . Quadrata igitur laterum figuræ diametri KB , cujus quadratum dimidium est quadrati summæ laterum figuræ ejus, minora sunt quadratis laterum figuræ cujuscunque alterius diametri in Ellipseos quadrantibus ΔZ , $r\theta$ ducendæ: ac quadrata laterum figuræ diametri huic utrinque propioris, in iisdem quadrantibus ductæ, minora sunt quadratis laterum figuræ diametri ab eadem remotioris. Consequitur etiam quadrata laterum figuræ Axis minoris $\Sigma\theta$ majora esse quadratis è lateribus figuræ cujuscunque alterius diametri sectionis simul sumptis. Q. E. D.

PROPOSITIO XLIX.

S*I in Hyperbola latus transversum figuræ Axis majus fuerit latere ejus recto: erit differentia quadratorum laterum figuræ Axis*


Sit Axis Hyperbolæ AF , & centrum O ; & sit AF major latere ejus recto: fiat FN ad NA & AZ ad ZF in ratione ipsius AF ad latus ejus rectum, ac ducantur diametri $KB, \xi T$. Dico differentiam inter quadratum ex AF & quadratum lateris ejus recti minorem esse differentiâ inter quadratum diametri KB & quadratum lateris recti ejusdem KB : ac differentiam inter quadrata ex KB & ex latere ejus recto minorem esse differentia inter quadrata ex ξT & ex latere ejus recto.

[illegible]

Li

PROPO:

quadratorum ex $N\Sigma$, ΣZ : ratio igitur rectanguli sub ΓN , $Z\Gamma$ ad rectangulum sub ΓN , $Z\Sigma$ major est ratione differentiarum quadratorum ex $N\Gamma$, ΓZ ad differentiam quadratorum ex $N\Sigma$, ΣZ : permutando autem ratio rectanguli sub ΓN , $Z\Gamma$ ad differentiam quadratorum ex $N\Gamma$, ΓZ major erit ratione rectanguli sub ΓN , $Z\Sigma$ ad differentiam quadratorum ex $N\Sigma$, ΣZ . Unde, eodem quo in præcedentibus usi sumus argumento, constabit rationem quadrati ex $\Lambda\Gamma$ ad differentiam quadratorum diametri τP & lateris ejus recti majorem esse ratione ejusdem quadrati ex $\Lambda\Gamma$ ad differentiam quadratorum laterum figuræ diametri $\sigma\delta$: ac proinde differentiam quadratorum laterum figuræ diametri $\sigma\delta$ majorem esse differentiam inter quadratum diametri τP & quadratum lateris recti ejus.



Denique cum ratio ΣZ ad $Z\Gamma$ major est ratione $\Sigma\Theta$ ad $\Theta\Gamma$ (quia ΣZ major est quam $Z\Gamma$ & $\Sigma\Theta$ minor quam $\Theta\Gamma$) erit ratio rectanguli sub ΓN , ΣZ ad rectangulum ΓN , $Z\Gamma$ major ratione dupli rectanguli sub NZ , $\Sigma\Theta$ ad duplum rectangulum sub NZ , $\Theta\Gamma$: quocirca, modo in præcedentibus usurpato, demonstrabitur differentiam quadratorum laterum figuræ Axis minoris ΔE majorem esse differentia inter quadratum diametri $\sigma\delta$ & quadratum lateris recti figuræ ejusdem. Q. E. D.

APOL-

APOLLONII PERGÆI CONICORUM

LIBER OCTAVUS RESTITUTUS:

S I V E

DE PROBLEMATIS DETERMINATIS DIVINATIO.

Halleius Aldrichio S. P.

CUM de Apollonio edendo tecum agerem, non mediocriter nos angebat, quod in Codicibus etiam Arabicis ultimus Conicorum liber desideraretur. Tu tamen, qua es ingenii felicitate, statim sensisti, pro re deplorata non habendum esse, sed forte quadantenus restitui posse, indicio ex eo facto quod in Pappi Collectionibus Mathematicis eadem ipsa tradantur Lemmata Conicorum Octavo pariter ac Septimo demonstrando inservientia; quæ tamen in cæteros libros diversos diversa reperiuntur. Hinc Tibi pro comperto fuit, utriusque libri argumenta conjunctissima fuisse; ac Problemata Octavi à Theorematis Septimi diversitas suas sortiri determinationes. Illud quidem mihi, re probe perpensa, cum conjecturâ probabile tum vestigiis quibusdam indicari videbatur: quo factum ut, Te viam monstrante, jacturæ isti, quantum in me est, resarciendæ memet accingerem. Quæso igitur hoc, quicquid est conaminis, benigne accipias. Vale.

PROPOSITIO I. PROBL.

Dato in Parabola data cujuslibet diametri latere recto; exhibere latus rectum cujuscunque alterius diametri.


Quoniam (per 5^m VII^m) demonstratum est, latus rectum cujuslibet alterius diametri Parabolæ excedere latus rectum Axis, quadruplâ interceptæ inter normalem ad Axem demissam & verticem principalem sectionis: manifestum est quod, si supra verticem Axis capiatur punctum quod quartâ parte lateris ejus recti distet à vertice, portio Axis, inter punctum illud & normalem à vertice cujusvis alterius diametri demissam, erit quarta pars lateris recti istius diametri.

M m

Sit

Sit itaque Parabolæ $AB\Gamma$ vertex B , Axis $B\Delta$, & latus rectum BZ ; producatursque Axis ad E , ita ut EB sit quarta pars lateris recti Axis; & per punctum quodvis sectionis Γ ducatur Axi parallela ΓH , quæ proinde (per 46. I. hujus) diameter erit; ac demittatur ad Axem normalis $\Gamma\Theta$. Dico latus rectum diametri ΓH quadruplum esse interceptæ ΘE .

Quod si diameter data non fuerit Axis, ut ΓH ; producaturs ΓH supra verticem ad K , ita ut ΓK sit quarta pars lateris recti datæ diametri; ad quam demittatur normalis de puncto quovis sectionis Λ , ut ΛM : erit latus rectum diametri ΛN quadruplum interceptæ KM . Hæc autem omnia liquido patent ex quintâ septimi hujus.



PROPOSITIO II. PROBL.

Vicissim dato in Parabola cujuscunque diametri latere recto; invenire diametrum quæ habeat latus suum rectum rectæ datæ æquale.

Sit data Parabola $AB\Gamma$, datæ autem diametri ΓH sit latus rectum datum. producaturs ΓH ad K , ita ut ΓK sit quarta pars lateris recti diametri istius; ac fiat KM æqualis quartæ parti alicujus alterius lateris recti; & per M ipsi ΓH normalis erigatur ΛM , occurrens sectioni in Λ ; per Λ vero ipsi ΓH parallela ducatur ΛN . Dico ΛN esse diametrum sectionis quæsitam, quæ producaturs ad O .

Vel si per K ducatur diametro normalis EKO , & intervallo OA quartæ parti lateris recti dati æquali ducatur MA ipsi EKO parallela; occurret sectioni in puncto quæsito Λ . Etenim cum ΓK sit quarta pars lateris recti diametri ΓH , & KM sit quarta pars lateris recti dati, cui æqualis est AO ; sit autem AO (per demonstrata in quinto VII^m) quarta pars lateris recti diametri ΛN : erit igitur ΛN diameter illa quam quærimus.


Latus autem rectum datum (per 32. VII^m) non minus esse potest latere recto Axis.

PROPOSITIO III. PROBL.

Dato in data Hyperbola datæ cujuscunque diametri latere recto; alterius cujuscunque diametri latus rectum invenire.

Sit in Hyperbola $AB\Gamma$, cujus centrum A , data aliqua diameter ΓA , ac semissis lateris ejus recti fiat ZB æqualis: proponitur latus rectum diametri cujuscunque alterius ΔE investigandum.

Per data tria puncta B , E , Z (per 5. 4. El.) describatur circulus $EBZH$ occurrens diametro propositæ ΔE in puncto H . Dico EH dimidium esse lateris recti quæsitæ. Nam (per 29^m. VII^m) differentia inter



quadratum diametri cujuscunque Hyperbolæ & figuram ejusdem ubique eadem est: adeoque rectangula sub diametris & differentiis inter easdem & latera sua recta sunt semper æqualia, uti & rectangula contenta sub earundem dimidiis; quare rectangulum BAZ æquale est contento sub ΔE & differentia inter ΔE & semissem lateris recti diametri ΔE . Sed, ob circulum (per 35. vel 36. III. Elem.) rectangulum sub EA , AH æquale est rectangulo BAZ : est igitur AH differentia inter semidiametrum ΔE & semilatus rectum ejusdem diametri, ac proinde EH dimidium est lateris recti quæsitæ.


PRO-

PROPOSITIO IV. PROBL.

IN Ellipsi datâ, si detur diameter aliqua una cum ejusdem latere recto; possumus diametri cujusvis alterius latus rectum exhibere.

Sit $\Gamma E B \Delta$ Ellipsis data, cujus centrum A ; & diametri ΓB detur latus rectum, ejusque dimidio æqualis fiat BZ , in producta diametro ponenda: ac fit quælibet alia diameter ΔE : & per tria puncta E, B, Z describatur circulus occurrens ipsi ΔE productæ in puncto H . Dico EH dimidium esse lateris recti quæsit.


Est enim in Ellipsi (per 30. VII^{mi}) summa quadrati diametri cujuscunque & figuræ ejusdem semper æqualis; hoc est, rectangulum contentum sub diametro & utrâque diametro & latere ejus recto simul ubique æquale est; adeoque & contenta sub earundem dimidiis: rectangulum igitur BAZ æquale est contento sub EA & utrâque EA & semisse lateris ejus recti simul. Sed (per 36^{am} III. *El.*) rectangulum EAH æquale est rectangulo BAZ ; quare AH æqualis est semidiametro EA una cum semisse lateris ejus recti simul sumpto: quapropter AH superat EA dimidio lateris recti quæsit; duplum igitur rectæ EH eidem lateri recto æquale est.



PROPOSITIO V. PROBL.

DAtis lateribus figuræ Axis Hyperbolæ, & datâ quavis ejusdem diametro magnitudine: positionem diametri istius in sectione determinare, atque situm & magnitudinem diametri cum eadem conjugatæ, latusque ejus rectum.

Sit Hyperbolæ AB Axis transversus AT , & latus rectum AA ; quod ponatur in directo Axis ad Δ & δ ; ac fiat ΓN ad NA ut & AE ad ET sicut ΓA ad AA ; erunt itaque puncta N, Z (per 2^{am} VII^{mi}) termini rectarum quas *Homologas* diximus: Componendo autem ΓA erit ad AN sicut Axis transversus & latus ejus rectum simul ad latus rectum, sive ut ΓA ad AA ; per conversionem vero rationis AN erit ad NZ sicut AA ad $\Gamma \delta$ differentiam Axis & lateris recti: ex æquo igitur ΓA erit ad NZ sicut ΓA ad $\delta \Gamma$; ac proinde rectangulum sub NZ & ΓA æquale erit contento sub AT & $\Gamma \delta$, sive sub Axe & differentia Axis laterisque recti. Rectangulum autem sub AT & differentia ejusdem & lateris ejus recti æquale est differentie quadrati Axis & figuræ ejus, quæ quidem (per 13^{am} & 29^{am} VII^{mi}) differentia est quadratorum è quibusvis sectionis diametris conjugatis: adeoque rectangulum sub NZ , ΓA æquale est differentie quadratorum ex quibuslibet sectionis diametris conjugatis. Pone jam BK esse diametrum quam quærimus, ac repetito Schemate Prop. 6^{ta} VII^{mi} (per eandem 6^{am}) quadratum ex BK erit ad quadratum ex ZH ut EM ad MN , ac per conversionem rationis quadratum ex BK erit ad differentiam quadratorum ex BK, ZH , sive ad rectangulum sub NZ & ΓA , sicut EM ad NZ : quocirca quod fit sub NZ & quadrato ex BK æquale erit contento sub NZ & rectangulo sub ΓA & EM ; adeoque quadratum ex BK æquale erit rectangulo sub EM & ΓA , sive sub EM & summa Axis & lateris ejus recti: est igitur BK media proportionalis inter ΓA & ME . Dantur autem BK & ΓA ; data est igitur ME , ac dato puncto Z punctum M datur.



Compositio autem manifesta est: manentibus enim descriptis, fiat ut ΓA ad BK


M m 2

ita

ita BK ad MZ, & erectâ Axi normali AM, fiat quadratum ex AM ad rectangulum AMΓ sicut figuræ Axis latus rectum ad transversum, ac punctum Λ (per 21^{am} primi) tanget sectionem. Jungantur ΛA, ΛΓ; & per centrum Θ ipfis ΛA, ΛΓ parallelæ ducantur diametri BK, ZH: habemus itaque (per demonstrata in 6^{ta} VII^{mi}) positionem utriusque diametri quæsitæ; ac factâ ΘB æquali semidiametro datæ, punctum B tanget sectionem. Fiat autem quadratum ex ΘZ vel ΘH ad quadratum ex ΘB sicut MN ad MZ, & erit ZH diameter cum BK conjugata: ac (per eandem 6^{am} VII^{mi}) data diameter BK erit ad latus suum rectum sicut MZ ad MN.

Invenimus itaque positionem diametri BK, & conjugatæ cum eadem tam magnitudinem quam situm, latusque rectum ejusdem, Curvâ nondum descriptâ: id quod in cæteris omnibus observandum. In hunc enim usum destinasse librum suum septimum videtur *Apollonius*, ut viam sterneret ad solutiones & determinationes problematum omnium quæ summas vel differentias diametrorum conjugatarum vel laterum figuræ earundem; sicut & summas vel differentias quadratorum ex iisdem similiaque spectant, absque supposita Sectionum delineatione: nec vulgari artificio quæsitæ diametrorum positiones in singulis assequitur.

Diametri autem conjugatæ cum diametro datâ magnitudinem, & latus rectum ejus, constructione paulo faciliore invenies, modo positionem non requiras. Capiatur enim media proportionalis inter ΑΓ & ΓΔ sive inter Axem & differentiam Axis & lateris ejus recti: quæ proinde poterit differentiam quadrati ex Axe & figuræ ejusdem, hoc est (per 29^{am} VII^{mi}) differentiam quadratorum e quibusvis diametris conjugatis. Sit ea ΠΟ; & erectâ ad ΟΠ normali ΠΡ, fiat ΟΡ æqualis diametro datæ, & erit ΠΡ æqualis diametro conjugatæ cum ΡΟ: si nempe latus rectum minus fuerit Axe. Si vero majus fuerit eo, fiat ΠΡ diametro propositæ æqualis, & juncta ΟΡ erit ejusdem diametro conjugatæ æqualis; & erecta super ΟΡ normali ΟΣ, erit ΡΣ latus rectum diametri ΠΡ. In priori vero casu, demissâ normali ΠΤ erit ΡΤ latus rectum diametri ΟΡ: conjugata enim media est proportionalis inter diametrum & latus suum rectum. Cætera patent ex 13^a & 29^a VII^{mi}.




Ac manifestum est diametrum propositam non minorem esse debere Hyperbolæ Axe dato.

PROPOSITIO VI. PROBL.

Datis Ellipseos Axe & latere recto, & datâ quavis ejusdem diametro magnitudine: diametri istius positionem designare, situmque & magnitudinem diametri cum datâ conjugatæ, simulque latus rectum ejusdem.

Sit Ellipseos ABΓ Axis transversus ΑΓ, qui producat utrinque, ac fiat utraque ΑΔ, ΑΔ' æqualis lateri recto, & (per 3^{am} VII^{mi}) habeantur rectæ Homologæ ΑΝ, ΓΖ; capiendo scilicet ΓΝ ad ΝΑ & ΑΖ ad ΖΓ sicut ΑΓ ad ΑΔ. Hinc dividendo ΓΑ erit ad ΑΝ sicut differentia Axis & lateris ejus recti ad latus rectum, sive ut ΓΔ ad ΔΑ; componendo vero ΑΝ erit ad ΝΖ sicut latus rectum ad summam Axis laterisque ejus recti, sive ut ΑΔ ad ΔΓ: ex æquo igitur ΓΑ erit ad ΝΖ sicut ΓΔ ad ΔΓ, sive ut differentia Axis & lateris ejus recti ad summam eorundem: rectangulum igitur sub Axe & summâ Axis & lateris ejus recti æquale est rectangulo sub ΝΖ & eorundem differentiâ. Sed rectangulum sub Axe & utroque Axe & latere recto simul æquale est quadrato ex Axe & figuræ ejusdem simul; quorum quidem summa (per 30^{am} & 12^{am} VII^{mi}) æqualis est sum-



CONICORUM LIB. VIII. RESTITUTUS. 141

mæ quadratorum è quibuscunque sectionis diametris conjugatis: huic igitur summæ æquale est rectangulum sub datis $N\Xi$, $\Gamma\delta$ five differentiâ Axis & lateris recti.

Putâ jam factum quod quæritur, sitque diameter BK æqualis datæ, eidemque conjugata ZH ; ductâque $\Lambda\Gamma$ ipsi parallêlâ, jungatur ΛA & demittatur normalis AM : & (per demonstrata in 7^{ma} VII^{mi}) quadratum ex BK erit ad quadratum ex ZH sicut ΞM ad MN . Componendo autem quadratum ex BK erit ad summam quadratorum ex BK , ZH , hoc est ad rectangulum sub $N\Xi$ & $\Gamma\delta$ five differentiâ Axis & lateris ejus recti, sicut ΞM ad $N\Xi$: igitur quod fit sub $N\Xi$ & quadrato ex BK æquale erit facto sub $N\Xi$ & rectangulo sub $M\Xi$ & $\Gamma\delta$; unde quadratum ex BK æquale erit rectangulo sub $M\Xi$ & $\Gamma\delta$, & proinde BK media proportionalis erit inter $M\Xi$ & $\Gamma\delta$. Datur autem utraque BK & $\Gamma\delta$: data est itaque $M\Xi$; &, ob datum punctum Ξ , punctum M quoque datur.

Componetur autem hoc modo. Fiat ut $\Gamma\delta$ five differentia Axis & lateris ejus recti ad diametrum datam BK ita eadem BK ad ΞM : &, erecta normali MA , fiat quadratum ex MA ad rectangulum $AM\Gamma$ sicut latus rectum Axis ad ipsum Axem, ac (per 21^{am} primi) punctum Λ tanget sectionem. Jungantur $\Lambda\Gamma$, ΛA , & per centrum Θ parallêlæ ipsis ducantur diametri $B\Theta K$, $Z\Theta H$; ac (per demonstrata in 7^{ma} VII^{mi}) habebuntur diametri quæsitæ positione; ac, factâ utraque ΘB , ΘK æquali semidiametro datæ, puncta quoque B , K tangent sectionem. Per eandem autem 7^{ma} VII^{mi}, erit ut $M\Xi$ ad MN ita BK ad latus rectum ejusdem, & ita quadratum ex BK ad quadratum diametri ZH cum BK conjugatæ. Satisfactum est igitur problemati, & inventus est situs utriusque diametri, Ellipfi etiam nondum descriptâ.

Abſque positione autem paratius est diametri conjugatæ laterisque recti magnitudinem invenire. Nam cum quadrata ex BK , ZH quadratis Axium simul sumptis, hoc est summæ quadrati Axis & figuræ ejus (per 12^{am} & 36^{am} VII^{mi}) semper æqualia sunt, si capiatur $\Gamma\Pi$ media proportionalis inter $\Lambda\Gamma$ & $\Gamma\Delta$, poterit $\Gamma\Pi$ summam quadratorum ex BK , ZH , five quadruplum summæ quadratorum semiaxium $\Lambda\Theta$, ΘO , hoc est quadrati ex ΛO . Quapropter si diametro $\Gamma\Pi$ vel radio ΛO describatur semi-circulus $\Lambda\Delta B$, in quo inscribatur recta AB datæ diametro BK æqualis, ac jungatur $B\Delta$: erit $B\Delta$ æqualis conjugatæ ZH ; erectaque $\Gamma\Delta$ normali super $\Lambda\Delta$ ulque dum occurrat ipsi AB productæ in Γ , erit $B\Gamma$ tertia proportionalis ipsis ΛB , $B\Delta$, hoc est ipsis BK , ZH ; ac proinde $B\Gamma$ æqualis erit lateri recto quæſito.

Manifestum autem est oportere diametrum BK non majorem esse Axe majore, nec minorem Axe minore, five mediâ proportionali inter latus rectum Axis ipsumque Axem.



PROPOSITIO VII. PROBL.

Datis Axe & latere recto Axis Hyperbolæ, ac datâ ratione diametrorum sectionis conjugatarum: invenire diametros illas conjugatas tam magnitudine quam positione.

Habeantur puncta Ξ , N Homologarum termini, ut in quinta hujus docetur: & quoniam fieri potest ut Axis major sit latere ejus recto, vel æqualis, vel minor eo; primum sit major eo, ac (per demonstrata in 21^{ma} VII^{mi}) ratio Axis ad suam conjugatam major esse debet ratione cujuscunque alterius diametri ad suam conjugatam. Sit igitur ratio data sicut $P\Xi$ ad ΣT five majoris ad minorem, sed minor ratione Axium inter se; ac fiat ut $P\Xi$ ad ΣT ita ΣT ad ΣT : datis igitur $P\Xi$, ΣT datur quoque ΣT , & ratio $P\Xi$ ad ΣT quoque datur, nempe ratio quadratorum ex $P\Xi$, ΣT , hoc est ratio quadratorum diametrorum quas quærimus. Putâ jam factum, & sit BK diameter quæſita, ejusque conjugata ZH , ac

N n

ducatur



PROPOSITIO XII. PROBL.

Datis Ellipseos Axe majore & latere recto, invenire diametros
ejus conjugatas, quarum differentia æqualis sit rectæ datæ.

Iisdem manentibus quæ in Ellipsi descripsimus, erit (per 9^{am} VII^{mi}) ut quadratum Axis ad rectangulum sub NR, MZ ita quadratum differentiæ diametrorum conjugatarum ad quadratum differentiæ ipsius MZ & ejus quæ potest rectangulum NMZ ; unde eodem omnino argumento quo in præcedente usi sumus, erit ut $r\delta$ (sive differentia Axis & lateris recti) ad differentiam diametrorum conjugatarum ita eadem differentia ad MZ, MN simul, hoc est ad NZ sive dupla ipsius θz , demptâ duplâ ejus quæ potest rectangulum NMZ . Fiat igitur ut differentia Axis & lateris recti ad differentiam conjugatarum ita semissis ejusdem differentiæ ad $o\theta$, quæ proinde data est, datumque punctum o . Sed $o\theta$, per jam dicta, æqualis est excessui quo θz superat eam quæ potest rectangulum NMZ : poterit igitur recta zo rectangulum NMZ , hoc est (per 6^{am}. II. *El.*) differentiam quadratorum ex θz , θM ; adeoque quadratum ex θM æquale est excessui quo quadratum ex θz superat quadratum ex oz . Dantur autem $\theta z, oz$, unde & θM quoque data est, punctumque M datum.

Componetur itaque problema, si fiat ut differentia Axis & lateris recti

ad differentiam conjugatarum datam, ita semiffis datæ differentiæ ad $\theta 0$; quæ à centro θ in Axe versus ε ponatur: deinde in producto Axe minore fiat θx ipsi 0ε æqualis, ac centro x radio $\theta\varepsilon$ describatur arcus circuli occurrens Axi in punctis M, μ , æqualiter à centro θ distantibus; & erectis normalibus ut $M\Lambda$, inveniuntur diametri quæsitæ modo superius descripto. Cujus compositionis ratio ex *Analysi* & ex 47^{ma} I. *El.* manifesta est.


Differentia autem propofita non major effe debet differentiâ Axium Ellipseos, nam (per 27^{am} VII^{mi}) fi ponatur major eâ, problema impoffibile erit, punctumque M extra Axem cadet.

Aliter autem, ac modo fane non inel-
ganti, invenire possumus diametros Ellipseos
conjugatas, datâ earundem vel summâ vel
differentiâ. Quoniam enim AP (five ea quæ
potest semiaxium quadrata simul) poterit
quoque (per duodecimam VII^{mi}) quarumvis
femidiametrorum conjugatarum quadrata;
radio AP describatur circulus AΓBΔ, & su-
per diametrum AB ad centrum P erigatur nor-
malis ΓPΔ, occurrens circulo in Γ, Δ: dein
centro Δ radio ΔA circinetur arcus AZB, qui
ob æquales AP, PΔ erit circuli quadrans, ac
proinde angulus quem capit erit (per 20^{am}. III.
El.) sesquialter anguli recti. Huic arcui in-
scribatur ZB æqualis differentiæ diametrorum
conjugatarum, quæ producatur ad occursum
semi-circuli AΓB in puncto H: Dico rectas
BH, HZ æquales esse diametris conjugatis quas quærimus.

Jungantur

Jungantur enim $\Lambda H, \Lambda Z$, & (per 31^{am}. III. *El.*) angulus $\Lambda H B$ erit rectus; angulis autem $H Z A$, qui deinceps est angulo $\Lambda Z B$, est semirectus: adeoque & angulus $H \Lambda Z$ angulo $H Z A$ æqualis, unde & ΛH ipsi $H Z$ æqualis: quadrata igitur ex $\Lambda H, H B$ (hoc est ex $Z H, H B$) simul sumpta, ob angulum $\Lambda H B$ rectum, æqualia sunt quadruplo quadrati ex ΛP , hoc est quadratis Axium Ellipseos simul sumptis, per constructionem: ipsarum vero $B H, H Z$ differentia est recta proposita $Z B$; quare (per 12^{am} VII^{mi} hujus) $B H, H Z$ diametris conjugatis quæsitis sunt æquales.

Si vero, ut in Propositione decima, data fuerit conjugatarum summa, ac proponatur diametros ipsas exhibere; centro Γ radio ΓA describatur arcus $A \Theta B$, qui (per 20^{am} III. *El.*) capiet angulum æqualem semirecto: igitur si recta datæ summæ conjugatarum æqualis, puta $B \Theta$, eidem arcui inscribatur, & ducantur $\Lambda \Theta, \Lambda H$, erit angulus $\Lambda \Theta H$ semirectus; & ob angulum $\Lambda H B$ rectum, erit quoque angulus $\Theta \Lambda H$ semirectus, ac proinde ΘH ipsi $H \Lambda$ æqualis erit. Quadrata autem ex $\Lambda H, H B$, hoc est ex $\Theta H, H B$ æqualia sunt quadrato ex ΛB five quadratis Axium simul: quare rectæ $\Theta H, H B$, quarum summa est ΘB , æquales sunt diametris conjugatis quas invenire oportuit.




Coroll. Ac manifestum est quod, si in quibusvis Ellipsis specie diversis, summæ quadratorum Axium æquales fuerint inter se, quascunque sumpseris diametros magnitudine datas, æquales quoque erunt diametri cum æqualibus conjugatæ.

Hic obiter notandum quod, quemadmodum quadrato radii ΛP æqualis est Lunula Hippocratis $\Lambda \Lambda B \Gamma$; ita, si ducatur diameter $E \Gamma K$ ipsi ΛB parallela, erit spatium $\Lambda E K B \Lambda$ æquale quadrato ex $E \Gamma$, ac proinde duplum Lunulæ $\Lambda \Lambda B \Gamma$: unde spatium $E \Gamma H \Lambda$ femi-lunulæ $\Lambda H \Gamma \Lambda$ fit æquale. Cujus rei demonstratio manifesta est.

PROPOSITIO XIII. PROBL.

Datis Axe & latere recto Hyperbolæ, invenire diametros ejus conjugatas, tam magnitudine quam positione, quæ contineant rectangulum rectangulo dato æquale.

Manentibus Schematis Hyperbolæ prius descriptis, ponatur $B K, Z H$ diametros esse quæsitæ. Quoniam autem (per 10^{am} VII^{mi}) quadratum ex $\Lambda \Gamma$ est ad rectangulum sub diametris conjugatis Hyperbolæ sicut $N \Gamma$ ad eam quæ potest rectangulum $N M \Xi$, ac (per demonstrata in 7^{ma} VIII^{vi}) rectangulum sub $N \Gamma$ & summâ Axis & lateris recti æquale est quadrato ex $\Lambda \Gamma$; sublato utrinque $N \Gamma$, erit rectangulum sub $\Gamma \Delta$ (Axe & latere ejus recto simul) & eâ quæ potest rectangulum $N M \Xi$ æquale rectangulo dato sub diametris quæsitis $B K, Z H$. Si igitur applicetur rectangulum propositum ad $\Gamma \Delta$ summam Axis & lateris ejus recti, data erit latitudo, nempe ea quæ potest rectangulum $N M \Xi$, hoc est (per 6^{am}. II. *El.*) ea quæ potest differentiam quadratorum ex $\Theta M, \Theta \Xi$. Sit latitudo ea ΘO , ac quadratum ex ΘO æquale erit differentię quadratorum ex $\Theta M, \Theta \Xi$: utrinque adjiciatur quadratum ex $\Theta \Xi$, & quadrata ex $\Theta O, \Theta \Xi$ æqualia erunt quadrato ex ΘM . Dantur autem $\Theta O, \Theta \Xi$: adeoque & ΘM datur, unde & punctum M datum.



Componetur

CONICORUM LIB. VIII. RESTITUTUS. 149

Componetur autem problema hoc modo. Iisdem manentibus quæ in præcedentibus Hyperbolæ figuris, applicetur datum rectangulum sub diametris conjugatis ad rectam $\Gamma\Delta$, five ad æqualem summæ Axis & lateris ejus recti; sitque latitudo inde orta recta ΘO , ita ut rectangulum sub $\Gamma\Delta$, ΘO æquale sit rectangulo dato; ac ponatur ΘO in Axe conjugato, & jungatur $\text{O}\Xi$; ac fiat ΘM ipsi $\text{O}\Xi$ æqualis; & invento jam puncto M , fiant cætera ut prius. Demonstratio autem manifesta est ex Analyfi & ex 47^{ma} I. *El.*

PROPOSITIO XIV. PROBL.

Similiter in Ellipsi, datis Axe & latere recto, oporteat invenire diametros ejus conjugatas, tam magnitudine quam positione, sub quibus rectangulum æquale rectangulo dato comprehendatur.

Manentibus descriptis in prioribus Ellipseos Schematis, eodem omnino argumento quo in præcedenti usi sumus, erit (per decimam VII^{mi}) sicut rectangulum sub NT & rd differentiâ Axis laterisque ejus recti (hoc est quadratum ex AT) ad rectangulum sub diametris conjugatis BK, ZH , ita NT ad eam quæ potest rectangulum NME ; &, ob NT ex utraque parte repertam, erit rectangulum sub rd differentiâ Axis & lateris ejus recti & eâ quæ potest rectangulum NME æquale rectangulo dato, nempe sub diametris conjugatis quæsitis BK, ZH contento: applicato igitur rectangulo illo proposito ad datam rd , dabitur latitudo ex applicatione orta, æqualis ei quæ poterit rectangulum NME ; hoc est (per 5^{am}. II. *El.*) ei quæ poterit excessum quo quadratum ex OE superat quadratum ex OM . Sit latitudo ista rectæ OP æqualis, & quadratum ex OP æquale erit excessui quo quadratum ex OE superat quadratum ex OM : quadratum igitur ex OE superat quadratum ex OP quadrato ex OM . Dantur autem OE, OP : quare recta OM quoque datur, punctumque M datum.

Compositio autem manifesta est.

Nam si applicetur
rectangulum da-
tum ad $r\delta$ diffe-
rentiam Axis & la-
teris ejus recti; hoc
est, si habeatur la-
titudine $\odot\Pi$, ita ut
rectangulum sub
 $\odot\Pi$, $r\delta$ sit æquale
rectangulo dato, ac
ponatur $\odot\Pi$ in axe


minore producto; dein centro Π radio $\Theta \Xi$ describatur arcus circuli occurrens Axi in punctis M, μ : erectis normalibus, ut MA , habebuntur, modo toties dicto, diametri conjugatae, quarum rectangulum æquale erit dato.

Oportebit autem rectangulum datum (per 28^{am} VII^{mi}) non minus esse rectangulo sub utroque Axe comprehenso; nec majus esse quadrato sub æqualibus diametris contento, hoc est (per 12^{am} VII^{mi}) femi-summâ quadratorum ex utroque Axe, sive rectangulo sub $\Theta\Gamma$, $\Gamma\Delta$, quod æquale est femi-summæ quadrati Axis & figuræ ejusdem.


Obtinebimus autem easdem diametros modo prorsus diverso. Quoniam enim (per 12^{am} VII^{mi}) summa quadratorum ex BK, ZH fit æqualis summæ datæ quadratorum Axium Ellipseos; si eidem summæ adjiciatur duplum rectangulum sub BK, ZH, fiet (per 4^{am} II. *Elem*) quadratum ex BK, ZH simul sumptis, adeoque BK, ZH simul dantur. Si vero ab eadem quadratorum summâ auferatur duplum illud rectangulum, remanebit (per 7^{am} II. *Elem*.) quadratum differentię ipsarum BK, ZH: adeoque & ipsa differentia data est. Datis autem summâ ac differentiâ duarum rectarum, ipsę rectę quoque dantur.

PP

Compo.




Componetur itaque, si poterit AB summam quadratorum Axiū; ac ad rectos angulos ponatur BF potens duplum rectanguli dati sub diametris quæsitis; ac centro B , radio BF , describatur arcus circuli FE . dividatur bifariam recta AB in Δ , ac centro Δ , radio BA , describatur semicirculi particula occurrens arcui FE in E , & jungantur AE , AF : quæ, per jam dicta, æquales erunt summæ ac differentię diametrorum quæsitarum. Fiat AZ ipsi AE æqualis, & secetur ZF bifariam in H , & erit AH diametrorum major, HF vero earundem minor.



PROPOSITIO XV. PROBL.

Datis Hyperbolæ Axe & latere recto, invenire situm & magnitudinem diametrorum ejus conjugatarum, quarum data sit quadratorum summa.

Maneant figuræ Hyperbolæ prius descriptæ, ac proposito diametrorum quarumvis conjugatarum BK , ZH quadratorum aggregato, oporteat ipsas diametros invenire. Quoniam (per 11^{am} VII^{mi}) quadratum ex AF est ad summam quadratorum ex diametris conjugatis Hyperbolæ sicut NF ad utramque NM , MZ simul; ac quadratum ex AF æquale est rectangulo sub NF & FA summâ Axis & lateris recti: ob utrinque communem NF , erit rectangulum sub FA & utrâque NM , MZ simul, sive duplâ ipsius OM , æquale datæ summæ quadratorum è diametris conjugatis. Applicatâ igitur quadratorum illorum datâ summâ ad FA summam Axis & lateris ejus recti, data erit latitudo duplæ ipsius OM æqualis: data est igitur OM , ac ob datum O punctum M quoque datur.



Componetur itaque problema, si applicetur semi-summa quadratorum è diametris conjugatis ad FA sive ad summam Axis & lateris ejus recti, ac ponatur latitudo ex applicatione orta de centro O ad punctum M in Axe situm: inventoque puncto M habebuntur diametri ipsæ, prout supra. Demonstratio autem ex Analyfi manifestissima est.

Manifestum etiam est quod summa quadratorum proposita non minor esse potest summâ quadratorum Axiū, hoc est summâ quadrati Axis & figuræ ejusdem, sive rectangulo $AF\Delta$.

PROPOSITIO XVI. PROBL.

Datis Ellipseos Axe & latere recto, oporteat invenire diametros ejus conjugatas, tam magnitudine quam positione, quæ datam habeant quadratorum differentiam.

Manentibus Ellipseos figuris prius descriptis, sint diametri BK , ZH conjugatæ, quarum quadrata datam habeant differentiam: ipsarumque situm ac magnitudinem hoc modo investigabimus. Quoniam (per 14^{am} VII^{mi}) quadratum ex AF est ad differentiam quadratorum è diametris conjugatis sicut NF ad duplam ipsius OM ; argumento toties usurpato, erit rectangulum sub FD (differentiâ Axis & lateris ejus recti) & duplâ ipsius OM æquale differentię quadratorum è diametris conjugatis: applicatâ itaque datâ quadratorum differentiâ ad FD (datam Axis & lateris recti differentiam) emerget latitudo data, nempe dupla ipsius OM : est igitur OM data, punctumque M datum.


Manifesta autem est Compositio: nam si applicetur semi-differentia quadratorum è diametris conjugatis ad FD differentiam Axis & lateris recti, orietur ex applicatione latitudo quæsitæ OM æqualis, unde cætera consequuntur.

Oportebit

CONICORUM LIB. VIII. RESTITUTUS. 151

Oportebit autem differentiam quadratorum propositam non majorem esse differentiam quadratorum Axium, five differentiam quadrati & figuræ Axis, hoc est rectangulo $AF\delta$.

Possumus etiam aliter tam XV^{um} quam XVI^{um} problema resolvere, ope 12^{mæ} & 13^æ Prop. lib. Septimi. Nam cum in Hyperbola (per 13^{am} VII^{mi}) differentia quadratorum Axium æqualis sit differentię quadrato-



rum quarumvis conjugatarum, si semi-summæ propositæ quadratorum ex iisdem adjiciatur ac auferatur semi-differentia data; dabuntur quadrata utriusque diametri quæsitæ, æqualia nempe datorum summæ ac differentię. Pariterque, ob summam quadratorum in Ellipsi (per 12^{am} VII^{mi}) datam, si detur quoque earundem differentia, eodem argumento obtinebimus utriusque diametri quadratum. Unde, si libuerit, punctum M quoque inveniemus, per demonstrata in 5^a & 6^a Octavi.


PROPOSITIO XVII. PROBL.

Datis Hyperbolæ Axe & latere recto, invenire diametros ejus conjugatas tam magnitudine quam positione, quæ datum contineant angulum.

Hoc problema, sicut etiam sequens, nobis resolutum dedit *Apollonius* in fine Libri secundi: ibi tamen sectiones ipsas jam descriptas esse supponit. Propositionem autem 31^{am} septimi inter *Theoremata dioristica* inseruisse videtur, ut viam sterneret ad solutionem eorundem problematum, ipsis Curvis nondum describi suppositis, ut in præmissis dictum est.

Quoniam enim (per 31^{am} septimi) rectangulum sub Axibus contentum sit æquale parallelogrammo obliquangulo sub quibuscunque duabus conjugatis diametris comprehenso; si ab extremitate diametri alicujus ad conjugatam ejus demittatur normalis, erit duplum rectanguli sub normali & diametro illâ conjugatâ contenti æquale rectangulo sub Axibus sectionis: quod proinde rectangulum erit ad rectangulum sub ipsis conjugatis contentum sicut normalis ipsa ad semi-diametrum, à cujus extremitate demissa est normalis. Dato autem angulo, data est ratio hæc, adeoque, ob datum Axium rectangulum, datum est rectangulum sub diametris conjugatis.

Pone jam factum esse quod quæritur, ac sint BK, ZH diametri conjugatæ, continentis angulum $B\theta Z$ æqualem angulo dato: demittaturq; normalis BT ad diametrum ZH ; ac, ob datum angulum $B\theta Z$, dabitur ratio BT ad $B\theta$. Sed, per jam dicta, sicut BT ad $B\theta$ ita rectangulum sub Axibus ad rectangulum sub BK, ZH contentum: &, ob datos Axes, datum quoque erit rectangulum sub BK, ZH . Dato autem rectangulo sub diametris conjugatis dantur quoque ipsæ diametri, tam magnitudine quam positione, per ea quæ demonstravimus in 13^a hujus.




Hinc talis conficitur problematis compositio. Fiat angulus $A\theta\pi$ æqualis angulo dato, in qua capiatur θP ad Axem $A\Gamma$ sicut Axis conjugatus ad $\Gamma\Delta$ five summam Axis & lateris ejus recti, & super θP ad angulos rectos erigatur PX occurrens Axi conjugato producto in X : Dico XZ junctam vel jungi suppositam ipsi θM æqualem esse. Invento autem puncto M, erigatur normalis AM , ac habebuntur cætera sicut prius.

P p 2

Fecimus

Fecimus enim rectangulum sub $\Gamma\Delta$, $\Theta\Phi$ æquale rectangulo sub Axibus contento; & ob angulum $\Theta\Phi$ æqualem angulo $Z\Theta B$, erit $\Phi\Theta$ ad ΘX sicut TB ad $B\Theta$, hoc est (per 31^m VII^m huj.) ut rectangulum sub Axibus ad rectangulum sub diametris BK , ZH ; erit igitur rectangulum sub $\Gamma\Delta$, ΘX æquale contento sub diametris conjugatis BK , ZH ; adeoque, per ea quæ in Compositione problematis 13ⁱ ostensa sunt, rite inventum est punctum M . Ac manifestum est angulum hunc non habere limitem; sed quo propiores sunt diametri conjugatæ ipsis Asymptotis, eo minorem evadere.




PROPOSITIO XVIII. PROBL.

Similiter in Ellipsi, datis Axe & latere ejus recto, oporteat invenire diametros conjugatas, tam magnitudine quam positione, quæ datum contineant angulum.

Rectangulum sub Axibus Ellipseos contentum (per eandem 31^m VII^m) æquale est parallelogrammo cuius obliquangulo sub diametris conjugatis contento: adeoque, demissa normali ab extremitate alicujus diametri ZH ad conjugatam ejus BK , ut HT , erit duplum rectangulum sub BK , HT æquale rectangulo sub Axibus contento; quod quidem datum est, adeoque rectangulum sub BK , HT datur. Est autem rectangulum sub BK , HT ad rectangulum sub BK , $H\Theta$ sicut HT ad $H\Theta$; ratio autem HT ad $H\Theta$ datur, ob angulum $B\Theta H$ datum: ac proinde datum est rectangulum sub BK , $H\Theta$, ejusque duplum sub BK , HZ , sive rectangulum sub diametris quæsitis. Dato autem conjugatarum rectangulo dabitur quoque (per 14^m VIII^m) recta ΘM ; unde punctum M datum.

Componetur itaque problema hoc modo. Fiat angulus $\Lambda\Theta\Phi$ æqualis angulo dato sub conjugatis contento, ac capiatur $\Theta\Phi$, ita ut rectangulum sub $\Theta\Phi$ & $\Gamma\Delta$ (differentiâ Axis & lateris ejus recti) æquale sit rectangulo sub Axibus sectionis; & erigatur normalis $P\Pi$ occurrens Axi minori producto in Π : dein centro Π , radio ipsi ΘZ æquali, describatur arcus circuli occurrens Axi majori in punctis M, μ ; & erigantur normales ut $M\Lambda$, unde cætera consequentur modo toties dicto.



Rectangulum enim sub $\Gamma\Delta$, $\Theta\Phi$ æquale est parallelogrammo Ellipsei circumscripto; quod quidem est ad rectangulum sub conjugatis BK , ZH sicut HT ad $H\Theta$, hoc est ut $\Theta\Phi$ ad $\Theta\Pi$, quia angulus $\Theta\Pi\Phi$ angulo $B\Theta H$ factus est æqualis: proinde rectangulum sub $\Gamma\Delta$, $\Theta\Pi$ erit æquale rectangulo sub BK , ZH : quare (per ea quæ in 14^m hujus invenimus) circulus centro Π , radio ΘZ descriptus, per punctum quæsitum M necessario transibit.

Oportebit autem angulum acutum à diametris conjugatis contentum non minorem esse angulo deinceps ei qui sub rectis ΛO , $O\Gamma$ ad mediam sectionem inclinatis continetur; uti demonstravit Apollonius in penultima Propositione libri II. Ac si minor fuerit eo, recta $\Theta\Pi$ major evadet ipsa ΘZ , ac proinde circulus præscriptus ad occursum Axis $\Lambda\Gamma$ pertingere non potest.

Ipsas autem diametros obtinebimus, si datæ summæ quadratorum ex utroque Axe

CONICORUM LIB. VIII. RESTITUTUS. 153

Axe, five rectangulo $\Lambda \Gamma \Delta$, adjiciatur ac auferatur duplum dati rectanguli sub conjugatis, quod nempe est ad rectangulum datum sub Axibus Ellipseos in data ratione ΘH ad HT , five ut Radius ad sinum anguli dati: habebuntur enim (per 4^m & 7^m II. *El.*) quadrata tam summæ quam differentiæ ipsarum diametrorum quadratarum BK , ZH .


Observandum autem hic loci, quod in omnibus his problematis sectionum diametros conjugatas spectantibus, non nisi duas, nempe BK , ZH , inquisivimus; cum tamen etiam aliud diametrorum par proposito satisfacere possit, inclinatis diametris ad Axem sub iisdem quidem angulis sed ad alterum ejus latus. Notandum etiam quod in Schematis ac demonstrationibus præcedentibus posuimus Axem latere recto majorem: quod si minor latere recto fuerit Axis, nulla omnino difficultas aut diversitas vel in Analyfi vel in Compositione Problematum exinde orietur.

SCHOLION.

Veteribus Geometris, ac speciatim Apollonio nostro, mos erat problemata plana pro resolutis habere, postquam rem eo deduxerant, ut rectangulum dato rectangulo æquale sub lateribus quæsitis contineretur, quorum summa vel differentia data rectæ æqualis fuerat. Hoc autem docet Euclides in 28^{va} & 29^{va} Sexti Elem. monstrando quo pacto applicandum sit parallelogrammum datum ad rectam datam, quod excedat vel deficiat parallelogrammo cuius dato simili. Cujus quidem rei generalissime propositæ casus sunt particulares; applicare rectangulum vel quadratum ad rectam datam, quod excedat vel deficiat quadrato: hujusque effectiorem postulant Geometræ Euclide posteriores. Quoniam vero in subsequentibus problematis fere omnibus usui erunt dictæ effectiões, ab hoc loco non alienum videbitur, earundem compendia, quantum fieri possit, simplicissima exhibere; ac more Lemmatum præmittere.


Oporteat igitur primo, applicare datum quadratum ad rectam datam excedens quadrato: hoc est, invenire puncta Γ , Z in data rectâ AB productâ, ita ut rectangula $\Lambda \Gamma \text{B}$, ΛZB æqualia sint quadrato è rectâ datâ ΔE . Bisecetur AB in Δ , & erigatur normalis ΔE , quæ fiat æqualis lateri quadrati applicandi: ac junctæ rectæ ΔE vel jungi suppositæ æquales fiant $\Delta \Gamma$, ΔZ : Dico Γ , Z esse puncta quæsitæ.

Est enim quadratum ex ΔE , hoc est quadratum ex $\Gamma \Delta$, æquale quadratis ex $\Lambda \Delta$, ΔE simul. Quadratum autem ex $\Gamma \Delta$ (per 6^m II. Elem.) æquale est quadrato ex $\Lambda \Delta$ una cum rectangulo $\Lambda \Gamma \text{B}$: quadrata igitur ex $\Lambda \Delta$, ΔE æqualia sunt quadrato ex $\Lambda \Delta$ & rectangulo $\Lambda \Gamma \text{B}$; quare sublato communi quadrato ex $\Lambda \Delta$, erit quadratum ex ΔE æquale rectangulo $\Lambda \Gamma \text{B}$; quod fieri oportuit. Ac eodem modo probabitur rectangulum ΛZB eidem quadrato ex ΔE æquale: unde manifestum est rectas $\Lambda \Gamma$, BZ æquales esse.



2^{do} Oporteat applicare datum quadratum ad rectam datam deficiens quadrato, five invenire in rectâ datâ AB , inter Λ & B , puncta Γ , Z , ita ut rectangula $\Lambda \Gamma \text{B}$, ΛZB æqualia sint quadrato datæ alicujus ΔE . Bisecetur similiter AB in Δ , ac sit normalis ΔE latus quadrati dati; & centro E , radio $\Lambda \Delta$ describatur arcus circuli occurrens rectæ AB in punctis Γ , Z : Dico Γ , Z puncta esse quæ quærimus.

Quadratum etenim ex $\text{E}\Gamma$ æquale est quadratis ex ΔE , $\Gamma \Delta$ simul, ac idem quadratum ex $\text{E}\Gamma$ five $\Lambda \Delta$ (per 5^m II. Elem.) æquale est rectangulo $\Lambda \Gamma \text{B}$ una cum quadrato ex $\Gamma \Delta$: sublato itaque communi quadrato ex $\Gamma \Delta$, restabit quadratum ex ΔE æquale rectangulo $\Lambda \Gamma \text{B}$; parique argumento etiam rectangulo ΛZB : unde $\Lambda \Gamma$ ipsi ZB & ΛZ ipsi ΓB sunt æquales. Ac manifestum est quod ΔE latus quadrati applicandi non majus esse debet dimidio rectæ datæ AB ; nam si aliter fuerit, circulus centro E radio $\Lambda \Delta$ descriptus nec secabit neque continget ipsam AB ; adeoque problema impossibile est.



3^o Applicandum sit rectangulum sub datis lateribus contentum ad rectam datam excedens

est quadrato ex NZ . Datur autem quadratum ex NZ ; datur igitur rectangulum sub MZ & excessu jam dicto. Adjacet autem data recta, nempe dupla ipsius NZ una cum ϕ simul, deficiens quadrato: datur igitur recta MZ , punctumque M datum est.

Componetur autem hoc modo. Fiat ut semi-summa Axis & lateris ejus recti ad dimidium lateris recti dati ξ , ita idem dimidium lateris recti ad semissem ipsius ϕ , cui fiat NE æqualis, & erigatur Axi normalis EX quæ ponatur ipsi NZ æqualis, & centro X radio ZE describatur circuli particula occurrens Axi in puncto M &c. Cujus rei ratio ex Analyfi & Lemmate 2^{do} Scholii manifesta est.



Si vero Hyperbolæ Axis minor fuerit latere ejus recto, erit MZ minor quam MN . Cum autem, per præcedentia, MZ est ad MN sicut MN ad ϕ , erit ϕ major quam MN : quare per conversionem rationis MZ erit ad NZ sicut MN ad excessum quo ϕ superat MN , ac permutando MZ erit ad MN sicut NZ ad excessum ipsius ϕ supra MN ; adeoque rursus, per conversionem rationis MZ erit ad NZ sicut NZ ad excessum quo differentia inter ϕ & duplam ipsius NZ superat MZ : igitur rectangulum sub MZ & excessu quo MZ superatur à differentia quæ est inter ϕ & duplam ipsius NZ æquale erit quadrato ex NZ . Sed datum est quadratum ex NZ : datum igitur est rectangulum sub MZ & dictum excessum. Adjacet autem rectangulum illud datum rectæ datæ, nempe excessui quo ϕ superat duplam ipsius NZ , deficiens quadrato: datur igitur MZ , punctumque M datum.

Compositio autem vix diversa est, nisi quod, hoc in casu, punctum N à vertice remotius est quam Z : fiat igitur ut semi-summa Axis & lateris ejus recti ad semi-latus rectum datum, ita idem semi-latus rectum ad tertiam proportionalem, cui æqualis ponatur NE ; & erecta ad Axem normali EX , fiat EX ipsi NZ æqualis; & centro X radio ZE describatur arcus circuli occurrens Axi in puncto M quæsito, vel in punctis M, μ , quoties fieri possit: est enim NE æqualis dimidio ipsius ϕ ; adeoque ZE æqualis dimidio ejus cui adjacet rectangulum æquale quadrato ex NZ deficiens quadrato, nempe dimidio excessus quo ϕ superat duplam ipsius NZ .

Διορισμός. In primo quidem casu, ubi Axis major est latere ejus recto, manifestum est (ex 33^{am} VII^{mi}) quod latus rectum Axis minus erit latere recto cujusvis alterius diametri; adeoque propositum latus rectum ξ debet esse majus latere recto Axis; ac quo majus est ξ eo remotior erit diameter quæsita ab Axe sectionis. Atque etiam in altero casu, si Axis minor fuerit latere ejus recto, non tamen minor dimidio ejus, eodem modo (per 34^{am} VII^{mi}) se res habebit. At vero si latus rectum majus fuerit duplo Axis, erit NZ major quam EA : ac si fiat EM ipsi NZ æqualis, & erigatur normalis MX five EX ipsi NZ æqualis, habebitur (per 35^{am} VII^{mi}) diameter illa sectionis BK , cujus latus rectum, ex omnibus lateribus rectis *Minimum*, duplum erit diametri; coincidentibus scilicet punctis M, E , & circulo, cujus centrum X & radius ME , Axem contingente in puncto M , propter ZE ipsi EX æqualem. Diameter autem BK , per ea quæ in sexta hujus demonstravimus, media est proportionalis inter ME five NZ & summam Axis ejusque lateris recti; adeoque rectangulum sub NZ & summâ Axis & lateris recti æquale est quadrato ex BK . Sed summa Axis & lateris recti est ad differentiam earundem sicut Axis AT ad NZ ; quare rectangulum sub NZ & summa Axis laterisque recti ejus æquale est rectangulo sub Axe & excessu lateris recti supra Axem: quadratum igitur ex BK æquale est rectangulo sub Axe & differentia Axis & lateris recti, hoc est differentie inter figuram Axis ejusdemque

Q q 2

Axis



Axis quadratum: erit igitur BK media proportionalis inter Axem & differentiam Axis & lateris recti; & latus rectum Hyperbolæ *minimum* duplum erit ipsius BK .

Quapropter si propositum latus rectum minus fuerit duplo mediæ proportionalis inter Axem & differentiam Axis laterisque ejus recti, hoc est, si quadratum ejus minus fuerit quadruplo excessu quo rectangulum sub Axe & latere ejus recto superat quadratum Axis, impossibile erit problema. Hoc si majus fuerit, sed minus latere recto Axis, inveniuntur duæ diametri ab utraque Axis parte, quibus idem datum latus rectum competat: si vero fuerit lateri recto Axis æquale, utrinque una reperietur præter Axem, ita ut omnino tres diametri rem præstent. Si vero latere recto Axis majus fuerit latus rectum propositum, non nisi una diameter ab utroque Axis latere problemati satisfacere potest. *Maximum* autem non datur.

Dico insuper, quemadmodum latus rectum diametri BK duplum est ipsius BK , ita, in omni casu ubi habentur, ab utraque Axis parte, duæ diametri quarum latera recta sunt æqualia, earundem summam æqualem esse communi earum lateri recto.


Est enim (per 29^m VII^m) differentia quadrati ex diametro quavis ZH & figuræ super ZH factæ æqualis differentiæ quadrati Axis AF & figuræ ejusdem; hoc est, æqualis est rectangulo sub Axe & differentiâ inter Axem & latus rectum ejus: rectangulum igitur sub ZH & excessu quo latus rectum ejus superat ipsam ZH datum est. Adjacet autem rectæ datæ, nempe lateri recto proposito, deficiens quadrato: proinde latus rectum æquale erit utrique & ZH & alteri diametro quæ idem habeat latus rectum ac ZH .

Coroll. Hinc manifestum est alteram diametrum, quæ latus rectum idem habet ac Axis AF , æqualem esse excessui quo latus illud rectum superat Axem.

PROPOSITIO XX. PROBL.

Datis in Ellipsi Axe & latere ejus recto: invenire diametrum, quæ habeat latus suum rectum rectæ datæ æquale.

Iisdem manentibus quæ in Schematis Ellipseos prioribus. Sit recta data ξ , & oporteat invenire diametrum illam Ellipseos quæ habeat latus ejus rectum ipsi ξ æquale. Per 15^m VII^m, demonstratum est quadratum ex AF , sive rectangulum sub NR & rd (differentiâ Axis & lateris ejus recti) esse ad rectangulum sub NR , Mz , sicut quadratum lateris recti ξ ad quadratum ex MN : est igitur ut differentia Axis & lateris recti ad Mz ita quadratum ex ξ ad quadratum ex MN : quapropter si




fiat ut differentia Axis & lateris ejus recti ad ξ ita ξ ad aliam, quæ fit ϕ ; data erit recta ϕ , ac rectangulum sub Mz & ϕ æquale erit quadrato ex MN : *ἀνάλογον* itaque Mz erit ad MN sicut MN ad ϕ , ac componendo zN erit ad MN sicut MN & ϕ simul ad ϕ ; unde rectangulum sub zN & ϕ æquale erit quadrato ex MN una cum rectangulo sub MN & ϕ . Datum autem est rectangulum sub zN , ϕ ; datum igitur est rectangulum sub MN & MN & ϕ simul: adjacet igitur rectangulum datum sub zN & ϕ datæ rectæ ϕ excedens quadrato; quare data est recta MN ; ac ob punctum N datum, datur quoque punctum M .

Compo-

CONICORUM LIB. VIII. RESTITUTUS. 157

Compositio igitur manifesta est: nam si producat^{ur} ΣN ad Π , ac fiat $N\Pi$ ipsi ϕ æqualis, five ut $N\Pi$ sit ad ξ sicut ξ ad $r\delta$ differentiam Axis laterisque ejus recti; & ad $N\Pi$ applicetur rectangulum æquale contento sub ΣN & $N\Pi$ excedens quadrato, quod sit rectangulum $NM\Pi$: inventum erit (*per Lem. 3^{um} Schol.*) punctum M , unde habebitur positio diametri BK quæ problemati satisfacit.

In Ellipfi etiam aliter resolvetur hoc problema, eo nempe quo usi sumus modo in Hyperbolâ; unde paulo paratior oritur constructio: nam cum $M\Sigma$ sit ad MN sicut MN ad ϕ , erit componendo $M\Sigma$ ad ΣN sicut MN ad MN & ϕ simul: ac per-



mutando $M\Sigma$ erit ad MN sicut ΣN ad MN & ϕ simul: rursusque componendo, $M\Sigma$ erit ad ΣN sicut ΣN ad MN , ΣN & ϕ simul sumptas, five ad excessum quo ϕ & duplum ipsius ΣN superat $M\Sigma$: quadratum igitur ex ΣN æquale est rectangulo sub $M\Sigma$ & excessu quo ϕ & dupla ipsius ΣN superant $M\Sigma$. Quod quidem rectangulum datum est, ob datam $N\Sigma$; adjacet vero rectæ datæ, nempe ei quæ æqualis est ipsis ϕ & duplæ ipsius ΣN simul, deficiens quadrato: datur itaque recta $M\Sigma$; & ob datum punctum Σ , punctum M quoque datur.

Hinc talis conficitur constructio. Fiat ut differentia Axis laterisque ejus recti ad ξ ita dimidium ipsius ξ ad dimidium ipsius ϕ , cui fiat ipsa NE æqualis; & erectâ normali EX , fiat EX ipsi $N\Sigma$ æqualis, ac centro X radio XE describatur circuli particula occurrens Axi in puncto M : quo invento, cætera peragantur ut prius.

Ac manifestus est hujus problematis *δοξα*. Nam si latus rectum propositum minus fuerit latere recto Axis majoris, vel majus latere recto Axis minoris, impossibile erit problema; cadente puncto M , in priori casu, inter E & A ; in posteriore, ultra verticem Γ .


PROPOSITIO XXI. PROBL.

Datis Hyperbolæ Axe & latere recto Axis; invenire diametrum ejus, quæ ad latus suum rectum datam habeat rationem.

Manentibus prius descriptis, sit ratio data sicut Σ ad τ , ac ponatur BK diameter quæsitâ; & demissâ normali AM , erit (*per 6^{am} VII^{mi}*) ut Σ ad τ , five ut BK ad latus ejus rectum, ita $M\Sigma$ ad MN : datur igitur ratio $M\Sigma$ ad MN : ac dividendo ratio $N\Sigma$ ad ΣM data est, quæ nempe eadem est ac ratio differentiarum terminorum Σ & τ ad terminum Σ diametro analogum: ac ob datam $N\Sigma$ data quoque est ΣM , unde & punctum M datum.

Si igitur fiat ut differentia terminorum ad terminum diametro analogum, ita $N\Sigma$ ad ΣM ; habebitur punctum quæsitum M , unde cætera consequuntur.


Ratio autem proposita non major esse potest ratione Axis ad latus ejus rectum, si Axis major fuerit latere recto; nec minor ratione eorundem, si Axis minor fuerit.



PROPOSITIO XXII. PROBL.

Pari modo, datis Ellipseos Axe & latere recto Axis, inveni-
enda sit diameter ea quæ ad latus suum rectum datam ha-
beat rationem.

Manentibus Schematis Ellipseos prioribus, fit ratio data sicut Σ ad Γ . Puta factum, ac fit BK diameter quam quærimus: erit igitur (per 7^{am} VII^{mi}) ut Σ ad Γ , hoc est ut BK ad latus suum rectum, ita MZ ad MN : datur itaque ratio MZ ad MN , ac componendo ratio NZ ad EM data est; eadem enim est ac ratio summæ terminorum Σ, Γ ad terminum Σ qui diametro respondet. Datur autem EN ; adeoque MZ quoque datur, punctumque M datum.



Si igitur fiat ut summa terminorum Σ, Γ ad terminum Σ ita NZ ad EM , habebimus punctum M , & ejus ope diametrum quæsitam, tam magnitudine quam positione, per ea quæ in sexta hujus ostendimus.

Ratio autem proposita non major esse potest ratione Axis majoris ad latus ejus rectum; nec minor ratione Axis minoris ad latus ejus rectum; hoc est non minor ratione lateris recti Axis majoris ad Axem ipsum.

PROPOSITIO XXIII. PROBL.

Datis Hyperbolæ Axe & latere recto; oporteat invenire dia-
metri situm & magnitudinem, quæ datâ differentiâ diffe-
rat à latere suo recto.


Manentibus Hyperbolæ figuris, puta factum; sitque diameter quæsitæ BK , eademque parallela $\Gamma\Delta$, ac demittatur normalis ΔM . Erit itaque (per 16^{am} VII^{mi}) ut quadratum ex $\Delta\Gamma$, sive rectangulum sub $N\Gamma, \Gamma\Delta$, ad rectangulum sub $N\Gamma, MZ$ (hoc est ut $\Gamma\Delta$ ad MZ) ita quadratum differentię diametri BK laterisque ejus recti ad quadratum ex EN . Data autem est ratio quadrati differentię istius ad quadratum ex EN , ob datas ipsas: quare datur ratio $\Gamma\Delta$ ad MZ ; & ob datam $\Gamma\Delta$, recta MZ quoque datur, adeoque & punctum M .

Componetur autem problema hoc modo. Fiat ut quadratum differentię datæ ad quadratum ex EN , ita summa Axis laterisque ejus recti ad MZ : invento autem puncto M peragantur cætera ad modum superius dictum.

Ac constabit differentiam datam minorem esse debere differentiâ inter Axem ejusque latus rectum, ex iis quæ in 6^a VII^{mi} demonstrata sunt, uti & ex ipsâ

constructione: sunt enim rectæ omnes MZ reciprocè ut quadrata differentiarum inter diametros lateraque earundem recta: adeoque perpetuo augentur dum differentię illæ decrescunt, quæ proinde ad *Minimam* nunquam devenire possunt.

Diametrorum autem magnitudines aliunde obtinebimus: cum enim differentia inter cujusvis diametri quadratum & figuram ejusdem (per 29^{am} VII^{mi}) sit ubique æqualis



cessu quo NZ & ψ simul superant MZ ; quod quidem rectangulum datum est, ob datum quadratum ex NZ . Adjacet autem rectangulum illud rectæ æquali ipsis NZ & ψ simul, deficiens quadrato; ac proinde (*per Lem. 2. Schol. nostr.*) data est recta EM , & ob datum EM punctum M datur.

Componetur itaque hoc modo. Fiat OE æqualis dimidio ipsius ψ , à O versus N ponenda; & erecta normali ET , ponatur ET ipsi OE æqualis: dein centro T radio TE describatur arcus circuli $MΣμ$ occurrens Axi in punctis $M, μ$; è quorum utroque habebitur positio diametri quæ habeat à latere suo recto propositam differentiam. In alterâ autem diameter excedet latus rectum, in altera vero latus rectum eâdem differentia superabit diametrum.

Hujus autem problematis *δοξασμὸς* ex Proposit. 37^{ma} VII^{mi} petendi. Nam si differentia proposita major fuerit eâ qua Axis major superat latus ejus rectum, cadet punctum M extra Axem, ultra verticem A : ac si major fuerit differentia quæ est inter Axem minorem & latus ejus rectum, cadet quoque punctum $μ$ ultra verticem Γ : unde omnino impossibile erit problema. Hac vero si minor fuerit, sed major eâ quæ inter Axem majorem & latus ejus rectum intercedit, duabus diametris utrinque Axi minori adjacentibus satisfactum erit problemati. Si vero differentia proposita minor fuerit differentia inter Axem majorem & latus ejus rectum, cadet utrumque M & $μ$ in Axe AT , & omnino habebuntur quatuor diversæ diametri quarum differentiæ à lateribus suis rectis æquales erunt inter se & eidem datæ. *Minima* autem non datur differentia, sed in diametris conjugatis æqualibus evanescit, punctis M & $μ$ in centro O coeuntibus.

Coroll. Ac nullo negotio demonstrabitur, duarum diversarum diametrorum rem propositam præstantium differentiam æqualem esse dimidio datæ differentiæ inter diametros illas & latera sua recta: adeoque si data fuerit altera harum diametrorum una cum latere ejus recto, alteram facile invenies. Etenim datarum (diametri & semi-differentiæ) summa ac differentia æquales sunt, altera quidem diametro, altera lateri ejus recto, quæsitis.


Coroll. 2. Quare duplum diametri alicujus æquale erit alteri diametro ejusque lateri recto simul sumptis, quarum differentia æqualis sit differentiæ inter datam diametrum & latus rectum ejusdem.

Coroll. 3. Eodemque argumento patebit. Ellipseos diametrum, cujus conjugata ipsi æqualis est, mediam proportionalem esse inter duas quasvis diametros sectionis, quarum altera excesserit latus suum rectum eodem excessu quo latus rectum alterius superat diametrum.

PROPOSITIO XXV. PROBL.

Datis in Hyperbola Axe & latere ejus recto; oporteat invenire positionem diametri illius, quæ una cum latere suo recto datam conficit summam.


Iisdem positis ac in præcedentibus Hyperbolæ Schematis, puta factum quod quæritur: ac sit BK diameter illa quæ cum latere suo recto propositam facit summam. Per 17^{am} VII^{mi} quadratum ex AT , sive rectangulum $N\Gamma\Delta$, id est, quod sub $N\Gamma$ & utroque Axe & latere ejus recto simul, est ad rectangulum sub $N\Gamma$ & MZ , sicut quadratum summæ diametri alicujus BK & lateris ejus recti ad quadratum rectæ compositæ ex NM , MZ simul sumptis: erit igitur ut summa Axis & lateris ejus recti



CONICORUM LIB. VIII. RESTITUTUS. 161

recti ad MZ , ita quadratum ex BK & latus ejus rectum simul ad quadratum ex NM , MZ simul, five ad quadruplum quadrati ex ΘM . Hinc si fiat ut summa Axis & lateris recti ad semi-summam propositam, ita eadem semi-summa ad aliam, puta ad ψ ; erit recta ψ data, & rectangulum sub MZ & ψ æquale erit quadrato ex ΘM : adeoque MZ erit ad ΘM sicut ΘM ad ψ ; ac dividendo $z\Theta$ erit ad ΘM sicut differentia inter ΘM & ψ ad ipsam ψ : datum igitur rectangulum sub $z\Theta$ & ψ æquale erit contento sub ΘM & differentia ipsarum ΘM & ψ ; ac proinde datum est rectangulum illud. Adjacet autem rectæ ψ excedens quadrato, si Axis sectionis major fuerit latere ejus recto; deficiens vero quadrato, si latus rectum Axis majus fuerit ipso Axe: unde (per *Lemma 3^{um} vel 4^{um} Scholii*) manifesta erit in utroque casu problematis constructio.


Sed ut in præcedentibus, ita in hoc quoque problemate, paulo paratior habetur Compositio. Cum enim MZ sit ad ΘM sicut ΘM ad ψ ; per conversionem rationis & permutando erit MZ ad ΘM sicut $z\Theta$ ad excessum quo ΘM superat ψ : ac rursus per conversionem rationis MZ erit ad $z\Theta$ sicut $z\Theta$ ad excessum quo $z\Theta$ & ψ simul superant ΘM , excessum scilicet quo MZ superat ipsam $z\Theta$; hoc est, MZ erit ad $z\Theta$ sicut $z\Theta$ ad excessum quo dupla ipsius $z\Theta$ & ψ simul superant MZ , si latus rectum minus fuerit Axe. Ubi vero Axis minor fuerit latere recto, pari ratione erit ut MZ ad $z\Theta$ ita $z\Theta$ ad excessum quo differentia inter ψ & duplam ipsius $z\Theta$ superat MZ : rectangulum igitur sub MZ & dictum excessum æquale erit quadrato ex $z\Theta$. Data autem $z\Theta$, datum est rectangulum illud, adjacens rectæ datæ, æquali nempe ipsi ψ auctæ vel minutæ duplo ipsius $z\Theta$, & deficiens quadrato: unde (per *Lemma 2^{dum} Schol.*) data erit recta MZ , punctumque M datum.



Componetur itaque hoc modo. Fiat ut dupla summa Axis & lateris ejus recti, five ΓA bis, ad datam semi-summam diametri & lateris ejus recti, ita eadem semi-summa ad tertiam proportionalem, quæ ideo æqualis erit dimidio rectæ quam ψ diximus; ac fiat ΘE (versus A ponenda) eidem dimidio rectæ ψ æqualis; unde zE æqualis erit dimidio ejus cui applicandum est rectangulum æquale quadrato ex $z\Theta$, idque in utroque Casu. Erigatur igitur (per *Lemma 2^{dum}*) normalis EX ipsi $z\Theta$ æqualis, ac centro X radio zE describatur arcus circuli occurrens Axi in puncto M , vel etiam in punctis M, μ , si problema dupliciter construi possit; uti proxime docebitur.

Determinatur autem problema hoc ex propositionibus 38^{va}, 39^{na} & 40^a Septimi. Nam si Axis sectionis major fuerit latere ejus recto, per 38^{am} erit summa Axis & lateris ejus recti minor quavis aliâ diametro una cum latere ejus recto simul sumpto; oportebit igitur summam propositam majorem esse Axe & latere ejus recto simul. Nec aliter si Axis minor fuerit latere ejus recto, sed non minor tertia parte ejusdem; nam, per 39^{am} Septimi, constat quoque summam Axis laterisque ejus recti minorem esse summâ diametri alterius cujuscvis & lateris ejus recti: ea igitur major esse debet summa proposita; aliter problema erit impossibile.

Quod si Axis Hyperbolæ minor fuerit tertia parte lateris ejus recti, erit $z\Theta$ major quartâ parte Axis; ac si fiat zE ipsi $z\Theta$ æqualis, cadet punctum E in Axe ultra verticem A ; erectæque normali EX ipsi $z\Theta$ æquali, circulus centro X radio zE , hoc est $z\Theta$, continget Axem in puncto E ; ac proinde diameter BK , cujus positio hoc in casu determinatur per punctum E coincidens cum puncto M , *Minimam* omnium habebit summam sui laterisque sui recti. Et quoniam NE tripla est ipsius zE , erit (per 6^{am} VII^{mi}) latus rectum diametri BK triplum ipsius zE , quod quidem plenius in 40^{ma} VII^{mi} demonstratum invenietur. Diameter autem illa BK




Sf

(per

dratum ex $N\Xi$. Sed data sunt cætera; ergò datur quoque $M\Xi$: nam quadratum summæ propositæ est ad quadratum ex $N\Xi$ sicut differentia Axis & lateris ejus recti ad $M\Xi$: & datò puncto Ξ , punctum M quoque datur.

Manifesta autem est Compositio. Fiat enim ut quadratum è summâ propositâ ad quadratum ex $N\Xi$, ita differentia Axis laterisque recti ejusdem ad rectam ipsi $M\Xi$ æqualem, quæ ponatur à Ξ versus N ; ac, si problema propositum possibile sit, cadet punctum M in Axe AT : obtento autem puncto M , cætera efficiantur ut in præmissis.




Hujus autem problematis limites ex 41^{ma} Septimi petendi sunt; nam summa illa non minor esse potest Axe majore & latere ejus recto simul: nec major summâ Axis minoris & lateris recti ejusdem. In priori casu cadet punctum M ultra verticem A , in posteriore citra punctum Γ , extra Ellipsin.

Diametrum autem ipsam, datâ summâ ejusdem & lateris ejus recti, satis expedite invenire licet. Nam, per 30^{am} VII^{mi}, rectangulum sub qualibet diametro & summâ ejusdem & lateris recti æquale est rectangulo sub Axe & Axe unâ cum latere ejus recto simul sumpto: proinde *ἀνάλογον* erit ut summa proposita diametri alicujus & lateris ejus recti ad summam Axis laterisque recti Axis, ita ipse Axis Ellipseos ad diametrum quæsitam: unde manifestum est, ob datum Axem ejusque latus rectum, summam diametri cujuscvis & lateris ejus recti reciprocè proportionalem esse ipsi diametro Ellipseos.

PROPOSITIO XXVII. PROBL.

DAtis lateribus figuræ Axis Hyperbolæ, oporteat invenire positionem diametri quæ habeat figuram ejus, sive rectangulum sub diametro & latere ejus recto, proposito rectangulo æquale.

Iisdem manentibus quæ in figuris Hyperbolæ præmissis, erit (per 18^{am} VII^{mi}) quadratum ex AT ad rectangulum sub diametro BK & latere ejus recto, sicut NT ad MN ; sed quadratum ex AT ostensum est æquale rectangulo sub NT & summa Axis & lateris ejus recti: quare, ob utrinque inventum NT , erit rectangulum sub MN & summa Axis & lateris ejus recti æquale rectangulo sive figuræ propositæ: si igitur rectangulum illud datum applicetur rectæ datæ, nempe ipsi TA , summæ Axis & lateris ejus recti; latitudo ex applicatione orta æqualis erit quæsitæ MN , quæ proinde data est: ac ob datum punctum N punctum M quoque datur.



Applicetur igitur figura proposita ad summam Axis & lateris ejus recti, ac ponatur inventa latitudo à puncto N versus A , ut NM ; ac si major fuerit NM quam NA , possibile erit problema: invento autem puncto M , peragantur cætera ut in præcedentibus. *Διορισμὸν* autem habet ex 42^{da} VII^{mi}, qua demonstratur figuram propositam minorem esse non posse figurâ Axis: Maximam autem figuram non habet Hyperbola.


PROPOSITIO XXVIII. PROBL.

Datis lateribus figuræ Axis Ellipseos, proponatur sectionis diametrum illam invenire, quæ cum suo latere recto datam figuram sive rectangulum contineat.

Iisdem positis ac in Schematis Ellipseos præcedentibus; argumento omnino consimili probabitur (ex 18^{ta} VII^{mi}) rectangulum sub MN & differentiâ Axis & lateris ejus recti æquale esse figuræ propositæ, sive rectangulo sub diametro quæsitâ & latere ejus recto: quare si rectangulum illud datum applicetur rectæ datæ, hoc est, differentiæ Axis & lateris ejus recti, latitudo inde orta æqualis erit quæsitæ MN , quæ propterea data est: ac dato puncto N , datur etiam punctum M .

Applicato igitur rectangulo proposito ad rectam $r\delta$ differentiæ Axis & lateris ejus recti æqualem, latitudini ex applicatione inventæ æqualis fiat NM , à N versus centrum ponenda; ac

si punctum M cadat in Axe, sive inter A & r , problema possibile erit: ac dato puncto M erigatur normalis MA , cujus quadratum sit ad rectangulum $AM\Gamma$ ut latus rectum Axis ad



ipsum Axem; junctæque rA parallela ducatur BK , quæ, per demonstrata in præmissis, diameter erit quam quærimus.

Limites autem habet problema hoc ex 43^{ta} Septimi, qua constat figuram propositam non minorem esse figurâ Axis majoris; aliâs enim caderet punctum M citra A , extra sectionem: nec potest esse major figurâ Axis minoris; hoc enim si fuerit, caderet M extra sectionem, ultra verticem r . Nec opus est ut toties repetamus, reperiri aliam diametrum ipsi BK æqualem, parique intervallo alteri Axis lateri adjacentem, quæ quoque rem propositam efficiat.

In hac autem, uti & in præcedente, diametrum quæsitam habebimus, ope 29^{am} & 30^{am} VII^{mi}. Nam cum in Ellipfi (per 30^{am}) summa quadrati & figuræ Axis sit semper æqualis summæ quadrati diametri cujuscunque & figuræ ejusdem; si de datâ summâ quadrati & figuræ Axis auferatur data figura diametri quæsitæ, restabit quadratum ipsius diametri. In Hyperbola autem differentia quadrati & figuræ Axis (per 29^{am} VII^{mi}) æqualis est differentiæ quadrati & figuræ cujuscunque diametri; erit igitur excessus, quo quadratum Axis & proposita figura simul superant figuram Axis, æqualis quadrato diametri quæsitæ.

PROPOSITIO XXIX. PROBL.

Datis lateribus figuræ Axis Hyperbolæ, proponatur diametrum sectionis invenire, cujus quadratum una cum quadrato lateris recti ejusdem datam conficiat summam.

Iisdem positis, quæ in prioribus Hyperbolæ Schematis descripta sunt, puta factum; & sit BK diameter illa quam quærimus: erit igitur (per 19^{am} VII^{mi}) quadratum ex $A\Gamma$, sive rectangulum sub $N\Gamma$ & summâ Axis & lateris ejus recti, ad rectangulum sub $N\Gamma$ & $M\Xi$; hoc est, ut summa Axis & lateris recti ad $M\Xi$, ita proposita summa quadratorum ex BK & latere ejus recto ad summam quadratorum ex NM & $M\Xi$: ac applicatâ quadratorum summâ illâ datâ ad summam Axis & lateris ejus recti, erit rectangulum sub $M\Xi$ & latitudine ex applicatione ortâ, quæ sit ψ , æquale summæ quadratorum ex MN & $M\Xi$.

Jam Axis sectionis vel major erit latere ejus recto, vel minor, vel eidem æqualis; ac

ac primum sit major eo; unde (per 6^{am} VII^{mi}) ME major erit quam NM , ac (per 7^{am} II^{di} *Elem.*) quadrata ex NM , ME simul æqualia erunt duplo rectangulo sub NME & quadrato ex NZ : quocirca rectangulum sub ME & datâ latitudine ψ nuper inventâ, æquale erit duplo rectangulo sub NME & quadrato ex NZ . Sed NM excessus est quo ME superat NZ ; adeoque duplum rectangulum NME æquale est duplo excessus quo quadratum ex ME superat rectangulum sub NEM : quadratum igitur ex NZ , una cum duplo excessu quo quadratum ex ME superat rectangulum NEM , æquale est rectangulo sub ψ & ME : ac dempto utrinque duplo illius excessus, erit differentia, qua rectangulum sub ME & ψ superat duplum excessum quadrati ex ME supra rectangulum NEM , æqualis quadrato ex NZ : ac dimidiando erit rectangulum sub ME & semisse ipsius ψ & NZ simul, dempto quadrato ex ME , æquale semissi quadrati ex NZ . Datur autem quadratum ex NZ : datum igitur est rectangulum sub ME & $\frac{1}{2}\psi$ & NZ simul, deficiens quadrato ex ME : adjacet autem rectâ datâ, nempe ipsi $\frac{1}{2}\psi$ & NZ simul sumptæ: datur igitur ME ; ac dato puncto Z , datur quoque punctum M .



Componetur autem problema ad hunc modum. Descriptis cæteris ut prius, applicetur pars quarta summæ quadratorum propositæ ad $\Gamma\Delta$ summam Axis & lateris ejus recti; ac ponatur latitudo applicatione obtenta, quæ sit ϕ , (quæque quartæ parti ipsius ψ æqualis est) in Axe versus verticem A , de centro Θ ad E , ita ut rectangulum sub $\Gamma\Delta$, ΘE sit æquale quartæ parti datæ quadratorum summæ; & erigatur normalis EX : factâque $\Theta\Pi$ in Axe minore ipsi ΘZ vel ΘN æquali, jungatur $N\Pi$, & capiatur EX eidem æqualis: dein centro X radio XE describatur circuli portio, quæ occurrat Axi in puncto M , ad quod erigatur Axi normalis MA ; cæteraque fiant quæ in præcedentibus. Demonstratio autem Analyfi reciproca satis manifesta est, cum scilicet facta sit EX æqualis ei quæ potest duplum quadrati ex EO , five semissi quadrati ex NZ .

Neque alium habet limitem, præterquam quod in 44^{ta} VII^{mi} demonstratum sit summam quadratorum Axis laterisque ejus recti minorem esse summâ quadratorum laterum figuræ cujuslibet alterius diametri. Hâc igitur si summa proposita minor fuerit, cadet punctum M citra verticem, five extra sectionem; vel circulus Axem non attinget: ac proinde problema impossibile erit.

PROPOSITIO XXX. PROBL.

Iisdem positis, sit jam Axis Hyperbolæ minor latere ejus recto; ac oporteat invenire diametrum sectionis, quæ habeat quadrata laterum figuræ ejus simul sumpta æqualia dato rectangulo.

Per ea quæ in præcedente demonstravimus, ex 19^{na} VII^{mi} erit ut summa Axis & lateris ejus recti ad ME , ita proposita quadratorum summa ad summam quadratorum ex NM & ME : quare applicatâ summâ illâ datâ ad summam Axis & lateris ejus recti, erit rectangulum sub ME & datâ latitudine ex applicatione ortâ, quæ sit recta ψ , æquale summæ quadratorum ex MN , ME . Quoniam vero Axis AG minor est quam latus ejus rectum, erit ME minor quam MN . Verum (per 7^{am} II^{di} *Elem.*) quadrata ex MN , ME simul æqualia erunt duplo rectangulo sub NME una cum quadrato ex NZ , hoc est, duplo rectangulo sub ME ; & ME , NZ simul una cum quadrato ex NZ : quapropter rectangulum sub ME & ψ æquale erit duplo rectangulo sub ME , NZ simul & ME una cum quadrato ex NZ : & utrinque sublato communi, duplo nempe rectangulo sub NZ , ME simul & ME , erit excessus, quo rectangulum sub ψ & ME superat duplum rectangulum



T t

NEM



NEM & duplum quadratum ex $M\Xi$ simul, æqualis quadrato ex $N\Xi$: ac, capiendo æqualium dimidia, erit rectangulum sub $M\Xi$ & excessu quo $\frac{1}{2}\psi$ superat ipsam $N\Xi$ dempto quadrato ex $M\Xi$, æquale dimidio quadrati ex $N\Xi$: datur autem quadratum ex $N\Xi$; adeoque datur rectangulum sub dicto excessu & $M\Xi$. Adjacet autem rectangulum illud datæ rectæ, nempe differentię ipsarum $\frac{1}{2}\psi$ & $N\Xi$, deficiens quadrato: datur itaque $M\Xi$, ac ob datum punctum Ξ , datur quoque M .

Compositio autem hoc in casu nihil differt à præcedente, nisi quod hic punctum Ξ vertici A jam vicinior fit quam centrum Θ : applicatâ igitur quartâ parte summæ quadratorum propositæ ad summam Axis & lateris ejus recti, ponatur latitudo inde orta, quæ sit ϕ , à Θ versus verticem A , ut ΘE ; ac ad punctum E & ad angulos rectos super Axem erigatur recta EX æqualis ipsi $N\pi$, quæ possit dimidium quadrati ex $N\Xi$; & centro X , radio ΞE describatur arcus circuli, qui quidem, si problema possibile fit, occret Axi ultra verticem, in puncto M , vel etiam in punctis M, μ , sub certis conditionibus mox dicendis.

Διοκλεμὲς autem habet problema hoc ex 45^{ta} & 46^{ta} Septimi. Nam, per 45^{am}, si quadratum Axis Hyperbolæ non minus fuerit dimidio quadrati differentię inter Axem & latus ejus rectum, summa quadratorum Axis & lateris ejus recti minor erit quadratis laterum figuræ cujuscvis alterius sectionis diametri simul sumptis: ac proinde oportebit propositam summam majorem esse quadratis laterum figuræ Axis; ac quo major fuerit summa illa, tanto longius aberit ab Axe diameter quam quærimus.

Si vero quadratum Axis minus fuerit dimidio quadrati differentię inter Axem & latus ejus rectum, demonstratur, in 46^{ta} VII^{mi}, quod ab utraque Axis parte reperiatur diameter, cujus quadratum, una cum quadrato lateris ejus recti simul, minus erit summâ quadratorum laterum figuræ cujuscunque alterius diametri, ab eadem Axis parte sumendæ; quodque huic utrinque propiores diametri minorem habent summam quadratorum laterum figuræ quam ab eadem remotiores: hoc enim in casu punctum E cadet in Axe Hyperbolæ ultra verticem producto; ac EX , sive ea quæ poterit dimidium quadrati ex $N\Xi$, æqualis erit ipsi ΞE , ac circulus centro X descriptus continget Axem in puncto E , hoc in casu cum puncto M coincidente: adeoque quartâ pars ipsius ψ , sive ΘE , æqualis erit ei quæ poterit duplum quadrati ex $\Xi\Theta$ una cum ipsâ $\Xi\Theta$; ac proinde ΘE erit ad $\Xi\Theta$ sicut diagonium quadrati & latus ejus simul ad latus quadrati, sive ut $\sqrt{2+1}$ ad 1. Rectangulum autem sub ΘE , hoc est $\frac{1}{2}\psi$, & summâ Axis & lateris ejus recti, æquale est (per construct.) quartæ parti minimæ quadratorum summæ; ac proinde rectangulum sub sub $\sqrt{2+1} \times N\Xi$ & summâ Axis & lateris ejus recti æquale erit dimidio minimæ illius summæ. Cum autem summa Axis & lateris ejus recti sit ad differentiam earundem sicut Axis ad $N\Xi$; erit rectangulum sub $N\Xi$ & summâ Axis & lateris ejus recti æquale excessui quo figura Axis superat Axis quadratum; adeoque *Minima* summa quadratorum è lateribus figuræ erit ad excessum quo figura Axis superat Axis quadratum sicut $\sqrt{8+2}$ ad unitatem, sive ut dupla summa diagonii quadrati & lateris ejus ad ipsum latus.

Hac igitur *Minima* summâ si minor fuerit proposita, impossibile erit problema; circulo, cujus radius est ΞE , Axem non attingente. Si vero major fuerit eâ, minor vero summâ quadratorum è lateribus figuræ Axis; occurret circulus Axi in duobus punctis ultra verticem, ut ad M & μ ; quorum ope, modo toties dicto, invenientur duæ diametri ab utroque Axis latere, hoc est omnino quatuor, quæ habeant eandem propositam quadratorum laterum figuræ summam. Quod si data summa æqualis fuerit summæ quadratorum è lateribus figuræ Axis, coincidet punctum μ cum



cum vertice A; punctum M vero dabit duas alias diametros, ab utraque scilicet Axis parte unam, quæ habeant eandem summam. Verum si major fuerit summa proposita quam est summa quadratorum laterum figuræ Axis, cadet punctum μ citra verticem A: at alterum punctum occursus M duas præbebit diametros, utrinque unam, quæ problemati satisficient. *Maxima* autem quadratorum summa, ex natura Hyperbolæ, dari non potest.

Quod si Axis æqualis fuerit lateri ejus recto, erunt quoque (per 23^{am} VII^{mi}) diametri omnes lateribus suis rectis æquales; adeoque dimidium summæ propositæ æquale erit quadrato diametri quam quærimus.

Coroll. 1. Hinc manifesto constabit duarum diametrorum Hyperbolæ, eandem summam quadratorum laterum figuræ habentium, quadrata simul sumpta æqualia esse excessui quo semi-summa illa quadratorum laterum figuræ, una cum quadrato Axis, superat Axis figuram.

Coroll. 2. Proinde quadratum diametri illius, quæ eandem habet summam ac ipse Axis, æquale erit excessui quo femi-summa illa quadratorum laterum figuræ superat figuram Axis; hoc est dimidio quadrati ex differentia Axis & lateris ejus recti. Quadratum autem lateris recti ejus æquale erit eidem femi-summæ quadratorum laterum figuræ Axis una cum eorundem rectangulo sive figurâ Axis simul sumptâ; hoc est dimidio quadrati è summâ utriusque & Axis & lateris ejus recti.

Coroll. 3. Idem dicendum de alia quavis datâ diametro, quæ non fit Axis sectionis.

PROPOSITIO XXXI. PROBL.

DAtis lateribus figuræ Axis Ellipseos, oporteat invenire diametrum, cujus quadratum, una cum quadrato lateris ejus recti simul sumpto, propositam conficiat summam.

Manentibus iis quæ in præcedentibus Ellipseos Schematis descripta sunt, puta factum; sitque BK diameter illa quam quærimus. Erit igitur (per 19^{am} VII^m) ut quadratum ex AF, five rectangulum sub NF & differentia Axis & lateris ejus recti, ad rectangulum sub NF & MZ, hoc est ut $\Gamma\delta$ differentia Axis & lateris ejus recti ad MZ, ita summa illa proposita ad summam quadratorum ex MN, MZ; adeoque applicato rectangulo summæ propositæ æquali ad differentiam Axis & lateris recti, dicatur latitudo inde orta ψ , quæ proinde data est. Ac manifestum est rectangulum sub MZ & ψ æquale esse quadratis ex MN, MZ simul. Verum (per 4^{am} II^{di} Elem.) quadratum ex NZ æquale est quadratis ex MN, MZ simul una cum duplo rectangulo sub NMZ, hoc est quadratum ex NZ æquale est rectangulo sub MZ & ψ una cum duplo rectangulo sub NMZ; rectangulum autem sub NMZ æquale est rectangulo sub NZM dempto quadrato ex MZ: quapropter rectangulum sub MZ & utraque NZ & $\frac{1}{2}\psi$ simul, dempto quadrato ex MZ, æquale est dimidio quadrati ex NZ. Sed datur quadratum ex NZ: datum est igitur rectangulum sub MZ & utraq; NZ & $\frac{1}{2}\psi$ simul, dempto quadrato ex MZ. Adjacet autem rectæ datæ, ipsis nempe $\frac{1}{2}\psi$ & NZ simul sumptis æquali, deficiens quadrato: data est igitur recta MZ, datumque punctum M.

Componetur itaque problema ad hunc modum. Applicetur quarta pars datae

T t 2

summæ


summæ quadratorum ad differentiam Axis & lateris ejus recti; ac latitudini inventæ, five quartæ parti ipsius ψ , æqualis ponatur recta ΘE in Axe, de centro Θ versus N ; & ad punctum E erigatur normalis EX ipsi EN æqualis, five quæ poterit dimidium quadrati ex NZ : dein centro X radio XE describatur arcus circuli, qui, si problema propositum possibile sit, occurret Axi inter A & Γ , ad punctum M ; & erecta ad Axem normali MA , habebitur tam magnitudo quam positio diametri quæsitæ BK .

Determinatur autem problema ex 47^{ma} & 48^{va} VII^{mi}. Nam si quadratum Axis majoris Ellipseos non majus fuerit dimidio quadrati summæ laterum figuræ ejusdem Axis, manifestum est (per dictam 47^{am}) summam quadratorum propositam minorem esse non posse quam quadrata laterum figuræ Axis majoris simul sumpta, quo in casu punctum M cadet citra verticem A ; nec majorem quam quadrata laterum figuræ Axis minoris simul sumpta: nam hoc posito punctum M cadet ultra verticem Γ , ac impossibile erit problema. Si vero quadratum Axis majoris æquale fuerit dimidio quadrati summæ laterum figuræ ejus, ac proponatur summa, summæ quadratorum laterum figuræ Axis æqualis, coincidit punctum E cum puncto A ; in cæteris vero casibus longius aberit E à centro Θ , & extra sectionem cadet.

Verum si quadratum ex Axe AG majus fuerit dimidio quadrati è summa laterum figuræ Axis, reperietur (per 48^{am} VII^{mi}) ab utraque Axis parte diameter, cujus quadratum æquale erit dimidio quadrati ex eadem diametro & latere ejus recto simul sumpto; cujus quidem diametri quadratum una cum quadrato lateris sui recti omnium *Minimam* conficiet summam: ac quadrata laterum figuræ diametri huic utrinque propioris minora erunt quadratis laterum figuræ diametri ab eadem remotioris, prout ibidem demonstratur. Quænam autem fuerit minima illa summa, eodem argumento quo in Hyperbola usi sumus, statim patebit. Quoniam enim punctum M , in hoc *summæ minimæ* casu, coincidit cum puncto E ; erit XE , quæ semper æqualis est ei quæ poterit duplum quadrati ex $N\Theta$, rectæ ZE æqualis; adeoque ΘE æqualis erit excessui quo potens duplum quadrati ex $N\Theta$ superat $N\Theta$: quare ΘE erit ad $N\Theta$ sicut excessus quo diagonium quadrati superat latus ejus ad ipsum latus, five ut $\sqrt{2} - 1$ ad 1.

Per constructionem autem, rectangulum sub ΘE & differentia Axis & lateris ejus recti æquale est quartæ parti summæ quadratorum laterum figuræ; adeoque rectangulum sub $\sqrt{2} - 1 \times NZ$ & differentia Axis & lateris ejus recti æquale erit dimidio summæ minimæ quadratorum laterum figuræ, quam quærimus. Cum autem differentia Axis & lateris ejus recti sit ad earundem summam sicut ipse Axis ad NZ ; erit rectangulum sub NZ & differentia Axis & lateris ejus recti æquale rectangulo sub Axe & summâ Axis & lateris ejus recti; hoc est, quadrato Axis & figuræ ejusdem simul, five summæ quadratorum ex utroque Axe: *Minima* igitur summa quadratorum è lateribus figuræ erit ad summam quadratorum Axium Ellipseos sicut $\sqrt{8} - 2$ ad unitatem, five ut duplus excessus quo diagonium quadrati superat latus ejusdem ad ipsum latus.

Quapropter, si in Ellipfi proponeretur inquirere diametrum, quæ habeat summam quadratorum laterum figuræ minorem jam ostensâ, impossibile erit problema, ac circulus juxta leges compositionis descriptus non attinget Axem. Si vero major fuerit dictâ *Minimâ*, minor vero quam summa quadratorum laterum figuræ Axis, conveniet circulus cum Axe in duobus punctis M, μ intra sectionem; ac proinde



CONICORUM LIB. VIII. RESTITUTUS. 169

ab utroque Axis latere habebuntur duæ diametri, hoc est omnino quatuor, quæ habeant propositam summam quadratorum laterum figuræ. Ac si æqualis fuerit summa proposita quadratis ex Axe & è latere ejus recto simul sumptis, ipse Axis ac duæ aliæ diametri, utrinque una, rem præstant. Verumtamen si proposita summa adhuc major, sed quæ minor sit summâ quadratorum è lateribus figuræ Axis minoris; invenietur ab utroque Axis latere una diameter, quæ problemati satisfaciat, cadente adhuc puncto M intra sectionem. *Maxima* autem quadratorum summa ea est quæ fit è quadratis laterum figuræ Axis minoris; quæque est ad summam quadratorum è lateribus figuræ Axis majoris in ratione Axis ad latus ejus rectum. Hæc si major proponatur, rursus impossibile erit problema, egresso jam puncto M ultra verticem r.

Coroll. 1. Summa autem quadratorum duarum quarumvis diametrorum, eandem quadratorum laterum figuræ summam habentium, æqualis est propositæ quadratorum semi-summæ una cum rectangulo sub Axe & Axe cum latere ejus recto simul sumpto; sive una cum quadratis ex utroque Axe simul.

Coroll. 2. Ac proinde diameter illa, quæ eandem habet quadratorum summam quam habet Axis ipse, æqualis erit ei quæ poterit dimidium quadrati ex Axe & latere ejus recto simul sumptis: latus autem rectum ejus poterit dimidium quadrati excelsûs quo Axis major superat latus ejus rectum. Idemque verum est etiam si diameter data non fuerit Axis.

Coroll. 3. Unde manifestum est quatuor illas Ellipseos diametros, quoties quatuor sunt, quæ, ut dictum est, eandem habere possunt summam, semper cadere inter Axem majorem & conjugatas æquales; cum scilicet diametri majores sunt lateribus suis rectis.

Coroll. 4. Quadratum autem diametri ejus quæ omnium minimam habet quadratorum summam, erit ad eam quæ potest semi-summam quadratorum Axium, hoc est ad quadratum ex AO, sicut diagonium quadrati ad ejusdem latus, sive ut $\sqrt{2}$ ad 1: & latus rectum ejusdem diametri ad ipsam diametrum erit ut $\sqrt{2}$ ad 2 — $\sqrt{2}$.


Coroll. 5. Unde in omni Ellipsi, tam diametri quam latera recta, quarum summa quadratorum minima est, eandem semper habent rationem ad AO subtensam quadrantis Ellipseos.

Coroll. 6. Ac manifestum est, ex determinationibus jam dictis, quod, si Axis major majorem habeat rationem ad Axem conjugatam quam habet Unitas ad $\sqrt{2-1}$, sive quam 1 ad 0,6436; duci possunt quatuor diametri, quæ eandem habeant quadratorum sui & lateris sui recti summam: aliter vero non item.

PROPOSITIO XXXII. PROBL.

Datis Hyperbolæ Axe & latere recto; invenire diametrum ejus, cujus quadratum à quadrato lateris recti ejus datâ differentiâ differat.

Manentibus Hyperbolæ figuris in præcedentibus descriptis, puta factum: sitque BK diameter quæsitâ, cujus quadratum differat à quadrato lateris sui recti datâ differentiâ. Per 20^{am} VII^{mi} erit quadratum Axis sectionis, sive rectangulum sub NF, rA, ad rectangulum sub NF, MZ, hoc est ΔF ad MZ, sicut differentia quadratorum proposita ad differentiam quadratorum ex NM, MZ. Est autem differentia quadratorum ex NM, MZ (per 6^{am} II^{di} El.) æqualis quadruplo rectanguli sub ΘM , ΘZ ; adeoque si fiat rectangulum sub rA & aliâ quadam ψ æquale quartæ parti differentiæ quadratorum propositæ, data erit recta ψ : ac, argumento toties usurpato, rectangulum sub MZ & ψ æquale erit rectangulo sub ΘM , ΘZ ; erit igitur *analogum* ut ΘZ ad ψ ita MZ ad ΘM , ac dividendo erit differentia ipsarum ΘZ & ψ ad



U u

CONICORUM LIB. VIII. RESTITUTUS. 171

Ex iis autem quæ in ultima Propositione Libri Septimi traduntur problema hoc limites suos sortitur. Nam ex omnibus diametris Ellipseos quæ majores sunt lateribus suis rectis, Axis majoris quadratum majori spatio superat quadratum lateris sui recti: ex illis vero quæ lateribus suis rectis minores sunt, omnium *Maximam* habet quadratorum illorum differentiam Axis minor; quæ quidem differentia major est excessu quo quadratum Axis majoris superat quadratum lateris sui recti, in ratione lateris recti Axis majoris ad Axem ipsum. Quocirca si differentia data minor fuerit differentiâ quadratorum Axis majoris laterisque ejus recti, quatuor diversæ diametri, ab utroque Axis latere duæ, satisficient problemati; cadente utroque puncto M & μ inter vertex Ellipseos A, Γ . Quod si major fuerit hæc, minor vero differentiâ quadratorum Axis minoris & lateris ejus recti, duæ tantum diametri rem præstant, ab utroque scilicet Axis minoris latere. Verum si hac quoque major fuerit, problema impossibile erit, cadente utroque puncto M, μ extra Axem $A\Gamma$. *Minima* autem non datur quadratorum differentia: nam in æqualibus diametris conjugatis differentia hæc nulla evadit, quia diametris ipsis æqualia fiunt latera recta.

Quoniam vero ZE est ad EO sicut EO ad EM , erit EO ad OE sicut EM ad MO : ac pari ratione EO erit ad OE , hoc est ad OE , sicut EM ad MO ; adeoque erit EM ad MO sicut EM ad MO . Quocirca in omni casu recta EM Harmonice dividitur in punctis O, μ ; ac proinde, data qualibet diametro, facile erit correspondentem invenire, quæ eandem habeat differentiam quadratorum sui laterisque sui recti.

Hactenus, eodem ubique observato ordine quo traduntur διασκευαί, operam dedimus resolutioni problematum illorum, quorum limites immediate pendent à propositionibus διασκευαίς libri Septimi: nec diversam fuisse libri Octavi deperditi materiam omnino mihi persuasum habeo. Speramus autem, si ita contigerit ut ipsas Apollonii Analyses & Compositiones minus assecuti simus, nos illud saltem præstitisse, ut quacunque in earum locum substituissemus a quo Lectori haud inconcinna videantur. Etiam si vero innumera fere sint Problemata Conica determinata, quorum Analyses ex his Elementis non multo studio peti possunt; in præsentia tamen, id solum nobis propositum fuit, ut Apollonii vestigia, quoad ejus fieri posset, premeremus. Quod si forte fortuna integrum Auctoris opus posthac lucem conspexerit, nobis leve damnum erit, ea conditione oleum & operam perdidisse.

F I N I S.

Σ Ε Ρ Η Ν Ο Υ

ΑΝΤΙΝΣΕΩΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΠΕΡΙ ΤΟΜΗΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΚΩΝΟΥ

ΒΙΒΛΙΑ ΔΥΟ.

S E R E N I

PHILOSOPHI ANTISSENSIS

DE SECTIONE

CYLINDRI ET CONI

LIBRI DUO.

Ex Codd. MSS. *Græcis* edidit EDMUNDUS HALLEIUS apud
Oxonienſes Geometriæ Profeſſor *Savilianus*.

[] a

VIRO REVERENDO,
Bonarum Literarum FAUTORI EXIMIO;
D. HEN. ALDRICHIO,
S. T. P.
ÆDIS CHRISTI DECANO,
SERENI ANTISSENSIS
DE SECTIONE
CYLINDRI & CONI
LIBELLOS,
Nunc primum GRÆCE & LATINE
EX SUO EXEMPLARI MS^o EDITOS,
IURE MERITOQUE
D. D. C.

EDM. HALLEIUS.

JOHN R. GANMAN

JOHN R. GANMAN

JOHN R. GANMAN

JOHN R. GANMAN

JOHN R. GANMAN

JOHN R. GANMAN

JOHN R. GANMAN

JOHN R. GANMAN

JOHN R. GANMAN

JOHN R. GANMAN

JOHN R. GANMAN

Σ Ε Ρ Η Ν Ο Υ

*ΑΝΤΙΝΣΕΩΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

Π Ε Ρ Ι

ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΤΟΜΗΣ.

S E R E N I

ANTISSENSIS PHILOSOPHI

DE

SECTIONE CYLINDRI

LIBER.

ΠΟΛΛΟΥΣ ὄραν, ὦ φίλε Κύρε, τὴν περὶ γεωμετρίας ἀναστροφὴν, οἰομένους ἢ τῇ κυλίνδρου πλαγίᾳ τομῇ ἐπὶ τῇ αὐτῇ τῇ κατὰ τομῆς τῆς καλυμμένης ἐλλείψει· ἰδιαιότατα μὴ χρῆσθαι θεωρεῖν ἀγνοήσαντας αὐτοὺς τι καὶ τὴν ἐκ αὐτῆς ὕψος φρεσὶν ἀκατασκευασμένους· καὶ τοὺς δόξαντες ἂν παντὶ ἄλλοι (εἴ), γεωμέτρως γε ὄντας περὶ γεωμετρικῶν προβλημάτων ἀνευ ἀποδείξεως ἀποφαινομένους πρὸς πιθανολογίαν ἀπεχθάνεσθαι, ἀλλότῃ γεωμετρίας περὶ γὰρ πᾶντα. ὁμοίως δ' ἐν ἐκείνῃ ὅπως ὑπεκλήφασιν, ἡμῶς δὲ ἐκ συμφερόμεθα, φέρε γεωμετρικῶς ἀποδείξωμεν, ὅτι μίαν καὶ τὴν αὐτὴν κατ' εἶδος ἀνάγκη γίνεσθαι ἐν ἀμφοτέρω τοῖς σχήμασι τομῇ, καὶ κῶν λέγω καὶ τῇ κυλίνδρῳ, τοίῳ δὲ μέντοι, ἀλλ' ἔχ' ἀπλῶς τεμνομένοις. ὥστε δὲ οἱ τὰ κοινὰ παραγματοποιούμενοι τὴν παλαιὰν ἐκ ἡμέτερας εἶναι τῇ κοινῇ ἐπινοίᾳ ἔκ κῶν, ὅτι τεργάνεω θεωρηθέντος ὀρθογωνίου συρίζεται, θεωροῦντες δὲ καὶ

CUM viderem, Amice Cyre, plurimos eorum qui in Geometria versantur, in ea esse opinione, transversam Cylindri sectionem plane diversam esse ab ista Coni sectione quæ Ellipsis vocatur; non committendum putavi, ut ab errore non liberarem tum eos ipsos, tum & illos quibus persuaserunt ita se rem habere: quod absurdum omnino videatur, Geometras de problemate Geometrico absque demonstratione quicquam affirmare, argumentis à probabili incite adhibitis; quod à Geometria quam maxime alienum est. Itaque quoniam hi ita sentiunt, nos vero illis non assentimur, libeat Geometrice demonstrare unam eandemque specie sectionem necessario fieri in utraque figura, in Cono inquam & Cylindro; si modo ratione quadam & non simpliciter fecentur. Quemadmodum autem Veteres qui Conica tractarunt, non contenti communi notitiâ Coni, nempe quod circumductu trianguli rectanguli describatur; uberius &

* Pro Ἀνωτίως juxta scribendi modum sequioris ævi Græcis familiarem.

universalius rem contemplati sunt, non tantum rectos sed etiam scalenos Conos statuentes: ita oportebit & nos, quoniam Cylindri sectionem tractandam proposuerimus, non de recto solum agere, sed insuper ad Cylindri scaleni sectionem disquisitiones nostras ulterius aliquanto extendere. Quanquam autem non ignoro, neminem fore qui non facile admittat omnem Cylindrum non rectum esse, communi id suadente ratione, tamen contemplationis gratiā melius esse judicavi definitione magis universali utrumque complecti; quoniam recti Cylindri sectionem eandem fore cum Ellipsi in solo Cono recto sectā probari continget: ex hypothesi vero universaliori Ellipsi cuilibet sectionem illam æquiparari deprehendetur; id quod in hoc libro demonstrandum suscipimus. Præmittendæ autem nobis sunt istæ ad rem propositam spectantes definitiones.

DEFINITIONES.

1. **S**I igitur duorum circulorum æqualium & æquidistantium diametri semper inter sese parallelæ, & ipsæ in circulorum planis circa inans centrum circumferantur; & unâ circumferatur recta linea diametrorum terminos ex eadem parte coniungens, quousque rursus in eum locum restituitur à quo moveri coepit: superficies, quæ à circumlata recta describitur, cylindrica superficies vocetur; quæ quidem & in infinitum augeri potest, rectâ ipsam describente in infinitum productâ.
2. Cylindrus autem figura, quæ circulis æquidistantibus & cylindrica superficie inter ipsos interjectâ continetur.
3. Cylindri vero bases, circuli ipsi.
4. Axis autem, recta linea quæ per circulorum centra ducitur.
5. Latus vero cylindri, linea quæ, cum recta sit & in superficie ipsius cylindri bases utrasque contingit; quamque circumlatam cylindri superficiem describere antea diximus.
6. E Cylindris autem recti quidem dicantur, qui axem habent ad rectos angulos existentem ipsis basibus.
7. Scaleni vero, qui non ad rectos angulos existentem ipsis basibus axem habent.

καθολικώτερον ἐφιλοτεχνήσαντο, μὴ μόνον ὀρθὰς ἀλλὰ καὶ σκαληνὰς ὑποσημαίνοντες κώνους. ὅπου χρὴ καὶ ἡμᾶς, ἐπειδὴ πρῶτον περὶ κυλίνδρου τομῆς ἐπισκέψασθαι, μὴ τὸ ὀρθὸν μόνον ἀφορεῖσθαι τὰς ἐπ' αὐτῷ ποιούμεθαι τὴν σκέψιν, ἀλλὰ καὶ τὴν σκαληνὴν περιλαβόντας ὑπὲρ πλεονέκτηναι τιτὺ θεωρεῖσθαι. ὅτι μὲν γὰρ ἐκ τῶν πρῶτον τῶν ἐποίμως μὴ ἔχει πάντα κύλινδρον ὀρθὸν εἶναι, τὴν κοινὴν ἐνοσίαν τῆτο συμφελκύσσης, ἐκ ἀγνοῶς διήποθεν· ἔτι μὲν ἀλλ' ἐνεκεν γὰρ τῆς θεωρίας ἀμεινον ὁμῶς καθολικωτέρῳ ὀρισμῷ περιλαβεῖν, ἐπεὶ καὶ τὸ τομὴν, ὀρθῶς μένοντι αὐτῷ, μόνῃ τῇ ὀρθῇ κώνῳ ἐλλείπει τιτὺ αὐτῷ εἶναι συμβῆσθαι. καθολικωτέρῳ δὲ ὑποθέμεντος ὅλη τῇ ἐλλείπει καὶ αὐτῷ ἐξιστάσθαι· ὃ δὴ καὶ δεῖξαι ὁ παρὼν λόγος ἐπαγγέλλεται. ἴσους δὲ ἡμῖν περὶ τὸ περιεχόμενον ὀρισμαίνουσι ταῦτα.

ΟΡΟΙ.

- α'. **E**ΑΝ μὲν εἴη τὸ δύο κύκλων ἴσων τε καὶ παρὰ ἀλλήλων αἱ ἀξόμετροι ἀξόμετροι ὡς ἀξόμετρος, αὐτὰ τε περιχθῆσαι ἐν τοῖς τῶν κύκλων ὀρθοπέδῳ περὶ μέσῳ τὸ κέντρον, καὶ συμπεριγεῖσθαι τὰ πέρατα αὐτῶν καὶ τὸ αὐτὸ μέρος ὁριζογνήσασθαι εὐθεῖαν, ὡς τὸν πᾶν σπινθηριστὴν ἢ γραφεῖσθαι ὑπὸ τῆς περιχθῆσεως εὐθείας ὀρθοπέδῳ, κυλινδρική ὀρθοπέδια καλεῖσθαι ἥτις ἐπ' ἀπειρὸν ἀξέσθαι δύναται, ἢ γραφῆσθαι αὐτῶν εὐθείας ἐκβαλλομένης.
- β'. Κύλινδρος δὲ τὸ περιεχόμενον σχῆμα ὑπὸ τῆς ἀλλήλων κύκλων καὶ τῆς μεταξὺ αὐτῶν ἀπειλημμένης κυλινδρικής ὀρθοπέδειας.
- γ'. Βάσεις δὲ εἰς κυλίνδρου οἱ κύκλοι.
- δ'. Ἀξων δὲ ἡ ἀξὸς τῆς κέντρον αὐτῶν ἀγομένη εὐθεῖα.
- ε'. Πλάτος δὲ εἰς κυλίνδρου γραμμὴ τις, ἥτις εὐθεῖα εἴη καὶ ὑπὲρ τῆς ὀρθοπέδειας εἴη εἰς κυλίνδρου τῆς βάσεως ἀμφοτέρων ἀπὸ τῆς ἢ καὶ φάμεν περιεγεῖσθαι γραφῆσαι τὴν κυλινδρικήν ὀρθοπέδειαν.
- ς'. Τῶν δὲ κυλίνδρων, ὀρθοὶ μὲν οἱ τῆς ἀξὸς πρὸς ὀρθὰς ἔχοντες τὰς βάσεις.
- ζ'. Σκαλῆνοι δὲ οἱ μὴ πρὸς ὀρθὰς ἔχοντες τὰς βάσεις τῆς ἀξὸς.

ΟΕΙΣΤΕΙ

Ορίσθαι δὲ καὶ Ἀπολλώνιον καὶ ταύτῃ.

η'. Πάσης καμπύλης γραμμῆς, ἐν ἐνὶ ὅπτι πέ-
δω ὅσῃς, ἀφ' ἑαυτῆς καλεῖσθαι εὐθείας τις, ἥτις
ἡγμένη ἀπὸ τῆς καμπύλης γραμμῆς πάσας τὰς
ἀγορεύσας ἐν τῇ γραμμῇ εὐθείας εὐθείας πᾶσι
ἀλλήλῃς διχα διαρεῖ.

θ'. Κορυφὴ δὲ τῆς καμπύλης γραμμῆς τὸ πέ-
ρας τῆς εὐθείας τὸ πρὸς τῇ γραμμῇ.

ι'. Τεταγμένως δὲ ὅπτι τῆς ἀφ' ἑαυτῆς κατῆ-
χται ἐκάστη τῶν ἀλλήλων.

ια'. Συζυγεῖς δὲ ἀφ' ἑαυτῆς καλεῖσθαι, αἵτινες
ἀπὸ τῆς γραμμῆς τεταγμένως ἀχθεῖσιν
ὅπτι τὰς συζυγεῖς ἀφ' ἑαυτῆς, ὁμοίως αὐταῖς διχα
τέμνουν.

ιβ'. Τοιούτων δὲ γραμμῶν ὑφισταμένων καὶ ἐν
ταῖς πλαγίαις τομῇς ὁ κυλίνδρος, ἡ διχοτομία τῆς
ἀφ' ἑαυτῆς κέντρον τομῆς καλεῖσθαι.

ιγ'. Ἡ δὲ ἀπὸ τῆς κέντρον ὅπτι τῇ γραμμῇ
παραπλήσια, ὅτι κέντρον τῆς γραμμῆς.

ιδ'. Ἡ δὲ ἀφ' ἑαυτῆς κέντρον τῆς τομῆς πρὸς τε-
ταγμένως κατηγμένην ἀχθεῖσιν καὶ περατῆμένην
ὑπὸ τῆς γραμμῆς, δούτερα ἀφ' ἑαυτῆς καλεῖσθαι
δειχθήσεται ὅτι πάσας τὰς ἀγορεύσας ἐν τῇ τομῇ
πρὸς τῇ ἀφ' ἑαυτῆς διχα τέμνουν.


ιε'. Ἐπὶ καὶ κείνῳ παραδιδόσθαι ὅτι ὁμοίαι
ἐλλείψεις εἰσιν, ὧν ἐκάτεραι αἱ συζυγεῖς ἀφ' ἑαυ-
τῆς πρὸς ἀλλήλῃς τῇ αὐτῇ ἔχουσιν λόγον, καὶ πρὸς
ἴσας γωνίας τέμνουν ἀλλήλῃς.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ α'.

Εάν ποτε δύο εὐθείαι ἀπὸ μὲν ἀλλήλων πρὸς δύο
εὐθείας ἀπομύδων ἀλλήλων, καὶ ἴσας ἐκάτεραν
ἐκάτερας· αἱ τὰ πέρατα αὐτῶν ὅπτι ἀγνοῦσιν
καὶ αὐταὶ ἴσαι τε καὶ πρὸς ἀλλήλῃς εἰσιν.

ΕΣΤΩΣΑΝ δύο εὐθείαι ἀπὸ μὲν ἀλλήλων
αἱ AB, BG , πρὸς δύο εὐθείας ἀπομύδων
ἀλλήλων τὰς DE, EZ ,
καὶ ἴση ἔστω ἡ μὲν AB
τῇ DE , ἡ δὲ BG τῇ
 EZ , ὅτι ἐπεὶ ζεύχονται
αἱ AG, AZ λέ-
γεται ὅτι αἱ AG, AZ ἴσαι
τε καὶ πρὸς ἀλλήλῃς εἰσιν.

Ἐπεὶ ζεύχονται αἱ
 $AD, BE, ΓΖ$. ἐπεὶ ἡ AB τῇ DE ἴση τε καὶ πρὸς ἀλλή-
λος ἐστὶ ὁ BE ἄρα τῇ AD ἴση τε καὶ πρὸς ἀλλήλῃς



Sed & hæc juxta Apollonium definienda.

8. Omnis lineæ curvæ, in uno plano
existentis, diameter vocetur recta linea;
quæ quidem ducta à linea curva omnes
quæ in ipsa ducuntur rectas rectæ cui-
piam parallelas bifariam dividit.

9. Vertex autem curvæ, terminus illius
rectæ qui est ad curvæ.

10. Ordinatum vero ad diametrum ap-
plicari unamquamque rectarum paral-
lelarum.

11. Conjugatæ diametri dicantur,
quæ quidem, à curva ordinatim ductæ
ad conjugatas diametros, ipsas fimiliter
bifariam dividunt.

12. His igitur suppositis lineis in trans-
versis sectionibus cylindri, punctum quod
diametrum bifariam dividit centrum se-
ctionis vocetur.

13. Quæ vero à centro ad lineam cur-
vam perducitur, dicatur ea quæ ex centro.

14. Quæ vero per centrum sectionis
transit, parallela ei quæ ordinatim ap-
plicata est, & terminatur ab ipsa linea
curva, secunda diameter dicatur: de-
monstrabitur enim rectas omnes in se-
ctione ductas, quæ priori diametro pa-
rallæ sunt, bifariam secare.

15. Illud etiam definiendum est: si-
miles ellipses esse, quarum conjugatæ
diametri, sese ad angulos æquales secan-
tes, eandem habent rationem inter se.

PROP. I. Theor.

Si duæ rectæ lineæ convenient, ac dua-
bus rectis lineis etiam convenientibus
parallelæ sint, & sint utræque utrif-
que æquales: rectæ quæ terminos ea-
rum conjungunt & ipsæ æquales &
parallelæ erunt.

SINT duæ rectæ lineæ concurrentes AB, BG ;
quæ duabus rectis lineis etiam concurren-
tibus, ut DE, EZ , pa-
rallæ sint; sitque
 AB æqualis DE , &
 BG ipsi EZ ; & jun-
gantur AG, AZ : di-
co rectas AG, AZ &
æquales esse & pa-
rallælas.

Junctis enim AD ,
 $BE, ΓΖ$; quoniam AB ipsi DE est æqualis & pa-
rallæla; erit [per 33. 1.] BE & æqualis & pa-
rallæla

DE SECTIONE CYLINDRI.

5

ΗΧΘω δὲ τὸ Β κέντρον ἐπὶ τῷ ΕΖ εὐθείᾳ
κάθετος ἡ ΒΚ, καὶ διὰ τῆς ΚΒ, ΒΑ διελθὼν
ἐπιπέδον, καὶ ἐκείνου κενὴν τομὴν αἱ ΑΛ, ΚΛ, καὶ
ἐπεξέχουσιν αἱ ΒΖ, ΑΘ. ἐπεὶ ὅν ὁ κύκλος ὁ
μὲν Α κύκλος τῷ Β, τὸ δὲ ΕΘ ἐπιπέδον τῷ ΓΔ ἐπι-
πέδῳ, καὶ τέμνεται ὑπὸ τοῦ ΑΒΚΛ ἐπιπέδου· παρά-
λληλος ἄρα ἐστὶν ἡ μὲν ΑΛ τῇ ΒΚ, ἡ δὲ ΚΛ τῇ

ΒΑ· ὁμοειδή γὰρ ἔσονται ἄρα
ἐπὶ τὸ ΚΑ· ἴση ἄρα ἡ μὲν
ΚΛ τῇ ΒΑ, ἡ δὲ ΒΚ τῇ ΑΛ.
καὶ ἐπεὶ ἡ μὲν ΒΚ τῇ ΑΛ πα-
ράλληλος ἐστὶν, ἡ δὲ ΚΖ τῇ ΑΘ·
ἔστιν ἡ ὑπὸ ΒΚΖ ἄρα γωνία τῇ
ὑπὸ ΑΛΘ ἴση. καὶ ἐστὶν ἡ ΒΚ
κάθετος ἐπὶ τῷ ΚΖ, καὶ ἡ ΑΛ
ἄρα κάθετος ἐστὶν ἐπὶ τῇ ΑΘ.
καὶ ἐστὶν ἴση ἴση ἄρα καὶ ΑΕΖ,
ΗΘ, ἀλλὰ ἔστι ὁμοειδή. καὶ
ἐπεὶ ἡ ΒΖ τῇ ΑΘ ὁμοειδής
ἐστὶ· τὸ ἄρα διὰ τῆς ΒΖ καὶ
τοῦ Αξονος ἀγόμενον ἐπιπέδον


ἡδὲ καὶ διὰ τῆς ΑΘ, καὶ τὴν πηλοῦ ὁμοειδή-
γραμμον, καὶ πλάττει αὐτὰς ἴση ἡ πρὸς Ζ, Θ ἐπι-
γυνοῦσαι εὐθεῖαι, ἐπὶ τῇ ἐπιφανείᾳ ἔσονται κύλινδρος.
ἐστὶν ἡ δὲ ΖΘ πλάττει τὰ ΕΖΗΘ σχήματος ἐπὶ
τῇ κύλινδρος ἐπιφανείᾳ· κενὴ ἄρα πλάττει ἐπὶ
τῇ πρὸς Αξονος ὁμοειδήγραμμον καὶ ΕΗΖΘ
σχήματος. εὐθεῖα δὲ εἰσέχουσα πλάττει τὸ διὰ τῆς
Αξονος ὁμοειδήγραμμον· ἡ ΖΘ ἄρα ἐστὶν εὐθεῖα,
ὁμοίως δὲ καὶ ἡ ΕΗ. καὶ ἐπιζυγύνουσιν ἴσας πρὸς πα-
ράλληλους πρὸς ΕΖ, ΗΘ· τὸ ΕΘ ἄρα ὁμοειδή-
γραμμον ἐστὶν.

Λέγω δὲ ὅτι καὶ ἰσογώνιον τῷ ΓΔ. ἐπεὶ γὰρ δύο
αἱ ΔΒ, ΒΖ δυοὶ τῶν ΜΑ, ΑΘ ὁμοειδῶν ἐσὶν, καὶ
ἐστὶν αἱ πρὸς αὐτὰς εὐθεῖαι ἴση· καὶ αἱ ΖΔ, ΜΘ ἄρα
ἴση πρὸς τὸ ὁμοειδῶν ἐσὶν, διὰ τὸ πρῶτον ἰσχυρίσασθαι.
ἔστιν ἡ ΖΘ, ΔΜ ἄρα καὶ αὐτὰς ἴση πρὸς τὸ ὁμοειδῶν
ἐσὶν. ἐστὶν ἡ δὲ ΑΘ τῇ ΑΜ ὁμοειδής· ἡ ἄρα
ὑπὸ ΑΘΖ γωνία ἔστι ὁμοειδής τῇ ὑπὸ ΑΜΔ γωνίᾳ· ἡ δὲ
ὑπὸ ΑΜΔ γωνία ἔστι ἡ γωνία τῷ ΓΔ ὁμοειδής ἴση
ἐστὶν· ἰσογώνιον ἄρα τὸ ΕΘ τῷ ΓΔ.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Δ'.

Εὰν καμπύλῳ γεγραμμένῳ ὑποτέταται εὐθεῖα, αἱ
δὲ ἀπὸ τῆς γραμμῆς ἐπὶ τὴν ὑποτέταται καθεῖται
ἴσων διωγμῶν πρὸς τὴν τμηματικὴν τὴν ὑπο-
τέταται· ἡ γεγραμμένη κύκλος περιφέρειαν ἔσται.

ΕΣΤΩ καμπύλη γραμμὴ
ἡ ΑΒΓΔ, ὑποτέταται
τῇ αὐτῇ ἡ ΑΔ εὐθεῖα, ἐκεί-
νη ἡχθῶσαν ἐπὶ τῷ ΑΔ αἱ
ΒΕ, ΓΖ, καὶ ὑποκαίεται τὸ μὲν
ἀπὸ τῆς ΒΕ ἴσων τῷ ὑπὸ ΑΒΕ,
ΕΔ, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ΓΖ ἴσων τῷ
ὑπὸ ΑΓΖ· λέγω ὅτι ἡ ΑΒΓΔ κύκλος περιφέρειαν ἔσται.



Ducatur à centro B ad BZ perpendicularis BK;
perque rectas KB, BA ducto plano, communes
sectiones sint AL, KL; & jungantur BZ, AO.
quoniam igitur circulus A circulo B æquidistat,
& BO planum plano ΓΔ, secaturque ab ipso
ABKL plano: recta AL [per 16. 11.] paral-
lela erit rectæ BK, & KL ipsi BA; quare KA
parallelogrammum est: ideoque recta KL æ-
qualis est rectæ BA, & BK
ipsi AL. & quoniam BK
quidem ipsi AL parallela est,
KZ vero ipsi AO; erit BKZ
angulus [per 10. 11.] æqua-
lis angulo AAO. atque est
BK ad KZ perpendicularis:
perpendicularis est igitur AL
ad ipsam AO. sunt autem
æquales: ergo æquales sunt
ipsæ EZ, HO, & parallelæ.
præterea quoniam BZ pa-
rallela est ipsi AO; planum
per BZ arque axem ductum
transibit etiam per AO; se-
ctionemque faciet parallelo-

grammum, cuius latus recta linea, quæ pun-
cta Z, O conjungit, & in superficie ipsius cy-
lindri existit. est autem & ZO latus figuræ
EZHΘ in superficie cylindri: commune igitur
latus est & parallelogrammi per axem &
figuræ EHZΘ. sed [per 2. huj.] demonstratum
est latus parallelogrammi per axem esse rectam
lineam: quare recta linea est ZO, similiter
& recta erit ipsa EH. conjungunt autem æ-
quales & parallelas rectas EZ, HO: ergo [per
33. 1.] planum EO parallelogrammum erit.

Dico insuper & æquiangulum esse paralle-
logrammo ΓΔ. quoniam enim duæ rectæ AB,
BZ duabus rectis MA, AO parallelæ sunt,
suntque quatuor rectæ æquales; & ipsæ ZΔ,
MΘ inter se æquales erunt & parallelæ, per
primum theorema: ergo & æquales & paral-
læ sunt ipsæ ZO, ΔM. est autem & AO ipsi AM
parallela: angulus igitur AΘZ parallelogrammi
EO æqualis est angulo AMΔ parallelogrammi
ΓΔ: quare parallelogrammum EO parallelo-
grammo ΓΔ æquiangulum erit.

PROP. IV. Theor.

Si curvæ lineæ recta subtendatur; & quæ à
linea ad subtenfam perpendiculares du-
cuntur, possint spatium æquale ei, quod
ipsius subtenfæ partibus continetur:
dicta linea circuli circumferentia erit.

SIT curva linea ΑΒΓΔ, &
quæ ei subtenditur re-
cta ΑΔ; ducantur autem ΒΕ,
ΓΖ perpendiculares ad ipsam
ΑΔ, ponaturque quadratum
ex ΒΒ æquale rectangulo
ΑΒ, ΒΔ, & quadratum ex ΓΖ
æquale ipsi ΑΖΔ: dico li-
neam ΑΒΓΔ circuli circumferentiam esse.

[1] B

Secetur

DE SECTIONE CYLINDRI.

7

τομή ἐν τῷ ὀρθῷ κυλινδρῷ εὐθεία, ἴσας
 μὲν ποιῶν γωνίας τῶν ὀρθῶν κυλινδρῶν,
 μὴ παραλλήλων δὲ ἔσται τῶν βάσεων ὁ πα-
 ραλλелоγράφος ἢ τομή κύκλος ἔσται. καλεῖ-
 σθαι δὲ ἢ τοιαύτη ἀποτομή ὁ ἐπιπέδου ὑπερφανία.


rallelogrammo rectam lineam, conti-
 nentem angulos æquales angulis pa-
 rallelogrammi, non autem ipsius ba-
 sibus parallelam: sectio circulus erit
 vocetur autem talis sectio *Scalen-*
traria.

ΕΣΤΩ σκαληνὸς κύλινδρος, ὃς τὸ ἀξὸς ἔστω ἄξωνος
 ὀρθῶν κυλινδρῶν εὐθεία τὸ ΑΔ, πρὸς ὁρθεῖς
 ἐν τῇ βάσει, περμιθεῖται ὁ δὲ κύλινδρος καὶ ἐτέρῳ ἐπι-
 πέδῳ τῷ ΕΖΗ, ὁρθῶν αὐτῷ πρὸς τὸ ΑΔ ὀρθῶν
 κυλινδρῶν, καὶ ποιῶντι ἐν αὐτῷ κοινὴν τομήν τινι
 ΕΗ εὐθείαν, μὴ ὀρθῶν κυλινδρῶν μὲν πᾶσι ΑΒ, ΓΔ,
 ἴσας ὅς γωνίας ποιῶντι τινι μὲν ὑπὸ ΗΕΑ τῇ ὑπὸ
 ΕΑΒ, τινι δὲ ὑπὸ ΕΗΒ τῇ ὑπὸ ΑΒΗ· λέγω ὅτι
 ἡ ΕΖΗ τομή κύκλος ἔσται.

SIT cylindrus scalenus, cujus parallelogram-
 mum per axem ΑΔ, ad rectos angulos
 existens ipsi basi; secetur autem cylindrus &
 alio plano ΕΖΗ ad parallelogrammum ΑΔ
 recto, quod in ipso communem sectionem fa-
 ciat rectam lineam ΕΗ basibus ΑΒ, ΓΔ, non
 quidem parallelam, sed quæ contineat angulum
 ΗΕΑ æqualem angulo ΕΑΒ, . angulum vero
 ΕΗΒ æqualem ipsi ΑΒΗ: dico sectionem ΕΖΗ
 circulum esse.

Εἰληφθὼς τι σημεῖον ἐπὶ
 τῇ ΕΗ εὐθείᾳ τὸ Θ, καὶ
 πρὸς ὁρθεῖς τῇ ΕΗ ἡχθῶ
 εὐθεία ἡ ΘΖ, ἐν τῷ ΕΖΗ
 ἐπιπέδῳ ἔσται ἡ ΘΖ ὅρα
 κάθετος ἐστὶν πρὸς τὸ ΑΔ
 ὀρθῶν κυλινδρῶν. ἡχθῶ δὲ
 Θ τῇ ΑΒ ὀρθῶν κυλινδρῶν ἡ
 ΚΘΛ, καὶ κείτω τῇ ΑΒ
 πρὸς ὁρθεῖς ἡ ΜΝ, ὅρα
 τῇ ΘΖ, ΚΛ ἡχθῶ ὀρθῶν
 κυλινδρῶν ποιῶντι τινι ΚΖΛ το-
 μῇ. ἐπεὶ γὰρ ἡ ΜΝ κά-
 θετος ἐστὶν πρὸς τὴν ΑΒ κοινὴν
 τομήν τῶν ὀρθῶν κυλινδρῶν,
 ἐν τῷ τῇ βάσει ὀρθῶν κυλινδρῶν ἔσται κάθετος ὅρα ἐστὶν ἡ
 ΜΝ πρὸς τὸ ΑΔ ὀρθῶν κυλινδρῶν ὀρθῶν κυλινδρῶν ὅρα ἐστὶν
 αἱ ΘΖ, ΜΝ. ὀρθῶν κυλινδρῶν καὶ αἱ ΚΛ, ΑΒ καὶ τῇ
 δι' αὐτῶν ὀρθῶν κυλινδρῶν ἡ ΚΖΛ ὅρα τομή ὀρθῶν
 κυλινδρῶν ἐστὶ τῇ βάσει κύκλος ὅρα ἐστὶν ἡ ΚΖΛ τομή.
 ἀξίμετρος δὲ ὁ κύκλος ἡ ΚΛ, καὶ τῇ ΚΛ πρὸς ὁ-
 ρθεῖς ἡ ΘΖ ἴσων ὅρα τὸ ὑπὸ τῇ ΚΘ, ΘΛ τῷ ὑπὸ τῇ
 ΘΖ. ἀλλὰ τὸ ὑπὸ τῇ ΚΘ, ΘΛ τῷ ὑπὸ τῇ ΕΘ,
 ΘΗ ἴσων ἐστὶν, ἴση γὰρ ἡ μὲν ΕΘ τῇ ΘΚ, ἡ δὲ ΗΘ τῇ
 ΘΛ, ἀξίμετρος τῇ πρὸς ΕΚ, ΛΗ βάσει γωνίας
 ἴσας εἶναι καὶ τῷ ὑπὸ τῇ ΕΘ, ΘΗ ὅρα τὸ ὑπὸ τῇ
 ΘΖ ἴσων ἐστὶν, καὶ ἐστὶν ὁρθῶν ἡ ΘΖ πρὸς τῇ ΕΗ. ὁμοίως
 δὲ, καὶ ἄλλῃ ἀναγωγῇ ὀρθῶν κυλινδρῶν τῇ ΘΖ πρὸς τινι
 ΕΗ, ἴσων διωθήσεται τῷ ὑπὸ τῇ γωνιῶν τμημάτων
 τῇ ΕΗ· κύκλος ὅρα ἐστὶν ἡ ΕΖΗ τομή, καὶ ἀξίμετρος
 ἡ ΕΘΗ εὐθεία.

Sumatur aliquod pun-
 ctum in recta ΕΗ,
 quod sit Θ; & ad re-
 ctos angulos ipsi ΕΗ du-
 catur ΘΖ in ΕΖΗ pla-
 no: ergo [per 4.def.11]
 ΖΘ perpendicularis est
 ad planum ΑΔ. ducatur
 per Θ ipsi ΑΒ pa-
 rallela ΚΘΛ, ponatur-
 que ipsi ΑΒ ad rectos
 angulos ΜΝ, & per ΖΘ,
 ΚΛ ducatur planum fa-
 ciens sectionem ΚΖΛ.
 quoniam igitur ΜΝ, in
 basis plano existens, per-
 pendicularis est ad ΑΒ



communem planorum sectionem; erit ipsa ΜΝ
 perpendicularis ad planum ΑΔ: quare [per 6.
 11.] ΖΘ, ΜΝ parallelæ sunt. sed & parallelæ
 ipsæ ΚΛ, ΑΒ: ergo [per 15. 11.] parallela quo-
 que quæ per illas transeunt plana: sectio igitur
 ΚΖΛ parallela est basi; ideoque [per præc.]
 circulus est, & ejus diameter ΚΛ, cui ipsa ΖΘ
 ad rectos angulos insistit: quare [per corr. 13.6.]
 rectangulum ΚΘ, ΘΛ est æquale quadrato ex ΘΖ.
 at rectangulum ΚΘ, ΘΛ æquale est ipsi ΕΘ, ΘΗ
 rectangulo, cum sit [per 6.1.] ΕΘ æqualis ipsi
 ΘΚ, & ΗΘ ipsi ΘΛ, propterea quod ad bases
 ΕΚ, ΛΗ anguli æquales sunt: ergo quadratum
 ex ΖΘ æquale est rectangulo ΕΘ, ΘΗ; atque est
 ΖΘ ad ΕΗ perpendicularis. similiter autem,
 si ad ΕΗ alia ducatur parallela ipsi ΖΘ, po-
 terit spatium æquale ei, quod sub partibus ipsius
 ΕΗ continetur: igitur [per 4. huj.] sectio ΕΖΗ
 circulus est, cujus diameter est recta ΕΘΗ.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Ζ'.

Δοθέντος κυλίνδρου καὶ σημείου πρὸς ὅπῃ τῇ ὀρθῇ
 πρὸς αὐτὸν ἀγαγῶν ἀξίμετρος τῇ σημείῳ πλῆθος ὁ
 κυλινδρῶν.

PROP. VII. Probl.

Cylindro dato & puncto in superfi-
 cie ejus; per dictum punctum latus
 cylindri ducere.

ΕΣΤΩ κύλινδρος, ὃς βάσεις μὲν οἱ Α, Β κύκλοι,
 ἄξωνος δὲ ἡ ΑΒ εὐθεία, τὸ δὲ δοθέν σημεῖον πρὸς τῇ

SIT cylindrus, cujus bases circuli Α, Β, axis vero
 recta linea ΑΒ; datum autem punctum in ejus
 superficie

DE SECTIONE CYLINDRI.

μήτε ὀδυνήλω καὶ διὰ τ' ἀξίους ἐκτείνω·
ἢ τομὴ ἐκ ἔσται κύκλος, ὅδε αὐτὴν ἡραμμοῖα

quidistanti ei quod per axem fit paral-
lelogrammo; secus neque circulus,
neque rectilineum erit.

ΕΣΤΩ κύλινδρος, ὃ βάσις οἱ Α, Β κύκλοι, καὶ
 περὶμήδω σπιπέδω, μήτε ὡς πρὸς βάσεις,
 μήτε ὑπεραντίως, μήτε διὰ τὸ ἄξονος, μήτε ὡς ἀν-
 τίστως τῷ ἄξονι· τὸ δὲ τέμνον σπιπέδον ἦτις Ε πρὸς
 βάσις τέμνει ἀμφοτέρους, ἢ πῶς ἐτέραν, ἢ ἐδεδίταν.
 πρῶτον δὲ μηδὲτέραν τέμνεται, καὶ ποιῶτω γραμ-
 μὴν ἐν τῇ σπιφανείᾳ Ε κύλινδρου πῶς ΓΕΔ· λέγω
 ὅτι ἡ ΓΕΔ τεμνὴ ἔστι κύκλος ἐστίν, ἔστι εὐθύγραμμος.


Οπὶ μὲν ἐκ ἑστῆς εὐθύγραμμου, δῆλον. εἰ γὰρ δύνα-
ται, ἔστω εὐθύγραμμος, καὶ εἰληφθῶ πλάρεια τις αὐ-
τῇ ἢ Γ Ε. ἐπεὶ ἐν ᾧ τῇ δὲ ᾧ φανεραῖς τῷ κυλίνδρῳ
δύο σημεῖα εἰληπία τὰ Γ, Ε, μὴ ὄντα ᾧ τῇ δὲ αὐτῆς
πλάρειας δὲ κυλίνδρῳ, (ἢ γὰρ πλάρεια κατὰ δύο ση-
μεῖα ἔκτεναι τὴν τοιαύτην γραμμὴν) ἢ ἄρα τὰ Γ,
Ε σημεῖα ἐπὶ τῷ ὀρθογώνῳ εὐ-
θείᾳ ἐπὶ τῇ ἐπιφανείᾳ ἐστὶ δὲ
κυλίνδρῳ, ὅπερ ἀδυνάτων ἐ-
δείχθη· ἐκ ἄρα εὐθείᾳ ἐστὶν
ἢ Γ Ε γραμμὴ· τὰ ἄρα Γ Ε Δ
σῆμα ἐκ ἑστῆς εὐθύγραμμου.

Διεκτίον δὴ ὅτι ἐδὲ κύκλος.
 ἐπεὶ γὰρ τὸ ΓΕΔ πμῆς ἐπίπε-
 δον τῶ τῷ Α κύκλῳ ἐπίπεδῳ
 ἐκ ἐπὶ ὁρθάλληλον, ἐκβεβη-
 λόμῳ καὶ ἐπίπεδῳ πμῆς
 ἀλλήλα. πμνέτω, καὶ ἔσω κει-
 νῇ τμῇ αὐτῶν ἡ ΖΗ, καὶ διὰ
 τῷ Α κέντρῳ ἡχθῶ κάθετος
 ἐπὶ τῇ ΖΗ ἢ ΘΑΗ, καὶ διὰ
 τῷ Θ Α καὶ τῷ ἄξονος ἐκβεβη-
 ῶν ἐπίπεδον, ποιῶν ἐν μὲν τῷ κυλίνδρῳ πμῶν τὸ
 ΘΚ ὁρθάλληλόγραμμον, ἐν δὲ τῇ ΓΕΔ πμῇ τῇ
 ΓΔ ὡθεῖαν· καὶ, τῷ ΓΔ διχα τμηθείσης κατὰ τὸ Α,
 ἡχθῶσαι τῇ ΖΗ ὁρθάλληλοι, διὰ μὲν τῷ Α ἡ
 ΕΛΜ, διὰ δὲ τῷ Α ἡ ΝΑΞ· αἱ ἄρα ΜΕ, ΝΞ πε-
 ράλληλαί εἰσι ἀλλήλαις. ἡχθῶ τίνυντα διὰ τῷ ΕΜ
 ἐπίπεδον ὁρθάλληλον τῇ βάσει τῷ κυλίνδρου, ποιῶν
 ἐν τῷ κυλίνδρῳ πμῶν τῷ ΟΕΠΜ· ἡ ΟΕΠΜ
 ἄρα πμῇ κύκλος ἐστίν, καὶ διάμετρος ἐστὶν ἡ ΟΠ, δι-
 χαῖς πετμημένη κατὰ τὸ Α. ἐπὶ γὰρ τῷ ΛΟΓ, ΛΠΔ
 τριγώνων, ὁμοίων ὄντων, ἴση ἐστὶν ἡ ΓΑ τῇ ΛΔ· ἴση
 ἄρα καὶ ἡ ΟΛ τῇ ΛΠ· διάμετρος ἄρα καὶ ἡ ΕΛΜ
 τῷ ΟΕΠ κύκλος. ἐπεὶ γὰρ ὁρθάλληλός ἐστιν ἡ μὲν
 ΟΛ τῇ ΘΑ, ἡ δὲ ΛΜ τῇ ΑΞ· ἡ ἄρα ὑπὸ τῷ ΟΛ,
 ΛΜ γωνία τῇ ὑπὸ τῷ ΘΑ, ΑΞ ἴση ἐστίν. ὁρθὴ δὲ ἡ
 ὑπὸ ΘΑΞ· ὁρθὴ ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ τῷ ΟΛ, ΛΜ· ἡ
 ΕΛ ἄρα κάθετός ἐστιν ἐπὶ τῷ ΟΠ διάμετρον τῷ κύ-
 κλῳ· τὸ ἄρα διπλὸν τῷ ΕΛ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΟΛ, ΛΠ.
 ἐπεὶ δὲ ἐκ ἐστὶν ἡ πμῇ ὑπεναντία, ἡ ἄρα ὑπὸ ΛΟΓ
 γωνία ἐκ ἐστὶν ἴση τῇ ὑπὸ ΟΓΑ· ἐδὲ ἡ ΟΛ ἄρα ὡ-
 θεῖα τῇ ΓΑ ἴση ἐστίν· ἐδὲ τὸ διπλὸν τῷ ΟΛ ἄρα, τετραπλὸν
 τὸ ὑπὸ τῷ ΟΛ, ΛΠ, τῷ διπλῷ τῷ ΓΑ, τετραπλὸν τῷ ὑπὸ
 τῷ ΓΑ, ΛΔ, ἴσον ἐστίν. ἀλλὰ τῷ ὑπὸ τῷ ΟΛ, ΛΠ τὸ
 διπλὸν τῷ ΕΛ ἴσον· τὸ ἄρα διπλὸν τῷ ΕΛ ἐκ ἐστὶ τῷ ὑπὸ

SIT cylindrus, cujus bases circuli A, B; & secetur plano neque æquidistante basibus, neque subcontrarie posito, neque per axem, neque axi æquidistante: vel igitur secans planum bases utrasque secabit, vel alteram tantum, vel neutram. primum vero neutram secet, & faciat in superficie cylindri lineam $\Gamma E \Delta$: dico sectionem $\Gamma E \Delta$ neque circulum esse, neque rectilineum.

Nam rectilineum non esse manifestum constat. sit enim rectilineum, si fieri potest: & sumatur latus quodpiam ipsius $\Gamma\Delta$. quoniam igitur in cylindri superficie duo puncta Γ, Δ sumuntur, in eodem latere cylindri non existentia; (latus enim in duobus punctis talem lineam non secant) erit recta linea, quæ puncta Γ, Δ coniungit, in superficie ipsius cylindri; quod quidem [per præced.] fieri non posse jam demonstratum est: $\Gamma\Delta$ igitur recta linea non est, neque figura $\Gamma\Delta$ rectilinea.

Demonstrandum deinceps est, quoniam enim sectionis REA planum plano circuli A non est æquidistans: si plana producantur, ipsa se invicem secabunt. secent ergo sese, & sit ipsorum communis sectio ZH ; perque A centrum ducatur ΘAH ad ZH perpendicularis; & per ΘA perque axem du-



catur planum, faciens in cylindro sectionem parallelogrammum $\Theta\kappa$, in sectione autem $\Gamma\epsilon\Delta$ rectam lineam $\Gamma\Delta$; & secta $\Gamma\Delta$ bifariam in puncto Λ , ducantur ipsi ZH parallelæ, per Λ quidem recta $\epsilon\Lambda M$, per Λ vero ipsa $N\Lambda\Xi$: quare [per 9. 11.] ME , $N\Xi$ inter sese parallelæ erunt. ducatur deinde planum per ϵM basi cylindri æquidistans, quod faciat in cylindro sectionem $\Theta\beta\pi\mu$; & erit [per 5. huj.] sectio $\Theta\beta\pi\mu$ circulus, cujus diameter $\Theta\pi$ bifariam secatur in Λ . nam, cum triangula $\Delta\Theta\Gamma$, $\Lambda\eta\Delta$ similia sint, & sit $\Gamma\Lambda$ æqualis ipsi $\Lambda\Delta$; erit & $\Theta\Lambda$ ipsi $\Lambda\pi$ æqualis: quare $\epsilon\Lambda M$ circuli $\Theta\beta\pi$ diameter erit. & quoniam recta $\Theta\Lambda$ ipsi $\Theta\Lambda$ parallela est, ut & ΛM ipsi $\Lambda\Xi$; angulus $\Theta\Lambda M$ [per 10. 11.] angulo $\Theta\Lambda\Xi$ est æqualis: rectus autem est angulus $\Theta\Lambda\Xi$; rectus igitur est $\Theta\Lambda M$, & $\epsilon\Lambda$ perpendicularis est ad $\Theta\pi$ circuli diametrum: unde sequitur quadratum ex $\epsilon\Lambda$ æquale esse rectangulo $\Theta\Lambda\pi$, quoniam autem sectio non est subcontraria, angulus $\Delta\Theta\Gamma$ angulo $\Theta\Gamma\Lambda$ æqualis non erit: & idcirco latera $\Theta\Lambda$, $\Gamma\Lambda$ inæqualia: igitur quadratum ex $\Theta\Lambda$, hoc est rectangulum $\Theta\Lambda\pi$, non est æquale quadrato ex $\Gamma\Lambda$, hoc est rectangulo $\Gamma\Lambda\Delta$. sed rectangulo $\Theta\Lambda\pi$ æquale est quadratum ex $\epsilon\Lambda$: quare quadratum ex $\epsilon\Lambda$ non est æquale rectangulo


[] C

Γ Λ Δ :

DE SECTIONE CYLINDRI.

11

ΗΧθω Ἀφ' τῷ Ε σημείω ὡς α' τ' ἄξονα ἢ ΘΕΗ
 εὐθεία, τίμνωσαι τ' ὡς ἐφέρεται τ' βύστωσι κατὰ τὸ
 Θ, καὶ διὰ τῷ Θ ἤΧθω ἢ ΘΚ ὡς ῥαλληλος τῇ ὀπῇ τ'
 ΓΑ καθεύτω, ἥτιν παραῤλληλος ἰσοσκελεῖται ἢ ΕΖ·
 τιμῇ ἄρα ἢ ΘΚ τ' ΓΑ Ἐ αὐτῇ. ἤχθω ἔν δια τ' ΗΘ,
 ΘΚ ὀπίπεδον τίμνωι τ' κύλινδρον, Ἐ ποιεῖται τὸ ΗΝ
 παραῤλληλόγραμμον, καὶ ἐπὶ εὐχθω ἢ ΚΑ κατὰ τὴν το-
 μὴν τ' ΓΔ, ΝΗ παραῤλληλογραμ-
 μων. ἐπὶ πίνω αἱ ΕΖ, ΚΘ τῇ
 αὐτῇ εἰσι παραῤλληλοι. Ἐ ἀλλή-
 λαις ἄρα εἰσι παραῤλληλοι. καὶ
 ἔστιν ἢ ΘΚ ἐν τῷ ΚΗ ἐπιπιδω·
 καὶ ἢ ΕΖ ἄρα ἐν τῷ ΚΗ ἐστιν ἐπι-
 πιδω· ὁκβαλλομένη ἄρα ἢ ΕΖ
 πίπτει ὀπῇ τ' ΑΚ, ἥτις ἔστιν ἐν τῷ
 ΓΔ ἐπιπιδω· ἢ ΕΖ ἄρα ἐν τῷ
 πίπτει ὀπῇ ΓΔ παραῤλληλογράμμου.
 Φανερόν ὅτι, καὶ εἰς τὸ ἔπερον
 μέρος ὁκβληθῇ μεχρὶ ὀπῇ Μ, ὅπερ
 ἐστὶν ὀπῇ τ' ἐπιφανείας τῷ κυλίν-
 δρῳ, ὅττω εἰσι πετμημένη ἢ ΕΜ κατὰ τὸ Ζ. ἐπεὶ γὰρ
 ἢ ΓΑ διάμετρος ὡς ὁρτός ἐστι τῇ ΘΚ· ἴση ἄρα
 ἢ ΘΚ τῇ ΚΝ. Ἐ παραῤλληλοι αἱ ΜΝ, ΑΚ, ΗΘ
 ἴση ἄρα ἢ ΜΖ τῇ ΖΕ.



Ducatur enim per Θ recta $\Theta\Theta\Theta$ parallela
axi, quæ basis circumferentiam secet in Θ ; &
per Θ ducatur ΘK parallela perpendiculari ad
 ΓA , cui etiam parallela perpendiculari $\Theta\Theta\Theta$ ergo
& ΘK ipsam ΓA secabit. itaque iuncta rectis
lineas $H\Theta$, ΘK ducatur planum sectionis cylin-
dri, quod faciat sectionem parallelogram-
mum $H N$; & jungatur $K A$ communis sectio
parallelogrammorum $\Gamma \Delta$, $N H$.
quoniam igitur rectæ $E Z$, $K \Theta$
eidem sunt parallela, etiam
inter se parallele sunt: atque
est ΘK in plano $K H$, quare
& $E Z$ in plano $K H$ erit;
adeoque producta conveniet
cum ΛK quæ in plano $\Gamma \Delta$
est: recta igitur $E Z$ intra
 $\Gamma \Delta$ parallelogrammum cadet.
perspicuum autem est, si ad
alteram partem producatuſ
que in punctum M , quod est
in superficie cylindri, bifa-
riam secari $E M$ in Z , nam cum

diameter $\Gamma \Lambda$ perpendicularis fit ad ΘK ; erit
[per 3.] ΘK ipsi $K N$ æqualis. sed parallele
sunt ipsæ $M N$, ΛK , $H \Theta$: ergo $M Z$ ipsi $Z E$
æqualis erit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ια'.

Εὰν κυλινδρὸς ἑπιπέδῳ τμηθῇ διὰ τῷ ἄξονος, τμη-
θῇ δὲ καὶ ἐτέρῳ ἑπιπέδῳ τέμνοντι μὲν τὸ δὲ βά-
σιος ἑπίπεδον ἐκτὸς τοῦ κύκλου, ἡ δὲ κοινὴ τομὴ
τῷ ἑπιπέδῳ πρὸς ὁρθὰς ἢ τῇ βάσει τοῦ ἄξο-
νος παραλληλογράμμου, ἢ τῇ ἐκ' εὐθείας αὐ-
τῇ αἰ ἀγόμεναι εὐθεῖαι ὁποῦν τὸ τομῆς τὸ εἰς τῇ
ἑπιφανείᾳ τοῦ κυλινδρὸς γινομένης ὑπὸ τοῦ τε-
μινοτος ἑπιπέδου, παράλληλαι τῇ πρὸς ὁρθὰς
τῇ βάσει τοῦ διὰ τοῦ ἄξονος παραλληλογράμμου,
ἢ τῇ ἐκ' εὐθείας αὐτῇ, ἐπὶ τῇ κοινῇ τομῇ
τῷ ἑπιπέδῳ πρὸς τῇ, καὶ ὁροσεβαλλόμεναι ὥς
τοῦ ἐτέρου μέρους τὸ τομῆς διχα τμηθήσονται ὑπὸ
τῆς κοινῆς τομῆς τῷ ἑπιπέδῳ καὶ ἡ πρὸς
ὁρθὰς τῇ βάσει τοῦ διὰ τοῦ ἄξονος ὡς κυ-
λινδρῶν, ἢ τῇ ἐκ' εὐθείας αὐτῇ, ὁρθῇ
μέτοις τῷ κυλινδρῷ, πρὸς ὁρθὰς ἔσται καὶ
τῇ κοινῇ τομῇ τῷ διὰ τοῦ ἄξονος παρα-
λληλογράμμου καὶ τοῦ τεμινοτος ἑπιπέδου. Σχε-
ληνὸν δὲ ὅτις, ἐκέπαι πλην ὅταν τὸ διὰ τοῦ
ἄξονος ἑπίπεδον πρὸς ὁρθὰς ἢ τῇ βάσει τοῦ
κυλινδρῷ.

ΕΣΤΩ κύλινδρος, ἔχων βάσιν μὲν οἱ Α, Β κύκλοι,
τὸ δὲ διὰ τῶν ᾤοντων παραλληλογράμμου τὸ
ΓΔ, ἔστω περὶ αὐτὸν κύλινδρος, ὡς εἶρη, ἐπιπέδῳ

PROP. XI. Theor.

Si cylindrus fecetur plano per axem, fecetur etiam alio plano basis planum extra circulum secante; communis autem planorum sectio perpendicularis fit ad basim parallelogrammi per axem, vel ad eam quæ in directum ipsi constituitur: rectæ lineæ quæ à sectione in superficie cylindri à secante plano factâ ducuntur, parallelæ ei quæ perpendicularis est ad basim parallelogrammi per axem, vel ad eam quæ in directum ipsi constituitur, communi planorum sectioni occurrent, & productæ usque ad alteram sectionis partem, à communi planorum sectione bifariam dividuntur; quæ vero perpendicularis est ad basim parallelogrammi per axem, vel ad eam quæ in directum ipsi constituitur, cylindro recto existente, etiam ad communem planorum sectionem, parallelogrammi scilicet per axem & secantis plani, perpendicularis erit. Scaleno autem existente cylindro, non item; præterquam cum parallelogrammum per axem ad ipsam basim cylindri rectum fuerit.

SIT cylindrus, cujus bafes quidem circuli
A, B, parallelogrammum autem per axem
 $\Gamma \Delta$; & fecetur plano, ut dictum est, quod faci-
ciat

ciat sectionem $EZH\Theta$, ita ut planis sectionis $EZH\Theta$ & basis $\Lambda\Gamma$ concurrentibus, communis sectio $\kappa\Lambda$ perpendicularis sit ad ipsam $\Gamma\Lambda\Lambda$; & à sectione $EZH\Theta$ ducatur recta ZM parallela ipsi $\kappa\Lambda$, quæ producta pertingat ad alteram partem superficiæ in puncto Θ : dico rectam ZM occurrere ipsi $E\Theta$, & ipsi $M\Theta$ æqualem esse.

Nam quoniam in sectione $EZH\Theta$ ducta est ZM parallela ipsi $\kappa\Lambda$; intra $\Gamma\Delta$ parallelogrammum cadet. quoniam autem ZM est in plano $EZH\Theta$, atque est $E\Theta$ communis sectio ipsius & parallelogrammi $\Gamma\Delta$; occurret ZM ipsi $E\Theta$, & ZM ipsi $M\Theta$ æqualis erit: id quod patet ex antecedenti theoremate. Reliquum est ut ostendamus, si cylindrus rectus sit, vel planum $\Gamma\Delta$ rectum super basim cylindri, rectam $\kappa\Lambda$ ad ipsam $E\Theta$ perpendicularem esse. quoniam enim planum $\Gamma\Delta$ ad planum basis rectum est, & $\kappa\Lambda$ in basis plano existens perpendicularis est ad $\Gamma\Lambda\Lambda$ communem planorum sectionem; & ad reliquum ipsius $\Gamma\Delta$ parallelogrammi planum [per 4. defin. 11.] perpendicularis erit.

Quod si planum $\Gamma\Delta$ non sit rectum ad basim, scaleno existente cylindro, $\kappa\Lambda$ ad $\Lambda\Theta$ perpendicularis non erit. si enim fieri potest, sit $\kappa\Lambda$ perpendicularis ad $\Lambda\Theta$; est autem & ad $\Lambda\Gamma$ perpendicularis: quare [per 4. 11.] & ad planum quod per ipsas transit, hoc est ad planum $\Gamma\Delta$: planum igitur per $\kappa\Lambda$, hoc est planum basis Λ , ad planum $\Gamma\Delta$ [per 18. 11.] rectum erit, contra hypothefin: ergo $\kappa\Lambda$ ad $\Lambda\Theta$ non est perpendicularis.


Ex jam demonstratis itaque constat, rectam $E\Theta$ sectionis $EZH\Theta$ diametrum esse; omnes enim, quæ ad ipsam ducuntur parallela ipsi $\kappa\Lambda$, bifariam dividit, quemadmodum $Z\Theta$.

PROP. XII. Theor.


Si duæ rectæ lineæ similiter secantur; erit ut quadratum primæ ad quadratum secundæ, ita quod fit sub primæ partibus rectangulum ad rectangulum sub partibus secundæ.

RECTÆ namque lineæ AB , $\Gamma\Delta$ similiter secantur in punctis E , Z : dico ut quadratum ex AB ad quadratum ex $\Gamma\Delta$, ita esse rectangulum ABE ad rectangulum $\Gamma Z\Delta$.

Quoniam enim ut AB ad EB ita ΓZ ad $Z\Delta$; erit componendo & permutando ut AB ad $\Gamma\Delta$ ita EB ad $Z\Delta$. & rursus quoniam ut AB



πιάνει τὴν $EZH\Theta$ τομὴν, ὥστε, συμπίπτουσιν τὰτε τὸ $EZH\Theta$ τομῆς καὶ τὸ $\Lambda\Gamma$ βάσεως ἐπιπέδω, τὴν κοινὴν τομὴν τὴν $\kappa\Lambda$ πρὸς ὁρθὰς εἶναι τῇ $\Gamma\Lambda\Lambda$ εὐθείᾳ, ὥστε τὸ $EZH\Theta$ τομῆς ἡχθῶ τις εὐθεῖα παράλληλος τῇ $\kappa\Lambda$ ἢ ZM , καὶ πρὸς ἐκδιδίχθῃ περατῶσθαι κατὰ τὸ ἕτερον μέρος τὸ ἐπιφανέως κατὰ τὸ Θ . λέγω ὅτι ἡ ZM πίπτει ἐπὶ τὴν $E\Theta$, καὶ ὅτι ἴση ἐστὶν ἢ ZM τῇ $M\Theta$.



Επεὶ γὰρ ἐν τῇ $EZH\Theta$ τομῇ παράλληλος ἡκται τῇ $\kappa\Lambda$ ἢ ZM : ἐντὸς ἄρα πίπτει τῇ $\Gamma\Delta$ παραλληλογράμμῳ. ἐπεὶ δὲ ἐστὶν ἡ μὲν ZM εὐθεῖα ἐν τῷ $EZH\Theta$ ἐπιπέδῳ, ἡ δὲ $E\Theta$ κοινὴ τομὴ ἐστὶν αὐτῇ καὶ τῇ $\Gamma\Delta$ παραλληλογράμμῳ: ἡ ZM ἄρα ἐπὶ τὴν $E\Theta$ πίπτει. ὅτι καὶ ἡ ZM τῇ $M\Theta$ ἴση ἐστὶ φανερόν ἐστί, διὰ τὸ πρὸς τῇ Θ γωνίᾳ. Διὸν δὲ δὴ λέγω, ὅτι ἡ $\kappa\Lambda$, ὁρθῶς μένουσας τῇ κυλίνδρῳ, ἡ τῇ $\Gamma\Delta$ πρὸς

ὁρθὰς ὅντος τῇ βάσει τῇ κυλίνδρῳ, πρὸς ὁρθὰς ἐστὶ τῇ $E\Theta$. ἐπεὶ γὰρ τὸ μὲν $\Gamma\Delta$ ἐπιπέδῳ πρὸς ὁρθὰς ἐστὶ τῇ βάσει ἐπιπέδῳ, τῇ δὲ κοινῇ αὐτῶν τομῇ τῇ $\Gamma\Lambda\Lambda$ πρὸς ὁρθὰς ἐστὶν ἡ $\kappa\Lambda$, ἐν τῷ τῆς βάσεως ἐπιπέδῳ ἔσται καὶ τὸ λοιπὸν ἄρα τῷ τῇ $\Gamma\Delta$ παραλληλογράμμῳ ἐπιπέδῳ πρὸς ὁρθὰς ἐστὶν.

Εἰ δὲ τὸ $\Gamma\Delta$ ἂν ἔσται πρὸς ὁρθὰς τῇ βάσει, σκαληνὴ δὴλαδὴ ὅντος τῇ κυλίνδρῳ, ἐκ ἑσται πρὸς ὁρθὰς ἡ $\kappa\Lambda$ τῇ $\Lambda\Theta$. εἰ γὰρ διωκτὴν, ἔστω πρὸς ὁρθὰς ἡ $\kappa\Lambda$ τῇ $\Lambda\Theta$: ἐστὶ δὲ καὶ τῇ $\Lambda\Gamma$ πρὸς ὁρθὰς: ὥστε τὸ δι' αὐτῶν ἄρα ἐπιπέδῳ, τυχέσει τῷ $\Gamma\Delta$, πρὸς ὁρθὰς ἔσται ἡ $\kappa\Lambda$. ὥστε τὸ δι' αὐτῆς ἄρα ἐπιπέδον, τυχέσει τὸ τῇ Λ βάσει, πρὸς ὁρθὰς ἔσται τῷ $\Gamma\Delta$, ὅπερ ἐστὶν ὑπόκει· ἂν ἄρα ἡ $\kappa\Lambda$ πρὸς ὁρθὰς ἐστὶ τῇ $\Lambda\Theta$.

Εκ δὲ τῇ διδιδίχθῃ φανερόν, ὅτι ἡ $E\Theta$ διάμετρος ἐστὶ τῇ $EZH\Theta$ τομῇ: πάντες γὰρ πᾶς πρὸς τὴν $\kappa\Lambda$ καταγομένης ἐπ' αὐτὴν διχα τέμνει, ὡς περὶ τὴν $Z\Theta$.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ 16'.

Εάν δύο εὐθεῖαι ὁμοίως τμηθῶσιν ἔσται ὡς τὸ ἀπὸ τῇ πρώτης πρὸς τὸ ἀπὸ τῇ δευτέρας, ὅπως τὸ ἀπὸ τῇ τμημάτων τῇ πρώτης πρὸς τὸ ἀπὸ τῇ τμημάτων τῇ δευτέρας.

ΕΤΘΕΙΑΙ γὰρ αἱ AB , $\Gamma\Delta$ ὁμοίως τμηθῶσιν κατὰ πᾶς E , Z σημεία. λέγω ὅτι ὡς τὸ ἀπὸ τῇ AB πρὸς τὸ ἀπὸ τῇ $\Gamma\Delta$, ὅπως τὸ ἀπὸ τῇ AE , EB πρὸς τὸ ἀπὸ τῇ ΓZ , $Z\Delta$. Επεὶ γὰρ ὡς ἡ AE πρὸς EB ὅπως ἡ ΓZ πρὸς $Z\Delta$, συνθέντι ἄρα καὶ ἀναλλὰξ ὡς ἡ AB πρὸς $\Gamma\Delta$ ὅπως ἡ EB πρὸς $Z\Delta$. καὶ ἐπεὶ ὡς ἡ AE πρὸς EB ὅπως

ἔτιωσ ἡ ΓΖ πρὸς ΖΔ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΓΑΕ, ΕΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΖ, ΖΔ διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΕΒ πρὸς ΖΔ, τὰ τε γὰρ ἡπερ ἡ ΑΒ πρὸς ΓΔ· ἀλλὰ καὶ τὸ δὲ τὸ ΑΒ πρὸς τὸ δὲ τὸ ΓΔ διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΑΒ πρὸς ΓΔ· ὡς ἄρα τὸ δὲ τὸ ΓΔ ΑΒ πρὸς τὸ δὲ τὸ ΓΔ ἔτιωσ τὸ ὑπὸ ΓΑΕ, ΕΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΖ, ΖΔ· ὁ ποσὲν δὲ αἴτιον.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

Εάν κύλινδρος ἐπιτέδῃ τμηθῇ ἀξὸνος, τμηθῇ δὲ καὶ ἑτέρῳ ἐπιτέδῳ τέμνοντι τὸ τὴν βάσεως ἐπίπεδον, ἡ δὲ κοινὴ τομὴ τῶν τε βάσεως καὶ τῶν τεμνόντων ἐπιπέδων πρὸς ὁρθεῖς ἢ τῇ βάσει ἢ διὰ τῆς ἀξὸνος ὡς ἀλλήλογραμμῶν, ἡ τῇ ἐπὶ εὐθείας αὐτῇ, ὅπου δὲ τὸ τομῆς ἀχθῇ πρὸς τὴν διάμετρον ὡς ἀλλήλοσ τῇ εὐθυμῇ κοινῇ τομῇ τῶν ἐπιπέδων· ἡ ἀχθεῖσα διωθήσεται πρὸς ἑλόν, πρὸς δὲ τὸ ὑπὸ τῶν τμημάτων τῶν ἀξόμετρον τὸ τομῆς λόγον ἔχει, ὅν τὸ δὲ τὸ διάμετρον τὸ τομῆς πρὸς τὸ δὲ τὸ ἀξόμετρον τὴν βάσεως.

ΕΣΤΩ κύλινδρος, ὃς βάσεις μὲν οἱ Α, Β κύκλοι, τὸ δὲ ἀξὸν τῆς ἀξὸνος ὡς ἀλλήλογραμμοὶ τὸ ΓΔ, ὃ περ τῶν οὐ κύλινδρος ἐπιτέδῃ συμπίπτοντι τῶν τε βάσεως ἐπιπέδων κατ' εὐθείαν ὁρθεῖν πρὸς τῇ ΓΑ ἐκβληθεῖσαν, καὶ ἔστω ἡ γινόμενὴ τομὴ ἡ ΕΖΗ, κοινὴ τῇ τομῇ ὡς ἀλλήλογραμμῶν καὶ τῇ τεμνόντων ἐπιπέδων ἡ ΕΗ, ἀξόμετρον ἔστω τὸ τομῆς, ὡς ἐδείχθη· ληφθέντος δὲ πινος σημείου ἐπὶ τῇ τομῇ Ζ, κατήχθω ἀπ' αὐτοῦ ἐπὶ τὴν διάμετρον εὐθεία ὡς ἀλλήλοσ τῇ κοινῇ τομῇ τῶν ἐπιπέδων ἡ ΖΘ· πίπτει ἄρα ἡ ΖΘ ἐπὶ τῇ ΕΗ, ὡς ἐδείχθη· λέγω δὲ ὅτι τὸ ὑπὸ ΓΕΘ, ΘΗ πρὸς τὸ δὲ τὸ ΖΘ λόγον ἔχει, ὅν τὸ δὲ τὸ ΕΗ διάμετρον πρὸς τὸ δὲ τὸ ἀξόμετρον τὴν βάσεως.

Ἡχθῶ δὲ διὰ τὸ Θ ὡς ἀλλήλοσ τῇ ΓΑ ἡ ΚΘΛ, καὶ διὰ τὴν ΖΘ, ΚΛ εὐθεῖαν ἡχθῶ ἐπίπεδον, τομὴν ποιῶν τὴν ΚΖΛ. ἐπεὶ γὰρ ἡ μὲν ΚΛ τῇ ΓΑ ὡς ἀλλήλοσ, ἡ δὲ ΖΘ τῇ κοινῇ τομῇ τῶν ἐπιπέδων, ἔσθ' ἐν τῷ τῇ βάσεως ἐπίπεδῳ καὶ τῷ δὲ αὐτῶν ἄρα ἐπίπεδα παράλληλα ἔσιν· ἡ ΚΖΛ ἄρα τομὴ κύκλος ἐστὶ· πάλιν ἐπεὶ ὡς ἀλλήλοσ ἐστὶν ἡ μὲν ΚΛ τῇ ΓΑ, ἡ δὲ ΖΘ τῇ κοινῇ τομῇ τῶν ἐπιπέδων πρὸς ὁρθεῖς ἔσθ' ὡς πρὸς τῇ ΓΑ· καὶ ἡ ΖΘ ἄρα πρὸς ὁρθεῖς ἐστὶ τῇ ΚΛ· καὶ ἐστὶ κύκλος ὁ ΚΖΛ· τὸ ἄρα δὲ τὸ ΖΘ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν ΚΘ, ΘΛ. καὶ ἐπεὶ ἡ ΚΕ τῇ ΛΗ ὡς ἀλλήλοσ ἐστὶν· ὡς ἄρα ἡ ΚΘ πρὸς τῇ ΘΛ ἔτιωσ ἡ ΕΘ πρὸς τῇ ΘΗ· τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν

ad ΕΒ· ita ΓΖ ad ΖΔ; rectangulum ΑΕΒ ad rectangulum ΓΖΔ duplicatam rationem habebit ejus quam habet ΕΒ ad ΖΔ, hoc est, quam habet ΑΒ ad ΓΔ. sed & quadratum ex ΑΒ ad quadratum ex ΓΔ duplicatam rationem habet ejus quæ est ΑΒ ad ΓΔ: ergo ut quadratum ex ΑΒ ad quadratum ex ΓΔ ita rectangulum ΑΕΒ ad rectangulum ΓΖΔ, quod erat demonstrandum.

PROP. XIII. Theor.


Si cylindrus plano secetur per axem; & secetur alio plano basis planum secante, ita ut communis sectio basis & secantis plani perpendicularis sit ad basim parallelogrammi per axem, vel ad eam quæ in directum ipsi constituitur; à sectione autem ad diametrum ducatur recta communi planorum sectioni parallela: poterit dicta recta spatium quoddam, ad quod rectangulum sub partibus diametri sectionis contentum eam rationem habet, quam habet quadratum diametri sectionis ad quadratum diametri basis.

SIT cylindrus, cujus bases Α, Β κύκλοι; & parallelogrammum per axem ΓΔ; secetur autem cylindrus plano occurrenti plano basis secundum rectam lineam, quæ ad ipsam ΓΑ productam sit perpendicularis; sitque sectio facta ΕΖΗ; & communis sectio parallelogrammi ΓΔ & secantis plani sit recta ΕΗ, quæ diameter est sectionis, ut ostensum est; sumpto deinde in sectione quovis puncto Ζ, ab eo ad diametrum ducatur recta linea ΖΘ, parallela communi planorum sectioni: cadet igitur ΖΘ, ex iis quæ [per 11. huj.] demonstrata sunt, in ipsam ΕΗ: dico itaque rectangulum ΕΘΗ ad quadratum ex ΖΘ eam rationem habere quam diametri ΕΗ quadratum ad quadratum diametri basis.

Ducatur enim per Θ recta ΚΘΛ parallela ipsi ΓΑ; & per ΖΘ, ΚΛ rectas planum ducatur, quod faciat sectionem ΚΖΛ. itaque quoniam recta ΚΛ parallela est ipsi ΓΑ, & ΖΘ parallela communi planorum sectioni quæ in basis plano existit; igitur [per 15. 11.] quæ per ipsas transeunt plana inter se æquidistantia erunt: quare [per 5. huj.] circulus est sectio ΚΖΛ, rursus quoniam ΚΛ ipsi ΓΑ est parallela; & ΖΘ parallela communi sectioni planorum, quæ perpendicularis est ad ΓΑ: erit & ΖΘ ad ΚΛ perpendicularis, est autem circulus ΚΖΛ; ergo [per 4. huj.] quadratum ex ΖΘ rectangulo ΚΘΛ æquale erit. & cum parallela sit ΚΕ ipsi ΛΗ, erit ut ΚΘ ad ΘΛ ita ΕΘ ad ΘΗ: quare rectangu-

[] D

lum



lum $E\Theta H$ simile est rectangulo $K\Theta\Lambda$: & propterea ut rectangulum $E\Theta H$ ad ipsum $K\Theta\Lambda$, hoc est ad quadratum ex $Z\Theta$, ita [per 12. huj.] quadratum diametri BH ad quadratum ex $K\Lambda$, hoc est ad quadratum diametri basis.

PROP. XIV. Theor.

Recta linea, quæ per punctum quod diametrum sectionis bifariam dividit ordinatim in sectione applicatur, secunda diameter erit.

SIT sectionis BZH diameter BH , quæ bifariam secetur in Θ ; & $Z\Theta M$ ordinatim applicetur: dico ZM secundam diametrum esse sectionis.

Ducatur enim recta $NO\Xi$ parallela ipsi BH , & ducantur $N\Pi$, ΞP ipsi ZM parallelæ: ergo & $N\Pi$, ΞP ordinatim applicatæ sunt. itaque quoniam [per præced. 13. huj.] quadratum ex $N\Pi$ ad rectangulum $B\Pi H$ eandem habet rationem, quam habet quadratum diametri basis cylindri ad quadratum diametri sectionis, & habet quadratum ex ΞP ad rectangulum EPH hanc eandem rationem; erit ut quadratum ex $N\Pi$ ad rectangulum $B\Pi H$ ita quadratum ex ΞP ad rectangulum EPH , & permutando, est autem quadratum ex $N\Pi$ æquale quadrato ex ΞP ; parallelogrammum enim est $N\Pi P\Xi$: ergo & rectangulum $B\Pi H$ æquale est rectangulo EPH . quibus sublati ab æqualibus quadratis ex $B\Theta$, & ΘH , erit [per 5. 2.] reliquum quadratum ex $\Pi\Theta$ reliquo quadrato ex ΘP æquale: æqualis igitur est $\Pi\Theta$ ipsi ΘP , hoc est NO ipsi $O\Xi$. Eadem ratione & aliæ omnes ipsi BH parallelæ à ZM bifariam secabuntur: ergo [ex definit.] ZM secunda diameter est sectionis.



PROP. XV. Theor.

Si cylindrus plano secetur basis planum secante; communis autem sectio plani basis & secantis plani perpendicularis sit ad basim parallelogrammi per axem, vel ad eam quæ in directum ipsi constituitur: quæ à sectione ad diametrum ducitur, parallela communi planorum sectioni jam dictæ, poterit spatium quoddam, ad quod rectangulum sub diametri partibus contentum eam rationem habet, quam habet diametri sectionis quadratum ad quadratum secundæ diametri; quæ vero à sectione ad secundam diametrum ducitur parallela diametro, poterit spatium, ad

$E\Theta$, ΘH ὁμοίον ἐστὶ τῷ ὑπὸ $K\Theta$, $\Theta\Lambda$ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ Γ $E\Theta$, ΘH πρὸς τὸ ὑπὸ Γ $K\Theta$, $\Theta\Lambda$, τετρίσι πρὸς τὸ δὲ $Z\Theta$, ὥτως τὸ δὲ BH διαμέτρῳ πρὸς τὸ δὲ $K\Lambda$, τετρίσι πρὸς τὸ δὲ Γ Δ διαμέτρῳ Γ βάσει.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΔ'.

Ἡ $\Delta\Gamma$ διχοτομίας Γ διαμέτρῳ Γ τομῆς τεταγμένης ἀρμονικῇ ἐν τῇ τομῇ, δευτέρα διάμετρος ἐστί.

ΕΣΤΩ ἡ Γ EZH τομῆς διάμετρος ἡ BH , ἡ δὲ $\Delta\Gamma$ τεταγμένη κατὰ τὸ Γ , καὶ διήχθω ἡ $Z\Theta M$ τεταγμένη: λέγω ὅτι ἡ ZM δευτέρα διάμετρος ἐστὶ τῆς τομῆς.

Ἡχθῶ ὡς καὶ πρὶν τὴν BH ἡ $NO\Xi$, ὡς καὶ δὲ πρὶν ZM αἱ $N\Pi$, ΞP τεταγμέναι ἄρα εἰσὶ καὶ αἱ $N\Pi$, ΞP ἐπεὶ ἐν τῷ δὲ Γ τῆς $N\Pi$ πρὸς τὸ ὑπὸ $B\Pi H$ λόγον ἔχει, ὃν τὸ δὲ Γ τῆς διαμέτρῳ τῆς βάσεως τῆς κυλίνδρου πρὸς τὸ δὲ Γ τῆς διαμέτρῳ τῆς τομῆς, ἔχει δὲ καὶ τὸ δὲ Γ τῆς ΞP πρὸς τὸ ὑπὸ EPH τὸν αὐτὸν λόγον ὡς ἄρα τὸ δὲ Γ τῆς $N\Pi$ πρὸς τὸ ὑπὸ $B\Pi H$ ὥτως τὸ δὲ Γ τῆς ΞP πρὸς τὸ ὑπὸ EPH , καὶ ἐναλλάξ. ἴσον δὲ τὸ δὲ Γ $N\Pi$ τῷ δὲ Γ ΞP , ὡς ἄλλῃ λόγῳ ἀμμον γὰρ ἐστὶ τὸ $N\Pi P\Xi$ ἴσον ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ $B\Pi H$ τῷ ὑπὸ EPH . καὶ ἀπ' ἴσων ἀφαιρεται τῶν δὲ Γ $E\Theta$, ΘH λοιπὸν ἄρα τὸ δὲ Γ $\Pi\Theta$ λοιπῶ τῷ δὲ Γ ΘP ἴσον ἐστίν. ἴση ἄρα ἡ $\Pi\Theta$ γῆ ΘP , τετρίσιν ἡ NO τῇ $O\Xi$. ὁμοίως δὲ πᾶσι αἱ παρὰ τὴν BH διχα τέμνοντι ὑπὸ τῆς ZM δευτέρας διαμέτρος ἄρα ἐστὶν ἡ ZM .


ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΕ'.

Εάν κύλινδρος ἐπιπέδῳ τμηθῇ τέμνοντι τὸ Γ βάσεως ἐπιπέδον, ἡ δὲ κοινὴ τομὴ τῷ Γ βάσεως καὶ Γ τέμνοντος ἐπιπέδου πρὸς ὀρθὰς ἢ τῇ βάσει τῶ $\Delta\Gamma$ ὁ $\Delta\Gamma$ ὡς ἄλλῃ λόγῳ ἀμμον, ἢ τῇ ἐπ' εὐθείας αὐτῇ ἢ μὲν δὲ Γ τομῆς ἐπὶ Γ διαμέτρῳ ἀχθεῖσα ὡς ἄλλῃ λόγῳ ἀμμον τῇ ἐφ' ἑαυτῇ κοινῇ τομῇ Γ ἐπιπέδον, διωθήσεται χωρίον, πρὸς ὃ τὸ ὑπὸ Γ τμημάτων Γ διαμέτρῳ λόγον ἔχει, ὃν τὸ δὲ Γ διαμέτρῳ Γ τομῆς πρὸς τὸ δὲ Γ δευτέρας διαμέτρῳ. ἡ δὲ δὲ Γ τομῆς ἐπὶ Γ δευτέρας διαμέτρῳ ἀχθεῖσα παρὰ Γ λόγῳ ἀμμον τῇ διαμέτρῳ διωθήσεται χωρίον, πρὸς ὃ τὸ

ὅτι ὑπὸ τῆς τετραγώνου τῆς διὰ τῆς ἀφ' ἑαυτῆς ἀφ' ἑαυτῆς
λόγου ἔχει, ὅτι τὸ ὑπὸ τῆς διὰ τῆς ἀφ' ἑαυτῆς ἀφ' ἑαυτῆς
πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς ἀφ' ἑαυτῆς ἀφ' ἑαυτῆς.

ΕΣΤΩ κύλινδρος, ὃς κατασκευάσθω ὡς ἐν τῷ
17. ἐπεὶ ἔνδεξις τὸ μὲν ὑπὸ τῆς ΕΘ, ΘΗ
πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς ΖΗ ὡς τὸ ὑπὸ τῆς ΕΗ πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς
ἀφ' ἑαυτῆς ἀφ' ἑαυτῆς διχοτομίας τῆς ΕΗ πετα-
γμύως, ὡς ἐδείχθη πρὸς τὸ 9. θεωρήματι· ἡ δὲ
διχοτομία τῆς ἀφ' ἑαυτῆς ἀφ' ἑαυτῆς διχοτομίας
ἀφ' ἑαυτῆς ἀφ' ἑαυτῆς, ὡς ἐν τῷ πρὸς τῷ 8. ἐστὶν ὡς τὸ
ὑπὸ τῆς ΕΗ ἀφ' ἑαυτῆς ἀφ' ἑαυτῆς πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς διὰ τῆς
ἀφ' ἑαυτῆς ἀφ' ἑαυτῆς, ὡς τὸ ὑπὸ τῆς ΕΘ, ΘΗ πρὸς τὸ ὑπὸ
τῆς ΖΘ. ὅπερ εἶδει δεῖξαι.

Ἀλλὰ δὴ ὑποκείτω τὸ
μὲν Θ διχοτομῆς τῆς ΕΗ διά-
μετρον, τῆς δὲ ΖΘ πετα-
γμύης ἐναι· δότιρα ἄρα
ἀφ' ἑαυτῆς ἀφ' ἑαυτῆς ἡ ΖΘ. κατήχθω
ἐπ' αὐτῇ δὴ τῆς τμήτης ἡ
ΜΝ ὡς ἀπὸ τῆς ΕΗ·
λέγω ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν ΦΝ,
ΝΖ πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς ΜΝ
λόγον ἔχει, ὅτι τὸ ὑπὸ τῆς
ΦΖ διὰ τῆς ἀφ' ἑαυτῆς ἀφ' ἑαυτῆς πρὸς
τὸ ὑπὸ τῆς ΕΗ ἀφ' ἑαυτῆς ἀφ' ἑαυτῆς
τμήτης. ἡ γὰρ ΖΘ τῆς ΜΝ
ὁμοειδὲς ὡς ἀπὸ τῆς ΕΗ
ὁμοειδὲς ὡς ἀπὸ τῆς ΕΗ
ὁμοειδὲς ὡς ἀπὸ τῆς ΕΗ



κύλινδρον· ποιησὶ δὲ παραλλήλογραμμον τῆς τμήτης.
ποιεῖται τὸ ΡΣ, ὡς ὅταν ἡ κοινὴ τμήτης αὐτῆς μὲν καὶ τῆς
παραλλήλων κύκλων αἱ ΣΤ, ΕΟ, ΠΡ, αὐτῆς καὶ τῆς
ΕΖΗ τμήτης κοινὴ τμήτης εἴη ἡ ΜΝ. ἐπεὶ ἔνδεξις ὡς ἀπὸ
τῆς ΕΗ ἀφ' ἑαυτῆς ἀφ' ἑαυτῆς πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς ΕΘ, ΘΗ πρὸς τὸ
ὑπὸ τῆς ΖΘ. ὅπερ εἶδει δεῖξαι. ὡς ἀπὸ τῆς ΕΗ ἀφ' ἑαυτῆς
ἀφ' ἑαυτῆς πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς ΕΘ, ΘΗ πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς ΖΘ.
ὅπερ εἶδει δεῖξαι. ὡς ἀπὸ τῆς ΕΗ ἀφ' ἑαυτῆς ἀφ' ἑαυτῆς
πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς ΕΘ, ΘΗ πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς ΖΘ. ὅπερ εἶδει
δεῖξαι. ὡς ἀπὸ τῆς ΕΗ ἀφ' ἑαυτῆς ἀφ' ἑαυτῆς πρὸς τὸ
ὑπὸ τῆς ΕΘ, ΘΗ πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς ΖΘ. ὅπερ εἶδει δεῖξαι.

quod rectangulum sub secundæ dia-
metri partibus eam habet rationem,
quam quadratum secundæ diametri
ad ipsius diametri quadratum.

SIT cylindrus, & constuantur omnia, sicut
in decimo tertio theoremate. quoniam
igitur ostensum est, rectangulum ΕΘΗ esse ad
quadratum ex ΖΘ sicut quadratum ex ΕΗ ad
quadratum diametri basis, hoc est ad quadra-
tum ejus quæ ordinatim applicata bifariam fecat
ipsam ΕΗ, uti demonstratum est in nono theore-
mate; ea autem quæ ordinatim applicatur & bi-
fariam diametrum fecat, secunda diameter est, ex
præcedenti theoremate: ergo ut quadratum dia-
metri ΕΗ ad quadratum secundæ diametri ita
rectangulum ΕΘΗ ad quadratum ex ΖΘ. quod
erat demonstrandum.

Sed ponatur jam in puncto Θ bifariam secari dia-
metrum ΕΗ, & rectam ΖΘ
ordinatim applicatam esse;
erit igitur ΖΘ secunda dia-
meter. ducatur autem ad
ipsam recta ΜΝ parallela
ipsi ΕΗ: dico rectangulum
ΦΝΖ ad quadratum ex ΜΝ
eam rationem habere quam
quadratum ex ΦΖ secundā
diametro ad quadratum dia-
metri sectionis ΕΗ. ducatur
per rectam ΜΝ planum æ-
quidistans parallelogrammo
ΓΔ, quod cylindrum secet:
faciet igitur [per 3. huj.]

sectionem parallelogrammum. faciat ΡΣ; &
communes sectiones ipsius & æquidistantium
circularum sint ΣΤ, ΕΟ, ΠΡ; ipsius vero &
plani sectionis ΕΖΗ communis sectio ΜΝ.
itaque quoniam æquidistantia plana ΓΔ, ΡΣ
secantur à plano ΚΖΛ, communes eorum se-
ctiones parallelae erunt: parallela est igitur ΘΚ
ipsi ΝΖ. erat autem & ΘΕ ipsi ΝΜ parallela:
ergo [per 10. 11.] angulus ΚΘΕ æqualis est an-
gulo ΖΝΜ. & cum parallelogrammum ΡΣ
parallelogrammo ΓΔ æquiangulum sit, id quod
demonstravimus in tertio theoremate, angulus
ΣΠΡ angulo ΒΓΑ æqualis erit, hoc est ΣΖΝ
ipsi ΕΚΘ: similia igitur triângula sunt ΕΚΘ,
ΜΖΝ: quare ut ΚΘ ad ΘΕ ita ΖΝ ad ΝΜ,
& [per 22. 6.] ut quadratum ex ΚΘ ad qua-
dratum ex ΘΕ, hoc est ut quadratum ex ΦΖ
secundā diametro ad quadratum diametri ΕΗ,
ita quadratum ex ΖΝ ad quadratum ex ΝΜ. sed
quadratum ex ΝΖ æquale est rectangulo ΦΝΖ,
quia ΚΖΛ circulus est & ΘΖ perpendicularis
ad ΚΘ, ΖΝ; ut igitur quadratum ex ΦΖ se-
cundā diametro ad quadratum diametri ΕΗ ita
rectangulum ΦΝΖ ad quadratum ex ΜΝ. quod
erat demonstrandum.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ 16.

Εάν κύλινδρος τομῆς συζυγῆς ἀφ' ἑαυτῆς ἀφ' ἑαυτῆς
ποιεῖται ὡς ἡ διάμετρος τῆς τομῆς πρὸς τὴν διὰ τῆς

PROP. XVI. Theor.

Si in cylindri sectione conjugatæ dia-
metri sint; & fiat ut diameter se-
ctionis

tionis ad secundam diametrum ita
secunda diameter ad aliam quampiam:
quæ à sectione ad diametrum ordi-
natim applicata est poterit spatium,
quod adjacet tertiæ illi proportionali,
latitudinem habens eam quæ inter
ordinatim applicatam & sectionem in-
terjicitur, deficiens vero figura simili
ei quæ sub diametro ipsâ & tertiâ
proportionali continetur.

SIT cylindri sectio, cujus diameter quidem AB , secunda vero diameter $\Gamma\Delta$, & fiat ut AB ad $\Gamma\Delta$ ita $\Gamma\Delta$ ad AH ; apteturque AH ipsi AB ad rectos angulos; & junctâ BH , applicetur EZ ordinatim ad AB ; & ducatur $Z\Theta$ ipsi AH parallela & ΘK parallela ipsi AZ : dico quadratum ex EZ æquale esse rectangulo $A\Theta$.

Quoniam enim ut quadratum ex AB ad quadratum ex $\Gamma\Delta$ ita recta AB ad ipsam AH, hoc est BZ ad $Z\Theta$; ut autem quadratum ex AB ad quadratum ex $\Gamma\Delta$ ita rectangulum BZA ad quadratum ex EZ, & ut BZ ad $Z\Theta$ ita BZA rectangulum ad rectangulum ΘZA , hoc est ad $A\Theta$ parallelogrammum: quadratum igitur ex EZ æquale erit rectangulo $A\Theta$, quod quidem adjacet tertiæ proportionali AH, latitudinem habens AZ, & deficiens figura HK \ominus ipsi HAB simili. vocetur autem AB transversum figuræ latus, & AH latus rectum.

Ex quibus manifeste constat, cylindri sectionem $AB\Gamma$ ellipsim esse. quæcunque enim hoc loco demonstrata sunt inesse huic sectioni, omnia similiter & coni ellipsi insunt, ut demonstratum est in elementis conicis, theoremate quinto decimo [libri primi] iis saltem qui ejus theorematibus vim rite perceperint : & nos quoque in nostris in idipsum commentariis geometrice demonstravimus*.

PROP. XVII. *Theor.*

Si in cylindri sectione conjugatæ diametri sint; & fiat ut secunda diameter ad diametrum ita diameter ad aliam quampiam: quæ à sectione ad secundam diametrum ordinatim applicatur poterit spatium quod adjacet tertiæ proportionali, latitudinem habens eam quæ inter ordinatim applicatam & sectionem interjicitur, deficiens vero figura simili ei quæ sub secundâ diametro & tertia proportionali inventâ continetur.

τέτραν διάμετρον τῇ τομῇ ὅπως ἡ δὲ τέτρα διά-
 μετρος πρὸς ἄλλην πηδᾷ· ἥτις ἀνὰ ἀπὸ τῇ τομῇ
 ὅπῃ τῇ διάμετρον ἀχθῇ τεταγμένης διωήσῃ
 τὸ πρὸς τὴν τρίτῃ ἀνάλογον πρὸς κείμενον
 χεῖλιον, πλάτος ἔχον τῇ ἀπὸ αὐτῆς τεταγμένης
 ἀχθείσῃς ὑπολαμβάνομένην πρὸς τῇ τομῇ,
 ἐλλείπον εἶδει ὁμοίῳ πρὸς πεπεχυμένῳ ὑπὸ τῇ
 διαμέτρῳ καὶ τῇ τρίτῃ ἀνάλογον.

ΕΣΤΩ κυλίνδρος τομή, ἥς διάμετρος μὲν ἡ
ΑΒ, δαυτέρα δὲ διάμετρος ἡ ΓΔ, καὶ γενέσθαι
ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΓΔ ὥτως ἡ ΓΔ πρὸς καὶ ΑΗ, καὶ
κέκαστω ἡ ΑΗ πρὸς ὀρθὰς τῇ ΑΒ, Ἐπεξεύχθω ἡ
ΒΗ, Ἐπὶ τῇ ΑΒ ἤχθω πεπεγμμένης ἡ ΕΖ, καὶ ὡς
μὲν τῇ ΑΗ ἡ ΖΘ, παρὰ δὲ τῇ ΑΖ ἡ ΘΚ· λεγώ οτι
τὸ ἀπὸ τῇ ΕΖ ἴσον ἐστὶ τῷ ΑΘ ὡς ἄλληλογράμμου.

Επειὶ ὡς τὸ ἀπὸ Γ ΑΒ
πρὸς τὸ ἀπὸ Γ ΓΔ ἔτῳς
ἢ ΑΒ πρὸς πλὴν ΑΗ, τυχέει
ἢ ΒΖ πρὸς Ζ Θ· ἀλλ' ὡς μὲν
τὸ ἀπὸ Γ ΑΒ πρὸς τὸ ἀπὸ
 Γ ΓΔ ἔτῳς τὸ ὑπὸ Ζ Β,
Ζ Α πρὸς τὸ ἀπὸ Ζ Θ, ὡς
ἢ ἢ ΒΖ πρὸς Ζ Θ ἔτῳς τὸ
ὑπὸ Β Ζ, Ζ Α πρὸς τὸ ὑπὸ
Θ Ζ, Ζ Α, τυχέει τὸ Α Θ
παραλλήλογραμμον· τὸ ἀρα

ἀπὸ τῆς ΕΖ ἰσὺν εἰς τῷ ΑΘ, ὃ περικυκλῆται περὶ τὴν
ΑΗ τρίτῳ ἀνάλογον, πλάτος ἔχον τὴν ΑΖ, ἐλλεί-
πον εἶδει τῷ ὑπὸ ΗΚΘ ὁμοίῳ τῷ ὑπὸ ΑΗΒ. κα-
λεῖσθαι δὲ ἢ μὲν ΑΒ πλάγια εἶδες πλάρῃ, ἢ
δὲ ΑΗ ὀρθία εἶδες πλάρῃ.

Τῶν ἑξ ἑξ ἔχοντων, φανερόν ἐστιν ὅτι ἡ Α Β Γ Δ
κυλίνδρου τομὴ ἑλλείψις ἐστίν. ὅσα γὰρ ἐνταῦθα τῇ
τομῇ ἐδείχθη ὑπάρχοντα, πάντα ὁμοίως καὶ ὅτι τὰ
κῶνα τῇ ἑλλείψει ὑπάρχον· ὡς ἐν τοῖς κωνικοῖς δεί-
κνυται, θεωρήματι ιε, τοῖς διωαμῆοις λέγειν τὴν
ἀκρίβειαν τῶν θεωρημάτων· καὶ ἡμεῖς ἐν τοῖς εἰς αὐ-
τὰ ὑπομνήμασιν γεωμετρικῶς ἀπεδείξαμεν.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ 15.

Εάν ἐν κυλίνδρῳ τομῇ συζυγεῖς ἀξίμετροι ὥσθ, καὶ
 ποιηθῇ ὡς ἡ δολύτρεα. ἀξίμετρος πρὸς τὴν διά-
 μετρον ὅπως ἡ ἀξίμετρος πρὸς ἄλλην πινά-
 ῃς αὖ ἀπὸ τῆς τομῆς ὅτι τὴν δολύτρεαν ἀξίμε-
 τρον ἀχθῇ τεταγμένως, διωθήσεται τὸ πρῶτον τὴν
 τρίτῳ ἀνάλογον, πλάτος ἔχον τὸ ὑπὸ αὐτῆς
 τεταγμένως ἀχθείσης ἀπολαμβάνομένην πρὸς
 τῇ τομῇ, ἐλλείπον εἶδει ὁμοίᾳ τῇ περὶ τεταγμένως
 ὑπὸ τῆς δολύτρεας διαμέτρους καὶ τῆς πρὸς αὐτῆς
 τρίτης ἀνάλογον.

* Vide *Enticii* Comment. in prop. XVI. lib. primi Conicorum *Apollonii*.

ΕΣΤΩ κυλίνδρου τομή η $ΑΒΓΔ$, η γενέσθω ως η $ΓΔ$ δεύτερα διάμετρος πρὸς τὴν $ΑΒ$ διάμετρον ἔστω η $ΑΒ$ πρὸς τὴν $ΓΗ$, η καὶ ὡς η $ΓΗ$ πρὸς ὁρθὰς τῇ $ΓΔ$, η ἐπεξέχθω η $ΔΗ$, η δὲ τῇ $ΓΔ$ κατὰ ἑαυτὴν πεπιγμένως η $ΕΖ$, η ὡς μὲν τὴν $ΓΗ$ η $ΖΘ$, ὡς δὲ τὴν $ΓΔ$ η $ΘΚ$. λέγω ὅτι τὸ δὲ τῇ $ΕΖ$ ἴσον ἐστὶ τῷ $ΓΘ$ ὡς παραλληλογράμμου.

Επεὶ γὰρ ὡς τὸ δὲ τῇ $ΓΔ$ πρὸς τὸ δὲ τῇ $ΑΒ$ ἔστω η $ΓΔ$ πρὸς τὴν $ΓΗ$, τὰ τε-
ταρτα ἡ $ΔΖ$ πρὸς $ΖΘ$,
ἀλλ' ὡς μὲν τὸ δὲ τῇ $ΓΔ$ πρὸς τὸ δὲ τῇ $ΑΒ$ ἔστω τὸ ὑπὸ τῶν $ΔΖ, ΖΓ$ πρὸς τὸ δὲ τῇ $ΕΖ$, ταῦτα γὰρ ἐδείχθη· ὡς δὲ ἡ $ΔΖ$ πρὸς $ΖΘ$ ἔστω τὸ ὑπὸ $ΔΖ, ΖΓ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΘΖ, ΖΓ$, τὰ τεταρτα τὸ $ΓΘ$ ὁρθογώνιον· ἴσον ἄρα τὸ δὲ τῇ $ΕΖ$ τῷ $ΓΘ$, ὃ ὡς ἐδείχθη· ὡς δὲ τῇ $ΕΖ$ ἀνάλογον τὴν $ΓΗ$, ἀνάλογον ἔχον τὴν $ΖΓ$, ἡλλοῦται ὅτι τῷ ὑπὸ $ΘΚΗ$ ὁμοίω τῷ ὑπὸ $ΔΓΗ$. ὅπερ εἶναι δεῖναι.


Ταῦτα σαφένετα παρακαλεσθῆ τῇ ἐλλείψει ἐν τῷ κ'. θεωρήματι ἔ. πρῶτον τῇ κωνικῶν· ἡλλοῦται ἄρα ἐστὶν ἡ $ΑΒΓΔ$ τομή τῆς κυλίνδρου.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κ'.

Εὰν ἐν κυλίνδρῳ τομὴ εὐθεῖα ἀχθῶσιν ὅτι τῇ διάμετρον πεπιγμένως· ἔστω τὰ ἀπ' αὐτῶν τεταρτα πρὸς μὲν τὰ τεταρτα χρεῖα ὑπὸ τῇ ἀποκαταμείνῃ ὑπ' αὐτῶν πρὸς τοῖς πέρασι τῇ πλαγίᾳ ἢ ὅσας πλευρὰς, ὡς ἔδειξεν ἡ ὁρθία πλευρὰ πρὸς τὴν πλαγίαν πρὸς ἑαυτὰ δὲ ὡς τὰ τεταρτα χρεῖα ὑπὸ τῇ, ὡς εἶρη, ἀποκαταμείνῃ εὐθεῖᾳ.

ΕΣΤΩ κυλίνδρου τομή η $ΑΒΓΔ$, διάμετρος δὲ αὐτῆς η $ΑΔ$ η πλαγία πλευρὰ ἢ ὅσας, ὁρθία δὲ ἢ ὅσας πλευρὰς η $ΑΗ$, καὶ δὲ τῇ $ΑΔ$ πεπιγμένως ἡχθῶσιν αἱ $ΒΕ, ΓΖ$. λέγω ὅτι τὸ μὲν δὲ τῇ $ΒΕ$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῇ $ΑΕ, ΕΔ$ ἐστὶν ὡς ἡ $ΗΑ$ πρὸς $ΑΔ$, τὸ δὲ τῇ $ΒΕ$ πρὸς τὸ δὲ τῇ $ΓΖ$ ἐστὶν ὡς τὸ ὑπὸ $ΑΕΔ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΑΖΔ$.

Επεὶ γὰρ ὡς τὸ ἀπὸ τῇ δὲ πρῶτας διάμετρος πρὸς τὸ ἀπὸ τῇ διάμετρος ἔστω τὸ ἀπὸ τῇ $ΒΕ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΑΕΔ$, καὶ ἡ $ΑΗ$ ὁρθία πλευρὰ πρὸς τὴν $ΑΔ$ πλαγίαν· ὡς ἄρα ἡ ὁρθία πρὸς τὴν πλαγίαν ἔστω τὸ ἀπὸ τῇ $ΒΕ$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῇ $ΑΕΔ$. ὁμοίως δὲ η $ΓΖ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΑΖΔ$ · η ἡ ἀλλὰ, ὡς ὡς τὸ



SIT cylindri sectio $ΑΒΓΔ$, &c. fiat ut $ΓΔ$ secunda diameter ad diametrum $ΑΒ$ ita $ΑΒ$ ad $ΓΗ$; ponaturque $ΓΗ$ ad rectos angulos ipsi $ΓΔ$, &c. jungatur $ΔΗ$; deinde ad $ΓΔ$ ordinatim applicetur $ΕΖ$, &c. ducatur $ΖΘ$ quidem ipsi $ΓΗ$ parallela, $ΘΚ$ vero parallela ipsi $ΓΔ$: dico quadratum ex $ΕΖ$ parallelogrammum $ΓΘ$ æquale esse.

Quoniam enim ut quadratum ex $ΓΔ$ ad quadratum ex $ΑΒ$, ita recta $ΓΔ$ ad ipsam $ΓΗ$, hoc est $ΔΖ$ ad $ΖΘ$; ut autem quadratum ex $ΓΔ$ ad quadratum ex $ΑΒ$ ita rectangulum $ΔΖΓ$ ad quadratum ex $ΕΖ$,

quod [per 15. huj.] demonstratum jam est: ut autem $ΔΖ$ ad $ΖΘ$ ita rectangulum $ΔΖΓ$ ad rectangulum $ΘΖΓ$, hoc est ad $ΓΘ$: quadratum igitur ex $ΕΖ$ æquale est rectangulo $ΓΘ$, quod quidem adjacet tertiæ proportionali $ΓΗ$, latitudinem habens $ΖΓ$, deficiens vero figura $ΘΚΗ$ simili ei quæ sub $ΔΓΗ$ continetur. quod erat demonstrandum.

Hæc autem manifestissime conveniunt ellipsi, ut ex quinto decimo theoremate primi Conicorum apparet: unde sequitur sectionem cylindri $ΑΒΓΔ$ necessario ellipsim esse.

PROP. XVIII. Theor.

Si in sectione cylindri rectæ lineæ ad diametrum ordinatim applicentur: erunt quadrata earum ad spatia contenta eis quæ inter ipsas & terminos transversî lateris figuræ interjiciuntur, ut rectum figuræ latus ad transversum; inter sese vero ut spatia, quæ rectis modo dicto interceptis continentur.

SIT cylindri sectio $ΑΒΓΔ$, cujus diameter quidem &c transversum figuræ latus $ΑΔ$, rectum vero latus $ΑΗ$, &c ad ipsam $ΑΔ$ ordinatim applicentur $ΒΕ, ΓΖ$: dico ut quadratum ex $ΒΕ$ ad rectangulum $ΑΕΔ$ ita esse $ΗΑ$ ad $ΑΔ$, &c quadratum ex $ΒΕ$ ad quadratum ex $ΓΖ$ sicut rectangulum $ΑΕΔ$ ad rectangulum $ΑΖΔ$.

Quoniam enim ut quadratum secundæ diametri ad diametri quadratum ita est quadratum ex $ΒΕ$ ad rectangulum $ΑΕΔ$, &c ita $ΑΗ$ re-

ctum latus ad transversum $ΑΔ$: erit ut rectum latus ad transversum ita quadratum ex $ΒΕ$ ad rectangulum $ΑΕΔ$. similiter autem &c quadratum ex $ΓΖ$ ad rectangulum $ΑΖΔ$: quare &c permu-

[] E

tando

Διζήμετρον ὁ ΒΕΓ κύκλος, βάσις ἐσόμενος κώνυς ἢ τὸ ΔΙΔ ἢ ἄλλου τριγώνου ἐπὶ τὸ ΑΒΓ. καὶ τὸ ΘΗ ἐκβληθείσης ὅππῃ τὸ Ο, ἤχθω πρὸς ὀρθὰς τῇ ΒΕ ἢ ΟΠ, ἐν τῷ τὸ κύκλων ὀπίπεδον ἔσται, καὶ ἤχθω ΔΙΔ τὸ ΟΠ, ὁ Θ εὐθείων ὀπίπεδον· ποιήσεται δὲ τομὴ ἐν τῷ κώνῳ τῷ ὅππῃ τὸ ΒΕΓ βάσις. ποιήσεται τὸ ΘΡΗ ἢ ΘΗ ἄρα εὐθεία Διζήμετρος ἐστὶ τὸ τομῆς. τὸ ἔν ΘΗ διχα τμηθείσης κατὰ τὸ Σ, κατήχθωσαν πεταγμένως ἐπ' αὐτήν, δώδεκα μὲν διάμετρος ἡ ΡΣΤ, τυχῶσαι ἢ ἡ ΓΦ, καὶ γινέσθω ὡς τὸ δὸτὸ τὸ ΘΗ Διζήμετρος τὸ ΘΡΗ τομῆς πρὸς τὸ δὸτὸ τὸ ΡΤ δώδεκα διαμέτρους τὸ αὐτῆς τομῆς, ἔστω ἡ ΘΗ πλαγία ἢ εἶδος πλάτους πρὸς τὸ ΘΧ ὀρθίαν.

Ἐπεὶ ἔν ἡ μὲν ΘΚ τῇ ΑΖ ὁμοειδέης ἐστίν, ἡ δὲ ΘΟ τῇ ΑΕ· ὡς ἄρα τὸ δὸτὸ τῆς ΑΕ πρὸς τὸ δὸτὸ τῆς ΕΖ ἔστω τὸ δὸτὸ τῆς ΘΟ πρὸς τὸ δὸτὸ τῆς ΚΟ. ἀλλ' ὡς μὲν τὸ δὸτὸ τῆς ΑΕ πρὸς τὸ δὸτὸ τῆς ΒΕ, ΕΓ * ἔστω τὸ δὸτὸ τῆς ΘΗ Διζήμετρος τὸ ἔν κώνυς τομῆς πρὸς τὸ ἀπὸ τὸ ΡΤ δώδεκα διαμέτρους τῆς αὐτῆς τομῆς· ὡς δὲ τὸ ἀπὸ τὸ ΘΟ πρὸς τὸ ἀπὸ τὸ ΟΚ ἔστω τὸ ἀπὸ τῆς ΘΗ πρὸς τὸ ἀπὸ τὸ ΚΛ, ταῦτα ἔστω τὸ ἀπὸ τὸ ΗΘ διάμετρος τὸ ἔν κυλίνδρου τομῆς πρὸς τὸ ἀπὸ τὸ δώδεκα διαμέτρους τὸ ἔν κυλίνδρου τομῆς, ὡς εἰδήσθαι πρῶτον· ἡ ἄρα δώδεκα διάμετρος τὸ ἔν κυλίνδρου τομῆς ἴση ἐστὶ τῇ ΡΤ δώδεκα διαμέτρους τὸ ἔν κώνυς τομῆς. καὶ ἐστὶν ἡ διχοτομία τὸ ΘΗ κατὰ τὸ Σ, καὶ πρὸς ὀρθὰς ἄρα τῇ ΘΗ δώδεκα Διζήμετρος τῆς ἔν κυλίνδρου τομῆς, ὡς αὖτε ἢ ΡΤ· ἡ ἄρα ΡΤ δώδεκα διάμετρος ἐστὶ τὸ κώνυς καὶ τῆς ἔν κυλίνδρου τομῆς. ὁμοίως ἢ ἡ ΘΗ Διζήμετρος ἐστὶ τῆς ἔν κώνυς καὶ τῆς ἔν κυλίνδρου τομῆς· τὸ Ρ ἄρα σημεῖον ὅππῃ τῆς κωνικῆς ὀπίφανείας ἐπὶ τῆς ἔν κυλίνδρου ὀπίφανείας ἐστὶ· πάλιν ἐπεὶ ἐν τῇ τομῆς τῆς κώνυς ἢ ἔν κυλίνδρου αἱ αὐταὶ ἐστὶ Διζήμετροι, ἢ πὲρ ΘΗ ἢ ΡΤ· καὶ ἡ τριτὴ ἄρα ἀνάλογον ἡ αὐτὴ, ταῦτα ἢ ΘΧ ὀρθία ἢ εἶδος πλάτους· ἡ ἄρα ΘΧ καὶ ὅππῃ τὸ κυλίνδρου τομῆς ὀρθία ἐστὶ ἢ εἶδος πλάτους. ἐπεὶ ἔν ὡς ἡ ΘΗ πρὸς τὸ ΘΧ ἔστω τὸ ὑπὸ τὸ ΗΦ, ΦΘ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΦΤ· εἰδήσθαι ἢ καὶ ὅππῃ τῆς ἔν κυλίνδρου τομῆς, ὡς ἡ πλαγία τῆς εἶδος πλάτους πρὸς τὸ ὀρθίαν ἔστω τὸ ὑπὸ τὸ τμημάτων τῆς διαμέτρου πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς κατηγμένης ἐπ' αὐτὴν πεταγμένως καὶ πίσεως τὰ τμήματα· ἢ ὅππῃ τῆς ἔν κυλίνδρου ἄρα τομῆς ὡς ἡ ΘΗ πλαγία τῆς εἶδος πλάτους πρὸς τὸ ΘΧ ὀρθίαν ἔστω τὸ ὑπὸ τὸ ΗΦ, ΦΘ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ἴσης τῇ ΓΦ καὶ πρὸς ἴσας γωνίας ἀγομένη ὅππῃ τὸ ΘΗ. ἀλλ' ἡ ἴση τῇ ΓΦ καὶ πρὸς ἴσας γωνίας ὅππῃ τὸ αὐτὴν ἀγομένη κατὰ τὸ Φ ἔχ' ἴτερα ἐπὶ τῆς ΓΦ· ἡ ἄρα ΦΤ ἐν τῇ ἔν κυλίνδρου ἐστὶ τομῆς· τὸ ἄρα Τ σημεῖον, ὅππῃ τῆς ἔν κώνου ὀπίφανείας ἐστὶ, καὶ ὅππῃ τῆς ἔν κυλίνδρου ἐστὶν ὀπίφανείας. ὁμοίως ἢ δεικνύει, καὶ ὡς αὖτε ὁμοίως πεταγμένως ἀναγόμεν· ἡ ΘΡΗ ἄρα γεγραμμένη ἐν τῇς ὀπίφανείας ἐστὶν ἀμφοτέρων τῶν σχημάτων· ἡ ΘΡΗ ἄρα τομῆς μία καὶ αὐτὴ ἐν ἀμφοτέροις ἐστὶ τῶν σχημάτων. καὶ ἐπεὶ κατισοκάσθη ἡ ὑπὸ ΓΑ, ΑΕ γωνία, τοῦτεστιν ἡ ὑπὸ ΑΗ, ΗΘ, ἢ τῇ μείζον ἢ ἐλάττω ἔσται

batur circulus ΒΕΓ, pro base conī cūjus triangulum per axem sit ΑΒΓ; &, protrahā ΘΗ ad Ο, ducatur in circulatorum plano recta ΟΠ ad rectos angulos ipsi ΒΕ; perque ΟΠ, ΟΘ ducatur planum: faciet igitur sectionem in cono cūjus basis circulus ΒΕΓ. sit autem ea sectio ΘΡΗ; recta igitur ΘΗ diameter est sectionis. eā ideo bifariam divisā in Σ, ad ipsā ordinatim applicetur secunda diameter ΡΣΤ, & alia quævis ΤΦ; fiatque ut quadratum ex ΘΗ diametro sectionis ΘΡΗ, ad quadratum ex ΡΤ secundā diametro ejusdem sectionis, ita ΗΘ transversum figuræ latus ad rectum ΘΧ.

Quoniam igitur ΘΚ quidem ipsi ΑΖ parallela est, ΘΟ vero ipsi ΑΒ: erit ut quadratum ex ΑΕ ad quadratum ex ΕΖ ita quadratum ex ΘΟ ad quadratum ex ΚΟ. sed ut quadratum ex ΑΒ ad rectangulum ΒΕΓ * ita quadratum ex ΘΗ diametro sectionis conī ad quadratum ex ΡΤ secundā diametro ejusdem sectionis; ut autem quadratum ex ΘΟ ad quadratum ex ΟΚ ita quadratum ex ΘΗ ad quadratum ex ΚΛ, hoc est, ita quadratum ex ΘΗ diametro sectionis cylindri ad quadratum secundæ diametri ejusdem cylindri sectionis, sicut demonstratum est superius: quare secunda diameter sectionis cylindri æqualis est ipsi ΡΤ secundæ diametro sectionis conī. dividiturque ΘΗ bifariam in puncto Σ, & ipsi ad rectos angulos ducitur secunda diameter sectionis cylindri, quemadmodum & ipsa ΡΤ: ergo ΡΤ secunda diameter est sectionis tum conī tum cylindri. similiter & ΘΗ est diameter sectionis conī & cylindri: & propterea punctum Ρ & in conī & in cylindri superficie erit. rursus quoniam in sectionibus conī & cylindri eadem diametri sunt ΘΗ, ΡΤ, tertia etiam proportionalis eadem erit; hoc est ΘΧ rectum latus figuræ sectionis conī: quare ΘΧ & in cylindri sectione rectum est figuræ latus. quoniam igitur ut ΘΗ ad ΘΧ ita rectangulum ΗΦΘ ad quadratum ex ΦΤ; atque ostensum est in cylindri sectione, ut transversum figuræ latus ad rectum ita rectangulum sub diametri partibus contentum ad quadratum ejus quæ ad ipsam ordinatim applicata partes efficit: erit & in cylindri sectione ut ΘΗ transversum figuræ latus ad ΘΧ rectum ita rectangulum ΗΦΘ ad quadratum rectæ ipsi ΤΦ æqualis & sub angulis æqualibus ad ipsam ΘΗ ductæ. sed recta, æqualis ipsi ΤΦ & sub æqualibus angulis cum ipsa ΘΗ ad punctum Φ occurrens, non alia est quam ipsa ΤΦ; ergo ΦΤ & in cylindri sectione erit: ac propterea punctum Τ, in conī superficie existens, in cylindri etiam erit superficie. simili modo demonstratio fiet & in aliis, quæ ad ipsam ordinatim applicabuntur; linea igitur ΘΡΗ in superficiebus utriusque figuræ continetur: quare ΘΡΗ una eademque sectio est in utraque figura. præterea quoniam angulus ΓΑΒ, hoc est, angulus ΑΗΘ, factus est vel major vel minor angulo qui ad Β, se-

* Hoc est ad quadratum ex ΕΖ, per constructionem.

ΓΒΔ. & quoniam BZ fecat BH, si producat, fecabit etiam omnes, quæ ipsi BH parallelæ sunt, in infinitum productas: ac proinde ipsi BZ parallelæ fecabunt eas quæ rectæ BH parallelæ sunt. ducatur igitur MN ipsi BZ parallelæ, quæ producta secet ΘΛ, ΕΚ in punctis Ζ, Ο; ipsi vero ΕΘ parallela ducatur ΚΛ; & circa diametrum ΚΛ describatur circulus æquidistans ei qui est circa ΕΘ: concipietur itaque cylindrus, cujus bases quidem circuli ΕΘ, ΚΛ, parallelogrammum vero per axem ΚΘ, quod ad basim rectum sit. si igitur per M ducatur recta MP ad rectos angulos ipsi ΓΔΖ, quæque sit in eodem plano in quo circulus Α; & per rectas MP, ΜΟ planum ducatur: faciet illud sectionem in cono quidem ellipsim ΝΣΤ, cujus diameter ΝΤ; in cylindro vero ellipsim ΟΦΞ, cujus diameter ΟΞ: dico ellipsim ΝΣΤ ipsi ΟΦΞ similem esse.


Quoniam enim OM, BZ parallelæ sunt inter se, itemque parallelæ ΕΚ, ΘΛ, BH, & recta EZ communiter omnes fecat; erit ut MO ad ME, hoc est ut OΞ ad OE, ita BZ ad ZH: quare ut quadratum ex OΞ ad quadratum ex OE, ita quadratum ex BZ

ad quadratum ex ZH, hoc est ad rectangulum ΓΖΔ [per constructionem.] sed ut quadratum ex OΞ ad quadratum ex OE ita quadratum diametri OΞ ad quadratum conjugatæ diametri, videlicet ipsius ΦΧ. ut autem quadratum ex BZ ad rectangulum ΓΖΔ ita [per 15. I. conic.] quadratum diametri ΝΤ ad quadratum conjugatæ diametri ΣΩ: ergo ut quadratum ex OΞ ad quadratum ex ΦΧ ita quadratum ex ΝΤ ad quadratum ex ΣΩ; ac propterea ut OΞ ad conjugatam ΦΧ ita ΝΤ ad diametrum conjugatam ΣΩ. at vero diametrum OΞ fecare ΦΧ ad rectos angulos, itemque ΝΤ similiter fecare ΣΩ, manifeste apparet; quia ipsas ΦΧ, ΩΣ, & inter sese & ipsi MP parallelas, recta linea MO ad rectos angulos fecat: sectio igitur ΟΦΞ similis est sectioni ΝΣΤ. neutra autem earum est circulus, quippe quia sectio subcontraria non sit; angulus enim ΔΒΖ, videlicet ΒΤΝ, non est æqualis angulo ΒΓΔ: quocirca utraque sectionum ΟΦΞ, ΝΣΤ ellipses est, suntque similes inter sese. quod erat faciendum.

PROP. XXIII. Probl.

Cylindro dato invenire conum, & utrosque eodem plano secare, ita ut sectiones faciat in utrisque ellipses similes.

αὐτῶν ἄρα εἰσὶν ὀπτιπέδω τῷ ΓΒΔ τετράγωνον. καὶ ἐπεὶ ἡ ΒΖ τέμνει τὴν ΒΗ, ἡ ΒΖ ἄρα ἐκβαλλομένη πρὸς τὰς τῇ ΒΗ ὀρθογώνους ἐπ' ἀπὸρον ἐκβαλλομένης τέμνει· καὶ αἱ ὀρθογώνιοι ἐν τῇ ΒΖ πάσαις τὰς τῇ ΒΗ ὀρθογώνους τέμνουσιν. ἡχθῶ τῇ ΒΖ ὀρθογώνιος ἡ ΜΝ, καὶ ἐκβληθεῖσαι τέμνεταις τὰς ΘΛ, ΕΚ κατὰ τὰ Ζ, Ο σημεῖα, καὶ τῇ ΕΘ ὀρθογώνιος ἡ ΚΛ, καὶ περὶ τῇ ΚΛ διάμετρον κύκλος ὀρθογώνιος τῷ περὶ τὴν ΕΘ νόσῃ δὴ κύλινδρος, ὃ βάσεις μὲν οἱ ΕΘ, ΚΛ κύκλοι, τὸ δὲ διὰ τῆς ἁγίας ὀρθογώνιοι ὀρθογώνιοι τὸ ΚΘ δὴλονότι, ἐκ αὐτῶν περὶ ὁρτὰς ὅν τῇ βάσει. καὶ ἐὰν διὰ τῆς Μ τῇ ΓΔΖ περὶ ὁρτὰς ἀράγωμεν τὴν ΜΡ, ἐν τῷ αὐτῷ ὀπτιπέδῳ εἶσιν αὐτῶν Α κύκλῳ, καὶ διὰ τῆς ΜΡ, ΜΟ διενδύλωμεν ὀπτιπέδον, ποιήσῃ ἐν μὲν τῷ κώνῳ τὴν ΝΣΤ ἑλλείψιν, ἐν δὲ τῷ κύλινδρῳ τὴν ΟΦΞ, διαμέτροι δὲ τῆς ΝΤ, τῆς ΟΞ. λέγω δὲ ὅτι ἡ ΝΣΤ ἑλλείψις τῇ ΟΦΞ ἑλλείψει ὁμοία ἐστίν.



Επεὶ γὰρ αἱ ΟΜ, ΒΖ ὀρθογώνιοι εἰσιν ἀλλήλαις· ἀλλὰ καὶ αἱ ΕΚ, ΘΛ, ΒΗ ὀρθογώνιοι ἀλλήλαις, κοινὴ δὲ ἡ ΕΖ τέμνει· ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ ΜΟ περὶ τὴν ΜΕ, τετέστιν ὡς ἡ ΟΞ περὶ τὴν ΘΕ, ἕτως ἡ ΒΖ περὶ τὴν ΖΗ· καὶ ὡς ἄρα τὸ δὲ τῆς ΟΞ


περὶ τὸ δὲ τῆς ΘΕ ἕτως τὸ δὲ τῆς ΒΖ περὶ τὸ δὲ τῆς ΖΗ, τετέστι περὶ τὸ ὑπὸ τῇ ΓΖ, ΖΔ. ἀλλ' ὡς μὲν τὸ δὲ τῆς ΟΞ περὶ τὸ δὲ τῆς ΘΕ ἕτως τὸ δὲ τῆς ΟΞ διαμέτρος περὶ τὸ δὲ τῆς συζυγῆς διαμέτρος, φέρε τῇ ΦΧ. ὡς δὲ τὸ δὲ τῆς ΒΖ περὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ ἕτως τὸ δὲ τῆς ΝΤ διαμέτρος περὶ τὸ δὲ τῆς συζυγῆς διαμέτρος, φέρε τῇ ΣΩ. ὡς ἄρα τὸ δὲ τῆς ΟΞ πρὸς τὸ δὲ τῆς ΦΧ ἕτως τὸ δὲ τῆς ΝΤ περὶ τὸ δὲ τῆς ΣΩ· καὶ ὡς ἡ ΟΞ ἄρα περὶ τῇ ΦΧ συζυγὴ διάμετρον ἕτως ἐστὶν ἡ ΝΤ περὶ τὴν ΣΩ συζυγὴ διάμετρον. ὅτι δὲ περὶ ἴσους γωνίας τέμνουσιν, ἥτις ΟΞ τὴν ΦΧ, καὶ ἡ ΝΤ τὴν ΣΩ, δὴλον· πᾶς γὰρ ΦΧ, ΩΣ, ὀρθογώνιος ἔσται ἀλλήλαις τε καὶ τῇ ΜΡ, ἡ ΜΟ τέμνει· ἡ ἄρα ΟΦΞ τομὴ τῇ ΝΣΤ τομῇ ὁμοία ἐστίν. καὶ ἐκ ἐστὶ κύκλος ἑδωτέρω αὐτῶν, διὰ τὸ μὴ ὑπεναντίαν εἶναι τὴν τομὴν· τὸ ὑπὸ τῶν ΔΒΖ γωνίας, τετέστι τὸ ὑπὸ τῶν ΒΤΝ, ἀνίσταται τῇ ὑπὸ τῇ ΒΓ, ΓΔ· ἑλλείψις ἄρα ἐστὶν ἑκατέρω τῶν ΟΦΞ, ΝΣΤ τομῶν, καὶ εἰσιν ὁμοίαι ἀλλήλαις. ὅπερ εἶδει ποιῆσαι.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ xγ'.

Κυλίνδρου δοθέντος εὑρεῖν κώνον, καὶ τέμνειν ἀμφοτέρους ἐν ὀπτιπέδῳ, ποιήσῃ τὴν τομὴν ἐν ἑκατέρῳ ὁμοίας ἑλλείψεις.

ΔΕΔΟ-

ΔΕΔΟΣΘΩ κύλινδρος, ἔστω βάσις αὐτοῦ ὁ κύκλος A , τὸ δὲ διὰ τοῦ ἀξὸνος ὡς ἀλλήλογραμμον τὸ $BΓ$, πρὸς ὁποῖον ἐν τῇ βάσει, ὅς ἐστι βεβλήθω ἡ BA . τῆ δὲ ζήτησιν κῶνα βάσις ἔστω ἡ τοῦ A κύκλος, ἢ ἄλλος τις ἐν τῷ αὐτῷ ὀπιπέδῳ τῷ A , οἷον ὁ περὶ τῆς EZ διάμετρον, ἐφ' ἧς κέντρον τὸ Δ . ὅς ἐστι ληφθέντος σημείου τυχόντος ἐπὶ τῆς ZH ἢ H , εἰλήφθω τῆς EH , HZ μέση ἀνάλογον ἢ ΘH , καὶ κέντρον τῷ H , διασημασθῇ ἡ τοῦ Θ μέση ἢ ἐλάττω τῆς $H\Theta$, γεγραφθῶ ἐν τῷ $BΓ$ ὀπιπέδῳ περὶ τὸν κέντρον κύκλος ἢ KL , καὶ διὰ τοῦ Θ πλυσθῶς τῆς $BΓ$ ὡς ἀλλήλογραμμος παραλληλὸς ἢ $χθ$ ἢ ΘM , καὶ ἐπεξέχθωσαν αἱ ME , MZ , MH , καὶ τῇ MH παραλληλὸς ἢ $χθ$ περὶ τὸν κέντρον καὶ τὸ παραλληλόγραμμον ἢ NZ . εἰ δὲ διὰ τοῦ N διάγωμεν ὀπιπέδον, κατὰ τὸ διποθεθέντα τρόπον, ἔσται ἡ τοῦ ὁμοία ἐν ἐκατέρῳ. δεῖξαι δὲ ὅτι αὐτὴ τῷ πρὸς τῆς. ὅτι δὲ καὶ ἐλλείψεις αἱ τοιαύται, καὶ ἐκὶ κύκλοι, δηλονότι ὅτι διὰ τοῦ MH ἢ τοῦ Θ κατεσκευάσθη ἢ ἐλάττω τῆς διὰ τοῦ $H\Theta$, τῆς EH , HZ .



SIT cylindrus datus, cujus basis circulus A ; & parallelogrammum per axem $BΓ$ super basim rectum; & producat BA ; conus vero quaesiti basis sit vel circulus A , vel alius aliquis in eodem existens plano, qualis est cujus diameter EZ , in qua centrum Δ ; & sumpto quovis puncto H in recta ZH , inter EH , HZ media proportionalis capiatur ΘH ; & centro H , intervalloque vel majore vel minore quam sit $H\Theta$, describatur in plano $BΓ$ circuli circumferentia KL , perque Θ ducatur ΘM parallelogrammi $BΓ$ lateribus parallela; & jungantur ME , MZ , MH : dein ducatur NZ ipsi MH parallela, tam triangulum quam parallelogrammum secans. itaque si per N , eodem modo quo ante dictum est, planum ducatur, sectio in utroque similis erit. demonstratio autem eadem est quae supra. verum sectiones ellipses esse, non circulos, perspicue constat; quadratum enim ex MH factum est vel majus vel minus quadrato ex $H\Theta$, hoc est rectangulo EHZ .

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κα'.

Εάν εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῇ κατὰ δύο σημεία, τὸ δὲ πρὸς τῷ ἐνὶ πέρατι τῆς εὐθείας τμήμα μὴ μείζον ἢ τὸ πρὸς τῷ λοιπῷ πέρατι τμήματος, τὸ δὲ συναμφοτέρω τέτε μέσος τμήματος καὶ τὸ λοιπὸν τετραγώνων ἴσον ὡς καὶ τὸ μὴ μείζον τμήμα ὡς ἀλλήλοισι χωρίον, ὑπερέαλλον εἶδει τετραγώνων ἢ πλυσθῶς ὡς ἀλλήλοισι μείζον μὴ ἔσται ἢ μέσος τμήματος, ἐλάττω δὲ συναμφοτέρω τέτε μέσος καὶ τὸ πρὸς τῷ λοιπῷ πέρατι τμήματος.

ΕΣΤΩ εὐθεῖα ἡ AB , τετμημένη κατὰ τοὺς Γ καὶ Δ , ἡ δὲ AG τῆς AB μὴ ἔστω μείζων. λέγω δὲ ὅτι εἰάν τῷ διὰ τοῦ ΓB τετραγώνων ἴσον χωρίον ὡς καὶ τῷ AG ὡς ἀλλήλοισι, ὑπερέαλλον εἶδει τετραγώνων, ἢ πλυσθῶς ὡς ὑπερέαλλοισι μείζων μὴ ἔσται τῆς $\Gamma\Delta$, ἐλάττω δὲ τῆς ΓB .

Εἰ γὰρ δυνατόν, ποιέσθω πρῶτον ἡ $\Gamma\Delta$ πλυσθῶς εἶναι τῆς ὑπερέαλλοισι. ἐπεὶ ἔν τῷ ὡς καὶ τῷ AG ὡς ἀλλήλοισι, ὑπερέαλλον τῷ διὰ τοῦ $\Gamma\Delta$ τετραγώνων, τῶν τῶν ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῷ $A\Delta\Gamma$ ἐστὶ τὸ ὡς καὶ τῷ AG ὡς ἀλλήλοισι, ὑπερέαλλον

PROP. XXIV. Theor.

Si recta linea secetur in duobus punctis, segmentum vero quod ad unum rectae extremum non majus sit eo quod ad alterum; applicetur autem ad non majus segmentum spatium æquale quadrato ex segmento medio & non minore simul sumpto, excedens figurâ quadratâ: latus excessus majus quidem erit medio, minus vero quam medium & quod ad alterum rectae terminum adjacet segmentum simul sumptum.

SIT recta linea AB , quæ secetur in punctis Γ , Δ ; & sit AG non major quam AB : dico si ad AG applicetur spatium æquale quadrato ex ΓB excedens figurâ quadratâ, latus excessus majus quidem esse quam $\Gamma\Delta$, minus vero quam ΓB .

Si enim fieri potest, primum ponatur $\Gamma\Delta$ latus esse excessus. quoniam igitur id quod ad AG applicatur, excedens quadrato ex $\Gamma\Delta$, idem est ac rectangulum $A\Delta\Gamma$, quod quidem æquale est quadrato ex ΓB ; erit rectangulum $A\Delta\Gamma$

ἡ ΓΗ πρὸς τὴν ΗΚ· καὶ ὡς ἄρα τὸ δῶπὸν τῆς ΔΖ πρὸς
 τὸ δῶπὸν τῆς ΖΒ ἔστω τὸ δῶπὸν τῆς ΓΗ πρὸς τὸ δῶπὸν τῆς
 ΗΚ, τῆς τε τὸ δῶπὸν τῆς ΜΑ πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς ΒΛ,
 ΔΚ. ἀλλ' ὡς μὲν τὸ δῶπὸν τῆς ΔΖ πρὸς τὸ δῶπὸν
 τῆς ΖΒ ἔστω τὸ δῶπὸν τῆς ΕΔ πρὸς τὸ δῶπὸν τῆς
 ΒΚ, τῆς τε τὸ δῶπὸν ΕΔ τῆς Διαμέτρου τῆς τῷ κυ-
 λίνδρου ἐλλείψεως πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς συζυγῆς
 Διαμέτρου· ὡς δὲ τὸ ἀπὸ ΜΑ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν
 ΒΔΚ, ἔστω τὸ ἀπὸ ΝΞ τῆς ὁμῆς ἐλλείψεως δια-
 μέτρου πρὸς τὸ δῶπὸν τῆς συζυγῆς Διαμέτρου· καὶ
 ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς διαμέτρου τῆς ὁμῆς κυλίνδρου, ἐλ-
 λείψεως πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς συζυγῆς Διαμέτρου ἔστω
 τὸ ἀπὸ τῆς Διαμέτρου τῆς ὁμῆς καὶ ἐλλείψεως πρὸς
 τὸ ἀπὸ τῆς συζυγῆς Διαμέτρου· καὶ ὡς ἄρα ἡ διά-
 μετρος τῆς ἐλλείψεως ὁμῆς κυλίνδρου πρὸς τὴν συζυγὴν
 διάμετρον, ἔστω ἡ διάμετρος τῆς ὁμῆς καὶ ἐλλείψεως
 πρὸς τὴν συζυγὴν διάμετρον. καὶ εἰπὼν αἱ δευτέρα
 Διαμέτροι πρὸς ἴσας γωνίας τῶν Διαμέτρων, ἀμ-
 φότεραι γὰρ ὡς ἀλλήλοισι εἰσι τῶν πρὸς ὁρθὰς τῇ ΒΗ,
 τῇ ΖΟ καὶ τῇ ΑΠ· ἡ ἄρα ὁμῆς ἐλλείψης ὁμοία
 ἐστὶ τῇ ὁμῇ κυλίνδρου ἐλλείψει, καὶ μένοντι ὑπὸ τῇ αὐτῇ
 ὀρθῇ, καὶ συνέσει ὁ κύκλος ὅτι τῆς αὐτῆς βάσεως
 ὀρθῇ.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κς'.

Τὸν δοθέντα κύλινδρον ἢ κῶνον σκαληνὸν διωατὸν
 ὅστιν ἀπὸ ἑτέρου μέρους ἀπειραχθεὶς τεμῆν δυ-
 οῖν ὀπιπέδοις, μὴ ὡς ἀλλήλως μὲν κεκλιμένοις,
 ποιῶσι δὲ ὁμοίας ἐλλείψεις.

ΕΣΤΩ περὶ τὸν ὀρθοῦς κύλινδρον σκαληνός, καὶ τὸ διὰ τοῦ ἄξονος ὡς ἀπὸ ἀλλήλων γραμμῶν τὸ ΑΒ πρὸς ὁρίως ἐν τῇ βάσει τοῦ κυλίνδρου, καὶ ὑποκείτω ἡ πρὸς τὸ Α γωνία ὀξεία, καὶ διὰ τοῦ Γ ἤχθω κάθετος πρὸς τὴν ΑΔ πλευράν ἢ ΓΔ· ελαχίστη ἄρα ἐστὶν ἡ ΓΔ πασι τῶν ΤΓ ΑΔ, ΓΒ ὡς ἀπὸ ἀλλήλων ἐμπιπασάντων. εἰλήφθωσαν ἐφ' ἐκάστης ΕΔ, ΔΖ, καὶ ἐπέζεύχθωσαν αἱ ΒΓ, ΓΖ· ἴση ἄρα ἡ ΕΓ τῇ ΖΓ. εἰ δ' ἔν, κατὰ τὸ ὥσπερ δεδομένον τρέπον, ἀράγωμεν διὰ τῶν Γ Ε, Γ Ζ ὅτι πεδα, τιμῆ τὸν κύλινδρον. ἵερνέτω Ἐ ποιέτω τις ΕΗΓ, ΖΘΓ ἐλάειψεις· λέγω δὴ ὅτι ὅμοιαι εἰσίν.

Επει γὰρ ὡς τὸ ἀπὸ τῆς ΕΓ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΓΑ, ἔτως τὸ ἀπὸ τῆς ΖΓ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΓΑ ἄλλα τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ΕΓ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΓΑ ἔστιν ὡς τὸ ἀπὸ τῆς ΕΓ διαμέτρου τῆς τομῆς πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ἐαυτῇ συζυγῆς διαμέτρου, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ΖΓ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ ἔστιν ὡς τὸ ἀπὸ τῆς ΖΓ διαμέτρου τῆς τομῆς πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς συζυγῆς ἐαυτῇ διαμέτρου· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΕΓ

HK, & idcirco ut quadratum ex ΔZ ad quadratum ex ZB ita quadratum ex ΓH ad quadratum ex HK, hoc est quadratum ex MA ad rectangulum $B AK$. sed ut quadratum ex ΔZ ad quadratum ex ZB ita quadratum ex $E \Delta$ ad quadratum ex BK , hoc est quadratum diametri ellipseos cylindri $E \Delta$ ad quadratum conjugatæ diametri; & ut quadratum ex MA ad rectangulum $B AK$, ita quadratum ipsius $N \Sigma$ diametri ellipseos conï ad conjugatæ diametri quadratum: ergo ut quadratum diametri ellipseos cylindri ad quadratum conjugatæ diametri ejus, ita quadratum diametri ellipseos conï ad quadratum conjugatæ diametri ejusdem: ut igitur diameter ellipseos cylindri ad conjugatam diametrum ejus, ita ellipseos conï diameter ad conjugatam ejus diametrum. sunt autem secundæ diametri perpendiculares ad diametros; utræque enim parallelæ sunt rectis $Z O$, $\Lambda \Pi$, quæ sunt ad rectos angulos ipsi BH ; quocirca conï ellipsis ellipsi cylindri similis erit, & facta est ab eodem plano; constitutusque est conus super eandem basin & eadem altitudine. quæ omnia fecisse oportebat.

ὡς κυλίνδρου, καὶ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὕψος. ὥστε ἦν πρὸς


PROP. XXVI. *Probl.*

Datum cylindrum vel conum scalenum
possumus ex eadem parte infinite se-
cure duobus planis, non æquidistan-
ter positis, quæ ellipses similes effi-
ciant.

SIT primum datus cylindrus scalenus, cu-
jus per axem parallelogrammum AB re-
ctum sit ad basim cylindri; ponaturque an-
gulus ad A acutus, &
per Γ ducatur $\Gamma\Delta$ ad
latus AA perpendicu-
laris: minima igitur est
 $\Gamma\Delta$ omnium quæ inter
parallelas AA , ΓB ca-
dunt. sumantur ex u-
traque parte puncti Δ
rectæ æquales $E\Delta$, ΔZ ,
& jungantur $B\Gamma$, ΓZ :
erit igitur $B\Gamma$ ipsi ΓZ
æqualis. si igitur per ΓE ,
 ΓZ , juxta prædictum
modum, plana ducan-
tur, secabunt cylindrum.
secent itaque & faciant
ellipses $E\Gamma\Gamma$, $Z\Theta\Gamma$:
dico eas inter se simi-
les esse.

Quoniam enim ut quadratum ex BF ad quadratum ex GA , ita quadratum ex ZF ad quadratum ex GA ; ratio autem quadrati ex BF ad quadratum ex GA ratio est quadrati ex BF diametri sectionis ad quadratum conjugatæ diametri; & ratio quadrati ex ZF ad quadratum ex AF ratio est quadrati diametri sectionis ZF ad quadratum conjugatæ ipsi diametri: erit ut BF

\square G diameter



diameter ad conjugatam ejus diametrum, ita & diameter $Z\Gamma$ ad conjugatam ipsi diametrum. sed & ad æquales angulos secantur utraque diametri, ut sæpius ostensum est: ergo similes inter se sunt $BH\Gamma$, $Z\Theta\Gamma$ ellipses. quod si alias sumpseris æquales rectas ex utraque parte puncti Δ , rursus aliæ duæ ellipses inter se similes constituentur, idque in infinitum. notandum autem est in cylindro ellipses ex eadem parte similes etiam æquales esse; propterea quod ratio diametrorum ad eandem lineam AG necessario eadem sit.


διάμετρος πρὸς τὴν αὐτὴν συζυγὴν διάμετρον, ὥτως καὶ ἡ $Z\Gamma$ διάμετρος πρὸς τὴν αὐτὴν συζυγὴν διάμετρον. ἀλλὰ καὶ πρὸς ἰσὰς γωνίας τέμνον· ἐκάτεραι αἱ διαμέτροι, ὡς ἐδείχθη πολλάκις· ὁμοίαι ἄρα αἱ ἑλλείψεις εἰσὶν αἱ $BH\Gamma$, $Z\Theta\Gamma$ ἑλλείψεις. καὶ ἑτέρας δὲ δοπολαύσας ἰσὰς εὐθείας περὶ ἐκάστην τὴν Δ , συστήσῃ πάλιν ἑτέρας δύο ἑλλείψεις ὁμοίαι ἀλλήλαις, καὶ ταῦτο ἐπ' ἀπειρον. ὁποσημαντέον ὅτι ὅτι τὸ Δ κυλίνδρου ἀνάγκη πᾶσι ἐν αὐτῷ μέρει ὁμοίαι καὶ ἰσὰς εἶναι, διὰ τὸ λόγον εἶναι τὴν διάμετρον τὴν αὐτὴν πρὸς τὴν αὐτὴν τὴν AG .

PROP. XXVII. Probl.

SED sit datus conus scalenus, cujus per axem triangulum $AB\Gamma$ ad basim coni rectum, sitque AB major quam AG , & circa ipsum circulus describatur; & per A ducatur AA parallela ipsi $B\Gamma$, quæ circulum secabit; deinde, circumferentiâ ΔA bifariam sectâ in E , sumatur in ipsâ punctum aliquod Z , & ducatur ZH parallela ipsi AA ; junctisque ZA , HA & productis, occurrat ZA quidem rectæ $B\Gamma$ in Θ , HA vero eidem in K ; adeoque ut AK ad KH ita $A\Theta$ ad ΘZ . sed ut AK ad KH ita quadratum ex AK ad rectangulum HKA ; & ut $A\Theta$ ad ΘZ ita quadratum ex $A\Theta$ ad rectangulum $A\Theta Z$: ut igitur quadratum ex AK ad rectangulum HKA , hoc est [per 36.3.] ad rectangulum $BK\Gamma$, ita quadratum ex $A\Theta$ ad rectangulum $Z\Theta A$,

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κζ'.

ΕΣΤΩ δὲ νῦν ὁ δοθὼν κώνος σκαληνός, ὃς τὸ διὰ τῆς ἀξὸνος τετραγώνον τὸ $AB\Gamma$ πρὸς ὀρθὰς ἐν τῇ βάσει τῆς κώνου, καὶ ἔστω ἡ AB τῇ AG μείζων, καὶ περιγεγράφθω κύκλος, καὶ ἦχθω διὰ τῆς A τῇ $B\Gamma$ ὡς ῥαλληλὸς ἡ AA , δηλονότι τέμνεται τὸν κύκλον, καὶ τὸ ΔA περιφερείας διχα τμηθείσης κατὰ τὸ E εἰσάφθω π σημείον ὅπου τὸ ΔE περιφερείας τὸ Z , καὶ ἦχθω ὡς ῥαλληλὸς τῇ AA ἡ ZH , καὶ ὅπου αὐτὴν εἰσάφθω ἡ $μὲν ZA$ συμπίπτει τῇ $B\Gamma$ κατὰ τὸ Θ , ἡ δὲ HA κατὰ τὸ K . ὡς ἄρα ἡ AK πρὸς τὴν KH ὥτως ἡ $A\Theta$ πρὸς τὸ ΘZ . ἀλλ' ὡς μὲν ἡ AK πρὸς τὴν KH ὥτως τὸ ἀπὸ τῆς AK πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν HKA , ὡς δὲ ἡ $A\Theta$ πρὸς τὸ ΘZ ὥτως τὸ ἀπὸ τῆς $A\Theta$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $A\Theta Z$. ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς AK πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν HKA , καὶ ταῦτα



hoc est ad rectangulum $B\Theta\Gamma$. itaque si ducantur rectæ lineæ parallelæ, AM quidem ipsi AK , AN vero ipsi $A\Theta$, & per ipsas plana conum secantia; similes habebuntur ellipses. Quoniam enim ut quadratum ex AK ad rectangulum $BK\Gamma$ ita est quadratum ex $A\Theta$ ad rectangulum $B\Theta\Gamma$; est autem quadratum ex AK ad rectangulum $BK\Gamma$ sicut quadratum ex AM diametro ellipseos ad quadratum conjugatæ diametri ejus; & ut quadratum ex $A\Theta$ ad rectangulum $B\Theta\Gamma$ ita quadratum ex AN diametro ellipseos ad quadratum diametri ipsi conjugatæ: erit igitur ut diameter AM ad conjugatam ei diametrum ita diameter AN ad diametrum ipsi conjugatam: & idcirco AM , AN similium ellipsium diametri sunt. quod demonstrandum erat. At si alias rectas ipsi ZH parallelas ducamus, ut ΞO ; & à punctis Ξ , O rectas junctas produca-

πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν BK , $K\Gamma$, ὥτως τὸ ἀπὸ τῆς $A\Theta$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $Z\Theta$, ΘA , ταῦτα πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $B\Theta$, $\Theta\Gamma$. εἰάν ἔν διάγωμεν εὐθείας ὡς ῥαλληλὰς τῇ μὲν AK τῇ AM , τῇ δὲ $A\Theta$ τῇ AN , καὶ δι' αὐτῶν ἀχθόντες ὅπου περὶ αὐτῶν τὸν κώνον, ὁμοίαις ἑλλείψεσι ποιήσῃ. ἐπεὶ γὰρ ὡς τὸ ἀπὸ τῆς AK πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν BK , $K\Gamma$ ὥτως τὸ ἀπὸ τῆς $A\Theta$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $B\Theta$, $\Theta\Gamma$. ἀλλ' ὡς μὲν τὸ ἀπὸ τῆς AK πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν BK , $K\Gamma$ ὥτως τὸ ἀπὸ τῆς AM διαμέτρου τῆς ἑλλείψεως πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς συζυγῆς αὐτῇ διαμέτρου, ὡς δὲ τὸ ἀπὸ τῆς $A\Theta$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $B\Theta$, $\Theta\Gamma$ ὥτως τὸ ἀπὸ τῆς AN διαμέτρου τῆς ἑλλείψεως πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς συζυγῆς αὐτῇ διαμέτρου· καὶ ὡς ἄρα ἡ AM διάμετρος πρὸς τὴν συζυγὴν διάμετρον ὥτως ἡ AN διάμετρος πρὸς τὴν συζυγὴν διάμετρον· αἱ ἄρα AM , AN ὁμοίων ἑλλείψεων εἰσι διαμέτροι. ὅπερ ἐδείχθη. καὶ ἑτέρας ὅτι τῇ ZH ὡς ῥαλληλὰς ἀράγωμεν, ὡς τὴν ΞO , καὶ ἀπὸ τῶν Ξ καὶ O ὅπου τὸ A ὅπου εὐξάντες

PROP. XXX. Theor.

Ex his manifestum est, conjugationi similium ellipsium, quæ ex eadem parte fit, similem esse conjugationem quandam similium ellipsium ex oppositis partibus; quippe quæ diametros habeat ex contraria parte diametris respondententes.

Si enim in cylindri figura fiat ut quadratum ex $ΕΓ$ vel $ΓΖ$ ad quadratum ex $ΓΑ$, ita quadratum ex $ΓΑ$ ad quadratum ex $ΑΘ$ vel $ΓΚ$; erit ut quadratum ex alterutra ipsarum $ΕΓ$, $ΓΖ$ ad quadratum ex $ΓΑ$, hoc est ut quadratum diametri similium ellipsium quæ ex eadem parte fiunt, ad quadratum secundæ diametri ipsius conjugatæ, ita quadratum ex $ΓΑ$ ad quadratum ex alterutra ipsarum $ΑΘ$, $ΓΚ$, hoc est ita quadratum secundæ diametri similium ellipsium quæ ex oppositis partibus fiunt ad quadratum conjugatæ ipsius diametri: ut igitur unius conjugationis transversa diameter ad secundam diametrum, ita alterius conjugationis secunda diameter ad diametrum ipsius transversam.


In cono autem, si rursus fiat ut $ΗΑ$ ad $ΑΚ$ ita $ΑΠ$ ad $ΠΣ$: erit ut $ΑΚ$ ad $ΚΗ$ ita $ΠΣ$ ad $ΣΑ$; hoc est ut quadratum ex $ΑΚ$ ad rectangulum $ΗΚΑ$ ita rectangulum $ΠΣΑ$ ad quadratum ex $ΑΣ$. sed ut quadratum ex $ΑΚ$ ad rectangulum $ΗΚΑ$, hoc est ad rectangulum $ΒΚΓ$, ita quadratum diametri duarum similium ellipsium quæ ex eadem parte fiunt, nempe

ΠΡΟΤΑΣΙΣ λ'.

Καὶ φανερόν ὅτι τῇ δὲ αὐτῇ μέρει τῇ ὁμοίαν ἐλλείψαν συζυγία γίνεται τις ὁμοία δὲ αὐταυτῇ μέρει ὁμοίαν ἐλλείψαν συζυγία, ἀπεναντιομένη μὲν ταῖς ἀφ' ἐκείνης τῆς ἀφ' ἐκείνης.

Εάν γὰρ ᾖ τῷ $Ε$ κυλίνδρῳ καταγραφῆς κατὰ σφαιρίστικον ὡς τὸ ἀπὸ $ΕΓ$ ἢ $ΓΖ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΓΑ$, ὥτως τὸ ἀπὸ $ΓΑ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΑΘ$ ἢ $ΓΚ$ γνηστικῶς ὡς τὸ ἀπὸ ἐκείνης τῆς $ΕΓ$, $ΓΖ$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $ΓΑ$, ταύτην ὡς τὸ ἀπὸ τῆς διαμέτρου τῇ ὁμοίαν ἐλλείψαν τῇ αὐτῇ μέρει ἡγησόμεθα πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς δευτέρας συζυγίας διαμέτρου, ὥτως τὸ ἀπὸ τῆς $ΓΑ$ πρὸς τὸ ἀπὸ ἐκείνης τῆς $ΑΘ$, $ΓΚ$, ταύτην ὥτως τὸ ἀπὸ τῆς δευτέρας διαμέτρου δὲ τῇ ἀντικειμένην ἡγησόμεθα ὁμοίαν ἐλλείψαν πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς συζυγίας διαμέτρου ὡς ἄρα τῇ ἐκείνης συζυγίας ἢ διαμέτρου πρὸς τῇ δευτέρᾳ διαμέτρῳ ὥτως τῇ ἐκείνης συζυγίας ἢ δευτέρᾳ διαμέτρῳ πρὸς τῇ διαμέτρῳ.

Επὶ δὲ τῷ κώνῳ, εἰν πάλιν κατασφαιρίστικον ὡς τῇ $ΗΑ$ πρὸς $ΑΚ$, ὥτως τῇ $ΑΠ$ πρὸς τῇ $ΠΣ$ ἔσται ὡς ἢ $ΑΚ$ πρὸς τῇ $ΚΗ$, ὥτως ἢ $ΠΣ$ πρὸς τῇ $ΣΑ$, ταύτην ὡς τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΚ$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς $ΗΚ$, $ΚΑ$ ὥτως τὸ ὑπὸ τῆς $ΠΣ$, $ΣΑ$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΣ$. ἀλλ' ὡς μὲν τὸ ἀπὸ $ΑΚ$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς $ΗΚ$, $ΚΑ$, ταύτην πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς $ΒΚ$, $ΚΓ$, ὥτως τὸ ἀπὸ τῆς διαμέτρου τῇ αὐτῇ



quadratum ex $ΑΝ$ vel $ΑΜ$, ad quadratum secundæ diametri eidem conjugatæ; ut autem rectangulum $ΠΣΑ$, hoc est $ΓΣΒ$, ad quadratum ex $ΣΑ$, ita quadratum secundæ diametri similium ellipsium quæ ex oppositis partibus fiunt ad conjugatæ diametri $ΒΤ$ vel $ΓΦ$ quadratum: ergo ut unius conjugationis diameter ad secundam ejus diametrum, ita alterius conjugationis secunda diameter ad diametrum ipsam.

Ἐαὐτῇ μέρει ὁμοίαν δύο ἐλλείψαν, ἥτοι τῇ $ΑΝ$ ἢ τῇ $ΑΜ$, πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς δευτέρας συζυγίας διαμέτρου ὡς ἢ τὸ ὑπὸ τῆς $ΠΣ$, $ΣΑ$, ταύτην τὸ ὑπὸ τῆς $ΓΣ$, $ΣΒ$, πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $ΣΑ$, ὥτως τὸ ἀπὸ τῆς δευτέρας διαμέτρου τῇ αὐτῇ ἀντικειμένην μέρει ἡγησόμεθα ὁμοίαν ἐλλείψαν πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς συζυγίας διαμέτρου τῇ $ΒΤ$ ἢ τῇ $ΓΦ$ ὡς ἄρα τῇ ἐκείνης συζυγίας ἢ διαμέτρου πρὸς τῇ δευτέρᾳ διαμέτρῳ, ὥτως τῇ ἐκείνης συζυγίας ἢ δευτέρᾳ διαμέτρῳ πρὸς τῇ διαμέτρῳ.

Καὶ

DE SECTIONE CYLINDRI.

31

ΘΜ. Ἐπεὶ ἑκάτερα τῶν ΔΟ, ΕΠ τῇ ΓΚ ὡς ἀλλή-
λως ἔσιν, αἱ ΔΟ, ΕΠ ἄρα ἑ ἀλλήλαις εἰσὶ ὡς ἀλ-
ληλοι. εἰν δὲ διὰ τῶν ΔΟ, ΕΠ εὐθειῶν ἀχθῆναι τῆς
πέδον, περὶ τὸ Η παραλληλόγραμμον κατὰ τὴν
ΟΠ γραμμὴν, καὶ ἔσται τὸ ΠΕΔΟ ὁπίπεδον ὡς ἀλ-
ληλον ὁπίπεδον πρὸς τῇ ΔΙΕ τῇ ΒΑ ἀποκρίων καὶ πε-
μονόντων τὸ ΗΘ· τὸ ἄρα ΠΕΔΟ ὁπίπεδον ποιή-
σει ἐν τῷ κυλίνδρῳ παραλληλόγραμμον, ὡς
ἐδείχθη ἐν θεωρήματι τρίτῳ. καὶ ἔστιν ἡ ΕΔ γραμμὴ
κοινὴ τομῇ τῶν ΠΕΔΟ ἐπιπέδων καὶ τῶν κυλίνδρου ἐπι-
φανείας· ἡ ΕΔ ἄρα εὐθεῖα ἐστὶ καὶ πλάτος τῶν πα-
ραλληλογραμμῶν. ὁμοίως δὲ δεικνύει καὶ τῆς πα-
σῶν τῶν ἐφαπτομένων· καὶ ὅτι πάλιν ὁπίπεδα μέρη
αἱ ἀφ' αὐτῶν κατὰ τὰ Ρ καὶ Σ γίνονται, καὶ εἰσιν ὁπίπεδα
εὐθείας παραλλήλας τῇ ΕΔ· πᾶσι ἄρα αἱ ἐφα-
πτομεναι καὶ ἐνὸς παραλληλογραμμοῦ πλάτων
ταὺς ἀφ' αὐτῶν ποιῶνται. ὃ προσέκειτο δεῖξαι.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΛΒ'.

ΤΟΥΤΟΙ δὲ χθόνες, ἔστω παραλληλόγραμμον
τὸ ΑΒΓΔ, καὶ ὡς τῇ ΑΒ αὐτῶν βάσιν ἡχθώ-
σαν αἱ ΕΖ, ΗΘ, καὶ εἰληφθῶσι σημεῖον τὸ Κ, μὴ ὄν
ἐν τῷ τῶν παραλληλογραμμοῦ ὁπίπεδον, καὶ ὁπίπε-
δοῦ αἱ ΚΕ, ΚΖ, ΚΗ, ΚΘ καὶ ἐκτελεσθῶσι προσ-
πτετώσων ὁπίπεδον πρὸς παραλλήλῳ ὄντι τῷ
ΑΒΓΔ κατὰ τὰ Λ, Μ, Ν, Ξ σημεῖα, ἔπεξ' ἐχθώ-
σαν αἱ ΛΝ, ΜΞ· λέγω ὅτι ἡ ΜΞ τῇ ΛΝ ὡς ἀλ-
ληλος ἐστὶ.


Τὸ γὰρ διὰ τῶν ΚΑ, ΕΖ
εὐθειῶν ἐκτελεσθῶσιν ὁπί-
πεδον περὶ καὶ τὸ ΛΜΝΞ
ὁπίπεδον, καὶ ποιήσεται ἐν αὐ-
τῷ κοινὴ τομὴν ΛΜ πα-
ραλλήλων ἔσων τῇ ΕΖ· ὁ-
μοίως δὲ καὶ τὸ διὰ τῶν ΚΝ,
ΗΘ εὐθειῶν ὁπίπεδον ποιή-
σεται ὡς ἀλλήλων τῇ ΝΞ τῇ
ΗΘ. ἐπεὶ ἔν τῳ ΑΚΝ τρί-
γωνον τέμνεται ὑπὸ πα-
ραλλήλων ἐπιπέδων τῶν
ΑΒΓΔ, ΛΜΝΞ, αἱ ἄρα κοι-
ναὶ αὐτῶν τομαὶ παραλλη-
λοι εἰσιν ἀλλήλαις, τρεῖς τιν
ἡ ΝΑ τῇ ΗΕ. διὰ τὰ αὐτὰ καὶ ἡ ΕΜ τῇ ΘΖ
παραλλήλος· ὡς ἄρα ἡ ΕΚ πρὸς τῇ ΚΑ ἔστω ἡ
ΗΚ πρὸς τῇ ΚΝ, καὶ ὡς ἡ ΗΚ πρὸς τῇ ΚΝ ἔστω ἡ
ΗΘ πρὸς τὴν ΝΞ. ὡς δὲ ἡ ΕΚ πρὸς ΚΑ ἔστω ἡ
ΕΖ πρὸς ΛΜ· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΕΖ πρὸς τῇ ΛΜ ἔστω
ἡ ΗΘ πρὸς τῇ ΝΞ, καὶ ἐναλλάξ. ἔστιν ἴση ἡ ΕΖ τῇ
ΗΘ· ἴση ἄρα ἔστι ἡ ΛΜ τῇ ΝΞ. εἰσὶ καὶ καὶ παραλλη-
λοι· παραλλήλος ἄρα καὶ ἡ ΜΞ εὐθεῖα τῇ ΛΝ.

Εἰν δὲ τὸ μὲν Κ σημεῖον ὑποθώμεθα εἶναι τὸ
Φωτίζον, τὸ δὲ ΑΓ παραλληλόγραμμον τὸ ὁπίπε-
θὲν τῇ ἀκτίσιν, εἴτε καθ' αὐτὸ εἴη, εἴτε ἐν κυλίνδρῳ
συμπίπτει τὰς δύο τῇ Κ Φωτίζοντος ἀκτίνες ἐκ-
βαλλομένης ὁρίζου τῇ τε ΝΑ καὶ τῇ ΜΞ εὐθείαις, καὶ
τὸ μεταξὺ τῶν ΝΑ, ΜΞ παραλλήλων ἐκκλισμένον

& quoniam ΔΟ, ΕΠ parallelæ sunt ipsi ΓΚ,
etiam inter se parallelæ erunt: quare si per
eas planum ducatur, secabit parallelogrammum
ΘΗ secundum rectam lineam ΟΠ, atque erit
planum ΠΕΔΟ æquidistans plano alicui eo-
rum quæ per axem ΒΑ ducta secant paral-
lelogrammum ΗΘ: planum igitur ΠΕΔΟ sectio-
nem facit in cylindro parallelogrammum, ut
ostensum est in theoremate tertio; & recta ΕΔ
est communis sectio ipsius & superficiei cylin-
dri: quare ΕΔ recta linea est & parallelogram-
mi latus. pari modo etiam in cæteris contin-
gentibus idem demonstrabitur; fientque rursus
tactus ex altera parte in punctis Ρ, Σ, quæ
sunt in una recta ipsi ΕΔ parallelâ: omnes igitur
rectæ cylindrum contingentes in unius paral-
lelogrammi lateribus tactiones faciunt. quod de-
monstrandum proponebatur.

PROP. XXXII. Theor.

ΗΟC demonstrato, sit parallelogrammum
ΑΒΓΔ, & ejus basi ΑΒ parallelæ du-
cantur ΕΖ, ΗΘ; sumpto autem aliquo pun-
cto Κ non existente in plano parallelogrammi,
jungantur ΚΕ, ΚΖ, ΚΗ, ΚΘ, quæ productæ oc-
currant plano cuiuspiam æquidistanti ipsi ΑΒΓΔ
in punctis Λ, Μ, Ν, Ξ, & jungantur ΛΝ, ΜΞ:
dico rectam ΜΞ ipsi ΛΝ parallelam esse.



Planum enim per re-
ctas ΚΑ, ΕΖ ductum se-
cabit etiam planum ΛΜ-
ΝΞ, & in eo commu-
nem sectionem faciet re-
ctam lineam ΛΜ ipsi ΕΖ
parallelam: similiter &
planum per ΚΝ, ΗΘ du-
ctum faciet ΝΞ paral-
lelam ipsi ΗΘ. quoniam
igitur ΑΚΝ triangulum
ab æquidistantibus planis
ΑΒΓΔ, ΛΜΝΞ secatur,
communes ipsorum sectio-
nes ΝΑ, ΗΕ [per 16. I.]
inter se parallelæ sunt.
& eadem ratione paral-


lelæ sunt rectæ ΞΜ, ΘΖ: quare ut ΕΚ ad ΚΑ
ita ΗΚ ad ΚΝ, & ut ΗΚ ad ΚΝ ita ΗΘ ad
ΝΞ. sed ut ΕΚ ad ΚΑ ita ΕΖ ad ΛΜ; ut
igitur ΕΖ ad ΛΜ ita ΗΘ ad ΝΞ, & permu-
tando. est autem ΕΖ æqualis ipsi ΗΘ; ergo
& ΛΜ ipsi ΝΞ. & sunt inter se parallelæ;
recta igitur ΜΞ [per 33. I.] ipsi ΛΝ paral-
lela est.

Si igitur ponamus punctum Κ esse corpus
illuminans, & ΑΓ parallelogrammum quod ejus
radii opponatur, sive per se sive in cylin-
dro: accidet ut radii, qui ab ipso Κ produ-
cuntur, terminentur rectis lineis ΝΑ, ΜΞ; &
quod intra parallelas ΝΑ, ΜΞ continetur umbro-
sum

ΚΕ ἔστω ἡ ΕΑ πρὸς τὴν ΑΖ. ἐπεὶ ὅτι ἡ ΝΕ πρὸς τὴν ΕΚ ἔστω ἡ ΖΑ πρὸς τὴν ΑΡ, ὡς ὅτι ἡ ΕΚ πρὸς τὴν ΚΑ ἔστω ἡ ΕΑ πρὸς τὴν ΑΖ. δι' ὧν ἄρα ἐν πεπεσμένῃ ἀναλογίᾳ ὡς ἡ ΕΝ πρὸς τὴν ΚΑ ἔστω ἡ ΕΑ πρὸς τὴν ΑΡ, ταύτην ἡ ΕΟ πρὸς τὴν ΗΡ. ἐπεὶ ὅτι ὁ ΜΔ πρὸς τὴν ΔΚ λόγος ὁ αὐτός ἐστι τῷ ΖΔ πρὸς τὴν ΔΕ λόγῳ, ὅτι ὁ ΖΔ πρὸς τὴν ΔΕ λόγος σύγκειται ἐκ τοῦ ΖΑ πρὸς τὴν ΕΔ καὶ τοῦ ΕΑ πρὸς τὴν ΔΕ. καὶ ὁ ΜΔ πρὸς τὴν ΔΚ λόγος ἄρα σύγκειται ἐκ τοῦ ΖΑ πρὸς τὴν ΕΔ καὶ τοῦ ΕΑ πρὸς τὴν ΔΕ. ἀλλ' ὁ μὲν ΖΑ πρὸς τὴν ΕΔ λόγος ὁ αὐτός ἐστι τῷ ΖΗ πρὸς τὴν ΗΕ, διὰ τὸ ὑπόθεσιν, ὅτι ὁ ΕΑ πρὸς τὴν ΔΕ, ταύτην ὁ ΕΝ πρὸς τὴν ΕΚ, ὁ αὐτός ἐστι τῷ ΟΕ πρὸς τὴν ΠΡ. ὁ ἄρα πρὸς τὴν ΜΔ πρὸς τὴν ΔΚ λόγος σύγκειται ἐκ τοῦ ΖΗ πρὸς τὴν ΗΕ λόγου καὶ τοῦ ΟΕ πρὸς τὴν ΠΡ. πάλιν ἐπεὶ ὁ ΜΔ πρὸς τὴν ΑΚ λόγος ὁ αὐτός ἐστι τῷ ΖΠ πρὸς τὴν ΠΡ, ὅτι ὁ ΖΠ πρὸς τὴν ΠΡ λόγος σύγκειται ἐκ τοῦ ΖΠ πρὸς τὴν ΟΕ λόγου, ταύτην ὁ ΖΗ πρὸς τὴν ΗΕ, ὁ δὲ ΟΕ πρὸς τὴν ΠΡ. καὶ ὁ ΜΔ πρὸς τὴν ΑΚ λόγος σύγκειται ἐκ τοῦ ΖΗ πρὸς τὴν ΗΕ λόγου καὶ τοῦ ΟΕ πρὸς τὴν ΠΡ. ἐπομένως ὁ καὶ ὁ ΜΔ πρὸς τὴν ΔΚ λόγος ἐκ τῶν αὐτῶν συγκοινωνῶν ὡς ἄρα ἡ ΜΔ πρὸς τὴν ΔΚ ἔστω ἡ ΜΑ πρὸς τὴν ΑΚ. ὁμοίως δὲ δευτέρω, καὶ ἄλλαν διακρίνωσι δὲ τὸ ΕΔ πρὸς τὴν ΑΘ διακρίνωσι τὸ αἰρημένον τρόπον. ὅπερ εἶδει δεῖξαι.

Καὶ αὖ δὲ τὸ ΕΔ διακρίνωσι ἀνάλογον ὡς τὴν μὲν ΑΖ πρὸς τὴν ΔΕ ἔστω ἡ ΖΗ πρὸς τὴν ΗΕ, ὡς δὲ ἡ ΜΔ πρὸς τὴν ΔΚ ἔστω ἡ ΜΑ πρὸς τὴν ΑΚ. ἡ πᾶς ἐν τῷ τετραγώνῳ ἀπὸ λαμβανόμεναι εὐθείαι, οἷον αἱ ΖΕ, ΜΚ, ἀνάλογον τμήματα εὐθείας διαγομένη διὰ τῆς κορυφῆς ἢ ἐν τῷ τετραγώνῳ.

Εἰ γὰρ δυνατὸν, ἦεν τὴν ἐκτὸς κατὰ τὸ Φ σημείον. καὶ διήχθω ἡ ΑΗΨ εὐθεῖα. ἐπεὶ ὅτι, κατὰ τὸ περὶ δευτέρου, εὐθείαι πᾶς δὲ τὸ κορυφῆς ἡ ΑΨ ἀγομένη τμήματα τὸ ΖΔ εὐθείαν, ὡς ἐστὶν ὡς τὸ ΖΔ πρὸς τὸ ΔΕ ἔστω ὡς τὸ ΖΗ πρὸς τὴν ΗΕ. καὶ τὸ ΜΔ ἄρα ἀνάλογον τμήμα ὡς ἄρα ἡ ΜΔ πρὸς τὴν ΔΚ ἔστω ἡ ΜΨ πρὸς τὴν ΨΚ, ὅπερ ἀδυνάτον. ὅπερ καὶ γὰρ ὡς ἡ ΜΔ πρὸς τὸ ΔΚ ἔστω ἡ ΜΑ πρὸς τὸ ΑΚ. ἡ ἄρα ΑΗ εὐκαταλλομένη ἐχ' ἔχει δι' ἄλλαν σημείον πλὴν τοῦ Α. ὅπερ εἶδει δεῖξαι.



ἡ ΜΨ πρὸς τὴν ΨΚ, ὅπερ ἀδυνάτον. ὅπερ καὶ γὰρ ὡς ἡ ΜΔ πρὸς τὸ ΔΚ ἔστω ἡ ΜΑ πρὸς τὸ ΑΚ. ἡ ἄρα ΑΗ εὐκαταλλομένη ἐχ' ἔχει δι' ἄλλαν σημείον πλὴν τοῦ Α. ὅπερ εἶδει δεῖξαι.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΛΔ'.

Αἱ δὲ τὸ ΕΔ σημεία κατὰ τὴν ἐκτὸς εὐθείαν ὡς τὴν ΑΖ πρὸς τὴν ΔΕ ἔστω ἡ ΖΗ πρὸς τὴν ΗΕ, ὡς δὲ ἡ ΜΔ πρὸς τὴν ΔΚ ἔστω ἡ ΜΑ πρὸς τὴν ΑΚ. ἡ πᾶς ἐν τῷ τετραγώνῳ ἀπὸ λαμβανόμεναι εὐθείαι, οἷον αἱ ΖΕ, ΜΚ, ἀνάλογον τμήματα εὐθείας διαγομένη διὰ τῆς κορυφῆς ἢ ἐν τῷ τετραγώνῳ.

parallel est ipsi ΚΑ; ut igitur ΕΚ ad ΚΑ ita est ΕΑ ad ΑΖ; quoniam idem est ΝΑ ad ΕΚ ita ΖΑ ad ΑΡ, & ut ΕΚ ad ΚΑ ita ΕΑ ad ΑΖ: erit ex aequali in perturbata ratione, ut ΕΝ ad ΚΑ ita ΕΑ ad ΑΡ, hoc est ita ΕΟ ad ΠΡ: quoniam igitur ratio ΜΔ ad ΔΚ eadem est quae ΖΔ ad ΔΕ, ratio autem ΖΔ ad ΔΕ componitur ex ratione ΖΑ ad ΕΑ & ΕΑ ad ΔΕ: erit ratio ΜΔ ad ΔΚ ex eisdem rationibus composita. sed ratio ΖΑ ad ΕΑ eadem est quae ratio ΖΗ ad ΗΕ, ex hypothesi; & ratio ΕΑ ad ΔΕ, hoc est ΕΝ ad ΕΚ, ostensa est eadem quae est ΟΕ ad ΠΡ: ergo ratio ΜΔ ad ΔΚ componitur ex ratione ΖΗ ad ΗΕ & ratione ΟΕ ad ΠΡ. rursus quoniam ratio ΜΑ ad ΑΚ eadem est quae ratio ΖΠ ad ΠΡ, & ratio ΖΠ ad ΠΡ componitur ex ratione ΖΠ ad ΟΕ, hoc est ΖΗ ad ΗΕ, & ratione ΟΕ ad ΠΡ: ratio igitur ΜΑ ad ΑΚ composita est ex ratione ΖΗ ad ΗΕ & ratione ΟΕ ad ΠΡ: sed ratio ΜΔ ad ΔΚ componitur ex eisdem rationibus, ut jam ostensum est: ergo ut ΜΔ ad ΔΚ ita ΜΑ ad ΑΚ. pari modo & de aliis, quae à puncto Δ ductae fuerint, demonstrabitur: omnes enim à recta ΑΘ in eadem, quam diximus, proportionem secabuntur [Harmonice nempe.] quod erat demonstrandum.

Quod si à puncto Δ ductae lineae in eadem proportionem secantur, ita ut quam rationem habet ΖΑ ad ΔΕ eandem habeat ΖΗ ad ΗΕ; & rursus quam habet ΜΔ ad ΔΚ eandem habeat ΜΑ ad ΑΚ: recta linea, proportionaliter secans eas quae intra triangulum continentur, nempe rectas ΖΕ, ΜΚ, per verticem trianguli necessario transibit.

Si enim fieri potest, transeat extra verticem per punctum Φ; & ducatur recta linea ΑΗΨ, quoniam igitur, ex iis quae proxime demonstrata sunt, recta quaedam ΑΨ à vertice ducta secat ΖΔ, ita ut quam rationem habet ΖΑ ad ΔΕ eandem habeat ΖΗ ad ΗΕ; etiam ipsam ΜΔ in eadem

proportionem secabit: eritque ut ΜΔ ad ΔΚ ita ΜΨ ad ΨΚ, quod est absurdum; posuimus enim ΜΔ ad ΔΚ sicut ΜΑ ad ΑΚ: quare ΑΗ producta non transibit per aliud punctum quam per verticem trianguli, quod erat demonstrandum.

PROP. XXXIV. Theor.

Omnes rectae lineae, quae ab eodem puncto conicam superficiem ex utra-

[] I

que

que parte contingunt, in unius trianguli lateribus tactiones faciunt.

SIT conus, cujus basis quidem circulus circa centrum A, vertex punctum B, axis autem recta linea AB; & sumpto aliquo puncto Γ extra conum, ab eo ducantur ΓΔ, ΓΕ rectæ lineæ, conicam superficiem ex eadem parte contingentes: dico omnia puncta tactionum E, Δ in eadem recta linea esse.

Ducatur à puncto Γ ad AB * perpendicularis ΓΖ; & per ΓΖ ducatur planum æquidistans plano circuli A, quod sectionem in cono faciat circulum circa centrum Z, ita ut conus constituatur, cujus basis circulus Z, & axis ΖΒ. rursus per ΓΖ & axem aliud planum ducatur, faciens in cono triangulum ΒΗΘ; & ipsi ΓΖ ad rectos angulos agatur ΓΚ, quæ

in circuli Z plano existat; deinde per ΓΚ & utramque ipsarum ΓΔ, ΓΕ ducantur planaconum secantia, quæ faciant in cono quidem superficies sectiones ΑΔΜ, ΝΕΞ, in plano autem trianguli ΒΗΘ rectas lineas ΑΓ, ΝΓ: diametri igitur sectionum ΑΔΜ, ΝΕΞ sunt rectæ ΑΜ, ΝΞ. itaque ad diametros ΑΜ, ΝΞ ordinatim applicentur ΔΟ,

ΕΠ; quæ ad alteram partem superficiei ad puncta Ρ, Σ producantur. quoniam igitur recta linea ΓΔ contingit sectionem ΑΔΜ in puncto Δ, & ΔΟ ordinatim applicata est; erit [per 36. I.] ut ΑΓ ad ΓΜ ita ΑΟ ad ΟΜ. eadem quoque ratione ut ΝΓ ad ΓΞ ita erit ΝΠ ad ΠΞ: ergo, per proxime demonstrata, recta linea quæ connectit puncta Ο, Π, si producat, per verticem transibit. ducatur igitur ΟΠΒ. & quoniam ΒΣ, ΔΡ ipsi ΓΚ sunt parallelæ; etiam inter se parallelæ & in eodem plano erunt; itaque planum juxta rectas ΒΠΟ & ΕΣ, ΔΡ ductum sectionem faciet in cono superficie triangulum: adeoque puncta Ε, Δ, quæ sunt in superficie cono, erunt etiam in latere trianguli secantis triangulum ΒΗΘ secundum rectam lineam ΒΠΟ. simili modo demonstrabitur idem evenire in quibusvis aliis, uti & in contingentibus ad puncta Ρ, Σ. omnes igitur rectæ lineæ, quæ à puncto Γ ductæ conicam

καὶ ὅτι τὰ κατὰ τὰ Ρ καὶ Σ ἐφαπτομένων, τὸ αὐτὸ συμβαίνει· πᾶσι ἄρα αἱ ἀπὸ τῆς Γ ἐφαπτομένης τῆς

* Supponit hic conum rectum esse, sed eadem fere demonstratione res in cono scaleno comprobari potest, uti diximus in nota ad vigesimam nonam propositionem de Cylindro.

καὶ εἰς τῶν πλεονέκτης ἐπαφὰς ποιεῖ.

ΕΣΤΩ κώνος, ὃς βάσις μὲν ὁ περὶ τὸ Α κέντρον κύκλος, κορυφή δὲ τὸ Β σημεῖον, ἄξων δὲ ἡ ΑΒ εὐθεῖα, σημεία δὲ πῶς ἔΓ ληφθέντες ἐκ τῆς κώνου, ἡχθῶσιν ἀπὸ τῆς Γ αἱ ΓΔ, ΓΕ εὐθεῖαι, ἐφαπτομένης τῆς κώνου ὁπρὸς τὴν ἀπὸ τῆς Α μέρη· λέγω ὅτι τὰ Ε, Δ σημεία τῶν ἐπαφῶν ὅτι μιᾶς εὐθείας ἐστὶ.

Κατήχθω δὲ τὸ Γ σημείον ὅτι τὸ ΑΒ πρὸς ὀρθὰς ἡ ΓΖ, καὶ διὰ τῆς ΓΖ ἡχθῶ ὁπίπεδον ὡς ἀλλήλων τῶν τῆς Α κύκλου ὁπίπεδον, καὶ ποιέτω τοῦτο ἐν τῷ κώνῳ τὸ περὶ τὸ Ζ κέντρον κύκλον, ὥστε κώνον ὑποσθῆναι, ὃς βάσις μὲν ὁ Ζ κύκλος, ἄξων δὲ ὁ ΖΒ· καὶ διὰ τῆς ΓΖ καὶ τῆς ἄξωνος ἐκβεβλήθω ὁπίπεδον ποιεῖν ἐν τῷ κώνῳ τὸ διὰ τῆς ἄξωνος τριγώνον τὸ ΒΗΘ, καὶ τῇ

ΓΖ πρὸς ὀρθὰς ἡχθῶ ἡ ΓΚ, ἐν τῷ τῆς Ζ κύκλου ὁπίπεδῳ ἔστω καὶ διὰ τῆς ΓΚ καὶ ἐκατέρως τῆς ΓΔ, ΓΕ ἡχθῶ ὁπίπεδα τέμνοντα τὸ κώνον, καὶ ποιέτω διὰ τῆς τομῆς, ἐν μὲν τῇ ὁπίφανείᾳ τῆς κώνου πᾶς ΑΔΜ, ΝΕΞ γραμμὰς, ἐν δὲ τῷ ΒΗΘ τριγώνῳ ὁπίπεδον πᾶς ΑΓ, ΝΓ εὐθείας· διάμετροι ἄρα τῶν

ΑΔΜ, ΝΕΞ τομῶν εἰσὶν αἱ ΑΜ, ΝΞ εὐθεῖαι. ἡχθῶσιν τίνυν ὁπί πᾶς ΑΜ, ΝΞ διαμέτρους αἱ ΔΟ, ΕΠ τεταγμένως, καὶ περὶ τῆς ΒΗΘ τριγώνου μέρους τῆς ὁπίφανείας κατὰ τὰ Ρ καὶ Σ. ἐπεὶ ἔν ἡ ΓΔ εὐθεῖα τῆς ΑΔΜ γραμμῆς ἐφάπτεται κατὰ τὸ Δ σημεῖον, ἐκατήκται τεταγμένως ἡ ΔΟ· ὥς ἄρα ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΓΜ ὥτως ἡ ΑΟ πρὸς τὴν ΟΜ· καὶ διὰ τὰ αὐτὰ ὥς ἡ ΝΓ πρὸς τὴν ΓΞ ὥτως ἡ ΝΠ πρὸς τὴν ΠΞ· ἡ ἄρα τὰ Ο ΕΠ ὁπίπλευσται εὐθεῖα ἐκβαλλομένη ἡξει διὰ τῆς κορυφῆς, διὰ τὸ πρὸς τὰς. διήχθω τίνυν ἡ ΟΠΒ. καὶ ἐπεὶ ἐκατέρω τῆς ΕΣ, ΔΡ τῇ ΓΚ ἐστὶ ὡς ἀλλήλων· αἱ ἄρα ΔΡ, ΕΣ παράλληλοι τε εἰσὶν ἀλλήλαις καὶ ἐν ἐνὶ εἰσὶν ἐπίπεδῳ. τὸ ἔν δὲ ΒΠΟ καὶ τῆς ΕΣ, ΔΡ ὁπίπεδον ἐκβαλλόμενον τὸ τομὴν ποιήσει τρίγωνον ἐν τῇ τῆς κώνου ὁπίφανείᾳ· τὰ ἄρα Ε ΕΔ σημεία, ἐν τῇ ὁπίφανείᾳ ὄντα τῆς κώνου, ὅτι πλὴν ἐστὶ τριγώνου τῆς τέμνοντος τὸ ΒΗΘ τριγώνον κατὰ τὴν ΒΠΟ εὐθεῖαν. ὁμοίως δὲ δεῖν ὅτι τὰ ἐφαπτομένων πᾶσιν,

νικῆς ἐπιφανείας καθ' ἑνὸς τριγώνου πλὴρῶν ἀπὸ τῆς
συν. ὅπερ εἶδει δεῖξαι.

superficiem contingunt, in unius trianguli late-
ribus tactus faciunt. quod erat demonstrandum.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΛΕ΄.

PROP. XXXV. Theor.

ΤΟΥΤΟΥ δὲ δειχθέντος, ἔστω τρίγωνον τὸ
ΑΒΓ, καὶ παρὰ τὴν ΒΓ βάσιν αἱ ΔΕ, ΖΗ, καὶ
εἰληφθῶσι σημεῖον τὸ Θ, μὴ ὄν ἐν τῷ τῷ τριγώνῳ
ἐπιπέδῳ, καὶ ἐπιζυγισθῶσι αἱ ΘΔ, ΘΖ, ΘΗ, ΘΕ
ἐκτελεσθῶσι περὶ τὴν ἐπιπέδῳ πνι, ὡς ἀλ-
λήλων ὄντι τῷ ΑΒΓ ἐπιπέδῳ, κατὰ τὰ Κ, Λ, Μ, Ν
σημεῖα· τὸ δὲ διὰ τῶν ΕΔ, ΚΘ εὐθειῶν ἐπιπέδον ἐκ-
τελεσθῶν τεμεῖ τὸ ΚΛ-
ΜΝ ἐπιπέδον, καὶ ποιήσει ἐν
αὐτῷ κοινὴν τομὴν τὴν ΚΝ
εὐθείαν, παράλληλον ἔσται
τῇ ΕΔ. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ διὰ
τῶν ΖΗ, ΑΘ ἐπιπέδον ἐκ-
τελεσθῶν ποιήσει παράλ-
ληλον τῇ ΖΗ τὸ ΛΜ. ἐπεὶ
ἔν τῷ ΚΘΑ ἐπιπέδῳ τε-
μενεῖ ὑπὸ ὡς ἀλλήλων ἐπι-
πέδων τῶν ΑΒΓ, ΚΛΜΝ,
αἱ κοιναὶ αὐτῶν τομαὶ αἱ
ΚΛ, ΔΖ παράλληλοί εἰσιν
ἀλλήλαις. διὰ ταῦτα δὲ καὶ
ἡ ΝΜ τῇ ΗΕ παράλληλος
ἔστιν· ἐκτελεσθῶσι ἄρα αἱ
ΚΛ, ΜΝ συμπεσύν) κατὰ τὸ Ε. ἐπεὶ ἔν δύο αἱ
ΚΕ, ΕΝ δυοὶ τῶν ΑΔ, ΑΕ ὡς ἀλλήλοι εἰσιν· ἴση
ἄρα ἡ πρὸς τὸ Ε γωνία τῇ πρὸς τὸ Α. πάλιν ἐπεὶ
δύο αἱ ΕΚ, ΚΝ δυοὶ τῶν ΑΔ, ΔΕ παράλληλοί εἰσιν·
ἡ ἄρα ὑπὸ τῶν ΕΚ, ΚΝ γωνία τῇ ὑπὸ ΑΔ, ΔΕ ἴση·
τὰ ἄρα ΕΚΝ, ΑΒΓ τρίγωνα ὁμοία εἰσιν ἀλλήλαις.

Εάν ἔν πάλιν τὸ μὲν Θ σημεῖον ὑποθώμεθα τὸ
φωτίζον εἶναι, τὸ δὲ ΑΒΓ τρίγωνον τὸ ἐπιπροσθῆναι
τῶν ἀκτῶν, ἔστω καθ' αὐτὸ ὃν τὸ τρίγωνον ἔστω ἐν κώ-
νῳ, συμπίπτει) τὰς ἀπὸ τοῦ Θ φερομένης ἀκτῖνας, ἐκ-
τελεσθῶσι Διὰ τῶν ΑΒΓ τριγώνου, ποιῶν τὸ ΚΝΕ
τρίγωνον τῆς σκιάς, ὁμοίον ὃν τῷ ΑΒΓ. ταῦτα εἰ
ὁπλικῆς θεωρίας ἔχη), καὶ δοκεῖ διὰ τῶν τῶν παρὰ
σῆς πειραματικῆς ἀλλοτρία εἶναι· ἀλλ' ἔν ἐκείνῳ
καὶ φανερόν γέγονεν, ὅτι, ἀνευ τῶν τῶν τῶν κυλίνδρου καὶ
τῶν τῶν κώνου τομῆς ἐν ταῦτα δειχθέντων, τῶν ἐλλείψεως
λέγω καὶ τῶν ἀπὸ τοῦ ὀρθογώνου αὐτῆς εὐθειῶν, ἀδύνατον ἦν
κατασκευασθῆναι τὸ πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦ προβλήματος. ὥστε ἐκ ἀλόγου,
ἀλλὰ Διὰ τῶν τῶν χρεῖαν, ἐπεισέλθον ὁ τῶν τῶν λόγος.

ΗΘ Cigitur demonstrato, sit triangulum ΑΒΓ,
cujus basi ΒΓ parallelæ ducantur ΔΕ, ΖΗ;
& sumpto aliquo puncto Θ, quod non sit in
trianguli plano, jungantur ΘΔ, ΘΖ, ΘΗ, ΘΕ;
quæ productæ occurrant plano alicui, quod pla-
no ΑΒΓ æquidistat, in punctis Κ, Λ, Μ, Ν:
planum igitur per rectas ΕΔ, ΚΘ ductum seca-
bit etiam planum ΚΛΜΝ, & in eo commu-
nem sectionem faciet re-
ctam lineam ΚΝ ipsi ΔΕ
parallelam: eodem modo
& planum ductum per
ipsas ΖΗ, ΑΘ faciet re-
ctam lineam ΛΜ paral-
lelam ipsi ΖΗ. quoniam
igitur planum ΚΘΑ æ-
quidistantibus planis ΑΒΓ,
ΚΛΜΝ secatur, commu-
nes ipsorum sectiones ΚΛ,
ΔΖ parallelæ erunt. ea-
dem ratione parallelæ sunt
rectæ ΜΝ, ΗΕ: ergo ΚΛ,
ΜΝ productæ convenient
inter se. convenient in Ε;
& cum duæ rectæ ΚΕ, ΕΝ
duabus ΑΔ, ΑΒ parallelæ
sint; erit angulus ad Ε angulo ad Α æqualis.



rursus cum duæ ΕΚ, ΚΝ duabus ΑΔ, ΔΕ pa-
rallelæ sunt, erit angulus ΕΚΝ angulo ΑΔΕ
æqualis; triacula igitur ΕΚΝ, ΑΒΓ inter se si-
milis erunt.

Quod si punctum Θ fingamus esse corpus il-
luminans, & triangulum ΑΒΓ ejus radiis oppo-
situm, siue per se siue in cono, eveniet ut ra-
dii, qui ab ipso Θ emittuntur juxta triangu-
lum ΑΒΓ, faciant triangulum umbræ ΚΝΕ ipsi
ΑΒΓ simile. etsi enim hæc ad Opticam contem-
plationem pertineant, & ob id à proposita tra-
ctatione aliena videantur, tamen perspicue con-
stat, absque iis quæ hoc loco de coni & cy-
lindri sectione, hoc est de ellipsi & rectis li-
neis eam contingentibus, demonstrata sunt, pro-
blema hujusmodi absolvi non posse: quare non
temere, sed necessario de his sermonem insti-
tuimus.

ΣΕΡΗ

Σ Ε Ρ Η Ν Ο Υ

ΑΝΤΙΝΣΕΩΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

Π Ε Ρ Ι

Κ Ω Ν Ο Υ Τ Ο Μ Η Σ.

S E R E N I

ANTISSENSIS PHILOSOPHI

DE

SECTIONE CONI

LIBER.

CUM ea sectio, præstantissime *Cyre*, quæ in Conis per verticem fit, in eorum quidem superficiebus triangula efficiat, variamque & perpulchram præbeat contemplationem; à nullo autem eorum qui nos præcesserunt, quod sciam, pertractata fit: non malè me facturum existinavi, si locum hunc inexplicatum non relinquerem, sed perscriberem de his quæcunque ipse cogitatione complectebat. Propemodum quidem hæc omnia, quæque profundiore geometriâ indigere videntur, me hoc libro comprehendisse arbitror: neque mirum alicui videri debeat, si nonnulla quæ dici debuerant prætermiserim, utpote qui primus ad hanc contemplationem sum aggressus. Quamobrem par est, ut vel tu, in eorundem studium incumbens, vel posteriorum aliquis, qui in hæc inciderit, nostro exemplo ductus, à nobis omiſſa supplenda curaret. Quædam autem sunt quæ consulto præterierim, vel quod manifesta essent, vel quod ab aliis tractata. Siquidem in omni

ΤΗΣ ἐν ταῖς κώνῃς τοῦτ᾽ ἐστὶν Κίρη, ὅταν ἀφ' τῆς κορυφῆς αὐτῶν γίνῃται, τρίγωνα μὲν ὑφίσταται ἐν τοῖς κώνῃς, πασίλινον δὲ καὶ γλαφυρὸν ἡμεῖς ἔχουσιν, καὶ μηδὲν τῶν περὶ ἡμῶν, ὅτι γὰρ μὴ εἰδὼς, περὶ γεωμετρίας. ἔδοξε μοι μὴ κελεύς ἔχειν ἀπεξήραστον ἀφ᾽ αὐτῶν τὸν τόπον τῆς τοῦ αὐτοῦ δὲ περὶ αὐτῶν ὅτι γὰρ οὐκ ἐμὲν ἀφ᾽ αὐτῶν κεπέληται. ὁμοῦ δὲ ἐν ταῖς κώνῃς, ὅτι βαρύνεται δὲ κῆντα δὲ γεωμετρίας, ἡγεῖμαι λόγῳ περὶ κώνῃς καὶ ἡμῶν. ἔκ αὖ δὲ γεωμετρίας, εἰ καὶ τῶν ὑφίσταται λογιστικῶν παρὰ τῶν ἀφ᾽ αὐτῶν, ὅτι περὶ τῶν ἐγγεγραμμένων τῇ τῆς κώνῃς. ὅτι εἰκότως ἢ οὐ κατὰ τὴν εἰς τὴν αὐτὴν σκέψιν, ἢ τῶν ὑπερὶ ἐντυξομένων πρὸς, ὁμοῦ μὲν οὐδὲν, τὸ παρορθεῖν ἡμῖν περὶ αὐτῶν. ἔτι δὲ ἀ καὶ ἐκόντες ἀφ᾽ αὐτῶν, ἢ ἀφ᾽ τὸ σαφές, ἢ ἀφ᾽ τὸ ἄλλως διδόναι. αὐτῶν τὸ μὲν οὐ παντὶ κώνῃ τριγώνον εἶναι, εἰ ἀφ᾽ τῆς κορυφῆς τριγώνον,

DE SECTIONE CONI.

37

τμηθείη, ἀλλ' τὸ διδόναι ἄλλος ὥς ἔπος ἔχει, ἡμῶς ἀποδεχόμεθα, ἵνα μὴ ἀλλότριαι τοῖς ὑφ' ἡμῶν εὑρεθεῖσι συγγραμμάτων ἢ τὰ δ' ὀλιγαριθμοῦναι καὶ τοῖς πολλοῖς εὐληπὰ γραφῆς ἐκζητούμεθα, ἵνα μὴ τ' ἐπιγυμνάσιον ἢ περὶ τῆς διανοίας ἀλίστουται. ἰσχυρὸν δὲ ὅτι τ' ἀπαιτούμεναι ἀποδείξω.


verticem secetur, cum ab aliis demonstratum sit, nos omittimus, ne aliena nostris inventis infererentur. Quæ vero magis obvia sunt, & facillime intelligi possunt, non existimavi me scribere oportere, ne legentium annos parum attentos redderem, igitur ad rem propositam accedamus.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Α'.

Εάν τετάρτη εὐθεία ἢ ὁποῖα πρὸς πλὴν δύο πρὸς μείζονα λόγον ἔχῃ, ἢ περὶ ἢ τετάρτη πρὸς τετάρτη· τὸ ὑπὸ πρῆτης καὶ τετάρτης μείζον ἐστὶ τὸ ὑπὸ δευτέρας καὶ τρίτης.

Εἴθε γὰρ ὅτι ἡ Α πρὸς τὴν Β μείζονα λόγον ἔχῃ, ἢ περὶ ἢ τὴν Γ πρὸς τὴν Δ Ε· λέγω ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν Α, Δ Ε μείζον ἐστὶ τῶν Β, Γ.

Επειδὴ ἡ Α πρὸς Β μείζονα λόγον ἔχει ἢ περὶ ἢ τὴν Γ πρὸς Δ Ε, ἔστω δὲ ἡ Α πρὸς Β ὡς ἡ Γ πρὸς Δ Ζ· τὸ ὑπὸ Α, Δ Ζ ἴσον ἐστὶ τῶν Β, Γ. μείζον δὲ τὸ ὑπὸ Α, Δ Ε ὡς τὸ Α, Δ Ζ· καὶ ὡς τὸ Β, Γ ὡς τὸ Α, Δ Ε.



PROP. I. Theor.

Si prima quatuor rectarum ad secundam majorem rationem habeat quam tertia ad quartam: rectangulum contentum sub prima & quarta majus est eo quod sub secunda & tertia continetur.

Ἡ Α Β Γ Α τὴν Α ad rectam Β majorem rationem quam Γ ad Δ Ε: dico rectangulum sub Α & Δ Ε rectangulo sub Β & Γ majus esse.


Quoniam enim Α ad Β majorem rationem habet quam Γ ad Δ Ε; fiat ut Α ad Β ita Γ ad Δ Ζ: rectangulum igitur sub Α & Δ Ζ æquale rectangulo sub Β & Γ. majus autem est quod fit sub Α & Δ Ε eo quod sub Α & Δ Ζ; ergo rectangulum sub Α & Δ Ε rectangulo sub Β & Γ majus erit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Β'.

Εάν τετράγωνον ὀρθογώνιον ἀπὸ τῆς ἐπὶ τῆς γωνίας ὅπῃ μίαν τὴν εὐθεῖαν ἢ ὀρθὴν ἀχθῇ εὐθεῖα· ἢ ἀχθεῖσα πρὸς τὴν ἀπὸ τῆς ἀνωμύτης ὑπὸ αὐτῆς πρὸς τῇ κατὰ τὴν μείζονα λόγον ἔχῃ, ἢ περὶ ἢ ἐξ ἀρχῆς ὑποτείνουσα πλὴν ὀρθῶς πρὸς τὴν τμηθεῖσαν πλευρὰν ὑπὸ τῆς ἀχθείσης.

ΤΡΙΓΩΝΟΥ ὅτι ὀρθογώνιον τὸ Α Β Γ, ὀρθῶς ἔχοντος πλὴν Α γωνίαν, ἀπὸ μίαν τῶν γωνιῶν τῆς Γ ὅπῃ τὴν Α Β ἢ κατὰ τὴν εὐθεῖαν ἢ Γ Δ· λέγω ὅτι ἡ Γ Δ πρὸς Δ Α μείζονα λόγον ἔχει ἢ περὶ ἢ τὴν Γ Β πρὸς Β Α.

Ἡ κατὰ τὴν πρὸς τὴν Γ Β ἢ Δ Ε. ἐπεὶ ἐν ὀρθῇ ἐστὶν ἡ ὑπὸ Δ Α Γ, ἀμειλίχεια ἀρα ἡ ὑπὸ Δ Ε Γ· μείζων ἀρα ἡ Δ Γ τῆς Δ Ε· ἢ ἀρα Γ Δ πρὸς Δ Α μείζονα λόγον ἔχει ἢ περὶ ἢ τὴν Ε Δ πρὸς Δ Α, τῆς τε ἢ περὶ ἢ τὴν Γ Β πρὸς Β Α.



PROP. II. Theor.

Si in triangulo orthogonio ab altero angulorum ad unum latus quod est circa angulum rectum recta ducatur: ducta illa habebit ad eam quæ inter ipsam & perpendicularem interjicitur majorem rationem, quam quæ à principio subtenditur recto angulo ad jam dictum latus.

SIT triangulum orthogonium Α Β Γ, rectum habens angulum ad Α; & ab uno angulorum, videlicet à Γ, ad Α Β ducatur recta Γ Δ: dico Γ Δ ad Δ Α majorem rationem habere quam Γ Β ad Β Α.

Ducatur enim recta Δ Ε ipsi Γ Β parallela. & quoniam rectus est angulus Δ Α Γ, angulus Δ Ε Γ obtusus erit: major igitur est Δ Γ quam Δ Ε; & idcirco Γ Δ ad Δ Α majorem rationem habet quam Ε Δ ad Δ Α, hoc est quam Γ Β ad Β Α.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Γ'.

Εάν κώνος ὀρθός ἀπὸ τῆς κορυφῆς ὀκτιπέδῳ τμηθῇ· τὰ γινόμενα ἐν ταῖς τομῇς τετράγωνα τὰ ἴσα ἔχοντα βάσεις ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα.

PROP. III. Theor.


Si conus rectus planis per verticem secetur; triangula illa, quæ in sectionibus fiunt & æquales habent bases, inter se æqualia erunt.

[] K

SIT

SIT conus rectus, cujus vertex punctum A, & basis circulus circa centrum B. cono itaque planis per verticem secto, generentur triangula $\Lambda\Gamma\Delta$, $\Lambda\epsilon\text{Z}$, æquales bases habentia $\Gamma\Delta$, ϵZ (triangula enim ex his sectionibus fieri alibi [per 3. 1. conic.] ostensum est.) dico triangula $\Lambda\Gamma\Delta$, $\Lambda\epsilon\text{Z}$ æqualia esse.

Nam cum bases sint æquales, itemque æquales inter se $\Lambda\Gamma$, $\Lambda\Delta$, $\Lambda\epsilon$, ΛZ ; erit triangulum triangulo quoque æquale.



ΕΣΤΩ κώνος, ὃς κορυφὴ μὲν τὸ Α σημείον, βάσις δὲ ὁ περὶ τὸ Β κέντρον κύκλος· ὃς δὲ κώνος διὰ τῆς κορυφῆς τμηθέντες ὀρθοπέδαις, γεννηθῶσι τὰ ὑπὸ τῆς τομῆς γινόμενα τρίγωνα. (ὅτι γὰρ τρέγωνα ποιῶσιν αἱ τοιαύται τομαὶ ἐν ἄλλοις δέκνυται) γεννηθῶσι δὲ καὶ $\Lambda\Gamma\Delta$, $\Lambda\epsilon\text{Z}$, ἴσους ἔχοντες τὰς $\Gamma\Delta$, ϵZ βάσεις· λέγω ὅτι καὶ $\Lambda\Gamma\Delta$, $\Lambda\epsilon\text{Z}$ τρέγωνα ἴσα ἀλλήλοις ἔσονται. Ἐπεὶ γὰρ αἱ τε βάσεις ἴσαι ἀλλήλαις, ἴσαι δὲ καὶ αἱ $\Lambda\Gamma$, $\Lambda\Delta$, $\Lambda\epsilon$, ΛZ καὶ τὸ τρέγωνον ἄρα τῶν τρέγωνων ἴσον.

PROP. IV. Theor.

In conis rectis similia triangula inter se æqualia sunt.

SIT enim in proposita figura $\Lambda\Gamma\Delta$ triangulum triangulo $\Lambda\epsilon\text{Z}$ simile: dico & æquale esse, quoniam enim ut $\Lambda\Gamma$ ad $\Gamma\Delta$ ita $\Lambda\epsilon$ ad ϵZ ; erit permutando ut $\Gamma\Delta$ ad $\Lambda\epsilon$ ita $\Gamma\Delta$ ad ϵZ . & sunt $\Gamma\Delta$, $\Lambda\epsilon$ æquales; ergo & æquales sunt $\Gamma\Delta$, ϵZ . triangula vero æqualium basium, quæ in conis rectis fiunt, inter se [per 8. huj.] sunt æqualia: ergo & triangula $\Lambda\Gamma\Delta$, $\Lambda\epsilon\text{Z}$ æqualia erunt.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Δ'.

Εν τοῖς ὀρθοῖς κώνοις τὰ ὅμοια τρέγωνα ἴσα ἀλλήλοις ἔσονται.


ΕΣΤΩ γὰρ ὅτι τὸ ποικιλομήκες καταγεωφῆς τὸ $\Lambda\Gamma\Delta$ τρέγωνον τῷ $\Lambda\epsilon\text{Z}$ ὁμοιον· λέγω ὅτι καὶ ἴσα ἔσονται. ἐπεὶ γὰρ ἔστιν ὡς ἡ $\Lambda\Gamma$ πρὸς $\Gamma\Delta$ ὅτως ἡ $\Lambda\epsilon$ πρὸς ϵZ , καὶ ἐναλλάξ ἄρα καὶ ἴσων ἔσονται αἱ $\Gamma\Delta$, $\Lambda\epsilon$ · ἴσων ἄρα καὶ αἱ $\Gamma\Delta$, ϵZ . καὶ δὲ ὅτι ἴσων βάσεων τρέγωνα ἐν τοῖς ὀρθοῖς κώνοις ἴσα ἔσονται ἄρα καὶ $\Lambda\Gamma\Delta$, $\Lambda\epsilon\text{Z}$ τρέγωνα.

PROP. V. Theor.

Si conus rectus planis per verticem secetur, & per axem & extra axem; sitque axis non minor semidiametro basis: eorum quæ fiunt triangulorum maximum est illud quod per axem transit.

SIT conus, cujus vertex A, basis circulus circa B centrum, & axis AB; cono itaque per verticem secto, fiant triangula, per axem quidem $\Lambda\Gamma\Delta$, extra axem vero $\Lambda\epsilon\text{Z}$; ponaturque ϵZ ipsi $\Gamma\Delta$ parallela; axis autem AB non minor sit ipsa BG: dico $\Lambda\Gamma\Delta$ triangulum triangulo $\Lambda\epsilon\text{Z}$ majus esse.

Jungatur BE, & ab ipso B ad EZ perpendicularis ducatur BH: ergo [per 3. 3.] EZ bifariam dividetur in H; & juncta AH perpendicularis erit ad EZ; triangulum enim BAZ æquicrurum est, quoniam igitur AB non est minor semidiametro BE, & est EH minor quam BE; erit AB ipsa BH major. itaque abscindatur BΘ æqualis ipsi BH, & jungatur HΘ: quoniam igitur EH ipsi BΘ est æqualis, communis autem est BH; ergo



ΠΡΟΤΑΣΙΣ Ε'.

Εάν κώνος ὀρθὸς ὀρθοπέδαις τμηθῇ ἀφ' ὃς κορυφῆς, καὶ μὲν ἀφ' ὃς ἄξονος, τοῖς δὲ ἐκτὸς ὃς ἄξονος, ὁ δὲ ἀξὼν ὃς κέντρον μὴ ἐλάττωσιν ἢ τὸ ἐκτὸς κέντρον τῆς βάσεως· τὸ γινόμενον ἐν τῇ κούφῃ τρέγωνται μέγιστον ἔσται τὸ ἀφ' ὃς ἄξονος.

ΕΣΤΩ κώνος, ὃς κορυφὴ μὲν τὸ Α, βάσις δὲ ὁ περὶ τὸ Β κέντρον κύκλος, ἄξων δὲ ὁ ΑΒ· τμηθέντες δὲ ὁ κώνος διὰ τῆς κορυφῆς, γεννηθῶσι τρέγωνα, ἀφ' ὃς μὲν ὃς ἄξονος τὸ $\Lambda\Gamma\Delta$, ἐκτὸς δὲ ὃς ἄξονος τὸ $\Lambda\epsilon\text{Z}$, ὃς κείδω τὸ ὀρθοπέδαις ἡ EZ τῇ $\Gamma\Delta$, ὁ δὲ ἀξὼν, τμηθέντες ἡ ΑΒ εὐθεῖα, μὴ ἐλάττωσιν ἔστω τῇ ΒΓ· λέγω ὅτι τὸ $\Lambda\Gamma\Delta$ τρέγωνον μείζον ἐστὶν ὃς $\Lambda\epsilon\text{Z}$ τρέγωνον.

Ἐπιζεύχεται ἡ BE, ὃς ἀπὸ τῆς Β κέντρον ἔχουσα ὅτι τῇ EZ ἡ BH· διχαῖα ἄρα τμήματα ἡ EZ κατὰ τὸ H. ἐπιζεύχεται ἡ AH· ἡ AH ἄρα κάθετος ἐστὶν ἐπὶ τῇ EZ, ἰσοσκελὲς γὰρ τὸ BAZ. ἐπεὶ γὰρ ἡ AB ἢ ἐστὶν ἐλάττωσιν τῇ ἐκτὸς κέντρον τῇ BE, ἐλάττωσιν δὲ ἡ EH τῇ BE· ἡ ἄρα AB μείζων ἐστὶν τῇ EH. ἀφαιρεθῶσι τῶν τῇ EH ἴση ἡ BΘ, καὶ ἐπιζεύχεται ἡ ΘH. ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ μὲν EH τῇ BΘ, κοινὴ δὲ ἡ BH· δύο ἄρα

$\alpha\beta\alpha$ $\delta\upsilon\sigma\iota\nu$ $\iota\sigma\alpha\iota$, $\kappa\epsilon$ $\gamma\omega\gamma\acute{\alpha}\nu\iota\alpha$ η $\upsilon\pi\acute{o}$ $\epsilon\eta\beta$ $\tau\eta$ $\iota\sigma\alpha\tau\acute{o}$ $\eta\beta$ θ
 $\iota\sigma\alpha\iota$, $\epsilon\phi\eta$ $\gamma\upsilon$ $\epsilon\kappa\alpha\tau\epsilon\rho\alpha$ · $\kappa\epsilon$ $\beta\acute{\alpha}\sigma\iota\varsigma$ $\acute{\alpha}\rho\alpha$ η $\epsilon\beta$ $\tau\eta$ θ η $\iota\sigma\eta$
 $\epsilon\sigma\tau\iota$, $\kappa\epsilon$ $\acute{o}\mu\iota\omega\iota$ $\tau\acute{\alpha}$ $\tau\epsilon\lambda\acute{\iota}\gamma\omega\gamma\alpha$ · $\acute{\omega}\varsigma$ $\acute{\alpha}\rho\alpha$ η $\beta\epsilon$ $\pi\acute{\alpha}\rho\epsilon\varsigma$ $\epsilon\eta$
 $\acute{\alpha}\tau\omega\varsigma$ η $\eta\theta$ $\pi\acute{\alpha}\rho\epsilon\varsigma$ $\theta\beta$. η γ η $\eta\theta$ $\pi\acute{\alpha}\rho\epsilon\varsigma$ $\theta\beta$ $\mu\acute{\epsilon}\iota\zeta\omicron\nu\alpha$
 $\lambda\acute{o}\gamma\omega\nu$ $\acute{\epsilon}\chi\epsilon\iota$ η $\pi\epsilon\rho$ η $\eta\alpha$ $\pi\acute{\alpha}\rho\epsilon\varsigma$ $\alpha\beta$, $\acute{\omega}\varsigma$ $\pi\omega\rho\epsilon\delta\epsilon\chi\eta\eta$,
 $\epsilon\phi\eta\gamma\omega\gamma\omega\mu\iota\omega\nu$ $\gamma\upsilon$ $\tau\acute{o}$ $\alpha\beta\eta$ · $\kappa\alpha\iota$ η $\beta\epsilon$ $\acute{\alpha}\rho\alpha$ $\pi\acute{\alpha}\rho\epsilon\varsigma$ $\epsilon\eta$,
 $\tau\epsilon\tau\epsilon\sigma\tau\iota$ η $\gamma\beta$ $\pi\acute{\alpha}\rho\epsilon\varsigma$ $\epsilon\eta$, $\tau\epsilon\tau\epsilon\sigma\tau\iota$ η $\gamma\delta$ $\pi\acute{\alpha}\rho\epsilon\varsigma$ $\epsilon\zeta$,
 $\mu\acute{\epsilon}\iota\zeta\omicron\nu\alpha$ $\lambda\acute{o}\gamma\omega\nu$ $\acute{\epsilon}\chi\epsilon\iota$ η $\pi\epsilon\rho$ η $\eta\alpha$ $\pi\acute{\alpha}\rho\epsilon\varsigma$ $\alpha\beta$ · $\tau\acute{o}$ $\acute{\alpha}\rho\alpha$
 $\upsilon\pi\acute{o}$ $\tau\omega\nu$ $\gamma\delta$, $\beta\alpha$ $\mu\acute{\epsilon}\iota\zeta\omicron\nu$ $\epsilon\sigma\tau\iota$ $\tau\acute{\alpha}$ $\upsilon\pi\acute{o}$ $\tau\eta\zeta$, $\eta\alpha$, $\delta\iota\gamma\alpha$
 $\tau\acute{o}$ $\pi\rho\acute{\omega}\tau\omega\nu$ $\lambda\eta\mu\mu\alpha\tau\iota\omega\nu$. $\acute{\alpha}\lambda\lambda\alpha$ $\tau\acute{\alpha}$ $\mu\eta\delta\epsilon$ $\iota\sigma\alpha\tau\acute{o}$ $\gamma\delta$, $\beta\alpha$
 η $\mu\iota\sigma\upsilon$ $\epsilon\sigma\tau\iota$ $\tau\acute{o}$ $\alpha\gamma\delta$ $\tau\epsilon\lambda\acute{\iota}\gamma\omega\gamma\omega\nu$, $\tau\acute{\alpha}$ $\delta\epsilon$ $\iota\sigma\alpha\tau\acute{o}$ $\epsilon\zeta$, $\eta\alpha$
 η $\mu\iota\sigma\upsilon$ $\tau\acute{o}$ $\epsilon\alpha\zeta$ $\tau\epsilon\lambda\acute{\iota}\gamma\omega\gamma\omega\nu$ · $\kappa\alpha\iota$ $\tau\acute{o}$ $\alpha\gamma\delta$ $\acute{\alpha}\rho\alpha$ $\tau\epsilon\lambda\acute{\iota}\gamma\omega\gamma\omega\nu$
 $\tau\acute{\alpha}$ $\alpha\epsilon\zeta$ $\mu\acute{\epsilon}\iota\zeta\omicron\nu$ $\epsilon\sigma\tau\iota$ · $\kappa\alpha\iota$ $\pi\acute{\alpha}\nu\tau\omega\nu$ $\acute{\alpha}\rho\alpha$ $\tau\eta$ $\iota\sigma\iota\varsigma$
 $\beta\acute{\alpha}\sigma\epsilon\iota\varsigma$ $\acute{\epsilon}\chi\omicron\nu\tau\omega\nu$ $\tau\eta$ $\epsilon\zeta$, $\kappa\alpha\iota$ $\delta\iota\alpha$ $\tau\acute{\alpha}$ $\tau\omega$ $\iota\sigma\omega\nu$ $\acute{\omicron}\nu\tau\omega\nu$,
 $\mu\acute{\epsilon}\iota\zeta\omicron\nu$ $\epsilon\sigma\tau\iota$ $\tau\acute{o}$ $\alpha\gamma\delta$. $\acute{o}\mu\iota\omega\iota\varsigma$ $\delta\epsilon$ $\delta\epsilon\acute{\iota}\chi\omicron\mu\epsilon\nu$ $\kappa\alpha\iota$ $\delta\eta\lambda\iota$
 $\tau\omega\nu$ $\acute{\alpha}\lambda\lambda\omega\nu$ $\tau\epsilon\mu\acute{\omega}\nu$ $\tau\omega\nu$ $\acute{\epsilon}\kappa\tau\acute{o}\varsigma$ $\acute{\epsilon}\xi\acute{\alpha}\lambda\omicron\nu\omicron\varsigma$ · $\mu\acute{\epsilon}\gamma\iota\sigma\tau\omega$ $\acute{\alpha}\rho\alpha$
 $\tau\acute{o}$ $\delta\iota\gamma\alpha$ $\acute{\epsilon}\xi\acute{\alpha}\lambda\omicron\nu\omicron\varsigma$ $\tau\epsilon\lambda\acute{\iota}\gamma\omega\gamma\omega\nu$.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ 5'.

Επὶ τὸ αὐτὸ ἄλλως καὶ καθολικώτερον δεῖξαι, ὅτι καὶ
ἀπλῶς τῇ τριγῶνι τὸ μέγιστον βάσις ἔχον μεί-
ζον ὅστι.

ΤΜΗΘΕΝΤΟΣ ἢ τῆ κώνη, γενέσθω πρὸς ΑΓΔ,
ΑΖΔ, ὥστε πρὸς ΓΔ, ΖΔ βάσεις συμβάλλειν
ἀλλήλαις κατὰ τὸ Δ πέρας, καὶ ἔσω μείζων τῆ
ΖΔ ἢ ΓΔ, εἴτε διὰ τὸ κέντρος εἶναι, εἴτε μὴ· λέγω
ὅτι τὸ ΑΓΔ τῆ ΑΖΔ μείζον ἐστίν.

$\text{ΗΧ}\theta\omega\sigma\iota\upsilon\iota\ \delta\theta\eta\iota\ \pi\acute{\alpha}\varsigma\ \text{ΖΔ}, \Gamma\Delta$
 $\kappa\acute{\alpha}\theta\eta\tau\epsilon\iota\ \alpha\acute{\gamma}\ \text{ΑΒ}, \text{ΑΗ}, \delta\theta\eta\iota\ \delta\epsilon\ \tau\acute{\iota}\omega$
 $\text{ΑΔ}\ \eta\ \text{ΒΘ}.\ \epsilon\pi\epsilon\iota\ \epsilon\upsilon\ \eta\ \Gamma\Delta\ \tau\eta\varsigma$
 $\text{ΖΔ}\ \mu\acute{\epsilon}\iota\omega\upsilon\iota\ \epsilon\sigma\tau\iota\ \kappa\epsilon\ \eta\ \eta\mu\acute{\iota}\sigma\iota\sigma\epsilon\iota\ \acute{\alpha}\rho\alpha$
 $\eta\ \text{ΒΔ}\ \tau\eta\varsigma\ \Delta\text{Η}\ \mu\acute{\epsilon}\iota\omega\upsilon\iota\ \tau\acute{o}\ \delta\alpha\pi\acute{o}$
 $\text{ΒΔ}\ \acute{\alpha}\rho\alpha\ \tau\tilde{\epsilon}\ \delta\alpha\pi\acute{o}\ \Delta\text{Η}\ \mu\acute{\epsilon}\iota\omega\upsilon\iota\ \epsilon\sigma\tau\iota$
 $\kappa\alpha\iota\ \lambda\omicron\iota\pi\acute{o}\nu\ \acute{\alpha}\rho\alpha\ \tau\acute{o}\ \delta\alpha\pi\acute{o}\ \text{ΒΑ}\ \lambda\omicron\iota\pi\tilde{\epsilon}\ \tau\tilde{\epsilon}\ \delta\alpha\pi\acute{o}\ \text{ΑΗ}\ \epsilon\lambda\alpha\tau\acute{\iota}\theta\eta\iota\ \epsilon\sigma\tau\iota\ \tau\acute{o}$
 $\acute{\alpha}\rho\alpha\ \delta\alpha\pi\acute{o}\ \text{ΑΒ}\ \pi\omega\varsigma\ \tau\acute{o}\ \delta\alpha\pi\acute{o}\ \text{ΒΔ}$
 $\epsilon\lambda\acute{\alpha}\tau\eta\iota\theta\eta\alpha\ \lambda\acute{o}\gamma\omicron\iota\iota\ \epsilon\chi\epsilon\iota\ \eta\pi\epsilon\rho\ \tau\acute{o}\ \delta\alpha\pi\acute{o}\ \text{ΑΗ}\ \pi\omega\varsigma\ \tau\acute{o}\ \delta\alpha\pi\acute{o}\ \text{ΗΔ}.\ \alpha\lambda\lambda\prime$
 $\acute{\omega}\varsigma\ \tau\acute{o}\ \delta\alpha\pi\acute{o}\ \text{ΑΒ}\ \pi\omega\varsigma\ \tau\acute{o}\ \delta\alpha\pi\acute{o}\ \text{ΒΔ}$
 $\acute{\epsilon}\tau\omega\varsigma\ \eta\ \text{ΑΘ}\ \pi\omega\varsigma\ \Theta\Delta\ \kappa\alpha\iota\ \eta\ \text{ΑΘ}\ \acute{\alpha}\rho\alpha\ \pi\rho\acute{o}\varsigma$
 $\Theta\Delta\ \epsilon\lambda\acute{\alpha}\tau\eta\iota\theta\eta\alpha\ \lambda\acute{o}\gamma\omicron\iota\iota\ \epsilon\chi\epsilon\iota\ \eta\pi\epsilon\rho\ \tau\acute{o}\ \delta\alpha\pi\acute{o}\ \text{ΑΗ}\ \pi\rho\acute{o}\varsigma$
 $\tau\acute{o}\ \delta\alpha\pi\acute{o}\ \text{ΗΔ}.\ \gamma\epsilon\upsilon\acute{\epsilon}\sigma\theta\omega\ \acute{\omega}\varsigma\ \tau\acute{o}\ \delta\alpha\pi\acute{o}\ \text{ΑΗ}\ \pi\rho\acute{o}\varsigma\ \tau\acute{o}$
 $\delta\alpha\pi\acute{o}\ \text{ΗΔ}\ \acute{\epsilon}\tau\omega\varsigma\ \eta\ \text{ΑΚ}\ \pi\rho\acute{o}\varsigma\ \text{ΚΔ},\ \kappa\alpha\iota\ \epsilon\pi\epsilon\zeta\epsilon\upsilon\chi\theta\omega$
 $\eta\ \text{ΗΚ}.\ \kappa\acute{\alpha}\theta\eta\tau\epsilon\iota\ \acute{\alpha}\rho\alpha\ \epsilon\sigma\tau\iota\ \kappa\epsilon\ \text{ΗΚ}\ \delta\theta\eta\iota\ \tau\acute{\iota}\omega\ \text{ΑΔ},$
 $\acute{\omega}\varsigma\ \delta\epsilon\iota\chi\theta\eta\iota\sigma\epsilon\iota).$

Καὶ ἐπεὶ ὑποκείται ἡ ΑΒ τῆς ΒΔ ἐκ ἐλάτιων, ἥτοι μείζων ἔσται ἡ ΑΒ τῆς ΒΔ, ἢ ἴση. ἔσω πρό-
τερον μείζων· μείζων ἄρα καὶ ἡ ΑΘ τῆς ΘΔ. πε-
τμήσω ἡ ΑΔ διχα κατὰ τὸ Α. ἐπεὶ ἐν τῷ μὲν
ὑπὸ ΑΘ, ΘΔ τῆ δὲ ὑπὸ ΑΛ ἐλατίον ἐστὶ τῷ ὑπὸ
ΛΘ, τὸ δὲ ὑπὸ ΑΚ, ΚΔ τῆ δὲ ὑπὸ ΑΛ ἐλατίον
ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΛΚ, καὶ ἐστὶ μείζων τὸ ὑπὸ ΛΚ τῆ
ὑπὸ ΛΘ· μείζων ἄρα τὸ ὑπὸ ΑΘ, ΘΔ, τετάρτοι
τὸ ὑπὸ ΒΘ, τῆ δὲ ὑπὸ ΑΚ, ΚΔ, τετάρτοι τῆ δὲ ὑπὸ
ΗΚ· ἡ ΘΒ ἄρα μείζων τῆς ΗΚ. καὶ εἰσιν αἱ

$\text{duæ } \odot B, BH \text{ duabus } EH, HB \text{ æquales sunt, \&}$
 $\text{angulus } EHB \text{ æqualis angulo } H\odot B, \text{ nam uter-}$
 $\text{que rectus: basis igitur } EB \text{ basi } \odot H \text{ est æqua-}$
 $\text{lis, \& triangulum triangulo simile: quare ut}$
 $BE \text{ ad } EH \text{ ita } H\odot \text{ ad } \odot B. \text{ sed } H\odot \text{ ad } \odot B \text{ ma-}$
 $\text{jorem rationem habet quam } HA \text{ ad } AB, \text{ ut pro-}$
 $\text{xime [per 2.huj.] demonstravimus; orthogonium}$
 $\text{enim triangulum est } ABH: \text{ ergo } BE \text{ ad } EH, \text{ hoc}$
 $\text{est } \Gamma B \text{ ad } EH, \text{ hoc est } \Gamma \Delta \text{ ad } EZ, \text{ majorem ratio-}$
 $\text{nem habet quam } HA \text{ ad } AB: \text{ rectangulum igitur}$
 $\text{quod fit sub } \Gamma \Delta, BA \text{ majus est eo quod sub } EZ,$
 $HA, \text{ per primum theorema. sed rectanguli qui-}$
 $\text{dem sub } \Gamma \Delta, BA \text{ dimidium est } A\Gamma \Delta \text{ triangulum;}$
 $\text{rectanguli vero sub } EZ, HA \text{ dimidium est trian-}$
 $\text{gulum } BAZ: \text{ quare triangulum } A\Gamma \Delta \text{ majus est}$
 $\text{triangulo } AEZ, \& \text{ majus aliis omnibus quæ ba-}$
 $\text{ses habent æquales basi } EZ, \text{ ac proinde inter se}$
 $\text{æqualia sunt. pari modo demonstrabitur, \& in}$
 $\text{aliis sectionibus quæ extra axem fiunt: triangu-}$
 $\text{lum igitur per axem omnium maximum erit.}$

PROP. VI. *Theor.*


Licet idem aliter & universalius demon-
strare, quòd simpliciter in his trian-
gulis, quod majorem basim habet il-
lud majus est.

SECTO namque cono, fiant triangula $\text{A}\Gamma\Delta$, $\text{AZ}\Delta$, ita ut bases $\Gamma\Delta$, $\text{Z}\Delta$ inter se ad terminum Δ conveniant; & fit $\Gamma\Delta$ major ipsa $\text{Z}\Delta$; five per centrum transeat, five non: dico triangulum $\text{A}\Gamma\Delta$ majus esse triangulo $\text{AZ}\Delta$.

Ducantur enim ad $Z\Delta$, $\Gamma\Delta$ perpendiculares AB , AH ; & ad $A\Delta$ ducatur $B\Theta$ perpendicularis. itaque quoniam $\Gamma\Delta$ major est ipsa $Z\Delta$; erit ejus dimidia $B\Delta$ major quam ΔH ; ergo quadratum ex $B\Delta$ quadrato ex ΔH majus erit; & propterea reliquum quadratum ex BA minus quadrato ex AH : quadratum igitur ex AB ad quadratum ex $B\Delta$ minorem rationem habet quam quadratum ex AH ad quadratum ex $H\Delta$. sed ut quadra-

tum ex AB ad quadratum ex BD ita est $A\Theta$ ad $\Theta\Delta$: ergo $A\Theta$ ad $\Theta\Delta$ minorem habet rationem quam quadratum ex AH ad quadratum ex $H\Delta$. fiat ut quadratum ex AH ad quadratum ex $H\Delta$ ita AK ad $K\Delta$, & jungatur HK ; quæ ad $A\Delta$ perpendicularis erit, uti mox demonstrabitur.

Quoniam igitur ponimus AB non minorem ipsâ $B\Delta$, erit AB vel major quam $B\Delta$, vel ipsi æqualis. sit primum major; ergo $A\Theta$ major est quam $\Theta\Delta$. secetur $A\Delta$ bifariam in Λ . & quoniam [per 5. 2.] rectangulum $A\Theta\Delta$ minus est quam quadratum ex $A\Lambda$ quadrato ex $\Lambda\Theta$; rectangulum vero $AK\Delta$ minus quam quadratum ex $A\Lambda$ quadrato ex ΛK , & majus est quadratum ex ΛK quadrato ex $\Lambda\Theta$; erit rectangulum $A\Theta\Delta$, hoc est quadratum ex $B\Theta$, majus rectangulo $AK\Delta$, hoc est quadrato ex HK : recta igitur ΘB major est




est recta HK. suntque BΘ, HK altitudines triangulorum ABΔ, AHΔ: quare triangulum ABΔ majus est triangulo AHΔ, ut & eorundem dupla, videlicet triangulum AΓΔ majus triangulo AZΔ. sed ipsi AZΔ æquale est aliud omne basim habens ipsi ZΔ æqualem: triangulum igitur AΓΔ majus est quolibet triangulo, cujus basis est æqualis ipsi ZΔ.

Quod si AB sit æqualis ipsi BΔ, erit & AΘ ipsi ΘΔ æqualis: & similiter rectangulum AΘΔ, hoc est quadratum ex BΘ, majus erit rectangulo AKΔ, hoc est quadrato ex HK: proptereaque recta BΘ major quam HK, & triangulum ABΔ triangulo AHΔ majus. eodem modo demonstrabitur etiam, si alias bases duxerimus: quare triangulum majorem habens basim triangulo minorem habente majus erit.

At vero rectam HK ad AΔ perpendicularem esse, hoc modo ostendetur.

Sit triangulum orthogonium AHΔ rectum habens angulum ad H, & à puncto H ad basim ducatur HK, ita ut quam rationem habet quadratum ex AH ad quadratum ex HΔ eandem habeat recta AK ad KΔ: dico HK ad AΔ perpendicularem esse.

Si enim non ita sit, fit HΛ perpendicularis: ut igitur quadratum ex HA ad quadratum ex HΔ ita AΛ ad ΛΔ, erat autem ut quadratum ex AH ad quadratum ex HΔ ita AK ad KΔ; quare ut AΛ ad ΛΔ ita erit AK ad KΔ, quod est absurdum: igitur HΛ non est perpendicularis. similiter ostendimus neque aliam ullam perpendicularem esse præter ipsam HK: ergo HK ad AΔ perpendicularis erit.




PROP. VII. Theor.

Si in cono recto triangulum per axem majus sit quovis triangulo extra axem constituto: axis conī non minor erit femidiametro.

SIT conus cujus vertex quidem A punctum, axis recta AB; basis autem circulus circa centrum B; & triangulum per axem AΓΔ, quod majus sit omni triangulo extra axem in cono constituto: dico rectam AB femidiametro basis non minorem esse.

Si enim fieri potest, fit minor: & ducatur in circulo recta BE ad ΓΔ perpendicularis. quoniam igitur angulus ABE rectus est, recta quæ puncta A, E conjungit, major est femidiametro BE: quare si à puncto A in angulo ABE aptetur recta linea ipsi femidiametro æqualis, inter puncta B & B



BΘ, HK ὑψή των ABΔ, AHΔ τριγώνων· μείζον ἄρα τὸ ABΔ τῷ AHΔ, ὥς τε καὶ διπλασιασά· τὸ ἄρα AΓΔ τοῦ AZΔ μείζον ἐστίν. ἀλλὰ τῷ AZΔ ἴσον ἑκάστον ἔῃ βάσις ἴση ἐστὶ τῇ ZΔ· τὸ ἄρα AΓΔ παντὸς τριγώνου μείζον ἐστίν, οὗ ἡ βάσις ἴση ἐστὶ τῇ ZΔ.

Εἰ δὲ ἡ AB τῇ BΔ ἴση, ἴση ἄρα ἔῃ ἡ AΘ τῇ ΘΔ· ὁμοίως ἄρα τὸ ὑπὸ AΘ, ΘΔ, τριπλάσιον τὸ διπλὸν BΘ, μείζον ἐστὶ τῷ ὑπὸ AK, KΔ, τριπλάσιον τῷ διπλῷ HK· ἡ ἄρα BΘ μείζων ἐστὶ τῆς HK, καὶ τὸ ABΔ τριγώνον τῷ AHΔ τριγώνου μείζον. ὁμοίως δὲ δεῖξαι ἔτι, καὶ ἄλλας βάσεις διαράγωμεν· ὥς τε τὸ ἔσως ἔχον μείζονα βάσιν τριγώνον μείζον ἐστὶ τῷ ἔχοντος ἐλάσσονα.

Οτι δὲ ἡ HK κάθετός ἐστι πρὸς τὴν AΔ, δεικνύται ἔσως.

Τριγώνον γὰρ ὀρθογώνιον τῷ AHΔ, ὀρθὸν ἔχοντος πρὸς τὸ H γωνίαν, διηρήσθω ἡ AΔ βάσις ὑπὸ τῆς HK, ὥς τε εἶναι ὡς τὸ διπλὸν AH πρὸς τὸ διπλὸν HΔ ἔσως ἡ AK πρὸς KΔ· λέγω ὅτι κάθετός ἐστιν ἡ HK πρὸς τὴν AΔ.

Εἰ γὰρ μὴ, ἔστω ἡ HΛ κάθετός· ὥς ἄρα τὸ διπλὸν HA πρὸς τὸ διπλὸν HΔ ἔσως ἡ AΛ πρὸς τὴν ΛΔ. ὡς δὲ ὡς τὸ διπλὸν AH πρὸς τὸ διπλὸν HΔ ἔσως ἡ AK πρὸς KΔ· ἔσται ἄρα ὡς ἡ AΛ πρὸς ΛΔ ἔσως ἡ AK πρὸς KΔ, ὅπερ ἄπορον· οὐκ ἄρα κάθετός ἐστιν ἡ HΛ. ὁμοίως δὲ δεῖκνυται ὅτι ἐστὶ ἄλλη τις πλὴν τῆς HK· ἡ ἄρα HK κάθετός ἐστιν πρὸς τὴν AΔ.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Ζ'.

Εὰν ἐν κώνῳ ὀρθῷ τὸ διὰ τῆς ἄξονος τριγώνον μέγιστον ἢ πάντων τῶν ἐκτὸς τῆς ἄξονος συνισταμένων τριγώνων· ὁ ἄξων ἔκ κώνου ἔκ ἐλάσσων ἔσται τῷ ἐκ τῆς κέντρης τῆς βάσεως.

ΕΣΤΩ κώνος, ὃς κορυφὴν μὲν τὸ A, ἄξων δὲ ἡ AB εὐθεῖα, βάσις δὲ ὁ κύκλος τὸ B κέντρον κύκλος, τὸ δὲ διὰ τῆς ἄξονος τριγώνον τὸ AΓΔ, μέγιστον ὃν πάντων τῶν ἐν τῷ κώνῳ συνισταμένων τριγώνων ἐκτὸς ἄξονος· λέγω ὅτι ἡ AB ἐκ ἐστὶν ἐλάττω τῶν ἐκ τῆς κέντρης.

Εἰ γὰρ διωμάτῳ ἐσὼ ἐλάττω, καὶ ἤχθω ἐν τῷ κύκλῳ πρὸς ὀρθὰς τῇ ΓΔ ἡ BE. ἔπειτα ἡ ὑπὸ ABE γωνία ὀρθή ἐστιν, ἡ ἄρα τὰ A, E σημεία πρὸς ἀλλήλους εὐθεῖα μείζων ἐστὶ τῷ ἐκ τῆς κέντρης τῆς BE· εἰ ἄρα ἴση τῇ ἐκ τῆς κέντρης ἀπὸ τῆς A ὑπὸ τὴν ABE γωνίαν συναρμολογῇ, μεταξὺ πεσεῖται τῶν B καὶ E σημείων.

SECTO enim cono fiant triacula, per axem quidem $\Lambda\Gamma\Delta$, extra axem vero $\Lambda\text{E}\text{Z}$, quod triangulo $\Lambda\Gamma\Delta$ sit æquale; sitque EZ ipsi $\Gamma\Delta$ parallela, & ducantur ΛB , ΛH perpendiculares, & jungantur BE , BH : dico axem ΛB semidiametro $\text{B}\Delta$ minorem esse.

Quoniam enim $\Lambda\text{E}\text{Z}$ triangulum æquale est triangulo $\Lambda\Gamma\Delta$; & eorundem dupla æqualia erunt, videlicet rectangulum sub EZ & $\text{H}\Lambda$ æquale rectangulo sub $\Gamma\Delta$ & $\text{B}\Lambda$: ergo [per 14.6.] ut $\Gamma\Delta$ ad BZ , hoc est ΓB ad BH [five BE ad BH] ita $\text{H}\Lambda$ ad ΛB . quoniam igitur duo triacula BEH , $\text{H}\Lambda\text{B}$ unum angulum EHB uni angulo $\Lambda\text{B}\text{H}$ æqualem habent; (est enim uterque rectus) circa alios autem angulos latera sunt proportionalia, estque reliquorum BBH , $\Lambda\text{H}\text{B}$ uterque recto minor; triacula inter se similia erunt: ut igitur BH ad HB ita ΛB ad HB ; quare ΛB ipsi BH est æqualis. sed BH minor est semidiametro BB ; ergo ΛB coni axis semidiametro minor erit. quod erat demonstrandum.

Corollarium.


Quod autem demonstratum est in lineis parallelis $\Gamma\Delta$, EZ ; constabit etiam si non fuerint parallelæ: quippe cum [per 3.huj.] ostensum sit triacula bases æquales habentia inter se æqualia esse.

PROP. X. Theor.

Isdem manentibus, demonstrandum est, si rursus planum ducatur conum per verticem secans, faciensque in basi rectam lineam, cujus magnitudo media sit inter bases æqualium triangulorum; triangulum illud utrisque triangulis æqualibus majus esse.

SIT, ut in antecedenti figura, triangulum per axem $\Lambda\Gamma\Delta$ æquale triangulo basim habenti EZ ; & ducatur quælibet recta linea KM , cujus magnitudo sit inter $\Gamma\Delta$, EZ ; ponatur autem utrique earum parallela, & per ipsam & verticem planum ducatur: dico triangulum $\Lambda\text{K}\text{M}$ utroque ipsorum $\Lambda\Gamma\Delta$, $\Lambda\text{E}\text{Z}$ majus esse.

Secetur enim rursus KM bifariam in Λ , & jungantur $\Lambda\Lambda$, BK , $\text{B}\Lambda$. itaque quoniam $\Lambda\Gamma\Delta$ triangulum æquale est triangulo $\Lambda\text{E}\text{Z}$: erit ΛB ipsi EH , hoc est dimidiæ ipsius EZ , æqualis, ut proxime demonstratum fuit. sed $\text{K}\Lambda$ est major quam EH : ergo & $\text{K}\Lambda$ ipsa ΛB major erit. ponatur BN æqualis ipsi $\text{K}\Lambda$,



TMHΘENTOS γὰρ τριγώνω, γένεσθαι τριγώνω, ἂν μὲν τὸ ἄξονος τὸ $\Lambda\Gamma\Delta$, ἐκπὸς δὲ τὸ $\Lambda\text{E}\text{Z}$, ἴσων ὃν τῷ $\Lambda\Gamma\Delta$, ἔστω δὲ ὁ ὁριζήσας ἡ EZ τῇ $\Gamma\Delta$, καὶ κείνηται αἱ ΛB , ΛH , καὶ ἐπιζεύχθωσαν αἱ BE , BH . λέγω δὲ ὅτι ἡ ΛB ὁ ἄξων ἑλάσσων ἐστὶ τῆς $\text{B}\Delta$ τῆς ὅκιν κέντρου.

Ἐπεὶ ὅν τὸ $\Lambda\text{E}\text{Z}$ τριγώνον ἴσων ἐστὶ τῷ $\Lambda\Gamma\Delta$, καὶ τὰ διπλασία ἄρα ἴσων, τετάρτη τὸ ὑπὸ τῷ EZ , $\text{H}\Lambda$ ἴσων ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῷ $\Gamma\Delta$, $\text{B}\Lambda$. ὡς ἄρα ἡ $\Gamma\Delta$ πρὸς EZ , τετάρτη ἡ ΓB πρὸς $\Delta\text{E}\text{H}$, ἔτι καὶ ἡ $\text{H}\Lambda$ πρὸς ΛB . ἔπει ἐν δύο τριγώνω τὰ BEH , $\text{H}\Lambda\text{B}$ μίαν γωνίαν τὴν ὑπὸ EHB μίαν γωνίαν τῇ ὑπὸ $\Lambda\text{B}\text{H}$ ἴσων ἔχον, (ὁρθὴ γὰρ ἑκατέρω) ὡς δὲ ἄλλας γωνίας τὰς BEH , $\text{H}\Lambda\text{B}$ τὰς πλεονεξίας ἀνάλογον, ἑκατέρω δὲ τῷ λοιπῷ τῷ ὑπὸ EBH , $\Lambda\text{H}\text{B}$ ἐλάττω ἐστὶν ὁρθῆς· ὁμοίως ἄρα ἐστὶ τὰ τρίγωνα· ὡς ἄρα ἡ EH πρὸς HB ἔτι καὶ ἡ ΛB πρὸς HB . ἴση ἄρα ἡ ΛB τῇ EH . ἐλάττω δὲ ἡ EH τῇ ὅκιν κέντρου τῇ BE . καὶ ἡ ΛB ἄρα, ἄξων ὅκιν κέντρου, ἐλάττω ἐστὶ τῆς ὅκιν κέντρου. ὁ ὁριζήσας δὲ ὁ EZ .

Πόρισμα.

Ἐπεὶ πίνυν ἐδείχθη ὅτι ὁριζήσας τῶν $\Gamma\Delta$, EZ , φανερόν ὡς, καὶ μὴ ὁριζήσας ὄντων, ἐδὲν δαίσει· ἐδείχθη γὰρ ὡς τὰ ἴσων ἔχοντα βάσεις τριγώνων ἴσων ἐστὶ.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Ι.

Τῶν αὐτῶν ὄντων, δευτέρως ὅτι ἐὰν διαχθῇ πάλιν ὁπίπτοντι τέμνει τὸ κέντρον ἂν καὶ καμψῆς, καὶ πάλιν ἐὰν τῇ βάσει ἐνδύσῃ καὶ μεγάλῃ μεταξὺ τῆς βάσεων τῇ ἴσων τετραγώνω· ἐκείνο τὸ τετράγωνον μείζον ἔσται ἑκατέρω τῇ ἴσων τετραγώνω.

ΕΣΤΩ γὰρ, ὅτι τὸ ὁμοίως καταγεγραμμένον, τὸ διὰ τῷ ἄξονος τριγώνον τὸ $\Lambda\Gamma\Delta$ ἴσων τῷ βάσει ἔχοντι τῷ EZ , καὶ διήχθω τοχῶσαι ἡ KM μερῶς μεταξὺ τῶν $\Gamma\Delta$, EZ , καὶ ἑκατέρω αὐτῶν κείσθω περὶ ἑαυτὴν, ἐδείχθη τὸ ὁπίπτον· λέγω δὲ ὅτι τὸ $\Lambda\text{K}\text{M}$ τρίγωνον μείζον ἐστὶν ἑκατέρω τῶν $\Lambda\Gamma\Delta$, $\Lambda\text{E}\text{Z}$.

Τετραγώνω γὰρ πάλιν δὲ καὶ ἡ KM τῷ Λ , καὶ ἐπιζεύχθωσαν αἱ $\Lambda\Lambda$, BK , $\text{B}\Lambda$. ἐπεὶ ὅν ἴσων ἐστὶ τὸ $\Lambda\Gamma\Delta$ τρίγωνον τῷ $\Lambda\text{E}\text{Z}$ τριγώνω, ἡ ἄρα ΛB τῇ EH τῇ ἡμισείᾳ τῇ EZ ἴση ἐστὶν, ὡς ἐν τῷ πρὸ τούτου συνεπιδείχθη. μείζων δὲ ἡ $\text{K}\Lambda$ τῇ EH , καὶ τῇ ΛB ἄρα μείζων ἐστὶν ἡ $\text{K}\Lambda$. κείσθω δὲ τῇ $\text{K}\Lambda$ ἴση ἡ BN

BN

ΒΝ, καὶ ἐπιζεύχθω ἡ ΑΝ· Ἀλλὰ τὰ αὐτὰ δὴ τοῖς
περιγεγραμμένοις ἔσται τὸ ΒΚΛ τρίγωνον τῷ ΑΝΒ
τρίγωνῳ ἴσον τε καὶ ὅμοιον· ὥς ἂν ἡ ΒΚ πρὸς ΚΛ,
τὰύτως ἡ ΓΒ πρὸς ΚΛ, τὰύτως ἡ ΓΔ πρὸς
ΚΜ, ὥτως ἡ ΑΝ πρὸς ΝΒ. ἡ δὲ ΑΝ πρὸς ΝΒ
ἐλάττω λόγον ἔχει ἢ περὶ ἡ ΑΑ πρὸς ΑΒ· τὸ ἄρα
ὑπὸ τῶν ΓΔ, ΒΑ ἐλάττω ἔστι τῶν ὑπὸ τῶν ΚΜ,
ΑΑ, τὰύτως τὸ ΑΓΔ τρίγωνον ἐλάττω ἔστι τῶν ΑΚΜ
τρίγωνων· μείζον ἄρα τὸ ΑΚΜ τῶν ΑΓΔ καὶ
τῶν ΑΕΖ τριγώνων.

Πόρισμα.

Τὸ αὐτὸ δὴ δέκνυται καὶ ὅτι πάντων τριγώνων,
ὧν ἡ βάσις μετέξῃ ἐστὶ τῶν ΓΔ καὶ ΕΖ· ἔδεν
γὰρ διοίσει καὶ μὴ ὡς ἀλλήλοισιν αἱ βάσεις, ὥς
καὶ περὶ τὸν ἐδείχθη.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΑ'.

Δοθέντα κώνον ὀρθόν, καὶ ὁ ἄξων ἐλάττω ὥστε ὁ κώνος
κέντρον τῆς βάσεως, τεμεῖν διὰ τῆς κορυφῆς, ὥστε τὸ
γινόμενον τρίγωνον ἴσον εἶναι τῷ διὰ τῆς ἄξωνος
τρίγωνῳ.

ΕΣΤΩ ὁ δοθεὶς κώνος, καὶ ἄξων μὲν ὁ ΑΒ, τὸ δὲ
ἀλλὰ τῆς ἄξωνος τρίγωνον τὸ ΑΓΔ· ἔδεν ἔστω
τεμεῖν τὸν κώνον ὅπως ἐπείδω, ποιῶντι τρίγωνον ἐν τῷ
κῶνῳ ἴσον τῷ ΑΓΔ.

Ἡχθῶ τῇ ΓΔ ἐν τῷ κύκλῳ
πρὸς ὀρθὰς Ἀλλὰ τὰ κέντρον ἡ
ΕΒΖ. καὶ ἐπεὶ ἡ ΑΒ ἐλάττω ἔστι
τῆς ἐκ τῆς κέντρος, ἐνηρμόσθω ἡ
ΑΗ, ὑποτείνουσα μὲν τὴν ὑπὸ
ΑΒΖ γωνίαν, ἵση δὲ εἶναι τῇ ἐκ τῆς
κέντρος, (τὰ τοῦ ἰσάδιον ποιῶντι)
καὶ διὰ τῆς Η ὡς ἀλλήλοισιν τῇ ΓΔ
ἡχθῶ ἡ ΘΗΚ· ἡ ΘΗΚ ἄρα
κατὰ τὸ Η δίχα τέμνεται καὶ πρὸς ὀρθὰς τῇ ΕΒΖ.
διεκβεβλήθω τὸ διὰ τῆς ΘΚ, ΗΑ ὅτι πεδον, ποιῶν
τὸ ΑΘΚ τρίγωνον· λέγω ὅτι ἴσον εἶναι τῷ ΑΓΔ.

Επιζεύχθω ἡ ΒΘ. καὶ ἐπεὶ ἵση ἡ ΑΗ τῇ ΒΘ, ὥς
ἂν ἡ ΑΗ πρὸς ΗΒ ὥτως ἡ ΒΘ πρὸς ΗΒ. ἐπεὶ
ἔν δύο τρίγωνοις τὰ ΒΘΗ, ΗΑΒ μίαν γωνίαν μὴ
γωνία ἴσην ἔχει (ὀρθαὶ γὰρ αἱ ὑπὸ ΘΗΒ, ΑΒΗ) πα-
ρα δὲ ἄλλαις γωνίαις τὰς πλάγους ἀνάλογον, τὰς τε
λοιπὰς ὀρθὰς ἐλάττωσιν· ὅμοια ἄρα τὰ ΒΘΗ,
ΗΑΒ τρίγωνα· ὥς ἂν ἡ ΒΘ πρὸς ΘΗ, τὰύτως
ὥς ἡ ΓΔ πρὸς ΘΚ, ὥτως ἡ ΗΑ πρὸς ΑΒ· τὸ ἄρα
ὑπὸ ΓΔ, ΒΑ ἴσον τῷ ὑπὸ ΘΚ, ΗΑ, καὶ τὸ ἡμίσεα
τὸ ΑΓΔ τρίγωνον ἄρα ἴσον εἶναι τῷ ΑΘΚ τριγώνῳ.
ὅπερ εἶδει ποιῶντι.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΒ'.

Εάν κώνος ὀρθὸς διὰ τῆς κορυφῆς ὅπως πεδον τεμνῇ,
τὸ δὲ γινόμενον ἐκ τῶν κῶνων τριγώνων πρὸς ἡ ὑπὸ
τῆς κορυφῆς ὅτι τῆς βάσεως κέντρον ἴση ἢ τῇ ἡμι-

& jungatur ΑΝ, ac eadem ratione qua supra,
demonstrabimus triangulum ΒΚΛ æquale & si-
mile triangulo ΑΝΒ: quare ut ΒΚ ad ΚΛ,
hoc est ut ΓΒ ad ΚΛ, hoc est ΓΔ ad ΚΜ, ita
ΑΝ ad ΝΒ. sed ΑΝ ad ΝΒ minorem ratio-
nem habet quam ΑΑ ad ΑΒ; & propterea
rectangulum sub ΓΔ & ΒΑ minus est rectan-
gulo sub ΚΜ & ΑΑ, hoc est triangulum ΑΓΔ
minus triangulo ΑΚΜ: triangulum igitur ΑΚΜ
& triangulo ΑΓΔ & triangulo ΑΕΖ ma-
jus erit.

Corollarium.

Idem demonstrabitur etiam in omnibus trian-
gulis, quorum bases magnitudine inter ΓΔ, ΕΖ
intermediæ sint, nihil enim differt si bases non
sint parallelæ, ut supra demonstratum fuit.

PROP. XI. Probl.

Datum conum rectum, cujus axis fit
minor semidiametro basis, plano per
verticem ita secare, ut faciat trian-
gulum æquale ei quod per axem con-
stituitur.

SIT datus conus rectus, cujus axis quidem
ΑΒ; triangulum vero per axem ΑΓΔ: &
oporteat eum plano per verticem ita secare,
ut faciat triangulum triangulo ΑΓΔ æquale.


Ducatur in circulo per cen-
trum recta ΕΒΖ ad rectos
angulos ipsi ΓΔ. & quo-
niam ΑΒ minor est semidia-
metro basis, aptetur ΑΗ sub-
tendens angulum ΑΒΖ, quæ
semidiametro fit æqualis (quod
quidem facile effici potest)
deinde per Η ducatur ΘΗΚ
ipsi ΓΔ parallela: ergo [per

3. 3.] ΘΗΚ ad Η bifariam secatur & ad ΕΒΖ
est perpendicularis. ducatur juxta rectas ΘΚ,
ΗΑ planum triangulum ΑΘΚ efficiens: dico
ΑΘΚ triangulo ΑΓΔ æquale esse.

Jungatur enim ΒΘ, & quoniam ΑΗ est æqua-
lis ipsi ΒΘ, erit ut ΑΗ ad ΗΒ ita ΒΘ ad ΒΗ:
quod cum duo triangula ΒΘΗ, ΗΑΒ unum an-
gulum uni angulo æqualem habeant (sunt enim
ΘΗΒ, ΑΒΗ utrique recti) & circa alios angulos
latera proportionalia sint, reliquorum vero uter-
quo recto minor; erunt ΒΘΗ, ΗΑΒ triangula
inter se similia: quare ut ΒΘ ad ΘΗ, hoc est
ΓΔ ad ΘΚ, ita ΗΑ ad ΑΒ: & idcirco rectan-
gulum quod fit sub ΓΔ & ΒΑ æquale est re-
ctangulo sub ΘΚ & ΗΑ; proinde eorum di-
midia, videlicet triangulum ΑΓΔ æquale erit
triangulo ΑΘΚ. quod erat faciendum.

PROP. XII. Theor.


Si conus rectus planis per verticem se-
cetur, & in uno triangulorum sectio-
ne factorum recta à vertice ad ba-
sim perpendicularis ducta æqualis fit
dimidiæ



dimidiæ basis: erit illud triangulum majus omnibus triangulis diffimilibus in cono constitutis.

SIT in cono recto triangulum $\Lambda\Gamma\Delta$, quod perpendicularem AB æqualem habeat ipsi $B\Delta$ dimidiæ $\Gamma\Delta$ basis: dico $\Lambda\Gamma\Delta$ triangulum majus esse omnibus triangulis diffimilibus quæ in cono constituntur.

Sumatur enim aliud quodvis triangulum ΛEZ ipsi diffimile, in quo sit perpendicularis AH ; & à puncto quidem B ad $\Lambda\Delta$ perpendicularis ducatur $B\Theta$; à puncto autem H ad AZ itidem ducatur perpendicularis HK . quoniam igitur triangulum $\Lambda\Gamma\Delta$ diffimile est triangulo ΛEZ , & $\Lambda B\Delta$ ipsi ΛHZ diffimile erit. sunt autem orthogonia, & æquicure est $\Lambda B\Delta$: ergo ΛHZ non est æquicure; & quadratum quidem ex AB æquale est quadrato ex $B\Delta$, quadratum vero ex AH quadrato ex HZ non est æquale. ut autem quadratum ex AB ad quadratum ex $B\Delta$ ita recta $\Lambda\Theta$ ad $\Theta\Delta$; & ut quadratum ex AH ad quadratum ex HZ ita ΛK ad KZ : recta igitur $\Lambda\Delta$ in partes æquales dividitur, ΛZ vero in partes inæquales. itaque quoniam id quod sub æqualibus partibus continetur majus est contento sub partibus inæqualibus; erit $\Lambda\Theta\Delta$ rectangulum majus rectangulo ΛKZ . fed rectangulo $\Lambda\Theta\Delta$ æquale est quadratum ex $B\Theta$; & rectangulo ΛKZ æquale quadratum ex HK : quadratum igitur ex $B\Theta$ quadrato ex HK majus erit; idcircoque linea $B\Theta$ major quam HK . ut autem $B\Theta$ ad HK ita rectangulum sub $B\Theta$, $\Lambda\Delta$ ad rectangulum sub HK , ΛZ ; & ita dimidium ad dimidium, hoc est triangulum $\Lambda B\Delta$ ad triangulum ΛHZ : majus igitur est $\Lambda B\Delta$ triangulum triangulo ΛHZ , & eorundem dupla, videlicet triangulum $\Lambda\Gamma\Delta$ majus triangulo ΛEZ . similiter ostendetur $\Lambda\Gamma\Delta$ majus esse omnibus triangulis ipsi diffimilibus. quod erat demonstrandum.



οὐκ ἔστι βάσις· τὸ μᾶλλον ἔστι πάντων τῶν ἐπιμέτρων ἐν τῷ κώνῳ τετραγώνων.

EN ᾧ κώνῳ ὁρθῶν τριγώνων ἔστω τὸ $\Lambda\Gamma\Delta$, ἔχον $\tauὴν AB$ κάθετον ἰσὴν τῇ $B\Delta$, ἡμισεία ἔσθι $\tauὴν \Gamma\Delta$ βάσις· λέγω ὅτι τὸ $\Lambda\Gamma\Delta$ τρίγωνον μείζον ἐστὶ πάντων τῶν ἀνομοίων ἐν τῷ κώνῳ συνεσταμένων τετραγώνων.

Εἰλήφθω γὰρ ἄλλο τυχὸν τρίγωνον ἀνόμοιον αὐτῷ τῷ ΛEZ , ἐν ᾧ κάθετος ἡ AH . καὶ δοτὶ μὲν $\tauὴν B\Delta$ κάθετος ἡχθῶ ἡ $B\Theta$, δοτὶ δὲ $\tauὴν HZ$ κάθετος ἡχθῶ ἡ HK . ἐπεὶ γὰρ ἀνόμοιον ἐστὶ τὸ $\Lambda\Gamma\Delta$ τῷ ΛEZ , ἀνόμοιον ἄρα καὶ τὸ $\Lambda B\Delta$ τῷ ΛHZ . ἔστιν ὁρθογώνια, ἔστις κελεύς τὸ $\Lambda B\Delta$. τὸ ΛHZ ἄρα ἀνισοσκελές· καὶ τὸ μὲν ἄρα δοτὶ $\tauὴν AB$ ἰσὴν ἐστὶ τῷ δοτὶ $\tauὴν B\Delta$, τὸ δὲ δοτὶ $\tauὴν AH$ τῷ δοτὶ $\tauὴν HZ$ ἀνισόν. ἀλλ' ὡς μὲν τὸ ἀπὸ $\tauὴν AB$ πρὸς τὸ ἀπὸ $\tauὴν B\Delta$ ὥτως ἡ $\Lambda\Theta$ πρὸς $\Theta\Delta$, ὡς δὲ τὸ ἀπὸ ΛH πρὸς τὸ ἀπὸ HZ ὥτως ἡ ΛK πρὸς KZ . ἡ μὲν ἄρα $\Lambda\Delta$ εἰς ἰσὰ τέμνεται, ἡ δὲ ΛZ εἰς ἀνισα. ἐπεὶ γὰρ αἱ $\Delta\Lambda$, ΔZ ἰσῆς εἰσὶ, καὶ ἡ μὲν εἰς ἰσὰ διήρηται, ἡ δὲ εἰς ἀνισα,

τὸ ὑπὸ τῶν ἰσῶν τμημάτων τὸ ὑπὸ τῶν ἀνισῶν μείζον ἐστὶ· τὸ ἄρα ὑπὸ $\Lambda\Theta\Delta$ μείζον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΛKZ . ἀλλὰ τῷ μὲν ὑπὸ $\Lambda\Theta\Delta$ ἰσὴν ἐστὶ τὸ ἀπὸ $B\Theta$, τὸ δὲ ὑπὸ ΛKZ ἰσὴν τῷ ἀπὸ HK . μείζον ἄρα τὸ ἀπὸ $B\Theta$ τῷ ἀπὸ HK . μείζων ἄρα καὶ ἡ $B\Theta$ τῆς HK . ὡς δὲ ἡ $B\Theta$ πρὸς HK ὥτως τό τε ὑπὸ $B\Theta$, $\Lambda\Delta$ πρὸς τὸ ὑπὸ HK , ΛZ , καὶ τὸ ἡμῶν πρὸς τὸ ἡμῶν, ταῦτε τὸ $\Lambda B\Delta$ τρίγωνον πρὸς τὸ ΛHZ . μείζον ἄρα τὸ $\Lambda B\Delta$ τῷ ΛHZ , καὶ πάλιν διπλασιασὰ τὸ $\Lambda\Gamma\Delta$ τῷ ΛEZ . ὁμοίως δὲ δεικνύται ὅτι πάντων τῶν ἀνομοίων μείζον ἐστὶ τὸ $\Lambda\Gamma\Delta$. ὅπερ εἶδει δεῖξαι.

PROP. XIII. Probl.

Datum conum rectum, cujus axis sit minor semidiametro basis, plano per verticem ita secare, ut faciat triangulum majus omnibus triangulis diffimilibus in cono constitutis.

SIT datus conus rectus, cujus vertex quidem A punctum; basis circulus circa centrum B , axis vero AB minor semidiametro basis: & oporteat conum juxta præscriptum secare.

Ducatur planum per axem quod faciat triangulum $\Lambda\Gamma\Delta$, & erit AB perpendicularis & minor quam $B\Delta$. deinde in plano circuli ducatur BE ad rectos angulos ipsi GB ; & quo quadratum ex ΔB superat quadratum ex BA , ejus dimidium sit quadratum ex BH ; perque

ΠΡΟΤΑΣΙΣ γ'.

Τὸν δοθέντα κώνον ὁρθόν, ὃς ἂν ἔσται ἐλάττω ὅσον ἢ ἐκ τῆς κέντρης τῆς βάσεως, τεμνὲν διὰ τῆς κορυφῆς ὅταν πλάτος, ὅταν τὸ γινώσκον τετραγώνον μείζον ἐστὶ πάντων τῶν ἀνομοίων αὐτῷ ἐν τῷ κώνῳ γινωσκόμενων τετραγώνων.

EΣΤΩ ὁ δοθεὶς κώνος ὁρθός, ὃς κορυφὴ μὲν τὸ A , βάσις δὲ ὁ κύκλος τὸ B κέντρον κύκλος, ἔστω δὲ ὁ AB , ἐλάττω ὢν τῆς BA κέντρης τῆς βάσεως· ἔστω δὲ ἐν τῷ κώνῳ πλάτος ὡς περιπίπτει.

Ἡχθῶ τὸ διὰ τῆς κορυφῆς διήκονον, πλάτος τὸ $\Lambda\Gamma\Delta$ τρίγωνον· ἡ AB ἄρα κάθετος ἐλάττω ἐστὶ τῇ $B\Delta$. ἡχθῶ ἐν τῷ κύκλῳ διήκονον τῇ GB πρὸς ὁρθὰς ἡ BE · καὶ ὡς μείζον ἐστὶ τὸ ἀπὸ $\tauὴν \Delta B$ τῷ ἀπὸ $\tauὴν BA$, ταῦτε ἡμῶν ὅταν τὸ ἀπὸ τῆς BH καὶ διὰ τῆς H παράλ-


DE SECTIONE CONI.

45

Η ὁμοειδὴς ἡχθω τῇ ΓΔ ἢ ΖΗΘ, καὶ ἐπεζεύ-
χθωσαν αἱ ΑΗ, ΒΘ.

H ducatur ZHΘ parallela ipsi ΓΔ; & jungantur
AH, BΘ.

Ἐπεὶ ἔν τῳ δὲ ΒΔ, τὰ πρὸς
τὸ δὲ ΒΘ, τὰ δὲ ΒΑ μεί-
ζον ἐστὶ δύο τοῖς ἀπὸ ΒΗ, τὸ
δὲ ἀπὸ ΑΗ τὰ δὲ ΑΒ μεί-
ζον ἐστὶ ἐν τῳ δὲ ΒΗ. τὸ
ἀρα ἀπὸ ΒΘ τὰ ἀπὸ ΑΗ μεί-
ζον ἐστὶ τῳ ἀπὸ ΒΗ. ἐστὶ δὲ καὶ
τὰ ἀπὸ ΗΘ τῳ ἀπὸ ΒΗ μεί-
ζον τὸ ἀπὸ ΒΘ. ἑκατέρωθεν
τῶν ἀπὸ ΑΗ, ΗΘ τῳ αὐτῷ ὑπερέχει τὸ ἀπὸ ΒΘ.
ἴσων ἄρα τὸ ἀπὸ ΑΗ τῳ ἀπὸ ΗΘ, καὶ ἡ ΑΗ τῇ
ΗΘ ἴση. καὶ ἐστὶ καὶ ἡ ΖΗ τῇ ΗΘ ἴση. ἡ ἄρα ΑΗ
ἴση ἐστὶ τῇ ἡμισείᾳ τῆς ΖΘ. εἰάν ἄρα διὰ τῶν ΖΘ,
ΗΑ διεκβάλωμεν ὀπίπεδον, ἔστω τρίγωνον ἐν τῳ
κῶνῳ. γενητέω τὸ ΑΖΘ. ἐπεὶ ἔν τριγώνῳ ἐστὶν
ἐν κῶνῳ τὸ ΑΖΘ, ἡ ἀπὸ τῆς κορυφῆς κάθετος ἡ
ΑΗ ἴση ἐστὶ τῇ ἡμισείᾳ τῆς βάσεως. τὸ ΑΖΘ ἄρα
μείζον ἐστὶ πάντων τῶν ἐν τῳ κῶνῳ γινόμενων τρι-
γώνων ἀνομοίων αὐτῷ. ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.



Quoniam quadratum ex ΒΔ,
hoc est ex ΒΘ, superat qua-
dratum ex ΒΑ duobus quadra-
tis ex ΒΗ, quadratum autem
ex ΑΗ superat quadratum ex
ΑΒ uno quadrato ex ΒΗ: ergo
quadratum ex ΒΘ superat
quadratum ex ΑΗ ipsius ΒΗ
quadrato. sed quadratum ex
ΒΘ superat quadratum ex ΗΘ
quadrato ex ΒΗ; quadratum

igitur ex ΒΘ utrumque quadratum ex ΑΗ & ex
ΗΘ eodem quadrato superat: adeoque quadra-
tum ex ΑΗ æquale est quadrato ex ΗΘ, & recta
ΑΗ rectæ ΗΘ æqualis. est autem & ΖΗ æqualis
ipsi ΗΘ; quare ΑΗ æqualis est dimidiæ ipsius ΖΘ:
si igitur per ΖΘ, ΗΑ planum ducatur, fiet in
cono triangulum, quod sit ΑΖΘ. itaque quo-
niam triangulum ΑΖΘ est in cono, à cuius ver-
tice ducta perpendicularis ΑΗ æqualis est dimi-
diæ basi: erit [per 12. huj.] ΑΖΘ triangulum
majus omnibus triangulis dissimilibus in ipso co-
no constitutis. quod erat faciendum.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΔ'.

Τὸν δοθέντα κῶνον διὰ τῆς ἀξὸνος ὀπιπέδῳ τεμῶν
πρὸς ὀρθὰς τῇ βάσει.


PROP. XIV. Probl.

Datum conum plano per axem ad re-
ctos angulos ipsi basi secare.

ΕΣΤΩ ὁ δοθείς κῶνος, ὃς κορυφὴ μὲν τὸ Α ση-
μεῖον, βάσις δὲ ὁ κύκλος τὸ Β κέντρον κύκλος, ἀξὸς
δὲ ὁ ΑΒ καὶ δέον ἔστω τὸ κῶνον τεμῶν διὰ τῆς ΑΒ πρὸς
ὀρθὰς τῇ βάσει.

SIT datus conus, cujus vertex A punctum,
basis circulus circa centrum B; axis vero
AB: & oporteat conum secare secundum rectam
AB ad rectos angulos ipsi basi.

Εἰ μὲν ἔν ὀρθὸς ἐστὶν ὁ κῶ-
νος, δῆλον ὅτι ἡ τε ΑΒ πρὸς
ὀρθὰς ἐστὶ τῇ βάσει, καὶ πάντα
τὰ διὰ τῆς ΑΒ ὀπίπεδα ἐκ-
βαλλόμενα πρὸς ὀρθὰς ἐστὶ
τῇ βάσει. ὥστε τὸ ΑΓΔ τρί-
γωνον, διὰ τῆς ΑΒ ὄν, πρὸς
ὀρθὰς ἐστὶ τῇ βάσει.



Si igitur conus sit rectus,
perspicuum est rectam AB
ad basim perpendicularem
esse; & ob id [per 18.
11.] omnia quæ per ipsam
transcunt plana ad rectos
angulos erunt: quare &
triangulum ΑΓΔ per li-
neam AB ductum ad rectos
angulos erit ipsi basi.

Ἀλλὰ δὲ σκαληνὸς ἔστω ὁ
κῶνος. ἡ ἄρα ΑΒ ἐκ ἐστὶ πρὸς
ὀρθὰς τῇ βάσει. πιπτεύω τοί-
νον ἡ ἀπὸ τῆς Α κορυφῆς κά-
θετος ὅτι τὸ τῆς βάσεως ὀπίπεδον, κατὰ τὸ Ε, καὶ
ἐπεζεύχθω ἡ ΒΕ, καὶ διεκβλήθω τὸ τῆς ΑΒΕ τρι-
γώνου ὀπίπεδον, πρὸς ἐν τῳ κῶνῳ τὸ ΑΓΔ τρίγω-
νον. λέγω ὅτι τὸ ΑΓΔ πρὸς ὀρθὰς ἐστὶ τῇ τῆς κῶνῳ
βάσει. ἐπεὶ γὰρ ἡ ΑΕ κάθετος ἐστὶν ὅτι τὸ τῆς βάσεως
ὀπίπεδον καὶ πάντεσσι αἶραι διὰ τῆς ΑΕ ὀπίπεδα ἐκ-
βαλλόμενα πρὸς ὀρθὰς ἐστὶ τῳ τῆς βάσεως ὀπίπεδῳ.
καὶ τὸ ΑΓΔ ἄρα τρίγωνον πρὸς ὀρθὰς ἐστὶ τῳ τῆς βά-
σεως ὀπίπεδῳ. ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.

Sed sit conus scalenus:
ergo AB non est ad basim
perpendicularis. cadat à
vertice A perpendicularis ad
basi planum in puncto E; & junctâ BE, pro-
ducatur trianguli ΑΒΕ planum, quod in cono
sectionem faciat triangulum ΑΓΔ: dico ΑΓΔ
triangulum ad rectos angulos esse basi coni. quo-
niam enim ΑΒ perpendicularis est ad basim pla-
num; & omnia quæ per ipsam ΑΒ transcunt
plana eidem ad rectos angulos erunt: ergo &
triangulum ΑΓΔ ad rectos angulos erit plano
basi. quod erat faciendum.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΕ'.


Εάν κῶνος σκαλιυὸς διὰ τῆς ἀξὸνος ὀπιπέδῳ τμη-
θῇ πρὸς ὀρθὰς τῇ βάσει τὸ γινόμενον τρίγω-

PROP. XV. Theor.

Si conus scalenus plano per axem se-
cetur ad rectos angulos ipsi basi: tri-
angulum

angulum in cono factum scalenum erit, cujus latus majus maxima erit linearum omnium, quæ à vertice coni ad basis circumferentiam ducuntur; & minus latus linearum omnium similiter ductarum minima erit; è reliquis vero, quæ maximæ propinquior est major erit quam quæ ab ipsâ remotior.

SIT conus scalenus, cujus vertex A punctum, basis circulus ΓΕΔ, & axis AB; cono autem secto per axem ad rectos angulos ipsi ΓΕΔ circulo, fiat triangulum ΑΓΔ; & axis ad partes Δ vergat. cum igitur conus scalenus sit, non erit AB perpendicularis ad circulum ΓΕΔ. ducatur ΑΘ ad ipsum perpendicularis, quæ proinde erit in plano trianguli ΑΓΔ, & in rectam ΓΒ productam cadet. itaque quoniam major est ΓΘ quam ΘΔ, & quadratum ex ΓΘ quadrato ex ΘΔ erit majus. commune apponatur quadratum ex ΘΑ: quadrata igitur ex ΓΘ, ΘΑ majora sunt quadratis ΔΘ, ΘΑ, hoc est quadratum ex ΓΑ majus quadrato ex ΑΔ: ergo recta ΑΓ major ipsâ ΑΔ.



Dico ΑΓ maximam esse rectarum omnium quæ à vertice ad basis circumferentiam ducuntur; ΑΔ vero minimam.


Ducantur enim ΘΕ, ΘΖ, ΘΗ, & jungantur ΑΕ, ΑΖ, ΑΗ, itaque quoniam [per 7 & 8.3.] ΓΘ maxima est ex iis quæ à Θ in circumferentiam cadunt; erit quadratum ex ΓΘ majus quadratis ex ΘΕ, ΘΖ, ΘΗ, ΘΔ. commune apponatur quadratum ex ΘΑ; quadrata igitur ex utrisque ΓΘ, ΘΑ facta majora sunt eis quæ fiunt ex ΕΘ, ΘΑ; ΖΘ, ΘΑ; ΗΘ, ΘΑ; hoc est quadratum ex ΑΓ majus est quolibet è quadratis ex ΑΕ, ΑΖ, ΑΗ, ΑΔ: adeoque recta ΑΓ major est qualibet rectarum ΑΕ, ΑΖ, ΑΗ, ΑΔ. similiter demonstrabitur etiam quavis alia majorem esse: igitur ΑΓ, uti diximus, maxima est omnium rectarum, quæ in ipso cono ducuntur. eadem ratione demonstrabitur rectam ΑΔ minimam esse. è cæteris vero ΑΕ major est quam ΑΖ, & ΑΖ major quam ΑΗ; & quæ propinquior est ipsi ΑΓ semper major est quam quæ ab eadem magis distat. quod erat demonstrandum.

PROP. XVI. Theor.

Si in triangulo recta linea ducatur à vertice ad punctum quod basim bi-

νοῖται σκαληνόν, ὃ ἢ μὲν μείζων πλευρὰ μέγιστη ἔσται πασῶν τῶν ἀπὸ τῆς κορυφῆς εἰς κῶνα τὸς τῆς περιφέρειας τῆς βάσεως ἀγομμένων εὐθειῶν, ἢ δὲ ἐλάττω πλευρὰ ἐλαχίστη πασῶν τῶν ὁμοίως ἀγομμένων εὐθειῶν, τῇ δὲ ἄλλων εὐθειῶν ἢ τῇ μεγίστῃ ἔγγιον & ἀπότερον ἔσται μείζων.

ΕΣΤΩ κῶνος σκαληνός, ὃ κορυφὴν μὲν τὸ Α, βάσιν δὲ τὸ ΓΕΔ κύκλος, ἄξονα δὲ τὸ ΑΒ· τῷ δὲ κῶνι τμηθέντος διὰ τῆς ἄξονος πρὸς ὀρθὰς τῷ ΓΕΔ κύκλῳ, τὸ γινόμενον τετράγωνον ἔστω τὸ ΑΓΔ, περσυνέτω δὲ ὁ ἄξων ὅτι τὸ Δ μέρος. ἐπεὶ ἔν, σκαληνὸν ὄντος ὁ κῶνος, ἐκ ἔστιν ἡ ΑΒ πρὸς ὀρθὰς τῷ ΓΕΔ κύκλῳ, ἔστω πρὸς ὀρθὰς αὐτῇ ἡ ΑΘ· ἡ ΑΘ ἄρα ἐν τῷ ΑΓΔ ἐστὶν ὀρθογώνιον, καὶ περσυνέτω ὅτι ΓΒ Δ ἐκβληθείσων. ἐπεὶ ἔν μείζων ἡ ΓΘ τῇ ΘΔ, καὶ τὸ ἀπὸ ΓΘ ἄρα ἔσται ἀπὸ Θ Δ μείζον. κοινὸν περσυνέτω τὸ ἀπὸ Θ Α· τὰ ἄρα ἀπὸ ΓΘ, Θ Α τῷ ἀπὸ ΔΘ, Θ Α μείζονά ἐστι, τετέστι τὸ ἀπὸ Γ Α μείζον ἐστὶ ἔσται ἀπὸ Α Δ· μείζων ἄρα ἡ ΑΓ τῇ Α Δ.



Λέγω δὲ ὅτι ἡ ΑΓ καὶ πασῶν ἀπὸ τοῦ μείζων ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς κορυφῆς ὅτι τῆς περιφέρειας τῆς βάσεως ἀγομμένων εὐθειῶν, ἢ δὲ ἐλάττω.

ΗΧΘωσιν γὰρ αἱ ΘΕ, ΘΖ, ΘΗ, καὶ ἐπερσυνέτωσαν αἱ ΑΕ, ΑΖ, ΑΗ. ἐπεὶ ἔν ἡ ΓΘ μείζων ἐστὶ πασῶν τῶν ἀπὸ Θ ἐπὶ τῆς περιφέρειας περσυνέτωσαν καὶ τὰ ἀπὸ τῆς ΓΘ ἄρα μείζον ἐστὶ τὸ ἀπὸ ΘΕ, ΘΖ, ΘΗ, ΘΔ. κοινὸν περσυνέτω τὸ ἀπὸ Θ Α· συναμφοτέρων ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ΓΘ, Θ Α μείζον ἐστὶν ἐκάστω συναμφοτέρω ἔσται ἀπὸ τῆς ΕΘ, Θ Α· ΖΘ, Θ Α· ΗΘ, Θ Α, τετέστι τὸ ἀπὸ ΑΓ ἐκάστω τῷ ἀπὸ ΑΕ, ΑΖ, ΑΗ, ΑΔ· ὅτι ἡ ΑΓ ἄρα μείζων ἐστὶν ἐκάστω τῶν ΑΕ, ΑΖ, ΑΗ, ΑΔ. ὁμοίως δευχθήσετὶ ὅτι καὶ τῶν ἄλλων μείζων ἄρα ἡ ΑΓ πασῶν τῶν ὡς εἴρη· ἀγομμένων εὐθειῶν ἐν τῷ κῶνι. διὰ τὰ αὐτὰ δευχθήσετὶ ὅτι καὶ ἡ μὲν ΑΔ ἐλάττω τῇ ἄλλων ἢ μὲν ΑΕ τῇ ΑΖ μείζων, ἢ δὲ ΑΖ τῇ ΑΗ, καὶ αἰεὶ ἡ ἔγγιον τῇ ΑΓ τῆς ἀπότερον ἐστὶ μείζων. ὅπερ εἶδει δεῖξαι.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ 15.

Εὰν τετράγωνον ἀπὸ τῆς κορυφῆς ὅτι τῇ διχοτομία τῆς βάσεως εὐθεῖα ἀρχθῇ· τὰ ἀπὸ τῶν πλευρῶν

πλευρῶν τετραγώνων ἴσα ὅτι τοῖς τε ὑπὸ
τῶν τμήματων τῆς βάσεως, καὶ τῶν δις ὑπὸ
τῆς ἡμιμέτης ὑπὸ τῆς κορυφῆς ὅτι τὴν βά-
σιν εὐθείας.




ΕΣΤΩ τετράγωνον τὸ ΑΒΓ, ὃ διχα πημήσθω
ἢ βάσις κατὰ τὸ Δ, καὶ διήχθω ἡ ΑΔ· λέγω
ὅτι τὰ ὑπὸ ΑΒ, ΑΓ τετραγώνων ἴσα εἰσι τοῖς ὑπὸ
τῶν ΒΔ, ΔΓ καὶ τῶν δις ὑπὸ τῆς ΑΔ.

Εἰ μὲν ἐν ἰσοσκελεῖς ἐστὶ τὸ ΑΒΓ τετράγωνον, φαι-
νερὰ ἡ δέξις, διὰ τὸ ἑκατέρωθεν τὸ πρὸς τῷ Δ γίνε-
σθαι ὀρθήν. ἀλλὰ δὲ ἔστω ἡ ΒΑ μείζων· μείζων ἄρα
ἔστω ἡ ὑπὸ ΒΔ Α γωνία τῇ ὑπὸ ΑΔ Γ. ἐκβεβλήσθω
ἡ ΑΔ, καὶ κατήχθωσαν ἐπ' αὐτὴν κάθετοι αἱ ΒΕ,
ΓΖ· ὅμοια ἄρα εἰσι τὰ ΕΒΔ, ΓΖΔ ὀρθογώνια, διὰ
τὸ ἀλλήλους εἶναι τὰς ΒΕ, ΖΓ· ὡς ἄρα ἡ ΒΔ

fariam dividit: quadrata è lateribus
facta æqualia erunt quadratis quæ
fiunt ex basis partibus, una cum du-
plo quadrati ejus quæ à vertice ad
basim ducta est.

SIT triangulum ΑΒΓ, cujus basis secetur
bifariam in Δ; & ducatur ΑΔ: dico qua-
drata ex ΑΒ, ΑΓ quadratis ex ΒΔ, ΔΓ una cum
duplo quadrati ex ΑΔ æqualia esse.

Si enim æquicrura sit ΑΒΓ triangulum, de-
monstratio manifesta erit, propterea quod
uterque angulorum qui ad Δ est rectus. sed sit
ΒΑ major quam ΑΓ: ergo ΒΔ Α angulus ma-
jor est angulo ΑΔ Γ. producat ΑΔ, & ad ipsam
perpendiculares ducantur ΒΕ, ΓΖ. similia igitur
sunt triangula orthogonia ΕΒΔ, ΓΖΔ, propter
parallelas ΒΕ, ΖΓ: quare ut ΒΔ ad ΔΓ ita



πρὸς ΔΓ ὥτως ἡ ΕΔ πρὸς ΔΖ. ἴση δὲ ἡ ΒΔ τῇ
ΓΔ· ἴση ἄρα καὶ ἡ ΕΔ τῇ ΔΖ, ἔστω ὑπὸ ΑΔ, ΔΕ
τῶν ὑπὸ ΑΔ, ΔΖ, καὶ τὸ δις ὑπὸ ΑΔ, ΔΕ τῶν δις
ὑπὸ ΑΔ, ΔΖ. ἐπεὶ ἐν τῷ μὲν ὑπὸ τῆς ΑΒ τῷ ὑπὸ
ΑΔ, ΔΒ μείζον ἐστὶ τῶν δις ὑπὸ ΑΔ, ΔΕ, τετέστι τῶν
δις ὑπὸ ΑΔ, ΔΖ, τὸ δὲ ὑπὸ ΑΓ τῷ ὑπὸ ΑΔ, ΔΓ
ἐλαττόν ἐστι τῶν αὐτῶν δις ὑπὸ ΑΔ, ΔΖ· τὰ ἄρα
ὑπὸ ΒΑ, ΑΓ ἴσα εἰσι τοῖς ὑπὸ ΒΔ, ΔΓ καὶ τῶν δις ὑπὸ
τῆς ΑΔ. ὅπερ εἶδει δεῖξαι.

ΕΔ ad ΔΖ. æqualis autem est ΒΔ ipsi ΓΔ: ergo
& ΕΔ æqualis est ipsi ΔΖ, & rectangulum ΑΔΕ
rectangulo ΑΔΖ æquale; & duplum rectanguli
ΑΔΕ duplo rectanguli ΑΔΖ. itaque quoniam
[per 12. 2.] quadratum ex ΑΒ majus est quadra-
tis ex ΑΔ, ΔΒ duplo rectanguli ΑΔΕ, hoc est
duplo rectanguli ΑΔΖ; quadratum vero ex ΑΓ
[per 13. 2.] minus est quadratis ex ΑΔ, ΔΓ du-
plo rectanguli ΑΔΖ: erunt quadrata ex ΒΑ &
ΑΓ simul æqualia quadratis ex ΒΔ, ΔΓ una cum
duplo quadrati ex ΑΔ. quod erat demonstrandum.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΖ.

Εάν πέντε εὐθεῖαι ἢ πρῶτη πρὸς τὴν δευτέραν
μείζονα λόγον ἔχῃ ἢ περὶ ἢ τετάρτη πρὸς τὴν πε-
ντάρτην· καὶ τὸ ὑπὸ τῆς πρῆτης πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς
δευτέρας μείζονα λόγον ἔξῃ ἢ περὶ τὸ ὑπὸ τῆς
τετάρτης πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς πεντάρτης. καὶ τὸ
ὑπὸ τῆς πρῆτης πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς δευτέρας μεί-
ζονα λόγον ἔχῃ ἢ περὶ τὸ ὑπὸ τῆς τετάρτης πρὸς
τὸ ὑπὸ τῆς πεντάρτης· ἢ πρῶτη πρὸς τὴν δευτέ-
ραν μείζονα λόγον ἔχει ἢ περὶ ἢ τετάρτη πρὸς
τὴν πεντάρτην.

ΕΣΤΩ ΣΑΝ εὐθεῖαι αἱ Α, Β, Γ, Δ, ἔστω δὲ ἡ
Α πρὸς τὴν Β μείζονα λόγον ἢ περὶ ἢ Γ πρὸς τὴν
Δ· λέγω ὅτι καὶ τὸ ὑπὸ τῆς Α πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς Β μεί-
ζονα λόγον ἔχει ἢ περὶ τὸ ὑπὸ τῆς Γ πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς Δ.

Επεὶ γὰρ ὁ Α πρὸς τὴν Β λόγος μείζων ἐστὶ τῆς
Γ πρὸς τὴν Δ, καὶ ὁ Ε μείζονος ἄρα διπλαστος μείζων

PROP. XVII. Theor.

Si prima quatuor rectarum ad secun-
dam majorem rationem habeat quam
tertia ad quartam; etiam quadratum
primæ ad quadratum secundæ majorem
habeat rationem quam tertiæ quadra-
tum ad quadratum quartæ. quod si
quadratum primæ ad quadratum se-
cundæ majorem rationem habeat quam
tertiæ quadratum ad quadratum quar-
tæ; prima quoque ad secundam ma-
jorem rationem habeat quam tertia
ad quartam.

SINT quatuor rectæ lineæ Α, Β, Γ, Δ; &
habeat Α ad Β majorem rationem quam
Γ ad Δ: dico quadratum ipsius Α ad quadra-
tum ex Β majorem habere rationem quam qua-
dratum ex Γ ad quadratum ex Δ.

Etenim cum ratio Α ad Β major sit quam habet
Γ ad Δ; erit dupla majoris rationis major quam
dupla

dupla minoris. est autem [per 20.6.] rationis majoris A ad B dupla ratio quadrati ex A ad quadratum ex B; & rationis minoris Γ ad Δ dupla est ratio quadrati ex Γ ad quadratum ex Δ: ergo ratio quadrati ex A ad quadratum ex B major est ratione quadrati ex Γ ad quadratum ex Δ. Rursus quadratum ex A ad quadratum ex B majorem rationem habeat quam quadratum ex Γ ad quadratum ex Δ: dico A ad B majorem rationem habere quam Γ ad Δ. nam cum ratio quadrati ex A ad quadratum ex B major sit quam quadrati ex Γ ad quadratum ex Δ, erit majoris rationis dimidia major quam dimidia minoris. sed rationis quidem majoris quadrati ex A ad quadratum ex B dimidia est ratio A ad B; rationis vero minoris quadrati ex Γ ad quadratum ex Δ dimidia est ratio Γ ad Δ: ratio igitur A ad B major est quam Γ ad Δ. quod erat demonstrandum.

PROP. XVIII. Theor.

Si duæ magnitudines æquales diffimiliter dividantur; & alterius partium major ad minorem rationem majorem habeat quam partium alterius major ad minorem, vel æqualis ad æqualem: prius dictarum partium major omnium maxima, minor vero omnium minima erit.

SINT duæ magnitudines æquales AB, ΓΔ, dividaturque AB in B & ΓΔ in Z; & sit AB major quam EB; & ΓZ non minor quam ZΔ, ita ut AB ad EB majorem rationem habeat quam ΓZ ad ZΔ: dico magnitudinum AE, EB, ΓZ, ZΔ maximam quidem esse AE, minimam vero EB.

Quoniam enim AB ad EB majorem rationem habet quam ΓZ ad ZΔ; componendo AB ad BE majorem habebit quam ΓΔ ad ΔZ; permutandoque AB ad ΓΔ majorem quam EB ad ZΔ. est autem AB ipsi ΓΔ æqualis; minor igitur est EB quam ZΔ. estque ZΔ non major quam ΓZ; quare est EB quam ΓZ minor. sed & erat minor quam AB; ergo EB minima erit. rursus quoniam AB est æqualis ipsi ΓΔ, quarum pars EB minor est parte ΔZ; erit reliqua EA major quam reliqua ΓZ. & ΓZ non est minor quam ZΔ: quare AE major est quam ZΔ. erat autem & major quam EB; adeoque AE omnium maxima erit, uti EB minima.

PROP. XIX. Theor.

Si duo triangula bases æquales habeant, itemque rectas quæ à vertice ad pun-

ἐστὶν ἑλάττωτος διπλασίονα. ἐστὶ δὲ ἡ μὲν τῆς Α πρὸς τῆς Β λόγος μείζωνος ὄντος διπλασίονος ὁ ἔξ ἀπὸ τῆς Α πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Β λόγος· τῆς ὅ τῆς Γ πρὸς τὴν Δ λόγος ἐλάττωτος ὄντος διπλασίονος ὁ ἔξ ἀπὸ τῆς Γ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Δ λόγος· καὶ ὁ τῆς ἀπὸ τῆς Α ἄρα πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Β λόγος μείζων ἐστὶν ἔξ ἀπὸ τῆς Γ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Δ. Πάλιν ὅ τὸ ἀπὸ τῆς Α πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Β μείζονα λόγον ἔχειται ἢ περὶ τὸ ἀπὸ τῆς Γ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Δ· λέγω ὅτι ἡ Α πρὸς τῆς Β μείζονα λόγον ἔχει ἢ περὶ τῆς Γ πρὸς τῆς Δ. ἐπεὶ γὰρ ὁ τῆς ἀπὸ τῆς Α πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Β λόγος μείζων ἐστὶν ἔξ ἀπὸ τῆς Γ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Δ λόγος, καὶ ὁ τῆς μείζονος ἄρα ἡμίσιος ἔξ ἀπὸ τῆς Α πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Β λόγος μείζωνος ὄντος ἡμίσιος ὁ τῆς Α πρὸς τῆς Β, ἔξ ἀπὸ τῆς Γ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Δ ἐλάττωτος ὄντος ἡμίσιος ὁ τῆς Γ πρὸς τῆς Δ· καὶ ὁ τῆς Α ἄρα πρὸς τῆς Β λόγος μείζων ἐστὶν ἔξ ἀπὸ τῆς Γ πρὸς τῆς Δ. ὁ.ε.δ.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ α'.

Εάν δύο μεγέθη ἴσα ἀπομόαις διαμεθῇ, τὸ δὲ ἑτέρας τμημάτων τὸ μᾶλλον πρὸς τὸ ἐλάττω μείζονα λόγον ἔχῃ ἢ περὶ τῶ λοιπῷ τὸ μᾶλλον πρὸς τὸ ἐλάττω, ἢ τὸ ἴσον πρὸς τὸ ἴσον· τὸ περιτμήνεται τμημάτων τὸ μᾶλλον μέρους ἔσται τῶν τριῶν τμημάτων, τὸ δὲ ἔλασιν ἐλάττω τὸ περιτμήνεται.

ΕΣΤΩ δύο μεγέθη ἴσα τὰ ΑΒ, ΓΔ, ὧς δηρὸν τὸ μὲν ΑΒ τῶ Ε, τὸ δὲ ΓΔ τῶ Ζ, ἔστω δὲ τὸ μὲν ΑΕ ἔξ ΕΒ μείζον, τὸ ὅ ΓΖ τῆς ΖΔ μὴ ἐλάττω, ὥστε τὸ ΑΕ πρὸς ΕΒ μείζονα λόγον ἔχῃ ἢ περὶ τὸ ΓΖ πρὸς τὸ ΖΔ· λέγω ὅτι τὰ ΑΕ, ΕΒ, ΓΖ, ΖΔ, μεγέθων μέγιστον μὲν ἐστὶ τὸ ΑΕ, ἐλάχιστον ὅ τὸ ΕΒ.

Επειδὴ τὸ ΑΕ πρὸς ΕΒ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περὶ τὸ ΓΖ πρὸς ΖΔ, καὶ συνθέντι ἄρα τὸ ΑΒ πρὸς ΒΕ μείζονα λόγον ἔχῃ ἢ περὶ τὸ ΓΔ πρὸς ΔΖ, ὧς συναλλὰξ τὸ ΑΒ πρὸς ΓΔ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περὶ τὸ ΕΒ πρὸς ΖΔ. καὶ ἐστὶν ἴσον τὸ ΑΒ τῶ ΓΔ· ἐλάττω ἄρα τὸ ΕΒ ἔξ ΖΔ. τὸ ὅ ΖΔ τῆς ΓΖ μὴ μείζον· ὧς ἔξ ΓΖ ἄρα ἐλαστόν ἐστὶ τὸ ΕΒ. ἢν δὲ καὶ ἔξ ΑΕ ἐλάττω· ἐλάχιστον ἄρα τὸ ΕΒ. πάλιν ὅτι τὸ ΑΒ τῶ ΓΔ ἴσον, ὡς τὸ ΕΒ τῆς ΔΖ ἐλάττω· λοιπὸν ἄρα τὸ ΕΑ λοιπὸν τῆς ΓΖ μείζον. τὸ δὲ ΓΖ ἔξ ΖΔ σὺν ἐλάττω ἐστὶ καὶ τῆς ΖΔ ἄρα μείζον ἐστὶ τὸ ΑΕ. ἢν δὲ καὶ τῆς ΕΒ μείζον· μέγιστον ἄρα ἐστὶ τὸ ΑΕ, τὸ δὲ ΕΒ ἐλάχιστον.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ β'.

Εάν δύο τρίγωνα τὰς τε βάσεις ἴσας ἔχῃ, ἔχῃ δὲ καὶ τὰς ἀπὸ τῆς κορυφῆς ἐπὶ τῆς δεχομένης τῆς βάσεως

consequitur angulum $\angle A H$ acutum esse. & quoniam $B A$ non est minor quam $A \Gamma$, angulus $A H B$ [per 25.1.] angulo $A H \Gamma$ non erit minor: angulus igitur $A H \Gamma$ non est major recto. erat autem $\angle A H$ angulus recto minor; ergo anguli $A H \Gamma$, $\angle A H$ duobus rectis minores sunt, ac proinde recta $A \Xi$ ipsi $H \Gamma$ non est parallela. ducatur per A ipsi $B \Gamma$ parallela recta $A \Pi$; & protrahatur $B \Xi$ ad Π , jungaturque $\Gamma \Pi$: triangulum igitur $A B \Gamma$ [per 38.1.] triangulo $B \Pi \Gamma$ est æquale; & idcirco $B A \Gamma$ majus est ipso $B \Xi \Gamma$, hoc est triangulo $E \Delta Z$. quod erat demonstrandum.


Circulos autem $K \Lambda$, $M N$ sese invicem secare, hoc modo demonstrabitur.

Sit enim lateri majori $E \Delta$ æqualis $B A P$; ac ponatur ΓZ ipsi ΔZ æqualis, in directum ipsi $B \Gamma$: tota igitur $B \Xi$ æqualis est utrifque $E Z$, $Z \Delta$. & quoniam $E Z$, $Z \Delta$ simul excedunt ipsam $E \Delta$, erit & $B \Xi$ ipsa $E \Delta$ major: itaque circulus centro B & intervallo $B P$ descriptus ipsam $\Gamma \Xi$ secabit. secet ad T , ac intra circulum ducatur recta quædam ΓA major quam $\Gamma \Xi$ five ΔZ ; itaque circulus centro Γ & intervallo $\Gamma \Xi$ descriptus occurret ipsi $A \Gamma$. occurrat ad O : circulus igitur, per puncta Σ , O transiens, per circumferentiam $P T$ transibit necessario; atque adeo circuli $K \Lambda$, $M N$ sese invicem secabunt.

PROP. XX. Theor.


Si duo triangula, quorum latera inæqualia, bases æquales habeant, itemque rectas quæ à vertice ad punctum quo bifecatur basis ducuntur: minoris trianguli majus latus ad minus majorem rationem habebit quam majoris trianguli majus latus ad minus.

SINT triangula $A B \Gamma$, $E Z H$, bases $A \Gamma$, $E H$ æquales habentia, quæ bifariam secantur in punctis Δ , Θ ; & sint æquales $B \Delta$, $Z \Theta$; sit autem majus triangulum $E Z H$; & sit $A B$ major quam $B \Gamma$, itemque $E Z$ quam $Z H$ major: dico $A B$ ad $B \Gamma$ majorem habere rationem quam $E Z$ ad $Z H$.



Si enim non ita sit, vel eandem rationem habebit, vel minorem. sit primum, si fieri potest,


ἄρα ἡ ὑπὸ $\angle A H$ γωνία. καὶ ἐπεὶ ἡ $B A$ τῇ $A \Gamma$ ὅση ἐστὶν ἐλάττω. καὶ ἡ ὑπὸ $\angle A H B$ ἄρα γωνία τῇ



ὑπὸ $\angle A H \Gamma$ ὅση ἐστὶν ἐλάττω. ἡ ἄρα ὑπὸ $\angle A H \Gamma$ & μείζων ἐστὶν ὀρθῆς. ἢ ἡ $\angle A H$ ὀρθῆς ἐλάττω. αἱ ἄρα ὑπὸ $\angle A H \Gamma$, $\angle A H$ δύο ὀρθῶν

ἐλάττωες εἰσιν. ὅση ἄρα ἡ $A \Xi$ τῇ $H \Gamma$ ὀρθῶν ἑστὶν. ἢ γὰρ δὴ $\Delta \Gamma$ τῇ $B \Gamma$ ὀρθῶν ἑστὶν ἢ $A \Pi$, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ $B \Xi$ πρὸς Π , καὶ ἐπεζευχθῶ ἡ $\Gamma \Pi$. τὸ ἄρα $A B \Gamma$ τρίγωνον ἴσον ἐστὶ τῷ $B \Pi \Gamma$ τριγώνῳ. ὅθεν τὸ ἄρα $B A \Gamma$ μείζον ἐστὶ τῷ $B \Xi \Gamma$, ὅπερ ἐδει δεῖξαι.

Οἱ δὲ τέμνουσιν ἀλλήλους οἱ $K \Lambda$, $M N$ κύκλοι, δεῖκνόν ἔστω.




Ἐστω γὰρ τῇ μὲν μείζονι πλευρᾷ τῇ $E \Delta$ ἴση ἡ $B A P$, τῇ δὲ ΔZ ἴση ἡ $\Gamma \Sigma$, ἐπ' εὐθείας ἔστω τῇ $B \Gamma$. ὅλη ἄρα ἡ $B \Xi$ ἴση ἐστὶ συναμφοτέρω τῇ $E Z$, $Z \Delta$. ἐπεὶ δὲ συναναμφοτέρως ἡ $E Z$, $Z \Delta$ τῇ $E \Delta$ μείζων ἐστὶ καὶ ἡ $B \Xi$ ἄρα τῇ $E \Delta$

μείζων ἐστὶν. ὅθεν κέντρον τῷ B διαστήματι τῇ $B P$ γραφομένης κύκλος περικύπτει τὴν $\Gamma \Sigma$. τεμνέτω κατὰ τὸ T , καὶ ἔστω ἐν τῷ Σ κύκλῳ εὐθεία τις ἡ ΓA μείζων τῇ $\Gamma \Sigma$, ὅθεν κέντρον τῷ Γ διαστήματι τῇ $\Gamma \Sigma$ γραφομένου κύκλος περικύπτει τὴν $A \Gamma$. τεμνέτω κατὰ τὸ O . ἢ ἔστω ἡ $\Delta \Gamma$ τῇ ΣO κύκλος. ὅθεν $\Delta \Gamma$ τῇ $P T$ περιφερείᾳ. τέμνουσιν ἄρα ἀλλήλους καὶ οἱ $K \Lambda$, $M N$ κύκλοι.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κ'.

Εάν δύο τρίγωνα ἀνισοσκελῆ τὰς τε βάσεις ἴσας ἔχῃ, ἔστω δὲ καὶ τὰς ἀπὸ τῆς κορυφῆς ἐπὶ τῇ διχοτομίᾳ τῆς βάσεως ἡγμέναις εὐθείαις ἴσας. τῷ ἐλάττωι ἢ μείζονι πλευρᾷ πρὸς τὸ ἐλάττωον μείζονα λόγον ἔχει ἢ περὶ ἢ ἢ μείζονος μείζονα πλευρὰ πρὸς τὸ ἐλάττωον.

ΕΣΤΩ τρίγωνα τὰ $A B \Gamma$, $E Z H$ ἴσας ἔχοντα τὰς τε $A \Gamma$, $E H$ βάσεις, διχα τεμημέναις




κατὰ τὰ Δ καὶ Θ σημεία, ἴσας τῇ ἑσώσταις αἱ $B \Delta$, $Z \Theta$ ἐμείζον τὰ $E Z H$ τρίγωνα, ἔστω ἡ μὲν $A B$ τῇ $B \Gamma$ μείζων, ἢ ἡ $E Z$ τῇ $Z H$. λέγω ὅτι ἡ $A B$ πρὸς $B \Gamma$ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περὶ ἢ $E Z$ πρὸς $Z H$.

Εἰ γὰρ μή. ἢτοι τὸ αὐτὸν ἢ ἐλάττωον ἔχει. ἔστω ἔν περὶ πρὸν, εἰ διωγατὶν, ὡς ἡ $A B$ πρὸς $B \Gamma$ ἔστω ἡ $E Z$

σημείον, πρὸς ὁραῖς δὲ τῷ ΒΓ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον
μεγίστη μὲν ἄρα ἡ ΒΑ ὅτι τὸ Γ κερυφῆς ἔκείνων εὐ-
θειῶν, ἐλαχίστη δὲ ἡ ΑΓ. Ὡππεταχθῶ δὴ ὁπὸ Γ
Α Ὡπὶ πῶς πεφύκειαν ἔκκεκκα ἀγαγῶν εὐθείαν,
πρὸς μὲν ἡ ΒΑ λόγον ἔχει ὃν ἔχει ἡ Δ εὐθεία μεῖζων
ἔσσι πρὸς τὴ Ε ἐλάττω. ἔχεται ᾗ ἡ Δ πρὸς Ε λό-
γον ἐλάττω ἔκκεκκα ὃν ἔχει ἡ ΒΑ πρὸς ΑΓ.

Κατήχθω ὅτι ἡ ΒΓ κάθετος ἡ ΑΖ, καὶ ἐκεί-
 βλήθω ἡ ΒΖ Η, καὶ ὥς ἡ Δ πρὸς Ε ἕτως ἐχέτω ἡ
 ΒΑ πρὸς ἄλλην πινά, ἐχέτω δὲ πρὸς τὴν ΑΗ, ἥτις
 ἐνημερώθω ὑπὸ τὴν ΑΖ Η γωνίαν· ἡ ΒΑ ἄρα πρὸς
 ΑΗ ἐλάττωνα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ ΑΒ πρὸς ΑΓ·
 μείζων ἄρα ἡ ΗΑ ἢ ΑΓ καὶ ἡ ΗΖ ἢ ΖΓ. ἐπεὶ δὲ
 ὥς τὸ ἀπὸ τῆ Δ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆ Ε ἕτως τὸ ἀπὸ τῆ




ΒΑ πρὸς τὸ Δπὸ τῆ ΑΗ, μείζον ἢ τὸ Δπὸ τῆ Δ τῆ
 Δπὸ τῆ Ε· μείζον ἄρα τὸ Δπὸ τῆ ΒΑ τῆ ἀπὸ τῆ ΑΗ,
 τετέστι τὴ ἀπὸ τῆ ΒΖ, ΖΑ τῆ ἀπὸ τῆ ΑΖ, ΖΗ. και-
 νὸν ἀφηρήσθω τὸ ἀπὸ ΑΖ· λοιπὸν ἄρα τὸ ἀπὸ ΒΖ
 τῆ ἀπὸ ΖΗ μείζον, καὶ ἡ ΒΖ τῆ ΖΗ. ἦν ἢ καὶ ἡ ΓΖ
 τῆ ΖΗ ἐλάττω· ἡ ἄρα ΖΗ τῆ μὲν ΖΓ μείζων
 ἐστίν, τῆ δὲ ΖΒ ἐλάττω. ἐνηρμόσθω πίνυν τῶ κύκλῳ
 τῇ ΖΗ ἴση ἡ ΖΘ, ᾧ ἐπέξεύχθω ἡ ΑΘ· ἐπεὶ ἔν
 ἡ ΘΖ τῇ ΖΗ ἴση, κοινὴ δὲ ἡ ΖΑ, καὶ πρὸς ὁρθαῖς
 ἐκατέρᾳ αὐτῶν· καὶ βάσις ἄρα ἡ ΘΑ τῇ ΑΗ ἴση
 ἐστίν. ἐπεὶ ἔν ὡς ἡ Δ πρὸς Ε ἕτως ἡ ΒΑ πρὸς ΑΗ,
 τετέστιν ἡ ΒΑ πρὸς ΑΘ, ἡ δὲ Δ πρὸς Ε ἐν τῷ δο-
 ξέντι λόγῳ ἐστίν· ᾧ ἡ ΒΑ ἄρα πρὸς ΑΘ ἐν τῷ δο-
 ξέντι λόγῳ ἐστίν· ἡ ΑΘ ἄρα διηκῶς, πρὸς μὲν ἡ ΒΑ
 λόγον ἔχει τῆ Πηπικχέντα. ὅπερ εἰς ποιῆσαι.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κα΄.

Τειρώνς δοθέντος σκαλιωῦ, καὶ ἀπὸ τῆ κορυφῆς ἐπὶ
τῇ διχοτομίᾳ τῆ βάσεως ἡγμυδῆς εὐθείας, ἄλλο
μείζον τείρωνον συστήσασθαι, ὥστε ἴσῃ μὲ ἔχειν τὴ
βάσιν καὶ τὴ ἀπὸ τῆ κορυφῆς ἐπὶ τῇ διχοτομίᾳ τῆ
βάσεως τῇ ὁδοῦ τειρώνος, λόγον δὲ ἔχειν
πρὸς τὸ δοθὲν τείρωνον ὅν εὐθεῖα τις μείζων
πρὸς ἐλάττωνα· δεῖ δὲ ταῖς τοιαύταις εὐθείαις
λόγον ἔχειν πρὸς ἀλλήλας μὴ μείζονα τῷ

A, & triangulum per axem $AB\Gamma$ ad rectos angulos ipsi $B\Gamma$ circulo: ergo BA rectarum quæ à vertice conï ducuntur maxima est, & $A\Gamma$ minima. itaque oporteat à puncto A ad circumferentiam circuli ducere rectam, ad quam ipsa BA rationem habeat eandem quam habet recta linea Δ major ad E minorem. habeat autem Δ ad E minorem rationem quam BA ad $A\Gamma$.

Ducatur à puncto A ad E perpendicularis AZ, producaturque BZH, & ut Δ ad E ita sit BA ad aliam quampiam AH, quæ coaptetur sub angulo AZH: ergo BA ad AH minorem rationem habet quam AB ad AG; & propterea HA major est quam AG, & HZ major quam ZG. quoniam igitur ut quadratum ex Δ ad quadratum ex E ita quadratum ex BA ad quadratum ex



AH , quadratum autem ex Δ majus est quadra-
 to ex E : quare quadratum ex BA quadrato ex AH
 majus; hoc est quadrata ex BZ , ZA simul majora
 sunt quadratis ex AZ , ZH simul. commune au-
 feratur quadratum ex AZ ; ergo reliquum qua-
 dratum ex BZ majus est quadrato ex ZH : &
 ideo erit BZ ipsa ZH major. erat autem ΓZ mi-
 nor quam ZH : quare ZH major est quam $Z\Gamma$,
 & minor quam ZB . coaptetur igitur in circulo
 recta $Z\Theta$ ipsi ZH æqualis; & jungatur $A\Theta$, ita-
 que quoniam ΘZ ipsi ZH est æqualis, communis
 autem ZA , & utrique ipsarum ad rectos angu-
 los: erit basis ΘA æqualis basi AH . sed ut Δ ad
 E ita est BA ad AH , hoc est BA ad $A\Theta$; estque
 Δ ad E in data ratione: ergo & BA ad $A\Theta$ in
 data ratione erit: ducta igitur est $A\Theta$, ad quam ipsa
 BA rationem habet datam. quod erat faciendum.

PROP. XXIV. *Probl.*

Dato triangulo scaleno, datâque eâ quæ
à vertice ducta basim ejus bifariam
fecat; super eandem basim, ac eâ-
dem à vertice ad bisectionem basis
distantiâ, aliud majus triangulum
construere, quod ad datum triangu-
lum datam habeat rationem majoris
ad minus: oportet autem rationem
illam datam non majorem esse eâ
quàm

quam habet ducta de vertice ad bisectionem basis dati trianguli ad cathetum de vertice ejusdem ad basim demissam.

SIT datum triangulum scalenum $AB\Gamma$, cujus latus AB majus sit latere $A\Gamma$, & basis $B\Gamma$ bifariam in Δ secetur, ducaturque $A\Delta$, sit autem $E\Delta$ perpendicularis ad $B\Gamma$, & æqualis ipsi ΔA ; & sit AZ ad eandem $B\Gamma$ perpendicularis: oporteatque aliud triangulum construere triangulo $AB\Gamma$ majus, quod habeat ductam à vertice ad punctum basim bifariam secans utrique ipsarum $\Delta E, \Delta A$ æqualem, quodque ad triangulum $AB\Gamma$ rationem eandem habeat quam Θ major ad H minorem. habeat autem Θ ad H non majorem rationem quam ΔA ad AZ .

Itaque centro Δ & intervallo ΔA circulus EA describatur, qui per E transibit. & quoniam ratio Θ ad H non major est ratione ΔA vel ΔE ad AZ ; erit vel eadem, vel minor. sit primum eadem, & jungantur EB , EF . quoniam est ut Θ ad H ita $E\Delta$ ad AZ , & ut $E\Delta$ ad AZ ita

rectangulum sub $E\Delta, B\Gamma$ ad rectangulum sub $AZ, B\Gamma$; [ergo ut Θ ad H ita rectangulum sub $E\Delta, B\Gamma$ ad rectangulum sub $AZ, B\Gamma$.] rectanguli autem sub $E\Delta, B\Gamma$ dimidium est triangulum $EB\Gamma$, & rectanguli sub $AZ, B\Gamma$ dimidium est triangulum $AB\Gamma$: triangulum igitur $BE\Gamma$ ad triangulum $BA\Gamma$ eam rationem habet quam Θ ad H , hoc est datam.

Habeat deinde Θ ad H minorem rationem quam habet $E\Delta$ ad AZ ; & fiat ut Θ ad H ita $K\Delta$ ad AZ , perque K ducatur KL ipsi $\Gamma\Delta$ parallela, & jungantur AB , $\Lambda\Gamma$. quoniam itaque ut Θ est ad H ita $K\Delta$ ad AZ ; ut autem $K\Delta$ ad AZ ita $B\Lambda\Gamma$ triangulum ad triangulum $B\Lambda\Gamma$: triangulum igitur $B\Lambda\Gamma$ ad triangulum $B\Lambda\Gamma$ datam habet rationem, videlicet quam habet Θ ad H ; estque $\Delta\Lambda$ ipsi ΔA æqualis. quod erat faciendum.


PROP. XXV. *Probl.*

Datum conum scalenum secare per axem plano faciente in eo triangulum, ad minimum triangulorum per axem ductorum rationem datam habens: oportet autem datam rationem esse majoris ad minus, neque majorem eâ quam maximum triangulorum per axem habet ad minimum.

SIT *data* contus *scalenus*, *cujus* *axis* *AB*,
basis *circulus* *circa* *B* *centrum*, *minimum*
vero *triangulorum* *per* *axem* *ATΔ*; & *opor-*

ὅτι ἔχει ἡ Σπό· ἡ κορυφὴ δὲ διδόντος τε γῆν
ἐπὶ ἡ διχοτομίαν· ἡ βάσις ἡ γῆν ὡς ἡ
Σπό· ἡ κορυφὴ ἐπὶ ἡ βάσιν πίπτεισαν ἀέθρον.

ΕΣΤΩ τεύγωνον δοθέν τὸ ΑΒΓ σκαληνόν, μείζονα ἔχον τὰ ΑΒ τῷ ΑΓ, ἢ τῇ ΒΓ βάσει τετμήσθαι οἷχα κατὰ τὸ Δ, καὶ διήχθω ἡ ΑΔ, καὶ ἡ μὲν ΕΔ πρὸς ὀρθαῖς ἔσω τῇ ΒΓ ἴση ἔσται τῇ ΔΑ, ἡ δὲ ΑΖ κάθετος πρὶ τῇ ΒΓ· καὶ δέον ἔσω ἄλλο τεύγωνον μείζον Ε' ΑΒΓ συστήσασθαι, τὴν ἀπὸ τῆς κερυφῆς πρὶ τὴν διχοτομίαν τῆς βάσεως ἴσην ἔχον ἑκατέρω τῶν ΔΕ, ΔΑ, καὶ προσέτι λόγον ἔχον πρὸς τὸ ΑΒΓ ὃν ἡ Θ πρὸς Η μείζον πρὸς ἐλάττωσα. ἐχέτω δὲ ἡ Θ πρὸς Η λόγον μὴ μείζονα ἢ περ ἡ ΔΑ πρὸς ΑΖ.



Κέντρῳ τῷ Δ, ἀναστή-
ματι ἢ τῷ ΔΑ, περιέχθῃ
κύκλος· ἥξει δὴ καὶ διὰ τῆς Ε,
ἔσω δὲ ὁδε ὁ ΕΑ. ἐπεὶ ὅν
ὁ τῆς Θ πρὸς Η λόγος ἔχει
ζῶν ἐπὶ τῆς τῆς Δ Α ἥτοι τῆς
Δ Ε πρὸς Α Ζ, ἥτοι ὁ αὐ-
τός ἐστιν ἡ ἐλάττω. ἔσω
πρότερον ὁ αὐτός, καὶ ἐπε-
ξυχθῶσιν αἱ ΕΒ, ΕΓ. ἐπεὶ

ἔν ὥς ἡ Θ πρὸς τὴν Η ἔτως ἡ ΕΔ πρὸς ΑΖ, ὥς
 δὲ ἡ ΕΔ πρὸς ΑΖ ἔτως τὸ ὑπὸ ΕΔ, ΒΓ πρὸς
 τὸ ὑπὸ ΑΖ, ΒΓ, ἀλλὰ τῆ μὲν ὑπὸ ΕΔ, ΒΓ
 ἡμισὺ ἐστὶ τὸ ΕΒΓ τρίγωνον, ἡ δὲ ὑπὸ ΑΖ, ΒΓ
 ἡμισὺ ἐστὶ τὰ ΑΒΓ τρίγωνον καὶ τὸ ΒΕΓ ἄρα
 πρὸς τὸ ΒΑΓ λόγον ἔχει ὃν ἡ Θ πρὸς Η, ταῦτα δὲ
 ὁμοιωθέντα.

Ἀλλὰ δὲ ἔχεται ἡ Θ πρὸς τὴν ἑλάνθηονα λόγον
 ἥπερ ἡ ΕΔ πρὸς ΑΖ, γενέσθω δὲ ὡς ἡ Θ πρὸς Η
 ἔτως ἡ ΚΔ πρὸς ΑΖ, καὶ ἀφ' ἧς Κτῆ ΓΔ ἀφ' ἧς
 ληλος ἡχθω ἡ ΚΛ, καὶ ἐπελεύχθωσαν αἱ ΔΒ, ΛΓ.
 ἐπεὶ ἔν ὡς ἡ Θ πρὸς τὴν Η ἔτως ἡ ΚΔ πρὸς ΑΖ,
 ὡς δὲ ἡ ΚΔ πρὸς ΑΖ ἔτως τὸ ΒΑΓ τρίγωνον
 πρὸς τὸ ΒΑΓ τρίγωνον· τὸ ἄρα ΒΑΓ πρὸς τὸ
 ΒΑΓ τὸ ὁπταχθέντι ἔχει λόγον τὸ τ' Θ πρὸς Η,
 ἔχει δὲ καὶ τὸ ΑΔ ἴσην τῇ ΔΑ. ὁ περὶ τούτου ποιῆσαι.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κέ'.


Τὸν δοθέντα κῶνον σκαληνὸν πεμεῖν ἀφ' ὃ ἄξονος
ὕπὲρ δὲ ποιεῖται τείνωνον εἰ τῷ κῶνῳ, ὃ τ' δο-
θέντα λόγον ἔξει πρὸς τὸ ἐλάχιστον τ' ἀφ' ὃ
ἄξονος τεχνῶνον· διὲ δὲ δοθέντα λόγον, μεί-
ζονος ὄντα πρὸς ἑλαττον, μὴ μείζονα (ἐκ) ὃ ὅν
ἔχει τὸ μέγιστον τείνωνον τ' ἀφ' ὃ ἄξονος
πρὸς ἐλάχιστον.

ΕΣΤΩ ὁ δοθεὶς κῶνος σφαληνός, ὃ ὀξὺς ὁ ΑΒ, βάσις ἧ ὁ περὶ τὸ Β κέντρον κύκλος, τὸ ἧ ἐλά-
χιστον τὸ ΑΔ· ὃ ἄξονος τετραγώνων τὸ ΑΓΔ· καὶ δεῖν
ἔσθαι

DE SECTIOME CONI.

ἀλλὰ διὰ τὸ ἂν ἄνθρωπος ἀναγνώσκειται καὶ ἀνα-
 γινώσκῃ λόγον εἶναι πρὸς τὰ ΑΓΔ τετραγώνου, ἐν τῇ
 ἡμετέρῃ μορφῇ καὶ πρὸς τὸ Ζ, καὶ μορφῇ καὶ ἡμε-
 τὰ μέγεθος τὸ διὰ τὸ ἄλλου τετραγώνου πρὸς τὸ ἰσ-
 χύου πρὸς ΑΓΔ. ὁ μὲν οὖν Ε πρὸς τὸ Ζ λόγος ἔχει
 ὡς τὸ μέγεθος τὸ διὰ τὸ ἄλλου τετραγώνου πρὸς τὸ
 ἰσχύου, διὰ τὸ Ε πρὸς ἑαυτὸς τῷ ΓΔ ἀπὸ τῆς
 ἀφ' ἑαυτοῦ ἐν τῇ φύσει, καὶ διὰ τὸ ἀρτιόμοιον καὶ τὸ
 ἄλλου ἀρτιόμοιον ἀπὸ τῆς εἰς ἑαυτὸν τρέχουσι ἰσ-
 συαλίαι, ὁ μὲν γάρ ἐστι διὰ τὸ ἄλλου, (πῶς γὰρ
 ἰσχύου) καὶ εἰς πρὸς τὰ ΑΒΔ λόγος τὸς Ε πρὸς
 τὸ Ζ, τὸν Ε δὲ ἀπὸ τῆς φύσεως.


Εἴπω δὲ τῷ ἱερᾷ ἐλάττω λόγῳ ἥπερ
τὸ μαζον + Δψ θ' ἀκούει γινώσκοντες τὸ ἐλά-
ττω + καὶ πάλιν αὖτις αἰδῶσι ἡ θ' ἰσχυρῶς τῇ
Ε.Α, καὶ αὖ αὖτις τὸ ΚΗΘ τρίγωνον, ὁμοιον ὃν
τῷ ΑΓΒ, ὡς καὶ τὸ ΚΗΘ ΑΓ ἰσχυρῶς, καὶ
πάντα ὡς, εἰ δὲ τῷ ΗΘ συνιστάται τρίγωνον,
ὡς τὸν πάλιν αὖτις αὖτις δὲ τῷ διχοτομῶν



τῷ βάσει τῇ ΚΛ, ὅτι ἄρα ἔχον πρὸς τὸ ΚΗΘὸν
 ἢ Εἰ πρὸς Ζ. τὸ δὲ ἀντιπαραβέβαιον τριγώνον τὸ
 κυρτὸν εἶναι δεῖ καὶ εἰς ἡμίση, ὡς διακρίνεται. ἔστω
 ὅτι τὸ ΜΗΘ, ὡς τὸ ΜΗ πλάττειν τὸ ΜΘ μεί-
 ζοντα ὄντα. ἐπεὶ ἐν ἡ ΜΛ τῇ ΑΚΐση, καὶ ἐν δὲ
 ἡ ΔΗ, μείζον ὅτι ἡ ὑπὸ ΚΛΗ γωνία τὴν ὑπὸ ΜΛΗ
 μείζον ἄρα ἡ ΚΗ τὴν ΜΗ. ἡ δὲ ΚΗ τῇ ΓΑΐση. ὥ-
 στε ἡ ΓΑ ἄρα τῆς ΜΗ μείζον ἐστὶ. πάλιν ἐπεὶ ἡ ΚΘ,
 τὴν περὶ ἡ ΑΔ, τῆς ΜΘ ἐλάττω ἐστὶ, ἡ δὲ ΜΘ
 τῆς ΜΗ ἐλάττω. ἡ ἄρα ΑΔ τὴν ΜΗ ἐπὶ ἐλάττω.
 ἐπεὶ ἐν ἡ ΜΗ τὴν μὲν μείζον τῶν ἐν τῷ κάτω
 τῆς ΑΓ ἐλάττω ἐστὶ, τῆς δὲ ἐλαχίστης τῆς ΔΑ
 μείζον, διωκτὴν ἄρα εὐθείαν ἴσην τῇ ΜΗ ἀπὸ
 τῆς Α παραβέβαιον δεῖ καὶ ἀντιπαραβέβαιον τῷ βάσει ἀνα-
 γνῶν, ὡς ἡ δὴ μαμαζήματα. ἤχθω δὴ καὶ ἔστω
 ἡ ΑΝ, ὅτι ἐπιζωχθῶ ἡ ΝΒΞ, καὶ ἡ ΑΞ. ἐπεὶ ἐν
 ἴση ἡ μὲν ΑΝ τῇ ΜΗ, ἡ δὲ ΝΒ τῇ ΗΛ, ἡ δὲ ΒΑ
 τῇ ΑΜ. ὅλον ἄρα τὸ ΑΝΒ τριγώνον τῷ ΜΗΔ
 ἴσον ἐστὶ, καὶ ἡ ὑπὸ ΑΒΝ γωνία τῇ ὑπὸ ΜΔΗ ἴση
 καὶ ἡ ὑπὸ ΑΒΞ ἄρα τῇ ὑπὸ ΜΛΘ. πάλιν ἐπεὶ ἴση ἡ
 μὲν ΑΒ τῇ ΑΜ, ἡ δὲ ΒΞ τῇ ΛΘ, ἀλλὰ ὥστε ἡ ὑπὸ
 ΑΒΞ γωνία ἴση ἐστὶ τῇ ὑπὸ ΜΛΘ ἴση ἄρα ἡ ΑΞ τῇ
 ΜΘ. καὶ ὅτι καὶ ἡ ΑΝ τῇ ΜΗ, ὥστε ἡ ΝΞ βάσις τῇ ΗΘ

[illegible]

Sed habeat nunc $H\theta$ & rationem ϕ potentiam quam maximum triangulum ϕ sit. ex θ ad minimum, & describamus ϕ rectam rectam $H\theta$ ad æqualis ipsi $\Gamma\Delta$, & super eam triangulum ϕ triangulo $\Lambda\Gamma\Delta$ simile, ita ut H sit angulis ϕ $\Lambda\Gamma$, & aliis aliis itidem æquales; per θ super rectam $H\theta$ construamus ϕ per præcedens triangulum, habens eam quæ à rectæ ad punctum θ




sem bifariam fecerat, ducitur ipsi EA æqualis; habensque ad triangulum KHE rationem eandem quam B ad Z . erit autem constructi trianguli vertex ad partes H , ut mox demonstrabitur. sit autem illud triangulum MHE , ita ut latus ME sit majus ipso ME . quoniam igitur MA est æqualis ipsi AK , & AH communis, angulus autem KAH major angulo MAH ; erit KH major ipsa MH . & est KH æqualis ipsi EA ; ergo EA quam MH major erit. rursus quoniam KE , hoc est AA , minor est quam ME , itemque ME minor quam MH ; erit AA ipsa MH minor, itaque cum MA sit minor quam AT maxima earum quæ in constructione, & major quam AA earundem minima; fieri potest ut à vertice A ad basis circumferentiam ducatur recta æqualis ipsi ME , quemadmodum attus [ad 23. hujus] didicimus. ducatur ergo & sit AN , junganturque NB , & NE . & quoniam AN est æqualis ipsi MH , & NB ipsi HN , & BE ipsi AM ; erit totum ABE triangulum triangulo MHA æquale, angulusque ABN æqualis angulo MAH ; quare & ABE angulus ipsi MAE æqualis. rursus quoniam AB est æqualis ipsi AM , & BE ipsi HE , angulusque ABE angulo MAE ; erit & AE æqualis ipsi ME . sed AN æqualis erat ipsi MH , & basis NE basi HE : triangulum igitur

tur ANZ est æquale triangulo HMO . sed triangulum HMO ad triangulum HKO , hoc est ad ipsum $ΓΑΔ$, eandem habet rationem quam E ad Z : ergo & triangulum ANZ ad triangulum $ΑΓΔ$ rationem habet eandem quam E ad Z : factum est igitur ANZ triangulum per axem, quemadmodum proponebatur.

Quod si quis dicat triangulum majus triangulo HKO , super ipsam $HΘ$ descriptum, ad partes $Θ$ verticem habere, absurdum sequetur. sit enim ita, si fieri potest. & quoniam æquales sunt $ΚΛ$, $ΜΛ$, communis autem $ΛΗ$, atque $ΜΛΗ$ angulus major est angulo $ΚΛΗ$: igitur MH major est quam KH . eadem ratione demonstrabitur $KΘ$ major quam $ΜΘ$. & cum MH sit major quam HK , & $ΜΘ$ minor quam $ΘΚ$; habebit MH ad HK majorem rationem quam $ΜΘ$ ad $ΘΚ$, permutandoque HM ad $ΜΘ$ majorem quam HK ad $ΚΘ$: triangulum igitur HMO [per 19. huj.] triangulo HKO est minus, quod fieri non potest; (supponebatur enim majus) quare triangulum HMO non ad partes $Θ$, sed ad eas ad quas est H , verticem habebit.

τὸ ἄρα ANZ τρίγωνον ἴσον ἐστὶ τῷ HMO . ἀλλὰ τὸ HMO πρὸς τὸ HKO , τέτρετι πρὸς τὸ $ΓΑΔ$, λόγον ἔχει τὸν $τ' E$ πρὸς τὴν Z . καὶ τὸ ANZ ἄρα πρὸς τὸ $ΑΓΔ$ λόγον ἔχει ὃν ἡ E πρὸς τὴν Z . ἤκτα ἄρα διὰ τῆς ἀξὸς $Θ$ τὸ ANZ τρίγωνον, ὡς ὀπιτεταιται.

Εἰ δέ τις λέγοι ὅτι τὸ συνιστάμενον ὅτι $τ' HΘ$ τρίγωνον, μείζον ὑπάρχον τῷ HKO , ὅτι τὰ $τ' HΘ$ μέρη τὴν κορυφὴν ἔχον, συμβέσται ἀδιώτατον. ἔσω γὰρ, εἰ διωγὰν, ἔστω. ἐπεὶ ἐν ἴσῳ αἱ $ΚΛ$, $ΜΛ$, κοινὴ δὲ ἡ $ΛΗ$, ἡ δὲ ὑπὸ $ΜΛΗ$ γωνία μείζων $τ' ὑπὸ ΚΛΗ$. μείζων ἄρα ἡ MH $τ' ΚΗ$. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ $κ' ἡ ΚΘ$ $τ' ΘΜ$ μείζων. ἐπεὶ ἐν ἡ μὲν MH τῆς HK μείζων ἐστίν, ἡ δὲ $ΜΘ$ $τ' ΘΚ$ ἐλάττω. ἡ ἄρα MH πρὸς HK μείζονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς $ΜΘ$ πρὸς $ΘΚ$. καὶ ἐναλλάξ ἄρα ἡ HM πρὸς $ΜΘ$ μείζονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς HK πρὸς $ΚΘ$. ἐλάττω ἄρα ἐστὶ τὸ HMO τῷ HKO , ὅπερ ἀδιώτατον. (ὑπέκειτο γὰρ μείζον) ἐκ ἄρα ὅτι τὰ $τ' HΘ$ μέρη $τ' κορυφὴν$ ἔχει τὸ τρίγωνον. ὅτι τὰ $τ' HΘ$ ἄρα μέρη ἔχον.




PROP. XXVI. Theor.

Si conus scalenus plano per axem secetur ad rectos angulos ipsi basi, & ea quæ à vertice facti trianguli ad basim perpendicularis ducitur non minor sit basis semidiametro: erit triangulum, quod ad rectos angulos est basi, majus quolibet alio extra axem in cono constituto, basimque habente basi dicti trianguli parallelam.

CONUS enim, cujus vertex A , basis autem circulus circa B centrum, secetur plano per axem quod faciat $ΑΓΔ$ triangulum, ad rectos angulos basi coni; quæ vero à puncto A ad $ΓΔ$ perpendicularis ducitur non sit minor semidiametro basis: dico triangulum $ΑΓΔ$ maximum esse è triangulis in cono constitutis ac bases habentibus ipsi $ΓΔ$ parallelas.

Ducatur enim in circulo recta EZ parallela ipsi $ΓΔ$, super quam triangulum $AΕΖ$ describatur; in plano autem trianguli $ΑΓΔ$, & ad rectos angulos ipsi $ΓΔ$, erigatur BH , & ducatur AH eidem $ΓΔ$ parallela: erit igitur BH æqualis ei quæ à puncto A ad $ΓΔ$ perpendicularis cadit. itaque junctis $HΓ$, $HΔ$, HE , HZ , concipiatur conus cujus vertex H , axis HB , & basis circulus circa



ΠΡΟΤΑΣΙΣ κς'.

Εάν κώνος σκαληνὸς διχοτμήσῃ ἀξὸς ὀπιτετῇ τμήσῃ τῇ πρὸς ὀρθὰς τῇ βάσει, ὅθεν γινόμενα τετράγωνα ἢ ἀπὸ $τ' κορυφῆς$ ὅτι $τ' βάσιν$ καθετος μὴ ἐλάττω των ἢ $τ' ἐκ$ $τ' κέντρων$ $τ' βάσεως$. τὸ πρὸς ὀρθὰς τῇ βάσει τετράγωνον μέγιστον ἐστὶ πάντων $τ' ἐκ$ $τ' ἀξόνος$ $ὅτι$ $τῷ$ κώνῳ συνιστάμενον τετράγωνον, καὶ ὁμοειδὲς βάσεις ἔχοντων τῇ $τ' πρὸς$ ὀρθὰς τετράγωνον.

ΚΩΝΟΣ γὰρ, $τ' κορυφὴν$ μὲν τὸ A , βάσις $τ' ὅ$ $πῶς$ τὸ B κέντρον κύκλος, πετμήσῃ $ΔΓ$ $τ' ἀξόνος$ ὀπιτετῇ $παιέντι$ τὸ $ΑΓΔ$ τρίγωνον, πρὸς ὀρθὰς τῇ βάσει $τ' κώνος$, ἡ $τ' ὅ$ $τῷ$ $Α$ $ὅτι$ $τ' ΓΔ$ καθετος μὴ ἐλάττω ἔσω $τ' ἐκ$ $τ' κέντρων$ $τ' βάσεως$. λέγω ὅτι τὸ $ΑΓΔ$ τετράγωνον μέγιστον ἐστὶ πάντων $τ' ἐν$ τῷ κώνῳ συνιστάμενων τετράγωνων, βάσεις ἔχοντων ὁμοειδὲς τῇ $ΓΔ$.

Διήχθω γὰρ ἐν τῷ κύκλῳ ὁμοειδὲς τῇ $ΓΔ$ ἡ EZ , ἐφ' ἧς τὸ $ΑΕΖ$ τετράγωνον, ἐν $τ' τῷ$ $ΑΓΔ$ τετράγωνῳ ὀπιτετῇ πρὸς ὀρθὰς ἀναστῇ τῇ $ΓΔ$ ἡ BH , καὶ τῇ $ΓΔ$ ὁμοειδὲς ἡ AH . ἡ BH ἄρα ἴση ἐστὶ τῇ $ΔΠ$ $τῷ$ A $ὅτι$ τὴν $ΓΔ$ καθετῶ. ἐπιζεύχθωσαν αἱ $HΓ$, $HΔ$, HE , HZ . νοηθήσεται δὴ κώνος, $τ' κορυφὴν$ μὲν τὸ H , ἀξὸν $τ' ἡ$ HB , βάσις δὲ $ὅ$ $πῶς$ τὸ B κέντρον


est quam AE , vel non minor. ponatur primum BA non minor quam AE . igitur quoniam BA non minor est quam AE , & BH est minor quam BZ ; ergo AB ad AE maiorem rationem habet quam EH ad BZ : & idcirco [per 1. huj.] ABZ rectangulum majus est rectangulo AEH . sed rectangulo ABZ æquale est triangulum basim habens duplam ipsius BZ & altitudinem AB , hoc est triangulum æquicruræ per axem; rectangulo autem AEH est æquale triangulum cujus basis dupla est EH & altitudo AE : ergo triangulum æquicruræ per axem majus est æquicruri per AE constituto. similiter quoque triangulum per axem triangulis omnibus, quæ inter puncta B, Δ bases habent, majus esse demonstrabitur.

Sed jam sit BA minor quam AE . & quoniam angulus ABE minor est recto, ducatur in plano trianguli ABE recta $B\Theta$ perpendicularis ipsi $\Gamma\Delta$, ipsique EH sit æqualis, & jungantur $\Theta E, BH$. cum igitur angulus ABE angulo AEB sit major, erit angulus AEB minor recto. rectus autem est ΘBE : ergo rectæ $\Theta B, AE$ productæ inter se convenient. convenient ad punctum K : & per Θ ducatur $\Theta\Lambda$ ipsi KE parallela. itaque quoniam ΘB est æqualis ipsi EH , communis autem BE , & angulus æquales continent, videlicet rectos; erit BH ipsi ΘE æqualis. rursus quoniam rectus est angulus $\Theta B\Lambda$, recta ΘB major erit quam $\Theta\Lambda$; adeoque $B\Theta$ ad ΘE minorem rationem habebit quam eadem $B\Theta$ ad $\Theta\Lambda$. ut autem $B\Theta$ ad $\Theta\Lambda$ ita BK ad KE ; quare $B\Theta$ ad ΘE minorem habet rationem quam BK ad KE . sed BK ad KE habet minorem quam BA ad AE , ut in 29^o theoremate ostendetur; igitur $B\Theta$ ad ΘE multo minorem habebit rationem quam BA ad AE : ergo BA ad AE maiorem rationem habet quam $B\Theta$ ad ΘE , hoc est quam BH ad HB five ad BZ . quoniam vero BA ad AE maiorem habet rationem quam EH ad BZ , erit rectangulum ABZ majus rectangulo AEH . sed rectangulo ABZ æquale est triangulum æquicruræ per axem, & rectangulo AEH æquale est triangulum æquicruræ per AE , cujus basis sit dupla ipsius EH : majus igitur est triangulum æquicruræ per axem triangulo æquicruri per AE transeunte. eadem ratione demonstrabitur majus aliis omnibus, quorum bases inter puncta B, Δ habentur. quod erat demonstrandum.

PROP. XXIX. Theor.


Si in triangulo orthogonio ab angulo recto ad hypotenusam recta quædam

est, hæc est minor quam hypotenusæ, & minor est quam altitudo, & minor est quam basis.



est, hæc est minor quam hypotenusæ, & minor est quam altitudo, & minor est quam basis. ἐστίν, ἢ ἔκ ἐστιν ἐλάττω. ὑποκειώδω δὲ μὴ εἶναι ἐλάττω ἢ BA τῆς AE . ἐπεὶ ἔν ἢ BA τῆς AE ὅτε ἐλάττω, ἐλάττω δὲ ἢ EH τῆς BZ . ἢ AB ἄρα πρὸς AE μείζονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς BZ . τὸ ἄρα ὑπὸ AB, BZ μείζον ἐστὶ τῷ ὑπὸ AE, EH . ἀλλὰ τῷ μὲν ὑπὸ AB, BZ ἴσον ἐστὶ τὸ τρίγωνον τὸ βάσιν ἔχον πλὴν τῆς BZ , ὕψος δὲ πλὴν AB , τρεῖς τὸ διὰ τῆς ἄξονος ἰσοσκελές, τῷ ὅν ὑπὸ AE, EH ἴσον ἐστὶ τὸ τρίγωνον τὸ βάσιν μὲν ἔχον τὴν διπλὴν τῆς EH , ὕψος δὲ πλὴν AE . τὸ ἄρα διὰ τῆς ἄξονος ἰσοσκελές μείζον ἐστὶ τῷ διὰ τῆς AE ἰσοσκελές. ὁμοίως δὲ δέκνυ) ὅτι καὶ πάντων τῶν μεταξὺ τῶν B, Δ τὰς βάσεις ἔχόντων μείζον ἐστὶ τὸ διὰ τῆς ἄξονος.

Αλλὰ δὲ ἔσω ἢ BA τῆς AE ἐλάττω. καὶ ἐπεὶ ἢ ὑπὸ ABE γωνία ἐλάττω ἐστὶν ὀρθῆς, ἢ χθῶ ἐν τῷ $\triangle ABE$ τεταγμένης ὀρθογώνιας τῇ $\Gamma\Delta$ πρὸς ὀρθῆς ἢ $B\Theta$, ἴση ἔστω τῇ EH , καὶ ἐπέευσθωσαν αἱ $\Theta E, BH$. καὶ ἐπεὶ ἢ ὑπὸ ABE γωνία τῆς ὑπὸ AEB μείζων ἐστίν, ἢ ἄρα ὑπὸ AEB ἐλάττω ἐστὶν ὀρθῆς. ὀρθὴ δὲ ἢ ὑπὸ ΘBE . αἱ ἄρα $\Theta B, AE$ εὐθεῖαι ἐκβαλλόμεναι συμπίπτουσι. συμπίπτουσιν κατὰ τὸ K , καὶ ἢ χθῶ $\triangle B\Theta E$ τῇ KE ὁρθογώνιας ἢ $\Theta\Lambda$. ἐπεὶ ἔν ἴση ἢ ΘB τῇ EH , κοινὴ ὅν ἢ BE , καὶ περὶ ἑαυτὰς ἴσας γωνίας, ὀρθὰς γάρ, ἴση ἄρα καὶ ἢ BH τῇ ΘE . ὅ ἐπεὶ ὀρθὴ ἢ ὑπὸ $\Theta B\Lambda$, μείζων ἄρα ἢ ΘB τῆς $\Theta\Lambda$. ἢ $B\Theta$ ἄρα πρὸς ΘE ἐλάττω λόγον ἔχει ἢ πρὸς $\Theta\Lambda$. ἀλλ' ὡς ἢ $B\Theta$ πρὸς $\Theta\Lambda$ ἔτως ἢ BK πρὸς KE . ἢ ἄρα $B\Theta$ πρὸς ΘE ἐλάττω λόγον ἔχει ἢ πρὸς KE . ἢ δὲ BK πρὸς KE ἐλάττω λόγον ἔχει ἢ πρὸς BA πρὸς AE , ὡς ἐν τῷ ἐξῆς δέκνυται. πολλὰ ἄρα ἢ $B\Theta$ πρὸς ΘE ἐλάττω λόγον ἔχει ἢ πρὸς BA πρὸς AE . ἢ ἄρα BA πρὸς AE μείζονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς $B\Theta$ πρὸς ΘE , τρεῖς ἢ πρὸς EH πρὸς HB , τρεῖς πρὸς BZ . ἐπεὶ ἔν ἢ BA πρὸς AE μείζονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς EH πρὸς BZ , τὸ ἄρα ὑπὸ AB, BZ μείζον ἐστὶ τῷ ὑπὸ AE, EH . ἀλλὰ τῷ μὲν ὑπὸ AB, BZ ἴσον ἐστὶ τὸ $\triangle B\Theta E$ τῆς ἄξονος ἰσοσκελές, τῷ δὲ ὑπὸ AE, EH ἴσον ἐστὶ τὸ $\triangle B\Theta E$ τῆς AE καὶ τῆς διπλῆς τῆς EH ἰσοσκελές. μείζον ἄρα τὸ διὰ τῆς ἄξονος ἰσοσκελές τῷ διὰ τῆς AE ἰσοσκελές. ὁμοίως δὲ δέκνυ) ὅτι καὶ τῶν αἰ βάσεις μεταξὺ τῶν B, Δ σημείων. ὁ προέκδο δέξαι.



ἢ πρὸς BA πρὸς AE , ὡς ἐν τῷ ἐξῆς δέκνυται. πολλὰ ἄρα ἢ $B\Theta$ πρὸς ΘE ἐλάττω λόγον ἔχει ἢ πρὸς BA πρὸς AE . ἢ ἄρα BA πρὸς AE μείζονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς $B\Theta$ πρὸς ΘE , τρεῖς ἢ πρὸς EH πρὸς HB , τρεῖς πρὸς BZ . ἐπεὶ ἔν ἢ BA πρὸς AE μείζονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς EH πρὸς BZ , τὸ ἄρα ὑπὸ AB, BZ μείζον ἐστὶ τῷ ὑπὸ AE, EH . ἀλλὰ τῷ μὲν ὑπὸ AB, BZ ἴσον ἐστὶ τὸ $\triangle B\Theta E$ τῆς ἄξονος ἰσοσκελές, τῷ δὲ ὑπὸ AE, EH ἴσον ἐστὶ τὸ $\triangle B\Theta E$ τῆς AE καὶ τῆς διπλῆς τῆς EH ἰσοσκελές. μείζον ἄρα τὸ διὰ τῆς ἄξονος ἰσοσκελές τῷ διὰ τῆς AE ἰσοσκελές. ὁμοίως δὲ δέκνυ) ὅτι καὶ τῶν αἰ βάσεις μεταξὺ τῶν B, Δ σημείων. ὁ προέκδο δέξαι.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κθ'.

Εὰν ὀρθογώνιος τεταγμένης ἀπὸ τῆς ὀρθῆς γωνίας ἐπὶ πλὴν ὑποτείνουσιν ἀχθῇ πρὸς εὐθεῖα. ἢ ἀχθῆται

χρη δὲ ἡ ΛB ἐλάττω τῆς $\epsilon\kappa$ τοῦ κέντρου· πολλῶν ἄρα ἡ BA ἐλάττω ἐστὶ τῆς $\epsilon\kappa$ τοῦ κέντρου. ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΛΒ΄.

Εάν $\epsilon\kappa$ κοινῆς σκαληνῆς τμηθέντι διὰ τῆς κορυφῆς ἐπιπέδοις ποτὶν, ὅπῃ τῶν ἀλλήλων βάσεων ἰσοσκελὴς τριγώνω συστή, ἀφ’ ὧς μέρος ἀποκόψῃ ὁ ἄξων τὸ διὰ τῆς ἄξωνος ἰσοσκελὲς τῶν συστάτων ἰσοσκελῶν $\epsilon\kappa$ ἔσται πάντων ἐλάχιστον.

ΕΣΤΩ κοινὸς σκαληνὸς, ὃς κορυφὴ μὲν τὸ A , ἄξων δὲ ὁ AB , ὃ δὲ διὰ τῆς ἄξωνος πρὸς ὀρθὰς τῷ κύκλῳ ὀπιπέδω χ ὃς κύκλος κοινὴ τομὴ ἡ $\Gamma B \Delta$ διέμετρος, ἐλάττω δὲ ἔστω ἡ ὑπὸ $AB \Delta$ γωνία ὀρθή· λέγω ὅτι τὸ διὰ τῆς ἄξωνος ἰσοσκελὲς τῶν συστάτων ἰσοσκελῶν, τὰς βάσεις ἐχόντων μεταξὺ τῶν Γ, B σημείων, ὃ πάντων ἐλάχιστον ἐστίν.

Επεζεύχθω γὰρ ἡ AG , ὅτι ἐν τῷ $AB \Gamma$ τριγώνῳ πρὸς ὀρθὰς ἦχθω τῇ $\Gamma \Delta$ ἡ BE . χ ἐπεὶ ἡ ΓE μέζων ἐστὶ τῆς ΓB τῆς $\epsilon\kappa$ τοῦ κέντρου, ἔστω ἡ EZ ἰση τῇ $\epsilon\kappa$ τοῦ κέντρου, καὶ πρὸς τὴν EB ἦχθω ἡ ZH , καὶ ἐπεζεύχθω ἡ AMH , καὶ πρὸς τὴν ZE ἦχθω ἡ $H \Theta$. ὡς ἀλλήλοισιν ἄρα τὸ $Z \Theta$, ἰση γὰρ ἡ ZE τῇ $H \Theta$. ἡ ἄρα $H \Theta$ τῇ $\epsilon\kappa$ τοῦ κέντρου ἐστὶ ἰση. ἦχθωσαν δὲ ἡ πάλιν ἐν τῷ $\epsilon\kappa$ κύκλῳ ὀπιπέδῳ τῇ $\Gamma \Delta$ πρὸς ὀρθὰς αἱ KB, HA , ὅτι ἐπεζεύχθω ἡ BA . ἐπεὶ ἔν δὲ ὀρθογώνια τὰ $\Theta HB, ABH$ ἴσους ἔχουσιν γωνίας πρὸς ὀρθὰς, περὶ τὴν ἄλλαν γωνίαν τὰς πλευρὰς ἀνάλογον, χ τὰ λοιπὰ τῶν περὶ τὰς ὁμοίων ἄρα ἐστὶ τὰς τριγώνων ὡς ἄρα ἡ $H \Theta$ πρὸς ΘB ὥτως ἡ BA πρὸς AH . ἐπεὶ ἔν ἡ $H \Theta$ πρὸς ΘB μέζονα λόγον ἔχει ἢ περὶ HM πρὸς MB , ἢ τὴν HM πρὸς MB μέζονα λόγον ἔχει ἢ περὶ ἡ HA πρὸς AB . ἡ ἄρα $H \Theta$ πρὸς ΘB μέζονα λόγον ἔχει ἢ περὶ ἡ HA πρὸς AB . ἀλλ’ ὡς ἡ $H \Theta$ πρὸς ΘB ὥτως ἡ BA , τὰ τεστὶν ἡ BK , πρὸς AH . ἡ ἄρα BK πρὸς AH μέζονα λόγον ἔχει ἢ περὶ ἡ HA πρὸς AB . τὸ ἄρα ὑπὸ AB , BK μείζον ἐστὶ τῷ ὑπὸ AH , HA , τὰ τεστὶν τὸ διὰ τῆς ἄξωνος ἰσοσκελὲς μείζον ἐστὶ τῷ διὰ τῆς AH ἰσοσκελὲς, ὃ βάσις ἐστὶν ἡ διπλὴ τῆς AH . οὐκ ἄρα τὸ διὰ τῆς ἄξωνος ἰσοσκελὲς ἐλάχιστον ἐστὶ πάντων τῶν μεταξὺ τῶν B, Γ σημείων τὰς βάσεις ἐχόντων ἰσοσκελῶν.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΛΓ΄.

Εάν ὅπῃ τῆς αὐτῆς βάσεως δύο τρίγωνα συστή, χ ὃ μὲν ἐτέρω ἢ πλευρᾷ πρὸς ὀρθὰς ἢ τῇ βάσει, ὃ δὲ ἐτέρω πρὸς ἀμβλείαν, τὸ δὲ ὃ ἀμβλυγων-


est autem ΛB minor semidiametro basis; quare & BA semidiametro basis multo minor erit. quod erat demonstrandum.

PROP. XXXII. Theor.

Si, cono scaleno planis per verticem secto, super bases parallelas triangula æquicrura constituentur, ad eam partem à qua axis declinat: triangulum æquicrura per axem transiens non erit omnium ejusmodi æquicrurum triangulorum minimum.

SIT conus scalenus cujus vertex A , axis AB , [basis circulus circa B centrum] plani vero per axem ad rectos angulos circulo ducti & ipsius circuli communis sectio sit diameter $\Gamma B \Delta$; sitque $AB \Delta$ angulus recto minor: dico triangulum æquicrura per axem transiens non esse minus omni triangulo æquicruri inter puncta Γ, B basin habente.

Jungatur enim AG ; & in triangulo $AB \Gamma$ ad rectos angulos ipsi $\Gamma \Delta$ ducatur BE . quoniam itaque ΓE major est semidiametro basis ΓB , capiatur EZ æqualis semidiametro, & ducatur ZH ipsi EB parallela; jungaturque AMH , & ducatur $H \Theta$ parallela ipsi ZE : $Z \Theta$ itaque parallelogrammum est, propterea quod ZB ipsi $H \Theta$ est æqualis; est igitur $H \Theta$ æqualis semidiametro basis. denique in circuli plano ducantur



KB, HA ad rectos angulos ipsi $\Gamma \Delta$, & jungatur BA . quoniam igitur duo triangula orthogonia $\Theta HB, ABH$ æquales habent rectos angulos, & circa alios angulos latera proportionalia, & reliquorum uterque est acutus; erunt [per 7. 6.] ea triangula inter se similia: & ideo ut $H \Theta$ ad ΘB ita BA ad AH . habet autem $H \Theta$ ad ΘB [per 2. huj.] majorem rationem quam HM ad MB ; & HM ad MB item majorem quam HA ad AB : ergo $H \Theta$ ad ΘB majorem rationem habebit quam HA ad AB . sed ut $H \Theta$ ad ΘB , ita BA sive BK ad AH : quapropter BK ad AH majorem habet rationem quam HA ad AB : rectangulum igitur ABK [per 1. huj.] majus est rectangulo AHA , hoc est triangulum æquicrura per axem majus triangulo æquicruri per AH , cujus basis est ipsius AH dupla: quare triangulum æquicrura per axem non minus est omni ejusmodi triangulo inter puncta B, Γ basin habente.

PROP. XXXIII. Theor.

Si super eandem basin duo triangula constituentur, & unius quidem latus sit ad rectos angulos basi, alterius vero ad angulos obtusos, sitque amblygonii


[] Q

amblygonii trianguli altitudo non minor altitudine orthogonii: angulus qui ad orthogonii verticem angulo qui ad verticem amblygonii major erit.

νίς ὑψος μὴ ἔλαττον ἢ ἔ' ὀρθογωνίᾳς ὑψους· ἢ
 πρὸς τῇ κορυφῇ γωνία δ' ὀρθογωνίᾳς μείζων ἔσται
 ἢ πρὸς τῇ κορυφῇ δ' ἀμβλυγωνίᾳς.

CONSTITUANTUR super basim AB triangula AFB , ADB , angulusque ABF sit rectus, & ABD obtusus; recta vero, quæ à puncto A ad AB basim perpendicularis ducitur, videlicet AZ , non minor sit perpendiculari FB : dico angulum AFB angulo ADB majorem esse.

Quoniam enim parallelæ sunt $B\Gamma$, ΔZ , & ad rectos angulos ipsi ABZ , non minor autem ΔZ quam ΓB ; erit $\Delta\Gamma$ angulus non minor recto: quare [per 19. 1.] $\Delta\Delta$ major erit quam $\Delta\Gamma$, & cum triangulum $AB\Gamma$ orthogonium sit, in semicirculo continetur [per 31. 3.] cujus diameter est $A\Gamma$: ergo descriptus circa ipsam semicirculus rectam $A\Delta$ secabit. secet in E , & jungatur EB : erit igitur angulus AEB [per 21. 3.] æqualis angulo $\Delta\Gamma B$. sed angulus AEB [per 16. 1.] est major ipso $\Delta\Delta B$: ergo $\Delta\Gamma B$ angulus angulo $\Delta\Delta B$ major erit.



ΣΥΝΕΣΤΑΤΩ $\triangle\eta\iota\epsilon$ $\tau\epsilon$ $\alpha\beta$ $\pi\alpha$ $\alpha\gamma\beta$, $\alpha\delta\beta$ τρι-
γωνα, ϵ η $\mu\epsilon\tau$ ϵ $\alpha\beta\gamma$ ϵ ω $\theta\rho\eta$, η $\delta\epsilon$ ϵ $\alpha\beta\delta$
 $\alpha\mu\beta\lambda\epsilon\iota\alpha$, η $\delta\epsilon$ $\delta\alpha\tau\epsilon$ ϵ δ $\alpha\lambda\epsilon\tau\epsilon$ $\triangle\eta\iota$ $\tau\mu\epsilon$
 $\alpha\beta$ η $\delta\epsilon$ $\alpha\beta$ $\mu\eta$ ϵ $\lambda\alpha\tau\tau\epsilon$ ϵ ω τ $\gamma\beta$ $\alpha\lambda\epsilon\tau\epsilon$ $\lambda\epsilon$ $\gamma\omega$
 ϵ $\pi\mu$ $\mu\epsilon$ $\lambda\epsilon$ ω ϵ $\pi\eta$ η ϵ $\alpha\beta\gamma$ τ ϵ $\alpha\beta\delta$ $\gamma\omega$ $\nu\iota\alpha$.

Επει αὐτοὶ ἄλλοι μὲν αἱ
ΒΓ, ΔΖ, καὶ πρὸς ὁρθὰς τῇ
ΑΒΖ, ὅση ἐλάττων δὲ ἡ ΔΖ
τῇ ΓΒ· ἡ ἄρα ὑπὸ ΑΓΔ
γωνία ἐκ ἐλάττων ἐστὶν ὀρθή·
μείζων ἄρα ἡ ΑΔ τῇ ΑΓ. καὶ
ἐπεὶ τὸ ΑΒΓ ὀρθογώνιον ἐστίν,
ἐν ἡμικυκλίῳ ἄρα ἐστὶν ἡ
διὰ μέτρος ἡ ΑΓ· ὡς ἐφα-
φθέν ἄρα τὸ ἡμικύκλιον πε-
ρὶ τὴν ΑΔ. πεμνέτω δὴ

καὶ τὸ Ε, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ ΕΒ· ἴση ἄρα ἡ ὑπο-
 ΑΕΒ τῇ ὑπο ΑΓΒ· ἀλλὰ ἡ ὑπο ΑΕΒ μείζων
 ἐστὶ τῇ ὑπο ΑΔΒ· καὶ ἡ ὑπο ΑΓΒ ἄρα μείζων
 ἐστὶ τῆς ὑπο ΑΔΒ.

PROP. XXXIV. *Theor.*


Iisdem positis, si trianguli orthogonii angulus ad verticem non major sit eo qui continetur sub recta vertices triangulorum conjungente & latere amblygonii quod obtusum angulum cum basi efficit: ea quæ in triangulo orthogonio subtendit angulum rectum ad eam quæ est ad rectos angulos basi minorem habet rationem quàm quæ subtendit angulum obtusum in amblygonio ad eam quæ cum basi facit angulum obtusum.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ λδ'.

Τῶν αὐτῶν ὄντων, ἐὰν τῷ ὀρθογωνίῳ ἡ πρὸς τῇ κορυφῇ γωνία μὴ μείζων ἢ $\frac{\pi}{2}$ περιεχομένης γωνίας ὑπὸ τε τῆς αὐτῆς κορυφᾶς τῶν τετραγώνων ἐπιξυγνύσῃ καὶ τῆς πρὸς ἀμβλείᾳ τῇ βάσει ἡ πῶ ὀρθῇ ἐκποτένῃσαι ὁ ὀρθογωνίος πλευρὰ πρὸς πῶ πρὸς ὀρθὰς τῇ βάσει ἐλάττωσα λόγον ἔχει ἥπερ ὁ ἀμβλυγωνίος ἢ ἡ ἀμβλείαν ἐκποτένῃσαι πρὸς $\frac{1}{2}$ πρὸς ἀμβλείαν τῇ βάσει.

DESCRIBANTUR triangula, & sit $\angle A\Gamma B$ angulus non major angulo $\Gamma \Delta B$: dico $A\Gamma$ ad ΓB minorem habere rationem quam $A\Delta$ ad ΔB .

Quoniam enim angulus ΓB major est angulo $A \Delta B$ (ut [in anteced.] ostensum fuit) & angulus $\Gamma A B$ major angulo $\Delta A B$, constituatur ipsi quidem angulo ΓB æqualis angulus $A \Delta H$, angulo autem $\Gamma A B$ æqualis $\Delta A H$: erunt itaque trian- gula $\Gamma B, A \Delta H$ æquiangula & similia: quare ut ΔA ad ΓA ita $H A$ ad $A B$; & con- tinent æquales angulos: junctâ igitur BH , tri- angulum $\Delta A \Gamma$ [per 6. 6.] triangulo $H A B$ simile erit, & angulus $\Gamma A \Delta$ angulo $A B H$ æqualis. quo-



ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΦΘΩ ΠΑΡ' Αὐτὰ τέλῃνας, ἑξῆς ἡ
ὑπὸ ΑΓΒ μὴ μεῖζαν τ' ὑπὸ ΓΔΒ· λέγας

ὅτι ἡ ΑΓ πρὸς ΓΒ ἐλάττωσα
λόγον ἔχει ἢ περὶ ἡ ΑΔ πρὸς ΔΒ.

Επει μείζων ἐστὶν ἡ μὲν ὑπὸ
ΑΓΒ ἢ ὑπὸ ΑΔΒ, ὡς ἐδεί-
χθη, ἡ δὲ ὑπὸ ΓΑΒ τῆς
ὑπὸ ΔΑΒ, συνεστέτω τῇ μὲν
ὑπὸ ΑΓΒ ἴση ἢ ὑπὸ ΑΔΗ,
τῇ δὲ ὑπὸ ΓΑΒ ἢ ὑπὸ ΔΑΗ·
ισογώνια ἄρα ἐστὶ καὶ ΑΓΒ,
ΑΔΗ τεύγωνα καὶ ὅμοια· ὡς
ἄρα ἡ ΔΑ πρὸς ΑΓ ἕτως ἢ
ΗΑ πρὸς ΑΒ, καὶ ἀεὶ ἴσχυται

ἴσους γωνίας· ὅμοιον ἄρα τὸ ΔΑΓ τετραγώνον τῷ
ΗΑΒ τετραγώνῳ, διὰ τὴν ὁμοιότητάς τ' ΒΗ· ἡ ἄρα
ὑπὸ ΑΓΔ γωνία τῇ ὑπὸ ΑΒΗ ἰση ἐστίν· ἐπεὶ

ἔν η' ΔΖ τ' ΓΒ ἐκ ἑστὶν ἐλάττων, ἢ τῇ ἰσῇ ἐστὶν ἢ μείζων. ἔστω πρῶτον ἰσὴ· ὀρθογώνιον ἄρα ἐστὶ πρὸς ἀλλήλοισιν ἡ γωνία τὸ ΓΖ· ἢ ἄρα ὑπὸ ΔΓΒ μὲν τ' ὑπὸ ΓΒΔ, ΔΒΖ δὲ οὖν ὀρθαῖς ἰσῶν εἰσὶν. ἀλλὰ τ' ὑπὸ ΓΔΒ, τῆς τε τ' ὑπὸ ΔΒΖ, ἢ μείζων ἐστὶν ἢ ὑπὸ ΑΓΒ· ἢ ἄρα ὑπὸ ΔΓΒ μὲν τ' ὑπὸ ΓΒΔ, ΑΓΒ ἢ μείζονες εἰσι δὲ οὖν ὀρθῶν, ὅ ἐστιν αἱ ὑπὸ ΑΓΔ, ΓΒΔ ἢ μείζονες εἰσι δὲ οὖν ὀρθῶν. ἀλλὰ τῇ ὑπὸ ΑΓΔ ἰσῇ ἐστὶν ἢ ὑπὸ ΑΒΗ· αἱ ἄρα ὑπὸ ΑΒΗ, ΓΒΔ ἢ μείζονες εἰσι δὲ οὖν ὀρθῶν. πρὸς κεῖναι ἢ ὑπὸ ΑΒΓ ὀρθή· αἱ ἄρα ὑπὸ ΑΒΗ, ΑΒΔ ἢ μείζονες εἰσι τριῶν ὀρθῶν· λοιπὴ ἄρα εἰς τεσσάρων ὀρθῶν ἢ ὑπὸ ΔΒΗ ἐκ ἐλάττων ἐστὶ μίαν ὀρθή· μείζων ἄρα ἢ ΗΔ τ' ΔΒ· ἢ ἄρα ΑΔ πρὸς ΔΗ ἐλάττωνα λόγον ἔχει ἢ περὶ ΑΔ πρὸς ΔΒ. ἀλλ' ὡς ἢ ΑΔ πρὸς ΔΗ ἔστω ἢ ΑΓ πρὸς ΓΒ· καὶ ἢ ἄρα ΑΓ πρὸς ΓΒ ἐλάττωνα λόγον ἔχει ἢ περὶ ΑΔ πρὸς ΔΒ.


Αλλὰ δ' ἔστω ἢ ΔΖ τῆς ΓΒ μείζων· ἀμβλείαν ἄρα ἢ ὑπὸ ΔΓΒ· ἢ χθῶν τῇ ΓΔ πρὸς ἀλλήλους ἢ ΒΕ. καὶ κατὰ ταῦτα, ἐπεὶ ἢ ὑπὸ ΔΓΒ μὲν τ' ὑπὸ ΓΒΔ, ΔΒΕ δὲ οὖν ὀρθαῖς ἰσῶν εἰσὶν, ἀλλὰ τ' ὑπὸ ΔΒΕ, τῆς τε τ' ὑπὸ ΓΔΒ, ἢ μείζων ἐστὶν ἢ ὑπὸ ΑΓΒ· αἱ ἄρα ὑπὸ ΑΓΔ, ΓΒΔ, τῆς τε αἱ ὑπὸ ΑΒΗ, ΓΒΔ, ἢ μείζονες εἰσι δὲ οὖν ὀρθῶν· αἱ ἄρα ὑπὸ ΑΒΔ, ΑΒΗ ἢ μείζονες εἰσι τριῶν ὀρθῶν· ἢ ἄρα ὑπὸ ΔΒΗ ἐκ ἐλάττων ὀρθῆς ἐστὶ μείζων ἄρα ἢ ΗΔ τ' ΔΒ· ἢ ἄρα ΑΔ πρὸς ΔΗ, τῆς τε αἱ ΑΓ πρὸς ΓΒ, ἐλάττωνα λόγον ἔχει ἢ περὶ ΑΔ πρὸς ΔΒ. ὅπερ εἶδει δεῖξαι.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ λε'.

Τῶν αὐτῶν ὄντων τ' ἄλλων, ἐὰν ὀρθογώνιος ἢ τ' ὀρθὴν ὑποτείνουσα πρὸς τ' πρὸς ὀρθῆς τῇ βάσει μείζονα λόγον ἔχει ἢ περὶ ἀμβλυγώνιος ἢ τ' ἀμβλείαν ὑποτείνουσα πρὸς τ' πρὸς ἀμβλείαν τῇ βάσει· ἢ πρὸς τῇ κορυφῇ ὀρθογώνιος γωνία μείζων ὅτι τ' πρὸς ἀμβλυγώνιος γωνία ὑπὸ τῇ κορυφῇ τ' τετράγωνον ὅτις ἀμβλυγώνιος καὶ τ' πρὸς ἀμβλείαν τῇ βάσει.

ΚΕΙΣΘΩ ἢ αὐτὴ κατασκευασμένη. ἐπεὶ ἔν η' ΑΓ πρὸς ΓΒ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περὶ ΑΔ πρὸς ΔΒ, ὡς ἢ ἢ ΑΓ πρὸς ΓΒ ἔστω ἢ ΑΔ πρὸς ΔΗ· ἔν η' ἄρα ΑΔ πρὸς ΔΗ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περὶ ΑΔ πρὸς ΔΒ· ἐλάττωνα ἄρα ἢ ΗΔ τ' ΔΒ· ἢ ἄρα ὑπὸ ΔΒΗ γωνία ἐλάττω ἐστὶν ὀρθῆς μίαν· λοι-


niam igitur ΔΖ non est minor ipsa ΓΒ, vel æqualis erit vel major. sit primum æqualis: ergo ΓΖ parallelogrammum est rectangulum; & propterea angulus ΔΓΒ una cum angulis ΓΒΔ, ΔΒΖ [per 32. 1.] est æqualis duobus rectis. sed [ex hypothesi] angulo ΓΔΒ, hoc est ΔΒΖ, non major est angulus ΑΓΒ: ergo angulus ΔΓΒ una cum angulis ΓΒΔ, ΑΓΒ, videlicet anguli ΑΓΔ, ΓΒΔ, non sunt duobus rectis majores. angulo autem ΑΓΔ æqualis est angulus ΑΒΗ: anguli igitur ΑΒΗ, ΓΒΔ non sunt majores duobus rectis. apponatur angulus ΑΒΓ rectus; quare anguli ΑΒΗ, ΑΒΔ non sunt majores tribus rectis: & idcirco angulus ΔΒΗ, reliquus ex quatuor rectis, non erit recto minor: major igitur ΗΔ quam ΔΒ; adeoque ΑΔ ad ΔΗ minorem habet rationem quam ΑΔ ad ΔΒ. sed ut ΑΔ ad ΔΗ ita ΑΓ ad ΓΒ; ergo ΑΓ ad ΓΒ minorem rationem habebit quam ΑΔ ad ΔΒ.



Sed sit ΔΖ major quam ΓΒ: ergo ΔΓΒ angulus est obtusus. itaque ducatur ΒΕ ipsi ΓΔ parallela. & quoniam angulus ΔΓΒ una cum angulis ΓΒΔ, ΔΒΕ est æqualis duobus rectis; angulo autem ΔΒΕ, hoc est ΓΔΒ, non major est angulus ΑΓΒ: erunt, eadem ratione qua supra, anguli ΑΓΔ, ΓΒΔ, hoc est ΑΒΗ, ΓΒΔ, non majores duobus rectis; adeoque ΑΒΔ, ΑΒΗ non sunt majores tribus rectis; proinde ΔΒΗ non est recto minor: ΗΔ igitur major est quam ΔΒ, & idcirco ΑΔ ad ΔΗ, hoc est ΑΓ ad ΓΒ, minorem habet rationem quam ΑΔ ad ΔΒ. quod erat demonstrandum.


PROP. XXXV. Theor.

Cæteris manentibus, si in triangulo orthogonio, quæ subtenditur angulo recto ad eam quæ est ad rectos angulos basi majorem rationem habeat, quam quæ subtenditur angulo obtuso in amblygonio ad eam quæ est ad angulum obtusum: angulus ad verticem orthogonii major est angulo sub rectâ verticibus triangulorum jungente & eâ quæ cum basi est ad angulum obtusum.



PONATUR eadem figura, iisdem constructis. quoniam itaque ΑΓ ad ΓΒ majorem rationem habet quam ΑΔ ad ΔΒ; ut autem ΑΓ ad ΓΒ ita ΑΔ ad ΔΗ; habebit ΑΔ ad ΔΗ majorem rationem quam ΑΔ ad ΔΒ; & ob id minor erit ΗΔ quam ΔΒ: angulus igitur ΔΒΗ minor erit recto: quare reliqui ΑΒΔ, ΑΒΗ tribus

bus rectis sunt majores. sed angulus ABH æqualis est angulo AGD: ergo anguli AGD, ABD majores sunt tribus rectis. auferatur angulus rectus ABG, & erunt anguli AGD, GBD duobus rectis majores. quoniam igitur angulus BGD una cum angulis AGB, GBD est major duobus rectis; una vero cum ipsis GAB, GBD est duobus rectis æqualis: sequitur angulum AGB angulo GAB majorem esse.




ποιήσεται αὐτὸν ὑπὸ ABΔ, ABH μείζονες εἶσι τριῶν ὀρθῶν. ἀλλ' ἡ ὑπὸ ABH ἴση τῇ ὑπὸ AGΔ· αἱ ἄρα ὑπὸ AGΔ, ABΔ μείζονες εἶσι τριῶν ὀρθῶν. ἀφαιρήσθω ἡ ὑπὸ ABΓ ὀρθή· αἱ ἄρα ὑπὸ AGΔ, ΓΒΔ δυεῖν ὀρθῶν μείζονες εἶσι. ἐπεὶ δὲ ἡ ὑπὸ BΓΔ μὲν μὴ τῇ ὑπὸ AGB, ΓΒΔ δυεῖν ὀρθῶν εἶσι μείζους, μὲν δὲ τῇ ὑπὸ ΓΔΒ, ΓΒΔ, δυεῖν ὀρθῶν ἴση· μείζων ἄρα ἡ ὑπὸ AGB τῆς ὑπὸ ΓΔΒ.

PROP. XXXVI. Theor.

Si, cono scaleno per verticem planis secto, super bases parallelas triangula æquicrura constituentur, ad eam partem à qua axis declinat: triangulum æquicrura per axem transiens omnium ejusmodi triangulorum neque maximum, neque minimum erit.

SIT conus, cujus axis AB, & basis circulus circa B centrum; plani vero per axem ad rectos angulos circulo, & ipsius circuli communis sectio fit ΓΒΔ; sitque angulus ABΔ recto minor: dico triangulum æquicrura per axem triangulorum omnium æquicrurum, quæ bases habent inter puncta, Γ, Β, neque maximum esse, neque minimum.

Vel enim axis est minor basis semidiametro, vel major, vel ipsi æqualis. sit primum minor. & quoniam AB minor est semidiametro basis, aptetur AE æqualis semidiametro; perque puncta B & E ducantur in circulo EZ, BH ad rectos angulos ipsi ΓΔ: & angulo AEB æqualis fiat angulus EBΘ, & jungatur ΘE. quoniam igitur utraque AE, BΘ æqualis est semidiametro, communis autem BE, & continent æquales angulos; reliqua quoque [per 6. 6.] erunt æqualia & triangula inter se similia; quapropter ut EA ad AB ita BΘ ad ΘE. & quoniam [per 7. 3.] ZE major est quam EΘ, æquales autem BH, BΘ; habebit BΘ ad ΘE majorem rationem quam BH ad ZE. sed ut BΘ ad ΘE ita EA ad AB: quapropter EA ad AB majorem rationem habet quam BH ad EZ; & idcirco [per 1. huj.] rectangulum AEZ majus est rectangulo ABH, hoc est triangulum æquicrura per AE, cujus basis est dupla ipsius EZ, majus est triangulo æquicruri per axem: triangulum igitur æquicrura per axem non est omnium ejusmodi triangulorum maximum. sed ostensum est universum, in trigesima secunda hujus, non minimum esse; quare neque maximum omnium, neque minimum est.



ΠΡΟΤΑΣΙΣ λς'.

Εάν ἐν κώνῳ σκαληνῷ τμηθέντι διὰ τὸ κορυφῆς ἐπιπέδῳ πρὸς τὸν ὅτι τὸ ἀλλήλων βάσεων ἰσοσκελῆ τριγώνια συστήσῃ, αὐτὸ μέρους ἀποσπένδῃ ὁ ἄξων τὸ διὰ τὸ ἄξωνος ἰσοσκελὲς τῶν, ὡς εἴρηται, συνισταμένων ἰσοσκελῶν ἔτε μέγιστον ἔσται πάντων, ἔτε ἐλάχιστον.

ΕΣΤΩ κώνος, ὃς ἄξων ὁ AB, βάσις δὲ ὁ περὶ τὸ B κέντρον κύκλος, ὃς δὲ διὰ τὸν ἄξωνος πρὸς ὀρθὰς γωνίας τῶν κύκλων διημιπέδῳ καὶ τῷ κύκλῳ κοινῇ τμήνῃ ΓΒΔ, ἡ δὲ ὑπὸ ABΔ ἐλάττω ἔστω ὀρθῆς· λέγω ὅτι τὸ διὰ τὸ ἄξωνος ἰσοσκελὲς τῶν συνισταμένων ἰσοσκελῶν, τὰς βάσεις ἔχοντων μεταξὺ τῶν Γ, Β σημείων, ἔτε μέγιστον ἐστὶ πάντων, ἔτε ἐλάχιστον.


Ὁ δὲ ἄξων ἢ τοι ἐλάττω ἐστὶ τῶν κέντρων τῶν βάσεων, ἢ ἴσος αὐτῇ, ἢ μείζων. ἔστω πρῶτον ἐλάττω. ἐπεὶ δὲ ἡ AB ἐλάττω ἐστὶ τῶν κέντρων, ἐνημιόσω ἴση τῇ κέντρων ἡ AE, καὶ διὰ τῶν B καὶ E σημείων τῇ ΓΔ πρὸς ὀρθὰς ἡχθῶσιν ἐν τῷ κύκλῳ αἱ EZ, BH, καὶ τῇ ὑπὸ AEB ἴση συνεχώστω ἡ EBΘ, καὶ ἐπεζεύχτω ἡ ΘE. ἐπεὶ δὲ ἐκάτερα τῶν AE, BΘ ἴση ἐστὶ τῇ κέντρων, κοινῇ δὲ ἡ BE, καὶ περιέχουσιν ἴσους γωνίας· καὶ τοι λοιπὰ ἄρα τοῖς λοιποῖς ἴσα· ὁμοία ἄρα τὰ τριγώνια· ὡς ἄρα ἡ EA πρὸς AB ἔστω ἡ BΘ πρὸς ΘE. ἐπεὶ δὲ μείζων ἡ ZE τῇ EΘ, ἴση δὲ αἱ BH, BΘ· ἡ ἄρα BΘ πρὸς ΘE μείζονα λόγον ἔχει ἢ περὶ ἡ BH πρὸς ZE. ἀλλ' ὡς ἡ BΘ πρὸς ΘE ἔστω ἡ EA πρὸς AB· ἡ ἄρα EA πρὸς AB μείζονα λόγον ἔχει ἢ περὶ ἡ BH πρὸς EZ· τὸ ἄρα ὑπὸ AE, EZ μείζον ἐστὶ ὑπὸ AB, BH, τὰ τεταῖα τὸ διὰ τὸ AE ἰσοσκελὲς, ὃς βάσις ἐστὶν ἡ διπλὴ τῇ EZ, ὃς δὲ ἄξωνος ἰσοσκελὲς μείζον ἐστὶ· τὸ ἄρα διὰ τὸ ἄξωνος ἰσοσκελὲς ἔτε πάντων μέγιστον ἐστὶ, ὡς εἴρηται, συνισταμένων τριγώνων. ἐδείχθη δὲ (ἐν τῷ τριακῶν δότῳ) καὶ ὅτι, ὅτι ἐδὲ ἐλάχιστον ἔτε ἄρα μείζον ἐστὶ πάντων, ἔτε ἐλάχιστον.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΛΖ'.

PROP. XXXVII. Theor.

ΑΛΛΑ δὴ ἔστω ὁ ΑΒ ἄξων ἴσος τῇ ἐκ τῆς κέντρης, ἢ δὲ ὑπὸ ΑΒΔ γωνία, ἐλάττω ὅσα ὀρθῆς, ἢτοι ἐλάττω ἐστὶν ἡμισείας ὀρθῆς ἢ ἕ. ἔστω περὶ τὸν ἐλάττω ἡμισείας, καὶ διὰ τῆς Α, ἐν τῷ ὀρθῷ πρὸς τὸν κύκλον ὀρθοπέδῳ, ὁμοῦ ἡμισημικλῶς ἡχθῶ τῇ ΓΒ ἢ ΑΕ, ἢ πρὸς ὀρθῆς ἢ ΒΕ, τῇ δὲ ΑΒ ὁμοῦ ἡμισημικλῶς ἢ ΕΖ, καὶ ἐπεξέχθῳ ἢ ΖΑ, ἐν δὲ τῷ κύκλῳ τῇ ΓΔ πρὸς ὀρθῆς ἡχθῶσιν αἱ ΒΘ, ΖΗ, καὶ ἐπεξέχθῳ ἢ ΒΗ. Ἐπεὶ ἔν ἡ ὑπὸ ΑΒΔ ἐκ ἐλάττω ἐστὶν ἡμισείας ὀρθῆς, καὶ ἡ ὑπὸ ΒΑΕ ἄρα ἐκ ἐλάττω ἐστὶν ἡμισείας ἢ ἄρα ὑπὸ ΕΒΑ, τετέστιν ἡ ὑπὸ ΖΕΒ, ἢ μείζων ἐστὶν ἡμισείας ὀρθῆς ἢ ἄρα ὑπὸ ΖΕΒ ἢ μείζων ἐστὶν ἢ ὑπὸ ΕΑΒ. ἔπειτα ἔν δύο τρίγωνα τὰ ΖΕΒ, ΖΑΒ ὅτι μίαν βάσεως συνέσκη, καὶ ἡ δὲ ΑΒ κἀκεῖτος ὅτι τῇ ΓΔ ἀνομοῦ, ὡς ἡ ΑΚ, ἐκ ἐστὶν ἐλάττω ἢ ΕΒ, ἢ δὲ ὑπὸ ΖΕΒ ὁρθογωνία γωνία ἢ μείζων ἐστὶν ἢ ὑπὸ ΕΑΒ ἢ ἄρα ΖΕ πρὸς ΕΒ ἐλάττω λόγον ἔχει ἢ περὶ ἢ ΖΑ πρὸς ΑΒ, διὰ τὸ τριακωσὸν πέμπτον θεωρημα. ὡς δὲ ἡ ΖΕ πρὸς ΕΒ ἔστω ἢ ΒΗ, τετέστιν ἢ ΒΘ, πρὸς ΖΗ. (ἴση γὰρ ἢ ΒΕ τῇ ΖΗ ἢ ΕΖ τῇ ἐκ τῆς κέντρης) καὶ ἡ ΒΘ ἄρα πρὸς ΖΗ ἐλάττω λόγον ἔχει ἢ περὶ ἢ ΖΑ πρὸς ΑΒ. τὸ ἄρα ὑπὸ ΑΒ, ΒΘ ἐλάττω ἐστὶν ὑπὸ ΑΖ, ΖΗ, τετέστι τὸ διὰ τῆς ἄξωνος ἰσοσκελὲς ἐλάττω ἐστὶν ὑπὸ ΑΖ ἰσοσκελὲς ἐκ ἄρα τὸ διὰ τῆς ἄξωνος ἰσοσκελὲς μέγιστον ἐστὶ πάντων τῶν, ὡς εἴρηται, συνισταμένων ἰσοσκελῶν.

ΑΛΛΑ δὴ ἔστω ἡ ὑπὸ ΑΒΔ ἐλάττω ἡμισείας ὀρθῆς, καὶ ἐκ ἐλάττω ἢ ΑΒ ὅτι τὸ Ε, ἐκείτω ἢ ΒΕ ἴση τῇ ἡμισείας τῆς ἐκ τῆς κέντρης, καὶ ἐν τῷ ὀρθῷ πρὸς τὸν κύκλον ὀρθοπέδῳ (ἐν ᾧ καὶ ἡ ΑΕ) τῇ ΑΕ πρὸς ὀρθῆς ἡχθῶ ἢ ΕΖ, τῇ δὲ ΓΔ πρὸς ὀρθῆς ἢ ΒΗ, καὶ ὑποταθέντων τῶν ὑπὸ ΖΒΗ γωνίαν ἢ ΖΗ εὐθεία, ἴση συσταθείσῃ τῇ ἐκ τῆς κέντρης, καὶ ἐπεξέχθῳ ἢ ΖΑ. Ἐπεὶ ἔν ἡ ὑπὸ ΑΒΔ, τετέστιν ἡ ὑπὸ ΖΒΕ, ἐλάττω ἐστὶν ὀρθῆς ἡμισείας, ὀρθῇ δὲ ἢ πρὸς τῷ Ε. ἢ ἄρα ΒΕ τῆς ΕΖ μείζων. καὶ ἔπειτα τὸ δὲ ΖΒ ἴσον ἐστὶ τῷ ΖΕ, ὡς μείζων τὸ δὲ ΖΕ ΕΒ τῷ δὲ ΖΕ. τὸ ἄρα δὲ ΖΒ ἐλάττω ἐστὶ ἢ διπλασίον τῷ δὲ ΖΕ. τὸ ἄρα δὲ ΖΗ μείζων ἢ διπλασίον ἐστὶ τῷ δὲ ΖΒ. λοιπὸν ἄρα τῷ δὲ ΖΗ ἐλάττω ἢ διπλασίον ἐστὶ τὸ δὲ ΖΗ. καὶ ἔπειτα ἡ ΕΒ ἡμισεία ἐστὶ τῆς ἐκ τῆς κέντρης, τὸ ἄρα δὲ ὑπὸ ΑΒ, ΒΕ ἴσον ἐστὶ τῷ δὲ ΖΑ. ἔπειτα ἔν τῷ δὲ ΖΑ ἴσον ἐστὶ τῷ δὲ ΑΒ, ΒΖ καὶ τῷ δὲ ὑπὸ ΑΒ, ΒΕ, ἀλλὰ τὸ δὲ ὑπὸ ΑΒ, ΒΕ ἴσον ἐστὶ τῷ δὲ ΑΒ. τὸ ἄρα δὲ ΖΑ ἴσον ἐστὶ τῷ δὲ ΑΒ καὶ τῷ δὲ ΒΖ. τὸ ἄρα δὲ ΖΑ μείζων ἢ διπλασίον ἐστὶ



SED fit axis AB semidiametro æqualis; angulus autem ABD recto minor, vel minor est semirecto, vel non. sit primum non minor semirecto, & per A in plano ad circulum recto ducatur AE ipsi GB parallela, & eidem ad rectos angulos recta BE, sitque EZ parallela ipsi AB; jungaturque ZA: in circulo autem ducantur BΘ, ZH ad rectos angulos ipsi ΓΔ, & jungatur BH. Quoniam igitur angulus ABD non est minor semirecto, neque [per 27. 1.] BAE semirecto minor erit: ergo EBA, hoc est ZEB, non est major semirecto, & ideo ZEB angulus non major est angulo EAB: itaque duo trianguula ZEB, ZAB super eandem basin constituta sunt, & perpendicularis

ris à puncto A ad ΓΔ ducta, videlicet AK, non est minor ipsa EB. angulus autem ZEB orthogonii trianguli non major est angulo EAB; quare, ex trigesimo quarto theoremate, ZE ad EB minorem habet rationem quam ZA ad AB. sed ut ZE ad EB ita BH, hoc est BΘ, ad ZH; (æqualis enim est BE ipsi ZH, & EZ basis semidiametro) ergo BΘ ad ZH minorem habet rationem quam ZA ad AB: & propterea [per 1. huj.] rectangulum ABΘ minus est rectangulo AZH, hoc est triangulum æquicrurum per axem minus triangulo æquicruri per AZ. igitur triangulum æquicrurum per axem omnium ejusmodi triangulorum maximum non erit.

Sit deinde angulus ABD minor medietate recti; & producaturs AB usque ad E, ita ut BE fit æqualis dimidio semidiametri; in plano autem ad circulum recto, in quo est AE, ducatur EZ ad ipsam AE perpendicularis, & BH perpendicularis ad ΓΔ, & angulo ZBH subtendatur ZH æqualis semidiametro, jungaturque ZA. Quoniam igitur angulus ABD, hoc est ZBE, minor est semirecto,


rectus autem qui ad E, erit BE major quam EZ: & quoniam quadratum ex ZB æquale est quadratis ex ZE, EB; quorum quidem quadratum ex EB majus est quadrato ex ZE: quadratum igitur ex ZB minus est quam duplum quadrati ex BE; & propterea quadratum ex ZH majus quam duplum qua-

drati ex ZB: quadratum igitur ex ZH minus erit quam duplum reliqui quadrati ex BH. & quoniam EB dimidia est semidiametri; quod bis continetur sub AB, BE æquale est quadrato ex BA. sed [per 12.2.] quadratum ex ZA est æquale quadratis ex AB, BZ una cum duplo rectanguli ABE; duplum vero rectanguli ABE æquale est quadrato ex AB: quadratum igitur ex ZA duplo quadrati ex AB & quadrato ex BZ æquale erit: ergo quadratum ex ZA majus est quam duplum quadrati

[] R

quadrati

quadrati ex AB. demonstratum autem est quadratum ex ZH minus esse quam duplum quadrati ex HB; quadratum igitur ex ZH ad quadratum ex HB minorem rationem habet quam quadratum ex ZA ad quadratum ex AB: ergo & ZH ad HB minorem habet rationem quam ZA ad AB. quod si rursus in circulo ducantur ZK, BΘ ad rectos angulos ipsi ΓΔ, & jungatur BK; habebit BΘ ad ZK minorem rationem quam ZA ad AB: triangulum igitur æquicrurum per axem minus est triangulo æquicruri per AZ ducto: quare triangulum æquicrurum per axem non erit omnium triangulorum, de quibus dictum est, maximum: ostensum autem est non esse minimum, adeoque neque maximum neque minimum est.




τὸ δὲ ἀπὸ AB. ἐδείχθη δὲ τὸ δὲ ἀπὸ ZH ἐλάττω ἢ διπλάσιον ἢ δὲ ἀπὸ HB. τὸ ἄρα δὲ ἀπὸ ZH πρὸς τὸ δὲ ἀπὸ HB ἐλάττω λόγον ἔχει ἢ περὶ τὸ δὲ ἀπὸ ZA πρὸς τὸ δὲ ἀπὸ AB. ὥστε καὶ ἡ ZH πρὸς HB ἐλάττω λόγον ἔχει ἢ περὶ ἡ ZA πρὸς AB. εἰν ἔν παλιν ἐν τῷ κύκλῳ τῇ ΓΔ πρὸς ὀρθὰς ἀχθῶσιν αἱ ZK, BΘ, ὁππότευχθῇ ἡ BK, ἡ BΘ πρὸς ZK ἐλάττω λόγον ἔχει ἢ περὶ ἡ ZA πρὸς AB. τὸ ἄρα

Διὰ τὸ ἄξονος ἰσοσκελὲς ἐλάττω ἐστὶ Διὰ τὸ AZ ὅτι ἄρα τὸ Διὰ τὸ ἄξονος ἰσοσκελὲς μέγιστον ἐστὶ πάντων τῶν, ὡς εἴρηται, συνισταμένων ἰσοσκελῶν. ἐδείχθη ὅτι ἐλάττω ἢ ἐλάττω ἢ ἐλάττω ἢ ἐλάττω ἢ ἐλάττω.


PROP. XXXVIII. Theor.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ λη΄.

DENIQUE sit axis AB semidiametro maior, & in plano ad circulum recto ducatur AE ad ΓΔ perpendicularis, quæ vel minor erit semidiametro, vel non minor. sit primum minor; perque A ducatur AZ ipsi ΓΔ parallela; & per B recta BZ parallela ipsi AE; & constitutur angulus BZH non major angulo ZAB, jungaturque HA. rursus ex jam demonstratis [ad 34. huj.] ZH ad ZB minorem rationem habebit quam HA ad AB. itaque quoniam ZB æqualis ipsi AE est minor semidiametro, & ZH major quam ZB; erit ZH vel major semidiametro, vel minor, vel æqualis. sit primum æqualis: si igitur in circulo ducantur HΛ, BM ad ipsam ΓΔ perpendiculares, ut superius factum est; & jungatur BA: per ea quæ sæpius demonstrata sunt, habebit HA ad AB maiorem rationem quam BM ad HΛ: quare triangulum æquicrurum per AH, HΛ majus est triangulo æquicruri per axem.



ΕΣΤΩ δὲ νῦν ὁ AB ἄξων μείζων τῆς ἐκ τῆς κέντρος, καὶ ἐν τῷ ὀρθῷ πρὸς τὸν κύκλον ὁππότευχθῇ ἡ AZ καὶ ἡ BZ, ὅτι τῇ ΓΔ ἡ AE, ἡ ὅτι AE ἡτοι ἐλάττω ἐστὶ τῆς ἐκ τῆς κέντρος, ἡ ἔ. ἔσω πρὸς τὸν ἐλάττω τῶν, καὶ Διὰ τὸ A πρὸς τὸ ΓΔ ἡ AZ, διὰ τὸ B πρὸς τὸ ΓΔ ἡ BZ, καὶ συστήται ἡ ὑπὸ BZH μὴ μείζων εἶναι τῇ ὑπὸ ZAB, ὅτι ἐπεὶ εὐχθῇ ἡ HA. πάλιν ἄρα, διὰ τὸ δειχθέντα, ἡ ZH πρὸς ZB ἐλάττω λόγον ἔχει ἢ περὶ ἡ HA πρὸς AB. ἐπεὶ ἔν ἡ ZB, ἴση εἶναι τῇ AE, ἐλάττω ἐστὶ τῆς ἐκ τῆς κέντρος, μείζων ὅτι ἡ ZH τῇ ZB. ἡ ἄρα ZH ἡτοι μείζων ἐστὶ τῆς ἐκ τῆς κέντρος, ἡ ἐλάττω, ἡ ἴση. ἔσω πρὸς τὸν ἴση. εἰν ἔν παλιν κατὰ τὸ εἰρηγὸς ἐν τῷ κύκλῳ τῇ ΓΔ πρὸς ὀρθὰς ἀχθῶσιν αἱ HΛ, MB, καὶ ὁππότευχθῇ τῇ BA. διὰ τὸ δειχθέντα πολλάκις, ἡ HA πρὸς AB μείζων λόγον ἔχει ἢ περὶ ἡ BM πρὸς HΛ. ὥστε καὶ τὸ διὰ τῇ AH, HΛ ἰσοσκελὲς μείζων εἶναι Διὰ τὸ ἄξονος ἰσοσκελῆς.



Si vero ZH sit minor semidiametro, fiat HN semidiametro æqualis. & quoniam HA ad AB maiorem rationem habet quam HZ ad ZB; HZ vero ad ZB maiorem habet quam HN ad NB: habebit HA ad AB maiorem rationem quam HN ad NB, hoc est quam BM ad HΛ; adeoque triangulum æquicrurum per AH, HΛ triangulo æquicruri per axem majus erit.


At si ZH sit semidiametro major, ducatur ZZ ipsi æqualis. quoniam igitur ZZ ad ZB angulus

Εἰ δὲ ἡ ZH ἐλάττω ἐστὶ τῆς ἐκ τῆς κέντρος, ἔσω ἡ HN ἴση τῇ ἐκ τῆς κέντρος. ἐπεὶ ἔν ἡ HA πρὸς AB μείζων λόγον ἔχει ἢ περὶ ἡ HZ πρὸς ZB, ἡ ὅτι HZ πρὸς ZB μείζων λόγον ἔχει ἢ περὶ ἡ HN πρὸς NB. καὶ ἡ ἄρα HA πρὸς AB μείζων λόγον ἔχει ἢ περὶ ἡ HN πρὸς NB, τῇ τῇ ἢ περὶ ἡ BM πρὸς HΛ. καὶ ἔ. τῶς τὸ Διὰ τῇ AH, HΛ ἰσοσκελὲς Διὰ τὸ ἄξονος ἰσοσκελῆς μείζων εἶναι.

Εἰ δὲ ἡ ZH μείζων ἐστὶ τῆς ἐκ τῆς κέντρος, δειχθῇ ἡ ZZ ἴση τῇ ἐκ τῆς κέντρος. ἐπεὶ ἔν ἡ ZZ πρὸς ZB μείζων

60

Ductis autem $\Psi\Omega$, χT , ΦT ipsi $\Gamma\Delta$ ad angulos rectos, junctisque $A\Omega$, AT , AT , erit, per jam
 ostensa, triangulum æquicrurum per $A\Omega$ omnium æquicrurum maximum; quodque per AT ducitur, non



Circulus centro O radio OH descriptus occurret

[] S

curret ipsi $Z\Lambda$ in puncto Λ . jungatur $M\Lambda$, cui parallela ducatur recta $Z\Pi$, occurrens ipsi NH in puncto Π . Dico si punctum N Axi propius est quam Π , tres Catheti in Curvam demitti possunt; si remotius, non nisi unum.


Horum omnium demonstrationem, cum in nimiam excreveret molem, totamque fere solidam Geometriam postuleret, in praesentia omittendam censeo. Ex iis tamen quae in quinto Conicorum habentur, & quae in *Philosoph. Transact. Num.* 188 & 190, tradidimus, non multo opere comprobare poterunt.

PROP. XL. Theor.

In omni cono scaleno, cum triangula per axem possunt esse infinita: rectae omnes, quae à vertice coni ad bases dictorum triangulorum perpendiculares ducuntur, in unius circuli circumferentiam cadunt; qui quidem est in eodem plano in quo basis coni, & circa diametrum æqualem interjectae inter centrum basis & perpendicularem à vertice coni ad dictum planum demissam.

SIT conus scalenus, cujus vertex punctum A , basis circulus circa centrum B , & axis AB ; à puncto autem A ad basis planum perpendicularis sit AG , & jungatur GB , cui per punctum B ad rectos angulos ducatur DE in eodem plano; & ducantur utcumque rectae ZH , $K\Theta$: erunt itaque $\Delta E, ZH, \Theta K$ bases triangulorum per axem transeuntium. itaque à puncto A ad ipsas $\Delta E, ZH, \Theta K$ perpendiculares ducantur AB, AL, AM . axem vero AB perpendicularem esse ad ΔE , & perpendiculares AL, AM ad partes BH, BK cadere, deinceps ostendetur. dico puncta B, L, M in unius circuli circumferentia esse, cujus diameter est recta BG .

Jungantur enim GA, GM . & quoniam AL perpendicularis est ad ZH ; erit angulus ZAA rectus. rursus quoniam AG ad basis planum est perpendicularis, anguli AGB, ALA, AGM recti erunt: quare cum quadratum ex AB æquale sit quadratis ex BL, LA , & quadratum ex LA quadratis ex AG, GA æquale; erit quadratum ex AB æquale tribus quadratis ex BL, LA, GA . idem autem est æquale quadratis ex BG, GA : quadrata igitur ex BG, GA quadratis ex BL, LA, GA æqualia sunt. commune auferatur quadratum ex GA ; erit reliquum quadratum ex BG æquale quadratis ex BL, LA : est igitur [per 48. 1.] angulus BAG in basis plano rectus. rursus quoniam quadratum ex AB æquale est quadratis ex BM, MA , & quadratum ex MA æquale quadratis ex MG, GA ; erit quadratum ex AB æquale quadratis ex BM, MG, GA . sed & æquale est quadratis ex BG, GA : ergo, sublato communi quadrato ex GA , erit quadratum ex BG quadratis ex BM, MG æquale: rectus igitur angulus



ΠΡΟΤΑΣΙΣ μ'.

Πάντος κώνος σκαληνῆς διυάμει ἀπείρων ὄντων ἑξ ἑκῶν ἑξ ἑκῶν τριγώνων· αἱ δὲ τὸ ἑξ ἑκῶν κώνος ὅτι τὰς βάσεις τῶν τριγώνων ἀγόμεναι καθετοὶ πᾶσαι ἐφ' ἐνὸς κύκλου περιφέρειαν πίπτουσιν, ὅντος τε ἐν τῷ αὐτῷ ὀρθογώνῳ τῆς βάσεως ἑξ ἑκῶν, καὶ αὐτῇ ἀξὶ μετροῦν ἢ ἐν τῷ εἰρημνῷ ὀρθογώνῳ ἀπολαμβανομένην εὐθείαν μεταξὺ τῆς κέντρης τῆς βάσεως καὶ τῆς ἀπὸ τῆς κορυφῆς ὅτι τὸ ὀρθογώνιον καθετοῦ.

ΕΣΤΩ κώνος σκαληνός, ἡ κορυφή μὲν τὸ A σημείον, βάση δὲ ὅτι τὸ B κέντρον κύκλος, καὶ ἄξων ὁ AB , ἀπὸ δὲ ἡ A κάθετος ὅτι τῆς βάσεως ὀρθογώνιον ἡ AG , ἐπεξεύχθω ἡ GB , τῇ δὲ GB ἀπὸ τῆς B πρὸς ὀρθὰς ἡχθῶ ἐν τῷ αὐτῷ ὀρθογώνῳ ἡ DE , τυχῶσαι δὲ αἱ $ZH, K\Theta$ γωνίαν δὲ αἱ $\Delta E, ZH, \Theta K$, βάσεις τριγώνων ἀπὸ τῆς ἑξ ἑκῶν ἡγόμεναι. ἡχθῶσαι μὲν ἐν κάθετῳ ἀπὸ τῆς A ὅτι τὰς $\Delta E, ZH, \Theta K$ εὐθείας αἱ AB, AL, AM . ὅτι γὰρ ὁ μὲν AB ἄξων πρὸς ὀρθὰς ἐστὶ τῇ DE , αἱ δὲ AL, AM κάθετοι ὅτι τὰς BH, BK μέρη πίπτουσιν, ἐξ ἧς δευχθήσεται. λέγω δὲ ὅτι τὰ B, L, M σημεία ἐφ' ἐνὸς κύκλου περιφέρειας ἐστίν, ἡ ἀξὶ μετροῦς ἐστὶν ἡ BG εὐθεία.

Επεξεύχθωσαι αἱ GA, GM . ἐπεὶ γὰρ ἡ AL κάθετος ἐστὶν ὅτι τὴν ZH , ὀρθὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ZAA γωνία. πάλιν ἐπεὶ ἡ AG κάθετος ἐστὶν ὅτι τὸ τῆς βάσεως ὀρθογώνιον, ὀρθαὶ ἄρα αἱ ὑπὸ AGB, ALA, AGM γωνίαι· ὥστε ἐπεὶ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς AB τοῖς ἀπὸ τῶν BL, LA ἴσων, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς LA τοῖς ἀπὸ AG, GA ἴσων· τὰ ἄρα ἀπὸ τῆς AB τοῖς ἀπὸ BL, LA, GA ἴσων ἐστίν. ἐστὶ δὲ καὶ τοῖς ἀπὸ BG, GA ἴσων τὰ ἀπὸ τῆς BA · τὰ ἄρα ἀπὸ τῆς BG, GA τοῖς ἀπὸ BL, LA, GA ἴσων ἐστίν. κοινὸν ἀφαιρεθῶ τὸ ἀπὸ GA · λοιπὸν ἄρα τὸ ἀπὸ BG ἴσων ἐστὶ τῷ ἀπὸ BL, LA · ὀρθὴ ἄρα ἡ ὑπὸ BAG ἐν τῷ τῆς βάσεως ὀρθογώνῳ. πάλιν ἐπεὶ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς AB ἴσων τοῖς ἀπὸ BM, MA , τὸ δὲ ἀπὸ τῆς MA ἴσων τοῖς ἀπὸ MG, GA · τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς AB ἴσων ἐστὶ τοῖς ἀπὸ BM, MG, GA . ἀλλὰ τὸ ἀπὸ τῆς AB ἴσων ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῆς BG, GA , κοινὸν ἀφαιρεθῶ τὸ ἀπὸ τῆς GA · τὸ ἄρα ἀπὸ BG ἴσων τοῖς ἀπὸ BM, MG · ὀρθὴ ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ BMG .

ΒΜΓ γωνία ἐν τῷ τῇ βάσει ὁριζώ. τὰ ἄρα Β, Λ, Μ, Γ σημεῖα ἐπὶ περιφέρειᾳ ἐστὶ αὐτῆς κύκλου, ἥ δὲ διάμετρος ἐστὶν ἡ ΒΓ. ὁμοίως ἔν καὶ ὅσων ἄλλων ἀνάγωμεν, ὃν εἰρήκαμεν τρόπον, ὥσπερ τὸ ΝΟΞ, τὸ αὐτὸ συμβαῖνον δεικνύσεται. ὅπερ εἶδει δεῖξαι.


Οπὶ δὲ ὁ μὲν ΑΒ ἄξων πρὸς ὁρίαν ἐστὶ τῇ ΔΕ, αἱ δὲ ΑΛ, ΑΜ κάθετοι ὅτι τὰ ΒΗ, ΒΚ μέρη πίπτουσιν, ἔτω δεικτέον.

Εάν γὰρ ὁριζώσωμεν τὰς ΑΔ, ΑΕ, ἔσται τὸ ΔΑΕ τρίγωνον ἰσοσκελές· καὶ διὰ τῆς τοῦ ἡ δὲ διὰ τῆς διχοτομίας τῆς βάσεως καὶ τῆς ΑΚ ρυφῆς ἀγομένη πρὸς ὁρίαν ἐστὶ τῇ ΔΕ. ἐπεὶ ἐν ἡρώσων δὲ καὶ αἱ ΓΖ, ΓΗ, ΑΖ, ΑΗ. ἐπεὶ ἔν ἀμβλείᾳ μὲν ἡ ὑπὸ ΖΒΓ γωνία, ὅξεία δὲ ἡ ὑπὸ ΓΒΗ· μείζων ἄρα ἡ ΖΓ τῇ ΓΗ, καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΖΓ ἑξ ἀπὸ τῆς ΓΗ μείζον· καὶ κοινὴ ἄρα πρὸς τὸν ἑαυτῆς ἀπὸ τῆς ΑΓ, τὸ ἀπὸ τῆς ΖΓ, ΓΑ ἑξ ἀπὸ τῆς ΗΓ, ΓΑ μείζον ἐστὶ, τῆς τῆς ἀπὸ ΖΑ ἑξ ἀπὸ ΑΗ μείζον ἐστὶ· μείζων ἄρα καὶ ἡ ΖΑ τῇ ΑΗ. ἐπεὶ ἔν αἱ μὲν ΖΒ, ΒΗ ἴσαι, κοινὴ δὲ ἡ ΒΑ, μείζων δὲ ἡ ΖΑ τῇ ΑΗ· ἡ μὲν ἄρα ὑπὸ ΖΒΑ γωνία ἀμβλεία ἐστὶν, ἡ δὲ ὑπὸ ΑΒΗ ὅξεία· ἡ ἄρα ἀπὸ τῆς Α κάθετος ὅτι τὴν ΖΗ ὅτι τὰ ΒΗ μέρη πίπτει. ὁμοίως δὲ δεικνύσεται καὶ ὅτι τῇ ἄλλων.

est & ΒΜΓ in basis plano; quare puncta Β, Λ, Μ, Γ sunt in circumferentia circuli, cuius diameter est ΒΓ. similiter & ductis aliis quibuscunque rectis, ut ΝΟΞ, idem evenire demonstrabimus. quod erat demonstrandum.

Axem vero ΑΒ perpendicularem esse ad ipsam ΔΕ, & perpendiculares ΑΛ, ΑΜ cadere ad partes ΒΗ, ΒΚ, hoc modo ostendimus.

Junctis enim ΑΔ, ΑΕ, erit ΔΑΕ triangulum æquicrurum; & ideo recta, quæ à vertice Α ad



punctum quo bifecatur basis ducitur, perpendicularis erit ad ΔΕ. jungantur ΓΖ, ΓΗ, ΑΖ, ΑΗ. & quoniam angulus ΖΒΓ obtusus est, acutus autem ΓΒΗ; erit recta ΖΓ major quam ΓΗ, & quadratum ex ΖΓ majus quadrato ex ΓΗ: ergo, communi appposito quadrato ex ΑΓ, quadrata ex ΖΓ, ΓΑ quadratis ex ΗΓ, ΓΑ majora sunt, hoc est qua-

dratum ex ΖΑ majus quadrato ex ΑΗ: major igitur est ΖΑ quam ΑΗ. sunt autem ΖΒ, ΒΗ inter se æquales, & communis est ΒΑ; ac ΖΑ major quam ΑΗ: ergo angulus ΖΒΑ obtusus est, & ΑΒΗ acutus. ducta igitur à puncto Α ad ΖΗ perpendicularis ad partes ΒΗ cadit. eodem modo & in aliis demonstrabitur.

Πόρισμα.

Ὡς φανερόν ὅτι αἱ περιφερειᾶς κάθετοι, ἀπὸ μετεώρου ἑστὶ σημεῖα ὅτι κύκλος περιφέρειαν πίπτει, κατ' ὅτι φανείας οἰομένη καὶ, ἡ βάσις μὲν ὁ ὑπὸ τῆς πλάσεως τῆς καθέτων γραφόμενος κύκλος, κορυφὴ δὲ ἡ αὐτὴ τῷ ἐξ ἀρχῆς κώνω.

Corollarium.

Quare constat dictas perpendiculares, à puncto sublimi ad circuli circumferentiam cadentes, in coni superficie ferri; cuius quidem basis est circulus à casu perpendicularem descriptus, & vertex idem qui est primi coni vertex.

SCHOLION.

IN c manifestum est quod, eodem modo quo in Scholio præcedente fecimus in Cono Scaleno triangulum æquicrurum triangulo dato æquale, etiam secari possit triangulum Scalenum dato æquale, cuius basis parallela sit datæ cuilibet diametro basis Coni, puta ipsi ΘΚ. Concipiatur enim alius Conus cuius vertex Α, Axis ΑΜ, ac basis circulus, priori æqualis & in eodem plano, circa centrum Μ, in quod cadit normalis à Vertice Α ad ΘΚ demissa, ita ut planum trianguli ΑΜΓ rectum sit super basis planum. In hoc inquam Cono triangula æquicrura ubique æqualia erunt Scalenis, eodem plano per verticem transeunte in priori Cono sectis; modo communis planorum basis & trianguli sectio parallela sit diametro ΘΚ: quemadmodum ad 26^{am} & 27^{am} hujus ostensum est in triangulis bases ipsi ΒΓ parallelas habentibus; easdem enim habent tam bases quam altitudines.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ μα'.

Εν κώνω σκαληνῷ, δοθέντος τινὸς τῆς ἀξὸς ἑξ ἄξωνος τριγώνου, ὃ μὴτε μέγιστον ὅτι μὴτε ἐλάχιστον· εὐρεῖν ἔστιν τρίγωνον ἀξὸς ἑξ ἄξωνος, ὃ μετὰ ἑξ δοθέντος ἴσον ἔσται συνικομφοτέρω τῷ μεγίστῳ καὶ τῷ ἐλάχιστῳ τῆς ἀξὸς ἑξ ἄξωνος.

ΕΣΤΩ κώνος σκαληνός, ἡ κορυφὴ μὲν τὸ Α σημεῖον, βάσις δὲ ὁ περὶ τὸ Β κέντρον κύκλος,


PROP. XLI. Probl.

In cono scaleno, dato aliquo triangulo per axem, quod neque maximum fit neque minimum: invenire aliud triangulum per axem, quod una cum dato utrisque maximo & minimo per axem fit æquale.

SIT conus scalenus, cuius vertex punctum Α, basis circulus circa centrum Β, axis autem ΑΒ,

AB, & AG ad basis planum perpendicularis; ducaturque per Γ & centrum B recta ΓΔΒΕ, cui ad rectos angulos sit ZBH: triangulorum igitur per axem transeuntium maximum quidem erit illud, cuius basis ZH & AB altitudo, ut sæpius demonstratum est: minimum vero, cuius basis EA & altitudo AG. sit datum triangulum per axem quod basim habeat ΘΚ, altitudinemque AA: & oporteat aliud triangulum per axem invenire, quod una cum eo, cuius basis ΘΚ & altitudo AA, utrisque maximo & minimo sit æquale.

Itaque quoniam AA perpendicularis est ad basim ΘΚ, erit punctum A in circumferentia circuli, cuius diameter est BG, per proxime demonstrata. describatur circulus BAG, & quo rectæ BA, AG simul sumptæ superant AA, eisdem sit æqualis M. quoniam igitur earum quæ à puncto A ad circumferentiam BAG ducuntur maxima quidem est AB, minima vero AG; erit AA minor quam AB, & major quam AG. sed AA una cum M est æqualis utrisque BA, AG simul, quarum AA est minor quam AB: ergo M quam AG major erit; & quadratum ex M majus quadrato ex AG. sint quadrato ex M æqualia quadrata ex AG, ΓN, & recta ΓN in circulo aptata, ducatur NΞBO, & jungatur NA: erit itaque angulus BNG in semicirculo rectus. quadratum autem ex AB æquale est quadratis ex BG, GA simul; & quadratum ex BG æquale quadratis ex BN, NG simul: quare quadratum ex AB quadratis ex BN, NG, GA æquale erit. è quibus, quadratis ex NG, GA æquale est quadratum ex NA: quadratum igitur ex AB est æquale quadratis ex BN, NA: & idcirco angulus BNA rectus est: quapropter AN est altitudo trianguli per axem, cuius basis OBΞ. & quoniam quadratum ex M est æquale quadratis ex AG, ΓN, & quadratum ex AN eisdem quadratis æquale; erit recta M ipsi AN æqualis: quare utraq; AA, AN æquales sunt utrisque BA, AG, & rectangulum contentum sub diametro & utrisque AA, AN æquale ei quod sub diametro & utrisque BA, AG continetur. sed rectangulum sub diametro & utrisque BA, AG duplum est trianguli maximi & minimi, quorum bases ZH, EA & altitudines BA, AG; rectangulum vero sub diametro & utrisque AA, AN duplum est triangulorum, quorum bases ΘΚ, ΟΞ, & altitudines AA, AN: triacula igitur, quorum bases ΘΚ, ΟΞ, & altitudines AA, AN, æqualia sunt triangulis maximo & minimo per axem. datum autem est triangulum cuius basis ΘΚ; ergo triangulum per axem cuius basis ΟΞ inventum est, quod, una cum dato cuius basis ΘΚ, utrisque maximo & minimo æquale erit.



ἄξων δὲ ὁ AB, καὶ ὅτι τὸ τῆς βάσεως ὀπίπεδον κἀντε-
τος ἡ AG, καὶ διὰ τῆς Γ καὶ B κέντρων διήχθω ἡ
ΓΔΒΕ εὐθεῖα, ἡ πρὸς ὀρθὰς τῇ ZBH· τῆς ἀρχῆς διὰ
τῆς ἀξὸνος τριγώνων μέγιστον μὲν ἔσται, ὡς ἐδείχθη
πολλὰκις, & βάσις μὲν ἡ ZH, ὕψος δὲ ἡ AB, ἐλα-
χίστον δὲ, & βάσις μὲν ἡ EA, ὕψος δὲ ἡ AG. ἔστω
δὲ τὸ δοθέν τρίγωνον διὰ τῆς ἀξὸνος, & βάσις μὲν
ἔστω ἡ ΘΚ, ὕψος δὲ ἡ AA· καὶ δέον ἔστω ἕτερον τρι-
γώνον τῇ διὰ τῆς ἀξὸνος εὐρεῖν, ὃ μὲν τῷ τριγώνῳ, &
βάσις μὲν ἡ ΘΚ, ὕψος δὲ ἡ AA, ἴσον ἔσται συναμ-
φοτέρῳ τῶν μεγίστῳ καὶ τῶν ἐλαχίστῳ.

Ἐπεὶ ἡ AA κἀντετός ἐστιν ὅτι τὴν ΘΚ βάσιν, τὸ
ἀρχὴ A σημεῖον ὅτι κύκλῳ περιφερείας ἐστίν, & διά-
μετρος ἐστὶν ἡ BG, διὰ τὸ περδείχθαι. γεγραμμένη
δὲ ὁ BAG κύκλος, καὶ ὡς μέγιστον ἐστὶ συναμφο-
τέρῳ ἡ BA, AG τῆς AA, τὰ τῶν ἴση ἔστω ἡ M.
ἐπεὶ ὅν τῶν δὲ τῶν τῆς A ὅτι τῶν BAG περιφερειῶν
ἀγομμένων εὐθειῶν μέγιστη μὲν ἡ AB, ἐλαχί-
στη δὲ ἡ AG· ἡ ἀρχὴ AA
ἐλάττω μὲν ἐστὶ τῆς AB,
μείζων δὲ τῆς AG· ἀλλ' ἡ
AA μὲν τῆς M ἴση ἐστὶ συν-
αμφοτέρῳ τῇ BA, AG,
ὡν ἡ AA ἐλάττω τῆς AB·
ἡ ἀρχὴ M τῆς AG μείζων
ἐστὶ· καὶ τὸ δοτὸν M ἀρχὴ τῆς
δοτῆς AG μείζων ἐστίν. ἔστω
τῶν δὲ τῆς M ἴση τὰ δὲ τῶν
τῆς AG, ΓN, & τῆς ΓN ἐναρ-
μοσθείσης εἰς τὸν κύκλον,

διήχθω ἡ NΞBO, & ἐπεζεύχθω ἡ NA· ἡ ἀρχὴ ὑπὸ
BNG γωνία ὀρθή ἐστιν, ἐν ἡμικυκλίῳ γάρ. ἐπεὶ ὅν
τὸ δοτὸν τῆς AB ἴσον ἐστὶ τοῖς δὲ τῶν BG, GA, τὸ δὲ τῶν
BG ἴσον τοῖς δὲ τῶν BN, NG· τὸ ἀρχὴ δὲ τῶν AB ἴσον ἐστὶ
τοῖς δὲ τῶν BN, NG, GA, ὡν τοῖς δὲ τῶν NG, GA τὸ
δοτὸν NA ἴσον ἐστὶ· τὸ ἀρχὴ δὲ τῶν AB τοῖς δὲ τῶν BN,
NA ἴσον ἐστὶ ὀρθὴ ἀρχὴ ἡ ὑπὸ BNA γωνία· ἡ AN ἀρχὴ
ὕψος ἐστὶ τῆς διὰ τῆς ἀξὸνος τριγώνου, & βάσις ἐστὶν ἡ
OBΞ. καὶ ἐπεὶ τὸ δοτὸν τῆς M ἴσον ἐστὶ τοῖς δὲ τῶν AG,
ΓN, ἐστὶ δὲ καὶ τὸ δοτὸν τῆς AN ἴσον τοῖς δὲ τῶν AG,
ΓN· ἴση ἀρχὴ ἡ M τῇ AN· ὥστε καὶ συναμφοτέρος
ἡ AA, AN συναμφοτέρῳ τῇ BA, AG ἴση ἐστὶ, καὶ τὸ
ὑπὸ τῆς διαμέτρου καὶ συναμφοτέρῳ τῆς AA, AN τῶν
ὑπὸ τῆς διαμέτρου & συναμφοτέρῳ τῆς BA, AG ἴσον ἐστίν.
ἀλλὰ τὸ μὲν ὑπὸ τῆς διαμέτρου καὶ συναμφοτέρῳ τῆς BA,
AG διπλασίον ἐστὶ τῷ μεγίστῳ & ἐλαχίστῳ τριγώνῳ,
ὡν αἱ βάσεις μὲν αἱ ZH, EA, ὕψος δὲ αἱ BA, AG,
τὸ δὲ ὑπὸ τῆς διαμέτρου & συναμφοτέρῳ τῆς AA, AN
διπλασίον ἐστὶ τῷ τριγώνῳ, ὡν βάσεις μὲν αἱ ΘΚ,
ΟΞ, ὕψος δὲ αἱ AA, AN· τὰ ἀρχὴ τριγώνου, ὡν
βάσεις μὲν αἱ ΘΚ, ΟΞ, ὕψος δὲ αἱ AA, AN, ἴσα ἐστὶ
τῶν τε ἐλαχίστῳ καὶ τῶν μεγίστῳ τῶν διὰ τῆς ἀξὸνος. & ἐστὶ
τὸ δοθέν τὸ ὅτι τῆς ΘΚ· εὐρηθὴν ἀρχὴ τριγώνου διὰ τῆς
ἀξὸνος τὸ ὅτι τῆς ΟΞ, ὃ μὲν τῶν δοθέντων & ὅτι τῆς
ΘΚ ἴσον ἐστὶ τῶν τε μεγίστῳ καὶ τῶν ἐλαχίστῳ.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ μβ.

Εάν δύο τριγώνων ἀξονος τετράγωνον αἱ βάσεις ἴσας περιφερείας ἀπολαμβάνουσιν πρὸς τῇ ἀξὶ τὴν κατέχου διαμέτρου· τὰ τρίγωνα ἴσα ἀλλήλοις ἔσονται. καλεῖσθαι δὲ ὁμοταγῆ.

ΕΣΤΩ κώνος, ὃς κορυφὴ μὲν τὸ Α, βάσις δὲ ὁ περὶ τὸ Β κέντρον κύκλος, καὶ ἄξων ὁ ΑΒ, καθεύδων δὲ τὸν τριγώνων ἡ ΑΓ, ἡ δὲ ἀξὶς ΑΒ σημεία τὰ καθέτω διαμέτρους ἡ ΓΔΒΕ· διήχθωσιν δὲ αἱ ΖΒΗ, ΘΒΚ ἴσας περιφερείας ἀπολαμβάνουσιν πρὸς τῷ Δ τὰς ΚΔ, ΔΗ· λέγω ὅτι τὰ διὰ τῆς ἀξονος τριγώνων, ὧν βάσεις εἰσιν αἱ ΖΗ, ΘΚ, ἴσα ἀλλήλοις ἔσονται.

Γεγραμμένον περὶ τὴν ΒΓ διάμετρον κύκλος ὁ ΒΛΓΜ, καὶ ἐπέζευχθωσιν αἱ ΑΛ, ΑΜ· καθεύδων αἱ εἰσιν, ἡ μὲν ΑΛ ὅτι τὴν ΖΗ, ἡ δὲ ΑΜ ὅτι τὴν ΘΚ. καὶ ἐπεὶ ἡ ὑπὸ ΓΒΜ γωνία τῇ ὑπὸ ΓΒΛ ἴση ἐστίν, ἴση ἄρα καὶ ἡ ΜΒ εὐθεία τῇ ΒΛ. ἐπεὶ δὲ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ ἴσων ἐστὶ τῶν ἀπὸ τῆς ΑΜ, ΜΒ, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἀπὸ ΑΛ, ΛΒ· καὶ τὰ ἀπὸ ΑΜ, ΜΒ ἄρα τοῖς ἀπὸ ΑΛ, ΛΒ ἴσα ἐστίν, ὧν τὸ ἀπὸ τῆς ΜΒ τῷ ἀπὸ ΒΛ ἴσων ἐστὶ· λοιπὸν ἄρα τὸ ἀπὸ ΜΑ τῷ ἀπὸ ΑΛ ἴσων ἐστίν· ἴση ἄρα ἡ ΑΛ τῇ ΑΜ. καὶ εἰσιν ὑψὲς τῶν τριγώνων, ὧν βάσεις εἰσιν αἱ ΖΗ, ΘΚ· ἴση ἄρα ἐστὶ τὰ ὅτι τῶν ΖΗ, ΘΚ βάσεων τριγώνων ἀξὶς ἀξονος. ὅπερ εἶδει δεῖξαι.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ μγ.

Τῶν ἀξὶς ἀξονος τετράγωνον τὰ ὁμοταγῆ ἴσα τε καὶ ὅμοια ἀλλήλοις ἔσονται.


ΕΣΤΩ γὰρ, ὡς ὅτι τὸ περικειμένης καταγραφή, τὰ ΖΑΗ, ΘΑΚ τριγώνων ὁμοταγῆ· λέγω ὅτι ἴσα τε καὶ ὅμοια ἐστὶν ἀλλήλοις. ὅτι μὲν ἔν ἴσων ἐστὶν ἡδη δεδεικνυμένον· ὅτι δὲ ὅμοια νῦν δεκτέον.

Ἐπεὶ γὰρ ἡ ΑΒ, ἐν ἑκατέρῳ τῶν τριγώνων, ἀπὸ τῆς κορυφῆς ὅτι τὴν διχοτομῶν ἡ κατὰ τὴν βάσεως, καὶ ἐστὶν ἴσων τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ τοῖς ἀπὸ ΑΜ, ΜΒ, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἀπὸ ΑΛ, ΛΒ ἴσων, ὧν τὸ ἀπὸ ΑΜ τῷ ἀπὸ ΑΛ ἴσων· λοιπὸν ἄρα τὸ ἀπὸ ΜΒ τῷ ἀπὸ ΒΛ, καὶ ἡ ΜΒ εὐθεία τῇ ΒΛ ἴση· ὥστε καὶ ὅλη ἡ ΜΘ τῇ ΑΖ. ἴση δὲ καὶ ἡ ΜΑ τῇ ΛΑ· καὶ τὰ ἀπὸ αὐτῶν ἄρα ἴσα ἐστὶ, τὰ τετὰ τὸ ἀπὸ ΑΖ τῷ ἀπὸ ΑΘ, καὶ ἡ ΑΖ τῇ ΑΘ ἴση. ὁμοίως δὲ καὶ ἡ ΑΚ τῇ ΑΗ δεικνύται ἴση. ἀλλὰ καὶ αἱ ΖΗ, ΘΚ βάσεις ἴσαι· τὰ ἄρα ΖΑΗ, ΘΑΚ τριγώνων ἴσα τε καὶ ὅμοια ἐστὶν ἀλλήλοις. δῆλον δὲ καὶ τὸ ἀντίστροφον αὐτῶν.

PROP. XLII. Theor.

Si duorum triangulorum per axem bases abscindant æquales circumferentias, apud diametrum quæ per lineam perpendicularem ducitur: triangula inter se æqualia erunt. Vocentur autem *Triangula coordinata*.

SIT conus, cujus vertex punctum Α, basis circulus circa centrum Β, & axis ΑΒ; perpendicularis autem ad basim ΑΓ; & per Γ punctum, quo cadit perpendicularis, diameter sit ΓΔΒΕ; ducanturque ΖΒΗ, ΘΒΚ, quæ utrinque à puncto Δ æquales circumferentias ΚΔ, ΔΗ abscindant: dico triangula per axem, quorum bases sunt ΖΗ, ΘΚ, inter se æqualia esse.



Describatur enim circa ΒΓ diametrum circulus ΒΛΓΜ, & jungantur ΑΛ, ΑΜ, quæ perpendiculares erunt, ΑΛ quidem ipsi ΖΗ; ΑΜ vero ipsi ΘΚ. & quoniam angulus ΓΒΜ æqualis est angulo ΓΒΛ, recta ΜΒ ipsi ΒΛ æqualis erit. sed quadratum ex ΑΒ quadratis ex ΑΜ, ΜΒ est æquale, itemque æquale est quadratis ex ΑΛ, ΛΒ: ergo qua-

drata ex ΑΜ, ΜΒ æqualia sunt quadratis ex ΑΛ, ΛΒ; quorum quadratum ex ΜΒ est æquale quadrato ex ΒΛ: reliquum igitur quadratum ex ΜΑ æquale est quadrato ex ΑΛ; atque ipsa ΑΛ æqualis ipsi ΑΜ, quæ quidem sunt triangulorum altitudines, quorum bases ΖΗ, ΘΚ: ergo triangula per axem super bases ΖΗ, ΘΚ constituta inter se æqualia erunt. quod erat demonstrandum.

PROP. XLIII. Theor.

E triangulis per axem, quæ coordinata sunt & æqualia & similia erunt inter se.

SINT triangula coordinata, ut in antecedenti figura, ΖΑΗ, ΘΑΚ: dico & æqualia & similia inter se esse. æqualia enim jam ostensa sunt; similia esse nunc demonstrandum.

Quoniam ΑΒ, in utroque triangulorum, ducta est à vertice ad punctum quod basim bifariam dividit, & quadratum ex ΑΒ quadratis ex ΑΜ, ΜΒ est æquale; itemque æquale est quadratis ex ΑΛ, ΛΒ, quorum quadratum ex ΑΜ æquale est quadrato ex ΑΛ: erit reliquum quadratum ex ΜΒ quadrato ex ΒΛ æquale, & recta ΜΒ ipsi ΒΛ æqualis: quare & tota ΜΘ toti ΑΖ. est autem ΜΑ æqualis ipsi ΛΑ: ergo & quæ ex ipsis fiunt quadrata inter se sunt æqualia, hoc est quadratum ex ΑΖ æquale quadrato ex ΑΘ: & propterea erit ΑΖ ipsi ΑΘ æqualis. similiter etiam ΑΚ ipsi ΑΗ æqualis demonstrabitur. sed & bases ΖΗ, ΘΚ sunt æquales: triangula igitur ΖΑΗ, ΘΑΚ & æqualia & similia inter se erunt. manifestum autem est & hujus theorematismis conversum.

[] T

PROP.

PROP. XLIV. Theor.

Si conus scaleni axis æqualis sit basis semidiametro: erit ut maximum triangulorum per axem transeuntium ad minimum, ita minimum ad æquicrurum quod est ad rectos angulos basi.

SIT conus scalenus, cujus vertex punctum A, & axis recta AB semidiametro basis æqualis; basis vero sit circulus circa centrum B; & è triangulis per axem, ad rectos quidem angulos basi sit $\Gamma\Delta\Delta$, æquicrurum autem EAZ: erit igitur EAZ maximum omnium quæ per axem transeunt, & $\Gamma\Delta\Delta$ minimum ex iis, per prius demonstrata. ducatur à puncto A ad basim perpendicularis AH, quæ in diametrum $\Gamma\Delta$ cadet, & sit ΘHK ad rectos angulos ipsi $\Gamma\Delta$; ducaturque planum faciens triangulum æquicrurum ΘAK , quod ad basim rectum erit: dico ut triangulum EAZ, maximum scilicet eorum quæ per axem ducuntur, ad $\Gamma\Delta\Delta$ minimum eorundem, ita $\Gamma\Delta\Delta$ ad æquicrurum triangulum ΘAK .

Quoniam enim triangulorum EAZ, $\Gamma\Delta\Delta$ bases sunt æquales, diametri scilicet $\Gamma\Delta$, EZ; altitudo autem trianguli EAZ est BA, & ipsius $\Gamma\Delta\Delta$ altitudo AH: erit ut BA ad AH ita EAZ triangulum ad triangulum $\Gamma\Delta\Delta$. rursus quoniam triangulorum $\Gamma\Delta\Delta$, ΘAK eadem est altitudo AH; trianguli autem $\Gamma\Delta\Delta$ basis est $\Gamma\Delta$, hoc est EZ; & trianguli ΘAK basis ΘK : erit ut EZ ad ΘK ita triangulum $\Gamma\Delta\Delta$ ad triangulum ΘAK . sed ut EZ ad ΘK ita earum dimidiæ, hoc est BK ad KH; & ut BK ad KH ita BA ad AH: (similia etenim sunt triangula orthogonia BHK, BHA) triangulum igitur $\Gamma\Delta\Delta$ est ad triangulum ΘAK ut BA ad AH. erat autem & triangulum EAZ ad ipsum $\Gamma\Delta\Delta$ ut BA ad AH; ergo ut EAZ triangulum ad triangulum $\Gamma\Delta\Delta$ ita $\Gamma\Delta\Delta$ ad triangulum ΘAK , quod erat demonstrandum.

PROP. XLV. Theor.

RURSUS sit ut triangulum EAZ ad $\Gamma\Delta\Delta$ ita $\Gamma\Delta\Delta$ ad ΘAK : dico axem BA semidiametro basis æqualem esse.


Quoniam enim ut triangulum EAZ ad $\Gamma\Delta\Delta$ ita BA ad AH; & ut EAZ ad $\Gamma\Delta\Delta$ ita $\Gamma\Delta\Delta$ ad ΘAK erit ut $\Gamma\Delta\Delta$ ad ΘAK ita BA ad AH. ut autem $\Gamma\Delta\Delta$ ad ΘAK ita EZ ad ΘK , hoc est BK ad KH: ergo ut BA ad AH ita BK ad KH: quare triangula BAH, BKH sunt similia, communis autem BH, atque homologæ AB, BK: recta igitur AB ipsi BK, hoc est semidiametro basis, æqualis erit. quod ostendendum proponebatur.

Simul vero & ostensum est, ex utraque demonstratione, triangulum EAZ simile esse tri-

ΠΡΟΤΑΣΙΣ μδ'.

Εάν κώνος σκαληνῆς ὁ ἀξὼν ἴσος ᾗ τῇ ἐκ τῆς κέντρης τῆς βάσεως ἑξαγῶς τὸ μέγιστον τῶν διὰ τῆς ἀξὼνος τριγώνων πρὸς τὸ ἐλάχιστον ἔστω τὸ ἐλάχιστον πρὸς τὸ πρὸς ὀρθαῖς τῇ βάσει ἰσοσκελές.

ΕΣΤΩ κώνος σκαληνός, ὃς κορυφῇ μὲν τὸ Α, ἀξὼν δὲ ἡ ΑΒ εὐθεία, ἴση ἑστί τῇ ἐκ τῆς κέντρης τῆς βάσεως, βάσις δὲ ὁ περὶ τὸ Β κέντρον κύκλος, καὶ τῶν διὰ τῆς ἀξὼνος τριγώνων τὸ μὲν πρὸς ὀρθαῖς τῇ βάσει ἑσὼ τὸ $\Gamma\Delta\Delta$, τὸ δὲ ἰσοσκελές τὸ ΕΑΖ· μέγιστον μὲν ἄρα ἐστὶ τὸ ΕΑΖ ἀξὼνος τὸ ΕΑΖ, ἐλάχιστον δὲ τὸ $\Gamma\Delta\Delta$, διὰ τὰς προτέρων δεχθέντα. ἤχθω ἔν ἀπὸ τῆς Α ὅτι τῇ βάσει κάθετος, πῆλπει δὲ ὅτι τῇ $\Gamma\Delta$ διὰ μέτρον. ἑσὼ ἔν ἡ ΑΗ, καὶ διήχθω ἡ ΘHK πρὸς ὀρθαῖς τῇ $\Gamma\Delta$, καὶ διεκβεβλήσθω τὸ ὀπίπεδον ποιῶν τὸ ΘAK τρίγωνον, ἰσοσκελές ὦν καὶ ὀρθὸν πρὸς τῇ βάσει· λέγω δὲ ὅτι ὡς τὸ ΕΑΖ μέγιστον τῶν διὰ τῆς ἀξὼνος πρὸς τὸ $\Gamma\Delta\Delta$ ἐλάχιστον, ἔτω τὸ $\Gamma\Delta\Delta$ πρὸς τὸ ΘAK ἰσοσκελές.



Ἐπεὶ γὰρ τὸ ΕΑΖ, $\Gamma\Delta\Delta$ τριγώνων αἱ μὲν βάσεις ἴσαι εἰσὶν αἱ $\Gamma\Delta$, EZ διὰ μέτρον, ὕψος δὲ τῶν ΕΑΖ ἡ ΒΑ, τῶν $\Gamma\Delta\Delta$ ἡ ΑΗ· ὡς ἄρα ἡ ΒΑ πρὸς ΑΗ ἔστω τὸ ΕΑΖ τρίγωνον πρὸς τὸ $\Gamma\Delta\Delta$. πάλιν ἐπεὶ τὸ $\Gamma\Delta\Delta$ καὶ ΘAK τριγώνων κοινὸν ὕψος ἔστιν ἡ ΑΗ, βάσις δὲ τῶν $\Gamma\Delta\Delta$ ἡ $\Gamma\Delta$, τῆς δὲ τῶν ΘAK ἡ ΘK · ὡς ἄρα ἡ EZ πρὸς ΘK ἔστω τὸ $\Gamma\Delta\Delta$ τρίγωνον πρὸς τὸ ΘAK . ἀλλ' ὡς ἡ EZ πρὸς ΘK ἔστω αἱ ἡμίσειαι πρὸς ἀλλήλας, τῆς περὶ ἡ ΒΚ πρὸς ΚΗ, ὡς δὲ ἡ ΒΚ πρὸς ΚΗ ἔστω ἡ ΒΑ πρὸς ΑΗ· (ὅμοια γάρ τε ΒΗΚ, ΒΗΑ τρίγωνα ὀρθογώνια) καὶ τὸ ἄρα $\Gamma\Delta\Delta$ τρίγωνον πρὸς τὸ ΘAK ἔστιν ὡς ἡ ΒΑ πρὸς ΑΗ. ἦν δὲ καὶ τὸ ΕΑΖ πρὸς τὸ $\Gamma\Delta\Delta$ ὡς ἡ ΒΑ πρὸς ΑΗ· ὡς ἄρα τὸ ΕΑΖ τρίγωνον πρὸς τὸ $\Gamma\Delta\Delta$, ἔστω τὸ $\Gamma\Delta\Delta$ πρὸς τὸ ΘAK . ὅπερ εἶδει δεῖξαι.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ με'.

ΠΑΛΙΝ ἑσὼ ὡς τὸ ΕΑΖ πρὸς τὸ $\Gamma\Delta\Delta$ ἔστω τὸ $\Gamma\Delta\Delta$ πρὸς τὸ ΘAK · λέγω ὅτι ἡ ΒΑ ἴση ἐστὶ τῇ ἐκ τῆς κέντρης τῆς βάσεως.

Ἐπεὶ γὰρ ὡς τὸ ΕΑΖ πρὸς τὸ $\Gamma\Delta\Delta$ ἔστω ἡ ΒΑ πρὸς ΑΗ, ὡς δὲ τὸ ΕΑΖ πρὸς τὸ $\Gamma\Delta\Delta$ ἔστω τὸ $\Gamma\Delta\Delta$ πρὸς τὸ ΘAK · ἔστω ἄρα $\Gamma\Delta\Delta$ πρὸς τὸ ΘAK ἔστιν ὡς ἡ ΒΑ πρὸς ΑΗ. ὡς δὲ τὸ $\Gamma\Delta\Delta$ πρὸς τὸ ΘAK ἔστω ἡ EZ πρὸς ΘK , τῆς περὶ ἡ ΒΚ πρὸς ΚΗ· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΒΑ πρὸς ΑΗ ἔστω ἡ ΒΚ πρὸς ΚΗ. ὅμοια ἄρα τε ΒΑΗ, ΒΚΗ τρίγωνα, καὶ κοινὴ ἡ ΒΗ, καὶ ὁμόλογοι αἱ ΑΒ, ΒΚ· ἴση ἄρα ἡ ΑΒ τῇ ΒΚ τῇ ἐκ τῆς κέντρης. ὃ πρὸς ἔδει δεῖξαι.

Καὶ συναπεδείχθη, κατὰ ἑκατέραν τῶν δειξάντων, ὅτι τὸ ΕΑΖ τρίγωνον τῷ ΘAK ὁμοίον ἐστίν· ὡς γὰρ

ἡ EZ πρὸς ΘK , ὥτως ἡ BA πρὸς AH . καὶ ἐπὶ τὸ μὲν EAZ πρὸς τὸ ΘAK διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς τὸ $\Gamma A\Delta$ πρὸς τὸ ΘAK . καὶ ἐπὶ τὸ $\Gamma A\Delta$ τρίγωνον πρὸς τὸ ΘAK ὡς ἡ $\Gamma\Delta$, τέτρετι ὡς ἡ EZ , πρὸς ΘK . ὥστε τὸ EAZ πρὸς τὸ ΘAK διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ ὁμολόγων παλινῶν $\Gamma\Delta$, ΘK . ὁμοία ἄρα τὰ EAZ , ΘAK .

Πόρισμα.

Ὡς τε φανερόν, ὅτι εἰν κώνυς σκαληνῆς ὁ ἄξων ἴσος ἢ τῇ ΘK ὁ κέντρος τῆς βάσεως, τὸ πρὸς ὁρθὰς τῇ βάσει ἰσοσκελὲς ὁμοιον ἔσται τῷ διὰ Σ ἄξωνος ἰσοσκελεῖ. Ἐν περὶ τούτου, ὅτι εἰν τὸ πρὸς ὁρθὰς τῇ βάσει ἰσοσκελὲς ὁμοιον ἢ τῷ $\Delta\Gamma$ ὁ ἄξωνος ἰσοσκελεῖ, ὁ ἄξωνος Σ κώνυς ἴσος ἔσται τῇ ΘK ὁ κέντρος τῆς βάσεως. καὶ τὸ Σ εὐκατανόητον ΘK τῇ Σ δειχθέντων.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ μς'.

Εἰν κύκλος κύκλον τέμνῃ διὰ Σ κέντρος αὐτῶν γεωφύμνος, ἀπὸ δὲ τῆς ἐτέρας αὐτῶν τομῆς διαχωρῶσιν εὐθείᾳ τέμνυσαι καὶ διὰ Σ κέντρος ἀεὶ φέρεται, καὶ προσεκκληθῶσιν ὅππῃ Σ ἐτέρῳ κύκλῳ ἀεὶ φέρεται. ἢ ἀπὸ λαμβανόμενῃ εὐθείᾳ, μεταξὺ τῶν ἐτέρων κυρτῆς ἀεὶ φερείας καὶ τῆς κοίλης Σ ἐτέρῳ, ἴση ἔσται τῇ ἀπὸ Σ κοινῆς τομῆς τῆς διαχωρείας εὐθείας καὶ τῆς $\Delta\Gamma$ ὁ κέντρος ἀεὶ φερείας ὅππῃ Σ ἐτέρῳ κοινῇ τομῇ τῶν κύκλων ὅππῃ $\Delta\Gamma$ γινώσκῃ.

Εἰς τὸν κύκλον Θ $AB\Gamma$ ἀεὶ κέντρον τὸ Δ , $\Delta\Gamma$ καὶ Σ Δ κέντρος γεγραφῶσι τὸν κύκλον Θ $B\Delta\Gamma$, τέμνων τὸν Θ ἀρχῆς κατὰ τὰς B, Γ σημεία, καὶ διήχθωσαν εὐθείαι διὰ μὲν Σ Δ ἢ $B\Delta E$, τεχέσται Σ ἢ BZH , καὶ ἐπεὶ εὐχθώσιν αἱ $\Delta\Gamma$, $Z\Gamma$. λέγω ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ZH τῇ $Z\Gamma$.

Ἐπεὶ εὐχθώσιν αἱ $E\Gamma$, ΓH . ἐπεὶ Σ ἴση ἐστὶν ἡ Σ $B\Delta\Gamma$ γωνία τῇ Σ BZH . καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ Σ $E\Delta\Gamma$ λοιπὴ τῇ Σ ΓZH ἴση ἐστὶν. ἀλλὰ καὶ ἡ Σ $\Delta E\Gamma$ τῇ Σ $Z H\Gamma$ ἴση, διὰ τὸ ὅτι τῶν αὐτῆς ἀεὶ φερείας βεβηκέναι. καὶ ἡ λοιπὴ ἄρα τῇ Σ ΓZH ἴση, ὁμοίως δὲ τὸ $\Gamma\Delta E$ ἰσοσκελὲς ἄρα καὶ τὸ ΓZH . ἴση ἄρα ἡ ZH τῇ $Z\Gamma$. ὁμοίως δὲ, καὶ ἄλλαι $\Delta\Gamma$ δῶσι, δειχθήσεται τὰς τῆς περὶ τούτου.

Πάλιν, ὅτι τῶν αὐτῆς κατὰ γεωφῆς, ὑποκείτω τῇ μὲν $\Gamma\Delta$ ἴση ἡ ΔE , τῇ Σ ΓZ ἡ ZH , τῇ $B\Delta\Gamma$ ἀεὶ φερείας κατὰ τὸ Δ δίχα τεμνόμενης. λέγω ὅτι ὁ κέντρος μὲν τῷ Δ , διαστήματι Σ ὁπταρῶν τῷ ΔB , $\Delta\Gamma$ γεωφύμνος κύκλος ἔξει καὶ $\Delta\Gamma$ τῇ E καὶ H σημείων. ἐπεὶ ἡ Σ ἴση ἡ Σ $E\Delta\Gamma$ γωνία τῇ Σ ΓZH .

angulo ΘAK : etenim EZ est ad ΘK sicut BA ad AH . habet quoque triangulum EAZ ad triangulum ΘAK duplicatam rationem ejus quam triangulum $\Gamma A\Delta$ ad triangulum ΘAK : est autem triangulum $\Gamma A\Delta$ ad triangulum ΘAK ut $\Gamma\Delta$, hoc est, ut EZ ad ΘK : quare triangulum EAZ ad triangulum ΘAK duplicatam rationem habebit laterum homologorum, nempe ipsarum $EZ, \Theta K$; & idcirco [ex conversa 19. 6.] triangula $EAZ, \Theta AK$ inter se similia erunt.


Corollarium.

Ex quibus perspicuum est, si conus scaleni axis æqualis sit basis semidiametro, triangulum æquicrurum ad rectos angulos basi simile esse triangulo æquicruri per axem: & è contra, si triangulum æquicrurum ad rectos angulos basi simile sit triangulo per axem æquicruri, conus axem semidiametro basis æqualem esse: id quod ex jam demonstratis facile intelligi potest.

PROP. XLVI. Theor.

Si circulus circulum secet per centrum ipsius descriptus; & ab altera eorum intersectione ducantur rectæ quæ secent circumferentiam per centrum transeuntem, & deinde ad alterius circuli circumferentiam producantur: recta linea inter convexam alterius circuli circumferentiam & concavam prioris interjecta, æqualis erit ei quæ à communi sectione rectæ ductæ & circumferentiæ per centrum ad alteram communem circulorum intersectionem perducitur.

SIT circulus $AB\Gamma$ circa centrum Δ ; & per Δ alius circulus $B\Delta\Gamma$ describatur, secans priorem circulum in punctis B, Γ ; ducanturque rectæ lineæ, per Δ quidem $B\Delta E$, alia vero utcunque BZH ; & jungantur $\Delta\Gamma$, $Z\Gamma$: dico rectam ZH ipsi $Z\Gamma$ æqualem esse.



Jungantur enim $B\Gamma$, ΓH . & quoniam angulus $B\Delta\Gamma$ æqualis est angulo BZH , erit reliquus $E\Delta\Gamma$ reliquo ΓZH æqualis. sed & æqualis est $\Delta B\Gamma$ ipsi $ZH\Gamma$, quod in eadem circumferentia consistat: reliquus igitur est æqualis reliquo, & triangula inter se similia sunt. æquicrurum autem est triangulum $\Gamma\Delta E$; ergo & æquicrurum est ΓZH , & recta ZH ipsi $Z\Gamma$ æqualis. similiter & in aliis ductis idem demonstrabitur.

æqualis. similiter & in aliis ductis idem demonstrabitur.

Rursus in eadem figura ponatur ΔE ipsi $\Gamma\Delta$ æqualis, & ZH æqualis ipsi ΓZ , circumferentiæ $B\Delta\Gamma$ bifariam in puncto Δ divisâ: dico circulum centro Δ & intervallo ΔB vel $\Delta\Gamma$ descriptum per puncta E, H transire. quoniam enim angulus $E\Delta\Gamma$ æqualis est angulo $HZ\Gamma$, &

& sunt triacula $\triangle B\Delta\Gamma$, $\triangle H\Gamma\Delta$ æquicrura: anguli $\angle BE\Gamma$, $\angle BH\Gamma$ inter se æquales erunt; & propterea in eodem circulo continebuntur anguli $\angle BE\Gamma$, $\angle BH\Gamma$: circulus igitur, centro Δ & intervallo ΔB descriptus, per puncta E, H transibit. quod erat demonstrandum.

PROP. XLVII. Theor.

Si in portione circuli inflectantur rectæ lineæ: maxima quidem erit quæ ad punctum medium inflectitur; è reliquis vero semper ipsi propinquior remotiore major erit.

IN portione enim $AB\Gamma$ inflectantur rectæ lineæ; $AB, B\Gamma$ quidem ita ut circumferentia $AB\Gamma$ bifariam in B secetur; $AD, \Delta\Gamma$ vero & $AH, H\Gamma$ utcumque: dico $AB, B\Gamma$ simul maximas esse omnium quæ in portione $AB\Gamma$ inflectantur; & $AD, \Delta\Gamma$ ipsis $AH, H\Gamma$ majores esse.

Quoniam enim AB circumferentia circumferentiæ $B\Gamma$ est æqualis; & recta AB æqualis erit ipsi $B\Gamma$. itaque centro B , & intervallo BA vel $B\Gamma$, circulus $A\Theta Z\Theta\Gamma$ describatur, & producantur $AB\Theta$, $A\Delta Z$, $AH\Theta$: ergo, ex antecedenti theoremate, EB ipsi $B\Gamma$ est æqualis; & $Z\Delta$ æqualis ipsi $\Delta\Gamma$, & ΘH ipsi $H\Gamma$. quoniam igitur AB diameter est circuli $A\Theta Z$; erit AE omnium quæ in circulo ducuntur maxima; & AZ major quam $A\Theta$. sed ipsi AE æquales sunt $AB, B\Gamma$, & ipsi AZ æquales $AD, \Delta\Gamma$, & ipsi $A\Theta$ æquales $AH, H\Gamma$: ergo $AB\Gamma$ omnium maxima est, & $AD\Gamma$ major quam $AH\Gamma$. & ita semper ea quæ propinquior est puncto medio circumferentiæ remotiore major erit. quod demonstrandum proponebatur.

Aliter.

SIT circulus $AB\Gamma$, & in portione $AB\Gamma$ inflectantur rectæ $AB, B\Gamma$, ita ut circumferentia $AB\Gamma$ bifariam in B dividatur: dico rectam ex $AB, B\Gamma$ compositam maximam esse ex iis quæ in eadem portione inflectuntur.


Inflectantur enim $AD, \Delta\Gamma$, & producat AD ad E , ita ut ΔE ipsi $\Delta\Gamma$ sit æqualis; junganturque BD, BE . quoniam igitur circumferentia AB æqualis est circumferentiæ $B\Gamma$; & in circumferentia quidem AB angulus $\angle B\Delta A$, in circumferentia vero $B\Gamma$ angulus $\angle B\Delta\Gamma$ consistit: erit angulus $\angle B\Delta A$ angulo $\angle B\Delta\Gamma$ æqualis. communis apponatur $\angle B\Delta E$; ergo utrique anguli $\angle B\Delta E, \angle B\Delta A$ utriqueque $\angle B\Delta E, \angle B\Delta\Gamma$ æquales sunt. & sunt $\angle B\Delta E, \angle B\Delta A$ duobus rectis æquales: ergo & $\angle B\Delta E, \angle B\Delta\Gamma$

$\angle H\Gamma\Delta$, & est in isosceles $\triangle B\Delta\Gamma, \triangle H\Gamma\Delta$ triangelis: $\angle BE\Gamma$ & $\angle BH\Gamma$ inter se æquales erunt: & propterea in eodem circulo continebuntur anguli $\angle BE\Gamma, \angle BH\Gamma$: circulus igitur, centro Δ & intervallo ΔB descriptus, per puncta E, H transibit. quod erat demonstrandum.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ μζ.

Εάν οἱ τμήματα κύκλου κλασθῶσιν εὐθείαι, μέγισται ἢ ὡς τῆς διχοτομίας τῆς κλάσεως ἔχουσαι, τῆς δὲ ἄλλων αἰεὶ ἢ ἔλαττον τῇ ὡς τῆς διχοτομίας τῆς ἀποπλεονέχουσι μείζων.

ΕΝ γὰρ τῷ $AB\Gamma$ τμήματι κεκλάσθωσαν εὐθεῖαι, αἱ μὲν $AB, B\Gamma$, ὥς τινὲς $AB\Gamma$ περιφέρειαν διχα τετμήσθω κατὰ τὸ B , τυχεύσας δὲ αἱ $AD, \Delta\Gamma$ & $AH, H\Gamma$. λέγω ὅτι συναμφοτέρος ἢ $AB, B\Gamma$ εὐθείας μέγισται ἐστὶ πασῶν τῶν ἐν τῷ τμήματι κλωμύμων εὐθειῶν, μείζων δὲ ἢ $AD, \Delta\Gamma$ τῶν $AH, H\Gamma$.




Επεὶ ἡ AB περιφέρειαν τῇ $B\Gamma$ περιφέρειᾳ ἴση ἐστὶ ἢ AB ἄρα εὐθεῖα τῇ $B\Gamma$ ἐστὶν ἴση. κέντρῳ ὅν τῷ B , διαστήματι δὲ ὅπου περιῶν τῇ $BA, B\Gamma$, γεγραφθῶς κύκλος ὁ $A\Theta Z\Theta\Gamma$, ἐκκεντρήσθω αἱ $AB\Theta, A\Delta Z, AH\Theta$. ἴση ἄρα ἐστὶ (διὰ τὸ ὡς τῆς διχοτομίας) ἢ μὲν EB τῇ $B\Gamma$, ἢ δὲ $Z\Delta$ τῇ $\Delta\Gamma$, & ἢ ΘH τῇ $H\Gamma$. ἐπεὶ ὅν ἡ AE διάμετρος ἐστὶ τοῦ $A\Theta Z$ κύκλου, μέγιστη ἢ ἄρα τῶν ἐν τῷ κύκλῳ εὐθειῶν ἢ AE , ἢ δὲ AZ μείζων τῆς $A\Theta$. ἀλλὰ τῇ μὲν AE ἴση συναμφοτέρος ἢ $AB, B\Gamma$, τῇ δὲ AZ ἢ $AD, \Delta\Gamma$, ἐστὶ τῇ $A\Theta$ ἢ $AH, H\Gamma$. & τῶν ἄρα μεγίστη μὲν ἢ $AB\Gamma$, μείζων δὲ ἢ $AD\Gamma$ τῆς $AH\Gamma$. καὶ ὁμοίως αἰεὶ ἢ ἔλαττον τῇ ὡς τῆς διχοτομίας τῆς ἀποπλεονέχουσι μείζων. ὃ προσέκειτο δεῖξαι.

κλω εὐθειῶν ἢ AE , ἢ δὲ AZ μείζων τῆς $A\Theta$. ἀλλὰ τῇ μὲν AE ἴση συναμφοτέρος ἢ $AB, B\Gamma$, τῇ δὲ AZ ἢ $AD, \Delta\Gamma$, ἐστὶ τῇ $A\Theta$ ἢ $AH, H\Gamma$. & τῶν ἄρα μεγίστη μὲν ἢ $AB\Gamma$, μείζων δὲ ἢ $AD\Gamma$ τῆς $AH\Gamma$. καὶ ὁμοίως αἰεὶ ἢ ἔλαττον τῇ ὡς τῆς διχοτομίας τῆς ἀποπλεονέχουσι μείζων. ὃ προσέκειτο δεῖξαι.

Ἄλλως.

ΕΣΤΩ κύκλος ὁ $AB\Gamma$, & ἐν τῷ $AB\Gamma$ τμήματι κεκλάσθω ἢ $AB\Gamma$ εὐθεῖαι, ὥς τινὲς $AB\Gamma$ περιφέρειαν διχα τετμήσθω κατὰ τὸ B . λέγω ὅτι συναμφοτέρος ἢ $AB, B\Gamma$ εὐθείας μέγισται ἐστὶ πασῶν τῶν ἐν τῷ αὐτῷ τμήματι κλωμύμων εὐθειῶν.



Κεκλάσθω γὰρ ἢ $AD\Gamma$, ἐκκεντρήσθω ἢ $A\Delta E$, & κείσθω ἢ ΔE τῇ $\Delta\Gamma$ ἴση, & ἐπεζεύχθωσαν αἱ BD, BE . ἐπεὶ ὅν ἡ AB περιφέρειαν τῇ $B\Gamma$ περιφέρειᾳ ἴση ἐστὶ, & ἐπὶ μὲν τῇ AB ἢ ὑπὸ $\angle B\Delta A$ γωνία βέβηκεν, ὅτι δὲ τῇ $B\Gamma$ ἢ ὑπὸ $\angle B\Delta\Gamma$ ἴση ἄρα ἢ ὑπὸ $\angle B\Delta A$ τῇ ὑπὸ $\angle B\Delta\Gamma$. κοινὴ προσκείσθω ἢ $\angle B\Delta E$ συναμφοτέρος ἄρα ἢ ὑπὸ $\angle B\Delta E, \angle B\Delta\Gamma$ ἐστὶν ἴση. & ἐστὶ συναμφοτέρος ἢ ὑπὸ $\angle B\Delta E, \angle B\Delta A$ δυσὶν ὀρθαῖς ἴση. & συναμφοτέρος ἄρα

ἄρα ἡ ὑπὸ Β Δ Ε, Β Α Γ δυὸν ὀρθαῖς ἐστὶν ἴση· ἐστὶ δὲ
 ἔ συναμφοτέρος ἡ ὑπὸ Β Δ Γ, Β Α Γ δυὸν ὀρθαῖς ἴση·
 συναμφοτέρος ἄρα ἡ ὑπὸ Β Δ Ε, Β Α Γ συναμφοτέρω
 τῇ ὑπὸ Β Δ Γ, Β Α Γ ἴση ἐστὶ· κοινῆς ἄρα ἀφαιρεθείσης
 τῆς ὑπὸ Β Α Γ, λοιπὴ ἡ ὑπὸ Β Δ Ε τῇ ὑπὸ Β Δ Γ ἴση
 ἐστὶ· ἐπεὶ ἔν ἴση μὲν ἡ Γ Δ τῇ Δ Ε, κοινὴ δὲ ἡ Β Δ,
 ἔ τοὺς ἴσας γωνίας· καὶ βάσις ἄρα ἡ Γ Β τῇ Β Ε ἐστὶν
 ἴση· καὶ ἐπεὶ αἱ Α Β, Β Ε εὐθεῖαι μείζονες εἰσι τῇ Α Ε,
 ἀλλὰ τῇ μὲν Α Β, Β Ε συναμφοτέρος ἡ Α Β, Β Γ ἴση
 ἐστὶ, τῇ δὲ Α Ε συναμφοτέρος ἡ Α Δ, Δ Γ ἴση ἐστὶ· καὶ
 συναμφοτέρος ἄρα ἡ Α Β Γ τῆς Α Δ Γ μείζων ἐστὶν·
 ὁμοίως δὲ δείκνυ) ἔ τῶν ἄλλων μείζων· συναμφο-
 τέρος ἄρα ἡ Α Β, Β Γ πασι τῶν ἐν τῷ τμήματι κλω-
 μένων μείζων ἐστὶν.


Ἀλλὰ δὴ ἔστω ἡ διχοτομία πρὸς τῷ Ζ· λέγω ὅτι
 ἡ τῷ Ζ ἐγγίον ἡ Α Β Γ συναμφοτέρος τῇ δότιερον τῆς
 Α Δ, Δ Γ μείζων ἐστὶν.

Ἐπεὶ γὰρ ἡ Α Ζ Β περιφέρει-
 ας τῇ Β Δ Γ περιφέρειας μεί-
 ζων ἐστὶ, καὶ ἡ ὑπὸ Β Δ Α ἄρα
 γωνία τῇ ὑπὸ Β Α Γ μείζων.
 κοινῆς ἀφαιρεθείσης τῇ Β Δ Ε,
 μείζονες εἰσι αἱ ὑπὸ Β Δ Ε,
 Β Δ Α τῇ ὑπὸ Β Δ Ε, Β Α Γ·
 αἱ ἄρα ὑπὸ Β Δ Ε, Β Α Γ
 ἐλάττωες εἰσι δυὸν ὀρθῶν.
 εἰσι δὲ αἱ ὑπὸ Β Δ Γ, Β Α Γ
 δυὸν ὀρθαῖς ἴση· αἱ ἄρα ὑπὸ
 Β Δ Γ, Β Α Γ τῇ ὑπὸ Β Δ Ε, Β Α Γ μείζονες εἰσι, καὶ
 κοινῆς ἀφαιρεθείσης τῇ ὑπὸ Β Α Γ, λοιπὴ ἡ ὑπὸ Β Δ Γ
 τῇ ὑπὸ Β Δ Ε μείζων ἐστὶν· ἐπεὶ ἔν ἴση ἡ Δ Γ τῇ Δ Ε,
 κοινὴ δὲ ἡ Δ Β, ἡ δὲ ὑπὸ Β Δ Γ τῇ ὑπὸ Β Δ Ε μεί-
 ζων· καὶ ἡ Γ Β ἄρα βάσις μείζων ἐστὶ τῇ Β Ε βάσει.
 καὶ ἐπεὶ αἱ Α Β, Β Ε εὐθεῖαι μείζονες εἰσι τῇ Α Ε, τῇ
 δὲ Α Β, Β Ε συναμφοτέρος ἡ Α Β, Β Γ μείζων ἐστὶ.
 συναμφοτέρος ἄρα ἡ Α Β, Β Γ τῇ Α Ε, τῇ δὲ Α Ε, Β Γ
 συναμφοτέρος τῇ Α Δ, Δ Γ, μείζων.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ μη'.

Εὰν πῶσιν ἀνίσωι εὐθειῶν τὸ δότὸ τῇ μείζονος καὶ τῇ
 ἐλαττοῦς τὸ συναμφοτέρω τετραγώνον ἴσον ἢ
 συναμφοτέρω τῷ δότὸ τῇ λοιπῶν ἢ συγκειμένη
 εὐθεῖα ὅκ τῇ μείζονος καὶ τῇ ἐλαττοῦς ἐλάττω
 ἔσαι τῇ συγκειμένης ὅκ τῇ λοιπῶν.


ΕΣΤΩΣΑΝ πῶσιν εὐθεῖαι αἱ Α Β, Β Γ, Δ Ε,
 Ε Ζ, καὶ μείζων μὲν πασι τῶν ἑσώ ἡ Α Β, ἐλαττοῦς



ἢ ἡ Β Γ, ἢ ἡ Δ Ε τῇ Ε Ζ μὴ ἐλάττω ἔστω, ἔστω ἢ πᾶ
 δότὸ Α Β, Β Γ τοῖς δότὸ Δ Ε, Ε Ζ ἴσαι· λέγω ὅτι ἡ
 Α Γ τῇ Δ Ζ ἐλάττω ἐστὶν.

æquales sunt duobus rectis. sunt autem anguli
 Β Δ Γ, Β Α Γ simul sumpti æquales duobus rectis:
 utrique igitur Β Δ Ε, Β Α Γ utrisque Β Δ Γ, Β Α Γ
 æquales sunt; &, dempto communi Β Α Γ, reli-
 quus Β Δ Ε reliquo Β Δ Γ est æqualis. itaque quo-
 niam Γ Δ est æqualis ipsi Δ Ε, & communis
 Β Δ; suntque circa æquales angulos: basis Γ Β
 basi Β Ε æqualis erit. & quoniam Α Β, Β Ε si-
 mul majores sunt ipsa Α Ε; utrisque vero Α Β,
 Β Ε simul sumptis æquales sunt Α Β, Β Γ, & ipsi Α Β
 æquales sunt utraque Α Δ, Δ Γ: erunt Α Β, Β Γ simul
 sumptæ quam Α Δ, Δ Γ majores. pari modo &
 aliis majores ostenduntur: ergo Α Β, Β Γ simul
 sumptæ majores sunt quibuscunque aliis quæ in
 portione Α Β Γ inflectuntur.

Sed fit punctum circumferentiæ medium ad
 Ζ: dico utraq; Α Β, Β Γ, quæ puncto Ζ pro-
 pinquiores sunt, ipsis Α Δ, Δ Γ remotioribus ma-
 jores esse.




Quoniam enim circum-
 ferentia Α Ζ Β major est
 quam circumferentia Β Δ Γ;
 angulus Β Δ Α angulo Β Α Γ
 est major. &, communi ap-
 posito Β Δ Ε, erunt Β Δ Ε,
 Β Δ Α anguli majores an-
 gulis Β Δ Ε, Β Α Γ: ergo
 Β Δ Ε, Β Α Γ sunt duobus
 rectis minores. & sunt Β Δ Γ,
 Β Α Γ æquales duobus re-
 ctis; anguli igitur Β Δ Γ,
 Β Α Γ angulis Β Δ Ε, Β Α Γ simul sumptis majores
 sunt; & dempto communi Β Α Γ, reliquus Β Δ Γ
 major erit reliquo Β Δ Ε. quoniam igitur Δ Γ est
 æqualis ipsi Δ Ε, & communis Δ Β, angulus au-
 tem Β Δ Γ major est angulo Β Δ Ε; erit basis
 Γ Β basi Β Ε major. & quoniam rectæ Α Β, Β Ε
 simul sumptæ majores sunt quam Α Ε, ipsis vero
 Α Β, Β Ε simul majores sunt Α Β, Β Γ simul sum-
 ptæ: igitur Α Β, Β Γ simul majores sunt quam
 Α Ε, hoc est quam ipsæ Α Δ, Δ Γ simul sumptæ.

Β Α Γ angulis Β Δ Ε, Β Α Γ simul sumptis majores
 sunt; & dempto communi Β Α Γ, reliquus Β Δ Γ
 major erit reliquo Β Δ Ε. quoniam igitur Δ Γ est
 æqualis ipsi Δ Ε, & communis Δ Β, angulus au-
 tem Β Δ Γ major est angulo Β Δ Ε; erit basis
 Γ Β basi Β Ε major. & quoniam rectæ Α Β, Β Ε
 simul sumptæ majores sunt quam Α Ε, ipsis vero
 Α Β, Β Ε simul majores sunt Α Β, Β Γ simul sum-
 ptæ: igitur Α Β, Β Γ simul majores sunt quam
 Α Ε, hoc est quam ipsæ Α Δ, Δ Γ simul sumptæ.

PROP. XLVIII. Theor.

Si, quatuor rectis lineis inæqualibus exi-
 stentibus, quadrata maximæ & mini-
 mæ æqualia sint quadratis reliquarum:
 recta composita ex maxima & mini-
 ma minor erit ea quæ ex reliquis
 componitur.

SINT quatuor rectæ lineæ Α Β, Β Γ, Δ Ε, Ε Ζ,
 quarum maxima sit Α Β, & Β Γ minima; Δ Ε




vero non sit minor quam Ε Ζ; & sint quadrata
 ex Α Β, Β Γ quadratis ex Δ Ε, Ε Ζ æqualia: dico
 lineam Α Γ minorem esse quam Δ Ζ.

[] U

Ducantur

Ducantur enim ad rectos angulos $BH, B\Theta$, & ponatur BH ipsi $B\Gamma$ æqualis, & $B\Theta$ æqualis EZ ; jungaturque $AH, \Delta\Theta$, describatur semicirculus circa triangulum orthogonium ABH . & quoniam quadrata ex $AB, B\Gamma$, hoc est ex AB, BH , quadratis ex $\Delta E, E\Theta$ sunt æqualia; erit quadratum ex AH æquale quadrato ex $\Delta\Theta$, & recta AH ipsi $\Delta\Theta$ æqualis. est autem $E\Theta$ major quam BM : quare aptata in semicirculo recta æqualis ipsi $E\Theta$ angulum BHA secabit. itaque aptetur, & sit HK : & juncta AK producat, ut sit KA æqualis ipsi KH . quoniam igitur quadrata ex AK, KH quadratis ex AB, BH æqualia sunt; quadrata autem ex AB, BH æqualia quadratis ex $\Delta E, E\Theta$: erunt quadrata ex AK, KH quadratis ex $\Delta E, E\Theta$ æqualia, quorum quadratum ex KH

ἡχθῶσιν πρὸς ὀρθὰς αἱ $BH, E\Theta$, καὶ κείσθω ἴση ἡ μὲν BH τῇ $B\Gamma$, ἢ $\tilde{\Gamma}$ $E\Theta$ τῇ EZ , Ἐπεὶ εὐχθῶσιν αἱ $AH, \Delta\Theta$, καὶ γεγραφθῶ περὶ τοῦ ABH ὀρθογώνιον ἡμικύκλιον. ὥστε ἔν τῷ δὲ $AB, B\Gamma$, ταῦτε τὰ δὲ AB, BH , τοῖς δὲ $\Delta E, E\Theta$ ἴσαι ἐστὶ καὶ τὸ δὲ AH ἄρα τῷ δὲ $\Delta\Theta$ ἴσων ἴσων, καὶ ἡ AH τῇ $\Delta\Theta$. καὶ ἐπεὶ ἡ $E\Theta$ τῇ BH μείζων ἐστὶν ἢ ἄρα τῇ $E\Theta$ ἴση, συναρμολογήσῃ τῷ ἡμικυκλίῳ, περὶ τὴν ὑπὸ BHA γωνίαν. ἐνηρμόσθω ἡ HK ἴση ἔστω τῇ $E\Theta$, καὶ ἐπεὶ εὐχθῶ ἡ AK , καὶ ἐκτελέσθω, καὶ ἔστω ἴση ἡ KA τῇ KH . ἐπεὶ ἔν τῷ δὲ AK, KH τοῖς δὲ AB, BH ἴσαι ἐστὶ, τὰ δὲ δὲ AB, BH τοῖς δὲ $\Delta E, E\Theta$ ἴσαι ἐστὶ τὰ ἄρα δὲ AK, KH τοῖς δὲ $\Delta E, E\Theta$ ἴσαι ἐστὶν, ὧν τὸ δὲ KH τῷ δὲ $E\Theta$ ἴσων. λοι-



est æquale quadrato ex $E\Theta$: reliquum igitur quadratum ex AK reliquo ex ΔE æquale erit, & recta AK ipsi ΔE æqualis: ergo triangulum AKH est æquale & simile triangulo $\Delta E\Theta$, & recta AA æqualis ipsi ΔZ . itaque quoniam recta linea AK non est minor quam KH ; neque circumferentia AK minor erit quam circumferentia KH : quare cum in circuli portione inflectantur rectæ AK, KH ; AB, BH , sintque AK, KH vel ad punctum circumferentiæ medium, vel ipsi propinquiore: erunt, ex antecedenti theoremate, AK, KH majores quam AB, BH , hoc est AA sive ΔZ major erit quam AG : minor est igitur AG quam ΔZ . quod erat demonstrandum.

PROP. XLIX. Theor.

Si duæ rectæ lineæ inæquales dividantur, ita ut quadrata partium minoris æqualia sint quadratis partium majoris: earum omnium maxima quidem erit major minoris pars, minor vero minima.

SINT rectæ lineæ $AB\Gamma, \Delta EZ$ in B, E punctis ita divisæ, ut ΔE sit major quam EZ , & AB non minor quam $B\Gamma$; sitque AG major quam ΔZ ; quadrata vero ex $AB, B\Gamma$ quadratis ex $\Delta E, EZ$ sint æqualia: dico harum rectarum $AB, B\Gamma, \Delta E, EZ$ maximam esse ΔE , & EZ minimam.

Ducatur enim ipsi AG ad rectos angulos BH, α æqualis ipsi $B\Gamma$, & jungatur AH ; circa triangulum vero orthogonium ABH describatur semicirculus. quoniam igitur recta AB non est minor quam BH , neque AB circumferentia circumferentiæ BH minor erit: & idcirco circumferentiæ ABH punctum medium vel erit ad B , vel in circumferen-

ΠΡΟΤΑΣΙΣ μδ'.

Εάν δύο εὐθεῖαι ἀποσι διηρηθῶσιν ὥς, τὰ δὲ δὲ τῷ τῷ ἐλάττωτος τμημάτων τετραγώνια ἴσα ἢ τοῖς δὲ τῷ μείζονος τμημάτων τετραγώνιοις: τῷ πλεονέκῳ τμημάτων μέγιστον ἔσται τὸ τῷ ἐλάττωτος μῆκρον τμήμα, ἐλάχιστον δὲ τὸ ἐλάττωτος.

ΕΣΤΩΣΑΝ εὐθεῖαι δύο ἀνισοὶ αἱ $AB\Gamma, \Delta EZ$ διηρηθῶσιν κατὰ τὰ B καὶ E σημεία, ὥς τῷ μὲν ΔE τῷ EZ μείζονα εἶναι, τὴν δὲ AB τῇ $B\Gamma$ μὴ εἶναι ἐλάχιστον, καὶ μείζον μὲν ἔστω ἡ AG τῇ ΔZ , τὰ δὲ δὲ τῷ $AB, B\Gamma$ τετραγώνια τοῖς δὲ τῷ $\Delta E, EZ$ τετραγώνιοις ἴσα. λέγω ὅτι τῷ $AB, B\Gamma, \Delta E, EZ$ εὐθεῖαν μεγίστη μὲν ἐστὶν ἡ ΔE , ἐλάχιστη δὲ ἡ EZ .

ἡχθῶ πρὸς ὀρθὰς τῇ AG ἡ BH ἴση ἔστω τῇ $B\Gamma$, Ἐπεὶ εὐχθῶ ἡ AH , καὶ ὥς τὸ ABH ὀρθογώνιον γεγραφθῶ ἡμικύκλιον. ἐπεὶ ἔν τῷ AB εὐθεῖα τῇ BH οὐκ ἐστὶν ἐλάχιστη, Ἐ ἡ AB περιφέρεια τῆς BH οὐκ ἐστὶν ἐλάχιστη ἢ ἄρα τῆς ABH περιφέρειας διχοτομία ἔστι κατὰ τὸ B εἶναι, ἢ ὅπῃ τῆς AB περιφέρειας,

PROP. LI. Theor.

Si conus scalenus per axem fecetur: eorum quæ sunt triangulorum quod majus est majorem perimetrum habet; quodque majorem habet perimetrum illud majus est triangulum.

SECEtur conus scalenus per axem AB, & sectiones fiant AΓΔ, AΕΖ triangula, quorum majus sit AΓΔ, ita ut BA quidem sit major quam AZ, ΓA vero non minor quam AΔ: dico AΓΔ perimetrum perimetro AΕΖ minorem esse.

Quoniam enim æquales sunt ΓΔ, ΕΖ bases, communis autem ducta est BA à vertice ad punctum quo bifecantur bases, & triangulum AΕΖ minus est triangulo AΓΔ; habebit BA ad AZ majorem rationem quam ΓA ad AΔ, ut in vigesimo theoremate demonstratum est: ergo BA maxima est è quatuor lineis, & AZ minima. id quod [ad 17. & 18. huj.] ostensum est. & quoniam quadrata è maxima & minima, hoc est quadrata ex EA, AZ simul, quadratis ex ΓA, AΔ simul sunt æqualia; erunt utraque EA, AZ simul [per præcedens 48^{um} theorema] minores utrisque ΓA, AΔ. apponantur ΕΖ, ΓΔ: tota igitur AΕΖ perimeter totâ perimetro AΓΔ est minor: ergo majoris trianguli perimeter major erit.

Ex quibus perspicuum est, in conis scalenis maximi quidem trianguli per axem facti, hoc est æquicruris, perimetrum esse maximam; minimi vero, hoc est ejus quod ad rectos angulos insistit basi conî, perimetrum minimam esse; è reliquis vero semper triangulum quod majus est majorem perimetrum habere quam quod minus.

Rursus ponatur trianguli ΓAΔ perimeter major perimetro EAZ: dico triangulum AΓΔ triangulo EAZ majus esse.

Quoniam enim AΓΔ perimeter major est perimetro EAZ, æqualis autem ΓΔ ipsi ΕΖ; erunt reliquæ ΓA, AΔ reliquis EA, AZ majores. sed quadrata ex ΓA, AΔ æqualia sunt quadratis ex EA, AZ: ergo quatuor rectorum ΓA, AΔ, EA, AZ maxima quidem est EA, minima vero AZ: (quæ omnia ante [per 49. huj.] demonstrata sunt) quare EA ad AZ majorem habet rationem quam AΔ ad AΓ. itaque quoniam duo triangula ΓAΔ, EAZ bases æquales habent, eandemque habent illam quæ à vertice ad punctum basim bifariam secans ducitur, alterius autem majus latus ad minus majorem rationem habet quam alterius majus latus ad minus, vel æquale ad æquale; triangulum igitur EAZ minus erit: triangulum igitur ΓAΔ majus est triangulo EAZ, ut in decima nona hujus demonstratum est.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ να'.

Εάν κώνος σκαληνός διὰ τῆς ἀξὸνος τμηθῇ· τὸ γινόμενον τετράγωνον τὸ μείζον μείζονα περιμέτρον ἔχει, καὶ τὸ τετράγωνον μείζον ἢ περιμέτρος καὶ αὐτὸ μείζον ὅσιν.

ΤΕΤΜΗΣΘΩ κώνος σκαληνός διὰ τῆς ἀξὸνος, ἢ γενέσθω ἐκ τῆς τομῆς τὰ AΓΔ, AΕΖ τρίγωνα, μείζον δὲ τὸ AΓΔ, ὥστε πλὴν μὲν ΕΑ τῆς ΑΖ μείζονα εἶναι, τὴν δὲ ΓΑ τῆς ΑΔ μὴ ἐλάττωσαν· λέγω ὅτι ἡ AΓΔ περιμέτρος τῆς AΕΖ περιμέτρος μείζων ἐστίν.

Ἐπεὶ γὰρ ἴση μὲν αἱ ΓΔ, ΕΖ βάσεις, κοινὴ δὲ ἡ κατὰ τὴν ΒΑ διὰ τὴν πλὴν διχοτομίαν αὐτῶν ἀπὸ τῆς κορυφῆς, καὶ ἐστὶ τὸ AΕΖ τῆς AΓΔ ἐλάττω· ἡ ἄρα ΕΑ πρὸς ΑΖ μείζονα λόγον ἔχει ἢ ἡ ΓΑ πρὸς ΑΔ, ὡς ἐδείχθη ἐν τῷ κ'. θεωρήματι· ἡ μὲν ἄρα ΕΑ μείζων ἐστὶ τῆς ΑΖ πρὸς ΑΔ, ὡς ἐδείχθη ἐν τῷ κ'. καὶ ἡ ΑΖ ἐλάττω, ἢ ἡ ΓΑ ἐλάττω, πᾶντα γὰρ ἐδείχθη ἐν τῷ ιζ'. καὶ ἡ ΕΑ πρὸς ΑΖ μείζων καὶ ἡ ΑΖ ἐλάττω, γὰρ ἐστὶ τὰ ἀπὸ ΕΑ, ΑΖ, τοῖς ἀπὸ ΓΑ, ΑΔ ἴσα ἐστὶ· συναμφοτέρως ἄρα ἡ ΕΑ, ΑΖ εὐθείαι συναμφοτέρως τῆς ΓΑ, ΑΔ ἐλάττω ἐστὶ, διὰ τὸ μὴ· θεωρήματι τῷ κ'. θεωρήματι δὲ ΕΖ, ΓΔ· ὅλη ἄρα ἡ AΕΖ περιμέτρος ὅλης τῆς AΓΔ περιμέτρος ἐλάττω ἐστὶ· μείζων ἄρα ἡ AΓΔ μείζονος περιμέτρος.

Καὶ γέγονε φανερόν ὅτι, ἐν τοῖς σκαληνοῖς κώνοις, τὸ διὰ τῆς ἀξὸνος τετράγωνον μείζον μὲν ἢ τῆς μείζωνος περιμέτρος, γὰρ ἐστὶ ἰσοσκελὲς· ἐλάττω δὲ ἢ ἐλάττω, γὰρ ἐστὶ πρὸς ὀρθῇ τῇ βάσει τῆς κώνου· τὸ δ' ἄλλων αἰετὶ τὸ μείζον μείζονα περιμέτρον ἔχει ἢ ἡ πρὸς τὸ ἐλάττω.

Πάλιν ὑποκείσθω ἡ AΓΔ τετράγωνον περιμέτρος μείζων εἶναι τῆς ΕΑΖ· λέγω δὲ ὅτι τὸ AΓΔ τετράγωνον τῆς ΕΑΖ μείζον ἐστίν.

Ἐπεὶ γὰρ ἡ AΓΔ περιμέτρος τῆς ΕΑΖ περιμέτρος μείζων ἐστὶ, ἴση δὲ ἡ ΓΔ τῇ ΕΖ· λοιπὴ ἄρα συναμφοτέρως ἡ ΓΑ, ΑΔ συναμφοτέρως τῆς ΕΑ, ΑΖ μείζων ἐστὶ. καὶ ἐστὶ τὰ ἀπὸ ΓΑ, ΑΔ τοῖς ἀπὸ ΕΑ, ΑΖ ἴσα· τὴν ἄρα ΓΑ, ΑΔ, ΕΑ, ΑΖ εὐθειῶν μείζων μὲν ἐστὶ ἡ ΕΑ, ἐλάττω δὲ ἡ ΑΖ· πᾶντα γὰρ ἀπαντα περὶ δέδεικται· ἡ ΕΑ ἄρα πρὸς ΑΖ μείζονα λόγον ἔχει ἢ ἡ ΑΔ πρὸς ΑΓ. ἐπεὶ ἂν δύο τρίγωνα τὰ ΓΑΔ, ΕΑΖ βάσεις ἴσας ἔχει, ἔχει δὲ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς κορυφῆς διὰ τὴν διχοτομίαν τῆς βάσεως ἡγμένην τὴν αὐτὴν, ἢ ἡ ΕΑ πρὸς ΑΖ μείζων πλὴν πρὸς τὸ ἐλάττω μείζονα λόγον ἔχει ἢ ἡ ΑΔ πρὸς ΑΓ πρὸς τὸ ἐλάττω, ὥστε πᾶν τοῦ ΕΑΖ τετράγωνον ἐλάττω ἐστὶ μείζον ἄρα τὸ AΓΔ τετράγωνον τῆς ΕΑΖ, ὡς ἐδείχθη ἐν τῷ θεωρήματι ιθ'. τέτατος βιβλίου.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ 16.

Τῶν ἴσων μὲν καὶ ὀρθῶν κώνων, ἀνομοίων δὲ, ἀντιπέπονθε τὰ διὰ τῶν ἀξόνων τεύχονα ταῖς ἐαυτῶν βάσεσιν.

ΕΣΤΩΣΑΝ κώνοι ὀρθοὶ καὶ ἴσοι, ἀνόμοιοι δὲ, ὧν κορυφαὶ μὲν αὖτε Α, Β σημεῖα, ἀξόνες δὲ οἱ ΑΗ, ΒΘ, καὶ διὰ τῶν ἀξόνων τεύχονα καὶ ΑΓΔ, ΒΕΖ, βάσεις δὲ τῶν κώνων οἱ περὶ τὰς ΓΔ, ΕΖ διαμέτρους κύκλοι· λέγω ὅτι ὡς τὸ ΑΓΔ τεύχονον πρὸς τὸ ΒΕΖ ἕτως ἡ ΕΖ βάσις πρὸς τὴν ΓΔ.

Ἐπεὶ γὰρ ἴσοι εἰσὶν οἱ κώνοι, ὡς ἄρα ὁ περὶ τὸ Η κέντρον κύκλος πρὸς τὸν περὶ τὸ Θ κέντρον ἕτως ἡ ΒΘ πρὸς τὴν ΑΗ· ὁ δὲ περὶ τὸ Η κέντρον κύκλος πρὸς τὸν περὶ τὸ Θ κέντρον διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περὶ ἡ ΓΔ πρὸς τὴν ΕΖ. ἐστὶν οὖν ΒΘ ΑΗ μέση ἀνάλογον ἢ ΚΗ, καὶ ἐπεὶ εὐχθῶσιν αἱ ΚΓ, ΚΔ· ὡς ἄρα ἡ ΓΔ πρὸς τὴν ΕΖ ἕτως ἡ ΒΘ πρὸς τὴν ΚΗ, ἢ ἡ ΚΗ πρὸς τὴν ΑΗ. ἐπεὶ ἔν ὡς ἡ ΓΔ πρὸς τὴν ΕΖ ἕτως ἡ ΒΘ πρὸς τὴν ΚΗ, τὸ ΒΕΖ ἄρα τεύχονον ἴσον ἐστὶ τῷ ΚΓΔ τεύχονον. καὶ ἐπεὶ ὡς ἡ ΓΔ πρὸς τὴν ΕΖ ἕτως ἡ ΚΗ πρὸς τὴν ΑΗ, ὡς δὲ ἡ ΚΗ πρὸς τὴν ΑΗ ἕτως τὸ ΚΓΔ τεύχονον πρὸς τὸ ΑΓΔ· ὡς ἄρα ἡ ΓΔ πρὸς τὴν ΕΖ ἕτως τὸ ΚΓΔ τεύχονον, τετάρτη τὸ ΒΕΖ τεύχονον, πρὸς τὸ ΑΓΔ τεύχονον· ἢ ὡς ἄρα τὸ ΑΓΔ τεύχονον πρὸς τὸ ΒΕΖ ἕτως ἡ ΕΖ βάσις πρὸς τὴν ΓΔ βάσιν. ἀντιπέπονθεν ἄρα τὰ ἐκκεῖνθα τεύχονα τῶν ἐαυτῶν βάσεσιν.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ 17.

Ὦν κώνων ὀρθῶν ἀντιπέπονθε τὰ διὰ τῶν ἀξόνων τεύχονα ταῖς ἐαυτῶν βάσεσιν, ἔσται ἴσοι εἰσὶν ἀλλήλοις.

ΕΣΤΩΣΑΝ κώνων ὀρθῶν κορυφαὶ μὲν αὖτε Α, Β σημεῖα, ἀξόνες δὲ αἱ ΑΗ, ΒΘ εὐθεῖαι, καὶ διὰ τῶν ἀξόνων τεύχονα καὶ ΑΓΔ, ΒΕΖ, καὶ ἕως ὡς ἡ ΓΔ πρὸς τὴν ΕΖ ἕτως τὸ ΒΕΖ τεύχονον πρὸς τὸ ΑΓΔ· λέγω ὅτι ἴσοι εἰσὶν ἀλλήλοις οἱ κώνοι.

Γενέσθω ὡς τὸ ΒΕΖ τεύχονον πρὸς τὸ ΑΓΔ ἕτως τὸ ΑΓΔ πρὸς τὸ ΚΕΖ· τὸ ΒΕΖ ἄρα πρὸς τὸ ΚΕΖ διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περὶ τὸ ΑΓΔ πρὸς τὸ ΚΕΖ.

* Propositio hæc, ut & reliquæ omnes hujus Libri, multo facilius demonstratur ex eo quod ratio Coni ad Conum componitur, ex ratione triangulorum per Axes & ratione diametrorum basium. Sit enim unius Coni altitudo a & basis diameter b , alterius vero altitudo α & diameter basis β . Manifestum est triangula per Axes esse inter se ut $a b$ ad $\alpha \beta$; bases autem ut $b b$ ad $\beta \beta$; Conos vero ipsos ut $a b b$ ad $\alpha \beta \beta$. Hinc si ponatur $a b b$ ipsi $\alpha \beta \beta$ æquale; erit ἀνάλογον [per 16.6.] ut $a b$ ad $\alpha \beta$ ita β ad b . quod erat demonstrandum.

PROP. LII. Theor.

Triangula per axes æqualium & rectorum conorum, dissimilium vero, reciproce proportionalia sunt suis basibus.

SINT recti conī æquales, sed dissimiles, quorum vertices Α, Β puncta, axes ΑΗ, ΒΘ; & triangula per axes ΑΓΔ, ΒΕΖ; bases autem circuli circa diametros ΓΔ, ΕΖ: dico ut triangulum ΑΓΔ ad triangulum ΒΕΖ ita esse basim ΕΖ ad basim ΓΔ.

Quoniam enim conī sunt æquales, erit [per 15.12.] ut circulus circa centrum Η ad circulum circa Θ ita axis ΒΘ ad axem ΑΗ; circulus autem circa Η [per 2.12.] ad circulum circa Θ duplicatam rationem habet ejus quam habet ΓΔ ad ΕΖ. sit inter ΒΘ & ΑΗ media proportionalis ΚΗ; & jungantur ΚΓ, ΚΔ. erit igitur ut ΓΔ ad ΕΖ ita ΒΘ ad ΚΗ, & ita ΚΗ ad ΗΑ. quoniam igitur ut ΓΔ ad ΕΖ ita ΒΘ ad ΚΗ, erit triangulum ΒΕΖ triangulo ΚΓΔ æquale. & quoniam ut ΓΔ ad ΕΖ ita est ΚΗ ad ΗΑ; ut autem ΚΗ ad ΗΑ ita ΚΓΔ triangulum ad triangulum ΑΓΔ; erit igitur ut ΓΔ ad ΕΖ ita triangulum ΚΓΔ, hoc est ΒΕΖ, ad triangulum ΑΓΔ: ergo ut ΑΓΔ triangulum ad triangulum ΒΕΖ ita basis ΕΖ ad ΓΔ basim. triangula igitur exposita suis basibus reciproce sunt proportionalia.

PROP. LIII. Theor.

Coni recti, quorum triangula per axes reciproce proportionalia sunt suis basibus, sunt inter se æquales.


SINT conorum vertices quidem Α, Β, axes rectæ ΑΗ, ΒΘ; triangula vero per axes ΑΓΔ, ΒΕΖ; & sit ut ΓΔ ad ΕΖ ita triangulum ΒΕΖ ad triangulum ΑΓΔ: dico conos inter se æquales esse.

Fiat enim ut ΒΕΖ triangulum ad triangulum ΑΓΔ ita ΑΓΔ ad triangulum ΚΕΖ; ergo triangulum ΒΕΖ ad triangulum ΚΕΖ duplicatam habet rationem ejus quam habet triangulum ΑΓΔ ad ipsum ΚΕΖ.

[] X

quoniam

quoniam igitur ut $\Gamma\Delta$ ad EZ ita BEZ triangulum ad triangulum $ΑΓΔ$; ut autem triangulum BEZ ad ipsum $ΑΓΔ$ ita $ΑΓΔ$ ad triangulum $ΚΕΖ$; erit igitur ut $\Gamma\Delta$ ad EZ ita $ΑΓΔ$ triangulum ad triangulum $ΚΕΖ$: quare cum triangula $ΑΓΔ$, $ΚΕΖ$ inter se sint sicut bases [ex convers. 1.6.] sub eadem erunt altitudine: ergo AH ipsi $K\Theta$ est æqualis. habet autem circulus H ad circulum Θ duplicatam rationem ejus quam habet $\Gamma\Delta$ diameter ad diametrum EZ ; & ut $\Gamma\Delta$ ad EZ ita triangulum $ΑΓΔ$ ad triangulum $ΕΚΖ$: ergo circulus H ad circulum Θ duplicatam rationem habet ejus quam $\Gamma\Delta$ triangulum ad triangulum $ΕΚΖ$. habebat autem & triangulum EBZ ad triangulum $ΕΚΖ$ duplicatam rationem ejus quam habet $\Gamma\Delta$ triangulum ad triangulum $ΕΚΖ$: ergo ut circulus H ad circulum Θ ita EBZ triangulum ad triangulum $ΕΚΖ$, hoc est recta $B\Theta$ ad ipsam ΘK . est autem ΘK ipsi AH æqualis: igitur ut circulus H ad circulum Θ ita recta $B\Theta$ ad AH . & sunt $B\Theta$, AH axes conorum qui reciproce sunt proportionales suis basibus videlicet circulis H , Θ : ergo coni $AH\Gamma\Delta$, $B\Theta EZ$ [per 15.12.] inter se æquales sunt.*




ἐπεὶ ὅν ὡς ἡ $\Gamma\Delta$ πρὸς τὴν EZ ὅτως τὸ BEZ τρίγωνον πρὸς τὸ $ΑΓΔ$, ὡς ἡ $\tauὸ BEZ$ πρὸς τὸ $ΑΓΔ$ ὅτως τὸ $ΑΓΔ$ πρὸς τὸ $ΚΕΖ$. ὡς ἄρα ἡ $\Gamma\Delta$ πρὸς τὴν EZ ὅτως τὸ $ΑΓΔ$ τρίγωνον πρὸς τὸ $ΚΕΖ$. ὥστε ἐπεὶ τὰ $ΑΓΔ$, $ΚΕΖ$ τρίγωνα πρὸς ἀλλήλας εἰσι ὡς αἱ βάσεις, ὑπὸ τὸ αὐτὸ ἄρα ὕψος εἰσὶν ἴση ἄρα ἡ AH τῇ $K\Theta$. καὶ ἐπεὶ ὁ H κύκλος πρὸς τὸν Θ κύκλον διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ $\Gamma\Delta$ διμέτρος πρὸς τὴν EZ , ὡς δὲ ἡ $\Gamma\Delta$ διμέτρος πρὸς τὴν EZ ὅτως τὸ $ΑΓΔ$ τρίγωνον πρὸς τὸ $ΕΚΖ$. ὁ ἄρα H κύκλος πρὸς τὸν Θ κύκλον διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περ τὸ $ΑΓΔ$ τρίγωνον πρὸς τὸ $ΕΚΖ$. εἶχε δὲ καὶ τὸ EBZ πρὸς τὸ $ΕΚΖ$ διπλασίονα λόγον ἢ περ τὸ $ΑΓΔ$ πρὸς τὸ $ΕΚΖ$. ὡς ἄρα ὁ H κύκλος πρὸς τὸν Θ κύκλον ὅτως τὸ EBZ τρίγωνον πρὸς τὸ $ΕΚΖ$, τῆστιν ἡ $B\Theta$ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΘK . καὶ εἰσὶν ἡ ΘK τῇ AH ἴση. ὡς ἄρα ὁ H κύκλος πρὸς τὸν Θ κύκλον ὅτως ἡ $B\Theta$ εὐθεῖα πρὸς τὴν AH . καὶ εἰσὶν αἱ $B\Theta$, AH ἄξονες τῶν κώνων, ὧς ἀντιπεπόμενοι τῇ βάσει, τῆστιν τοῖς H , Θ κύκλοις. οἱ ἄρα $AH\Gamma\Delta$, $B\Theta EZ$ κώνοι ἴσοι ἀλλήλοις εἰσὶν.

PROP. LIV. Theor.

Si in duobus conis rectis basis unius ad basim alterius duplicatam rationem habeat ejus quam habet conus ad conum; triangula per axes inter se æqualia erunt.

SIT conus recti, quorum vertices puncta A , B ; bases circuli circa centra H , Θ , & triangula per axes $ΑΓΔ$, $ΒΕΖ$: habeat autem circulus H ad circulum Θ duplicatam rationem ejus quam $ΑΓΔ$ conus ad conum $ΒΕΖ$: dico triangula $ΑΓΔ$, $ΒΕΖ$ inter se æqualia esse.

Sit enim ut $AH\Gamma\Delta$ conus ad $B\Theta EZ$ ita $B\Theta EZ$ ad conum $K\Theta EZ$. & quoniam circulus H ad circulum Θ duplicatam rationem habet ejus quam $AH\Gamma\Delta$ conus ad conum $B\Theta EZ$; conus autem $AH\Gamma\Delta$ ad conum $K\Theta EZ$ rationem duplicatam habet ejus quam $AH\Gamma\Delta$ conus ad conum $B\Theta EZ$: erit igitur ut circulus H ad circulum Θ ita conus $AH\Gamma\Delta$ ad conum $K\Theta EZ$. quare cum $AH\Gamma\Delta$, $K\Theta EZ$ coni inter se sint sicut bases, ejusdem erunt altitudinis, & conversa undecimæ duodecimi elementorum: unde AH ipsi



ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΔ'.

Εάν δύο κώνων ὀρθῶν ἡ βάσις πρὸς τὴν βάσιν διπλασίονα λόγον ἔχῃ ἢ περ ὁ κώνος πρὸς τὸν κώνον· τὰ διὰ τῶν ἀξόνων τρίγωνα ἴσα ἀλλήλοις εἴσιν.

ΕΣΤΩΣΑΝ κώνοι ὀρθοί, ὧν κερυφαὶ μὲν τὰ A , B σημεῖα, βάσεις δὲ οἱ περὶ τὰ H , Θ κέντρα κύκλοι, τὰ δὲ διὰ τῶν ἀξόνων τρίγωνα τὰ $ΑΓΔ$, $ΒΕΖ$. ἐχέτω δὲ ὁ H κύκλος πρὸς τὸν Θ διπλασίονα λόγον ἢ περ ὁ $AH\Gamma\Delta$ κώνος πρὸς τὸν $B\Theta EZ$. λέγω ὅτι τὰ $ΑΓΔ$, $ΒΕΖ$ τρίγωνα ἴσα ἀλλήλοις εἴσιν.

Εἰσω ὡς ὁ $AH\Gamma\Delta$ κώνος πρὸς τὸν $B\Theta EZ$ ὅτως ὁ $B\Theta EZ$ πρὸς τὸν $K\Theta EZ$. καὶ ἐπεὶ ὁ H κύκλος πρὸς τὸν Θ κύκλον διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περ ὁ $AH\Gamma\Delta$ κώνος πρὸς τὸν $B\Theta EZ$ κώνον, ὡς ἄρα ὁ $AH\Gamma\Delta$ κώνος πρὸς τὸν $K\Theta EZ$ κώνον. ὥστε ἐπεὶ οἱ $AH\Gamma\Delta$, $K\Theta EZ$ κώνοι πρὸς ἀλλήλους εἰσὶν ὡς αἱ βάσεις, ἴσου ὕψους ἄρα εἰσὶ, διὰ τὰ ἀντίστροφον

διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περ ὁ $AH\Gamma\Delta$ κώνος πρὸς τὸν $B\Theta EZ$. ὡς ἄρα ὁ H κύκλος πρὸς τὸν Θ κύκλον ὅτως ὁ $AH\Gamma\Delta$ κώνος πρὸς τὸν $K\Theta EZ$ κώνον. ὥστε ἐπεὶ οἱ $AH\Gamma\Delta$, $K\Theta EZ$ κώνοι πρὸς ἀλλήλους εἰσὶν ὡς αἱ βάσεις, ἴσου ὕψους ἄρα εἰσὶ, διὰ τὰ ἀντίστροφον

* Si ab sit ad $a\beta$ sicut β ad b , erit [per 16.6.] ab ipsi $a\beta$ æquale, hoc est Conus Cono.

ἔστω δὲ θεωρήματος ἡ 16. τὰ στοιχείων* ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΗ τῇ ΚΘ. ἐπεὶ ἔν ὃν ὁ Η κύκλος πρὸς τὸ διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περὶ ὃ ΑΗΓΔ κώνος πρὸς τὸ ΒΘΕΖ κώνον, τὰτέστιν ἢ περὶ ὃ ΒΘΕΖ πρὸς τὸ ΚΘΕΖ, τὰτέστιν ἢ περὶ ὃ ΒΘ πρὸς τὴν ΚΘ· ἔχει δὲ ὁ Η κύκλος πρὸς τὸν κύκλον διπλασίονα λόγον ἢ περὶ ὃ ΓΔ πρὸς τὸ ΕΖ· ὡς ἄρα ἡ ΓΔ πρὸς ΕΖ ἕτως ἡ ΒΘ πρὸς ΚΘ, τὰτέστι πρὸς ΑΗ· ἴσα ἄρα ἐστὶ τὰ ΑΓΔ, ΒΕΖ τρίγωνα. ὃ πρὸς αὐτὸ δεῖξαι.

KΘ est æqualis. quoniam igitur circulus H ad circulum Θ duplicatam rationem habet ejus quam ΑΗΓΔ conus ad conum ΒΘΕΖ, hoc est quam habet conus ΒΘΕΖ ad conum ΚΘΕΖ, hoc est [per 14. 12.] quam ΒΘ ad ΚΘ; habet autem circulus H ad circulum Θ duplicatam rationem ejus quam ΓΔ ad ΕΖ: erit itaque ut ΓΔ ad ΕΖ ita ΒΘ ad ΚΘ, hoc est ad ΑΗ: triangula igitur ΑΓΔ, ΒΕΖ inter se æqualia erunt. quod erat demonstrandum.*

ΠΡΟΤΑΣΙΣ νε΄.

Καὶ ἐὰν τὰ διὰ τὰ ἀξόνων τρίγωνα ἴσα ἀλλήλοις ᾖ, ἡ βάσις πρὸς τὴν βάσιν διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περὶ ὃ κώνος πρὸς τὸν κώνον.


PROP. LV. Theor.

Si triangula per axes inter se æqualia sint; basis ad basim duplicatam rationem habebit ejus quam conus ad conum.

Καταγεγράφωσαν πάλιν οἱ προκείμενοι κώνοι, καὶ ὑποκείσθω τὰ ΑΓΔ, ΒΕΖ τρίγωνα ἴσα ἀλλήλοις εἶναι. δεκτέον δὲ ὅτι ὁ Η κύκλος πρὸς τὸν κύκλον διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περὶ ὃ ΑΗΓΔ κώνος πρὸς τὸ ΒΘΕΖ κώνον.

Describantur rursus prædicti coni, & ponantur triangula ΑΓΔ, ΒΕΖ inter se æqualia. demonstrandum est circulum H ad circulum Θ duplicatam rationem habere ejus quam conus ΑΗΓΔ habet ad conum ΒΘΕΖ.

Ἐστω γὰρ ὡς ἡ ΒΘ εὐθεῖα πρὸς ΑΗ ἕτως ἡ ΑΗ πρὸς ΗΚ. ἐπεὶ ἔν τὰ ΑΓΔ, ΒΕΖ τρίγωνα ἴσα ἐστὶν ἀλλήλοις· ὡς ἄρα ἡ ΓΔ πρὸς ΕΖ ἕτως ἡ ΒΘ πρὸς ΑΗ, τὰτέστιν ἡ ΑΗ πρὸς ΗΚ.



Fiat enim ut recta ΒΘ ad ipsam ΑΗ ita ΑΗ ad ΗΚ. quoniam igitur triangula ΑΓΔ, ΒΕΖ sunt æqualia, erit ut ΓΔ ad ΕΖ ita ΒΘ ad ΑΗ, hoc est ΑΗ ad ΗΚ. & quoniam circulus H ad circulum Θ duplicatam habet rationem ejus quam

καὶ ἐπεὶ ὁ Η κύκλος πρὸς τὸ διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περὶ ὃ ΓΔ πρὸς ΕΖ, τὰτέστιν ἢ περὶ ὃ ΒΘ πρὸς ΑΗ, ἔχει δὲ καὶ ἡ ΒΘ πρὸς ΗΚ διπλασίονα λόγον ἢ περὶ ὃ ΒΘ πρὸς ΑΗ· ὡς ἄρα ὁ Η κύκλος πρὸς τὸν κύκλον ἕτως ἡ ΒΘ πρὸς ΚΗ· ὁ ἄρα ΚΗΓΔ κώνος τῷ ΒΘΕΖ κώνῳ ἴσος ἐστίν. ἐπεὶ ἔν ὡς ἡ ΓΔ πρὸς ΕΖ ἕτως ἡ ΑΗ πρὸς ΗΚ, ὡς δὲ ἡ ΑΗ πρὸς ΗΚ ἕτως ὁ ΑΗΓΔ κώνος πρὸς τὸ ΚΗΓΔ, τὰτέστι πρὸς τὸ ΒΘΕΖ κώνον· ὡς ἄρα ἡ ΓΔ πρὸς ΕΖ ἕτως ὁ ΑΗΓΔ κώνος πρὸς τὸ ΒΘΕΖ κώνον. ἀλλ' ὁ Η κύκλος πρὸς τὸν κύκλον διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περὶ ὃ ΓΔ πρὸς ΕΖ· ὁ ἄρα Η κύκλος πρὸς τὸν κύκλον, τὰτέστιν ἡ βάσις ἡ ΑΗΓΔ κώνος πρὸς τὴν βάσιν τὸ ΒΘΕΖ κώνος, διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περὶ ὃ ΑΗΓΔ κώνος πρὸς τὸ ΒΘΕΖ κώνον. ὃ πρὸς αὐτὸ δεῖξαι.

ΓΔ ad ΕΖ, hoc est quam ΒΘ ad ΑΗ; habetque ΒΘ ad ΗΚ duplicatam rationem ejus quam ΒΘ ad ΑΗ: erit ut circulus H ad circulum Θ ita ΒΘ ad ΚΗ; conus igitur ΚΗΓΔ [per 15. 12.] cono ΒΘΕΖ est æqualis. ut autem ΓΔ ad ΕΖ ita est ΑΗ ad ΗΚ; & ut ΑΗ ad ΗΚ ita [per 14. 12.] ΑΗΓΔ conus ad conum ΚΗΓΔ, hoc est ad conum ΒΘΕΖ: ergo ut ΓΔ ad ΕΖ ita ΑΗΓΔ conus ad conum ΒΘΕΖ. sed circulus H ad circulum Θ duplicatam habet rationem ejus quam ΓΔ ad ΕΖ: circulus igitur H ad circulum Θ, hoc est basis coni ΑΗΓΔ ad basim coni ΒΘΕΖ, duplicatam rationem habet ejus quam habet conus ΑΗΓΔ ad conum ΒΘΕΖ, quod erat demonstrandum. †

ΠΡΟΤΑΣΙΣ νς΄.

Οἱ ἰσοῦντες κώνοι ὁμοῖοι διπλασίονα λόγον ἔχουσι πρὸς ἀλλήλους, ἢ περὶ τὰ διὰ τὰ ἀξόνων τρίγωνα.

PROP. LVI. Theor.

Recti coni æquealti duplicatam inter se rationem habent ejus quam habent triangula per axes.

Καταγεγράφωσαν οἱ κώνοι, καὶ ἔστω ὁ ΑΗ ἄξων τῷ ΒΘ ἴσος· λέγω ὅτι ὁ ΑΗΓΔ κώνος πρὸς


Describantur iidem coni, & fit axis ΑΗ æqualis ipsi ΒΘ: dico conum ΑΗΓΔ ad

* Si $b b$ ad $\beta \beta$ duplicatam habeat rationem Coni ad Conum, five ipsius $a b b$ ad $\alpha \beta \beta$, erit b ad β sicut $a b b$ ad $\alpha \beta \beta$; adeoque $a b$ ipsi $\alpha \beta$ æquale erit.
† Si $a b$ sit æquale ipsi $\alpha \beta$, erit $a b b$ ad $\alpha \beta \beta$ sicut b ad β : unde $b b$ erit ad $\beta \beta$ (quæ sunt ut bases Conorum) in duplicata ratione ipsorum Conorum, five ejus quam habet $a b b$ ad $\alpha \beta \beta$.


conum

conum $B\Theta EZ$ duplicatam rationem habere ejus quam triangulum $ΑΓΔ$ habet ad triangulum $ΒΕΖ$.

Quoniam enim circulus H ad circulum Θ duplicatam rationem habet ejus quam $\GammaΔ$ ad EZ ; & ut circulus H ad circulum Θ ita conus $AHΓΔ$ ad conum $B\Theta EZ$: (sunt enim æque-alti) habebit igitur conus $AHΓΔ$ ad conum $B\Theta EZ$ duplicatam rationem ejus quam habet $\GammaΔ$ ad EZ ; hoc est quam $ΑΓΔ$ triangulum ad triangulum $ΒΕΖ$. quod erat demonstrandum.*



τὸν $B\Theta EZ$ κώνον διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περ τὸ $ΑΓΔ$ τρίγωνον πρὸς τὸ $ΒΕΖ$.



Ἐπεὶ γὰρ ὁ H κύκλος πρὸς τὸν Θ κύκλον διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ $\GammaΔ$ πρὸς τὴν EZ , ὡς ὅτι ὁ H κύκλος πρὸς τὸν Θ κύκλον ἔστω ὡς ὁ $AH\GammaΔ$ κώνος πρὸς τὸν $B\Theta EZ$ κώνον· ἰσοϋψεῖς γάρ· καὶ ὁ $AH\GammaΔ$ κώνος πρὸς τὸν $B\Theta EZ$ κώνον διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ $\GammaΔ$ πρὸς EZ , ταῦτέστιν ἢ περ τὸ $ΑΓΔ$ τρίγωνον πρὸς τὸ $ΒΕΖ$ τρίγωνον. ὅπερ ἐδείξαι.


$\GammaΔ$ ἄρα κώνος πρὸς τὸν $B\Theta EZ$ κώνον διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ $\GammaΔ$ πρὸς EZ , ταῦτέστιν ἢ περ τὸ $ΑΓΔ$ τρίγωνον πρὸς τὸ $ΒΕΖ$ τρίγωνον. ὅπερ ἐδείξαι.

PROP. LVII. Theor.

Si recti coni inter sese duplicatam rationem habeant ejus quam habent triangula per axes: ipsi æque-alti erunt.

Describantur coni, & ponatur $AHΓΔ$ conus ad conum $B\Theta EZ$ duplicatam habere rationem ejus quam triangulum $ΑΓΔ$ ad triangulum $ΒΕΖ$: dico AH ipsi $B\Theta$ æqualem esse.

Ponatur enim triangulo $ΒΕΖ$ æquale triangulum $ΚΓΔ$. & quoniam $AHΓΔ$ conus ad conum $B\Theta EZ$ duplicatam rationem habet ejus quam triangulum $ΑΓΔ$ ad triangulum $ΒΕΖ$; est autem triangulum $ΒΕΖ$ æquale triangulo $ΚΓΔ$: habebit igitur $AHΓΔ$ conus ad conum $B\Theta EZ$ duplicatam rationem ejus quam triangulum $ΑΓΔ$ ad triangulum $ΚΓΔ$, hoc est quam AH ad HK , hoc est quam conus $AHΓΔ$ ad conum $KHΓΔ$: ergo ut conus $AHΓΔ$ ad conum $KHΓΔ$ ita $KHΓΔ$ conus ad conum $B\Theta EZ$. quoniam igitur conorum $KHΓΔ$, $B\Theta EZ$ triangula per axem $ΚΓΔ$, $ΒΕΖ$ æqualia sunt, basis coni H ad basim Θ duplicatam rationem habebit ejus quam conus $KHΓΔ$ ad conum $B\Theta EZ$, ut in quinquagesima quinta hujus demonstratum est. sed ut conus $KHΓΔ$ ad conum $B\Theta EZ$ ita conus $AHΓΔ$ ad conum $KHΓΔ$, & ita recta AH ad HK : circulus igitur H ad circulum Θ duplicatam rationem habet ejus quam AH ad HK . sed & duplicatam habet rationem ejus quam diameter $\GammaΔ$ ad diametrum EZ : ergo ut $\GammaΔ$ ad EZ ita AH ad HK . itaque quoniam triangulum $ΚΓΔ$ triangulo $ΒΕΖ$ est æquale, erit [per 16. 6.] ut $\GammaΔ$ ad EZ ita $B\Theta$ ad KH . [ostensum est autem ut $\GammaΔ$ ad EZ ita AH ad HK ;] quare ut $B\Theta$ ad KH ita AH ad HK : æqualis igitur est AH ipsi $B\Theta$. quod erat demonstrandum.†



ΠΡΟΤΑΣΙΣ ιζ'.

Εάν ὀρθοὶ κώνοι πρὸς ἀλλήλους διπλασίονα λόγον ἔχωσιν ἢ περ τὰ ἀξόνων τρίγωνα· ἰσοϋψεῖς ἔσονται οἱ κώνοι.

Καταγεγραφέωσιν οἱ κώνοι, καὶ ὑποκείτω ὁ $AHΓΔ$ κώνος πρὸς τὸν $B\Theta EZ$ διπλασίονα λόγον ἔχειν ἢ περ τὸ $ΑΓΔ$ τρίγωνον πρὸς τὸ $ΒΕΖ$ τρίγωνον· λέγω ὅτι ἡ AH ἴση ἐστὶ τῇ $B\Theta$.

Κεῖσθω τῷ $ΒΕΖ$ τριγώνῳ ἴσον τὸ $ΚΓΔ$ τρίγωνον. ἐπεὶ ὅτι ὁ $AHΓΔ$ κώνος πρὸς τὸν $B\Theta EZ$ κώνον διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περ τὸ $ΑΓΔ$ τρίγωνον πρὸς τὸ $ΒΕΖ$, ἴσον ὅτι τὸ $ΒΕΖ$ τρίγωνον τῷ $ΚΓΔ$ τριγώνῳ.

ὁ ἄρα $AHΓΔ$ κώνος πρὸς τὸν $B\Theta EZ$ κώνον διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περ τὸ $ΑΓΔ$ τρίγωνον πρὸς τὸ $ΚΓΔ$ τρίγωνον, ταῦτέστιν ἢ περ ἡ AH πρὸς HK , ταῦτέστιν ἢ περ ὁ $AHΓΔ$ κώνος πρὸς τὸν $KHΓΔ$ κώνον· καὶ ὡς ἄρα ὁ $AHΓΔ$ κώνος πρὸς τὸν $KHΓΔ$ κώνον ἔστω ὡς ὁ $KHΓΔ$ πρὸς τὸν $B\Theta EZ$. καὶ ἐπεὶ τὸ $KHΓΔ$, $B\Theta EZ$ κώνων τὰ ἀξόνων τρίγωνα τὰ $ΚΓΔ$, $ΒΕΖ$ ἴσα ἀλλήλοις εἰσιν, ἡ ἄρα H βάσις Θ κώνος πρὸς τὴν Θ βάσιν διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περ ὁ $KHΓΔ$ κώνος πρὸς τὸν $B\Theta EZ$, ὡς ἐδείχθη ἐν τῷ νε. πρὸς ταῦτα θεωρήματα. ὡς ὅτι ὁ $KHΓΔ$ κώνος πρὸς τὸν $B\Theta EZ$ ἔστω ὡς ὁ $AHΓΔ$ κώνος πρὸς τὸν $KHΓΔ$, ὅτι ἡ AH εὐθεῖα πρὸς τὴν HK . ὁ ἄρα H κύκλος πρὸς τὸν Θ κύκλον διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ AH πρὸς τὴν HK . ἐχρήσθη ὁ H κύκλος πρὸς τὸν Θ κύκλον διπλασίονα λόγον ὅτι ἔχει ἡ $\GammaΔ$ ἀξίμετρος πρὸς τὴν EZ . ὡς ἄρα ἡ $\GammaΔ$ πρὸς τὴν EZ ἔστω ἡ AH πρὸς HK . ἐπεὶ δὲ τὸ $ΚΓΔ$ τῷ $ΒΕΖ$ τριγώνῳ ἴσον ἐστὶ, κατ' ἀντιπεπότησιν ἄρα ὡς ἡ $\GammaΔ$ πρὸς EZ ἔστω ἡ $B\Theta$ πρὸς KH . ὡς ἄρα ἡ $B\Theta$ πρὸς KH ἔστω ἡ AH πρὸς HK . ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ AH τῇ $B\Theta$.

* Si a fuerit ipsi a æqualis, erit abb ad $a\beta\beta$ sicut $aabb$ ad $aa\beta\beta$, hoc est in duplicata ratione ejus quam habet ab ad $a\beta$ five $a\beta$.

† Si abb sit ad $a\beta\beta$ sicut $aabb$ ad $aa\beta\beta$, erit a ad a sicut aa ad aa , ac proinde a ipsi a æqualis.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ η'.

Τῶν ἀντιπεπύθωναι κώνων ὀρθῶν τοῖς ἄξοσι τὰ διὰ τ' ἄξωνος τρίγωνα ἴσα ἀλλήλοις εἶναι.

Καταγορεύονται οἱ κώνοι, καὶ ἔστω ὡς ὁ ΑΗΓΔ κώνος πρὸς τὸ ΒΘΕΖ ἕτως ὁ ΒΘ ἄξων πρὸς τὸ ΑΗ· λέγω ὅτι τὰ ΑΓΔ, ΒΕΖ τρίγωνα ἴσα ἀλλήλοις εἶναι.

Ἐστω τῶν ΑΗΓΔ κώνων ἰσὺν ἡ δὲ ΚΘΕΖ κώνος. ἐπεὶ ἔν ἐστιν ὡς ὁ ΑΗΓΔ κώνος πρὸς τὸ ΒΘΕΖ ἕτως ἡ ΒΘ εὐθεία πρὸς τὴν ΑΗ, ἴση ἢ ἡ ΑΗ τῇ ΘΚ· ὡς ἄρα ὁ ΑΗΓΔ κώνος πρὸς τὸ ΒΘΕΖ ἕτως ἡ ΒΘ εὐθεία πρὸς τὴν

ΘΚ, ταῦτεστιν ὁ ΒΘΕΖ κώνος πρὸς τὸ ΚΘΕΖ· ὁ ἄρα ΑΗΓΔ κώνος πρὸς τὸ ΚΘΕΖ κώνον διπλασίων λόγον ἔχει ἢ πρὸς τὸ ΒΘΕΖ πρὸς τὸν ΚΘΕΖ κώνον. ἀλλ' ὡς ὁ ΒΘΕΖ κώνος πρὸς τὸ ΚΘΕΖ κώνον ἕτως τὸ ΒΕΖ τρίγωνον πρὸς τὸ ΚΕΖ· ὁ ἄρα ΑΗΓΔ κώνος πρὸς τὸ ΚΘΕΖ διπλασίων λόγον ἔχει ἢ πρὸς τὸ ΒΕΖ τρίγωνον πρὸς τὸ ΚΕΖ. ἔχει δὲ ὁ ΑΗΓΔ κώνος πρὸς τὸ ΚΘΕΖ ἰσὺν ἢ κώνον διπλασίων λόγον ὅτι ἔχει τὸ ΑΓΔ τρίγωνον πρὸς τὸ ΚΕΖ, ὡς ἐδείχθη ἐν τῷ πρὸ ἐνὸς ἱερήματι· ὡς ἄρα τὸ ΒΕΖ τρίγωνον πρὸς τὸ ΚΕΖ ἕτως τὸ ΑΓΔ τρίγωνον πρὸς τὸ ΚΕΖ· τὸ ἄρα ΑΓΔ τρίγωνον τῷ ΒΕΖ ἴσον εἶναι. ὅπερ εἶδει δεῖξαι.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ιθ'.

Καὶ ἐὰν τὰ διὰ τ' ἄξωνος τρίγωνα ἴσα ἀλλήλοις ᾖ ἀντιπεπύθωναι οἱ κώνοι τοῖς ἄξοσι.

ΥΠΟΚΕΙΣΘΩ ὅτι τὸ ΑΓΔ τρίγωνον τῷ ΒΕΖ τριγώνῳ ἴσον εἶναι· λέγω ὅτι ἐστὶν ὡς ὁ ΑΗΓΔ κώνος πρὸς τὸν ΒΘΕΖ κώνον ἕτως ὁ ΒΘ ἄξων πρὸς τὸν ΑΗ.

Ἐπὶ ὅτι τῆς αὐτῆς κατασκευῆς καὶ κατασκευῆς, ἐπεὶ τὸ ΑΓΔ τρίγωνον τῷ ΒΕΖ ἴσον εἶναι· ἐστὶν ἄρα ὡς τὸ ΑΓΔ πρὸς τὸ ΚΕΖ ἕτως τὸ ΒΕΖ πρὸς τὸ ΚΕΖ. ἐπεὶ δὲ ὁ ΑΗΓΔ κώνος πρὸς τὸν ΚΘΕΖ ἰσὺν ἢ κώνον διπλασίων λόγον ἔχει ἢ πρὸς τὸ ΑΓΔ πρὸς τὸ ΚΕΖ, ὡς δὲ τὸ ΑΓΔ τρίγωνον πρὸς τὸ ΚΕΖ ἕτως τὸ ΒΕΖ πρὸς τὸ ΚΕΖ· ὁ ἄρα ΑΗΓΔ κώνος πρὸς τὸν ΚΘΕΖ κώνον διπλασίων λόγον ἔχει ἢ πρὸς τὸ ΒΕΖ τρίγωνον πρὸς τὸ ΚΕΖ, ταῦτεστιν ὁ ΒΘΕΖ κώνος πρὸς τὸ ΚΘΕΖ· ὡς ἄρα ὁ ΑΗΓΔ κώνος πρὸς τὸν ΒΘΕΖ ἕτως ὁ ΒΘΕΖ πρὸς τὸν ΚΘΕΖ, ταῦτεστιν ἡ ΒΘ πρὸς τὴν ΘΚ. ἀλλ' ἡ ΘΚ τῇ ΑΗ ἴση ἐστὶν· ὡς ἄρα ὁ ΑΗΓΔ κώνος πρὸς τὸν ΒΘΕΖ ἕτως ὁ ΒΘ ἄξων πρὸς τὴν ΑΗ ἄξωνα. ὅπερ εἶδει δεῖξαι.


* Si $a b b$ fit ad $a \beta \beta$ sicut a ad a , erit [per 16.6.] $a a b b$ ipsi $a a \beta \beta$ æquale, unde patet $a b$ ipsi $a \beta$ æquale esse.

† Si $a b$ ipsi $a \beta$ æquale sit, erit & $a a b b$ ipsi $a a \beta \beta$ æquale, adeoque $a a b b$ erit ad $a \beta \beta$, sive conus ad conum, sicut a ad a , hoc est reciproce ut axes.

PROP. LVIII. Theor.

Si recti coni reciproce proportionales sint suis axibus; triangula per axes inter se æqualia erunt.

Δεσcribantur coni, & sit ut ΑΗΓΔ conus ad conum ΒΘΕΖ ita axis ΒΘ ad ΑΗ axem: dico triangula ΑΓΔ, ΒΕΖ inter se æqualia esse.



Sit enim cono ΑΗΓΔ conus ΚΘΕΖ æque-altus. & quoniam ut ΑΗΓΔ conus ad conum ΒΘΕΖ ita recta ΒΘ ad ΑΗ, æqualis autem est ΑΗ ipsi ΘΚ; erit itaque ΑΗΓΔ conus ad conum ΒΘΕΖ sicut ΒΘ ad ΘΚ, hoc est ut ΒΘΕΖ conus ad conum ΚΘΕΖ: co-

nus igitur ΑΗΓΔ ad conum ΚΘΕΖ duplicatam rationem habet ejus quam habet conus ΒΘΕΖ ad conum ΚΘΕΖ. sed ut conus ΒΘΕΖ ad conum ΚΘΕΖ ita triangulum ΒΕΖ ad triangulum ΚΕΖ; ergo conus ΑΗΓΔ ad conum ΚΘΕΖ duplicatam rationem habet ejus quam ΒΕΖ triangulum ad triangulum ΚΕΖ. habet autem conus ΑΗΓΔ ad conum æque-altum ΚΘΕΖ duplicatam rationem ejus quam ΑΓΔ triangulum ad triangulum ΚΕΖ, ut demonstratum est in quinquagesima sexta hujus: quare ut ΒΕΖ triangulum ad triangulum ΚΕΖ ita triangulum ΑΓΔ ad triangulum ΚΕΖ: triangulum igitur ΑΓΔ triangulo ΒΕΖ est æquale. quod erat demonstrandum. *

PROP. LIX. Theor.

Si triangula per axes inter se æqualia sint; erunt coni suis axibus reciproce proportionales.

ΡΟΝΑΤΟΥΡ ΑΓΔ triangulum triangulo ΒΕΖ æquale: dico ut conus ΑΗΓΔ ad conum ΒΘΕΖ ita esse axem ΒΘ ad axem ΑΗ.

In eadem enim figura & constructione, quoniam triangulum ΑΓΔ æquale est triangulo ΒΕΖ; erit ut ΑΓΔ triangulum ad triangulum ΚΕΖ ita triangulum ΒΕΖ ad ΚΕΖ triangulum. sed conus ΑΗΓΔ ad conum æque-altum ΚΘΕΖ duplicatam rationem habet ejus quam ΑΓΔ triangulum ad triangulum ΚΕΖ; & ut triangulum ΒΕΖ ad triangulum ΚΕΖ ita triangulum ΑΓΔ ad conum ΚΘΕΖ duplicatam rationem habet ejus quam habet triangulum ΒΕΖ ad ipsum ΚΕΖ, hoc est quam conus ΒΘΕΖ ad conum ΚΘΕΖ: ergo ut conus ΑΗΓΔ ad conum ΒΘΕΖ ita conus ΒΘΕΖ ad ΚΘΕΖ, hoc est ita ΒΘ ad ΘΚ. est autem ΘΚ ipsi ΑΗ æqualis; igitur ut conus ΑΗΓΔ ad conum ΒΘΕΖ ita ΒΘ axis ad axem ΑΗ. quod erat demonstrandum. †

[] Y


PROP.

PROP. LX. Theor.

Si conii recti sunt basibus reciproce proportionales sint; triangula per axes inter se triplicatam rationem habebunt ejus quam habent triangulorum bases inter se reciproce.

DEscribantur conii; & sit ut conus $AH\Gamma\Delta$ ad conum $B\Theta EZ$ ita basis Θ ad basim H : dico $A\Gamma\Delta$ triangulum ad triangulum BEZ triplicatam rationem habere ejus quam habet EZ ad $\Gamma\Delta$.

Ponatur enim ipsi $B\Theta$ æqualis KH ; erunt itaque conii æque-alti $KH\Gamma\Delta$, $B\Theta EZ$ inter sese ut eorum bases. quoniam igitur ut $AH\Gamma\Delta$ conus ad conum $B\Theta EZ$ ita Θ basis ad basim H ; & ut basis Θ ad basim H ita conus $B\Theta EZ$ ad conum $KH\Gamma\Delta$; erit ut $AH\Gamma\Delta$ conus ad conum $B\Theta EZ$ ita $B\Theta EZ$ ad ipsum $KH\Gamma\Delta$ conum: quare conus $AH\Gamma\Delta$ ad conum $KH\Gamma\Delta$ duplicatam rationem habet ejus quam conus $B\Theta EZ$ ad conum $KH\Gamma\Delta$. sed ut conus $AH\Gamma\Delta$ ad $KH\Gamma\Delta$ ita $A\Gamma\Delta$ triangulum ad triangulum $K\Gamma\Delta$: triangulum igitur $A\Gamma\Delta$ ad ipsum $K\Gamma\Delta$ duplicatam rationem habet ejus quam $B\Theta EZ$ conus ad conum æque-altum $KH\Gamma\Delta$. conus autem $B\Theta EZ$ ad ipsum $KH\Gamma\Delta$ duplicatam rationem habet ejus quam triangulum BEZ ad triangulum $K\Gamma\Delta$, per quinquagesimam sextam huj. ergo triangulum $A\Gamma\Delta$ ad triangulum $K\Gamma\Delta$ quadruplicatam rationem habet ejus quam habet BEZ triangulum ad triangulum $K\Gamma\Delta$: & propterea triangulum $A\Gamma\Delta$ ad ipsum BEZ triplicatam rationem habebit ejus quam triangulum BEZ habet ad triangulum $K\Gamma\Delta$. sed ut triangulum BEZ ad triangulum $K\Gamma\Delta$ ita EZ ad $\Gamma\Delta$: triangulum igitur $A\Gamma\Delta$ ad triangulum BEZ triplicatam rationem habebit ejus quam habet EZ ad $\Gamma\Delta$. * quod erat demonstrandum.



ΠΡΟΤΑΣΙΣ Ξ'.

Τῶν ἀντιπεπονημένων ὀρθῶν κώνων τὰς βάσεις τὰ ἀξὲς τῶν ἀξόνων τετραπλάσια πρὸς ἀλλήλας περιπλασίου λόγον ἔχει ἢ περ αἱ βάσεις τῶν τετραπλάσιος ἀλλήλα ἀντιπεπονημένους.

ΚΑταγράφουσιν οἱ κώνοι, καὶ ἔστω ὡς ὁ $AH\Gamma\Delta$ κώνος πρὸς τὸ $B\Theta EZ$ ὥτως ἡ Θ βάση πρὸς τὴν H βάση· λέγω ὅτι τὸ $A\Gamma\Delta$ τρίγωνον πρὸς τὸ BEZ τρίγωνον τετραπλάσιον λόγον ἔχει ἢ περ ἡ EZ πρὸς τὴν $\Gamma\Delta$.

Καὶ οὕτως τῇ $B\Theta$ ἴση ἡ KH · οἱ ἄρα $KH\Gamma\Delta$, $B\Theta EZ$ ἰσοψεῖς κώνοι πρὸς ἀλλήλους ὡς αἱ βάσεις. ἐπεὶ ὅτι ὡς ὁ $AH\Gamma\Delta$ κώνος πρὸς τὸ $B\Theta EZ$ ὥτως ἡ Θ βάση πρὸς τὴν H βάση, ἀλλ' ὡς ἡ Θ βάση πρὸς τὴν H βάση ὥτως ὁ

$B\Theta EZ$ κώνος πρὸς τὸν $KH\Gamma\Delta$ κώνον· ὡς ἄρα ὁ $AH\Gamma\Delta$ κώνος πρὸς τὸ $B\Theta EZ$ ὥτως ὁ $B\Theta EZ$ πρὸς τὸν $KH\Gamma\Delta$. ὁ $AH\Gamma\Delta$ ἄρα κώνος πρὸς τὸν $KH\Gamma\Delta$ διπλασίου λόγον ἔχει ἢ περ ὁ $B\Theta EZ$ πρὸς τὸν $KH\Gamma\Delta$. ἀλλ' ὡς ὁ $AH\Gamma\Delta$ κώνος πρὸς τὸν $KH\Gamma\Delta$ ὥτως τὸ $A\Gamma\Delta$ τρίγωνον πρὸς τὸ $K\Gamma\Delta$ · τὸ $A\Gamma\Delta$ ἄρα τρίγωνον πρὸς τὸ $K\Gamma\Delta$ διπλασίου λόγον ἔχει ἢ περ ὁ $B\Theta EZ$ κώνος πρὸς τὸν $KH\Gamma\Delta$ κώνον. ἀλλ' ὁ $B\Theta EZ$ κώνος πρὸς τὸν $KH\Gamma\Delta$ διπλασίου λόγον ἔχει ἢ περ τὸ BEZ τρίγωνον πρὸς τὸ $K\Gamma\Delta$ · τὸ ἄρα $A\Gamma\Delta$ τρίγωνον πρὸς τὸ $K\Gamma\Delta$ πετραπλάσιον λόγον ἔχει ἢ περ τὸ BEZ πρὸς τὸ $K\Gamma\Delta$ · καὶ τὸ ἄρα $A\Gamma\Delta$ τρίγωνον πρὸς τὸ BEZ τετραπλάσιον λόγον ἔχει ἢ περ τὸ BEZ τρίγωνον πρὸς τὸ $K\Gamma\Delta$. ὡς δὲ τὸ BEZ πρὸς τὸ $K\Gamma\Delta$ ὥτως ἡ EZ πρὸς τὴν $\Gamma\Delta$ · τὸ ἄρα $A\Gamma\Delta$ τρίγωνον πρὸς τὸ BEZ τρίγωνον τετραπλάσιον λόγον ἔχει ἢ περ ἡ EZ πρὸς τὴν $\Gamma\Delta$. ὅπερ εἶδει δεῖξαι.

PROP. LXI. Theor.

Si conorum rectorum triangula per axem inter se triplicatam rationem habeant ejus quam habent eorum bases inter se reciproce; hi conii suis basibus reciproce proportionales sunt.

IN eadem figura & constructione habeat $A\Gamma\Delta$ triangulum ad triangulum BEZ triplicatam rationem ejus quam basis trianguli EZ ad basim $\Gamma\Delta$: dico ut conus $AH\Gamma\Delta$ ad conum $B\Theta EZ$ ita esse circulum Θ basim conii $B\Theta EZ$ ad circulum H basim conii $AH\Gamma\Delta$.

Quoniam enim $A\Gamma\Delta$ triangulum ad triangulum BEZ triplicatam rationem habet ejus quam EZ ad $\Gamma\Delta$; ut autem EZ ad $\Gamma\Delta$ ita BEZ tri-

* Si $a b b$ sit ad $a \beta \beta$ sicut $\beta \beta$ ad $b b$, erit [per 16.6.] $a b$ ipsi $a \beta$ æquale, ac proinde ἀνάλογον $a b$ erit ad $a \beta$ sicut β ad b . πρὸς

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Ξα'.

Καὶ ὅτι κώνων ὀρθῶν τὰ ἀξὲς τῶν ἀξόνων τετραπλάσια λόγον ἔχει πρὸς ἀλλήλας ἢ περ αἱ τῶν τετραπλάσιος βάσεις πρὸς ἀλλήλας ἀντιπεπονημένους· ὅτι τὰς βάσεων ἀντιπεπονημένους.

ΕΠΙ τῇ αὐτῇ καταγραφῇ καὶ κατασκευῇ, ἔστω τὸ $A\Gamma\Delta$ τρίγωνον πρὸς τὸ BEZ τετραπλάσιον λόγον ἢ περ ἡ EZ βάση πρὸς τὴν $\Gamma\Delta$ βάση· λέγω δὲ ὅτι ὡς ὁ $AH\Gamma\Delta$ κώνος πρὸς τὸ $B\Theta EZ$ ὥτως ἡ Θ βάση πρὸς τὴν H βάση.

Επεὶ γὰρ τὸ $A\Gamma\Delta$ τρίγωνον πρὸς τὸ BEZ τετραπλάσιον λόγον ἔχει ἢ περ ἡ EZ πρὸς τὴν $\Gamma\Delta$, ὡς δὲ ἡ EZ πρὸς τὴν $\Gamma\Delta$ ὥτως τὸ BEZ τρίγωνον

πρὸς τὸ ΚΓΔ· τὸ ἄρα ΑΓΔ πρὸς τὸ ΒΕΖ τετραπλάσιον λόγον ἔχει ἢ πρὸς τὸ ΒΕΖ πρὸς τὸ ΚΓΔ· τὸ ἄρα ΑΓΔ πρὸς τὸ ΚΓΔ τετραπλάσιον λόγον ἔχει ἢ πρὸς τὸ ΒΕΖ πρὸς τὸ ΚΓΔ. ὡς δὲ τὸ ΑΓΔ πρὸς τὸ ΚΓΔ ἕτως ὁ ΑΗΓΔ κώνος πρὸς τὸ ΚΗΓΔ κώνον· ὁ ἄρα ΑΗΓΔ κώνος πρὸς τὸν ΚΗΓΔ κώνον τετραπλάσιον λόγον ἔχει ἢ πρὸς τὸ ΒΕΖ τρίγωνον πρὸς τὸ ΚΓΔ. ἔχει δὲ ὁ ΒΘΕΖ κώνος πρὸς τὸ ΚΗΓΔ ἰσούλην κώνον διπλάσιον λόγον ἢ πρὸς τὸ ΒΕΖ τρίγωνον πρὸς τὸ ΚΓΔ· ὁ ἄρα ΑΗΓΔ κώνος πρὸς τὸ ΚΗΓΔ διπλάσιον λόγον ἔχει ἢ πρὸς ὁ ΒΘΕΖ κώνος πρὸς τὸ ΚΗΓΔ· ὡς ἄρα ὁ ΑΗΓΔ κώνος πρὸς τὸν ΒΘΕΖ ἕτως ὁ ΒΘΕΖ πρὸς τὸν ΚΗΓΔ. ὡς ὅ ὁ ΒΘΕΖ κώνος πρὸς τὸν ΚΗΓΔ ἕτως ἡ Θ βάσις πρὸς τὴν Η βάσιν· ὡς ἄρα ὁ ΑΗΓΔ κώνος πρὸς τὸν ΒΘΕΖ ἕτως ἡ Θ βάσις πρὸς τὴν Η.

angulum ad triangulum æque-altum ΚΓΔ: habebit igitur triangulum ΑΓΔ ad triangulum ΒΕΖ triplicatam rationem ejus quam triangulum ΒΕΖ ad ipsum ΚΓΔ: ergo triangulum ΑΓΔ ad triangulum ΚΓΔ quadruplatam rationem habebit ejus quam triangulum ΒΕΖ ad triangulum ΚΓΔ. ut autem triangulum ΑΓΔ ad triangulum ΚΓΔ ita ΑΗΓΔ conus ad conum ΚΗΓΔ: conus igitur ΑΗΓΔ ad conum ΚΗΓΔ quadruplatam rationem habet ejus quam triangulum ΒΕΖ ad triangulum ΚΓΔ. sed conus ΒΘΕΖ ad conum æque-altum ΚΗΓΔ duplicatam rationem habet ejus quam triangulum ΒΕΖ ad triangulum ΚΓΔ: ergo conus ΑΗΓΔ ad conum ΚΗΓΔ duplicatam habebit rationem ejus quam ΒΘΕΖ conus ad conum ΚΗΓΔ: quare ut conus ΑΗΓΔ ad conum ΒΘΕΖ ita ΒΘΕΖ conus ad conum ΚΗΓΔ. sed ut ΒΘΕΖ conus ad conum ΚΗΓΔ ita basis Θ ad basim Η: igitur ut ΑΗΓΔ conus ad conum ΒΘΕΖ ita basis Θ ad Η basim. Q. E. D. *

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΖC.



Εάν κώνος ὀρθὸς πρὸς κώνον ὀρθὸν διπλάσιον λόγον ἔχει ἢ πρὸς ἡ βάσις πρὸς τὴν βάσιν τὸ ἀπὸ τῶν ἄξωνος τεύχωνται πρὸς τὸ διὰ τῶν ἄξωνος τεύχωνται τετραπλάσιον λόγον ἔχει ἢ πρὸς ἡ βάσις πρὸς τὴν βάσιν.

PROP. LXII. Theor.

Si rectus conus ad conum rectum duplicatam rationem habeat ejus quam basis ad basim; triangulum per axem ad triangulum per axem triplicatam rationem habebit ejus quam habet trianguli basis ad basim.

Καταγράφονται οἱ κώνοι, καὶ ὑποκείτω ὁ ΑΗΓΔ κώνος πρὸς τὸ ΒΘΕΖ κώνον διπλάσιον λόγον ἔχει ἢ πρὸς ἡ βάσις πρὸς τὴν βάσιν· λέγω ὅτι τὸ ΑΓΔ τρίγωνον πρὸς τὸ ΒΕΖ τετραπλάσιον λόγον ἔχει ἢ πρὸς ἡ ΓΔ βάσις πρὸς τὴν ΕΖ.

Εστω τῇ ΑΗ ἡ ΘΚ ἰσῆ· οἱ ἄρα ΑΗΓΔ, ΚΘΕΖ κώνοι, ἰσούλης ὄντες, πρὸς ἀλλήλους εἰσὶν ὡς αἱ βάσεις. ἐπεὶ δὲ ὁ ΑΗΓΔ κώνος πρὸς τὸ ΒΘΕΖ διπλάσιον λόγον ἔχει ἢ πρὸς ἡ Θ βάσιν, ὡς ὅ ἡ Η βάσις πρὸς τὴν Θ ἕτως ὁ ΑΗΓΔ κώνος πρὸς τὸν ΚΘΕΖ· ὁ ἄρα ΑΗΓΔ κώνος πρὸς τὸν ΒΘΕΖ διπλάσιον λόγον ἔχει ἢ πρὸς ὁ ΑΗΓΔ κώνος πρὸς τὸν ΚΘΕΖ· ὡς ἄρα ὁ ΑΗΓΔ κώνος πρὸς τὸν ΚΘΕΖ ἕτως ὁ ΚΘΕΖ πρὸς τὸν ΒΘΕΖ. καὶ ἐπεὶ ἰσούλης εἰσὶν οἱ ΑΗΓΔ, ΚΘΕΖ κώνοι, ὁ ἄρα ΑΗΓΔ κώνος πρὸς τὸν ΚΘΕΖ διπλάσιον λόγον ἔχει ἢ πρὸς τὸ ΑΓΔ τρίγωνον πρὸς τὸ ΚΕΖ, ὡς ἔδειχθη. ὡς ὅ ὁ ΑΗΓΔ κώνος πρὸς τὸ ΚΘΕΖ ἕτως ὁ ΚΘΕΖ κώνος πρὸς τὸ ΒΘΕΖ κώνον, καὶ τὸ ΚΕΖ τρίγωνον πρὸς τὸ ΒΕΖ· τὸ ἄρα ΚΕΖ τρίγωνον πρὸς τὸ ΒΕΖ διπλάσιον λόγον ἔχει ἢ πρὸς τὸ



Sit ipsi ΑΗ æqualis ΘΚ, & erunt conus æque-alti ΑΗΓΔ, ΚΘΕΖ inter sese sicut bases. quoniam igitur ΑΗΓΔ conus ad conum ΒΘΕΖ duplicatam rationem habet ejus quam habet basis Η ad basim Θ; ut autem basis Η ad Θ ita ΑΗΓΔ conus ad conum ΚΘΕΖ: habebit ΑΗΓΔ conus ad conum ΒΘΕΖ duplicatam rationem ejus quam ΑΗΓΔ conus ad conum ΚΘΕΖ: ergo ut ΑΗΓΔ conus ad conum ΚΘΕΖ ita ΚΘΕΖ ad ΒΘΕΖ conum. & quoniam conus ΑΗΓΔ, ΚΘΕΖ æque-alti sunt; habebit ΑΗΓΔ conus ad conum ΚΘΕΖ duplicatam rationem ejus quam triangulum ΑΓΔ ad triangulum ΚΕΖ, id quod [ad 56. huj.] demonstratum est. ut autem ΑΗΓΔ conus ad conum ΚΘΕΖ ita est conus ΚΘΕΖ ad ΒΘΕΖ conum, & ita ΚΕΖ triangulum ad triangulum ΒΕΖ: ergo ΚΕΖ triangulum ad triangulum ΒΕΖ duplicatam rationem habet ejus

* Si vero ab sit ad ab sicut ab ad b^2 ; erit, ut prius, ab ipsi ab æquale, adeoque ab erit ad ab sicut ab ad b^2 , hoc est conus ad conum sicut basis ad basim reciproce.

quam


quam triangulum $ΑΓΔ$ ad triangulum $ΚΕΖ$: ac propterea triangulum $ΑΓΔ$ ad triangulum $ΒΕΖ$ triplicatam habebit rationem ejus quam $ΑΓΔ$ triangulum ad triangulum $ΚΕΖ$. sed ut triangulum $ΑΓΔ$ ad triangulum $ΚΕΖ$ ita basis $ΓΔ$ ad $ΕΖ$ basim, sunt enim triangula æque-alta: triangulum igitur $ΑΓΔ$ ad triangulum $ΒΕΖ$ triplicatam rationem habet ejus quam $ΓΔ$ basis ad basim $ΕΖ$. quod erat demonstrandum.*

PROP. LXIII. Theor.

Si triangulum per axem ad triangulum per axem triplicatam rationem habeat ejus quam trianguli basis ad basim; conus ad conum duplicatam rationem habebit ejus quam habet basis coni ad basim.

IN eadem enim figura, triangulum $ΑΓΔ$ ad triangulum $ΒΕΖ$ triplicatam rationem habeat quam basis $ΓΔ$ ad $ΕΖ$ basim; & rursus ponatur ipsi $ΑΗ$ æqualis $ΘΚ$.

Quoniam igitur triangulum $ΑΓΔ$ ad triangulum $ΒΕΖ$ triplicatam rationem habet ejus quam $ΓΔ$ ad $ΕΖ$; ut autem $ΓΔ$ ad $ΕΖ$ ita $ΑΓΔ$ triangulum ad triangulum $ΚΕΖ$: habebit $ΑΓΔ$ triangulum ad triangulum $ΒΕΖ$ triplicatam rationem ejus quam triangulum $ΑΓΔ$ ad ipsum $ΚΕΖ$: ergo $ΚΕΖ$ triangulum ad triangulum $ΒΕΖ$ duplicatam rationem habet ejus quam $ΑΓΔ$ ad triangulum $ΚΕΖ$. sed ut triangulum $ΚΕΖ$ ad triangulum $ΒΕΖ$ ita conus $ΚΘΕΖ$ ad conum $ΒΘΕΖ$: conus igitur $ΚΘΕΖ$ ad conum $ΒΘΕΖ$ duplicatam rationem habebit ejus quam $ΑΓΔ$ triangulum ad triangulum $ΚΕΖ$. habet autem & $ΑΗΓΔ$ conus ad conum æque-altum $ΚΘΕΖ$ duplicatam rationem ejus quam $ΑΓΔ$ triangulum ad triangulum $ΚΕΖ$: ergo ut conus $ΑΗΓΔ$ ad conum $ΚΘΕΖ$ ita $ΚΘΕΖ$ ad conum $ΒΘΕΖ$: & idcirco $ΑΗΓΔ$ conus ad conum $ΒΘΕΖ$ duplicatam rationem habet ejus quam conus $ΑΗΓΔ$ ad conum $ΚΘΕΖ$, hoc est quam basis $Η$ ad $Θ$ basim. quod erat demonstrandum.†




$ΑΓΔ$ πρὸς τὸ $ΚΕΖ$. τὸ ἄρα $ΑΓΔ$ τρίγωνον πρὸς τὸ $ΒΕΖ$ τετραπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περὶ τὸ $ΑΓΔ$ πρὸς τὸ $ΚΕΖ$. ὡς δὲ τὸ $ΑΓΔ$ πρὸς τὸ $ΚΕΖ$ ἕτως ἢ $ΓΔ$ βάσις πρὸς τὴν $ΕΖ$. ἰσὺν γὰρ ἐστὶ τὰ τρίγωνα. τὸ ἄρα $ΑΓΔ$ τρίγωνον πρὸς τὸ $ΒΕΖ$ τρίγωνον τετραπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περὶ ἢ $ΓΔ$ πρὸς τὴν $ΕΖ$. ὅπερ εἶδει δεῖξαι.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ξγ'.

Καὶ εἰν τὸ διὰ $Θ$ ἄξονος τρίγωνον πρὸς τὸ διὰ $Θ$ ἄξονος τρίγωνον τετραπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περὶ ἢ $ΓΔ$ τριγώνου βάσις πρὸς τὴν βάσιν. ὁ κῶνος πρὸς τὸν κῶνον διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περὶ ἢ βάσις $Θ$ κῶνος πρὸς τὴν βάσιν.

ΕΠΙ γὰρ τῇ αὐτῇ καταγραφῇ τὸ $ΑΓΔ$ τρίγωνον πρὸς τὸ $ΒΕΖ$ τετραπλασίονα λόγον ἔχειται ἢ περὶ ἢ $ΓΔ$ πρὸς τὴν $ΕΖ$, καὶ κείνῳ πάλιν τῇ $ΑΗ$ ἰσὺν ἢ $ΘΚ$.



Επεὶ δὲ τὸ $ΑΓΔ$ τρίγωνον πρὸς τὸ $ΒΕΖ$ τετραπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περὶ ἢ $ΓΔ$ πρὸς $ΕΖ$, ὡς ὅτι ἢ $ΓΔ$ πρὸς $ΕΖ$ ἕτως τὸ $ΑΓΔ$ τρίγωνον πρὸς τὸ $ΚΕΖ$. τὸ ἄρα $ΑΓΔ$ τρίγωνον πρὸς τὸ $ΒΕΖ$ τετραπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περὶ τὸ $ΑΓΔ$ πρὸς τὸ $ΚΕΖ$.

τὸ ἄρα $ΚΕΖ$ πρὸς τὸ $ΒΕΖ$ διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περὶ τὸ $ΑΓΔ$ πρὸς τὸ $ΚΕΖ$. ἀλλ' ὡς τὸ $ΚΕΖ$ τρίγωνον πρὸς τὸ $ΒΕΖ$ ἕτως ὁ $ΚΘΕΖ$ κῶνος πρὸς τὸν $ΒΘΕΖ$. ὁ ἄρα $ΚΘΕΖ$ κῶνος πρὸς τὸν $ΒΘΕΖ$ διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περὶ τὸ $ΑΓΔ$ τρίγωνον πρὸς τὸ $ΚΕΖ$. ἔχῃ γὰρ ὁ $ΑΗΓΔ$ κῶνος πρὸς τὸν $ΚΘΕΖ$ κῶνον ἰσὺν ἢ διπλασίονα λόγον ἢ περὶ τὸ $ΑΓΔ$ τρίγωνον πρὸς τὸ $ΚΕΖ$. ὡς ἄρα ὁ $ΑΗΓΔ$ κῶνος πρὸς τὸν $ΚΘΕΖ$ ἕτως ὁ $ΚΘΕΖ$ πρὸς τὸν $ΒΘΕΖ$. ὁ ἄρα $ΑΗΓΔ$ κῶνος πρὸς τὸν $ΒΘΕΖ$ κῶνον διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περὶ ὁ $ΑΗΓΔ$ πρὸς τὸν $ΚΘΕΖ$ κῶνον, τῷ περὶ ἢ $Η$ βάσις $Θ$ κῶνος πρὸς τὴν $Θ$ βάσιν.

* Si $a b b$ fuerit ad $a \beta \beta$ sicut b^4 ad β^4 ; erit $a b$ ad $a \beta$ sicut b^3 ad β^3 ; itemque a ad a sicut $b b$ ad $\beta \beta$: unde patet Conorum bases (hoc in casu) suis altitudinibus directe esse proportionales.

† Si $a b$ sit ad $a \beta$ sicut b^3 ad β^3 ; erit $a b b$ ad $a \beta \beta$ sicut b^4 ad β^4 , hoc est, Coni erunt inter se in duplicata ratione basis ad basim.

FINIS.

