



??????

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:


- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>


A

806,974



THE GIFT OF
PROF. ALEXANDER ZIWET





PA

3971

A2

1883

;

16

EUCLIDIS^e
OPERA OMNIA.

EDIDERUNT

I. L. HEIBERG ET H. MENGE.



LIPSIAE
IN AEDIBUS B. G. TEUBNERI.
MDCCCLXXXVI.

4

Alexander Jones
EUCLIDIS

E L E M E N T A.

EDIDIT ET LATINE INTERPRETATUS EST

I. L. HEIBERG,

DR. PHIL.

UOL. III.

LIBRUM X CONTINENS.



LIPSIAE

IN AEDIBUS B. G. TEUBNERI.

MDCCCLXXXVI.

LIPSLAR: TYPIS B. G. TRUBNERI.

Quad. 1
Pag. Alex. Zivert
12-17-1923

08-1-30 M. C. M.

PRAEFATIO.

Praeter codices solitos PBFVb, quos ipse contuli, nisi quod cod. Bodl. B ab initio usque ad finem definitionum alt. p. 136, 19 beneuolenter conferendum suscepit G. A. Stewart, u. d. Oxoniensis, in hoc libro X uti mihi licuit palimpsesto cod. Musei Britannici Add. 17211 (L), de quo, cfr. uol. IV p. VI; continet

- X prop. 15 p. 44, 12 μετρήσει ad finem prop.
- X prop. 16 p. 46, 2 (μέγε)θος — p. 46, 8 ὅτι.
p. 46, 17 (με)τρει ad finem prop.
- X, 16 lemma p. 46, 23 -μον ἐλλειπὸν ad finem.
- X prop. 31 p. 92, 19 (μέ)σαι ad finem prop.
- X prop. 32 totam.
- X prop. 32 lemma ab initio ad p. 96, 20 ὅλῳ.
- X prop. 80 p. 240, 9 δυνατόν ad finem prop.
- X prop. 81 ab initio ad p. 244, 10 ὑπό.
- X prop. 112 p. 358, 19 ΒΔ ad finem prop.
- X prop. 113 ab initio ad p. 362, 19 οὕτως.

In appendicem hic, ut semper, ea sola recepi, quae in uno saltem meorum codicum in textu legebantur; quare in mea editione quaedam eorum, quae Augustus in app. V habet, frustra quaeras; sunt enim scholia marginalia, quae in uol. V suo ordine edentur. Prolegomena critica quominus uel huic uel quarto uolumini

praemitterem, sicuti constitueram, prohibuit ratio scholariorum, quae quinto volumine comprehenduntur. nam cum inde non pauca subsidia ad codices aestimandos peti posse uiderem, statui iis demum editis ad prolegomena illa adcedere.

Scrib. Hauniae mense Nouembri MDCCCLXXXV.

I. L. Heiberg.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

ί'.

Όροι.

α'. Σίμμετρα μεγέθη λέγεται τὰ τῷ αὐτῷ μέτρῳ μετρούμενα, ἀσύμμετρα δέ, ὧν μηδέν ἐνδέχεται κοινὸν μέτρον γενέσθαι.

~~ἡμεῖς~~ β'. Εὐθεῖαι δυνάμει σύμμετροί εἰσιν, ὅταν τὰ ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα τῷ αὐτῷ χωρίῳ μετρήται, ἀσύμμετροι δέ, ὅταν τοῖς ἀπ' αὐτῶν τετραγώνοις μηδέν ἐνδέχεται χωρίον κοινὸν μέτρον γενέσθαι.

γ'. Τούτων ὑποκειμένων δείκνυνται, ὅτι τῇ προτε-
10 θείσῃ εὐθείᾳ ὑπάρχουσιν εὐθεῖαι πλήθει ἅπριοι σύμμετροί τε καὶ ἀσύμμετροι αἱ μὲν μήκει μόνον, αἱ δὲ καὶ δυνάμει. καλείσθω οὖν ἡ μὲν προτεθείσα εὐθεῖα ῥητή, καὶ αἱ ταύτῃ σύμμετροι εἴτε μήκει καὶ δυνάμει εἴτε δυνάμει μόνον ῥηταί, αἱ δὲ ταύτῃ ἀσύμμετροι
15 ἄλλοι καλείσθωσαν.

δ'. Καὶ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς προτεθείσης εὐθείας τετράγωνον ῥητόν, καὶ τὰ τοῦτῳ σύμμετρα ῥητά, τὰ δὲ τοῦτῳ ἀσύμμετρα ἄλογα καλείσθω, καὶ αἱ δυνάμεναι

Ad deff. cfr. Hero deff. 128—129, Anonymus Hultschii p. 256, Martianus Capella VI, 718.

Εὐκλείδου στοιχείων ι P V, Εὐκλείδου στοιχείων τῆς θέωνος ἐκδόσεως ι F, Εὐκλείδου στοιχείων ι τῆς θέωνος ἐκδόσεως b. 1. ὅροι] om. PFV, ὅροι τοῦ ι b, ὅρος τοῦ ι B. numeros om. codd. 5. Ante σύμμετροι ras. 1 litt P. 8. ἐνδέχεται b φ. 9. προστεθείση b et e corr. F. 10. Post εὐθεῖα add. Theon: τουτέστιν ἀφ' ἧς θέσει τὰ μέτρα τό τε πηχναῖον καὶ τὸ παρυσιαῖον καὶ τὸ δακτυλιαῖον ἢ τὸ ποδιαῖον λαμβάνεται (BFVb).

Liber X.

Definitiones.

1. Magnitudines commensurabiles uocantur, quas eadem mensura metiri licet, incommensurabiles autem, quarum communis mensura inueniri nequit.

2. Rectae potentia commensurabiles sunt, ubi quadrata earum eadem mensura metiri licet, incommensurabiles autem, ubi nullum spatium communis quadratorum earum mensura inueniri potest.

3. His suppositis demonstratur, rectas numero infinitas esse datae rectae commensurabiles et incommensurabiles partim longitudine tantum, partim potentia quoque. iam data recta rationalis uocetur, et quae ei commensurabiles sunt siue longitudine potentiaque siue potentia tantum, rationales, quae autem ei incommensurabiles sunt, irrationales uocentur.

4. Et quadratum datae rectae rationale uocetur, et quae ei commensurabilia sunt, rationalia, quae autem ei incommensurabilia sunt, irrationalia, et rectae, quae

πλήθει] om. F. σύμμετροί τε καί] supra scr. m. rec. P. 11. μόνον, αὐ δὲ] om. Theon (BFVb). 12. Post δυνάμει add. Theon: αὐ δὲ δυνάμει μόνον (BFVb). προστεθείσα b et e corr. F. 14. σύμμετροι b, corr. m. rec.; deinde add. Theon: κατὰ τὸ συναμφοτέρον (syn- om. b), τουτέστιν (καὶ del. F) μήκει καὶ δυνάμει (BFVb); idem P mg. m. 1 pro scholio. 16. προστεθείσης b et e corr. F. 17. ζητά] om. F. 18. Ante ἄλογα add. κατὰ τὸ συναμφοτέρον F; idem P mg. m. 1 pro scholio. καλείσθωσαν Theon (BFVb).

αὐτὰ ἄλλοι, εἰ μὲν τετράγωνα εἴη, αὐταὶ αἱ πλευραί,
εἰ δὲ ἑτέρα τινα εὐθύγραμμα, αἱ ἴσα αὐτοῖς τετράγωνα
ἀναγράφουσαι.

α'.

5 Δύο μέγεθῶν ἀνίσων ἐκκειμένων, ἐὰν ἀπὸ
τοῦ μείζονος ἀφαιρεθῇ μείζον ἢ τὸ ἥμισυ καὶ
τοῦ καταλειπομένου μείζον ἢ τὸ ἥμισυ, καὶ
τοῦτο ἀεὶ γίγνεται, λειφθήσεται τι μέγεθος,
ὃ ἔσται ἑλασσον τοῦ ἐκκειμένου ἐλάσσονος με-
10 γέθους.

Ἔστω δύο μεγέθη ἄνισα τὰ AB, Γ , ὧν μείζον τὸ AB .
λέγω, ὅτι, ἐὰν ἀπὸ τοῦ AB ἀφαιρεθῇ μείζον ἢ τὸ ἥμισυ
καὶ τοῦ καταλειπομένου μείζον ἢ τὸ ἥμισυ, καὶ τοῦτο
ἀεὶ γίγνεται, λειφθήσεται τι μέγεθος, ὃ ἔσται ἑλασσον
15 τοῦ Γ μεγέθους.

Τὸ Γ γὰρ πολλαπλασιαζόμενον ἔσται ποτὲ τοῦ AB
μείζον. πεπολλαπλασιάσθω, καὶ ἔστω τὸ ΔE τοῦ μὲν Γ
πολλαπλάσιον, τοῦ δὲ AB μείζον, καὶ διηγήσθω τὸ ΔE
εἰς τὰ τῷ Γ ἴσα τὰ $\Delta Z, ZH, HE$, καὶ ἀφηγήσθω ἀπὸ
20 μὲν τοῦ AB μείζον ἢ τὸ ἥμισυ τὸ $B\Theta$, ἀπὸ δὲ τοῦ $A\Theta$
μείζον ἢ τὸ ἥμισυ τὸ ΘK , καὶ τοῦτο ἀεὶ γιγνέσθω,
ἕως ἂν αἱ ἐν τῷ AB διαιρέσεις ἰσοπληθεῖς γένωνται
ταῖς ἐν τῷ ΔE διαιρέσεσιν.

Ἔστωσαν οὖν αἱ $AK, K\Theta, \Theta B$ διαιρέσεις ἰσοπλη-
25 θεῖς οὔσαι ταῖς $\Delta Z, ZH, HE$. καὶ ἐπεὶ μείζον ἔστι τὸ
 ΔE τοῦ AB , καὶ ἀφήρηται ἀπὸ μὲν τοῦ ΔE ἑλασσον
τοῦ ἡμίσεως τὸ EH , ἀπὸ δὲ τοῦ AB μείζον ἢ τὸ ἥμισυ

1. ἄλογα V, corr. m. 2. Deinde add. καλεῖσθωσαν Theon (BFVb). 2. ἴσαι φ. 5. ἐκκειμένων] ante ἀνίσων add. B mg. m. 1. 8. ἀεὶ] αἰεὶ F, ἀεὶ ἄν V? γίγνεται V (η e corr.), γίγνεται b. ληφθήσεται Vb. 9. ἔστιν Theon (BFVb).

quadratae iis aequales sunt, irrationales uocentur, in quadratis ipsa latera, in ceteris figuris rectilineis eae, ex quibus quadrata illis aequalia construi possunt.

I.

Propositis duabus magnitudinibus inaequalibus si a maiore plus quam dimidium subtrahitur et a reliqua plus quam dimidium, et hoc semper fit, magnitudo relinquetur, quae minor erit proposita magnitudine minore.

Sint duae magnitudines inaequales AB , Γ , quarum maior sit AB . dico, si ab AB plus quam dimidium subtrahatur et ab reliqua plus quam dimidium, et hoc semper fiat, magnitudinem relictum iri, quae minor sit magnitudine Γ .

Nam Γ multiplicata aliquando magnitudine AB maior erit [cfr. V def. 4]. multiplicetur et ΔE magnitudinis Γ multiplex sit, eadem autem $> AB$, et ΔE in partes magnitudini Γ aequales ΔZ , ZH , HE diuidatur, et ab AB plus quam dimidium subtrahatur $B\Theta$, ab $A\Theta$ autem plus quam dimidium ΘK , et hoc semper fiat, donec in AB totidem diuisiones fiant, quot in ΔE .

ἐλάττων F. τοῦ] om. V? ἐγκειμένον b. ἐλάττωνος F. 12. δὴ ὅτι b. 13. καὶ — ἥμισυ] om. P. καὶ] (prius) καὶ ἀπὸ V. 14. αἰεὶ F. γίνεται V, γίνηται b. ληφθήσεται V. ἐστὶν V. ἐλάττων F. 16. γὰρ] ἄρα F. AB μεγέθους Theon (BFVb). 19. εἰς] m. rec. B. ἀπὸ] om. V. 21. γινέσθω P. 23. ταῖς] corr. ex ται m. rec. b. 24. οὖν] om. b. διαίρεσις P, sed corr. 25. HZ F. ἐστὶν F. 26. τοῦ] (alt.) post ins. m. 1 F. 27. ἡμίσεος b, ἡμίσεως V. τό] corr. ex τοῦ F. ἢ τὸ ἥμισυ] τοῦ ἡμίσεως F, τοῦ ἡμίσεος B V b.

το $B\Theta$, λοιπὸν ἄρα τὸ $H\Delta$ λοιποῦ τοῦ ΘA μείζον
 ἐστίν. καὶ ἐπεὶ μείζον ἐστὶ τὸ $H\Delta$ τοῦ ΘA , καὶ
 ἀφήρηται τοῦ μὲν $H\Delta$ ἡμισυ τὸ HZ , τοῦ δὲ ΘA μείζον
 ἢ τὸ ἡμισυ τὸ ΘK , λοιπὸν ἄρα τὸ ΔZ λοιποῦ τοῦ AK
 5 μείζον ἐστίν. ἴσον δὲ τὸ ΔZ τῷ Γ · καὶ τὸ Γ ἄρα
 τοῦ AK μείζον ἐστίν. ἔλασσον ἄρα τὸ AK τοῦ Γ .

Καταλείπεται ἄρα ἀπὸ τοῦ AB μεγέθους τὸ AK
 μέγεθος ἔλασσον ὃν τοῦ ἐκκειμένου ἐλάσσονος μεγέθους
 τοῦ Γ · ὅπερ ἔδει δεῖξαι. — ὁμοίως δὲ δειχθήσεται,
 10 καὶ ἡμίση ἢ τὰ ἀφαιρούμενα.

β'.

Ἐὰν δύο μεγεθῶν [ἐκκειμένων] ἀνίσων ἀνθ-
 υφαιρουμένου ἀεὶ τοῦ ἐλάσσονος ἀπὸ τοῦ μεί-
 ζονος τὸ καταλειπόμενον μηδέποτε καταμετρῇ
 15 τὸ πρὸ ἑαυτοῦ, ἀσύμμετρα ἔσται τὰ μεγέθη.

Δύο γὰρ μεγεθῶν ὄντων ἀνίσων τῶν AB , $\Gamma\Delta$ καὶ
 ἐλάσσονος τοῦ AB ἀνθυφαιρουμένου ἀεὶ τοῦ ἐλάσσονος
 ἀπὸ τοῦ μείζονος τὸ περιλειπόμενον μηδέποτε κατα-
 μετρεῖται τὸ πρὸ ἑαυτοῦ· λέγω, ὅτι ἀσύμμετρα ἔστι τὰ
 20 AB , $\Gamma\Delta$ μεγέθη.

Εἰ γάρ ἐστι σύμμετρα, μετρήσει τι αὐτὰ μέγεθος.
 μετρεῖται, εἰ δυνατόν, καὶ ἔστω τὸ E · καὶ τὸ μὲν AB
 τὸ $Z\Delta$ καταμετροῦν λειπέται ἑαυτοῦ ἔλασσον τὸ ΓZ ,

2. ἐστίν] comp. Fb, ἐστι BV. ἐστι] om. V. 4. η τοῦ
 ἡμισυ] τοῦ ἡμίσεος BVb, τοῦ ἡμίσεως F. 7. καταλείπεται Bb.
 8. ἐκκειμένου b. ἐλάττωνος F. 10. ἡμίση P, ἡμίσεα V.
 Seq. demonstr. altera, u. app. 12. ἐκκειμένων] mg. m.
 1 P. ἀνθυφαιρουμένου V, corr. m. 2. 13. αἰεὶ F. ἐλάτ-
 τονος F. 15. τὰ] τό F, corr. m. 2. 16. καὶ ὄντος Theon (BFVb).
 17. ἐλάττωνος F. ἀνθυφαιρουμένου V, corr. m. 2. αἰεὶ F.
 19. ἐστίν P. 21. ἐστι] supra scr. -αι V. τι] om. F. 23.

diuisiones igitur AK , $K\Theta$, ΘB numero aequales sint diuisionibus ΔZ , ZH , HE . et quoniam $\Delta E > AB$, et a ΔE minus quam dimidium subtractum est EH , ab AB autem plus quam dimidium $B\Theta$, erit $H\Delta > \Theta A$. et quoniam $H\Delta > \Theta A$, et ab $H\Delta$ dimidium subtractum est HZ , a ΘA autem plus quam dimidium ΘK , erit $\Delta Z > AK$. uerum $\Delta Z = \Gamma$. quare etiam $\Gamma > AK$. ergo $AK < \Gamma$.

Ergo ex magnitudine AB relinquitur magnitudo AK minor proposita magnitudine minore Γ ; quod erat demonstrandum. .

Similiter autem demonstrabitur, etiam si, quae subtrahuntur, dimidia sunt.

II.

Si ex duabus magnitudinibus inaequalibus minore semper uicissim a maiore subtracta reliquum nunquam praecedentem magnitudinem metitur, magnitudines incommensurabiles erunt.

Datis enim duabus magnitudinibus inaequalibus AB , $\Gamma\Delta$ minor sit AB , et minore semper uicissim a

maiore subtracta reliquum ne unquam praecedentem magnitudinem metiatur. dico, magnitudines AB , $\Gamma\Delta$ incommensurabiles esse.

Nam si commensurabiles sunt, magnitudo aliqua eas metietur. metiatur, si fieri potest, et sit E . et AB magnitudinem $Z\Delta$ metiens se ipsa minorem relinquat

$Z\Delta$] mut. in $\Gamma\Delta$ m. 2 B, m. rec. b; ΔZ e corr. PV. $\acute{\epsilon}\lambda\acute{\alpha}\sigma\sigma\omicron\nu\alpha$ P, sed α del.

τὸ δὲ ΓZ τὸ BH καταμετροῦν λειπέτω ἑαυτοῦ ἔλασσον
τὸ AH , καὶ τοῦτο ἀεὶ γινέσθω, ἕως οὗ λειφθῇ τι μέ-
γεθος, ὃ ἐστὶν ἔλασσον τοῦ E . γεγονέτω, καὶ λελείφθω
τὸ AH ἔλασσον τοῦ E . ἐπεὶ οὖν τὸ E τὸ AB μετρεῖ,
5 ἀλλὰ τὸ AB τὸ ΔZ μετρεῖ, καὶ τὸ E ἄρα τὸ $Z\Delta$ με-
τρῆσει. μετρεῖ δὲ καὶ ὅλον τὸ $\Gamma\Delta$ · καὶ λοιπὸν ἄρα
τὸ ΓZ μετρήσει. ἀλλὰ τὸ ΓZ τὸ BH μετρεῖ· καὶ τὸ E
ἄρα τὸ BH μετρεῖ. μετρεῖ δὲ καὶ ὅλον τὸ AB · καὶ
λοιπὸν ἄρα τὸ AH μετρήσει, τὸ μείζον τὸ ἔλασσον·
10 ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ ἄρα τὰ AB , $\Gamma\Delta$ μεγέθη
μετρήσει τι μέγεθος· ἀσύμμετρα ἄρα ἐστὶ τὰ AB , $\Gamma\Delta$
μεγέθη.

Ἐὰν ἄρα δύο μεγεθῶν ἀνίσων, καὶ τὰ ἐξῆς.

γ'.

15 Δύο μεγεθῶν συμμέτρων δοθέντων τὸ μέ-
γιστον αὐτῶν κοινὸν μέτρον εὑρεῖν.

Ἔστω τὰ δοθέντα δύο μεγέθη σύμμετρα τὰ AB , $\Gamma\Delta$,
ὧν ἔλασσον τὸ AB · δεῖ δὴ τῶν AB , $\Gamma\Delta$ τὸ μέγιστον
κοινὸν μέτρον εὑρεῖν.

20 Τὸ AB γὰρ μέγεθος ἥτοι μετρεῖ τὸ $\Gamma\Delta$ ἢ οὐ. εἰ
μὲν οὖν μετρεῖ, μετρεῖ δὲ καὶ ἑαυτό, τὸ AB ἄρα τῶν

1. BH] in ras. P, mut. in BA B m. 2, in AB m. rec.; H
e corr V. 2. γινέσθω F. ληφθῇ BVb. 3. ἐσται P. ἔλατ-
τον F. εἰληφθω V. 4. τό] (pr.) τοῦ F. 5. $Z\Delta$ P. $Z\Delta$
mut. in ΔZ V, ΔZ BFb. 8. BH] HB P. μετρεῖ] (prius)
supra m. 2 F. 10. ἐστίν] om. V. 11. Post τι ras. 1 litt. V.
ἐστίν P. 13. μεγεθῶν ἐκκειμένων F. καὶ τὰ ἐξῆς] ὅπερ

ἔδει δεῖξαι V (post ἐξῆς add. $\overset{\Delta}{\pi}$ b); ἐκκειμένων ἀνίσων ἀνθ-
υφαιρουμένου ἀεὶ τοῦ ἐλάσσονος ἀπὸ τοῦ μείζονος τὸ καταλει-
πόμενον μηδέποτε καταμετρή τὸ πρὸ ἑαυτοῦ, ἀσύμμετρα ἐστὶ
τὰ μεγέθη m. 2 V, del. ἀνίσων lin. 13. 17. ἔστωσαν F. σύμ-

ΓZ , ΓZ autem BH metiens se ipsa minorem relinquat AH , et hoc semper fiat, donec relinquatur magnitudo minor magnitudine E . fiat et relinquatur $AH < E$. ^{Prop. 22} iam quoniam E magnitudinem AB metitur et AB magnitudinem ΔZ , etiam E magnitudinem $Z\Delta$ metitur. ^{see Heath III, p.} uerum etiam totam $\Gamma\Delta$ metitur. itaque etiam reliquam magnitudinem ΓZ metietur. sed ΓZ magnitudinem BH metitur. quare etiam E magnitudinem BH metitur. uerum etiam totam AB metitur. quare etiam reliquam AH metietur, maior minorem; quod fieri non potest. itaque magnitudines AB , $\Gamma\Delta$ nulla magnitudo metietur. ergo magnitudines AB , $\Gamma\Delta$ incommensurabiles erunt [def. 1].

Ergo si ex duabus magnitudinibus inaequalibus, et quae sequuntur.

III.

Datis duabus magnitudinibus commensurabilibus maximam earum mensuram communem inuenire.

Sint duae magnitudines datae commensurabiles AB , $\Gamma\Delta$, quarum minor sit AB . oportet igitur magnitudinum AB , $\Gamma\Delta$ maximam mensuram communem inuenire.

Nam magnitudo AB magnitudinem $\Gamma\Delta$ aut metitur aut non metitur. iam si metitur, et se ipsam quoque


μετρα μεγέθη V. 18. ἔλαττον F. 20. μέγεθος] om. Theon (BFVb). ἥτοι] m. rec. P. 21. Post οὖν add. τὸ AB τὸ $\Gamma\Delta$ V. μετρεῖ] (prius) supra m. 1 B. αὐτό B, corr. m. 2. τῶν AB , $\Gamma\Delta$] om. V.

AB , $\Gamma\Delta$ κοινὸν μέτρον ἐστίν· καὶ φανερόν, ὅτι καὶ μέγιστον. μείζον γὰρ τοῦ AB μεγέθους τὸ AB οὐ μετρήσει.

Μὴ μετρεῖται δὴ τὸ AB τὸ $\Gamma\Delta$. καὶ ἀνθυφαιρου-
 5 μένον αἶ τοῦ ἐλάσσονος ἀπὸ τοῦ μείζονος, τὸ περι-
 λειπόμενον μετρήσει ποτὲ τὸ πρὸ ἑαυτοῦ διὰ τὸ μὴ
 εἶναι ἀσύμμετρα τὰ AB , $\Gamma\Delta$ · καὶ τὸ μὲν AB τὸ $E\Delta$
 καταμετροῦν λειπέτω ἑαυτοῦ ἐλασσον τὸ $E\Gamma$, τὸ δὲ
 $E\Gamma$ τὸ ZB καταμετροῦν λειπέτω ἑαυτοῦ ἐλασσον τὸ
 10 AZ , τὸ δὲ AZ τὸ ΓE μετρεῖται.

Ἐπεὶ οὖν τὸ AZ τὸ ΓE μετρεῖ, ἀλλὰ τὸ ΓE τὸ
 ZB μετρεῖ, καὶ τὸ AZ ἄρα τὸ ZB μετρήσει. μετρεῖ
 δὲ καὶ ἑαυτό· καὶ ὅλον ἄρα τὸ AB μετρήσει τὸ AZ .
 ἀλλὰ τὸ AB τὸ ΔE μετρεῖ· καὶ τὸ AZ ἄρα τὸ $E\Delta$
 15 μετρήσει. μετρεῖ δὲ καὶ τὸ ΓE · καὶ ὅλον ἄρα τὸ $\Gamma\Delta$
 μετρεῖ· τὸ AZ ἄρα τῶν AB , $\Gamma\Delta$ κοινὸν μέτρον ἐστίν.
 λέγω δὴ, ὅτι καὶ μέγιστον. εἰ γὰρ μὴ, ἔσται τι μέ-
 γεθος μείζον τοῦ AZ , ὃ μετρήσει τὰ AB , $\Gamma\Delta$. ἔστω
 τὸ H . ἐπεὶ οὖν τὸ H τὸ AB μετρεῖ, ἀλλὰ τὸ AB
 20 τὸ $E\Delta$ μετρεῖ, καὶ τὸ H ἄρα τὸ $E\Delta$ μετρήσει. μετρεῖ
 δὲ καὶ ὅλον τὸ $\Gamma\Delta$ · καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ ΓE μετρήσει
 τὸ H . ἀλλὰ τὸ ΓE τὸ ZB μετρεῖ· καὶ τὸ H ἄρα
 τὸ ZB μετρήσει. μετρεῖ δὲ καὶ ὅλον τὸ AB , καὶ
 λοιπὸν τὸ AZ μετρήσει, τὸ μείζον τὸ ἐλασσον· ὅπερ

1. ἐστίν] comp. F, ἐστὶ Bb, ἐστὶ τῶν AB , $\Gamma\Delta$ V. καί]
 (alt.) μέτρον ἐστὶ V. 4. καί] om. BFVb. ἀνθυφαιρούμενον V,
 sed corr. m. 2; ἀνθυφαιρούμενον F. 5. αἶ] ἄρα αἶ Vb, ἄρα F,
 om. B (ἄρα αἶ m. 2). 8. τὸ $E\Gamma$ — 9. ἐλασσον] m. 2 B. 10.
 δὲ AZ] AZ δὲ P. 13. μετρήσει — 14. AB] mg. m. 1 P. 14.
 Post AZ ras. 1 litt. V. 16. μετρεῖ] μετρήσει F. Deinde add.
 Theon: τὸ AZ ἄρα τὰ AB , $\Gamma\Delta$ μετρεῖ (BFVb); idem m. rec. P.
 ἄρα] om. φ. ἐστὶ BV, comp. Fb. 18. τὰ] τὸ B, corr.
 m. 2. Post $\Gamma\Delta$ add. μετρεῖται καὶ V, sed punctis del. 20.



metitur, AB magnitudinum AB , $\Gamma\Delta$ communis est mensura. et adparet, eandem maximam esse; nam magnitudo magnitudine AB maior AB non metietur.

itaque ne metiatur AB magnitudinem $\Gamma\Delta$. et minore semper uicissim a maiore subtracta reliquum aliquando magnitudinem praecedentem metietur, quia AB , $\Gamma\Delta$ incommensurabiles non sunt [cfr. prop. II]. et AB magnitudinem $E\Delta$ metiens se ipsa minorem relinquat $E\Gamma$, $E\Gamma$ autem ZB metiens se ipsa minorem relinquat AZ , et AZ magnitudinem ΓE metiatur. iam quoniam AZ magnitudinem ΓE metitur, ΓE autem ZB , etiam AZ magnitudinem ZB metietur. uerum etiam se ipsam metitur. quare etiam totam AB metietur AZ . sed AB magnitudinem ΔE metitur. itaque etiam AZ magnitudinem $E\Delta$ metietur. uerum etiam ΓE metitur. quare etiam totam $\Gamma\Delta$ metitur. itaque AZ magnitudinum AB , $\Gamma\Delta$ communis est mensura. iam dico, eandem maximam esse. nam si minus, magnitudo erit maior magnitudine AZ , quae AB , $\Gamma\Delta$ metiatur. sit H . iam quoniam H magnitudinem AB metitur, et AB magnitudinem $E\Delta$ metitur, etiam H magnitudinem $E\Delta$ metietur. uerum etiam totam $\Gamma\Delta$ metitur. quare etiam reliquam ΓE metitur H . sed ΓE magnitudinem ZB metitur. itaque etiam H magnitudinem ZB metitur. uerum etiam totam AB metitur et reliquam AZ me-

$E\Delta$] (prius) ΔE P. 21. $\kappa\alpha\iota$] (alt.) om. V. 23. $\tau\acute{o}$] (alt.) $\tau\acute{o}\nu$ P. 24. $\lambda\omicron\iota\pi\acute{o}\nu$ $\acute{\alpha}\rho\alpha$ F.

ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ ἄρα μείζον τι μέγεθος τοῦ AZ
τὰ AB , $\Gamma\Delta$ μετρήσει· τὸ AZ ἄρα τῶν AB , $\Gamma\Delta$ τὸ
μέγιστον κοινὸν μέτρον ἐστίν.

Δύο ἄρα μεγεθῶν συμμέτρων δοθέντων τῶν AB ,
5 $\Gamma\Delta$ τὸ μέγιστον κοινὸν μέτρον ἡῤῥηται· ὅπερ ἔδει
δείξαι.

Πόρισμα.

Ἐκ δὴ τούτου φανερόν, ὅτι, ἐὰν μέγεθος δύο με-
γέθη μετρήῃ, καὶ τὸ μέγιστον αὐτῶν κοινὸν μέτρον
10 μετρήσει.

δ'.

Τριῶν μεγεθῶν συμμέτρων δοθέντων το
μέγιστον αὐτῶν κοινὸν μέτρον εὑρεῖν.

Ἔστω τὰ δοθέντα τρία μεγέθη σύμμετρα τὰ A , B , Γ .
15 δεῖ δὴ τῶν A , B , Γ τὸ μέγιστον κοινὸν μέτρον εὑρεῖν.

Εἰλήφθω γὰρ δύο τῶν A , B τὸ μέγιστον κοινὸν
μέτρον, καὶ ἔστω τὸ Δ . τὸ δὴ Δ τὸ Γ ἥτοι μετρεῖ ἢ
οὐ [μετρεῖ]. μετρεῖται πρότερον. ἐπεὶ οὖν τὸ Δ τὸ
 Γ μετρεῖ, μετρεῖ δὲ καὶ τὰ A , B , τὸ Δ ἄρα τὰ A , B , Γ
20 μετρεῖ· τὸ Δ ἄρα τῶν A , B , Γ κοινὸν μέτρον ἐστίν.
καὶ φανερόν, ὅτι καὶ μέγιστον· μείζον γὰρ τοῦ Δ
μεγέθους τὰ A , B οὐ μετρεῖ.

1. ἐστίν] om. F. μείζον] supra scr. m. 1 P. τι μείζον F, sed corr. 2. μεγέθη μετρήσει Theon (BFVb). τό] (alt.) m. 2 F. 3. ἐστὶ BVb, comp. F. 5. μέτρο P, sed corr. εῤῥηται P. Deinde add. τὸ AZ V, sed punctis notat. 6. δεῖξαι] ποιῆσαι B et b (mg. γρ. δεῖξαι), δεῖ δεῖξαι F (mg. m. 2: γρ. ποιῆσαι). 9. μετρή] -η in ras. P. 15. Ante δεῖ ras. 1 litt. P. 16. δύο] om. V. 17. δὴ] m. rec. P. 18. μετρεῖ] om. P. 19. μετρεῖ δέ — 20. μετρεῖ] mg. m. 1 P. 20. Δ ἄρα] δέ Δ P. τῶν] -ν postea add. F. ἐστὶ BV, comp. Fb. 21. καί] (alt.) om. BVb. 22. μέγεθος Fb. Post B ras. 1 litt. V. Post μετρεῖ add. εἰ γὰρ δυνατόν, μετρεῖται τὰ A , B , Γ μείζον τοῦ Δ (μεγέθους add. V) τὸ E . καὶ ἐπεὶ τὰ A , B , Γ μετρεῖ,

tietur, maior minorem; quod fieri non potest. itaque magnitudo maior magnitudine AZ magnitudines AB , ΓA non metietur. ergo AZ magnitudinum AB , ΓA maxima mensura communis est.

Ergo datis duabus magnitudinibus commensurabilibus AB , ΓA maxima mensura communis inuenta est; quod erat demonstrandum.

Corollarium.

Hinc manifestum est, si magnitudo duas magnitudines metiatur, eandem maximam earum mensuram communem metiri.

IV.

Datis tribus magnitudinibus commensurabilibus maximam earum mensuram communem inuenire.

Sint datae tres magnitudines commensurabiles A , B , Γ . oportet igitur magnitudinum A , B , Γ maximam mensuram communem inuenire.

Sumatur enim duarum magnitudinum A , B maxima mensura communis [prop. III] et sit Δ . Δ igitur magnitudinem Γ aut metitur aut non metitur. prius metiatur. iam quoniam Δ magnitudinem Γ metitur, et etiam A , B metitur, Δ magnitudines A , B , Γ metitur. Δ igitur magnitudinum A , B , Γ communis est mensura. et adparet, eandem maximam esse; nam magnitudo maior magnitudine Δ non metitur A , B .

καὶ τὰ A , B μετρήσει καὶ τὸ τῶν A , B μέγιστον κοινὸν (κοινὸν μέγιστον V) μέτρον τὸ Δ μετρήσει (μετρήσει τὸ Δ V) τὸ μείζον τὸ ἐλάττω (ἐλάσσον V). ὅπερ ἀποπὸν ἐστὶν (ἀδύνατον V) V et mg. m. 2 B.

Μὴ μετρεῖται δὴ τὸ Δ τὸ Γ . λέγω πρῶτον, ὅτι
 σύμμετρά ἐστι τὰ Γ , Δ . ἐπεὶ γὰρ σύμμετρά ἐστι τὰ
 A , B , Γ , μετρήσει τι αὐτὰ μέγεθος, ὃ δηλαδὴ καὶ τὰ
 A , B μετρήσει· ὥστε καὶ τὸ τῶν A , B μέγιστον κοινὸν
 5 μέτρον τὸ Δ μετρήσει. μετρεῖ δὲ καὶ τὸ Γ · ὥστε τὸ
 εἰρημένον μέγεθος μετρήσει τὰ Γ , Δ · σύμμετρα ἄρα
 ἐστὶ τὰ Γ , Δ . εἰλήφθω οὖν αὐτῶν τὸ μέγιστον κοινὸν
 μέτρον, καὶ ἔστω τὸ E . ἐπεὶ οὖν τὸ E τὸ Δ μετρεῖ,
 ἀλλὰ τὸ Δ τὰ A , B μετρεῖ, καὶ τὸ E ἄρα τὰ A , B με-
 10 τρήσει. μετρεῖ δὲ καὶ τὸ Γ . τὸ E ἄρα τὰ A , B , Γ
 μετρεῖ· τὸ E ἄρα τῶν A , B , Γ κοινόν ἐστι μέτρον. λέγω
 δὴ, ὅτι καὶ μέγιστον. εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω τι τοῦ E
 μείζον μέγεθος τὸ Z , καὶ μετρεῖται τὰ A , B , Γ . καὶ
 ἐπεὶ τὸ Z τὰ A , B , Γ μετρεῖ, καὶ τὰ A , B ἄρα μετρήσει
 15 καὶ τὸ τῶν A , B μέγιστον κοινὸν μέτρον μετρήσει. τὸ
 δὲ τῶν A , B μέγιστον κοινὸν μέτρον ἐστὶ τὸ Δ · τὸ Z
 ἄρα τὸ Δ μετρεῖ. μετρεῖ δὲ καὶ τὸ Γ · τὸ Z ἄρα
 τὰ Γ , Δ μετρεῖ· καὶ τὸ τῶν Γ , Δ ἄρα μέγιστον κοινὸν
 μέτρον μετρήσει τὸ Z . ἐστὶ δὲ τὸ E · τὸ Z ἄρα τὸ E
 20 μετρήσει, τὸ μείζον τὸ ἔλασσον· ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον.
 οὐκ ἄρα μείζον τι τοῦ E μεγέθους [μέγεθος] τὰ A , B , Γ
 μετρεῖ· τὸ E ἄρα τῶν A , B , Γ τὸ μέγιστον κοινὸν μέτρον
 ἐστίν, ἐὰν μὴ μετρήῃ τὸ Δ τὸ Γ , ἐὰν δὲ μετρήῃ, αὐτὸ το Δ .

1. ὅτι πρῶτον F. 2. ἐστὶ] (alt.) ἐστὶν P. 4. μετρεῖ V. 5.
 μετρήσει τὸ Δ F. Post ὥστε ras. 2 litt. V. 6. μετρεῖ V.
 7. ἐστὶ] εἰσὶν P. οὖν] om. BFVb. τό] m. rec. P. 8.
 καί] om. F. ἔστω τὸ E] mg. m. 2 F. 9. μετρεῖ — A , B] om. F.
 μετρήσει] μετρεῖ V. 10. τὸ E — 11. μετρεῖ] om. Theon
 (BFVb). 11. μέτρον ἐστὶ V. ἐστὶν P. 14. μετρεῖ] supra
 scr. F. ἄρα] om. BFVb. 15. B] B ἄρα BFb. 16. μέγιστον]
 m. rec. P. 17. μετρεῖ] (prius) corr. ex μετρήσει m. rec. P.
 18. τὰ] τό b. 19. τὸ Z . ἐστὶ δὲ τὸ E] mg. m. 2 F; τὸ Z .
 τὸ δὲ τῶν Γ , Δ μέγιστον κοινὸν μέτρον ἐστὶ τὸ E V. 20. μετρεῖ V.

iam ne metiatur Δ magnitudinem Γ . prius dico, Γ , Δ commensurabiles esse. nam quoniam A , B , Γ commensurabiles sunt, magnitudo aliqua eas metietur, quae nimirum etiam A , B metietur. quare etiam maximam earum mensuram communem Δ metietur [prop. III coroll.]. uerum etiam Γ metitur. quare magnitudo illa Γ , Δ metietur. itaque Γ , Δ commensurabiles sunt. sumatur igitur maxima earum mensura communis [prop. III] et sit E . iam quoniam E magnitudinem Δ metitur, et Δ magnitudines A , B metitur, etiam E magnitudines A , B metietur. uerum etiam Γ metitur. E igitur A , B , Γ metitur. E igitur magnitudinum A , B , Γ communis est mensura. iam dico, eandem maximam esse. nam si fieri potest, magnitudo magnitudine E maior sit Z et metiatur A , B , Γ . et quoniam Z magnitudines A , B , Γ metitur, etiam A , B metietur et maximam earum mensuram communem [prop. III coroll.]. maxima autem magnitudinum A , B mensura communis est Δ . Z igitur Δ metitur. uerum etiam Γ metitur. Z igitur Γ , Δ metitur. quare etiam maximam earum mensuram communem metietur [id.]. ea autem est E . Z igitur E metietur, maior minorem; quod fieri non potest. itaque magnitudo magnitudine E maior A , B , Γ non metitur. E igitur magnitudinum A , B , Γ maxima est mensura communis, si Δ magnitudinem Γ non metitur, sin metitur, ipsa Δ .

21. τὰ A , B , Γ μετρεῖ μέγεθος F . μέγεθος] m. rec. P. τὰ] τό B , sed corr. Γ] Γ , Δ (eras.) μεγέθη V. 22. τό] (alt.) m. 2 F . 23. εἶν] εἶν P.

Τριῶν ἄρα μεγεθῶν συμμετρων δοθέντων τὸ μέγιστον κοινὸν μέτρον ἡῦρηται [ὅπερ ἔδει δεῖξαι].

Πόρισμα.

Ἐκ δὴ τούτου φανερόν, ὅτι, ἐὰν μέγεθος τρία με-
5 γέθη μετρῇ, καὶ τὸ μέγιστον αὐτῶν κοινὸν μέτρον
μετρήσει.

Ὁμοίως δὴ καὶ ἐπὶ πλειόνων το μέγιστον κοινὸν
μέτρον ληφθήσεται, καὶ τὸ πόρισμα προχωρήσει. ὅπερ
ἔδει δεῖξαι.

10

ε'.

Τὰ σύμμετρα μεγέθη πρὸς ἄλληλα λόγον
ἔχει, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν.

Ἔστω σύμμετρα μεγέθη τὰ *A*, *B*. λέγω, ὅτι τὸ *A*
πρὸς τὸ *B* λόγον ἔχει, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν.

15

Ἐπεὶ γὰρ σύμμετρά ἐστι τὰ *A*, *B*, μετρήσει τι αὐτὰ
μέγεθος. μετρεῖτω, καὶ ἔστω τὸ *Γ*. καὶ ὅσάκις τὸ *Γ*
τὸ *A* μετρεῖ, τοσαῦται μονάδες ἔστωσαν ἐν τῷ *A*, ὅσάκις
δὲ τὸ *Γ* τὸ *B* μετρεῖ, τοσαῦται μονάδες ἔστωσαν ἐν τῷ *E*.

Ἐπεὶ οὖν τὸ *Γ* τὸ *A* μετρεῖ κατὰ τὰς ἐν τῷ *A*
20 μονάδας, μετρεῖ δὲ καὶ ἡ μονὰς τὸν *A* κατὰ τὰς ἐν
αὐτῷ μονάδας, ἰσάκις ἄρα ἡ μονὰς τὸν *A* μετρεῖ ἀριθ-
μὸν καὶ τὸ *Γ* μέγεθος τὸ *A*. ἔστιν ἄρα ὡς τὸ *Γ* πρὸς
τὸ *A*, οὕτως ἡ μονὰς πρὸς τὸν *A*. ἀνάπαλιν ἄρα, ὡς
τὸ *A* πρὸς τὸ *Γ*, οὕτως ὁ *A* πρὸς τὴν μονάδα. πάλιν
25 ἐπεὶ τὸ *Γ* τὸ *B* μετρεῖ κατὰ τὰς ἐν τῷ *E* μονάδας,

2. εὔρηται P. ποιῆσαι B et F (supra scr. δεῖξαι). 4. μεγέθη F. 5. μέτρον] supra scr. F. 7. δέ BVb. 8. λειφ-
θήσεται F. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] om. Theon (BFVb). 15. ἐστιν P. B μεγέθη F. 20. τόν] τό Bb. 21. μετρήσει b.
ἀριθμόν] om. V. 22. καὶ] κατὰ F. 23. τόν] τό B. 25. τῷ E] corr. ex αὐτῷ m. rec. b.

Ergo datis tribus magnitudinibus commensurabilibus maxima mensura communis inuenta est.

Corollarium.

Hinc manifestum est, si magnitudo tres magnitudines metitur, eandem maximam earum mensuram communem metiri.

Iam similiter etiam in pluribus maxima mensura communis sumetur, et corollarium quoque progredietur. — quod erat demonstrandum.

V.


Magnitudines commensurabiles inter se rationem habent, quam numerus ad numerum.

Sint magnitudines commensurabiles A, B . dico, A ad B rationem habere, quam habeat numerus ad numerum.

Nam quoniam A, B commensurabiles sunt, magnitudo aliqua eas metietur. metiatur et sit Γ . et quoties Γ magnitudinem A metitur, totidem unitates sint in A , quoties autem Γ magnitudinem B metitur, totidem unitates sint in E .

iam quoniam Γ magnitudinem A secundum unitates numeri A metitur, sed etiam unitas numerum A secundum unitates eius metitur, unitas numerum A et Γ magnitudinem A aequaliter metitur.

itaque $\Gamma : A = 1 : A$ [VII def. 20]. e contrario igitur [V, 7 coroll.] $A : \Gamma = A : 1$. rursus quoniam Γ magnitudinem B secundum uni-



μετρεῖ δὲ καὶ ἡ μονὰς τὸν E κατὰ τὰς ἐν αὐτῷ μονάδας, ἰσάκεις ἄρα ἡ μονὰς τὸν E μετρεῖ καὶ τὸ Γ τὸ B · ἔστιν ἄρα ὡς τὸ Γ πρὸς τὸ B , οὕτως ἡ μονὰς πρὸς τὸν E . ἐδείχθη δὲ καὶ ὡς τὸ A πρὸς τὸ Γ , ὃ Δ πρὸς τὴν μονάδα· δι' ἴσου ἄρα ἔστιν ὡς τὸ A πρὸς τὸ B , οὕτως ὃ Δ ἀριθμὸς πρὸς τὸν E .

Τὰ ἄρα σύμμετρα μεγέθη τὰ A , B πρὸς ἄλληλα λόγον ἔχει, ὃν ἀριθμὸς ὃ Δ πρὸς ἀριθμὸν τὸν E · ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

10

ς'.

Ἐὰν δύο μεγέθη πρὸς ἄλληλα λόγον ἔχῃ, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμὸν, σύμμετρα ἔσται τὰ μεγέθη.

Δύο γὰρ μεγέθη τὰ A , B πρὸς ἄλληλα λόγον ἔχέτω, 15 ὃν ἀριθμὸς ὃ Δ πρὸς ἀριθμὸν τὸν E · λέγω, ὅτι σύμμετρά ἐστι τὰ A , B μεγέθη.

Ὅσαι γάρ εἰσιν ἐν τῷ Δ μονάδες, εἰς τοσαῦτα ἴσα διηγήσθω τὸ A , καὶ ἐν αὐτῶν ἴσον ἔστω τὸ Γ · ὅσαι δέ εἰσιν ἐν τῷ E μονάδες, ἐκ τοσούτων μεγεθῶν ἴσων 20 τῷ Γ συγκείσθω τὸ Z .

Ἐπεὶ οὖν, ὅσαι εἰσὶν ἐν τῷ Δ μονάδες, τοσαῦτά εἰσι καὶ ἐν τῷ A μεγέθη ἴσα τῷ Γ , ὃ ἄρα μέρος ἔστιν ἡ μονὰς τοῦ Δ , τὸ αὐτὸ μέρος ἔστι καὶ τὸ Γ τοῦ A · ἔστιν ἄρα ὡς τὸ Γ πρὸς τὸ A , οὕτως ἡ μονὰς πρὸς 25 τὸν Δ . μετρεῖ δὲ ἡ μονὰς τὸν Δ ἀριθμὸν· μετρεῖ ἄρα καὶ τὸ Γ τὸ A . καὶ ἐπεὶ ἔστιν ὡς τὸ Γ πρὸς τὸ A , οὕτως ἡ μονὰς πρὸς τὸν Δ [ἀριθμὸν], ἀνάπαλιν ἄρα ὡς τὸ A πρὸς τὸ Γ , οὕτως ὃ Δ ἀριθμὸς πρὸς

3. τό] (pr.) τόν P. 4. οὕτως ὃ V. 7. πρὸς ἄλληλα] mg.
m. 1 P. 11. ἔχει b. 14. δύο γὰρ μεγέθη] mg. m. 1 P.

tates numeri E metitur, sed etiam unitas numerum E secundum unitates eius metitur, unitas numerum E et Γ magnitudinem B aequaliter metitur. itaque [VII def. 20] $\Gamma : B = 1 : E$. demonstrauius autem, esse etiam $A : \Gamma = \Delta : 1$. itaque ex aequo [V, 22] $A : B = \Delta : E$.

Ergo magnitudines commensurabiles A, B inter se rationem habent, quam numerus Δ ad numerum E ; quod erat demonstrandum.

VI.

Si duae magnitudines inter se rationem habent, quam numerus ad numerum, commensurabiles sunt.

Duae enim magnitudines A, B inter se rationem habeant, quam numerus Δ ad numerum E . dico, A, B magnitudines commensurabiles esse.

nam quot sunt in Δ
 $\left. \begin{array}{l} \text{unitates, in totidem par-} \\ \text{tes aequales diuidatur } A, \\ \text{et uni earum aequalis} \end{array} \right\} H$
 sit Γ . quot autem sunt in E unitates, ex totidem
 magnitudinibus magnitudini Γ aequalibus componatur Z .

quoniam igitur, quot sunt in Δ unitates, totidem etiam in A magnitudines sunt magnitudini Γ aequales, quae pars est unitas numeri Δ , eadem pars est etiam Γ magnitudinis A . itaque $\Gamma : A = 1 : \Delta$ [VII def. 20]. uerum unitas numerum Δ metitur. quare etiam Γ

$\pi\rho\acute{o}s$ ἄλληλα τὰ A, B V. 15. τόν] τ' (τόν) F, τό φ. 21. τσαῦται V, ι eras. 22. εἰσι] ἐστίν P. ἴσαι V, ι eras. 23. Δ ἀριθμοῦ F. τό] (alt.) δ P, in ras. V. τοῦ] e corr. V. 25. Δ ἀριθμόν F. Post μονάς ras. 4 litt. V. 26. καὶ ἐπεὶ καὶ V. τό] δ P. 27. ἀριθμόν] om. P, corr. ex ἀριθμός F.

τὴν μονάδα. πάλιν ἐπεί, ὅσαι εἰσὶν ἐν τῷ *E* μονάδες, τοσαῦτά εἰσι καὶ ἐν τῷ *Z* ἴσα τῷ *Γ*, ἔστιν ἄρα ὡς τὸ *Γ* πρὸς τὸ *Z*, οὕτως ἡ μονὰς πρὸς τὸν *E* [ἀριθμόν]. ἐδείχθη δὲ καὶ ὡς τὸ *A* πρὸς τὸ *Γ*, οὕτως ὁ *Δ* πρὸς
 5 τὴν μονάδα· δι' ἴσον ἄρα ἐστὶν ὡς τὸ *A* πρὸς τὸ *Z*, οὕτως ὁ *Δ* πρὸς τὸν *E*. ἀλλ' ὡς ὁ *Δ* πρὸς τὸν *E*, οὕτως ἐστὶ τὸ *A* πρὸς τὸ *B*· καὶ ὡς ἄρα τὸ *A* πρὸς τὸ *B*, οὕτως καὶ πρὸς τὸ *Z*. τὸ *A* ἄρα πρὸς ἐκάτερον τῶν *B*, *Z* τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον· ἴσον ἄρα ἐστὶ τὸ *B*
 10 τῷ *Z*. μετρεῖ δὲ τὸ *Γ* τὸ *Z*· μετρεῖ ἄρα καὶ τὸ *B*. ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ *A*· τὸ *Γ* ἄρα τὰ *A*, *B* μετρεῖ. σύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ *A* τῷ *B*.

Ἐὰν ἄρα δύο μεγέθη πρὸς ἄλληλα, καὶ τὰ ἐξῆς.

Πόρισμα.

15 Ἐκ δὲ τούτου φανερόν, ὅτι, ἐὰν ᾧσι δύο ἀριθμοί, ὡς οἱ *Δ*, *E*, καὶ εὐθεῖα, ὡς ἡ *A*, δύνατόν ἐστι ποιῆσαι ὡς ὁ *Δ* ἀριθμὸς πρὸς τὸν *E* ἀριθμόν, οὕτως τὴν εὐθεῖαν πρὸς εὐθεῖαν. ἐὰν δὲ καὶ τῶν *A*, *Z* μέση ἀνάλογον ληφθῇ, ὡς ἡ *B*, ἔσται ὡς ἡ *A* πρὸς τὴν *Z*,
 20 οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς *A* πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *B*, τουτέστιν ὡς ἡ πρώτη πρὸς τὴν τρίτην, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς πρώτης πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς δευτέρας τὸ ὅμοιον καὶ ὁμοίως ἀναγραφόμενον. ἀλλ' ὡς ἡ *A* πρὸς τὴν *Z*, οὕτως ἐστὶν ὁ *Δ* ἀριθμὸς πρὸς τὸν *E* ἀριθμόν· γέγονεν ἄρα καὶ
 25 ὡς ὁ *Δ* ἀριθμὸς πρὸς τὸν *E* ἀριθμόν, οὕτως τὸ ἀπὸ

1. εἰσίν] εἰσι καὶ V. 2. τοσαῦται P, et FV, sed corr. εἰσιν P. Z μεγέθη F. ἴσαι V, sed corr. 3. ἀριθμόν] om. P. 4. τό] (alt.) τόν b. 5. τό] ὁ B. τό] τόν Bb. 6. ἀλλ' καὶ V. 7. ἐστὶ] om. V. 8. καὶ τὸ A F. 9. λόγον P, sed corr. 11. μὴν] μετρεῖ P. τὸ Γ]

magnitudinem A metitur. et quoniam est $\Gamma:A=1:\Delta$, e contrario [V, 7 coroll.] erit $A:\Gamma=\Delta:1$. rursus quoniam, quot sunt in E unitates, totidem etiam in Z magnitudines magnitudini Γ aequales sunt, erit $\Gamma:Z=1:E$ [VII def. 20]. demonstrauius autem, esse etiam $A:\Gamma=\Delta:1$. itaque ex aequo [V, 22] est $A:Z=\Delta:E$. uerum $\Delta:E=A:B$. quare etiam $A:B=A:Z$. A igitur ad utrumque B, Z eandem rationem habet. ergo $B=Z$ [V, 9]. Γ autem Z metitur; quare etiam B metitur. uerum etiam A metitur. Γ igitur A, B metitur. itaque A et B commensurabiles sunt.

Ergo si duae magnitudines inter se, et quae sequuntur.

Corollarium.

Hinc iam manifestum est, si duo numeri sint Δ, E et recta A , fieri posse, ut faciamus, ut $\Delta:E$, ita rectam ad aliam rectam. sin rectarum A, Z media proportionalis sumitur B , erit $A:Z=A^2:B^2$, h. e. ut prima ad tertiam, ita figura in prima descripta ad figuram in secunda similem et similiter descriptam [VI, 20 coroll. 2, cfr. V def. 9]. sed $A:Z=\Delta:E$.

καὶ τὸ Γ V. 12. ἐστὶν P. B] e corr. V. 13. καὶ τὰ
ἐξῆς] λόγον ἔχει, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμὸν, σύμμετρα ἔσται τὰ
μεγέθη· περὶ ἔδει δεῖξαι V. 16. ὡς] m. 2 F. εὐθείαι F.
ἢ Δ] e corr. V. 17. ὁ] τὸν V, supra scr. m. 2 F. Δ] om. Bfb. ἀριθμὸν FV. E] om. Bfb; ὡς τὸν Δ ἀριθμὸν
πρὸς τὸν E ἀριθμὸν m. 2 B. τήν] om. V, ἢ P; del. m.
rec. B. 18. εὐθείαν] -αν eras. V, εὐθεία P. εὐθείαν] τὴν
εὐθείαν V et m. rec. B. 19. Z] B B, sed corr. 21. ὡς]
ὅς εἰς? V. πρώτῃ] supra add. α F, α PBVb. τρίτῃ] ξ V,
γ Pb et corr. ex γ B m. 2 (ξ m. rec.); supra add. γ F. πρώτης]
α P. 24. ἀριθμὸν] corr. ex ἀριθμὸς F. γέγονεν ἄρα] supra
scr. m. rec. F.

τῆς *A* εὐθείας πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *B* εὐθείας· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

ζ'.

Τὰ ἀσύμμετρα μεγέθη πρὸς ἄλληλα λόγον οὐκ ἔχει, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν.

Ἐστω ἀσύμμετρα μεγέθη τὰ *A*, *B*· λέγω, ὅτι τὸ *A* πρὸς τὸ *B* λόγον οὐκ ἔχει, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν.

Εἰ γὰρ ἔχει τὸ *A* πρὸς τὸ *B* λόγον, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, σύμμετρον ἔσται τὸ *A* τῷ *B*. οὐκ ἔστι
10 δέ· οὐκ ἄρα τὸ *A* πρὸς τὸ *B* λόγον ἔχει, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν.

Τὰ ἄρα ἀσύμμετρα μεγέθη πρὸς ἄλληλα λόγον οὐκ ἔχει, καὶ τὰ ἐξῆς.

η'.

Ἐὰν δύο μεγέθη πρὸς ἄλληλα λόγον μὴ ἔχῃ, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, ἀσύμμετρα ἔσται τὰ μεγέθη.

Δύο γὰρ μεγέθη τὰ *A*, *B* πρὸς ἄλληλα λόγον μὴ ἔχέτω, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν· λέγω, ὅτι ἀσύμμετρά
20 ἔσται τὰ *A*, *B* μεγέθη.

Εἰ γὰρ ἔσται σύμμετρα, τὸ *A* πρὸς τὸ *B* λόγον ἔξει, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν. οὐκ ἔχει δέ· ἀσύμμετρα ἄρα ἔσσι τὰ *A*, *B* μεγέθη.

Ἐὰν ἄρα δύο μεγέθη πρὸς ἄλληλα, καὶ τὰ ἐξῆς.

1. *A* εὐθείας] in ras. m. 1 b. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] om. Theon (BFVb). Seq. demonstr. alt.; u. app. 5. Post ἀριθμόν ras. 3 litt. V. 7. τό] ins. m. 1 F. 9. Ante ἔσται ras. 1 litt. F. ἔστιν BF. 10. γρ. τὸ *A* ἄρα πρὸς τὸ *B* λόγον οὐκ ἔχει mg. m. 1 b. 12. σύμμετρα b. λόγον οὐκ ἔχει πρὸς ἄλληλα BFb. 13. καὶ τὰ ἐξῆς] om. F (in mg. quaedam erasa), ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν BVb. 20. ἔστιν P, ἔσται V. 21. γὰρ σύμμετρόν ἔστι τὸ *A* τῷ *B* Theon (BFVb). 22. ἐχει b. ὅνπερ V.

itaque inuenimus $A:E = A^2:B^2$. — quod erat demonstrandum.

VII.

Magnitudines incommensurabiles inter se rationem non habent, quam numerus ad numerum.

Sint magnitudines incommensurabiles A, B . dico, A ad B rationem non habere, quam habeat numerus ad numerum.

Nam si A ad B rationem habet, quam
 $\frac{A}{B}$ numerus ad numerum, A et B commensurabiles
 $\frac{B}{B}$ erunt [prop. VI]. uerum non sunt. itaque A
 ad B rationem non habet, quam numerus ad numerum.

Ergo magnitudines incommensurabiles inter se rationem non habent, et quae sequuntur.

VIII.

Si duae magnitudines inter se rationem non habent, quam numerus ad numerum, magnitudines incommensurabiles erunt.

Duae enim magnitudines A, B inter se
 $\frac{A}{B}$ rationem ne habeant, quam numerus ad nu-
 $\frac{B}{B}$ merum. dico, magnitudines A, B incommen-
 surabiles esse.

Nam si commensurabiles sunt, A ad B rationem habet, quam numerus ad numerum [prop. V]. uerum non habet. itaque magnitudines A, B incommensurabiles sunt.

Ergo si duae magnitudines inter se, et quae sequuntur.

$\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha$] corr. ex $\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha$ m. 1 P. 23. $\epsilon\sigma\tau\iota\nu$ P. 24.
 $\epsilon\acute{\alpha}\nu$ — $\mu\epsilon\gamma\epsilon\theta\eta$] om. F. $\pi\rho\acute{o}s$ $\acute{\alpha}\lambda\lambda\eta\lambda\alpha$] bis b. $\kappa\alpha\iota$ $\tau\acute{\alpha}$ $\xi\xi\eta\varsigma$] $\lambda\acute{o}\gamma\omicron\nu$ $\mu\eta$ $\xi\chi\eta$, $\delta\eta$ $\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha$ $\pi\rho\acute{o}s$ $\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha$ $\alpha\sigma\acute{\upsilon}\mu\mu\epsilon\tau\rho\alpha$ $\epsilon\sigma\tau\alpha\iota$ V.

θ'.

Τὰ ἀπὸ τῶν μήκει συμμέτρων εὐθείων τε-
 τράγωνα πρὸς ἄλληλα λόγον ἔχει, ὃν τετρά-
 γωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· καὶ
 5 τὰ τετράγωνα τὰ πρὸς ἄλληλα λόγον ἔχοντα,
 ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀρι-
 θμόν, καὶ τὰς πλευρὰς ἔξει μήκει συμμέτρους.
 τὰ δὲ ἀπὸ τῶν μήκει ἀσυμμέτρων εὐθείων τε-
 τράγωνα πρὸς ἄλληλα λόγον οὐκ ἔχει, ὅνπερ
 10 τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν·
 καὶ τὰ τετράγωνα τὰ πρὸς ἄλληλα λόγον μὴ
 ἔχοντα, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετρά-
 γωνον ἀριθμόν, οὐδὲ τὰς πλευρὰς ἔξει μήκει
 συμμέτρους.

15 Ἔστωσαν γὰρ αἱ A, B μήκει σύμμετροι· λέγω, ὅτι
 τὸ ἀπὸ τῆς A τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς B τετρά-
 γωνον λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τε-
 τράγωνον ἀριθμόν.

Ἐπεὶ γὰρ σύμμετρός ἐστιν ἡ A τῇ B μήκει, ἡ A
 20 ἄρα πρὸς τὴν B λόγον ἔχει, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν.
 ἐχέτω, ὃν ὁ Γ πρὸς τὸν Δ . ἐπεὶ οὖν ἐστιν ὥς ἡ A
 πρὸς τὴν B , οὕτως ὁ Γ πρὸς τὸν Δ , ἀλλὰ τοῦ μὲν
 τῆς A πρὸς τὴν B λόγου διπλασίων ἐστὶν ὁ τοῦ ἀπὸ
 τῆς A τετραγώνου πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς B τετράγωνον·
 25 τὰ γὰρ ὅμοια σχήματα ἐν διπλασίονι λόγῳ ἐστὶ τῶν
 ὁμολόγων πλευρῶν· τοῦ δὲ τοῦ Γ [ἀριθμοῦ] πρὸς
 τὸν Δ [ἀριθμόν] λόγου διπλασίων ἐστὶν ὁ τοῦ ἀπὸ τοῦ
 Γ τετραγώνου πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ Δ τετράγωνον· δύο
 γὰρ τετραγώνων ἀριθμῶν εἰς μέσος ἀνάλογόν ἐστιν

8. πρὸς ἄλληλα] supra scr. F. ἔχη V, corr. m. 1. 4.
 ἀριθμὸς] supra scr. m. 2 B. 5. τετράγωνα αἱ] supra scr. m.

IX.

Quadrata rectarum longitudine commensurabilium inter se rationem habent, quam numerus quadratus ad numerum quadratum; et quadrata, quae inter se rationem habent, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, etiam latera longitudine commensurabilia habebunt. quadrata autem rectarum longitudine incommensurabilium inter se rationem non habent, quam numerus quadratus ad numerum quadratum; et quadrata, quae inter se rationem non habent, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, ne latera quidem longitudine commensurabilia habebunt.

Nam A, B longitudine commensurabiles sint. dico, $A^2:B^2$ rationem habere, quam habeat numerus quadratus ad numerum quadratum.

Quoniam enim A et B longitudine commensurabiles sunt, $A:B$ rationem habet, quam numerus ad numerum [prop. V]. sit $A:B = \Gamma:\Delta$. iam quoniam $A:B = \Gamma:\Delta$, et $A^2:B^2$ duplex est quam ratio $A:B$ (nam figurae similes inter se duplicatam rationem habent

2 B. 8. *συμμέτρων* b (corr. m. rec.), φ; αλ seq. ras. F. 9. *ὅν* BFb. 10. *ἀριθμόν*] om. V. 11. *μὴ ἔχοντα λόγον* V. 12. *ὅνπερ* V. 15. *γάρ*] om. V. 16. *τό*] (prius) supra scr. m. 1 P. *τετράγωνον*] (alt.) m. 2 comp. F. 17. *ὅνπερ* V. 21. *ὅν*] *ὅν ὅν* Bb, *ὅν* corr. in *ὅν ὅν* FV. 22. *Γ ἀριθμός* BVb et e corr. F. *Δ ἀριθμός* BFVb. 23. *τῆς*] e corr. V. *διπλασίον* V, corr. m. 2. 24. *τό*] corr. ex *τόν* V. 26. *τοῦ*] (alt.) om. P, supra scr. F. *ἀριθμοῖ*] om. P. 27. *ἀριθμόν*] om. P. *ὁ τοῦ*] *τό* F. 28. Post *Γ* del. *πρὸς τὸν Δ* P. *τετραγώνου*] *τετραγων* seq. ras. 1 litt. F. *τόν*] *τό* B. 29. *μέσον* B, corr. m. 2.

ἀριθμός, καὶ ὁ τετράγωνος πρὸς τὸν τετράγωνον [ἀριθμὸν] διπλασίονα λόγον ἔχει, ἥπερ ἡ πλευρὰ πρὸς τὴν πλευράν· ἔστιν ἄρα καὶ ὡς τὸ ἀπὸ τῆς *A* τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *B* τετράγωνον, οὕτως ὁ ἀπὸ
 5 τοῦ *Γ* τετράγωνος [ἀριθμοῦ] πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ *Δ* [ἀριθμοῦ] τετράγωνον [ἀριθμόν].

Ἀλλὰ δὴ ἔστω ὡς τὸ ἀπὸ τῆς *A* τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *B*, οὕτως ὁ ἀπὸ τοῦ *Γ* τετράγωνος πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ *Δ* [τετράγωνον]· λέγω, ὅτι σύμμετρός
 10 ἔστιν ἡ *A* τῇ *B* μήκει.

Ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὡς τὸ ἀπὸ τῆς *A* τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *B* [τετράγωνον], οὕτως ὁ ἀπὸ τοῦ *Γ* τετράγωνος πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ *Δ* [τετράγωνον], ἀλλ' ὁ μὲν τοῦ ἀπὸ τῆς *A* τετραγώνου πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *B*
 15 [τετράγωνον] λόγος διπλασίων ἐστὶ τοῦ τῆς *A* πρὸς τὴν *B* λόγου, ὁ δὲ τοῦ ἀπὸ τοῦ *Γ* [ἀριθμοῦ] τετραγώνου [ἀριθμοῦ] πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ *Δ* [ἀριθμοῦ] τετράγωνον [ἀριθμόν] λόγος διπλασίων ἐστὶ τοῦ τοῦ *Γ* [ἀριθμοῦ] πρὸς τὸν *Δ* [ἀριθμόν] λόγου, ἔστιν ἄρα
 20 καὶ ὡς ἡ *A* πρὸς τὴν *B*, οὕτως ὁ *Γ* [ἀριθμός] πρὸς τὸν *Δ* [ἀριθμόν]. ἡ *A* ἄρα πρὸς τὴν *B* λόγον ἔχει, ὃν ἀριθμὸς ὁ *Γ* πρὸς ἀριθμόν τὸν *Δ*· σύμμετρος ἄρα ἔστιν ἡ *A* τῇ *B* μήκει.

Ἀλλὰ δὴ ἀσύμμετρος ἔστω ἡ *A* τῇ *B* μήκει· λέγω,
 25 ὅτι τὸ ἀπὸ τῆς *A* τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *B* [τετράγωνον] λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν.

Εἰ γὰρ ἔχει τὸ ἀπὸ τῆς *A* τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *B* [τετράγωνον] λόγον, ὃν τετράγωνος ἀριθ-

1. ἀριθμόν] om. B F V b. 5. Γ] in ras. F, Γ ἀριθμοῦ F V b. ἀριθμός] om. P. 6. ἀριθμοῦ] om. P. ἀριθμόν]

quam latera correspondentia [VI, 20 coroll.]), et $\Gamma^2 : \mathcal{A}^2$ duplex est quam ratio $\Gamma : \mathcal{A}$ (nam inter duos numeros quadratos unus medius est numerus, et numerus quadratus ad numerum quadratum duplicatam rationem habet quam latus ad latus [VIII, 11]), erit $\mathcal{A}^2 : B^2 = \Gamma^2 : \mathcal{A}^2$.

Iam uero sit $\mathcal{A}^2 : B^2 = \Gamma^2 : \mathcal{A}^2$. dico, \mathcal{A} et B longitudine commensurabiles esse.

nam quoniam est $\mathcal{A}^2 : B^2 = \Gamma^2 : \mathcal{A}^2$, et $\mathcal{A}^2 : B^2$ duplex est quam ratio $\mathcal{A} : B$, $\Gamma^2 : \mathcal{A}^2$ autem duplex quam $\Gamma : \mathcal{A}$, erit $\mathcal{A} : B = \Gamma : \mathcal{A}$. itaque \mathcal{A} ad B rationem habet, quam numerus Γ ad numerum \mathcal{A} . ergo \mathcal{A} et B longitudine commensurabiles sunt [prop. VI].

Iam uero \mathcal{A} et B longitudine incommensurabiles sint. dico, $\mathcal{A}^2 : B^2$ rationem non habere, quam habeat numerus quadratus ad numerum quadratum.

si enim $\mathcal{A}^2 : B^2$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, \mathcal{A} et B commen-

om. P. 8. B τετραγώνον BVb et e corr. F. τοῦ] corr. ex τῆς V. 9. τετραγώνον] om. P. 11. \mathcal{A}] in ras. b. 12. τετραγώνον] om. P. 13. τὸν] τό b. τετραγώνον] om. P. 14. τοῦ] m. 2 F. τό] τόν B, τὸν τοῦ F. 15. τετραγώνον] om. P. 16. ἀριθμοῦ] om. P. τετραγώνος BV. 17. ἀριθμοῦ] om. P, ἀριθμός BV. ἀριθμοῦ] om. P. τετραγώνον P. 18. ἀριθμόν] om. P. ἐστίν P. τοῦ] om. V. 19. ἀριθμοῦ] om. P. ἀριθμόν] om. P. 20. ἀριθμός] om. P. 21. ἀριθμόν] om. P. 22. τὸν \mathcal{A}] m. 2 B. 25. \mathcal{A}] corr. ex B m. 1 V. τετραγώνον] (alt.) om. P. 29. τετραγώνον] om. P.

μὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, σύμμετρος ἔσται ἡ *A* τῇ *B*. οὐκ ἔστι δέ· οὐκ ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς *A* τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *B* [τετράγωνον] λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν.

- 5 Πάλιν δὴ τὸ ἀπὸ τῆς *A* τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *B* [τετράγωνον] λόγον μὴ ἔχεται, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· λέγω, ὅτι ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ *A* τῇ *B* μήκει.

- Εἰ γάρ ἐστι σύμμετρος ἡ *A* τῇ *B*, ἔξει τὸ ἀπὸ τῆς 10 *A* πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *B* λόγον, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν. οὐκ ἔχει δέ· οὐκ ἄρα σύμμετρός ἐστιν ἡ *A* τῇ *B* μήκει.

Τὰ ἄρα ἀπὸ τῶν μήκει συμμέτρων, καὶ τὰ ἐξῆς.

Πόρισμα.

- 15 Καὶ φανερόν ἐκ τῶν δεδειγμένων ἔσται, ὅτι αἱ μήκει σύμμετροι πάντως καὶ δυνάμει, αἱ δὲ δυνάμει οὐ πάντως καὶ μήκει [εἴπερ τὰ ἀπὸ τῶν μήκει συμμέτρων εὐθειῶν τετράγωνα λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, τὰ δὲ λόγον ἔχοντα, 20 ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, σύμμετρά ἐστιν. ὥστε αἱ μήκει σύμμετροι εὐθεῖται οὐ μόνον [εἰσὶ] μήκει σύμμετροι, ἀλλὰ καὶ δυνάμει.

- πάλιν ἐπεὶ, ὅσα τετράγωνα πρὸς ἄλληλα λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, μήκει 25 ἐδείχθη σύμμετρα καὶ δυνάμει ὄντα σύμμετρα τῷ τὰ τετράγωνα λόγον ἔχειν, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, ὅσα ἄρα τετράγωνα λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, ἀλλὰ ἀπλῶς, ὃν

2. Post *B* add. μήκει m. 2 V. 3. τετράγωνον] om P. 5. δῆ] om. b, δέ BFV. 6. τετράγωνον] om. P. 8. ἐστιν] e

surabiles erunt. at non sunt. ergo $A^2:B^2$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum.

iam rursus $A^2:B^2$ rationem ne habeat, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. dico, A et B longitudine incommensurabiles esse.

nam si A et B commensurabiles sunt, $A^2:B^2$ rationem habebit, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. at non habet. ergo A et B longitudine commensurabiles non sunt.

Ergo quadrata rectarum longitudine commensurabilium, et quae sequuntur.

Corollarium.

Ex iis, quae demonstrauius, manifestum est, rectas longitudine commensurabiles semper etiam potentia

corr. F. 9. εἶ] in ras. P. ἔσται P. 10. A τετραγώνον BFb. B τετραγώνον BFb. 12. Post B add. ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ A τῇ B FVb, B m. 2. 13. Post συμμετρων add. εὐθεϊῶν τετραγωνα πρὸς ἄλληλα λόγον ἔχει, ὃν τετραγώνος ἀριθμὸς πρὸς τετραγώνον ἀριθμὸν V. Post ἐξῆς add. Theon: ὅπερ ἔδει δείξαι (BFVb). 15. ἐκ] ἔστω ἐκ BFV. ἔσται] om. b. 17. οὐ] in ras. F, σύμμετροι οὐ V. εἴπερ] corr. ex ἥπερ m. 2 V. τὰ] corr. ex τοῖς m. 1 F. 21. Post μήκει add. αἶ m. 2 B. εἰσὶ] om. P. 23. δσα] ὧν P, corr. mg. m. 1. τετραγωνα λόγον ἔχει πρὸς ἄλληλα F. 26. τετραγώνος ἀριθμὸς πρὸς τετραγώνον ἀριθμὸν BFVb. Post ἀριθμὸν add. οἷον ὁ λ καὶ ὁ ξ . ὁ γὰρ ξ πρὸς τὸν λ λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετραγώνος ἀριθμὸς πρὸς τετραγώνον ἀριθμὸν, σύμμετροι δέ· αἱ δὲ εὐθεῖαι, αἶ ὧν ἀνεγράφησαν, ἀσύμμετροί εἰσιν· τὰ γὰρ τετραγωνα ἀλογά εἰσιν· ὥστε οὐκ αἱ μήκει σύμμετροι πάντως καὶ δυνάμει, αἱ δὲ δυνάμει οὐ πάντως καὶ μήκει b. 28. ἀλλ' BFV. ἀπλῶς] om. Fb, m. 2 B. ὃν] ὃν ἑτερός τις BFVb.

ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, σύμμετρα μὲν ἔσται αὐτὰ τὰ
 τετράγωνα δυνάμει, οὐκ ἐτι δὲ καὶ μήκει· ὥστε τὰ μὲν
 μήκει σύμμετρα πάντως καὶ δυνάμει, τὰ δὲ δυνάμει
 οὐ πάντως καὶ μήκει, εἰ μὴ καὶ λόγον ἔχουσιν, ὃν τε-
 5 τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν.

λέγω δὴ, ὅτι [καὶ] αἱ μήκει ἀσύμμετροι οὐ πάντως
 καὶ δυνάμει, ἐπειδὴ περ αἱ δυνάμει σίμμετροι δύνανται
 λόγον μὴ ἔχειν, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετρά-
 γωνον ἀριθμόν, καὶ διὰ τοῦτο δυνάμει οὔσαι σύμ-
 10 μετροὶ μήκει εἰσὶν ἀσύμμετροι. ὥστε οὐχ αἱ τῷ μήκει
 ἀσύμμετροι πάντως καὶ δυνάμει, ἀλλὰ δύνανται μήκει
 οὔσαι ἀσύμμετροι δυνάμει εἶναι καὶ ἀσύμμετροι καὶ
 σύμμετροι.

αἱ δὲ δυνάμει ἀσύμμετροι πάντως καὶ μήκει ἀσύμ-
 15 μετροὶ· εἰ γὰρ [εἰσι] μήκει σύμμετροι, ἔσονται καὶ
 δυνάμει σύμμετροι. ὑπόκεινται δὲ καὶ ἀσύμμετροι·
 ὅπερ ἄτοπον. αἱ ἄρα δυνάμει ἀσύμμετροι πάντως
 καὶ μήκει].

Λήμμα.

20 Δέδεικται ἐν τοῖς ἀριθμητικοῖς, ὅτι οἱ ὅμοιοι ἐπί-
 πεδοὶ ἀριθμοὶ πρὸς ἀλλήλους λόγον ἔχουσιν, ὃν τε-
 τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, καὶ ὅτι,
 ἐάν δύο ἀριθμοὶ πρὸς ἀλλήλους λόγον ἔχουσιν, ὃν
 τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, ὅμοιοί
 25 εἰσιν ἐπίπεδοι. καὶ δῆλον ἐκ τούτων, ὅτι οἱ μὴ ὅμοιοι
 ἐπίπεδοι ἀριθμοί, τουτέστιν οἱ μὴ ἀνάλογον ἔχοντες
 τὰς πλευράς, πρὸς ἀλλήλους λόγον οὐκ ἔχουσιν, ὃν
 τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν. εἰ γὰρ
 ἔχουσιν, ὅμοιοι ἐπίπεδοι ἔσονται· ὅπερ οὐχ ὑπόκειται.

1. ἀριθμόν τινα V. μὲν] om. V. ἔσται] εἰσιν BF,
 ἔστιν comp. b; ἔστι V, corr. in μὲν m. 2. αὐτά] om. V;

commensurabiles esse, rectas autem potentia commensurabiles non semper etiam longitudine.¹⁾

Lemma.

In arithmetice demonstratum est, similes numeros planos eam inter se rationem habere, quam habeat numerus quadratus ad numerum quadratum [VIII, 26], et si duo numeri inter se rationem habeant, quam habeat numerus quadratus ad numerum quadratum, similes numeros planos eos esse.²⁾ unde adparet, numeros planos non similes (h. e. qui latera proportionalia non habent [cfr. VII def. 22]) inter se rationem non habere, quam habeat numerus quadratus ad numerum quadratum. nam si habebunt, similes erunt plani; quod contra hypothesim est. ergo numeri plani non

1) Quae sequitur p. 28, 17 — 30, 5 demonstratio corollarii et superflua est et a sermone Euclidis abhorret. praeterea offendit, quod plus demonstratur (λέγω δὴ lin. 6), quam propositum erat.

2) Hoc nusquam demonstratur; sed est VIII, 26 conuersa, qua etiam in IX, 10 p. 358, 19 utitur.

supra τὰ ras. est. 2. Ante δυνάμει add. *τοντέστιν αἱ εὐθεΐαι, αὗτ' ὧν ἀνεγράφθησαν* BFVb. τὰ] αἱ BFVb. 3. σύμμετροι BFVb. τὰ] αἱ BFVb. 4. Supra *ἔχοιεν* m. 2: τὰ τετράγωνα V. 6. καὶ] om. P. 7. Post *δυνάμει* add. *ἀσύμμετροι* V. *ἐπειδὴ περ]* *ἐπειδὴ γάρ* P. 10. τῶ] om. FV. 11. ἀλλὰ καὶ V. 12. *σύμμετροι καὶ ἀσύμμετροι* P. 14. μήκει] -η- e corr. P. 15. εἰσι] om. P, εἰσιν B, comp. b. 16. ὑπόκειται b. Post καὶ del. δυνάμει F. 19. λῆμμα] om. P. 20. δὴ ἐν F. ὅτι] supra scr. m. 1 b. 21. λόγον πρὸς ἀλλήλους ἔχουσιν F. ἔχουσι P, corr. m. rec. 23. δύο] supra scr. m. 1 F. 25. Supra *ἐπίπεδοι* scr. οἱ ἀριθμοὶ m. 1 b. μή] supra scr. m. 1 V. 29. ὑπόκειται P.

οἱ ἄρα μὴ ὅμοιοι ἐπίπεδοι πρὸς ἀλλήλους λόγον οὐκ ἔχουσιν, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν.

Ι'.

5 Τῇ προτεθείσῃ εὐθείᾳ προσευρεῖν δύο εὐθείας ἀσυμμέτρους, τὴν μὲν μήκει μόνον, τὴν δὲ καὶ δυνάμει.

Ἐστω ἡ προτεθείσα εὐθεῖα ἡ *A*. δεῖ δὲ τῇ *A* προσευρεῖν δύο εὐθείας ἀσυμμέτρους, τὴν μὲν μήκει μόνον, τὴν δὲ καὶ δυνάμει.

Ἐκκείσθωσαν γὰρ δύο ἀριθμοὶ οἱ *B*, *Γ* πρὸς ἀλλήλους λόγον μὴ ἔχοντες, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, τουτέστι μὴ ὅμοιοι ἐπίπεδοι, καὶ γεγονέτω ὡς ὁ *B* πρὸς τὸν *Γ*, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς *A* 15 τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *Δ* τετράγωνον· ἐμάθουμεν γάρ· σύμμετρον ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς *A* τῷ ἀπὸ τῆς *Δ*. καὶ ἐπεὶ ὁ *B* πρὸς τὸν *Γ* λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, οὐδ' ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς *A* πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *Δ* λόγον ἔχει, ὃν τε- 20 τράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ *A* τῇ *Δ* μήκει. εἰλήφθω τῶν *A*, *Δ* μέση ἀνάλογον ἡ *E*. ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ *A* πρὸς τὴν *Δ*, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς *A* τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *E*. ἀσύμμετρος δὲ ἐστὶν ἡ *A* τῇ *Δ* μήκει· ἀσύμ- 25 μετρον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς *A* τετράγωνον τῷ

1. ἄρα μὴ] in ras. m. 1 P. οὐκ] ins. m. 1 V. 3. Seq. demonstr. alt., u. app. 6. συμμέτρους *B*, corr. m. 2. 7. καί] ins. postea F. 8. δεῖ] δ- in ras. V. 10. τὴν] τῆς P, corr. m. rec.; τῇ V, sed corr. 13. τουτέστιν P. Post ἐπίπεδοι add. [F, cui signo in mg. nihil resp.; in b seq. οἱ γὰρ ὅμοιοι ἐπίπεδοι πρὸς ἀλλήλους λόγον ἔχουσιν, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς


similes inter se rationem non habent, quam numerus quadratus ad numerum quadratum.

X.

Data recta duas alias inuenire ei incommensurabiles, alteram longitudine tantum, alteram etiam potentia.

Data recta sit A . oportet igitur duas alias rectas inuenire rectae A incommensurabiles, alteram longitudine tantum, alteram etiam potentia.

Sumantur enim duo numeri B, Γ , qui inter se rationem non habeant, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, h. e. plani non similes [u. lemma], et fiat $B : \Gamma = A^2 : \Delta^2$ (hoc enim didicimus [prop. VI coroll.]). itaque A^2 et Δ^2 commen-



surabilia sunt [prop. VI]. et quoniam $B : \Gamma$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, ne $A^2 : \Delta^2$ quidem rationem habet, quam numerus quadratus ad

numerum quadratum. itaque A et Δ longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. sumatur rectarum A, Δ media proportionalis E . itaque $A : \Delta = A^2 : E^2$ [V def. 9]. sed A et Δ longitudine incommensurabiles

πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν; in V seq. διὰ τοῦτο, punctis del. m. 2. 16. τῆς] τοῦ P. τῆς] τοῦ P. Δ] corr. ex B m. 1 V, B b. 19. Δ] corr. ex Δ m. 1 F. πρὸς] supra m. 1 V. τὸ] corr. ex τῶ V. Δ] B b. 21. ἐστίν] postea ins. F. 24. E τετράγωνον V. 25. ἐστίν P.

ἀπὸ τῆς *E* τετραγώνῳ· ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ *A* τῇ *E* δυνάμει.

Τῇ ἄρα προτεθείσῃ εὐθείᾳ τῇ *A* προσεύρηνται δύο εὐθεῖαι ἀσύμμετροι αἱ *Δ*, *E*, μήκει μὲν μόνον ἡ *Δ*,
 5 δυνάμει δὲ καὶ μήκει δηλαδὴ ἡ *E* [ὅπερ ἔδει δεῖξαι].

ια'.

Ἐὰν τέσσαρα μεγέθη ἀνάλογον ᾗ, τὸ δὲ
 πρῶτον τῷ δευτέρῳ σύμμετρον ᾗ, καὶ τὸ τρί-
 τον τῷ τετάρτῳ σύμμετρον ἔσται· καὶ τὸ πρῶτον
 10 τῷ δευτέρῳ ἀσύμμετρον ᾗ, καὶ τὸ τρίτον τῷ
 τετάρτῳ ἀσύμμετρον ἔσται.

Ἔστωσαν τέσσαρα μεγέθη ἀνάλογον τὰ *A*, *B*, *Γ*, *Δ*,
 ὡς τὸ *A* πρὸς τὸ *B*, οὕτως τὸ *Γ* πρὸς τὸ *Δ*, τὸ *A* δὲ
 τῷ *B* σύμμετρον ἔστω· λέγω, ὅτι καὶ τὸ *Γ* τῷ *Δ* σύμ-
 15 μετρον ἔσται.

Ἐπεὶ γὰρ σύμμετρόν ἐστι τὸ *A* τῷ *B*, τὸ *A* ἄρα
 πρὸς τὸ *B* λόγον ἔχει, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν. καὶ
 ἐστὶν ὡς τὸ *A* πρὸς τὸ *B*, οὕτως τὸ *Γ* πρὸς τὸ *Δ*.
 καὶ τὸ *Γ* ἄρα πρὸς τὸ *Δ* λόγον ἔχει, ὃν ἀριθμὸς πρὸς
 20 ἀριθμόν· σύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ *Γ* τῷ *Δ*.

Ἀλλὰ δὴ τὸ *A* τῷ *B* ἀσύμμετρον ἔστω· λέγω, ὅτι
 καὶ τὸ *Γ* τῷ *Δ* ἀσύμμετρον ἔσται. ἐπεὶ γὰρ ἀσύμ-
 μετρόν ἐστι τὸ *A* τῷ *B*, τὸ *A* ἄρα πρὸς τὸ *B* λόγον
 οὐκ ἔχει, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν. καὶ ἐστὶν ὡς

3. προστεθείσῃ Pb. προσεύρηνται B F b. 4. ᾗ] corr.
 ex τῇ B. Post *Δ* add. καὶ B et F, sed del. 5. ὅπερ ἔδει
 δεῖξαι] om. P B F b. Seq. scholium in P B F b, u. app. 6. ια']
 corr. ex ι' m. rec. P, ex ιγ' V. 8. πρῶτον] ᾱ P, et sic saepius.
 τσ'] ins. postea F. τρίτον] γ̄ P et b (et sic saepius).
 15. ἐστὶν B V b. 16. ἐστὶν P. τὸ *Δ*] (alt.) postea ins. F. 17.
 B] corr. ex *A* m. 1 F. 18. τὸ *Δ*] corr. ex ὁ *A* V. 20. *Γ*]
 in ras. V. 21. ὅτι ἀσύμμετρόν ἐστι καὶ τὸ *Γ* τῷ *Δ* V. 22.

sunt. itaque etiam A^2 et E^2 incommensurabilia sunt.¹⁾
quare A et E potentia incommensurabiles sunt.²⁾

Ergo data recta A duae aliae inuentae sunt Δ , E
ei incommensurabiles, Δ longitudine tantum, E autem
potentia et longitudine; quod erat demonstrandum.

XI.

Si quattuor magnitudines proportionales sunt, et
prima secundaque commensurabiles sunt, etiam tertia
quartaque commensurabiles erunt. et si prima secunda-
que incommensurabiles sunt, etiam tertia quartaque
incommensurabiles sunt.

Quattuor magnitudi-
nes proportionales sint
 A ————— B —————
 Γ ————— Δ ————— A, B, Γ, Δ , ita ut sit
 $A:B = \Gamma:\Delta$, et A, B commensurabiles sint. dico,
etiam Γ, Δ commensurabiles esse.

Nam quoniam A, B commensurabiles sunt, $A:B$
rationem habet, quam numerus ad numerum [prop. V].
et $A:B = \Gamma:\Delta$. quare etiam $\Gamma:\Delta$ rationem habet,
quam numerus ad numerum. ergo Γ, Δ commensura-
biles sunt [prop. VI].

Iam uero A et B incommensurabiles sint. dico,
etiam Γ, Δ incommensurabiles fore. nam quoniam A, B
incommensurabiles sunt, $A:B$ rationem non habet,

1) Hoc ex prop. XI concludendum erat (quare Gregorius
propp. X et XI permutauit). omnino tota prop. X cum lem-
mate multis de causis suspecta est, et uix crediderim, eam a
manu Euclidis profectam esse.

2) Quare etiam longitudine (prop. IX coroll.).

ἐσται] ἐστίν BFb.
supra scr. m. 1 F.

23. A] (alt.) supra scr. m. 1 V.
24. $\sigma\upsilon\kappa$] m. rec. b.

ἀρεα]

τὸ A πρὸς τὸ B , οὕτως τὸ Γ πρὸς τὸ Δ . οὐδὲ τὸ Γ ἄρα πρὸς τὸ Δ λόγον ἔχει, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμὸν· ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ Γ τῷ Δ .

Ἐὰν ἄρα τέσσαρα μεγέθη, καὶ τὰ ἐξῆς.

5

ιβ'.

Τὰ τῷ αὐτῷ μεγέθει σύμμετρα καὶ ἀλλήλοις ἐστὶ σύμμετρα.

Ἐκάτερον γὰρ τῶν A, B τῷ Γ ἔστω σύμμετρον. λέγω, ὅτι καὶ τὸ A τῷ B ἐστὶ σύμμετρον.

10 Ἐπεὶ γὰρ σύμμετρόν ἐστι τὸ A τῷ Γ , τὸ A ἄρα πρὸς τὸ Γ λόγον ἔχει, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμὸν. ἐχέτω, ὃν ὁ Δ πρὸς τὸν E . πάλιν, ἐπεὶ σύμμετρόν ἐστι τὸ Γ τῷ B , τὸ Γ ἄρα πρὸς τὸ B λόγον ἔχει, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμὸν. ἐχέτω, ὃν ὁ Z πρὸς τὸν H .

15 καὶ λόγων δοθέντων ὁποσωνοῦν τοῦ τε, ὃν ἔχει ὁ Δ πρὸς τὸν E , καὶ ὁ Z πρὸς τὸν H εἰλήφθωσαν ἀριθμοὶ ἐξῆς ἐν τοῖς δοθεῖσι λόγοις οἱ Θ, K, Λ . ὥστε εἶναι ὥς μὲν τὸν Δ πρὸς τὸν E , οὕτως τὸν Θ πρὸς τὸν K , ὥς δὲ τὸν Z πρὸς τὸν H , οὕτως τὸν K πρὸς τὸν Λ .

20 Ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὥς τὸ A πρὸς τὸ Γ , οὕτως ὁ Δ πρὸς τὸν E , ἀλλ' ὥς ὁ Δ πρὸς τὸν E , οὕτως ὁ Θ πρὸς τὸν K , ἔστιν ἄρα καὶ ὥς τὸ A πρὸς τὸ Γ , οὕτως ὁ Θ πρὸς τὸν K . πάλιν, ἐπεὶ ἐστὶν ὥς τὸ Γ πρὸς τὸ B , οὕτως ὁ Z πρὸς τὸν H , ἀλλ' ὥς ὁ Z πρὸς τὸν H ,
25 [οὕτως] ὁ K πρὸς τὸν Λ , καὶ ὥς ἄρα τὸ Γ πρὸς τὸ B , οὕτως ὁ K πρὸς τὸν Λ . ἔστι δὲ καὶ ὥς τὸ A πρὸς

1. οὐδέ] om. V. 2. ἄρα] om. V. λόγον] ἄρα λόγον οὐκ V. 4. τέσσαρα] τὰ δ F. Ante καὶ add. ἀνάλογον ἢ BFb; ἀνάλογον ἢ, τὸ δὲ πρῶτον τῷ δευτέρῳ σύμμετρον ἢ V. Post ἐξῆς add. ὅπερ ἔδει δεῖξαι V. 5. ιβ'] corr. ex ια' m. rec. P. 6. μεγέθη b. 15. ὁπόσων? V (comp.). 17. ἐξῆς]

quam numerus ad numerum [prop. VII]. et $A:B=\Gamma:\Delta$.
quare ne $\Gamma:\Delta$ quidem rationem habet, quam nume-
rus ad numerum. itaque Γ, Δ incommensurabiles sunt
[prop. VIII].

Ergo si quattuor magnitudines, et quae sequuntur.

XII.

Quae eidem magnitudini commensurabilia sunt,
etiam inter se commensurabilia sunt.

Utraque enim A, B magnitudini Γ sit commen-
surabilis. dico, etiam A, B commensurabiles esse.

nam quoniam A, Γ commensurabiles sunt, $A:\Gamma$
rationem habet, quam numerus ad numerum [prop. V].

A ————	Γ ————	B ————	sit $A:\Gamma = \Delta:E$.
—————	Δ		rursus quoniam Γ, B
—————	E	—————	Θ
—————	Z	—————	K
—————	H	—————	A

commensurabiles sunt,
 $\Gamma:B$ rationem habet,
quam numerus ad nu-
merum [prop. V]. sit

$\Gamma:B = Z:H$. et datis quotlibet rationibus, $\Delta:E$ et
 $Z:H$, numeri sumantur deinceps in rationibus datis,
 Θ, K, A [cfr. VIII, 4], ita ut sit $\Delta:E = \Theta:K$, $Z:H$
 $= K:A$.

iam quoniam est $A:\Gamma = \Delta:E$ et $\Delta:E = \Theta:K$,
erit etiam $A:\Gamma = \Theta:K$ [V, 11]. rursus quoniam est
 $\Gamma:B = Z:H$ et $Z:H = K:A$, erit etiam $\Gamma:B = K:A$.

in ras. V; ἐλάχιστοι ἐξῆς F, sed corr. δοθεῖσιν P. 18. τὸν Δ
τόν postea ins. F, ὁ Δ P. 20. τό] (alt.) corr. ex τόν V. 22.
ὁ A P. τὸν Γ P. 23. ὁ Γ P. τό] τόν P. B] corr.
ex Γ m. 1 b. 25. οὕτως] om. P. καὶ ὥς — 26. A] bis F,
sed corr. 25. ὁ Γ P. 26. ἔστιν P. τό] ὁ F.

τὸ Γ, οὕτως ὁ Θ πρὸς τὸν Κ· δι' ἴσου ἄρα ἐστὶν ὡς
τὸ Α πρὸς τὸ Β, οὕτως ὁ Θ πρὸς τὸν Α. τὸ Α ἄρα
πρὸς τὸ Β λόγον ἔχει, ὃν ἀριθμὸς ὁ Θ πρὸς ἀριθμὸν
τὸν Α· σύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ Α τῷ Β.

8 Τὰ ἄρα τῷ αὐτῷ μεγέθει σύμμετρα καὶ ἀλλήλοις
ἐστὶ σύμμετρα· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

ιγ'.

Ἐὰν ἡ δύο μεγέθη σύμμετρα, τὸ δὲ ἕτερον
αὐτῶν μεγέθει τινὶ ἀσύμμετρον ἦ, καὶ τὸ λοιπὸν
10 τῷ αὐτῷ ἀσύμμετρον ἐστὶ.

Ἔστω δύο μεγέθη σύμμετρα τὰ Α, Β, τὸ δὲ ἕτερον
αὐτῶν τὸ Α ἄλλῳ τινὶ τῷ Γ ἀσύμμετρον ἐστω· λέγω,
ὅτι καὶ τὸ λοιπὸν τὸ Β τῷ Γ ἀσύμμετρόν ἐστιν.

Εἰ γάρ ἐστι σύμμετρον τὸ Β τῷ Γ, ἀλλὰ καὶ τὸ Α
15 τῷ Β σύμμετρόν ἐστιν, καὶ τὸ Α ἄρα τῷ Γ σύμμετρόν
ἐστὶν. ἀλλὰ καὶ ἀσύμμετρον· ὅπερ ἀδύνατον. οὐκ
ἄρα σύμμετρόν ἐστι τὸ Β τῷ Γ· ἀσύμμετρον ἄρα.

Ἐὰν ἄρα ἡ δύο μεγέθη σύμμετρα, καὶ τὰ ἐξῆς.

Δῆμα.

20 Δύο δοθεῖσῶν εὐθειῶν ἀνίσων εὐρεῖν, τίνι μείζων
δύναται ἢ μείζων τῆς ἐλάσσονος.

Ἔστωσαν αὖ δοθεῖσαι δύο ἄνισοι εὐθεῖαι αὖ ΑΒ, Γ,

2. ὁ Α πρὸς τὸν Β b. 4. ἐστὶν P. 6. σύμμετρα] συμ-
supra scr. m. 1 P. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. Bb. Seq.
lemma, u. app. 7. ιγ'] ιβ' corr. in ιγ' m. rec. P, γ in ras. F;
ιδ', δ in ras. m. 1 B, ιγ' mg. 8. ἡ] om. V. μεγέθη] -γέ-
supra m. 1 P. ἀσύμμετρα F, sed corr.; σύμμετρα ἡ V. δ' F.
11. δύο] mg. γρ. αὐτῷ m. 1. b. 12. ἄλλῳ] ἐτέρῳ BFV.
13. τὸ Β] om. b. τῷ Γ] eras. b. ἐστὶ τὸ Β τῷ Γ b. 14.
εἰ — Γ] supra scr. m. rec. b. Γ τῷ Β P. 15. ἐστὶ B,
comp. Fb, om. V. καὶ — σύμμε-] supra scr. m. 1 F.
-τρον — 16. καὶ] in ras. F. 16. ὅπερ ἐστὶν F. 17. ἄρα] (alt.)

uerum etiam $A : \Gamma = \Theta : K$. ex aequo igitur $A : B = \Theta : A$ [V, 22]. itaque $A : B$ rationem habet, quam numerus Θ ad numerum A . itaque A, B commensurabiles sunt [prop. VI].

Ergo quae eidem magnitudini commensurabilia sunt, etiam inter se commensurabilia sunt; quod erat demonstrandum.

XIII.

Si duae magnitudines commensurabiles sunt, et alterutra earum magnitudini alicui incommensurabilis est, etiam reliqua eidem incommensurabilis erit.

A ————— | Sint duae magnitudines commensurabiles A, B , et A alii magnitudi Γ incommensurabilis sit. dico, etiam B, Γ incommensurabiles esse.

nam si B, Γ commensurabiles sunt et etiam A, B commensurabiles, etiam A, Γ commensurabiles erunt [prop. XII]. at eaedem incommensurabiles sunt; quod fieri non potest. itaque B, Γ commensurabiles non sunt. incommensurabiles igitur.

Ergo si duae magnitudines commensurabiles sunt, et quae sequuntur.

Lemma.

Datis duabus rectis inaequalibus inuenire, quantum maior quadrata minorem excedat.

Sint datae duae rectae inaequales AB, Γ , quarum

postea ins. B. 18. η] om. P. $\alpha\sigma\upsilon\mu\epsilon\tau\alpha$ F, sed corr. $\kappa\alpha\iota \tau\alpha \xi\eta\varsigma$] $\tau\omicron \delta\epsilon \xi\tau\epsilon\rho\omicron\nu \alpha\upsilon\tau\omega\nu \mu\epsilon\gamma\acute{\epsilon}\theta\epsilon\iota \tau\iota\nu\iota \alpha\sigma\upsilon\mu\epsilon\tau\rho\omicron\nu \eta$, $\kappa\alpha\iota \tau\omicron \lambda\omicron\iota\pi\omicron\nu \tau\omicron \alpha\upsilon\tau\omicron \alpha\sigma\upsilon\mu\epsilon\tau\rho\omicron\nu \acute{\epsilon}\sigma\tau\alpha\iota$ $\acute{\omicron}\pi\epsilon\rho \acute{\epsilon}\delta\epsilon\iota \delta\epsilon\iota\chi\alpha\iota$ V. 19. $\iota\epsilon'$ B. 20. $\acute{\alpha}\nu\iota\sigma\alpha\nu \epsilon\upsilon\theta\epsilon\iota\omega\nu$ F. 21. $\acute{\epsilon}\lambda\acute{\alpha}\tau\tau\omicron\nu\omicron\varsigma$ F.

ὡν μελῶν ἔστω ἡ AB . δεῖ δὴ εὐρεῖν, τίνι μεῖζον δύναται ἡ AB τῆς Γ .

Γεγραφθῶ ἐπὶ τῆς AB ἡμικύκλιον τὸ $A\Delta B$, καὶ εἰς αὐτὸ ἐνηρμόσθω τῇ Γ ἴση ἡ $A\Delta$, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ ΔB . φανερόν δὴ, ὅτι ὀρθὴ ἔστιν ἡ ὑπὸ $A\Delta B$ γωνία, καὶ ὅτι ἡ AB τῆς $A\Delta$, τουτέστι τῆς Γ , μεῖζον δύναται τῇ ΔB .

Ὅμοίως δὲ καὶ δύο δοθεῖσῶν εὐθειῶν ἡ δυναμένη αὐτὰς εὐρίσκεται οὕτως.

- 10 Ἐστῶσαν αἱ δοθεῖσαι δύο εὐθεῖαι αἱ $A\Delta$, ΔB , καὶ δέον ἔστω εὐρεῖν τὴν δυναμένην αὐτάς. κείσθωσαν γάρ, ὥστε ὀρθὴν γωνίαν περιέχειν τὴν ὑπὸ $A\Delta$, ΔB , καὶ ἐπεξεύχθω ἡ AB . φανερόν πάλιν, ὅτι ἡ τὰς $A\Delta$, ΔB δυναμένη ἔστιν ἡ AB . ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

15


ιδ'.

- Ἐὰν τέσσαρες εὐθεῖαι ἀνάλογον ᾤσιν, δύνηται δὲ ἡ πρώτη τῆς δευτέρας μεῖζον τῷ ἀπὸ συμμετρου ἑαυτῇ [μήκει], καὶ ἡ τρίτη τῆς τετάρτης μεῖζον δυνήσεται τῷ ἀπὸ συμμετρου ἑαυτῇ [μήκει]. καὶ ἐὰν ἡ πρώτη τῆς δευτέρας μεῖζον δύνηται τῷ ἀπὸ ἀσυμμετρου ἑαυτῇ [μήκει], καὶ ἡ τρίτη τῆς τετάρτης μεῖζον δυνήσεται τῷ ἀπὸ ἀσυμμετρου ἑαυτῇ [μήκει].

- Ἐστῶσαν τέσσαρες εὐθεῖαι ἀνάλογον αἱ A , B , Γ , Δ ,
25 ὥς ἡ A πρὸς τὴν B , οὕτως ἡ Γ πρὸς τὴν Δ , καὶ ἡ

1. ἔστω] corr. ex ἔστιν m. 2 B. 3. $AB\Delta$ P. 4. αὐτῶν corr. F. ἡ $A\Delta$ ἴση F. 6. μεῖζον] corr. ex μεῖζων m. 1 F. 10. αἱ δοθεῖσαι] om. V. αἱ] αἱ δοθεῖσαι αἱ V. 11. τῇ] ins. postea V. ἐκείσθωσαν BFVb. 13. Ante πάλιν ins. ἔστι m. 1 F. ὅτι πάλιν b. ὅτι ἡ] ἡ in ras. F. 14. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. Theon (BFVb). 15. ιδ'] δ in ras. F, corr. ex

maior sit AB . oportet igitur inuenire, quantum AB^2 excedat Γ^2 .



describatur in AB semicirculus ADB , et in eum aptetur rectae Γ aequalis AD [IV, 1], et ducatur DB . manifestum igitur, $\angle ADB$ rectum esse [III, 31], et $AB^2 = AD^2 + DB^2 = \Gamma^2 + DB^2$ [I, 47].

Similiter etiam datis duabus rectis recta quadrata iis aequalis hoc modo inuenitur.

sint datae duae rectae AD , DB , et oporteat rectam quadratam iis aequalem inuenire. ponantur enim ita, ut angulum rectum comprehendant ADB , et ducatur AB . rursus manifestum est, esse $AB^2 = AD^2 + DB^2$ [I, 47]; quod erat demonstrandum.

XIV.

Si quattuor rectae proportionales sunt, et prima quadrata secundam excedit quadrato rectae sibi commensurabilis, etiam tertia quadrata quartam excedet quadrato rectae sibi commensurabilis. et si prima quadrata secundam excedit quadrato rectae sibi incommensurabilis, etiam tertia quadrata quartam excedet quadrato rectae sibi incommensurabilis.

Sint quattuor rectae proportionales A, B, Γ, Δ , ita ut sit $A : B = \Gamma : \Delta$, et sit $A^2 = B^2 + E^2$, $\Gamma^2 = \Delta^2 + Z^2$

γ' m. rec. P, $\iota\epsilon'$ B (mg. $\iota\delta'$). 16. $\acute{\omega}\sigma\iota$ Vb. 17. $\tau\tilde{\omega}$] e corr. V.
 18. $\mu\eta\kappa\epsilon\iota$] om. P. 19. $\acute{\alpha}\pi\delta\ \tau\tilde{\eta}\varsigma$ b. 20. $\mu\eta\kappa\epsilon\iota$] om. P. 21.
 $\delta\upsilon\nu\eta\sigma\eta\tau\alpha\iota$ FV, sed corr. $\sigma\upsilon\mu\mu\acute{\epsilon}\tau\rho\omicron\nu$ F, et B, corr. m. 2. $\acute{\epsilon}\alpha\nu\tau\tilde{\omega}$ b.
 $\mu\eta\kappa\epsilon\iota$] om. P. 22. $\delta\upsilon\nu\eta\sigma\eta\tau\alpha\iota$ F. 23. $\sigma\upsilon\mu\mu\acute{\epsilon}\tau\rho\omicron\nu$ PF, et B,
 corr. m. 2. $\acute{\epsilon}\alpha\nu\tau\tilde{\omega}$ b. $\mu\eta\kappa\epsilon\iota$] om. P. 24. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\omega\sigma\alpha\nu$ $\delta\eta$ V.
 25. A] e corr. V.

A μὲν τῆς *B* μείζον δυνάσθω τῷ ἀπὸ τῆς *E*, ἡ δὲ *Γ* τῆς *Δ* μείζον δυνάσθω τῷ ἀπὸ τῆς *Z*. λέγω, ὅτι, εἴτε σύμμετρός ἐστιν ἡ *A* τῇ *E*, σύμμετρός ἐστι καὶ ἡ *Γ* τῇ *Z*, εἴτε ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ *A* τῇ *E*, ἀσύμμετρός
 5 ἐστι καὶ ὁ *Γ* τῇ *Z*.

Ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὡς ἡ *A* πρὸς τὴν *B*, οὕτως ἡ *Γ* πρὸς τὴν *Δ*, ἔστιν ἄρα καὶ ὡς τὸ ἀπὸ τῆς *A* πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *B*, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς *Γ* πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *Δ*. ἀλλὰ τῷ μὲν ἀπο τῆς *A* ἴσα ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν *E*, *B*,
 10 τῷ δὲ ἀπὸ τῆς *Γ* ἴσα ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν *Δ*, *Z*. ἔστιν ἄρα ὡς τὰ ἀπὸ τῶν *E*, *B* πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *B*, οὕτως τὰ ἀπὸ τῶν *Δ*, *Z* πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *Δ*. διελόντι ἄρα ἐστὶν ὡς τὸ ἀπὸ τῆς *E* πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *B*, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς *Z* πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *Δ*. ἔστιν ἄρα καὶ ὡς ἡ *E*
 15 πρὸς τὴν *B*, οὕτως ἡ *Z* πρὸς τὴν *Δ*. ἀνάπαλιν ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ *B* πρὸς τὴν *E*, οὕτως ἡ *Δ* πρὸς τὴν *Z*. ἔστι δὲ καὶ ὡς ἡ *A* πρὸς τὴν *B*, οὕτως ἡ *Γ* πρὸς τὴν *Δ*. δι' ἴσου ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ *A* πρὸς τὴν *E*, οὕτως ἡ *Γ* πρὸς τὴν *Z*. εἴτε οὖν σύμμετρός ἐστιν ἡ *A* τῇ *E*,
 20 σύμμετρός ἐστι καὶ ἡ *Γ* τῇ *Z*, εἴτε ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ *A* τῇ *E*, ἀσύμμετρός ἐστι καὶ ἡ *Γ* τῇ *Z*.

Ἐὰν ἄρα, καὶ τὰ ἐξῆς.

ιε'.


Ἐὰν δύο μεγέθη σύμμετρα συντεθῇ, καὶ τὸ
 25 ὅλον ἐκατέρῳ αὐτῶν σύμμετρον ἔσται· καὶ τὸ ὅλον ἐνὶ αὐτῶν σύμμετρον ἦ, καὶ τὰ ἐξ ἀρχῆς μεγέθη σύμμετρα ἔσται.

Συγκείσθω γὰρ δύο μεγέθη σύμμετρα τὰ *AB*, *BΓ*.

1. τῆς *B*] corr. ex τῇ *B* m. 1 b. *Γ* δέ *BF* b. 3. ἐστιν]
 om. *V*. τῇ] corr. ex τῆς m. 1 *P*. ἐστιν *B*. 4. *Z*] e corr.

[u. lemma]. dico, siue A, E commensurabiles sint, etiam Γ, Z commensurabiles esse, siue A, E incommensurabiles sint, etiam Γ, Z incommensurabiles esse.

nam quoniam est $A:B = \Gamma:\Delta$, erit etiam $A^2:B^2 = \Gamma^2:\Delta^2$ [VI, 22]. uerum $A^2 = E^2 + B^2$, $\Gamma^2 = \Delta^2 + Z^2$.



itaque $E^2 + B^2:B^2 = \Delta^2 + Z^2:\Delta^2$.

subtrahendo igitur [V, 17] $E^2:B^2 = Z^2:\Delta^2$.

quare etiam [VI, 22] $E:B = Z:\Delta$.

itaque e contrario [V, 7

coroll.] $B:E = \Delta:Z$. uerum etiam

$A:B = \Gamma:\Delta$. ex aequo igitur [V, 22]

$A:E = \Gamma:Z$. itaque siue A, E com-

mensurabiles sunt, etiam Γ, Z commensurabiles sunt, siue A, E incommensurabiles sunt, etiam Γ, Z incommensurabiles sunt [prop. XI].

Ergo si, et quae sequuntur.

XV.

Si duae magnitudines commensurabiles componuntur, etiam totum utrique earum commensurabile erit; et si totum alterutri earum commensurabile est, etiam magnitudines ab initio positae commensurabiles erunt.

Componantur enim duae magnitudines commensura-

m. 1 b. 5. $\xi\sigma\tau\iota\nu$ PB. 7. $\kappa\alpha\iota$] om. V. 9. $\tau\omega$] corr. ex $\tau\omicron$ m. rec. P. Δ] in ras. m. 1 P. $\xi\sigma\tau\iota\nu$ P. 10. $\xi\sigma\tau\iota\nu$ P. Z, Δ P. 11. E, B] Δ, Z B. $\tau\acute{\alpha}$ F. B] Δ B. 12. Δ, Z] E, B B. $\tau\acute{\alpha}$ F. Δ] B in ras. m. 2 B. 13. $\acute{\alpha}\pi\omicron$] (alt.) ins. m. 2 F. 14. $\xi\sigma\tau\iota\nu$ — 15. Δ] mg. m. 1 P. 14. η] supra scr. m. 2 F. 17. $\xi\sigma\tau\iota\nu$ P. 19. $\epsilon\lambda\tau$] P. 20. $\xi\sigma\tau\iota$] $\xi\sigma\tau\iota\nu$ P. Post $\epsilon\lambda\tau$ del. $\sigma\upsilon\nu$ b. $\xi\sigma\tau\iota\nu$] om. V. 21. $\sigma\upsilon\nu\mu\epsilon\tau\rho\omicron\varsigma$ b. $\xi\sigma\tau\iota\nu$ B. 22. $\acute{\alpha}\rho\alpha$] om. V. Ante $\kappa\alpha\iota$ add. $\tau\acute{\epsilon}\sigma\sigma\alpha\rho\epsilon\varsigma \epsilon\delta\theta\epsilon\iota\alpha\iota \acute{\alpha}\nu\acute{\alpha}\lambda\omicron\gamma\omicron\nu \acute{\omega}\sigma\iota\nu$ ($\acute{\omega}\sigma\iota$ V) FV. 23. $\iota\epsilon$] e corr. PF; $\iota\zeta$ B, mg. $\iota\epsilon$. 28. $\sigma\upsilon\nu\kappa\epsilon\iota\sigma\theta\omega\sigma\alpha\nu$ BFb. $B\Gamma$] e corr. F.

λέγω, ὅτι καὶ ὅλον τὸ $ΑΓ$ ἐκατέρω τῶν $ΑΒ, ΒΓ$ ἐστὶ σύμμετρον.

Ἐπεὶ γὰρ σύμμετρά ἐστὶ τὰ $ΑΒ, ΒΓ$, μετρήσει τι αὐτὰ μέγεθος. μετρεῖτω, καὶ ἔστω τὸ $Δ$. ἐπεὶ οὖν
 5 τὸ $Δ$ τὰ $ΑΒ, ΒΓ$ μετρεῖ, καὶ ὅλον τὸ $ΑΓ$ μετρήσει. μετρεῖ δὲ καὶ τὰ $ΑΒ, ΒΓ$. τὸ $Δ$ ἄρα τὰ $ΑΒ, ΒΓ, ΑΓ$ μετρεῖ· σύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ $ΑΓ$ ἐκατέρω τῶν $ΑΒ, ΒΓ$.

Ἀλλὰ δὴ τὸ $ΑΓ$ ἔστω σύμμετρον τῷ $ΑΒ$ · λέγω δὴ, ὅτι καὶ τὰ $ΑΒ, ΒΓ$ σύμμετρά ἐστίν.

10 Ἐπεὶ γὰρ σύμμετρά ἐστὶ τὰ $ΑΓ, ΑΒ$, μετρήσει τι αὐτὰ μέγεθος. μετρεῖτω, καὶ ἔστω τὸ $Δ$. ἐπεὶ οὖν τὸ $Δ$ τὰ $ΓΑ, ΑΒ$ μετρεῖ, καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ $ΒΓ$ μετρήσει. μετρεῖ δὲ καὶ τὸ $ΑΒ$ · τὸ $Δ$ ἄρα τὰ $ΑΒ, ΒΓ$ μετρήσει· σύμμετρα ἄρα ἐστὶ τὰ $ΑΒ, ΒΓ$.

15 Ἐὰν ἄρα δύο μεγέθη, καὶ τὰ ἐξῆς.

ις'.


Ἐὰν δύο μεγέθη ἀσύμμετρα συντεθῇ, καὶ τὸ ὅλον ἐκατέρω αὐτῶν ἀσύμμετρον ἔσται· καὶ τὸ ὅλον ἐνὶ αὐτῶν ἀσύμμετρον ἦ, καὶ τὰ ἐξ
 20 ἀρχῆς μεγέθη ἀσύμμετρα ἔσται.

Συγκλείσθω γὰρ δύο μεγέθη ἀσύμμετρα τὰ $ΑΒ, ΒΓ$ · λέγω, ὅτι καὶ ὅλον τὸ $ΑΓ$ ἐκατέρω τῶν $ΑΒ, ΒΓ$ ἀσύμμετρον ἐστίν.

1. καί] καὶ τό V. τῶν] τῶι P. ἔσται b. σύμμετρον ἐστὶ V. 3. ἐστίν P. 6. τὰ] (prius) corr. ex τῶν F. 7. ἐστίν P. 8. $ΑΓ$] $ΑΒ, ΒΓ$ P; $ΑΓ$ ἐνὶ τῶν $ΑΒ, ΒΓ$ Theon (BFVb). τῷ] τῇ P, ἔστω δὴ τῷ (corr. ex τό V) Theon (BFVb). 9. δὴ] supra scr. F. 10. ἐστίν P. $ΑΓ$] $ΓΑ$ P, $Γ$ e corr. b; mg. γρ. $ΑΒ ΒΓ$ m. 1 b. 12. $ΑΓ$ FV. 13. τὰ] τό? V. 14. ἐστίν LPB. 15. Post μεγέθη add. σύμμετρα συντεθῇ, καὶ τὸ ὅλον ἐκατέρω αὐτῶν σύμμετρον ἔσται V. Post ἐξῆς add. ὅπερ εἶδει δεῖξαι V. 16. ις'] corr. ex ιδ' m. rec. P, mut. in ις' m.

biles $AB, B\Gamma$. dico, etiam totum $A\Gamma$ utrique $AB, B\Gamma$ commensurabile esse.

nam quoniam $AB, B\Gamma$ commensurabiles sunt, magnitudo aliqua eas metietur. metiatur et sit Δ . iam



quoniam Δ magnitudines $AB, B\Gamma$ metitur, etiam totum $A\Gamma$ metietur. uerum

etiam $AB, B\Gamma$ metitur. Δ igitur $AB, B\Gamma, A\Gamma$ metitur. ergo $A\Gamma$ utrique $AB, B\Gamma$ commensurabilis est [def. 1].

Iam uero $A\Gamma, AB$ commensurabiles sint. dico, etiam $AB, B\Gamma$ commensurabiles esse.

nam quoniam $A\Gamma, AB$ commensurabiles sunt, magnitudo aliqua eas metietur. metiatur et sit Δ . iam quoniam Δ magnitudines $\Gamma A, AB$ metitur, etiam reliquam $B\Gamma$ metietur. uerum etiam AB metitur. Δ igitur $AB, B\Gamma$ metietur. itaque $AB, B\Gamma$ commensurabiles erunt.

Ergo si duae magnitudines, et quae sequuntur.

XVI.

Si duae magnitudines incommensurabiles componuntur, etiam totum utrique earum incommensurabile est; et si totum alterutri earum incommensurabile est, etiam magnitudines ab initio positae incommensurabiles erunt.

Componantur enim duae magnitudines incommensurabiles $AB, B\Gamma$. dico, etiam totum $A\Gamma$ utrique $AB, B\Gamma$ incommensurabile esse.

2 F; $\iota\eta'$ B, mg. $\iota\epsilon'$. 19. $\sigma\acute{\upsilon}\mu\mu\epsilon\tau\epsilon\omicron\nu$ B, corr. m. 2; item lin. 20.
21. $\sigma\omicron\gamma\kappa\epsilon\iota\sigma\theta\acute{\omega}\sigma\alpha\nu$ V. $B\Gamma$] corr. ex ΓB F.

Εἰ γὰρ μὴ ἐστὶν ἀσύμμετρα τὰ ΓA , AB , μετρήσει
 τι [αὐτὰ] μέγεθος. μετρεῖτω, εἰ δυνατόν, καὶ ἔστω
 τὸ Δ . ἐπεὶ οὖν τὸ Δ τὰ ΓA , AB μετρεῖ, καὶ λοιπὸν
 ἄρα τὸ $B\Gamma$ μετρήσει. μετρεῖ δὲ καὶ τὸ AB · τὸ Δ
 ἄρα τὰ AB , $B\Gamma$ μετρεῖ. σύμμετρα ἄρα ἐστὶ τὰ AB , $B\Gamma$.
 ὑπέκλειντο δὲ καὶ ἀσύμμετρα· ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον.
 οὐκ ἄρα τὰ ΓA , AB μετρήσει τι μέγεθος· ἀσύμμετρα
 ἄρα ἐστὶ τὰ ΓA , AB . ὁμοίως δὲ δείξομεν, ὅτι καὶ
 τὰ $A\Gamma$, ΓB ἀσύμμετρά ἐστιν. τὸ $A\Gamma$ ἄρα ἐκατέρω
 10 τῶν AB , $B\Gamma$ ἀσύμμετρόν ἐστιν.

Ἀλλὰ δὴ τὸ $A\Gamma$ ἐνὶ τῶν AB , $B\Gamma$ ἀσύμμετρον ἔστω.
 ἔστω δὴ πρότερον τῷ AB · λέγω, ὅτι καὶ τὰ AB , $B\Gamma$
 ἀσύμμετρά ἐστιν. εἰ γὰρ ἔσται σύμμετρα, μετρήσει
 τι αὐτὰ μέγεθος. μετρεῖτω, καὶ ἔστω τὸ Δ . ἐπεὶ
 15 οὖν τὸ Δ τὰ AB , $B\Gamma$ μετρεῖ, καὶ ὅλον ἄρα τὸ $A\Gamma$
 μετρήσει. μετρεῖ δὲ καὶ τὸ AB · τὸ Δ ἄρα τὰ ΓA , AB
 μετρεῖ. σύμμετρα ἄρα ἐστὶ τὰ ΓA , AB · ὑπέκλειντο δὲ καὶ
 ἀσύμμετρα· ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ ἄρα τὰ AB , $B\Gamma$
 μετρήσει τι μέγεθος· ἀσύμμετρα ἄρα ἐστὶ τὰ AB , $B\Gamma$.
 20 Ἐὰν ἄρα δύο μεγέθη, καὶ τὰ ἐξῆς.

Λήμμα.

Ἐὰν παρὰ τινα εὐθείαν παραβληθῇ παραλληλό-
 γραμμον ἑλλείπον εἶδει τετραγώνῳ, τὸ παραβληθὲν

1. τὰ] τό P. 2. αὐτὰ] om. P. 4. AB] BA V. 5.
 ἐστὶν LP. 6. ὑπέκλεινται LBb. ἀδύνατόν ἐστιν V. 8.
 ἐστὶν LP. 9. Ante $A\Gamma$ del. Γ m. 1 P. σύμμετρα B, corr.
 m. 2. ἐστι V, comp. Fb. ΓA F. 10. ἐστὶν] om. B. 11.
 ἔστω] om. P. 12. ἔστω δὴ πρότερον] καὶ πρῶτον Theon (BFVb).
 τῷ] e corr. V. 13. ἐστὶ] ἐστι V. σύμμετρα] supra scr.
 α- m. 1 F. 17. ἐστὶ] ἐστὶν P, comp. F, ἔσται LBVb. ὑπέ-
 κλειντο F. 19. ἐστὶν LP. Post $B\Gamma$ add. ὁμοίως δὲ δείχ-
 νεται, ὅτι τὸ $A\Gamma$ καὶ λοιπῷ τῷ $B\Gamma$ ἀσύμμετρόν ἐστιν FVb.

nam si ΓA , AB incommensurabiles non sunt, magnitudo aliqua eas metietur. metiatur, si fieri potest, et sit Δ . iam quoniam Δ magnitudines ΓA , AB metitur, etiam reliquam $B\Gamma$ metietur. uerum etiam AB metitur. Δ igitur AB , $B\Gamma$ metitur. itaque AB , $B\Gamma$ commensurabiles sunt. supposuimus autem, easdem incommensurabiles esse; quod fieri non potest. itaque nulla magnitudo ΓA , AB metietur. ergo ΓA , AB incommensurabiles erunt. similiter demonstrabimus, etiam $A\Gamma$, ΓB incommensurabiles esse. ergo $A\Gamma$ utrique AB , $B\Gamma$ incommensurabilis est.

Iam uero $A\Gamma$ alterutri AB , $B\Gamma$ incommensurabilis sit. sit prius magnitudini AB incommensurabilis. dico, etiam AB , $B\Gamma$ incommensurabiles esse. nam si commensurabiles sunt, magnitudo aliqua eas metietur. metiatur et sit Δ . iam quoniam Δ magnitudines AB , $B\Gamma$ metitur, etiam totum $A\Gamma$ metietur. uerum etiam AB metitur. Δ igitur ΓA , AB metitur. itaque ΓA , AB commensurabiles sunt. supposuimus autem, easdem incommensurabiles esse; quod fieri non potest. itaque nulla magnitudo AB , $B\Gamma$ metietur. itaque AB , $B\Gamma$ incommensurabiles sunt.

Ergo si duae magnitudines, et quae sequuntur.

Lemma.

Si rectae alicui parallelogrammum adplicatur figura quadrata deficiens, adplicatum spatium rectangulo partium rectae adplicatione ortarum aequale est.

23. τετραγώνῳ] corr. ex παραλληλογράμμῳ m. rec. b. τὸ
τῷ F. τὸ παραβληθέν] om. b.

ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν ἐκ τῆς παραβολῆς γενομένων
 τμημάτων τῆς εὐθείας.

Παρά γὰρ εὐθείαν τὴν AB παραβεβλήσθω παρα-
 λληλόγραμμον τὸ AD ἑλλείπον εἶδει τετραγώνῳ τῷ $ΔB$.
 5 λέγω, ὅτι ἴσον ἐστὶ τὸ AD τῷ ὑπὸ τῶν $ΑΓ, ΓB$.

Καὶ ἐστὶν αὐτόθεν φανερόν· ἐπεὶ γὰρ τετράγωνόν
 ἐστὶ τὸ $ΔB$, ἴση ἐστὶν ἡ $ΔΓ$ τῇ $ΓB$, καὶ ἐστὶ τὸ AD
 τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΓ, ΓΔ$, τουτέστι τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΓ, ΓB$.
 Ἐὰν ἄρα παρά τινα εὐθείαν, καὶ τὰ ἐξῆς.


10

ιζ'.

Ἐὰν ὥσι δύο εὐθεῖαι ἄνισοι, τῷ δὲ τετάρτῳ
 μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος ἴσον παρὰ τὴν
 μείζονα παραβληθῇ ἑλλείπον εἶδει τετραγώνῳ
 καὶ εἰς σύμμετρα αὐτὴν διαιρῇ μήκει, ἡ μείζων
 15 τῆς ἐλάσσονος μείζον δυνήσεται τῷ ἀπὸ συμ-
 μέτρου ἑαυτῇ [μήκει]. καὶ εἰ ἡ μείζων τῆς
 ἐλάσσονος μείζον δύνηται τῷ ἀπὸ συμμέτρου
 ἑαυτῇ [μήκει], τῷ δὲ τετάρτῳ τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλάσ-
 20 σονος ἴσον παρὰ τὴν μείζονα παραβληθῇ ἑλλεί-
 πον εἶδει τετραγώνῳ, εἰς σύμμετρα αὐτὴν
 διαιρεῖ μήκει.

Ἔστωσαν δύο εὐθεῖαι ἄνισοι αἱ $A, BΓ$, ὧν μείζων
 ἡ $BΓ$, τῷ δὲ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος
 τῆς A , τουτέστι τῷ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς A , ἴσον
 25 παρὰ τὴν $BΓ$ παραβεβλήσθω ἑλλείπον εἶδει τετραγώνῳ,

3. τὸ AD παραλληλόγραμμον Theon (BFVb, ante AD eras.
 $ΓΔ F$). 4. τετραγώνῳ] corr. ex παραλληλογράμῳ m. rec. b.
 $ΔB$] $BΔ Fb$. 5. ἐστὶν LB. τῷ τό F. $ΑΓ$] corr. ex
 $ΓA$ m. 1 b. $ΓB$] $Γ e$ corr. V. 7. ἐστὶν LB. $ΓB$] $BΓ$
 BV . ἐστὶν LPB. 8. $ΓΔ$] $ΔP$, $Δ e$ corr. V. τουτέστι — $ΓB$
 m. 2 V. τουτέστιν LPBV. 9. Post εὐθείαν add. παρα-



Rectae enim AB parallelogrammum adplicetur AD figura quadrata AB deficiens. dico, esse

$$AD = AG \times GB.$$

et per se patet; nam quoniam AB quadratum est, erit $AG = GB$. et $AD = AG \times GD = AG \times GB$.

Ergo si rectae alicui, et quae sequuntur.

XVII.

Si duae rectae inaequales datae sunt, et quartae parti quadrati minoris aequale spatium maiori adplicatur figura quadrata deficiens, quod eam in partes longitudine commensurabiles diuidat, maior quadrata minorem excedet quadrato rectae sibi commensurabilis. et si maior quadrata minorem excedit quadrato rectae sibi commensurabilis, et spatium quartae parti quadrati minoris aequale maiori adplicatur figura quadrata deficiens, eam in partes longitudine commensurabiles diuidet.

Sint duae rectae inaequales $A, B\Gamma$, quarum maior sit $B\Gamma$, et quartae parti quadrati minoris A , hoc est $(\frac{1}{4}A)^2$, aequale spatium rectae $B\Gamma$ adplicetur figura

βληθῆ παραλληλόγραμμον V. Post *ἐξῆς* add. *τῆς προτάσεως* LBVb, F m. 2. 10. *ιη'* F m. 2; *ιβ'* B, mg. *ιζ'*. 11. *ὅσων* P.


12. *ἐλάττωνος* F. 13. *τετραγώνω*] in ras. m. 1 b. 14. *μήκη* F. 15. *ἐλάττωνος* F. *συμμέτρω* F. 16. *μήκει*] om. P. *αν* F. *ῆ*] *ῆ* b, et F, sed corr. 17. *ἐλάττωνος* F. *μεῖζον*] mg. m. 2 F, *μεῖζονα* b. 18. *μήκει*] om. P. Post *τετάρτω* add. *μέρει* b, F m. 2. *ἐλάττωνος* F. 20. *εἰς*] in ras. V, corr. ex *εἰ* m. rec. b. *αὐτῇ* V, sed corr. 21. *διελεῖ* B, *διέλη* Vb et corr. in *διελεῖ* F. *μήκη* F. 22. *μεῖζον* b, *μεῖζων*

ἔστω F. 23. *ἐλάττωνος* F. 24. *τῆς*] *τῆς* F. *τουτέστιν* P. *τῶ*] *τό* F, et V, sed corr. m. 1. *τοῦ* A B; *τῇ* A V, sed corr.

καὶ ἔστω τὸ ὑπὸ τῶν $B\Delta$, $\Delta\Gamma$, σύμμετρος δὲ ἔστω ἡ $B\Delta$ τῇ $\Delta\Gamma$ μήκει· λέγω, ὅτι ἡ $B\Gamma$ τῆς A μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ.

- Τετμήσθω γὰρ ἡ $B\Gamma$ δίχα κατὰ τὸ E σημεῖον; καὶ
 5 κείσθω τῇ ΔE ἴση ἡ EZ . λοιπὴ ἄρα ἡ $\Delta\Gamma$ ἴση ἐστὶ τῇ BZ . καὶ ἐπεὶ εὐθεῖα ἡ $B\Gamma$ τέτμηται εἰς μὲν ἴσα κατὰ τὸ E , εἰς δὲ ἄνισα κατὰ τὸ Δ , τὸ ἄρα ὑπὸ $B\Delta$, $\Delta\Gamma$ περιεχόμενον ὀρθογώνιον μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς $E\Delta$ τετραγώνου ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς $E\Gamma$ τετραγώνῳ.
 10 καὶ τὰ τετραπλάσια· τὸ ἄρα τετράκις ὑπὸ τῶν $B\Delta$, $\Delta\Gamma$ μετὰ τοῦ τετραπλασίου τοῦ ἀπὸ τῆς ΔE ἴσον ἐστὶ τῷ τετράκις ἀπὸ τῆς $E\Gamma$ τετραγώνῳ. ἀλλὰ τῷ μὲν τετραπλασίῳ τοῦ ὑπὸ τῶν $B\Delta$, $\Delta\Gamma$ ἴσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς A τετράγωνον, τῷ δὲ τετραπλασίῳ τοῦ ἀπὸ τῆς ΔE
 15 ἴσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΔZ τετράγωνον· διπλασίων γάρ ἐστιν ἡ ΔZ τῆς ΔE . τῷ δὲ τετραπλασίῳ τοῦ ἀπὸ τῆς $E\Gamma$ ἴσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς $B\Gamma$ τετράγωνον· διπλασίων γάρ ἐστι πάλιν ἡ $B\Gamma$ τῆς ΓE . τὰ ἄρα ἀπὸ τῶν A , ΔZ τετράγωνα ἴσα ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς $B\Gamma$ τετραγώνῳ.
 20 ὥστε τὸ ἀπὸ τῆς $B\Gamma$ τοῦ ἀπὸ τῆς A μείζον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΔZ · ἡ $B\Gamma$ ἄρα τῆς A μείζον δύναται τῇ ΔZ . δεικτέον, ὅτι καὶ σύμμετρός ἐστιν ἡ $B\Gamma$ τῇ ΔZ . ἐπεὶ γὰρ σύμμετρός ἐστιν ἡ $B\Delta$ τῇ $\Delta\Gamma$ μήκει, σύμμετρος ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ $B\Gamma$ τῇ $\Gamma\Delta$ μήκει. ἀλλὰ ἡ $\Gamma\Delta$ ταῖς
 25 $\Gamma\Delta$, BZ ἐστὶ σύμμετρος μήκει· ἴση γάρ ἐστιν ἡ $\Gamma\Delta$ τῇ BZ . καὶ ἡ $B\Gamma$ ἄρα σύμμετρός ἐστὶ ταῖς BZ , $\Gamma\Delta$ μήκει· ὥστε καὶ λοιπὴ τῇ $Z\Delta$ σύμμετρός ἐστιν ἡ $B\Gamma$

1. $\Delta\Gamma$] Γ in ras. F. 3. Post ἑαυτῇ add. μήκει Vb, F m. 2. 5. $\Delta\Gamma$] corr. ex $B\Gamma$ m. rec. b. ἐστίν P. 7. ὑπὸ τῶν BFV. 9. ἐστίν P. 10. τὰ] m. 2 V. τό] τὰ B. $B\Delta$] in ras. m. 1 P. 11. τετράκις Theon (BFVb). τοῦ] om.



commensurabilis.

nam $B\Gamma$ in puncto E in duas partes aequales secetur, et ponatur $EZ = \Delta E$. itaque $\Delta\Gamma = BZ$. et quoniam recta $B\Gamma$ in E in partes aequales secta est, in Δ autem in inaequales, erit [II, 5]

$$B\Delta \times \Delta\Gamma + E\Delta^2 = E\Gamma^2.$$

et quadrupla eodem modo; quare

$$4 B\Delta \times \Delta\Gamma + 4 \Delta E^2 = 4 E\Gamma^2.$$

uerum $A^2 = 4 B\Delta \times \Delta\Gamma$, $\Delta Z^2 = 4 \Delta E^2$ (nam $\Delta Z = 2 \Delta E$), $B\Gamma^2 = 4 E\Gamma^2$ (nam rursus $B\Gamma = 2 \Gamma E$). itaque

$$A^2 + \Delta Z^2 = B\Gamma^2$$

quare $B\Gamma^2$ excedit A^2 quadrato ΔZ^2 . demonstrandum, $B\Gamma$, ΔZ commensurabiles esse. nam quoniam $B\Delta$, $\Delta\Gamma$ longitudine commensurabiles sunt, $B\Gamma$ et $\Gamma\Delta$ longitudine commensurabiles sunt [prop. XV]. uerum $\Gamma\Delta$ rectis $\Gamma\Delta$, BZ longitudine commensurabilis est; nam $\Gamma\Delta = BZ$. quare etiam $B\Gamma$ rectis BZ , $\Gamma\Delta$ longitudine commensurabilis est [prop. XII]. quare $B\Gamma$ etiam

Theon (BFVb). $E\Delta$ FVb. ισα BF. 12. ΓE F. τετρα-
 $\text{πλασίῳ τοῦ}]$ τετρακίς Theon (BFVb). 13. $\text{τῶν}]$ om. b. 14. $\delta\epsilon]$
 postea ins. F. τετρακίς , om. τοῦ, Theon (BFVb). 15. τε-
 τραγώνων P, corr. m. 1. 16. $Z\Delta$ P. τετρακίς , om. τοῦ,
 Theon (BFVb). 18. $\Gamma E]$ $E\Gamma$ V. 19. $\Delta, \Delta Z]$ e corr. V.
 $\text{τετραγώνῳ}]$ \square' supra scr. m. 1 V. 20. Post ὥστε ras. 2
 litt. V. 21. $\tau\eta]$ corr. ex τοῦ F. $Z\Delta$ P. 22. $Z\Delta$ P. 23.
 ἔστι P, corr. m. 2. 24. $\alpha\lambda\lambda'$ F. 25. ZB F. 26. $\text{ταῖς } BZ,$
 $\Gamma\Delta$ ἔστι σύμμετρος Theon (BFVb). ἔστιν P. 27. $\text{μήκει}]$
 η in ras. m. 1 P. $B\Gamma]$ in ras. V.

μήκει· ἡ $B\Gamma$ ἄρα τῆς A μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ.

Ἀλλὰ δὴ ἡ $B\Gamma$ τῆς A μείζον δυνάσθω τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ, τῷ δὲ τετάρτῳ τοῦ ἀπὸ τῆς A ἴσον
5 παρὰ τὴν $B\Gamma$ παραβεβλήσθω ἐλλείπον εἶδει τετραγώνῳ, καὶ ἔστω τὸ ὑπὸ τῶν $B\Delta$, $\Delta\Gamma$. δεικτέον, ὅτι σύμμετρός ἐστιν ἡ $B\Delta$ τῇ $\Delta\Gamma$ μήκει.

Τῶν γὰρ αὐτῶν κατασκευασθέντων ὁμοίως δεῖξομεν,
ὅτι ἡ $B\Gamma$ τῆς A μείζον δύναται τῷ ἀπὸ τῆς $Z\Delta$.
10 δύναται δὲ ἡ $B\Gamma$ τῆς A μείζον τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ. σύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ $B\Gamma$ τῇ $Z\Delta$ μήκει· ὥστε καὶ λοιπῇ συναμφοτέρῳ τῇ BZ , $\Delta\Gamma$ σύμμετρός ἐστιν ἡ $B\Gamma$ μήκει. ἀλλὰ συναμφοτέρος ἡ BZ , $\Delta\Gamma$ σύμμετρός ἐστι τῇ $\Delta\Gamma$ [μήκει]. ὥστε καὶ ἡ $B\Gamma$ τῇ $\Gamma\Delta$
15 σύμμετρός ἐστι μήκει· καὶ διελόντι ἄρα ἡ $B\Delta$ τῇ $\Delta\Gamma$ ἐστὶ σύμμετρος μήκει.

Ἐὰν ἄρα ᾧσι δύο εὐθεῖαι ἄνισοι, καὶ τὰ ἐξῆς.

ιη'.

Ἐὰν ᾧσι δύο εὐθεῖαι ἄνισοι, τῷ δὲ τετάρτῳ
20 μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος ἴσόν παρὰ τὴν μείζονα παραβληθῇ ἐλλείπον εἶδει τετραγώνῳ, καὶ εἰς ἀσύμμετρα αὐτὴν διαιρῇ [μήκει], ἡ μείζων τῆς ἐλάσσονος μείζον δυνήσεται τῷ ἀπὸ ἀσυμ-

2. Post ἑαυτῇ add. μήκει V. 4. τοῦ] in ras. V. 8. ὁμοίως δὴ V. δεῖξομεν] δευ- corr. ex δη- F. 9. Post $Z\Delta$ del. m. 2: οὕτω γὰρ ὑπὸκειται V. 10. μείζον τῆς A P. 11. ἑαυτῆς P. 12. καί] m. 2 F. συναμφοτέρῳ] -φ θ corr. V. τῇ] corr. ex τῷ F. 14. τῇ $\Delta\Gamma$ σύμμετρός ἐστι Theon (BFVb; τῇ $\Delta\Gamma$ postea ins. F). μήκει] om. P. Dein add. Theon: ἵση γὰρ ἐστὶν ἡ BZ τῇ $\Delta\Gamma$ (BFVb; τῇ corr. in τῆς m. 2 F, τῆς b; $\Gamma\Delta$ F). ὥστε] om. Theon (BFVb). $B\Gamma$ ἄρα Theon (BFVb).

reliquae $Z\Delta$ longitudine commensurabilis est. ergo $B\Gamma^2$ excedit A^2 quadrato rectae sibi commensurabilis.

Iam uero $B\Gamma^2$ excedat A^2 quadrato rectae sibi commensurabilis, et quartae parti quadrati A^2 aequale rectae $B\Gamma$ adplicetur spatium figura quadrata deficiens, et sit $B\Delta \times \Delta\Gamma$ [u. lemma]. demonstrandum, $B\Delta$, $\Delta\Gamma$ longitudine commensurabiles esse.

nam iisdem comparatis similiter demonstrabimus, esse $B\Gamma^2 = A^2 + Z\Delta^2$. $B\Gamma^2$ autem quadrato rectae sibi commensurabilis excedit quadratum A^2 . itaque $B\Gamma$, $Z\Delta$ longitudine commensurabiles sunt. quare $B\Gamma$ etiam reliquae $BZ + \Delta\Gamma$ longitudine commensurabilis est [prop. XV]. uerum $BZ + \Delta\Gamma$ rectae $\Delta\Gamma$ commensurabilis est [prop. VI]. quare etiam $B\Gamma$, $\Gamma\Delta$ longitudine commensurabiles sunt [prop. XII]. itaque etiam dirimendo $B\Delta$, $\Delta\Gamma$ longitudine commensurabiles sunt.

Ergo si duae rectae inaequales datae sunt, et quae sequuntur.

XVIII.

Si duae rectae inaequales datae sunt, et quartae parti quadrati minoris aequale spatium maiori adplicatur figura quadrata deficiens, [quod eam in partes incommensurabiles diuidat, maior quadrata minorem excedet quadrato rectae sibi incommensurabilis. et si maior quadrata minorem excedit quadrato rectae sibi

σύμμετρός ἐστι τῇ $\Gamma\Delta$ Theon (BFVb; $\Delta\Gamma$ V). 15. μήκει· καί] om. Theon (BFVb). 17. καὶ τὰ ἐξῆς] τῷ δὲ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος ἴσον παρὰ τὴν μείζονα παραβληθῶν ἑλλείπον εἶδει τετραγώνῳ, καὶ τὰ ἐξῆς· ὅπερ εἶδει δεῖξαι V. 18. κ' B, ιη mg. 19. ὥσιν B. 20. ἐλάττωνος F. 22. μήκει] om. P, μήκη F. 23. ἐλάττωνος F. τό F. συμμέτρου F.

μέτρου ἐαυτῇ. καὶ ἐὰν ἡ μείζων τῆς ἐλάσσονος
μείζον δύνηται τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἐαυτῇ, τῷ δὲ
τετάρτῳ τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος ἴσον παρὰ τὴν
μείζονα παραβληθῇ ἐλλείπον εἶδει τετραγώνῳ,
5 εἰς ἀσύμμετρα αὐτὴν διαιρεῖ [μήκει].

Ἐστωσαν δύο εὐθεῖαι ἄνισοι αἱ A , $B\Gamma$, ὧν μείζων
ἡ $B\Gamma$, τῷ δὲ τετάρτῳ [μέρει] τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος
τῆς A ἴσον παρὰ τὴν $B\Gamma$ παραβεβλήσθω ἐλλείπον
εἶδει τετραγώνῳ, καὶ ἔστω τὸ ὑπὸ τῶν $B\Delta\Gamma$, ἀσύμ-
10 μετρος δὲ ἔστω ἡ $B\Delta$ τῇ $\Delta\Gamma$ μήκει· λέγω, ὅτι ἡ $B\Gamma$
τῆς A μείζον δύναιται τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἐαυτῇ.

Τῶν γὰρ αὐτῶν κατασκευασθέντων τῷ πρότερον
ὁμοίως δεῖξομεν, ὅτι ἡ $B\Gamma$ τῆς A μείζον δύναιται τῷ
ἀπὸ τῆς $Z\Delta$. δεικτέον [οὖν], ὅτι ἀσύμμετρός ἐστιν
15 ἡ $B\Gamma$ τῇ ΔZ μήκει. ἐπεὶ γὰρ ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ
 $B\Delta$ τῇ $\Delta\Gamma$ μήκει, ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ $B\Gamma$
τῇ $\Gamma\Delta$ μήκει. ἀλλὰ ἡ $\Delta\Gamma$ σύμμετρός ἐστι συναμ-
φοτέραις ταῖς BZ , $\Delta\Gamma$. καὶ ἡ $B\Gamma$ ἄρα ἀσύμμετρός
ἐστὶ συναμφοτέραις ταῖς BZ , $\Delta\Gamma$. ὥστε καὶ λοιπῇ τῇ
20 $Z\Delta$ ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ $B\Gamma$ μήκει. καὶ ἡ $B\Gamma$ τῆς A
μείζον δύναιται τῷ ἀπὸ τῆς $Z\Delta$ ἡ $B\Gamma$ ἄρα τῆς A
μείζον δύναιται τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἐαυτῇ.

Δυνάσθω δὴ πάλιν ἡ $B\Gamma$ τῆς A μείζον τῷ ἀπὸ
ἀσυμμέτρου ἐαυτῇ, τῷ δὲ τετάρτῳ τοῦ ἀπὸ τῆς A ἴσον
25 παρὰ τὴν $B\Gamma$ παραβεβλήσθω ἐλλείπον εἶδει τετραγώνῳ,

1. καὶ — 2. ἐαυτῇ] om. b. 1. μείζον V, sed corr. ἐλάτ-
τονος F. 2. συμμέτρου F, et B, corr. m. 2. 3. ἐλάττονος F.
5. διαιρεῖ P. μήκει] om. P, μήκη F. 7. ἐστὶν ἡ F. μέρει]
mg. m. 1 P. τοῦ] τῷ F. ἐλάττονος F. 8. τῆς] τῇ F. 9.
 $B\Gamma\Delta$ b; $B\Delta$, $\Delta\Gamma$ V ($\Delta\Gamma$ in ras.), F, P m. rec. 11. συμ-
μέτρου B, corr. m. rec. 12. τῷ] m. rec. B; τό P, corr. m. 2.
πρότερον F. 14. ΔZ V. οὖν] om. P. ὅτι καὶ P. 15.

incommensurabilis, et spatium quartae parti quadrati minoris aequale maiori adplicatur figura quadrata deficiens, eam in partes incommensurabiles diuidit.

Sint duae rectae inaequales $A, B\Gamma$, quarum maior sit $B\Gamma$, quartae autem parti quadrati minoris A aequale spatium rectae $B\Gamma$ adplicetur figura quadrata deficiens, et sit $B\Delta \times \Delta\Gamma$ [u. lemma p. 46], et $B\Delta, \Delta\Gamma$ longitudine incommensurabiles sint. dico, $B\Gamma^2$ excedere A^2 quadrato rectae sibi incommensurabilis.

iisdem enim, quae in priore propositione, comparatis similiter demonstrabimus, esse $B\Gamma^2 = A^2 + Z\Delta^2$. demonstrandum, $B\Gamma, \Delta Z$ longitudine incommensurabiles esse. nam quoniam $B\Delta, \Delta\Gamma$ longitudine incommensurabiles sunt, etiam $B\Gamma, \Gamma\Delta$ longitudine incommensurabiles sunt [prop. XVI]. uerum $\Delta\Gamma$ rectae $BZ + \Delta\Gamma$ commensurabilis est [prop. VI]. quare etiam $B\Gamma$ rectae $BZ + \Delta\Gamma$ incommensurabilis est [prop. XIII]. itaque $B\Gamma$ etiam reliquae $Z\Delta$ longitudine incommensurabilis est [prop. XVI]; et $B\Gamma^2 = A^2 + Z\Delta^2$. ergo $B\Gamma^2$ excedit A^2 quadrato rectae sibi incommensurabilis.

Iam rursus $B\Gamma^2$ excedat A^2 quadrato rectae sibi incommensurabilis, et spatium aequale $\frac{1}{4}A^2$ rectae $B\Gamma$ adplicetur figura quadrata deficiens, et sit $B\Delta \times \Delta\Gamma$.

$Z\Delta$ B. 16. μήκει] om. Vb, m. 2 B. ἄρα] om. V. ἐστίν P, comp. F. καί] m. 2 F. 17. $\Gamma\Delta$] in ras. F. ἀλλ' F. ἡ] supra scr. m. 1 V. ἀσύμμετρος F. 18. καί — 19. $\Delta\Gamma$] m. 2 B. 20. $Z\Delta$] " $\Delta'Z$ F. $B\Gamma$] (prius) ΓB V. 21. $B\Gamma$] B in ras. m. 1 B. 22. συμμέτρον B, corr. m. 2; item lin. 24. 24. τοῦ] τῷ F.

καὶ ἔστω τὸ ὑπὸ τῶν $ΒΔ$, $ΔΓ$. δεικτέον, ὅτι ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ $ΒΔ$ τῇ $ΔΓ$ μήκει.

Τῶν γὰρ αὐτῶν κατασκευασθέντων ὁμοίως δειξομεν, ὅτι ἡ $ΒΓ$ τῆς $Α$ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ τῆς $ΖΔ$. ἀλλὰ
 5 ἡ $ΒΓ$ τῆς $Α$ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσύμμετρου ἑαυτῇ. ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ $ΒΓ$ τῇ $ΖΔ$ μήκει· ὥστε
 καὶ λοιπῇ συναμφοτέρῳ τῇ $ΒΖ$, $ΔΓ$ ἀσύμμετρός ἐστὶν ἡ $ΒΓ$. ἀλλὰ συναμφοτέρος ἡ $ΒΖ$, $ΔΓ$ τῇ $ΔΓ$ σύμμετρός ἐστι μήκει· καὶ ἡ $ΒΓ$ ἄρα τῇ $ΔΓ$ ἀσύμμετρός
 10 ἐστὶ μήκει· ὥστε καὶ διελόντι ἡ $ΒΔ$ τῇ $ΔΓ$ ἀσύμμετρός ἐστι μήκει.

Ἐὰν ἄρα ὥσι δύο εὐθεῖαι, καὶ τὰ ἐξῆς.

Λήμμα.

Ἐπεὶ δέδεικται, ὅτι αἱ μήκει σύμμετροι πάντως καὶ
 15 δυνάμει [εἰσὶ σύμμετροι], αἱ δὲ δυνάμει οὐ πάντως καὶ μήκει, ἀλλὰ δὴ δύνανται μήκει καὶ σύμμετροι εἶναι καὶ ἀσύμμετροι, φανερόν, ὅτι, ἐὰν τῇ ἐκκειμένη ῥητῇ σύμμετρός τις ᾗ μήκει, λέγεται ῥητὴ καὶ σύμμετρος αὐτῇ οὐ μόνον μήκει, ἀλλὰ καὶ δυνάμει,
 20 ἐπεὶ αἱ μήκει σύμμετροι πάντως καὶ δυνάμει. ἐὰν δὲ τῇ ἐκκειμένη ῥητῇ σύμμετρός τις ᾗ δυνάμει, εἰ μὲν καὶ μήκει, λέγεται καὶ οὕτως ῥητὴ καὶ σύμμετρος αὐτῇ

1. $ΔΓ$] m. 2 B. 2. ἡ $ΔΒ$ ἐστὶν F. 4. $ΔΖ$ V. ἀλλ' FV. 5. συμέτρου F, corr. m. 2. 6. ἑαυτῆς P, corr. m. 1. ἀσύμμετρα P, corr. m. 1. $ΔΖ$ V. 8. τῇ $ΔΓ$] m. 2 F. ἀσύμμετρος F, sed corr. 9. ἐστὶν P. καί] om. P. καί — 10. μήκει] mg. F. 10. Ante ὥστε del. ἡ $ΒΓ$ ἄρα τῇ $ΔΓ$ m. 1 P. 12. ὥσιν B. Post εὐθεῖαι add. ἄνισοι, τῷ δὲ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος ἴσον παρὰ τὴν μείζονα παραβληθῇ V. 13. λήμμα] om. P^bb. 14. ἐπεὶ δέ V. 15. εἰσὶ σύμμετροι] om. P. οὐ] σύμμετροι οὐ P. 16. ἀλλὰ — μήκει] mg. m. 1 P. δὴ] δηλαδὴ B^vb, δὴ δηλαδὴ, del. δὴ, F. καὶ μήκει B^vb.

demonstrandum, $B\Delta$ et $\Delta\Gamma$ longitudine incommensurabiles esse.

iisdem enim comparatis similiter demonstrabimus, esse $B\Gamma^2 = A^2 + Z\Delta^2$. $B\Gamma^2$ autem A^2 excedit quadrato rectae sibi incommensurabilis. itaque $B\Gamma$, $Z\Delta$ longitudine incommensurabiles sunt. quare $B\Gamma$ etiam reliquae $BZ + \Delta\Gamma$ incommensurabilis est [prop. XVI]. uerum $BZ + \Delta\Gamma$ rectae $\Delta\Gamma$ longitudine commensurabilis est [prop. VI]. quare etiam $B\Gamma$ rectae $\Delta\Gamma$ longitudine incommensurabilis est [prop. XIII]. itaque etiam dirimendo $B\Delta$ et $\Delta\Gamma$ longitudine incommensurabiles sunt [prop. XVI].

Ergo si duae rectae, et quae sequuntur.

Lemma.

Quoniam demonstratum est [prop. IX coroll.], rectas longitudine commensurabiles semper etiam potentia commensurabiles esse, rectas autem potentia commensurabiles non semper etiam longitudine, sed posse longitudine tum commensurabiles esse tum incommensurabiles, adparet, si recta aliqua rationali propositae longitudine commensurabilis sit, eam rationalem eique commensurabilem uocari non modo longitudine, sed etiam potentia, quoniam rectae longitudine commensurabiles semper etiam potentia commensurabiles sunt; sin recta rationali propositae potentia commensurabilis sit, si etiam longitudine sit commensurabilis, eam sic quoque rationalem eique longitudine et potentia commensurabilem uocari; sin rursus recta rationali

19. $\alpha\tilde{\nu}\tau\eta$ F. 20. $\acute{\epsilon}\pi\epsilon\lambda\ \alpha\acute{\iota}$] $\alpha\acute{\iota}\ \gamma\acute{\alpha}\rho$ Theon (BFVb). 22.
 $\kappa\alpha\acute{\iota}$] (alt.) m. 2 B. $\alpha\tilde{\nu}\tau\eta$ F.

μήκει καὶ δυνάμει· εἰ δὲ τῇ ἐκκειμένη πάλιν ζητῇ
σύμμετρος τις οὕσα δυνάμει μήκει αὐτῇ ἢ ἀσύμμετρος,
λέγεται καὶ οὕτως ζητῇ δυνάμει μόνον σύμμετρος.

ιθ'.

5 Τὸ ὑπὸ ζητῶν μήκει συμμέτρων κατὰ τινα
τῶν προειρημένων τρόπων εὐθειῶν περιεχό-
μενον ὀρθογώνιον ζητόν ἐστιν.

Τὸ γὰρ ζητῶν μήκει συμμέτρων εὐθειῶν τῶν
AB, BΓ ὀρθογώνιον περιεχέσθω τὸ AΓ· λέγω, ὅτι
10 ζητόν ἐστὶ τὸ AΓ.

Ἀναγεγράφθω γὰρ ἀπὸ τῆς AB τετράγωνον τὸ AΔ·
ζητόν ἄρα ἐστὶ τὸ AΔ. καὶ ἐπεὶ σύμμετρος ἐστὶν ἡ
AB τῇ BΓ μήκει, ἴση δὲ ἐστὶν ἡ AB τῇ BΔ, σύμ-
μετρος ἄρα ἐστὶν ἡ BΔ τῇ BΓ μήκει. καὶ ἐστὶν ὥς
15 ἡ BΔ πρὸς τὴν BΓ, οὕτως τὸ AΔ πρὸς τὸ AΓ. σύμ-
μετρον ἄρα ἐστὶ τὸ AΔ τῷ AΓ. ζητόν δὲ τὸ AΔ·
ζητόν ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ AΓ.

Τὸ ἄρα ὑπὸ ζητῶν μήκει συμμέτρων, καὶ τὰ ἐξῆς.

κ'.

20 Ἐὰν ζητὸν παρὰ ζητὴν παραβληθῇ, πλάτος
ποιεῖ ζητὴν καὶ σύμμετρον τῇ, παρ' ἣν παρὰ-
κεῖται, μήκει.


2. οὕσα τις FV. δυνάμει] -ει e corr., seq. spat. 2 litt. F. αὐτῇ ἢ] ἡ αὐτῇ BFb, ἢ V. 3. οὕτως] comp. e corr. F. μόνον] comp. mg. V (εὐαν.). Seq. alt. lemma, u. app. 4. ιθ'] sic F, sed infra κ'; mg. τετράγωνον β' Fb. 5. μήκει — 6. προ-] in ras. m. 2 B. 5. εὐθειῶν κατὰ Theon (BFVb). 6. τρόπων? V. εὐ-
θειῶν] om. Theon (BFVb). 8. εὐθειῶν τῶν] in ras. V. 12. τὸ AΔ ἄρα ζητόν ἐστιν F. 13. AB] (alt.) BΔB. BΔ] ΔB in ras. P, BA in ras. B. σύμμετρος — 14. BΓ] om. B; mg. m. 2: ἴση lin. 13 — μήκει lin. 14, ut nos. 15. οὕτω V. τό]

propositae commensurabilis potentia, eadem longitudine ei incommensurabilis sit, sic quoque eam rationalem uocari potentia tantum commensurabilem.

XIX.

Rectangulum comprehensum rectis rationalibus longitudineque commensurabilibus secundum aliquem modorum, quos diximus [u. lemma], rationale est.

Rectis enim rationalibus longitudine commensurabilibus AB , $B\Gamma$ rectangulum comprehendatur $A\Gamma$. dico, $A\Gamma$ rationale esse.



nam in AB construatur quadratum AA . itaque AA rationale est [def. 4]. et quoniam AB , $B\Gamma$ longitudine commensurabiles sunt, et $AB = B\Delta$, $B\Delta$ et $B\Gamma$ longitudine commensurabiles sunt. et $B\Delta : B\Gamma = AA : A\Gamma$ [VI, 1]. itaque AA , $A\Gamma$ commensurabilia sunt [prop. XI]. uerum AA rationale est. itaque etiam $A\Gamma$ rationale est [def. 4].

Ergo rectangulum comprehensum rectis rationalibus longitudineque commensurabilibus, et quae sequuntur.

XX.

Si spatium rationale rectae rationali adplicatur, latitudinem rationalem facit et ei longitudine]commensurabilem, cui adplicatum est.

(alt.) corr. ex τήν m. rec. P. $A\Gamma$] e corr. P. 16. ἐστίν P, ἐστὶ καὶ V. τὸ] τῷ b. AA F. 17. ἐστίν P, om. FV. 18. μήναι συμμέτρων] om. BVb. Ante καὶ add. εὐθείων F. καὶ τὰ ἐξήs] om. PV. 19. κ'] seq. ras. 1 litt. B, κα' F. 21. ποιεῖ] -σι e corr. m. 1 F. τῇ] corr. ex τι m. rec. b.

Ῥητὸν γὰρ τὸ $ΑΓ$ παρὰ ῤητὴν κατὰ τινα πάλιν τῶν προειρημένων τρόπων τὴν $ΑΒ$ παραβληθῆσθαι πλάτος ποιοῦν τὴν $ΒΓ$. λέγω, ὅτι ῤητὴ ἐστὶν ἡ $ΒΓ$ καὶ σύμμετρος τῇ $ΒΑ$ μήκει.

- 5 Ἀναγεγράφθω γὰρ ἀπὸ τῆς $ΑΒ$ τετραγώνον τὸ $ΑΔ$. ῤητὸν ἄρα ἐστὶ τὸ $ΑΔ$. ῤητὸν δὲ καὶ τὸ $ΑΓ$. σύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ $ΔΑ$ τῷ $ΑΓ$. καί· ἐστὶν ὥς τὸ $ΔΑ$ πρὸς τὸ $ΑΓ$, οὕτως ἡ $ΔΒ$ πρὸς τὴν $ΒΓ$. σύμμετρος ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ $ΔΒ$ τῇ $ΒΓ$. ἴση δὲ ἡ $ΔΒ$ τῇ $ΒΑ$. σύμμετρος ἄρα καὶ ἡ $ΑΒ$ τῇ $ΒΓ$. ῤητὴ δὲ ἐστὶν ἡ $ΑΒ$. ῤητὴ ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ $ΒΓ$ καὶ σύμμετρος τῇ $ΑΒ$ μήκει.

Ἐὰν ἄρα ῤητὸν παρὰ ῤητὴν παραβληθῇ, καὶ τὰ ἐξῆς.

κα'.

- 15 Τὸ ὑπὸ ῤητῶν δυνάμει μόνον συμμετρῶν εὐθειῶν περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἄλογόν ἐστιν, καὶ ἡ δυναμένη αὐτὸ ἄλογός ἐστιν, καλεῖσθαι δὲ μέση.

diel

- Τὸ γὰρ ῤητῶν δυνάμει μόνον συμμετρῶν εὐθειῶν τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$ ὀρθογώνιον περιεχέσθαι τὸ $ΑΓ$. λέγω, ὅτι ἄλογόν ἐστὶ τὸ $ΑΓ$, καὶ ἡ δυναμένη αὐτὸ ἄλογός ἐστιν, καλεῖσθαι δὲ μέση.

Ἀναγεγράφθω γὰρ ἀπὸ τῆς $ΑΒ$ τετραγώνον τὸ $ΑΔ$. ῤητὸν ἄρα ἐστὶ τὸ $ΑΔ$. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρός ἐστὶν

1. ῤητὴν τὴν $ΑΒ$ V. 2. εἰρημένων Theon (BFVb). τὴν $ΑΒ$] om. V. 3. ποῶν P. 4. $ΑΒ$ P. 5. $ΑΒ$] corr. ex $ΑΓ$ m. 2 F. 6. ἐστὶν P. $ΑΓ$] $ΓΑ$ F. 7. ἐστὶν P. $ΔΑ$] $ΑΔ$ V. 8. τὴν] om. BFb. 9. ἐστὶν P. $ΔΒ$] (alt.) post ras. V, $ΒΔ$ F. 10. $ΒΑ$] $Α$ e corr. m. 1 P. ἄρα — τῇ] in ras. m. 1 P. 12. $ΒΑ$ BVb. 13. ἄν F. παρὰ ῤητὴν] om. F. παραβληθῇ] om. P. Seq. lemma, u. app. 14.

Rationale enim spatium AI rectae AB rationali rursus secundum aliquem modorum, quos diximus [u. lemma p. 56], adplicetur latitudinem faciens BI . dico, BI rationalem esse et rectae BA longitudine commensurabilem.

construatur enim in AB quadratum AA . AA igitur rationale est [def. 4]. uerum etiam AI rationale est. itaque AA , AI commensurabilia sunt. et $AA:AI = AB:BI$ [VI, 1]. itaque AB , BI commensurabiles sunt [prop. XI]. uerum $AB = BA$. itaque etiam AB , BI commensurabiles sunt. sed AB rationalis est. itaque etiam BI rationalis est et rectae AB longitudine commensurabilis [def. 3].

Ergo si spatium rationale rectae rationali adplicatur, et quae sequuntur.

XXI.

Rectangulum rectis rationalibus potentia tantum commensurabilibus comprehensum irrationale est, et recta ei aequalis quadrata irrationalis est, uocetur autem media.

Rectis enim rationalibus et potentia tantum commensurabilibus AB , BI rectangulum AI comprehenditur. dico, rectangulum AI irrationale esse, et rectam ei aequalem quadratam irrationalem; uocetur autem media.

nam in AB quadratum construatur AA . itaque AA rationale est [def. 4]. et quoniam AB , BI longi-

$\alpha\alpha'$] α in ras. m. 1 B, $\alpha\beta'$ F et sic deinceps. 15. Post $\delta\eta\tau\omega\eta$ add. $\delta\upsilon\sigma$ B. 16. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ PBV, comp. Fb. 17. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ BV, comp. Fb, $\acute{\epsilon}\sigma\tau\alpha\iota$ P. 22. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ PBV, comp. Fb.

ἡ AB τῇ $BΓ$ μήκει· δυνάμει γὰρ μόνον ὑπόκεινται
 σύμμετροι· ἴση δὲ ἡ AB τῇ $BΔ$, ἀσύμμετρος ἄρα
 ἐστὶ καὶ ἡ $ΔB$ τῇ $BΓ$ μήκει. καὶ ἐστὶν ὥς ἡ $ΔB$
 πρὸς τὴν $BΓ$, οὕτως τὸ $ΑΔ$ πρὸς τὸ $ΑΓ$ · ἀσύμμε-
 5 τρον ἄρα [ἐστὶ] τὸ $ΔΑ$ τῷ $ΑΓ$. ῥητὸν δὲ τὸ $ΔΑ$ ·
 ἄλογον ἄρα ἐστὶ τὸ $ΑΓ$ · ὥστε καὶ ἡ δυναμένη τὸ
 $ΑΓ$ [τουτέστιν ἡ ἴσον αὐτῷ τετράγωνον δυναμένη]
 ἄλογός ἐστιν, καλείσθω δὲ μέση· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.


Λήμμα.

10 Ἐὰν ὡς δύο εὐθείαι, ἐστὶν ὥς ἡ πρώτη πρὸς τὴν
 δευτέραν, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς πρώτης πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν
 δύο εὐθειῶν.

ἔστωσαν δύο εὐθεῖαι αἱ ZE , EH . λέγω, ὅτι ἐστὶν
 ὥς ἡ ZE πρὸς τὴν EH , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ZE πρὸς
 15 τὸ ὑπὸ τῶν ZE , EH .

ἀναγεγράφθω γὰρ ἀπὸ τῆς ZE τετράγωνον τὸ $ΔZ$,
 καὶ συμπληρώσθω τὸ $ΗΔ$. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὥς ἡ ZE
 πρὸς τὴν EH , οὕτως τὸ $ZΔ$ πρὸς τὸ $ΔH$, καὶ ἐστὶ
 τὸ μὲν $ZΔ$ τὸ ἀπὸ τῆς ZE , τὸ δὲ $ΔH$ τὸ ὑπὸ τῶν
 20 $ΔE$, EH , τουτέστι τὸ ὑπὸ τῶν ZE , EH , ἐστὶν ἄρα
 ὥς ἡ ZE πρὸς τὴν EH , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ZE πρὸς
 τὸ ὑπὸ τῶν ZE , EH . ὁμοίως δὲ καὶ ὥς τὸ ὑπὸ τῶν

1. $BΓ$] $ΓB$ V. γάρ] comp. F, supra scr. δέ. 3. ἐστὶν B.
 $ΔB$] (alt.) $BΔ$ P. 4. $ΑΓ$] corr. ex AB m. rec. P. 5. ἐστὶν
 B, om P. $ΑΔ$ FV. $ΑΔ$ F. 6. ἐστὶν P. 7. ἡ] supra scr.
 m. 2 V. 8. ἐστὶ PV, comp. Fb. Ante ὅπερ add. P:
 διὰ τὸ (mg. m. 1) τὴν ἴσον ἀναγράφουσαν τετράγωνον τῷ $ΑΓ$
 χωρίῳ, ἣν καλεῖ μέσην, μέσην ἀνάλογον εἶναι τῶν AB , $BΓ$;
 eodem loco Theon: διὰ τὸ τὸ ἀπ' αὐτῆς τετράγωνον ἴσον εἶναι
 τῷ ὑπὸ τῶν AB , $BΓ$ καὶ μέσην ἀνάλογον αὐτὴν γίνεσθαι (γί-
 νεσθαι BV) τῶν AB , $BΓ$ (BFVb). 9. λήμμα γ V (cfr. app.).
 10. ὡσιν B. ὡς] δὲ ὡς F. 11. πρὸς] supra scr. m. 1 F.




tudine incommensurabiles sunt (supposuimus enim, eas potentia tantum commensurabiles esse), et $AB = B\Delta$, etiam ΔB , $B\Gamma$ longitudine incommensurabiles sunt. et $\Delta B : B\Gamma = \Delta\Delta : \Delta\Gamma$ [VI, 1]. itaque ΔA , $\Delta\Gamma$ incommensurabilia sunt [prop. XI]. uerum ΔA rationale est; quare $\Delta\Gamma$ irrationale est [def. 4]. itaque etiam recta spatio $\Delta\Gamma$ aequalis quadrata¹⁾ irrationalis est [def. 4]; uocetur autem media; quod erat demonstrandum.

Lemma.

Datis duabus rectis est ut prima ad secundam, ita quadratum primae ad rectangulum duarum illarum rectarum.

Datae sint duae rectae ZE , EH . dico, esse

$$ZE : EH = ZE^2 : ZE \times EH.$$



describatur enim in ZE quadratum ΔZ , et expleatur $H\Delta$. iam quoniam est $ZE : EH = Z\Delta : \Delta H$ [VI, 1], et $Z\Delta = ZE^2$, $\Delta H = \Delta E \times EH = ZE \times EH$, erit

$$ZE : EH = ZE^2 : ZE \times EH.$$

1) Uerba *τουτέστιν* — *δυναμένη* lin. 7, quae nihil explicant, subdicia habeo (pro *δυναμένη* Augustus coni. *ἀναγκάουσα*). quae addiuntur lin. 8 (u. not. crit.) in P apertissime scholiastae sunt (*καλεῖ*); quare etiam additamentum simile codd. Theoninorum ipsi Theoni, non Euclidi tribuendum est.

$\dot{\upsilon}\rho\acute{o}$] corr. ex $\acute{\alpha}\rho\acute{o}$ Fb. 14. $\pi\rho\acute{o}\varsigma$ — ZE] mg. m. 2 B. EH] HE F. 17. $\tau\acute{o}$] corr. ex $\tau\eta\varsigma$ F. 18. $\tau\acute{\eta}\nu$] om. b. $\xi\sigma\tau\iota\nu$ P. 19. $\tau\acute{o}$ $\dot{\upsilon}\rho\acute{o}$ — 20. *τουτέστι*] supra scr. F. 20. *τουτέστιν* P. 22. *καὶ ὥς*] ins. m. 2 F.

HE , EZ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς EZ , τουτέστιν ὡς τὸ $H\Delta$ πρὸς τὸ $Z\Delta$, οὕτως ἡ HE πρὸς τὴν EZ . ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

κβ'.

- 5 Τὸ ἀπὸ μέσης παρὰ ῥητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ ῥητὴν καὶ ἀσύμμετρον τῇ, παρ' ἣν παρράκειται, μήκει.

Ἔστω μέση μὲν ἡ A , ῥητὴ δὲ ἡ GB , καὶ τῷ ἀπὸ τῆς A ἴσον παρὰ τὴν $BΓ$ παραβεβλήσθω χωρίον ὀρθο-
10 γώνιον τὸ $B\Delta$ πλάτος ποιῶν τὴν $\Gamma\Delta$. λέγω, ὅτι ῥητὴ ἐστὶν ἡ $\Gamma\Delta$ καὶ ἀσύμμετρος τῇ GB μήκει.

Ἐπεὶ γὰρ μέση ἐστὶν ἡ A , δύναται χωρίον περι-
εχόμενον ὑπὸ ῥητῶν δυνάμει μόνον συμμέτρων.
δυνάσθω τὸ HZ . δύναται δὲ καὶ τὸ $B\Delta$. ἴσον ἄρα
15 ἐστὶ τὸ $B\Delta$ τῷ HZ . ἔστι δὲ αὐτῷ καὶ ἰσογώνιον.
τῶν δὲ ἴσων τε καὶ ἰσογωνίων παραλληλογράμμων
ἀντιπεπόνθασιν αἱ πλευραὶ αἱ περὶ τὰς ἴσας γωνίας.
ἀνάλογον ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ $BΓ$ πρὸς τὴν EH , οὕτως
ἡ EZ πρὸς τὴν $\Gamma\Delta$. ἔστιν ἄρα καὶ ὡς τὸ ἀπὸ τῆς
20 $BΓ$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς EH , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς EZ πρὸς
τὸ ἀπὸ τῆς $\Gamma\Delta$. σύμμετρον δὲ ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς GB
τῷ ἀπὸ τῆς EH . ῥητὴ γάρ ἐστιν ἑκατέρα αὐτῶν. σύμ-
μετρον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς EZ τῷ ἀπὸ τῆς $\Gamma\Delta$.
ῥητὸν δὲ ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς EZ . ῥητὸν ἄρα ἐστὶ καὶ
25 τὸ ἀπὸ τῆς $\Gamma\Delta$. ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ $\Gamma\Delta$. καὶ ἐπεὶ
ἀσύμμετρός ἐστὶν ἡ EZ τῇ EH μήκει. δυνάμει γὰρ
μόνον εἰσὶ σύμμετροι. ὡς δὲ ἡ EZ πρὸς τὴν EH ,

2. $Z\Delta$] corr. ex ΔZ V, ΔZ BFb. HE] in ras. V. ὅπερ
ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. Theon (BFVb). 6. σύμμετρον P.
corr. m. 2. τῇ] corr. ex τι m. rec. b. 8. καὶ — 9. χωρίον]
in ras. F. 9. ὀρθογώνιον] m. rec. V. 13. μόνον] in ras. F.


similiter etiam $HE \times EZ : EZ^2 = HA : ZA = HE : EZ$;
quod erat demonstrandum.

XXII.

Quadratum mediae rationali adplicatum latitudinem facit rationalem et ei, cui adplicatum est, longitudine incommensurabilem.

Sit media A , rationalis autem ΓB , et quadrato A^2 aequale rectae $B\Gamma$ adplicetur spatium rectangulum $B\Delta$ latitudinem faciens $\Gamma\Delta$. dico, $\Gamma\Delta$ rationalem esse et rectae ΓB longitudine incommensurabilem.

nam quoniam media est A , quadrata aequalis est spatio rectis potentia tantum commensurabilibus comprehenso [prop. XXI]. sit quadrata aequalis HZ . uerum quadrata etiam spatio $B\Delta$ aequalis est. itaque $B\Delta = HZ$. uerum idem ei aequiangulum est. parallelogrammorum autem aequalium et aequiangulorum latera aequales angulos comprehendunt in contraria proportionem sunt [VI, 14]. itaque $B\Gamma : EH = EZ : \Gamma\Delta$. quare etiam $B\Gamma^2 : EH^2 = EZ^2 : \Gamma\Delta^2$ [VI, 20]. uerum ΓB^2 et EH^2 commensurabilia sunt; nam utraque rationalis est. quare etiam EZ^2 et $\Gamma\Delta^2$ commensurabilia sunt [prop. XI]. uerum EZ^2 rationale est; quare etiam $\Gamma\Delta^2$ rationale est [def. 4]. itaque $\Gamma\Delta$ rationalis est. et quoniam EZ , EH longitudine incommensurabiles sunt (nam potentia tantum commensurabiles sunt), et est



14. δύναται] δύνασθαι b. ΔB P. 15. ἐστίν P. ΔB P.
ἐστίν PB. αὐτό FV. 16. τε] corr. ex δέ m. 1 P, om.
FV. 21. ΓB] e corr. V, $B\Gamma$ F. 23. ἐστίν P. 24. ἐστίν P.
ἐστίν P. 25. ἐστίν] postea ins. F. 26. HE F.

οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς EZ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ZE , EH ,
 ἀσύμμετρον ἄρα [ἐστὶ] τὸ ἀπὸ τῆς EZ τῷ ὑπὸ τῶν
 ZE , EH . ἀλλὰ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς EZ σύμμετρόν ἐστι
 τὸ ἀπὸ τῆς $\Gamma\Delta$. ῥηταὶ γάρ εἰσι δυνάμει· τῷ δὲ ὑπὸ
 5 τῶν ZE , EH σύμμετρόν ἐστι τὸ ὑπὸ τῶν $\Delta\Gamma$, ΓB .
 ἴσα γάρ ἐστι τῷ ἀπὸ τῆς A · ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ καὶ
 τὸ ἀπὸ τῆς $\Gamma\Delta$ τῷ ὑπὸ τῶν $\Delta\Gamma$, ΓB . ὥς δὲ τὸ ἀπὸ
 τῆς $\Gamma\Delta$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $\Delta\Gamma$, ΓB , οὕτως ἐστὶν ἡ
 $\Delta\Gamma$ πρὸς τὴν ΓB · ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ $\Delta\Gamma$ τῇ
 10 ΓB μήκει. ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ $\Gamma\Delta$ καὶ ἀσύμμετρος τῇ
 ΓB μήκει· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

κγ'.

Ἡ τῇ μέσῃ σύμμετρος μέσῃ ἐστίν.

Ἔστω μέσῃ ἡ A , καὶ τῇ A σύμμετρος ἔστω ἡ B .
 15 λέγω, ὅτι καὶ ἡ B μέσῃ ἐστίν.

Ἐκκείσθω γὰρ ῥητὴ ἡ $\Gamma\Delta$, καὶ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς
 A ἴσον παρὰ τὴν $\Gamma\Delta$ παραβεβλήσθω χωρίον ὀρθο-
 γώνιον τὸ ΓE πλάτος ποιῶν τὴν $E\Delta$. ῥητὴ ἄρα
 ἐστὶν ἡ $E\Delta$ καὶ ἀσύμμετρος τῇ $\Gamma\Delta$ μήκει. τῷ δὲ
 20 ἀπὸ τῆς B ἴσον παρὰ τὴν $\Gamma\Delta$ παραβεβλήσθω χωρίον
 ὀρθογώνιον τὸ ΓZ πλάτος ποιῶν τὴν ΔZ . ἐπεὶ
 οὖν σύμμετρός ἐστὶν ἡ A τῇ B , σύμμετρόν ἐστι καὶ
 τὸ ἀπὸ τῆς A τῷ ἀπὸ τῆς B . ἀλλὰ τῷ μὲν ἀπὸ
 τῆς A ἴσον ἐστὶ τὸ $E\Gamma$, τῷ δὲ ἀπὸ τῆς B ἴσον ἐστὶ
 25 τὸ ΓZ · σύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ $E\Gamma$ τῷ ΓZ . καὶ

2. ἐστὶν ἄρα FV. ἐστὶ] om. P. 3. τῷ] corr. ex τό V.
 ἐστὶ] om. V. 4. εἰσιν P. δυνάμει] eras. V, dein add. ὥς
 ἄρα δέδεικται. 5. συμμέτρων P, corr. m. 1. ἐστὶ] om.
 BFb. 6. εἰσι BVb. σύμμετρον F, sed corr. ἐστὶν P. 7.
 ΓB περιεχομένῳ V. 8. $\Gamma\Delta$] $\Delta\Gamma$ F. 9. ΓB] ΓA b. ἐστὶν]
 om. b. 11. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] om. BFb, comp. P. 12. κγ']


$EZ:EH = EZ^2:ZE \times EH$ [u. lemma], EZ^2 et $ZE \times EH$ incommensurabilia erunt [prop. XI]. uerum EZ^2 et $\Gamma\Delta^2$ commensurabilia sunt (nam potentia rationales sunt); et $ZE \times EH$, $\Delta\Gamma \times \Gamma B$ commensurabilia sunt (nam quadrato A^2 aequalia sunt). itaque etiam $\Gamma\Delta^2$ et $\Delta\Gamma \times \Gamma B$ incommensurabilia sunt [prop. XIII]. uerum $\Gamma\Delta^2: \Delta\Gamma \times \Gamma B = \Delta\Gamma: \Gamma B$ [u. lemma]. itaque $\Delta\Gamma$, ΓB longitudine incommensurabiles sunt [prop. XI]. ergo $\Gamma\Delta$ rationalis est et rectae ΓB longitudine incommensurabilis; quod erat demonstrandum.

XXIII.

Recta mediae commensurabilis media est.

Sit media A , et rectae A commensurabilis sit B . dico, etiam B mediam esse.

ponatur enim rationalis $\Gamma\Delta$, et quadrato A^2 aequale rectae $\Gamma\Delta$ adplicetur spatium rectangulum ΓE latitudinem faciens $E\Delta$. itaque $E\Delta$ rationalis est et rectae $\Gamma\Delta$ longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. quadrato autem B^2 aequale rectae $\Gamma\Delta$ adplicetur spatium rectangulum ΓZ latitudinem faciens ΔZ . iam quoniam A et B commensurabiles sunt, etiam A^2 et B^2 commensurabilia sunt. uerum $A^2 = E\Gamma$, $B^2 = \Gamma Z$. itaque $E\Gamma$, ΓZ commensurabilia sunt. et $E\Gamma: \Gamma Z = E\Delta: \Delta Z$ [VI, 1]. itaque $E\Delta$, ΔZ longitudine commen-



om. P. 14. $\xi\sigma\omega$] (alt.) om. BFb. 16. $\tau\tilde{\omega}$] $\tau\acute{o}$ F. 20. $\Delta\Gamma$ BVb. 21. ΓZ] corr. ex EZ F. $Z\Delta$ P. $\xi\eta$] P, corr. m. rec. 22. $\xi\sigma\iota$] postea ins. F, $\xi\sigma\iota\upsilon$ P. 23. A] corr. ex AB V, A $\xi\sigma\iota$ F. 24. $\xi\sigma\iota$] (alt.) om. Vb. 25. ΓZ] (prius) Z in ras. m. 1 P.

ἐστὶν ὡς τὸ $EΓ$ πρὸς τὸ $ΓΖ$, οὕτως ἡ $EΔ$ πρὸς τὴν $ΔΖ$ · σύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ $EΔ$ τῇ $ΔΖ$ μήκει. φητὴ δέ ἐστιν ἡ $EΔ$ καὶ ἀσύμμετρος τῇ $ΔΓ$ μήκει· φητὴ ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ $ΔΖ$ καὶ ἀσύμμετρος τῇ $ΔΓ$ μήκει· αἱ
 5 $ΓΔ$, $ΔΖ$ ἄρα φηταὶ εἶσι δυνάμει μόνον σύμμετροι. ἡ δὲ τὸ ὑπὸ φητῶν δυνάμει μόνον συμμέτρων δυναμένη μέση ἐστίν. ἡ ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν $ΓΔ$, $ΔΖ$ δυναμένη μέση ἐστίν· καὶ δύναται τὸ ὑπὸ τῶν $ΓΔ$, $ΔΖ$ ἡ B · μέση ἄρα ἐστὶν ἡ B .

Πόρισμα.

- 10 Ἐκ δὴ τούτου φανερόν, ὅτι τὸ τῷ μέσῳ χωρίῳ σύμμετρον μέσον ἐστίν [δύνανται γὰρ αὐτὰ εὐθεῖαι, αἱ εἰσι δυνάμει σύμμετροι, ὧν ἡ ἑτέρα μέση· ὥστε καὶ ἡ λοιπὴ μέση ἐστίν].
- 15 Ὡσαύτως δὲ τοῖς ἐπὶ τῶν φητῶν εἰρημένοις καὶ ἐπὶ τῶν μέσων ἐξακολουθεῖ, τὴν τῇ μέσῃ μήκει σύμμετρον λέγεσθαι μέσῃν καὶ σύμμετρον αὐτῇ μὴ μόνον μήκει, ἀλλὰ καὶ δυνάμει, ἐπειδὴ περ καθόλου αἱ μήκει σύμμετροι πάντως καὶ δυνάμει. ἐὰν δὲ τῇ μέσῃ σύμ-
- 20 μετρός τις ᾗ δυνάμει, εἰ μὲν καὶ μήκει, λέγονται καὶ οὕτως μέσαι καὶ σύμμετροι μήκει καὶ δυνάμει, εἰ δὲ δυνάμει μόνον, λέγονται μέσαι δυνάμει μόνον σύμμετροι.

4. ἐστίν PB. 5. εἰσιν PB. 6. ἡ δὲ τό] τὸ δὲ BFVb. Post συμμέτρων add. εὐθειῶν περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἄλογόν ἐστι καὶ b, F mg. m. 1, V m. 2; deinde seq. αὐτὸ ἄλογόν ἐστι, καλεῖσθαι δὲ b, F mg. m. 1; ἡ δυναμένη αὐτὸ ἄλογός ἐστιν, καλεῖται δὲ μέση V m. 2. ἡ δυναμένη BFb, et V (del. punctis). 7. μέση] supra scr. F. μέση ἐστίν] punctis del. V. ἡ] m. 2 B. δυναμένη] δυνάμει ἡ b. 8. ἐστὶ Vb, comp. F. 9. ἡ B] (prius) HB Bb. 12. ἐστὶ BV, comp. F. αὐτά] -τά in ras. V, αὐτῷ F, αὐτό αἱ B, αἱ add. m. 2 V. 13. εἰσιν

surabiles sunt [prop. XI]. uerum $E\Delta$ rationalis est et rectae $\Delta\Gamma$ longitudine incommensurabilis. itaque etiam ΔZ rationalis est [def. 3] et rectae $\Delta\Gamma$ longitudine incommensurabilis [prop. XIII]. itaque $\Gamma\Delta$, ΔZ rationales sunt potentia tantum commensurabiles. recta autem quadrata aequalis spatio rectis potentia tantum commensurabilibus comprehenso media est [prop. XXI]. itaque recta quadrata spatio $\Gamma\Delta \times \Delta Z$ aequalis media est. et $B^2 = \Gamma\Delta \times \Delta Z$. ergo B media est.

Corollarium.

Hinc manifestum est, spatium spatio medio aequale medium esse.¹⁾

Lemma.

Congruenter iis, quae de rationalibus diximus [prop. XVIII coroll.], etiam in mediis sequitur, rectam mediae longitudine commensurabilem mediam uocari ei non modo longitudine, sed etiam potentia commensurabilem, quoniam omnino rectae longitudine commensurabiles semper etiam potentia commensurabiles sunt. sin recta mediae potentia commensurabilis est, si eadem longitudine est commensurabilis, sic quoque mediae et longitudine potentiaque commensurabiles uocantur, sin potentia tantum, mediae potentia tantum commensurabiles uocantur.

1) Sequentia lin. 12—14 obscura sunt et sine dubio subditiua.

PB. 20. εἰ μὲν — 21. δὲ δυνάμει] om. Fb; post σύμμετροι lin. 22 ea hab. V (punctis del., add. τὸ δὲ ἐξ ἧς οὐχ ἐκείνη ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ ἔφεσλου καὶ ἐπατήθη?) et B mg. m. 2 (add. in fine μόνον). 22. μόνον] (prius) del. m. 2 B. σύμμετροι] m. 2 B. Seq. lemma, u. app.

κδ'.

Τὸ ὑπὸ μέσων μήκει συμμετρων εὐθειῶν κατὰ τινὰ τῶν εἰρημένων τρόπων περιεχόμενον ὀρθογώνιον μέσον ἐστίν.

- 5 Ὑπὸ γὰρ μέσων μήκει συμμετρων εὐθειῶν τῶν AB , $B\Gamma$ περιεχέσθω ὀρθογώνιον τὸ $ΑΓ$. λέγω, ὅτι τὸ $ΑΓ$ μέσον ἐστίν.

Ἀναγεγράφθω γὰρ ἀπὸ τῆς AB τετράγωνον τὸ $ΑΔ$. μέσον ἄρα ἐστὶ τὸ $ΑΔ$. καὶ ἐπεὶ σύμμετρος 10 ἐστὶν ἡ AB τῇ $B\Gamma$ μήκει, ἴση δὲ ἡ AB τῇ $BΔ$, σύμμετρος ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ $ΔB$ τῇ $B\Gamma$ μήκει· ὥστε καὶ τὸ $ΔΑ$ τῷ $ΑΓ$ σύμμετρόν ἐστιν. μέσον δὲ τὸ $ΔΑ$ μέσον ἄρα καὶ τὸ $ΑΓ$. ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

κε'.

- 15 Τὸ ὑπὸ μέσων δυνάμει μόνον συμμετρων εὐθειῶν περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἥτοι ρητὸν ἢ μέσον ἐστίν.

Ὑπὸ γὰρ μέσων δυνάμει μόνον συμμετρων εὐθειῶν τῶν AB , $B\Gamma$ ὀρθογώνιον περιεχέσθω τὸ $ΑΓ$. 20 λέγω, ὅτι τὸ $ΑΓ$ ἥτοι ρητὸν ἢ μέσον ἐστίν.

Ἀναγεγράφθω γὰρ ἀπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ τετράγωνα τὰ $ΑΔ$, BE . μέσον ἄρα ἐστὶν ἐκάτερον τῶν $ΑΔ$, BE . καὶ ἐκκείσθω ρητὴ ἡ ZH , καὶ τῷ μὲν $ΑΔ$ ἴσον παρατὴν ZH παραβεβλήσθω ὀρθογώνιον παραλληλόγραμ- 25 μον τὸ $HΘ$ πλάτος ποιοῦν τὴν $ZΘ$, τῷ δὲ $ΑΓ$ ἴσον παρὰ τὴν $ΘM$ παραβεβλήσθω ὀρθογώνιον παραλλη-


8. κατὰ — τρόπων] om. B F b, supra scr. m. 2 V (κατὰ τινὰ τῶν eras.). 6. περιέχσθαι B, corr. m. 2. 9. $ΑΔ$] (prius) inter A et $Δ$ ras. 1 litt. V. 11. ἐστίν PB. $ΔB$] e corr. m. 2 V, $BΔ$ F. 12. ἐστὶ V, comp. F b. $ΔΑ$] e corr. m. 2 V. 16. εὐθειῶν] m. 2 V. 19. περιεχέσθω ὀρθογώνιον P.

XXIV.

Rectangulum rectis mediis comprehensum secundum aliquem modorum, quos diximus [u. lemma], commensurabilibus medium est.

Mediis enim AB , $B\Gamma$ longitudine commensurabilibus comprehendatur rectangulum $A\Gamma$. dico, $A\Gamma$ medium esse.



nam in AB quadratum describatur AA . itaque AA medium est. et quoniam AB , $B\Gamma$ longitudine commensurabiles sunt, et $AB = B\Delta$, etiam ΔB , $B\Gamma$ longitudine commensurabiles sunt. quare etiam ΔA , $A\Gamma$ commensurabilia sunt [VI, 1; prop. XI]. uerum ΔA medium est. ergo etiam $A\Gamma$ medium est [prop. XXIII coroll.]; quod erat demonstrandum.



XXV.

Rectangulum rectis mediis potentia tantum commensurabilibus comprehensum aut rationale aut medium est.

Rectis enim mediis AB , $B\Gamma$ potentia tantum commensurabilibus comprehendatur rectangulum $A\Gamma$. dico, $A\Gamma$ aut rationale aut medium esse.



nam in AB , $B\Gamma$ quadrata describantur AA , BE . itaque utrumque AA , BE medium est. et ponatur rationalis ZH , et quadrato AA aequale rectae ZH applicetur parallelogrammum rect-

περιέχεται B, corr. m. 2. 20. ἔστιν ἡ μέσον V. 23. ZE F, corr. m. 2. τῷ] corr. ex τό V. 25. τήν] corr. ex τό m. 2. F

λόγραμμον τὸ MK πλάτος ποιοῦν τὴν ΘK , καὶ ἐτι
 τῷ BE ἴσον ὁμοίως παρὰ τὴν KN παραβέβλησθω
 τὸ NA πλάτος ποιοῦν τὴν KA . ἐπ' εὐθείας ἄρα
 εἰσὶν αἱ $Z\Theta$, ΘK , KA . ἐπεὶ οὖν μέσον ἐστὶν ἐκά-
 5 τερον τῶν AA , BE , καὶ ἐστὶν ἴσον τὸ μὲν AA τῷ
 $H\Theta$, τὸ δὲ BE τῷ NA , μέσον ἄρα καὶ ἐκάτερον τῶν
 $H\Theta$, NA . καὶ παρὰ ῥητὴν τὴν ZH παράκειται ῥητὴ
 ἄρα ἐστὶν ἐκάτερα τῶν $Z\Theta$, KA καὶ ἀσύμμετρος τῇ
 ZH μήκει. καὶ ἐπεὶ σύμμετρόν ἐστι τὸ AA τῷ BE ,
 10 σύμμετρον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ $H\Theta$ τῷ NA . καὶ ἐστὶν
 ὡς τὸ $H\Theta$ πρὸς τὸ NA , οὕτως ἡ $Z\Theta$ πρὸς τὴν KA .
 σύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ $Z\Theta$ τῇ KA μήκει. αἱ $Z\Theta$, KA
 ἄρα ῥηταὶ εἰσι μήκει σύμμετροι· ῥητὸν ἄρα ἐστὶ τὸ
 ὑπὸ τῶν $Z\Theta$, KA . καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ μὲν AB τῇ
 15 BA , ἡ δὲ ΞB τῇ $B\Gamma$, ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ AB πρὸς τὴν
 $B\Gamma$, οὕτως ἡ AB πρὸς τὴν $B\Xi$. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ AB
 πρὸς τὴν $B\Gamma$, οὕτως τὸ AA πρὸς τὸ AG . ὡς δὲ ἡ
 AB πρὸς τὴν $B\Xi$, οὕτως τὸ AG πρὸς τὸ $\Gamma\Xi$. ἐστὶν
 ἄρα ὡς τὸ AA πρὸς τὸ AG , οὕτως τὸ AG πρὸς τὸ
 20 $\Gamma\Xi$. ἴσον δέ ἐστι τὸ μὲν AA τῷ $H\Theta$, τὸ δὲ AG
 τῷ MK , τὸ δὲ $\Gamma\Xi$ τῷ NA . ἐστὶν ἄρα ὡς τὸ $H\Theta$
 πρὸς τὸ MK , οὕτως τὸ MK πρὸς τὸ NA . ἐστὶν ἄρα
 καὶ ὡς ἡ $Z\Theta$ πρὸς τὴν ΘK , οὕτως ἡ ΘK πρὸς τὴν
 KA . τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν $Z\Theta$, KA ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς
 25 ΘK . ῥητὸν δὲ τὸ ὑπὸ τῶν $Z\Theta$, KA . ῥητὸν ἄρα ἐστὶ
 καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΘK . ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ΘK . καὶ εἰ
 μὲν σύμμετρός ἐστι τῇ ZH μήκει, ῥητὸν ἐστὶ τὸ ΘN .

2. ἴσον — KN] mg. m. 1 F, in textu ἄλλω παρὰ τὴν
 KN . 4. αἱ] corr. ex ται F m. 1, supra m. 2 P. 6. NA]
 N e corr. V. ἄρα ἐστὶ V. 7. NA] MA b et F (M in ras.).
 Ante ῥητὴ ras. 5 litt. V. 8. ἐστὶν] ἐστὶ καὶ V. 9. καὶ ἐπεὶ]
 ἐπεὶ οὖν Theon (BFVb). 10. ἐστὶν P. τό] m. 2 F. ΘH F.

angulum $H\Theta$ latitudinem faciens $Z\Theta$, rectangulo autem $A\Gamma$ aequale rectae ΘM adplicetur parallelogrammum rectangulum MK latitudinem faciens ΘK , et praeterea quadrato BE aequale similiter rectae KN adplicetur NA latitudinem faciens KA . itaque $Z\Theta$, ΘK , KA in eadem recta sunt. iam quoniam utrumque AA , BE medium est, et $AA = H\Theta$, $BE = NA$, etiam utrumque $H\Theta$, NA medium est. et rationali ZH adplicata sunt. itaque utraque $Z\Theta$, KA rationalis est et rectae ZH longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. et quoniam AA , BE commensurabilia sunt, etiam $H\Theta$, NA commensurabilia sunt. et $H\Theta : NA = Z\Theta : KA$ [VI, 1]. itaque $Z\Theta$, KA longitudine commensurabiles sunt [prop. XI]. itaque $Z\Theta$, KA rationales sunt longitudine commensurabiles. itaque $Z\Theta \times KA$ rationale est [prop. XIX]. et quoniam $AB = BA$, $B\Xi = B\Gamma$, erit $AB : B\Gamma = AB : B\Xi$. uerum $AB : B\Gamma = AA : A\Gamma$ [VI, 1], et $AB : B\Xi = A\Gamma : \Gamma\Xi$ [VI, 1]. quare $AA : A\Gamma = A\Gamma : \Gamma\Xi$. uerum $AA = H\Theta$, $A\Gamma = MK$, $\Gamma\Xi = NA$. ergo $H\Theta : MK = MK : NA$. quare etiam $Z\Theta : \Theta K = \Theta K : KA$ [VI, 1]. itaque $Z\Theta \times KA = \Theta K^2$ [VI, 17]. uerum $Z\Theta \times KA$ rationale est. quare etiam ΘK^2 rationale est. itaque ΘK rationalis est. et si rectae ZH longitudine commensurabilis est, ΘN rationale est [prop. XIX]; sin

$\kappa\alpha\iota$] om. FV. Post $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$ add. $\acute{\alpha}\rho\alpha$ $\kappa\alpha\iota$ V. 11. $\Theta H F$. $\tau\acute{o}\nu$ P, sed corr. AN e corr. m. 2 V. $\tau\acute{\eta}\nu$] om. Bb. 13. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$ P. 14. AB] e corr. Vb. 15. $B\Xi B$] corr. ex ZB V. AB] BA F. 16. $B\Xi$] corr. ex BZ P. 17. $\tau\acute{\eta}\nu$] corr. in $\tau\acute{o}$ F, $\tau\acute{o}$ b. 18. $B\Xi B$ B. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$ — 20. $\Gamma\Xi$] mg. m. 2 B. 19. AA] in ras. V. $A\Gamma$] (alt.) ΓA F. 20. $\Gamma\Xi$] in ras. V. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$ P. 24. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$ P. 25. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$ PB. 27. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ P. Post $\tau\acute{\eta}$ add. ΘM $\tau\acute{o}\upsilon\tau\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ $\tau\acute{\eta}$ V, B. m. 2 (del. m. rec.). ΘN] e corr. m. 2 V.

εἰ δὲ ἀσύμμετρός ἐστι τῇ ZH μήκει, αἱ $K\Theta$, ΘM φηταί
εἶσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· μέσον ἄρα τὸ ΘN . τὸ
 ΘN ἄρα ἥτοι φητὸν ἢ μέσον ἐστίν. ἴσον δὲ τὸ ΘN
τῷ AG . τὸ AG ἄρα ἥτοι φητὸν ἢ μέσον ἐστίν.

5 Τὸ ἄρα ὑπὸ μέσων δυνάμει μόνον συμμέτρων, καὶ
τὰ ἐξῆς.

κς'.

Μέσον μέσου οὐχ ὑπερέχει φητῶ.

Εἰ γὰρ δυνατόν, μέσον τὸ AB μέσου τοῦ AG
10 ὑπερεχέτω φητῶ τῷ AB , καὶ ἐκλείσθω φητὴ ἡ EZ ,
καὶ τῷ AB ἴσον παρὰ τὴν EZ παραβεβλήσθω παρ-
αλληλόγραμμον ὀρθογώνιον τὸ $Z\Theta$ πλάτος ποιῶν
τὴν $E\Theta$, τῷ δὲ AG ἴσον ἀφωρήσθω τὸ ZH . λοιπὸν
ἄρα τὸ BA λοιπῷ τῷ $K\Theta$ ἐστὶν ἴσον. φητὸν δὲ ἐστὶ
15 τὸ AB . φητὸν ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ $K\Theta$. ἐπεὶ οὖν μέσον
ἐστὶν ἐκάτερον τῶν AB , AG , καὶ ἐστὶ τὸ μὲν AB τῷ
 $Z\Theta$ ἴσον, τὸ δὲ AG τῷ ZH , μέσον ἄρα καὶ ἐκάτερον
τῶν $Z\Theta$, ZH . καὶ παρὰ φητὴν τὴν EZ παράκειται·
φητὴ ἄρα ἐστὶν ἐκάτερα τῶν ΘE , EH καὶ ἀσύμμετρος
20 τῇ EZ μήκει. καὶ ἐπεὶ φητόν ἐστι τὸ AB καὶ ἐστὶν
ἴσον τῷ $K\Theta$, φητὸν ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ $K\Theta$. καὶ παρὰ
φητὴν τὴν EZ παράκειται· φητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ $H\Theta$ καὶ
σύμμετρος τῇ EZ μήκει. ἀλλὰ καὶ ἡ EH φητὴ ἐστὶ

1. $K\Theta$] corr. in ΘK m. 2 V. ΘN B, ΘM ἄρα P. 2.
εἶσιν PB. ΘN] in ras. V. 3. ἥτοι] om. Fb. ἐστὶν ἢ
μέσον V. 4. ἐστὶ BV, comp. Fb. 5. τὸ ἄρα] τῶν δὲ F.
μόνων F. καὶ τὰ ἐξῆς] εὐθειῶν περιεχόμενον ὀρθογώνιον
ἥτοι φητόν ἢ μέσον ἐστίν: ~ P. 6. Post ἐξῆς add. ὅπερ ἔδει
δειξαι V. 7. καὶ P, corr. m. rec. 10. ὑπερέχει F, sed corr.
11. τῷ] τῷ μὲν B, τὸ μὲν b. 14. ΘK F. 15. AB] in
ras. V. ἐστὶν P. ΘK b. 16. ἐστὶ] ἐστὶν B. 17. καὶ]
om. b. 18. παράκειται V. 21. ἐστὶ] ἐστὶν P. 22. Post
καὶ ras. 1 litt. V.

rectae ZH longitudine incommensurabilis est, $K\Theta$, ΘM rationales sunt potentia tantum commensurabiles; quare ΘN medium est [prop. XXI]. ΘN igitur aut rationale aut medium est. uerum $\Theta N = A\Gamma$. $A\Gamma$ igitur aut rationale est aut medium.

Ergo rectangulum mediis potentia tantum commensurabilibus, et quae sequuntur.

XXVI.

Spatium medium non excedit medium spatio rationali.

Si enim fieri potest, medium AB excedat medium $A\Gamma$ rationali ΔB , et ponatur rationalis EZ , et spatio AB aequale rectae EZ adplicetur parallelogrammum rectangulum $Z\Theta$ latitudinem faciens $E\Theta$, spatio autem $A\Gamma$ aequale subtrahatur ZH . itaque relinquitur $B\Delta = K\Theta$. uerum ΔB rationale est. itaque etiam $K\Theta$ rationale est. iam quoniam utrumque AB , $A\Gamma$ medium est, et $AB = Z\Theta$, $A\Gamma = ZH$, etiam utrumque $Z\Theta$, ZH medium est. et rectae rationali EZ adplicata sunt. ergo utraque ΘE , EH rationalis est et rectae EZ longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. et quoniam ΔB rationale est et spatio $K\Theta$ aequale, etiam $K\Theta$ rationale est.¹⁾ et rectae rationali EZ adplicata est; itaque $H\Theta$ rationalis est et rectae EZ longitudine commensurabilis [prop. XX]. uerum etiam

1) Uerba τὸ ΔB lin. 20 — ἐστὶ καὶ lin. 21 post lin. 14—15 superuacua sunt et fortasse interpolata. uerba ἕτην δὲ lin. 14 — τὸ $K\Theta$ lin. 15 damnavit August.

καὶ ἀσύμμετρος τῇ EZ μήκει· ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν
 ἢ EH τῇ $H\Theta$ μήκει. καὶ ἐστὶν ὥς ἡ EH πρὸς τὴν
 $H\Theta$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς EH πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν EH ,
 $H\Theta$ · ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς EH τῷ ὑπὸ
 5 τῶν EH , $H\Theta$. ἀλλὰ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς EH σύμμετρά
 ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν EH , $H\Theta$ τετράγωνα· φητὰ γὰρ ἀμ-
 φότερα· τῷ δὲ ὑπὸ τῶν EH , $H\Theta$ σύμμετρόν ἐστὶ τὸ
 δις ὑπὸ τῶν EH , $H\Theta$ · διπλάσιον γάρ ἐστιν αὐτοῦ·
 ἀσύμμετρα ἄρα ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν EH , $H\Theta$ τῷ δις ὑπὸ
 10 τῶν EH , $H\Theta$ · καὶ συναμφότερα ἄρα τὰ τε ἀπὸ τῶν
 EH , $H\Theta$ καὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν EH , $H\Theta$, ὅπερ ἐστὶ τὸ
 ἀπὸ τῆς $E\Theta$, ἀσύμμετρόν ἐστι τοῖς ἀπὸ τῶν EH , $H\Theta$.
 φητὰ δὲ τὰ ἀπὸ τῶν EH , $H\Theta$ ἄλογον ἄρα τὸ ἀπὸ
 τῆς $E\Theta$. ἄλογος ἄρα ἐστὶν ἢ $E\Theta$. ἀλλὰ καὶ φητὴ·
 15 ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον.

Μέσον ἄρα μέσου οὐχ ὑπερέχει φητῷ· ὅπερ ἔδει
 δεῖξαι.

κζ'.

Μέσας εὐρεῖν δυνάμει μόνον συμμέτρους
 20 φητὸν περιεχούσας.

Ἐκκείσθωσαν δύο φηταὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι
 αἱ A , B , καὶ εἰλήφθω τῶν A , B μέση ἀνάλογον ἢ Γ ,
 καὶ γεγονέτω ὥς ἡ A πρὸς τὴν B , οὕτως ἢ Γ πρὸς
 τὴν Δ .

25 Καὶ ἐπεὶ αἱ A , B φηταὶ εἶσι δυνάμει μόνον σύμ-
 μετροι, τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν A , B , τουτέστι τὸ ἀπὸ τῆς Γ ,
 μέσον ἐστίν. μέση ἄρα ἢ Γ . καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὥς ἡ A
 πρὸς τὴν B , [οὕτως] ἢ Γ πρὸς τὴν Δ , αἱ δὲ A , B

4. ἀσύμμετρον b. τό] e corr. b. 7. τό] corr. ex τῷ B.

8. τῶν om. BF. 9. ἐστίν P. 10. τῶν] (prius) om. B. 11.
 τῶν] m. 2 F, om. B. ἐστίν PB. τὸ ἀπό] in ras. m. 1 P,

EH rationalis est et rectae EZ longitudine incommensurabilis. quare EH , $H\Theta$ longitudine incommensurabiles sunt [prop. XIII]. et $EH:H\Theta=EH^2:EH\times H\Theta$ [prop. XXI lemma]. quare EH^2 , $EH\times H\Theta$ incommensurabilia sunt [prop. XI]. uerum quadrato EH^2 commensurabilia sunt $EH^2+H\Theta^2$ (nam utrumque rationale est); et spatio $EH\times H\Theta$ commensurabile est $2\ EH\times H\Theta$ [prop. VI]; nam eo duplo maius est. itaque $EH^2+H\Theta^2$ et $2\ EH\times H\Theta$ incommensurabilia sunt [prop. XIII]. itaque etiam $EH^2+H\Theta^2+2\ EH\times H\Theta$, hoc est $E\Theta^2$ [II, 4], quadratis $EH^2+H\Theta^2$ incommensurabile est [prop. XVI]. uerum $EH^2+H\Theta^2$ rationalia sunt. quare $E\Theta^2$ irrationale est [def. 4]. itaque $E\Theta$ irrationalis est [id.]. uerum eadem rationalis est; quod fieri non potest.

Ergo spatium medium non excedit medium spatio rationali; quod erat demonstrandum.

XXVII.

Medias inuenire potentia tantum commensurabiles spatium rationale comprehendentes.

Ponantur duae rationales potentia tantum commensurabiles A , B , et sumatur earum media proportionalis Γ [VI, 13], et fiat $A:B=\Gamma:\Delta$ [VI, 12]. et quoniam A , B rationales sunt potentia tantum commensurabiles, $A\times B$ medium erit [prop. XXI], hoc est Γ^2 [VI, 17].

τὰ ἀπό b. 13. ῥητά — $H\Theta$] mg. m. 1 P. Seq. ras. 1 litt. V.
 14. ἄλογον b. 15. ἀδύνατον] -ατον in ras. V. 16. μέσον
 — 17. δεῖξαι] om. BFb; μέσον ἄρα μέσον in ras. m. 2 V;
 μέσον ἄρα μέσον οὐχ ὑπερέχει m. 2 B, καὶ τὰ ἐξῆς add. m.
 rec. 16. ὅπερ εἶδει δεῖξαι] comp. P. 18. κς' P, corr. m.
 rec. 25. εἰσιν PB. 26. τουτέστιν P. 27. ἐστίν] comp. Fb,
 ἐστὶ PBV. 28. οὕτως] om. P.

δυνάμει μόνον [εἰσὶ] σύμμετροι, καὶ αἱ Γ , Δ ἄρα δυνάμει μόνον εἰσὶ σύμμετροι. καὶ ἐστὶ μέση ἡ Γ μέση ἄρα καὶ ἡ Δ . αἱ Γ , Δ ἄρα μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι. λέγω, ὅτι καὶ ρητὸν περιέχουσιν.
 5 ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὡς ἡ A πρὸς τὴν B , οὕτως ἡ Γ πρὸς τὴν Δ , ἐναλλάξ ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ A πρὸς τὴν Γ , ἡ B πρὸς τὴν Δ . ἀλλ' ὡς ἡ A πρὸς τὴν Γ , ἡ Γ πρὸς τὴν B · καὶ ὡς ἄρα ἡ Γ πρὸς τὴν B , οὕτως ἡ B πρὸς τὴν Δ · το ἄρα ὑπὸ τῶν Γ , Δ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς B . ρη-
 10 τὸν δὲ τὸ ἀπὸ τῆς B ρητὸν ἄρα [ἐστὶ] καὶ τὸ ὑπὸ τῶν Γ , Δ .

Εὐρίηται ἄρα μέσαι δυνάμει μόνον σύμμετροι ρητὸν περιέχουσιν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

κη'.

15 Μέσας εὐρεῖν δυνάμει μόνον συμμέτρους μέσον περιεχούσας.

Ἐκκείσθωσαν [τρεις] ρηταὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι αἱ A , B , Γ , καὶ εἰλήφθω τῶν A , B μέση ἀνάλογον ἡ Δ , καὶ γερονέτω ὡς ἡ B πρὸς τὴν Γ , ἡ Δ πρὸς
 20 τὴν E .

Ἐπεὶ αἱ A , B ρηταὶ εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι, τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν A , B , τουτέστι τὸ ἀπὸ τῆς Δ , μέσον ἐστίν. μέση ἄρα ἡ Δ . καὶ ἐπεὶ αἱ B , Γ δυνάμει μόνον εἰσὶ σύμμετροι, καὶ ἐστὶν ὡς ἡ B πρὸς τὴν Γ ,

1. εἰσὶ] om. BFVb. καὶ — 2. σύμμετροι] om. B. 2. ἐστὶν B. 3. εἰσὶν B. 4. καὶ λέγω δὴ F, λέγω δὴ Vb. 10. ἐστὶ] om. BFVb. ὑπό] bis b. 12. ηὐρίηται FVb. 13. ρητὸν — δεῖξαι] καὶ τὰ ἐξῆς P. Seq. lemma, u. app. 14. κ' P, corr. m. rec. 17. Ante τρεις add. γάρ b, m. 2 FV. τρεις] om. P, τρεις εὐθεῖαι F. ἀσύμμετροι b. 19. Γ οὕτως V. 21. οὖν αἱ F. εἰσὶν B, corr. m. 2. 22. τουτέστι P. 23.

itaque Γ media est [prop. XXI]. et quoniam est $A:B=\Gamma:\Delta$, et A, B potentia tantum commensurabiles sunt, etiam Γ, Δ potentia tantum commensurabiles sunt [prop. XI]. et Γ media est. itaque etiam Δ media est [prop. XXIII]. Γ, Δ igitur mediae sunt potentia tantum commensurabiles. dico, easdem spatium rationale comprehendere. nam quoniam est $A:B=\Gamma:\Delta$, permutando [V, 16] est $A:\Gamma=B:\Delta$. uerum $A:\Gamma=\Gamma:B$. quare etiam $\Gamma:B=B:\Delta$ [V, 11]. itaque $\Gamma \times \Delta = B^2$ [VI, 17]. B^2 autem rationale est. itaque etiam $\Gamma \times \Delta$ rationale est.

Ergo inuentae sunt mediae potentia tantum commensurabiles spatium rationale comprehendentes; quod erat demonstrandum.

XXVIII.

Medias inuenire potentia tantum commensurabiles spatium medium comprehendentes [cfr. prop. XXV].

Ponantur rationales potentia tantum commensurabiles A, B, Γ , et sumatur rectarum A, B media proportionalis Δ [VI, 13], et fiat $B:\Gamma=\Delta:E$ [VI, 12].

quoniam A, B rationales sunt potentia tantum commensurabiles, $A \times B$ medium est [prop. XXI], hoc est Δ^2 [VI, 17]. itaque Δ media est [prop. XXI]. et

XXVIII. Cfr. Proclus p. 205, 10.

$\xi\sigma\tau\iota$ BVb, comp. F. $\Gamma, B B$. 24. Post $\sigma\acute{\upsilon}\mu\mu\epsilon\tau\epsilon\rho\alpha\iota$ rep. $\tau\acute{o}$ $\xi\sigma\tau\alpha$ lin. 22 $\rightarrow \Delta$ lin. 23 B, del. m. 2. 24. $\tau\eta\nu$] om. b. Γ $\sigma\acute{\upsilon}\tau\omega\varsigma$ V.

ἡ Δ πρὸς τὴν E , καὶ αἱ Δ , E ἄρα δυνάμει μόνον εἰσὶ
 σύμμετροι. μέση δὲ ἡ Δ . μέση ἄρα καὶ ἡ E . αἱ Δ , E
 ἄρα μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι. λέγω δὴ,
 ὅτι καὶ μέσον περιέχουσιν. ἐπεὶ γὰρ ἐστὶν ὡς ἡ B
 5 πρὸς τὴν Γ , ἡ Δ πρὸς τὴν E , ἐναλλὰξ ἄρα ὡς ἡ B
 πρὸς τὴν Δ , ἡ Γ πρὸς τὴν E . ὡς δὲ ἡ B πρὸς τὴν
 Δ , ἡ Δ πρὸς τὴν A . καὶ ὡς ἄρα ἡ Δ πρὸς τὴν A ,
 ἡ Γ πρὸς τὴν E . τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν A , Γ ἴσον ἐστὶ τῷ
 ὑπὸ τῶν Δ , E . μέσον δὲ τὸ ὑπὸ τῶν A , Γ . μέσον
 10 ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν Δ , E .

Εὐρίηται ἄρα μέσαι δυνάμει μόνον σύμμετροι μέ-
 σον περιέχουσιν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

Λήμμα.

Εὐρίην δύο τετραγώνους ἀριθμούς, ὥστε καὶ τὸν
 15 συγκείμενον ἐξ αὐτῶν εἶναι τετράγωνον.

Ἐκκεισθῶσαν δύο ἀριθμοὶ οἱ AB , $B\Gamma$, ἕστωσαν
 δὲ ἥτοι ἄρτιοι ἢ περιττοί. καὶ ἐπεὶ, εἴαν τε ἀπὸ ἀρ-
 τίου ἄρτιος ἀφαιρεθῇ, εἴαν τε ἀπὸ περισσοῦ περισσός,
 ὁ λοιπὸς ἄρτιός ἐστιν, ὁ λοιπὸς ἄρα ὁ $ΑΓ$ ἄρτιός
 20 ἐστίν. τετμήσθω ὁ $ΑΓ$ δίχα κατὰ τὸ Δ . ἕστωσαν
 δὲ καὶ οἱ AB , $B\Gamma$ ἥτοι ὅμοιοι ἐπίπεδοι ἢ τετράγωνοι,
 οἳ καὶ αὐτοὶ ὅμοιοι εἰσιν ἐπίπεδοι· ὁ ἄρα ἐκ τῶν AB ,
 $B\Gamma$ μετὰ τοῦ ἀπὸ [τοῦ] $\Gamma\Delta$ τετραγώνου ἴσος ἐστὶ τῷ
 ἀπὸ τοῦ $B\Delta$ τετραγώνῳ. καὶ ἐστὶ τετράγωνος ὁ ἐκ
 25 τῶν AB , $B\Gamma$, ἐπειδὴ περ εἰδείχθη, ὅτι, εἴαν δύο ὅμοιοι
 ἐπίπεδοι πολλαπλασιάσαντες ἀλλήλους ποιῶσί τινα, ὁ
 γενόμενος τετράγωνός ἐστιν. εὐρίηται ἄρα δύο τετρά-

1. σύμμετροι δυνάμει μόνον εἰσὶ V. μόνον] om. P.
 εἰσίν P. 3. εἰσίν P. 5. οὕτως ἡ Δ V. 6. ἡ Γ — τὴν Δ]
 m. 2 B. 6. ὡς — 7. A (prius)] mg. m. 1 F. 8. οὕτως ἡ

quoniam B, Γ potentia tantum commensurabiles sunt, et est $B:\Gamma = \Delta:E$, etiam Δ, E potentia tantum commensurabiles sunt [prop. XI]. uerum Δ media est; itaque etiam E media est [prop. XXIII]. quare Δ, E mediae sunt potentia tantum commensurabiles.

iam dico, easdem spatium medium comprehendere. nam quoniam est $B:\Gamma = \Delta:E$, permutando [V, 16] erit $B:\Delta = \Gamma:E$. uerum $B:\Delta = \Delta:A$. itaque etiam $\Delta:A = \Gamma:E$. quare $A \times \Gamma = \Delta \times E$ [VI, 16]. sed $A \times \Gamma$ medium est. itaque etiam $\Delta \times E$ medium est.

Ergo inuentae sunt mediae potentia tantum commensurabiles medium comprehendentes; quod erat demonstrandum.

Lemma I.

Inuenire duos numeros quadratos eiusmodi, ut etiam numerus ex iis compositus quadratus sit.

ponantur duo numeri $AB, B\Gamma$, et aut pares sint aut impares. et quoniam, siue a numero pari par subtrahitur, siue ab impari impar, reliquus par est [IX, 24, 26], reliquus $A\Gamma$ par est. in duas partes aequales secetur $A\Gamma$ in Δ . sint autem $AB, B\Gamma$ etiam aut similes plani aut quadrati, qui et ipsi similes sunt plani. itaque $AB \times B\Gamma + \Gamma\Delta^2 = B\Delta^2$ [II, 6]. et $AB \times B\Gamma$ quadratus est, quoniam de-

Γ F. 11. ὑφ' ὧν Vb. μέσαι] om. V. μέσον — 12. δεῖξαι] καὶ τὰ ἐξ ἧς P. 12. ὅπερ — δεῖξαι] om. BFb. 14. ἀριθμοῦς] m. 2 F. 16. Ante of add. ὅμοιοι ἐπίπεδοι mg. m. 2 B. 17. δὴ V. ἐπεὶ] supra scr. m. 1 F. τε] om. V. 18. περιττῶν περιττός V et b, sed corr. m. 1. 20. ἐστὶ BV, comp. Fb. $\Gamma\Delta$ P. 22. οὗ] ἢ b. ἐκ] ὑπὸ V, corr. ex ἀπὸ m. 1 b. 23. τοῦ $\Gamma\Delta$] $\Gamma\Delta$ B (corr. m. rec.) et b, τῆς $\Gamma\Delta$ P. 24. ΔB P. τετραγώνον P, corr. m. 1. ἐστὶν B. 25. ἐδελχθη] om. b. 26. ποιῶσιν B. 27. ὑφ' ὧν FVb.

γωνοὶ ἀριθμοὶ ὃ τε ἐκ τῶν AB , $B\Gamma$ καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ $\Gamma\Delta$, οἱ συντεθέντες ποιοῦσι τὸν ἀπὸ τοῦ $B\Delta$ τετράγωνον.

Καὶ φανερόν, ὅτι εὗρηται πάλιν δύο τετράγωνοι
 5 ὃ τε ἀπὸ τοῦ $B\Delta$ καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ $\Gamma\Delta$, ὥστε τὴν ὑπερ-
 οχὴν αὐτῶν τὸν ὑπὸ AB , $B\Gamma$ εἶναι τετράγωνον, ὅταν
 οἱ AB , $B\Gamma$ ὅμοιοι ὣσιν ἐπίπεδοι. ὅταν δὲ μὴ ὣσιν
 ὅμοιοι ἐπίπεδοι, εὗρηται δύο τετράγωνοι ὃ τε ἀπὸ
 τοῦ $B\Delta$ καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ $\Delta\Gamma$, ὧν ἡ ὑπεροχὴ ὁ ὑπὸ
 10 τῶν AB , $B\Gamma$ οὐκ ἔστι τετράγωνος· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

Ἀῆμα.

Εἶρεῖν δύο τετραγώνους ἀριθμούς, ὥστε τὸν ἐξ
 αὐτῶν συγκείμενον μὴ εἶναι τετράγωνον.

Ἔστω γὰρ ὁ ἐκ τῶν AB , $B\Gamma$, ὡς ἔφαμεν, τετρά-
 15 γωνος, καὶ ἄρτιος ὁ $\Gamma\Delta$, καὶ τετμήσθω ὁ $\Gamma\Delta$ διῆα
 τῷ Δ . φανερόν δὴ, ὅτι ὁ ἐκ τῶν AB , $B\Gamma$ τετράγωνος
 μετὰ τοῦ ἀπὸ [τοῦ] $\Gamma\Delta$ τετραγώνου ἴσος ἐστὶ τῷ ἀπὸ
 [τοῦ] $B\Delta$ τετραγώνῳ. ἀφηρησθῶ μονὰς ἡ ΔE . ὁ
 ἄρα ἐκ τῶν AB , $B\Gamma$ μετὰ τοῦ ἀπὸ [τοῦ] ΓE ἐλάσσων
 20 ἐστὶ τοῦ ἀπὸ [τοῦ] $B\Delta$ τετραγώνου. λέγω οὖν, ὅτι
 ὁ ἐκ τῶν AB , $B\Gamma$ τετράγωνος μετὰ τοῦ ἀπὸ [τοῦ] ΓE
 οὐκ ἔσται τετράγωνος.

Εἰ γὰρ ἔσται τετράγωνος, ἦτοι ἴσος ἐστὶ τῷ ἀπὸ
 [τοῦ] BE ἢ ἐλάσσων τοῦ ἀπὸ [τοῦ] BE , οὐκ ἐτί δὲ

2. ποιῶσι V, sed corr. $B\Delta$] supra scr. m. 1 F. τε-
 τραγώνον F, sed corr. 4. Mg. add. \mathbb{W} Bb, m. 2 PFV. πάλιν
 ἠύρηται F. ἠύρηται Vb. τετράγωνα P, corr. m. 1.
 5. ὃ] (alt.) om. P. 6. τὸν] τὴν FV. ὑπὸ τῶν V. AB]
 B ins. m. 2 P. τετράγωνον εἶναι B. 8. ἠύρηται Vb, et
 corr. ex εὗρηται m. 2 F. 9. ὃ] om. P. $\Gamma\Delta$ BFV. ἡ]
 om. b. 10. AB] A P. Ante ὅπερ add. ὁ ἄρα P. ὅπερ

monstrauimus, si duo numeri plani similes inter se multiplicantes numerum aliquem efficiant, numerum inde productum quadratum esse [IX, 1]. ergo inuenti sunt duo numeri quadrati $AB \times B\Gamma$ et ΓA^2 , qui compositi quadratum $B\Delta$ efficiant. et manifestum est, rursus inuentos esse duos numeros quadratos $B\Delta^2$ et $\Gamma\Delta^2$ eius modi, ut eorum differentia $AB \times B\Gamma$ quadrata sit, si AB , $B\Gamma$ plani sint similes. sin non sunt similes plani, duo numeri quadrati inuenti sunt $B\Delta^2$ et $\Delta\Gamma^2$, quorum differentia $AB \times B\Gamma$ quadrata non sit; quod erat demonstrandum.

Lemma II.

Inuenire duos numeros quadratos eius modi, ut numerus ex iis compositus quadratus non sit.

Sit enim $AB \times B\Gamma$ quadratus, uti diximus
 $\begin{array}{l} \text{---} A \\ | \\ \text{---} H \\ | \\ \Theta \text{---} \Delta \\ | \\ E \text{---} \Delta \\ | \\ \text{---} Z \\ | \\ \text{---} \Gamma \\ | \\ \text{---} B \end{array}$ [lemma I], et ΓA par sit et in Δ in duas partes aequales secetur. manifestum igitur, esse $AB \times B\Gamma + \Gamma\Delta^2 = B\Delta^2$ [u. lemma I]. subtrahatur unitas ΔE . itaque $AB \times B\Gamma + \Gamma E^2 < B\Delta^2$. dico igitur, numerum quadratum [IX, 1] $AB \times B\Gamma$ addito ΓE^2 quadratum non esse.

Nam si quadratus erit, aut aequalis est quadrato BE^2 aut minor quadrato BE^2 , maior autem non est,

$\xi\delta\epsilon\iota\ \delta\epsilon\iota\chi\alpha\iota$] om. BFVb, comp. P. 16. $\tau\omega$] $\kappa\alpha\tau\grave{\alpha}\ \tau\omega$ F. δ] om. P. 17. $\tau\omicron\upsilon$] (alt.) $\tau\eta\varsigma$ P. 18. $\tau\omicron\upsilon$] om. BFb, $\tau\eta\varsigma$ P, B m. 2. $\omicron\mu\omicron\iota\omega\varsigma\ \mu\omicron\nu\acute{\alpha}\varsigma$ P. 19. $\acute{\epsilon}\kappa$] $\acute{\alpha}\pi\omicron\ \text{b.}$ $\tau\omega\nu$] $\tau\omicron\upsilon$ P. $B\Gamma$ $\tau\epsilon\tau\rho\acute{\alpha}\gamma\omega\nu\omicron\varsigma$ V. $\tau\omicron\upsilon$] (alt.) om. BFb, $\tau\eta\varsigma$ P, B m. 2. $\acute{\epsilon}\lambda\acute{\alpha}\sigma\sigma\omega\nu$ $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\ \tau\omicron\upsilon$] in ras. m. 1 b. 20. $\tau\omicron\upsilon$] om. BFb, $\tau\eta\varsigma$ P, m. 2 B. 21. δ] om. b. $\tau\omicron\upsilon$] (alt.) om. BFb, $\tau\eta\varsigma$ P. 22. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ P. 23. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\alpha\iota$] $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ BFb. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$ B, sed corr. 24. $\tau\omicron\upsilon$] om. Bb, $\tau\eta\varsigma$ P. $\acute{\epsilon}\lambda\acute{\alpha}\sigma\sigma\omega\nu$] $\chi^{\omega\nu}$ F, $\acute{\epsilon}\lambda\acute{\alpha}\sigma\sigma\omega\nu\ \delta\nu$ b; $\acute{\epsilon}\lambda\acute{\alpha}\sigma\sigma\omega\nu$ B, seq. ras. 1 litt., $\acute{\epsilon}\lambda\acute{\alpha}\sigma\sigma\omega\nu$ m. rec. $\tau\omicron\upsilon$ — BE] om. V. $\tau\omicron\upsilon$] om. BFb. $\omicron\upsilon\kappa$ $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ b.

καὶ μελζων, ἵνα μὴ τμηθῇ ἡ μονάς. ἔστω, εἰ δυνα-
 τόν, πρότερον ὁ ἐκ τῶν AB , $BΓ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $ΓΕ$
 ἴσος τῷ ἀπὸ $ΒΕ$, καὶ ἔστω τῆς $ΔΕ$ μονάδος διπλα-
 σίων ὁ $ΗΑ$. ἐπεὶ οὖν ὅλος ὁ $ΑΓ$ ὅλου τοῦ $ΓΔ$
 5 ἐστὶ διπλασίων, ὧν ὁ $ΑΗ$ τοῦ $ΔΕ$ ἐστὶ διπλασίων,
 καὶ λοιπὸς ἄρα ὁ $ΗΓ$ λοιποῦ τοῦ $ΕΓ$ ἐστὶ διπλασίων·
 δίχα ἄρα τέμνεται ὁ $ΗΓ$ τῷ $Ε$. ὁ ἄρα ἐκ τῶν $ΗΒ$,
 $BΓ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $ΓΕ$ ἴσος ἐστὶ τῷ ἀπὸ $ΒΕ$ τετρα-
 γώνῳ. ἀλλὰ καὶ ὁ ἐκ τῶν AB , $BΓ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ
 10 $ΓΕ$ ἴσος ὑπόκειται τῷ ἀπὸ [τοῦ] $ΒΕ$ τετραγώνῳ· ὁ
 ἄρα ἐκ τῶν $ΗΒ$, $BΓ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $ΓΕ$ ἴσος ἐστὶ τῷ
 ἐκ τῶν AB , $BΓ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $ΓΕ$. καὶ κοινοῦ ἀφαι-
 ρεθέντος τοῦ ἀπὸ $ΓΕ$ συνάγεται ὁ AB ἴσος τῷ $ΗΒ$.
 ὅπερ ἄτοπον. οὐκ ἄρα ὁ ἐκ τῶν AB , $BΓ$ μετὰ τοῦ
 15 ἀπὸ [τοῦ] $ΓΕ$ ἴσος ἐστὶ τῷ ἀπὸ $ΒΕ$. λέγω δὴ, ὅτι
 οὐδὲ ἐλάσσων τοῦ ἀπὸ $ΒΕ$ εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω
 τῷ ἀπὸ BZ ἴσος, καὶ τοῦ $ΔΖ$ διπλασίων ὁ $ΘΑ$. καὶ
 συναχθήσεται πάλιν διπλασίων ὁ $ΘΓ$ τοῦ $ΓΖ$. ὥστε
 καὶ τὸν $ΓΘ$ δίχα τεμῆσθαι κατὰ τὸ Z , καὶ διὰ τοῦτο
 20 τὸν ἐκ τῶν $ΘΒ$, $BΓ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $ZΓ$ ἴσον γίνεσθαι
 τῷ ἀπὸ BZ . ὑπόκειται δὲ καὶ ὁ ἐκ τῶν AB , $BΓ$ μετὰ
 τοῦ ἀπὸ $ΓΕ$ ἴσος τῷ ἀπὸ BZ . ὥστε καὶ ὁ ἐκ τῶν
 $ΘΒ$, $BΓ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $ΓΖ$ ἴσος ἐστὶ τῷ ἐκ τῶν AB ,
 $BΓ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $ΓΕ$. ὅπερ ἄτοπον. οὐκ ἄρα ὁ ἐκ
 25 τῶν AB , $BΓ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $ΓΕ$ ἴσος ἐστὶ [τῷ] ἐλάσ-

1. μείζονι (ο et i corr.) B; γρ. μείζονι κρείττον ἐστὶ supra
 scr. m. 2 V. μῆ] μῆτε Theon (BFVb), P m. 2. Post μο-
 νάς add. Theon: μῆτε ὁ ἐκ τῶν AB , $BΓ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ (τοῦ
 add. V) $ΓΔ$, ὅς ἐστιν ὁ (om. b, mg. B) ἀπὸ (τοῦ add. PVb)
 $BΔ$ (e corr. m. 2 V, $ΔB$ PBb), ἴσος ἢ τῷ ἐκ (ὑπὸ BV) τῶν
 (om. PB) AB , $BΓ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ (τοῦ add. PV) $ΓΕ$ (BFVb,
 P m. 2). εἰ] corr. ex ἡ m. 2 P. 2. τῆς $ΓΕ$ P. 3. τῆς
 $ΒΕ$ P. τῆς $ΔΕ$ μονάδος] om. V. διπλάσιος P. 4. $ΗΑ$

ne unitas diuidatur.¹⁾ prius, si fieri potest, sit $AB \times B\Gamma + \Gamma E^2 = BE^2$, et sit $HA = 2AE$. iam quoniam $A\Gamma = 2\Gamma A$, $AH = 2AE$, erit etiam $H\Gamma = 2E\Gamma$. itaque $H\Gamma$ in E in duas partes aequales diuisus est. ergo $HB \times B\Gamma + \Gamma E^2 = BE^2$ [II, 6]. supposuimus autem, esse etiam $AB \times B\Gamma + \Gamma E^2 = BE^2$. quare $HB \times B\Gamma + \Gamma E^2 = AB \times B\Gamma + \Gamma E^2$. et subtracto, quod commune est, ΓE^2 concludimus, esse $AB = HB$; quod absurdum est. ergo $AB \times B\Gamma + \Gamma E^2$ quadrato BE^2 aequale non est. iam dico, ne minorem quidem esse quadrato BE^2 . nam si fieri potest, sit $AB \times B\Gamma + \Gamma E^2 = BZ^2$, et $\Theta A = 2AZ$. et rursus concludemus, esse $\Theta\Gamma = 2\Gamma Z$; quare etiam $\Gamma\Theta$ in Z in duas partes aequales diuisus est, et ea de causa $\Theta B \times B\Gamma + Z\Gamma^2 = BZ^2$ [II, 6]. supposuimus autem, esse etiam

1) Nam $AB \times B\Gamma + \Gamma E^2 < B\Delta^2$. sit latus x . ergo habebimus $BE^2 < x^2 < (BE + 1)^2$, h. e. $BE < x < BE + 1$, ita ut x fractio sit, quod fieri non potest.

$\tau\eta\varsigma \Delta E$ μονάδος V. 5. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\acute{\iota}\nu$ P. $\acute{\omega}\nu \delta\acute{\iota}$ P. διπλάσιος Bf b. 6. $\kappa\alpha\iota \delta$ Bf b. ΓH V. διπλάσιος Bf b. 7. Ante $\tau\tilde{\omega}$ ins. $\acute{\alpha}\pi\acute{o}$ m. 2 F. HB] B e corr. F. 8. $\tau\acute{o}\tilde{\upsilon} \Gamma E$ V. $\tau\acute{o}\tilde{\upsilon} BE$ V. 10. $\tau\acute{o}\tilde{\upsilon}$] om. Bf b. 11. HB] H in ras. V. BΓ] BH b. $\tau\acute{o}\tilde{\upsilon} \Gamma E$ V. 12. $\acute{\epsilon}\kappa$] $\acute{\upsilon}\pi\acute{o}$ V. $\tau\acute{\omega}\nu$] $\tau\acute{o}\tilde{\upsilon}$ P. AB] A in ras. V. $\tau\acute{o}\tilde{\upsilon} \Gamma E$ V. 13. $\tau\acute{o}\tilde{\upsilon} \Gamma E$ V. $\delta\acute{\iota}$] η P. $\acute{\iota}\sigma\omicron\varsigma \tau\tilde{\omega}$] $\acute{\iota}\sigma\eta \tau\tilde{\eta}$ P. 15. $\tau\acute{o}\tilde{\upsilon} \Gamma E$] ΓE Bf b, $\tau\eta\varsigma \Gamma E$ P. $\tau\acute{o}\tilde{\upsilon} BE$ V. δ $\acute{\upsilon}\pi\acute{o} \tau\acute{\omega}\nu HB$, BΓ $\acute{\iota}\sigma\omicron\varsigma \tau\tilde{\omega}$ $\acute{\epsilon}\kappa \tau\acute{\omega}\nu AB$, BΓ mg. F b. $\delta\eta$] om. b. 16. $\acute{\epsilon}\lambda\alpha\sigma\sigma\omicron\nu$ F m. 1, V (sed corr.); $\acute{\epsilon}\lambda\alpha\sigma\sigma\omicron\nu$ F m. 2, b, B in ras. $\tau\acute{o}\tilde{\upsilon} BE$ V. 17. $\tau\acute{o}\tilde{\upsilon} BZ$ V. $\acute{\iota}\sigma\omicron\varsigma$] om. F b, m. 2 BV. $\kappa\acute{\epsilon}\acute{\iota}\sigma\theta\omega \delta$ V. $\kappa\alpha\acute{\iota}$] om. V. 19. $\tau\acute{o}$] $\tau\acute{o}\nu$ F. 20. $\tau\acute{o}\nu$] $\tau\eta\acute{\nu}$ F. $\acute{\epsilon}\kappa$] $\acute{\upsilon}\pi\acute{o}$ b. $\tau\acute{o}\tilde{\upsilon} Z\Gamma$ V. $\gamma\acute{\iota}\gamma\gamma\epsilon\sigma\theta\alpha\iota$ F, $\gamma\epsilon\gamma\epsilon\sigma\theta\alpha\iota$ V b. 21. BZ] ZB B et V (supra Z ras. est). 22. $\tau\acute{o}\tilde{\upsilon} \Gamma E$ V, BE b. BZ] in ras. V, ΓE b. $\acute{\omega}\sigma\tau\epsilon$ — 23. $\tau\tilde{\omega}$] $\sigma\upsilon\nu\nu\alpha\chi\theta\acute{\eta}\sigma\epsilon\tau\alpha\iota \acute{\alpha}\rho\alpha \acute{\iota}\sigma\omicron\varsigma \delta$ Theon (BfVb). 24. $\mu\epsilon\tau\acute{\alpha}$] in ras. φ. Post ΓE add. Theon: $\tau\tilde{\omega} \acute{\epsilon}\kappa \tau\acute{\omega}\nu \Theta B$ (EB b) BΓ $\mu\epsilon\tau\acute{\alpha} \tau\acute{o}\tilde{\upsilon} \acute{\alpha}\pi\acute{o} \Gamma Z$ (BfVb). 25. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\acute{\iota}\nu$ P. $\tau\tilde{\omega}$] om. P. $\acute{\epsilon}\lambda\acute{\alpha}\tau\tau\omicron\nu$ V.

σони τοῦ ἀπὸ BE. ἐδείχθη δέ, ὅτι οὐδὲ [αὐτῷ] τῷ
 ἀπὸ BE. οὐκ ἄρα ὁ ἐκ τῶν AB, BΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ
 ΓΕ τετράγωνός ἐστιν [δυνατοῦ δὲ ὄντος καὶ κατὰ
 5 νύειν, ἀρκείσθωσαν ἡμῖν οἱ εἰρημένοι, ἵνα μὴ μακροτέ-
 ρας οὔσης τῆς πραγματείας ἐπὶ πλεον αὐτὴν μηκύνωμεν].
 ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

κθ'.

Εὐρεῖν δύο ρητὰς δυνάμει μόνον συμμέ-
 10 τρους, ὥστε τὴν μείζονα τῆς ἐλάσσονος μείζον
 δύνασθαι τῷ ἀπὸ συμμετρου ἑαυτῇ μήκει.

Ἐκκείσθω γάρ τις ρητὴ ἡ AB καὶ δύο τετράγωνοι
 ἀριθμοὶ οἱ ΓΔ, ΔΕ, ὥστε τὴν ὑπεροχὴν αὐτῶν τὸν
 ΓΕ μὴ εἶναι τετράγωνον, καὶ γεγράφθω ἐπὶ τῆς AB
 15 ἡμικύκλιον τὸ AZB, καὶ πεποιήσθω ὡς ὁ ΔΓ πρὸς
 τὸν ΓΕ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΒΑ τετράγωνον πρὸς τὸ
 ἀπὸ τῆς ΑΖ τετράγωνον, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΖΒ.

Ἐπεὶ [οὖν] ἐστὶν ὡς τὸ ἀπὸ τῆς ΒΑ πρὸς τὸ ἀπὸ
 τῆς ΑΖ, οὕτως ὁ ΔΓ πρὸς τὸν ΓΕ, τὸ ἀπὸ τῆς ΒΑ
 20 ἄρα πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΑΖ λόγον ἔχει, ὃν ἀριθμὸς ὁ
 ΔΓ πρὸς ἀριθμὸν τὸν ΓΕ· σύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ
 ἀπὸ τῆς ΒΑ τῷ ἀπὸ τῆς ΑΖ. ρητὸν δὲ τὸ ἀπὸ τῆς
 ΑΒ· ρητὸν ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΖ· ρητὴ ἄρα καὶ
 ἡ ΑΖ. καὶ ἐπεὶ ὁ ΔΓ πρὸς τὸν ΓΕ λόγον οὐκ ἔχει,
 25 ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν,

1. τοῦ BE V. αὐτῷ] om. P. 2. τῆς BE P; ΓΕ b. Dein add. Theon: οὐδὲ (om. b) μείζονι αὐτοῦ (BFVb). 3. ἐστι PBV, comp. Fb. δυνατοῦ] τ in ras. plurium litt. B.


4. τρόπους] bis b. τὸ εἰρημένον Theon (BFVb). ἀριθμούς] om. Theon (BFVb). ἐπιδεικνύειν] ἐπι- supra scr. F, in ras. B; ἐπιδεικνύναι V. 5. ἀρκείσθω ἡμῖν ὁ εἰρημένος Theon (BFVb). 7. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] om. Theon (BFVb). 9. εὐ- ρίσκειν B. 11. τῷ] corr. ex τοῦ m. 2 B. 13. τόν] τὴν V.

$AB \times B\Gamma + \Gamma E^2 = BZ^2$. quare etiam $\Theta B \times B\Gamma + \Gamma Z^2 = AB \times B\Gamma + \Gamma E^2$; quod absurdum est. itaque $AB \times B\Gamma + \Gamma E^2$ spatio minori, quam est quadratum BE^2 , aequale non est. demonstrauius autem, ne ipsi quidem BE^2 id aequale esse. ergo $AB \times B\Gamma + \Gamma E^2$ quadratus non est¹⁾; quod erat demonstrandum.

XXIX.

Duas rationales inuenire potentia tantum commensurabiles eius modi, ut maior quadrata minorem excedat quadrato rectae sibi longitudine commensurabilis.

ponantur enim recta rationalis AB et duo numeri



quadrati $\Gamma\Delta$, ΔE eius modi, ut eorum differentia ΓE quadrata non sit [lemma I]. et in AB semicirculus describatur AZB , et fiat $\Delta\Gamma : \Gamma E = BA^2 : AZ^2$ [prop. VI coroll.], et ducatur ZB .

quoniam est $BA^2 : AZ^2 = \Delta\Gamma : \Gamma E$, BA^2 ad AZ^2 rationem habet, quam numerus $\Delta\Gamma$ ad numerum ΓE . itaque BA^2 , AZ^2 commensurabilia sunt [prop. VI]. uerum AB^2 rationale est [def. 4]. itaque etiam AZ^2 rationale est [id.]. quare etiam AZ rationalis est. et quoniam $\Delta\Gamma : \Gamma E$ rationem non habet, quam numerus

1) $\deltaυνατοῦ$ lin. 3 — $μηκύνωμεν$ lin. 6 Euclides non scripsit; uncis ea inclusit August II p. 359. nescio, an idem recte de ambobus lemmatis totis dubitationem iniecerit. sed satis antiquo tempore interpolata sunt.

15. $\acute{\omega}\varsigma$] supra scr. m. 1 V. $\acute{\omicron}$] ras. F. $\Delta\Gamma$] in ras. m. 1 P. 17. $τετραγώνον$] om. V. 18. $\acute{\omicron}\nu$] om. P. 19. $\Delta\Gamma$] $\Gamma\Delta$ V. 21. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\acute{\iota}\nu$ P. 23. $\kappa\alpha\iota\ \acute{\eta}$] $\acute{\eta}$ P. 24. $\Delta\Gamma$] $\Gamma\Delta$ F. $\acute{\omicron}\nu$] supra scr. m. 1 P. 25. $\delta\nu$ $\acute{\omicron}$ V.

- οὐδὲ τὸ ἀπὸ τῆς BA ἄρα πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς AZ λόγον
 ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθ-
 μόν· ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ AB τῇ AZ μήκει· αἱ
 BA , AZ ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι.
 5 καὶ ἐπεὶ [ἐστὶν] ὡς ὁ $\Delta\Gamma$ πρὸς τὸν ΓE , οὕτως τὸ
 ἀπὸ τῆς BA πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς AZ , ἀναστρέψαντι ἄρα
 ὡς ὁ $\Gamma\Delta$ πρὸς τὸν ΔE , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς AB πρὸς
 τὸ ἀπὸ τῆς BZ . ὁ δὲ $\Gamma\Delta$ πρὸς τὸν ΔE λόγον ἔχει,
 ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν·
 10 καὶ τὸ ἀπὸ τῆς AB ἄρα πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς BZ λόγον
 ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν·
 σύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ AB τῇ BZ μήκει. καὶ ἐστι
 τὸ ἀπὸ τῆς AB ἴσον τοῖς ἀπὸ τῶν AZ , ZB · ἡ AB
 ἄρα τῆς AZ μείζον δύναται τῇ BZ συμμέτρῳ ἑαυτῇ.
 15 Εὐρηγεται ἄρα δύο ῥηταὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι
 αἱ BA , AZ , ὥστε τὴν μείζονα τὴν AB τῆς ἐλάσσονος
 τῆς AZ μείζον δύνασθαι τῷ ἀπὸ τῆς BZ συμμέτρου
 ἑαυτῇ μήκει· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

λ'.

- 20 Εὐρεῖν δύο ῥητὰς δυνάμει μόνον συμμέ-
 τρους, ὥστε τὴν μείζονα τῆς ἐλάσσονος μείζον
 δύνασθαι τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ μήκει.
 Ἐκκείσθω ῥητὴ ἡ AB καὶ δύο τετράγωνοι ἀριθμοὶ
 οἱ ΓE , $E\Delta$, ὥστε τὸν συγκείμενον ἐξ αὐτῶν τὸν $\Gamma\Delta$
 25 μὴ εἶναι τετράγωνον, καὶ γεγραφθῶ ἐπὶ τῆς AB ἡμι-


1. AB F. ἄρα] supra scr. m. 1 P. AZ] Z e corr. V.
 3. BA P. 4. AB , AZ BVb; AZ , AB F. εἰσιν B. 5.
 ἐστὶν] om. P. τόν] mut. in τό m. 2 F. 10. καὶ τό — 11.
 ἀριθμόν] mg. m. 1 F (partem abstulit reparatio pergam.). 12.
 σύμμετρος P. ἐστὶν P. 14. ἑαυτῇ μήκει V. 15. ἡϋρηγεται
 Fb. 17. μείζονα P. ZB Bb. συμμέτρῳ F. 18. ὅπερ

quadratus ad numerum quadratum [lemma I], ne BA^2 quidem ad AZ^2 rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. quare AB , AZ longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. itaque BA , AZ rationales sunt potentia tantum commensurabiles. et quoniam $\angle\Gamma: \angle E = BA^2: AZ^2$, conuertendo erit [V, 19 coroll.] $\angle\Gamma: \angle E = AB^2: BZ^2$ [cfr. III, 31. I, 47]. sed $\angle\Gamma: \angle E$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. quare etiam $AB^2: BZ^2$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque AB , BZ longitudine commensurabiles sunt [prop. IX]. et $AB^2 = AZ^2 + ZB^2$ [III, 31. I, 47]. itaque AB^2 excedit AZ^2 quadrato rectae BZ sibi commensurabilis.

Ergo inuentae sunt duae rationales potentia tantum commensurabiles BA , AZ eius modi, ut maior AB quadrata minorem AZ excedat quadrato rectae BZ sibi longitudine commensurabilis; quod erat demonstrandum.

XXX.

Inuenire duas rationales potentia tantum commensurabiles eius modi, ut maior quadrata minorem excedat quadrato rectae sibi longitudine incommensurabilis.



Ponatur rationalis AB et duo numeri quadrati ΓE , $E\Delta$ eius modi, ut numerus ex iis compositus $\Gamma\Delta$ quadratus non

$\xi\delta\epsilon\iota\ \delta\epsilon\iota\zeta\alpha\iota$: ~ P, om. B F b. Seq. lemma, u. app. 23. $\alpha\rho\iota\theta\mu\omicron\iota$ om. F V. 24. $\tau\omicron\nu$ (alt.) $\tau\omicron\nu$ b.

κύκλιον τὸ AZB , καὶ πεποιήσθω ὡς ὁ $\Delta\Gamma$ πρὸς τὸν ΓE , οὕτως τὸ ἀπο τῆς BA πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς AZ , καὶ ἐπεξεύχθω ἡ ZB .

Ὅμοιως δὴ δεῖξομεν τῷ πρὸ τούτου, ὅτι αἱ BA , AZ
 5 ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν
 ὡς ὁ $\Delta\Gamma$ πρὸς τὸν ΓE , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς BA πρὸς
 τὸ ἀπὸ τῆς AZ , ἀναστρέψαντι ἄρα ὡς ὁ $\Gamma\Delta$ πρὸς
 τὸν ΔE , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς AB πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς BZ .
 ὁ δὲ $\Gamma\Delta$ πρὸς τὸν ΔE λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγω-
 0 νος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· οὐδ' ἄρα τὸ
 ἀπὸ τῆς AB πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς BZ λόγον ἔχει, ὃν
 τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· ἀσύμ-
 μετρος ἄρα ἐστὶν ἡ AB τῇ BZ μήκει. καὶ δύναται
 ἡ AB τῆς AZ μείζον τῷ ἀπὸ τῆς ZB ἀσυμμέτρου
 5 ἑαυτῇ.

Αἱ AB , AZ ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμ-
 μετροι, καὶ ἡ AB τῆς AZ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ τῆς
 ZB ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ μήκει· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

λα'.

0 *Εὐρεῖν δύο μέσας δυνάμει μόνον συμμέ-
 τρους ῥητὸν περιεχούσας, ὥστε τὴν μείζονα
 τῆς ἐλάσσονος μείζον δύνασθαι τῷ ἀπὸ συμ-
 μέτρου ἑαυτῇ μήκει.*

Ἐκκεῖσθωσαν δύο ῥηταὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι
 5 αἱ A , B , ὥστε τὴν A μείζονα οὖσαν τῆς ἐλάσσονος
 τῆς B μείζον δύνασθαι τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ μήκει.

1. Post καὶ del. ἐπεξεύχθω m. 1 P. $\Gamma\Delta$ P. τόν] om. Fb.
 2. BA] e corr. m. 2 V. BZ b. 3. BZ P. 4. δέ b,
 corr. m. 1. ὡς ἐν τῷ Theon (BFVb). BA] e corr. m. 2 V.
 5. εἰσιν B. 6. τόν] om. BF. 7. $\Gamma\Delta$] $\Delta\Gamma$ b. 9. $\Gamma\Delta$]

sit [lemma II], et in AB semicirculus AZB describatur. et fiat $\angle \Gamma : \Gamma E = BA^2 : AZ^2$ [prop. VI coroll.], et ducatur ZB .

iam similiter ac in praecedenti [p. 86, 18 sq.] demonstrabimus, BA et AZ rationales esse potentia tantum commensurabiles. et quoniam est $\angle \Gamma : \Gamma E = BA^2 : AZ^2$, conuertendo [V, 19 coroll.] erit $\angle \Gamma : \angle E = BA^2 : BZ^2$ [III, 31. I, 47]. uerum $\angle \Gamma : \angle E$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. quare ne AB^2 quidem ad BZ^2 rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque AB , BZ longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. et $AB^2 = AZ^2 + ZB^2$ [III, 31. I, 47].

Ergo AB , AZ rationales sunt potentia tantum commensurabiles, et AB quadrata excedit AZ quadrato rectae ZB sibi longitudine incommensurabilis; quod erat demonstrandum.

XXXI.

Inuenire duas medias potentia tantum commensurabiles spatium rationale comprehendentes eius modi, ut maior quadrata minorem excedat quadrato rectae sibi longitudine commensurabilis.

Ponantur duae rectae rationales potentia tantum commensurabiles A , B eius modi, ut maior A quadrata excedat minorem B quadrato rectae sibi longitu-

in ras. V. $\sigma\upsilon\kappa$] postea ins. F. 13. $\tau\eta$] corr. ex η V. $\delta\upsilon$
 $\nu\acute{\alpha}\mu\epsilon\iota$ b. $-\mu\epsilon\iota$ supra scr. F. 14. $\mu\acute{\epsilon}\lambda\lambda\omicron\nu$ b. BZ Fb. $\acute{\alpha}\sigma\upsilon\mu$
 $\mu\acute{\epsilon}\tau\rho\omega$ BFb. 16. AZ] BZ Theon (BFVb). $\epsilon\lambda\epsilon\nu$ P. 17.
 $\tau\phi$] $\tau\eta$ P. 18. BZ F. $\acute{\alpha}\sigma\upsilon\mu\mu\acute{\epsilon}\tau\rho\omega$ F. $\tilde{\omicron}\pi\epsilon\rho$ $\acute{\epsilon}\delta\epsilon\iota$ $\delta\epsilon\iota\chi\alpha\iota$]
comp. P, $\tilde{\omicron}\pi\epsilon\rho$ b. 22. $\acute{\alpha}\pi\acute{o}$] $-\acute{o}$ eras. V. $\acute{\alpha}\sigma\upsilon\mu\mu\acute{\epsilon}\tau\rho\omega$ P.
26. $\acute{\alpha}\sigma\upsilon\mu\mu\acute{\epsilon}\tau\rho\omega$ P, et F ($\acute{\alpha}$ del.). $\mu\eta\kappa\epsilon\iota$] om. FVb, m. 2 R.

καὶ τῷ ὑπὸ τῶν *A, B* ἴσον ἔστω τὸ ἀπὸ τῆς *Γ*. μέ-
 σον δὲ τὸ ὑπὸ τῶν *A, B*· μέσον ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς
Γ· μέση ἄρα καὶ ἡ *Γ*. τῷ δὲ ἀπο τῆς *B* ἴσον ἔστω
 τὸ ὑπὸ τῶν *Γ, Δ*· ῥητὸν δὲ τὸ ἀπὸ τῆς *B*· ῥητὸν
 5 ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν *Γ, Δ*. καὶ ἐπεὶ ἔστιν ὥς ἡ *A*
 πρὸς τὴν *B*, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν *A, B* πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς
B, ἀλλὰ τῷ μὲν ὑπὸ τῶν *A, B* ἴσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς
Γ, τῷ δὲ ἀπὸ τῆς *B* ἴσον τὸ ὑπὸ τῶν *Γ, Δ*, ὥς ἄρα
 ἡ *A* πρὸς τὴν *B*, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς *Γ* πρὸς τὸ ὑπὸ
 10 τῶν *Γ, Δ*. ὥς δὲ τὸ ἀπὸ τῆς *Γ* πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν
Γ, Δ, οὕτως ἡ *Γ* πρὸς τὴν *Δ*· καὶ ὥς ἄρα ἡ *A* πρὸς
 τὴν *B*, οὕτως ἡ *Γ* πρὸς τὴν *Δ*. σύμμετρος δὲ ἡ *A*
 τῇ *B* δυνάμει μόνον· σύμμετρος ἄρα καὶ ἡ *Γ* τῇ *Δ*
 δυνάμει μόνον. καὶ ἐστὶ μέση ἡ *Γ*· μέση ἄρα καὶ
 5 ἡ *Δ*. καὶ ἐπεὶ ἔστιν ὥς ἡ *A* πρὸς τὴν *B*, ἡ *Γ* πρὸς
 τὴν *Δ*, ἡ δὲ *A* τῆς *B* μείζον δύνатаι τῷ ἀπὸ συμ-
 μέτρου ἑαυτῇ, καὶ ἡ *Γ* ἄρα τῆς *Δ* μείζον δύνатаι τῷ
 ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ.

Εὐρηγται ἄρα δύο μέσαι δυνάμει μόνον σύμμετροι
 10 αἱ *Γ, Δ* ῥητὸν περιέχουσαι, καὶ ἡ *Γ* τῆς *Δ* μείζον
 δύνатаι τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ μήκει.

Ὅμοιως δὴ δειχθήσεται καὶ τῷ ἀπὸ ἀσύμμετρου,
 ὅταν ἡ *A* τῆς *B* μείζον δύνатаι τῷ ἀπὸ ἀσύμμετρου
 ἑαυτῇ.

1. τῷ] corr. ex τῶν m. 1 P. 2. τῆς] corr. ex τοῦ m.
 2 F. 3. δέ] δ' F. 4. Δ] corr. ex A m. rec. b, A φ (non F).
 5. ἄρα ἐστὶ P. Ante ἐπεὶ ras. 3 litt. P. 7. ὑπὸ] ὑ- in
 ras. V. 8. ἐστὶ τό b. 14. ἐστὶν PB. 15. οὕτως ἡ Γ FV.
 16. τῆς] τῇ F. τῷ] corr. ex τό F. ἀσύμμετρου P, supra
 σ ras. 1 litt. B, συμμέτρω φ. 17. δυνήσεται Theon (BFVb).
 18. ἀσύμμετρου P, supra σ ras. 1 litt. B, συμμέτρω F. 19.
 εὐρηγται Vb, F m. 2. ἄρα] supra scr. m. 2 B. 21. ἀσυμ-
 μέτρου P, supra σ ras. 1 litt. B. 22. δέ FV. τῷ] τό FV.

dine commensurabilis [prop. XXIX]. et sit $\Gamma^2 = A \times B$.
 uerum $A \times B$ medium est [prop. XXI]. itaque etiam
 Γ^2 medium est; quare Γ est media [id.].
 sit autem $\Gamma \times \Delta = B^2$. uerum B^2 rationale
 est. itaque etiam $\Gamma \times \Delta$ rationale est. et
 quoniam est $A : B = A \times B : B^2$ [cfr. prop.
 XXI lemma], et $\Gamma^2 = A \times B$, $B^2 = \Gamma \times \Delta$,
 erit $A : B = \Gamma^2 : \Gamma \times \Delta$. est autem $\Gamma^2 : \Gamma \times \Delta = \Gamma : \Delta$
 [prop. XXI lemma]. quare etiam $A : B = \Gamma : \Delta$. uerum
 A , B potentia tantum commensurabiles sunt. itaque
 etiam Γ , Δ potentia tantum commensurabiles sunt
 [prop. XI]. et Γ media est. itaque etiam Δ media
 est [prop. XXIII]. et quoniam est $A : B = \Gamma : \Delta$, et
 A^2 excedit B^2 quadrato rectae sibi commensurabilis,
 etiam Γ^2 excedit Δ^2 quadrato rectae sibi commensu-
 rabilis [prop. XIV].

Ergo inuentae sunt duae mediae potentia tantum
 commensurabiles Γ , Δ spatium rationale comprehen-
 dentes, et Γ^2 excedit Δ^2 quadrato rectae sibi commen-
 surabilis.

Similiter demonstrabimus, Γ^2 excedere Δ^2 quadrato
 rectae sibi incommensurabilis, si A^2 excedat B^2 qua-
 drato rectae sibi incommensurabilis [prop. XXX].

συμμέτρον P, et F, corr. m. 1. 23. *ἢ Δ*] om. P. *δυνήσεται* B, *δυνήσεται* L, *δύνηται ἢ Δ* P. *συμμέτρον* P. 24. Seq. lemma, u. app.

λβ'.

Εὐρεῖν δύο μέσας δυνάμει μόνον συμμέ-
τρους μέσον περιεχούσας, ὥστε τὴν μείζονα
τῆς ἐλάσσονος μείζον δύνασθαι τῷ ἀπὸ συμ-
5 μέτρου ἐαντῇ.

Ἐκκείσθωσαν τρεῖς ῥηται δυνάμει μόνον σύμμετροι
αἱ *A*, *B*, *Γ*, ὥστε τὴν *A* τῆς *Γ* μείζον δύνασθαι τῷ
ἀπὸ συμμέτρου ἐαντῇ, καὶ τῷ μὲν ὑπὸ τῶν *A*, *B* ἴσον
ἔστω τὸ ἀπὸ τῆς *Δ*. μέσον ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς *Δ*· καὶ
0 ἡ *Δ* ἄρα μέση ἐστίν. τῷ δὲ ὑπὸ τῶν *B*, *Γ* ἴσον ἔστω
τὸ ὑπὸ τῶν *Δ*, *E*. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὥς τὸ ὑπὸ τῶν *A*,
B πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν *B*, *Γ*, οὕτως ἡ *A* πρὸς τὴν *Γ*,
ἀλλὰ τῷ μὲν ὑπὸ τῶν *A*, *B* ἴσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς *Δ*,
τῷ δὲ ὑπὸ τῶν *B*, *Γ* ἴσον τὸ ὑπὸ τῶν *Δ*, *E*, ἐστὶν
5 ἄρα ὥς ἡ *A* πρὸς τὴν *Γ*, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς *Δ* πρὸς
τὸ ὑπὸ τῶν *Δ*, *E*. ὥς δὲ τὸ ἀπὸ τῆς *Δ* πρὸς τὸ ὑπὸ
τῶν *Δ*, *E*, οὕτως ἡ *Δ* πρὸς τὴν *E*· καὶ ὥς ἄρα ἡ *A*
πρὸς τὴν *Γ*, οὕτως ἡ *Δ* πρὸς τὴν *E*. σύμμετρος δὲ
ἡ *A* τῇ *Γ* δυνάμει [μόνον]. σύμμετρος ἄρα καὶ ἡ *Δ*
0 τῇ *E* δυνάμει μόνον. μέση δὲ ἡ *Δ*· μέση ἄρα καὶ
ἡ *E*. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὥς ἡ *A* πρὸς τὴν *Γ*, ἡ *Δ* πρὸς
τὴν *E*, ἡ δὲ *A* τῆς *Γ* μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέ-
τρου ἐαντῇ, καὶ ἡ *Δ* ἄρα τῆς *E* μείζον δυνήσεται τῷ
ἀπὸ συμμέτρου ἐαντῇ. λέγω δὴ, ὅτι καὶ μέσον ἐστὶ
5 τὸ ὑπὸ τῶν *Δ*, *E*. ἐπεὶ γὰρ ἴσον ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν
B, *Γ* τῷ ὑπὸ τῶν *Δ*, *E*, μέσον δὲ τὸ ὑπὸ τῶν *B*, *Γ*

4. ἐλάττονος FV. μείζονα L, et B, sed corr. συμμέ-
τρου] ἄ- add. m. rec. b. 5. αὐτῇ L. 6. ῥηται αἱ *A*, *B*, *Γ* V.

7. αἱ *A*, *B*, *Γ*] om. V, αἱ *A*, *B* b. μείζονα L, et B, sed
corr. 8. συμμέτρου] ἄ- add. m. rec. b. τῷ] τό L. 10.
ἐστὶ V, comp. Fb. 11. τὸ ὑπὸ τῶν *Δ*, *E*] m. 1 b, supra scr.

m. rec. τῷ ἀπὸ τοῦ E. 13. ἐστίν L. 14. ἴσον ἐστὶ V. τὸ
 ὑπό τῶν Δ, E] m. 1 b, supra scr. m. rec. τῷ ἀπὸ τοῦ E. 16.
 τὸ ὑπό τῶν Δ, E] m. 1 b, supra scr. τὸ ἀπὸ τοῦ E. ὡς δὲ
 ἀλλ' ὡς V. 19. μόνον] om. P. 22. τῷ corr. ex τό m. 2 P.
 συμμέτρον] ἀ- add. m. rec. b, item lin. 24. 24. ἐστίν L.
 25. ἐστίν L. τό] τῷ V, et b, sed corr. 26. τῷ ὑπό τῶν
 Δ, E] m. 1 b, supra scr. m. rec. τῷ ἀπὸ τοῦ E. τό] τῷ P.

[αἱ γὰρ B, Γ ῥηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι], μέσον ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν A, E .

Εὗρονται ἄρα δύο μέσαι δυνάμει μόνον σύμμετροι αἱ A, E μέσον περιέχουσai, ὥστε τὴν μελίζονα τῆς ἐλάσσονος μελίζον δύνασθαι τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἐαυτῇ.

Ὅμοιως δὴ πάλιν δειχθήσεται καὶ τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου, ὅταν ἡ A τῆς Γ μελίζον δύνηται τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἐαυτῇ.

Λήμμα.

Ἔστω τρίγωνον ὀρθογώνιον τὸ $AB\Gamma$ ὀρθὴν ἔχον τὴν A , καὶ ἤχθω κάθετος ἡ AD · λέγω; ὅτι τὸ μὲν ὑπὸ τῶν GBA ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς BA , τὸ δὲ ὑπὸ τῶν $B\Gamma A$ ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς ΓA , καὶ τὸ ὑπὸ τῶν BAD , $AD\Gamma$ ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς AD , καὶ ἐτι τὸ ὑπὸ τῶν $B\Gamma$, AD ἴσον [ἐστὶ] τῷ ὑπὸ τῶν $BA, A\Gamma$.

Καὶ πρῶτον, ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν GBA ἴσον [ἐστὶ] τῷ ἀπὸ τῆς BA .

Ἐπεὶ γὰρ ἐν ὀρθογωνίῳ τριγώνῳ ἀπὸ τῆς ὀρθῆς γωνίας ἐπὶ τὴν βάσιν κάθετος ἤκται ἡ AD , τὰ ABD , $AD\Gamma$ ἄρα τρίγωνα ὁμοιά ἐστι τῷ τε ὅλῳ τῷ $AB\Gamma$ καὶ ἀλλήλοις. καὶ ἐπεὶ ὁμοιόν ἐστι τὸ $AB\Gamma$ τριγώνον τῷ ABD τριγώνῳ, ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΓB πρὸς τὴν BA , οὕτως ἡ BA πρὸς τὴν BD · τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν GBA ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς AB .

1. αἱ γὰρ — σύμμετροι] om. L F V b, mg. m. 2 B. εἰσιν P.

2. καὶ] om. L B. τὸ ὑπὸ τῶν A, E] m. 1 b, supra scr. m. rec. τὸ ἀπὸ τοῦ E . 3. ηὗρονται L F V b. 4. τὴν μὲν V. 5. συμμέτρου] ἀ-add. m. rec. b. 6. τῷ] τό V. συμμέτρου L, et B F, sed corr. 7. δύναται P b. συμμέτρου L, et B F, sed corr. 8. Post ἐαυτῇ add. ὅπερ ἔδει δεῖξαι V. Seq. lemma, u. app. 9. λήμμα] om. L. 10. ἔχων P. 11. A] ὑπὸ $B A \Gamma$ Theon (L B F V b); γρ. τὴν ὑπὸ $B A \Gamma$ mg. P. 12. $\Gamma B A$] supra add. B P V. ἐστὶν L.

quoniam $B \times \Gamma = \Delta \times E$, et $B \times \Gamma$ medium est [prop. XXI], etiam $\Delta \times E$ medium est.


Ergo inuentae sunt duae mediae potentia tantum commensurabiles medium comprehendentes Δ , E eius modi, ut maior quadrata minorem excedat quadrato rectae sibi commensurabilis.

Similiter rursus demonstrabimus, Δ^2 excedere E^2 quadrato rectae sibi incommensurabilis, si Δ^2 excedat Γ^2 quadrato rectae sibi incommensurabilis [prop. XXX].

Lemma.

Sit $AB\Gamma$ triangulus rectangulus rectum habens angulum A , et ducatur perpendicularis AA . dico, esse $\Gamma B \times BA = BA^2$, $B\Gamma \times \Gamma A = \Gamma A^2$, $BA \times \Delta \Gamma = AA^2$, $B\Gamma \times AA = BA \times \Delta \Gamma$.

et primum, esse $\Gamma B \times BA = BA^2$.



nam quoniam in triangulo rectangulo ab angulo recto ad basim perpendicularis ducta est AA , trianguli $AB\Delta$, $AA\Gamma$ et toti $AB\Gamma$ et inter se similes sunt [VI, 8]. et

quoniam $AB\Gamma \sim AB\Delta$, erit $\Gamma B : BA = BA : B\Delta$ [VI, 4]. quare [VI, 17] $\Gamma B \times BA = AB^2$.

13. $B\Gamma\Delta$] supra add. ΓPF ; $B\Gamma$, $\Gamma\Delta$ e corr. V. $\epsilon\sigma\upsilon\eta$] supra scr. m. 1 P. $\tau\eta\varsigma$] om. Bb. $\Delta\Gamma\varphi$. $B\Delta\Gamma$, supra add. Δ m. rec., P. 14. $B\Gamma$] e corr. V. 15. $\epsilon\sigma\tau\iota$] om. LBFVb. $\tau\omega\upsilon$] om. P. 16. $\tau\omega\upsilon$] om. P. $\Gamma B\Delta$] FVb, B m. 2; $\Gamma B LB$; $\Gamma\Delta B P$; ΓB , $B\Delta$ FV m. 2, P m. rec. $\epsilon\sigma\tau\iota$] om. LBFVb. 19. $\tau\acute{\alpha}$] corr. ex $\tau\eta\epsilon$ m. 2 B. $AB\Delta$] Δ in ras. m. 1 P. 20. $\Delta A\Gamma$? L. $\epsilon\sigma\tau\iota\nu$ LPB. 22. $AB\Delta$] B in ras. V. 23. BA] AB φ . BA] mut. in AB V. 24. ΓB , $B\Delta$ φ , m. rec. P, m. 2 V.

Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν $BΓΔ$ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$.

Καὶ ἐπεὶ, ἐὰν ἐν ὀρθογωνίῳ τριγώνῳ ἀπὸ τῆς ὀρθῆς γωνίας ἐπὶ τὴν βάσιν κάθετος ἀχθῇ, ἡ ἀχθεῖσα
 5 τῶν τῆς βάσεως τμημάτων μέση ἀνάλογόν ἐστιν, ἔστιν ἄρα ὥς ἡ $BΔ$ πρὸς τὴν $ΔΑ$, οὕτως ἡ $ΑΔ$ πρὸς τὴν $ΔΓ$. τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν $BΔ, ΔΓ$ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς $ΔΑ$.

Λέγω, ὅτι καὶ τὸ ὑπὸ τῶν $BΓ, ΑΔ$ ἴσον ἐστὶ τῷ
 0 ὑπὸ τῶν $ΒΑ, ΑΓ$. ἐπεὶ γάρ, ὥς ἔφαμεν, ὁμοίον ἐστὶ τὸ $ΑΒΓ$ τῷ $ΑΒΔ$, ἔστιν ἄρα ὥς ἡ $BΓ$ πρὸς τὴν $ΓΑ$, οὕτως ἡ $ΒΑ$ πρὸς τὴν $ΑΔ$ [ἐὰν δὲ τέσσαρες εὐθεῖαι ἀνάλογον ᾖσιν, τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν μέσων]. τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν $BΓ, ΑΔ$ ἴσον
 5 ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν $ΒΑ, ΑΓ$. ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

λγ'.

Εὐρεῖν δύο εὐθείας δυνάμει ἀσυμμέτρους ποιούσας τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων φητόν, τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν μέσον.

0 Ἐκκείσθωσαν δύο φηται δυνάμει μόνον σύμμετροι αἱ $ΑΒ, ΒΓ$, ὥστε τὴν μείζονα τὴν $ΑΒ$ τῆς ἐλάσσονος τῆς $ΒΓ$ μείζον δύνασθαι τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἐαυτῇ, καὶ τετμήσθω ἡ $ΒΓ$ δίχα κατὰ τὸ $Δ$, καὶ τῷ ἀφ' ὁποτέρας τῶν $BΔ, ΔΓ$ ἴσον παρὰ τὴν $ΑΒ$ παραβε-
 5 βλήσθω παραλληλόγραμμον ἐλλείπον εἶδει τετραγώνῳ, καὶ ἔστω τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΕΒ$, καὶ γεγραφθῶ ἐπὶ τῆς

1. $BΓ, ΓΔ$ m. rec. P, m. 2 V. ἐστὶ] om. Fb. 3. τριγώνῳ] supra scr. comp. m. 2 B. 6. $ΑΔ$] $ΔΑ$ B. 10. ἐστὶ] postea ins. F. 11. $ΑΒΓ$ τριγώνων F. $ΑΒΔ$] $ΑΓΔ$ B Fb, et supra scr. B m. 1 V. 12. $ΓΑ$] A in ras. V. $ΑΔ$]

eadem de causa etiam $B\Gamma \times \Gamma\Delta = A\Gamma^2$.

et quoniam, si in triangulo rectangulo ab angulo recto ad basim perpendicularis ducitur, recta ducta media est proportionalis partium basis [VI, 8 coroll.], erit $B\Delta : \Delta A = A\Delta : \Delta\Gamma$. quare [VI, 17] $B\Delta \times \Delta\Gamma = \Delta A^2$.

dico, esse etiam $B\Gamma \times A\Delta = BA \times A\Gamma$. nam quoniam, ut diximus, trianguli $AB\Gamma$, $AB\Delta$ similes sunt, erit [VI, 4] $B\Gamma : \Gamma A = BA : A\Delta$. itaque¹⁾ $B\Gamma \times A\Delta = BA \times A\Gamma$ [VI, 16]; quod erat demonstrandum.

XXXIII.

Inuenire duas rectas potentia incommensurabiles, quae summam quadratorum suorum rationalem efficiant, rectangulum autem medium.

Ponantur duae rationales potentia tantum commensurabiles AB , $B\Gamma$ eius modi, ut maior AB quadrata minorem $B\Gamma$ excedat quadrato rectae sibi incommensurabilis [prop. XXX], et $B\Gamma$ in Δ in duas partes aequales secetur, et quadrato $B\Delta^2$ uel $\Delta\Gamma^2$ aequale parallelogrammum rectae AB adplicetur figura quadrata deficiens [VI, 28] et sit $AE \times EB$, et in AB

1) Uerba quae praecedunt damnaui, quia non magis est, cur haec propositio omnibus uerbis citetur, quam VI, 17, quae bis in hoc lemmate tacite usus est.


ΔA φ. 13. ὁσα V. τό] corr. ex τῶ V. 15. τῶ] corr. ex τό m. 1 F, τό φ. τῶν] om. Bb. Seq. demonstr. alt., u. app. ὅπερ εἶδει δεῖξαι] comp. Pb, om. BFV. Seq. lemmata, u. app. 19. δέ F. 21. ἐλάττωτος b, comp. F. 22. μετρίονα P, corr. m. rec. 23. τῶ] corr. ex τό m. 1 V. 25. παραλλήλογραμον P. 26. AE, EB V, P m. rec.

AB ἡμικύκλιον τὸ AZB , καὶ ἤχθω τῇ AB πρὸς ὀρθὰς ἡ EZ , καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ AZ , ZB .

Καὶ ἐπεὶ [δύο] εὐθεῖαι ἄνισοι εἰσιν αἱ AB , $BΓ$, καὶ ἡ AB τῆς $BΓ$ μεῖζον δύνатаι τῷ ἀπὸ ἀσύμμετρον
 5 ἐάντῃ, τῷ δὲ τετάρτῳ τοῦ ἀπὸ τῆς $BΓ$, τουτέστι τῷ ἀπὸ τῆς ἡμισείας αὐτῆς, ἴσον παρὰ τὴν AB παραβέβληται παραλληλόγραμμον ἐλλείπον εἶδει τετραγώνῳ καὶ ποιεῖ τὸ ὑπὸ τῶν AEB , ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ AE τῇ EB . καὶ ἐστὶν ὥς ἡ AE πρὸς EB , οὕτως
 10 τὸ ὑπὸ τῶν BA , AE πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν AB , BE , ἴσον δὲ τὸ μὲν ὑπὸ τῶν BA , AE τῷ ἀπὸ τῆς AZ , τὸ δὲ ὑπὸ τῶν AB , BE τῷ ἀπὸ τῆς BZ · ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς AZ τῷ ἀπὸ τῆς ZB · αἱ AZ , ZB ἄρα δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι. καὶ ἐπεὶ ἡ AB ῥητὴ ἐστὶν,
 15 ῥητὸν ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς AB · ὥστε καὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AZ , ZB ῥητὸν ἐστὶν. καὶ ἐπεὶ πάλιν τὸ ὑπὸ τῶν AE , EB ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς EZ , ὑπόκειται δὲ τὸ ὑπὸ τῶν AE , EB καὶ τῷ ἀπὸ τῆς BA ἴσον, ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ZE τῇ BA ·
 20 διπλῇ ἄρα ἡ $BΓ$ τῆς ZE · ὥστε καὶ τὸ ὑπὸ τῶν AB , $BΓ$ σύμμετρον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν AB , EZ . μέσον δὲ τὸ ὑπὸ τῶν AB , $BΓ$ · μέσον ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν AB , EZ . ἴσον δὲ τὸ ὑπὸ τῶν AB , EZ τῷ ὑπὸ τῶν AZ , ZB · μέσον ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν AZ , ZB . ἐδείχθη
 25 δὲ καὶ ῥητὸν τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων.

1. AB] AEB b. ABZ P. 3. δύο] om. P, post εὐθεῖαι ins. m. 2. αἱ] m. rec. P. 4. συμμέτρον FV, corr. m. 2.

5. τὸ (τῷ V) δὲ τέταρτον BFVb, corr. m. 2 BV (τετάρτῳ m. rec. b). τῆς] τῆς ἐλάσσονος τῆς Theon (BFVb). τουτέστιν P. τῷ] τό Fb, corr. ex τό m. 2 B. 6. ἴσον] om. Fb, m. 2 B. 7. παραλληλόγραμμον] om. Fb, m. 2 B. 8. AE , EB V, m. rec. P. 9. πρὸς τὴν EB V. 10. τῶν] (alt.) om. P.



describatur semicirculus AZB , et ducatur ad AB perpendicularis EZ , et ducantur AZ , ZB .

et quoniam AB , $B\Gamma$ inaequales sunt rectae, et AB^2 excedit $B\Gamma^2$ quadrato rectae sibi incommensurabilis, et quartae parti quadrati $B\Gamma^2$, hoc est $(\frac{1}{4}B\Gamma)^2$, aequale parallelogrammum rectae AB adplicatum est figura quadrata deficiens et efficit $AE \times EB$, AE et EB incommensurabiles erunt [prop. XVIII]. est autem $AE:EB = BA \times AE:AB \times BE$ [u. p. 95 not.]; et $BA \times AE = AZ^2$, $AB \times BE = BZ^2$ [u. lemma]. itaque AZ^2 , ZB^2 incommensurabilia sunt [prop. XI]. quare AZ , ZB potentia incommensurabiles sunt. et quoniam AB rationalis est, etiam AB^2 rationale est. itaque summa quadratorum $AZ^2 + ZB^2$ rationale est [I, 47]. et quoniam rursus $AE \times EB = EZ^2$ [u. lemma], et supposuimus, esse etiam $AE \times EB = B\Delta^2$, erit $ZE = B\Delta$. itaque $B\Gamma = 2 ZE$. quare etiam $AB \times B\Gamma$ et $AB \times EZ$ commensurabilia sunt [prop. VI]. uerum $AB \times B\Gamma$ medium est [prop. XXI]. itaque etiam $AB \times EZ$ medium est [prop. XXIII coroll.]. uerum $AB \times EZ = AZ \times ZB$ [u. lemma]. itaque etiam $AZ \times ZB$ medium est. demonstrauius autem, etiam summam quadratorum earum rationalem esse.

12. ZB P. 13. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\acute{\iota}\nu$ P. ZB] (prius) BZ FVb. 14. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ BV, comp. Fb. 15. $\acute{\epsilon}\eta\tau\acute{o}\nu \acute{\alpha}\rho\alpha \acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$] mg. m. 1 F. 16. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ BV, comp. Fb. 19. $B\Delta$] (alt.) in ras. m. 1 P. 20. $\tau\eta\varsigma$] corr. ex $\tau\eta$ m. 1 V. 21. $\acute{\sigma}\acute{\upsilon}\mu\mu\epsilon\tau\rho\omicron\nu$] $\delta\iota\pi\lambda\acute{\alpha}\sigma\iota\omicron\nu$ Theon (BFVb); mg. m. 1: $\delta\iota\acute{\alpha} \tau\acute{o} \tau\eta\nu B\Gamma \delta\iota\pi\lambda\acute{\alpha}\sigma\iota\omicron\nu \acute{\epsilon}\iota\nu\alpha\iota \tau\eta\varsigma B\Delta$, $\tau\eta\nu \delta\acute{\epsilon} B\Delta \acute{\iota}\sigma\eta\nu \acute{\epsilon}\iota\nu\alpha\iota \tau\eta EZ$ pro scholio P. $\tau\acute{\omega}$] τοῦ Theon (BFV). 22. $AB\Gamma$ BFb, et V, corr. m. 2. 23. $\delta\acute{\epsilon}$] om. b.

Εὐρηνται ἄρα δύο εὐθείαι δυνάμει ἀσύμμετροι αἱ AZ , ZB ποιοῦσαι τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων ρητόν, τὸ δὲ ὑπ' αὐτῶν μέσον· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

5

λδ'.

Εὐρεῖν δύο εὐθείας δυνάμει ἀσυμμέτρους ποιούσας τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων μέσον, τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν ρητόν.

Ἐκκείσθωσαν δύο μέσαι δυνάμει μόνον σύμμετροι αἱ AB , $BΓ$ ρητόν περιέχουσαι τὸ ὑπ' αὐτῶν, ὥστε τὴν AB τῆς $BΓ$ μείζον δύνασθαι τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ, καὶ γεγράφθω ἐπὶ τῆς AB τὸ $ΑΔΒ$ ἡμικύκλιον, καὶ τεμήσθω ἡ $BΓ$ δίχα κατὰ τὸ E , καὶ παραβελήσθω παρὰ τὴν AB τῷ ἀπὸ τῆς BE ἴσον 5 παραλληλόγραμμον ἐλλείπον εἰδει τετραγώνῳ τὸ ὑπὸ τῶν AZB · ἀσύμμετρος ἄρα ἡ AZ τῇ ZB μήκει. καὶ ἡχθῶ ἀπὸ τοῦ Z τῇ AB πρὸς ὀρθὰς ἡ $ZΔ$, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ $ΑΔ$, $ΔB$.

Ἐπεὶ ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ AZ τῇ ZB , ἀσύμμετρον 0 ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν BA , AZ τῷ ὑπὸ τῶν AB , BZ . ἴσον δὲ τὸ μὲν ὑπὸ τῶν BA , AZ τῷ ἀπὸ τῆς $ΑΔ$, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν AB , BZ τῷ ἀπὸ τῆς $ΔB$ · ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΔ$ τῷ ἀπὸ τῆς $ΔB$. καὶ ἐπεὶ μέσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς AB , μέσον ἄρα καὶ 5 τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔB$. καὶ ἐπεὶ


1. ἡὐρηνται FV. 3. ρητῶν b, corr. m. 1. δ' BVb. ἀπ' F. 4. δεῖξαι] εὐρεῖν b, mg. m. 1: γε. δεῖξαι; in F mg. m. 2: γε. εὐρεῖν. 7. τό] corr. ex τόν P. 8. δέ F. 11. συμμέτρον F, corr. m. 1. 15. ἐλλείπον εἰδει τετραγώνῳ] om. Fb, m. 2 B. τό] ποιοῦν τό V. 16. τῶν AZB] non liquet F. AZ , ZB V. σύμμετρος φ, et B, corr. m. 2. ἐστίν] om. P, ἔσται φ. ZB] BZ P. 18. $ZΔ$] $ΔZ$ e corr. m. 2 V. $ΔB$]

Ergo inuentae sunt duae rectae potentia incommensurabiles AZ , ZB , quae summam quadratorum suorum rationalem efficiant, rectangulum autem medium; quod erat demonstrandum.

XXXIV.

Inuenire duas rectas potentia incommensurabiles, quae summam quadratorum suorum mediam efficiant, rectangulum autem rationale.

Ponantur duae mediae potentia tantum commensurabiles spatium rationale comprehendentes AB , $B\Gamma$



eius modi, ut AB^2 excedat $B\Gamma^2$ quadrato rectae sibi incommensurabilis [prop. XXXI], et in AB

describatur $A\Delta B$ semicirculus, et $B\Gamma$ in E in duas partes aequales secetur, et rectae AB quadrato BE^2 aequale parallelogrammum adplicetur $AZ \times ZB$ figura quadrata deficiens [VI, 28]. itaque AZ , ZB longitudine incommensurabiles sunt [prop. XVIII]. et a Z ad rectam AB perpendicularis ducatur $Z\Delta$, et ducantur $A\Delta$, ΔB .

quoniam AZ , ZB incommensurabiles sunt, etiam $BA \times AZ$ et $AB \times BZ$ incommensurabilia sunt [prop. XI]. uerum $BA \times AZ = A\Delta^2$, $AB \times BZ = \Delta B^2$ [prop. XXXII lemma]. ergo $A\Delta^2$, ΔB^2 incommensurabilia sunt.

et quoniam AB^2 medium est, etiam $A\Delta^2 + \Delta B^2$ medium est [III, 31. I, 47].

corr. ex $\Delta\Gamma$ V. 19. καὶ ἐπεὶ V, ἐπεὶ οὖν m. rec. P. 23. ἐστὶν P. τῆς] (alt.) om. P. ΓB b, corr. m. 1. 25. ΔB] in ras. V.

διπλῇ ἐστὶν ἡ $B\Gamma$ τῆς ΔZ , διπλάσιον ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ τοῦ ὑπὸ τῶν AB , $Z\Delta$. φητόν δὲ τὸ ὑπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ φητόν ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν AB , $Z\Delta$. τὸ δὲ ὑπὸ τῶν AB , $Z\Delta$ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν $A\Delta$, ΔB ὥστε καὶ τὸ ὑπὸ τῶν $A\Delta$, ΔB φητόν ἐστίν.

Εὐρίηται ἄρα δύο εὐθείαι δυνάμει ἀσύμμετροι αἱ $A\Delta$, ΔB ποιοῦσαι τὸ [μέν] συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων μέσον, τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν φητόν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

0

λε'.

Εὐρίηται δύο εὐθείαι δυνάμει ἀσύμμετρος ποιοῦσας τὸ τε συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων μέσον καὶ τὸ ὑπ' αὐτῶν μέσον καὶ ἔτι ἀσύμμετρον τῷ συγκειμένῳ ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων.

Ἐκκείσθωσαν δύο μέσαι δυνάμει μόνον σύμμετροι αἱ AB , $B\Gamma$ μέσον περιέχουσαι, ὥστε τὴν AB τῆς $B\Gamma$ μείζον δύνασθαι τῷ ἀπὸ ἀσύμμετρου ἑαυτῇ, καὶ γεγράφθω ἐπὶ τῆς AB ἡμικύκλιον τὸ $A\Delta B$, καὶ τὰ λοιπὰ γερονέτω τοῖς ἐπάνω ὁμοίως.

Καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρός ἐστὶν ἡ AZ τῇ ZB μήκει, ἀσύμμετρός ἐστι καὶ ἡ $A\Delta$ τῇ ΔB δυνάμει. καὶ ἐπεὶ μέσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς AB , μέσον ἄρα καὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $A\Delta$, ΔB . καὶ ἐπεὶ τὸ ὑπὸ

1. διπλῇ] διπλασίῳ Theon (BFVb). 2. τοῦ] e corr. F. Post $Z\Delta$ add. ὥστε καὶ σύμμετρον V, B m. 2. 3. Post $B\Gamma$ add. Theon: ὁπόκειται γάρ (οὕτως add. V) (BFVb). 4. $Z\Delta$] corr. in BZ m. 2 F, corr. ex BZ m. rec. b. τό] τῷ BF, τῷ δὲ τῷ b. τῷ] τό Bfb. τῶν] om. Pb. 6. ἡύρηται Vb. σύμμετροι P, corr. m. 1. 7. μέν] om. P. 8. τετραγώνων F et V, sed corr. δέ F. 9. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. BFVb. 10. λς' F, corr. m. 1. 13. τετραγώνων b, et F,


et quoniam $B\Gamma = 2 \Delta Z$, erit etiam $AB \times B\Gamma = 2 AB \times \Delta Z$. uerum $AB \times B\Gamma$ rationale est. itaque etiam $AB \times \Delta Z$ rationale est [prop. VI; def. 4]. uerum $AB \times \Delta Z = \Delta\Delta \times \Delta B$ [prop. XXXII lemma]. quare etiam $\Delta\Delta \times \Delta B$ rationale est.

Ergo inuentae sunt duae rectae potentia incommensurabiles $\Delta\Delta$, ΔB , quae summam quadratorum suorum mediam efficiant, rectangulum autem rationale; quod erat demonstrandum.

XXXV.

Inuenire duas rectas potentia incommensurabiles, quae et summam quadratorum suorum mediam efficiant et rectangulum medium et simul summae quadratorum incommensurabile.

Ponantur duae mediae potentia tantum commensurabiles AB , $B\Gamma$ medium comprehendentes eius modi, ut AB^2 excedat $B\Gamma^2$ quadrato rectae sibi incommensurabilis [prop. XXXII], et in AB semicirculus describatur ΔAB , et reliqua fiant, sicut supra.



et quoniam ΔZ , ZB longitudine incommensurabiles sunt, etiam $\Delta\Delta$, ΔB potentia incommensura-

biles sunt [prop. XI]. et quoniam AB^2 medium est, etiam $\Delta\Delta^2 + \Delta B^2$ medium est [prop. XXIII coroll.]. et

sed corr. 17. $B\Gamma$] (alt.) Γ b. 18. $\sigma\upsilon\mu\mu\acute{\epsilon}\tau\epsilon\rho\omicron\nu$ b et F, corr. m. 1.
 19. $\Delta\Delta B$] corr. ex $\Delta\Gamma B$ m. 1 b, $\Delta B\Delta$ φ. 20. $\gamma\epsilon\gamma\omicron\nu\acute{\epsilon}\tau\omega$] supra scr. F. $\acute{\epsilon}\pi\acute{\alpha}\nu\omega$ $\epsilon\lambda\eta\gamma\mu\acute{\epsilon}\nu\omicron\iota\varsigma$ V. $\acute{\omicron}\mu\omicron\iota\omega\iota\varsigma$] om. Fb, m. 2
 BV. 21. $\acute{\epsilon}\pi\epsilon\lambda\acute{\iota}$] om. B, corr. m. 2. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$] supra m. 1 P.
 ZB] BZ B. 22. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$] $\acute{\alpha}\rho\alpha$ $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ F, $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$ B.

τῶν AZ , ZB ἴσον ἐστὶ τῷ ἄφ' ἑκατέρας τῶν BE , ΔZ ,
 ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ BE τῇ ΔZ · διπλῇ ἄρα ἡ $B\Gamma$ τῆς
 $Z\Delta$ · ὥστε καὶ τὸ ὑπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ διπλασίον ἐστι
 τοῦ ὑπὸ τῶν AB , $Z\Delta$. μέσον δὲ τὸ ὑπὸ τῶν AB ,
 5 $B\Gamma$ · μέσον ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν AB , $Z\Delta$. καὶ ἐστὶν
 ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν $A\Delta$, ΔB · μέσον ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ
 τῶν $A\Delta$, ΔB . καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρός ἐστὶν ἡ AB τῇ
 $B\Gamma$ μήκει, σύμμετρος δὲ ἡ ΓB τῇ BE , ἀσύμμετρος
 ἄρα καὶ ἡ AB τῇ BE μήκει· ὥστε καὶ τὸ ἀπὸ τῆς
 10 AB τῷ ὑπὸ τῶν AB , BE ἀσύμμετρόν ἐστιν. ἀλλὰ
 τῷ μὲν ἀπὸ τῆς AB ἴσα ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν $A\Delta$, ΔB ,
 τῷ δὲ ὑπὸ τῶν AB , BE ἴσον ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν AB ,
 $Z\Delta$, τουτέστι τὸ ὑπὸ τῶν $A\Delta$, ΔB · ἀσύμμετρον ἄρα
 ἐστὶ το συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $A\Delta$, ΔB τῷ
 15 ὑπὸ τῶν $A\Delta$, ΔB .

Εὐρίηται ἄρα δύο εὐθεῖαι αἱ $A\Delta$, ΔB δυνάμει
 ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τό τε συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ'
 αὐτῶν μέσον καὶ τὸ ὑπ' αὐτῶν μέσον καὶ ἔτι ἀσύμ-
 μετρον τῷ συγκειμένῳ ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων·
 20 ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

λς'.

Ἐὰν δύο ῥηταὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι
 συντεθῶσιν, ἡ ὅλη ἄλογός ἐστιν, καλείσθω δὲ
 ἐκ δύο ὀνομάτων.

25 Συγκείμεσθωσαν γὰρ δύο ῥηταὶ δυνάμει μόνον σύμ-
 μετροι αἱ AB , $B\Gamma$ · λέγω, ὅτι ὅλη ἡ $A\Gamma$ ἄλογός ἐστιν.


1. AZ] ΔZ b. τῷ] τῷ ἀπὸ P, corr. m. rec. 3. ΔZ
 B F b. 4. τοῦ] τό F, corr. ex τό m. rec. P, mut. in τῷ m. 1 b.
 τὸ ὑπό — 5. ἄρα καὶ] mg. m. 2 B. 8. $B\Gamma$] ΓB F. ΓB] mut. in $B\Gamma$ V. 9. AB] BA e corr. m. 2 V. τό] ins. m. 2 F. 10. τῷ] corr. ex τό F. σύμμετρον F, corr. m. 1. ἄρα ἐστὶν b, ἄρα supra add. F. 11. ἐστὶν P. τῶν] ins. m. 2 F. 12. τῷ] corr. ex τά m. 1 F. 13. ΔZ B. τουτέστιν P. 14.

quoniam $AZ \times ZB = BE^2 = AZ^2$, erit $BE = AZ$. itaque $B\Gamma = 2 Z\Delta$. quare etiam $AB \times B\Gamma = 2 AB \times Z\Delta$. uerum $AB \times B\Gamma$ medium est. itaque etiam $AB \times Z\Delta$ medium est. et $AB \times Z\Delta = A\Delta \times \Delta B$ [prop. XXXII lemma]. itaque etiam $A\Delta \times \Delta B$ medium est. et quoniam $AB, B\Gamma$ longitudine incommensurabiles sunt, et $\Gamma B, BE$ commensurabiles, etiam AB, BE longitudine incommensurabiles sunt [prop. XIII]. quare etiam AB^2 et $AB \times BE$ incommensurabilia sunt [prop. XXI lemma; prop. XI]. uerum $A\Delta^2 + \Delta B^2 = AB^2$ [I, 47] et $AB \times Z\Delta = AB \times BE = A\Delta \times \Delta B$. itaque $A\Delta^2 + \Delta B^2$ et $A\Delta \times \Delta B$ incommensurabilia sunt.

Ergo inuentae sunt duae rectae $A\Delta, \Delta B$ potentia incommensurabiles, quae et summam quadratorum suorum mediam efficiant et rectangulum medium et simul summae quadratorum incommensurabile; quod erat demonstrandum.

XXXVI.

Si duae rectae rationales potentia tantum commensurabiles componuntur, tota irrationalis est, uocetur autem ex duobus nominibus.

Componantur enim duae
 rectae rationales potentia tan-

$\tau\omega\upsilon$] (prius) mut. in $\tau\eta\varsigma$ m. 1 b. 16. $af A\Delta, \Delta B$] om. V.
 18. $\alpha\upsilon\tau\omega\upsilon\upsilon\tau\epsilon\tau\rho\alpha\gamma\omega\upsilon\omega\upsilon$ V. $\mu\acute{\epsilon}\sigma\sigma\omicron\upsilon\kappa\alpha\iota$] mg. V. $\kappa\alpha\iota\tau\acute{o}$
 seq. ras. 1 litt. V, $\tau\acute{o}\delta\acute{\epsilon}$ Fb, $\tau\acute{o}\delta'$ B. 20. $\acute{o}\pi\epsilon\rho\ \xi\delta\epsilon\iota\ \delta\epsilon\iota\chi\alpha\iota$
 comp. P, om. BFVb. Seq. $\acute{\alpha}\rho\chi\eta\ \tau\omega\upsilon\upsilon\ \kappa\alpha\tau\acute{\alpha}\ \sigma\acute{\upsilon}\nu\theta\epsilon\sigma\iota\upsilon\ \xi\acute{\xi}\acute{\alpha}\delta\omega\upsilon$
 BFb, mg. V; et in mg. $\xi\upsilon\tau\epsilon\upsilon\theta\epsilon\upsilon\ \acute{\alpha}\rho\chi\epsilon\tau\alpha\iota\ \pi\alpha\rho\alpha\delta\iota\delta\acute{o}\nu\alpha\iota\ \kappa\alpha\tau\acute{\alpha}\$
 $\sigma\acute{\upsilon}\nu\theta\epsilon\sigma\iota\upsilon\ \xi\acute{\xi}$ ($\xi\acute{\xi}\eta\varsigma$ V) $\acute{\alpha}\lambda\acute{o}\gamma\omicron\upsilon\varsigma$ BFVb. 21. $\lambda\zeta'$] mut. in $\lambda\zeta'$ F.
 23. $\xi\sigma\tau\iota$ BV, comp. Fb. $\kappa\alpha\lambda\epsilon\iota\tau\alpha\iota$ P. 26. $\acute{o}\lambda\eta$] om. FVb,
 m. 2 B. AB b, corr. m. 1.

Ἐπεὶ γὰρ ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ AB τῇ $BΓ$ μήκει·
 δυνάμει γὰρ μόνον εἰσὶ σύμμετροι· ὥς δὲ ἡ AB πρὸς
 τὴν $BΓ$, οὕτως το ὑπὸ τῶν $ABΓ$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς
 $BΓ$, ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν AB , $BΓ$ τῷ
 5 ἀπὸ τῆς $BΓ$. ἀλλὰ τῷ μὲν ὑπὸ τῶν AB , $BΓ$ σύμ-
 μετρόν ἐστι τὸ δις ὑπὸ τῶν AB , $BΓ$, τῷ δὲ ἀπὸ τῆς
 $BΓ$ σύμμετρά ἐστι τὰ ἀπὸ τῶν AB , $BΓ$ · αἱ γὰρ AB ,
 $BΓ$ ζηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἀσύμμετρον
 ἄρα ἐστὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν AB , $BΓ$ τοῖς ἀπὸ τῶν AB , $BΓ$.
 10 καὶ συνθέντι τὸ δις ὑπὸ τῶν AB , $BΓ$ μετὰ τῶν ἀπὸ
 τῶν AB , $BΓ$, τουτέστι τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$, ἀσύμμετρόν
 ἐστι τῷ συγκειμένῳ ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AB , $BΓ$. ζητὸν
 δὲ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AB , $BΓ$ ἄλογον
 ἄρα [ἐστὶ] τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$ · ὥστε καὶ ἡ $ΑΓ$ ἄλογός
 15 ἐστίν, καλεισθῶ δὲ ἐκ δύο ὀνομάτων· ὅπερ ἔδει
 δεῖξαι.

λξ'.

Ἐὰν δύο μέσαι δυνάμει μόνον σύμμετροι
 συντεθῶσι ζητὸν περιέχουσαι, ἡ ὅλη ἄλογός
 20 ἐστίν, καλεισθῶ δὲ ἐκ δύο μέσων πρώτη.
 Συγκεισθῶσαν γὰρ δύο μέσαι δυνάμει μόνον σύμ-
 μετροι αἱ AB , $BΓ$ ζητὸν περιέχουσαι· λέγω, ὅτι ὅλη
 ἡ $ΑΓ$ ἄλογός ἐστιν.

1. σύμμετρος P, corr. m. 1. 3. ὑπό] α in ras. in extr.
 lin. F. τῶν] τῆς F. $ABΓ$] $AB F$; AB , $BΓ$ e corr. V, m.
 rec. P. ἀπὸ τῆς $BΓ$] seq. α eras. b, ὑπὸ τῶν AB , $BΓ$ F.
 4. ὑπὸ τῶν] ἀπὸ τῆς F. $BΓ$] om. F. 5. ἀπὸ τῆς] ὑπὸ
 τῶν $AB F$. 7. $BΓ$] (prius) $AB F$, sed corr.? αἱ — 8. σύμ-
 μετροι] om. Theon (BFVb). 8. ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τό] τὸ
 ἄρα V, ὥστε καὶ τό BFb. 9. τοῖς] ἀσύμμετρόν ἐστι τοῖς F.
 $BΓ$ ἀσύμμετρόν ἐστι BVb. 10. συντεθέντι P et V, sed corr.;
 συντεθέν F, corr. m. 1 et 2. τῶν] (alt.) corr. ex τοῦ m. 2 F. 11.
 AB] corr. ex $ΑΓ$ V. τουτέστιν P. 12. ἐστίν P. 13. ἄλογος
 F, corr. m. 2. 14. ἐστὶ] om. BFVb. 15. ἐστὶ PBV, comp.

tum commensurabiles AB , $B\Gamma$. dico, totam $A\Gamma$ irrationalem esse.

nam quoniam AB , $B\Gamma$ longitudine incommensurabiles sunt (nam potentia tantum sunt commensurabiles), et $AB : B\Gamma = AB \times B\Gamma : B\Gamma^2$ [prop. XXI lemma], etiam $AB \times B\Gamma$ et $B\Gamma^2$ incommensurabilia sunt [prop. XI]. uerum $AB \times B\Gamma$ et $2 AB \times B\Gamma$ commensurabilia sunt [prop. VI], et $AB^2 + B\Gamma^2$, $B\Gamma^2$ commensurabilia sunt (nam AB , $B\Gamma$ rationales sunt potentia tantum commensurabiles) [prop. XV]. itaque $2 AB \times B\Gamma$ et $AB^2 + B\Gamma^2$ incommensurabilia sunt [prop. XIII]. et componendo

$2 AB \times B\Gamma + AB^2 + B\Gamma^2$, hoc est $A\Gamma^2$ [II, 4], et $AB^2 + B\Gamma^2$ incommensurabilia sunt [prop. XVI]. uerum $AB^2 + B\Gamma^2$ rationale est. itaque $A\Gamma^2$ irrationalis est [def. 4]. quare etiam $A\Gamma$ irrationalis est [def. 4], uocetur autem ex duobus nominibus; quod erat demonstrandum.

XXXVII.

Si duae rectae mediae potentia tantum commensurabiles componuntur spatium rationale comprehendentes, tota irrationalis est, uocetur autem ex duabus mediis prima.

Componantur enim duae mediae potentia tantum commensurabiles AB , $B\Gamma$ spatium rationale comprehendentes [prop. XXVII]. dico, totam $A\Gamma$ irrationalem esse.

Fb. Ante $\delta\pi\epsilon\sigma$ schol. est, u. app. $\delta\pi\epsilon\sigma$ $\xi\delta\epsilon\iota$ $\delta\epsilon\iota\chi\alpha\iota$] comp. P, om. BFVb. 17. $\lambda\eta'$ F. 19. $\sigma\upsilon\nu\tau\epsilon\theta\acute{\omega}\sigma\iota\nu$ BF. 20. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ PBV, comp. Fb. 21. $\sigma\upsilon\gamma\kappa\alpha\lambda\epsilon\iota\sigma\theta\omega\sigma\alpha\nu$ b. 22. $\kappa\alpha\iota$ $\lambda\acute{\epsilon}\gamma\omega$ F. $\delta\lambda\eta$] post ras. 1 litt. P, om. Fb.

Ἐπεὶ γὰρ ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ AB τῇ $BΓ$ μήκει, καὶ τὰ ἀπὸ τῶν AB , $BΓ$ ἄρα ἀσύμμετρά ἐστι τῷ δις ὑπὸ τῶν AB , $BΓ$ καὶ συνθέντι τὰ ἀπὸ τῶν AB , $BΓ$ μετὰ τοῦ δις ὑπὸ τῶν AB , $BΓ$, ὅπερ ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$, ἀσύμμετρόν ἐστι τῷ ὑπὸ τῶν AB , $BΓ$. φητὸν δὲ τὸ ὑπὸ τῶν AB , $BΓ$ ὑπόκεινται γὰρ αἱ AB , $BΓ$ φητὸν περιέχουσαι· ἄλογον ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$ · ἄλογος ἄρα ἡ $ΑΓ$, καλείσθω δὲ ἐκ δύο μέσων πρώτη· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

10

λη'.

Ἐὰν δύο μέσαι δυνάμει μόνον σύμμετροι συντεθῶσι μέσον περιέχουσai, ἡ ὅλη ἄλογός ἐστιν, καλείσθω δὲ ἐκ δύο μέσων δευτέρα.
 αὐ Συγκείσθωσαν γὰρ δύο μέσαι δυνάμει μόνον σύμ-
 15 μετροι αἱ AB , $BΓ$ μέσον περιέχουσai· λέγω, ὅτι ἄλογός ἐστιν ἡ $ΑΓ$.

Ἐκκείσθω γὰρ φητὴ ἡ $ΔΕ$, καὶ τῷ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$ ἴσον παρὰ τὴν $ΔΕ$ παραβεβλήσθω τὸ $ΔΖ$ πλάτος ποιοῦν τὴν $ΔΗ$. καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$ ἴσον ἐστὶ
 20 τοῖς τε ἀπὸ τῶν AB , $BΓ$ καὶ τῷ δις ὑπὸ τῶν AB , $BΓ$, παραβεβλήσθω δὴ τοῖς ἀπὸ τῶν AB , $BΓ$ παρὰ τὴν $ΔΕ$ ἴσον τὸ $ΕΘ$ · λοιπὸν ἄρα τὸ $ΘΖ$ ἴσον ἐστὶ τῷ δις ὑπὸ τῶν AB , $BΓ$. καὶ ἐπεὶ μέση ἐστὶν ἑκατέρα τῶν AB , $BΓ$, μέσα ἄρα ἐστὶ καὶ τὰ ἀπὸ τῶν


1. τῇ] m. rec. P. $ΑΓ$ b. 2. ἐστι τῷ] corr. ex ἔστω m. 2 B. τῷ] corr. ex τό F. 3. καὶ] om. Theon (BFVb). συντεθέντι P. ἄρα τὰ Theon (BFVb). τὰ] τό V. 4. ἐστὶν P. τὸ ἀπό] in ras. m. 1 P. 5. σύμμετρα F, sed. corr. ἐστὶν P. $BΓ$] postea ins. F. φητόν — 6. $BΓ$] (prius) om. F b, m. 2 B. 6. γὰρ] m. 2 B, δέ F b, B m. 1. αἱ] αἱ ἀπὸ τῶν b. 7. ἄλογος — 8. $ΑΓ$] mg. m. 1 P. 8. πρώτη] seq. schol., u. app. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. BFVb. 10. λθ' F.

nam quoniam AB , $B\Gamma$ longitudine incommensurabiles sunt, etiam $AB^2 + B\Gamma^2$ et $2 AB \times B\Gamma$ incommensurabilia sunt [cfr. p. 108, 1 sq.]. et componendo $AB^2 + B\Gamma^2 + 2 AB \times B\Gamma$, hoc est $A\Gamma^2$ [II, 4], et $AB \times B\Gamma$ incommensurabilia sunt [prop. XVI]. uerum $AB \times B\Gamma$ rationale est; supposuimus enim, AB et $B\Gamma$ spatium rationale comprehendere. itaque $A\Gamma^2$ irrationale est. ergo $A\Gamma$ irrationalis est [def. 4], uocetur autem ex duabus mediis prima; quod erat demonstrandum.

XXXVIII.

Si duae mediae potentia tantum commensurabiles componuntur medium comprehendentes, tota irrationalis est, uocetur autem ex duabus mediis secunda.

Componantur enim duae mediae potentia tantum commensurabiles AB , $B\Gamma$ medium comprehendentes [prop. XXVIII]. dico, $A\Gamma$ irrationalem esse.



ponatur enim rationalis AE , et quadrato $A\Gamma^2$ aequale rectae AE adplicetur AZ latitudinem efficiens AH [I, 44]. et

quoniam $A\Gamma^2 = AB^2 + B\Gamma^2 + 2 AB \times B\Gamma$ [II, 4],

12. συντεθῶσιν PF. 13. ἐστὶ BV, comp. Fb. 17. γὰρ] om. FVb, m. 2 B. ἡ] corr. ex α V. τῶ] corr. ex τὸ m. 2 P. 21. Post BΓ add. Theon: τὸ δὲ ἀπὸ τῆς AΓ ἴσον ἐστὶ τῷ AZ, καὶ τὸ AZ ἴσον ἐστὶ τοῖς (τε add. V) ἀπὸ τῶν AB, BΓ καὶ τῷ δις ὑπὸ τῶν AB, BΓ (BVb, F mg. m. 1). δὴ παρὰ τὴν AE V. παρὰ τὴν AE] om. V. 22. ἐστὶ] m. 2 F. 24. μέση B, corr. m. 2. ἐστὶ] m. 2 V.

AB , $B\Gamma$. μέσον δὲ ὑπόκειται καὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν
 AB , $B\Gamma$. καὶ ἐστὶ τοῖς μὲν ἀπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ ἴσον
τὸ $E\Theta$, τῷ δὲ δις ὑπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ ἴσον τὸ $Z\Theta$.
μέσον ἄρα ἐκάτερον τῶν $E\Theta$, ΘZ . καὶ παρὰ ρητὴν
5 τὴν ΔE παράκειται· ρητὴ ἄρα ἐστὶν ἐκατέρωτα τῶν
 $\Delta\Theta$, ΘH καὶ ἀσύμμετρος τῇ ΔE μήκει. ἐπεὶ οὖν
ἀσύμμετρός ἐστὶν ἡ AB τῇ $B\Gamma$ μήκει, καὶ ἐστὶν ὡς
ἡ AB πρὸς τὴν $B\Gamma$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς AB πρὸς τὸ
ὑπο τῶν AB , $B\Gamma$, ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς
10 AB τῷ ὑπὸ τῶν AB , $B\Gamma$. ἀλλὰ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς
 AB σύμμετρόν ἐστι τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν
 AB , $B\Gamma$ τετραγώνων, τῷ δὲ ὑπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ σύμ-
μετρόν ἐστι τὸ δις ὑπὸ τῶν AB , $B\Gamma$. ἀσύμμετρον ἄρα
ἐστὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ τῷ δις
15 ὑπὸ τῶν AB , $B\Gamma$. ἀλλὰ τοῖς μὲν ἀπὸ τῶν AB , $B\Gamma$
ἴσον ἐστὶ τὸ $E\Theta$, τῷ δὲ δις ὑπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ ἴσον
ἐστὶ τὸ ΘZ . ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ $E\Theta$ τῷ ΘZ .
ὥστε καὶ ἡ $\Delta\Theta$ τῇ ΘH ἐστὶν ἀσύμμετρος μήκει. αὐ
 $\Delta\Theta$, ΘH ἄρα ρηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι.
20 ὥστε ἡ ΔH ἄλογός ἐστιν. ρητὴ δὲ ἡ ΔE . τὸ δὲ ὑπὸ
ἀλόγου καὶ ρητῆς περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἄλογόν
ἐστίν· ἄλογον ἄρα ἐστὶ τὸ ΔZ χωρίον, καὶ ἡ δυνα-
μένη [αὐτὸ] ἄλογός ἐστιν. δύναται δὲ τὸ ΔZ ἢ $A\Gamma$.

1. καί] om. BFb; τὸ ὑπὸ τῶν (om. Fb) AB , $B\Gamma$. μέσον
ἄρα Bb, postea ins. F; κείμενον· τὸ δις ὑπὸ τῶν AB , $B\Gamma$.
μέσον ἄρα mg. m. rec. B. ὑπὸ τῶν] spat. uac. F. 3. $Z\Theta$
corr. ex ΘZ V. 5. παράκειται V. 6. ἐπεὶ οὖν] καὶ ἐπεὶ
Theon (BFVb). 7. καὶ — 9. $B\Gamma$] om. Theon (BFVb). 9.
ἀσύμμετρον — 10. $B\Gamma$] punctis del. V. 9. ἄρα] om. FVb,
m. rec. B. ἐστὶν P. ἀπὸ τῆς AB τῷ] συγκείμενον ἐκ τῶν
ἀπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ τῷ δις Theon (BFVb). 10. ἀλλὰ — 15.
 AB , $B\Gamma$ (prius)] om. Theon (BFVb). In mg. καὶ ἐστὶν lin. 7
— AB , $B\Gamma$ lin. 15 addito κείμενον et signis $\times \cup$ ad locum
suum relat. V (lin. 10 ἀπὸ pro ὑπὸ), eadem B mg. m. 2, nisi

rectae $\angle E$ adplicetur $E\Theta$ quadratis $AB^2 + B\Gamma^2$ aequale. itaque reliquum $\Theta Z = 2 AB \times B\Gamma$. et quoniam media est utraque $AB, B\Gamma$, etiam $AB^2 + B\Gamma^2$ media sunt. supposuimus autem, etiam $2 AB \times B\Gamma$ medium esse. et $E\Theta = AB^2 + B\Gamma^2$, $\Theta Z = 2 AB \times B\Gamma$. itaque utrumque $E\Theta, \Theta Z$ medium est. et rationali $\angle E$ adplicata sunt. itaque utraque $\angle\Theta, \Theta H$ rationalis est et rectae $\angle E$ longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. iam quoniam $AB, B\Gamma$ longitudine incommensurabiles sunt, et $AB : B\Gamma = AB^2 : AB \times B\Gamma$ [prop. XXI lemma], AB^2 et $AB \times B\Gamma$ incommensurabilia sunt [prop. XI]. uerum AB^2 et $AB^2 + B\Gamma^2$ commensurabilia sunt [prop. XV], et $AB \times B\Gamma, 2 AB \times B\Gamma$ commensurabilia sunt [prop. VI]. itaque $AB^2 + B\Gamma^2$ et $2 AB \times B\Gamma$ incommensurabilia sunt [prop. XIII]. uerum $E\Theta = AB^2 + B\Gamma^2$, $\Theta Z = 2 AB \times B\Gamma$. itaque $E\Theta, \Theta Z$ incommensurabilia sunt. quare etiam $\angle\Theta, \Theta H$ longitudine incommensurabiles sunt [VI, 1; prop. XI]. ergo $\angle\Theta, \Theta H$ rationales sunt potentia tantum commensurabiles. quare $\angle H$ irrationalis est [prop. XXXVI]. uerum $\angle E$ rationalis est. rectangulum autem recta irrationali et rationali comprehensum irrationale est [prop. XX]. quare spatium $\angle Z$ irrationale est, et recta ei aequalis quadrata irrationalis est [def. 4]. uerum $\angle\Gamma^2 = \angle Z$. ergo $\angle\Gamma$ irrationalis est; uocetur

quod om. ἀπό lin. 14 — $AB, B\Gamma$ lin. 15 et del. ἀσύμμετρον lin 18 — ἐκ τῶν lin. 14. 17. ΘZ] mut. in $Z\Theta$ V, $Z\Theta$ B F b. ἐστίν P. ΘZ] $Z\Theta$ B b. 18. ἀσύμμετρός ἐστι V. μήκει om. F b, m. 2 B. Deinde add. ἐδείχθησαν δὲ ὅτι V, m. 2 B. 19. εἰσιν P B. 20. ἐστὶ B V, comp. F b. 22. ἐστίν P. καὶ] ὥστε καὶ V. 23. αὐτό] om. P. ἐστὶ P B V, comp. F b. δὲ ἡ $\angle Z$ τὸ $\angle\Gamma$ ἄρα ἄλογός ἐστιν F.

ἄλογος ἄρα ἐστὶν ἡ $ΑΓ$, καλείσθω δὲ ἐκ δύο μέσων
δευτέρᾳ. ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

λθ'.

Ἐὰν δύο εὐθελαι δυνάμει ἀσύμμετροι συν-
5 τεθῶσι ποιοῦσαι τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν
ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων ῥητόν, τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν
μέσον, ἡ ὅλη εὐθεῖα ἄλογός ἐστιν, καλείσθω δὲ
ισοι μείζων.

Συγκείσθωσαν γὰρ δύο εὐθελαι δυνάμει ἀσύμμε-
10 τροι αἱ $ΑΒ$, $ΒΓ$ ποιοῦσαι τὰ προκείμενα· λέγω, ὅτι
ἄλογός ἐστιν ἡ $ΑΓ$.

Ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$ μέσον ἐστίν, καὶ
τὸ δις [ἄρα] ὑπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$ μέσον ἐστίν. τὸ δὲ
συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$ ῥητόν· ἀσύμ-
15 μετρον ἄρα ἐστὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$ τῷ συγ-
κειμένῳ ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$ ὥστε καὶ τὰ ἀπὸ
τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$ μετὰ τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$, ὅπερ
ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$, ἀσύμμετρόν ἐστι τῷ συγκειμένῳ
ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$ [ῥητόν δὲ τὸ συγκείμενον
20 ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$]· ἄλογον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ
τῆς $ΑΓ$. ὥστε καὶ ἡ $ΑΓ$ ἄλογός ἐστιν, καλείσθω δὲ
μείζων. ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

μ'.

Ἐὰν δύο εὐθελαι δυνάμει ἀσύμμετροι συν-
25 τεθῶσι ποιοῦσαι το μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν
ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων μέσον, τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν

2. δευτέρᾳ] seq. schol., u. app. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp.
P, om. B F V b. 3. λθ'] om. b, μ' F. 4. συντεθῶσιν P B F.

autem ex duabus mediis secunda. quod erat demonstrandum.

XXXIX.

Si duae rectae potentia incommensurabiles componuntur, quae summam quadratorum suorum rationalem efficiant, rectangulum autem medium, tota recta irrationalis est, uocetur autem maior.

Componantur enim duae rectae
 $\overline{A} \quad \overline{B} \quad \overline{\Gamma}$ potentia incommensurabiles $AB, B\Gamma$,
 quae proposita efficiant [prop. XXXIII]. dico, $A\Gamma$ irrationalis esse.

nam quoniam $AB \times B\Gamma$ medium est, etiam $2 AB \times B\Gamma$ medium est [prop. VI, XXIII coroll.]. est autem $AB^2 + B\Gamma^2$ rationale. itaque $2 AB \times B\Gamma$ et $AB^2 + B\Gamma^2$ incommensurabilia sunt [def. 4]. quare etiam $AB^2 + B\Gamma^2 + 2 AB \times B\Gamma$, hoc est $A\Gamma^2$ [II, 4], et $AB^2 + B\Gamma^2$ incommensurabilia sunt [prop. XVI]. ergo $A\Gamma^2$ irrationalis est; quare etiam $A\Gamma$ irrationalis est [def. 4]; uocetur autem maior. quod erat demonstrandum.

XL.

Si duae rectae potentia incommensurabiles componuntur, quae summam quadratorum suorum mediam efficiant, rectangulum autem rationale, tota recta irra-

5. μέν] τε V. 6. τετραγώνον b. τὸ δέ BF, δὲ τό b. 7. ἐστὶ V, comp. Fb. 12. ἐστὶ PBV, comp. Fb. 13. ἄρα] om. P. ἐστὶ PBV, comp. Fb. 16. τὰ] τό B. 18. ἐστὶν P. σύμμετρον b, corr. m. rec. ἐστὶν P. 19. ῥητόν — 20. BΓ] om. P. 20. ἄλογος F, corr. m. 1. 21. ἐστὶ PBV. comp. Fb. 22. μελίζων] seq. schol., u. app. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] om. BFb, comp. P. 23. μὰ F. 24. συντεθεῶσιν BF. 26. δέ F.

ζητόν, ἡ ὅλη εὐθεῖα ἄλογός ἐστιν, καλείσθω δὲ
~~ζητόν καὶ μέσον δυναμένη.~~

*de of
final +
medial*

Συγκείσθωσαν γὰρ δύο εὐθεῖαι δυνάμει ἀσύμμετροι
 αἱ AB , $BΓ$ ποιοῦσαι τὰ προκείμενα· λέγω, ὅτι ἄλογός
 ἐστὶν ἡ $ΑΓ$.

Ἐπεὶ γὰρ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AB , $BΓ$
 μέσον ἐστίν, τὸ δὲ δις ὑπὸ τῶν AB , $BΓ$ ζητόν, ἀσύμ-
 μετρον ἄρα ἐστὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AB ,
 $BΓ$ τῷ δις ὑπὸ τῶν AB , $BΓ$ · ὥστε καὶ τὸ ἀπὸ τῆς
 10 $ΑΓ$ ἀσύμμετρόν ἐστι τῷ δις ὑπὸ τῶν AB , $BΓ$. ζητόν
 δὲ τὸ δις ὑπὸ τῶν AB , $BΓ$ · ἄλογον ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς
 $ΑΓ$. ἄλογος ἄρα ἡ $ΑΓ$, καλείσθω δὲ ζητόν καὶ μέ-
 στον δυναμένη. ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

μα'.

15 Ἐὰν δύο εὐθεῖαι δυνάμει ἀσύμμετροι συν-
 τεθῶσι ποιοῦσαι τό τε συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ'
 αὐτῶν τετραγώνων μέσον καὶ τὸ ὑπ' αὐτῶν μέ-
 στον καὶ ἔτι ἀσύμμετρον τῷ συγκειμένῳ ἐκ τῶν
 ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων, ἡ ὅλη εὐθεῖα ἄλογός
 20 ἐστὶν, καλείσθω δὲ δύο μέσα δυναμένη.

*de of sum
2 medial*

Συγκείσθωσαν γὰρ δύο εὐθεῖαι δυνάμει ἀσύμμε-
 τροὶ αἱ AB , $BΓ$ ποιοῦσαι τὰ προκείμενα· λέγω, ὅτι
 ἡ $ΑΓ$ ἄλογός ἐστιν.

Ἐκκείσθω ζητὴ ἡ $ΔΕ$, καὶ παραβελθήσθω παρὰ

1. ζητόν, ἡ] in ras. V. ἐστὶ BV , comp. Fb. καλεῖται P.
 3. γὰρ] supra scr. m. 1 b. 4. αἱ] supra m. 1 P. προσ-
 κείμενα F, sed corr. 5. AB , corr. m. rec., P. 6. ὑπὸ F,
 corr. m. 2. 7. μέσον] μέσ- in ras. V. ἐστὶ $PBVb$, comp. F.
 δις] supra scr. m. 1 V. ζητόν] corr. ex μέσον m. 2 V. σύμ-
 μετρον B, corr. m. rec. 8. ἐστὶν P. 10. τῷ — $BΓ$] bis b,
 mg. m. 1 P. Post καὶ add. συνθέντι Theon (BFVb), P m.

tionalis est, uocetur autem spatio rationali et medio aequalis quadrata.

$\left\{ \begin{array}{l} A \\ B \\ \Gamma \end{array} \right.$ Componantur enim duae rectae potentia incommensurabiles, quae proposita efficiant, AB , $B\Gamma$ [prop. XXXIV]. dico, $A\Gamma$ irrationalem esse.
nam quoniam $AB^2 + B\Gamma^2$ medium est, $2AB \times B\Gamma$ autem rationale, $AB^2 + B\Gamma^2$ et $2AB \times B\Gamma$ incommensurabilia sunt. quare etiam $A\Gamma^2$ et $2AB \times B\Gamma$ incommensurabilia sunt [prop. XVI]. uerum $2AB \times B\Gamma$ rationale est. itaque $A\Gamma^2$ irrationale est. quare $A\Gamma$ irrationalis est [def. 4]; uocetur autem spatio rationali et medio aequalis quadrata. quod erat demonstrandum.

XLI.

Si duae rectae potentia incommensurabiles componuntur, quae summam quadratorum suorum mediam efficiant, et rectangulum medium et simul summae quadratorum incommensurabile, tota recta irrationalis est, uocetur autem duobus spatiis mediis aequalis quadrata.

Componantur enim duae rectae potentia incommensurabiles AB , $B\Gamma$, quae proposita efficiant [prop. XXXV]. dico, $A\Gamma$ irrationalem esse.

ponatur rationalis AE , et rectae AE quadratis

rec. 12. ἄλογος — $A\Gamma$] mg. m. 1 P. 13. δυναμένη] seq. schol., u. app. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] om. Bf^b, comp. P. 14. μᾶ'] mut. in μβ' m. 2 F. 15. συντεθῶσιν PBF. 17. καὶ τὸ ὑπ' αὐτῶν μέσον] supra scr. m. 2 V. 19. τετραγώνω PV. ἧ] m. 2 F. 20. ἐστὶ PBV, comp. Fb. 22. τὰ προκειμένα] τὸ τε συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ μέσον καὶ τὸ ὑπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ μέσον καὶ ἐστὶ ἀσύμμετρον τῷ συγκειμένῳ ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ τετραγώνων Theon (Bf^vb, τετραγώνω Fv^b).


- τὴν ΔE τοῖς μὲν ἀπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ ἴσον τὸ ΔZ , τῷ
 δὲ δις ὑπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ ἴσον τὸ $H\Theta$. ὅλον ἄρα τὸ
 $\Delta\Theta$ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς AG τετραγώνῳ. καὶ ἐπεὶ
 5 καὶ ἐστὶν ἴσον τῷ ΔZ , μέσον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ΔZ .
 καὶ παρὰ ρητὴν τὴν ΔE παράκειται· ρητὴ ἄρα ἐστὶν
 ἡ ΔH καὶ ἀσύμμετρος τῇ ΔE μήκει. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ
 καὶ ἡ HK ρητὴ ἐστὶ καὶ ἀσύμμετρος τῇ HZ , τουτ-
 ἐστὶ τῇ ΔE , μήκει. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρά ἐστὶ τὰ ἀπὸ
 10 τῶν AB , $B\Gamma$ τῷ δις ὑπὸ τῶν AB , $B\Gamma$, ἀσύμμετρόν
 ἐστὶ τὸ ΔZ τῷ $H\Theta$. ὥστε καὶ ἡ ΔH τῇ HK ἀσύμμε-
 τρός ἐστιν. καὶ εἰσι ρηταί· αἱ ΔH , HK ἄρα ρηταί
 εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἄλογος ἄρα ἐστὶν ἡ
 ΔK ἡ καλουμένη ἐκ δύο ὀνομάτων. ρητὴ δὲ ἡ ΔE .
 15 ἄλογον ἄρα ἐστὶ τὸ $\Delta\Theta$ καὶ ἡ δυναμένη αὐτὸ ἄλογός
 ἐστὶν. δύναται δὲ τὸ $\Theta\Delta$ ἡ AG . ἄλογος ἄρα ἐστὶν ἡ
 AG , καλεῖσθω δὲ δύο μέσα δυναμένην. ὅπερ εἶδει
 δεῖξαι.

Λήμμα.

- 20 Ὅτι δὲ αἱ εἰρημέναι ἄλογοι μοναχῶς διαιροῦνται
 εἰς τὰς εὐθείας, ἐξ ὧν σύγκεινται ποιουσῶν τὰ προ-
 κείμενα εἶδη, δειξόμεν ἤδη προεκθέμενοι λημμάτιον
 τοιοῦτον·
 Ἐκκείσθω εὐθεῖα ἡ AB καὶ τετμήσθω ἡ ὅλη εἰς
 25 ἄνισα καθ' ἑκάτερον τῶν Γ , Δ , ὑποκείσθω δὲ μέζων

1. ΔE] corr. ex ΔA m. 2 P. 3. $\Theta\Delta$ P. 6. ΔE] corr.
 ex Δ m. rec. B. 7. διὰ — 9. μήκει] mg. m. 2 F. 8. ἐστὶν B.
 τουτεστιν B. 9. ἀσύμμετρόν ἐστὶ τὸ BV. 10. τῷ — $B\Gamma$]
 mg. m. 1 P (τῷ corr. ex τὸ m. rec.). 11. ἄρα ἐστὶ P. ΔH]
 $H\Delta$ b. 12. ἐστὶ Vb, comp. F m. 2. εἰσιν B. Post αἱ
 del. δὲ F. ἄρα] m. 2 F. 13. εἰσιν P. 14. ΔK] K e corr.
 m. 1 b. 16. ἐστὶ V, comp. b et m. 2 F. $\Theta\Delta$] in ras. Vb,
 $\Delta\Theta$ corr. ex ΔH m. 2 B. ἡ AG] m. 2 B. ἄρα] γὰρ B.


$AB^2 + B\Gamma^2$ aequale adplicetur ΔZ , rectangulo autem $2 AB \times B\Gamma$ aequale $H\Theta$. itaque $\Delta\Theta = A\Gamma^2$ [II, 4].



et quoniam $AB^2 + B\Gamma^2$ medium est et $= \Delta Z$, etiam ΔZ medium est. et rectae rationali ΔE adplicatum est. itaque ΔH rationalis est et rectae ΔE longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. eadem de causa etiam HK rationalis est et rectae HZ , hoc est ΔE , longitudine incommensurabilis. et quoniam $AB^2 + B\Gamma^2$ et $2 AB \times B\Gamma$ incommensurabilia sunt, ΔZ et $H\Theta$ incommensurabilia sunt. quare etiam ΔH , HK incommensurabiles sunt [VI, 1; prop. XI]. et sunt rationales; itaque ΔH , HK rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo ΔK irrationalis est, ex duobus nominibus quae uocatur [prop. XXXVI]. ΔE autem rationalis est. itaque $\Delta\Theta$ irrationale est, et recta ei aequalis quadrata irrationalis [def. 4]. est autem $A\Gamma^2 = \Delta\Theta$. ergo $A\Gamma$ irrationalis est; uocetur autem duobus spatiis mediis aequalis quadrata. quod erat demonstrandum.

Lemma.

Rectas autem irracionales, quas nominauimus, uno tantum modo in rectas diuidi, ex quibus compositae sint proposita efficientibus, demonstrabimus huiusmodi lemmate praemisso.



17. *δυναμένην*] seq. schol., u. app. *ὅπερ ἔδει δεῖξαι*] om. BFVb. 19. *λήμμα*] om. BV, m. rec. P. 20. *ὅτι*] τι V. 21. *προσκειμένα* F, corr. m. 2. 22. *προθέμενοι* P, *προσεκείμενοι* B et F, sed corr. 24. Ante *εὐθεία* ras. 3 litt. V. *ἢ ὀλίγη*] *ὀλίγη* FVb. 25. *καὶ καθ'* F, *ἐκάτερα* BV. *ὑποκείσθω δέ* καὶ ὑποκείσθω P.

ἡ $ΑΓ$ τῆς $ΑΒ$ · λέγω, ὅτι τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ μείζονά ἐστι τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$.

Τετμήσθω γὰρ ἡ $ΑΒ$ δίχα κατὰ τὸ $Ε$. καὶ ἐπεὶ μείζων ἐστὶν ἡ $ΑΓ$ τῆς $ΑΒ$, κοινὴ ἀφρηρήσθω ἡ $ΔΓ$.
 5 λοιπὴ ἄρα ἡ $ΑΔ$ λοιπῆς τῆς $ΓΒ$ μείζων ἐστίν. ἴση δὲ ἡ $ΑΕ$ τῇ $ΕΒ$ · ἐλάττων ἄρα ἡ $ΔΕ$ τῆς $ΕΓ$. τὰ $Γ$, $Δ$ ἄρα σημεῖα οὐκ ἴσον ἀπέχουσι τῆς διχοτομίας. καὶ ἐπεὶ τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς $ΕΓ$ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς $ΕΒ$, ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ ὑπὸ τῶν
 10 $ΑΔ$, $ΔΒ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $ΔΕ$ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς $ΕΒ$, τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς $ΕΓ$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς $ΔΕ$. ὦν τὸ ἀπὸ τῆς $ΔΕ$ ἑλασσόν ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς $ΕΓ$. καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ ἑλασσόν
 15 ἐστὶ τοῦ ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$. ὥστε καὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ ἑλασσόν ἐστὶ τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$. καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ μείζον ἐστὶ τοῦ συγκειμένου ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$. ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

20

μβ'.

Ἡ ἐκ δύο ὀνομάτων κατὰ ἓν μόνον σημεῖον διαιρεῖται εἰς τὰ ὀνόματα.

Ἔστω ἐκ δύο ὀνομάτων ἡ $ΑΒ$ διηρημένη εἰς τὰ ὀνόματα κατὰ τὸ $Γ$. αἱ $ΑΓ$, $ΓΒ$ ἄρα ρηταὶ εἰσι δυνά-
 25 μει μόνον σύμμετροι. λέγω, ὅτι ἡ $ΑΒ$ κατ' ἄλλο σημείον οὐ διαιρεῖται εἰς δύο ρητὰς δυνάμει μόνον συμμέτρους.

2. $ΑΔ$] $ΑΓ$ corr. in $ΑΒ$ m. rec. b. 4. Post κοινή del. δέ $Υ$. $ΔΓ$] $ΑΓ$ b, $ΔΓ$ καί P. 6. ἐλάσσων P. ἄρα ἐστίν P. 7. $Δ$, $Γ$ P. 9. μήν] om. P. 10. τῆς $ΔΕ$ $Υ$. τῷ] τοῦ b.

Ponatur recta AB et tota in Γ , Δ in partes inaequales secetur, et supponatur $A\Gamma > \Delta B$. dico, esse $A\Gamma^2 + \Gamma B^2 > A\Delta^2 + \Delta B^2$. nam AB in duas partes aequales secetur in E . et quoniam $A\Gamma > \Delta B$, subtrahatur, quae communis est, $\Delta\Gamma$. itaque relinquitur $A\Delta > \Gamma B$. uerum $AE = EB$. itaque $\Delta E < E\Gamma$. itaque puncta Γ , Δ a puncto medio aequaliter non distant. et quoniam $A\Gamma \times \Gamma B + E\Gamma^2 = EB^2$ [II, 5], et $A\Delta \times \Delta B + \Delta E^2 = EB^2$ [id.], erit $A\Gamma \times \Gamma B + E\Gamma^2 = A\Delta \times \Delta B + \Delta E^2$. quorum $\Delta E^2 < E\Gamma^2$. itaque reliquum $A\Gamma \times \Gamma B < A\Delta \times \Delta B$. quare etiam $2 A\Gamma \times \Gamma B < 2 A\Delta \times \Delta B$. ergo etiam reliquum¹⁾ $A\Gamma^2 + \Gamma B^2 > A\Delta^2 + \Delta B^2$; quod erat demonstrandum.

XLII.

Recta ex duobus nominibus in uno tantum puncto in nomina diuiditur.

Ex duobus nominibus sit AB in puncto Γ in nomina diuisa. itaque $A\Gamma$, ΓB rationales sunt potentia tantum commensurabiles [prop. XXXVI]. dico, AB in nullo alio puncto in duas rationales potentia tantum commensurabiles diuidi.

¹⁾ Nam $A\Gamma^2 + \Gamma B^2 + 2 A\Gamma \times \Gamma B = AB^2 = A\Delta^2 + \Delta B^2 + 2 A\Delta \times \Delta B$ (II, 4).

11. ΓB] in ras. F. 12. $\tau\eta\varsigma$] postea ins. F. 13. $\omega\nu - \Delta E$] om. F. $\xi\lambda\alpha\sigma\omega\nu$ V. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$] om. V. 14. $\xi\lambda\alpha\tau\tau\omega\nu$ BVb, comp. F (in B supra scr. $\mu\epsilon\tau\iota\zeta\omega\nu$ m. rec., sed del.); item lin. 16. 16. $\kappa\alpha\iota$] supra scr. F. 18. $\acute{\alpha}\pi\acute{o}$] corr. ex $\acute{\upsilon}\pi\acute{o}$ m. 2 V. 19. Ante $\delta\pi\epsilon\rho$ add. $\epsilon\iota\pi\epsilon\rho$ $\sigma\upsilon\nu\alpha\mu\phi\acute{o}\tau\epsilon\rho\alpha$ $\iota\sigma\alpha$ $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ $\tau\hat{\omega}$ ($\tau\hat{\omega}\nu$ b) $\acute{\alpha}\pi\acute{o}$ $\tau\eta\varsigma$ AB Theon (BFVb), m. rec. P. 21. $\kappa\alpha\theta'$ b. 24. $\kappa\alpha\tau\acute{\alpha}$] supra scr. m. 1 P. $\epsilon\iota\sigma\iota\nu$ PBF.

- Εἰ γὰρ δυνατόν, διηγήσθω καὶ κατὰ τὸ Δ , ὥστε καὶ τὰς $\Delta\Delta$, ΔB ῥητὰς εἶναι δυνάμει μόνον συμμέτρους. φανερόν δὴ, ὅτι ἡ $ΑΓ$ τῇ ΔB οὐκ ἔστιν ἰσότης. εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω. ἔσται δὴ καὶ ἡ $\Delta\Delta$ τῇ ΓB ἢ αὐτῇ· καὶ ἔσται ὥς ἡ $ΑΓ$ πρὸς τὴν ΓB , οὕτως ἡ $B\Delta$ πρὸς τὴν ΔA , καὶ ἔσται ἡ $ΑB$ κατὰ τὸ αὐτὸ τῇ κατὰ τὸ Γ διαιρέσει διαιρεθεῖσα καὶ κατὰ τὸ Δ · ὅπερ οὐχ ὑπόκειται. οὐκ ἄρα ἡ $ΑΓ$ τῇ ΔB ἔστιν ἡ αὐτή. διὰ δὴ τοῦτο καὶ τὰ Γ , Δ σημεῖα οὐκ ἴσονται ἀπέχουσι τῆς διχοτομίας. ὥς ἄρα διαφέρει τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, ΓB τῶν ἀπὸ τῶν $\Delta\Delta$, ΔB , τούτῳ διαφέρει καὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν $\Delta\Delta$, ΔB τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, ΓB διὰ τὸ καὶ τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, ΓB μετὰ τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, ΓB καὶ τὰ ἀπὸ τῶν $\Delta\Delta$, ΔB μετὰ τοῦ δις ὑπὸ τῶν $\Delta\Delta$, ΔB ἴσα εἶναι τῷ ἀπὸ τῆς $ΑB$. ἀλλὰ τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, ΓB τῶν ἀπὸ τῶν $\Delta\Delta$, ΔB διαφέρει ῥητῶ· ῥητὰ γὰρ ἀμφοτέρω· καὶ τὸ δις ἄρα ὑπὸ τῶν $\Delta\Delta$, ΔB τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, ΓB διαφέρει ῥητῷ μέσα ὄντα· ὅπερ ἄτοπον· μέσον γὰρ μέσου οὐχ ὑπερέχει ῥητῶ.
- Οὐκ ἄρα ἡ ἐκ δύο ὀνομάτων κατ' ἄλλο καὶ ἄλλο σημεῖον διαιρεῖται· καθ' ἓν ἄρα μόνον· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

μγ'.

- Ἡ ἐκ δύο μέσων πρώτη κατ' ἓν μόνον σημεῖον διαιρεῖται.

1. διαιρέσθω V. καὶ κατὰ] κατὰ BFVb. 3. ΔB] $B\Delta$ e corr. m. 2 V. 4. δὴ] corr. ex δέ V. $\Delta\Delta$] corr. ex $\Delta\Gamma$ V. 5. ΓB] mut. in $B\Gamma$ V. ὥς ἡ — 6. ἔσται] m. 2 B. 6. τὴν] om. Fb. ἡ] ὥς ἡ b (corr.), ὥς supra scr. m. 1 F. αὐτό] αὐ- e corr. V; αὐτὸ τμήμα P, τμήμα supra scr. m. 2 V. 7. τῇ κατὰ] m. rec. P. Post καὶ add. τῇ supra m. 1 V. 8. ΔB] AB φ. 10. ἀπέχουσιν B. τοῦ διχοτομίου P, corr. m. rec. φ] ὥς φ. 12. $ΑΓ$, ΓB P. τοῦ] corr. ex ου

$\begin{array}{l} \text{---}A \\ | \\ \text{---}A \\ | \\ \text{---}\Gamma \\ | \\ \text{---}B \end{array}$
 Nam, si fieri potest, in Δ diuidatur ita, ut etiam $A\Delta$, ΔB rationales sint potentia tantum commensurabiles. manifestum est igitur, $A\Gamma$ et ΔB easdem non esse. sint enim, si fieri potest. itaque etiam $A\Delta$ et ΓB eaedem erunt. et erit $A\Gamma : \Gamma B = B\Delta : \Delta A$, et AB etiam in Δ eodem modo ac in Γ diuisa erit, id quod contra hypothesim est. quare $A\Gamma$, ΔB eaedem non sunt. ea de causa Γ , Δ puncta a medio puncto aequaliter non distant [cfr. lemma]. quo igitur $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$ ab $A\Delta^2 + \Delta B^2$ differt [u. lemma], eo etiam $2A\Delta \times \Delta B$ a $2A\Gamma \times \Gamma B$ differt, quia $A\Gamma^2 + \Gamma B^2 + 2A\Gamma \times \Gamma B = AB^2 = A\Delta^2 + \Delta B^2 + 2A\Delta \times \Delta B$ [II, 4]. uerum $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$ ab $A\Delta^2 + \Delta B^2$ spatio rationali differt; nam utrumque rationale est. itaque etiam $2A\Delta \times \Delta B$ a $2A\Gamma \times \Gamma B$ spatio rationali differt, quamquam media sunt [prop. XXI]; quod absurdum est; nam spatium medium non excedit medium spatio rationali [prop. XXVI].

Ergo recta ex duobus nominibus non diuiditur in punctis diuersis; itaque in uno tantum diuiditur; quod erat demonstrandum.

XLIII.

Recta ex duabus mediis prima in uno tantum puncto diuiditur.

m. rec. P. $\tau\acute{\omega}\nu$] om. P. $A\Gamma$, ΓB] $A\Delta$, ΔB P. 15. AB] supra scr. Δ b. 16. Post ΓB ras. magna V. $\tau\acute{\omega}\nu$] corr. ex $\tau\acute{\omega}$ b. 17. $\acute{\alpha}\rho\alpha$] supra scr. m. 2 F. $A\Delta B$ P, corr. m. rec. 18. $A\Gamma B$ Pb, corr. m. rec. 19. $\acute{\omicron}\pi\epsilon\rho\ \acute{\alpha}\tau\omicron\pi\omicron\nu$] om. Theon (BFVb). $\gamma\acute{\alpha}\rho$] $\delta\acute{\epsilon}$ Theon (BFVb). 21. $\delta\iota\epsilon\phi\epsilon\iota\tau\alpha\iota$ P, corr. m. rec. $\acute{\omicron}\pi\epsilon\rho\ \acute{\epsilon}\delta\epsilon\iota\ \delta\epsilon\iota\acute{\xi}\alpha\iota$] comp. P, om. BFVb. 25. $\delta\iota\alpha\iota\phi\epsilon\iota\tau\alpha\iota\ \epsilon\iota\varsigma\ \tau\acute{\alpha}\ \acute{\omicron}\nu\acute{\omicron}\mu\alpha\tau\alpha$ Theon (BFVb).

Ἐστω ἐκ δύο μέσων πρώτη ἡ AB διηρημένη κατὰ τὸ Γ , ὥστε τὰς AG , GB μέσας εἶναι δυνάμει μόνον συμμετρους ῥητὸν περιεχοῦσας· λέγω, ὅτι ἡ AB κατ' ἄλλο σημεῖον οὐ διαιρεῖται.

- 5 $Εἰ$ γὰρ δυνατόν, διηρήσθω καὶ κατὰ τὸ Δ , ὥστε καὶ τὰς $A\Delta$, ΔB μέσας εἶναι δυνάμει μόνον συμμετρους ῥητὸν περιεχοῦσας. ἐπεὶ οὖν, ᾧ διαφέρει τὸ δις ὑπὸ τῶν $A\Delta$, ΔB τοῦ δις ὑπὸ τῶν AG , GB , τούτῳ διαφέρει τὰ ἀπὸ τῶν AG , GB τῶν ἀπὸ τῶν $A\Delta$, ΔB ,
 10 ῥητῷ δὲ διαφέρει τὸ δις ὑπὸ τῶν $A\Delta$, ΔB τοῦ δις ὑπὸ τῶν AG , GB · ῥητὰ γὰρ ἀμφοτέρω· ῥητῷ ἄρα διαφέρει καὶ τὰ ἀπὸ τῶν AG , GB τῶν ἀπὸ τῶν $A\Delta$, ΔB μέσα ὄντα· ὅπερ ἄτοπον.

- Οὐκ ἄρα ἡ ἐκ δύο μέσων πρώτη κατ' ἄλλο καὶ
 15 ἄλλο σημεῖον διαιρεῖται εἰς τὰ ὀνόματα· καθ' ἓν ἄρα μόνον· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

μδ'.


Ἡ ἐκ δύο μέσων δευτέρα καθ' ἓν μόνον σημεῖον διαιρεῖται.

- 20 Ἐστω ἐκ δύο μέσων δευτέρα ἡ AB διηρημένη κατὰ τὸ Γ , ὥστε τὰς AG , GB μέσας εἶναι δυνάμει μόνον συμμετρους μέσον περιεχοῦσας· φανερόν δὴ, ὅτι τὸ Γ οὐκ ἔστι κατὰ τῆς διχοτομίας, ὅτι οὐκ εἰσὶ μήκει σύμμετροι. λέγω, ὅτι ἡ AB κατ' ἄλλο σημεῖον οὐ διαι-
 25 ρεῖται.

$Εἰ$ γὰρ δυνατόν, διηρήσθω καὶ κατὰ τὸ Δ , ὥστε

1. ἡ AB] supra scr. F, corr. ex ἡ $A\Delta$ m. rec. P. 4. οὐ] om. b. 5. κατ'] om. Fb. 9. τῶν ἀπό] in ras. m. 1 P. 10. ΔB] supra scr. m. 1 F. 13. Post ὄντα add. μέσον μέσον ὑπερέχει ῥητῷ φ. 16. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. BFVb. 17. μδ'] mut. in με' F. 19. διαιρεῖται εἰς τὰ ὀνόματα

Sit AB ex duabus mediis prima in Γ ita diuisa, ut $A\Gamma$, ΓB mediae sint potentia tantum commensurabiles spatium rationale comprehendentes [prop. XXXVII].



dico, AB in nullo alio puncto diuidi.

nam, si fieri potest, in Δ ita diuidatur, ut etiam $A\Delta$, ΔB mediae sint potentia tantum commensurabiles spatium rationale comprehendentes. iam quoniam, quo differt $2 A\Delta \times \Delta B$ a $2 A\Gamma \times \Gamma B$, eo differt $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$ ab $A\Delta^2 + \Delta B^2$ [prop. XLI lemma], et $2 A\Delta \times \Delta B$ a $2 A\Gamma \times \Gamma B$ spatio rationali differt (nam utrumque rationale est), etiam $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$ ab $A\Delta^2 + \Delta B^2$ spatio rationali differt, quamquam media sunt; quod absurdum est [prop. XXVI].

Ergo recta ex duabus mediis prima in nomina non diuiditur in punctis diuersis; itaque in uno tantum diuiditur; quod erat demonstrandum.

XLIV.

Recta ex duabus mediis secunda in uno tantum puncto diuiditur.

Sit AB ex duabus mediis secunda in Γ diuisa, ita ut $A\Gamma$, ΓB mediae sint potentia tantum commensurabiles spatium medium comprehendentes [prop. XXXVIII]. manifestum est igitur, Γ punctum medium non esse, quod longitudine commensurabiles non sunt. dico, AB in nullo alio puncto diuidi.


nam, si fieri potest, etiam in Δ diuidatur, ita ut

Theon (BFVb). 23. $\xi\sigma\tau\iota\nu$ B. $\tau\eta\nu$ διχοτομίας V. $\delta\tau\iota$ $\xi\pi\epsilon\iota\delta\eta\pi\epsilon\rho$ Theon (BFVb). $\epsilon\iota\sigma\iota\nu$ PB. 26. $\kappa\alpha\iota$] om. Theon (BFVb).

- τὴν $ΑΓ$ τῇ $ΔΒ$ μὴ εἶναι τὴν αὐτήν, ἀλλὰ μείζονα καθ' ὑπόθεσιν τὴν $ΑΓ$. δῆλον δὴ, ὅτι καὶ τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$, ὡς ἐπάνω ἐδείξαμεν, ἐλάσσονα τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$. καὶ τὰς $ΑΔ$, $ΔΒ$ μέσας εἶναι δυνάμει
- 5 μόνον συμμετρους μέσον περιεχούσας. καὶ ἐκκείσθω ῥητὴ ἡ EZ , καὶ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς $ΑΒ$ ἴσον παρὰ τὴν EZ παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον παραβελλήσθω τὸ EK , τοῖς δὲ ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ ἴσον ἀφηγήσθω τὸ EH . λοιπὸν ἄρα τὸ $ΘΚ$ ἴσον ἐστὶ τῷ δις ὑπὸ τῶν
- 10 $ΑΓ$, $ΓΒ$. πάλιν δὴ τοῖς ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$, ἅπερ ἐλάσσονα ἐδείχθη τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$, ἴσον ἀφηγήσθω τὸ $ΕΑ$. καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ $ΜΚ$ ἴσον τῷ δις ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$. καὶ ἐπεὶ μέσα ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$, μέσον ἄρα [καὶ] τὸ $ΕΗ$. καὶ παρὰ ῥητὴν
- 15 τὴν EZ παράκειται ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ $EΘ$ καὶ ἀσύμμετρος τῇ EZ μήκει. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ $ΘΝ$ ῥητὴ ἐστὶ καὶ ἀσύμμετρος τῇ EZ μήκει. καὶ ἐπεὶ αἱ $ΑΓ$, $ΓΒ$ μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι, ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ $ΑΓ$ τῇ $ΓΒ$ μήκει. ὡς δὲ ἡ $ΑΓ$ πρὸς
- 20 τὴν $ΓΒ$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$. ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$ τῷ ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$. ἀλλὰ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς $ΑΓ$ σύμμετρά ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$. δυνάμει γάρ εἰσι

1. $ΑΓ$] $Γ$ in ras. F. 2. κατὰ P. δῆλον δὴ, ὅτι] δηλαδὴ Theon (BFVb); ὅτι add. B m. 2. 3. $ΑΓ$, $ΓΒ$ μείζονα τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$, ὡς ἐπάνω ἐδείξαμεν Theon (BFVb). 4. Ante καὶ add. ἔστω δέ* V, et in mg. m. 1 *ἐλάσσονα τῶν ἀπὸ $ΑΓ$, $ΓΒ$. 5. κείσθω V, corr. m. 1. 6. τῷ] corr. ex τό V. 7. παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον] om. Theon (BFVb). 9. $ΘΚ$] in ras. V. 10. ἅπερ — 11. $ΓΒ$] om. Fb, mg. m. 2 BV. 11. ἐλάττωνα V. 12. $ΕΑ$] ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ B. Deinde add. πάλιν δὴ τοῖς ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ ἔλασσον ἐδείχθη τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ B, ἐπεὶ καὶ (καὶ ἐπεὶ V) τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ ἐλάσσονα (ἐλάττωνα F) ἐδείχθη τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ FVb, in V del.

AG , AB eadem non sint, sed AG maior supponatur (manifestum est igitur, esse etiam $AA^2 + AB^2 < AG^2 + GB^2$, ut supra demonstrauius [prop. XLI lemma]), et ut AA , AB mediae sint potentia tantum commensurabiles spatium medium comprehendentes. et pona-



tur rationalis EZ , et quadrato AB^2 aequale rectae EZ parallelogrammum rectangulum EK adplicetur [I, 44], quadratis autem $AG^2 + GB^2$ aequale auferatur EH . itaque quod relinquitur, $ΘK = 2 AG \times GB$ [II, 4]. rursus quadratis $AA^2 + AB^2$ (quae minora esse quam $AG^2 + GB^2$, demonstrauius) aequale auferatur EA . itaque $MK = 2 AA \times AB$. et quoniam $AG^2 + GB^2$ media sunt, EH medium est. et rectae rationali EZ adplicatum est. ergo $EΘ$ rationalis est et rectae EZ longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. eadem de causa etiam $ΘN$ rationalis est et rectae EZ longitudine incommensurabilis. et quoniam AG , GB mediae sunt potentia tantum commensurabiles, AG et GB longitudine incommensurabiles sunt. sed $AG:GB = AG^2:AG \times GB$ [prop. XXI lemma]. itaque etiam AG^2 et $AG \times GB$ incommensurabilia sunt [prop.

ἐστὶ τῶ P. 13. ἐστὶ] in ras. m. 1 b, ἐστὶν B. 14. καὶ τό] τό BFVb. 16. $ΘN$] EH b, EN in ras. m. 1 F. 17. ἐστὶν P.
18. ἐστὶν B. 19. GB] $BΓ$ B. 20. $ΓB$] in ras. V. 21. σύμμετρον V, corr. m. 1. AG] A e corr. V. 22. ἀλλὰ] supra scr. m. 1 V. τῶ] corr. ex τό m. 1 F. τῶ μέν] e corr. V. 23. $ΓB$] B eras. B.

σύμμετροι αὖ $ΑΓ, ΓΒ$. τῷ δὲ ὑπὸ τῶν $ΑΓ, ΓΒ$ σύμμετρόν ἐστι τὸ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ, ΓΒ$. καὶ τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΓ, ΓΒ$ ἄρα ἀσύμμετρά ἐστι τῷ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ, ΓΒ$. ἀλλὰ τοῖς μὲν ἀπὸ τῶν $ΑΓ, ΓΒ$ ἴσον ἐστὶ
 5 τὸ $ΕΗ$, τῷ δὲ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ, ΓΒ$ ἴσον τὸ $ΘΚ$. ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ $ΕΗ$ τῷ $ΘΚ$. ὥστε καὶ ἡ $ΕΘ$ τῇ $ΘΝ$ ἀσύμμετρός ἐστι μήκει. καὶ εἰσι ρηταί· αὖ $ΕΘ, ΘΝ$ ἄρα ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι. ἐὰν δὲ δύο ρηταὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι συντεθῶσιν,
 10 ἡ ὅλη ἄλογός ἐστιν ἡ καλουμένη ἐκ δύο ὀνομάτων· ἡ $ΕΝ$ ἄρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ διηρημένη κατὰ τὸ $Θ$. κατὰ τὰ αὐτὰ δὴ δειχθήσονται καὶ αὖ $ΕΜ, ΜΝ$ ρηταὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι· καὶ ἔσται ἡ $ΕΝ$ ἐκ δύο ὀνομάτων κατ' ἄλλο καὶ ἄλλο διηρημένη τό τε $Θ$
 15 καὶ τὸ $Μ$, καὶ οὐκ ἐστὶν ἡ $ΕΘ$ τῇ $ΜΝ$ ἡ αὐτή, ὅτι τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΓ, ΓΒ$ μείζονά ἐστι τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΔ, ΔΒ$. ἀλλὰ τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΔ, ΔΒ$ μείζονά ἐστι τοῦ δις ὑπὸ $ΑΔ, ΔΒ$. πολλῷ ἄρα καὶ τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΓ, ΓΒ$, τούτέστι τὸ $ΕΗ$, μείζον ἐστὶ τοῦ δις ὑπὸ τῶν
 20 $ΑΔ, ΔΒ$, τούτέστι τοῦ $ΜΚ$. ὥστε καὶ ἡ $ΕΘ$ τῇ $ΜΝ$ μείζων ἐστίν. ἡ ἄρα $ΕΘ$ τῇ $ΜΝ$ οὐκ ἐστὶν ἡ αὐτή· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

1. Supra σύμμετροι add. α' Fb. τῷ δέ — $ΓΒ$] mg. m. 1 P. 2. τό] corr. ex τῷ Vb. τὰ] supra scr. m. 2 F. 3. σύμμετρα b, et B, corr. m. 2; α- del. F. 4. $ΓΒ$ μήκει V. $ΓΒ$] (alt.) $Γ$ e corr. V. 5. ἴσον ἐστὶ P. 6. ἐστίν P. $ΕΗ$] H in ras. V. 8. $ΕΘ$] "Θ' E F. εἰσιν P. 9. ἐντεθῶσιν B, corr. m. 2. 10. ἐκ] ἐκ τῶν F. 11. ἄρα] om. P. ἐστίν P. 12. $ΘΚ$ b. 15. ἔστιν] ἔσται V. ἡ] supra scr. m. 1 F. ἡ] postea ins. F. ὅτι] ἐπειδήπερ Theon (BFVb). 17. Mg. m. 1: γρ. τὰ δὲ ἀπὸ (τῶν $Α, Δ$ F) Fb. 18. τῶν $ΑΔ$ FV. 19. τούτέστι P. 20. τούτέστιν P. τοῦ] e corr. V. $ΜΚ$] M seq. ras. 1 litt. B. ἡ] supra scr. m.

XI]. uerum AG^2 et $AG^2 + GB^2$ commensurabilia sunt; nam AG , GB potentia commensurabiles sunt. et $AG \times GB$, $2AG \times GB$ commensurabilia sunt [prop. VI]. quare etiam $AG^2 + GB^2$ et $2AG \times GB$ incommensurabilia sunt [prop. XIII]. uerum $EH = AG^2 + GB^2$, $\Theta K = 2AG \times GB$. itaque EH , ΘK incommensurabilia sunt. quare etiam $E\Theta$, ΘN longitudine incommensurabiles sunt [VI, 1; prop. XI]. et sunt rationales. itaque $E\Theta$, ΘN rationales sunt potentia tantum commensurabiles. sin duae rectae rationales potentia tantum commensurabiles componuntur, tota irrationalis est ex duobus nominibus, quae uocatur [prop. XXXVI]. itaque EN ex duobus nominibus est in Θ diuisa. eodem igitur modo demonstrabimus, etiam EM , MN rationales esse potentia tantum commensurabiles. et EN , quae ex duobus nominibus est, in punctis diuersis Θ et M diuisa erit [quod absurdum est; prop. XLII], et $E\Theta$, MN eadem non sunt, quod $AG^2 + GB^2 > AA^2 + AB^2$; uerum $AA^2 + AB^2 > 2AA \times AB$.¹⁾ quare multo magis $AG^2 + GB^2 > 2AA \times AB$, hoc est $EH > MK$. quare etiam $E\Theta > MN$ [VI, 1]. itaque $E\Theta$, MN eadem non sunt; quod erat demonstrandum.

1) U. prop. LIX lemma.

1 b. 21. *μείζον* V, sed corr. *τῇ* τῆς b, Post *αὐτῇ* add. *ἡ EN ἄρα ἐκ δύο ὀνομάτων καλουμένη καὶ ἄλλο καὶ ἄλλο σημείον διαιρεῖται ὅπερ ἄτοπον. οὐκ ἄρα ἐκ δύο μέσων δευτέρου καὶ ἄλλο καὶ ἄλλο σημείον διαιρεῖται ἢ καθ' ἓν μόνον* F. 22. *ὅπερ ἔδει δεῖξαι*] om. BV b.

μέ'.

Ἡ μείζων κατὰ τὸ αὐτὸ μόνον σημείον διαιρεῖται.

Ἐστω μείζων ἡ AB διηρημένη κατὰ τὸ Γ , ὥστε
 5 τὰς AG , GB δυνάμει ἀσυμμέτρους εἶναι ποιούσας τὸ
 μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AG , GB τετραγώνων
 ῥητόν, τὸ δ' ὑπὸ τῶν AG , GB μέσον· λέγω, ὅτι ἡ
 AB κατ' ἄλλο σημείον οὐ διαιρεῖται.

Εἰ γὰρ δυνατόν, διηγήσθω καὶ κατὰ τὸ Δ , ὥστε
 10 καὶ τὰς AD , DB δυνάμει ἀσυμμέτρους εἶναι ποιού-
 σας τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AD , DB ῥη-
 τόν, τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν μέσον. καὶ ἐπεὶ, ᾧ διαφέρει
 τὰ ἀπὸ τῶν AG , GB τῶν ἀπὸ τῶν AD , DB , τούτῳ
 διαφέρει καὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν AD , DB τοῦ δις ὑπὸ
 15 τῶν AG , GB , ἀλλὰ τὰ ἀπὸ τῶν AG , GB τῶν ἀπὸ
 τῶν AD , DB ὑπερέχει ῥητῶ· ῥητὰ γὰρ ἀμφοτέρω·
 καὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν AD , DB ἄρα τοῦ δις ὑπὸ τῶν
 AG , GB ὑπερέχει ῥητῶ μέσα ὄντα· ὅπερ ἐστὶν ἀδύ-
 νατον. οὐκ ἄρα ἡ μείζων κατ' ἄλλο καὶ ἄλλο σημείον
 20 διαιρεῖται· κατὰ τὸ αὐτὸ ἄρα μόνον διαιρεῖται· ὅπερ
 ἔδει δεῖξαι..

μς'.

Ἡ ῥητόν καὶ μέσον δυναμένη καθ' ἓν μόνον
 σημείον διαιρεῖται.

25 Ἐστω ῥητόν καὶ μέσον δυναμένη ἡ AB διηρημένη
 κατὰ τὸ Γ , ὥστε τὰς AG , GB δυνάμει ἀσυμμέτρους

1. μς' F. 2. Supra τό add. m. 2 καὶ ἐν P. διαιρεῖται
 εἰς τὰ ὀνόματα Theon (BFVb). 5. GB] supra scr. B. Supra
 ποιούσας scr. καὶ m. 1 V. 6. AG] ΓA Fb; mg. m. 1 AB ,
 $B\Gamma$ b. τετραγώνων] supra scr. ο b, -ων in ras. V. 7.
 ῥητός F. δέ BF. 9. καί] om. Theon (BFVb). 10. δυ-

XLV.

Recta maior in uno tantum puncto diuiditur.

Sit AB maior in Γ ita diuisa, ut AG , GB potentia incommensurabiles sint efficientes summam $AG^2 + GB^2$ rationalem, $AG \times GB$ autem medium [prop. XXXIX]. dico, AB in nullo alio puncto diuidi.

nam, si fieri potest, etiam in Δ diuidatur, ita ut $A\Delta$, ΔB potentia incommensurabiles sint efficientes summam $A\Delta^2 + \Delta B^2$ rationalem, $A\Delta \times \Delta B$ autem medium. et quoniam, quo $AG^2 + GB^2$ ab $A\Delta^2 + \Delta B^2$ differt [prop. XLI lemma], eo etiam $2 A\Delta \times \Delta B$ a $2 AG \times GB$ differt [cfr. p. 122, 10 sq.], et $AG^2 + GB^2$ excedit $A\Delta^2 + \Delta B^2$ spatio rationali (nam utrumque rationale est), etiam $2 A\Delta \times \Delta B$ excedit $2 AG \times GB$ spatio rationali, quamquam media sunt; quod fieri non potest [prop. XXVI]. itaque maior non diuiditur in punctis diuersis. ergo in uno tantum diuiditur; quod erat demonstrandum.

XLVI.

Recta spatio rationali et medio aequalis quadrata in uno tantum puncto diuiditur.

Sit AB recta spatio rationali et medio aequalis quadrata in Γ ita diuisa, ut AG , GB potentia incommensurabiles sint efficientes $AG^2 + GB^2$ medium,

νάμεις P, corr. m. 1. 11. τῶν ἀπό] m. 2 V. φητῶν F.
 12. δὲ F. ἀτῶν P, corr. m. 1. 14. τό] corr. ex τοῦ V.
 17. τό] τὰ V. 20. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. BFVb.
 24. Post διαιρεῖται add. εἰς τὰ ὀνόματα Theon (BFVb), P m. 2.

εἶναι ποιούσας τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ μέσον, τὸ δὲ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ ῥητόν· λέγω, ὅτι ἡ $ΑΒ$ κατ' ἄλλο σημεῖον οὐ διαιρεῖται.

Εἰ γὰρ δυνατόν, διηρησθῶ καὶ κατὰ τὸ $Δ$, ὥστε
 5 καὶ τὰς $ΑΔ$, $ΔΒ$ δυνάμει ἀσυμμέτρους εἶναι ποιού-
 σας τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$
 μέσον, τὸ δὲ δις ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ ῥητόν. ἐπεὶ οὖν,
 ᾧ διαφέρει τὸ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ τοῦ δις ὑπὸ τῶν
 $ΑΔ$, $ΔΒ$, τούτῳ διαφέρει καὶ τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$
 10 τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$, τὸ δὲ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$
 τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ ὑπερέχει ῥητῶ, καὶ τὰ
 ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ ἄρα τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ ὑπ-
 ερέχει ῥητῶ μέσα ὄντα· ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ ἄρα
 ἡ ῥητόν καὶ μέσον δυναμένη κατ' ἄλλο καὶ ἄλλο ση-
 15 μεῖον διαιρεῖται. κατὰ ἐν ἄρα σημεῖον διαιρεῖται·
 ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

μζ'.

Ἡ δύο μέσα δυναμένη καθ' ἐν μόνον ση-
 μεῖον διαιρεῖται.

20 Ἔστω [δύο μέσα δυναμένη] ἡ $ΑΒ$ διηρημένη κατὰ
 τὸ $Γ$, ὥστε τὰς $ΑΓ$, $ΓΒ$ δυνάμει ἀσυμμέτρους εἶναι
 ποιούσας τὸ τε συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$
 μέσον καὶ τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ μέσον καὶ ἐτι ἀσύμ-
 μετρον τῷ συγκειμένῳ ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν. λέγω, ὅτι
 25 ἡ $ΑΒ$ κατ' ἄλλο σημεῖον οὐ διαιρεῖται ποιοῦσα τὰ
 προκείμενα.

2. $ΓΒ$] in ras. V. δέ] δ' B, συγκείμενον ἐκ τῶν V. δέ] om. Theon (BFVb). ὑπό] corr. ex ἀπό V. 3. Post λέγω ras. 1 litt. F. $ΑΒ$ εὐθεία V. 4. καί] om. Bb, postea add. FV. 5. καί] supra scr. V. 6. ἀπό τῶν — 7. ῥητόν] in ras. m. 1 F. 6. $ΔΒ$] $ΔΒ$, KZ b. 7. δέ] δ' BFb, δὲ συγ- κείμενον ἐκ τῶν V. δέ] om. Theon (BFVb). 10. δέ] om.

$2 \mathcal{A}\Gamma \times \Gamma B$ autem rationale [prop. XL]. dico, $\mathcal{A}B$ in nullo alio puncto diuidi.

nam si fieri potest, etiam in \mathcal{A} ita diuidatur, ut $\mathcal{A}\mathcal{A}$, $\mathcal{A}B$ potentia incommensurabiles sint efficientes $\mathcal{A}\mathcal{A}^2 + \mathcal{A}B^2$ medium, $2 \mathcal{A}\mathcal{A} \times \mathcal{A}B$ autem rationale. iam quoniam, quo differt $2 \mathcal{A}\Gamma \times \Gamma B$ a $2 \mathcal{A}\mathcal{A} \times \mathcal{A}B$, eo etiam $\mathcal{A}\mathcal{A}^2 + \mathcal{A}B^2$ ab $\mathcal{A}\Gamma^2 + \Gamma B^2$ differt, $2 \mathcal{A}\Gamma \times \Gamma B$ autem $2 \mathcal{A}\mathcal{A} \times \mathcal{A}B$ excedit spatio rationali, etiam $\mathcal{A}\mathcal{A}^2 + \mathcal{A}B^2$ excedit $\mathcal{A}\Gamma^2 + \Gamma B^2$ spatio rationali, quamquam media sunt; quod fieri non potest [prop. XXVI]. itaque recta spatio rationali et medio aequalis quadrata non diuiditur in punctis diuersis. ergo in uno tantum puncto diuiditur; quod erat demonstrandum.

XLVII.

Recta duobus spatiis mediis aequalis quadrata in uno tantum puncto diuiditur.


Sit $\mathcal{A}B$ in Γ ita diuisa, ut $\mathcal{A}\Gamma$, ΓB potentia incommensurabiles sint efficientes $\mathcal{A}\Gamma^2 + \Gamma B^2$ medium et $\mathcal{A}\Gamma \times \Gamma B$ medium et simul quadratis $\mathcal{A}\Gamma^2 + \Gamma B^2$ incommensurable [prop. XLI]. dico, $\mathcal{A}B$ in nullo alio puncto diuidi, ita ut proposita efficiat.

B V. δις ἄρα V. 11. τὰ] τό P. 12. τῶν] (alt.) corr. ex τὰ m. 2 F. 14. σημεία P, corr. m. 1. 15. καθ' BFb. κατά — 16. δεῖξαι] m. 2 V. 16. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. BF. 17. μὲν] e corr. F. 18. ἡ δύο μέσα] in ras. m. 1 F. 19. δεικνύται εἰς τὰ ὀνόματα Theon (BFVb). 20. δύο μέσα δυναμένη] om. P. 23. καὶ τό — μέσον] mg. m. 1 P. τό] τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν V. 24. τῷ συγκειμένῳ] ego; τὸ συγκείμενον PBFVb. Post αὐτῶν add. τῷ (corr. ex τό m. rec. P) συγκειμένῳ (corr. ex -μενον m. rec. P) ἐκ τῶν ὅπ' (corr. ex ἀπ' m. 2 V, ἀπ' b) αὐτῶν (τετραγώνων add. b, F m. 2) BFVb, P mg. m. 1.

Εἰ γὰρ δυνατόν, διηρησθῶ κατὰ τὸ Δ , ὥστε πάλιν
 δηλονότι τὴν $ΑΓ$ τῇ $\DeltaΒ$ μὴ εἶναι τὴν αὐτήν, ἀλλὰ
 μείζονα καθ' ὑπόθεσιν τὴν $ΑΓ$, καὶ ἐκκείσθω ρητὴ
 ἡ $ΕΖ$, καὶ παραβελήσθω παρὰ τὴν $ΕΖ$ τοῖς μὲν ἀπὸ
 5 τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ ἴσον τὸ $ΕΗ$, τῷ δὲ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$,
 $ΓΒ$ ἴσον τὸ $\ThetaΚ$. ὅλον ἄρα τὸ $ΕΚ$ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ
 τῆς $ΑΒ$ τετραγώνῳ. πάλιν δὲ παραβελήσθω παρὰ
 τὴν $ΕΖ$ τοῖς ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $\DeltaΒ$ ἴσον τὸ $ΕΑ$. λοιπὸν
 ἄρα τὸ δις ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $\DeltaΒ$ λοιπῷ τῷ $ΜΚ$ ἴσον
 10 ἐστίν. καὶ ἐπεὶ μέσον ὑπόκειται τὸ συγκείμενον ἐκ
 τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$, μέσον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ $ΕΗ$.
 καὶ παρὰ ρητὴν τὴν $ΕΖ$ παράκειται· ρητὴ ἄρα ἐστὶν
 ἡ $\ThetaΕ$ καὶ ἀσύμμετρος τῇ $ΕΖ$ μήκει. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ
 καὶ ἡ $\ThetaΝ$ ρητὴ ἐστὶ καὶ ἀσύμμετρος τῇ $ΕΖ$ μήκει.
 15 καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρόν ἐστι τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ
 τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ τῷ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$, καὶ τὸ $ΕΗ$
 ἄρα τῷ $ΗΝ$ ἀσύμμετρόν ἐστιν· ὥστε καὶ ἡ $Ε\Theta$ τῇ
 $\ThetaΝ$ ἀσύμμετρός ἐστιν. καὶ εἰσι ρηταί· αἱ $Ε\Theta$, $\ThetaΝ$
 ἄρα ρηταί· εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἡ $ΕΝ$ ἄρα
 20 ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ διηρημένη κατὰ τὸ Θ . ὁμοίως
 δὲ δειξομεν, ὅτι καὶ κατὰ τὸ $Μ$ διήρηται. καὶ οὐκ
 ἐστὶν ἡ $Ε\Theta$ τῇ $ΜΝ$ ἡ αὐτή· ἡ ἄρα ἐκ δύο ὀνομά-
 των κατ' ἄλλο καὶ ἄλλο σημεῖον διήρηται· ὅπερ ἐστὶν
 αἰτοπον. οὐκ ἄρα ἡ δύο μέσα δυναμένη κατ' ἄλλο καὶ
 25 ἄλλο σημεῖον διαιρεῖται· καθ' ἓν ἄρα μόνον [σημεῖον]
 διαιρεῖται.

1. καὶ κατὰ V. 3. κείσθω P. 6. $ΕΚ$] corr. ex $\ThetaΚ$
 m. 2 P. 10. ἐστὶ BV, comp. Fb. 13. $\ThetaΕ$] $Ε\Theta$ P. 14.
 ἐστὶν P. 15. τό — 16. τῷ] in ras. m. 1 F. 16. τῷ] τῷ
 συγκείμενον ἐκ τῶν (τοῦ F) F Vb. δὲ] supra scr. F. ὑπό]
 in ras. F. $ΓΒ$] $ΒΓ'$ F. $ΕΝ$ b. 17. ἄρα] om. V. τῷ]
 mut. in τῶν m. 2 V. $ΗΝ$] $\ThetaΚ$ B Fb, $\ThetaΚ$ ἄρα V. 18.
 ἐστὶν] comp. Fb, ἐστὶ μήκει V. εἰσιν PB. 19. εἰσιν PB.

nam, si fieri potest, in Δ ita diuidatur, ut scilicet rursus $A\Gamma$, ΔB eadem non sint, sed supponatur maior



$A\Gamma$, et ponatur rationalis EZ , et rectae EZ quadratis $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$ aequale adplicetur EH , rectangulo autem $2A\Gamma \times \Gamma B$ aequale ΘK . itaque $EK = AB^2$ [II, 4]. iam rursus rectae EZ quadratis $A\Delta^2 + \Delta B^2$ aequale adplicetur EA . itaque quod re-

linquitur, $2A\Delta \times \Delta B = MK$. et quoniam supposuimus, $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$ medium esse, etiam EH medium est. et rectae rationali EZ adplicatum est; itaque ΘE rationalis est et rectae EZ longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. eadem de causa etiam ΘN rationalis est et rectae EZ longitudine incommensurabilis. et quoniam $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$ et $2A\Gamma \times \Gamma B$ incommensurabilia sunt, etiam EH , HN incommensurabilia sunt. quare etiam $E\Theta$, ΘN incommensurabiles sunt [VI, 1; prop. XI]. et sunt rationales. itaque $E\Theta$, ΘN rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo EN ex duobus nominibus est in Θ diuisa [prop. XXXVI]. similiter demonstrabimus, eandem in M diuisam esse. et $E\Theta$, MN eadem non sunt. itaque recta ex duobus nominibus in punctis diuersis diuisa est; quod fieri non potest [prop. XLII]. itaque recta duobus spatiis mediis aequalis quadrata non diuiditur in punctis diuersis. ergo in uno tantum diuiditur.

21. διαίρεται V. 22. MN ἄρα b. ἐκ τῶν P. 23. ἄτοπόν ἐστιν V. 24. ἡ] corr. ex ἐκ V. 25. ἕνα F. σημεῖον] om. P.

"Οροι δεύτεροι.

α'. Ὑποκειμένης φητῆς καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων διηρημένης εἰς τὰ ὀνόματα, ἥς τὸ μείζον ὄνομα τοῦ ἐλάσσονος μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμετρου ἐαυτῇ
5 μήκει, ἐὰν μὲν τὸ μείζον ὄνομα σύμμετρον ᾗ μήκει τῇ ἐκκειμένῃ φητῇ, καλείσθω [ἡ ὅλη] ἐκ δύο ὀνομάτων πρώτη.

β'. Ἐὰν δὲ τὸ ἐλάσσον ὄνομα σύμμετρον ᾗ μήκει τῇ ἐκκειμένῃ φητῇ, καλείσθω ἐκ δύο ὀνομάτων
10 δευτέρα.

γ'. Ἐὰν δὲ μηδέτερον τῶν ὀνομάτων σύμμετρον ᾗ μήκει τῇ ἐκκειμένῃ φητῇ, καλείσθω ἐκ δύο ὀνομάτων τρίτη.

δ'. Πάλιν δὲ ἐὰν τὸ μείζον ὄνομα [τῷ ἐλάσσονος]
15 μείζον δύνηται τῷ ἀπὸ ἀσύμμετρου ἐαυτῇ μήκει, ἐὰν μὲν τὸ μείζον ὄνομα σύμμετρον ᾗ μήκει τῇ ἐκκειμένῃ φητῇ, καλείσθω ἐκ δύο ὀνομάτων τετάρτη.

ε'. Ἐὰν δὲ τὸ ἐλάσσον, πέμπτη.

ς'. Ἐὰν δὲ μηδέτερον, ἕκτη.

20

μη'.

Εὐρεῖν τήν ἐκ δύο ὀνομάτων πρώτην.

Ἐκκείσθωσαν δύο ἀριθμοὶ οἱ ΑΓ, ΓΒ, ὥστε τὸν συγκέλειμενον ἕξ αὐτῶν τὸν ΑΒ πρὸς μὲν τὸν ΒΓ λόγον ἔχειν, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, πρὸς δὲ τὸν ΓΑ λόγον μὴ ἔχειν, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, καὶ ἐκκείσθω
25

1. ὕροι δεύτεροι] mg. B, m. 2 V, om. F, μη' b. numeros om. codd. 4. ἐλάττονος BFb. αὐτῇ B, corr. m. rec.; et supra scr. φ b; ε- e corr. V. 5. μήκει] (alt.) om. V, m. 2 F (eras). 6. φητῇ μήκει FV. ἡ ὅλη] supra scr. m. 2 P, ὅλη B.

Definitiones alterae.

1. Proposita recta rationali et recta ex duobus nominibus in nomina diuisa, cuius nomen maius potentia minus excedit quadrato rectae sibi longitudine commensurabilis, si maius nomen rationali propositae longitudine commensurabile est, uocetur ex duobus nominibus prima.

2. Sin minus nomen rationali propositae longitudine commensurabile est, uocetur ex duobus nominibus secunda.

3. Sin neutrum nomen rationali propositae longitudine commensurabile est, uocetur ex duobus nominibus tertia.

4. Rursus si maius nomen potentia excedit quadrato rectae sibi longitudine incommensurabilis, si maius nomen rationali propositae longitudine commensurabile est, uocetur ex duobus nominibus quarta.

5. Sin minus commensurabile est, quinta.

6. Sin neutrum, sexta.

XLVIII.

Inuenire rectam ex duobus nominibus primam.

Exponantur duo numeri $ΑΓ$, $ΓΒ$ eius modi, ut $ΑΒ : ΒΓ$ rationem habeat, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, $ΑΒ$ autem ad $ΓΑ$ rationem non habeat, quam numerus quadratus ad numerum quadratum [prop. XXVIII lemma], et exponatur ratio-

8. μήκει] om. V. 9. ῥητῇ μήκει V. ἡ ὅλη ἐκ F. 14. τοῦ ἐλάσσονος] m. 2 P, τοῦ ἐλάττονος V. 15. συμμετέτρον BFb, corr. m. 2. ἐαυτῇ] supra scr. ω b. 16. ὄνομα] om. V. 19. Seq. schol., u. app. 20. μὲν F. 23. τόν] (prius) corr. ex τῶν V. 25. ΓΑ] ras. V.


τις ῥητὴ ἡ Δ , καὶ τῇ Δ σύμμετρος ἔστω μήκει ἡ EZ .
 ῥητὴ ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ EZ . καὶ γεγονέντω ὡς ὁ BA
 ἀριθμὸς πρὸς τὸν AG , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς EZ πρὸς
 τὸ ἀπὸ τῆς ZH . ὁ δὲ AB πρὸς τὸν AG λόγον ἔχει,
 5 ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμὸν· καὶ τὸ ἀπὸ τῆς EZ ἄρα
 πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ZH λόγον ἔχει, ὃν ἀριθμὸς πρὸς
 ἀριθμὸν· ὥστε σύμμετρόν ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς EZ τῷ
 ἀπὸ τῆς ZH . καὶ ἐστὶ ῥητὴ ἡ EZ . ῥητὴ ἄρα καὶ ἡ
 ZH . καὶ ἐπεὶ ὁ BA πρὸς τὸν AG λόγον οὐκ ἔχει,
 10 ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν,
 οὐδὲ τὸ ἀπὸ τῆς EZ ἄρα πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ZH λόγον
 ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν·
 ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ EZ τῇ ZH μήκει. αὖ EZ ,
 ZH ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἐκ δύο
 15 ἄρα ὀνομάτων ἐστὶν ἡ EH .

Λέγω, ὅτι καὶ πρώτη.

Ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὡς ὁ BA ἀριθμὸς πρὸς τὸν AG ,
 οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς EZ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ZH , μείζων
 δὲ ὁ BA τοῦ AG , μείζον ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς EZ
 20 τοῦ ἀπὸ τῆς ZH . ἔστω οὖν τῷ ἀπὸ τῆς EZ ἴσα τὰ
 ἀπὸ τῶν ZH , Θ . καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ὁ BA πρὸς τὸν
 AG , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς EZ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ZH ,
 ἀναστρέψαντι ἄρα ἐστὶν ὡς ὁ AB πρὸς τὸν BG , οὕτως
 τὸ ἀπὸ τῆς EZ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Θ . ὁ δὲ AB πρὸς
 25 τὸν BG λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετρά-
 γωνον ἀριθμὸν· καὶ τὸ ἀπὸ τῆς EZ ἄρα πρὸς τὸ
 ἀπὸ τῆς Θ λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς
 τετράγωνον ἀριθμὸν. σύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ EZ τῇ

1. τις] supra scr. m. 1 V. 2. ἐστὶ καὶ] ἐστὶν B. 3.
 AG] ΓΑ FVb. Dein add. ἀριθμὸν V. 4. ZH] H eras. F.
 ὁ δέ — 5. ἀριθμὸν] mg. m. 2 B. 5. ὃν ὁ F. 8. ἐστὶν B.

nalis aliqua Δ , et rectae Δ longitudine commensurabilis sit EZ ; itaque EZ rationalis est [def. 3]. et fiat



$BA : \Delta\Gamma = EZ^2 : ZH^2$
[prop. VI coroll.]. uerum
 $AB : \Delta\Gamma$ rationem habet,
quam numerus
ad numerum. itaque

etiam $EZ^2 : ZH^2$ rationem habet, quam numerus ad numerum. quare EZ^2, ZH^2 commensurabilia sunt [prop. VI]. et EZ rationalis est. itaque etiam ZH rationalis est. et quoniam $BA : \Delta\Gamma$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, ne EZ^2 quidem ad ZH^2 rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque EZ, ZH longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. quare EZ, ZH rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo EH ex duobus nominibus est [prop. XXXVI]. dico, eandem primam esse.

nam quoniam est $BA : \Delta\Gamma = EZ^2 : ZH^2$, et $BA > \Delta\Gamma$, erit etiam $EZ^2 > ZH^2$ [V, 14]. sit igitur $ZH^2 + \Theta^2 = EZ^2$. et quoniam est $BA : \Delta\Gamma = EZ^2 : ZH^2$, conuertendo [V, 19 coroll.] est $AB : B\Gamma = EZ^2 : \Theta^2$. uerum $AB : B\Gamma$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque etiam $EZ^2 : \Theta^2$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. quare EZ, Θ longitudine commensurabiles sunt [prop.

9. BA] mut. in AB V. $\omicron\upsilon\kappa$] postea ins. F. 14. $ZH - \delta\upsilon\nu\acute{\alpha}\mu\epsilon\iota$] m. 2 B. $\epsilon\lambda\acute{o}\upsilon\nu$ P. 15. $\acute{\alpha}\rho\alpha$] m. rec. b. 17. \acute{o}] in ras. m. 1 P. AB F. 18. $\tau\acute{o}$] (prius) supra scr. m. 1 P. $\mu\epsilon\iota\zeta\omicron\nu$ F. 20. $\tau\acute{\omega}$] corr. ex $\tau\acute{o}$ V. 21. AB P. 25. $\tau\acute{o}\nu$] om. BFb. $B\Gamma$] Γ supra scr. V. 26. EZ] ZE corr. ex ZB F. 27. Θ] seq. ras. 1 litt. F.

⊙ μήκει· ἡ EZ ἄρα τῆς ZH μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμετρων ἑαυτῇ. καὶ εἰσι ρηταὶ αἱ EZ , ZH , καὶ σύμμετρος ἡ EZ τῇ Δ μήκει.

Ἡ EH ἄρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ πρώτη· ὅπερ
5 εἶδει δεῖξαι.

μθ'.

Εὐρεῖν τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων δευτέραν.

Ἐκκείσθωσαν δύο ἀριθμοὶ οἱ $ΑΓ$, $ΓΒ$, ὥστε τὸν
συγκείμενον ἐξ αὐτῶν τὸν $ΑΒ$ πρὸς μὲν τὸν $ΒΓ$ λό-
10 γον ἔχειν, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον
ἀριθμόν, πρὸς δὲ τὸν $ΑΓ$ λόγον μὴ ἔχειν, ὃν τετρά-
γωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, καὶ ἐκκείσ-
θω ρητὴ ἡ Δ , καὶ τῇ Δ σύμμετρος ἔστω ἡ EZ μήκει·
ρητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ EZ . γεγονέτω δὴ καὶ ὡς ὁ $ΓΑ$
15 ἀριθμὸς πρὸς τὸν $ΑΒ$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς EZ πρὸς
τὸ ἀπὸ τῆς ZH · σύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς EZ
τῷ ἀπὸ τῆς ZH . ρητὴ ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ ZH . καὶ ἐπεὶ
ὁ $ΓΑ$ ἀριθμὸς πρὸς τὸν $ΑΒ$ λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετρά-
γωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, οὐδὲ τὸ
20 ἀπὸ τῆς EZ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ZH λόγον ἔχει, ὃν τε-
τράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν. ἀσύμ-
μετρος ἄρα ἐστὶν ἡ EZ τῇ ZH μήκει· αἱ EZ , ZH
ἄρα ρηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἐκ δύο ἄρα
ὀνομάτων ἐστὶν ἡ EH .

25 Δεικτέον δὴ, ὅτι καὶ δευτέρα.

2. εἰσιν PB. 3. ἀσύμμετρος F, ἀ- eras.; deinde add. μήκει, del. m. 1. Post μήκει del. ἀσύμμετροι m. 1 F. 4. ὅπερ εἶδει δεῖξαι] comp. P, om. BFVb. 6. ν' F, et sic deinceps. 8. τόν] corr. ex τό m. 2 V. 11. ΓΑ BVb. 12. τετράγωνος F. 13. EZ] ZH BVb, in ras. F, m. rec. P. 14. ρητὴ — EZ] καὶ ἡ ZH ἄρα ρητὴ ἐστὶν F. EZ] ZH BVb, m. rec. P. γεγονέτω δὴ καὶ] καὶ ἔστω V. δέ F, supra scr. δὴ. 15. EZ] HZ F, et corr. ex ZH V, ZH Bb, P m.

IX]. itaque EZ^2 excedit ZH^2 quadrato rectae sibi commensurabilis. et EZ , ZH rationales sunt, et EZ , Δ longitudine commensurabiles.

Ergo EH ex duobus nominibus est prima [def. alt. 1]; quod erat demonstrandum.

XLIX.

Inuenire rectam ex duobus nominibus secundam.

Exponantur duo numeri AG , GB eius modi, ut AB ad BG rationem habeat, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, ad AG autem rationem non habeat, quam numerus quadratus ad numerum quadratum [prop. XXVIII lemma]. et ponatur rationalis Δ , et rectae Δ longitudine commensurabilis sit EZ ; itaque EZ rationalis est. iam fiat etiam $GA:AB = EZ^2:ZH^2$ [prop. VI coroll.]. itaque EZ^2 , ZH^2 commensurabilia sunt [prop. VI]. quare etiam ZH ratio-

nalis est. et quoniam $GA:AB$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, ne EZ^2 quidem ad ZH^2 rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque EZ , ZH longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. quare EZ , ZH rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo EH ex duobus nominibus est [prop. XXXVI]. iam demonstrandum, eandem secundam esse.

rec. 16. ZH] ZE BFVb, m. rec. P; item lin. 17 bis, 20, 22.

16. EZ] HZ Bb, et corr. ex ZH V, ZH F, P m. rec.

17. $\epsilon\sigma\tau\iota\nu$ B.

18. GA] in ras. V.

19. $\sigma\delta\delta'$ $\alpha\rho\alpha$ Theon (BFVb).

20.

EZ] HZ BFV, et e corr. m. 1 b.

22. EZ] HZ Bb, P m.

rec.; ZH V, ZH' F.

$\tau\eta\varsigma$ b.

23. $\epsilon\sigma\tau\iota\nu$ B.

25. $\delta\epsilon$ P.

- Ἐπεὶ γὰρ ἀνάπαλιν ἐστὶν ὡς ὁ BA ἀριθμὸς πρὸς τὸν AG , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς HZ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ZE , μείζων δὲ ὁ BA τοῦ AG , μείζων ἄρα [καὶ] τὸ ἀπὸ τῆς HZ τοῦ ἀπὸ τῆς ZE . ἔστω τῷ ἀπὸ τῆς HZ ἴσα
 5 τὰ ἀπὸ τῶν EZ , Θ . ἀναστρέψαντι ἄρα ἐστὶν ὡς ὁ AB πρὸς τὸν BG , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ZH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Θ . ἀλλ' ὁ AB πρὸς τὸν BG λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ZH ἄρα πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Θ λόγον ἔχει, ὃν τετρά-
 10 γωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν. σύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ ZH τῇ Θ μήκει· ὥστε ἡ ZH τῆς ZE μείζων δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἐαυτῇ. καὶ εἰσι ῥηταὶ αἱ ZH , ZE δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ τὸ EZ ἑλασσον ὄνομα τῇ ἐκκειμένη ῥητῇ σύμμετρόν ἐστι
 15 τῇ Δ μήκει.
 Ἡ EH ἄρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ δευτέρα· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

ν'.

- Εὐρεῖν τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων τρίτην.
 20 Ἐκκείσθωσαν δύο ἀριθμοὶ οἱ AG , GB , ὥστε τὸν συγκεκείμενον ἐξ αὐτῶν τὸν AB πρὸς μὲν τὸν BG λόγον ἔχειν, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, πρὸς δὲ τὸν AG λόγον μὴ ἔχειν, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν. ἐκκείσθω
 25 δέ τις καὶ ἄλλος μὴ τετράγωνος ἀριθμὸς ὁ Δ , καὶ πρὸς ἑκάτερον τῶν BA , AG λόγον μὴ ἔχτω, ὃν τε-

1. AB P. ἀριθμός] om. b. 2. HZ] EZ BFVb, m. rec. P, item lin. 4 bis. ZE] ZH BFVb, m. rec. P, item lin. 4, 11. 3. μείζων — AG] mg. m. 1 P (μείζων, sed corr. m. 1). BA] A e corr. V. καί] om. P. 5. EZ] HZ BFVb, m. rec. P. 6] ἡ b φ (non F). 6. ZH] EZ BFVb, m. rec. P, item lin. 9, 11 bis. 8. καί — 10. ἀριθμόν] mg. m.


nam quoniam e contrario est [V, 7 coroll.] $BA:AF = HZ^2:ZE^2$, et $BA > AF$, erit $HZ^2 > ZE^2$ [V, 14]. sit $HZ^2 = EZ^2 + \Theta^2$. conuertendo [V, 19 coroll.] igitur est $AB:BF = ZH^2:\Theta^2$. uerum $AB:BF$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque etiam $ZH^2:\Theta^2$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque ZH, Θ longitudine commensurabiles sunt [prop. IX]. quare ZH^2 excedit ZE^2 quadrato rectae sibi commensurabilis. et rationales sunt ZH, ZE potentia tantum commensurabiles, et minus nomen EZ rationali propositae Δ commensurabilis est longitudine.

Ergo EH ex duobus nominibus secunda est [def. alt. 2]; quod erat demonstrandum.

L.

Inuenire rectam ex duobus nominibus tertiam.

Exponentur duo numeri AF, FB eius modi, ut AB ad BF rationem habeat, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, ad AF autem rationem non habeat,



quam numerus quadratus ad numerum quadratum. exponatur autem etiam alius aliquis numerus non quadratus Δ , et ad utrumque BA, AF rationem ne habeat,

1 F. 12. εἰσιν B. 13. EZ, ZH B F V b, m. rec. P. 14. EZ] ZH B F V b, m. rec. P. ἔλαττον B V b, comp. F. σύμμετρον ἐστὶ τῇ Theon (B F V b). σύμμετρον ἐστὶ] om. Theon (B F V b). 16. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. B F V b. 20. κελύθειαν, supra scr. ἐκ, V. δύο] corr. ex of m. rec. P. 25. ἀριθμός] om. V.

τεράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· καὶ ἐκ-
 κείσθω τις ῥητὴ εὐθεία ἡ E , καὶ γερονέτω ὡς ὁ Δ
 πρὸς τὸν AB , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς E πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς
 ZH · σύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς E τῷ ἀπὸ τῆς
 5 ZH . καὶ ἐστὶ ῥητὴ ἡ E · ῥητὴ ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ ZH .
 καὶ ἐπεὶ ὁ Δ πρὸς τὸν AB λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετρά-
 γωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, οὐδὲ τὸ
 ἀπὸ τῆς E πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ZH λόγον ἔχει, ὃν τετρά-
 γωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· ἀσύμμετρος
 10 ἄρα ἐστὶν ἡ E τῇ ZH μήκει. γερονέτω δὲ πάλιν ὡς
 ἡ BA ἀριθμὸς πρὸς τὸν AG , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ZH
 πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $H\Theta$ · σύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ
 τῆς ZH τῷ ἀπὸ τῆς $H\Theta$. ῥητὴ δὲ ἡ ZH · ῥητὴ ἄρα
 καὶ ἡ $H\Theta$. καὶ ἐπεὶ ὁ BA πρὸς τὸν AG λόγον οὐκ
 15 ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν,
 οὐδὲ τὸ ἀπὸ τῆς ZH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΘH λόγον
 ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀρι-
 θμόν· ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ ZH τῇ $H\Theta$ μήκει.
 αὐτὴ ZH , $H\Theta$ ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι·
 20 ἡ $Z\Theta$ ἄρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστίν.

Λέγω δὴ, ὅτι καὶ τρίτη.

Ἐπεὶ γὰρ ἐστὶν ὡς ὁ Δ πρὸς τὸν AB , οὕτως τὸ
 ἀπὸ τῆς E πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ZH , ὡς δὲ ὁ BA πρὸς
 τὸν AG , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ZH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς
 25 $H\Theta$, δι' ἴσου ἄρα ἐστὶν ὡς ὁ Δ πρὸς τὸν AG , οὕτως
 τὸ ἀπὸ τῆς E πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $H\Theta$. ὁ δὲ Δ πρὸς
 τὸν AG λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς
 τετράγωνον ἀριθμόν· οὐδὲ τὸ ἀπὸ τῆς E ἄρα πρὸς
 τὸ ἀπὸ τῆς $H\Theta$ λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς

2. ῥητὴ] m. 2 F. 3. τῇ ZH b. 4. τό — 5. ZH] (prius) m.
 2 B. 5. καὶ ἐστὶ ῥητὴ] ῥητὴ δέ B. ἐστίν B. 10. δέ V.

quam numerus quadratus ad numerum quadratum; et ponatur aliqua recta rationalis E , et fiat $\Delta:AB = E^2:ZH^2$ [prop. VI coroll.]. itaque E^2, ZH^2 commensurabilia sunt [prop. VI]. et E rationalis est; quare etiam ZH rationalis est. et quoniam $\Delta:AB$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, ne E^2 quidem ad ZH^2 rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque E, ZH longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. iam rursus fiat $BA:AG = ZH^2:H\Theta^2$ [prop. VI coroll.]. itaque $ZH^2, H\Theta^2$ commensurabilia sunt [prop. VI]. uerum ZH rationalis est; itaque etiam $H\Theta$ rationalis est. et quoniam $BA:AG$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, ne ZH^2 quidem ad $H\Theta^2$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque $ZH, H\Theta$ longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. quare $ZH, H\Theta$ rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo $Z\Theta$ ex duobus nominibus est [prop. XXXVI]. iam dico, eandem tertiam esse. nam quoniam est $\Delta:AB = E^2:ZH^2$ et $BA:AG = ZH^2:H\Theta^2$, ex aequo [V, 22] erit $\Delta:AG = E^2:H\Theta^2$. uerum $\Delta:AG$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad

11. BA] AB' F. $\tau\acute{o}ν$] om. B. 14. ΓA F. 16. ΘH] in ras. V, $H\Theta$ F. 18. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\acute{\iota}ν$] $\acute{\epsilon}\sigma\tau\acute{\iota} \kappa\alpha\iota$ F. ZH] e corr. m. 2 (ex HZ ?) V. $\tau\eta$] m. rec. P. ΘH F. 19. $\acute{H}\Theta$] in ras. V. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\acute{\iota}ν$ B. 20. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\acute{\iota}$ BV, comp. Fb. 22. $\acute{\omega}\varsigma$] supra scr. m. 1 F. 23. ZH] HZ F. BA] AB P, AB' F. 24. $\tau\acute{o}ν$] om. P. AG] corr. ex AB m. 1 F. 25. $H\Theta$] $Z\Theta$ P, corr. m. rec. (euan.). 28. $\tau\epsilon\tau\rho\acute{\alpha}\gamma\omega\nu\omicron\varsigma$ F, corr. m. 1.

πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ
E τῇ *HΘ* μήκει. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ὁ *ΒΑ* πρὸς τὸν
ΑΓ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς *ZH* πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *HΘ*,
 5 μείζον ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς *ZH* τοῦ ἀπὸ τῆς *HΘ*. ἔστω
 οὖν τῷ ἀπὸ τῆς *ZH* ἴσα τὰ ἀπὸ τῶν *HΘ*, *Κ*· ἀνα-
 στρέψαντι ἄρα [ἐστὶν] ὡς ὁ *ΑΒ* πρὸς τὸν *ΒΓ*, οὕτως
 τὸ ἀπὸ τῆς *ZH* πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *Κ*. ὁ δὲ *ΑΒ* πρὸς
 τὸν *ΒΓ* λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τε-
 τράγωνον ἀριθμόν· καὶ τὸ ἀπὸ τῆς *ZH* ἄρα πρὸς τὸ
 10 ἀπὸ τῆς *Κ* λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς
 τετράγωνον ἀριθμόν· σύμμετρος ἄρα [ἐστὶν] ἡ *ZH* τῇ
Κ μήκει. ἡ *ZH* ἄρα τῆς *HΘ* μείζον δύνатаι τῷ ἀπὸ
 συμμέτρου ἐαυτῇ. καὶ εἰσιν αἱ *ZH*, *HΘ* φηταὶ δυνά-
 μει μόνον σύμμετροι, καὶ οὐδετέρα αὐτῶν σύμμετρός
 15 ἐστὶ τῇ *E* μήκει.

Ἡ *ZΘ* ἄρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ τρίτη· ὅπερ
 εἶδει δεῖξαι.

νά'.

Εὐρεῖν τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων τετάρτην.

20 Ἐκκείσθωσαν δύο ἀριθμοὶ οἱ *ΑΓ*, *ΓΒ*, ὥστε τὸν
ΑΒ πρὸς τὸν *ΒΓ* λόγον μὴ ἔχειν μήτε μὴν πρὸς τὸν
ΑΓ, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀρι-
 θμόν. καὶ ἐκκείσθω φητὴ ἡ *Δ*, καὶ τῇ *Δ* σύμμετρος
 ἔστω μήκει ἡ *ΕΖ*· φητὴ ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ *ΕΖ*. καὶ γε-
 25 γονέτω ὡς ὁ *ΒΑ* ἀριθμὸς πρὸς τὸν *ΑΓ*, οὕτως τὸ
 ἀπὸ τῆς *ΕΖ* πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *ZH*· σύμμετρον ἄρα

1. ἐστίν] m. 2 F, om. B. 3. τό] (alt.) om. b. 4. τῆς]
 (alt.) om. b. 6. ἐστίν] om. P. τὸν] om. Fb. 11. ἐστίν]
 om. BFVb. 12. ἄρα] m. 2 V. δύνатаι] -να- in ras. P.
 13. ἀσυμμέτρου F, corr. m. rec.; ἀ- supra scr. F m. 2. HΘ
 ἄρα V. 15. ἐστὶν B. τῇ E ἐστὶν F. 16. τρίτῃ] corr. ex
 φητὴ m. rec. b; φητὴ F, mg. γρ. τρίτῃ m. rec. ὅπερ εἶδει

numerus quadratum. itaque ne E^2 quidem ad $H\Theta^2$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. quare E , $H\Theta$ longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. et quoniam est $BA:AG = ZH^2:H\Theta^2$, erit $ZH^2 > H\Theta^2$ [V, 14]. sit igitur $ZH^2 = H\Theta^2 + K^2$. itaque conuertendo [V, 19 coroll.] $AB:B\Gamma = ZH^2:K^2$. uerum $AB:B\Gamma$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. quare etiam $ZH^2:K^2$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque ZH , K longitudine commensurabiles sunt. itaque ZH^2 excedit $H\Theta^2$ quadrato rectae sibi commensurabilis. et ZH , $H\Theta$ rationales sunt potentia tantum commensurabiles, et neutra rectae E longitudine commensurabilis est.

Ergo $Z\Theta$ ex duobus nominibus tertia est [def. alt. 3]; quod erat demonstrandum.

LI.

Inuenire rectam ex duobus nominibus quartam.

Exponentur duo numeri AG , ΓB eius modi, ut AB neque ad $B\Gamma$ neque ad AG rationem habeat, quam numerus quadratus ad numerum quadratum [prop. XXVIII lemma]. et ponatur rationalis Δ , et rectae Δ longitudine commensurabilis sit EZ . itaque EZ rationalis est. et fiat $BA:AG = EZ^2:ZH^2$ [prop. VI coroll.]. itaque EZ^2 , ZH^2 commensurabilia sunt [prop. VI]. itaque etiam ZH ra-

$\delta\epsilon\iota\chi\epsilon\iota$] comp. P, om. B F V b. 21. τὸν $B\Gamma$] ἑκάτερον αὐτῶν Theon (B F V b). $B\Gamma$] corr. ex AG m. 1 P. μῆτε — 22. AG] om. Theon (B F V b). 24. ἐστὶν B. 25. BA] $A'B'$ F. ἀριθμός] om. V. ΓA F. 26. σύμμετρος P, corr. m. 1.

ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς EZ τῷ ἀπὸ τῆς ZH· ῥητὴ ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ ZH. καὶ ἐπεὶ ὁ BA πρὸς τὸν AG λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, οὐδὲ τὸ ἀπὸ τῆς EZ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ZH
 5 λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ EZ τῇ ZH μήκει. αἱ EZ, ZH ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ὥστε ἡ EH ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστίν.

Λέγω δὴ, ὅτι καὶ τετάρτη.

10 Ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὡς ὁ BA πρὸς τὸν AG, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς EZ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ZH [μείζων δὲ ὁ BA τοῦ AG], μείζον ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς EZ τοῦ ἀπὸ τῆς ZH. ἔστω οὖν τῷ ἀπὸ τῆς EZ ἴσα τὰ ἀπὸ τῶν ZH, Θ· ἀναστρέψαντι ἄρα ὡς ὁ AB ἀριθμὸς πρὸς τὸν
 15 BΓ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς EZ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Θ. ὁ δὲ AB πρὸς τὸν BΓ λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· οὐδ' ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς EZ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Θ λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν. ἀσύμμετρος
 20 ἄρα ἐστὶν ἡ EZ τῇ Θ μήκει· ἡ EZ ἄρα τῆς HZ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ. καὶ εἰσιν αἱ EZ, ZH ῥηταὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ ἡ EZ τῇ A σύμμετρός ἐστι μήκει.

Ἡ EH ἄρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ τετάρτη· ὅπερ
 25 ἔδει δεῖξαι.

1. Post ZH add. ῥητὴ δὲ (seq. ras. 1 litt. F) ἡ EZ b, m. 2 F. ῥητὴ ἄρα] ἡ EZ ῥητὴ ἄρα V m. 2, ῥητὴ ἐστὶν ἄρα b. ἐστὶ] om. b, ἐστίν PB. 2. καὶ] (prius) om. BFb. BA] AB P. οὐκ] postea add. m. 1 F. 6. τῇ] τῆς b. 7. εἰσιν B. 8. ἐστὶ BV, comp. Fb. 9. δὴ] supra scr. m. 1 P. καὶ] m. 2 F. 10. BA] corr. ex AB V. τόν] om. Bb, corr. ex τό m. rec. P. 11. μείζων — 12. AG] mg. m. 1 in ras. P.

tionalis est. et quoniam $BA : A\Gamma$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, ne EZ^2 quidem ad ZH^2 rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque EZ, ZH longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. itaque EZ, ZH rationales sunt potentia tantum commensurabiles. quare EH ex duobus nominibus est [prop. XXXVI].

Iam dico, eandem quartam esse. nam quoniam est $BA : A\Gamma = EZ^2 : ZH^2$, erit $EZ^2 > ZH^2$ [V, 14]. sit igitur $EZ^2 = ZH^2 + \Theta^2$. itaque conuertendo [V, 19 coroll.] $AB : B\Gamma = EZ^2 : \Theta^2$. uerum $AB : B\Gamma$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque ne EZ^2 quidem ad Θ^2 rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. quare EZ, Θ longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. EZ^2 igitur excedit ZH^2 quadrato rectae sibi incommensurabilis. et EZ, ZH rationales sunt potentia tantum commensurabiles, et EZ, A longitudine commensurabiles sunt.

Ergo EH ex duobus nominibus est quarta [def. alt. 4]; quod erat demonstrandum.

11. BA] A e corr. V. 12. $\tau\eta\varsigma$] (prius) om. P. 13. $\tau\phi$] $\tau\phi$ F. 16. $\tau\acute{o}\nu$] om. BFb. 18. Θ] ΘA b. 20. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\acute{\iota}\nu$] om. Fb. $\acute{\alpha}\rho\alpha$] om. F. $\tau\eta\varsigma$] corr. ex $\tau\eta$ V. HZ] corr. ex ZH V, EH F. 21. $\sigma\upsilon\mu\mu\acute{\epsilon}\tau\rho\omicron\nu$ b, corr. m. rec., et F, corr. m. 2. $\acute{\epsilon}\alpha\nu\tau\eta\ \mu\acute{\eta}\chi\epsilon\iota$ F. 24. $\acute{o}\pi\epsilon\rho\ \acute{\epsilon}\delta\epsilon\iota\ \delta\epsilon\iota\acute{\xi}\alpha\iota$] comp. P, om. BFVb.

νβ'.

Εὐρεῖν τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων πέμπτην.

Ἐκκείσθωσαν δύο ἀριθμοὶ οἱ ΑΓ, ΓΒ, ὥστε τὸν ΑΒ πρὸς ἐκάτερον αὐτῶν λόγον μὴ ἔχειν, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, καὶ ἐκκείσθω ῥητὴ τις εὐθεῖα ἡ Δ, καὶ τῇ Δ σύμμετρος ἔστω [μήκει] ἡ ΕΖ· ῥητὴ ἄρα ἡ ΕΖ. καὶ γεγονέτω ὡς ὁ ΓΑ πρὸς τὸν ΑΒ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΕΖ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΖΗ. ὁ δὲ ΓΑ πρὸς τὸν ΑΒ λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· οὐδὲ τὸ ἀπὸ τῆς ΕΖ ἄρα πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΖΗ λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν. αἱ ΕΖ, ΖΗ ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἐκ δύο ἄρα ὀνομάτων ἐστὶν ἡ ΕΗ.

15 Λέγω δὴ, ὅτι καὶ πέμπτη.

Ἐπεὶ γάρ ἴστιν ὡς ὁ ΓΑ πρὸς τὸν ΑΒ, οὕτως το ἀπὸ τῆς ΕΖ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΖΗ, ἀνάπαλιν ὡς ὁ ΒΑ πρὸς τὸν ΑΓ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΖΗ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΖΕ· μείζον ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ΗΖ τοῦ ἀπὸ τῆς ΖΕ. ἔστω οὖν τῷ ἀπὸ τῆς ΗΖ ἴσα τὰ ἀπὸ τῶν ΕΖ, Θ· ἀναστρέψαντι ἄρα ἐστὶν ὡς ὁ ΑΒ ἀριθμὸς πρὸς τὸν ΒΓ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΗΖ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Θ. ὁ δὲ ΑΒ πρὸς τὸν ΒΓ λόγον οὐκ ἔχει, ὃν

3. τόν] corr. ex τό V. 7. μήκει] om. P. ΕΖ] ΖΗ Theon (BFVb), ΗΖ m. rec. P. ῥητὴ ἄρα ἡ ΕΖ] ῥητὴ ἄρα ἡ ΖΗ V, mg. ῥητὴ τῇ ἄρα ΗΖ m. 2. ΕΖ] ΖΗ Theon (BFb), ΗΖ P m. rec. 8. ΕΖ] Z post ras. 1 litt. V, ΖΗ F, ΗΖ Bb, P m. rec. 9. ΖΗ] ΖΕ Theon (BFVb), m. rec. P. Deinde add. σύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΗΖ τῷ ἀπὸ τῆς ΖΕ· ῥητὴ ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ ΖΕ. καὶ ἐπεὶ Theon (BFVb), P m. rec. (ΖΗ πρὸ ΗΖ). δέ] om. Theon (BFVb). τόν] om. BFb. 11. τῆς] (prius) m. 2 B. ΕΖ] ΗΖ FVb, m. 2 B, m. rec. P. ἄρα] om. B. πρὸς τὸ ἀπὸ] m. 2 B. ΖΗ] P, ΖΕ BFVb,

LII.

Inuenire rectam ex duobus nominibus quintam.

Exponantur duo numeri $ΑΓ$, $ΓΒ$ eius modi, ut $ΑΒ$ ad neutrum rationem habeat, quam numerus quadratus ad numerum quadratum [prop. XXVIII lemma], et ponatur recta aliqua rationalis $Δ$, et rectae $Δ$ commensurabilis sit $ΕΖ$. itaque $ΕΖ$ rationalis est. et fiat

$$ΓΑ:ΑΒ=ΕΖ^2:ΖΗ^2$$

[prop. VI coroll.]. $ΓΑ$ autem ad $ΑΒ$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque ne $ΕΖ^2$ quidem ad $ΖΗ^2$ rationem habet,

quam numerus quadratus ad numerum quadratum. quare $ΕΖ$, $ΖΗ$ rationales sunt potentia tantum commensurabiles [prop. IX]. ergo $ΕΗ$ ex duobus nominibus est [prop. XXXVI].

iam dico, eandem quintam esse. nam quoniam est $ΓΑ:ΑΒ=ΕΖ^2:ΖΗ^2$, e contrario [V, 7 coroll.] est $ΒΑ:ΑΓ=ΖΗ^2:ΖΕ^2$. itaque $ΗΖ^2 > ΖΕ^2$ [V, 14]. sit igitur $ΗΖ^2 = ΕΖ^2 + Θ^2$. itaque conuertendo [V,

m. rec. P. 12. τετραγώνος F, corr. m. 1. ἀριθμὸν] m. 2 V. Deinde add. ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ ΗΖ τῇ ΖΕ (τῇ ΖΕ om. V) μήκει b, mg. m. 1 F, m. 2 V. 13. εἶσιν PB. 14. ἄρα] om. P. EH] H e corr. m. 1 b. 15. καί] m. 2 F. 17. ΕΖ] P; ΗΖ ΒVb, P m. rec.; ΖΗ F. ΖΗ] P, ΖΕ BFVb, P m. rec. Ante ὡς add. ἄρα m. rec. P. 18. οὕτως] om. BVb. ΖΗ] P, ΕΖ BFVb, P m. rec. 19. ΖΕ] P, ΖΗ BFVb, P m. rec. Dein add. ὁ δὲ ΒΑ τοῦ ΑΓ μείζων (corr. ex μείζον ἐστὶ V; μείζον (μείζων m. rec. b) δὲ τὸ (ὁ m. rec. b) ΒΑ τοῦ ΑΓ b, in ras. F. μείζον ἄρα] sustulit rep. in F. ἄρα ἐστὶ V. τό] m. 2 F. ΗΖ] P, ΕΖ BFVb, P m. rec.; item lin. 20, 22. 20. τῇς] om. P. ΖΕ] P, ΖΗ BFVb, P m. rec. τῷ] supra scr. m. 1 b, postea add. m. 1 V, corr. ex τό F m. 1. 21. ΕΖ] P, ΗΖ BFb, m. rec. P, in ras. V.

τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· οὐδ'
 ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ZH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Θ λόγον ἔχει,
 ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν.
 ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ ZH τῇ Θ μήκει· ὥστε ἡ
 5 ZH τῆς ZE μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσύμμετρου ἑαυ-
 τῇ. καὶ εἰσιν αἱ HZ , ZE ῥηταὶ δυνάμει μόνον σύμ-
 μετροι, καὶ τὸ EZ ἑλαττον ὄνομα σύμμετρόν ἐστι τῇ
 ἐκκειμένη ῥητῇ τῇ Δ μήκει.
 Ἡ EH ἄρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ πέμπτη· ὅπερ
 10 ἔδει δεῖξαι.

νγ'.

Εὐρεῖν τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων ἑκτην.
 Ἐκκείσθωσαν δύο ἀριθμοὶ οἱ $ΑΓ$, $ΓΒ$, ὥστε τὸν
 $ΑΒ$ πρὸς ἑκάτερον αὐτῶν λόγον μὴ ἔχειν, ὃν τετρά-
 15 γωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· ἔστω δὲ
 καὶ ἕτερος ἀριθμὸς ὁ Δ μὴ τετράγωνος ὢν μηδὲ πρὸς
 ἑκάτερον τῶν $ΒΑ$, $ΑΓ$ λόγον ἔχων, ὃν τετράγωνος
 ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· καὶ ἐκκείσθω τις
 ῥητὴ εὐθεῖα ἡ $Ε$, καὶ γερονέτω ὡς ὁ Δ πρὸς τὸν
 20 $ΑΒ$, οὕτως το ἀπὸ τῆς $Ε$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ZH · σύμ-
 μετρον ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς $Ε$ τῷ ἀπὸ τῆς ZH . καὶ ἐστὶ
 ῥητὴ ἡ $Ε$ · ῥητὴ ἄρα καὶ ἡ ZH . καὶ ἐπεὶ οὐκ ἔχει

1. τετράγωνος] corr. ex τετράγωνος m. 1 b. 2. ZH] P,
 EZ BFVb, P m. rec.; item lin. 4, 5. Θ] ras. 1 litt. V.
 4. ἐστὶν] om. BVb. 5. τῆς] corr. ex τῇ Vb. ZE] P,
 ZH BFVb, P m. rec. συμμέτρου F, corr. m. 2. 6. εἰσι V,
 comp. Fb. αἱ] m. rec. P. αἱ HZ , ZE] om. FVb; αἱ EZ ,
 ZH supra scr. m. 2 B. 7. EZ] P, ZH BFVb, HZ m. rec. P.
 9. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. BFVb. 13. $ΑΓ$] A,
 seq. ras. 1 litt. F. τὸν] corr. ex τό m. 2 B. 16. μήτε P.
 17. $ΒΑ$] supra scr. Γ m. 1 b, $ΑΒ$ F et V, sed corr. ἔχειν
 V, sed corr. 18. καὶ] m. 2 F. 20. οὕτως καὶ V. σύμ-
 μετρος Theon (BFVb), P m. rec. 21. ἄρα ἐστὶν FV. τό—

19 coroll.] $AB:BG = HZ^2:\Theta^2$. uerum $AB:BG$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque ne ZH^2 quidem ad Θ^2 rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque ZH , Θ longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. quare ZH^2 excedit ZE^2 quadrato rectae sibi incommensurabilis. et HZ , ZE rationales sunt potentia tantum commensurabiles, et minus nomen EZ rectae rationali propositae Δ longitudine commensurabilis est.

Ergo EH ex duobus nominibus est quinta [def. alt. 5]; quod erat demonstrandum.

LIII.

Inuenire rectam ex duobus nominibus sextam.

Exponentur duo numeri AG , GB eius modi, ut AB ad neutrum rationem habeat, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, sit autem etiam alius numerus Δ non quadratus neque ad alterutrum BA , AG rationem habens, quam numerus quadratus ad numerum quadratum [prop. XXVIII lemma]; et ponatur recta rationalis E , et fiat

$$\Delta:AB = E^2:ZH^2$$

[prop. VI coroll.]. itaque E^2 , ZH^2 commensurabilia sunt [prop. VI]. et E rationalis est; itaque etiam ZH rationalis est. et quoniam $\Delta:AB$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, ne E^2 quidem ad ZH^2 rationem habet, quam nu-

ZH] ἢ E $\tau\eta$ (τῷ ἀπὸ τῆς P) ZH δυνάμει Theon (BFVb), P
m. rec. $\xi\sigma\tau\iota\nu$ B. 22. $\xi\pi\epsilon\iota$] m. 2 B, om. F.

ὁ Δ πρὸς τὸν AB λόγον, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς
 πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, οὐδὲ τὸ ἀπὸ τῆς E ἄρα
 πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ZH λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀρι-
 5 E τῇ ZH μήκει. γεγονέντω δὴ πάλιν ὡς ὁ BA πρὸς
 τὸν AG , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ZH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $H\Theta$.
 σύμμετρον ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ZH τῷ ἀπὸ τῆς ΘH . φη-
 τὸν ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ΘH · φητὴ ἄρα ἡ ΘH . καὶ ἐπεὶ
 ὁ BA πρὸς τὸν AG λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος
 10 ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, οὐδὲ τὸ ἀπὸ τῆς
 ZH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $H\Theta$ λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος
 ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· ἀσύμμετρος ἄρα
 ἐστὶν ἡ ZH τῇ $H\Theta$ μήκει. αἱ ZH , $H\Theta$ ἄρα φηταί
 εἶσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἐκ δύο ἄρα ὀνομάτων
 15 ἐστὶν ἡ $Z\Theta$.

Δεικτέον δὴ, ὅτι καὶ ἔκτῃ.

Ἐπεὶ γὰρ ἐστὶν ὡς ὁ Δ πρὸς τὸν AB , οὕτως τὸ
 ἀπὸ τῆς E πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ZH , ἔστι δὲ καὶ ὡς ὁ
 BA πρὸς τὸν AG , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ZH πρὸς τὸ
 20 ἀπὸ τῆς $H\Theta$, δι' ἴσου ἄρα ἐστὶν ὡς ὁ Δ πρὸς τὸν AG ,
 οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς E πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $H\Theta$. ὁ δὲ Δ
 πρὸς τὸν AG λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς
 πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· οὐδὲ τὸ ἀπὸ τῆς E ἄρα
 πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $H\Theta$ λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθ-
 25 μὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ
 E τῇ $H\Theta$ μήκει. ἐδείχθη δὲ καὶ τῇ ZH ἀσύμμετρος·
 ἐκατέρα ἄρα τῶν ZH , $H\Theta$ ἀσύμμετρός ἐστι τῇ E μήκει.
 καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ὁ BA πρὸς τὸν AG , οὕτως τὸ ἀπὸ
 τῆς ZH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $H\Theta$, μείζον ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς

7. ἀσύμμετρον F, sed corr. ΘH] in ras. V, $H\Theta$ Fb.
 Deinde add. φητὸν δὲ τὸ ἀπὸ τῆς ZH Theon (BFVb). 8. ἄρα

merus quadratus ad numerum quadratum. itaque E, ZH longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. iam rursus fiat $BA:AG = ZH^2:H\Theta^2$ [prop. VI coroll.]. itaque $ZH^2, \Theta H^2$ commensurabilia sunt [prop. VI]. itaque ΘH^2 rationale est; quare ΘH est rationalis. et quoniam $BA:AG$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, ne ZH^2 quidem ad $H\Theta^2$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque $ZH, H\Theta$ longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. quare $ZH, H\Theta$ rationales sunt potentia tantum commensurabiles. itaque $Z\Theta$ ex duobus nominibus est.

iam demonstrandum, eandem sextam esse. nam quoniam est $A:AB = E^2:ZH^2$, et $BA:AG = ZH^2:H\Theta^2$, ex aequo erit [V, 22] $A:AG = E^2:H\Theta^2$. uerum $A:AG$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque ne E^2 quidem ad $H\Theta^2$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque $E, H\Theta$ longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. demonstrauius autem, etiam E, ZH incommensurabiles esse. itaque utraque $ZH, H\Theta$ rectae E longitudine incommensurabilis est. et quoniam est $BA:AG = ZH^2:H\Theta^2$, erit $ZH^2 > H\Theta^2$ [V, 14]. iam sit $ZH^2 = H\Theta^2 + K^2$. quare conuertendo [V, 19 coroll.] erit $AB:BG = ZH^2:K^2$. uerum $AB:BG$

καί Theon (BFVb). $\delta\eta\tau\acute{\eta} - \Theta H$] mg. V. $H\Theta$ P. 9.
 BA] AB' F. 10. $\text{o}\acute{\upsilon}\delta\acute{\epsilon}$] $\text{o}\acute{\upsilon}\delta'$ $\acute{\alpha}\rho\alpha$ FVb, $\text{o}\acute{\upsilon}\kappa$ $\acute{\alpha}\rho\alpha$ B. $\tau\acute{o}$
 $\tau\acute{\alpha}$ F. 14. $\epsilon\iota\sigma\iota\nu$ B. 18. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$ B. 19. BA] AB P. 21.
 $\delta\acute{\epsilon}$] m. 2 F. 23. $\text{o}\acute{\upsilon}\delta\acute{\epsilon}$] $\text{o}\acute{\upsilon}\delta'$ $\acute{\alpha}\rho\alpha$ Theon (BFVb). $\acute{\alpha}\rho\alpha$] $\acute{\alpha}\rho\alpha$
om. Theon (BFVb). 26. HZ F. 27. $\acute{\epsilon}\kappa\alpha\tau\acute{\epsilon}\rho\alpha - E$] η \acute{E}
 $\acute{\alpha}\rho\alpha$ $\acute{\epsilon}\kappa\alpha\tau\acute{\epsilon}\rho\alpha$ $\tau\acute{\omega}\nu$ $ZH, H\Theta$ $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$ $\acute{\alpha}\sigma\acute{\upsilon}\mu\epsilon\tau\rho\acute{o}\varsigma$ V. $\acute{\alpha}\rho\alpha$] supra
scr. F. 28. $\text{o}\acute{\upsilon}\tau\omega\varsigma$] om. b, m. 2 B. 29. Post $H\Theta$ add.
 $\mu\epsilon\lambda\acute{\iota}\omega\nu$ $\delta\acute{\epsilon}$ δ AB $\tau\acute{o}\upsilon$ AG V. $\mu\epsilon\lambda\acute{\iota}\omega\nu$] bis F.

ZH τοῦ ἀπὸ τῆς $H\Theta$. ἔστω οὖν τῷ ἀπὸ [τῆς] ZH ἴσα τὰ ἀπὸ τῶν $H\Theta$, K . ἀναστρέψαντι ἄρα ὡς ὁ AB πρὸς $B\Gamma$, οὕτως τὸ ἀπὸ ZH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς K . ὁ δὲ AB πρὸς τὸν $B\Gamma$ λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν· ὥστε οὐδὲ τὸ ἀπὸ ZH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς K λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν. ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ ZH τῇ K μήκει· ἡ ZH ἄρα τῆς $H\Theta$ μείζον δύνатаι τῷ ἀπὸ ἀσύμμετρου ἐκντῆ. καὶ εἰσὶν αἱ ZH , $H\Theta$ ῥηταὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ οὐδετέρω αὐτῶν σύμμετρός ἐστι μήκει τῇ ἐκκειμένη ῥητῇ τῇ E .

Ἡ $Z\Theta$ ἄρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶν ἕκτη· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

15 $\Lambda\eta\mu\mu\alpha.$

Ἐστω δύο τετράγωνα τὰ AB , $B\Gamma$ καὶ κείσθωσαν ὥστε ἐπ' εὐθείας εἶναι τὴν AB τῇ BE . ἐπ' εὐθείας ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ ZB τῇ BH . καὶ συμπληρώσθω τὸ AG παραλληλόγραμμον· λέγω, ὅτι τετράγωνόν ἐστι τὸ AG , καὶ ὅτι τῶν AB , $B\Gamma$ μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ ΔH , καὶ ἔτι τῶν AG , GB μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ $\Delta\Gamma$.

Ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ μὲν AB τῇ BZ , ἡ δὲ BE τῇ BH , ὅλη ἄρα ἡ ΔE ὅλη τῇ ZH ἐστὶν ἴση. ἀλλ' ἡ μὲν ΔE ἑκατέρω τῶν $A\Theta$, $K\Gamma$ ἐστὶν ἴση, ἡ δὲ ZH ἑκατέρω τῶν AK , $\Theta\Gamma$ ἐστὶν ἴση· καὶ ἑκατέρω ἄρα τῶν $A\Theta$, $K\Gamma$ ἑκατέρω τῶν AK , $\Theta\Gamma$ ἐστὶν ἴση. ἰσόπλευρον ἄρα ἐστὶ τὸ AG παραλληλόγραμμον· ἐστὶ δὲ καὶ ὀρθογώνιον· τετράγωνον ἄρα ἐστὶ τὸ AG .

1. ZH] $Z\Theta$ b. τῆς] om. P. τῆς] om. Pb. 3. τὸν $B\Gamma$ V. τῆς ZH FV. 4. πρὸς τὸν $B\Gamma$] mg. m. 1 P. 6. τῆς ZH FV. 7. ἀσύμμετρα P, corr. m. 1. 9. συμ-

rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. quare ne ZH^2 quidem ad K^2 rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque ZH , K longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. itaque ZH^2 excedit $H\Theta^2$ quadrato rectae sibi incommensurabilis. et ZH , $H\Theta$ rationales sunt potentia tantum commensurabiles, et neutra earum rationali propositae E longitudine commensurabilis est.

Ergo $Z\Theta$ recta ex duobus nominibus est sexta [def. alt. 6]; quod erat demonstrandum.

Lemma.

Sint duo quadrata AB , $B\Gamma$ et ita ponantur, ut $\angle B$, BE in eadem recta sint. itaque etiam ZB , BH in eadem sunt recta. et expleatur parallelogrammum $A\Gamma$. dico, $A\Gamma$ quadratum esse, et $\angle H$ medium esse proportionale inter AB , $B\Gamma$, et praeterea $\angle \Gamma$ medium esse proportionale inter $A\Gamma$, ΓB .

nam quoniam $\angle B = BZ$, $BE = BH$, erit $\angle E = HZ$. uerum $\angle E = A\Theta = K\Gamma$, $ZH = AK = \Theta\Gamma$ [I, 34]. quare etiam

$$A\Theta = K\Gamma = AK = \Theta\Gamma.$$

μέτρον F, corr. m. 2. εαντῇ μήκει F. 11. ἀντῶν] τῶν
 ZH , $H\Theta$ Theon (BFVb). εστιν P. ἐγκειμένη F. 12.
 E] EH b, H add. m. 2 F. 13. ἡ] om. b. ὅπερ ἐδει δεῖξαι]
 comp. P, om. BFVb. 18. εστιν B. 19. ὅτι τὸ $A\Gamma$ V.
 εστιν P. 20. τὸ $A\Gamma$] om. V. ὅτι] ἔτι BF, supra scr.
 ὅτι m. 2. 21. εστιν P. 22. ZB B. 24. Post $\iota\sigma\eta$ del.
 ἀλλ' ἡ μὲν $\angle E$ ἐκαστέρῳ m. 1 P. HZ BFV. 25. $\Gamma\Theta$ V.
 ἄρα] om. b. 26. $A\Theta$] A postea add. V. 27. εστιν P.
 εστιν PB. 28. εστιν P.

Καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ ZB πρὸς τὴν BH , οὕτως ἡ ΔB πρὸς τὴν BE , ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ZB πρὸς τὴν BH , οὕτως τὸ AB πρὸς τὸ ΔH , ὡς δὲ ἡ ΔB πρὸς τὴν BE , οὕτως τὸ ΔH πρὸς τὸ $B\Gamma$, καὶ ὡς ἄρα τὸ AB
 5 πρὸς τὸ ΔH , οὕτως τὸ ΔH πρὸς τὸ $B\Gamma$. τῶν AB , $B\Gamma$ ἄρα μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ ΔH .

Λέγω δὴ, ὅτι καὶ τῶν AG , GB μέσον ἀνάλογόν [ἐστι] τὸ $\Delta\Gamma$.

Ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὡς ἡ AD πρὸς τὴν ΔK , οὕτως
 10 ἡ KH πρὸς τὴν $H\Gamma$. ἴση γάρ [ἐστίν] ἑκατέρα ἑκατέρῃ· καὶ συνθέντι ὡς ἡ AK πρὸς $K\Delta$, οὕτως ἡ $K\Gamma$ πρὸς GH , ἀλλ' ὡς μὲν ἡ AK πρὸς $K\Delta$, οὕτως τὸ AG πρὸς τὸ $\Gamma\Delta$, ὡς δὲ ἡ $K\Gamma$ πρὸς GH , οὕτως τὸ $\Delta\Gamma$ πρὸς GB , καὶ ὡς ἄρα τὸ AG πρὸς $\Delta\Gamma$, οὕ-
 15 τως τὸ $\Delta\Gamma$ πρὸς τὸ $B\Gamma$. τῶν AG , GB ἄρα μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ $\Delta\Gamma$. ἃ προέκειτο δεῖξαι.

νδ'.

Ἐὰν χωρίον περιέχεται ὑπὸ φητῆς καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων πρώτης, ἡ τὸ χωρίον δυνα-
 20 μένη ἄλογός ἐστιν ἡ καλουμένη ἐκ δύο ὀνομάτων.

Χωρίον γὰρ τὸ AG περιέχεται ὑπὸ φητῆς τῆς AB καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων πρώτης τῆς AD . λέγω, ὅτι ἡ τὸ AG χωρίον δυναμένη ἄλογός ἐστιν ἡ καλου-
 25 μένη ἐκ δύο ὀνομάτων.

3. τὴν BE — 5. $B\Gamma$] postea ins. m. 1 F. 4. οὕτω B. τ'] m. 2 F. τὸ $B\Gamma$] corr. ex τὴν $B\Gamma$ m. 2 B. 5. οὕτω B. 6. ἄρα] om. b. 8. ἐστι] om. P. 10. τὴν] om. BFb. ἐστίν] om. P. ἑκατέρῃ] om. P. 11. τὴν $K\Delta$ V. 12. τὴν GH V. τὴν $K\Delta$ V. 13. τὴν GH V. 14. τὸ GB V, seq. ras. 1 litt. $\Delta\Gamma$] τὸ $\Gamma\Delta$ V. 15. $\Delta\Gamma$] $\Gamma\Delta$ V. τὸ $B\Gamma$] $B\Gamma$

itaque parallelogrammum AG aequilaterum est; est autem idem rectangulum. ergo AG quadratum est.


et quoniam est $ZB:BH=AB:BE$, et $ZB:BH=AB:AH$, $AB:BE=AH:BG$ [VI, 1], erit etiam $AB:AH=AH:BG$. ergo AH medium est proportionale inter AB , BG .

Iam dico, AG etiam medium proportionale esse inter AG , GB .

nam quoniam est $AA:AK=KH:HG$ (nam utraque utrique aequalis est), et componendo [V, 18] $AK:KA=KG:GH$, est autem $AK:KA=AG:GA$, $KG:GH=AG:GB$, erit etiam $AG:GA=AG:GB$. ergo AG medium est proportionale inter AG , GB ; quae propositum erat demonstrare.

LIV.

Si spatium recta rationali et recta ex duobus nominibus prima comprehenditur, recta spatio aequalis quadrata irrationalis est ex duobus nominibus, quae uocatur.



Spatium enim AG recta rationali AB et recta ex duobus nominibus prima AA comprehendatur. dico, rectam spatio AG aequalem quadratam irrationalem esse ex duobus nominibus, quae uocatur.

B, GB Fb. 16. α] ὁπερ Theon (BFVb). Post δεῖξαι add. ο > : > P. 18. τῆς] m. 2 B. 22. χαρὸν — 25. ὀνομάτων] mg. m. 1 F. 22. AG] $ABGA$ Theon (BFVb). 23. AB] AA F.

Ἐπεὶ γὰρ ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ πρώτη ἡ $ΑΔ$, διη-
 ρήσθω εἰς τὰ ὀνόματα κατὰ τὸ E , καὶ ἔστω τὸ μείζον
 ὄνομα τὸ $ΑΕ$. φανερόν δὴ, ὅτι αἱ $ΑΕ$, $ΕΔ$ ῥηταί
 εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ ἡ $ΑΕ$ τῆς $ΕΔ$
 5 μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ, καὶ ἡ $ΑΕ$
 σύμμετρός ἐστι τῇ ἐκκειμένη ῥητῇ τῇ $ΑΒ$ μήκει. τε-
 τμησθῶ δὴ ἡ $ΕΔ$ δίχα κατὰ τὸ Z σημεῖον. καὶ ἐπεὶ
 ἡ $ΑΕ$ τῆς $ΕΔ$ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου
 ἑαυτῇ, ἂν ἄρα τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλάσ-
 10 σονος, τοιούτῳ τῷ ἀπὸ τῆς EZ , ἴσον παρὰ τὴν μείζονα
 τὴν $ΑΕ$ παραβληθῇ ἐλλείπον εἶδει τετραγώνῳ, εἰς
 σύμμετρα αὐτὴν διαιρεῖ. παραβεβλήσθω οὖν παρὰ
 τὴν $ΑΕ$ τῷ ἀπὸ τῆς EZ ἴσον τὸ ὑπὸ $ΑΗ$, $ΗΕ$ · σύμ-
 μετρος ἄρα ἐστὶν ἡ $ΑΗ$ τῇ $ΕΗ$ μήκει. καὶ ἤχθωσαν
 15 ἀπὸ τῶν H , E , Z ὁποτέρᾳ τῶν $ΑΒ$, $ΓΔ$ παράλληλοι
 αἱ $HΘ$, $EΚ$, $ZΑ$ · καὶ τῷ μὲν $ΑΘ$ παραλληλογράμμῳ
 ἴσον τετράγωνον συνεστάτω τὸ $ΣΝ$, τῷ δὲ $ΗΚ$ ἴσον
 τὸ $ΝΠ$, καὶ κείσθω ὥστε ἐπ' εὐθείας εἶναι τὴν MN
 τῇ $NΞ$ · ἐπ' εὐθείας ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ PN τῇ NO . καὶ
 20 συμπεπληρωσθῶ τὸ $ΣΠ$ παραλληλόγραμμον· τετρά-
 γωνον ἄρα ἐστὶ τὸ $ΣΠ$. καὶ ἐπεὶ τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΗ$,
 $ΗΕ$ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς EZ , ἔστιν ἄρα ὡς ἡ $ΑΗ$
 πρὸς EZ , οὕτως ἡ ZE πρὸς $ΕΗ$ · καὶ ὡς ἄρα τὸ $ΑΘ$
 πρὸς $ΕΑ$, τὸ $ΕΑ$ πρὸς $ΚΗ$ · τῶν $ΑΘ$, $ΗΚ$ ἄρα μέσον
 25 ἀνάλογόν ἐστι τὸ $ΕΑ$. ἀλλὰ τὸ μὲν $ΑΘ$ ἴσον ἐστὶ

2. E] e corr. m. rec. P. 3. δὴ] corr. ex δέ B. 4.
 εἰσιν P. ἀσύμμετροι F, sed corr. 5. ἀσυμμέτρον b, sed
 corr.; in F supra add. ἀ- m. 2. καί] om. F. ΕΑ F. 7.
 δὴ] δέ V. 8. ἀσυμμέτρον b, sed corr. 9. τετάρτῳ] δ' b.
 τοῦ] τῷ B. τῆς] e corr. V. 12. σύμμετρον P. διέλη
 V b, διέλη corr. in διελει F, διελει B. Dein add. μήκει V. 13.
 ὑπὸ τῶν F V. HE] HΘ P. 14. ΑΗ] H e corr. m. 1 V.

nam quoniam AA ex duobus nominibus prima est, in E in nomina diuidatur, et maius nomen sit AE . manifestum igitur, AE , $E\Delta$ rationales esse potentia tantum commensurabiles, et AE^2 excedere $E\Delta^2$ quadrato rectae sibi commensurabilis, et AE rationali propositae AB longitudine commensurabilem esse [def. alt. 1]. iam $E\Delta$ in Z puncto in duas partes aequales secetur. et quoniam AE^2 excedit $E\Delta^2$ quadrato rectae sibi commensurabilis, si quārtae parti quadrati minoris, hoc est quadrato EZ^2 , aequale maiori AE adplicatur parallelogrammum figura quadrata deficiens, eam in partes commensurabiles diuidit [prop. XVII]. adplicetur igitur rectae AE quadrato EZ^2 aequale $AH \times HE$. itaque AH , EH longitudine commensurabiles sunt. et ab H , E , Z alterutri AB , $\Gamma\Delta$ parallelae ducantur $H\Theta$, EK , $Z\Lambda$. et parallelogrammo $A\Theta$ aequale quadratum ΣN construatur, et $NH = HK$ [II, 14], et ita ponantur, ut MN , $N\Xi$ in eadem recta sint; quare etiam PN , NO in eadem sunt recta. et parallelogrammum $\Sigma\Pi$ expleatur; itaque $\Sigma\Pi$ quadratum est [u. lemma]. et quoniam est $AH \times HE = EZ^2$, erit $AH : EZ = ZE : EH$ [VI, 17]. quare etiam $A\Theta : EA = EA : KH$ [VI, 1].

EH] HE in ras. V. 15. H] m. 2 F. AB] A eras. F.
 $\Gamma\Delta$] in ras. V, $B\Delta$ F, $\Delta\Gamma$ B. 16. EK] E postea ins. m.
 1 F. $Z\Lambda$] mut. in AZ V, AZ BFb. $\pi\alpha\rho\alpha\lambda\lambda\eta\lambda\omicron\gamma\rho\alpha\mu\mu\omicron\nu$ P,
 corr. m. 1. 17. ΣN] Σ corr. ex E BFb. 18. $\kappa\epsilon\iota\sigma\theta\omega\sigma\alpha\nu$ V.
 MN] corr. ex N m. 1 F. 19. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\acute{\iota}\nu$ B. NP P. 20.
 $\Sigma\Pi$] corr. ex $E\Pi$ B, item lin. 21. 21. $\tau\acute{o}$] $\tau\tilde{\omega}$ V. AHE b,
 et corr. in AH , EH m. 2 V, AH F, et B, corr. m. 2. 22.
 $\tau\tilde{\omega}$] $\tau\acute{o}$ V. 23. $\pi\rho\acute{o}\varsigma$ $\tau\eta\nu$ V. ZE] EZ P. EH] $\tau\eta\nu$ H,
 ante H ras. 1 litt. V. 24. $\pi\rho\acute{o}\varsigma$ $\tau\acute{o}$, seq. ras. 1 litt. V. EA]
 E eras. V. $\tau\acute{o}$ KH V. $\acute{\alpha}\rho\alpha$] postea add. m. 1 P.

τῷ ΣΝ, τὸ δὲ ΗΚ ἴσον τῷ ΝΠ· τῶν ΣΝ, ΝΠ ἄρα μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ ΕΛ. ἐστὶ δὲ τῶν αὐτῶν τῶν ΣΝ, ΝΠ μέσον ἀνάλογον καὶ τὸ ΜΡ· ἴσον ἄρα ἐστὶ τὸ ΕΛ τῷ ΜΡ· ὥστε καὶ τῷ ΟΞ ἴσον ἐστίν. ἐστὶ δὲ
 5 καὶ τὰ ΑΘ, ΗΚ τοῖς ΣΝ, ΝΠ ἴσα· ὅλον ἄρα τὸ ΑΓ ἴσον ἐστὶν ὅλῳ τῷ ΣΠ, τουτέστι τῷ ἀπὸ τῆς ΜΞ τετραγώνῳ· τὸ ΑΓ ἄρα δύναται ἢ ΜΞ.

Λέγω, ὅτι ἡ ΜΞ ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστίν.

Ἐπεὶ γὰρ σύμμετρός ἐστὶν ἡ ΑΗ τῇ ΗΕ, σύμμε-
 10 τρός ἐστι καὶ ἡ ΑΕ ἑκατέρα τῶν ΑΗ, ΗΕ. ὑπόκει-
 ται δὲ καὶ ἡ ΑΕ τῇ ΑΒ σύμμετρος· καὶ αἱ ΑΗ, ΗΕ
 ἄρα τῇ ΑΒ σύμμετροί εἰσιν. καὶ ἐστὶ φητὴ ἡ ΑΒ
 φητὴ ἄρα ἐστὶ καὶ ἑκατέρα τῶν ΑΗ, ΗΕ· φητὸν ἄρα
 ἐστὶν ἐκότερον τῶν ΑΘ, ΗΚ, καὶ ἐστὶ σύμμετρον τὸ
 15 ΑΘ τῷ ΗΚ. ἀλλὰ τὸ μὲν ΑΘ τῷ ΣΝ ἴσον ἐστίν,
 τὸ δὲ ΗΚ τῷ ΝΠ· καὶ τὰ ΣΝ, ΝΠ ἄρα, τουτέστι
 τὰ ἀπὸ τῶν ΜΝ, ΝΞ, φητά ἐστὶ καὶ σύμμετρα. καὶ
 ἐπεὶ ἀσύμμετρός ἐστὶν ἡ ΑΕ τῇ ΕΛ μήκει, ἀλλ' ἡ
 μὲν ΑΕ τῇ ΑΗ ἐστὶ σύμμετρος, ἡ δὲ ΑΕ τῇ ΕΖ
 20 σύμμετρος, ἀσύμμετρος ἄρα καὶ ἡ ΑΗ τῇ ΕΖ· ὥστε
 καὶ τὸ ΑΘ τῷ ΕΛ ἀσύμμετρόν ἐστιν. ἀλλὰ τὸ μὲν
 ΑΘ τῷ ΣΝ ἐστὶν ἴσον, τὸ δὲ ΕΛ τῷ ΜΡ· καὶ τὸ
 ΣΝ ἄρα τῷ ΜΡ ἀσύμμετρόν ἐστιν. ἀλλ' ὥς τὸ ΣΝ

1. ΣΝ] (bis) corr. ex EN B, item lin. 3, 5. 2. ΕΛ] corr. ex A m. 1 F. ἐστὶν PB. 3. ἐστίν P. 4. τό] corr. ex τῷ m. 1 P. ΜΡ τῷ ΕΛ Theon (BFVb). ὥστε καὶ τῷ] ἀλλὰ τὸ μὲν ΜΡ τῷ ΟΞ (corr. ex ΞΟ V) ἴσον ἐστὶ (ἐστίν B) τὸ δὲ ΕΛ [(ΕΛ F) τῷ ΖΓ, ὅλον ἄρα τὸ ΕΓ τοῖς ΜΡ Theon (BFVb). τῷ] corr. ex τό m. 1 P. ἐστίν] postea ins. m. 1 F. 5. EN, ΠN F. 6. τουτέστιν P. 9. AN F, corr. m. 1. HE] corr. ex EH m. 2 V, E''H' F. 10. ΕΛ ἑκατέ-
 ρων F. 11. σύμμετρος — 12. AB] (prius) mg. m. 1 F. 11. καί] μήκει καὶ V, B m. 2. αἱ] ἡ EF, in ras. B. EH P. 12. εἰσι V, comp. Fb. ἐστὶν B. 13. ἐστίν PB. 14. ἐστίν] ἐστὶ καὶ V.

itaque EA medium est proportionale inter ΣN , $N\Pi$.
 uerum etiam MP inter eadem ΣN , $N\Pi$ medium est
 proportionale [u. lemma]. quare $EA = MP$. itaque etiam
 $EA = O\Xi$ [I, 43]. uerum etiam $A\Theta + HK = \Sigma N + N\Pi$.
 quare totum¹⁾ $A\Gamma = \Sigma\Pi = M\Xi^2$. ergo $M\Xi$ quadrata
 spatio $A\Gamma$ aequalis est.

dico, $M\Xi$ ex duobus nominibus esse. nam quoniam
 AH rectae HE commensurabilis est, AE utrique rectae
 AH , HE commensurabilis est [prop. XV]. supposui-
 mus autem, etiam AE , AB commensurabiles esse.
 quare etiam AH , HE rectae AB commensurabiles
 sunt [prop. XII]. et AB rationalis est. itaque etiam
 utraque AH , HE rationalis est. quare etiam $A\Theta$,
 HK rationalia sunt [prop. XIX], et $A\Theta$, HK commen-
 surabilia. uerum $A\Theta = \Sigma N$, $HK = N\Pi$. itaque etiam
 ΣN , $N\Pi$, hoc est MN^2 , $N\Xi^2$, rationalia sunt et
 commensurabilia. et quoniam AE , EA longitudine in-
 commensurabiles sunt, et AE , AH commensurabiles,
 et AE , EZ commensurabiles, AH et EZ incom-
 mensurabiles sunt [prop. XIII]. quare etiam $A\Theta$ et
 EA incommensurabilia sunt [VI, 1; prop. XI]. uerum
 $A\Theta = \Sigma N$, $EA = MP$. quare etiam ΣN , MP in-
 commensurabilia sunt. est autem $\Sigma N : MP = ON : NP$
 [VI, 1]. itaque ON , NP incommensurabiles sunt

1) Nam $EA = Z\Gamma$.

15. ΣN] corr. ex EN B, item lin. 16. 15. $\xi\sigma\tau\iota\nu \iota\sigma\sigma\upsilon\nu$ V.
 $\xi\sigma\tau\iota$ PBb, comp. F. 16. $\tau\acute{\alpha}$] $\tau\acute{o}$ F. $N\Pi \acute{\alpha}\rho\alpha$] $\tau\tilde{\omega}$ $N\Pi$ F.
 17. $\alpha\sigma\upsilon\mu\mu\epsilon\tau\rho\alpha$ B. 18. $\acute{\alpha}\lambda\lambda\acute{\alpha}$ Bb. 19. AH] corr. ex
 AB V. EZ] $EZ \xi\sigma\tau\iota$ V. 20. $\kappa\alpha\iota$] $\xi\sigma\tau\iota\nu$ V. Post EZ
 add. $\mu\eta\kappa\epsilon\iota$ Vb, m. 2 B. 21. $\xi\sigma\tau\iota\nu$] om. Bb. 22. ΣN]
 $N\Sigma'$ F.

πρὸς MP , ἢ ON πρὸς τὴν NP ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἢ ON τῇ NP . ἴση δὲ ἢ μὲν ON τῇ MN , ἢ δὲ NP τῇ $NΞ$ · ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἢ MN τῇ $NΞ$. καὶ ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς MN σύμμετρον τῷ ἀπὸ τῆς $NΞ$, καὶ
 5 ῥητὸν ἐκάτερον· αἱ MN , $NΞ$ ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι.

Ἡ $MΞ$ ἄρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ καὶ δύνатаι τὸ $ΑΓ$ · ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

νέ'.

- 10 Ἐὰν χωρίον περιέχῃται ὑπὸ ῥητῆς καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων δευτέρας, ἢ τὸ χωρίον δυναμένη ἄλογός ἐστιν ἢ καλουμένη ἐκ δύο μέσων πρώτη.

Περιεχέσθω γὰρ χωρίον τὸ $ΑΒΓΔ$ ὑπὸ ῥητῆς
 15 τῆς $ΑΒ$ καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων δευτέρας τῆς $ΑΔ$ · λέγω, ὅτι ἢ τὸ $ΑΓ$ χωρίον δυναμένη ἐκ δύο μέσων πρώτη ἐστίν.

Ἐπεὶ γὰρ ἐκ δύο ὀνομάτων δευτέρα ἐστὶν ἢ $ΑΔ$, διηρήσθω εἰς τὰ ὀνόματα κατὰ τὸ E , ὥστε τὸ μείζον
 20 ὄνομα εἶναι τὸ $ΑΕ$ · αἱ $ΑΕ$, $EΔ$ ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ ἢ $ΑΕ$ τῆς $EΔ$ μείζον δύνάται τῷ ἀπὸ συμέτρου ἐαυτῇ, καὶ τὸ ἑλαττον ὄνομα ἢ $EΔ$ σύμμετρόν ἐστι τῇ $ΑΒ$ μήκει. τετμήσθω ἢ $EΔ$ δίχα κατὰ τὸ Z , καὶ τῷ ἀπὸ τῆς EZ ἴσον παρὰ τὴν
 25 $ΑΕ$ παραβεβλήσθω ἐλλείπον εἰδει τετραγώνῳ τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΗΕ$ · σύμμετρος ἄρα ἢ $ΑΗ$ τῇ $ΗΕ$ μήκει. καὶ

1. τὸ MP V. οὕτως ἢ V. τήν] om. Bf. b. MP F. ἐστὶν ἄρα F. 2. PN P. NM P. 4. τῆς] (prius) om. Fb, m. 2 B. $NΞ$] $MΞ$ F. 5. εἰσιν B. 6. μονονον P. 7. ἐκ] ἢ ἐκ P b. 12. ἐκ] ἢ ἐκ b. 14. Post γὰρ del. τό B. 18. γὰρ] om. Fb, m. 2 B. 20. $ΑΕ$] (alt.) $ΕΑ$ P, corr. in $Δ$

[prop. XI]. uerum $ON = MN$, $NP = NΞ$. quare MN , $NΞ$ incommensurabiles sunt. et MN^2 , $NΞ^2$ commensurabilia sunt, et utrumque rationale. MN , $NΞ$ igitur rationales sunt potentia tantum commensurabiles.

Ergo $MΞ$ ex duobus nominibus est [prop. XXXVI], et $MΞ^2 = AΓ$; quod erat demonstrandum.

LV.

Si spatium recta rationali et recta ex duobus nominibus secunda comprehenditur, recta spatio aequalis quadrata irrationalis est ex duobus mediis prima, quae uocatur.


Spatium enim $ABΓΔ$ rationali AB et recta ex duobus nominibus secunda $ΔΔ$ comprehendatur. dico, rectam spatio $AΓ$ aequalem quadratam ex duobus mediis primam esse.

nam quoniam $ΔΔ$ ex duobus nominibus secunda est, in E in nomina diuidatur ita, ut AE maius nomen sit. itaque AE , $EΔ$ rationales sunt potentia tantum commensurabiles, et AE^2 excedit $EΔ^2$ quadrato rectae sibi commensurabilis, et minus nomen $EΔ$ rectae AB longitudine commensurabile est [def. alt. 2]. iam $EΔ$ in Z in duas partes aequales secetur, et quadrato EZ^2 aequale rectae AE adplicetur $AH \times HE$ figura quadrata deficiens. itaque AH , HE longitudine commensurabiles sunt [prop. XVII]. et per H , E , Z rectis AB , $ΓΔ$ parallelae ducantur $HΘ$, EK , $ZΛ$, et paral-

m. rec. $εἰσιν$ PB. 21. $τῆς EΔ$] mg. m. 1 P. 22. $ἐλασσον$
P, comp. F. 23. AB] A ins. m. 1 F. 24. $τῶ$] corr. ex
 $τὸ$ m. 1 F. 25. $τῶ$] $τῶ$ V. 26. AH , HE V e corr.

διὰ τῶν H, E, Z παράλληλοι ἤχθωσαν ταῖς $AB, ΓΔ$
 αἱ $HΘ, EK, ZΑ$, καὶ τῷ μὲν $AΘ$ παραλληλογράμμῳ
 ἴσον τετράγωνον συνεστιάτω τὸ $ΣΝ$, τῷ δὲ $ΗΚ$ ἴσον
 τετράγωνον τὸ $ΝΠ$, καὶ κείσθω ὥστε ἐπ' εὐθείας εἶναι
 5 τὴν MN τῇ $NΞ$. ἐπ' εὐθείας ἄρα [ἐστὶ] καὶ ἡ PN
 τῇ NO . καὶ συμπεπληρώσθω τὸ $ΣΠ$ τετράγωνον·
 φανερόν δὴ ἐκ τοῦ προδεδειγμένου, ὅτι τὸ MP μέσον
 ἀνάλογόν ἐστι τῶν $ΣΝ, ΝΠ$, καὶ ἴσον τῷ $ΕΔ$, καὶ
 10 ὅτι τὸ $ΑΓ$ χωρίον δύναται ἡ $MΞ$. δεικτέον δὴ, ὅτι
 ἡ $MΞ$ ἐκ δύο μέσων ἐστὶ πρώτη. ἐπεὶ ἀσύμμετρος
 ἐστὶν ἡ $ΑΕ$ τῇ $ΕΔ$ μήκει, σύμμετρος δὲ ἡ $ΕΔ$ τῇ
 AB , ἀσύμμετρος ἄρα ἡ $ΑΕ$ τῇ AB . καὶ ἐπεὶ σύμμε-
 τρός ἐστιν ἡ $ΑΗ$ τῇ $ΕΗ$, σύμμετρός ἐστι καὶ ἡ $ΑΕ$
 ἐκατέρᾳ τῶν $ΑΗ, ΗΕ$. ἀλλὰ ἡ $ΑΕ$ ἀσύμμετρος τῇ
 15 AB μήκει· καὶ αἱ $ΑΗ, ΗΕ$ ἄρα ἀσύμμετροί εἰσι τῇ
 AB . αἱ $ΒΑ, ΑΗ, ΗΕ$ ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον
 σύμμετροι· ὥστε μέσον ἐστὶν ἐκάτερον τῶν $AΘ, ΗΚ$.
 ὥστε καὶ ἐκάτερον τῶν $ΣΝ, ΝΠ$ μέσον ἐστίν. καὶ
 αἱ $MN, NΞ$ ἄρα μέσαι εἰσίν. καὶ ἐπεὶ σύμμετρος ἡ
 20 $ΑΗ$ τῇ $ΗΕ$ μήκει, σύμμετρόν ἐστι καὶ τὸ $AΘ$ τῷ $ΗΚ$,
 τουτέστι τὸ $ΣΝ$ τῷ $ΝΠ$, τουτέστι τὸ ἀπὸ τῆς MN

1. $ΓΔ$] $ΒΓ, ΓΔ$ P, corr. m. 1; $ΑΓ$ Bb. 2. $ZΔ$] mut. in AZ V, AZ Fb. 3. Post τετράγωνον del. τὸ $ΝΠ$ m. 1 P. $ΕΝΒ$ P, sed corr. 5. $NΞ$] mut. in NZ V. ἐστὶ] om. P, ἐστίν B. 8. $ΝΠ$] $ΠΝ$ F et in ras. V. 9. $MΞ$] $MN, NΞ$ corr. ex $MNΞ$ V; mg. m. 1 γρ. $MN, NΞ$ b. δὲ V. 10. μέσον F, corr. m. 1. ἐπεὶ γάρ F. 12. ἄρα] ἄρα καὶ V, ἄρα ἐστίν F. Post AB add. μήκει V, m. 2 B. ἐπεὶ] om. P. 13. $ΕΗ$] $ΗΕ$ F. ἐστίν B. 14. ἀλλὰ — 15. καὶ] καὶ ἐστι (ἐστίν B) ῥητὴ ἡ $ΑΕ$. ῥητὴ ἄρα καὶ ἐκατέρᾳ τῶν $ΑΗ (ΑΕ F), ΗΕ$. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρός ἐστίν ἡ $ΑΕ$ τῇ AB , σύμμετρος δὲ ἡ $ΑΕ$ ἐκατέρᾳ τῶν $ΑΗ, ΗΕ$, καὶ (om. B) Theon ($BFVb$). 15. ἄρα] m. 2 F. σύμμετροι BF , sed corr. εἰσίν PB . 16. Post AB add. μήκει m. 2 B. $ΒΑ$] om. P. εἰσίν B. 18. ἐστὶ PV , comp. Fb. 19. εἰσὶ V, comp. Fb. Ante ἡ add.



lelogrammo $A\Theta$ aequale construatur quadratum ΣN , parallelogrammo HK autem $N\Pi$, et ponantur ita, ut MN , $N\Xi$ in eadem recta sint; itaque etiam PN , NO in eadem sunt recta. expleatur quadratum $\Sigma\Pi$. tum ex iis, quae antea demonstrata sunt [prop. LIII lemma], adparet,

MP medium esse proportionale inter ΣN , $N\Pi$ et $= EA$ [p. 162, 1], et esse $M\Xi^2 = A\Gamma$ [p. 162, 5]. iam demonstrandum est, $M\Xi$ ex duabus mediis primam esse. quoniam AE , $E\Delta$ longitudine incommensurabiles sunt, et $E\Delta$, AB commensurabiles, AE , AB incommensurabiles erunt [prop. XIII]. et quoniam AH , EH commensurabiles sunt, etiam AE utrique AH , HE commensurabilis est [prop. XV]. uerum AE , AB longitudine incommensurabiles sunt. quare etiam AH , HE rectae AB incommensurabiles sunt [prop. XIII]. itaque BA et AH , HE rationales sunt potentia tantum commensurabiles. quare utrumque $A\Theta$, HK medium est [prop. XXI]. quare etiam utrumque ΣN , $N\Pi$ medium est. itaque etiam MN , $N\Xi$ mediae sunt. et quoniam AH , HE longitudine commensurabiles sunt, etiam $A\Theta$, HK , hoc est ΣN , $N\Pi$ siue MN^2 , $N\Xi^2$ commensurabilia sunt [VI, 1; prop. XI]. et quoniam AE , $E\Delta$ longitudine incommensurabiles sunt, et AE , AH commensurabiles, et $E\Delta$, EZ com-

ἰστυν BVb, m. 2 F. 20. καὶ τὸ $A\Theta$] eras. V. τῶ] τῇ P.
MK F, corr. m. 2.

- τῷ ἀπο τῆς $NΞ$ [ὥστε δυνάμει εἰσὶ σύμμετροι αἱ MN , $NΞ$]. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ $ΑΕ$ τῇ $ΕΔ$ μήκει, ἀλλ' ἡ μὲν $ΑΕ$ σύμμετρός ἐστι τῇ $ΑΗ$, ἡ δὲ $ΕΔ$ τῇ $ΕΖ$ σύμμετρος, ἀσύμμετρος ἄρα ἡ $ΑΗ$ τῇ $ΕΖ$. ὥστε
 5 καὶ τὸ $ΑΘ$ τῷ $ΕΑ$ ἀσύμμετρόν ἐστιν, τουτέστι τὸ $ΣΝ$ τῷ $ΜΡ$, τουτέστιν ἡ $ΟΝ$ τῇ $ΝΡ$, τουτέστιν ἡ $ΜΝ$ τῇ $ΝΞ$ ἀσύμμετρός ἐστι μήκει. ἐδείχθησαν δὲ αἱ MN , $NΞ$ καὶ μέσαι οὐσαι καὶ δυνάμει σύμμετροι· αἱ MN , $NΞ$ ἄρα μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι. λέγω
 10 δὴ, ὅτι καὶ ῥητὸν περιέχουσιν. ἐπεὶ γὰρ ἡ $ΔΕ$ ὑποκεῖται ἑκατέρᾳ τῶν $ΑΒ$, $ΕΖ$ σύμμετρος, σύμμετρος ἄρα καὶ ἡ $ΕΖ$ τῇ $ΕΚ$. καὶ ῥητὴ ἑκατέρα αὐτῶν· ῥητὸν ἄρα τὸ $ΕΑ$, τουτέστι τὸ $ΜΡ$. τὸ δὲ $ΜΡ$ ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν $MNΞ$. ἐὰν δὲ δύο μέσαι δυνάμει μόνον
 15 σύμμετροι συντεθῶσι ῥητὸν περιέχουσαι, ἡ ὅλη ἄλογός ἐστιν, καλεῖται δὲ ἐκ δύο μέσων πρώτη.

Ἡ ἄρα $ΜΞ$ ἐκ δύο μέσων ἐστὶ πρώτη· ὅπερ εἶδει δεῖξαι.

νς'.

- 20 Ἐὰν χωρίον περιέχεται ὑπὸ ῥητῆς καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων τρίτης, ἡ τὸ χωρίον δυναμένη ἄλογός ἐστιν ἡ καλουμένη ἐκ δύο μέσων δευτέρα.

- Χωρίον γὰρ τὸ $ΑΒΓΔ$ περιεχέσθω ὑπὸ ῥητῆς τῆς
 25 $ΑΒ$ καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων τρίτης τῆς $ΑΔ$ διηρημένης εἰς τὰ ὀνόματα κατὰ τὸ $Ε$, ὃν μειζὸν ἐστὶ τὸ

1. ὥστε — 2. $NΞ$] om. P. ὥστε καὶ F, sed corr. 3. ἀλλὰ V. 4. σύμμετρος] om. FVb. ἀσύμμετρος] corr. ex σύμμετρος m. 2 F. 5. ἀσύμμετρος F, corr. m. 2. ἐστὶ BV, comp. Fb. $ΣΝ$] corr. ex $ΕΝ$ B. 6. $ΝΡ$] in ras. V. 7. ἐστὶν P. 8. δυνάμει μόνον V. αἱ — 9. σύμμετροι] mg. m. 2 V. 9. εἰσὶν B. 10. $ΔΕ$] in ras. V. 11. $ΑΒ$] corr.

mensurabiles, AH et EZ incommensurabiles sunt [prop. XIII]. quare $A\Theta$, EA , hoc est EN , MP , incommensurabilia sunt, siue ON , NP , hoc est MN , $N\Xi$, longitudine incommensurabiles [VI, 1; prop. XI]. demonstrauimus autem, MN , $N\Xi$ et medias esse et potentia commensurabiles. itaque MN , $N\Xi$ mediae sunt potentia tantum commensurabiles. iam dico, easdem spatium rationale comprehendere. nam quoniam supposuimus, AE utrique AB , EZ commensurabilem esse, etiam EZ , EK commensurabiles sunt. et utraque rationalis est. quare EA , hoc est MP , rationale est [prop. XIX]. uerum $MP = MN \times N\Xi$. sin duae mediae potentia tantum commensurabiles componuntur spatium rationale comprehendentes, tota irrationalis est, uocatur autem ex duabus mediis prima [prop. XXXVII].

Ergo $M\Xi$ ex duabus mediis prima est; quod erat demonstrandum.

LVI.

Si spatium recta rationali et recta ex duobus nominibus tertia comprehenditur, recta spatio aequalis quadrata irrationalis est ex duabus mediis secunda, quae uocatur.

Spatium enim $AB\Gamma A$ comprehendatur rationali AB et recta ex duobus nominibus tertia AA in nomina in E diuisa, quorum maius est AE . dico, rectam

ex EB m. rec. F. EZ] in ras. V. $\sigma\acute{\upsilon}\mu\mu\epsilon\tau\rho\omicron\varsigma$] om. F. 12. $\acute{\alpha}\rho\alpha$ $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ P. EZ] mut. in ZE V, ZE P. 13. $\tau\omicron\upsilon\tau\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\upsilon$ P.
 14. MN , $N\Xi$ V. $\mu\acute{o}\nu\omicron\nu$] om. BFV. 15. $\sigma\upsilon\nu\tau\epsilon\delta\acute{\omega}\sigma\iota\nu$
 P B. η] m. 2 F. 16. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ V, comp. Fb. 17. $M\Xi$] MHZ ,
 del. Z, F. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$] m. 2 F. 24. $\delta\eta\tau\eta\varsigma$] supra scr. F. 25.
 $\tau\epsilon\lambda\epsilon\tau\eta\varsigma$] supra scr. F. 26. $\acute{\omega}\nu$] $\acute{\omega}\nu$ τό P. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\omega$ BFb.

AE · λέγω, ὅτι ἡ τὸ AG χωρίον δυναμένη ἄλογός ἐστιν ἡ καλουμένη ἐκ δύο μέσων δευτέρα.

Κατεσκευάσθω γὰρ τὰ ἀντὰ τοῖς πρότερον. καὶ ἐπεὶ ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ τρίτη ἡ AD , αἱ AE , ED
 5 ἄρα ρηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ ἡ AB τῆς ED μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ, καὶ οὐδετέρα τῶν AE , ED σύμμετρός [ἐστὶ] τῇ AB μήκει. ὁμοίως δὲ τοῖς προδεδειγμένοις δείξομεν, ὅτι ἡ $MΞ$ ἐστὶν ἡ τὸ AG χωρίον δυναμένη, καὶ αἱ MN , $NΞ$
 10 μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι· ὥστε ἡ $MΞ$ ἐκ δύο μέσων ἐστίν.

Δεικτέον δὲ, ὅτι καὶ δευτέρα.


[Καὶ] ἐπεὶ ἀσύμμετρός ἐστὶν ἡ AE τῇ AB μήκει, τουτέστι τῇ EK , σύμμετρος δὲ ἡ AE τῇ EZ , ἀσύμ-
 15 μετρος ἄρα ἐστὶν ἡ EZ τῇ EK μήκει. καὶ εἰσι ρηταὶ αἱ ZE , EK ἄρα ρηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι. μέσον ἄρα [ἐστὶ] τὸ EA , τουτέστι τὸ MP · καὶ περιέχεται ὑπὸ τῶν $MNΞ$ · μέσον ἄρα ἐστὶ τὸ ὑπο τῶν $MNΞ$.

20 Ἡ $MΞ$ ἄρα ἐκ δύο μέσων ἐστὶ δευτέρα· ὅπερ ἔδει δείξαι.

1. ἡ] supra scr. m. 1 b. 3. κατασκευάσθω Vb. γάρ] δέ V. 5. εἰσὶν P. Post AE del. ED ἄρα ρηταὶ εἰσὶν m. 1 P. 7. ἐστὶ] om. P. 8. τοῖς πρότερον δεδειγμένοις Theon (BFVb). ἡ] m. rec. P. 9. ἡ] postea ins. F. καὶ ὅτι αἱ BFV. 10. εἰσὶν B. $MΞ$] MZ FV. 11. ἐστὶ BV, comp. Fb. 12. καὶ] m. 2 BF, om. Vb. ἐπεὶ οὖν V. 13. EZ] ZE P. EK] EH P. 14. εἰσὶν PB. 15. ἐστὶ] om. BFVb. τουτέστιν P. 16. MN , $NΞ$ b. μέσον — 17. $MNΞ$] mg. m. 2 F. 18. $MΞ$] MN , add. $Ξ$ m. 2 B; $MNΞ$ FVb. ἄρα] supra scr. m. 1 F. ἐστὶ] om. P. ὅπερ ἔδει δείξαι] om. BFVb.

spatio AG aequalem quadratam irrationalem esse ex duabus mediis secundam, quae uocatur.

Comparentur enim eadem, quae antea. et quoniam AA ex duobus nominibus tertia est, AE , EA



rationales sunt potentia tantum commensurabiles, et AE^2 excedit EA^2 quadrato rectae sibi commensurabilis, et neutra rectarum AE , EA rectae AB longitudine commensurabilis est [def. alt. 3]. iam eodem modo quo antea demonstrabimus, esse

$$MΞ^2 = AG$$

[cfr. p. 162, 5], et MN , $NΞ$ medias esse potentia tantum commensurabiles [cfr. p. 166, 10 sq.]. quare $MΞ$ ex duabus mediis est.

iam demonstrandum est, eandem secundam esse. quoniam AE , AB , hoc est AE , EK , longitudine incommensurabiles sunt, et AE , EZ commensurabiles, EZ et EK longitudine incommensurabiles sunt [prop. XIII]. et rationales sunt; itaque ZE , EK rationales sunt potentia tantum commensurabiles. quare EA , hoc est MP , medium est [prop. XXI]. et rectis MN , $NΞ$ comprehenditur. itaque $MN \times NΞ$ medium est.

Ergo $MΞ$ ex duabus mediis secunda est [prop. XXXVIII]; quod erat demonstrandum.

νζ'.

Ἐὰν χωρίον περιέχῃται ὑπὸ ρητῆς καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων τετάρτης, ἢ τὸ χωρίον δυναμένη ἄλογός ἐστιν ἢ καλουμένη μείζων.

- 5 Χωρίον γὰρ τὸ $ΑΓ$ περιεχέσθω ὑπὸ ρητῆς τῆς $ΑΒ$ καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων τετάρτης τῆς $ΑΔ$ διηρημένης εἰς τὰ ὀνόματα κατὰ τὸ $Ε$, ὧν μείζον ἔστω τὸ $ΑΕ$. λέγω, ὅτι ἢ τὸ $ΑΓ$ χωρίον δυναμένη ἄλογός ἐστιν ἢ καλουμένη μείζων.
- 10 Ἐπεὶ γὰρ ἡ $ΑΔ$ ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ τετάρτη, αἱ $ΑΕ$, $ΕΔ$ ἄρα ρηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ ἡ $ΑΕ$ τῆς $ΕΔ$ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσύμμετρου ἑαυτῇ, καὶ ἡ $ΑΕ$ τῇ $ΑΒ$ σύμμετρός [ἐστὶ] μήκει. τετμησθῶ ἡ $ΔΕ$ δίχα κατὰ τὸ $Ζ$, καὶ τῷ ἀπὸ τῆς $ΕΖ$
- 15 ἴσον παρὰ τὴν $ΑΕ$ παραβελήσθω παραλληλόγραμμον τὸ ὑπὸ $ΑΗ$, $ΗΕ$. ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ $ΑΗ$ τῇ $ΗΕ$ μήκει. ἤχθωσαν παράλληλοι τῇ $ΑΒ$ αἱ $ΗΘ$, $ΕΚ$, $ΖΛ$, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ αὐτὰ τοῖς πρὸ τούτου γερονέτω· φανερόν δὴ, ὅτι ἢ τὸ $ΑΓ$ χωρίον δυναμένη ἐστὶν ἢ
- 20 $ΜΞ$. δεικτέον δὴ, ὅτι ἡ $ΜΞ$ ἄλογός ἐστιν ἢ καλουμένη μείζων. ἐπεὶ ἀσύμμετρός ἐστὶν ἡ $ΑΗ$ τῇ $ΕΗ$ μήκει, ἀσύμμετρόν ἐστι καὶ τὸ $ΑΘ$ τῷ $ΗΚ$, τουτέστι τὸ $ΣΝ$ τῷ $ΝΠ$. αἱ $ΜΝ$, $ΝΞ$ ἄρα δυνάμει εἰσὶν


2. περιέχεται P. 4. μείζων V, sed corr. 8. ἢ] om. Fb.
 $ΑΕ$ P. χωρίον ἢ Fb. 10. ἐστὶν P. 11. εἰσιν P. 12.
 τῆς] τῇ b. τῷ] corr. ex τό V. συμμέτρον, ἀ- add. m. 2,
 BFb. 13. ἐστὶ] om. P. 15. $ΑΕ$] supra $Α$ scr. $Δ$ b, $Ε$ in
 ras. V. 16. ὑπὸ τῶν V. $ΑΗ$] corr. ex $ΑΕ$ m. 1 F. 17.
 $ΕΗ$ V. 18. $ΖΛ$] in ras., seq. ras. 3 litt. V, $Ζ$ in ras. m. 1 B.
 λοιπὰ] supra scr. V. τὰ] om. FV. αὐτὰ] om. F. 21.
 σύμμετρος F, corr. m. 2. ἐστὶν] om. B. 22. τουτέστιτεστι P,
 corr. m. 1. 23. τῷ] corr. ex τό FV. ἄρα] om. b. εἰσὶν
 σύμμετροι V, corr. m. 2.

LVII.

Si spatium recta rationali et recta ex duobus nominibus quarta comprehenditur, recta spatio aequalis quadrata irrationalis est maior, quae uocatur.

Spatium enim AF rationali AB comprehendatur et AD recta ex duobus nominibus quarta in E in nomina diuisa, quorum maius sit AE . dico, rectam spatio AF aequalem quadratam irrationalem esse maiorem, quae uocatur.

nam quoniam AD ex duobus nominibus quarta est, AE , ED rationales sunt potentia tantum commensurabiles, et AE^2 excedit ED^2



quadrato rectae sibi incommensurabilis, et AE , AB longitudine commensurabiles sunt [deff. alt. 4]. secetur DE in Z in duas partes aequales, et quadrato EZ^2 aequale rectae AE adplicetur parallelogrammum

$$AH \times HE.$$

itaque AH , HE longitudine incommensurabiles sunt [prop. XVIII]. rectae AB parallelae ducantur $H\Theta$, EK , ZA , et reliqua eodem modo, quo antea [p. 166, 1 sq.], fiant. manifestum igitur est, esse $M\Xi^2 = AF$. iam demonstrandum, $M\Xi$ irrationalem esse maiorem, quae uocatur. quoniam AH , EH longitudine incommensurabiles sunt, etiam $A\Theta$, HK , hoc est ΣN , $N\Pi$, incommensurabilia sunt [VI, 1; prop. XI]. itaque MN , $N\Xi$ potentia incommensurabiles sunt. et quoniam AE , AB longitudine commensurabiles sunt, AK rationale est [prop.

ἀσύμμετροι. καὶ ἐπεὶ σύμμετρός ἐστιν ἡ AE τῇ AB
 μήκει, φητόν ἐστι τὸ AK · καὶ ἐστὶν ἴσον τοῖς ἀπὸ
 τῶν MN , $NΞ$ · φητόν ἄρα [ἐστὶ] καὶ τὸ συγκείμενον
 ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν MN , $NΞ$. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρός
 5 [ἐστὶν] ἡ AE τῇ AB μήκει, τουτέστι τῇ EK , ἀλλὰ
 ἡ AE σύμμετρός ἐστι τῇ EZ , ἀσύμμετρος ἄρα ἡ EZ
 τῇ EK μήκει. αὖ EK , EZ ἄρα φηταί εἰσι δυνάμει
 μόνον σύμμετροι· μέσον ἄρα τὸ AE , τουτέστι τὸ MP .
 καὶ περιέχεται ὑπὸ τῶν MN , $NΞ$ · μέσον ἄρα ἐστὶ
 10 τὸ ὑπὸ τῶν MN , $NΞ$. καὶ φητόν τὸ [συγκείμενον]
 ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν MN , $NΞ$, καὶ εἰσιν ἀσύμμετροι αἱ
 MN , $NΞ$ δυνάμει. ἐὰν δὲ δύο εὐθεῖαι δυνάμει ἀσύμ-
 μετροὶ συντεθῶσι ποιῶσαι τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν
 ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων φητόν, τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν μέσον,
 15 ἡ ὅλη ἄλογός ἐστιν, καλεῖται δὲ μεῖζων.
 Ἡ $MΞ$ ἄρα ἄλογός ἐστιν ἡ καλουμένη μεῖζων,
 καὶ δύναται τὸ AG χωρίον· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

νή'.

Ἐὰν χωρίον περιέχεται ὑπὸ φητῆς καὶ τῆς
 20 ἐκ δύο ὀνομάτων πέμπτης, ἡ τὸ χωρίον δυνα-
 μένη ἄλογός ἐστιν ἡ καλουμένη φητόν καὶ μέ-
 σον δυναμένη.

Χωρίον γὰρ τὸ AG περιεχέσθω ὑπὸ φητῆς τῆς
 AB καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων πέμπτης τῆς AA διη-
 25 ρημένης εἰς τὰ ὀνόματα κατὰ τὸ E , ὥστε τὸ μεῖζον
 ὄνομα εἶναι τὸ AE · λέγω [δὴ], ὅτι ἡ τὸ AG χωρίον

1. EAP . 2. ἐστὶ] ἐστὶν P, dein del. ἡ AE τῇ AB m. 1. τὸ]
 e corr. m. 1 V. 3. MN] NM P. ἐστὶ] om. B F V b. καὶ]
 om. b. 5. ἐστὶν] om. P. τουτέστιν P. ἀλλ' F. 6.
 ἐστὶν P. τῇ] τῆς P. 7. εἰσιν P. 8. τουτέστιν b. τὸ]
 corr. ex τῷ m. 1 F. 9. μέσον — 10. $NΞ$] mg. m. 1 P. 10.

XIX]. et $AK = MN^2 + N\mathfrak{E}^2$. quare etiam $MN^2 + N\mathfrak{E}^2$ rationale est. et quoniam $\angle E$, AB , hoc est $\angle E$, EK , longitudine incommensurabiles sunt [prop. XIII], et $\angle E$, EZ commensurabiles, EZ , EK longitudine incommensurabiles sunt [prop. XIII]. itaque EK , EZ rationales sunt potentia tantum commensurabiles. quare $\angle E$, hoc est MP , medium est [prop. XXI]. et rectis MN , $N\mathfrak{E}$ comprehenditur. itaque $MN \times N\mathfrak{E}$ medium est. et $MN^2 + N\mathfrak{E}^2$ rationale est, et MN , $N\mathfrak{E}$ potentia incommensurabiles sunt. sin duae rectae potentia incommensurabiles componuntur efficientes summam quadratorum suorum rationalem, rectangulum autem medium, tota irrationalis est, uocatur autem maior [prop. XXXIX].

Ergo $M\mathfrak{E}$ irrationalis est maior, quae uocatur, et $M\mathfrak{E}^2 = A\Gamma$; quod erat demonstrandum.

LVIII.

Si spatium recta rationali et recta ex duobus nominibus quinta comprehenditur, recta spatio aequalis quadrata irrationalis est spatio rationali et medio aequalis quadrata, quae uocatur.

Spatium enim $A\Gamma$ comprehendatur rationali AB et AA recta ex duobus nominibus quinta in E in nomina diuisa, ita ut AE maius nomen sit. dico, rectam spatio $A\Gamma$ aequalem quadratam irrationalem esse

ὑπό] συγκείμενον ἐκ V. συγκείμενον] om. P. 11. ἐκ τῶν] supra scr. F. καὶ ἐστὶν ἀσύμμετρος ἡ MN τῇ N\mathfrak{E} Theon (BFVb). 13. συντεθῶσιν PB. 14. δέ comp. F. 15. ἐστὶ BV, comp. Fb. 19. καὶ τῇς] bis b. 26. δῆ] om. P. ἡ] supra scr. m. 1 P.


δυναμένη ἄλογός ἐστιν ἢ καλουμένη ῥητὸν καὶ μέσον δυναμένη.

Κατεσκευάσθω γὰρ τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον δεδειγμένοις· φανερόν δὴ, ὅτι ἢ τὸ $ΑΓ$ χωρίον δυναμένη ἐστὶν
 5 ἢ $ΜΞ$. δεικτέον δὴ, ὅτι ἢ $ΜΞ$ ἐστὶν ἢ ῥητὸν καὶ μέσον δυναμένη. ἐπεὶ γὰρ ἀσύμμετρός ἐστιν ἢ $ΑΗ$ τῇ $ΗΕ$, ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ $ΑΘ$ τῷ $ΘΕ$, τουτέστι τὸ ἀπὸ τῆς $ΜΝ$ τῷ ἀπὸ τῆς $ΝΞ$. αἱ $ΜΝ$, $ΝΞ$ ἄρα δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι. καὶ ἐπεὶ ἢ $ΑΔ$ ἐκ
 10 δύο ὀνομάτων ἐστὶ πέμπτη, καὶ [ἐστὶν] ἔλασσον αὐτῆς τμήμα τὸ $ΕΔ$, σύμμετρος ἄρα ἢ $ΕΔ$ τῇ $ΑΒ$ μήκει. ἀλλὰ ἢ $ΑΕ$ τῇ $ΕΔ$ ἐστὶν ἀσύμμετρος· καὶ ἢ $ΑΒ$ ἄρα τῇ $ΑΕ$ ἐστὶν ἀσύμμετρος μήκει [αἱ $ΒΑ$, $ΑΕ$ ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι]· μέσον ἄρα ἐστὶ
 15 τὸ $ΑΚ$, τουτέστι τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $ΜΝ$, $ΝΞ$. καὶ ἐπεὶ σύμμετρός ἐστιν ἢ $ΔΕ$ τῇ $ΑΒ$ μήκει, τουτέστι τῇ $ΕΚ$, ἀλλὰ ἢ $ΔΕ$ τῇ $ΕΖ$ σύμμετρός ἐστιν, καὶ ἢ $ΕΖ$ ἄρα τῇ $ΕΚ$ σύμμετρός ἐστιν. καὶ ῥητὴ ἢ $ΕΚ$ · ῥητὸν ἄρα καὶ τὸ $ΕΑ$, τουτέστι τὸ $ΜΡ$, τουτέστι
 20 ἐστὶ τὸ ὑπὸ $ΜΝΞ$. αἱ $ΜΝ$, $ΝΞ$ ἄρα δυνάμει ἀσύμμετροί εἰσι ποιοῦσαι τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων μέσον, τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν ῥητόν.

3. κατασκευάσθω V, sed corr. γάρ] οὖν V. τοῖς προ-
 δεδειγμένοις Theon (BFVb). 5. δέ F. 7. $ΗΕ$] corr. ex
 $ΕΗ$ V. ἐστὶν PB. 8. τῆς $ΝΞ$] τῶν $ΝΞ$ P. 9. σύμ-
 μετροι V, corr. m. 2. $ΑΔ$] $Δ$ e corr. V. 10. ἐστὶν] om. P.
 12. ἀλλ' F. 13. $ΒΑ$] mut. in $ΑΒ$ m. 2 V, $ΑΒ$ F. 14.
 εἰσιν B. 16. ἀσύμμετρος B, corr. m. 2. 17. ἀλλ' F. $ΔΕ$
 corr. ex $ΒΓ$, ut uidetur, V. ἐστὶ PBV, comp. Fb. 18.
 Ante σύμμετρος ras. 1 litt. V. καὶ ῥητῇ] ῥητὴ δέ BFVb.
 19. Post $ΕΚ$ add. ῥητὴ ἄρα καὶ ἢ $ΕΖ$ V. $ΕΔ$] supra add.
 $Δ$ m. 1 b. τουτέστιν P. τουτέστιν P. 20. ὑπὸ τῶν FV.
 $ΜΝ$, $ΝΞ$ B. 21. εἰσιν PB. 22. δέ F.

spatio rationali et medio aequalem quadratam, quae uocatur.

comparentur enim eadem, quae in superioribus demonstrationibus. manifestum igitur est, esse $M\Xi^2 = A\Gamma$



[p. 162, 1 sq.]. iam demonstrandum est, $M\Xi$ esse rectam spatio rationali et medio aequalem quadratam. nam quoniam AH , HE incommensurabiles sunt [prop. XVIII], $A\Theta$, ΘE , hoc est MN^2 , $N\Xi^2$, incommensurabilia sunt [VI, 1; prop. XI]. itaque MN , $N\Xi$ potentia

incommensurabiles sunt. et quoniam $A\Delta$ ex duobus nominibus est quinta, et minor pars eius est $E\Delta$, $E\Delta$ et AB longitudine commensurabiles sunt [def. alt. 5]. uerum AE , $E\Delta$ incommensurabiles sunt. quare etiam AB , AE longitudine incommensurabiles sunt [prop. XIII].¹⁾ itaque AK , hoc est $MN^2 + N\Xi^2$, medium est [prop. XXI]. et quoniam ΔE , AB , hoc est ΔE , EK , longitudine commensurabiles sunt, et ΔE , EZ commensurabiles, etiam EZ , EK commensurabiles sunt [prop. XII]. et EK rationalis est. itaque etiam $E\Delta$, hoc est MP siue $MN \times N\Xi$, rationale est [prop. XIX]. itaque MN , $N\Xi$ potentia incommensurabiles sunt summam quadratorum suorum mediam efficientes, rectangulum autem rationale.

1) Cum lin. 13 $\alpha\eta\alpha$, quod edd. post AE habent, in codd. omittatur, malui delere at BA — lin. 14 $\sigma\acute{\upsilon}\mu\mu\epsilon\tau\epsilon\omicron\iota$.

Ἡ ΜΞ ἄρα ῥητὸν καὶ μέσον δυναμένη ἐστὶ καὶ
δύναται τὸ ΑΓ χωρίον· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

νθ'.

Ἐὰν χωρίον περιέχεται ὑπὸ ῥητῆς καὶ τῆς
ἐκ δύο ὀνομάτων ἑκτης, ἡ τὸ χωρίον δυναμένη
ἄλογός ἐστιν ἢ καλουμένη δύο μέσα δυναμένη.

Χωρίον γὰρ τὸ ΑΒΓΔ περιεχέσθω ὑπὸ ῥητῆς τῆς
ΑΒ καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων ἑκτης τῆς ΑΔ διηρη-
μένης εἰς τὰ ὀνόματα κατὰ τὸ Ε, ὥστε τὸ μείζον
10 ὄνομα εἶναι τὸ ΑΕ· λέγω, ὅτι ἡ τὸ ΑΓ δυναμένη ἢ
δύο μέσα δυναμένη ἐστίν.

Κατεσκευάσθω [γὰρ] τὰ αὐτὰ τοῖς προοδευμένοις.
φανερὸν δὴ, ὅτι [ἡ] τὸ ΑΓ δυναμένη ἐστίν ἢ ΜΞ,
καὶ ὅτι ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ ΜΝ τῇ ΝΞ δυνάμει. καὶ
15 ἐπεὶ ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ ΕΑ τῇ ΑΒ μήκει, αἱ ΕΑ,
ΑΒ ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· μέσον
ἄρα ἐστὶ τὸ ΑΚ, τουτέστι τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ
τῶν ΜΝ, ΝΞ. πάλιν, ἐπεὶ ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ ΕΑ
τῇ ΑΒ μήκει, ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ ΖΕ τῇ ΕΚ·
20 αἱ ΖΕ, ΕΚ ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι·
μέσον ἄρα ἐστὶ τὸ ΕΑ, τουτέστι τὸ ΜΡ, τουτέστι τὸ
ὑπὸ τῶν ΜΝΞ. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρος ἡ ΑΕ τῇ ΕΖ,
καὶ τὸ ΑΚ τῷ ΕΑ ἀσύμμετρόν ἐστιν. ἀλλὰ τὸ μὲν

1. ἐστίν PB. 6. ἡ] postea ins. F. μέσας P, corr. m. 1.
7. ῥητῆς] om. F. 10. ἡ — δυναμένη] mg. m. 1 P. ἡ]
(alt.) ἄλογός ἐστιν ἢ καλουμένη Vb, e corr. F. 11. ἐστίν] del.
F, om. Vb. 12. κατεσκευάσθω V. γὰρ] om. P. 13. ἡ]
om. PF. 15. ΕΑ] ΑΕ FVb. ΕΑ] ΑΕ' F, in ras. V. 16.
εἰσιν B. 17. ἐστίν P. 'ἀπὸ τῶν' ἐκ τῶν F. 18. ΝΞ]
mut. in ΞΝ V. 19. Post ΑΒ add. τουτέστι τῇ ΕΚ V. ἐστίν B.
ΖΕ] ΕΖ P. 20. αἱ] καὶ αἱ BFb. εἰσιν P. 21. ΜΡ]
corr. ex ME m. rec. b. τουτέστιν P. 22. ἡ] ἐστίν ἢ FV.
23. ἀσύμμετρος F.

Ergo $MΞ$ recta spatio rationali et medio aequalis quadrata est [prop. XL], et $MΞ^2 = AΓ$; quod erat demonstrandum.

LIX.


Si spatium recta rationali et recta ex duobus nominibus sexta comprehenditur, recta spatio quadrata aequalis irrationalis est duobus spatiis mediis aequalis quadrata, quae uocatur.

Spatium enim $ABΓΔ$ comprehendatur recta rationali AB et recta ex duobus nominibus sexta $ΔΔ$ in E in nomina diuisa, ita ut maius nomen sit AE . dico, rectam spatio $AΓ$ aequalem quadratam rectam esse duobus spatiis mediis aequalem quadratam.

comparentur eadem, quae in superioribus demonstrationibus. manifestum est igitur, esse $MΞ^2 = AΓ$,

et MN , $NΞ$ potentia incommensurabiles esse [p. 176, 6 sq.]. et quoniam EA , AB longitudine incommensurabiles sunt [deff. alt. 6], EA et AB rationales sunt potentia tantum commensurabiles. itaque AK , hoc est $MN^2 + NΞ^2$, medium est [prop. XXI]. rursus quoniam

EA , AB longitudine incommensurabiles sunt [deff. alt. 6], ZE et EK incommensurabiles sunt [prop. XIII]. quare ZE , EK rationales sunt potentia tantum commensurabiles. itaque EA , hoc est MP siue $MN \times NΞ$, medium est [prop. XXI]. et quoniam AE , EZ incommensurabiles sunt, etiam AK , EA



AK ἐστὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπο τῶν MN , $NΞ$,
τὸ δὲ EA ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν $MNΞ$ · ἀσύμμετρον ἄρα
ἐστὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $MNΞ$ τῷ ὑπὸ
τῶν $MNΞ$. καὶ ἐστὶ μέσον ἐκάτερον αὐτῶν, καὶ αἱ
5 MN , $NΞ$ δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι.

Ἡ $MΞ$ ἄρα δύο μέσα δυναμένη ἐστὶ καὶ δύνатаι
τὸ $ΑΓ$ · ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

[Λήμμα.

Ἐὰν εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῇ εἰς ἄνισα, τὰ ἀπὸ τῶν
10 ἀνίσων τετράγωνα μείζονά ἐστὶ τοῦ δις ὑπὸ τῶν ἀνί-
σων περιεχομένου ὀρθογωνίου.

Ἔστω εὐθεῖα ἡ AB καὶ τετμήσθω εἰς ἄνισα
κατὰ τὸ Γ , καὶ ἔστω μείζων ἡ $ΑΓ$ · λέγω, ὅτι τὰ
ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, ΓB μείζονά ἐστὶ τοῦ δις ὑπὸ τῶν
15 $ΑΓ$, ΓB .

Τετμήσθω γὰρ ἡ AB δίχα κατὰ τὸ Δ . ἐπεὶ οὖν
εὐθεῖα γραμμὴ τέτμηται εἰς μὲν ἴσα κατὰ τὸ Δ , εἰς
δὲ ἄνισα κατὰ τὸ Γ , τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, ΓB μετὰ
τοῦ ἀπὸ $\Gamma\Delta$ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ $ΑΔ$ · ὥστε τὸ ὑπὸ
20 τῶν $ΑΓ$, ΓB ἑλαττόν ἐστὶ τοῦ ἀπὸ $ΑΔ$ · τὸ ἄρα δις
ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, ΓB ἑλαττον ἢ διπλάσιόν ἐστὶ τοῦ ἀπὸ
 $ΑΔ$. ἀλλὰ τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, ΓB διπλάσιά [ἐστὶ] τῶν
ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $\Delta\Gamma$ · τὰ ἄρα ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, ΓB μείζονά
ἐστὶ τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, ΓB · ὅπερ ἔδει δεῖξαι.]

ξ'.

25

Τὸ ἀπὸ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων παρὰ φητήν

2. ἐστὶ] m. 2 F. τῶν] om. BFb. 3. MN , $NΞ$ V. τῷ
τό FV. 4. MN , $NΞ$ m. 2 V. ἐστὶ P. μέσον] μὲν V.
6. δυνάμει V. 8. λήμμα] m. 2 P. 10. ἴσον V, sed corr.

incommensurabilia sunt [VI, 1; prop. XI]. uerum $AK = MN^2 + N\Xi^2$, $EA = MN \times N\Xi$. itaque $MN^2 + N\Xi^2$ et $MN \times N\Xi$ incommensurabilia sunt. et utrumque medium est, et MN , $N\Xi$ potentia incommensurabiles sunt.

Ergo $M\Xi$ recta est duobus spatiis mediis aequalis quadrata [prop. XLI], et $M\Xi^2 = A\Gamma$; quod erat demonstrandum.

[Lemma.

Si recta linea in partes inaequales secatur, quadrata partium inaequalium maiora sunt duplo rectangulo partibus inaequalibus comprehenso.

Sit recta AB et in Γ in partes inaequales secetur, et maior sit $A\Gamma$. dico, esse

$$A\Gamma^2 + \Gamma B^2 > 2 A\Gamma \times \Gamma B.$$

nam AB in Δ in duas partes aequales secetur.

ΓB iam quoniam recta linea in Δ in partes aequales secta est, in Γ autem in inaequales, erit $A\Gamma \times \Gamma B + \Gamma \Delta^2 = A\Delta^2$ [II, 5]. quare $A\Gamma \times \Gamma B < A\Delta^2$. itaque $2 A\Gamma \times \Gamma B < 2 A\Delta^2$. est autem $A\Gamma^2 + \Gamma B^2 = 2(A\Delta^2 + \Delta\Gamma^2)$ [II, 9]. ergo $A\Gamma^2 + \Gamma B^2 > 2 A\Gamma \times \Gamma B$; quod erat demonstrandum.¹⁾

LX.

Quadratum rectae ex duobus nominibus rectae ra-

1) Cum Euclides iam prop. XLIV p. 128, 17 hoc lemmate tacite usus sit, parum credibile est, id ab eo ipso hic demum additum esse. quare puto, lemma ab interpolatore adiectum esse, quem fugerit, id iam antea usurpatum esse. facile adparet res ipsa ex II, 7.

εἶσι V. ἀνίσων τῆς ὅλης τμημάτων V. 12. ἔστω γάρ F. 13. μείζον τὸ $A\Gamma$ P. 16. Δ] corr. ex B F. 17. γραμμὴ ἢ AB V. 19. ἀπὸ τῆς Vb. $\Gamma\Delta$] in ras. V, $\Delta\Gamma$ P. τῆς $A\Delta$ V. 20. ἔλασσον P, comp. Fb. τῆς $A\Delta$ V. 22. τῆς $A\Delta$ V. ἔστι] om. P. 24. τῶν] om. P. 25. $\nu\theta'$, corr. m. 2, F.

παραβαλλόμενον πλάτος ποιεί τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων πρώτην.


Ἔστω ἐκ δύο ὀνομάτων ἡ AB διηρημένη εἰς τὰ ὀνόματα κατὰ τὸ Γ , ὥστε τὸ μείζον ὄνομα εἶναι τὸ
 5 $ΑΓ$, καὶ ἐκκείσθω ῥητὴ ἡ ΔE , καὶ τῷ ἀπὸ τῆς AB ἴσον παρὰ τὴν ΔE παραβεβλήσθω τὸ ΔEZH πλάτος ποιοῦν τὴν ΔH . λέγω, ὅτι ἡ ΔH ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ πρώτη.

Παραβεβλήσθω γὰρ παρὰ τὴν ΔE τῷ μὲν ἀπὸ
 10 τῆς $ΑΓ$ ἴσον τὸ $\Delta \Theta$, τῷ δὲ ἀπὸ τῆς $BΓ$ ἴσον τὸ $KΛ$. λοιπὸν ἄρα τὸ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓB$ ἴσον ἐστὶ τῷ MZ . τετμήσθω ἡ MH δίχα κατὰ τὸ N , καὶ παραλλήλος ἤχθω ἡ $NΞ$ [ἐκατέρα τῶν $ΜΑ$, HZ]. ἐκάτερον ἄρα τῶν $MΞ$, NZ ἴσον ἐστὶ τῷ ἁπαξ ὑπὸ τῶν
 15 $ΑΓB$. καὶ ἐπεὶ ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶν ἡ AB διηρημένη εἰς τὰ ὀνόματα κατὰ τὸ Γ , αἱ $ΑΓ$, $ΓB$ ἄρα ῥηταί· εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· τὰ ἄρα ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓB$ ῥητά ἐσσι καὶ σύμμετρα ἀλλήλοις· ὥστε καὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓB$ [σύμμετρόν
 20 ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓB$ · ῥητὸν ἄρα ἐστὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓB$]. καὶ ἐστὶν ἴσον τῷ ΔA · ῥητὸν ἄρα ἐστὶ τὸ ΔA . καὶ παρὰ ῥητὴν τὴν ΔE παράκειται· ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ΔM καὶ σύμμετρος τῇ ΔE μήκει. πάλιν, ἐπεὶ αἱ $ΑΓ$, $ΓB$ ῥηταί· εἰσι
 25 δυνάμει μόνον σύμμετροι, μέσον ἄρα ἐστὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓB$, τουτέστι τὸ MZ . καὶ παρὰ ῥητὴν τὴν $ΜΑ$ παράκειται· ῥητὴ ἄρα καὶ ἡ MH ἐστὶ καὶ ἀσύμ-

5. τῷ] corr. ex τό m. 1 F. AB] A e corr. B. 9. τῷ] corr. ex τό m. 1 F. 10. τό] mut. in τῷ m. 1 F. $\Delta \Theta$] Θ e corr. V. τῷ] corr. ex τό m. 1 F. 11. ἐστὶ] m. 2 F. 12. δίχα] m. 2 V. 13. $NΞ$] N eras. F, Ξ b. ἐκατέρα — HZ] om. P. 14. Post ἄρα del. τῶν AH V. NZ] corr. ex $NΞ$

tionali adplicatum latitudinem efficit rectam ex duobus nominibus primam.

Sit AB recta ex duobus nominibus in Γ in nomina diuisa, ita ut maius nomen sit $A\Gamma$, et ponatur rationalis ΔE , et quadrato AB^2 aequale rectae ΔE adplicetur ΔEZH latitudinem efficiens ΔH . dico, ΔH rectam esse ex duobus nominibus primam.



nam rectae ΔE adplicetur $\Delta\Theta = A\Gamma^2$ et $KA = B\Gamma^2$. itaque reliquum [II, 4] $2A\Gamma \times \Gamma B = MZ$. iam MH in N in duas partes aequales secetur, et NZ parallela ducatur. itaque $MZ = NZ = A\Gamma \times \Gamma B$. et quoniam AB ex duobus nominibus est in Γ in nomina diuisa, $A\Gamma$, ΓB rationales sunt potentia tantum commensurabiles [prop. XXXVI]. itaque $A\Gamma^2$, ΓB^2 rationalia sunt et commensurabilia. quare etiam $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$ [prop. XV]. et $A\Gamma^2 + \Gamma B^2 = \Delta A$. itaque etiam ΔA rationale est. et rectae rationali ΔE adplicatum est; quare ΔM rationalis est et rectae ΔE longitudine commensurabilis [prop. XX]. rursus quoniam $A\Gamma$, ΓB rationales sunt potentia tantum commensurabiles, $2A\Gamma \times \Gamma B$, hoc est MZ , medium est [prop. XXI]. et rectae rationali MA adplicatum est. itaque MH rationalis est et rectae MA , hoc est ΔE , longitudine

m. 1 F. 15. $A\Gamma$, ΓB in ras. V. 16. $\alpha\Gamma$] $\kappa\alpha\Gamma$ $\alpha\Gamma$ V. 18. $\xi\sigma\tau\iota$] $\epsilon\iota\sigma\iota$ BFb. $\kappa\alpha\Gamma$] (alt.) om. V. 19. Post ΓB del. $\kappa\alpha\Gamma$ $\xi\sigma\tau\iota\nu$ $\epsilon\iota\sigma\iota\nu$ F. $\sigma\acute{\upsilon}\mu\mu\epsilon\tau\rho\omicron\nu$ — 20. ΓB] mg. m. 1 P. 20. $\phi\eta\tau\acute{o}\nu$ — 21. ΓB] om. P. 22. ΔA] A e corr. FV, ΔA P. $\tau\acute{o}$] $\tau\acute{o}$ F. ΔA] corr. ex ΔA m. rec. P. 23. ΔM] corr. ex ΔH m. 2 F. 27. $\alpha\theta\alpha$ $\xi\sigma\tau\iota$ BFVb. $\kappa\alpha\Gamma$] om. V. $\xi\sigma\tau\iota$] om. BFVb. $\sigma\acute{\upsilon}\mu\mu\epsilon\tau\rho\omicron\varsigma$ F, corr. m. 2.

μετρος τῇ MA , τουτέστι τῇ AE , μήκει. ἔστι δὲ καὶ ἡ MA ῥητὴ καὶ τῇ AE μήκει σύμμετρος· ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ AM τῇ MH μήκει.¹ καὶ εἰσι ῥηταί· αἱ AM , MH ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι·
 5 ἐκ δύο ἄρα ὀνομάτων ἐστὶν ἡ AH .

Δεικτέον δὴ, ὅτι καὶ πρώτῃ.

Ἐπεὶ τῶν ἀπὸ τῶν AG , GB μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ ὑπὸ τῶν AGB , καὶ τῶν AO , KA ἄρα μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ MO . ἔστιν ἄρα ὡς τὸ AO πρὸς τὸ
 10 MO , οὕτως τὸ MO πρὸς τὸ KA , τουτέστιν ὡς ἡ AK πρὸς τὴν MN , ἡ MN πρὸς τὴν MK . τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν AK , KM ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς MN . καὶ ἐπεὶ σύμμετρόν ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς AG τῷ ἀπὸ τῆς GB , σύμμετρόν ἐστι καὶ τὸ AO τῷ KA . ὥστε καὶ ἡ AK τῇ
 15 KM σύμμετρός ἐστιν. καὶ ἐπεὶ μεζονά ἐστι τὰ ἀπὸ τῶν AG , GB τοῦ δις ὑπὸ τῶν AG , GB , μεζον ἄρα καὶ τὸ AO τοῦ MZ . ὥστε καὶ ἡ AM τῆς MH μεζων ἐστίν. καὶ ἐστὶν ἴσον τὸ ὑπὸ τῶν AK , KM τῷ ἀπὸ τῆς MN , τουτέστι τῷ τετάρτῳ τοῦ ἀπὸ τῆς MH , καὶ
 20 σύμμετρος ἡ AK τῇ KM . ἐὰν δὲ ᾧσι δύο εὐθεταὶ ἀντιστοι, τῷ δὲ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος ἴσον παρὰ τὴν μεζονα παραβληθῇ ἑλλείπον εἶδει τετραγώνῳ καὶ εἰς σύμμετρα αὐτὴν διαιρῇ, ἡ μεζων τῆς ἐλάσσονος μεζον δύνανται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ· ἡ AM ἄρα
 25 τῆς MH μεζον δύνανται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ. καὶ εἰσι ῥηταὶ αἱ AM , MH , καὶ ἡ AM μεζον ὀνομα οὕσα σύμμετρός ἐστι τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ τῇ AE μήκει.

1. MA] AM in ras. V. ἔστιν PB. 3. AM] MA P.
 καὶ εἰσι] e corr. V. εἰσιν B. 4. AM , MH ἄρα] e
 corr. V. 5. ἄρα] supra scr. F, om. P. 7. Post ἐπεὶ add.
 γὰρ BVb, F m. 2. 8. AG , GB m. 2 V. 10. AK] K
 in ras. V. 13. GB] BF in ras. V. 15. KM μήκει σύμ-

incommensurabilis [prop. XXII]. uerum MA rationalis est et rectae AE longitudine commensurabilis. itaque AM , MH longitudine incommensurabiles sunt [prop. XIII]. et sunt rationales. itaque AM , MH rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo AH ex duobus nominibus est [prop. XXXVI]. iam demonstrandum, eandem primam esse. quoniam $AI \times GB$ medium est proportionale inter AI^2 , GB^2 [cfr. prop. XXI lemma], etiam ME medium est proportionale inter AE , KA . itaque $AE:ME = ME:KA$, hoc est [VI, 1] $AK:MN = MN:MK$. itaque $AK \times KM = MN^2$ [VI, 17]. et quoniam AI^2 , GB^2 commensurabilia sunt, etiam AE , KA commensurabilia sunt. quare etiam AK , KM commensurabiles sunt [VI, 1; prop. XI]. et quoniam est $AI^2 + GB^2 > 2AI \times GB$ [u. ad lemma], erit $AM > MZ$. quare etiam $AM > MH$ [VI, 1; V, 14]. et

$$AK \times KM = MN^2 = \frac{1}{4} MH^2,$$

et AK , KM commensurabiles sunt. sin datae sunt duae rectae inaequales, et quartae parti quadrati minoris aequale spatium maiori adplicatur figura quadrata deficiens et eam in partes commensurabiles diuidit, maior quadrata minorem excedit quadrato rectae sibi commensurabilis [prop. XVII]. itaque AM^2 excedit MH^2 quadrato rectae sibi commensurabilis. et AM , MH rationales sunt, et maius nomen AM rectae rationali propositae AE longitudine commensurabilis est.

μετρώς ἐστι V. Post ἐστίν add. μήκει m. 2 B. 16. τοῦ — GB] supra scr. F. 18. ἐστὶ PVb, comp. F. 20. Post KM add. μήκει V, m. 2 B. ὅσιν PB. 23. διαιρεῖ b. 24. Ante μείζον ras. 1 litt. F. 25. τῶ] τό V. 26. καὶ ἡ — 27. ἐστὶ] in ras. F. 26. AM] MH P, HM Fb.

Ἡ ΔH ἄρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ πρώτη· ὅπερ
ἔδει δεῖξαι.

ξά'.

Τὸ ἀπὸ τῆς ἐκ δύο μέσων πρώτης παρὰ ῥη-
5 τὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ τὴν ἐκ δύο
ὀνομάτων δευτέραν.

Ἐστω ἐκ δύο μέσων πρώτη ἡ AB διηρημένη εἰς
τὰς μέσας κατὰ τὸ Γ , ὧν μείζων ἡ AG , καὶ ἐκκείσθω
ῥητὴ ἡ ΔE , καὶ παραβεβλήσθω παρὰ τὴν ΔE τῷ ἀπὸ
10 τῆς AB ἴσον παραλληλόγραμμον τὸ ΔZ πλάτος ποιοῦν
τὴν ΔH · λέγω, ὅτι ἡ ΔH ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ δευτέρα.

Κατεσκευάσθω γὰρ τὰ αὐτὰ τοῖς πρὸ τούτου. καὶ
ἐπεὶ ἡ AB ἐκ δύο μέσων ἐστὶ πρώτη διηρημένη κατὰ
τὸ Γ , αἱ AG , GB ἄρα μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον
15 σύμμετροι ῥητὸν περιέχουσαι· ὥστε καὶ τὰ ἀπὸ τῶν
 AG , GB μέσα ἐστίν. μέσον ἄρα ἐστὶ τὸ ΔA . καὶ παρὰ
ῥητὴν τὴν ΔE παραβέβληται· ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ΔA
καὶ ἀσύμμετρος τῇ ΔE μήκει. πάλιν, ἐπεὶ ῥητὸν ἐστὶ
τὸ δις ὑπὸ τῶν AG , GB , ῥητὸν ἐστὶ καὶ τὸ MZ . καὶ
20 παρὰ ῥητὴν τὴν MA παράκειται· ῥητὴ ἄρα [ἐστὶ] καὶ
ἡ MH καὶ μήκει σύμμετρος τῇ MA , τουτέστι τῇ ΔE ·
ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ ΔM τῇ MH μήκει. καὶ εἰσι
ῥηταί· αἱ ΔM , MH ἄρα ῥηταί εἰσι δυνάμει μόνον
σύμμετροι· ἐκ δύο ἄρα ὀνομάτων ἐστὶν ἡ ΔH .


1. ὀνομάτων b. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] om. BFVb, comp. P. 3.
ἐβ' F. 4. ῥητῆς B, sed corr. 7. ἐστω] e corr. m. 2 F. 9.
παρὰ τὴν ΔE παραβεβλήσθω P. 10. AB] corr. ex ΔA m.
1 b. ἴσον τό P. 12. κατασκευάσθω V. 14. αἱ] in ras.
m. 2 B. εἰσὶν B. 16. ἐστὶν] ἐστὶ PB, comp. Fb, εἰσὶ V.
17. παράκειται Theon (BFVb). 19. ἐστὶ] om. B. 20. ῥη,
supra scr. τὴν P. ἐστὶ] om. BFVb. 21. σύμμετρος μήκει V.
 MA] M e corr. V. 22. ἐστὶν] om. V. μήκει τῇ MH V.
εἰσὶν B.

Ergo ΔH ex duobus nominibus prima est [deff. alt. 1]; quod erat demonstrandum.

LXI.

Quadratum rectae ex duabus mediis primae rectae rationali adplicatum latitudinem efficit rectam ex duobus nominibus secundam.

Sit AB recta ex duabus mediis prima in Γ in medias diuisa, quarum maior sit $A\Gamma$, et ponatur rationalis ΔE , et rectae ΔE adplicetur quadrato AB^2 aequale parallelogrammum ΔZ latitudinem efficiens ΔH . dico, ΔH ex duobus nominibus secundam esse.



nam comparentur eadem, quae in priore propositione. et quoniam AB ex duabus mediis prima est in Γ diuisa, $A\Gamma$, ΓB mediae sunt potentia tantum commensurabiles spatium rationale comprehendentes [prop. XXXVII]. quare etiam $A\Gamma^2$, ΓB^2 media sunt [prop. XXI]. itaque ΔA medium est. et rectae rationali ΔE adplicatum est. itaque $M\Delta$ rationalis est et rectae ΔE longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. rursus quoniam $2 A\Gamma \times \Gamma B$ rationale est, etiam MZ rationale est. et rectae rationali $M\Delta$ adplicatum est. itaque etiam MH rationalis est et rectae $M\Delta$ longitudine commensurabilis [prop. XX], hoc est rectae ΔE . itaque ΔM , MH longitudine incommensurabiles sunt [prop. XIII]. et sunt rationales. itaque ΔM , MH rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo ΔH ex duobus nominibus est [prop. XXXVI].

Δεικτέον δὴ, ὅτι καὶ δευτέρα.

Ἐπεὶ γὰρ τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ μείζονά ἐστι τοῦ
 δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$, μείζον ἄρα καὶ τὸ $ΔΑ$ τοῦ
 $ΜΖ$. ὥστε καὶ ἡ $ΔΜ$ τῆς $ΜΗ$. καὶ ἐπεὶ σύμμετρον
 5 ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$ τῷ ἀπὸ τῆς $ΓΒ$, σύμμετρον ἐστὶ
 καὶ τὸ $ΔΘ$ τῷ $ΚΑ$. ὥστε καὶ ἡ $ΔΚ$ τῇ $ΚΜ$ σύμμε-
 τρός ἐστιν. καὶ ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν $ΔΚΜ$ ἴσον τῷ ἀπὸ
 τῆς $ΜΝ$. ἡ $ΔΜ$ ἄρα τῆς $ΜΗ$ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ
 συμμέτρου ἐναντῇ. καὶ ἐστὶν ἡ $ΜΗ$ σύμμετρος τῇ $ΔΕ$
 10 μήκει.

Ἡ $ΔΗ$ ἄρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ δευτέρα.

ξβ'.

Τὸ ἀπὸ τῆς ἐκ δύο μέσων δευτέρας παρὰ
 φητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ τὴν ἐκ
 15 δύο ὀνομάτων τρίτην.

Ἔστω ἐκ δύο μέσων δευτέρα ἡ $ΑΒ$ διηρημένη εἰς
 τὰς μέσας κατὰ τὸ $Γ$, ὥστε τὸ μείζον τμήμα εἶναι τὸ
 $ΑΓ$, φητὴ δέ τις ἔστω ἡ $ΔΕ$, καὶ παρὰ τὴν $ΔΕ$ τῷ
 ἀπὸ τῆς $ΑΒ$ ἴσον παραλληλόγραμμον παραβελθήσθω
 20 τὸ $ΔΖ$ πλάτος ποιούν τὴν $ΔΗ$. λέγω, ὅτι ἡ $ΔΗ$ ἐκ
 δύο ὀνομάτων ἐστὶ τρίτη.

Κατεσκευάσθω τὰ αὐτὰ τοῖς προδεδειγμένοις. καὶ
 ἐπεὶ ἐκ δύο μέσων δευτέρα ἐστὶν ἡ $ΑΒ$ διηρημένη
 κατὰ τὸ $Γ$, αὐτὰ $ΑΓ$, $ΓΒ$ ἄρα μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον
 25 σύμμετροι μέσον περιέχουσαι. ὥστε καὶ τὸ συγκείμενον

3. $ΑΓ$] $Γ$ in ras. m. 1 P. 7. ἐστὶν] ἐστὶ BV, comp. Fb.
 ἐστὶ] ἐστὶν P. $ΔΚΜ$] $Κ$ corr. ex M m. 1 P; $ΔΚ$, $ΚΜ$ corr.
 ex $ΔΚ$, NM V. 8. $ΜΗ$] corr. ex MN m. 1 b. δύναται
 μείζον V. 12. ξβ'] corr. ex ξγ' F. 15. ὀνομάτων] corr. ex
 μέσων m. 2 B. τρίτην] in ras. m. 1 B. 16. ἔστω] in ras.
 m. 1 B. 18. ἔστω] γεγονέτω V. $ΔΕ$] in ras. m. 1 B. τήν]

iam demonstrandum est, eandem secundam esse.


nam quoniam $AI^2 + IB^2 > 2AI \times IB$ [prop. LIX lemma], erit etiam $AI > MZ$. quare etiam $AM > MH$. et quoniam AI^2, IB^2 commensurabilia sunt, etiam AI, IB commensurabilia sunt. quare etiam AK, KM commensurabiles sunt [VI, 1; prop. XI]. et $AK \times KM = MN^2$ [cfr. p. 184, 7 sq.]. itaque AM^2 excedit MH^2 quadrato rectae sibi commensurabilis [prop. XVII]; et MH, AE longitudine commensurabiles sunt.

Ergo AH ex duobus nominibus secunda est [def. alt. 2].

LXII.

Quadratum rectae ex duabus mediis secundae rectae rationali adplicatum latitudinem efficit rectam ex duobus nominibus tertiam.

Sit AB ex duabus mediis secunda in Γ in medias diuisa, ita ut maior pars sit AI , rationalis autem sit AE , et rectae AE quadrato AB^2 aequale parallelogrammum AZ adplicetur latitudinem efficiens AH . dico, AH ex duobus nominibus tertiam esse.



comparentur eadem, quae in superioribus demonstrationibus. et quoniam AB ex duabus mediis secunda est in Γ diuisa, AI, IB mediae sunt potentia tantum commensurabiles spatium medium comprehen-

δητήν τήν F. τῷ] corr. ex τό m. 1 F. 20. τήν] corr. ex τό m. 1 B, τό F. 22. καὶ κατεσκευάσθω, del. καί, F; κατασκευάσθω γάρ V. καί] postea ins. F. 23. ἐστὶ δευτέρα P. 24. IB] Γ in ras. V. μέσαι ἄρα V. εἰσὶν PB.

ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ μέσον ἐστίν. καὶ ἐστὶν
 ἴσον τῷ $ΔΑ$ · μέσον ἄρα καὶ τὸ $ΔΑ$. καὶ παρὰκειται
 παρὰ ῥητὴν τὴν $ΔΕ$ · ῥητὴ ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ $ΜΔ$ καὶ
 ἀσύμμετρος τῇ $ΔΕ$ μήκει. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ἡ
 5 $ΜΗ$ ῥητὴ ἐστὶ καὶ ἀσύμμετρος τῇ $ΜΑ$, τουτέστι τῇ
 $ΔΕ$, μήκει· ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἑκατέρα τῶν $ΔΜ$, $ΜΗ$
 καὶ ἀσύμμετρος τῇ $ΔΕ$ μήκει. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρός
 ἐστὶν ἡ $ΑΓ$ τῇ $ΓΒ$ μήκει, ὥς δὲ ἡ $ΑΓ$ πρὸς τὴν $ΓΒ$,
 οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΓΒ$, ἀσύμ-
 10 μετρον ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$ τῷ ὑπὸ τῶν $ΑΓΒ$.
 ὥστε καὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$
 τῷ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓΒ$ ἀσύμμετρόν ἐστὶν, τουτέστι τὸ
 $ΔΑ$ τῷ $ΜΖ$ · ὥστε καὶ ἡ $ΔΜ$ τῇ $ΜΗ$ ἀσύμμετρός
 ἐστὶν. καὶ εἰσι ῥηταί· ἐκ δύο ἄρα ὀνομάτων ἐστὶν
 15 ἡ $ΔΗ$.

Δεικτέον [δὴ], ὅτι καὶ τρίτη.

Ὅμοιως δὲ τοῖς προτέροις ἐπιλογιούμεθα, ὅτι μεί-
 ζων ἐστὶν ἡ $ΔΜ$ τῆς $ΜΗ$, καὶ σύμμετρος ἡ $ΔΚ$ τῇ
 $ΚΜ$. καὶ ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν $ΔΚΜ$ ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς
 20 $ΜΝ$ · ἡ $ΔΜ$ ἄρα τῆς $ΜΗ$ μείζον δύνатаι τῷ ἀπὸ
 συμμέτρου ἑαυτῇ. καὶ οὐδετέρα τῶν $ΔΜ$, $ΜΗ$ σύμ-
 μετρός ἐστὶ τῇ $ΔΕ$ μήκει.

Ἡ $ΔΗ$ ἄρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ τρίτη· ὅπερ
 εἶδει δεῖξαι.

1. ἐκ τῶν] om. Fb, m. 2 B. ἐστίν] ἐστὶ PBVb, comp. F.
 2. παρὰκειται] om. V. 3. τὴν $ΔΕ$ ῥητὴν P. ἐστίν B. καὶ]
 om. B. $ΔΜ$ P. 4. διὰ] καὶ διὰ F. 6. ῥητὴ — 7. μήκει]
 mg. m. 2 V. 6. $ΜΝ$ V. 8. τῇ $ΓΒ$ — ἡ $ΑΓ$] supra scr.
 m. 2 F. 9. τῆς] τῶν B. $ΑΓ$, $ΒΑ$ B. σύμμετρον B, corr.
 m. 2. 10. τό] corr. ex τῷ V. τῷ] corr. ex τό m. 2 P.
 $ΑΓ$, $ΓΒ$ V. 11. $ΓΒ$] om. P. 12. $ΑΒΓ$ P. ἐστὶ PBFV,
 comp. b. τό] τῷ F. 13. $ΔΑ$] $ΔΑ$ F et, eras. $Α$, b. καὶ]
 om. B. 14. ἐστὶ PBV, comp. Fb. 16. δὴ] om. P. 17.

dentes [prop. XXXVIII]. quare etiam $AG^2 + GB^2$ medium est. est autem $AG^2 + GB^2 = AA$. itaque etiam AA medium est. et rectae rationali AE adplicatum est. itaque MA rationalis est et rectae AE longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. eadem de causa etiam MH rationalis est et rectae MA , hoc est AE , longitudine incommensurabilis. itaque utraque AM , MH rationalis est et rectae AE longitudine incommensurabilis. et quoniam AG , GB longitudine incommensurabiles sunt, et $AG:GB = AG^2:AG \times GB$ [prop. XXI lemma], etiam AG^2 et $AG \times GB$ incommensurabilia sunt [prop. XI]. quare etiam $AG^2 + GB^2$ et $2AG \times GB$, hoc est AA et MZ , incommensurabilia sunt. quare etiam AM , MH incommensurabiles sunt [VI, 1; prop. XI]. et sunt rationales. ergo AH ex duobus nominibus est [prop. XXXVI].

demonstrandum, eandem tertiam esse.

eodem igitur modo, quo antea [p. 188, 2 seq.], concludemus, esse $AM > MH$, et AK , KM commensurabiles esse. et $AK \times KM = MN^2$. itaque AM^2 excedit MH^2 quadrato rectae sibi commensurabilis [prop. XVII]. et neutra rectarum AM , MH rectae AE longitudine commensurabilis est.

Ergo AH ex duobus nominibus tertia est [def. alt. 3]; quod erat demonstrandum.

$\delta\eta$] $\delta\epsilon$ V. $\pi\rho\acute{o}\tau\epsilon\rho\omicron\nu$ BFb. $\delta\tau\iota$] corr. ex $\tau\iota$ m. rec. P. 19. ΔKM] Δ e corr. V, corr. ex A m. rec. P. 21. $\sigma\mu\mu\acute{\epsilon}\tau\rho\omicron\nu$] σ in ras. V. 22. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$ PV. 23. $\acute{o}\pi\epsilon\rho$ $\acute{\epsilon}\delta\epsilon\iota$ $\delta\epsilon\iota\chi\alpha\iota$] comp. P, om. BFVb.

ξγ'.

Τὸ ἀπὸ τῆς μείζονος παρὰ ῥητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων τετάρτην.

- 5 Ἔστω μείζων ἡ AB διηρημένη κατὰ τὸ Γ , ὥστε μείζονα εἶναι τὴν AG τῆς GB , ῥητὴ δὲ ἡ AE , καὶ τῷ ἀπὸ τῆς AB ἴσον παρὰ τὴν AE παραβεβλήσθω τὸ AZ παραλληλόγραμμον πλάτος ποιοῦν τὴν AH λέγω, ὅτι ἡ AH ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ τετάρτη.
- 10 Κατεσκευάσθω τὰ αὐτὰ τοῖς προδεδειγμένοις. καὶ ἐπεὶ μείζων ἐστὶν ἡ AB διηρημένη κατὰ τὸ Γ , αἱ AG , GB δυνάμει εἰδὼν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων ῥητόν, τὸ δὲ ὑπ' αὐτῶν μέσον. ἐπεὶ οὖν ῥητόν ἐστι τὸ συγκείμενον
- 15 ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AG , GB , ῥητόν ἄρα ἐστὶ τὸ AA . ῥητὴ ἄρα καὶ ἡ AM καὶ σύμμετρος τῇ AE μήκει. πάλιν, ἐπεὶ μέσον ἐστὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν AG , GB , τουτέστι τὸ MZ , καὶ παρὰ ῥητὴν ἐστὶ τὴν MA , ῥητὴ ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ MH καὶ ἀσύμμετρος τῇ AE μήκει.
- 20 ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ AM τῇ MH μήκει. αἱ AM , MH ἄρα ῥηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἐκ δύο ἄρα ὀνομάτων ἐστὶν ἡ AH .

Δεικτέον [δὴ], ὅτι καὶ τετάρτη.


Ὅμοιως δὴ δεῖξομεν τοῖς πρότερον, ὅτι μείζων ἐστὶν

1. ξδ' F, et sic deinceps. 6. ῥη supra scr. τῇ V. δέ τις V. 7. παρὰ — 8. AZ] mg. m. 1 F. 8. AH] corr. ex AE m. 1 F. 9. ἡ AH] corr. ex AH F. 10. κατασκευάσθω V. Dein add. γὰρ FV. προδεδειμένοις F, corr. m. 2; προδεδιδαγμένοις P, mg. m. 1 γρ. προδεδειγμένοις. 12. GB ἄρα V. εἰσὶ σύμμετροι B, corr. m. 2. μὲν] supra scr. m. 1 F. 13. δ' BFV. 15. AA] corr. ex AA m. rec. P. 16. AM] MA BVb, " AM " F. 17. AGB P. 18. ἐστὶ] om.

LXIII.

Quadratum maioris rectae rationali adplicatum latitudinem efficit rectam ex duobus nominibus quartam.

Sit maior AB in Γ diuisa, ita ut sit $A\Gamma > \Gamma B$, et rationalis sit ΔE , et quadrato AB^2 aequale rectae



ΔE adplicetur parallelogrammum ΔZ latitudinem efficiens ΔH . dico, ΔH ex duobus nominibus quartam esse.

comparentur eadem, quae in superioribus demonstrationibus. et quoniam AB maior est in Γ diuisa, $A\Gamma$, ΓB potentia sunt incommensurabiles efficientes summam quadratorum rationalem, rectangulum autem medium [prop. XXXIX]. iam quoniam $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$ rationale est, ΔA rationale est. quare ΔM rationalis est et rectae ΔE longitudine commensurabilis [prop. XX]. rursus quoniam $2A\Gamma < \Gamma B$ medium est, hoc est MZ , et rectae rationali MA adplicatum est, etiam MH rationalis est et rectae ΔE longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. itaque ΔM , MH longitudine incommensurabiles sunt [prop. XIII]. quare ΔM , MH rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo ΔH ex duobus nominibus est [prop. XXXVI].

demonstrandum, eandem quartam esse.

iam eodem modo, quo antea, demonstrabimus, esse

Theon (BFVb). MA] corr. ex MA m. rec. b, MA BF. Deinde add. $\pi\alpha\rho\acute{\alpha}\nu\epsilon\iota\tau\alpha\iota$ Theon (BFVb). 19. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\acute{\iota}\nu$ V. 20. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\acute{\iota}\nu$ P. ΔM] M e corr. m. 1 F. Ante $\alpha\lambda$ del. $\kappa\alpha\iota$ F. 21. $\acute{\alpha}\rho\alpha$] om. P. 23. $\delta\eta$] om. P. 24. $\delta\eta$ τοῖς πρότερον ἐπιλογισμέθα, ὅτι Theon (BFVb).

ἡ ΔM τῆς MH , καὶ ὅτι τὸ ὑπὸ ΔKM ἴσον ἐστὶ τῷ
 ἀπὸ τῆς MN . ἐπεὶ οὖν ἀσύμμετρόν ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς
 $\Delta\Gamma$ τῷ ἀπὸ τῆς ΓB , ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ
 $\Delta\Theta$ τῷ $K\Lambda$. ὥστε ἀσύμμετρος καὶ ἡ ΔK τῇ KM
 5 ἐστίν. ἐὰν δὲ ὥσι δύο εὐθεῖαι ἄνισοι, τῷ δὲ τετάρτῳ
 μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος ἴσον παραλληλόγραμμον
 παρὰ τὴν μείζονα παραβληθῇ ἑλλείπον εἶδει τετρα-
 γώνῳ καὶ εἰς ἀσύμμετρα αὐτὴν διαιρῇ, ἡ μείζων τῆς
 ἐλάσσονος μείζον δυνήσεται τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἐαυτῇ
 10 μήκει· ἡ ΔM ἄρα τῆς MH μείζον δύνатаι τῷ ἀπὸ
 ἀσυμμέτρου ἐαυτῇ. καὶ εἰσιν αἱ ΔM , MH ρηταὶ δυ-
 νάμει μόνον σύμμετροι, καὶ ἡ ΔM σύμμετρός ἐστι
 τῇ ἐκκειμένη ρητῇ τῇ ΔE .

Ἡ ΔH ἄρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ τετάρτη· ὅπερ
 15 ἔδει δεῖξαι.

ξδ'.

Τὸ ἀπο τῆς ρητὸν καὶ μέσον δυναμένης πα-
 ρὰ ρητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ τὴν ἐκ
 δύο ὀνομάτων πέμπτην.

20 Ἔστω ρητὸν καὶ μέσον δυναμένη ἡ AB διηρημένη
 εἰς τὰς εὐθείας κατὰ τὸ Γ , ὥστε μείζονα εἶναι τὴν
 $\Delta\Gamma$, καὶ ἐκκείσθω ρητὴ ἡ ΔE , καὶ τῷ ἀπὸ τῆς AB
 ἴσον παρὰ τὴν ΔE παραβεβλήσθω τὸ ΔZ πλάτος
 ποιοῦν τὴν ΔH . λέγω, ὅτι ἡ ΔH ἐκ δύο ὀνομάτων
 25 ἐστὶ πέμπτη.

1. τῆς] τῇ V? MN BV. ὑπὸ τῶν V. ΔKM] supra
 add. K V. 3. τό] corr. ex τά? F. 4. ἀσύμμετρος] om.
 Theon (BFVb). KM ἀσύμμετρός ἐστιν Theon (BFVb).
 5. ὥσι BF. 6. Post ἴσον del. παρὰ τὴν μείζονα F. παρ-
 αλληλόγραμμον] om. V. 7. παρὰ τὴν μείζονα] om. Fb, m.
 2 B. 8. διαιρεῖ F, διαιρεῖ μήκει V. 10. ΔM] corr. ex
 ΔH F. 11. συμμέτρου F. 13. ΔE] corr. ex ΔH F. 14.


$\Delta M > MH$, et $\Delta K \times KM = MN^2$. iam quoniam $\Delta \Gamma^2$, ΓB^2 incommensurabilia sunt, etiam $\Delta \Theta$, $K\Delta$ incommensurabilia sunt. quare ΔK , KM incommensurabiles sunt [VI, 1; prop. XI]. sin datae sunt duae rectae inaequales, et quartae parti quadrati minoris aequale parallelogrammum maiori adplicatur figura quadrata deficiens et eam in partes incommensurabiles diuidit, maior quadrata minorem excedit quadrato rectae sibi incommensurabilis [prop. XVIII]. itaque ΔM^2 excedit MH^2 quadrato rectae sibi incommensurabilis. et ΔM , MH rationales sunt potentia tantum commensurabiles, et ΔM rationali propositae ΔE commensurabilis est.

Ergo ΔH ex duobus nominibus quarta est [deff. alt. 4]; quod erat demonstrandum.

LXIV.

Quadratum rectae spatio rationali et medio aequalis quadratae rectae rationali adplicatum latitudinem efficit rectam ex duobus nominibus quintam.

Sit AB recta spatio rationali et medio aequalis quadrata in Γ in rectas diuisa, ita ut $\Delta \Gamma$ maior sit,



et ponatur ΔE rationalis, et quadrato AB^2 aequale rectae ΔE adplicetur ΔZ latitudinem efficiens ΔH . dico, ΔH ex duobus nominibus quintam esse.

$\delta\pi\epsilon\theta$ $\xi\delta\epsilon\iota$ $\delta\epsilon\iota\xi\alpha\iota$] comp. P, om. BFVb. 17. $\kappa\alpha\iota$] postea ins. m. 1 F. 20. $\phi\eta\tau\eta$ F, sed corr. η AB] m. 2 V.

Κατεσκευάσθω τα αὐτα τοῖς πρὸ τούτου. ἐπεὶ οὖν
 ρητὸν καὶ μέσον δυναμένη ἐστὶν ἡ AB διηρημένη
 κατὰ το Γ , αὶ AG , GB ἄρα δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι
 ποιοῦσαι τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετρα-
 5 γώνων μέσον, τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν ρητόν. ἐπεὶ οὖν μέ-
 σον ἐστὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AG , GB ,
 μέσον ἄρα ἐστὶ τὸ AA' . ὥστε ρητὴ ἐστὶν ἡ AM καὶ
 μήκει ἀσύμμετρος τῇ AE . πάλιν, ἐπεὶ ρητόν ἐστι τὸ
 δις ὑπὸ τῶν AGB , τουτέστι τὸ MZ , ρητὴ ἄρα ἡ MH
 10 καὶ σύμμετρος τῇ AE . ἀσύμμετρος ἄρα ἡ AM τῇ
 MH . αὶ AM , MH ἄρα ρηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον
 σύμμετροι· ἐκ δύο ἄρα ὀνομάτων ἐστὶν ἡ AH .

Λέγω δὴ, ὅτι καὶ πέμπτη.

Ὅμοίως γὰρ δειχθήσεται, ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν AKM
 15 ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς MN , καὶ ἀσύμμετρος ἡ AK τῇ
 KM μήκει· ἡ AM ἄρα τῆς MH μείζον δύνανται τῷ
 ἀπὸ ἀσυνμέτρου ἐαυτῇ. καὶ εἰσιν αὶ AM , MH [ρη-
 ται] δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ ἡ ἐλάσσων ἡ MH
 σύμμετρος τῇ AE μήκει.

20 Ἡ AH ἄρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ πέμπτη· ὅπερ
 εἶδει δεῖξαι.

ξέ'.

Τὸ ἀπὸ τῆς δύο μέσα δυναμένης παρὰ ρη-
 τὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ τὴν ἐκ δύο
 25 ὀνομάτων ἑκτην.

Ἔστω δύο μέσα δυναμένη ἡ AB διηρημένη κατὰ
 τὸ Γ , ρητὴ δὲ ἔστω ἡ AE , καὶ παρὰ τὴν AE τῷ

1. κατασκευάσθω V. Deinde add. γὰρ FV. πρὸ τούτου]
 πρότερον, corr. m. 2, F. 4. τετράγωνον F, corr. m. 2. 5.
 δέ F. 7. καὶ τό b. 8. τῇ] ἡ b. 9. AG , GB B et corr.
 in $AB\Gamma$ V. 10. Post AE add. μήκει m. 2 B. 11. AM]
 in ras. V. 17. συμμέτρον, sed corr., BFb. ρηταί] om. P,

comparentur eadem, quae antea. iam quoniam AB recta est spatio rationali et medio aequalis quadrata in Γ diuisa, AG , GB potentia incommensurabiles sunt efficientes summam quadratorum mediam, rectangulum autem rationale [prop. XL]. iam quoniam $AG^2 + GB^2$ medium est, AA medium est. itaque AM rationalis est et rectae AE longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. rursus quoniam $2AG \times GB$, hoc est MZ , rationale est, MH rationalis est et rectae AE commensurabilis [prop. XX]. itaque AM , MH incommensurabiles sunt [prop. XIII]. quare AM , MH rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo AH ex duobus nominibus est [prop. XXXVI].

iam dico, eandem quintam esse.

nam similiter demonstrabimus, esse $AK \times KM = MN^2$ et AK , KM longitudine incommensurabiles. itaque AM^2 excedit MH^2 quadrato rectae sibi commensurabilis [prop. XVIII]. et AM , MH potentia tantum commensurabiles sunt, et minor MH rectae AE longitudine commensurabilis est.

Ergo AH ex duobus nominibus est quinta [deff. alt. 5]; quod erat demonstrandum.

LXV.

Quadratum rectae duobus spatiis mediis aequalis quadratae rectae rationali adplicatum latitudinem efficit rectam ex duobus nominibus sextam.

Sit AB recta duobus spatiis mediis aequalis qua-

m. 2 F. 20. ΔH] ΔM PBb, ΔH in ras. V, mut. in ΔM
m. 2 F. $\delta\pi\epsilon\rho$ $\xi\delta\epsilon\iota$ $\delta\epsilon\iota\xi\alpha\iota$] comp. P, om. BVb. 27. δ' b.
 $\tau\eta\upsilon$] $\xi\eta\tau\iota\upsilon$ $\tau\eta\upsilon$ F. $\tau\phi$] corr. ex $\tau\omicron$ m. 1 F.


ἀπὸ τῆς AB ἴσον παραβεβλήσθω τὸ ΔZ πλάτος
 ποιοῦν τὴν ΔH · λέγω, ὅτι ἡ ΔH ἐκ δύο ὀνομάτων
 ἐστὶν ἕκτη.

Κατεσκευάσθω γὰρ τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον. καὶ
 5 ἐπεὶ ἡ AB δύο μέσα δυναμένη ἐστὶ διηρημένη κατὰ
 τὸ Γ , αἱ AG , GB ἄρα δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι
 ποιοῦσαι τό τε συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετρα-
 γώνων μέσον καὶ τὸ ὑπ' αὐτῶν μέσον καὶ ἐτι ἀσύμ-
 μετρον τὸ ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων συγκείμενον
 10 τῷ ὑπ' αὐτῶν· ὥστε κατὰ τὰ προδεδειγμένα μέσον
 ἐστὶν ἑκάτερον τῶν ΔA , MZ . καὶ παρὰ φητὴν τὴν
 ΔE παράκειται· φητὴ ἄρα ἐστὶν ἑκατέρω τῶν ΔM ,
 MH καὶ ἀσύμμετρος τῇ ΔE μήκει. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμε-
 τρόν ἐστι τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AG , GB
 15 τῷ δις ὑπὸ τῶν AG , GB , ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ
 ΔA τῷ MZ . ἀσύμμετρος ἄρα καὶ ἡ ΔM τῇ MH ·
 αἱ ΔM , MH ἄρα φηταὶ εἶσι δυνάμει μόνον σύμμε-
 τροὶ· ἐκ δύο ἄρα ὀνομάτων ἐστὶν ἡ ΔH .

Λέγω δὴ, ὅτι καὶ ἕκτη.

20 Ὅμοίως δὴ πάλιν δεῖξομεν, ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν ΔKM
 ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς MN , καὶ ὅτι ἡ ΔK τῇ KM
 μήκει ἐστὶν ἀσύμμετρος· καὶ διὰ τὰ αὐτὰ δὴ ἡ ΔM
 τῆς MH μείζον δύνανται τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἐαντὴ
 μήκει. καὶ οὐδέτερά τῶν ΔM , MH σύμμετρός ἐστι
 25 τῇ ἐκκειμένῃ φητὴ τῇ ΔE μήκει.

1. ἴσον] ἴσον παραλληλόγραμμον V. 4. κατασκευάσθω V,
 sed corr. 5. δύο] δ corr. ex μ F. 6. AG] GA F. 9.
 τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων Theon (BFVb).
 10. τῷ] τῷ ἐκ τῶν P. τὰ] om. b. προδεδειγμένα P,
 corr. m. 1. 12. παράκειται P. ἐστὶν] ἐστὶ καὶ BFVb.
 15. ἐστὶν P. 16. MZ] corr. ex $M\Gamma$ m. 1 F. 17. ΔM]
 corr. ex AM m. rec. P. 19. δὴ] om. BV. 20. δὴ] γάρ



drata in Γ diuisa, ΔE autem rationalis sit, et rectae ΔE quadrato AB^2 aequale adplicetur ΔZ latitudinem efficiens ΔH . dico, ΔH ex duobus nominibus sextam esse.

comparentur enim eadem, quae antea. et quoniam AB recta est duobus spatiis mediis aequalis quadrata in Γ diuisa, $A\Gamma$, ΓB potentia incommensurabiles sunt efficientes summam quadratorum mediam et rectangulum medium et praeterea summam quadratorum rectangulo incommensurabilem [prop. XLI]. quare ex iis, quae antea demonstrata sunt, ΔA et MZ media sunt. et rectae rationali ΔE adplicata sunt. quare utraque ΔM , MH rationalis est et rectae ΔE longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. et quoniam $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$ et $2 A\Gamma \times \Gamma B$ incommensurabilia sunt, ΔA et MZ incommensurabilia sunt. quare etiam ΔM , MH incommensurabiles sunt [VI, 1; prop. XI]. itaque ΔM , MH rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo ΔH ex duobus nominibus est [prop. XXXVI].

iam dico, eandem sextam esse.

iam rursus similiter demonstrabimus, esse $\Delta K \times KM = MN^2$, et ΔK , KM longitudine incommensurabiles esse. eadem igitur de causa ΔM^2 excedit MH^2 quadrato rectae sibi longitudine incommensurabilis [prop. XVIII]. et neutra rectarum ΔM , MH rectae rationali propositae ΔE longitudine commensurabilis est.

Theon (BFVb).
Theon (BFVb).
in KMH m. 2.
sed corr.

$\piάλιν$] om. V. Deinde add. τοῖς πρὸ τούτου
 $\delta\tau\iota$] supra scr. F. 21. KM] MH F, corr.
22. διὰ τὰυτα BV. 23. συμμέτρον BF,
sed corr.

Ἡ ΔH ἄρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶν ἑκτη· ὅπερ
ἔδει δεῖξαι.

ξς'.

Ἡ $\tau\eta$ ἐκ δύο ὀνομάτων μήκει σύμμετρος καὶ
5 αὐτὴ ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ καὶ $\tau\eta$ τάξει ἡ
αὐτὴ.

Ἐστω ἐκ δύο ὀνομάτων ἡ AB , καὶ $\tau\eta$ AB μήκει
σύμμετρος ἔστω ἡ $\Gamma\Delta$. λέγω, ὅτι ἡ $\Gamma\Delta$ ἐκ δύο ὀνο-
μάτων ἐστὶ καὶ $\tau\eta$ τάξει ἡ αὐτὴ $\tau\eta$ AB .

10 Ἐπεὶ γὰρ ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶν ἡ AB , διηρησθῶ
εἰς τὰ ὀνόματα κατὰ τὸ E , καὶ ἔστω μείζων ὄνομα το
 AE . αἱ AE , EB ἄρα φηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμ-
μετροι. γεγονέτω ὥς ἡ AB πρὸς τὴν $\Gamma\Delta$, οὕτως ἡ
 AE πρὸς τὴν ΓZ . καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ EB πρὸς λοιπὴν
15 τὴν $Z\Delta$ ἐστίν, ὥς ἡ AB πρὸς τὴν $\Gamma\Delta$. σύμμετρος
δὲ ἡ AB $\tau\eta$ $\Gamma\Delta$ μήκει· σύμμετρος ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ μὲν
 AE $\tau\eta$ ΓZ , ἡ δὲ EB $\tau\eta$ $Z\Delta$. καὶ εἰσι φηταὶ αἱ AE ,
 EB . φηταὶ ἄρα εἰσὶ καὶ αἱ ΓZ , $Z\Delta$. καὶ [ἐπεὶ] ἐστίν
ὥς ἡ AE πρὸς ΓZ , ἡ EB πρὸς $Z\Delta$. ἐναλλὰξ ἄρα
20 ἐστὶν ὥς ἡ AE πρὸς EB , ἡ ΓZ πρὸς $Z\Delta$. αἱ δὲ
 AE , EB δυνάμει μόνον [εἰσὶ] σύμμετροι· καὶ αἱ ΓZ ,
 $Z\Delta$ ἄρα δυνάμει μόνον εἰσὶ σύμμετροι. καὶ εἰσι φηταί·
ἐκ δύο ἄρα ὀνομάτων ἐστὶν ἡ $\Gamma\Delta$.

Λέγω δὴ, ὅτι $\tau\eta$ τάξει ἐστὶν ἡ αὐτὴ $\tau\eta$ AB .

1. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. BFVb. 5. ἐστὶν P.
ἡ] m. 2 B. 7. ἡ — 8. ὀνομάτων] mg. m. 2 B. 11. ὄνομα]
om. V. 14. ΓZ] mut. in BZ b. καί] in ras. V. 15.
 $Z\Delta$] ΔZ FV. $\Gamma\Delta$] corr. ex $E\Delta$ F. σύμμετρος — 16.
μήκει] m. 2 B. 16. ἐστὶ] om. b, m. 2 B. 17. $Z\Delta$] corr.
ex ΔZ V. αἱ AE , EB] mg. m. 2 V. 18. εἰσὶν B. ἐπεὶ]
om. P. 19. πρὸς ΓZ — 20. AE] mg. m. 2 B. 19. τὴν ΓZ
BV. ΓZ — πρὸς] supra scr. F. τὴν $Z\Delta$ V. ἄρα] om. F.

Ergo ΔH ex duobus nominibus sexta est [deff. alt. 6]; quod erat demonstrandum.

LXVI.

Recta rectae ex duobus nominibus longitudine commensurabilis et ipsa ex duobus nominibus est et ordine eadem.

Sit AB ex duobus nominibus, et $\Gamma\Delta$ rectae AB longitudine commensurabilis sit. dico, $\Gamma\Delta$ ex duobus nominibus esse et ordine eandem ac AB .

nam quoniam AB ex duobus nominibus est, in E in nomina diuidatur, et maius nomen sit AE . itaque AE , EB rationales sunt potentia tantum commensurabiles [prop. XXXVI]. fiat [VI, 12] $AB:\Gamma\Delta = AE:\Gamma Z$. itaque etiam $EB:Z\Delta = AB:\Gamma\Delta$ [V, 16; V, 19 coroll.]. uerum AB , $\Gamma\Delta$ longitudine commensurabiles sunt. itaque etiam AE , ΓZ et EB , $Z\Delta$ longitudine commensurabiles sunt [prop. XI]. et AE , EB rationales sunt. itaque etiam ΓZ , $Z\Delta$ rationales sunt. est autem $AE:\Gamma Z = EB:Z\Delta$ [V, 11]. itaque permutando [V, 16] $AE:EB = \Gamma Z:Z\Delta$. uerum AE , EB potentia tantum commensurabiles sunt. itaque etiam ΓZ , $Z\Delta$ potentia tantum commensurabiles sunt [prop. XI]. et sunt rationales. ergo $\Gamma\Delta$ ex duobus nominibus est [prop. XXXVI].

iam dico, eam ordine eandem esse ac AB .

20. οὐτως ἡ ΓZ V. 21. ἐστὶ] om. P. 23. $\Gamma\Delta$] Δ in ras. V. 24. $\delta\eta$] om. V. $\delta\tau\iota$] $\delta\tau\iota$ καὶ BFV.

Ἡ γὰρ AE τῆς EB μείζον δύναται ἥτοι τῷ ἀπὸ
 συμμέτρου ἑαυτῇ ἢ τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου. εἰ μὲν οὖν
 ἡ AE τῆς EB μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου
 ἑαυτῇ, καὶ ἡ ΓZ τῆς $Z\Delta$ μείζον δυνήσεται τῷ ἀπὸ
 5 συμμέτρου ἑαυτῇ. καὶ εἰ μὲν σύμμετρός ἐστιν ἡ AE
 τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ, καὶ ἡ ΓZ σύμμετρος αὐτῇ ἔσται,
 καὶ δια τοῦτο ἑκατέρα τῶν $AB, \Gamma\Delta$ ἐκ δύο ὀνομάτων
 ἐστὶ πρώτη, τουτέστι τῇ τάξει ἡ αὐτή. εἰ δὲ ἡ EB
 σύμμετρός ἐστὶ τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ, καὶ ἡ $Z\Delta$ σύμ-
 10 μετρός ἐστὶν αὐτῇ, καὶ διὰ τοῦτο πάλιν τῇ τάξει ἡ
 αὐτὴ ἔσται τῇ AB . ἑκατέρα γὰρ αὐτῶν ἔσται ἐκ δύο
 ὀνομάτων δευτέρα. εἰ δὲ οὐδετέρα τῶν AE, EB σύμ-
 μετρός ἐστὶ τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ, οὐδετέρα τῶν $\Gamma Z, Z\Delta$
 σύμμετρος αὐτῇ ἔσται, καὶ ἐστὶν ἑκατέρα τρίτη. εἰ δὲ
 15 ἡ AE τῆς EB μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου
 ἑαυτῇ, καὶ ἡ ΓZ τῆς $Z\Delta$ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσυμ-
 μέτρου ἑαυτῇ. καὶ εἰ μὲν ἡ AE σύμμετρός ἐστὶ τῇ
 ἐκκειμένῃ ῥητῇ, καὶ ἡ ΓZ σύμμετρός ἐστὶν αὐτῇ, καὶ
 ἐστὶν ἑκατέρα τετάρτη. εἰ δὲ ἡ EB , καὶ ἡ $Z\Delta$, καὶ
 20 ἔσται ἑκατέρα πέμπτη. εἰ δὲ οὐδετέρα τῶν AE, EB ,
 καὶ τῶν $\Gamma Z, Z\Delta$ οὐδετέρα σύμμετρός ἐστὶ τῇ ἐκκει-
 μένῃ ῥητῇ, καὶ ἔσται ἑκατέρα ἕκτη.

Ὡστε ἡ τῇ ἐκ δύο ὀνομάτων μήκει σύμμετρος ἐκ

1. AE] corr. ex AB m. 2 F. τῆς] corr. ex τῇ m. 2 F.
 2. ἀσυμμέτρου] corr. ex συμμέτρου m. 2 B. εἰ] corr. ex
 ἡ V. 3. τῆς] corr. ex τῇ m. 2 F. ἀσυμμέτρου b, ἀ- supra
 add. m. 2 F. 4. τῆς] corr. ex τῇ m. 2 V. ΔZ V. δυν-
 ηήσεται b. 5. ἀσυμμέτρου F b. 7. $\Gamma\Delta$] postea add. F, dein
 del. B Γ. 8. εἰ] postea ins. F. 9. ΔZ F b. 10. Post
 ἐστὶν del. ἡ m. 1 F. τοῦτο] corr. ex τοῦ m. 2 F. 11. ἔσται]
 (alt.) ἐστὶ b, om. V. 12. ἐστὶ δευτέρα V. δ' F. 13. οὐδὲ
 οὐδετέρα BF. 14. τρίτη] ῥητὴ b. εἰ δὲ ἡ] ἡ δὲ b. 15.
 τῆς] corr. ex τῇ m. 2 F. συμμέτρου BF, sed corr. 16. $Z\Delta$]

nam AE^2 excedit EB^2 aut quadrato rectae sibi commensurabilis aut incommensurabilis. iam si AE^2 excedit EB^2 quadrato rectae sibi commensurabilis, etiam ΓZ^2 excedet $Z\Delta^2$ quadrato rectae sibi commensurabilis [prop. XIV]. et siue AE rationali propositae commensurabilis est, etiam ΓZ ei commensurabilis erit [prop. XII]; quare utraque AB , $\Gamma\Delta$ ex duobus nominibus prima est [deff. alt. 1], hoc est ordine eadem. siue EB rationali propositae commensurabilis est, etiam $Z\Delta$ ei commensurabilis est [prop. XII]; quare rursus ordine eadem erit ac AB ; nam utraque earum ex duobus nominibus secunda erit [deff. alt. 2]. siue neutra rectarum AE , EB rationali propositae commensurabilis est, neutra rectarum ΓZ , $Z\Delta$ ei commensurabilis est [prop. XIII], et utraque tertia est [deff. alt. 3]. sin AE^2 excedit EB^2 quadrato rectae sibi incommensurabilis, etiam ΓZ^2 excedit $Z\Delta^2$ quadrato rectae sibi incommensurabilis [prop. XIV]. et siue AE rationali propositae commensurabilis est, etiam ΓZ ei commensurabilis est [prop. XII], et utraque quarta est [deff. alt. 4]. siue EB , etiam $Z\Delta$ commensurabilis est, et utraque quinta est [deff. alt. 5]. siue neutra rectarum AE , EB , etiam neutra rectarum ΓZ , $Z\Delta$ rectae rationali propositae commensurabilis est, et utraque sexta est [deff. alt. 6].

Quare recta rectae ex duobus nominibus longitu-

ΔZ F. $\delta\upsilon\nu\eta\sigma\epsilon\tau\alpha\iota$ Theon (BFVb). $\sigma\upsilon\mu\mu\epsilon\tau\rho\omicron\nu$ BF, sed corr. 17. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ — 18. $\acute{\epsilon}\eta\tau\eta\eta$] e corr. F. 19. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$] supra scr. m. 1 P, $\acute{\epsilon}\sigma\tau\alpha\iota$ FVb. η] (prius) m. 2 P. $\kappa\alpha\iota \acute{\epsilon}\sigma\tau\alpha\iota \acute{\epsilon}\nu\alpha\tau\acute{\epsilon}\rho\alpha \pi\acute{\epsilon}\mu\mu\eta\tau\eta$] mg. m. 1 P.

δύο ὀνομάτων ἐστὶ καὶ τῇ τάξει ἢ αὐτῇ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

ξξ'.

Ἡ τῇ ἐκ δύο μέσων μήκει σύμμετρος καὶ
5 αὐτῇ ἐκ δύο μέσων ἐστὶ καὶ τῇ τάξει ἢ αὐτῇ.

Ἐστω ἐκ δύο μέσων ἡ AB , καὶ τῇ AB σύμμετρος
ἔστω μήκει ἡ $\Gamma\Delta$ · λέγω, ὅτι ἡ $\Gamma\Delta$ ἐκ δύο μέσων ἐστὶ
καὶ τῇ τάξει ἢ αὐτῇ τῇ AB .

Ἐπεὶ γὰρ ἐκ δύο μέσων ἐστὶν ἡ AB , διηρησθῶ
10 εἰς τὰς μέσας κατὰ τὸ E · αἱ AE , EB ἄρα μέσαι εἰσὶ
δυνάμει μόνον σύμμετροι. καὶ γεροντέω ὥς ἡ AB
πρὸς $\Gamma\Delta$, ἡ AE πρὸς ΓZ · καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ EB
πρὸς λοιπὴν τὴν $Z\Delta$ ἐστίν, ὥς ἡ AB πρὸς $\Gamma\Delta$.
σύμμετρος δὲ ἡ AB τῇ $\Gamma\Delta$ μήκει· σύμμετρος ἄρα
15 καὶ ἑκατέρω τῶν AE , EB ἑκατέρω τῶν ΓZ , $Z\Delta$.
μέσαι δὲ αἱ AE , EB μέσαι ἄρα καὶ αἱ ΓZ , $Z\Delta$. καὶ
ἐπεὶ ἐστίν ὥς ἡ AE πρὸς EB , ἡ ΓZ πρὸς $Z\Delta$, αἱ
δὲ AE , EB δυνάμει μόνον σύμμετροί εἰσιν, καὶ αἱ
 ΓZ , $Z\Delta$ [ἄρα] δυνάμει μόνον σύμμετροί εἰσιν. ἐδείχ-
20 θησαν δὲ καὶ μέσαι· ἡ $\Gamma\Delta$ ἄρα ἐκ δύο μέσων ἐστίν.

Λέγω δὴ, ὅτι καὶ τῇ τάξει ἢ αὐτῇ ἐστὶ τῇ AB .

Ἐπεὶ γὰρ ἐστίν ὥς ἡ AE πρὸς EB , ἡ ΓZ πρὸς
 $Z\Delta$, καὶ ὥς ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς AE πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν
 AEB , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΓZ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $\Gamma Z\Delta$.
25 ἐναλλάξ ὥς τὸ ἀπὸ τῆς AE πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΓZ ,


1. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] om. B F V b. 3. ξξ'] ξ' in ras. F. 4.
τῇ] m. 2 B. καὶ αὐτῇ] om. Theon (B F V b). 7. ἡ $\Gamma\Delta$
μήκει V. 8. AB] $B\Delta$ P. 9. διηρημένη Theon (B F V b).
10. εἰς] ἐς V. AE] EA P. εἰσὶν P. 12. τὴν $\Gamma\Delta$ V.
τὴν ΓZ V. 13. $Z\Delta$] in ras. V, ΔZ B. τὴν $\Gamma\Delta$ V. 14.
ἀσύμμετρος δέ b, sed corr. 15. καὶ ἡ μὲν AE τῇ ΓZ (Z F F),
ἡ δὲ EB τῇ $Z\Delta$ (corr. ex ΔZ V) Theon (B F V b). 16. μέσαι
δέ] καὶ εἰσι μέσαι Theon (B F V b). καὶ αἱ] καὶ b. 17. AE]

dine commensurabilis ex duobus nominibus est et ordine eadem; quod erat demonstrandum.

LXVII.

Recta rectae ex duabus mediis longitudine commensurabilis et ipsa ex duabus mediis est et ordine eadem.

Sit AB ex duabus mediis, et rectae AB longitudine commensurabilis sit $\Gamma\Delta$. dico, $\Gamma\Delta$ ex duabus mediis esse et ordine eandem ac AB .

 nam quoniam AB ex duabus mediis est, in E in medias diuidatur. AE, EB igitur mediae sunt potentia tantum commensurabiles. et fiat $AB : \Gamma\Delta = AE : \Gamma Z$ [VI, 12]. itaque etiam [V, 19 coroll.; V, 16] $EB : Z\Delta = AB : \Gamma\Delta$. uerum $AB, \Gamma\Delta$ longitudine commensurabiles sunt; itaque etiam utraque AE, EB utrique $\Gamma Z, Z\Delta$ commensurabilis est [prop. XI]. uerum AE, EB mediae sunt. itaque etiam $\Gamma Z, Z\Delta$ mediae sunt [prop. XXIII]. et quoniam est $AE : EB = \Gamma Z : Z\Delta$, et AE, EB potentia tantum commensurabiles sunt, etiam $\Gamma Z, Z\Delta$ potentia tantum commensurabiles sunt [prop. XI]. demonstrauius autem, easdem medias esse. ergo $\Gamma\Delta$ ex duabus mediis est.

iam dico, etiam ordine eam eandem esse ac AB .

nam quoniam est $AE : EB = \Gamma Z : Z\Delta$, erit etiam [prop. XXI lemma] $AE^2 : AE \times EB = \Gamma Z^2 : \Gamma Z \times Z\Delta$.

AB B. $\tau\eta\nu EB$ V. $\tau\eta\nu Z\Delta$ V. 18. $\epsilon\iota\sigma\iota$ $\sigma\acute{\upsilon}\mu\mu\epsilon\tau\rho\omicron\iota$ BFVb.

19. $\acute{\alpha}\rho\alpha$] om. P. $\epsilon\iota\sigma\iota$ $\sigma\acute{\upsilon}\mu\mu\epsilon\tau\rho\omicron\iota$ BFVb. 20. $\Delta \Gamma$ F. $\epsilon\iota\sigma\iota$ BVb, comp. F. 22. $\tau\eta\nu EB$ BV. $\omicron\upsilon\tau\omega\varsigma \eta$ F. ΓZ $\Gamma\Delta$ F.

23. $\tau\eta\nu Z\Delta$ V, $Z\Delta$ F. 24. ΓZ] $Z\Gamma$ F. $\Gamma Z\Delta$ supra scr. Z m. 2 V. 25. $\acute{\alpha}\rho\alpha$ $\acute{\omega}\varsigma$ F.

οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΕΒ$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $ΓΖΔ$.
 σύμμετρον δὲ τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΕ$ τῷ ἀπὸ τῆς $ΓΖ$ · σύμ-
 μετρον ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΕΒ$ τῷ ὑπὸ τῶν $ΓΖΔ$.
 εἴτε οὖν ρητόν ἐστι τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΕΒ$, καὶ τὸ ὑπο
 5 τῶν $ΓΖΔ$ ρητόν ἐστιν [καὶ διὰ τοῦτο ἐστιν ἐκ δύο
 μέσων πρώτη]. εἴτε μέσον, μέσον, καὶ ἐστιν ἑκατέρω
 δευτέρα.

Καὶ διὰ τοῦτο ἔσται ἡ $ΓΔ$ τῇ $ΑΒ$ τῇ τάξει ἡ
 αὐτῇ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

10 ξη'.

Ἡ τῇ μείζονι σύμμετρος καὶ αὐτὴ μείζων
 ἐστίν.

Ἐστω μείζων ἡ $ΑΒ$, καὶ τῇ $ΑΒ$ σύμμετρος ἔστω
 ἡ $ΓΔ$ · λέγω, ὅτι ἡ $ΓΔ$ μείζων ἐστίν.

15 Διηγήσθω ἡ $ΑΒ$ κατὰ τὸ $Ε$ · αἱ $ΑΕ$, $ΕΒ$ ἄρα
 δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὸ μὲν συγκείμενον
 ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων ρητόν, τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν
 μέσον· καὶ γερονέτω τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον. καὶ ἐπεὶ
 ἐστὶν ὡς ἡ $ΑΒ$ πρὸς τὴν $ΓΔ$, οὕτως ἡ τε $ΑΕ$ πρὸς
 20 τὴν $ΓΖ$ καὶ ἡ $ΕΒ$ πρὸς τὴν $ΖΔ$, καὶ ὡς ἄρα ἡ $ΑΕ$
 πρὸς τὴν $ΓΖ$, οὕτως ἡ $ΕΒ$ πρὸς τὴν $ΖΔ$. σύμμετρος
 δὲ ἡ $ΑΒ$ τῇ $ΓΔ$ · σύμμετρος ἄρα καὶ ἑκατέρω τῶν
 $ΑΕ$, $ΕΒ$ ἑκατέρω τῶν $ΓΖ$, $ΖΔ$. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ
 $ΑΕ$ πρὸς τὴν $ΓΖ$, οὕτως ἡ $ΕΒ$ πρὸς τὴν $ΖΔ$, καὶ
 25 ἐναλλάξ ὡς ἡ $ΑΕ$ πρὸς $ΕΒ$, οὕτως ἡ $ΓΖ$ πρὸς $ΖΔ$,
 καὶ συνθέντι ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ $ΑΒ$ πρὸς τὴν $ΒΕ$, οὕτως

1. $ΓΖΔ$] $Δ$ in ras. m. 1 b; $ΓΔΖ$ P, γρ. $ΓΖΔ$ mg. m. 1.

2. δέ] corr. ex ἄρα m. 2 F. τό — 3. ἄρα] mg. m. 2 F. 4.
 ἐστὶν B. 5. ἔσται BFb. καὶ — 6. πρώτη] om. P. 5. ἐστὶν]
 comp. post ras. 1 litt. F, ἔσται V. 6. εἴτε μέσον τὸ ὑπὸ τῶν
 $ΑΕΒ$, μέσον καὶ τὸ ὑπὸ τῶν $ΓΖΔ$ Theon (BFVb). 8. ἔσται]

permutando [V, 16] erit $AE^2: \Gamma Z^2 = AE \times EB: \Gamma Z \times ZA$.
 uerum AE^2 , ΓZ^2 commensurabilia sunt. itaque etiam
 $AE \times EB$, $\Gamma Z \times ZA$ commensurabilia sunt [prop.
 XI]. itaque siue $AE \times EB$ rationale est, etiam
 $\Gamma Z \times ZA$ rationale est; siue medium, medium est
 [prop. XXIII coroll.], et utraque secunda est [prop.
 XXXVII—XXXVIII].


Ea de causa ΓA ordine eadem erit ac AB ; quod
 erat demonstrandum.

LXVIII.

Recta maiori commensurabilis et ipsa maior erit.

Sit AB maior, et rectae AB commensurabilis sit
 ΓA . dico, ΓA maiorem esse.

diuidatur AB in E . itaque AE , EB potentia in-
 commensurabiles sunt efficientes summam quadratorum
 rationalem, rectangulum autem medium [prop. XXXIX],
 et fiant eadem, quae antea. et quoniam est



$AB: \Gamma A = AE: \Gamma Z$ et $AB: \Gamma A = EB: Z \Delta$
 [cfr. p. 204, 11 sq.], erit etiam $AE: \Gamma Z = EB: Z \Delta$
 [V, 11]. uerum AB , ΓA commensurabiles
 sunt. quare etiam utraque AE , EB utrique
 ΓZ , $Z \Delta$ commensurabilis est [prop. XI]. et

om. Vb. καὶ ἡ B F Vb. ΓA] $A \Delta$ b. 9. ὅπερ ἔδει δεῖξαι]
 comp. P, om. B F Vb. 10. ξη'] ξ seq. ras. 1 litt. F. 11.
 μέλ[ονι] o eras. b. 14. ὅτι καὶ B F b. ΓA] Δ post ras. 1
 litt. b. ἐστὶ PV, comp. F b; ἐστὶ καὶ B. 15. $A E$] corr. ex
 AB F. EB] m. rec. P. ἄρα] m. 2 F. 17. δ'] δέ F.
 ὑπ' αὐτῶν] corr. ex ὑπὸ τῶν m. 1 P. 18. καὶ γεγρονέτω]
 γεγρονέτω γάρ P. 19. τε] om. F. 20. EB] BE' F. τήν]
 om. P. καὶ ὥς ἄρα] ἐστὶν ἄρα καὶ ὥς in ras. V. ἡ AE — 21.
 $Z \Delta$] in ras. V. 21. ΓZ] EB V. EB] ΓZ V. τήν] om.
 Bb. 22. AB] corr. ex EB m. 2 F. 24. τήν] (alt.) om. P.
 25. τήν EB V. τήν $Z \Delta$ V.

ἡ $\Gamma\Delta$ πρὸς τὴν ΔZ · καὶ ὥς ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς AB
 πρὸς τὸ ἀπο τῆς BE , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς $\Gamma\Delta$ πρὸς τὸ
 ἀπὸ τῆς ΔZ . ὁμοίως δὴ δείξομεν, ὅτι καὶ ὥς τὸ ἀπὸ
 τῆς AB πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς AE , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς $\Gamma\Delta$
 5 πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΓZ . καὶ ὥς ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς AB
 πρὸς τὰ ἀπὸ τῶν AE, EB , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς $\Gamma\Delta$
 πρὸς τὰ ἀπὸ τῶν $\Gamma Z, Z\Delta$ · καὶ ἐναλλάξ ἄρα ἐστὶν
 ὡς τὸ ἀπο τῆς AB πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $\Gamma\Delta$, οὕτως τὰ
 ἀπὸ τῶν AE, EB πρὸς τὰ ἀπὸ τῶν $\Gamma Z, Z\Delta$. σύμ-
 10 μετρον δὲ τὸ ἀπὸ τῆς AB τῷ ἀπὸ τῆς $\Gamma\Delta$ · σύμμετρα
 ἄρα καὶ τὰ ἀπὸ τῶν AE, EB τοῖς ἀπὸ τῶν $\Gamma Z, Z\Delta$.
 καὶ ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν AE, EB ἅμα ῥητόν, καὶ τὰ ἀπὸ
 τῶν $\Gamma Z, Z\Delta$ ἅμα ῥητόν ἐστὶν. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ δις
 ὑπο τῶν AE, EB σύμμετρόν ἐστὶ τῷ δις ὑπὸ τῶν
 15 $\Gamma Z, Z\Delta$. καὶ ἐστὶ μέσον τὸ δις ὑπὸ τῶν AE, EB .
 μέσον ἄρα καὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν $\Gamma Z, Z\Delta$. αἱ $\Gamma Z, Z\Delta$
 ἄρα δυνάμει ἀσύμμετροί εἰσι ποιοῦσαι τὸ μὲν συγκεί-
 μενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων ἅμα ῥητόν, τὸ
 δὲ δις ὑπ' αὐτῶν μέσον· ὅλη ἄρα ἡ $\Gamma\Delta$ ἄλογός ἐστιν
 20 ἡ καλουμένη μείζων.

Ἡ ἄρα τῇ μείζονι σύμμετρος μείζων ἐστίν· ὅπερ
 εἶδει δεῖξαι.

ξθ'.

Ἡ τῇ ῥητόν καὶ μέσον δυναμένη σύμμετρος
 25 [καὶ αὐτῇ] ῥητόν καὶ μέσον δυναμένη ἐστίν.

1. τὴν ΔZ] ΔB mut. in ΔZ m. rec. P; τὴν $Z\Delta$ FV. 3.
 ΔZ] $Z\Delta$ F. 4. τὸ ἀπὸ τῆς $\Gamma\Delta$ πρὸς] m. rec. P. 5. τό] (alt.)
 e corr. V. 6. τὰ] τό Fb, et B, corr. m. 2. 7. τὰ] τό PFb,
 et B, sed corr. ΓZ] $\Gamma\Delta$ F. 8. τὰ] τό F, et B, sed corr.
 9. τὰ] τό F, et B, sed corr. ΓZ] $\bar{E}Z$ b, et F, sed corr.;
 Γ in ras. B. 11. AE] A e corr. b. ΓZ] EZ b, et F, sed
 corr. 12. τὰ] τό F. τὰ] τό PF. 13. ἐστὶν V. 15. καὶ

quoniam est $AE: \Gamma Z = EB: ZA$ et permutando [V, 16] $AE: EB = \Gamma Z: ZA$, etiam componendo erit [V, 18] $AB: BE = \Gamma A: AZ$. quare etiam $AB^2: BE^2 = \Gamma A^2: AZ^2$ [VI, 20]. iam similiter demonstrabimus, esse etiam

$$AB^2: AE^2 = \Gamma A^2: \Gamma Z^2.$$

quare etiam $AB^2: AE^2 + EB^2 = \Gamma A^2: \Gamma Z^2 + ZA^2$. permutando igitur [V, 16]

$$AB^2: \Gamma A^2 = AE^2 + EB^2: \Gamma Z^2 + ZA^2.$$

uerum $AB^2, \Gamma A^2$ commensurabilia sunt. itaque etiam $AE^2 + EB^2$ et $\Gamma Z^2 + ZA^2$ commensurabilia sunt [prop. XI]. et $AE^2 + EB^2$ rationale est, et¹⁾ $\Gamma Z^2 + ZA^2$ rationale. eodem modo etiam $2AE \times EB$ et $2\Gamma Z \times ZA$ commensurabilia sunt. et $2AE \times EB$ medium est. itaque etiam $2\Gamma Z \times ZA$ medium est [prop. XXIII coroll.]. itaque $\Gamma Z, ZA$ potentia incommensurabiles sunt [prop. XIII; cfr. p. 206, 15 et 22] efficientes summam quadratorum rationalem, rectangulum autem medium. itaque tota ΓA irrationalis est maior, quae uocatur [prop. XXXIX].

Ergo recta maiori commensurabilis maior est; quod erat demonstrandum.

LXIX.

Recta rectae spatio rationali et medio aequali quadratae commensurabilis ipsa spatio rationali et medio quadrata aequalis est.

1) Post ZA lin. 13 Augustus non male addidit $\alpha\theta\alpha$.

$\epsilon\sigma\tau\iota \mu\acute{\epsilon}\sigma\sigma\omicron\nu$] $\mu\acute{\epsilon}\sigma\sigma\omicron\nu$ δέ V. 16. ΓZ] supra add. E b. ΓZ] Γ in ras. m. 2 P, supra scr. E b. 17. $\epsilon\lambda\omicron\nu \acute{\alpha}\sigma\acute{\upsilon}\mu\mu\epsilon\tau\omicron\iota$ BFVb. $\epsilon\lambda\omicron\nu$ P. 19. $\eta \delta\lambda\eta$ Vb. 21. $\delta\pi\epsilon\rho \xi\delta\epsilon\iota \delta\epsilon\iota\chi\alpha\iota$] comp. P, om. BFVb. 24. $\phi\eta\tau\omicron\nu$] -ον in ras. B. 25. $\kappa\alpha\iota \acute{\alpha}\nu\tau\eta$] om. P.

Euclides, edd. Heiberg et Menge. III.

Ἐστω ρητὸν καὶ μέσον δυναμένη ἡ AB , καὶ τῇ AB σύμμετρος ἔστω ἡ $\Gamma\Delta$. δεικτέον, ὅτι καὶ ἡ $\Gamma\Delta$ ρητὸν καὶ μέσον δυναμένη ἐστίν.

- Διηρησθῶ ἡ AB εἰς τὰς εὐθείας κατὰ τὸ E . αἱ
 5 AE , EB ἄρα δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὸ
 μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγ' ὧν μέσον,
 τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν ρητόν. καὶ τὰ αὐτὰ κατασκευασθῶ
 τοῖς πρότερον. ὁμοίως δὲ δειξόμεν, ὅτι καὶ αἱ ΓZ ,
 $Z\Delta$ δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι, καὶ σύμμετρον τὸ μὲν
 10 συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AE , EB τῷ συγκειμένῳ
 ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΓZ , $Z\Delta$, τὸ δὲ ὑπὸ AE , EB τῷ ὑπὸ
 ΓZ , $Z\Delta$ ὥστε καὶ τὸ [μὲν] συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ
 τῶν ΓZ , $Z\Delta$ τετραγώνων ἐστὶ μέσον, τὸ δ' ὑπὸ τῶν
 ΓZ , $Z\Delta$ ρητόν.
 15 Ῥητὸν ἄρα καὶ μέσον δυναμένη ἐστὶν ἡ $\Gamma\Delta$. ὅπερ
 εἶδει δεῖξαι.

ο'.

Ἡ τῇ δύο μέσα δυναμένη σύμμετρος δύο
 μέσα δυναμένη ἐστίν.

- 20 Ἐστω δύο μέσα δυναμένη ἡ AB , καὶ τῇ AB
 σύμμετρος ἡ $\Gamma\Delta$. δεικτέον, ὅτι καὶ ἡ $\Gamma\Delta$ δύο μέσα
 δυναμένη ἐστίν.

- Ἐπεὶ γὰρ δύο μέσα δυναμένη ἐστὶν ἡ AB , διη-
 ρησθῶ εἰς τὰς εὐθείας κατὰ τὸ E . αἱ AE , EB ἄρα
 25 δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὸ τε συγκείμενον

1. καὶ τῇ AB] supra scr. m. 1 F. 2. δεικτέον] λέγω V.
 3. ἐστὶ B, comp. Fb. 7. δέ F. κατασκευασθῶ b. 8.
 αἱ] ἡ V. 11. δ' P. τῶν AE V. 12. τῶν ΓZ (corr. ex
 ΓH) V. μέν] om. P. 13. τετραγώνων P. δέ F. 15.
 ὅπερ εἶδει δεῖξαι] comp. P, om. BF Vb. 17. ο'] seq. ras. 1
 litt. F. 18. καὶ αὐτῇ δύο V. 21. ἡ] ἔστω ἡ V. δεικτέον]
 λέγω V. δὴ ὅτι B. 24. κατὰ τὸ E εἰς τὰς εὐθείας V. εὐ-
 θείας] m. 2 B.

Sit AB spatio rationali et medio aequalis quadrata, et rectae AB commensurabilis sit $\Gamma\Delta$. demonstrandum, etiam $\Gamma\Delta$ spatio rationali et medio aequalem esse quadratam.

$\begin{array}{c} A \\ | \\ \Gamma \\ | \\ Z \\ | \\ E \\ | \\ \Delta \\ | \\ B \end{array}$
 diuidatur AB in rectas in E ; itaque AE , EB potentia incommensurabiles sunt efficientes summam quadratorum mediam, rectangulum autem rationale [prop. XL]; et comparentur eadem, quae antea. iam similiter demonstrabimus, ΓZ , $Z\Delta$ potentia incommensurabiles esse et $AE^2 + EB^2$, $\Gamma Z^2 + Z\Delta^2$ commensurabilia et $AE \times EB$, $\Gamma Z \times Z\Delta$ commensurabilia. quare etiam $\Gamma Z^2 + Z\Delta^2$ medium est, $\Gamma Z \times Z\Delta$ autem rationale.

Ergo $\Gamma\Delta$ spatio rationali et medio aequalis est quadrata; quod erat demonstrandum.

LXX.

- Recta rectae duobus spatiis mediis aequali quadratae commensurabilis ipsa duobus spatiis mediis quadrata est aequalis.

Sit AB duobus spatiis mediis aequalis quadrata, et rectae AB commensurabilis $\Gamma\Delta$. demonstrandum, etiam $\Gamma\Delta$ duobus spatiis mediis aequalem esse quadratam.

$\begin{array}{c} A \\ | \\ \Gamma \\ | \\ Z \\ | \\ E \\ | \\ \Delta \\ | \\ B \end{array}$
 nam quoniam AB duobus spatiis mediis aequalis est quadrata, in E in rectas diuidatur. itaque AE , EB potentia incommensurabiles sunt efficientes summam quadratorum mediam et rectangulum medium et praeterea $AE^2 + EB^2$, $AE \times EB$ incommensurabilia [prop. XLI];

ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν [τετραγώνων] μέσον καὶ τὸ ὑπ' αὐτῶν μέσον καὶ ἔτι ἀσύμμετρον τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AE , EB τετραγώνων τῷ ὑπὸ τῶν AE , EB · καὶ κατεσκευάσθω τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον. ὁμοίως
 5 δὴ δεῖξομεν, ὅτι καὶ αἱ ΓZ , $Z\Delta$ δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι καὶ σύμμετρον τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AE , EB τῷ συγκειμένῳ ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΓZ , $Z\Delta$, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν AE , EB τῷ ὑπὸ τῶν ΓZ , $Z\Delta$ ὥστε καὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΓZ , $Z\Delta$
 10 τετραγώνων μέσον ἐστὶ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΓZ , $Z\Delta$ μέσον καὶ ἔτι ἀσύμμετρον τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΓZ , $Z\Delta$ τετραγώνων τῷ ὑπὸ τῶν ΓZ , $Z\Delta$.

Ἡ ἄρα $\Gamma\Delta$ δύο μέσα δυναμένη ἐστίν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

15

οα'.

Ῥητοῦ καὶ μέσου συντιθεμένου τέσσαρες ἄλλοιοι γίνονται ἥτοι ἐκ δύο ὀνομάτων ἢ ἐκ δύο μέσων πρώτη ἢ μελίων ἢ ῥητὸν καὶ μέσον δυναμένη.

20 Ἐστω ῥητὸν μὲν τὸ AB , μέσον δὲ τὸ $\Gamma\Delta$ · λέγω, ὅτι ἢ τὸ $\Delta\Delta$ χωρίον δυναμένη ἦτοι ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶν ἢ ἐκ δύο μέσων πρώτη ἢ μελίων ἢ ῥητὸν καὶ μέσον δυναμένη.

Τὸ γὰρ AB τοῦ $\Gamma\Delta$ ἦτοι μεῖζόν ἐστὶν ἢ ἔλασσον.
 25 ἔστω πρότερον μεῖζον· καὶ ἐκκείσθω ῥητὴ ἢ EZ , καὶ παραβεβλήσθω παρὰ τὴν EZ τῷ AB ἴσον τὸ EH πλάτος ποιοῦν τὴν $E\Theta$ · τῷ δὲ $\Delta\Gamma$ ἴσον παρὰ τὴν EZ

1. τετραγώνων] om. P. ὑπ'] mut. in ἀπ' m. 2 F, ἀπ' b. 3. AE] (prius) corr. ex AB m. 2 F. 5. ΓZ] in ras. m. 1 P. 8. τὸ δέ] ὥστε καὶ τό P. 9. $\Gamma\Delta$, ΔZ P. 12. τῷ] τό V. 13. $\Gamma\Delta$ ἄρα B. $\Gamma\Delta$] Δ postea ins. V. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. B F V b. 15. οβ', β eras. F. 17. γίνονται] γίνονται B F V b et,

παραβεβλήσθω τὸ ΘI πλάτος ποιοῦν τὴν ΘK . καὶ
 ἐπεὶ ζητὸν ἐστὶ τὸ AB καὶ ἐστὶν ἴσον τῷ EH , ζητὸν
 ἄρα καὶ τὸ EH . καὶ παρὰ [ζητὴν] τὴν EZ παραβέ-
 βληται πλάτος ποιοῦν τὴν $E\Theta$. ἡ $E\Theta$ ἄρα ζητή ἐστὶ
 5 καὶ σύμμετρος τῇ EZ μήκει. πάλιν, ἐπεὶ μέσον ἐστὶ
 τὸ ΓA καὶ ἐστὶν ἴσον τῷ ΘI , μέσον ἄρα ἐστὶ καὶ
 τὸ ΘI . καὶ παρὰ ζητὴν τὴν EZ παράκειται πλάτος
 ποιοῦν τὴν ΘK . ζητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ΘK καὶ ἀσύμμετρος
 τῇ EZ μήκει. καὶ ἐπεὶ μέσον ἐστὶ τὸ ΓA , ζητὸν δὲ
 10 τὸ AB , ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ AB τῷ ΓA . ὥστε
 καὶ τὸ EH ἀσύμμετρόν ἐστὶ τῷ ΘI . ὥς δὲ τὸ EH
 πρὸς τὸ ΘI , οὕτως ἐστὶν ἡ $E\Theta$ πρὸς τὴν ΘK . ἀσύμ-
 μετρος ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ $E\Theta$ τῇ ΘK μήκει. καὶ εἰσιν
 ἀμφοτέραι ζηταί· αἱ $E\Theta$, ΘK ἄρα ζηταὶ εἰσι δυνάμει
 15 μόνον σύμμετροι· ἐκ δύο ἄρα ὀνομάτων ἐστὶν ἡ EK
 διηρημένη κατὰ τὸ Θ . καὶ ἐπεὶ μεζὸν ἐστὶ τὸ AB
 τοῦ ΓA , ἴσον δὲ τὸ μὲν AB τῷ EH , τὸ δὲ ΓA τῷ
 ΘI , μεζὸν ἄρα καὶ τὸ EH τοῦ ΘI . καὶ ἡ $E\Theta$ ἄρα
 μεζὼν ἐστὶ τῆς ΘK . ἥτοι οὖν ἡ $E\Theta$ τῆς ΘK μεζὼν
 20 δύνатаι τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἐαυτῇ μήκει ἢ τῷ ἀπὸ
 ἀσυμμέτρου. δυνάσθω πρότερον τῷ ἀπὸ συμμέτρου
 ἐαυτῇ· καὶ ἐστὶν ἡ μεζὼν ἡ ΘE σύμμετρος τῇ ἐκκει-
 μένῃ ζητῇ τῇ EZ . ἡ ἄρα EK ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ

1. ΘI] mut. in ΘH F, I eras. V. 3. καί] (prius) m. 2 F.
 [ζητὴν] om. P. 4. $E\Theta$] (prius) ΘE F. [ζητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ
 $E\Theta$ Theon (BFVb). ἐστὶν P. 6. ΘI] I in ras. F. 7.
 ΘI] I in ras. F. Post παράκειται add. Theon: τουτέστι
 (-ιν V) τὴν ΘH (BFVb). 8. ἄρα] corr. ex ἔσται F. 9.
 EZ] Z postea ins. m. 1 V. ΓA] eras. V. 11. EH] ZH
 e corr. V. ΘI] corr. ex $\Theta \Gamma$ P, I in ras. F. 12. ΘI] I
 in ras. F. 13. ἐστὶν B. 15. EK] corr. ex $E\Theta$ m. rec. b.
 16. Post Θ ras. 1 litt. B. μεζὼν V, sed corr. 18. ΘI]
 I e corr. F. καί] m. 2 F. ΘI] I in ras. F. 20. ἐαυτῇ μήκει]
 om. V. 21. ἀσυμμέτρου] συμμέτρω F, corr. m. 2; συμμέτρου B,

et $AB = EH$, etiam EH rationale est. et rectae EZ adplicatum est latitudinem efficiens $E\Theta$. itaque $E\Theta$ rationalis est et rectae EZ longitudine commensurabilis [prop. XX]. rursus quoniam ΓA medium est et $\Gamma A = \Theta I$, etiam ΘI medium est. et rectae rationali EZ adplicatum est latitudinem efficiens ΘK . itaque ΘK rationalis est et rectae EZ longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. et quoniam ΓA medium est, AB autem rationale, AB et ΓA incommensurabilia sunt. quare etiam EH , ΘI incommensurabilia sunt. uerum $EH : \Theta I = E\Theta : \Theta K$ [VI, 1]. quare etiam $E\Theta$, ΘK longitudine incommensurabiles sunt [prop. XI]. et utraque rationalis est. itaque $E\Theta$, ΘK rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo EK ex duobus nominibus est in Θ diuisa [prop. XXXVI]. et quoniam $AB > \Gamma A$ et $AB = EH$, $\Gamma A = \Theta I$, erit etiam $EH > \Theta I$. itaque etiam $E\Theta > \Theta K$ [V, 14]. iam $E\Theta^2$ excedit ΘK^2 quadrato rectae aut sibi commensurabilis aut incommensurabilis. prius excedat quadrato rectae sibi commensurabilis; et maior ΘE rationali propositae EZ commensurabilis est. ergo EK ex duobus nominibus est prima [deff. alt. 1]. EZ autem rationalis est. sin spatium recta rationali et recta ex duobus nominibus prima comprehenditur, recta spatio aequalis quadrata ex duobus nominibus est [prop. LIV]. itaque recta spatio EI aequalis quadrata ex duobus nominibus est; quare etiam recta spatio AA aequalis quadrata ex duobus nominibus est. iam uero $E\Theta^2$ excedat ΘK^2 quadrato rectae sibi incommensurabilis; et maior $E\Theta$

corr. m. 2. 22. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu \eta]$ $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ B. $E\Theta$ F. 23. $\acute{\eta}]$ m. 2 P.
 $\acute{\epsilon}\kappa]$ supra scr. b.

πρώτη. ζητῇ δὲ ἡ EZ . ἐὰν δὲ χωρίον περιέχεται ὑπὸ
 ζητῆς καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων πρώτης, ἡ τὸ χωρίον
 δυναμένη ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστίν. ἡ ἄρα το EI δυνα-
 μένη ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστίν. ὥστε καὶ ἡ το AA
 5 δυναμένη ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστίν. ἀλλὰ δη δυνάσθω
 ἡ $E\Theta$ τῆς ΘK μείζον τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ· καὶ
 ἐστὶν ἡ μείζων ἡ $E\Theta$ σύμμετρος τῇ ἐκκειμένη ζητῇ
 τῇ EZ μήκει· ἡ ἄρα EK ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ τε-
 τάρτη. ζητῇ δὲ ἡ EZ . ἐὰν δὲ χωρίον περιέχεται ὑπὸ
 10 ζητῆς καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων τετάρτης, ἡ τὸ χωρίον
 δυναμένη ἄλογός ἐστὶν ἡ καλουμένη μείζων. ἡ ἄρα τὸ
 EI χωρίον δυναμένη μείζων ἐστίν· ὥστε καὶ ἡ τὸ AA
 δυναμένη μείζων ἐστίν.



Ἀλλὰ δη ἔστω ἔλασσον τὸ AB τοῦ ΓA · καὶ τὸ
 15 EH ἄρα ἔλασσόν ἐστι τοῦ ΘI . ὥστε καὶ ἡ $E\Theta$ ἐλάσσων
 ἐστὶ τῆς ΘK . ἦτοι δὲ ἡ ΘK τῆς $E\Theta$ μείζον δύναται
 τῷ ἀπὸ συμέτρου ἑαυτῇ ἢ τῷ ἀπὸ ἀσυμέτρου. δυ-
 νάσθω πρότερον τῷ ἀπὸ συμέτρου ἑαυτῇ μήκει· καὶ
 ἐστὶν ἡ ἐλάσσων ἡ $E\Theta$ σύμμετρος τῇ ἐκκειμένη ζητῇ
 20 τῇ EZ μήκει· ἡ ἄρα EK ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ δευ-
 τέρα. ζητῇ δὲ ἡ EZ . ἐὰν δὲ χωρίον περιέχεται ὑπο
 ζητῆς καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων δευτέρας, ἡ τὸ χωρίον
 δυναμένη ἐκ δύο μέσων ἐστὶ πρώτη. ἡ ἄρα τὸ EI
 χωρίον δυναμένη ἐκ δύο μέσων ἐστὶ πρώτη· ὥστε καὶ
 25 ἡ τὸ AA δυναμένη ἐκ δύο μέσων ἐστὶ πρώτη. ἀλλὰ

2. ζητῶν V. 3. ἐκ] ἡ ἐκ F. ἐστὶ P. ἡ ἄρα] corr.
 ex παρα m. 2 P. EI] I in ras. F. 5. δυναμένη] corr. ex
 ἀδυναμένη V. 6. Ante ἡ ras. 3 litt. F. ΘK] corr. ex $O\Sigma$
 m. 2 F. μείζων b. συμέτρου B, sed corr. 7. ἐστίν]
 ἐστι, supra scr. ω, B; ἔστω P. ἡ] (prius) om. B. 11. μείζον
 V, sed corr. 12. EI] I in ras. F. 15. ΘI] ΘK b et corr.
 ex $\Theta \Gamma F$. $E\Theta$ ἄρα b. ἔλασσον b. 17. συμέτρου — ἀπό] mg.
 m. 1 P. συμέτρου] ἀσυμέτρου V, sed α eras. ἀσυμέτρου]

rationali propositae EZ longitudine commensurabilis est. itaque EK ex duobus nominibus est quarta [deff. alt. 4]. EZ autem rationalis est. sin spatium recta rationali et recta ex duobus nominibus quarta comprehenditur, recta spatio aequalis quadrata irrationalis est maior, quae uocatur [prop. LVII]. itaque recta spatio EI aequalis quadrata maior est. ergo etiam recta spatio AA aequalis quadrata maior est.

iam uero sit $AB < \Gamma A$. quare etiam $EH < \Theta I$. itaque etiam $E\Theta < \Theta K$ [VI, 1; V, 14]. uerum ΘK^2 excedit $E\Theta^2$ quadrato rectae aut sibi commensurabilis aut incommensurabilis. prius excedat quadrato rectae sibi longitudine commensurabilis. et minor $E\Theta$ rationali propositae EZ longitudine commensurabilis est. itaque EK ex duobus nominibus est secunda [deff. alt. 2]. EZ autem rationalis est. sin spatium recta rationali et recta ex duobus nominibus secunda comprehenditur, recta spatio aequalis quadrata ex duabus

mediis est prima [prop. LV]. itaque recta spatio EI aequalis quadrata ex duabus mediis est prima. ergo etiam recta spatio AA aequalis quadrata ex duabus mediis prima est. iam uero ΘK^2 excedat ΘE^2 quadrato rectae sibi incommensurabilis; et minor $E\Theta$ rationali propositae EZ commensurabilis est. itaque EK ex duobus nominibus est quinta [deff. alt. 5]. EZ autem ratio-



συμμέτρον BV, sed corr. 19. ἡ] (prius) m. 2 F, om. B. 21.
 $\delta\epsilon$] (alt.) m. 2 F. περιέχεται P. 23. EI] I in ras. F. 24.
 χαλόν] om. V. 25. AA χαλόν BFb.

- δὴ ἡ ΘΚ τῆς ΘΕ μείζον δυνάσθω τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου
 ἐαυτῇ. καὶ ἐστὶν ἡ ἐλάσσων ἡ ΕΘ σύμμετρος τῇ ἐκ-
 κειμένη φητῇ τῇ ΕΖ· ἡ ἄρα ΕΚ ἐκ δύο ὀνομάτων
 ἐστὶ πέμπτη. φητὴ δὲ ἡ ΕΖ· ἐὰν δὲ χωρίον περιέχεται
 5 ὑπὸ φητῆς καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων πέμπτης, ἡ τὸ
 χωρίον δυναμένη φητον καὶ μέσον δυναμένη ἐστίν.
 ἡ ἄρα τὸ ΕΙ χωρίον δυναμένη φητὸν καὶ μέσον δυ-
 ναμένη ἐστίν· ὥστε καὶ ἡ τὸ ΑΔ χωρίον δυναμένη
 φητὸν καὶ μέσον δυναμένη ἐστίν.
- 10 ῥητοῦ ἄρα καὶ μέσου συντιθεμένου τέσσαρες ἄλογοι
 γίνονται ἥτοι ἐκ δύο ὀνομάτων ἢ ἐκ δύο μέσων πρώτῃ
 ἢ μείζων ἢ φητὸν καὶ μέσον δυναμένη· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

οβ'.

- Δύο μέσων ἀσυμμέτρων ἀλλήλοις συντιθε-
 15 μένων αἱ λοιπαὶ δύο ἄλογοι γίνονται ἥτοι ἐκ
 δύο μέσων δευτέρα ἢ [ἢ] δύο μέσα δυναμένη.
 Συγκείσθω γὰρ δύο μέσα ἀσύμμετρα ἀλλήλοις τὰ
 ΑΒ, ΓΔ· λέγω, ὅτι ἡ τὸ ΑΔ χωρίον δυναμένη ἥτοι
 ἐκ δύο μέσων ἐστὶ δευτέρα ἢ δύο μέσα δυναμένη.
- 20 Τὸ γὰρ ΑΒ τοῦ ΓΔ ἥτοι μείζον ἐστὶν ἢ ἔλασσον.
 ἔστω, εἰ τύχοι, πρότερον μείζον τὸ ΑΒ τοῦ ΓΔ· καὶ

1. ΘΕ] supra scr. η b, ΘΗ e corr. F, ΕΘ V (E in ras.).
 συμμέτρον F, et B, sed corr. m. 2. 2. ἢ] (prius) om. B. 4.
 ἐστὶ] postea ins. F, ἐστίν P. 7. δυναμένη — 8. χωρίον] in
 ras. F. 9. φητόν — δυναμένη] mg. m. 2 B. ἐστὶ PBb.
 10. ἀνάλογοι P, sed corr. m. rec. 11. γίνονται FVb. ἥτοι
 ἢ V. 12. ἢ φητόν] m. 2 V. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P,
 om. BFVb. 13. ογ', sed corr. m. 2, F. 14. συμμέτρων,
 corr. m. 2, F. συντιθέτων Theon (BFVb); συντιθεμένων
 supra scr. m. 2 B. 15. Post δύο ras. 2 litt. V. γίνονται
 Fb, et supra scr. γ, V. ἐκ] ἢ ἐκ V. 16. ἢ] deleo. 17.
 συγκείσθω FV. τὰ] τό b. 18. ΑΔ] corr. ex ΓΔ m. 2 F.
 19. ἢ] ἢ ἢ P. 21. εἰ τύχοι] om. Theon (BFVb).

nalis est. sin spatium recta rationali et recta ex duobus nominibus quinta comprehenditur, recta spatio aequalis quadrata recta spatio rationali et medio aequalis quadrata est [prop. LVIII]. itaque recta spatio EI aequalis quadrata recta spatio rationali et medio aequalis quadrata est. quare etiam recta spatio AA aequalis quadrata recta spatio rationali et medio aequalis quadrata est.


Ergo spatiis rationali et medio compositis quattuor irrationales oriuntur, aut recta ex duobus nominibus aut ex duabus mediis prima aut maior aut spatio rationali et medio aequalis quadrata; quod erat demonstrandum.

LXXII.

Duobus mediis sibi incommensurabilibus compositis reliquae duae irrationales oriuntur, aut recta ex duabus mediis secunda aut duobus spatiis mediis aequalis quadrata.

Componentur enim duo media sibi incommensurabilia AB , ΓA . dico, rectam spatio AA aequalem quadratam aut ex duabus mediis secundam esse aut duobus spatiis mediis aequalem quadratam.

nam aut $AB > \Gamma A$ aut $AB < \Gamma A$. sit uerbi gratia prius $AB > \Gamma A$, et ponatur recta rationalis EZ , et spatium AB aequale rectae EZ adplicetur EH latitudinem efficiens $E\Theta$, spatio autem ΓA aequale ΘI latitudinem efficiens ΘK . et quoniam utrumque AB , ΓA medium est, etiam utrumque EH , ΘI medium est. et rectae



ἐκκείσθω ῥητὴ ἡ EZ , καὶ τῷ μὲν AB ἴσον παρὰ τὴν EZ παραβελήσθω τὸ EH πλάτος ποιοῦν τὴν $E\Theta$, τῷ δὲ $\Gamma\Delta$ ἴσον τὸ ΘI πλάτος ποιοῦν τὴν ΘK . καὶ ἐπεὶ μέσον ἐστὶν ἐκάτερον τῶν AB , $\Gamma\Delta$, μέσον ἄρα
 5 καὶ ἐκάτερον τῶν EH , ΘI . καὶ παρὰ ῥητὴν τὴν ZE παράκειται πλάτος ποιοῦν τὰς $E\Theta$, ΘK · ἐκατέρα ἄρα τῶν $E\Theta$, ΘK ῥητὴ ἐστὶ καὶ ἀσύμμετρος τῇ EZ μήκει. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρόν ἐστι τὸ AB τῷ $\Gamma\Delta$, καὶ ἐστὶν ἴσον το μὲν AB τῷ EH , τὸ δὲ $\Gamma\Delta$ τῷ ΘI , ἀσύμμετρον ἄρα
 10 ἐστὶ καὶ τὸ EH τῷ ΘI . ὥς δὲ τὸ EH πρὸς τὸ ΘI , οὕτως ἐστὶν ἡ $E\Theta$ πρὸς ΘK · ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ $E\Theta$ τῇ ΘK μήκει. αἱ $E\Theta$, ΘK ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἐκ δύο ἄρα ὀνομάτων ἐστὶν ἡ EK . ἦτοι δὲ ἡ $E\Theta$ τῆς ΘK μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμ-
 15 μέτρου ἑαυτῇ ἢ τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου. δυνάσθω πρό- τερον τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ μήκει· καὶ οὐδετέρα τῶν $E\Theta$, ΘK σύμμετρός ἐστι τῇ ἐκκειμένη ῥητῇ τῇ EZ μήκει· ἡ EK ἄρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ τρίτη. ῥητὴ δὲ ἡ EZ · ἐὰν δὲ χωρίον περιέχεται ὑπὸ ῥητῆς
 20 καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων τρίτης, ἡ τὸ χωρίον δυνα- μένη ἐκ δύο μέσων ἐστὶ δευτέρα· ἡ ἄρα τὸ EI , τουτ- ἐστὶ τὸ $A\Delta$, δυναμένη ἐκ δύο μέσων ἐστὶ δευτέρα. ἀλλὰ δὴ ἡ $E\Theta$ τῆς ΘK μείζον δυνάσθω τῷ ἀπο ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ μήκει· καὶ ἀσύμμετρός ἐστὶν ἐκα-
 25 τέρα τῶν $E\Theta$, ΘK τῇ EZ μήκει· ἡ ἄρα EK ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶν ἑκτη. ἐὰν δὲ χωρίον περιέχεται ὑπὸ ῥητῆς καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων ἑκτης, ἡ τὸ χωρίον

1. τις ῥητὴ F. τῷ] corr. ex τό m. 2 P. 2. EH] EZ b.
 3. Post ἴσον add. παρὰ τὴν ΘH V, del. m. 2. 4. ἐπεὶ —
 ἄρα καὶ] om. b. 5. τῶν] corr. ex τό m. 2 b. EH] supra
 add. Θ b. ΘI] $\Theta \Gamma$, supra add. H, b. καὶ] m. 2 F. 6.

rationali EZ adplicata sunt latitudines efficientia $E\Theta$, ΘK . itaque utraque $E\Theta$, ΘK rationalis est et rectae EZ longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. et quoniam AB , ΓA incommensurabilia sunt, et $AB = EH$, $\Gamma A = \Theta I$, etiam EH , ΘI incommensurabilia sunt. uerum $EH : \Theta I = E\Theta : \Theta K$ [VI, 1]. itaque etiam $E\Theta$, ΘK longitudine incommensurabiles sunt [prop. XI]. quare $E\Theta$, ΘK rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo EK ex duobus nominibus est [prop. XXXVI]. uerum $E\Theta^2$ excedit ΘK^2 quadrato rectae aut sibi commensurabilis aut incommensurabilis. prius excedat quadrato rectae longitudine commensurabilis. et neutra rectorum $E\Theta$, ΘK rectae rationali propositae EZ longitudine commensurabilis est. itaque EK ex duobus nominibus est tertia [deff. alt. 3]. uerum EZ rationalis est. sin spatium recta rationali et recta ex duobus nominibus tertia comprehenditur, recta spatio aequalis quadrata ex duabus mediis est secunda [prop. LVI]. itaque recta spatio EI , hoc est AA , aequalis quadrata ex duabus mediis est secunda. iam uero $E\Theta^2$ excedat ΘK^2 quadrato rectae sibi incommensurabilis; et utraque $E\Theta$, ΘK rectae EZ longitudine incommensurabilis est. itaque EK ex duobus nominibus est sexta [deff. alt. 6]. sin spatium recta rationali et recta ex duobus nominibus sexta comprehenditur, recta

παράκειται P, παράκεινται V. ποιοῦντα Vb. 7. ΘK ἄρα V. ἔστιν P. 8. ἀσύμμετρος P, corr. m. rec. ἔστιν P. AB] supra add. H V. ἔστιν] m. 2 F. 10. πρὸς] m. 2 F. τό] τῷ F. 11. πρὸς τήν V. 12. εἰσιν P. 14. ἀσυμμέτρον V, sed corr. 15. συμμέτρον BV, corr. m. 2. 16. ἀσυμμέτρον V, sed corr.; ἀ- supra add. b m. 1. 17. ἔστιν P. 18. τρίτῃ] corr. ex ῥητῇ m. rec. b. 25. τῇ] corr. ex τῆς B. ἐκ] m. rec. P.

δυναμένη ἢ δύο μέσα δυναμένη ἐστίν· ὥστε καὶ ἡ τὸ
ΑΔ χωρίον δυναμένη ἢ δύο μέσα δυναμένη ἐστίν.

[Ὁμοίως δὴ δείξομεν, ὅτι καὶ ἔλαττον ἢ τὸ *ΑΒ*
 τοῦ *ΓΔ*, ἢ τὸ *ΑΔ* χωρίον δυναμένη ἢ ἐκ δύο μέσων
 5 δευτέρα ἐστίν ἥτοι δύο μέσα δυναμένη].

Δύο ἄρα μέσων ἀσυμμέτρων ἀλλήλοις συντιθεμένων
 αἱ λοιπαὶ δύο ἄλογοι γίνονται ἥτοι ἐκ δύο μέσων
 δευτέρα ἢ δύο μέσα δυναμένη.

Ἡ ἐκ δύο ὀνομάτων καὶ αἱ μετ' αὐτὴν ἄλογοι οὕτε
 10 τῇ μέσῃ οὕτε ἀλλήλαις εἰσὶν αἱ αὐταί. τὸ μὲν γὰρ
 ἀπὸ μέσης παρα φητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ
 φητὴν καὶ ἀσύμμετρον τῇ παρ' ἣν παράκειται μήκει.
 τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων παρὰ φητὴν παρα-
 βαλλόμενον πλάτος ποιεῖ τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων πρώτην.
 15 τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ἐκ δύο μέσων πρώτης παρὰ φητὴν παρα-
 βαλλόμενον πλάτος ποιεῖ τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων δευ-
 τέραν. τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ἐκ δύο μέσων δευτέρας παρὰ
 φητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ τὴν ἐκ δύο ὀνο-
 μάτων τρίτην. τὸ δὲ ἀπὸ τῆς μελίσσους παρὰ φητὴν
 20 παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων
 τετάρτην. τὸ δὲ ἀπὸ τῆς φητὸν καὶ μέσον δυναμένης
 παρὰ φητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ τὴν ἐκ δύο
 ὀνομάτων πέμπτην. τὸ δὲ ἀπὸ τῆς δύο μέσα δυνα-
 μένης παρὰ φητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ τὴν

1. ἢ δύο] δύο B V. ὥστε καὶ ἡ] ἢ ἄρα V. 2. *ΑΒ* b. χω-
 ρίον] om. V. ἡ] om. B F V. δύο] β P, δύο m. rec. μέσας F.
 3. ὁμοίως — 5. δυναμένη] om. P. 4. τὸ *ΑΔ* χωρίον] τὸ
 χωρίον τὸ *ΑΔ* V. ἡ] om. F. 5. ἥτοι δύο μέσα] ἢ φητὸν
 καὶ μέσον B. 6. ἡ δύο F. 7. γίνονται P F V b. ἥτοι ἡ V.
 8. ἡ] ἢ ἡ V. δύο] in ras. m. 1 P. 9. ογ', γ in ras., F.
 αἱ] supra scr. b. 11. ἀπὸ τῆς F. 12. τῇ] corr. ex

spatio aequalis quadrata recta est duobus spatiis mediis aequalis quadrata [prop. LIX]. quare recta spatio AA aequalis quadrata recta duobus spatiis mediis aequalis quadrata est.

Ergo duobus spatiis mediis sibi incommensurabilibus compositis reliquae duae irrationales oriuntur, aut recta ex duabus mediis secunda aut duobus spatiis mediis aequalis quadrata.

Recta ex duobus nominibus et irrationales ab ea deriuatae neque mediae neque inter se eadem sunt. nam quadratum mediae rectae rationali adplicatum latitudinem efficit rationalem et rectae, cui adplicatum est, longitudine incommensurabilem [prop. XXII]. quadratum autem rectae ex duobus nominibus rationali adplicatum latitudinem efficit rectam ex duobus nominibus primam [prop. LX]. quadratum autem rectae ex duabus mediis primae rationali adplicatum latitudinem efficit rectam ex duobus nominibus secundam [prop. LXI]. quadratum autem rectae ex duabus mediis secundae rationali adplicatum latitudinem efficit rectam ex duobus nominibus tertiam [prop. LXII]. quadratum autem maioris rationali adplicatum latitudinem efficit rectam ex duobus nominibus quartam [prop. LXIII]. quadratum autem rectae spatio rationali et medio aequalis quadratae rationali adplicatum latitudinem efficit rectam ex duobus nominibus quintam [prop. LXIV].

$\tau\eta\nu$ V. $\eta\nu$] corr. ex $\eta\iota$ F. 13. $\delta\epsilon$] δ' P. παραβαλό-
μενον P. 15. $\tau\delta\delta\epsilon$ — 19. $\tau\rho\acute{\epsilon}\tau\eta\nu$] mg. m. 2 V. 16. $\pi\omicron\iota\epsilon\acute{\iota}$]
om. V. 17. $\delta\epsilon$] δ' P. 19. $\delta\epsilon$] δ' P. 21. $\delta\epsilon$] δ' P. 23.
 $\tau\acute{o}$] e corr. V. $\delta\epsilon$] δ' P. 24. $\pi\lambda\acute{\alpha}\tau\omicron\varsigma$] corr. ex $\pi\acute{\alpha}\tau\omicron\varsigma$ m. 1 P.

ἐκ δύο ὀνομάτων ἕκτην. τὰ δ' εἰρημένα πλάτῃ διαφέρει τοῦ τε πρώτου καὶ ἀλλήλων, τοῦ μὲν πρώτου, ὅτι ῥητὴ ἐστίν, ἀλλήλων δέ, ὅτι τῇ τάξει οὐκ εἰσὶν αἱ αὐταί· ὥστε καὶ αὐταὶ αἱ ἄλλοι διαφέρουσιν ἀλλήλων.

5

ογ'.

Ἐὰν ἀπὸ ῥητῆς ῥητὴ ἀφαιρεθῇ δυνάμει μόνον σύμμετρος οὖσα τῇ ὅλῃ, ἡ λοιπὴ ἄλογός ἐστιν· καλείσθω δὲ ἀποτομή.

Ἀπὸ γὰρ ῥητῆς τῆς *AB* ῥητὴ ἀφαιρεθῶ ἡ *BΓ*
10 δυνάμει μόνον σύμμετρος οὖσα τῇ ὅλῃ· λέγω, ὅτι ἡ λοιπὴ ἡ *ΑΓ* ἄλογός ἐστιν ἡ καλουμένη ἀποτομή.

Ἐπεὶ γὰρ ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ *AB* τῇ *BΓ* μήκει, καὶ ἐστίν ὥς ἡ *AB* πρὸς τὴν *BΓ*, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς *AB* πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν *AB*, *BΓ*, ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ
15 τὸ ἀπὸ τῆς *AB* τῷ ὑπὸ τῶν *AB*, *BΓ*. ἀλλὰ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς *AB* σύμμετρά ἐστι τὰ ἀπὸ τῶν *AB*, *BΓ* τετραγώνων, τῷ δὲ ὑπὸ τῶν *AB*, *BΓ* σύμμετρόν ἐστι τὸ δις ὑπὸ τῶν *AB*, *BΓ*. καὶ ἐπειδήπερ τὰ ἀπὸ τῶν *AB*, *BΓ* ἴσα ἐστὶ τῷ δις ὑπὸ τῶν *AB*, *BΓ* μετὰ τοῦ
20 ἀπὸ *ΓΑ*, καὶ λοιπῷ ἄρα τῷ ἀπὸ τῆς *ΑΓ* ἀσύμμετρά ἐστι τὰ ἀπὸ τῶν *AB*, *BΓ*. ῥητὰ δὲ τὰ ἀπὸ τῶν *AB*,

1. τὰ δ'] ἐπεὶ οὖν τὰ Theon (BFVb). εἰρημένα] εἰ-ε corr. V. 3. τῇ] om. F. 4. ὥστε] δῆλον ὥς Theon (BFVb).

5. Seq. δευτέρᾳ τάξει ἐτέρων λόγων (om. b) τῶν κατὰ ἀφαίρεσιν P²BVb (videtur fuisse in F, sed sust. reparatio); ἀρχὴ τῶν κατ' ἀφαιρέσιν ἐξάδων m. 2 B. ογ'] postea add. F (ab initio haec prop. a praecedentibus dirempta non erat). 7. τῇ] om. b. ἡ λοιπὴ] λοιπῇ F. 8. ἐστὶ BV, comp. Fb. δέ] δὴ B. 9. ῥητῆς] διττῆς F. BΓ] ΓB F. 11. ἡ καλουμένη] καλείσθω δέ V. 12. ἀσύμμετρος] corr. ex ἄρα σύμμετρος m. rec. P, ex σύμμετρος m. 2 B. ἡ AB τῇ BΓ ἀσύμμετρός ἐστι V. 13. τῇ] τὰς F. 14. ἀσύμμετρον] -ον e corr. V, corr. ex -ος m. rec. P. 16. σύμμετρα — τῶν]

quadratum autem rectae duobus spatiis mediis aequalis quadratae rationali adplicatum latitudinem efficit rectam ex duobus nominibus sextam [prop. LXV]. latitudines autem, quas significauimus, differunt et a prima et inter se, a prima, quia ea rationalis est, inter se autem, quia ordine non sunt eadem. ergo etiam ipsae rectae irrationales inter se differunt.

LXXIII.

Si a recta rationali rationalis aufertur potentia tantum toti commensurabilis, reliqua irrationalis est, uocetur autem apotome.

A rationali enim AB rationalis auferatur $B\Gamma$ potentia tantum toti commensurabilis. dico, reliquam $A\Gamma$ irrationalem esse apotomen, quae uocatur.

nam quoniam AB , $B\Gamma$ longitudine incommensurabiles sunt, et est $AB : B\Gamma = AB^2 : AB \times B\Gamma$ [prop. XXI lemma], etiam AB^2 , $AB \times B\Gamma$ incommensurabilia sunt [prop. XI]. uerum AB^2 et $AB^2 + B\Gamma^2$ commensurabilia sunt [prop. XV], et $AB \times B\Gamma$, $2 AB \times B\Gamma$ commensurabilia [prop. VI]. et quoniam est [II, 7]

$$AB^2 + B\Gamma^2 = 2 AB \times B\Gamma + \Gamma A^2,$$

etiam $A\Gamma^2$, $AB^2 + B\Gamma^2$ incommensurabilia sunt [prop. XIII, XVI]. uerum $AB^2 + B\Gamma^2$ rationale est. ergo

mg. m. 2 B. 17. τῶ] τό corr. ex τὰ m. 1 b. τό] τῶ b.
 18. BΓ] e corr. V. καὶ ἐπειδήπερ τὰ] τὰ ἄρα Theon
 (BFVb). 19. ἴσα] ἀσύμμετρα Theon (BFVb). μετὰ τοῦ
 ἀπὸ ΓΑ] om. Theon (BFVb). 20. καὶ] in ras. V. σύμ-
 μετρα B, corr. m. 2. 21. Post BΓ add. Theon: ἐπεὶ καὶ τὰ
 ἀπὸ τῶν AB, BΓ ἴσα ἐστὶ τῶ δις ὑπὸ τῶν AB, BΓ μετὰ τοῦ
 ἀπὸ (τοῦ add. V) ΓΑ (BFVb).

ΒΓ· ἄλογος ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΓ· καλείσθω δὲ ἀποτομή.
ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

οδ'.

Ἐὰν ἀπὸ μέσης μέση ἀφαιρεθῇ δυνάμει
5 μόνον σύμμετρος οὕσα τῇ ὅλῃ, μετὰ δὲ τῆς
ὅλης ῥητὸν περιέχουσα, ἡ λοιπὴ ἄλογός ἐστιν·
ιστ. αρ. a medieval καλείσθω δὲ μέσης ἀποτομὴ πρώτη.
Ἀπὸ γὰρ μέσης τῆς ΑΒ μέση ἀφηρήσθω ἡ ΒΓ
δυνάμει μόνον σύμμετρος οὕσα τῇ ΑΒ, μετὰ δὲ τῆς
10 ΑΒ ῥητὸν ποιοῦσα τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ· λέγω, ὅτι
ἡ λοιπὴ ἡ ΑΓ ἄλογός ἐστιν· καλείσθω δὲ μέσης ἀπο-
τομὴ πρώτη.

Ἐπεὶ γὰρ αἱ ΑΒ, ΒΓ μέσαι εἰσὶν, μέσα ἐστὶ καὶ
τὰ ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ· ῥητὸν δὲ τὸ δις ὑπὸ τῶν ΑΒ,
15 ΒΓ· ἀσύμμετρα ἄρα τὰ ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ τῷ δις ὑπο
τῶν ΑΒ, ΒΓ· καὶ λοιπῷ ἄρα τῷ ἀπὸ τῆς ΑΓ ἀσύμ-
μετρόν ἐστι τὸ δις ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ, ἐπεὶ κἂν τὸ
ὅλον ἐνὶ αὐτῶν ἀσύμμετρον ᾖ, καὶ τὰ ἐξ ἀρχῆς μεγέθη
ἀσύμμετρα ἔσται. ῥητὸν δὲ τὸ δις ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ·
20 ἄλογον ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ· ἄλογος ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΓ·
καλείσθω δὲ μέσης ἀποτομὴ πρώτη.

οε'.

Ἐὰν ἀπὸ μέσης μέση ἀφαιρεθῇ δυνάμει
μόνον σύμμετρος οὕσα τῇ ὅλῃ, μετὰ δὲ τῆς

1. ἄλογον in ras. V. ἐστὶν ἄρα b. ἐστὶν ἡ ΑΓ] καὶ
τὸ ἀπὸ τῶν ΑΓ· ὥστε καὶ ἡ ΑΓ in ras. m. 2 V. 2. ὅπερ
ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. BFVb. 3. οδ'] corr. ex oe' F.

6. περιέχει Theon (BVb, περιέχει F). ἐστὶ PBV, comp.
Fb. 7. μέση V (seq. ras. 1 litt.) et P, corr. m. rec. 10.
ποιοῦσα] P F V b, περιέχουσα B et mg. m. 1 Fb, add. γρ. Post
ὅτι add. καὶ b, m. 2 F. 11. ἐστὶ BV, comp. F. καλεῖται P.

AG irrationalis est [def. 4]; uocetur autem apotome; quod erat demonstrandum.

LXXIV.

Si a recta media aufertur media potentia tantum commensurabilis toti, cum tota autem spatium rationale comprehendens, reliqua irrationalis est; uocetur autem prima apotome mediae.

A media enim AB media auferatur $B\Gamma$ potentia tantum rectae AB commensurabilis, cum AB autem spatium rationale comprehendens $AB \times B\Gamma$ [prop. XXVII]. dico, reliquam AG irrationalem esse, uocetur autem prima apotome mediae.

nam quoniam AB , $B\Gamma$ mediae sunt, etiam AB^2 , $B\Gamma^2$ media sunt. uerum $2AB \times B\Gamma$ rationale est. itaque $AB^2 + B\Gamma^2$ et $2AB \times B\Gamma$ incommensurabilia sunt. quare etiam $2AB \times B\Gamma$ reliquo [cfr. II, 7] AG^2 incommensurabile est, quoniam, si totum alterutri incommensurabile est, etiam magnitudines ab initio sumptae incommensurabiles erunt [prop. XVI]. uerum $2AB \times B\Gamma$ rationale est. quare AG^2 irrationale est. ergo AG irrationalis est [def. 4]; uocetur autem prima apotome mediae.

LXXV.

Si a media media aufertur potentia tantum toti commensurabilis, cum tota autem spatium medium

$\mu\acute{\epsilon}\sigma\eta$ seq. ras. 1 litt. V, supra scr. ς F. 13. $\epsilon\lambda\acute{o}\iota$ V, comp. Fb. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$] m. 2 F. 14. Ante $\delta\acute{\epsilon}$ del. $\tau\acute{o}$ P. 15. $\acute{\alpha}\rho\alpha$ $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ b. $\tau\acute{\omega}$ — 16. $B\Gamma$] mg. m. 1 P. 17. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$] corr. ex $\acute{\alpha}\rho\alpha$ F. $\tau\acute{\omega}\nu$] om. P. 21. $\delta\acute{\epsilon}$] $\delta\eta$ P. $\mu\acute{\epsilon}\sigma\eta$ Fb. 22. $\alpha\varsigma$ F, sed corr.

ὅλης μέσον περιέχουσα, ἡ λοιπὴ ἄλογός ἐστιν.
~~2. καλ~~ ~~καλ~~ καλείσθω δὲ μέσης ἀποτομῇ δευτέρα.

Ἀπὸ γὰρ μέσης τῆς AB μέση ἀφηγήσθω ἡ $ΓB$.
 δυνάμει μόνον σύμμετρος οὖσα τῇ ὅλῃ τῇ AB , μετὰ
 5 δὲ τῆς ὅλης τῆς AB μέσον περιέχουσα τὸ ὑπὸ τῶν
 $AB, BΓ$. λέγω, ὅτι ἡ λοιπὴ ἡ $ΑΓ$ ἄλογός ἐστιν· κα-
 λείσθω δὲ μέσης ἀποτομῇ δευτέρα.


Ἐκλείσθω γὰρ ῥητὴ ἡ $ΔΙ$, καὶ τοῖς μὲν ἀπὸ τῶν
 $AB, BΓ$ ἴσον παρὰ τὴν $ΔΙ$ παραβεβλήσθω τὸ $ΔΕ$
 10 πλάτος ποιοῦν τὴν $ΔΗ$, τῷ δὲ δις ὑπὸ τῶν $AB, BΓ$
 ἴσον παρὰ τὴν $ΔΙ$ παραβεβλήσθω τὸ $ΔΘ$ πλάτος
 ποιοῦν τὴν $ΔΖ$. λοιπὸν ἄρα τὸ $ΖΕ$ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ
 τῆς $ΑΓ$. καὶ ἐπεὶ μέσα καὶ σύμμετρά ἐστι τὰ ἀπὸ τῶν
 $AB, BΓ$, μέσον ἄρα καὶ τὸ $ΔΕ$. καὶ παρὰ ῥητὴν τὴν
 15 $ΔΙ$ παράκειται πλάτος ποιοῦν τὴν $ΔΗ$. ῥητὴ ἄρα ἐστὶν
 ἡ $ΔΗ$ καὶ ἀσύμμετρος τῇ $ΔΙ$ μήκει. πάλιν, ἐπεὶ μέσον
 ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν $AB, BΓ$, καὶ τὸ δις ἄρα ὑπὸ τῶν
 $AB, BΓ$ μέσον ἐστίν. καὶ ἐστὶν ἴσον τῷ $ΔΘ$. καὶ
 τὸ $ΔΘ$ ἄρα μέσον ἐστίν. καὶ παρὰ ῥητὴν τὴν $ΔΙ$
 20 παραβεβλήται πλάτος ποιοῦν τὴν $ΔΖ$. ῥητὴ ἄρα ἐστὶν
 ἡ $ΔΖ$ καὶ ἀσύμμετρος τῇ $ΔΙ$ μήκει. καὶ ἐπεὶ αἱ AB ,

1. περιέχῃ Theon (BFb, περιέχει F). ἐστὶ BV, comp. Fb. 2. μέση V, P (corr. m. rec.), F (supra scr. σ m. 2). 3. μέση] supra scr. m. 1 V. $ΓB$] e corr. V. 5. δὲ τῆς] δέ F. 6. ὅτι ἡ] ὅτι καὶ V. ἐστὶ PBV, comp. b. 7. μέση P (corr. m. rec.), F (corr. m. 2), e corr. V. 8. $ΔK$ b, et FV, sed corr. 9. $ΔΙ$] I in ras. B, $ΔK$ FVb (in V corr.). $ΔΕ$] E in ras. B. 10. $ΔΗ$] corr. ex $HΔ$ m. 2 F. 11. $ΔK$ FVb, sed corr. Ante $ΔΘ$ del. $ΔΕ$ πλάτος ποιοῦν τὴν $ΔΗ$ (corr. ex $HΔ$ m. 2), τῷ δὲ δις ὑπὸ τῶν $AB, BΓ$ (supra scr. m. 2) ἴσον παρὰ τὴν $ΔΚ$ (corr. ex $ΔΙ$) παραβεβλήσθω F. 12. $ΔΖ$] Z in ras. F. $ΖΕ$] $ZΘ$ F. ἐστὶ] om. F. 13. καὶ σύμμετρα] om. Theon (BFVb). ἐστὶν P. 14. καὶ] (alt.) postea ins. m. 1 F. 15. $ΔΙ$] $ΔK$ FVb, sed corr. παράκειται] om. b. Ante $ΔΗ$ del. Z F. 16. Post $ΔΗ$ del. Z F. $ΔΙ$]

comprehendens, reliqua irrationalis est; uocetur autem mediae apotome secunda.

A media enim AB media auferatur ΓB potentia tantum toti AB commensurabilis, cum tota autem AB medium comprehendens $AB \times B\Gamma$ [prop. XXVIII]. dico, reliquam $A\Gamma$ irrationalem esse, uocetur autem mediae apotome secunda.

ponatur enim rationalis ΔI , et quadratis $AB^2 + B\Gamma^2$ aequale rectae ΔI adplicetur ΔE latitudinem efficiens



ΔH , spatio autem $2 AB \times B\Gamma$ aequale rectae ΔI adplicetur $\Delta \Theta$ latitudinem efficiens ΔZ . itaque reliquum $ZE = A\Gamma^2$ [II, 7]. et quoniam $AB^2, B\Gamma^2$ media sunt et commensurabilia, etiam ΔE medium est.¹⁾

et rectae rationali ΔI adplicatum est latitudinem efficiens ΔH . itaque ΔH rationalis est et rectae ΔI longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. rursus quoniam $AB \times B\Gamma$ medium est, etiam $2 AB \times B\Gamma$ medium est [prop. XXIII coroll.]. et est $= \Delta \Theta$. itaque etiam $\Delta \Theta$ medium est. et rationali ΔI adplicatum est latitudinem efficiens ΔZ . quare ΔZ rationalis est et rectae ΔI longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. et quoniam $AB, B\Gamma$ potentia tantum com-

1) Sequitur ex prop. XV et prop. XXIII coroll. ceterum idem tacite usurpatur p. 226, 13 sq.

ΔK FVb, sed corr. 17. καὶ τό — 18. $B\Gamma$] in ras. F. 18. ἐστίν] ἐστὶ PBV, comp. b; cum proximis sustulit rep. in F.

19. ἐστὶ PBV, comp. Fb. ΔK FVb, sed corr. 20. παρὰ-
νεται F. ΔH F, corr. m. 2. 21. ΔH F. ΔI] ΔK b,
et V, sed corr.; corr. ex ΔI m. 2 F.

ΒΓ δυνάμει μόνον σύμμετροί εἰσιν, ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΒ τῇ ΒΓ μήκει· ἀσύμμετρον ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ τετραγώνον τῷ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ. ἀλλὰ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς ΑΒ σύμμετρά ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΒ,
 5 ΒΓ, τῷ δὲ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ σύμμετρόν ἐστὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ· ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ τοῖς ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ. ἴσον δὲ τοῖς μὲν ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ τὸ ΔΕ, τῷ δὲ δις ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ τὸ ΔΘ· ἀσύμμετρον ἄρα [ἐστὶ] τὸ ΔΕ τῷ
 10 ΔΘ. ὥς δὲ τὸ ΔΕ πρὸς τὸ ΔΘ, οὕτως ἡ ΗΔ πρὸς τὴν ΔΖ· ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ ΗΔ τῇ ΔΖ. καὶ εἰσιν ἀμφοτέραι φηταί· αἱ ἄρα ΗΔ, ΔΖ φηταί εἶσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἡ ΖΗ ἄρα ἀποτομή ἐστίν. φητὴ δὲ ἡ ΑΙ· τὸ δὲ ὑπὸ φητῆς καὶ ἀλόγου περι-
 15 εχόμενον ἄλογόν ἐστιν, καὶ ἡ δυναμένη αὐτὸ ἄλογός ἐστιν. καὶ δύναται τὸ ΖΕ ἡ ΑΓ· ἡ ΑΓ ἄρα ἄλογός ἐστιν· καλεῖσθω δὲ μέσης ἀποτομῇ δευτέρα. ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

ος'.

20 Ἐὰν ἀπὸ εὐθείας εὐθεῖα ἀφαιρεθῇ δυνάμει ἀσύμμετρος οὕσα τῇ ὄλῃ, μετὰ δὲ τῆς ὄλης ποιοῦσα τὰ μὲν ἀπ' αὐτῶν ἅμα φητόν, τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν μέσον, ἡ λοιπὴ ἄλογός ἐστιν· καλεῖσθω
ἡ ὁ δὲ ἐλάσσων.


25 Ἀπὸ γὰρ εὐθείας τῆς ΑΒ εὐθεῖα ἀφηρήσθω ἡ ΒΓ

1. ΒΓ] ΓΒ F. ἀσύμμετρος] σύμμετρος b. 2. καὶ τῇ P. 3. τῆς ΑΒ] om. b. 4. ἐστὶν P. 5. τῷ] corr. ex τὸ m. 1 F. 6. ἀσύμμετρα ἄρα ἐστὶ (om. V) τὰ ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ τῷ δις ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ Theon (BFVb). 7. ὑπό] ὑ- in ras. m. 1 P. ἴσον — 8. ΒΓ] mg. m. 2 B. 8. τό] τῷ F. 9. ἐστὶ] om. BFVb. 11. ΗΔ] ΔΗ P. ΔΖ] corr. ex ΖΔ V. 12. εἰσι] εἰσιν B. 13. ἐστὶ BV, comp. Fb. 14. ΑΙ] ΔΚ FVb,

mensurabiles sunt, AB , $B\Gamma$ longitudine incommensurabiles sunt. itaque etiam AB^2 , $AB \times B\Gamma$ incommensurabilia sunt [prop. XXI lemma, prop. XI]. uerum AB^2 , $AB^2 + B\Gamma^2$ commensurabilia sunt [prop. XV] et $AB \times B\Gamma$, $2AB \times B\Gamma$ commensurabilia [prop. VI]. itaque $2AB \times B\Gamma$ et $AB^2 + B\Gamma^2$ incommensurabilia sunt [prop. XIII]. est autem $\angle E = AB^2 + B\Gamma^2$, $\angle \Theta = 2AB \times B\Gamma$. itaque $\angle E$, $\angle \Theta$ incommensurabilia sunt. uerum $\angle E : \angle \Theta = HA : AZ$ [VI, 1]. itaque HA , AZ incommensurabiles sunt [prop. XI]. et utraque rationalis est. itaque HA , AZ rationales sunt potentia tantum commensurabiles. quare ZH apotome est [prop. LXXIII]. uerum AI rationalis est. spatium autem recta rationali et irrationali comprehensum irrationale est [prop. XX], et recta ei aequalis quadrata irrationalis est. et $AI^2 = ZE$. ergo AI irrationalis est [def. 4]; uocetur autem mediae apotome secunda; quod erat demonstrandum.

LXXVI.

Si a recta aufertur recta potentia incommensurabilis toti et cum tota efficiens summam quadratorum rationalem, rectangulum autem medium, reliqua irrationalis est; uocetur autem minor.



A recta enim AB recta auferatur $B\Gamma$ potentia toti incom-

sed corr. 15. ἐστι PV, comp. Fb. ἄρα αὐτό Theon (BFVb).
 16. ἐστίν] ἐστι PBV, comp. Fb. ἡ AI] (alt.) m. 2 F.
 17. ἐστι PBV, comp. Fb. δέ] δὲ ἐκ F. μέση P, et V,
 corr. m. 2. ὅπερ ἐδει δεῖξαι] comp. P, om. BFVb. 22.
 δέ F. 23. ἐστι BV, comp. Fb.

δυνάμει ἀσύμμετρος οὖσα τῇ ὅλῃ ποιοῦσα τὰ προκει-
μενα. λέγω, ὅτι ἡ λοιπὴ ἢ $ΑΓ$ ἄλογός ἐστιν ἢ κα-
λουμένη ἐλάσσων.

Ἐπεὶ γὰρ τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΒ$,
5 $ΒΓ$ τετραγώνων φητόν ἐστιν, τὸ δὲ δις ὑπὸ τῶν $ΑΒ$,
 $ΒΓ$ μέσον, ἀσύμμετρα ἄρα ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$
τῷ δις ὑπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$ καὶ ἀναστρέψαντι λοιπῷ
τῷ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$ ἀσύμμετρά ἐστι τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$.
φητὰ δὲ τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$ ἄλογον ἄρα τὸ ἀπὸ
10 τῆς $ΑΓ$ ἄλογος ἄρα ἢ $ΑΓ$ καλείσθω δὲ ἐλάσσων.
ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

οξ'.

Ἐὰν ἀπὸ εὐθείας εὐθεῖα ἀφαιρεθῇ δυνάμει
ἀσύμμετρος οὖσα τῇ ὅλῃ, μετὰ δὲ τῆς ὅλης
15 ποιοῦσα τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν
τετραγώνων μέσον, τὸ δὲ δις ὑπ' αὐτῶν φητόν,
ἢ λοιπὴ ἄλογός ἐστιν· καλείσθω δὲ ἢ μετὰ φητοῦ
μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα.

Ἀπὸ γὰρ εὐθείας τῆς $ΑΒ$ εὐθεῖα ἀφηρήσθω ἢ $ΒΓ$
20 δυνάμει ἀσύμμετρος οὖσα τῇ $ΑΒ$ ποιοῦσα τὰ προκει-
μενα· λέγω, ὅτι ἡ λοιπὴ ἢ $ΑΓ$ ἄλογός ἐστιν ἢ προει-
ρημένη.

Ἐπεὶ γὰρ τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν
 $ΑΒ$, $ΒΓ$ τετραγώνων μέσον ἐστίν, τὸ δὲ δις ὑπὸ τῶν

1. οὖσα ἀσύμμετρος V. τὰ προκειμένα] μετὰ τῆς ὅλης
τῆς $ΑΒ$ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$ ἅμα φητόν,
τὸ δὲ δις ὑπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$ ἅμα μέσον Theon (BFVb). 4.
μέν] m. 2 V. $ΑΒ$] B in ras. m. 2 P. 5. $ΒΓ$] ΓB P.
τετραγώνων] □ eras. V. ἐστι PBV, comp. Fb. δὲ δις]
δ' V. 6. τῶν] m. rec. P. $ΑΒ$] in ras. m. 1 P. 8.
ἀσύμμετρά ἐστι τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$ (m. 2 F) τῷ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$
(haec 4 uerba om. F) Theon (BFVb). 9. Mg. γρ. φητόν δὲ

mensurabilis et proposita efficiens [prop. XXXIII]. dico, reliquam AG irrationalem esse minorem, quae uocatur.

nam quoniam $AB^2 + BG^2$ rationale est, et $2AB \times BG$ medium, incommensurabilia sunt $AB^2 + BG^2$ et $2AB \times BG$. et e contrario reliquo [II, 7] AG^2 incommensurabile est $AB^2 + BG^2$ [prop. XVI]. uerum $AB^2 + BG^2$ rationale est. itaque AG^2 irrationale est. ergo AG irrationalis est [def. 4]; uocetur autem minor; quod erat demonstrandum.

LXXVII.

Si a recta aufertur recta potentia incommensurabilis toti, cum tota autem efficiens summam quadratorum mediam, duplum autem rectangulum rationale, reliqua irrationalis est; uocetur autem recta cum rationali totum medium efficiens.

A recta enim AB auferatur recta BG potentia rectae AB incommensurabilis proposita efficiens [prop. XXXIV]. dico, reliquam AG irrationalem esse, quam significauimus.

nam quoniam $AB^2 + BG^2$ medium est, $2AB \times BG$

τὸ συγχεόμενον Fb. ἄρα] ἐστὶ P. 10. ἄλογος — AG] om. P.
 11. ὅπερ εἶδει δεῖξαι] comp. P, om. BFVb. 12. οἷ F. 17.
 ἐστὶ PBV, comp. Fb. δὲ ἢ] δέ BFVb. Supra μετὰ scr. ἀπὸ
 comp. m. 1 b. 19. AB] corr. ex AG m. 2 F. 20. ἀσύμ-
 μετρος οὕσα δυνάμει V. τῇ ὅλη τῇ Theon (BFVb). τὰ
 προκείμενα] τὸ μὲν συγχεόμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AB , BG τε-
 τραγῶνων μέσον, τὸ δὲ δις ὑπὸ τῶν AB , BG ῥητόν Theon
 (BFVb). 21. ἐστὶ BV, comp. F. ἡ προειρημένη] καλεῖσθαι
 (καλεῖται B) δὲ ἢ (om. Vb) μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα
 Theon (BFVb). 24. ἐστὶ PBV, comp. Fb.

AB , $B\Gamma$ ῥητόν, ἀσύμμετρα ἄρα ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ τῷ δις ὑπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ · καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς AG ἀσύμμετρόν ἐστι τῷ δις ὑπὸ τῶν AB , $B\Gamma$. καὶ ἐστὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ ῥητόν· τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς AG ἄλογόν ἐστιν· ἄλογος ἄρα ἐστὶν ἡ AG · καλεῖσθω δὲ ἡ μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα. ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

οἷ'.

Ἐὰν ἀπὸ εὐθείας εὐθεῖα ἀφαιρεθῇ δυνάμει
10 ἀσύμμετρος οὖσα τῇ ὅλῃ, μετὰ δὲ τῆς ὅλης
ποιοῦσα τὸ τε συγκεείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν
τετραγώνων μέσον τὸ τε δις ὑπ' αὐτῶν μέσον
καὶ ἐστὶ τὰ ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα ἀσύμμετρα
τῷ δις ὑπ' αὐτῶν, ἡ λοιπὴ ἄλογός ἐστιν· κα-
15 λείσθω δὲ ἡ μετὰ μέσον μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα.

Ἀπὸ γὰρ εὐθείας τῆς AB εὐθεῖα ἀφηρήσθω ἡ
 $B\Gamma$ δυνάμει ἀσύμμετρος οὖσα τῇ AB ποιοῦσα τὰ προ-
κείμενα· λέγω, ὅτι ἡ λοιπὴ ἡ AG ἄλογός ἐστιν ἡ κα-
λουμένη ἡ μετὰ μέσον μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα.
20 Ἐκκείσθω γὰρ ῥητὴ ἡ AI , καὶ τοῖς μὲν ἀπὸ τῶν
 AB , $B\Gamma$ ἴσον παρὰ τὴν AI παραβεβλήσθω τὸ AE
πλάτος ποιοῦν τὴν AH , τῷ δὲ δις ὑπὸ τῶν AB , $B\Gamma$
ἴσον ἀφηρήσθω τὸ $A\Theta$ [πλάτος ποιοῦν τὴν AZ].
λοιπὸν ἄρα τὸ ZE ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς AG ὥστε

2. $B\Gamma$ τετράγωνα BFb. $B\Gamma$] B m. 2 V. καὶ] om. P.

3. σύμμετρον F. 4. καὶ — δις] ῥητόν δὲ τό V. ῥητόν]

om. V. 6. δὲ ἡ] δέ b. 7. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] om. BFVb,

comp. P. 8. οὐδ' F. 10. δέ] om. P. 11. τε] in ras. V,

μὲν BFb. ἀπ'] ἀπὸ τῶν V. 12. τε] in ras. V, δέ BFb.

13. καὶ ἐστὶ] ἐτι τε Theon (BFVb). 14. ἡ] λέγω ὅτι ἡ V.

ἐστὶ BV, comp. Fb. 15. ἡ] om. FVb. 17. τὰ προκεί-

μενα] τὸ μὲν συγκεείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ τετραγώνων

μέσον, τὸ δὲ δις ὑπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ μέσον ἐτι τε (om. V, m. 2 F)



$\left. \begin{array}{l} A \\ \Gamma \\ B \end{array} \right\}$ autem rationale, $AB^2 + B\Gamma^2$ et $2AB \times B\Gamma$ incommensurabilia sunt. itaque etiam reliquum [II, 7] $A\Gamma^2$ et $2AB \times B\Gamma$ incommensurabilia sunt [prop. XVI]. et $2AB \times B\Gamma$ rationale est. itaque $A\Gamma^2$ irrationale est. ergo $A\Gamma$ irrationalis est [def. 4]; uocetur autem recta cum rationali totum medium efficiens; quod erat demonstrandum.

LXXVIII.

Si a recta aufertur recta potentia incommensurabilis toti, cum tota autem efficiens et summam quadratorum mediam et duplum rectangulum medium praetereaue summam quadratorum duplo rectangulo incommensurabilem, reliqua irrationalis est; uocetur autem recta cum medio totum medium efficiens.

A recta enim AB recta auferatur $B\Gamma$ potentia rectae AB incommensurabilis proposita efficiens [prop. XXXV]. dico, reliquam $A\Gamma$ irrationalem esse, quae uocetur recta cum medio totum medium efficiens.

ponatur enim rationalis AI , et quadratis $AB^2 + B\Gamma^2$ aequale rectae AI adplicetur AE latitudinem efficiens



$\triangle H$, spatio autem $2AB \times B\Gamma$ aequale auferatur $\triangle \Theta$. itaque reliquum $ZE = A\Gamma^2$ [II, 7]. quare $A\Gamma$ spatio ZE quadrata aequalis est. et quoniam AB^2

τὰ ἀπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ ἀσύμμετρα τῷ δις ὑπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ Theon (BFVb). 18. ἐστὶ BV , comp. F. ἡ καλουμένη] καλεῖσθαι δέ Theon (BFVb). 19. μέσον] supra scr. F. 20. $\triangle I$] $\triangle K$ in ras. V, item lin. 21. 21. ἴσον] ἴσον τὸ $\triangle E$ V. τήν] corr. ex φητὴν m. 1 P, φητὴν τήν V, m. 2 B. τὸ $\triangle E$] om. V. 23. πλάτος — $\triangle Z$] om. P.

ἡ $ΑΓ$ δύναται τὸ $ΖΕ$. καὶ ἐπεὶ το συγκείμενον ἐκ
 τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΒ, ΒΓ$ τετραγώνων μέσον ἐστὶ καὶ
 ἐστὶν ἴσον τῷ $ΔΕ$, μέσον ἄρα [ἐστὶ] τὸ $ΔΕ$. καὶ
 παρὰ ρητὴν τὴν $ΔΙ$ παράκειται πλάτος ποιοῦν τὴν $ΔΗ$.
 5 ρητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ $ΔΗ$ καὶ ἀσύμμετρος τῇ $ΔΙ$ μήκει.
 πάλιν, ἐπεὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν $ΑΒ, ΒΓ$ μέσον ἐστὶ καὶ
 ἐστὶν ἴσον τῷ $ΔΘ$, τὸ ἄρα $ΔΘ$ μέσον ἐστίν. καὶ παρὰ
 ρητὴν τὴν $ΔΙ$ παράκειται πλάτος ποιοῦν τὴν $ΔΖ$.
 ρητὴ ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ $ΔΖ$ καὶ ἀσύμμετρος τῇ $ΔΙ$ μήκει.
 10 καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρά ἐστι τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΒ, ΒΓ$ τῷ δις
 ὑπὸ τῶν $ΑΒ, ΒΓ$, ἀσύμμετρον ἄρα καὶ τὸ $ΔΕ$ τῷ
 $ΔΘ$. ὥς δὲ τὸ $ΔΕ$ πρὸς τὸ $ΔΘ$, οὕτως ἐστὶ καὶ ἡ
 $ΔΗ$ πρὸς τὴν $ΔΖ$. ἀσύμμετρος ἄρα ἡ $ΔΗ$ τῇ $ΔΖ$.
 καὶ εἰσιν ἀμφοτέραι ρηταί· αἱ $ΗΔ, ΔΖ$ ἄρα ρηταί
 15 εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι. ἀποτομὴ ἄρα ἐστὶν ἡ
 $ΖΗ$. ρητὴ δὲ ἡ $ΖΘ$. τὸ δὲ ὑπὸ ρητῆς καὶ ἀποτομῆς
 περιεχόμενον [ὀρθογώνιον] ἄλογόν ἐστίν, καὶ ἡ δυνα-
 μένη αὐτὸ ἄλογός ἐστιν. καὶ δύναται τὸ $ΖΕ$ ἡ $ΑΓ$.
 ἡ $ΑΓ$ ἄρα ἄλογός ἐστιν· καλείσθω δὲ ἡ μετὰ μέσον
 20 μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα. ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

οθ'.

~ be
καὶ Τῇ ἀποτομῇ μία [μόνον] προσαρμόξει εὐθεῖα
 ρητὴ δυνάμει μόνον σύμμετρος οὖσα τῇ ὅλῃ.

1. $ΑΓ$] $ΑΓ$ μεῖζον b. καί] m. 2 F. 3. ἐστὶ] om. P.
 4. $ΔΙ$] $ΔΚ$ in ras. V, item lin. 5, 8, 9; $ΔΗ$ P. 5. σύμμετρος
 B, corr. m. 2. 7. τῷ] corr. ex τό m. 1 F. ἐστίν] ἐστὶ PBV,
 comp. Fb. 9. ἐστίν PB. καί] (prius) om. B. 10. ἀσύμμετρός F.
 ἐστὶν P. 11. τό] corr. ex τῷ m. 2 F. τῷ] corr. ex τό m.
 2 F. 12. $ΔΘ$] (alt.) Θ, add. Ζ m. 2, F. ἐστίν PB. καί]
 om. P. 13. τήν] om. P. $ΔΗ$] $Δ$ in ras. V, $ΗΔ$ Fb. 14.
 ἄρα] m. 2 F. 15. εἰσιν P. 16. $ΖΘ$] $ΔΚ$ in ras. V. δέ] δ' P.

$+B\Gamma^2$ medium est et $=\Delta E$, ΔE medium est. et rationali ΔI adplicatum est latitudinem efficiens ΔH . itaque ΔH rationalis est et rectae ΔI longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. rursus quoniam $2AB \times B\Gamma$ medium est et $=\Delta\Theta$, $\Delta\Theta$ medium est. et rationali ΔI adplicatum est latitudinem efficiens ΔZ . itaque ΔZ rationalis est et rectae ΔI longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. et quoniam $AB^2 + B\Gamma^2$ et $2AB \times B\Gamma$ incommensurabilia sunt, etiam ΔE , $\Delta\Theta$ incommensurabilia sunt. uerum $\Delta E : \Delta\Theta = \Delta H : \Delta Z$ [VI, 1]. itaque ΔH , ΔZ incommensurabiles sunt [prop. XI]. et utraque rationalis est. itaque HA , ΔZ rationales sunt potentia tantum commensurabiles. quare ZH apotome est [prop. LXXIII]. $Z\Theta$ autem rationalis est. spatium autem recta rationali et apotome comprehensum irrationale est [prop. XX], et recta ei potentia aequalis irrationalis est. est autem $A\Gamma^2 = ZE$. ergo $A\Gamma$ irrationalis est; uocetur autem recta cum medio totum medium efficiens. quod erat demonstrandum.

LXXIX.

Apotomae una tantum congruit recta rationalis potentia tantum toti commensurabilis.

17. ὁρθογώνιον] om. P. ἔστι PBV, comp. Fb. 18. ἔστι PBV, comp. Fb. 19. ἔστι BV, comp. Fb. ἡ] om. P.

20. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. BFVb. 21. οἱ] corr. ex π' m. 2 F. 22. μόνον] om. P, μόνη V et F supra scr. ον m. 1.

Ἔστω ἀποτομή ἡ AB , προσαρμόζουσα δὲ αὐτῇ ἡ $BΓ$. αἱ $ΑΓ$, $ΓΒ$ ἄρα φηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· λέγω, ὅτι τῇ AB ἑτέρα οὐ προσαρμόζει φητὴ δυνάμει μόνον σύμμετρος οὕσα τῇ ὅλῃ.

- 5 Εἰ γὰρ δυνατόν, προσαρμोजέτω ἡ $ΒΔ$ · καὶ αἱ $ΑΔ$, $ΔΒ$ ἄρα φηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι. καὶ ἐπεὶ, ὧς ὑπερέχει τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$, τούτῳ ὑπερέχει καὶ τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$. τῷ γὰρ αὐτῷ τῷ
 10 ἀπὸ τῆς AB ἀμφοτέρω ὑπερέχει· ἐναλλαξ ἄρα, ὧς ὑπερέχει τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$, τούτῳ ὑπερέχει [καὶ] τὸ δις ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$. τὰ δὲ ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ ὑπερέχει φητῶ· φητὰ γὰρ ἀμφοτέρω.
 15 καὶ τὸ δις ἄρα ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ ὑπερέχει φητῶ· ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον· μέσα γὰρ ἀμφοτέρω, μέσον δὲ μέσου οὐχ ὑπερέχει φητῶ. τῇ ἄρα AB ἑτέρα οὐ προσαρμόζει φητὴ δυνάμει μόνον σύμμετρος οὕσα τῇ ὅλῃ.
- 20 Μία ἄρα μόνη τῇ ἀποτομῇ προσαρμόζει φητὴ δυνάμει μόνον σύμμετρος οὕσα τῇ ὅλῃ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

π'.

Τῇ μέσης ἀποτομῇ πρώτη μὴ μόνον προσαρμόζει ἐνδεῖα μέση δυνάμει μόνον σύμμετρος

3. φητῇ] m. 2 F. 5. προσαρμोजέσθω b. καὶ] om. B.
 6. $ΔΒ$] $ΒΔ$ F. 9. τῷ ἀπὸ τῆς] τό F. 10. AB — ὑπερέχει] ἀπ' ἀμφοτέρων ὑπεροχῆς τῷ ἀπὸ τῆς AB B F b; in B del. m. 2, mg. τῷ γὰρ αὐτῷ — ὑπερέχει m. 2. ὧς b. 11. $ΑΔ$, $ΔΒ$] $ΑΓ$, $ΓΒ$ F, corr. m. 2. ἀπό — 12. ὑπερέχει] in ras. F. 12. καὶ] om. P. $ΔΒ$] m. 2 F. 14. φητὰ] corr. ex φητῇ V et m. rec. B. Post γὰρ add. εἰσιν F V b, ἐστὶν B. 15. τό] corr. ex τῷ m. 1 F. ἄρα] om. V. 17. Post γὰρ add. εἰσιν V b,

Sit AB apotome, ei autem congruens $B\Gamma$.
 itaque $A\Gamma$, ΓB rationales sunt potentia tantum
 commensurabiles [prop. LXXIII]. dico, nullam
 aliam rationalem potentia tantum toti commen-
 surabilem rectae AB congruere.

nam si fieri potest, congruat $B\Delta$. itaque etiam
 $A\Delta$, ΔB rationales sunt potentia tantum com-
 mensurabiles [prop. LXXIII]. et quoniam
 $(A\Delta^2 + \Delta B^2) \div 2 A\Delta \times \Delta B = (A\Gamma^2 + \Gamma B^2) \div 2 A\Gamma \times \Gamma B$
 (nam utrumque excedit eodem spatio AB^2 [II, 7]), per-
 mutando erit

$(A\Delta^2 + \Delta B^2) \div (A\Gamma^2 + \Gamma B^2) = 2 A\Delta \times \Delta B \div 2 A\Gamma \times \Gamma B$.
 uerum $A\Delta^2 + \Delta B^2$ excedit $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$ spatio rationali;
 nam utraque rationalia sunt. itaque etiam $2 A\Delta \times \Delta B$
 excedit $2 A\Gamma \times \Gamma B$ spatio rationali; quod fieri non
 potest; nam utrumque medium est [prop. XXI], me-
 dium autem non excedit medium spatio rationali [prop.
 XXVI]. itaque rectae AB nulla alia rationalis po-
 tentia tantum toti commensurabilis congruit.

Ergo una tantum recta rationalis potentia tantum
 toti commensurabilis apotomae congruit; quod erat
 demonstrandum.

LXXX.

Mediae apotomae primae una tantum congruit recta
 media potentia tantum toti commensurabilis, cum tota
 autem spatium rationale comprehendens.

ἔστιν BF. 18. τῇ] corr. ex τὰ m. 2 F. ὁ γῆ V. 20.
 μία — 21. ὁ γῆ] bis F, sed corr. 20. μόνον BFb. προσ-
 αρμόσει BFVb. 21. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. BFVb.
 22. πα' F, et sic deinceps. 23. μέσης] corr. ex μέση m.
 rec. P, μέση BFV, μέση b. μία] om. b.

οὐσα τῇ ὅλῃ, μετὰ δὲ τῆς ὅλης ῥητὸν περιέχουσα.

Ἔστω γὰρ μέσης ἀποτομὴ πρώτη ἡ AB , καὶ τῇ AB προσαρμोजέτω ἡ $BΓ$. αἱ $ΑΓ, ΓΒ$ ἄρα μέσαι εἰσὶ
 5 δυνάμει μόνον σύμμετροι ῥητὸν περιέχουσai τὸ ὑπὸ
 τῶν $ΑΓ, ΓΒ$. λέγω, ὅτι τῇ AB ἑτέρα οὐ προσαρμोजεί
 μέση δυνάμει μόνον σύμμετρος οὐσα τῇ ὅλῃ, μετὰ δὲ
 τῆς ὅλης ῥητὸν περιέχουσα.

Εἰ γὰρ δυνατόν, προσαρμोजέτω καὶ ἡ $ΔΒ$. αἱ ἄρα
 10 $ΑΔ, ΔΒ$ μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι ῥητὸν
 περιέχουσai τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΔ, ΔΒ$. καὶ ἐπεί, ᾧ ὑπερ-
 ἔχει τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΔ, ΔΒ$ τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΑΔ, ΔΒ$,
 τούτῳ ὑπερέχει καὶ τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΓ, ΓΒ$ τοῦ δις ὑπὸ
 τῶν $ΑΓ, ΓΒ$. τῷ γὰρ αὐτῷ [πάλιν] ὑπερέχουσι τῷ
 15 ἀπὸ τῆς AB . ἐναλλάξ ἄρα, ᾧ ὑπερέχει τὰ ἀπὸ τῶν
 $ΑΔ, ΔΒ$ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ, ΓΒ$, τούτῳ ὑπερέχει καὶ
 τὸ δις ὑπὸ τῶν $ΑΔ, ΔΒ$ τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ, ΓΒ$.
 τὸ δὲ δις ὑπὸ τῶν $ΑΔ, ΔΒ$ τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ,$
 $ΓΒ$ ὑπερέχει ῥητῷ. ῥητὰ γὰρ ἀμφοτέρω. καὶ τὰ ἀπὸ
 20 τῶν $ΑΔ, ΔΒ$ ἄρα τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ, ΓΒ$ [τετραγώνων]
 ὑπερέχει ῥητῷ. ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. μέσα γὰρ ἐστὶν
 ἀμφοτέρω, μέσον δὲ μέσου οὐχ ὑπερέχει ῥητῷ.

Τῇ ἄρα μέσης ἀποτομῇ πρώτῃ μία μόνον προσ-
 αρμोजεί εὐθεῖα μέση δυνάμει μόνον σύμμετρος οὐσα
 25 τῇ ὅλῃ, μετὰ δὲ τῆς ὅλης ῥητὸν περιέχουσα. ὅπερ ἔδει
 δεῖξαι.

3. μέση BVb, om. F. 4. προσαρμोजεί F, corr. m. 2. αἱ] corr. ex εἰ m. 1 F. ἄρα ΑΓ, ΓΒ BFVb. εἰσὶν B. 5. σύμμετρος V, corr. m. 1. 6. προσαρμोजεί V. 8. περιέχουσai V, corr. m. 1. 10. ΑΔ] m. 2 F. εἰσιν LB. 12. τὰ] corr. ex τό m. 2 F. τοῦ] τῷ F. ΑΓ, ΓΒ F. 13. ὑπερεῖχε b, corr. m. 1. 14. τῷ] corr. ex τό V. πάλιν] om. P. ὑπερ-

$\left. \begin{array}{l} A \\ B \\ \Gamma \\ \Delta \end{array} \right\}$ Sit enim AB mediae apotome prima, et rectae AB congruat $B\Gamma$. itaque $A\Gamma$, ΓB mediae sunt potentia tantum commensurabiles spatium rationale comprehendentes $A\Gamma \times \Gamma B$ [prop. LXXIV]. dico, rectae AB nullam aliam mediam potentia tantum tota commensurabilem congruere cum tota spatium rationale comprehendentem.

nam si fieri potest, etiam ΔB congruat. $\Delta\Delta$, ΔB igitur mediae sunt potentia tantum commensurabiles spatium rationale comprehendentes $\Delta\Delta \times \Delta B$ [prop. LXXIV]. et quoniam est

$(\Delta\Delta^2 + \Delta B^2) \div 2 \Delta\Delta \times \Delta B = (A\Gamma^2 + \Gamma B^2) \div 2 A\Gamma \times \Gamma B$
 (nam eodem spatio ΔB^2 excedunt [II, 7]), permutando erit

$(\Delta\Delta^2 + \Delta B^2) \div (A\Gamma^2 + \Gamma B^2) = 2 \Delta\Delta \times \Delta B \div 2 A\Gamma \times \Gamma B$.
 uerum $2 \Delta\Delta \times \Delta B$ excedit $2 A\Gamma \times \Gamma B$ spatio rationali; nam utrumque rationale est. itaque etiam $\Delta\Delta^2 + \Delta B^2$ excedit $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$ spatio rationali; quod fieri non potest; nam utraque media sunt [prop. XXIV], medium autem non excedit medium spatio rationali [prop. XXVI].

Ergo mediae apotomae primae una tantum recta media congruit potentia tantum toti commensurabilis, cum tota autem spatium rationale comprehendens; quod erat demonstrandum.

$\epsilon\chi\omicron\upsilon\sigma\iota\nu$ LBF. $\tau\acute{\alpha}$ b. 15. $\tau\acute{\alpha}$ καὶ $\tau\acute{\alpha}$ LB. 17. $\tau\acute{o}$ $\tau\acute{\alpha}$ P. 18. $\tau\acute{o}$ $\delta\acute{\epsilon}$ — 19. ΓB] καὶ V. 20. $\tau\epsilon\tau\omicron\alpha\gamma\acute{\alpha}\nu\alpha\nu$] om. P.
 21. $\upsilon\pi\epsilon\rho\acute{\epsilon}\xi\epsilon\iota$ P, ξ supra scr. B. 22. $\delta\acute{\epsilon}$] γάρ L. 23. $\mu\acute{\epsilon}\sigma\eta$ uel $\mu\acute{\epsilon}\sigma\eta$ LBFVb. 25. $\upsilon\pi\epsilon\rho$ $\xi\delta\epsilon\iota$ $\delta\epsilon\iota\chi\epsilon\iota$] comp. P, om. LBFVb.

πα'.

Τῇ μέσης ἀποτομῇ δευτέρα μία μόνον προσ-
αρμόζει εὐθεῖα μέση δυνάμει μόνον σύμμετρος
τῇ ὅλῃ, μετὰ δὲ τῆς ὅλης μέσον περιέχουσα.


- 5 Ἐστω μέσης ἀποτομῇ δευτέρα ἡ AB καὶ τῇ AB
προσαρμόξουσα ἡ $BΓ$. αἱ ἄρα $ΑΓ$, $ΓΒ$ μέσαι εἰσὶ
δυνάμει μόνον σύμμετροι μέσον περιέχουσai τὸ ὑπὸ
τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$. λέγω, ὅτι τῇ AB ἑτέρα οὐ προσαρμόσει
εὐθεῖα μέση δυνάμει μόνον σύμμετρος οὐσα τῇ ὅλῃ,
10 μετὰ δὲ τῆς ὅλης μέσον περιέχουσα.

- Εἰ γὰρ δυνατόν, προσαρμोजέτω ἡ $ΒΔ$. καὶ αἱ $ΑΔ$,
 $ΔΒ$ ἄρα μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι μέσον
περιέχουσai τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$. καὶ ἐκκείσθω ῥητὴ
ἡ EZ , καὶ τοῖς μὲν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ ἴσον παρὰ τὴν
15 EZ παραβελήσθω τὸ EH πλάτος ποιοῦν τὴν EM .
τῷ δὲ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ ἴσον ἀφηγήσθω τὸ $ΘH$
πλάτος ποιοῦν τὴν $ΘM$. λοιπὸν ἄρα τὸ EA ἴσον ἐστὶ
τῷ ἀπὸ τῆς AB . ὥστε ἡ AB δύναται τὸ EA . πάλιν
δὴ τοῖς ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ ἴσον παρὰ τὴν EZ παρα-
20 βελήσθω τὸ EI πλάτος ποιοῦν τὴν EN . ἔστι δὲ καὶ
τὸ EA ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς AB τετραγώνῳ. λοιπὸν ἄρα
τὸ $ΘI$ ἴσον ἐστὶ τῷ δις ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$. καὶ ἐπεὶ
μέσαι εἰσὶν αἱ $ΑΓ$, $ΓΒ$, μέσα ἄρα ἐστὶ καὶ τὰ ἀπὸ τῶν
 $ΑΓ$, $ΓΒ$. καὶ ἐστὶν ἴσα τῷ EH . μέσον ἄρα καὶ τὸ
25 EH . καὶ παρὰ ῥητὴν τὴν EZ παράκειται πλάτος ποιοῦν

2. μέση uel μέση LBFVb. μόνη V. 5. μέση uel
μέση LBFb, e corr. V. δευτέρα] om. b. AB] B in ras.
m. 1 P. καὶ τῇ AB] om. V. 6. ἡ] δὲ ἡ V. αἱ] supra
scr. m. rec. b. εἰσὶν LBP. 7. τῷ τὰ L? 8. τῶν] om. b.
προσαρμόζει LBB. 11. $ΔΒ$ F. καί] om. B. 12. εἰσὶν
LB. 16. AB , $BΓ$ b. 20. EI] supra scr. Z F. ἔστιν L.
21. καὶ λοιπὸν V. 22. ἴσον — 24. τῷ EH] mg. m. 1 F.

LXXXI.

Mediae apotomae secundae una tantum recta media congruit potentia tantum toti commensurabilis, cum tota autem spatium medium comprehendens.



Sit AB mediae apotome secunda et rectae AB congruens $B\Gamma$. itaque $A\Gamma$, ΓB mediae sunt potentia tantum commensurabiles medium comprehendentes $A\Gamma \times \Gamma B$ [prop. LXXV]. dico, rectae AB nullam aliam rectam mediam congruere potentia tantum toti commensu-

rabilem, cum tota autem medium comprehendentem.

nam si fieri potest, congruat $B\Delta$. itaque etiam $A\Delta$, ΔB mediae sunt potentia tantum commensurabiles medium comprehendentes $A\Delta \times \Delta B$ [prop. LXXV]. et ponatur rationalis EZ , et quadratis $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$ aequale rectae EZ adplicetur EH latitudinem efficiens EM ; spatio autem $2 A\Gamma \times \Gamma B$ aequale auferatur ΘH latitudinem efficiens ΘM . itaque reliquum $EA = AB^2$ [II, 7]. itaque AB spatio EA aequalis est quadrata. iam rursus quadratis $A\Delta^2 + \Delta B^2$ aequale rectae EZ adplicetur EI latitudinem efficiens EN . est autem $EA = AB^2$. itaque reliquum $\Theta I = 2 A\Delta \times \Delta B$ [II, 7]. et quoniam $A\Gamma$, ΓB mediae sunt, etiam $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$ media sunt. et $A\Gamma^2 + \Gamma B^2 = EH$. quare etiam EH medium est. et rectae rationali EZ adplicatum est latitudinem efficiens EM . itaque EM rationalis est

22. ἐστίν L. Post ἐπεὶ del. m. 1: ἵσον ἐστὶ τῷ δις P. 23. ἐστίν L, εἰσὶ Fb. 24. EH] seq. ἵσον ἐστὶ τῷ EH F.

τὴν EM · ζητῇ ἄρα ἐστὶν ἡ EM καὶ ἀσύμμετρος τῇ EZ μήκει. πάλιν, ἐπεὶ μέσον ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν AG , GB , καὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν AG , GB μέσον ἐστίν. καὶ ἐστὶν ἴσον τῷ ΘH · καὶ τὸ ΘH ἄρα μέσον ἐστίν. καὶ
 5 παρὰ ζητῆν τὴν EZ παράκειται πλάτος ποιοῦν τὴν ΘM · ζητῇ ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ ΘM καὶ ἀσύμμετρος τῇ EZ μήκει. καὶ ἐπεὶ αἱ AG , GB δυνάμει μόνον σύμμετροί εἰσιν, ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ AG τῇ GB μήκει. ὥς δὲ ἡ AG πρὸς τὴν GB , οὕτως ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς AG
 10 πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν AG , GB · ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς AG τῷ ὑπὸ τῶν AG , GB . ἀλλὰ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς AG σύμμετρά ἐστι τὰ ἀπὸ τῶν AG , GB , τῷ δὲ ἰπὶ τῶν AG , GB σύμμετρόν ἐστι τὸ δις ὑπὸ τῶν AG , GB · ἀσύμμετρα ἄρα ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν AG , GB
 15 τῷ δις ὑπὸ τῶν AG , GB . καὶ ἐστι τοῖς μὲν ἀπὸ τῶν AG , GB ἴσον τὸ EH , τῷ δὲ δις ὑπὸ τῶν AG , GB ἴσον τὸ $H\Theta$ · ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ EH τῷ ΘH . ὥς δὲ τὸ EH πρὸς τὸ ΘH , οὕτως ἐστὶν ἡ EM πρὸς τὴν ΘM · ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ EM τῇ $M\Theta$ μήκει.
 20 καὶ εἰσιν ἀμφοτέραι ζηταί· αἱ EM , $M\Theta$ ἄρα ζηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἀποτομὴ ἄρα ἐστὶν ἡ $E\Theta$, προσαρμόζουσα δὲ αὐτῇ ἡ ΘM . ὁμοίως δὲ δεῖξομεν, ὅτι καὶ ἡ ΘN αὐτῇ προσαρμόζει· τῇ ἄρα ἀποτομῇ ἄλλη καὶ ἄλλη προσαρμόζει εὐθεῖα δυνάμει μόνον
 25 σύμμετρος οὖσα τῇ ὅλῃ· ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον.

Τῇ ἄρα μέσης ἀποτομῇ δευτέρᾳ μίᾳ μόνον προσ-

1. EM] (alt.) EN L?, ME b. 2. ἐστὶν L. 3. δις ἄρα V. ἐστίν] L, comp. Fb, ἐστὶ PBV. 4. τῷ ΘH] om. L, m. 2 B. ἐστίν] L, comp. Fb, ἐστὶ PBV. 5. ἐστὶν L. 6. ἐστὶν L. 7. GB] in ras. V. ἀσύμμετροί F, sed corr. 8. ἐστὶν L, ἄρα ἐστὶ B. 9. ἀσύμμετρον — 10. GB] m. 2 V. 10. ἐστὶ καὶ B. 11. AG] (prius) φ (non F, habuit B). 12. ἐστὶν P.

et rectae EZ longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. rursus quoniam $A\Gamma \times \Gamma B$ medium est, etiam $2A\Gamma \times \Gamma B$ medium est [prop. XXIII coroll.]. et $\Theta H = 2A\Gamma \times \Gamma B$. itaque etiam ΘH medium est. et rectae rationali EZ adplicatum est latitudinem efficiens ΘM . itaque ΘM rationalis est et rectae EZ longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. et quoniam $A\Gamma$, ΓB potentia tantum commensurabiles sunt $A\Gamma$ et ΓB longitudine incommensurabiles sunt. uerum $A\Gamma : \Gamma B = A\Gamma^2 : A\Gamma \times \Gamma B$ [prop. XXI coroll.]. quare $A\Gamma^2$ et $A\Gamma \times \Gamma B$ incommensurabilia sunt [prop. XI]. uerum $A\Gamma^2$, $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$ commensurabilia, et $A\Gamma \times \Gamma B$, $2A\Gamma \times \Gamma B$ commensurabilia. quare $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$, $2A\Gamma \times \Gamma B$ incommensurabilia sunt [prop. XIII]. est autem $EH = A\Gamma^2 + \Gamma B^2$, $H\Theta = 2A\Gamma \times \Gamma B$. itaque EH , ΘH incommensurabilia sunt. est autem $EH : \Theta H = EM : \Theta M$ [VI, 1]. itaque EM , $M\Theta$ longitudine incommensurabiles sunt [prop. XI]. et utraque rationalis est. quare EM , $M\Theta$ rationales sunt potentia tantum commensurabiles. itaque $E\Theta$ apotome est [prop. LXXIII], ei autem congruens ΘM . iam similiter demonstrabimus, etiam ΘN ei congruere. itaque apotomae rectae diuersae congruunt potentia tantum toti commensurabiles; quod fieri non potest [prop. LXXIX].

Ergo mediae apotomae secundae una tantum recta

15. $\epsilon\sigma\tau\iota\nu$ P. 17. $H\Theta$] in ras. V. EH] mut. in HE m.
 1 V, HE Bb. 18. $\tau\acute{o}$] (alt.) om. b. 19. $M\Theta$] in ras. m.
 1 B, ΘM P. 20. $\acute{\alpha}\rho\alpha$] postea ins. m. 1 V. 21. $\epsilon\lambda\epsilon\iota$] om. φ .
 $\sigma\acute{\upsilon}\mu\mu\epsilon\tau\rho\alpha\iota$] -οι e corr. P. 23. ΘN] N in ras. V. $\pi\rho\sigma\alpha\gamma\mu\acute{o}\tau\tau\epsilon\iota$ V. $\acute{\alpha}\pi\omicron\tau\omicron\mu\eta\ \tau\eta\ E\Theta$ V. 24. $\mu\acute{o}\nu\omicron\nu$] supra scr.
 m. 1 F. 25. $\delta\pi\epsilon\rho\ \acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu\ \acute{\alpha}\delta\acute{\upsilon}\nu\alpha\tau\omicron\nu$] om. V. 26. $\mu\acute{\epsilon}\sigma\eta$
 BFVb.

αρμόζει εὐθεία μέση δυνάμει μόνον σύμμετρος οὐσα τῇ ὅλῃ, μετὰ δὲ τῆς ὅλης μέσον περιέχουσα· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

πβ'.

5 Τῇ ἐλάσσονι μία μόνον προσαρμόζει εὐθεῖα δυνάμει ἀσύμμετρος οὐσα τῇ ὅλῃ ποιοῦσα μετὰ τῆς ὅλης τὸ μὲν ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων φητόν, τὸ δὲ δις ὑπ' αὐτῶν μέσον.

Ἔστω ἡ ἐλάσσων ἡ AB , καὶ τῇ AB προσαρμόζουσα
10 ἔστω ἡ $BΓ$. αἱ ἄρα $ΑΓ$, $ΓΒ$ δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων φητόν, τὸ δὲ δις ὑπ' αὐτῶν μέσον· λέγω, ὅτι τῇ AB ἑτέρα εὐθεῖα οὐ προσαρμόσει τὰ αὐτὰ ποιοῦσα.

Εἰ γὰρ δυνατόν, προσαρμοζέτω ἡ $ΒΔ$ · καὶ αἱ $ΑΔ$,
15 $ΔΒ$ ἄρα δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὰ προειρημένα. καὶ ἐπεὶ, ὃ ὑπερέχει τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$, τούτῳ ὑπερέχει καὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$, τὰ δὲ ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ τετράγωνα τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$
20 τετραγώνων ὑπερέχει φητῶ· φητὰ γὰρ ἔστιν ἀμφοτέρα· καὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ ἄρα τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ ὑπερέχει φητῶ· ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον· μέσα γὰρ ἔστιν ἀμφοτέρα.

Τῇ ἄρα ἐλάσσονι μία μόνον προσαρμόζει εὐθεῖα
25 δυνάμει ἀσύμμετρος οὐσα τῇ ὅλῃ καὶ ποιοῦσα τὰ μὲν

1. εὐθεῖα — μόνον] om. P. 2. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. B F V b. 4. πβ'] corr. ex πγ' F. 5. μόνη V, μόν' η F. 9. ἡ] (prius) ins. m. 2 F. 10. ἄρα] supra scr. m. 1 V. σύμμετροι F. 13. τῇ] corr. ex ἡ m. 2 F. ἑτέραι εὐθεῖαι F. προσαρμόζει b. 14. καὶ] om. B. αἱ] om. b. 15. Ante εἰσὶν ras. 4 litt. V. τὰ] τό V, et F, corr. m. 2. προειρημένα] μὲν ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ (m. 2 F) τετράγωνα (γώνων FV) ἅμα φητόν, τὸ δὲ δις ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ μέσον

media congruit potentia tantum toti commensurabilis, cum tota autem spatium medium comprehendens; quod erat demonstrandum.

LXXXII.

Rectae minori una tantum recta potentia toti incommensurabilis congruit cum tota efficiens summam quadratorum rationalem, rectangulum autem duplum medium.

Sit AB minor, et rectae AB congruat $B\Gamma$. itaque $A\Gamma$, ΓB potentia incommensurabiles sunt efficientes summam quadratorum rationalem, rectangulum autem duplum medium [prop. LXXVI]. dico, rectae AB nullam aliam rectam congruere eadem efficientem.

nam si fieri potest, congruat $B\Delta$. itaque etiam $A\Delta$, ΔB potentia incommensurabiles sunt efficientes, quae diximus [prop. LXXVI]. et quoniam est [II, 7; cfr. p. 238, 7 sq.]

$(A\Delta^2 + \Delta B^2) \div (A\Gamma^2 + \Gamma B^2) = 2A\Delta \times \Delta B \div 2A\Gamma \times \Gamma B$,
et $A\Delta^2 + \Delta B^2$ excedit $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$ spatio rationali (nam utraque rationalia sunt), etiam $2A\Delta \times \Delta B$ excedit $2A\Gamma \times \Gamma B$ spatio rationali; quod fieri non potest [prop. XXVI]; nam utrumque medium est.

Ergo rectae minori una tantum recta congruit potentia toti incommensurabilis et cum tota efficiens

Theon (BFVb). 16. $\tau\acute{\alpha}$] in ras. m. 1 P. 17. $\tau\acute{\omicron}$] $\tau\acute{\alpha}$ B; $\tau\acute{\omega}$ F, sed corr. m. 1. 18. $\dot{\upsilon}\pi\acute{o}$ — $\delta\acute{\epsilon}$] mg. m. 2 B. $\tau\acute{o}\dot{\upsilon}$ — 19. ΔB] e corr. m. 1 F. 19. $A\Delta$] Δ e corr. m. 1 V. 20. $\dot{\upsilon}\pi\epsilon\rho\acute{\epsilon}\chi\epsilon\iota$] m. 2 B. $\epsilon\iota\sigma\iota\nu$ b. 21. $\acute{\alpha}\rho\alpha$] m. 2 B, om. FVb. 23. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$] m. 2 F. 24. $\acute{\alpha}\rho\alpha$] om. P. Ante $\mu\acute{\iota}\alpha$ del. $\tau\eta$ AB m. 2 V. $\mu\acute{o}\nu\eta$ V. 25. $\delta\upsilon\nu\acute{\alpha}\mu\epsilon\iota$ $\mu\acute{o}\nu\omicron\nu$ FVb. $\sigma\acute{\upsilon}\mu\mu\epsilon\tau\rho\omicron\varsigma$ FVb, et B, corr. m. 2. $\kappa\acute{\alpha}\iota$] om. V. $\tau\acute{\alpha}$] $\tau\acute{o}$ PFV.

ἀπ' αὐτῶν τετραγῶνα ἅμα ῥητόν, τὸ δὲ δις ὑπ' αὐτῶν μέσον· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

πγ'.

Τῇ μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιούσῃ μία
 5 μόνον προσαρμόζει εὐθεῖα δυνάμει ἀσύμμετρος
 οὕσα τῇ ὅλῃ, μετὰ δὲ τῆς ὅλης ποιοῦσα τὸ μὲν
 συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων
 μέσον, τὸ δὲ δις ὑπ' αὐτῶν ῥητόν.

Ἔστω ἡ μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα ἡ AB ,
 10 καὶ τῇ AB προσαρμοζέτω ἡ $BΓ$. αἱ ἄρα $ΑΓ$, $ΓΒ$
 δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὰ προκείμενα·
 λέγω, ὅτι τῇ AB ἑτέρα οὐ προσαρμόσει τὰ αὐτὰ
 ποιοῦσα.

Εἰ γὰρ δυνατόν, προσαρμοζέτω ἡ $ΒΔ$ · καὶ αἱ $ΑΔ$,
 15 $ΔΒ$ ἄρα εὐθεῖαι δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι
 τὰ προκείμενα. ἐπεὶ οὖν, ὃ ὑπερέχει τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΔ$,
 $ΔΒ$ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$, τούτῳ ὑπερέχει καὶ τὸ
 δις ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$
 ἀκολουθῶς τοῖς πρὸ αὐτοῦ, τὸ δὲ δις ὑπὸ τῶν $ΑΔ$,
 20 $ΔΒ$ τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ ὑπερέχει ῥητῷ· ῥητὰ
 γὰρ ἐστὶν ἀμφοτέρω· καὶ τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ ἄρα
 τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ ὑπερέχει ῥητῷ· ὅπερ ἐστὶν
 ἀδύνατον· μέσα γὰρ ἐστὶν ἀμφοτέρω. οὐκ ἄρα τῇ AB
 ἑτέρα προσαρμόσει εὐθεῖα δυνάμει ἀσύμμετρος οὕσα

1. τετραγῶνον P, τετραγώνων V, et F, corr. m. 2. Post ῥητόν add. μετὰ τῆς ὅλης V. 2. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. BFVb. 3. πδ' F. 4. μετὰ τοῦ V. Post ῥητοῦ add. καὶ m. 2 F. 5. μόνη V. 10. καὶ τῇ AB] om. B. προσ-
 αρμόζουσα Vb, προσαρμόζουσα δὲ B, ἀρμόζουσα F. 11. τὰ
 προκείμενα] τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ τε-
 τραγώνων μέσον, τὸ δὲ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ ῥητόν Theon

summam quadratorum rationalem, rectangulum autem duplum medium; quod erat demonstrandum.

LXXXIII.

Rectae cum rationali totum medium efficienti una tantum recta congruit potentia toti incommensurabilis, cum tota autem summam quadratorum mediam efficiens, rectangulum autem duplum rationale.

Sit AB recta cum rationali totum medium efficiens, et rectae AB congruat $B\Gamma$. itaque $A\Gamma$, ΓB potentia incommensurabiles sunt proposita efficientes [prop. LXXVII]. dico, rectae AB nullam aliam congruere eadem efficientem.

nam si fieri potest, congruat $B\Delta$. itaque etiam $A\Delta$, ΔB rectae potentia incommensurabiles sunt proposita efficientes [prop. LXXVII]. iam quoniam, sicut in priore propositione [p. 246, 16 sq.]

$(A\Delta^2 + \Delta B^2) \div (A\Gamma^2 + \Gamma B^2) = 2A\Delta \times \Delta B \div 2A\Gamma \times \Gamma B$, et $2A\Delta \times \Delta B$ excedit $2A\Gamma \times \Gamma B$ spatio rationali (nam utrumque rationale est), etiam $A\Delta^2 + \Delta B^2$ excedit $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$ spatio rationali; quod fieri non potest; nam utraque media sunt [prop. XXVI]. itaque rectae AB nulla alia recta congruet potentia toti incommensurabilis, cum tota autem efficiens, quae dixi-

(BFVb). 12. λέγω — 16. προκειμένα] om. P. 12. ταῦτα V.

14. $A\Delta$] Δ e corr. m. 1 b. 16. τὰ προκειμένα] τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $A\Delta$, ΔB τετραγώνων μέσον, τὸ δὲ δις ὑπὸ τῶν $A\Delta$, ΔB (AB , $B\Delta$ φ) ῥητόν Theon (BFVb). τὰ] corr. ex τό F. 18. Post ΓB uacat una linea et spat. 6 litt. b.

21. ἔστιν] om. V, m. 2 F. 23. γὰρ εἰσιν V.

τῇ ὄλῃ, μετὰ δὲ τῆς ὄλης ποιοῦσα τὰ προειρημένα·
μία ἄρα μόνον προσαρμόσει· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

πδ'.

Τῇ μετὰ μέσου μέσον τὸ ὅλον ποιούσῃ μία
μόνη προσαρμόζει εὐθεῖα δυνάμει ἀσύμμετρος
οὔσα τῇ ὄλῃ, μετὰ δὲ τῆς ὄλης ποιοῦσα τό τε
συνκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων
μέσον τό τε δις ὑπ' αὐτῶν μέσον καὶ ἔτι ἀσύμ-
μετρον τῷ συνκείμενῳ ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν.

10 Ἔστω ἡ μετὰ μέσου μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα ἡ AB ,
προσαρμόζουσα δὲ αὐτῇ ἡ $BΓ$. αἱ ἄρα $ΑΓ$, $ΓB$ δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὰ προειρημένα. λέγω,
ὅτι τῇ AB ἑτέρα οὐ προσαρμόσει ποιοῦσα τὰ προει-
ρημένα.

15 $ΕΙ$ γὰρ δυνατόν, προσαρμοζέτω ἡ $BΔ$, ὥστε καὶ
τὰς $ΑΔ$, $ΔB$ δυνάμει ἀσυμμέτρους εἶναι ποιούσας τὰ
τε ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔB$ τετράγωνα ἅμα μέσον καὶ τὸ
δις ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔB$ μέσον καὶ ἔτι τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΔ$,
 $ΔB$ ἀσύμμετρα τῷ δις ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔB$ καὶ ἐκκείσθω
20 φητὴ ἡ EZ , καὶ τοῖς μὲν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓB$ ἴσον παρὰ
τὴν EZ παραβεβλήσθω τὸ $ΕΗ$ πλάτος ποιοῦν τὴν


1. τὰ προειρημένα] τὸ μὲν συνκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων μέσον, τὸ δὲ δις ὑπ' αὐτῶν φητόν Theon (BFVb).

2. μία ἄρα] τῇ ἄρα μετὰ φητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιούσῃ μία BVb et F, om. μία. προσαρμόζει Vb, καὶ τὰ ἐξῆς F. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. BFVb. 3. πδ'] sic m. 2 F. 5. μόνον BFb. Post δυνάμει del. μόνον m. 1 P. 8. τό τε] καὶ τό Theon (BFVb). ὑπὸ τῶν b. ἀσύμμετρος F, sed corr. 9. τὸ συνκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τῷ δις ὑπ' αὐτῶν Theon (BFVb). 11. αὐτῇ] om. Theon (BFVb). 12. τὰ προειρημένα] τό τε (μὲν F) συνκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων μέσον καὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓB$ (ὑπ' αὐτῶν V) μέσον, ἔτι (corr. ex ἐστὶ F) δὲ τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓB$ τετράγωνα (τά add. F) ἀσύμμετρα τῷ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓB$ Theon (BFVb).

mus. ergo una tantum congruet; quod erat demonstrandum.

LXXXIV.

Rectae cum medio totum medium efficienti una tantum congruit recta potentia toti incommensurabilis, cum tota autem efficiens summam quadratorum mediam et duplum rectangulum medium praetereaue summae quadratorum incommensurabile.



Sit AB recta cum medio totum medium efficiens, ei autem congruens $BΓ$. itaque $AΓ$, $ΓB$ potentia incommensurabiles sunt efficientes, quae diximus [prop. LXXVIII]. dico, rectae AB

nullam aliam congruere efficientem, quae diximus.

nam si fieri potest, congruat $BΔ$, ita ut etiam $AΔ$, $ΔB$ potentia incommensurabiles sint efficientes $AΔ^2 + ΔB^2$ medium et $2 AΔ \times ΔB$ medium et praeterea $AΔ^2 + ΔB^2$, $2 AΔ \times ΔB$ incommensurabilia [prop. LXXVIII]. et ponatur rationalis EZ , et quadratis $AΓ^2 + ΓB^2$ aequale rectae EZ adplicetur EH latitudinem efficiens EM , spatio autem $2 AΓ \times ΓB$ aequale rectae EZ adplicetur $ΘH$ latitudinem efficiens $ΘM$.

13. Post προσαρμόσει add. Theon: δυνάμει ἀσύμμετρος οὕσα τῇ ὅλῃ, μετὰ δὲ τῆς ὅλης (BFVb). προειρημένα] -ει- in ras. m. 1 P, προκειμένα Theon (BFVb). 16. εἶναι ἀσύμμετρος BFV, εἶσιν ἀσύμμ. b. τὰ τε] τό τε P, τὰ μὲν BFb, τό τε συγγεόμενον e corr. V. 17. ἀπό] ἐκ V. $AΔ$, $ΔB$ in ras. V. τετραγώνων P et V (supra -ων ras. est). ἄμα] supra scr. V. τό] supra scr. V. 18. ὑπό — $ΔB$] ὑπ' αὐτῶν V. τὰ] om. P. 19. Post $ΔB$ del. m. 2 τετράγωνον V. ἀσύμμετρον P. 20. τοῖς] corr. ex τούς m. 1 V.

EM , τῷ δὲ δις ὑπὸ τῶν AG , GB ἴσον παρὰ τὴν EZ
 παραβεβλήσθω τὸ ΘH πλάτος ποιοῦν τὴν ΘM . λοιπὸν
 ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς AB ἴσον ἐστὶ τῷ EA . ἡ ἄρα AB
 δύναται τὸ EA . πάλιν τοῖς ἀπὸ τῶν AD , AB ἴσον
 5 παρὰ τὴν EZ παραβεβλήσθω τὸ EI πλάτος ποιοῦν
 τὴν EN . ἐστὶ δὲ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς AB ἴσον τῷ EA .
 λοιπὸν ἄρα τὸ δις ὑπὸ τῶν AD , AB ἴσον [ἐστὶ] τῷ
 ΘI . καὶ ἐπεὶ μέσον ἐστὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ
 τῶν AG , GB καὶ ἐστὶν ἴσον τῷ EH , μέσον ἄρα ἐστὶ
 10 καὶ τὸ EH . καὶ παρὰ ῥητὴν τὴν EZ παράκειται πλάτος
 ποιοῦν τὴν EM . ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ EM καὶ ἀσύμ-
 μετρος τῇ EZ μήκει. πάλιν, ἐπεὶ μέσον ἐστὶ τὸ δις
 ὑπὸ τῶν AG , GB καὶ ἐστὶν ἴσον τῷ ΘH , μέσον ἄρα
 καὶ τὸ ΘH . καὶ παρὰ ῥητὴν τὴν EZ παράκειται
 15 πλάτος ποιοῦν τὴν ΘM . ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ΘM καὶ
 ἀσύμμετρος τῇ EZ μήκει. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρόν ἐστι
 τὰ ἀπὸ τῶν AG , GB τῷ δις ὑπὸ τῶν AG , GB , ἀσύμ-
 μετρόν ἐστι καὶ τὸ EH τῷ ΘH . ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶ
 καὶ ἡ EM τῇ $M\Theta$ μήκει. καὶ εἰσὶν ἀμφοτέραι ῥηταί·
 20 αἱ ἄρα EM , $M\Theta$ ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι·
 ἀποτομὴ ἄρα ἐστὶν ἡ $E\Theta$, προσαρμόζουσα δὲ αὐτῇ ἡ
 ΘM . ὁμοίως δὲ δείξομεν, ὅτι ἡ $E\Theta$ πάλιν ἀποτομὴ
 ἐστὶν, προσαρμόζουσα δὲ αὐτῇ ἡ ΘN . τῇ ἄρα ἀποτομῇ
 ἄλλη καὶ ἄλλη προσαρμόζει ῥητὴ δυνάμει μόνον σύμ-
 25 μετρος οὕσα τῇ ὅλῃ· ὅπερ ἐδείχθη ἀδύνατον. οὐκ ἄρα
 τῇ AB ἑτέρα προσαρμόσει εὐθεῖα.

1. παρὰ — 2. παραβεβλήσθω] ἀφορήσθω V. 2. $H\Theta$ B.
 $M\Theta$ in ras. V, ΘN F. λοιπόν — 6. EN] mg. m. 1 F. 4.
 τοὺς μὲν P. 6. τῇ] bis V. 7. ἐστὶ] ἐστὶν P, om. FVb,
 m. 2 B. 9. τῷ] τό F. μέσον — 10. EH] mg. m. 2 V,
 om. καί. 13. τῷ] corr. ex τό V, τό F. ΘH] $H\Theta$ F. 15.
 ῥητὴ — ΘM] mg. m. 1 P (ἐστὶ τῇ). 17. ἀσύμμετρον — 18.

itaque reliquum [II, 7] $AB^2 = EA$. quare AB spatio EA aequalis est quadrata. rursus quadratis $AA^2 + AB^2$ aequale rectae EZ adplicetur EI latitudinem efficiens EN . uerum etiam $AB^2 = EA$. itaque reliquum [II, 7]

$$2 AA \times AB = \Theta I.$$

et quoniam $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$ medium est, et $A\Gamma^2 + \Gamma B^2 = EH$, etiam EH medium est. et rectae rationali EZ adplicatum est latitudinem efficiens EM . itaque EM rationalis est et rectae EZ longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. rursus quoniam medium est $2 A\Gamma \times \Gamma B$, et $2 A\Gamma \times \Gamma B = \Theta H$, etiam ΘH medium est. et rationali EZ adplicatum est latitudinem efficiens ΘM . itaque ΘM rationalis est et rectae EZ longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. et quoniam $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$ et $2 A\Gamma \times \Gamma B$ incommensurabilia sunt, etiam EH , ΘH incommensurabilia sunt. itaque etiam EM , $M\Theta$ longitudine incommensurabiles sunt [VI, 1; prop. XI]. et utraque rationalis est. itaque EM , $M\Theta$ rationales sunt potentia tantum commensurabiles. quare $E\Theta$ apotome est [prop. LXXIII] et ΘM ei congruens. iam similiter demonstrabimus, rursus $E\Theta$ apotomen esse, ei autem congruentem ΘN . itaque apotomae diuersae rectae congruunt potentia tantum toti commensurabiles; quod demonstratum est fieri non posse [prop. LXXIX]. itaque rectae AB nulla alia recta congruet.

ΘH] mg. m. 1 V. 18. ἄρα ἐστὶ BFb. ΘH] $H\Theta'$ F. ἐστὶν PB. 19. μήκει] om. b. 21. προσαρμόττουσα V. 22. ΘM] $H\Theta$ b, et F, corr. ex $M\Theta$. 23. ἐστὶ PBV, comp. Fb. 24. καὶ ἄλλη ὁμότη B. ὁμότη] m. 2 B. 25. ἀδύνατον εἶδειν V. 26. Post AB del. εὐθεία m. 1 V. προσαρμόζει b.

Τῇ ἄρα AB μία μόνον προσαρμόζει εὐθεῖα δυνάμει
 ἀσύμμετρος οὐσα τῇ ὅλῃ, μετὰ δὲ τῆς ὅλης ποιούσα
 τὰ τε ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα ἅμα μέσον καὶ τὸ δις ὑπ'
 αὐτῶν μέσον καὶ ἔτι τὰ ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα ἀσύμ-
 μετρα τῷ δις ὑπ' αὐτῶν ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

Ὅροι τρίτοι.

α'. Ὑποκειμένης ῥητῆς καὶ ἀποτομῆς, ἐὰν μὲν ἡ ὅλη
 τῆς προσαρμοζούσης μείζον δύνηται τῷ ἀπὸ συμμέτρου
 ἑαυτῇ μήκει, καὶ ἡ ὅλη σύμμετρος ἢ τῇ ἐκκειμένη
 ῥητῇ μήκει, καλεῖσθω ἀποτομὴ πρώτη.

¹⁰ *ιστ. αβ.* β'. Ἐὰν δὲ ἡ προσαρμοζούσα σύμμετρος ἢ τῇ ἐκ-
 κειμένη ῥητῇ μήκει, καὶ ἡ ὅλη τῆς προσαρμοζούσης
 μείζον δύνηται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ, καλεῖσθω
² *αβ.* ἀποτομὴ δευτέρα.

15 γ'. Ἐὰν δὲ μηδετέρα σύμμετρος ἢ τῇ ἐκκειμένη
 ῥητῇ μήκει, ἡ δὲ ὅλη τῆς προσαρμοζούσης μείζον δύ-
 νηται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ, καλεῖσθω ἀποτομὴ
² *αβ.* τρίτη.

δ'. Πάλιν, ἐὰν ἡ ὅλη τῆς προσαρμοζούσης μείζον
 20 δύνηται τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ [μήκει], ἐὰν μὲν
 ἡ ὅλη σύμμετρος ἢ τῇ ἐκκειμένη ῥητῇ μήκει, καλεῖσθω
¹ *αβ.* ἀποτομὴ τετάρτη.

¹ *αβ.* ε'. Ἐὰν δὲ ἡ προσαρμοζούσα, πέμπτη—

¹ *αβ.* σ'. Ἐὰν δὲ μηδετέρα, ἕκτη.

1 μόνῃ V. προσαρμόσει BFV. 3. τὰ] om. b, τό P.
 τετράγωνον P. μέσα V. 4. καὶ ἔτι] ἔτι τε BFVb. 5.
 δις] om. b. αὐτῶν] eras. B. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] om. BV.
 6. ὅροι τρίτοι] PV, mg. m. 2 B, om. F; πε' b, mg. m. 2 B.
 numeros om. codd. 7. ἡ] om. B. 8. δύνηται φ. ἀσυμ-
 μέτρου BV, sed corr. 9. ἡ] supra scr. m. 1 b, om. V. 11.
 εἰ V. 12. καὶ ἡ — 13. ἑαυτῇ] om. Fb, mg. m. 2 B. 12.

Ergo rectae AB una tantum congruit recta potentia toti incommensurabilis, cum tota autem efficiens summam quadratorum mediam et duplum rectangulum medium praetereaue summam quadratorum duplo rectangulo incommensurabilem; quod erat demonstrandum.

Definitiones tertiae.

1. Datis recta rationali et apotome, si tota quadrata congruentem excedit quadrato rectae sibi commensurabilis, et tota rationali propositae longitudine commensurabilis est, uocetur apotome prima.

2. Sin congruens rationali propositae longitudine commensurabilis est, et tota quadrata congruentem excedit quadrato rectae sibi commensurabilis, uocetur apotome secunda.

3. Sin neutra rationali propositae longitudine commensurabilis est, et tota quadrata congruentem excedit quadrato rectae sibi commensurabilis, uocetur apotome tertia.

4. Rursus si tota quadrata congruentem excedit quadrato rectae sibi incommensurabilis, si tota rationali propositae longitudine commensurabilis est, uocetur apotome quarta.

5. Sin congruens ei commensurabilis est, quinta.

6. Sin neutra, sexta.

$\kappa\alpha\iota$] supra scr. m. 1 V. 13. $\delta\acute{\upsilon}\nu\alpha\tau\alpha\iota$ PV. Post $\kappa\alpha\lambda\epsilon\iota\sigma\theta\omega$ ras. 2 litt. V. 15. $\epsilon\iota$ V. 16. $\eta\ \delta\epsilon\ \sigma\lambda\eta$ — 17. $\epsilon\alpha\nu\tau\eta$] om. Fb, m. 2 B. 16. $\delta\acute{\upsilon}\nu\alpha\tau\alpha\iota$ V. 19. η] m. 2 B. $\tau\eta\iota$ προσ-
αρμοζούση B, sed corr. (ante $\tau\eta\iota$ ras. 1 litt.). 20. $\sigma\upsilon\mu\mu\epsilon\tau\rho\omicron\nu$
B, corr. m. 2. $\mu\acute{\eta}\kappa\epsilon\iota$] om. P. $\mu\acute{\epsilon}\nu$] supra scr. m. 1 F. 21.
 η] m. 2 B. 24. $-\rho\alpha$ ξ - in ras. m. 1 P.

πε'.

Εύρεῖν τὴν πρώτην ἀποτομήν.

Ἐκκείσθω ῥητὴ ἡ A , καὶ τῇ A μήκει σύμμετρος
 ἔστω ἡ BH . ῥητὴ ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ BH . καὶ ἐκκείσθωσαν
 5 δύο τετράγωνοι ἀριθμοὶ οἱ ΔE , EZ , ὧν ἡ ὑπεροχὴ ὁ
 $Z\Delta$ μὴ ἔστω τετράγωνος· οὐδ' ἄρα ὁ $E\Delta$ πρὸς τὸν
 ΔZ λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετρά-
 γωνον ἀριθμόν. καὶ πεποιήσθω ὡς ὁ $E\Delta$ πρὸς τὸν
 ΔZ , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς BH τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ
 10 τῆς $H\Gamma$ τετράγωνον· σύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς
 BH τῷ ἀπὸ τῆς $H\Gamma$. ῥητὸν δὲ τὸ ἀπὸ τῆς BH .
 ῥητὸν ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς $H\Gamma$. ῥητὴ ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ
 $H\Gamma$. καὶ ἐπεὶ ὁ $E\Delta$ πρὸς τὸν ΔZ λόγον οὐκ ἔχει,
 ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, οὐδ'
 15 ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς BH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $H\Gamma$ λόγον ἔχει,
 ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν·
 ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ BH τῇ $H\Gamma$ μήκει. καὶ εἰσιν
 ἀμφοτέραι ῥηταί· αἱ BH , $H\Gamma$ ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει
 μόνον σύμμετροι· ἡ ἄρα $B\Gamma$ ἀποτομὴ ἐστίν.

20 Λέγω δὴ, ὅτι καὶ πρώτη.

Ὡς γὰρ μεῖζόν ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς BH τοῦ ἀπὸ τῆς
 $H\Gamma$, ἔστω τὸ ἀπὸ τῆς Θ . καὶ ἐπεὶ ἐστίν ὡς ὁ $E\Delta$
 πρὸς τὸν $Z\Delta$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς BH πρὸς τὸ ἀπὸ
 τῆς $H\Gamma$, καὶ ἀναστρέψαντι ἄρα ἐστὶν ὡς ὁ ΔE πρὸς
 25 τὸν EZ , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς HB πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Θ .

1. πε'] om. BFb. 3. ῥητὴ] m. 2 B. μήκει] om. V. 4.
 ἔστω] ἔσται F, corr. m. 1; ἔστω μήκει V. ἐστίν P. BH]
 corr. ex HB V. 5. ἡ] m. 2 F. 6. ΔZ BVb. οὐκ FV.
 7. ΔZ] " $Z\Delta$ " F. 8. πεποιήσθω F. ὁ] m. 2 F. 10.
 τετράγωνον] om. V. σύμμετρος V, corr. m. 1. ἐστίν V.
 11. HB F. HΓ] supra scr. Θ b; Θ Γ F, sed corr. (?).
 ῥητόν — BH] m. 2 B. 13. HΓ] in ras. V, corr. ex ΓΔ
 m. 1 b. 14. ἀριθμός] om. V. ἀριθμόν] om. V. οὐδέ

LXXXV.

Inuenire apotomen primam.

Ponatur rationalis A , et rectae A longitudine commensurabilis sit BH . itaque etiam BH rationalis est. et ponantur duo numeri quadrati ΔE , EZ , quorum

A ———— | B Γ H differentia $Z\Delta$ quadratus
 Θ ———— | E Z Δ numerus ne sit [prop.
 XXVIII lemma I]. itaque

$E\Delta : \Delta Z$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. et fiat $E\Delta : \Delta Z = BH^2 : H\Gamma^2$ [prop. VI coroll.]. itaque BH^2 , $H\Gamma^2$ commensurabilia sunt [prop. VI]. uerum BH^2 rationale est. itaque etiam $H\Gamma^2$ rationale est. quare etiam $H\Gamma$ rationalis est. et quoniam $E\Delta : \Delta Z$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, ne BH^2 quidem ad $H\Gamma^2$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque BH , $H\Gamma$ longitudine incommensurabiles sunt. et utraque rationalis est. itaque BH , $H\Gamma$ rationales sunt potentia tantum incommensurabiles. ergo $B\Gamma$ apotome est [prop. LXXIII].

Iam dico, eandem primam esse.

sit enim $\Theta^2 = BH^2 \div H\Gamma^2$ [prop. XIII lemma]. et quoniam est

$$E\Delta : Z\Delta = BH^2 : H\Gamma^2,$$

etiam conuertendo [V, 19 coroll.] est

$$\Delta E : EZ = HB^2 : \Theta^2.$$

uerum $\Delta E : EZ$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum; nam uterque quadratus

FVb. 15. $\alpha\rho\alpha$] supra scr. m. 1 V. $H\Gamma$] e corr. V. 17. BH] HB φ . 18. $\epsilon\lambda\sigma\iota\nu$ P. 19. $\epsilon\lambda\sigma\iota$ V, comp. b, $\epsilon\lambda\sigma\iota$ comp. φ . 22. Θ] in spat. 2 litt. φ . $E\Delta$] ΔE V. 23. $\tau\acute{o}\nu$] $\tau\acute{o}$ b. ΔZ BVb. 24. ΔE] in ras. m. 1 P.

ὁ δὲ ΔE πρὸς τὸν EZ λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· ἐκάτερος γὰρ τετράγωνός ἐστιν· καὶ τὸ ἀπὸ τῆς HB ἄρα πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Θ λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς
 5 τετράγωνον ἀριθμόν· σύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ BH τῇ Θ μήκει. καὶ δύνανται ἡ BH τῆς $H\Gamma$ μείζον τῷ ἀπὸ τῆς Θ · ἡ BH ἄρα τῆς $H\Gamma$ μείζον δύνανται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἐαυτῇ μήκει. καὶ ἐστὶν ἡ ὅλη ἡ BH σύμμετρος τῇ ἐκκειμένῃ ρητῇ μήκει τῇ A . ἡ $B\Gamma$ ἄρα
 10 ἀποτομή ἐστὶ πρώτη.

Εὐρίηται ἄρα ἡ πρώτη ἀποτομή ἡ $B\Gamma$ · ὅπερ ἔδει εὐρεῖν.

πς'.

Εὐρεῖν τὴν δευτέραν ἀποτομήν.

15 Ἐκκείσθω ρητὴ ἡ A καὶ τῇ A σύμμετρος μήκει ἡ $H\Gamma$. ρητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ $H\Gamma$. καὶ ἐκκείσθωσαν δύο τετράγωνοι ἀριθμοὶ οἱ ΔE , EZ , ὧν ἡ ὑπεροχὴ ὁ ΔZ μὴ ἔστω τετράγωνος. καὶ πεποιήσθω ὡς ὁ $Z\Delta$ πρὸς τὸν ΔE , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΓH τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς
 20 HB τετράγωνον. σύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΓH τετράγωνον τῷ ἀπὸ τῆς HB τετραγώνῳ. ρητὸν δὲ τὸ ἀπὸ τῆς ΓH . ρητὸν ἄρα [ἐστὶ] καὶ τὸ ἀπὸ τῆς HB · ρητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ BH . καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς $H\Gamma$ τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς HB λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς
 25 τετράγωνον ἀριθμόν, ἀσύμμετρός ἐστὶν ἡ ΓH τῇ HB μήκει. καὶ εἰσὶν ἀμφοτέραι ρηταί· αἱ ΓH , HB ἄρα

1. EZ] in ras. V. Post λόγον del. οὐκ F. 2. τετράγωνος] τετράγωνον F, sed corr. 3. ἐστὶ PBV, comp. Fb. ἄρα] om. F. 4. Θ] $H\Theta$ b. 5. BH] HB P. 6. τῆς] τῇ b. 7. Θ . η] ΘH b; $H\Theta$. ἡ F. 8. ἀσύμμετρον P, et eras. ἀ- V. η] (prius) om. BVb. 9. μήκει] om. F. τῇ A μήκει BV. 13. πς'] om. F, in figura πε. 14. τήν] supra scr. m. 1 P. 15. ἀσύμμετρος P, corr. m. rec.; σύμμετρος ἔστω V. 16. ἐστὶν

est. itaque etiam $HB^2 : \Theta^2$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. quare BH, Θ longitudine commensurabiles sunt [prop. IX]. est autem $BH^2 \div H\Gamma^2 = \Theta^2$. itaque BH quadrata excedit $H\Gamma$ quadrato rectae sibi longitudine commensurabilis. et tota BH rationali propositae A commensurabilis est. itaque $B\Gamma$ apotome prima est [def. tert. 1].


Ergo inuenta est $B\Gamma$ apotome prima; quod erat inueniendum.

LXXXVI.

Inuenire apotomen secundam.

Ponatur rationalis A et rectae A longitudine commensurabilis $H\Gamma$. itaque $H\Gamma$ rationalis est. et ponantur duo numeri quadrati $\Delta E, EZ$, quorum differentia ΔZ numerus quadratus ne sit [prop. XXVIII lemma I]. et fiat $Z\Delta : \Delta E = \Gamma H^2 : HB^2$ [prop. VI coroll.]. itaque $\Gamma H^2, HB^2$ commensurabilia sunt [prop. VI] uerum ΓH^2 rationale est. quare etiam HB^2 ratio nale est. itaque etiam BH rationalis est. et quoniam $H\Gamma^2 : HB^2$

rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, ΓH et HB longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. et utraque rationalis est. itaque $\Gamma H, HB$



καὶ ἡ P. 17. τετράγωνοι] om. F, ins. m. 2 ante δύο. δ] ἡ V. 18. πεποιεῖσθαι F. ΔZ FVb. 20. σύμμετρος P, corr. m. rec. 21. τετραγώνων] om. V. 22. ἐστὶ] om. BFVb. 25. ἐστὶν] ἄρα + ἐστὶν (sic) b, ἄρα ἐστὶν V; ἄρα add. m. 2 F. HB] BH BF. 26. μήκει] e corr. V. HB] B e corr. V. ἄρα] om. Pφ.

φηται εἶσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἡ ΒΓ ἄρα ἀποτομή ἐστιν.

Λέγω δὴ, ὅτι καὶ δευτέρα.

Ὡς γὰρ μείζον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΗ τοῦ ἀπὸ τῆς
 5 ΗΓ, ἔστω τὸ ἀπὸ τῆς Θ. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς τὸ ἀπὸ
 τῆς ΒΗ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΗΓ, οὕτως ὁ ΕΔ ἀριθμὸς
 πρὸς τὸν ΔΖ ἀριθμὸν, ἀναστρέψαντι ἄρα ἐστὶν ὡς
 τὸ ἀπὸ τῆς ΒΗ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Θ, οὕτως ὁ ΔΕ
 πρὸς τὸν ΕΖ. καὶ ἐστὶν ἐκότερος τῶν ΔΕ, ΕΖ τε-
 10 τράγωνος· τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς ΒΗ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Θ
 λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον
 ἀριθμὸν· σύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ ΒΗ τῇ Θ μήκει. καὶ
 δύναται ἡ ΒΗ τῆς ΗΓ μείζον τῷ ἀπὸ τῆς Θ· ἡ ΒΗ
 ἄρα τῆς ΗΓ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἐαντῇ
 15 μήκει. καὶ ἐστὶν ἡ προσαρμόζουσα ἡ ΓΗ τῇ ἐκκειμένη
 ῥητῇ σύμμετρος τῇ Α. ἡ ΒΓ ἄρα ἀποτομή ἐστὶ δευτέρα.

Εὐρηται ἄρα δευτέρα ἀποτομή ἡ ΒΓ· ὅπερ ἔδει
 δεῖξαι.

πξ'.

20 Εὐρεῖν τὴν τρίτην ἀποτομήν.

Ἐκκελσθω ῥητὴ ἡ Α, καὶ ἐκκελσθωσαν τρεῖς ἀριθμοὶ
 οἱ Ε, ΒΓ, ΓΔ λόγον μὴ ἔχοντες πρὸς ἀλλήλους, ὃν
 τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν, ὁ δὲ
 ΓΒ πρὸς τὸν ΒΔ λόγον ἔχεται, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς

2. ἐστὶ P^BV, comp. F^b. 3. δὴ] om. V. 6. ἀριθμός] om. V. 7. ἀριθμὸν] om. V. 8. οὕτως] s τῶν (corr. ex τό) F. 9. supra scr. F. ΔΕ] ΕΔ F. 12. ἐστὶν] ἐστὶ μήκει V. μήκει] om. F^Vb, m. 2 B. καὶ δύναται] m. 2 supra scr. B, -ύνα- in ras. V, καὶ ἐστὶν F^b, Bm. 1. 13. μείζων F^b et B, sed corr. m. 2; seq. ras. 6 litt. V. τῷ] in ras. m. 1 B, τοῦ b. τῆς] om. V. ἡ ΒΗ — 14. συμμέτρου] mg. m. 1 V (συμμέτρου etiam in textu). 14. ἀσυμμέτρου b, corr. m. rec. 15. σύμμετρος τῇ ἐκκειμένη ῥητῇ Theon (B^FV b).

rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo $B\Gamma$ apotome est [prop. LXXIII].

Iam dico, eandem secundam esse.

sit enim $\Theta^2 = B\Gamma^2 \div H\Gamma^2$ [prop. XIII lemma]. iam quoniam est $BH^2 : H\Gamma^2 = EA : AZ$,

conuertendo [V, 19 coroll.] erit $BH^2 : \Theta^2 = AE : EZ$. et uterque AE , EZ quadratus est. itaque $BH^2 : \Theta^2$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque BH , Θ longitudine commensurabiles sunt [prop. IX]. et $BH^2 \div H\Gamma^2 = \Theta^2$. quare BH quadrata excedit $H\Gamma$ quadrato rectae sibi longitudine commensurabilis. et congruens ΓH rationali propositae A commensurabilis est. itaque $B\Gamma$ apotome est secunda [deff. tert. 2].

Ergo inuenta est apotome secunda $B\Gamma$; quod erat demonstrandum.

LXXXVII.

Inuenire apotomen tertiam.

Ponatur rationalis A , et ponantur tres numeri E , $B\Gamma$, ΓA rationem inter se non habentes, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, ΓB autem ad $B A$ rationem habeat, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, et fiat $E : B\Gamma = A^2 : ZH^2$ [prop. XXVIII lemma I], et $B\Gamma : \Gamma A = ZH^2 : H\Theta^2$. iam quon-

16. μήκει τῇ A Bb, τῇ A μήκει V. ἄρα] ἄρα φητὴ F. ἐστὶν PB. 17. ἄρα ἢ V. $B\Gamma$] φ (de F non liquet). ὅπερ ἐδείξαι] φ et comp. P, ὅπερ ἐδείξει V, om. Bb. 19. πς' F (euan.). 21. ἢ φητὴ ἢ P. 22. ΓA] corr. ex A m. 2 F. 24. ΓB] corr. ex ΓA m. rec. b.

πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, καὶ πεποιήσθω ὥς μὲν ὁ *E*
 πρὸς τὸν *BΓ*, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς *A* τετράγωνον πρὸς
 τὸ ἀπὸ τῆς *ZH* τετράγωνον, ὥς δὲ ὁ *BΓ* πρὸς τὸν
ΓΔ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς *ZH* τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ
 5 τῆς *HΘ*. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὥς ὁ *E* πρὸς τὸν *BΓ*, οὕτως
 τὸ ἀπὸ τῆς *A* τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *ZH* τε-
 τράγωνον, σύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς *A* τετρά-
 γωνον τῷ ἀπὸ τῆς *ZH* τετραγώνῳ. φητὸν δὲ τὸ ἀπὸ
 τῆς *A* τετράγωνον. φητὸν ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς *ZH*.
 10 φητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ *ZH*. καὶ ἐπεὶ ὁ *E* πρὸς τὸν *BΓ*
 λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον
 ἀριθμόν, οὐδ' ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς *A* τετράγωνον πρὸς τὸ
 ἀπὸ τῆς *ZH* [τετράγωνον] λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος
 ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· ἀσύμμετρος ἄρα
 15 ἐστὶν ἡ *A* τῇ *ZH* μήκει. πάλιν, ἐπεὶ ἐστὶν ὥς ὁ *BΓ*
 πρὸς τὸν *ΓΔ*, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς *ZH* τετράγωνον πρὸς
 τὸ ἀπὸ τῆς *HΘ*, σύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς *ZH*
 τῷ ἀπὸ τῆς *HΘ*. φητὸν δὲ τὸ ἀπὸ τῆς *ZH*. φητὸν
 ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς *HΘ*. φητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ *HΘ*. καὶ
 20 ἐπεὶ ὁ *BΓ* πρὸς τὸν *ΓΔ* λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετρά-
 γωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, 'οὐδ' ἄρα
 τὸ ἀπὸ τῆς *ZH* πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *HΘ* λόγον ἔχει, ὃν
 τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· ἀσύμ-
 μετρος ἄρα ἐστὶν ἡ *ZH* τῇ *HΘ* μήκει. καὶ εἰσὶν ἀμ-
 25 φότεραι φηταί· αἱ *ZH*, *HΘ* ἄρα φηταί εἰσι δυνάμει
 μόνον σύμμετροι· ἀποτομὴ ἄρα ἐστὶν ἡ *ZΘ*.

Λέγω δὴ, ὅτι καὶ τρίτη.

Ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὥς μὲν ὁ *E* πρὸς τὸν *BΓ*, οὕτως
 τὸ ἀπὸ τῆς *A* τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *ZH*, ὥς

1. πεποιήσθω F. 4. *ZH*] corr. ex *AH* F. 6. *A* τετρά-
 γωνον] *A* V. 7. ἐστὶ] om. V. τετράγωνον] om. V. 8. τε-

iam est $E:BG = A^2:ZH^2$, A^2 et ZH^2 commensurabilia sunt [prop. VI]. uerum A^2 rationale est. itaque etiam ZH^2 rationale est. quare ZH rationalis est. et quoniam $E:BG$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, ne A^2 quidem ad ZH^2 rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque A , ZH longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. rursus quoniam est

$$BG:GA = ZH^2:H\Theta^2,$$

ZH^2 et $H\Theta^2$ commensurabilia sunt [prop. VI]. uerum ZH^2 rationale est; itaque etiam $H\Theta^2$ rationale est. quare $H\Theta$ rationalis est. et quoniam $BG:GA$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, ne ZH^2 quidem ad $H\Theta^2$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. quare ZH , $H\Theta$ longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. et utraque rationalis est. itaque ZH , $H\Theta$ rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo $Z\Theta$ apotome est [prop. LXXIII].

Iam dico, eandem tertiam esse.

nam quoniam est $E:BG = A^2:ZH^2$, $BG:GA = ZH^2:H\Theta^2$, ex aequo [V, 22] $E:GA = A^2:H\Theta^2$.

$\tau\epsilon\alpha\gamma\acute{\omega}\nu\varphi$] om. V. $\delta\acute{\epsilon}$] $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$, add. $\delta\acute{\epsilon}$ m. 2, V. 9. $\tau\epsilon\tau\rho\acute{\alpha}\gamma\omega\nu\varphi$] om. V. 12. $\sigma\acute{\upsilon}\delta\acute{\epsilon}$ b. 13. $\tau\epsilon\tau\rho\acute{\alpha}\gamma\omega\nu\varphi$] om. P. 15. $\tau\eta$] corr. ex $\tau\eta\varsigma$ B, $\tau\eta\varsigma$ F. 16. $\tau\acute{o}\nu$] om. B. 17. $H\Theta$] e corr. F. 18. $\tau\tilde{\omega}$] $\pi\rho\acute{o}\varsigma\ \tau\acute{o}$ Fb. $\xi\eta\tau\acute{o}\nu$ — ZH] mg. m. 1 V. 19. $\acute{\alpha}\rho\alpha\ \kappa\alpha\iota$] in ras. V. $\xi\eta\tau\acute{\eta}$ — $H\Theta$] mg. m. 1 F. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\acute{\iota}\nu$] om. b. 21. $\sigma\acute{\upsilon}\delta\acute{\epsilon}$ b. 22. $\tau\acute{o}$] (alt.) supra scr. m. 1 F. $H\Theta$] H eras. V. 24. ZH] HZ F. 25. $\alpha\iota$ — $\acute{\epsilon}\lambda\sigma\iota$] mg. m. 2 B, in textu $\alpha\iota$ $\acute{\epsilon}\lambda\sigma\iota$. $\acute{\epsilon}\lambda\sigma\iota\nu$ P. 27. $\tau\epsilon\iota\tau\eta$] corr. ex $\xi\eta\tau\acute{\eta}$ m. 1 P. 28. $\sigma\acute{\upsilon}\tau\omega$ B.

δὲ ὁ $B\Gamma$ πρὸς τὸν $\Gamma\Delta$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ZH πρὸς
τὸ ἀπὸ τῆς ΘH , δι' ἴσου ἄρα ἐστὶν ὡς ὁ E πρὸς τὸν
 $\Gamma\Delta$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς A πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΘH . ὁ
δὲ E πρὸς τὸν $\Gamma\Delta$ λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος
5 ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· οὐδ' ἄρα τὸ ἀπὸ
τῆς A πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $H\Theta$ λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος
ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· ἀσύμμετρος ἄρα
ἢ A τῇ $H\Theta$ μήκει. οὐδετέρα ἄρα τῶν ZH , $H\Theta$ σύμ-
μετρός ἐστι τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ τῇ A μήκει. ὃ οὖν
10 μείζον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ZH τοῦ ἀπὸ τῆς $H\Theta$, ἔστω
τὸ ἀπὸ τῆς K . ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ὁ $B\Gamma$ πρὸς τὸν $\Gamma\Delta$,
οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ZH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $H\Theta$, ἀναστρέ-
ψαντι ἄρα ἐστὶν ὡς ὁ $B\Gamma$ πρὸς τὸν $B\Delta$, οὕτως τὸ
ἀπὸ τῆς ZH τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς K . ὁ δὲ
15 $B\Gamma$ πρὸς τὸν $B\Delta$ λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς
πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ZH ἄρα
πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς K λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς
πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν. σύμμετρός ἄρα ἐστὶν ἢ ZH
τῇ K μήκει, καὶ δύναται ἢ ZH τῆς $H\Theta$ μείζον τῷ
20 ἀπὸ συμέτρου ἐαντῇ. καὶ οὐδετέρα τῶν ZH , $H\Theta$
σύμμετρός ἐστὶ τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ τῇ A μήκει· ἢ $Z\Theta$
ἄρα ἀποτομή ἐστὶ τρίτη.

Εὐρηται ἄρα ἢ τρίτη ἀποτομή ἢ $Z\Theta$. ὅπερ ἔδει
δεῖξαι.

25

πη'.

Εὐρεῖν τὴν τετάρτην ἀποτομήν.

Ἐκκείσθω ῥητὴ ἢ A καὶ τῇ A μήκει σύμμετρος
ἢ BH · ῥητὴ ἄρα ἐστὶ καὶ ἢ BH . καὶ ἐκκείσθωσαν

1. τόν] om. P. οὕτω B. 3. ΘH] corr. ex $H\Theta$ V. 4.
τὸν $\Gamma\Delta$] corr. ex Γ m. 2 F. 9. ἐστὶν V. 11. $B\Gamma$] ras. 2

uerum $E: \Gamma A$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum; itaque ne A^2 quidem ad $H\Theta^2$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. quare $A, H\Theta$ longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. itaque neutra rectarum $ZH, H\Theta$ rationali propositae A commensurabilis est longitudine. iam sit $ZH^2 \div H\Theta^2 = K^2$ [prop. XIII lemma]. quoniam igitur est $B\Gamma: \Gamma A = ZH^2: H\Theta^2$, conuertendo [V, 19 coroll.] est $B\Gamma: B A = ZH^2: K^2$. uerum $B\Gamma: B A$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque etiam $ZH^2: K^2$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. quare ZH, K longitudine commensurabiles sunt [prop. IX], et ZH quadrata excedit $H\Theta$ quadrato rectae sibi commensurabilis. et neutra rectarum $ZH, H\Theta$ rationali propositae A longitudine commensurabilis est. itaque $Z\Theta$ apotome est tertia [deff. tert. 3].

Ergo inuenta est apotome tertia $Z\Theta$; quod erat demonstrandum.

LXXXVIII.

Inuenire apotomen quartam.

Ponatur rationalis A et rectae A longitudine commensurabilis BH . itaque etiam BH rationalis est.

litt. V, corr. ex BE F. τόν] om. P. ΓA] eras. V, corr. ex ΓΓ m. 1 b. 12. τό] (alt.) supra scr. m. 1 b. 13. BΓ] corr. ex ΓB V. 15. πρὸς] πρὸν P. 16. ἄρα] supra scr. F. 19. τῇ K — ἡ ZH] mg. m. 1 P. Post μείζον add. Theon: τῷ ἀπὸ τῆς K. ἡ ἄρα ZH τῆς HΘ μείζον δύναται (BVb, F mg. m. 1). 23. ἡ] om. FV. τολῆ] om. F. ὅπερ ἐδει δεῖξαι] comp. P, om. Bb. 24. δεῖξαι] εὐρεῖν V φ. 25. πζ' F, et sic deinceps. 27. μὴ^{κει} b. 28. ἄρ P, corr. m. 2. εἶσιν PBV. καί] (prius) corr. ex κα P, om. FV.

δύο ἀριθμοὶ οἱ ΔZ , ZE , ὥστε τὸν ΔE ὅλον πρὸς
 ἐκάτερον τῶν ΔZ , EZ λόγον μὴ ἔχειν, ὃν τετράγωνος
 ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν. καὶ πεποιήσθω
 ὡς ὁ ΔE πρὸς τὸν EZ , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς BH τε-
 5 τράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $H\Gamma$ · σύμμετρον ἄρα ἐστὶ
 τὸ ἀπὸ τῆς BH τῷ ἀπὸ τῆς $H\Gamma$. ῥητόν δὲ τὸ ἀπὸ
 τῆς BH · ῥητόν ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς $H\Gamma$ · ῥητὴ ἄρα
 ἐστὶν ἡ $H\Gamma$. καὶ ἐπεὶ ὁ ΔE πρὸς τὸν EZ λόγον οὐκ
 ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν,
 10 οὐδ' ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς BH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $H\Gamma$ λόγον
 ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν·
 ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ BH τῇ $H\Gamma$ μήκει. καὶ εἰσιν
 ἀμφοτέραι ῥηταί· αἱ BH , $H\Gamma$ ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει
 μόνον σύμμετροι· ἀποτομὴ ἄρα ἐστὶν ἡ $B\Gamma$.

15 [Λέγω δὴ, ὅτι καὶ τετάρτη].

Ὡς οὖν μεῖζόν ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς BH τοῦ ἀπὸ τῆς
 $H\Gamma$, ἔστω τὸ ἀπὸ τῆς Θ . ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ὁ ΔE
 πρὸς τὸν EZ , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς BH πρὸς τὸ ἀπὸ
 τῆς $H\Gamma$, καὶ ἀναστρέψαντι ἄρα ἐστὶν ὡς ὁ $E\Delta$ πρὸς
 20 τὸν ΔZ , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς HB πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Θ .
 ὁ δὲ $E\Delta$ πρὸς τὸν ΔZ λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος
 ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· οὐδ' ἄρα τὸ ἀπὸ
 τῆς HB πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Θ λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος
 ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· ἀσύμμετρος ἄρα
 25 ἐστὶν ἡ BH τῇ Θ μήκει. καὶ δύναται ἡ BH τῆς $H\Gamma$
 μεῖζον τῷ ἀπὸ τῆς Θ · ἡ ἄρα BH τῆς $H\Gamma$ μεῖζον δύ-
 νηται τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἐαυτῇ. καὶ ἐστὶν ὅλη ἡ BH

2. EZ] eras. V. μῆ] om. φ. 4. τόν] mg. m. 1 P. 5.
 πρὸς] om. φ. $H\Gamma$] $B\Gamma$ supra scr. H b. ἐστίν P, et V
 del. v. 8. ἐστίν] ἐστὶ καὶ FV. 9. πρὸς — 10. τῆς (prius)]
 om. φ lacuna relicta. 9. ἀριθμόν] om. V. 10. οὐδέ b.
 11. ἀριθμός] om. V. ἀριθμόν] om. V. 12. ἐστίν] om. FV.

A ————— | B ———— | Γ ———— | H et ponantur duo numeri ΔZ ,
 Θ ————— | Δ ———— | Z ———— | E ZE , ita ut totus ΔE ad
 utrumque ΔZ , EZ rationem
 non habeat, quam numerus quadratus ad numerum
 quadratum. et fiat $\Delta E: EZ = BH^2: H\Gamma^2$ [prop. VI
 coroll.]. itaque BH^2 , $H\Gamma^2$ commensurabilia sunt
 [prop. VI]. uerum BH^2 rationale est. itaque etiam
 $H\Gamma^2$ rationale est. quare $H\Gamma$ rationalis est. et
 quoniam $\Delta E: EZ$ rationem non habet, quam numerus
 quadratus ad numerum quadratum, ne BH^2 quidem
 ad $H\Gamma^2$ rationem habet, quam numerus quadratus ad
 numerum quadratum. quare BH , $H\Gamma$ longitudine in-
 commensurabiles sunt [prop. IX]. et utraque ratio-
 nalis est. itaque BH , $H\Gamma$ rationales sunt potentia
 tantum commensurabiles. ergo $B\Gamma$ apotome est [prop.
 LXXIII]. iam sit $\Theta^2 = BH^2 \div H\Gamma^2$ [prop. XIII lemma].
 quoniam igitur est $\Delta E: EZ = BH^2: H\Gamma^2$, etiam conuer-
 tendo [V, 19 coroll.] est $E\Delta: \Delta Z = BH^2: \Theta^2$. uerum
 $E\Delta: \Delta Z$ rationem non habet, quam numerus quadratus
 ad numerum quadratum. itaque ne BH^2 quidem ad Θ^2
 rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum
 quadratum. quare BH , Θ longitudine incommensura-
 biles sunt [prop. IX]. est autem $BH^2 \div H\Gamma^2 = \Theta^2$.
 itaque BH quadrata excedit $H\Gamma$ quadrato rectae sibi

BH] $\mu\eta$ φ . $\mu\eta\kappa\epsilon\iota$] om. FV. $\kappa\alpha\iota$ — 13. $\delta\eta\tau\alpha\iota$] mg. m.
 1 V. 13. $\epsilon\iota\sigma\iota\nu$ P. 14. $\sigma\acute{\upsilon}\mu\mu\epsilon\tau\rho\omicron\nu$ $\omicron\upsilon\kappa$ φ . $B\Gamma$] B e corr. φ ,
 BH P. 15. $\lambda\acute{\epsilon}\gamma\omega$ — $\tau\epsilon\tau\acute{\alpha}\rho\tau\eta$] om. PB, $\kappa\alpha\iota$ φ . $\delta\eta$] om. V.
 17. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$] om. V. 18. $\pi\rho\acute{o}\varsigma$ $\tau\acute{o}\nu$ EZ] $\tau\omicron\upsilon$ $\acute{\alpha}\nu\theta$ $\tau\eta\varsigma$ EZ b,
 corr. mg. m. 1. $\pi\rho\acute{o}\varsigma$ $\tau\acute{o}$] $\tau\omicron\upsilon$ b. 19. $H\Gamma$] H in ras. m.
 1 B. $\acute{\alpha}\nu\alpha\sigma\tau\rho\acute{\epsilon}\psi\alpha\iota$ φ . 20. $\tau\acute{o}\nu$] om. P, $\tau\acute{o}$ b. BH V. 21.
 $E\Delta$] Δ in ras. m. 1 B. 22. $\sigma\acute{\upsilon}\delta\acute{\epsilon}$ Vb. 24. $\acute{\alpha}\rho\iota\theta\mu\acute{o}\varsigma$] om. V.
 $\acute{\alpha}\rho\alpha$] in ras. V. 25. BH] (alt.) mut. in HB V, HB Bf b.
 27. $\sigma\acute{\upsilon}\mu\mu\epsilon\tau\rho\omicron\nu$ b, corr. m. rec. $\acute{\epsilon}\alpha\nu\tau\eta\grave{\eta}$ $\mu\eta\kappa\epsilon\iota$ B. η $\delta\lambda\eta$ η V.

σύμμετρος τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ μήκει τῇ *A*. ἡ ἄρα *BΓ* ἀποτομή ἐστὶ τετάρτη.

Εὐρίθεται ἄρα ἡ τετάρτη ἀποτομή· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

πθ'.

5 *Εὐρεῖν τὴν πέμπτην ἀποτομήν.*

Ἐκκείσθω ῥητὴ ἡ *A*, καὶ τῇ *A* μήκει σύμμετρος ἔστω ἡ *ΓΗ*. ῥητὴ ἄρα [ἐστίν] ἡ *ΓΗ*. καὶ ἐκκείσθωσαν δύο ἀριθμοὶ οἱ *ΔΖ*, *ΖΕ*, ὥστε τὸν *ΔΕ* πρὸς ἐκάτερον τῶν *ΔΖ*, *ΖΕ* λόγον πάλιν μὴ ἔχειν, ὃν τετράγωνος
10 ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν· καὶ πεποιήσθω ὥς ὁ *ΖΕ* πρὸς τὸν *ΕΔ*, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς *ΓΗ* πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *ΗΒ*. ῥητὸν ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς *ΗΒ*. ῥητὴ ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ *ΒΗ*. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὥς ὁ *ΔΕ* πρὸς τὸν *ΕΖ*, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς *ΒΗ* πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς
15 *ΗΓ*, ὁ δὲ *ΔΕ* πρὸς τὸν *ΕΖ* λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν, οὐδ' ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς *ΒΗ* πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *ΗΓ* λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν· ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ *ΒΗ* τῇ *ΗΓ* μήκει. καὶ εἰσιν
20 ἀμφοτέραι ῥηταί· αἱ *ΒΗ*, *ΗΓ* ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἡ *ΒΓ* ἄρα ἀποτομή ἐστίν.

Λέγω δὴ, ὅτι καὶ πέμπτη.

Ὅτι γὰρ μεζὼν ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς *ΒΗ* τοῦ ἀπὸ τῆς *ΗΓ*, ἔστω τὸ ἀπὸ τῆς *Θ*. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὥς τὸ ἀπὸ
25 τῆς *ΒΗ* πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *ΗΓ*, οὕτως ὁ *ΔΕ* πρὸς τὸν

1. *BΓ* ἄρα *B*. 2. ἐστὶν *P*. 3. ἡ] καὶ ἡ *F*, ἡ *BΓB*. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. *P*, om. *BFVb*. 7. ἐστίν] om. *P*. 8. *ΖΕ*] *ΕΖF*. *ΔΕ*] *ΑΕ* in ras. *V*. 9. τῶν] τὸν φ. πάλιν] om. *Fb*. 10. πεποιήσθω *F*. 11. τόν] om. *P*. 12. Post *ΗΒ* add. σύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς *ΗΓ* (*ΓΗV*) τῷ ἀπὸ

incommensurabilis. et tota BH rationali propositae A commensurabilis est longitudine. itaque $B\Gamma$ apotome est quarta [deff. tert. 4].

Ergo inuenta est quarta apotome; quod erat demonstrandum.

LXXXIX.

Inuenire apotomen quintam.

Ponatur rationalis A , et rectae A longitudine commensurabilis sit ΓH . itaque ΓH rationalis est. et ponantur duo numeri ΔZ , ZE , ita ut ΔE rursus ad neutrum numerorum ΔZ , ZE rationem habeat, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. et fiat $ZE:E\Delta = \Gamma H^2:HB^2$. itaque etiam HB^2 rationale est [prop. VI]. quare etiam BH rationalis est. et quoniam est $\Delta E:EZ = BH^2:H\Gamma^2$, et $\Delta E:EZ$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, ne BH^2 quidem ad $H\Gamma^2$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque BH , $H\Gamma$ longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. et utraque rationalis est. quare BH , $H\Gamma$ rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo $B\Gamma$ apotome est [prop. LXXIII].

Iam dico, eandem quintam esse.

sit enim $\Theta^2 = BH^2 \div H\Gamma^2$ [prop. XIII lemma]. quoniam igitur est

$$BH^2 : H\Gamma^2 = \Delta E : EZ,$$

$\tau\eta\varsigma BH$. $\phi\eta\tau\acute{o}\nu$ δὲ τὸ ἀπὸ $\tau\eta\varsigma \Gamma H$ b, mg. FV. $\phi\eta\tau\acute{o}\nu - HB$ mg. V. $\acute{\alpha}\rho\alpha - 13$. $\phi\eta\tau\acute{\eta}$] om. P. 15. $H\Gamma$] Γ in ras. V. 16. οὐδ' $\acute{\alpha}\rho\alpha$] οὐδέ P. 18. $\tau\epsilon\tau\rho\acute{\alpha}\gamma\omega\gamma\omega\gamma\omega\gamma$] $\tau\epsilon\tau\rho\acute{\alpha}\gamma\omega\gamma\omega\gamma\omega\gamma$ b, sed corr. 21. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ BV, comp. Fb. 25. $H\Gamma - p.$ 270, 1. EZ] in ras. F.

EZ , ἀναστρέψαντι ἄρα ἐστὶν ὡς ὁ $EΔ$ πρὸς τὸν $ΔΖ$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς BH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $Θ$. ὁ δὲ $EΔ$ πρὸς τὸν $ΔΖ$ λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν· οὐδ' ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς BH
 5 πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $Θ$ λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν· ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ BH τῇ $Θ$ μήκει. καὶ δύναται ἡ BH τῆς $HΓ$ μείζον τῷ ἀπὸ τῆς $Θ$ · ἡ HB ἄρα τῆς $HΓ$ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσύμμετρου ἐαυτῇ μήκει. καὶ ἐστὶν ἡ προσ-
 10 αρμόζουσα ἡ $ΓH$ σύμμετρος τῇ ἐκκειμένη φητῇ τῇ A μήκει· ἡ ἄρα $BΓ$ ἀποτομή ἐστὶ πέμπτη.

Εὐρίθεται ἄρα ἡ πέμπτη ἀποτομή ἡ $BΓ$ · ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

α'.

15 Εὐρεῖν τὴν ἕκτην ἀποτομήν.

Ἐκκείσθω φητὴ ἡ A καὶ τρεῖς ἀριθμοὶ οἱ $E, BΓ, ΓΔ$ λόγον μὴ ἔχοντες πρὸς ἀλλήλους, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν· ἔτι δὲ καὶ ὁ $ΓB$ πρὸς τὸν $BΔ$ λόγον μὴ ἔχέτω, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς
 20 πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν· καὶ πεποιθήσθω ὡς μὲν ὁ E πρὸς τὸν $BΓ$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς A πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ZH , ὡς δὲ ὁ $BΓ$ πρὸς τὸν $ΓΔ$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ZH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $HΘ$.

Ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ὁ E πρὸς τὸν $BΓ$, οὕτως τὸ
 25 ἀπὸ τῆς A πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ZH , σύμμετρον ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς A τῷ ἀπὸ τῆς ZH . φητὸν δὲ τὸ ἀπὸ τῆς A φητὸν ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ZH · φητὴ ἄρα ἐστὶ καὶ

1. ἀναστρέψαντι — 2. $EΔ$] e corr. F. 1. ἐστὶν] om. B F b. $EΔ$] $ΔE$ P. 4. HB F. 7. $Θ$] $HΘ$ F. BH] HB B F V. μείζον] om. P. 8. ἄρα HB V. BH P. δύναται] om. V. 9. ἀσύμμετρον] ἀ- in ras. V, m. 2 B. ἐαυτῇ δύναται V. 10. Post $ΓH$ eras. καὶ ἀ- V. 11. $BΓ$ ἄρα b.

conuertendo [V, 19 coroll.] est $EA:AZ = BH^2:\Theta^2$.
uerum $EA:AZ$ rationem non habet, quam numerus
quadratus ad numerum quadratum. itaque ne BH^2
quidem ad Θ^2 rationem habet, quam numerus quadratus
ad numerum quadratum. quare BH, Θ longitudine
incommensurabiles sunt [prop. IX]. est autem

$$BH^2 \div HI^2 = \Theta^2.$$


itaque HB quadrata excedit HI quadrato rectae sibi
incommensurabilis. et congruens GH rationali pro-
positae A longitudine commensurabilis est. itaque
 $B\Gamma$ apotome est quinta [deff. tert. 5].

Ergo inuenta est apotome quinta $B\Gamma$; quod erat
demonstrandum.

XC.

Inuenire apotomen sextam.

Ponatur rationalis A et tres numeri $E, B\Gamma, \Gamma\Delta$
inter se rationem non habentes, quam numerus qua-



dratus ad numerum quadratum; et
praeterea ne ΓB quidem ad $B\Delta$
rationem habeat, quam numerus
quadratus ad numerum quadra-
tum. et fiat $E:B\Gamma = A^2:ZH^2$,
 $B\Gamma:\Gamma\Delta = ZH^2:H\Theta^2$.

iam quoniam est $E:B\Gamma = A^2:ZH^2$, erunt A^2 ,
 ZH^2 commensurabilia [prop. VI]. uerum A^2 rationale
est. itaque etiam ZH^2 rationale est. quare etiam

12. ὁπερ ἐδείξει comp. P, om. BFVb. 16. συγγεῖσθω
B, corr. m. 2. Post E eras. B F. 18. ΓB] supra add.
 $\Gamma\Delta$ B; $B\Gamma$ V. 19. $B\Delta$] corr. ex $B\Gamma$ m. rec. P. 20. πε-
ποιήσθω P, sed corr.; πεποιεῖσθω F. μὲν δ] ὁ μὲν V. 22.
τόν] om. B. 23. $H\Theta$] ΘH b. 26. ῥητόν — 27. ZH]
mg. V. 27. καί] ἐστὶ καί BFb. ἐστὶν PB.

ἡ ZH . καὶ ἐπεὶ ὁ E πρὸς τὸν $B\Gamma$ λόγον οὐκ ἔχει,
 ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν,
 οὐδ' ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς A πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ZH λόγον
 ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν.
 5 ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ A τῇ ZH μήκει. πάλιν, ἐπεὶ
 ἐστὶν ὡς ὁ $B\Gamma$ πρὸς τὸν $\Gamma\Delta$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ZH
 πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $H\Theta$, σύμμετρον ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ZH
 τῷ ἀπὸ τῆς $H\Theta$. ῥητὸν δὲ τὸ ἀπὸ τῆς ZH . ῥητὸν
 ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς $H\Theta$. ῥητὴ ἄρα καὶ ἡ $H\Theta$. καὶ
 10 ἐπεὶ ὁ $B\Gamma$ πρὸς τὸν $\Gamma\Delta$ λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος
 ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, οὐδ' ἄρα τὸ ἀπὸ
 τῆς ZH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $H\Theta$ λόγον ἔχει, ὃν τετρά-
 γωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· ἀσύμμετρος
 ἄρα ἐστὶν ἡ ZH τῇ $H\Theta$ μήκει. καὶ εἰσιν ἀμφοτέραι
 15 ῥηταί· αἱ ZH , $H\Theta$ ἄρα ῥηταί· εἰσι δυνάμει μόνον σύμ-
 μετροι· ἡ ἄρα $Z\Theta$ ἀποτομή ἐστίν.

Λέγω δὴ, ὅτι καὶ ἔκτε.

Ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὡς μὲν ὁ E πρὸς τὸν $B\Gamma$, οὕτως
 τὸ ἀπὸ τῆς A πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ZH , ὡς δὲ ὁ $B\Gamma$
 20 πρὸς τὸν $\Gamma\Delta$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ZH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς
 $H\Theta$, δι' ἴσου ἄρα ἐστὶν ὡς ὁ E πρὸς τὸν $\Gamma\Delta$, οὕτως
 τὸ ἀπὸ τῆς A πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $H\Theta$. ὁ δὲ E πρὸς
 τὸν $\Gamma\Delta$ λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς
 τετράγωνον ἀριθμόν· οὐδ' ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς A πρὸς
 25 τὸ ἀπὸ τῆς $H\Theta$ λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς
 πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ
 A τῇ $H\Theta$ μήκει· οὐδετέρα ἄρα τῶν ZH , $H\Theta$ σύμ-
 μετρός ἐστι τῇ A ῥητῇ μήκει. ᾧ οὖν μεῖζόν ἐστι

1. HZ P. 3. οὐδέ Vb. 5. ἐστὶ V. A] K φ. τῇ]
 τῆς F. 6. ἡ $B\Gamma$ πρὸς τὴν B. 7. ἄρα ἐστὶ V. 11. οὐδέ V.
 15. σύμμετροι μόνον V. 16. ἐστὶ BV, comp. Fb. 17. δῆ]

ZH rationalis est. et quoniam $E:BF$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, ne A^2 quidem ad ZH^2 rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque A, ZH longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. rursus quoniam est

$$BF:FA = ZH^2:HO^2,$$

ZH^2 et HO^2 commensurabilia sunt [prop. VI]. uerum ZH^2 rationale est; quare etiam HO^2 rationale est. itaque HO rationalis est. et quoniam $BF:FA$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, ne ZH^2 quidem ad HO^2 rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque ZH, HO longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. et utraque rationalis est. itaque ZH, HO rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo ZO apotome est [prop. LXXIII].

Iam dico, eandem sextam esse. nam quoniam est $E:BF = A^2:ZH^2$, $BF:FA = ZH^2:HO^2$, ex aequo [V, 22] est $E:FA = A^2:HO^2$. uerum $E:FA$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque ne A^2 quidem ad HO^2 rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. quare A, HO longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. ergo neutra rectarum ZH, HO rationali A commensurabilis est longitudine. iam sit $K^2 = ZH^2 \div HO^2$ [prop.

supra scr. m. 1 P. 21. $\epsilon\sigma\tau\iota\nu \acute{\alpha}\rho\alpha$ F. 24. $\omicron\upsilon\delta'$ — 26. $\acute{\alpha}\rho\iota\theta\mu\acute{\omicron}\nu$] mg. m. 2 B. 24. $\omicron\upsilon\delta'$ $\acute{\alpha}\rho\alpha$] $\omicron\upsilon\delta\epsilon$ b. A] $A \acute{\alpha}\rho\alpha$ b.
25. $H\Theta$] mut. in ΘH m. 2 V, ΘH b. 27. $\omicron\upsilon\delta\epsilon\tau\epsilon\iota\sigma\alpha \acute{\alpha}\rho\alpha$] $\kappa\alpha\iota \omicron\upsilon\delta\epsilon\tau\epsilon\iota\sigma\alpha$ BV b. 28. $\tau\tilde{\eta} A \phi\eta\tau\tilde{\eta}$] $\tau\tilde{\eta} \epsilon\kappa\kappa\epsilon\iota\mu\acute{\epsilon}\nu\eta \phi\eta\tau\tilde{\eta} \tau\tilde{\eta} A$ b et e corr. F (post A del. $\phi\eta\tau\tilde{\eta}$). ϕ] $\acute{\omega}\varsigma$ b. $\omicron\upsilon\nu$] $\omicron\upsilon$ P, corr. m. 2.

τὸ ἀπὸ τῆς ZH τοῦ ἀπὸ τῆς $H\Theta$, ἔστω τὸ ἀπὸ τῆς K .
 ἐπεὶ οὖν ἔστιν ὡς ὁ $B\Gamma$ πρὸς τὸν $\Gamma\Delta$, οὕτως τὸ ἀπὸ
 τῆς ZH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $H\Theta$, ἀναστρέψαντι ἄρα ἔστιν
 ὡς ὁ ΓB πρὸς τὸν $B\Delta$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ZH πρὸς
 5 τὸ ἀπὸ τῆς K . ὁ δὲ ΓB πρὸς τὸν $B\Delta$ λόγον οὐκ
 ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν·
 οὐδ' ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ZH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς K λόγον
 ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν·
 ἀσύμμετρος ἄρα ἔστιν ἡ ZH τῇ K μήκει. καὶ δύνатаι
 10 ἡ ZH τῆς $H\Theta$ μείζον τῷ ἀπὸ τῆς K · ἡ ZH ἄρα τῆς
 $H\Theta$ μείζον δύνатаι τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἐαυτῇ μήκει.
 καὶ οὐδετέρα τῶν ZH , $H\Theta$ σύμμετρός ἐστι τῇ ἐκκει-
 μένῃ φητῇ μήκει τῇ A . ἡ ἄρα $Z\Theta$ ἀποτομή ἐστιν ἕκτη.
 Εὐρηται ἄρα ἡ ἕκτη ἀποτομή ἡ $Z\Theta$. ὅπερ ἔδει
 15 δεῖξαι.

α'.

Ἐὰν χωρίον περιέχεται ὑπὸ φητῆς καὶ ἀπο-
 τομῆς πρώτης, ἡ τὸ χωρίον δυναμένη ἀποτομή
 ἐστιν.

20 Περιεχέσθω γὰρ χωρίον τὸ AB ὑπὸ φητῆς τῆς AG
 καὶ ἀποτομῆς πρώτης τῆς AD . λέγω, ὅτι ἡ τὸ AB
 χωρίον δυναμένη ἀποτομή ἐστιν.

Ἐπεὶ γὰρ ἀποτομή ἐστι πρώτη ἡ AD , ἔστω αὐτῇ
 προσαρμόζουσα ἡ ΔH . αἱ AH , $H\Delta$ ἄρα φηταὶ εἰσι
 25 δυνάμει μόνον σύμμετροι. καὶ ὅλη ἡ AH σύμμετρός
 ἐστι τῇ ἐκκειμένῃ φητῇ τῇ AG , καὶ ἡ AH τῆς $H\Delta$
 μείζον δύνатаι τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἐαυτῇ μήκει· ἐὰν

3. ἄρα] om. F. 4. ΓB] $B\Gamma$ FB. $B\Delta$] supra add. Γ
 m. 1 b. ΔB corr. ex $B\Delta$ uel $B\Gamma$ V. 5. τῆς] τοῦ φ. 8.
 ἔχει] οὐκ ἔχει P. 10. τῷ] corr. ex τό m. 1 F. ἡ] in ras.
 m. 1 P. 11. συμμέτρου B, corr. m. 2. 13. τῇ A μήκει V.
 14. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. BFVb. Seq. demonstr.

XIII lemma]. quoniam igitur est $B\Gamma : \Gamma\Delta = ZH^2 : H\Theta^2$,
conuertendo [V, 19 coroll.] est



$$\Gamma B : B\Delta = ZH^2 : K^2.$$

uerum $\Gamma B : B\Delta$ rationem non habet, quam numerus
quadratus ad numerum quadratum. itaque ne ZH^2
quidem ad K^2 rationem habet, quam numerus qua-
dratus ad numerum quadratum. quare ZH, K longi-
tudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. est autem
 $ZH^2 \div H\Theta^2 = K^2$. itaque ZH quadrata excedit $H\Theta$
quadrato rectae sibi incommensurabilis. et neutra
rectarum $ZH, H\Theta$ rationali propositae Δ commensu-
rabilis est longitudine. itaque $Z\Theta$ apotome est sexta
[deff. tert. 6].

Ergo inuenta est apotome sexta $Z\Theta$; quod erat
demonstrandum.

XCI.

Si spatium comprehenditur recta rationali et apo-
tome prima, recta spatio aequalis quadrata apotome est.



Spatium enim AB ratio-
nali $A\Gamma$ et apotome prima
 $A\Delta$ comprehendatur. dico,
rectam spatio AB aequalem
quadratam apotomen esse.

nam quoniam $A\Delta$ apo-
tome est prima, ei congruens
sit ΔH . itaque $AH, H\Delta$
rationales sunt potentia tan-
tum commensurabiles [prop.

alt., u. app. 16. $q' F, q\beta'$ BVb, et sic deinceps. 19. $\xi\sigma\tau$
BV, comp. Fb. 20. $\tau\phi$ $\tau\phi$ V. 21. η m. 2 F. 23. $\gamma\acute{\alpha}\epsilon$
om. b, m. 2 B. $\pi\rho\acute{\omega}\tau\eta$ $\xi\sigma\tau\upsilon\nu$ BFV. 24. $AH, H\Delta$ in ras.
m. 2 V. 27. $\acute{\alpha}\sigma\upsilon\mu\mu\acute{\epsilon}\tau\rho\omicron\nu$ F, et V, sed corr.

ἄρα τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ΔH ἴσον παρὰ τὴν AH παραβληθῇ ἐλλείπον εἶδει τετραγώνῳ, εἰς σύμμετρα αὐτὴν διαιρεῖ. τετμήσθω ἡ ΔH δίχα κατὰ τὸ E , καὶ τῷ ἀπὸ τῆς EH ἴσον παρὰ τὴν AH παραβελήσθω ἐλλείπον εἶδει τετραγώνῳ, καὶ ἔστω τὸ ὑπὸ τῶν AZ , ZH · σύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ AZ τῇ ZH . καὶ διὰ τῶν E , Z , H σημείων τῇ AG παράλληλοι ἤχθωσαν αἱ $E\Theta$, ZI , HK .

Καὶ ἐπεὶ σύμμετρός ἐστὶν ἡ AZ τῇ ZH μήκει,
 10 καὶ ἡ AH ἄρα ἐκατέρᾳ τῶν AZ , ZH σύμμετρός ἐστὶ μήκει. ἀλλὰ ἡ AH σύμμετρός ἐστὶ τῇ AG · καὶ ἐκατέρᾳ ἄρα τῶν AZ , ZH σύμμετρός ἐστὶ τῇ AG μήκει. καὶ ἐστὶ φητὴ ἡ AG · φητὴ ἄρα καὶ ἐκατέρᾳ τῶν AZ , ZH · ὥστε καὶ ἐκάτερον τῶν AI , ZK φητόν ἐστιν.
 15 καὶ ἐπεὶ σύμμετρός ἐστὶν ἡ ΔE τῇ EH μήκει, καὶ ἡ ΔH ἄρα ἐκατέρᾳ τῶν ΔE , EH σύμμετρός ἐστὶ μήκει. φητὴ δὲ ἡ ΔH καὶ ἀσύμμετρος τῇ AG μήκει· φητὴ ἄρα καὶ ἐκατέρᾳ τῶν ΔE , EH καὶ ἀσύμμετρος τῇ AG μήκει· ἐκάτερον ἄρα τῶν $\Delta\Theta$, EK μέσον ἐστίν.

20 Κεῖσθω δὴ τῷ μὲν AI ἴσον τετράγωνον τὸ AM , τῷ δὲ ZK ἴσον τετράγωνον ἀφηρησθῶ κοινὴν γωνίαν ἔχον αὐτῷ τὴν ὑπὸ $AO\Theta$ τὸ $N\Xi$ · περὶ τὴν αὐτὴν ἄρα διάμετρον ἐστὶ τὰ AM , $N\Xi$ τετράγωνα. ἔστω αὐτῶν διάμετρος ἡ OP , καὶ καταγεγραφήτω τὸ σχῆμα.
 25 ἐπεὶ οὖν ἴσον ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν AZ , ZH περιεχόμενον

1. μέρει] -εσ- in ras. B. τοῦ ἀπό] m. 2 F. 2. τὴν] corr. ex τῆς m. 2 F. AH] A in ras. F. 3. διαιρεῖ] supra add. μήκει m. 2 V, διελει BF, διέλη b. 4. τῷ] τό F. 6. ZH] (alt.) HZ F. 8. ἤχθωσαν] ἤχθω- in ras. m. 1 P. ZI] mut. in ZH m. 2 F. 9. τῇ] τῆς F. 11. ἀλλ' F. AG] Γ e corr. m. 1 F. 13. ἐστὶν P. 14. AI] AG P, I in ras. V. ἐστὶν] ἐστὶ BV, comp. Fb. 15. καὶ] (alt.) om. V. 19. ἐστὶ P b V, comp. Fb. 20. καὶ κεῖσθω V. 22. AO , OM

LXXIII]. et tota AH rationali propositae AF commensurabilis est, et AH quadrata excedit HA quadrato rectae sibi longitudine commensurabilis [deff. tert. 1]. itaque si quartae parti quadrati AH^2 aequale rectae AH adplicatur spatium figura quadrata deficiens, in partes commensurabiles eam diuidit [prop. XVII]. secetur AH in duas partes aequales in E , et quadrato EH^2 aequale rectae AH adplicetur spatium figura quadrata deficiens, et sit $AZ \times ZH$. itaque AZ , ZH commensurabiles sunt. et per puncta E , Z , H rectae AF parallelae ducantur $E\Theta$, ZI , HK .

et quoniam AZ , ZH longitudine commensurabiles sunt, etiam AH utrique AZ , ZH commensurabilis est [prop. XV]. uerum AH , AF commensurabiles sunt. quare etiam utraque AZ , ZH rectae AF longitudine commensurabilis est [prop. XII]. et AF rationalis est. quare etiam utraque AZ , ZH rationalis est. itaque etiam utrumque AI , ZK rationale est [VI, 1; prop. XI]. et quoniam AE , EH longitudine commensurabiles sunt, etiam AH utrique AE , EH longitudine commensurabilis est [prop. XV]. uerum AH rationalis est et rectae AF longitudine incommensurabilis. quare etiam utraque AE , EH rationalis est et rectae AF longitudine incommensurabilis [prop. XIII]. ergo utrumque $A\Theta$, EK medium est [prop. XX].

ponatur igitur quadratum $AM = AI$, et spatio ZK aequale auferatur quadratum $N\Xi$ communem angulum habens AOM . itaque quadrata AM , $N\Xi$

PF, τῶν AO , OM Bb. 23. ἐστὶ] εἶσι V. τετράγωνον] om. V.
25. τό] in ras. V. τῶν] m. 2 F. περιεχόμενον] -ον in
ras. V.

ὁρθογώνιον τῷ ἀπὸ τῆς EH τετραγώνῳ, ἔστιν ἄρα
ὡς ἡ AZ πρὸς τὴν EH , οὕτως ἡ EH πρὸς τὴν ZH .
ἀλλ' ὡς μὲν ἡ AZ πρὸς τὴν EH , οὕτως τὸ AI πρὸς
τὸ EK , ὡς δὲ ἡ EH πρὸς τὴν ZH , οὕτως ἔστι τὸ
5 EK πρὸς τὸ KZ . τῶν ἄρα AI , KZ μέσον ἀνάλογόν
ἔστι τὸ EK . ἔστι δὲ καὶ τῶν AM , $NΞ$ μέσον ἀνά-
λογον τὸ MN , ὡς ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἐδείχθη, καὶ
ἔστι τὸ [μὲν] AI τῷ AM τετραγώνῳ ἴσον, τὸ δὲ KZ
τῷ $NΞ$ · καὶ τὸ MN ἄρα τῷ EK ἴσον ἐστίν. ἀλλὰ
10 τὸ μὲν EK τῷ $\Delta\Theta$ ἔστιν ἴσον, τὸ δὲ MN τῷ $\LambdaΞ$.
το ἄρα ΔK ἴσον ἐστὶ τῷ $\Gamma\Phi X$ γνώμονι καὶ τῷ $NΞ$.
ἔστι δὲ καὶ τὸ AK ἴσον τοῖς AM , $NΞ$ τετραγώνοις·
λοιπὸν ἄρα τὸ AB ἴσον ἐστὶ τῷ ΣT . τὸ δὲ ΣT τὸ
ἀπὸ τῆς AN ἔστι τετράγωνον· τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς AN
15 τετράγωνον ἴσον ἐστὶ τῷ AB . ἡ AN ἄρα δύναται
τὸ AB .

Λέγω δὴ, ὅτι ἡ AN ἀποτομή ἔστιν.

Ἐπεὶ γὰρ ῥητόν ἐστιν ἐκότερον τῶν AI , ZK , καὶ
ἔστιν ἴσον τοῖς AM , $NΞ$, καὶ ἐκότερον ἄρα τῶν AM ,
20 $NΞ$ ῥητόν ἐστιν, τουτέστι τὸ ἀπὸ ἐκατέρως τῶν AO ,
 ON · καὶ ἐκατέρα ἄρα τῶν AO , ON ῥητὴ ἔστιν.
πάλιν, ἐπεὶ μέσον ἐστὶ τὸ $\Delta\Theta$ καὶ ἔστιν ἴσον τῷ $\LambdaΞ$,
μέσον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ $\LambdaΞ$. ἐπεὶ οὖν τὸ μὲν $\LambdaΞ$
μέσον ἐστίν, τὸ δὲ $NΞ$ ῥητόν, ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ
25 τὸ $\LambdaΞ$ τῷ $NΞ$ · ὡς δὲ τὸ $\LambdaΞ$ πρὸς τὸ $NΞ$, οὕτως
ἔστιν ἡ AO πρὸς τὴν ON · ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ

2. τῇ] (prius) om. P. 6. Post ἀνάλογον ras. 3 litt. V. 7.
NM B. 8. μέν] om. BFVb. 9. τό] τῷ b. MN] EK
in ras. V. EK] MN in ras. V. ἔστιν ἴσον V. 10. τό]
(prius) τῷ V. τῷ] ἴσον ἐστὶ τό V. τῷ $\Delta\Theta$] in ras. m.
1 P. ἔστιν ἴσον] om. V, ἴσον ἐστίν F. τῷ δὲ MN ἴσον
ἐστὶ τὸ $\LambdaΞ$ ἴσον ἄρα τὸ ΔK τῷ V. 12. ἴσον] om. V (supra

circum eandem diametrum posita sunt [VI, 26]. sit OP diametrus eorum, et describatur figura [cfr. uol. I p. 137 not.]. iam quoniam est $AZ \times ZH = EH^2$, erit [VI, 17] $AZ:EH = EH:ZH$. uerum $AZ:EH = AI:EK$ et $EH:ZH = EK:KZ$ [VI, 1]. itaque EK medium proportionale est inter AI, KZ . est autem etiam MN medium proportionale inter $AM, NΞ$, sicuti supra [prop. LIII lemma] demonstratum est, et $AI = AM, KZ = NΞ$. itaque etiam $MN = EK$. est autem $EK = AO$, $MN = AΞ$ [I, 43]. itaque $AK = OΦX + NΞ$. uerum etiam $AK = AM + NΞ$. itaque reliquum $AB = ΣT$. est autem $ΣT = AN^2$. quare $AN^2 = AB$. ergo AN quadrata spatio AB aequalis est.

Iam dico, AN apotomen esse.

nam quoniam utrumque AI, ZK rationale est, et

$$AI = AM, ZK = NΞ,$$

etiam utrumque $AM, NΞ$, hoc est AO^2, ON^2 , rationale est. quare etiam utraque AO, ON rationalis est. rursus quoniam AO medium est, et $AO = AΞ$, etiam $AΞ$ medium est. iam quoniam $AΞ$ medium est, $NΞ$ autem rationale, $AΞ$ et $NΞ$ incommensurabilia sunt. uerum $AΞ:NΞ = AO:NO$ [VI, 1]. itaque AO, ON longitudine incommensurabiles sunt [prop. XI]. et utraque rationalis est; itaque AO, ON ra-

est ras.). 13. $ΣT$] corr. ex $BΓ$ V. τὸ δὲ $ΣT$] supra scr. m. 1 P. τὸ] corr. ex. τῷ FV. 15. ἐστὶ] postea ins. F. τῷ] τό F. 17. καὶ ἡ P. 19. ἐστὶ V. ἴσων] ἴσα Bb, om. V. $NΞ$ ἴσα V. 20. ἐστὶ BV, comp. Fb. 21. ἐστὶ PBV, comp. Fb. 23. ἐστὶ] ἐστὶν P, om. V. 24. ἐστὶν] ἐστὶ PBVb, comp. F. 25. $NΞ$] (prius) corr. ex NK m. 1 b. τὸ] (tert.) in ras. m. 1 P.

- AO τῇ ON μήκει. καὶ εἰσιν ἀμφοτέρωθεν ῥηταί· αἱ AO , ON ἄρα ῥηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἀποτομή ἄρα ἐστὶν ἡ AN . καὶ δύναται τὸ AB χωρίον· ἡ ἄρα τὸ AB χωρίον δυναμένη ἀποτομή ἐστίν.
- 5 Ἐὰν ἄρα χωρίον περιέχεται ὑπὸ ῥητῆς καὶ τὰ ἐξῆς.

αβ'.

- Ἐὰν χωρίον περιέχεται ὑπὸ ῥητῆς καὶ ἀποτομῆς δευτέρας, ἡ τὸ χωρίον δυναμένη μέσης ἀποτομή ἐστὶ πρώτη.
- 10 Χωρίον γὰρ τὸ AB περιεχέσθω ὑπὸ ῥητῆς τῆς AG καὶ ἀποτομῆς δευτέρας τῆς AD . λέγω, ὅτι ἡ τὸ AB χωρίον δυναμένη μέσης ἀποτομή ἐστὶ πρώτη.
- Ἔστω γὰρ τῇ AD προσαρμόζουσα ἡ AH . αἱ ἄρα AH , HD ῥηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ ἡ
- 15 προσαρμόζουσα ἡ AH σύμμετρός ἐστὶ τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ τῇ AG , ἡ δὲ ὅλη ἡ AH τῆς προσαρμόζουσας τῆς HD μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ μήκει. ἐπεὶ οὖν ἡ AH τῆς HD μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ, ἐὰν ἄρα τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς
- 20 HD ἴσον παρὰ τὴν AH παραβληθῇ ἑλλείπον εἶδει τετραγώνῳ, εἰς σύμμετρα αὐτὴν διαιρεῖ. τετμήσθω οὖν ἡ AD δίχα κατὰ τὸ E . καὶ τῷ ἀπὸ τῆς EH ἴσον παρὰ τὴν AH παραβεβλήσθω ἑλλείπον εἶδει τετραγώνῳ,

2. ON] NO e corr. V. εἰσιν V, sed ν del. 4. τὸ AB ἄρα V. 5. καὶ τὰ ἐξῆς] καὶ ἀποτομῆς πρώτης, ἡ τὸ χωρίον δυναμένη ἀποτομή ἐστίν Theon (BFVb). 8. μέση BFVb et P, sed corr. m. 1. 11. AD] AB b; δὲ AD P, corr. m. 1. 12. AB] corr. ex AD V. μέση BFb, et V, corr. m. 2. 14. HD] ΔH F. δυναμένη V, corr. m. 2. 16. τῆς] om. F. 17. HD] eras. V. Ante συμμέτρου ras. 1 litt. V. 18. AH] H in ras. V. τῆς] corr. ex τῇ m. 2 V. 19. τοῦ]

tionales sunt potentia tantum commensurabiles. quare AN apotome est [prop. LXXIII]. et quadrata spatio AB est aequalis. itaque recta spatio AB aequalis quadrata apotome est.



Ergo si spatium comprehenditur recta rationali, et quae sequuntur.

XCII.

Si spatium recta rationali et apotome secunda comprehenditur, recta spatio aequalis quadrata mediae apotome est prima.

Spatium enim AB recta rationali AG et apotome secunda AD comprehendatur. dico, rectam spatio AB aequalem quadratam mediae apotomen primam esse.

nam AH rectae AD congruens sit. itaque AH , HA rationales sunt potentia tantum commensurabiles



[prop. LXXIII], et congruens AD rationali propositae AG commensurabilis est, tota autem AH quadrata excedit congruentem HA quadrato rectae sibi commensurabilis longitudine [def. tert. 2]. iam quoniam AH^2 excedit HA^2 quadrato rectae sibi commen-

surabilis, si $\frac{1}{4}HA^2$ aequale rectae AH adplicatur spatium figura quadrata deficiens, in partes commensurabiles eam diuidit [prop. XVII]. iam AD in puncto E in duas partes aequales secetur. et quadrato EH^2 aequale

τῷ b. 20. AH] H e corr. V. 21. $\delta\iota\epsilon\lambda\epsilon\iota$ Theon (BFVb).
Dein add. $\mu\eta\kappa\epsilon\iota$ V. 22. AD] e corr. m. 2 V. EH] ΘH P.

καὶ ἔστω τὸ ὑπὸ τῶν AZ , ZH · σύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ AZ τῇ ZH μήκει. καὶ ἡ AH ἄρα ἐκατέρᾳ τῶν AZ , ZH σύμμετρός ἐστι μήκει. φητὴ δὲ ἡ AH καὶ ἀσύμμετρος τῇ AG μήκει· καὶ ἐκατέρᾳ ἄρα τῶν AZ , ZH
 5 φητὴ ἐστὶ καὶ ἀσύμμετρος τῇ AG μήκει· ἐκάτερον ἄρα τῶν AI , ZK μέσον ἐστίν. πάλιν, ἐπεὶ σύμμετρός ἐστὶν ἡ AE τῇ EH , καὶ ἡ AH ἄρα ἐκατέρᾳ τῶν AE , EH σύμμετρός ἐστὶν. ἀλλ' ἡ AH σύμμετρός ἐστι τῇ AG μήκει [φητὴ ἄρα καὶ ἐκατέρᾳ τῶν AE , EH καὶ
 10 σύμμετρος τῇ AG μήκει]. ἐκάτερον ἄρα τῶν AO , EK φητόν ἐστιν.

Συνεστιάτω οὖν τῷ μὲν AI ἴσον τετραγώνον τὸ AM , τῷ δὲ ZK ἴσον ἀφηγήσθω τὸ $NΞ$ περὶ τὴν αὐτὴν γωνίαν ὃν τῷ AM τὴν ὑπὸ τῶν AO , OM · περὶ
 15 τὴν αὐτὴν ἄρα ἐστὶ διάμετρον τὰ AM , $NΞ$ τετραγωνα. ἔστω αὐτῶν διάμετρος ἡ OP , καὶ καταγεγράφθω τὸ σχῆμα. ἐπεὶ οὖν τὰ AI , ZK μέσα ἐστὶ καὶ ἐστὶν ἴσα τοῖς ἀπὸ τῶν AO , ON , καὶ τὰ ἀπὸ τῶν AO , ON [ἄρα] μέσα ἐστίν· καὶ αἱ AO , ON ἄρα μέσαι εἰσὶ
 20 δυνάμει μόνον σύμμετροι. καὶ ἐπεὶ τὸ ὑπὸ τῶν AZ , ZH ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς EH , ἔστιν ἄρα ὡς ἡ AZ πρὸς τὴν EH , οὕτως ἡ EH πρὸς τὴν ZH · ἀλλ' ὡς μὲν ἡ AZ πρὸς τὴν EH , οὕτως τὸ AI πρὸς τὸ EK · ὡς δὲ ἡ EH πρὸς τὴν ZH , οὕτως [ἐστὶ] τὸ EK πρὸς
 25 τὸ ZK · τῶν ἄρα AI , ZK μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ

1. ἀσύμμετρος b, sed corr. 2. Post μήκει add. καὶ διὰ τῶν E, Z, H σημείων τῇ AG παράλληλοι ἤχθωσαν αἱ EΘ, ZI, HK (corr. ex ZK V). καὶ ἐπεὶ σύμμετρός ἐστὶν ἡ AZ τῇ ZH μήκει b, V mg. m. 1, F mg., sed euan. 4. ἄρα] om. FV. 6. AI] mut. in AZ F, AZ b. ZH b, et e corr. F. ἐστὶ BV, comp. Fb. 7. ἡ AH] HΔ F. 8. ἐστὶ] m. 2 B. 9. φητὴ — 10. μήκει] om. P. 9. AE, EH] E bis in ras. V. 10. καὶ ἐκάτερον b. 11. ἐστὶ PBV, comp. Fb. 12. τῷ] corr.

rectae AH spatium adplicetur figura quadrata deficiens, et sit $AZ \times ZH$. itaque AZ, ZH longitudine commensurabiles sunt. itaque etiam AH utrique AZ, ZH longitudine commensurabilis est [prop. XV]. uerum AH rationalis est et rectae AI longitudine incommensurabilis. itaque etiam utraque AZ, ZH rationalis est et rectae AI longitudine incommensurabilis [prop. XIII]. quare utrumque AI, ZK medium est [prop. XX]. rursus quoniam AE, EH commensurabiles sunt, etiam AH utrique AE, EH commensurabilis est [prop. XV].¹⁾ uerum AH, AI longitudine commensurabiles sunt. ergo utrumque AE, EK rationale est.

iam construatur quadratum $AM = AI$, et spatio ZK aequale auferatur $N\Xi$ in eodem angulo AOM positum, quo AM . itaque quadrata $AM, N\Xi$ circum eandem diametrum posita sunt [VI, 26]. sit OP eorum diametrus, et describatur figura [cfr. uol. I p. 137 not.]. iam quoniam AI, ZK media sunt et $AI = AO^2, ZK = ON^2$, etiam AO^2, ON^2 media sunt. quare etiam AO, ON mediae sunt potentia tantum commensurabiles. et quoniam $AZ \times ZH = EH^2$, erit [VI, 17] $AZ:EH = EH:ZH$. uerum $AZ:EH = AI:EK$

1) Hoc promptius ex prop. VI concludi poterat; nam $AH = 2 AE = 2 EH$.

ex ó V, τό F. 14. δν τῷ AM] e corr. F. τήν] τῷ P. τῶν] om. V. 15. ἐστιν ἄρα V. 17. Post ἐστὶ add. Theon: καὶ σύμμετρα ἀλλήλοις (BFVb; in V post καὶ ras. 1 litt.). ἴσον F. 19. ἄρα] om. P. μέσαι εἰσὶ V, sed corr. ἐστὶ PB, comp. Fb. καὶ] corr. ex δν- V. αὶ — 20. δν-] mg. m. 2 V. 19. εἰσὶ] εἰσὶν λέγω ὅτι καὶ P. 20. μόνον] eras. V. σύμμετρα V, corr. m. 2. καὶ ἐπεὶ] ἐπεὶ γάρ P. 21. ἐστὶ] supra scr. m. 1 F. ἴστιν] corr. ex ἴσον m. 1 F. 23. AI] AH P. 24. ἐστὶ] om. P. 25. ZK] (alt.) Z corr. ex K m. 1 V.

ΕΚ. ἔστι δὲ καὶ τῶν ΑΜ, ΝΞ τετραγώνων μέσον ἀνάλογον τὸ ΜΝ· καὶ ἔστιν ἴσον τὸ μὲν ΑΙ τῷ ΑΜ, τὸ δὲ ΖΚ τῷ ΝΞ· καὶ τὸ ΜΝ ἄρα ἴσον ἔστι τῷ ΕΚ. ἀλλὰ τῷ μὲν ΕΚ ἴσον [ἔστι] τὸ ΑΘ, τῷ δὲ ΜΝ ἴσον
 5 τὸ ΑΞ· ὅλον ἄρα τὸ ΑΚ ἴσον ἔστι τῷ ΤΦΧ γινώμονι καὶ τῷ ΝΞ. ἐπεὶ οὖν ὅλον τὸ ΑΚ ἴσον ἔστι τοῖς ΑΜ, ΝΞ, ὧν τὸ ΑΚ ἴσον ἔστι τῷ ΤΦΧ γινώμονι καὶ τῷ ΝΞ, λοιπὸν ἄρα τὸ ΑΒ ἴσον ἔστι τῷ ΤΣ. τὸ δὲ ΤΣ ἔστι τὸ ἀπὸ τῆς ΑΝ· τὸ ἀπὸ τῆς ΑΝ ἄρα
 10 ἴσον ἔστι τῷ ΑΒ χωρίῳ· ἡ ΑΝ ἄρα δύναται τὸ ΑΒ χωρίον.

Λέγω [δὴ], ὅτι ἡ ΑΝ μέσης ἀποτομῆς ἔστι πρώτη.
 Ἐπεὶ γὰρ ῥητόν ἔστι τὸ ΕΚ καὶ ἔστιν ἴσον τῷ ΑΞ, ῥητόν ἄρα ἔστι τὸ ΑΞ, τουτέστι τὸ ὑπὸ τῶν
 15 ΑΟ, ΟΝ. μέσον δὲ ἐδείχθη τὸ ΝΞ· ἀσύμμετρον ἄρα ἔστι τὸ ΑΞ τῷ ΝΞ· ὥς δὲ τὸ ΑΞ πρὸς τὸ ΝΞ, οὕτως ἔστιν ἡ ΑΟ πρὸς ΟΝ· αὖ ΑΟ, ΟΝ ἄρα ἀσύμμετροι εἰσι μήκει. αὖ ἄρα ΑΟ, ΟΝ μέσαι εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι ῥητὸν περιέχουσιν· ἡ ΑΝ ἄρα μέσης
 20 ἀποτομῆς ἔστι πρώτη· καὶ δύναται τὸ ΑΒ χωρίον.

Ἡ ἄρα τὸ ΑΒ χωρίον δυναμένη μέσης ἀποτομῆς ἔστι πρώτη· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

αγ'.

Ἐὰν χωρίον περιέχεται ὑπὸ ῥητῆς καὶ ἀπο-

1. ΕΚ] ΕΙ F. ΝΞ] ΜΝ F, sed corr. 3. ΖΚ] corr. ex KZ m. 1 V. 4. τῷ τό V. ἔστι] om. P. τό] τῷ V. τῷ τό V. ἴσον ἔστι Bb. 5. τό] (prius) τῷ V φ. 7. ὧν] ὅν φ. ἔστι] m. 2 F. 8. ΤΣ] in ras. V. 9. τὸ δὲ ΤΣ ἔστι] τουτέστι B. 10. ἔστιν P. τό] τὸ ἀπὸ τῆς P; τὸ ἀπὸ τῆς ΑΝ mg. m. 1 b. 12. δὴ] om. P. μέση PBFb, μέσης φ, e corr. m. 2 V. ἔστιν P. 13. τὸ ΕΚ — 14. τῷ ΑΞ] in ras. F. 13. ἔστιν] ἔστι b. Post ἴσον add. τῷ (τό F) ΝΜ τουτέστι Fb, m. 2 V.

[VI, 1] et [id.] $EH:ZH=EK:ZK$. quare EK medium est proportionale inter AI , ZK . uerum etiam MN medium est proportionale inter AM , $N\Xi$ [prop. LIII lemma]. et $AI=AM$, $ZK=N\Xi$. quare etiam $MN=EK$. uerum $\angle\Theta=EK$, $\angle\Xi=MN$ [I, 43]. quare $\angle K=T\Phi X+N\Xi$. iam quoniam $\angle K=\angle M+N\Xi$, quorum $\angle K=T\Phi X+N\Xi$, erit reliquum $\angle B=T\Sigma$. sed $T\Sigma=\angle N^2$. itaque $\angle N^2=\angle B$. ergo $\angle N$ quadrata spatio AB aequalis est.

Iam dico, $\angle N$ mediae esse apotomen primam. nam quoniam EK rationale est, et $EK=\angle\Xi$, etiam $\angle\Xi$ rationale est, hoc est $\angle O \times ON$. demonstrauius autem, $N\Xi$ medium esse [u. p. 282, 18]. quare $\angle\Xi$, $N\Xi$ incommensurabilia sunt. est autem

$$\angle\Xi:N\Xi=\angle O:ON$$

[VI, 1]. quare $\angle O$, ON longitudine incommensurabiles sunt [prop. XI]. itaque $\angle O$, ON mediae sunt potentia tantum commensurabiles spatium rationale comprehendentes. itaque $\angle N$ mediae apotome est prima [prop. LXXIV]. et est $\angle N^2=AB$.

Ergo recta spatio AB aequalis quadrata mediae apotome est prima; quod erat demonstrandum.

XCIII.

Si spatium recta rationali et apotome tertia com-

16. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\acute{\iota}\nu$ P. $\tau\acute{\omega}$ $N\Xi$] m. 2 B. $\acute{\omega}\varsigma$ $\delta\acute{\epsilon}$] $\kappa\alpha\iota$ $\acute{\omega}\varsigma$ $\acute{\alpha}\rho\alpha$ B.
 17. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\acute{\iota}\nu$] om. V. $\pi\rho\acute{o}\varsigma$ $\tau\acute{\eta}\nu$ FV. $\acute{\alpha}\rho\alpha$ — 18. $\mu\acute{\eta}\kappa\epsilon\iota$] $\delta\upsilon$ -
 $\nu\acute{\alpha}\mu\epsilon\iota$ $\epsilon\iota\sigma\iota$ $\mu\acute{o}\nu\omicron\nu$ $\sigma\acute{\upsilon}\mu\mu\epsilon\tau\rho\omicron\iota$ in ras. V, mg. add. m. rec.: $\acute{\alpha}\rho\alpha$
 $\mu\acute{\eta}\kappa\epsilon\iota$ $\epsilon\iota\sigma\iota\iota$ $\acute{\alpha}\sigma\acute{\upsilon}\mu\mu\epsilon\tau\rho\omicron\iota$ $\tau\acute{\alpha}$ $\delta\acute{\epsilon}$ $\acute{\alpha}\pi'$ $\alpha\upsilon\tau\acute{\omega}\nu$ $\tau\epsilon\tau\rho\acute{\alpha}\gamma\omega\gamma\alpha$ $\sigma\acute{\upsilon}\mu\mu\epsilon\tau\rho\omicron\iota$.
 $\alpha\iota$ $\angle O$, ON $\acute{\alpha}\rho\alpha$. 17. $\sigma\acute{\upsilon}\mu\mu\epsilon\tau\rho\omicron\iota$ F. 19. $\angle N$] ON b,
 $\angle H$ F. $\mu\acute{\epsilon}\sigma\eta$ BFVb. 21. $\acute{\eta}$ — $\chi\omega\rho\acute{o}\nu$] om. φ . $\delta\upsilon\nu\alpha$ -
 in spatio 9 litt. F. $\mu\acute{\epsilon}\sigma\eta$ BFb. 22. $\acute{\omicron}\pi\epsilon\rho$ $\acute{\epsilon}\delta\epsilon\iota$ $\delta\epsilon\iota\chi\epsilon\iota$] comp.
 P, om. BFVb.

τομῆς τρίτης, ἢ τὸ χωρίον δυναμένη μέσης ἀποτομῇ ἐστὶ δευτέρα.

Χωρίον γὰρ τὸ AB περιεχέσθω ὑπὸ ῥητῆς τῆς AG καὶ ἀποτομῆς τρίτης τῆς AD . λέγω, ὅτι ἡ τὸ AB
 5 χωρίον δυναμένη μέσης ἀποτομῇ ἐστὶ δευτέρα.



Ἔστω γὰρ τῇ AD προσαρμόξουσα ἡ ΔH . αὐτὴ AH ,
 $H\Delta$ ἄρα ῥηταὶ εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ
 οὐδετέρα τῶν AH , $H\Delta$ σύμμετρός ἐστι μήκει τῇ ἐκ-
 κειμένη ῥητῇ τῇ AG , ἡ δὲ ὅλη ἡ AH τῆς προσαρμο-
 10 ξούσης τῆς ΔH μείζον δύνανται τῷ ἀπὸ συμμέτρου
 ἑαυτῇ. ἐπεὶ οὖν ἡ AH τῆς $H\Delta$ μείζον δύνανται τῷ
 ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ, εἰς ἄρα τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ
 ἀπὸ τῆς ΔH ἴσον παρὰ τὴν AH παραβληθῇ ἐλλείπον
 εἶδει τετραγώνῳ, εἰς σύμμετρα αὐτὴν διελεῖ. τετμήσθω
 15 οὖν ἡ ΔH δίχα κατὰ τὸ E , καὶ τῷ ἀπὸ τῆς EH ἴσον
 παρὰ τὴν AH παραβεβλήσθω ἐλλείπον εἶδει τετραγώνῳ,
 καὶ ἔστω τὸ ὑπὸ τῶν AZ , ZH . καὶ ἦχθωσαν διὰ τῶν
 E , Z , H σημείων τῇ AG παράλληλοι αὐτῶν $E\Theta$, ZI , HK .
 σύμμετροι ἄρα εἰσὶν αὐτῶν AZ , ZH . σύμμετρον ἄρα καὶ
 20 τὸ AI τῷ ZK . καὶ ἐπεὶ αὐτῶν AZ , ZH σύμμετροί εἰσι
 μήκει, καὶ ἡ AH ἄρα ἐκατέρᾳ τῶν AZ , ZH σύμ-
 μετρός ἐστι μήκει. ῥητὴ δὲ ἡ AH καὶ ἀσύμμετρος
 τῇ AG μήκει. ὥστε καὶ αὐτῶν AZ , ZH . ἐκάτερον ἄρα τῶν

1. μέση B F V b. 5. μέση B F b, et V, corr. m. 2. ἐστὶν P.
 9. -αρμοξ-] in ras. V. 10. ἀσύμμετρον b. 11. ἐπεὶ — 12.
 ἑαυτῇ] punctis notat. V. 11. $H\Delta$] ΔH P. 12. τοῦ] corr.
 ex τῷ m. 1 b. 14. διελεῖ μήκει V. 15. τῷ] τό φ. 18.
 H] ὁμ. V. ZI] mut. in IZ V. 19. εἰσὶν] εἰ- e corr. V.
 20. εἰσὶν P. 23. ὥστε καὶ αὐτῶν AZ , ZH] καὶ ἐκατέρᾳ ἄρα
 (supra, scr. m. 1 V) τῶν AZ , ZH ῥητὴ ἐστὶ καὶ ἀσύμμετρος τῇ
 AG μήκει. καὶ Theon (B F V b).

prehenditur, recta spatio aequalis quadrata mediae apotome est secunda.

Spatium enim AB recta rationali AG et apotome tertia AD comprehendatur. dico, rectam spatio AB aequalem quadratam mediae apotomen esse secundam.

nam $\triangle H$ rectae AD congruens sit. itaque AH , HA rationales sunt potentia tantum commensurabiles,



et neutra rectarum AH , HA rationali propositae AG longitudine commensurabilis est, tota autem AH congruentem $\triangle H$ excedit quadrato rectae sibi commensurabilis [def. tert. 3]. quoniam igitur AH^2 excedit $\triangle H^2$ quadrato rectae sibi commensurabilis, si $\frac{1}{4}AH^2$ aequale rectae AH adplicatur

spatium figura quadrata deficiens, in partes commensurabiles eam diuidet [prop. XVII]. iam $\triangle H$ in E in duas partes aequales secetur, et quadrato EH^2 aequale rectae AH adplicetur spatium figura quadrata deficiens, et sit $AZ \times ZH$. et per puncta E , Z , H rectae AG parallelae ducantur $E\Theta$, ZI , HK . itaque AZ , ZH commensurabiles sunt. quare AI , ZK commensurabilia sunt [VI, 1; prop. XI]. et quoniam AZ , ZH longitudine commensurabiles sunt, etiam AH utrique AZ , ZH longitudine commensurabilis est [prop. XV]. uerum AH rationalis est et rectae AG longitudine incommensurabilis. quare etiam AZ , ZH [prop. XIII]. itaque utrumque AI , ZK medium est [prop. XX]. rursus quoniam $\triangle E$, EH longitudine commen-

AI , ZK μέσον ἐστίν. πάλιν, ἐπεὶ σύμμετρος ἐστὶν ἡ ΔE τῇ EH μήκει, καὶ ἡ ΔH ἄρα ἐκατέρᾳ τῶν ΔE , EH σύμμετρος ἐστὶ μήκει. φητὴ δὲ ἡ $H\Delta$ καὶ ἀσύμμετρος τῇ AG μήκει· φητὴ ἄρα καὶ ἐκατέρᾳ τῶν ΔE ,
 5 EH καὶ ἀσύμμετρος τῇ AG μήκει· ἐκατέρον ἄρα τῶν $\Delta\Theta$, EK μέσον ἐστίν. καὶ ἐπεὶ αἱ AH , $H\Delta$ δυνάμει μόνον σύμμετροί εἰσιν, ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶ μήκει ἡ AH τῇ $H\Delta$. ἀλλ' ἡ μὲν AH τῇ AZ σύμμετρος ἐστὶ μήκει, ἡ δὲ ΔH τῇ EH · ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ AZ
 10 τῇ EH μήκει. ὥς δὲ ἡ AZ πρὸς τὴν EH , οὕτως ἐστὶ τὸ AI πρὸς τὸ EK · ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ AI τῷ EK .

Συνεστιάτω οὖν τῷ μὲν AI ἴσον τετράγωνον τὸ AM , τῷ δὲ ZK ἴσον ἀπληρώσθω τὸ $N\Xi$ περὶ τὴν αὐτὴν
 15 γωνίαν ὅν τῷ AM · περὶ τὴν αὐτὴν ἄρα διάμετρόν ἐστὶ τὰ AM , $N\Xi$. ἔστω αὐτῶν διάμετρος ἡ OP , καὶ καταγεγράφθω τὸ σχῆμα. ἐπεὶ οὖν τὸ ὑπὸ τῶν AZ , ZH ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς EH , ἔστιν ἄρα ὥς ἡ AZ πρὸς τὴν EH , οὕτως ἡ EH πρὸς τὴν ZH . ἀλλ' ὥς
 20 μὲν ἡ AZ πρὸς τὴν EH , οὕτως ἐστὶ τὸ AI πρὸς τὸ EK · ὥς δὲ ἡ EH πρὸς τὴν ZH , οὕτως ἐστὶ τὸ EK πρὸς τὸ ZK · καὶ ὥς ἄρα τὸ AI πρὸς τὸ EK , οὕτως τὸ EK πρὸς τὸ ZK · τῶν ἄρα AI , ZK μέσον ἀνάλογόν ἐστὶ τὸ EK . ἔστι δὲ καὶ τῶν AM , $N\Xi$ τετρα-
 25 γώνων μέσον ἀνάλογον τὸ MN · καὶ ἐστὶν ἴσον το μὲν AI τῷ AM , τὸ δὲ ZK τῷ $N\Xi$ · καὶ τὸ EK ἄρα

1. ἐστίν] ἐστὶ P B V, comp. F b. ἐστίν] ἐστὶ V. 3. μήκει] om. B. ΔH F, $H\Delta$ in ras. V. 4. φητὴ — 5. μήκει] m. 2 B. 5. καὶ ἐκατέρον V. 6. EK] ΘK P. ἐστὶ B V, comp. F b. δυνάμεις, c euan., V. 7. εἰσὶ σύμμετροι V. ἐστίν V. μήκει] om. V. 8. AH] H in ras. V, deinde add. μήκει m. 2. $H\Delta$] ΔH P. ἀλλ' — 9. τῇ EH] mg.

surabiles sunt, etiam ΔH utrique ΔE , EH longitudine commensurabilis est [prop. XV; cfr. p. 283 not.]. uerum HA rationalis est et rectae AG longitudine incommensurabilis. quare etiam utraque ΔE , EH rationalis est et rectae AG longitudine incommensurabilis [prop. XIII]. itaque utrumque $\Delta\Theta$, EK medium est [prop. XX]. et quoniam AH , HA potentia tantum commensurabiles sunt, AH et HA longitudine incommensurabiles sunt; uerum AH , AZ et ΔH , EH longitudine commensurabiles sunt. quare AZ , EH longitudine incommensurabiles sunt [prop. XIII]. est autem $AZ:EH=AI:EK$ [VI, 1]. ergo AI , EK incommensurabilia sunt [prop. XI].

construatur igitur quadratum $AM=AI$, et auferatur spatio ZK aequale $N\Xi$ in eodem angulo positum, quo AM . itaque AM , $N\Xi$ circum eandem diametrum posita sunt [VI, 26]. sit OP eorum diametrus, et figura describatur [cfr. uol. I p. 137 not.]. iam quoniam est $AZ \times ZH = EH^2$, erit $AZ:EH=EH:ZH$ [VI, 17]. est autem $AZ:EH=AI:EK$ [VI, 1], et $EH:ZH=EK:ZK$ [id.]. quare etiam $AI:EK=EK:ZK$. itaque EK medium est proportionale inter AI , ZK . uerum etiam MN medium est proportionale inter quadrata AM , $N\Xi$ [prop. LIII lemma]. et $AI=AM$,

m. 1 P. 8. Post $\mu\acute{\epsilon}\nu$ ras. 1 litt. V. AZ $\mu\acute{\eta}\kappa\epsilon\iota$ V. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$ V. 9. $\mu\acute{\eta}\kappa\epsilon\iota$ om. V. $\acute{\alpha}\rho\alpha$] supra scr. m. 1 F. 10. AZ] supra scr. Δ b. EH] in ras. V. 11. $\tau\acute{o}$] (pr.) $\tau\acute{o}$ $\acute{\alpha}\nu\theta\iota$ $\tau\eta\varsigma$ F. $\tau\acute{o}$] $\tau\eta\nu$ b. EK] EA supra scr. K b. $\acute{\alpha}\sigma\sigma\mu\epsilon\tau\rho\omicron\nu$ — 12. EK] om. P. 11. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ $\tau\acute{o}$] m. 2 F. 13. $\tau\acute{\omega}$] corr. ex $\tau\acute{o}$ m. 1 F. $\tau\epsilon\tau\rho\alpha\gamma\omega\acute{\nu}\omega\nu$ P, sed corr. 15. $\delta\nu$] supra scr. m. 1 F. $\tau\acute{\omega}$] $\tau\acute{o}$ F. 17. $\acute{\upsilon}\pi\acute{o}$] $\acute{\alpha}\nu\theta\iota$ b. 22. $\kappa\alpha\iota$ $\acute{\omega}\varsigma$ — 23. $\tau\acute{o}$ ZK] mg. m. 2 B. 23. $\tau\acute{o}$ ZK] ZK PB.

ἴσον ἐστὶ τῷ MN . ἀλλὰ τὸ μὲν MN ἴσον ἐστὶ τῷ $ΑΞ$,
 τὸ δὲ EK ἴσον [ἐστὶ] τῷ $ΑΘ$ · καὶ ὅλον ἄρα τὸ AK
 ἴσον ἐστὶ τῷ $ΓΦΧ$ γνώμονι καὶ τῷ $NΞ$. ἐστὶ δὲ καὶ
 5 ἐστὶ τῷ $ΣΤ$, τουτέστι τῷ ἀπὸ τῆς AN τετραγώνῳ·
 ἢ AN ἄρα δύναται τὸ AB χωρίον.

Λέγω, ὅτι ἡ AN μέσης ἀποτομῆ ἐστὶ δευτέρα.

Ἐπεὶ γὰρ μέσα ἐδείχθη τὰ AI , ZK καὶ ἐστὶν ἴσα
 τοῖς ἀπὸ τῶν AO , ON , μέσον ἄρα καὶ ἐκάτερον τῶν
 10 ἀπὸ τῶν AO , ON · μέση ἄρα ἐκάτερα τῶν AO , ON .
 καὶ ἐπεὶ σύμμετρόν ἐστι τὸ AI τῷ ZK , σύμμετρον ἄρα
 καὶ τὸ ἀπὸ τῆς AO τῷ ἀπὸ τῆς ON . πάλιν, ἐπεὶ
 ἀσύμμετρον ἐδείχθη τὸ AI τῷ EK , ἀσύμμετρον ἄρα
 ἐστὶ καὶ τὸ AM τῷ MN , τουτέστι τὸ ἀπὸ τῆς AO
 15 τῷ ὑπὸ τῶν AO , ON · ὥστε καὶ ἡ AO ἀσύμμετρός
 ἐστὶ μήκει τῇ ON · αἱ AO , ON ἄρα μέσαι εἰσὶ δυ-
 νάμει μόνον σύμμετροι.

Λέγω δὴ, ὅτι καὶ μέσον περιέχουσιν.

Ἐπεὶ γὰρ μέσον ἐδείχθη τὸ EK καὶ ἐστὶν ἴσον
 20 τῷ ὑπὸ τῶν AO , ON , μέσον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ὑπὸ
 τῶν AO , ON · ὥστε αἱ AO , ON μέσαι εἰσὶ δυνάμει
 μόνον σύμμετροι μέσον περιέχουσαι. ἡ AN ἄρα μέσης
 ἀποτομῆ ἐστὶ δευτέρα· καὶ δύναται τὸ AB χωρίον.

Ἡ ἄρα τὸ AB χωρίον δυναμένη μέσης ἀποτομῆ
 25 ἐστὶ δευτέρα· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

1. τό] corr. ex τῷ m. rec. P. τῷ] corr. ex τό m. rec. P.
 2. $ΑΞ$] $ΑΞ$ F. τό] corr. ex τῷ m. rec. P. ἐστὶ] P, om.
 BFVb. τῷ] corr. ex τό m. rec. P. Post $ΑΘ$ in b adp. :~,
 deinde spatium 1 lin. uacat. 3. $NΞ$] mut. in NZ m. rec. B.
 4. ἴσον] (prius) m. 2 FV. 5. AN] AM P; AN F, corr.
 m. 2. 6. AN] A eras. V. 7. μέση BFVb. ἐστὶν P. 11.
 σύμμετρον] (prius) σύμμετρος F. 12. τῆς] corr. ex τῶν F.
 Post AO add. ON B et supra m. 1 P. τῆς] corr. ex

$ZK = NΞ$. itaque etiam $EK = MN$. uerum $MN = AΞ$ [I, 43], $EK = AΘ$. quare etiam $AK = TΦX + NΞ$. est autem etiam

$$AK = AM + NΞ.$$

itaque reliquum $AB = ΣT = AN^2$. ergo AN quadrata spatio AB aequalis est.

dico, AN mediae apotomen esse secundam. nam quoniam demonstrauius, AI , ZK media esse, et $AI = AO^2$, $ZK = ON^2$, etiam utrumque AO^2 , ON^2 medium est. quare utraque AO , ON media est. et quoniam AI , ZK commensurabilia sunt [VI, 1; prop. XI], etiam AO^2 , ON^2 commensurabilia sunt. rursus quoniam demonstrauius, AI et EK incommensurabilia esse, etiam AM et MN , hoc est AO^2 et $AO \times ON$, incommensurabilia sunt. quare etiam AO , ON longitudine incommensurabiles sunt [VI, 1; prop. XI]. ergo AO , ON mediae sunt potentia tantum commensurabiles. iam dico, easdem spatium medium comprehendere. nam quoniam demonstrauius, EK medium esse, et $EK = AO \times ON$, etiam $AO \times ON$ medium est. quare AO , ON mediae sunt potentia tantum commensurabiles medium comprehendentes. itaque AN mediae apotome est secunda [prop. LXXV]. et spatio AB aequalis est quadrata.

Ergo recta spatio AB aequalis quadrata mediae apotome est secunda; quod erat demonstrandum.

τῶν F. 14. ἐστίν P. MN] NM P. 15. τῶ] corr. ex τό m. 1 F. 16. εἰσίν P. 18. περιέχονσαι V. 19. γὰρ] om. Fb, m. 2 B. 20. μέσον — 21. ON (prius)] mg. V. 22. σύμμετροι P. AN b. μέση BFVb. 23. ἐστίν P. χωρόν] om. Theon (BFVb). 24. μέση BFVb. 25. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. BFVb.

98'.

Ἐὰν χωρίον περιέχῃται ὑπὸ ῥητῆς καὶ ἀποτομῆς τετάρτης, ἡ τὸ χωρίον δυναμένη ἐλάσσων ἐστίν.

5 Χωρίον γὰρ τὸ AB περιεχέσθω ὑπὸ ῥητῆς τῆς AG καὶ ἀποτομῆς τετάρτης τῆς AD . λέγω, ὅτι ἡ τὸ AB χωρίον δυναμένη ἐλάσσων ἐστίν.

Ἔστω γὰρ τῇ AD προσαρμόξουσα ἡ $ΔH$. αἱ ἄρα $AH, HΔ$ ῥηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ ἡ 10 $ΔH$ σύμμετρός ἐστι τῇ ἐκκειμένη ῥητῇ τῇ AG μήκει, ἡ δὲ ὅλη ἡ $ΔH$ τῆς προσαρμοζούσης τῆς $ΔH$ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσύμμετρου ἑαυτῇ μήκει. ἐπεὶ οὖν ἡ $ΔH$ τῆς $HΔ$ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσύμμετρου ἑαυτῇ μήκει, ἐὰν ἄρα τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς 15 $ΔH$ ἴσον παρὰ τὴν $ΔH$ παραβληθῇ ἐλλείπον εἶδει τετραγώνῳ, εἰς ἀσύμμετρα αὐτὴν διελεί. τετμήσθω οὖν ἡ $ΔH$ δίχα κατὰ τὸ E , καὶ τῷ ἀπὸ τῆς EH ἴσον παρὰ τὴν $ΔH$ παραβεβλήσθω ἐλλείπον εἶδει τετραγώνῳ, καὶ ἔστω τὸ ὑπὸ τῶν AZ, ZH . ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶ 20 μήκει ἡ AZ τῇ ZH . ἤχθωσαν οὖν διὰ τῶν E, Z, H παράλληλοι ταῖς $AG, BΔ$ αἱ $EΘ, ZI, HK$. ἐπεὶ οὖν ῥητὴ ἐστὶν ἡ $ΔH$ καὶ σύμμετρος τῇ AG μήκει, ῥητὸν ἄρα ἐστὶν ὅλον τὸ AK . πάλιν, ἐπεὶ ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ $ΔH$ τῇ AG μήκει, καὶ εἰσιν ἀμφότεραι ῥηταί, μέσον 25 ἄρα ἐστὶ τὸ $ΔK$. πάλιν, ἐπεὶ ἀσύμμετρός ἐστὶν ἡ AZ τῇ ZH μήκει, ἀσύμμετρον ἄρα καὶ τὸ AI τῷ ZK .



2. τετάρτης ἀποτομῆς V. 4. ἐστὶ BV, comp. Fb. 5. ῥητῆς τῆς] corr. ex τῆς m. 2 F, ῥητῆς V. 6. AD] $ABΔ$ b, $Δ$ in ras. m. 1 B. 7] supra scr. P. 7. AB] om. Bb, m. 2 V. 8. AD] mut. in AB m. 2 F, AB b. 11. $ΔH$] $HΔ$ V. 12. δυναμένη P. συμμετρον B, corr. m. 2. 15. ἴσον] μέσον φ. 16. ἀσύμμετρον P, σύμμετρα b. διελεί μήκει V.

XCIV.

Si spatium recta rationali et apotome quarta comprehenditur, recta spatio aequalis quadrata minor est.

Spatium enim AB rationali AG et apotome quarta AD comprehendatur. dico, rectam spatio AB aequalem quadratam minorem esse.

sit enim $\triangle H$ rectae AD congruens. itaque AH , HA rationales sunt potentia tantum commensurabiles,



et AH rationali propositae AG longitudine commensurabilis est, tota autem AH quadrata congruentem $\triangle H$ excedit quadrato rectae sibi longitudine incommensurabilis [deff. tert. 4]. iam quoniam AH^2 excedit HA^2 quadrato rectae sibi longitudine incommensurabilis, si $\frac{1}{4}AH^2$

aequale rectae AH adplicetur spatium figura quadrata deficiens, in partes incommensurabiles eam diuidet [prop. XVIII]. $\triangle H$ igitur in E in duas partes aequales secetur, et quadrato EH^2 aequale rectae AH adplicetur spatium figura quadrata deficiens, et sit $AZ \times ZH$. itaque AZ , ZH incommensurabiles sunt. iam per E , Z , H rectis AG , BA parallelae ducantur $EΘ$, ZI , HK . quoniam igitur AH rationalis est et rectae AG longitudine commensurabilis, AK rationale est. rursus

17. EH] E e corr. V. 19. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\acute{\iota}\nu$ PV. 20. $\mu\acute{\eta}\kappa\epsilon\iota$] om. V. ZH] HZ F. $\delta\iota\alpha$ P. E, Z] Z, E PFb, in ras. m. 2 B. 21. BA] eras. V, ΓB b. 23. $\delta\lambda\omicron\nu$] supra scr. m. 1 b. 52. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\acute{\iota}\nu$ P. 26. $\acute{\alpha}\sigma\upsilon\mu\mu\epsilon\tau\omicron\nu$] $\acute{\alpha}$ - del. F. $\acute{\alpha}\rho\alpha$ $\acute{\epsilon}\sigma\tau\acute{\iota}$ F.

συνεστάτω οὖν τῷ μὲν AI ἴσον τετράγωνον τὸ AM ,
 τῷ δὲ ZK ἴσον ἀφηγήσθω περὶ τὴν αὐτὴν γωνίαν
 τὴν ὑπὸ τῶν LOM τὸ $NΞ$. περὶ τὴν αὐτὴν ἄρα διά-
 μετρόν ἐστι τὰ AM , $NΞ$ τετράγωνα. ἔστω αὐτῶν
 5 διάμετρος ἡ OP , καὶ καταγεγράφθω τὸ σχῆμα. ἐπεὶ
 οὖν τὸ ὑπὸ τῶν AZ , ZH ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς EH ,
 ἀνάλογον ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ AZ πρὸς τὴν EH , οὕτως
 ἡ EH πρὸς τὴν ZH . ἀλλ' ὡς μὲν ἡ AZ πρὸς τὴν
 EH , οὕτως ἐστὶ τὸ AI πρὸς τὸ EK , ὡς δὲ ἡ EH
 10 πρὸς τὴν ZH , οὕτως ἐστὶ τὸ EK πρὸς τὸ ZK . τῶν
 ἄρα AI , ZK μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ EK . ἐστι δὲ
 καὶ τῶν AM , $NΞ$ τετραγώνων μέσον ἀνάλογον τὸ MN ,
 καὶ ἐστὶν ἴσον τὸ μὲν AI τῷ AM , τὸ δὲ ZK τῷ $NΞ$.
 καὶ τὸ EK ἄρα ἴσον ἐστὶ τῷ MN . ἀλλὰ τῷ μὲν EK
 15 ἴσον ἐστὶ τὸ AO , τῷ δὲ MN ἴσον ἐστὶ τὸ $ΛΞ$. ὅλον
 ἄρα τὸ AK ἴσον ἐστὶ τῷ $ΓΦΧ$ γνώμονι καὶ τῷ $NΞ$.
 ἐπεὶ οὖν ὅλον τὸ AK ἴσον ἐστὶ τοῖς AM , $NΞ$ τετρα-
 γώνοις, ὧν τὸ AK ἴσον ἐστὶ τῷ $ΓΦΧ$ γνώμονι καὶ
 τῷ $NΞ$ τετραγώνῳ, λοιπὸν ἄρα τὸ AB ἴσον ἐστὶ τῷ
 20 $ΣΤ$, τουτέστι τῷ ἀπὸ τῆς AN τετραγώνῳ· ἡ AN ἄρα
 δύναται τὸ AB χωρίον.

Λέγω, ὅτι ἡ AN ἄλογός ἐστιν ἡ καλουμένη ἐλάσσων.

Ἐπεὶ γὰρ ῥητόν ἐστι τὸ AK καὶ ἐστὶν ἴσον τοῖς
 ἀπὸ τῶν AO , ON τετράγωνοις, τὸ ἄρα συγκείμενον
 25 ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AO , ON ῥητόν ἐστίν. πάλιν, ἐπεὶ
 τὸ AK μέσον ἐστίν, καὶ ἐστὶν ἴσον τὸ AK τῷ δις
 ὑπὸ τῶν AO , ON , τὸ ἄρα δις ὑπὸ τῶν AO , ON μέσον

2. Post ZK ras. 1 litt. F. 3. τῶν] om. BFV. AO N
 φ et, supra scr. M, b. τό] e corr. m. rec. b. 4. ἐστι] εἶσι P.
 5. ἡ] m. rec. P. 7. AZ] AH , supra scr. Z, b. τὴν]
 om. P. 8. AZ] Z in ras. F. 9. οὕτως] οὕτως ἐστὶν ἡ EH
 πρὸς τὴν ZH . ἀλλ' ὡς μὲν ἡ AZ πρὸς τὴν EH , οὕτως b.

quoniam ΔH , $\Delta \Gamma$ longitudine incommensurabiles sunt, et utraque rationalis est, ΔK medium est [prop. XXI]. rursus quoniam AZ , ZH longitudine incommensurabiles sunt, AI et ZK incommensurabilia sunt [VI, 1; prop. XI]. iam construatur quadratum $AM = AI$, et spatio ZK aequale auferatur $N\Xi$ in eodem angulo positum ΔOM . itaque quadrata AM , $N\Xi$ circum eandem diametrum posita sunt [VI, 26]. sit OP eorum diametrus, et describatur figura [cfr. uol. I p. 137 not.]. iam quoniam $AZ \times ZH = EH^2$, erit $AZ : EH = EH : ZH$ [VI, 17]. est autem $AZ : EH = AI : EK$, $EH : ZH = EK : ZK$ [VI, 1]. quare EK medium est proportionale inter AI , ZK . uerum etiam MN medium est proportionale inter quadrata AM , $N\Xi$ [prop. LIII lemma], et $AI = AM$, $ZK = N\Xi$. quare etiam $EK = MN$. uerum $\Delta \Theta = EK$, $\Delta \Xi = MN$ [I, 43]. itaque $\Delta K = \Gamma\Phi X + N\Xi$. iam quoniam est $AK = AM + N\Xi$, quorum $\Delta K = \Gamma\Phi X + N\Xi$, erit $AB = \Sigma T = AN^2$. ergo AN quadrata spatio AB aequalis est.

dico, AN irrationalem esse minorem, quae uocatur. nam quoniam AK rationale est, et $AK = AO^2 + ON^2$, $AO^2 + ON^2$ rationale est. rursus quoniam ΔK medium est, et $\Delta K = 2 AO \times ON$, $2 AO \times ON$ medium est.

$\xi\sigma\tau\iota$] om. V. AI] supra scr. Γ b. EH] E e corr. F, ras. 2 litt. V. 10. $\xi\sigma\tau\iota$] om. V. 11. $\xi\sigma\tau\iota\nu$ P. 12. $\tau\epsilon\tau\rho\alpha\gamma\acute{\omega}\nu\omega\nu$] om. V. 13. AI] $\Delta\Gamma$ P. $N\Xi$] N in ras. V. 14. $\xi\sigma\sigma\iota\nu \xi\sigma\tau\iota$] $\xi\sigma\tau\iota\nu \xi\sigma\sigma\iota\nu$ F, $\xi\sigma\sigma\iota\nu$ V. $\tau\tilde{\omega}$] (alt.) $\tau\acute{o}$ corr. in $\tau\acute{o}\nu$ (?) V. 15. $\xi\sigma\tau\iota$] om. V. $\tau\acute{o}$] $\tau\tilde{\omega}$ V. $\Theta \Delta B$. $\tau\tilde{\omega}$] corr. ex $\tau\acute{o}$ m. 1 V, $\tau\acute{o}$ P. $\xi\sigma\tau\iota$] om. V. $\tau\acute{o}$] $\tau\tilde{\omega}$ P. 20. $\tau\epsilon\tau\rho\alpha\gamma\acute{\omega}\nu\omega\nu$] om. V. 22. ΔH F. $\acute{\alpha}\nu\acute{\alpha}\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ Fb. 24. $\tau\tilde{\omega}\nu$] $\tau\acute{o}\nu$ P. 25. ON $\tau\epsilon\tau\rho\alpha\gamma\acute{\omega}\nu\omega\nu$ V. $\xi\sigma\tau\iota$ BVb, comp. F. 26. $\xi\sigma\tau\iota\nu$] comp. F, $\xi\sigma\tau\iota$ PBVb. $\tau\acute{o}$ ΔK] om. V. $\tau\tilde{\omega}$] e corr. V.

ἐστίν. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρον ἐδείχθη τὸ AI τῷ ZK , ἀσύμμετρον ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς AO τετραγώνου τῷ ἀπὸ τῆς ON τετραγώνῳ. αἱ AO, ON ἄρα δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν
 5 ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων φητόν, τὸ δὲ δις ὑπ' αὐτῶν μέσον. ἡ AN ἄρα ἄλογός ἐστιν ἡ καλουμένη ἐλάσσων· καὶ δύναται τὸ AB χωρίον.

Ἡ ἄρα τὸ AB χωρίον δυναμένη ἐλάσσων ἐστίν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

10

9ε'.

Ἐὰν χωρίον περιέχεται ὑπὸ φητῆς καὶ ἀποτομῆς πέμπτης, ἡ τὸ χωρίον δυναμένη [ἡ] μετὰ φητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσά ἐστιν.

Χωρίον γὰρ τὸ AB περιεχέσθω ὑπὸ φητῆς τῆς
 15 AG καὶ ἀποτομῆς πέμπτης τῆς AD . λέγω, ὅτι ἡ τὸ AB χωρίον δυναμένη [ἡ] μετὰ φητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσά ἐστιν.

Ἔστω γὰρ τῇ AD προσαρμόζουσα ἡ AH . αἱ ἄρα
 20 AH, HA φηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ ἡ
 20 προσαρμόζουσα ἡ HA σύμμετρός ἐστι μήκει τῇ ἐκκειμένη φητῇ τῇ AG , ἡ δὲ ὅλη ἡ AH τῆς προσαρμόζουσας τῆς AH μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ. ἐὰν ἄρα τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς AH ἴσον παρὰ τὴν AH παραβληθῇ ἑλλείπον εἶδει τετρα-

1. ἐστὶ B V b, comp. F. 2. σύμμετρον B, corr. m. 2. ἄρα ἐστὶ V. τετραγώνου] om. V. 3. ἀσύμμετροί εἰσι δυνάμει V, deinde del. m. 2: διὰ τὸ δεύτερον θεώρημα τοῦ βιβλίου. 6. AH F. ἀνάλογος P, sed corr. 7. AB] B corr. ex Γ m. 2 F. 8. ἐστὶ B. 9. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. B F V b. 12. ἡ] (alt.) om. F V b, m. 2 B. 13. ἐστὶ B V, comp. F b. 16. ἡ] om. F V b, m. 2 B. 20. HA] in ras. m. 1 b, AH P. μήκει] om. V. 21. AG μήκει V. 22. συμέτρου B, corr. m. 2.

et quoniam demonstrauius, AI et ZK incommensurabilia esse, etiam AO^2 , ON^2 incommensurabilia sunt. itaque AO , ON potentia incommensurabiles sunt efficientes summam quadratorum rationalem, duplum autem rectangulum medium. quare AN irrationalis est minor, quae uocatur [prop. LXXVI]. et $AN^2 = AB$.


Ergo recta spatio AB aequalis quadrata minor est; quod erat demonstrandum.

XCV.


Si spatium recta rationali et apotome quinta comprehenditur, recta spatio aequalis quadrata recta est cum rationali totum medium efficiens.

Spatium enim AB recta rationali AF et apotome quinta AA comprehendatur. dico, rectam spatio AB aequalem quadratam rectam esse cum rationali totum medium efficientem.

nam AH rectae AA congruens sit. itaque AH , HA rationales sunt potentia tantum commensurabiles,



et congruens HA rationali propositae AF longitudine commensurabilis est, tota autem AH quadrata excedit congruentem $ΔH$ quadrato rectae sibi incommensurabilis [deff. tert. 5]. itaque si $\frac{1}{4}AH^2$ aequale rectae AH adplicatur spatium figura quadrata deficiens, in partes incommensurabiles eam diuidet [prop.



XVIII]. AH igitur in puncto E in duas partes aequales

γώνω, εἰς ἀσύμμετρα αὐτὴν διελεῖ. τετμήσθω οὖν ἡ
 ΔH δίχα κατὰ τὸ E σημείον, καὶ τῷ ἀπὸ τῆς $E H$
 ἴσον παρὰ τὴν $A H$ παραβεβλήσθω ἐλλείπον εἶδει τε-
 τραγώνω καὶ ἔστω τὸ ὑπὸ τῶν $A Z, Z H$ ἀσύμμετρος
 5 ἄρα ἐστὶν ἡ $A Z$ τῇ $Z H$ μήκει. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρός
 ἐστὶν ἡ $A H$ τῇ ΓA μήκει, καὶ εἰσὶν ἀμφοτέραι ρηταί,
 μέσον ἄρα ἐστὶ τὸ $A K$. πάλιν, ἐπεὶ ρητὴ ἐστὶν ἡ
 ΔH καὶ σύμμετρος τῇ $A \Gamma$ μήκει, ρητόν ἐστι τὸ ΔK .
 συνεστιάτω οὖν τῷ μὲν $A I$ ἴσον τετράγωνον τὸ ΔM ,
 10 τῷ δὲ $Z K$ ἴσον τετράγωνον ἀφηρήσθω τὸ $N \Xi$ περὶ
 τὴν αὐτὴν γωνίαν τὴν ὑπὸ $\Delta O M$ · περὶ τὴν αὐτὴν
 ἄρα διάμετρόν ἐστι τὰ $\Delta M, N \Xi$ τετράγωνα. ἔστω
 αὐτῶν διάμετρος ἡ $O P$, καὶ καταγεγράφθω τὸ σχῆμα.
 ὁμοίως δὴ δεῖξομεν, ὅτι ἡ ΔN δύναται τὸ ΔB χωρίον.
 15 Λέγω, ὅτι ἡ ΔN ἢ μετὰ ρητοῦ μέσον τὸ ὅλον
 ποιούσά ἐστιν.

Ἐπεὶ γὰρ μέσον ἐδείχθη τὸ $A K$ καὶ ἐστὶν ἴσον
 τοῖς ἀπὸ τῶν $\Delta O, O N$, τὸ ἄρα συγκείμενον ἐκ τῶν
 ἀπὸ τῶν $\Delta O, O N$ μέσον ἐστίν. πάλιν, ἐπεὶ ρητόν
 20 ἐστὶ τὸ ΔK καὶ ἐστὶν ἴσον τῷ δις ὑπὸ τῶν $\Delta O, O N$,
 καὶ αὐτὸ ρητόν ἐστιν. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρόν ἐστι τὸ
 ΔI τῷ $Z K$, ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΔO
 τῷ ἀπὸ τῆς $O N$ · αἱ $\Delta O, O N$ ἄρα δυνάμει εἰσὶν ἀσύμ-
 μετροὶ ποιοῦσαι τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν
 25 τετραγώνων μέσον, τὸ δὲ δις ὑπ' αὐτῶν ρητόν. ἡ
 λοιπὴ ἄρα ἡ ΔN ἄλογός ἐστιν ἢ καλουμένη μετὰ

1. Post διελεῖ del. μήκει V. 3. $A H$] H e corr. m. 1 V.

4. τό] corr. ex τῷ P. 5. τῇ] supra scr. m. 1 b. Post μήκει add. καὶ ἤχθωσαν διὰ τῶν E, Z, H τῇ $A \Gamma$ ($A b$) παράλληλοι αἱ $E \Theta, Z I, H K$ b, mg. FV. 6. ΓA] in ras. V, $A \Gamma$ P.

8. Ante σύμμετρος ras. 1 litt. V. ἄρα ἐστὶ V b, m. 2 F. 9. ἐστιάτω b, ἔστω V. 10. τετράγωνον] supra scr. F. τὸ $N \Xi$]

secetur, et quadrato EH^2 aequale rectae AH adplicetur spatium figura quadrata deficiens et sit $AZ \times ZH$. itaque AZ , ZH longitudine incommensurabiles sunt. et quoniam AH , ΓA longitudine incommensurabiles, et utraque rationalis est, AK medium est [prop. XXI]. rursus quoniam $\angle H$ rationalis est et rectae $A\Gamma$ longitudine commensurabilis, $\angle K$ rationale est [prop. XIX]. construatur igitur quadratum $AM = AI$, et spatio ZK aequale auferatur quadratum $N\Xi$ in eodem angulo $\angle OM$ positum. itaque quadrata AM , $N\Xi$ circum eandem diametrum posita sunt [VI, 26]. sit OP eorum diameter, et describatur figura [uol. I p. 137 not.]. eodem igitur modo demonstrabimus, esse $AN^2 = AB$.

dico, AN rectam esse cum rationali totum medium efficientem. quoniam enim demonstrauius, AK medium esse, et $AK = AO^2 + ON^2$, $AO^2 + ON^2$ medium est. rursus quoniam $\angle K$ rationale est, et

$$\angle K = 2 \angle O \times ON,$$

hoc et ipsum rationale est. et quoniam AI , ZK incommensurabilia sunt, etiam AO^2 , ON^2 incommensurabilia sunt. quare AO , ON potentia incommensurabiles sunt efficientes summam quadratorum mediam, duplum autem rectangulum rationale. itaque reliqua

om. Theon (BFVb). 11. ὑπὸ τῶν BFb. $\angle OM$ τὸ $N\Xi$ ($M\Xi \varphi$) Theon (BFVb). 12. ἐστὶ] εἰσι in ras. m. 2 V. τὰ] in ras. m. 2 V. AM] A in ras. m. 2 V. 18. συγκεκλιμενον] om. V. 19. ἐστὶ BV, comp. Fb. 21. αὐτό] τὸ δις ἄρα ὑπὸ τῶν AO , ON Theon (BFVb). ἐστὶ PBV, comp. Fb. 22. AI] mut. in AE m. 2 F, AE b. 23. ON] (prius) e corr. V. 25. ἡ] om. B. 26. καλονμένη] κα- supra scr. m. 1 b. ἡ μετὰ b.

ζητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιούσα· καὶ δύναται τὸ AB χωρίον.

Ἡ τὸ AB ἄρα χωρίον δυναμένη μετὰ ζητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιούσά ἐστιν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

5

95'.

Ἐὰν χωρίον περιέχεται ὑπὸ ζητῆς καὶ ἀποτομῆς ἑκτης, ἡ τὸ χωρίον δυναμένη μετὰ μέσον μέσον τὸ ὅλον ποιούσά ἐστιν.

Χωρίον γὰρ τὸ AB περιχέσθω ὑπὸ ζητῆς τῆς AG
 10 καὶ ἀποτομῆς ἑκτης τῆς AD . λέγω, ὅτι ἡ τὸ AB χωρίον δυναμένη [ἡ] μετὰ μέσον μέσον τὸ ὅλον ποιούσά ἐστιν.

Ἔστω γὰρ τῇ AD προσαρμόξουσα ἡ AH . αἱ ἄρα AH , HD ζηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ
 15 οὐδετέρα αὐτῶν σύμμετρός ἐστι τῇ ἑκκειμένη ζητῇ τῇ AG μήκει, ἡ δὲ ὅλη ἡ AH τῆς προσαρμοξούσης τῆς AH μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσύμμετρου ἑαυτῇ μήκει. ἐπεὶ οὖν ἡ AH τῆς HD μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσύμμετρου ἑαυτῇ μήκει, ἐὰν ἄρα τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ
 20 ἀπὸ τῆς AH ἴσον παρὰ τὴν AH παραβληθῇ ἐλλείπον εἶδει τετραγώνῳ, εἰς ἀσύμμετρα αὐτὴν διελεί. τετμήσθω οὖν ἡ AH διχα κατὰ τὸ E [σημείον], καὶ τῷ ἀπὸ τῆς EH ἴσον παρὰ τὴν AH παραβεβλήσθω ἐλλείπον εἶδει

3. ἄρα τὸ AB V. ἄρα] om. PB, m. 2 F. χωρίον ἄρα B. 4. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. BFVb. 6. ὑπ' P. 8. ἐστι BV, comp. Fb. 9. AB] $AB\Gamma$ P. 10. ἑκτης τῆς] corr. ex ἑκτης m. rec. P. 11. ἡ] om. BFVb. 14. καὶ οὐδετέρῃ] in ras. F. 15. αὐτῶν] τῶν AH , HD BVb, e corr. F. 16. τῆς] (alt.) τῇ F. 17. σύμμετρου P. ἑαυτοῦ F. 18. ἐπεὶ — 19. μήκει] mg. m. 2 B. 19. ἑαυτῆς B, ἑαυτοῦ F. τοῦ] τῷ b. 20. AH] ΔH B. παραβεβλήμεν B, παρα-

AN irrationalis est cum rationali totum medium efficiens, quae uocatur [prop. LXXVII]. et $AN^2 = AB$.



Ergo recta spatio AB aequalis quadrata recta cum rationali totum medium efficiens est; quod erat demonstrandum.

XCVI.

Si spatium recta rationali et sexta apotome comprehenditur, recta spatio aequalis quadrata recta est cum medio totum medium efficiens.

Spatium enim AB rationali AI et sexta apotome AD comprehendatur. dico, rectam spatio AB aequalem quadratam rectam esse cum medio totum medium efficientem.

nam ΔH rectae AD congruens sit. itaque AH , HA rationales sunt potentia tantum commensurabiles,



et neutra earum rationali positae AI longitudine commensurabilis est, tota autem AH congruentem ΔH quadrata excedit quadrato rectae sibi longitudine incommensurabilis [deff. tert. 6]. iam quoniam AH^2 excedit HA^2 quadrato rectae sibi incommensurabilis longitudine, si $\frac{1}{4} \Delta H^2$ aequale

rectae AH adplicatur spatium figura quadrata deficiens, in partes incommensurabiles eam diuidet [prop. XVIII]. ΔH igitur in puncto E in duas partes aequales secetur, et quadrato EH^2 aequale rectae AH adplicetur

βαλλόμενον F, παραβάλλωμεν Vb. 22. σημειον] om. P. τῶ] τό F. 23. ἴσον] om. V. ἴσον ἐλλειπον V.

τετραγώνῳ, καὶ ἔστω τὸ ὑπὸ τῶν AZ, ZH · ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ AZ τῇ ZH μήκει. ὥς δὲ ἡ AZ πρὸς τὴν ZH , οὕτως ἐστὶ τὸ AI πρὸς τὸ ZK · ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ AI τῷ ZK . καὶ ἐπεὶ αἱ AH, AI ρηταὶ
 5 εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι, μέσον ἐστὶ τὸ AK .
 πάλιν, ἐπεὶ αἱ AI, AH ρηταὶ εἰσι καὶ ἀσύμμετροι μήκει, μέσον ἐστὶ καὶ τὸ AK . ἐπεὶ οὖν αἱ AH, HA δυνάμει μόνον σύμμετροί εἰσιν, ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ AH τῇ HA μήκει. ὥς δὲ ἡ AH πρὸς τὴν HA ,
 10 οὕτως ἐστὶ τὸ AK πρὸς τὸ KA · ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ AK τῷ KA . συνεσιτάτω οὖν τῷ μὲν AI ἴσον τετράγωνον τὸ AM , τῷ δὲ ZK ἴσον ἀφηρήσθω περὶ τὴν αὐτὴν γωνίαν τὸ $NΞ$ · περὶ τὴν αὐτὴν ἄρα διάμετρον ἐστὶ τὰ $AM, NΞ$ τετράγωνα. ἔστω αὐτῶν
 15 διάμετρος ἡ OP , καὶ καταγεγράφθω τὸ σχῆμα. ὁμοίως δὲ τοῖς ἐπάνω δειξομεν, ὅτι ἡ AN δύναται τὸ AB χωρίον.

Λέγω, ὅτι ἡ AN [ἡ] μετὰ μέσον μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσά ἐστιν.

20 Ἐπεὶ γὰρ μέσον ἐδείχθη τὸ AK καὶ ἐστὶν ἴσον τοῖς ἀπὸ τῶν AO, ON , τὸ ἄρα συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AO, ON μέσον ἐστίν. πάλιν, ἐπεὶ μέσον ἐδείχθη τὸ AK καὶ ἐστὶν ἴσον τῷ δις ὑπὸ τῶν AO, ON , καὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν AO, ON μέσον ἐστίν. καὶ
 25 ἐπεὶ ἀσύμμετρον ἐδείχθη τὸ AK τῷ AK , ἀσύμμετρα [ἄρα] ἐστὶ καὶ τὰ ἀπὸ τῶν AO, ON τετράγωνα τῷ δις ὑπὸ τῶν AO, ON . καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρόν ἐστὶ τὸ

1. ἀσύμμετρον P, corr. m. 1. 2. ZH] HZ F. 3. AI] ἀπὸ AI F. 4. ἐστίν P. AI] corr. ex AI m. rec. P. 5. AK] corr. ex AK m. rec. P. 6. πάλιν — 7. AK] om. P. 10. KA] AK V. 11. KA] corr. ex AK V. 12. ἀφηρήσθω

spatium figura quadrata deficiens, et sit $AZ \times ZH$. itaque AZ , ZH longitudine incommensurabiles sunt. est autem $AZ:ZH = AI:ZK$ [VI, 1]. itaque AI , ZK incommensurabilia sunt [prop. XI]. et quoniam AH , AG rationales sunt potentia tantum commensurabiles, AK medium est [prop. XXI]. rursus quoniam AG , AH rationales sunt et longitudine incommensurabiles, etiam AK medium est [id.]. quoniam igitur AH , HA potentia tantum commensurabiles sunt, AH et HA longitudine incommensurabiles sunt. est autem $AH:HA = AK:KA$ [VI, 1]. itaque AK , KA incommensurabilia sunt [prop. XI]. construatur igitur quadratum $AM = AI$, et spatio ZK aequale auferatur $N\Xi$ in eodem angulo positum. itaque quadrata AM , $N\Xi$ circum eandem diametrum posita sunt [VI, 26]. sit OP eorum diametrus, et describatur figura [uol. I p. 137 not.]. eodem igitur modo, quo supra, demonstrabimus, esse $AN^2 = AB$.

dico, AN rectam esse cum medio totum medium efficientem. nam quoniam demonstrauius, AK medium esse, et $AK = AO^2 + ON^2$, $AO^2 + ON^2$ medium est. rursus quoniam demonstrauius AK medium esse, et $AK = 2AO \times ON$, etiam $2AO \times ON$ medium est. et quoniam demonstrauius, AK et AK incommensurabilia esse, etiam $AO^2 + ON^2$ et $2AO \times ON$ incommensurabilia sunt. et quoniam AI , ZK incom-

$\tau\acute{o}$ $N\Xi$ V. 13. $\pi\epsilon\rho\acute{\iota}$ — $\gamma\omega\nu\lambda\alpha\nu$] om. Fb, mg. m. 2 B. $\alpha\upsilon\tau\eta\eta\nu$] (prius) $\alpha\upsilon\tau\eta\eta\nu$ $\tau\eta\nu$ $\upsilon\pi\acute{o}$ $ΛΟΜ$ V. $\tau\acute{o}$ $N\Xi$] om. V. 14. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$] $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ V. $\tau\epsilon\tau\rho\acute{\alpha}\gamma\omega\nu\alpha$] om. V. 16. $\delta\acute{\upsilon}\nu\alpha\tau\alpha\iota$ — 18. AN] mg. m. 2 V. 18. η] (alt.) om. P. 20. $\acute{\iota}\sigma\sigma\upsilon$] m. 2 F. 22. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ PBVb, comp. F. 24. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ PBV, comp. Fb. 26. $\acute{\alpha}\rho\alpha$] om. BFVb.

AI τῷ ZK , ἀσύμμετρον ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς AO τῷ
ἀπὸ τῆς ON . αἱ AO , ON ἄρα δυνάμει εἰσὶν ἀσύμ-
μετροὶ ποιοῦσαι τό τε συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν
τετραγώνων μέσον καὶ τὸ δις ὑπ' αὐτῶν μέσον ἔτι τε
5 τὰ ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα ἀσύμμετρα τῷ δις ὑπ' αὐτῶν.
ἡ ἄρα AN ἄλογός ἐστιν ἡ καλουμένη μετὰ μέσου
μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα· καὶ δύναται τὸ AB χωρίον.
Ἡ ἄρα τὸ χωρίον δυναμένη μετὰ μέσου μέσον τὸ
ὅλον ποιοῦσά ἐστιν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

10

95'.

Το. ἀπὸ ἀποτομῆς παρὰ ῥητὴν παραβαλλό-
μενον πλάτος ποιεῖ ἀποτομὴν πρώτην.

Ἔστω ἀποτομή ἡ AB , ῥητὴ δὲ ἡ $ΓΔ$, καὶ τῷ ἀπὸ
τῆς AB ἴσον παρὰ τὴν $ΓΔ$ παραβεβλήσθω τὸ $ΓΕ$
15 πλάτος ποιοῦν τὴν $ΓΖ$. λέγω, ὅτι ἡ $ΓΖ$ ἀποτομή ἐστι
πρώτη.

Ἔστω γὰρ τῇ AB προσαρμόζουσα ἡ BH . αἱ ἄρα
 AH , HB ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι. καὶ
τῷ μὲν ἀπὸ τῆς AH ἴσον παρὰ τὴν $ΓΔ$ παραβεβλήσθω
20 τὸ $ΓΘ$, τῷ δὲ ἀπὸ τῆς BH τὸ $ΚΔ$. ὅλον ἄρα τὸ $ΓΔ$
ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν AH , HB . ὧν τὸ $ΓΕ$ ἴσον
ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς AB . λοιπὸν ἄρα τὸ $ΖΔ$ ἴσον ἐστὶ
τῷ δις ὑπὸ τῶν AH , HB . τετμήσθω ἡ ZM δίχα
κατὰ τὸ N σημεῖον, καὶ ἤχθω διὰ τοῦ N τῇ $ΓΔ$
25 παράλληλος ἡ $NΞ$. ἐκότερον ἄρα τῶν $ZΞ$, AN
ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν AH , HB . καὶ ἐπεὶ τὰ ἀπὸ

2. ON] (prius) $NO P$. 3. τε] μὲν $BFVb$. συγκείμενον]
m. 2 V . 4. καὶ] ins. m. 1 V . ἐτι] ε- in ras. V . 6. AN]
corr. ex $AN B$. 7. ποιοῦσαι φ. 8. χωρίον] $AB BFb$, AB
χωρίον V . 9. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] : ~ P . 11. ἀπό] om. b .

τῶν AH, HB ῥητά ἐστίν, καὶ ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν AH, HB ἴσον τὸ ΔM , ῥητὸν ἄρα ἐστὶ τὸ ΔM . καὶ παρὰ ῥητὴν τὴν ΓA παραβέβληται πλάτος ποιοῦν τὴν ΓM · ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ΓM καὶ σύμμετρος τῇ ΓA μήκει.
 5 πάλιν, ἐπεὶ μέσον ἐστὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν AH, HB , καὶ τῷ δις ὑπὸ τῶν AH, HB ἴσον τὸ $Z A$, μέσον ἄρα τὸ $Z A$. καὶ παρὰ ῥητὴν τὴν ΓA παρὰκεῖται πλάτος ποιοῦν τὴν $Z M$ · ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ $Z M$ καὶ ἀσύμμετρος τῇ ΓA μήκει. καὶ ἐπεὶ τὰ μὲν ἀπὸ τῶν AH, HB ῥητά
 10 ἐστίν, τὸ δὲ δις ὑπὸ τῶν AH, HB μέσον, ἀσύμμετρα ἄρα ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν AH, HB τῷ δις ὑπὸ τῶν AH, HB . καὶ τοῖς μὲν ἀπὸ τῶν AH, HB ἴσον ἐστὶ τὸ ΓA , τῷ δὲ δις ὑπὸ τῶν AH, HB τὸ $Z A$ · ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ ΔM τῷ $Z A$. ὥς δὲ τὸ ΔM πρὸς τὸ
 15 $Z A$, οὕτως ἐστὶν ἡ ΓM πρὸς τὴν $Z M$. ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ ΓM τῇ $Z M$ μήκει. καὶ εἰσὶν ἀμφοτέραι ῥηταί· αἱ ἄρα $\Gamma M, MZ$ ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἡ ΓZ ἄρα ἀποτομὴ ἐστίν.

Λέγω δὴ, ὅτι καὶ πρώτη.

20 Ἐπεὶ γὰρ τῶν ἀπὸ τῶν AH, HB μέσον ἀνάλογόν ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν AH, HB , καὶ ἐστὶ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς AH ἴσον τὸ $\Gamma \Theta$, τῷ δὲ ἀπὸ τῆς BH ἴσον τὸ $K A$, τῷ δὲ ὑπὸ τῶν AH, HB τὸ $N A$, καὶ τῶν $\Gamma \Theta, K A$ ἄρα μέσον ἀνάλογόν ἐστὶ τὸ $N A$ · ἐστὶν ἄρα ὥς τὸ
 25 $\Gamma \Theta$ πρὸς τὸ $N A$, οὕτως τὸ $N A$ πρὸς τὸ $K A$. ἀλλ' ὥς μὲν τὸ $\Gamma \Theta$ πρὸς τὸ $N A$, οὕτως ἐστὶν ἡ ΓK πρὸς

1. ῥητά — 2. HB] mg. m. 2 B. 1. ἐστίν] ἐστὶ PBVB, comp. F. καὶ ἐστὶ τοῖς] τοῖς δέ V. 3. παρὰκεῖται Theon (BFVB); παραβέβληται supra add. m. 2 B. 6. τῷ] corr. ex τό FV. 8. ἐστίν] ἐστὶ καὶ F. καὶ ἀσύμμετρος] bis b. 10. ἐστὶ BV, comp. b, εἰσι F? μέσα P, et F, corr. m. 1. 11. ἄρα] om. B. ἐστίν P. 12. καὶ] καὶ ἐστὶ BFVB. ἐστὶ]

rationale est, et $\Delta M = \Delta H^2 + HB^2$, ΔM rationale est. et rectae rationali $\Gamma\Delta$ adplicatum est latitudinem efficiens ΓM . itaque ΓM rationalis est et rectae $\Gamma\Delta$ longitudine commensurabilis [prop. XX]. rursus quoniam medium est $2\Delta H \times HB$, et $Z\Delta = 2\Delta H \times HB$, $Z\Delta$ medium est. et rectae rationali $\Gamma\Delta$ adplicatum est latitudinem efficiens ZM . itaque ZM rationalis est et rectae $\Gamma\Delta$ longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. et quoniam $\Delta H^2 + HB^2$ rationale est, $2\Delta H \times HB$ autem medium, $\Delta H^2 + HB^2$ et $2\Delta H \times HB$ incommensurabilia sunt. et

$$\Gamma\Delta = \Delta H^2 + HB^2, Z\Delta = 2\Delta H \times HB.$$

itaque ΔM , $Z\Delta$ incommensurabilia sunt. est autem $\Delta M : Z\Delta = \Gamma M : ZM$ [VI, 1]. itaque ΓM , ZM longitudine incommensurabiles sunt [prop. XI]. et utraque rationalis est. itaque ΓM , MZ rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo ΓZ apotome est [prop. LXXIII].

iam dico, eandem primam esse. quoniam enim $\Delta H \times HB$ medium est proportionale inter ΔH^2 et HB^2 [prop. XXI lemma], et $\Gamma\Theta = \Delta H^2$, $K\Delta = BH^2$, $N\Delta = \Delta H \times HB$, erit etiam $N\Delta$ medium proportionale inter $\Gamma\Theta$, $K\Delta$. quare $\Gamma\Theta : N\Delta = N\Delta : K\Delta$. est autem $\Gamma\Theta : N\Delta = \Gamma K : NM$ et $N\Delta : K\Delta = NM : KM$ [VI, 1]. itaque $\Gamma K \times KM = MN^2$ [VI, 17] = $\frac{1}{2} ZM^2$.

om. B F V b. 13. HB] corr. ex AB m. 1 b, HB ἴσον V. 15. $\tau\eta\nu$] om. B. 18. ἔστι B V b, comp. F. 21. ἔστι] (alt.) ἔστιν P. $\tau\omega$] corr. ex $\tau\acute{o}$ m. 1 F. 22. $\tau\omega$ δὲ ὑπὸ τῶν ΔH , HB ἴσον τὸ $N\Delta$, $\tau\omega$ δὲ ἀπὸ τῆς BH ἴσον τὸ $K\Delta$ καὶ κτλ. Theon (B F V b). 24. $N\Delta$] e corr. V. ἔστιν — 25. πρὸς τὸ $N\Delta$] mg. m. 1 P. 25. $N\Delta$] corr. ex ΔN V. οὕτως — 26. $N\Delta$] mg. m. 2 B. 26. $N\Delta$] corr. ex ΔN V. ἔστιν] m. 2 F. η] ras. 1 litt. b.

- τὴν NM . ὥς δὲ τὸ NA πρὸς τὸ KA , οὕτως ἐστὶν ἡ NM πρὸς τὴν KM . τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν $ΓΚ$, KM ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς NM , τουτέστι τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ZM . καὶ ἐπεὶ σύμμετρόν ἐστι τὸ ἀπὸ 5 τῆς AH τῷ ἀπὸ τῆς HB , σύμμετρόν [ἐστὶ] καὶ τὸ $ΓΘ$ τῷ KA . ὥς δὲ τὸ $ΓΘ$ πρὸς τὸ KA , οὕτως ἡ $ΓΚ$ πρὸς τὴν KM . σύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ $ΓΚ$ τῇ KM . ἐπεὶ οὖν δύο εὐθεῖαι ἄνισοι εἰσιν αἱ $ΓΜ$, MZ , καὶ τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ZM ἴσον παρὰ τὴν 10 $ΓΜ$ παραβέβληται ἐλλείπον εἶδει τετραγώνῳ τὸ ὑπὸ τῶν $ΓΚ$, KM , καὶ ἐστὶ σύμμετρος ἡ $ΓΚ$ τῇ KM , ἡ ἄρα $ΓΜ$ τῆς MZ μείζον δύνανται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ μήκει. καὶ ἐστὶν ἡ $ΓΜ$ σύμμετρος τῇ ἐκκειμένη φητῇ τῇ $ΓΔ$ μήκει· ἡ ἄρα $ΓΖ$ ἀποτομή ἐστὶ πρώτη.
- 15 Τὸ ἄρα ἀπὸ ἀποτομῆς παρὰ φητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ ἀποτομὴν πρώτην· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

αἡ'.

- Τὸ ἀπὸ μέσης ἀποτομῆς πρώτης παρὰ φητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ ἀποτομὴν δευ- 20 τέραν.

- Ἔστω μέσης ἀποτομῆς πρώτη ἡ AB , φητὴ δὲ ἡ $ΓΔ$, καὶ τῷ ἀπὸ τῆς AB ἴσον παρὰ τὴν $ΓΔ$ παραβεβλήσθω τὸ $ΓΕ$ πλάτος ποιούν τὴν $ΓΖ$. λέγω, ὅτι ἡ $ΓΖ$ ἀποτομή ἐστὶ δευτέρα.
- 25 Ἔστω γὰρ τῇ AB προσαρμόζουσα ἡ BH . αἱ ἄρα AH , HB μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι φητὸν περιέχουσαι. καὶ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς AH ἴσον παρὰ τὴν

1. ὥς δέ — 2. KM] om. F, uidetur fuisse in mg. 2. Post prins KM add. καὶ ὥς ἄρα ἡ $ΓΚ$ πρὸς τὴν NM (MNF), οὕτως ἡ

et quoniam AH^2 , HB^2 commensurabilia sunt, etiam $\Gamma\Theta$, $K\Lambda$ commensurabilia sunt. est autem

$$\Gamma\Theta : K\Lambda = \Gamma K : KM$$

[VI, 1]. itaque ΓK , KM commensurabiles sunt [prop. XI]. iam quoniam sunt duae rectae inaequales ΓM , MZ , et $\frac{1}{4} ZM^2$ aequale spatium rectae ΓM adplicatum est $\Gamma K \times KM$ figura quadrata deficiens, et ΓK , KM commensurabiles sunt, ΓM^2 excedit MZ^2 quadrato rectae sibi commensurabilis longitudine [prop. XVII]. et ΓM rationali propositae $\Gamma\Lambda$ longitudine commensurabilis est. itaque ΓZ apotome est prima [def. tert. 1].

Ergo quadratum apotomes rectae rationali adplicatum latitudinem efficit apotomen primam; quod erat demonstrandum.

XCVIII.

Quadratum mediae apotomes primae rectae rationali adplicatum latitudinem efficit apotomen secundam.

Sit AB mediae apotome prima, $\Gamma\Lambda$ autem rationalis, et quadrato AB^2 aequale rectae $\Gamma\Lambda$ adplicetur ΓE latitudinem efficiens ΓZ . dico, ΓZ apotomen esse secundam.


nam BH rectae AB congruens sit. itaque AH , HB mediae sunt potentia tantum commensurabiles

NM πρὸς τὴν *KM* FVb. 3. *τὸντέστιν* P. 4. *σύμμετρος* P, corr. m. rec. *ἔστιν* P. 5. *ἔστι*] om. P. 11. *ἔστιν* P. *ἀσύμμετρος* F. 12. ΓM] $M\Gamma$ e corr. V; KM supra scr. Γ b. MZ] ZM F. *ἀσύμμετρον* b, α - add. m. 2 F. 15. *παρὰ φητήν*] om. V. 16. *ὅπερ ἔδει δεῖξαι*] comp. P, om. BFVb. 21. *μέση* BFVb. 22. Post *παρὰ* del. φη m. 1 P. $\Gamma\Lambda$] ΓM F. 23. ΓE] corr. ex $\Gamma\Theta$ m. rec. P. 25. BH] corr. ex ZH m. 2 V. *αἱ ἄρα*] *ἄρα ἡ* F. 26. *εἰσὶν* B.

- $\Gamma\Delta$ παραβεβλήσθω τὸ $\Gamma\Theta$ πλάτος ποιοῦν τὴν ΓK ,
 τῷ δὲ ἀπὸ τῆς HB ἴσον τὸ $K\Lambda$ πλάτος ποιοῦν τὴν
 KM . ὅλον ἄρα τὸ $\Gamma\Lambda$ ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν AH ,
 HB μέσον ἄρα καὶ τὸ $\Gamma\Lambda$. καὶ παρὰ ῥητὴν τὴν $\Gamma\Delta$
 5 παράκειται πλάτος ποιοῦν τὴν ΓM . ῥητὴ ἄρα ἐστὶν
 ἡ ΓM καὶ ἀσύμμετρος τῇ $\Gamma\Delta$ μήκει. καὶ ἐπεὶ τὸ $\Gamma\Lambda$
 ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν AH , HB , ὦν τὸ ἀπὸ τῆς AB
 ἴσον ἐστὶ τῷ ΓE , λοιπὸν ἄρα τὸ δις ὑπὸ τῶν AH ,
 HB ἴσον ἐστὶ τῷ $Z\Lambda$. ῥητὸν δέ [ἐστι] τὸ δις ὑπὸ
 10 τῶν AH , HB . ῥητὸν ἄρα τὸ $Z\Lambda$. καὶ παρὰ ῥητὴν
 τὴν ZE παράκειται πλάτος ποιοῦν τὴν ZM . ῥητὴ ἄρα
 ἐστὶ καὶ ἡ ZM καὶ σύμμετρος τῇ $\Gamma\Delta$ μήκει. ἐπεὶ οὖν
 τὰ μὲν ἀπὸ τῶν AH , HB , τουτέστι τὸ $\Gamma\Lambda$, μέσον
 ἐστίν, τὸ δὲ δις ὑπὸ τῶν AH , HB , τουτέστι τὸ $Z\Lambda$,
 15 ῥητόν, ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ $\Gamma\Lambda$ τῷ $Z\Lambda$. ὥς δὲ τὸ
 $\Gamma\Lambda$ πρὸς τὸ $Z\Lambda$, οὕτως ἐστὶν ἡ ΓM πρὸς τὴν ZM .
 ἀσύμμετρος ἄρα ἡ ΓM τῇ ZM μήκει. καὶ εἰσὶν ἀμ-
 φότεραι ῥηταί· αἱ ἄρα ΓM , MZ ῥηταὶ εἰσι δυνάμει
 μόνον σύμμετροι· ἡ ΓZ ἄρα ἀποτομή ἐστίν.
- 20 *Λέγω δὴ, ὅτι καὶ δευτέρα.*

Τετμήσθω γὰρ ἡ ZM δίχα κατὰ τὸ N , καὶ ἥχθω
 διὰ τοῦ N τῇ $\Gamma\Delta$ παράλληλος ἡ $N\Xi$. ἐκάτερον ἄρα
 τῶν $Z\Xi$, $N\Lambda$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν AH , HB . καὶ
 ἐπεὶ τῶν ἀπὸ τῶν AH , HB τετραγώνων μέσον ἀνά-

1. τὸ ἄρα βεβλήσθω φ. τὸ $\Gamma\Theta$] om. V, supra est ras.
 ΓK] ΓK τὸ $\Gamma\Theta$ V. 3. $\Gamma\Delta$] $\Gamma\Delta$ b. 4. Post HB add.
 καὶ ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν AH , HB μέσα καὶ ἴσα τῷ $\Gamma\Lambda$ V. 5.
 ῥητῇ] -τῇ in ras. P. 6. ἡ ΓM καί] m. 2 F. 8. ἐστὶ τῷ
 ΓE] τῷ ΓE ὦν φ. 9. ἐστὶ] om. P. 10. ἄρα] ἐστὶ καὶ V,
 supra add. ἄρα m. 2; ἄρα καὶ F? (καὶ φ). 12. ἐστὶν B. 14.
 ἐστὶ PBFV, comp. b. HB ῥητόν V. $Z\Lambda$] $\Gamma\Lambda$, supra scr.
 Z, b. 15. ῥητόν] om. V. ἄρα] m. 2 F. 16. πρὸς τὸ
 τῷ B, corr. m. 2. ἐστίν] om. V. 17. ἀσύμμετρος — ZM]



spatium rationale comprehen-
dentes [prop. LXXIV]. et qua-
drato AH^2 aequale rectae ΓA
adplicetur $\Gamma \Theta$ latitudinem efficiens
 ΓK , quadrato autem HB^2 aequale
 $K A$ latitudinem efficiens $K M$.

quare totum $\Gamma A = AH^2 + HB^2$. quare etiam ΓA
medium est. et rectae rationali ΓA adplicatum est
latitudinem efficiens ΓM . itaque ΓM rationalis est
et rectae ΓA longitudine incommensurabilis [prop.
XXII]. et quoniam est

$$\Gamma A = AH^2 + HB^2,$$

quorum $AB^2 = \Gamma E$, erit reliquum $2 AH \times HB = ZA$
[II, 7]. uerum $2 AH \times HB$ rationale est. itaque ZA
rationale est. et rectae rationali ZE adplicatum est
latitudinem efficiens ZM . itaque etiam ZM rationalis
est et rectae ΓA longitudine commensurabilis [prop.
XX]. quoniam igitur $AH^2 + HB^2$, hoc est ΓA , me-
dium est, et $2 AH \times HB$, hoc est ZA , rationale, ΓA
et ZA incommensurabilia sunt. est autem

$$\Gamma A : ZA = \Gamma M : ZM$$

[VI, 1]. itaque ΓM , ZM longitudine incommensura-
biles sunt [prop. XI]. et utraque rationalis est. itaque
 ΓM , MZ rationales sunt potentia tantum commen-
surabiles. ergo ΓZ apotome est [prop. LXXIII].

iam dico, eandem secundam esse. ZM enim in N
in duas partes aequales secetur, et per N rectae ΓA
parallela ducatur $N \Xi$. itaque $Z \Xi = NA = AH \times HB$.

mg. m. 2 B. 18. ἀρα] φ, post MZ hab. F. 19. ἐστὶ BVb,
comp. F. 20. οὐ ἐστὶ Vb. δευτέρω ἐστὶν B. 23. ZΞ]
Z in ras. B. 24. ἐπεὶ] ἐτι B (supra est ras.).

λογόν ἐστι τὸ ὑπὸ τῶν AH , HB , καὶ ἐστὶν ἴσον τὸ
 μὲν ἀπὸ τῆς AH τῷ $\Gamma\Theta$, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν AH , HB
 τῷ NA , τὸ δὲ ἀπὸ τῆς BH τῷ KA , καὶ τῶν $\Gamma\Theta$,
 KA ἄρα μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ NA . ἐστὶν ἄρα ὡς
 5 τὸ $\Gamma\Theta$ πρὸς τὸ NA , οὕτως τὸ NA πρὸς τὸ KA .
 ἀλλ' ὡς μὲν τὸ $\Gamma\Theta$ πρὸς τὸ NA , οὕτως ἐστὶν ἡ ΓK
 πρὸς τὴν NM , ὡς δὲ τὸ NA πρὸς τὸ KA , οὕτως
 ἐστὶν ἡ NM πρὸς τὴν MK . ὡς ἄρα ἡ ΓK πρὸς τὴν
 NM , οὕτως ἐστὶν ἡ NM πρὸς τὴν KM . τὸ ἄρα ὑπὸ
 10 τῶν ΓK , KM ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς NM , τουτέστι
 τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ZM [καὶ ἐπεὶ σύμ-
 μετρόν ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς AH τῷ ἀπὸ τῆς BH , σύμμε-
 τρόν ἐστι καὶ τὸ $\Gamma\Theta$ τῷ KA , τουτέστιν ἡ ΓK τῇ KM].
 ἐπεὶ οὖν δύο εὐθεῖαι ἄνισοί εἰσιν αἱ ΓM , MZ , καὶ
 15 τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς MZ ἴσον παρὰ τὴν
 μείζονα τὴν ΓM παραβέβληται ἐλλείπον εἶδει τετρα-
 γώνῳ τὸ ὑπὸ τῶν ΓK , KM καὶ εἰς σύμμετρα αὐτὴν
 διαιρεῖ, ἡ ἄρα ΓM τῆς MZ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ
 συμμέτρου ἑαυτῇ μήκει. καὶ ἐστὶν ἡ προσαρμόζουσα
 20 ἡ ZM σύμμετρος μήκει τῇ ἐκκειμένη φητῇ τῇ ΓA . ἡ
 ἄρα ΓZ ἀποτομή ἐστὶ δευτέρα.

Τὸ ἄρα ἀπὸ μέσης ἀποτομῆς πρώτης παρὰ φητὴν
 παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ ἀποτομὴν δευτέραν.
 ὁπερ εἶδει δεῖξαι.

25

ςθ'.

Τὸ ἀπὸ μέσης ἀποτομῆς δευτέρας παρὰ
 φητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ ἀποτομὴν
 τρίτην.

1. ἐστὶν] ἐστι V. ἴσον] supra scr. m. 1 V. 2. τῷ] in
 ras. V. 3. τῷ] τῶν mut. in τό m. 1 V. τό] τῷ P. τῷ]
 τό P V. τῶν] τῷ b. 5. τὸ NA] (alt.) mg. m. 2 F. πρὸς
 τὸ KA] τὸ NA φ. Deinde del. m. 1: ἀλλ' ὡς μὲν τὸ $\Gamma\Theta$ πρὸς

et quoniam $AH \times HB$ medium est proportionale inter AH^2 et HB^2 [prop. XXI lemma], et $AH^2 = \Gamma\Theta$, $AH \times HB = NA$, $BH^2 = KA$, etiam NA medium est proportionale inter $\Gamma\Theta$, KA . itaque erit $\Gamma\Theta : NA = NA : KA$. uerum $\Gamma\Theta : NA = \Gamma K : NM$, $NA : KA = NM : MK$ [VI, 1]. quare $\Gamma K : NM = NM : KM$. itaque $\Gamma K \times KM = NM^2$ [VI, 17], hoc est $= \frac{1}{4} ZM^2$. iam quoniam sunt duae rectae inaequales ΓM , MZ , et $\frac{1}{4} MZ^2$ aequale maiori ΓM adplicatum est spatium $\Gamma K \times KM$ figura quadrata deficiens et eam in partes commensurabiles¹⁾ diuidit, ΓM^2 excedit MZ^2 quadrato rectae sibi commensurabilis longitudine [prop. XVII]. et congruens ZM rationali propositae ΓA longitudine commensurabilis est. itaque ΓZ apotome est secunda [deff. tert. 2].

Ergo quadratum mediae apotomes primae rectae rationali adplicatum latitudinem efficit apotomen secundam; quod erat demonstrandum.

IC.

Quadratum mediae apotomes secundae rectae rationali adplicatum latitudinem efficit apotomen tertiam.

1) Nam AH^2 et BH^2 commensurabilia sunt, et
 $AH^2 : BH^2 = \Gamma\Theta : KA = \Gamma K : KM$
 [VI, 1]; tum u. prop. XI.

$\tau\acute{o}$ NA , οὕτως $\tau\acute{o}$ NA πρὸς $\tau\acute{o}$ KA V. 8. NM] N in ras. V.
 9. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\acute{\iota}\nu$] om. V. 11. $\tau\omicron\upsilon$] $\tau\tilde{\omega}$ F. $\kappa\alpha\iota$ $\acute{\epsilon}\pi\epsilon\iota$ — 13.
 KM] om. P. 12. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$] om. Fb. Post BH del. οὕτως
 m. 1 V. 13. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$] supra scr. m. 1 FV. 14. $\delta\acute{\upsilon}\omicron$ $\epsilon\upsilon\theta\epsilon\iota\alpha\iota$] supra scr. m. 1 F. $\kappa\alpha\iota$ $\tau\tilde{\omega}$] $\tau\tilde{\omega}$ $\delta\acute{\epsilon}$ BFVb. 15. $\tau\eta\varsigma$] e corr. V.
 MZ] corr. ex ZM V. 17. $\tau\acute{o}$] mut. in $\tau\tilde{\omega}$ m. 2 P. 18.
 $\tau\eta\varsigma$] corr. ex $\tau\eta$ m. rec. V. 20. Mg. γρ. ἀσύμμετρος m. 1 P.
 ΓA] ΓA μήκει φ. 22. $\pi\rho\acute{\omega}\tau\eta\varsigma$] om. P. 24. $\delta\pi\epsilon\rho$ $\acute{\epsilon}\delta\epsilon\iota$
 $\delta\epsilon\iota\chi\acute{\alpha}\iota$] : \curvearrowright P, om. BFVb.


Ἐστω μέσης ἀποτομή δευτέρα ἡ AB , φητὴ δὲ ἡ ΓA , καὶ τῷ ἀπο τῆς AB ἴσον παρὰ τὴν ΓA παραβεβλήσθω τὸ ΓE πλάτος ποιοῦν τὴν ΓZ . λέγω, ὅτι ἡ ΓZ ἀποτομή ἐστὶ τρίτη.

- Ἐστω γάρ τῇ AB προσαρμόζουσα ἡ BH . αἱ ἄρα AH , HB μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι μέσον περιέχουσαι. καὶ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς AH ἴσον παρὰ τὴν ΓA παραβεβλήσθω τὸ $\Gamma \Theta$ πλάτος ποιοῦν τὴν ΓK , τῷ δὲ ἀπὸ τῆς BH ἴσον παρὰ τὴν $K \Theta$ παραβεβλήσθω τὸ $K A$ πλάτος ποιοῦν τὴν $K M$. ὅλον ἄρα τὸ ΓA ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν AH , HB [καὶ ἐστὶ μέσα τὰ ἀπὸ τῶν AH , HB]. μέσον ἄρα καὶ τὸ ΓA . καὶ παρὰ φητὴν τὴν ΓA παραβέβληται πλάτος ποιοῦν τὴν ΓM . φητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ΓM καὶ ἀσύμμετρος τῇ ΓA μήκει. καὶ ἐπεὶ ὅλον τὸ ΓA ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν AH , HB , ὧν τὸ ΓE ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς AB , λοιπὸν ἄρα τὸ AZ ἴσον ἐστὶ τῷ δις ὑπὸ τῶν AH , HB . τετμήσθω οὖν ἡ ZM δίχα κατὰ τὸ N σημειον, καὶ τῇ ΓA παράλληλος ἦχθω ἡ $N \Xi$. ἐκότερον ἄρα τῶν $Z \Xi$, $N A$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν AH , HB . μέσον δὲ τὸ ὑπὸ τῶν AH , HB . μέσον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ $Z A$. καὶ παρὰ φητὴν τὴν EZ παράκειται πλάτος ποιοῦν τὴν ZM . φητὴ ἄρα καὶ ἡ ZM καὶ ἀσύμμετρος τῇ ΓA μήκει. καὶ ἐπεὶ αἱ AH , HB δυνάμει μόνον εἰσὶ σύμμετροι, ἀσύμμετρος ἄρα [ἐστὶ] μήκει ἡ AH τῇ HB . ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς AH τῷ ὑπὸ τῶν AH , HB . ἀλλὰ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς AH σύμμετρόν ἐστι τὰ ἀπὸ τῶν

1. μέση BV . δευτέρα] in ras. V. 4. τρίτη ἐστὶν $BFVb$. 9. $K \Theta$] corr. ex $\Gamma \Theta$ V. 10. KM] corr. ex KA m. 1 F. ΓA] corr. ex KA V. 11. καὶ — 12. HB] om. FVb , m. 2 B. 13. φητόν P. 17. AZ] corr. ex ZA V. 21.

Sit AB mediae apotome secunda, ΓA autem rationalis, et quadrato AB^2 aequale rectae ΓA adplicetur ΓE latitudinem efficiens ΓZ . dico, ΓZ apotomen tertiam esse.

nam BH rectae AB congruens sit. itaque AH, HB mediae sunt potentia tantum commensurabiles spatium



medium comprehendentes [prop. LXXV]. et quadrato AH^2 aequale rectae ΓA adplicetur $\Gamma \Theta$ latitudinem efficiens ΓK , quadrato autem BH^2 aequale rectae $K \Theta$ adplicetur KA latitudinem efficiens KM . itaque totum $\Gamma A = AH^2 + HB^2$. et $AH^2 + HB^2$ medium est. itaque etiam ΓA medium est. et rationali ΓA adplicatum est latitudinem efficiens ΓM . quare ΓM rationalis est et rectae ΓA longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. et quoniam est $\Gamma A = AH^2 + HB^2$, quorum $\Gamma E = AB^2$, erit reliquum $AZ = 2AH \times HB$ [II, 7]. iam ZM in puncto N in duas partes aequales secetur, et rectae ΓA parallela ducatur $N\Xi$. itaque $Z\Xi = NA = AH \times HB$. uerum $AH \times HB$ medium est. itaque etiam ZA medium est. et rectae rationali EZ adplicatum est latitudinem efficiens ZM . quare ZM rationalis est et rectae ΓA longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. et quoniam AH, HB potentia tantum commensurabiles sunt, AH et HB longitudine incommensurabiles sunt. quare etiam AH^2 et $AH \times HB$ incommensurabilia sunt [prop. XXI lemma, prop. XI].

ZA] corr. ex $Z\Delta$ m. rec. P, mut. in AZ V. 23. $\alpha\alpha'$] (primum) $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$ V. 25. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$] om. P. AH] H in ras. V. $\tau\eta$] om. b.

AH, HB , τῷ δὲ ὑπο τῶν AH, HB τὸ δις ὑπὸ τῶν AH, HB ἀσύμμετρα ἄρα ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν AH, HB τῷ δις ὑπὸ τῶν AH, HB . ἀλλὰ τοῖς μὲν ἀπὸ τῶν AH, HB ἴσον ἐστὶ τὸ $ΓΑ$, τῷ δὲ δις ὑπὸ τῶν AH, HB ἴσον ἐστὶ τὸ $ΖΑ$. ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ $ΓΑ$ τῷ $ΖΑ$. ὥς δὲ τὸ $ΓΑ$ πρὸς τὸ $ΖΑ$, οὕτως ἐστὶν ἡ $ΓΜ$ πρὸς τὴν $ΖΜ$. ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ $ΓΜ$ τῇ $ΖΜ$ μήκει. καὶ εἰσιν ἀμφοτέραι ρηταί· αἱ ἄρα $ΓΜ, ΜΖ$ ρηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἀποτομῇ
 10 ἄρα ἐστὶν ἡ $ΓΖ$.

Λέγω δὴ, ὅτι καὶ τρίτη.

Ἐπεὶ γὰρ σύμμετρόν ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς AH τῷ ἀπὸ τῆς HB , σύμμετρον ἄρα καὶ τὸ $ΓΘ$ τῷ $ΚΑ$. ὥστε καὶ ἡ $ΓΚ$ τῇ $ΚΜ$. καὶ ἐπεὶ τῶν ἀπὸ τῶν AH, HB
 15 μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ ὑπὸ τῶν AH, HB , καὶ ἐστὶ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς AH ἴσον τὸ $ΓΘ$, τῷ δὲ ἀπὸ τῆς HB ἴσον τὸ $ΚΑ$, τῷ δὲ ὑπὸ τῶν AH, HB ἴσον τὸ $ΝΑ$, καὶ τῶν $ΓΘ, ΚΑ$ ἄρα μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ $ΝΑ$.
 20 ἐστὶν ἄρα ὡς τὸ $ΓΘ$ πρὸς τὸ $ΝΑ$, οὕτως τὸ $ΝΑ$ πρὸς τὸ $ΚΑ$. ἀλλ' ὡς μὲν τὸ $ΓΘ$ πρὸς τὸ $ΝΑ$, οὕτως ἐστὶν ἡ $ΓΚ$ πρὸς τὴν NM , ὥς δὲ τὸ $ΝΑ$ πρὸς τὸ $ΚΑ$, οὕτως ἐστὶν ἡ NM πρὸς τὴν $ΚΜ$. ὥς ἄρα ἡ $ΓΚ$ πρὸς τὴν MN , οὕτως ἐστὶν ἡ MN πρὸς τὴν $ΚΜ$. τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν $ΓΚ, ΚΜ$ ἴσον ἐστὶ τῷ [ἀπὸ
 25 τῆς MN , τουτέστι τῷ] τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς $ΖΜ$. ἐπεὶ οὖν δύο εὐθεῖαι ἄνισοι εἰσιν αἱ $ΓΜ, ΜΖ$, καὶ τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς $ΖΜ$ ἴσον παρὰ τὴν $ΓΜ$ παραβέβληται ἐλλείπον εἶδει τετραγώνῳ καὶ εἰς

1. τό] σύμμετρόν ἐστι τό Theon (BFVb). 2. Post HB del. τὸ $ΖΑ$ V. ἀσύμμετρα — 3. HB] om. P. 2. ἀσύμμετρα — 5. $ΖΑ$] mg. m. 1 V. 2. ἄρα] om. b. ἐστὶν ἄρα V. ἀπό]

uerum AH^2 et $AH^2 + HB^2$, $AH \times HB$ et $2 AH \times HB$ incommensurabilia sunt. itaque $AH^2 + HB^2$ et $2 AH \times HB$ incommensurabilia sunt [prop. XIII]. est autem

$$\Gamma A = AH^2 + HB^2, ZA = 2 AH \times HB.$$

quare ΓA , ZA incommensurabilia sunt. est autem $\Gamma A : ZA = \Gamma M : ZM$ [VI, 1]. quare ΓM , ZM longitudine incommensurabiles sunt [prop. XI]. et utraque rationalis est. itaque ΓM , MZ rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo ΓZ apotome est [prop. LXXIII].

Iam dico, eandem tertiam esse. nam quoniam AH^2 , HB^2 commensurabilia sunt, etiam $\Gamma\Theta$, $K\Lambda$ commensurabilia sunt. quare etiam ΓK , KM commensurabiles sunt [VI, 1; prop. XI]. et quoniam $AH \times HB$ medium est proportionale inter AH^2 et HB^2 [prop. XXI lemma], et $\Gamma\Theta = AH^2$, $K\Lambda = HB^2$, $N\Lambda = AH \times HB$, etiam $N\Lambda$ medium est proportionale inter $\Gamma\Theta$, $K\Lambda$. itaque $\Gamma\Theta : N\Lambda = N\Lambda : K\Lambda$. est autem

$$\Gamma\Theta : N\Lambda = \Gamma K : NM, N\Lambda : K\Lambda = NM : KM$$

[VI, 1]. quare $\Gamma K : MN = MN : KM$. itaque [VI, 17] $\Gamma K \times KM = MN^2 = \frac{1}{4} ZM^2$. quoniam igitur duae rectae inaequales sunt ΓM , MZ , et $\frac{1}{4} ZM^2$ aequale rectae ΓM spatium adplicatum est figura quadrata deficiens et eam in partes commensurabiles diuidit,

ὁπό B. 4. ΓA] corr. ex ΓA m. rec. P. $\tau\omega$] τό V. 5. τό] (prius) mut. in $\tau\omega$ V. 7. ΓM] $H\Gamma$ b. ZM] MZ P, ΓM b. 8. Post ZM eras. $\mu\eta$ V. 9. MZ] ZM F. 12. $\sigma\upsilon\mu\mu\epsilon\tau\rho\omicron\varsigma$ P, corr. m. rec. 13. $\alpha\gamma\alpha$ ἐστὶ V. $K\Lambda$] ΓA P. 14. KM $\sigma\upsilon\mu\mu\epsilon\tau\rho\omicron\varsigma$ ἐστὶ V. $\tau\omega\upsilon$] (alt.) om. b. 15. ἐστὶ] (prius) ἐστὶν P. 17. ὁπό] ἀπό F. 20. τὸν $K\Lambda$ P. 21. NM] MN bφ. 22. $K\Lambda$] NK ? P. MN F. ὡς — 23. τὴν KM] punctis del. V. 23. MN] NM V. ἐστὶν] om. V. MN] NM V. 24. ἀπό — 25. $\tau\omega$] mg. m. 1 P.

σύμμετρα αὐτὴν διαιρεῖ, ἡ ΓM ἄρα τῆς MZ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ. καὶ οὐδετέρα τῶν ΓM , MZ σύμμετρός ἐστι μήκει τῇ ἐκκειμένῃ $\phi\eta\tau\eta$ τῇ $\Gamma\Delta$ · ἡ ἄρα ΓZ ἀποτομή ἐστὶ τρίτη.

- 5 Τὸ ἄρα ἀπὸ μέσης ἀποτομῆς δευτέρας παρὰ $\phi\eta\tau\eta\eta$ παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ ἀποτομὴν τρίτην· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

ρ'.

- Τὸ ἀπὸ ἐλάσσονος παρὰ $\phi\eta\tau\eta\eta$ παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ ἀποτομὴν τετάρτην.

Ἐστω ἐλάσσων ἡ AB , $\phi\eta\tau\eta$ δὲ ἡ $\Gamma\Delta$, καὶ τῷ ἀπὸ τῆς AB ἴσον παρὰ $\phi\eta\tau\eta\eta$ τὴν $\Gamma\Delta$ παραβεβλήσθω τὸ ΓE πλάτος ποιοῦν τὴν ΓZ · λέγω, ὅτι ἡ ΓZ ἀποτομή ἐστὶ τετάρτη.

- 15 Ἐστω γὰρ τῇ AB προσαρμόξουσα ἡ BH · αἱ ἄρα AH , HB δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AH , HB τετραγώνων $\phi\eta\tau\acute{o}\nu$, τὸ δὲ δις ὑπὸ τῶν AH , HB μέσον. καὶ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς AH ἴσον παρὰ τὴν $\Gamma\Delta$ παραβεβλήσθω
20 τὸ $\Gamma\Theta$ πλάτος ποιοῦν τὴν ΓK , τῷ δὲ ἀπὸ τῆς BH ἴσον το KA πλάτος ποιοῦν τὴν KM · ὅλον ἄρα τὸ $\Gamma\Delta$ ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν AH , HB . καὶ ἐστὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AH , HB $\phi\eta\tau\acute{o}\nu$ · $\phi\eta\tau\acute{o}\nu$ ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ $\Gamma\Delta$. καὶ παρὰ $\phi\eta\tau\eta\eta$ τὴν $\Gamma\Delta$ παρά-
25 κειται πλάτος ποιοῦν τὴν ΓM · $\phi\eta\tau\eta$ ἄρα καὶ ἡ ΓM καὶ σύμμετρος τῇ $\Gamma\Delta$ μήκει. καὶ ἐπεὶ ὅλον τὸ $\Gamma\Delta$ ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν AH , HB , ὧν τὸ ΓE ἴσον ἐστὶ

1. σύμμετρον P. MZ] ZM P. 3. μήκει] om. b. 4. ἐστὶν P. 5. τό] corr. ex τῷ m. 2 F. ἀπό] m. 2 F. παρὰ $\phi\eta\tau\eta\eta$] mg. m. 2 V. 6. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] om. BFVb, comp. P.

ΓM^2 excedit MZ^2 quadrato rectae sibi commensurabilis. et neutra rectarum ΓM , MZ rationali propositae ΓA longitudine commensurabilis est. itaque ΓZ apotome est tertia [deff. tert. 3].


Ergo quadratum mediae apotomes secundae rectae rationali adplicatum latitudinem efficit apotomen secundam; quod erat demonstrandum.

C.

Quadratum minoris rectae rationali adplicatum latitudinem efficit apotomen quartam.

Sit AB minor, ΓA autem rationalis, et quadrato AB^2 aequale rationali ΓA adplicetur ΓE latitudinem efficiens ΓZ . dico, ΓZ apotomen quartam esse.

nam BH rectae AB congruens sit. itaque AH , HB potentia incommensurabiles sunt efficientes $AH^2 + HB^2$



rationale, $2AH < HB$ autem medium [prop. LXXVI]. et quadrato AH^2 aequale rectae ΓA adplicetur $\Gamma \Theta$ latitudinem efficiens ΓK , et $KA = BH^2$ latitudinem efficiens KM . itaque totum

$\Gamma A = AH^2 + HB^2$. et $AH^2 + HB^2$ rationale est. quare etiam ΓA rationale est. et rationali ΓA adplicatum est latitudinem efficiens ΓM . itaque ΓM rationalis est et rectae ΓA longitudine commensurabilis [prop. XX]. et quoniam totum $\Gamma A = AH^2 + HB^2$,

11. ἐλάσσων] ἐ- in ras. m. 1 P. 14. ἔσιν P. τετάρτη
ἔσιν V. 15. γὰρ] m. 2 F. 16. HB] supra scr. m. 1 P.
19. μὲν] om. V. 21. KM] ΓK b. 25. καί] om. Fb,
ἔσιν V.

τῷ ἀπὸ τῆς AB , λοιπὸν ἄρα τὸ ZA ἴσον ἐστὶ τῷ δις ὑπὸ τῶν AH, HB . τετμήσθω οὖν ἡ ZM δίχα κατὰ τὸ N σημείον, καὶ ἤχθω διὰ τοῦ N ὀποτέρᾳ τῶν GA, MA παράλληλος ἡ $NΞ$. ἐκάτερον ἄρα τῶν $ZΞ, NA$
 5 ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν AH, HB . καὶ ἐπεὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν AH, HB μέσον ἐστὶ καὶ ἐστὶν ἴσον τῷ ZA , καὶ τὸ ZA ἄρα μέσον ἐστίν. καὶ παρὰ ρητὴν τὴν ZE παράκειται πλάτος ποιοῦν τὴν ZM . ρητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ZM καὶ ἀσύμμετρος τῇ GA μήκει. καὶ ἐπεὶ το μὲν
 10 συγκαίμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AH, HB ρητόν ἐστίν, τὸ δὲ δις ὑπὸ τῶν AH, HB μέσον, ἀσύμμετρον [ἄρα] ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν AH, HB τῷ δις ὑπὸ τῶν AH, HB . ἴσον δέ [ἐστὶ] τὸ GA τοῖς ἀπὸ τῶν AH, HB , τῷ δὲ δις ὑπὸ τῶν AH, HB ἴσον τὸ ZA . ἀσύμμετρον ἄρα
 15 [ἐστὶ] τὸ GA τῷ ZA . ὥς δὲ τὸ GA πρὸς τὸ ZA , οὕτως ἐστὶν ἡ GM πρὸς τὴν MZ . ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ GM τῇ MZ μήκει. καὶ εἰσὶν ἀμφοτέραι ρηταί· αἱ ἄρα GM, MZ ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἀποτομὴ ἄρα ἐστὶν ἡ GZ .

20 Λέγω [δή], ὅτι καὶ τετάρτη.

Ἐπεὶ γὰρ αἱ AH, HB δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι, ἀσύμμετρον ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς AH τῷ ἀπὸ τῆς HB . καὶ ἐστὶ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς AH ἴσον τὸ $ΓΘ$, τῷ δὲ ἀπὸ τῆς HB ἴσον τὸ $ΚΑ$. ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ $ΓΘ$ τῷ
 25 $ΚΑ$. ὥς δὲ τὸ $ΓΘ$ πρὸς τὸ $ΚΑ$, οὕτως ἐστὶν ἡ $ΓΚ$ πρὸς τὴν $ΚΜ$. ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ $ΓΚ$ τῇ $ΚΜ$ μήκει. καὶ ἐπεὶ τῶν ἀπὸ τῶν AH, HB μέσον ἀνάλογόν ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν AH, HB , καὶ ἐστὶν ἴσον τὸ μὲν ἀπὸ τῆς AH τῷ $ΓΘ$, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς HB τῷ $ΚΑ$,

1. τῷ] (alt.) τῶν P. 2. οὖν] οὖν καὶ P. 3. τοῦ N σημείου V. 5. τῶν] om. P. 6. τῷ] corr. ex τό m. 1 B.

quorum $GE = AB^2$, erit reliquum $ZA = 2AH \times HB$ [II, 7]. iam ZM in puncto N in duas partes aequales secetur, et per N utrique GA , MA parallela ducatur NZ . itaque $ZN = NA = AH \times HB$. et quoniam $2AH \times HB$ medium est et $2AH \times HB = ZA$, etiam ZA medium est. et rectae rationali ZE adplicatum est latitudinem efficiens ZM . itaque ZM rationalis est et rectae GA longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. et quoniam $AH^2 + HB^2$ rationale est, $2AH \times HB$ autem medium, $AH^2 + HB^2$ et $2AH \times HB$ incommensurabilia sunt. uerum $GA = AH^2 + HB^2$ et $ZA = 2AH \times HB$. quare GA , ZA incommensurabilia sunt. est autem $GA:ZA = GM:MZ$ [VI, 1]. quare GM , MZ longitudine incommensurabiles sunt [prop. XI]. et utraque rationalis est. itaque GM , MZ rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo GZ apotome est [prop. LXXIII].

Iam dico, eandem quartam esse. nam quoniam AH , HB potentia incommensurabiles sunt, etiam AH^2 et HB^2 incommensurabilia sunt. et $GA = AH^2$, $KA = HB^2$. quare GA , KA incommensurabilia sunt. uerum $GA:KA = GK:KM$ [VI, 1]. itaque GK , KM longitudine incommensurabiles sunt [prop. XI]. et

7. ἐστὶ PBV, comp. Fb. 10. ἐστὶ PBV, comp. Fb. 11. ἄρα] om. P. 13. δ' b. ἐστὶ] om. P. 14. τό] corr. ex τῷ m. 1 F. 15. ἐστὶ] om. P. τό] in ras. m. 1 P. Supra GA τῷ ras. est in V. GA] ZA P. ZA] GA P. 16. πρὸς τῇν] τῇ P. ZM F. ἀσύμμετρος — 17. MZ] om. P. 20. δῆ] om. FVb, m. 2 B. 22. ἄρα] ἐστὶ V. HB] corr. ex BH m. 2 V. 23. τό] corr. ex τῷ m. 1 F. 26. $ΓΚ$] $ΚΓ$ P. 27. μῆκει] mg. m. 2 V. 28. τό] (alt.) τῷ PV. 29. μέν] om. V. τῷ] τό P et V, corr. m. 1. τό] τῷ P. τῷ] τό P. Supra KA add. N m. 1 b.

τὸ δὲ ὑπὸ τῶν AH , HB τῷ NA , τῶν ἄρα $\Gamma\Theta$, KA
μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ NA . ἔστιν ἄρα ὡς τὸ $\Gamma\Theta$
πρὸς τὸ NA , οὕτως τὸ NA πρὸς τὸ KA . ἀλλ' ὡς
μὲν τὸ $\Gamma\Theta$ πρὸς τὸ NA , οὕτως ἐστὶν ἡ ΓK πρὸς τὴν
5 NM , ὡς δὲ τὸ NA πρὸς τὸ KA , οὕτως ἐστὶν ἡ NM
πρὸς τὴν KM . ὡς ἄρα ἡ ΓK πρὸς τὴν MN , οὕτως
ἐστὶν ἡ MN πρὸς τὴν KM . τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΓK ,
 KM ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς MN , τουτέστι τῷ τετάρτῳ
μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ZM . ἐπεὶ οὖν δύο εὐθεῖαι ἄνισοί
10 εἰσιν αἱ ΓM , MZ , καὶ τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς
 MZ ἴσον παρὰ τὴν ΓM παραβέβληται ἐλλείπον εἶδει
τετραγώνῳ τὸ ὑπὸ τῶν ΓK , KM καὶ εἰς ἀσύμμετρα
αὐτὴν διαιρεῖ, ἡ ἄρα ΓM τῆς MZ μείζον δύνανται τῷ
ἀπὸ ἀσύμμετρου ἑαυτῇ. καὶ ἐστὶν ὅλη ἡ ΓM σύμ-
15 μετρος μήκει τῇ ἐκκειμένη φητῇ τῇ ΓA . ἡ ἄρα ΓZ
ἀποτομή ἐστὶ τετάρτη.

Τὸ ἄρα ἀπὸ ἐλάσσονος καὶ τὰ ἐξῆς.

ρα'.

Τὸ ἀπὸ τῆς μετὰ φητοῦ μέσον τὸ ὅλον
20 ποιούσης παρὰ φητὴν παραβαλλόμενον πλάτος
ποιεῖ ἀποτομὴν πέμπτην.

Ἔστω ἡ μετὰ φητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιούσα ἡ AB ,
φητὴ δὲ ἡ ΓA , καὶ τῷ ἀπὸ τῆς AB ἴσον παρὰ τὴν
 ΓA παραβεβλήσθω τὸ ΓE πλάτος ποιῶν τὴν ΓZ .
25 λέγω, ὅτι ἡ ΓZ ἀποτομή ἐστὶ πέμπτη.

Ἔστω γὰρ τῇ AB προσαρμόζουσα ἡ BH . αἱ ἄρα

1. ὑπό] corr. ex ἀπό V. τῶν] (alt.) τῷ b. 3. NA] AN F. οὕτως — 4. NA] mg. m. 2 B. 3. KA] KA' F.
4. μέν] om. V. ἐστὶν] m. 2 F. 6. ὡς] καὶ ὡς b, mg. V.
ἄρα — 7. τὴν KM] mg. V. 6. τήν] (alt.) τό φ. 8. NM P.

quoniam $AH \times HB$ inter AH^2 , HB^2 medium est proportionale [prop. XXI lemma], et $AH^2 = \Gamma\Theta$, $HB^2 = KA$, $AH \times HB = NA$, inter $\Gamma\Theta$, KA medium proportionale est NA . itaque $\Gamma\Theta : NA = NA : KA$. uerum $\Gamma\Theta : NA = \Gamma K : NM$, $NA : KA = NM : KM$ [VI, 1]. itaque $\Gamma K : MN = MN : KM$. quare $\Gamma K \times KM = MN^2$ [VI, 17] = $\frac{1}{4} ZM^2$. iam quoniam sunt duae rectae inaequales ΓM , MZ , et $\frac{1}{4} MZ^2$ aequale rectae ΓM adplicatum est $\Gamma K \times KM$ figura quadrata deficiens et eam in partes incommensurabiles diuidit, ΓM^2 excedit MZ^2 quadrato rectae sibi incommensurabilis [prop. XVIII]. et tota ΓM rationali propositae ΓA commensurabilis est longitudine. itaque ΓZ apotome est quarta [deff. tert. 4].

Ergo quadratum minoris, et quae sequuntur.

CI.

Quadratum rectae cum rationali totum medium efficientis rectae rationali adplicatum latitudinem efficit apotomen quintam.

Sit AB recta cum rationali totum medium efficiens, ΓA autem rationalis, et quadrato AB^2 aequale rectae ΓA adplicetur ΓE latitudinem efficiens ΓZ . dico, ΓZ apotomen quintam esse.


nam BH rectae AB congruens sit. itaque rectae

10. καὶ τῷ] τῷ δέ F V. τοῦ] m. 2 F. 12. τό] τῷ b. 14. συμμέτρον Pb et V, sed corr. ἐστίν] om. V φ. 15. μήκει] ἐστὶ V. 17. καὶ τὰ ἐξῆς] παρὰ φητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ ἀποτομήν τετάρτην Theon (BFVb). 22. ἡ] (prius) om. V. 23. φητὴ — AB] mg. m. 1 P. τῷ] e corr. P. 24. ΓΔ] ΔΓ F. ΓΖ] corr. ex ΓΔ P. 25. ΓΖ] ΖΓ e corr. V, ΑΓ φ. 26. γὰρ] m. 2 F.

AH, HB εὐθεῖαι δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι
 τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων
 μέσον, τὸ δὲ δις ὑπ' αὐτῶν ρητόν. καὶ τῷ μὲν ἀπὸ
 τῆς AH ἴσον παρὰ τὴν $ΓΔ$ παραβελήσθω τὸ $ΓΘ$,
 5 τῷ δὲ ἀπὸ τῆς HB ἴσον τὸ $ΚΑ$. ὅλον ἄρα τὸ $ΓΑ$
 ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν AH, HB . τὸ δὲ συγκείμενον
 ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AH, HB ἅμα μέσον ἐστίν· μέσον
 ἄρα ἐστὶ τὸ $ΓΑ$. καὶ παρὰ ρητὴν τὴν $ΓΔ$ παράκειται
 πλάτος ποιοῦν τὴν $ΓΜ$. ρητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ $ΓΜ$ καὶ
 10 ἀσύμμετρος τῇ $ΓΔ$. καὶ ἐπεὶ ὅλον τὸ $ΓΑ$ ἴσον ἐστὶ
 τοῖς ἀπὸ τῶν AH, HB , ὧν τὸ $ΓΕ$ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ
 τῆς AB , λοιπὸν ἄρα τὸ $ΖΑ$ ἴσον ἐστὶ τῷ δις ὑπὸ
 τῶν AH, HB . τετμήσθω οὖν ἡ ZM δίχα κατὰ τὸ N ,
 καὶ ἡχθῶ διὰ τοῦ N ὁποτέρᾳ τῶν $ΓΔ, ΜΑ$ παράλ-
 15 ληλος ἡ $NΞ$. ἐκάτερον ἄρα τῶν $ZΞ, ΝΑ$ ἴσον ἐστὶ
 τῷ ὑπὸ τῶν AH, HB . καὶ ἐπεὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν $AH,$
 HB ρητόν ἐστι καὶ [ἐστίν] ἴσον τῷ $ΖΑ$, ρητόν ἄρα
 ἐστὶ τὸ $ΖΑ$. καὶ παρὰ ρητὴν τὴν EZ παράκειται
 πλάτος ποιοῦν τὴν ZM . ρητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ZM καὶ
 20 σύμμετρος τῇ $ΓΔ$ μήκει. καὶ ἐπεὶ τὸ μὲν $ΓΑ$ μέσον
 ἐστίν, τὸ δὲ $ΖΑ$ ρητόν, ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ $ΓΑ$
 τῷ $ΖΑ$. ὥς δὲ τὸ $ΓΑ$ πρὸς τὸ $ΖΑ$, οὕτως ἡ $ΓΜ$
 πρὸς τὴν MZ . ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ $ΓΜ$ τῇ MZ
 μήκει. καὶ εἰσιν ἀμφοτέραι ρηταί· αἱ ἄρα $ΓΜ, ΜΖ$
 25 ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἀποτομή ἄρα
 ἐστὶν ἡ $ΓΖ$.

3. μέν] om. V. 5. Post δέ ras. 2 litt. V. HB] mut.
 in AB m. 2 F, in ras. V. ΓΑ] A in ras. m. 1 P, corr. ex
 A B. 6. τὸ δέ — 7. ἀπὸ τῶν] τὰ δὲ ἀπὸ τῆς V. 7. ἐστίν]
 ἐστὶ PB, comp. FV; εἶναι V, supra scr. ἐστὶ m. 1. 8. ΓΑ]
 mut. in ΑΓ m. 1 F. 9. ΓΜ] ΓΗ φ. ρητὴ] ρη- om. φ.
 11. ΓΕ] ΒΑ B. 13. οὖν] om. V φ. 14. καὶ — Ν] supra

AH , HB potentia incommensurabiles sunt efficientes summam quadratorum mediam, duplum autem rectan-



gulum rationale [prop. LXXVII]. et rectae ΓA adplicetur $\Gamma\Theta = AH^2$, $K\Lambda = HB^2$. itaque totum

$$\Gamma A = AH^2 + HB^2.$$

uerum $AH^2 + HB^2$ medium est; itaque etiam ΓA medium est. et

rationali ΓA adplicatum est latitudinem efficiens ΓM . itaque ΓM rationalis est et rectae ΓA incommensurabilis [prop. XXII]. et quoniam $\Gamma A = AH^2 + HB^2$, quorum $\Gamma E = AB^2$, erit reliquum $Z\Lambda = 2AH \times HB$ [II, 7]. iam ZM in N in duas partes aequales secetur, et per N utrique ΓA , $M\Lambda$ parallela ducatur $NΞ$. quare $ZΞ = N\Lambda = AH \times HB$. et quoniam $2AH \times HB$ rationale est, et $2AH \times HB = Z\Lambda$, $Z\Lambda$ rationale est. et rationali EZ adplicatum est latitudinem efficiens ZM . itaque ZM rationalis est et rectae ΓA longitudine commensurabilis [prop. XX]. et quoniam ΓA medium est, $Z\Lambda$ autem rationale, ΓA et $Z\Lambda$ incommensurabilia sunt. est autem $\Gamma A : Z\Lambda = \Gamma M : MZ$ [VI, 1]. quare ΓM , MZ longitudine incommensurabiles sunt [prop. XI]. et utraque rationalis est. itaque ΓM , MZ rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo ΓZ apotome est [prop. LXXIII].

scr. m. 1 P. 17. $\xi\sigma\tau\iota\nu$] om. P. $Z\Lambda$] Z (uel Ξ) corr. ex N V, item lin. 18. 18. EZ] e corr. m. 1 V. 19. ZM] (alt.) ZH b. 20. $\acute{\alpha}\sigma\acute{\upsilon}\mu\mu\epsilon\tau\epsilon\omicron\varsigma$ B, supra σ ras. est in V. ΓA] corr. ex ΓZ b; ΓZ V, Z eras. 21. $\xi\sigma\tau\iota\nu$] $\xi\sigma\tau\iota$ PBFV, comp. b. 23. $\tau\eta\nu$] $\tau\acute{o}$ V. $\xi\sigma\tau\iota\nu$] $\xi\sigma\tau\iota$ καὶ Vφ. 24. ΓM , MZ $\acute{\alpha}\rho\alpha$ V.

Λέγω δὴ, ὅτι καὶ πέμπτη.

Ὅμοίως γὰρ δεῖξομεν, ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν $\Gamma K M$ ἴσον
 ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς $N M$, τουτέστι τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ
 ἀπὸ τῆς $Z M$. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρόν ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς
 5 $A H$ τῷ ἀπὸ τῆς $H B$, ἴσον δὲ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς $A H$
 τῷ $\Gamma \Theta$, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς $H B$ τῷ $K \Lambda$, ἀσύμμετρον ἄρα
 το $\Gamma \Theta$ τῷ $K \Lambda$. ὥς δὲ τὸ $\Gamma \Theta$ πρὸς τὸ $K \Lambda$, οὕτως ἡ
 ΓK πρὸς τὴν $K M$. ἀσύμμετρος ἄρα ἡ ΓK τῇ $K M$
 μήκει. ἐπεὶ οὖν δύο εὐθεῖαι ἄνισοί εἰσιν αἱ ΓM , $M Z$,
 10 καὶ τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς $Z M$ ἴσον παρὰ τὴν
 ΓM παραβέβληται ἐλλείπον εἶδει τετραγώνῳ καὶ εἰς
 ἀσύμμετρα αὐτὴν διαιρεῖ, ἡ ἄρα ΓM τῆς $M Z$ μείζον
 δύνανται τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἐαυτῇ. καὶ ἐστὶν ἡ προσ-
 αρμοζούσα ἡ $Z M$ σύμμετρος τῇ ἑκκειμένην φητῇ τῇ $\Gamma \Lambda$.
 15 ἡ ἄρα ΓZ ἀποτομή ἐστὶ πέμπτη· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

ρβ'.

Τὸ ἀπὸ τῆς μετὰ μέσου μέσον τὸ ὅλον
 ποιούσης παρὰ φητὴν παραβαλλόμενον πλάτος
 ποιεῖ ἀποτομὴν ἕκτην.

20 Ἔστω ἡ μετὰ μέσου μέσον τὸ ὅλον ποιούσα ἡ $A B$,
 φητὴ δὲ ἡ $\Gamma \Lambda$, καὶ τῷ ἀπὸ τῆς $A B$ ἴσον παρὰ τὴν
 $\Gamma \Lambda$ παραβεβλήσθω τὸ ΓE πλάτος ποιῶν τὴν ΓZ .
 λέγω, ὅτι ἡ ΓZ ἀποτομή ἐστὶν ἕκτη.

Ἔστω γὰρ τῇ $A B$ προσαρμοζούσα ἡ $B H$. αἱ ἄρα
 25 $A H$, $H B$ δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιῶσαι τὸ τε
 συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων μέσον καὶ

1. δῆ] m. 2 F. 2. ΓK , $K M$ FV. 4. ἐστὶ] om. V φ. 5.
 $A H$] (alt.) A e corr. F. 6. $\Gamma \Theta$] Θ in ras. m. 1 P. 8. τήν]
 om. P. $K M$] ΓM P et B in ras. ἄρα ἐστὶν V φ. $K M$]
 ΓM P et in ras. B. 9. εἰσι P, corr. m. 1. 10. $Z M$] $M Z$

Iam dico, eandem quintam esse. nam similiter demonstrabimus, esse $\Gamma K \times KM = NM^2 = \frac{1}{4} ZM^2$. et quoniam AH^2 , HB^2 incommensurabilia sunt, et $AH^2 = \Gamma\Theta$, $HB^2 = KA$, $\Gamma\Theta$ et KA incommensurabilia sunt. est autem $\Gamma\Theta:KA = \Gamma K:KM$ [VI, 1]. quare ΓK , KM longitudine incommensurabiles sunt [prop. XI]. iam quoniam sunt duae rectae inaequales ΓM , MZ , et $\frac{1}{4} ZM^2$ aequale rectae ΓM adplicatum est spatium figura quadrata deficiens et eam in partes incommensurabiles diuidit, ΓM^2 excedit MZ^2 quadrato rectae sibi incommensurabilis [prop. XVIII]. et congruens ZM rationali propositae ΓA commensurabilis est.

Ergo ΓZ apotome est quinta [deff. tert. 5]; quod erat demonstrandum.

CII.

Quadratum rectae cum medio totum medium efficientis rectae rationali adplicatum latitudinem efficit apotomen sextam.

Sit AB recta cum medio totum medium efficiens, ΓA autem rationalis, et quadrato AB^2 aequale rectae ΓA adplicetur ΓE latitudinem efficiens ΓZ . dico, ΓZ apotomen sextam esse.

nam BH rectae AB congruens sit. itaque AH , HB potentia incommensurabiles sunt efficientes sum-


P, et V (?), sed corr. m. 1. 13. $\epsilon\alpha\nu\tau\eta\ \mu\eta\chi\epsilon\iota$ V. 14. ZM MZ P. 15. $\delta\pi\epsilon\rho\ \epsilon\delta\epsilon\iota\ \delta\epsilon\iota\chi\epsilon\iota$] om. BFVb. In hac pag. et sequenti multi loci euan. in F. 21. $\pi\alpha\rho\alpha\]\ \pi\alpha\rho\alpha\ \phi\eta\tau\eta\nu$ Vφ. $\tau\eta\nu$] supra scr. m. 1 V. 22. $\tau\eta\nu$] $\tau\eta$ b. 24. $\alpha\rho\mu\acute{o}\zeta\omicron\nu\sigma\alpha$, supra scr. $\pi\rho\omicron\sigma$ m. 1, F. HB P. 25. Post HB ras. 5 litt. V. Supra $\tau\epsilon$ scr. $\mu\acute{\epsilon}\nu$ m. 1 b.

- τὸ δις ὑπὸ τῶν AH , HB μέσον καὶ ἀσύμμετρον τα
ἀπὸ τῶν AH , HB τῷ δις ὑπὸ τῶν AH , HB . παρα-
βεβλήσθω οὖν παρὰ τὴν $ΓΔ$ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς AH
ἴσον τὸ $ΓΘ$ πλάτος ποιοῦν τὴν $ΓΚ$, τῷ δὲ ἀπὸ τῆς
5 BH τὸ $ΚΑ'$ ὅλον ἄρα τὸ $ΓΑ$ ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν
 AH , HB · μέσον ἄρα [ἐστὶ] καὶ τὸ $ΓΑ$. καὶ παρὰ
φητὴν τὴν $ΓΔ$ παράκειται πλάτος ποιοῦν τὴν $ΓΜ$.
φητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ $ΓΜ$ καὶ ἀσύμμετρος τῇ $ΓΔ$ μήκει.
ἐπεὶ οὖν τὸ $ΓΑ$ ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν AH , HB ,
10 ὧν τὸ $ΓΕ$ ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς AB , λοιπὸν ἄρα τὸ $ΖΑ$
ἴσον ἐστὶ τῷ δις ὑπὸ τῶν AH , HB . καὶ ἐστὶ τὸ δις
ὑπὸ τῶν AH , HB μέσον· καὶ τὸ $ΖΑ$ ἄρα μέσον ἐστίν.
καὶ παρὰ φητὴν τὴν $ΖΕ$ παράκειται πλάτος ποιοῦν
τὴν $ΖΜ$. φητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ $ΖΜ$ καὶ ἀσύμμετρος τῇ
15 $ΓΔ$ μήκει. καὶ ἐπεὶ τὰ ἀπὸ τῶν AH , HB ἀσύμμετρά
ἐστὶ τῷ δις ὑπὸ τῶν AH , HB , καὶ ἐστὶ τοῖς μὲν ἀπὸ
τῶν AH , HB ἴσον τὸ $ΓΑ$, τῷ δὲ δις ὑπὸ τῶν AH ,
 HB ἴσον τὸ $ΖΑ$, ἀσύμμετρον ἄρα [ἐστὶ] τὸ $ΓΑ$ τῷ
 $ΖΑ$. ὥς δὲ τὸ $ΓΑ$ πρὸς τὸ $ΖΑ$, οὕτως ἐστὶν ἡ $ΓΜ$
20 πρὸς τὴν $ΜΖ$ · ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ $ΓΜ$ τῇ $ΜΖ$
μήκει. καὶ εἰσιν ἀμφοτέραι φηταί. αὖ $ΓΜ$, $ΜΖ$ ἄρα
φηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἀποτομὴ ἄρα
ἐστὶν ἡ $ΓΖ$.

Λέγω δὴ, ὅτι καὶ ἔκτε.

- 25 Ἐπεὶ γὰρ τὸ $ΖΑ$ ἴσον ἐστὶ τῷ δις ὑπὸ τῶν AH ,
 HB , τετμήσθω δίχα ἡ $ΖΜ$ κατὰ τὸ N , καὶ ἤχθω διὰ
τοῦ N τῇ $ΓΔ$ παράλληλος ἡ $NΞ$ · ἐκότερον ἄρα τῶν

1. μέσον] φητόν F. καί] καὶ ξι V, ξι δὲ BFb. ἀσύμ-
μετρα BFVb. τὰ] τό P. 5. Post $ΚΑ$ add. πλάτος ποιοῦν
τὴν KM mg. m. 2 V. 6. ἐστὶ] om. P. 8. ἐστίν] ἐστὶ καὶ V.
10. ἴσον ἐστὶ Vφ. τῷ] τό φ. 11. ἐστὶ] γίνεται V. δὲ]
corr. ex δι' m. 2 P. 12. ἐστὶ PBV, comp. Fb. 16. τοῖς]



mam quadratorum mediam et
 $2AH \times HB$ medium et $AH^2 + HB^2$,
 $2AH \times HB$ incommensurabilia
 [prop. LXXVIII]. iam rectae ΓA
 adplicetur $\Gamma\Theta = AH^2$ latitudi-
 dinem efficiens ΓK et $KA = BH^2$. itaque totum
 $\Gamma A = AH^2 + HB^2$. quare etiam ΓA medium est.
 et rationali ΓA adplicatum est latitudinem efficiens
 ΓM . itaque ΓM rationalis est et rectae ΓA longi-
 tudine incommensurabilis [prop. XXII]. iam quoniam
 $\Gamma A = AH^2 + HB^2$, quorum $\Gamma E = AB^2$, erit reliquum
 $ZA = 2AH \times HB$ [II, 7]. et $2AH \times HB$ medium
 est. quare etiam ZA medium est. et rationali ZE
 adplicatum est latitudinem efficiens ZM . quare ZM
 rationalis est et rectae ΓA longitudine incommensu-
 rabilis [prop. XXII]. et quoniam $AH^2 + HB^2$,
 $2AH \times HB$ incommensurabilia sunt, et

$\Gamma A = AH^2 + HB^2$, $ZA = 2AH \times HB$,
 ΓA et ZA incommensurabilia sunt. est autem [VI, 1]
 $\Gamma A : ZA = \Gamma M : MZ$. quare ΓM , MZ longitudine
 incommensurabiles sunt [prop. XI]. et utraque ratio-
 nalis est. itaque ΓM , MZ rationales sunt potentia
 tantum commensurabiles. ergo ΓZ apotome est [prop.
 LXXIII].

Iam dico, eandem sextam esse. nam quoniam est
 $ZA = 2AH \times HB$, recta ZM in N in duas partes
 aequales secetur, et per N rectae ΓA parallela du-

τῷ V. ἀπὸ τῶν] om. P. 17. ΓA — 18. ἴσον τό] om. b.
 18. ἐστὶ] om. P. 19. τό] (alt.) om. P. ZA] corr. ex
 ZA ? F. 20. τῇν] om. P. MZ] in ras. V. MZ] corr.
 ex ZM V. 21. ἀρὰ] om. V. 22. εἰσιν P. εἰσιν ἀρὰ B.

$Z\Xi$, NA ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν AH , HB . καὶ ἐπεὶ
 αἱ AH , HB δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι, ἀσύμμετρον
 ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς AH τῷ ἀπὸ τῆς HB . ἀλλὰ τῷ
 μὲν ἀπὸ τῆς AH ἴσον ἐστὶ τὸ $\Gamma\Theta$, τῷ δὲ ἀπὸ
 5 τῆς HB ἴσον ἐστὶ τὸ KA . ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ
 $\Gamma\Theta$ τῷ KA . ὥς δὲ τὸ $\Gamma\Theta$ πρὸς τὸ KA , οὕτως ἐστὶν
 ἡ ΓK πρὸς τὴν KM . ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ ΓK
 τῇ KM . καὶ ἐπεὶ τῶν ἀπὸ τῶν AH , HB μέσον ἀνά-
 λογόν ἐστι τὸ ὑπὸ τῶν AH , HB , καὶ ἐστὶ τῷ μὲν ἀπὸ
 10 τῆς AH ἴσον τὸ $\Gamma\Theta$, τῷ δὲ ἀπὸ τῆς HB ἴσον τὸ KA ,
 τῷ δὲ ὑπὸ τῶν AH , HB ἴσον τὸ NA , καὶ τῶν ἄρα
 $\Gamma\Theta$, KA μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ NA . ἔστιν ἄρα ὡς
 τὸ $\Gamma\Theta$ πρὸς τὸ NA , οὕτως τὸ NA πρὸς τὸ KA . καὶ
 διὰ τὰ αὐτὰ ἡ GM τῆς MZ μείζον δύνανται τῷ ἀπὸ
 15 ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ. καὶ οὐδετέρα αὐτῶν σύμμετρος
 ἐστὶ τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ τῇ ΓA . ἡ ΓZ ἄρα ἀποτομή
 ἐστὶν ἕκτη. ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

φγ'.

Ἡ τῇ ἀποτομῇ μήκει σύμμετρος ἀποτομή
 20 ἐστὶ καὶ τῇ τάξει ἡ αὐτή.

Ἐστω ἀποτομή ἡ AB , καὶ τῇ AB μήκει σύμμετρος
 ἔστω ἡ ΓA . λέγω, ὅτι καὶ ἡ ΓA ἀποτομή ἐστὶ καὶ
 τῇ τάξει ἡ αὐτὴ τῇ AB .

Ἐπεὶ γὰρ ἀποτομή ἐστὶν ἡ AB , ἔστω αὐτῇ προσ-

2. εἰσὶ σύμμετροι b. 4. τὸ ἀπὸ τῆς $\Gamma\Theta$ P. 5. ἐστὶ]
 om. V. 6. τῷ] corr. ex τό m. 2 P. 8. ἀπὸ τῶν] om. P;
 ὑπὸ τῶν supra scr. α m. 1 b; ὑπὸ τῶν ins. m. 2 F. 11. τῷ
 δὲ ὑπὸ — NA] mg. m. 2 V. τῷ] τό V. AH] H e corr. V.
 ἴσον ἐστὶ P. 12. NA] N b. 13. NA] (prius) A , supra
 add. N m. 2, F. 14. τὰ αὐτὰ] corr. ex ταῦτα V. MZ]
 corr. ex ZM V. 15. ἀσυμμέτρου] corr. ex σύμμετρον m. 2 B.

catur $N\Xi$. itaque $Z\Xi = NA = AH \times HB$. et quoniam AH , HB potentia incommensurabiles sunt, AH^2 et HB^2 incommensurabilia sunt. est autem $\Gamma\Theta = AH^2$, $KA = HB^2$. quare $\Gamma\Theta$, KA incommensurabilia sunt. est autem $\Gamma\Theta : KA = \Gamma K : KM$ [VI, 1]. itaque ΓK , KM incommensurabiles sunt [prop. XI]. et quoniam $AH \times HB$ medium est proportionale inter AH^2 et HB^2 [prop. XXI lemma], et $\Gamma\Theta = AH^2$, $KA = HB^2$, $NA = AH \times HB$, etiam NA medium est proportionale inter $\Gamma\Theta$, KA . itaque $\Gamma\Theta : NA = NA : KA$. et eadem de causa [cfr. p. 326, 9 sq.] ΓM^2 excedit MZ^2 quadrato rectae sibi incommensurabilis [prop. XVIII]. et neutra earum rationali propositae ΓA commensurabilis est.


Ergo ΓZ apotome est sexta [deff. tert. 6]; quod erat demonstrandum.¹⁾

CIII.

Recta apotomae longitudine commensurabilis apotome est et ordine eadem.

Sit AB apotome, et rectae AB longitudine commensurabilis sit ΓA . dico, ΓA quoque apotomen esse et ordine eandem ac AB .

nam quoniam AB apotome est, BE ei congruens

1) In B figura haec est . deinde in mg. adiicitur uera addito $\epsilon\upsilon \alpha\lambda\lambda\omega$.

16. ΓA] Δ in ras. m. 1 F. 17. $\tilde{\upsilon}\pi\epsilon\rho \xi\delta\epsilon\iota \delta\epsilon\lambda\epsilon\alpha\iota$] comp. P, om. BFVb. 21. $\sigma\acute{\upsilon}\mu\mu\epsilon\tau\rho\omicron\varsigma \xi\sigma\tau\omega \mu\acute{\eta}\kappa\epsilon\iota$ BFb. 23. $\acute{\eta}$] m. 2 P. 24. $\pi\rho\omicron\sigma\alpha\phi\acute{\omicron}\xi\omicron\nu\sigma\alpha \xi\sigma\tau\omega \alpha\acute{\upsilon}\tau\eta\tilde{\eta}$ V. $\alpha\acute{\upsilon}\tau\eta\tilde{\eta} \eta$ Fb.


αρμόζουσα ἡ BE . αἱ AE , EB ἄρα φηταί εἰσι δυνάμει
μόνον σύμμετροι. καὶ τῷ τῆς AB πρὸς τὴν $\Gamma\Delta$ λόγῳ
ὁ αὐτὸς γερονέτω ὁ τῆς BE πρὸς τὴν ΔZ . καὶ ὡς
ἐν ἄρα πρὸς ἕν, πάντα [ἐστὶ] πρὸς πάντα· ἐστὶν ἄρα
5 καὶ ὡς ὅλη ἡ AE πρὸς ὅλην τὴν ΓZ , οὕτως ἡ AB
πρὸς τὴν $\Gamma\Delta$. σύμμετρος δὲ ἡ AB τῇ $\Gamma\Delta$ μήκει·
σύμμετρος ἄρα καὶ ἡ AE μὲν τῇ ΓZ , ἡ δὲ BE τῇ
 ΔZ . καὶ αἱ AE , EB φηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμ-
μετροι· καὶ αἱ ΓZ , $Z\Delta$ ἄρα φηταί εἰσι δυνάμει μόνον
10 σύμμετροι [ἀποτομή ἄρα ἐστὶν ἡ $\Gamma\Delta$].

Λέγω δὴ, ὅτι καὶ τῇ τάξει ἡ αὐτὴ τῇ AB].

Ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ἡ AE πρὸς τὴν ΓZ , οὕτως ἡ
 BE πρὸς τὴν ΔZ , ἐναλλάξ ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ AE πρὸς
τὴν EB , οὕτως ἡ ΓZ πρὸς τὴν $Z\Delta$. ἦτοι δὴ ἡ AE
15 τῆς EB μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ ἢ
τῷ ἀπὸ ἀσυνμέτρου. εἰ μὲν οὖν ἡ AE τῆς EB μείζον
δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ, καὶ ἡ ΓZ τῆς $Z\Delta$
μείζον δυνήσεται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ. καὶ εἰ
μὲν σύμμετρός ἐστὶν ἡ AE τῇ ἐκκειμένῃ φητῇ μήκει,
20 καὶ ἡ ΓZ , εἰ δὲ ἡ BE , καὶ ἡ ΔZ , εἰ δὲ οὐδετέρω
τῶν AE , EB , καὶ οὐδετέρω τῶν ΓZ , $Z\Delta$. εἰ δὲ ἡ
 AE [τῆς EB] μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσυνμέτρου
ἑαυτῇ, καὶ ἡ ΓZ τῆς $Z\Delta$ μείζον δυνήσεται τῷ ἀπὸ
ἀσυνμέτρου ἑαυτῇ. καὶ εἰ μὲν σύμμετρός ἐστὶν ἡ AE
25 τῇ ἐκκειμένῃ φητῇ μήκει, καὶ ἡ ΓZ , εἰ δὲ ἡ BE , καὶ

1. ἡ BE] αὐτῇ ἡ EB φ. AE] om. φ. $A B$. 3. ὁ] (prius)
om. φ. ΔZ] $Z\Delta$ B. 4. ἐστὶ] om. P. ἐστὶν ἄρα] om.
V φ. 5. ὅλη ἄρα V. 7. ἄρα] ἄρα ἐστὶ V φ (del. V). καί]
om. φ. μὲν AE V φ (post AE hab. μὲν B). BE δὲ BFb.
τῇ] supra scr. V m. 1. 8. ΔZ] $Z\Delta$ BF. καὶ αἱ] καί
εἰσιν αἱ V, αἱ δὲ B. εἰσι] om. V. 10. ἀποτομή — 11.
 AB] om. P. 12. οὖν] γάρ Theon (BFVb). AE] corr. ex
 EA V. 13. τῇν] om. B, m. 2 F. $Z\Delta$ F. ἄρα] om. V.

sit. itaque AE , EB rationales sunt potentia tantum



commensurabiles [prop. LXXIII].

fiat $BE:AZ = AB:ΓΔ$ [VI, 12].

quare etiam ut unum ad unum, ita omnia ad omnia [V, 12]. itaque $AE:ΓΖ = AB:ΓΔ$.

uerum AB , $ΓΔ$ longitudine commensurabiles sunt. itaque etiam AE , $ΓΖ$ et BE , $ΔΖ$ commensurabiles sunt [prop. XI]. uerum AE , EB rationales sunt potentia tantum commensurabiles. itaque etiam $ΓΖ$, $ΖΔ$ rationales sunt potentia tantum commensurabiles [prop. XIII].

Iam quoniam est $AE:ΓΖ = BE:ΔΖ$, permutando [V, 16] est $AE:EB = ΓΖ:ΖΔ$. AE^2 igitur EB^2 excedit quadrato rectae aut sibi commensurabilis aut incommensurabilis. iam si AE^2 excedit EB^2 quadrato rectae sibi commensurabilis, etiam $ΓΖ^2$ excedet $ΖΔ^2$ quadrato rectae sibi commensurabilis [prop. XIV]. et siue AE rationali propositae longitudine commensurabilis est, etiam $ΓΖ$ ei commensurabilis est [prop. XII], siue BE , etiam $ΔΖ$ [id.], siue neutra rectarum AE , EB , etiam neutra rectarum $ΓΖ$, $ΖΔ$ [prop. XIII]. sin AE^2 excedit quadrato rectae sibi incommensurabilis, etiam $ΓΖ^2$ excedet $ΖΔ^2$ quadrato rectae sibi incommensurabilis [prop. XIV]. et siue AE rationali propositae longitudine commensurabilis est, etiam $ΓΖ$

14. $\delta\eta$] om. P, $\delta\epsilon$ BV. 15. $\tau\phi$] corr. ex $\tau\omicron\upsilon$ m. 2 P. 16. Ante $\epsilon\lambda$ ins. $\kappa\alpha\iota$ (?) m. 2 F. $\epsilon\lambda$] e corr. V. 17. $\acute{\alpha}\sigma\upsilon\mu\mu\acute{\epsilon}\tau\rho\omicron\nu$ B, corr. m. 2; $\acute{\alpha}$ - supra add. m. 2 F. $\tau\eta\varsigma$] $\tau\eta\iota$ F. 18. $\acute{\alpha}\sigma\upsilon\mu\mu\acute{\epsilon}\tau\rho\omicron\nu$ B, et F, sed corr. 19. AE] $A\theta$ e corr. F. 20. $ΓΖ$] $Z\Gamma$ F. 21. $\omicron\acute{\upsilon}\delta\epsilon\tau\acute{\epsilon}\rho\alpha$] $\omicron\acute{\upsilon}\theta\epsilon\tau\acute{\epsilon}\rho\alpha$ P. 22. $\tau\eta\varsigma EB$] mg. m. 1 F. $\delta\acute{\upsilon}\nu\alpha\tau\alpha\iota$] supra add. $\eta\sigma\epsilon$ m. 2 F, $\delta\upsilon\nu\eta\sigma\epsilon\tau\alpha\iota$ b. $\sigma\upsilon\mu\mu\acute{\epsilon}\tau\rho\omicron\nu$ P, corr. m. 1. 23. $\tau\eta\varsigma$] corr. ex $\tau\eta$ V.

ἡ ΔZ , εἰ δὲ οὐδετέρω τῶν AE , EB , οὐδετέρω τῶν GZ , $Z\Delta$.

Ἀποτομή ἄρα ἐστὶν ἡ $\Gamma\Delta$ καὶ τῇ τάξει ἡ αὐτὴ τῇ AB . ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

5

ρδ'.

Ἡ τῇ μέσῃς ἀποτομῇ σύμμετρος μέσῃς ἀποτομὴ ἐστὶ καὶ τῇ τάξει ἡ αὐτὴ.

Ἐστω μέσῃς ἀποτομὴ ἡ AB , καὶ τῇ AB μήκει σύμμετρος ἔστω ἡ $\Gamma\Delta$. λέγω, ὅτι καὶ ἡ $\Gamma\Delta$ μέσῃς
10 ἀποτομὴ ἐστὶ καὶ τῇ τάξει ἡ αὐτὴ τῇ AB .

Ἐπεὶ γὰρ μέσῃς ἀποτομὴ ἐστὶν ἡ AB , ἔστω αὐτῇ προσαρμόζουσα ἡ EB . αἱ AE , EB ἄρα μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι. καὶ γεγονέτω ὡς ἡ AB πρὸς τὴν $\Gamma\Delta$, οὕτως ἡ BE πρὸς τὴν ΔZ . σύμμετρος
15 ἄρα [ἐστὶ] καὶ ἡ AE τῇ GZ , ἡ δὲ BE τῇ ΔZ . αἱ δὲ AE , EB μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι· καὶ αἱ GZ , $Z\Delta$ ἄρα μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι· μέσῃς ἄρα ἀποτομὴ ἐστὶν ἡ $\Gamma\Delta$.

Λέγω δὴ, ὅτι καὶ τῇ τάξει ἐστὶν ἡ αὐτὴ τῇ AB .

20 Ἐπεὶ [γάρ] ἐστὶν ὡς ἡ AE πρὸς τὴν EB , οὕτως ἡ GZ πρὸς τὴν $Z\Delta$ [ἀλλ' ὡς μὲν ἡ AE πρὸς τὴν EB , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς AE πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν AE , EB ,

1. οὐδετέρω] (alt.) οὐδὲ οὐδετέρω BVb; οὐδέ m. 2 add. F, sed euan. 3. τῇ AB] om. F. 4. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. Pb, om. BV.


6. μέση BFVb. μέση BV, et F, corr. m. 2. ἀποτομῆς b (σ supra add. F m. 2). 7. ἐστὶν P. 8. μέση BFb, et V (σ fuit add. m. 2, sed eras.). μήκει] m. 2 B, om. FVb. 9. λέγω δὴ V. μέση B, et F supra add. σ m. 2; in V add. σ m. 2, sed eras. 10. ἐστὶ P. 11. μέση B. αὐτῇ] ἡ V, αὐτῇ ἡ Fb. 12. ἡ] αὐτῇ ἡ V. AE] EA BFb. εἰσὶν B.

ei commensurabilis est, siue BE , etiam ΔZ [prop. XII], siue neutra rectarum AE , EB , neutra rectarum ΓZ , $Z\Delta$ [prop. XIII].

Ergo $\Gamma\Delta$ apotome est [prop. LXXIII] et ordine eadem ac AB [deff. tert. 1—6]; quod erat demonstrandum.

CIV.

Recta mediae apotomae commensurabilis mediae apotome est et ordine eadem.



Sit AB mediae apotome, et rectae AB longitudine commensurabilis sit $\Gamma\Delta$. dico, etiam $\Gamma\Delta$ mediae apotomen esse et ordine eandem ac AB .

nam quoniam AB mediae apotome est, sit EB ei congruens. itaque AE , EB mediae sunt potentia tantum commensurabiles [prop. LXXIV—LXXV]. et fiat [VI, 12] $AB:\Gamma\Delta = BE:\Delta Z$. itaque etiam AE , ΓZ et BE , ΔZ commensurabiles sunt [V, 12; prop. XI]. uerum AE , EB mediae sunt potentia tantum commensurabiles. itaque etiam ΓZ , $Z\Delta$ mediae sunt [prop. XXIII] potentia tantum commensurabiles [prop. XIII]. ergo $\Gamma\Delta$ mediae est apotome [prop. LXXIV—LXXV].

Iam dico, eam ordine quoque eandem esse ac AB .

14. οὕτως — ΔZ] mg. m. 1 P. η] corr. ex δ m. 2 V. 15. $\epsilon\sigma\tau\iota$] om. P, $\epsilon\sigma\tau\iota\nu$ B. AE] AE $\mu\acute{\epsilon}\nu$ BFb. 16. $\kappa\alpha\iota$ — 17. $\sigma\acute{\upsilon}\mu\mu\epsilon\tau\rho\omicron\iota$] mg. m. 2 B. 17. ΓZ] Z e corr. V. 18. $\mu\acute{\epsilon}\sigma\eta$ B. $\acute{\alpha}\nu\omicron\tau\omicron\mu\eta\varsigma$ V. 19. $\lambda\acute{\epsilon}\gamma\omega$] $\delta\epsilon\iota\kappa\tau\acute{\epsilon}\sigma\iota\nu$ Theon (BFVb). $\delta\eta$] corr. ex $\delta\epsilon$ $\acute{\omicron}\tau\iota$ m. 1 F; $\delta\acute{\epsilon}$ V. $\epsilon\sigma\tau\iota\nu$] om. Theon (BFVb). 20. $\gamma\acute{\alpha}\rho$] om. P. $\sigma\acute{\upsilon}\tau\omega\varsigma$ $\epsilon\sigma\tau\iota\nu$ F. 21. $\tau\acute{\eta}\nu$] om. BFb. $\acute{\alpha}\lambda\lambda$ — p. 336, 2. $Z\Delta$] om. P.

ὥς δὲ ἡ ΓΖ πρὸς τὴν ΖΔ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΓΖ
 πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ], ἔστιν ἄρα καὶ ὥς τὸ ἀπὸ
 τῆς ΑΕ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕ, ΕΒ, οὕτως τὸ ἀπὸ
 τῆς ΓΖ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ [καὶ ἐναλλάξ ὥς
 5 τὸ ἀπὸ τῆς ΑΕ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΓΖ, οὕτως τὸ ὑπὸ
 τῶν ΑΕ, ΕΒ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ]. σύμμετρον
 δὲ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΕ τῷ ἀπὸ τῆς ΓΖ· σύμμετρον ἄρα
 ἐστὶ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕ, ΕΒ τῷ ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ.
 εἴτε οὖν ῥητόν ἐστι τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕ, ΕΒ, ῥητόν ἐσται
 10 καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ, εἴτε μέσον [ἐστὶ] τὸ ὑπὸ
 τῶν ΑΕ, ΕΒ, μέσον [ἐστὶ] καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ.
 Μέσης ἄρα ἀποτομὴ ἐστὶν ἡ ΓΔ καὶ τῇ τάξει ἡ
 αὐτῇ τῇ ΑΒ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

ρε'.

15 Ἡ τῇ ἐλάσσονι σύμμετρος ἐλάσσων ἐστίν.
 Ἔστω γὰρ ἐλάσσων ἡ ΑΒ καὶ τῇ ΑΒ σύμμετρος
 ἡ ΓΔ· λέγω, ὅτι καὶ ἡ ΓΔ ἐλάσσων ἐστίν.
 Γεγονέτω γὰρ τὰ αὐτά· καὶ ἐπεὶ αἱ ΑΕ, ΕΒ δυ-
 νάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι, καὶ αἱ ΓΖ, ΖΔ ἄρα δυνάμει
 20 εἰσὶν ἀσύμμετροι. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὥς ἡ ΑΕ πρὸς τὴν
 ΕΒ, οὕτως ἡ ΓΖ πρὸς τὴν ΖΔ, ἔστιν ἄρα καὶ ὥς τὸ
 ἀπὸ τῆς ΑΕ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΕΒ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς
 ΓΖ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΖΔ. συνθέντι ἄρα ἐστὶν ὥς τὰ
 ἀπὸ τῶν ΑΕ, ΕΒ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΕΒ, οὕτως τὰ
 25 ἀπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΖΔ [καὶ ἐναλλάξ].

1. ΓΖ] (alt.) ΖΓ F. 2. ὥς] om. φ. 4. καί — 6. ΖΔ]
 om. P. 6. τῶν] (alt.) om. b. 9. ΕΒ] B in ras. m. 1 P.
 ἐστὶ] ἐστὶ Theon (BFVb). 10. ἐστὶ] om. P 11. ἐστὶ]
 om. P. 12. μέση BVb. 13. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om.
 BFVb. 15. τῇ] corr. in τῆς m. 2 F, τῆς b. ἐλάσσονι] ἐλασσον
 F m. 1, ἐλάσσονος b, F m. 2. Deinde del. μήκει F. 16. γάρ]

quoniam est $AE:EB = \Gamma Z:ZA$ [V, 12; V, 16], erit etiam [prop. XXI lemma]

$$AE^2:AE \times EB = \Gamma Z^2:\Gamma Z \times ZA.$$


uerum $AE^2, \Gamma Z^2$ commensurabilia sunt. itaque etiam $AE \times EB, \Gamma Z \times ZA$ commensurabilia sunt [V, 16; prop. XI]. siue igitur $AE \times EB$ rationale est, etiam $\Gamma Z \times ZA$ rationale est [def. 4], siue $AE \times EB$ medium est, etiam $\Gamma Z \times ZA$ medium est [prop. XXIII coroll.].

Ergo ΓA apotome est et ordine eadem ac AB [prop. LXXIV—LXXV]; quod erat demonstrandum.

CV.

Recta minori commensurabilis minor est.

Sit enim AB minor et rectae AB commensurabilis ΓA . dico, etiam ΓA minorem esse.



nam fiant eadem. et quoniam AE, EB potentia sunt incommensurabiles [prop. LXXVI], etiam $\Gamma Z, ZA$ potentia incommensurabiles sunt [prop. XIII]. iam quoniam est $AE:EB = \Gamma Z:ZA$ [V, 12; V, 16], erit etiam $AE^2:EB^2 = \Gamma Z^2:ZA^2$ [VI, 20 coroll.]. itaque etiam componendo [V, 18] est

$$AE^2 + EB^2:EB^2 = \Gamma Z^2 + ZA^2:ZA^2.$$

om. Theon (BFVb). 17. ΓA] (prius) Γ e corr. m. 1 F. $\xi\sigma\tau\iota$ PBV, comp. Fb. 18. $\alpha\upsilon\tau\alpha\ \tau\omicron\iota\varsigma\ \pi\rho\acute{o}\tau\epsilon\rho\omicron\nu$ V. 19. ΓZ] Z e corr. m. 1 b. 20. $\tau\eta\nu$] om. Bb. 21. $\tau\eta\nu$] m. 2 F. 23. ZA] ΔZ B. $\xi\sigma\tau\iota\nu$] supra scr. m. 1 V. $\tau\acute{\alpha}$] corr. ex $\tau\acute{o}$ m. 1 V. 24. $\tau\acute{\omega}\nu$] $\tau\eta\varsigma$ P. $\sigma\upsilon\tau\omega$ Bb. 25. ZA] (prius) supra scr. m. 2 F (Z incertum est). $\kappa\alpha\iota\ \epsilon\nu\alpha\lambda\lambda\acute{\alpha}\xi$] om. P. Dein del. $\acute{\omega}\varsigma\ \tau\acute{o}\ \acute{\alpha}\pi\omicron\delta\ \tau\eta\varsigma\ BE\ \pi\rho\acute{o}\varsigma\ \tau\acute{o}\ \acute{\alpha}\pi\omicron\delta\ \tau\eta\varsigma\ ZA$, $\sigma\upsilon\tau\omega\varsigma\ \tau\acute{\alpha}\ \acute{\alpha}\pi\omicron\delta\ \tau\acute{\omega}\nu\ AE, EB\ \pi\rho\acute{o}\varsigma\ \tau\acute{\alpha}\ \acute{\alpha}\pi\omicron\delta\ \tau\acute{\omega}\nu\ \Gamma Z, ZA$ V.

σύμμετρον δέ ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς BE τῷ ἀπο τῆς ΔZ ·
 σύμμετρον ἄρα καὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν
 AE, EB τετραγώνων τῷ συγκειμένῳ ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν
 $\Gamma Z, Z\Delta$ τετραγώνων. ῥητὸν δέ ἐστι τὸ συγκείμενον
 5 ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AE, EB τετραγώνων· ῥητὸν ἄρα
 ἐστὶ καὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $\Gamma Z, Z\Delta$
 τετραγώνων. πάλιν, ἐπεὶ ἐστὶν ὥς τὸ ἀπὸ τῆς AE
 πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν AE, EB , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΓZ
 πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $\Gamma Z, Z\Delta$, σύμμετρον δὲ τὸ ἀπὸ τῆς
 10 AE τετραγώνων τῷ ἀπὸ τῆς ΓZ τετραγώνῳ, σύμ-
 μετρον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν AE, EB τῷ ὑπὸ τῶν
 $\Gamma Z, Z\Delta$. μέσον δὲ τὸ ὑπὸ τῶν AE, EB · μέσον
 ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν $\Gamma Z, Z\Delta$ · αἱ $\Gamma Z, Z\Delta$ ἄρα δυ-
 νάμει εἶσιν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι το μὲν συγκείμενον
 15 ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων ῥητόν, τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν
 μέσον.

Ἐλάσσων ἄρα ἐστὶν ἡ $\Gamma\Delta$ ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

ρς'.

Ἡ τῇ μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσθ
 20 σύμμετρος μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσά
 ἐστίν.

Ἔστω μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα ἡ AB
 καὶ τῇ AB σύμμετρος ἡ $\Gamma\Delta$ · λέγω, ὅτι καὶ ἡ $\Gamma\Delta$
 μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσά ἐστίν.

25 Ἔστω γὰρ τῇ AB προσαρμόζουσα ἡ BE · αἱ $AE,$
 EB ἄρα δυνάμει εἶσιν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὸ μὲν
 συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AE, EB τετραγώνων

1. ἐστίν P. τό] corr. ex τῷ m. 1 F, ex τά (?) V. ΔZ] $Z\Delta$ P. 3. τετραγώνων Pb et comp. ins. m. 1 V. 4. $\Gamma\Delta$, ΔZ b. 5. ῥηταί F, sed corr. 6. ἐστὶ] εἰσὶ F. 7. τό]

uerum BE^2 , AZ^2 commensurabilia sunt. itaque etiam $AE^2 + EB^2$ et $\Gamma Z^2 + ZA^2$ commensurabilia sunt [V, 16; prop. XI]. uerum $AE^2 + EB^2$ rationale est [prop. LXXVI]. itaque etiam $\Gamma Z^2 + ZA^2$ rationale est [def. 4]. rursus quoniam est

$$AE^2 : AE \times EB = \Gamma Z^2 : \Gamma Z \times ZA$$

[prop. XXI lemma], et AE^2 , ΓZ^2 commensurabilia sunt, etiam $AE \times EB$, $\Gamma Z \times ZA$ commensurabilia sunt. $AE \times EB$ autem medium est [prop. LXXVI]. quare etiam $\Gamma Z \times ZA$ medium est [prop. XXIII coroll.]. itaque ΓZ , ZA potentia incommensurabiles sunt efficientes summam quadratorum rationalem, rectangulum autem medium.

Ergo ΓA minor est [prop. LXXVI]; quod erat demonstrandum.

CVI.

Recta rectae cum rationali totum medium efficienti commensurabilis recta est cum rationali totum medium efficiens.

Sit AB recta cum rationali totum medium efficiens et rectae AB commensurabilis ΓA . dico, etiam ΓA rectam esse cum rationali totum medium efficientem.

nam BE rectae AB congruens sit. itaque AE , EB potentia incommensurabiles sunt efficientes $AE^2 + EB^2$

om. V. 9. Post ZA add. $\kappa\alpha\iota \epsilon\nu\alpha\lambda\lambda\acute{\alpha}\xi$ BFb. 13. $\acute{\alpha}\rho\alpha \epsilon\sigma\tau\iota$
 $\kappa\alpha\iota$ BFb. ZA] (alt.) Z in ras. m. 1 B. 17. $\delta\pi\epsilon\rho \epsilon\delta\epsilon\iota$
 $\delta\epsilon\iota\chi\epsilon\iota$] comp. P, om. BFb. De additamento in V u. app.
 nr. 24. 19. $\kappa\alpha\iota\sigma\acute{\upsilon}\sigma\eta \mu\eta\kappa\omicron\varsigma$ F. 20. Ante $\mu\epsilon\tau\acute{\alpha}$ add. $\kappa\alpha\iota$
 $\alpha\upsilon\tau\eta$ BFb, m. 2 V. $\kappa\alpha\iota\sigma\acute{\upsilon}\sigma\alpha \tau\omicron \delta\lambda\omicron\nu$ b. 22. $\kappa\alpha\iota\sigma\acute{\upsilon}\sigma\alpha \tau\omicron$
 $\delta\lambda\omicron\nu$ V. 24. $\tau\omicron \delta\lambda\omicron\nu \mu\epsilon\sigma\sigma\omicron\nu$ b. 25. BE] E e corr. m. 1 P.

μέσον, τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν ῥητόν. καὶ τὰ αὐτὰ κατε-
σκευάσθω. ὁμοίως δὲ δείξομεν τοῖς πρότερον, ὅτι αἱ
ΓΖ, ΖΔ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ εἰσὶ ταῖς ΑΕ, ΕΒ, καὶ
σύμμετρόν ἐστι τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΕ,
5 ΕΒ τετραγώνων τῷ συγκειμένῳ ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΓΖ,
ΖΔ τετραγώνων, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν ΑΕ, ΕΒ τῷ ὑπὸ
τῶν ΓΖ, ΖΔ· ὥστε καὶ αἱ ΓΖ, ΖΔ δυνάμει εἰσὶν
ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ
τῶν ΓΖ, ΖΔ τετραγώνων μέσον, τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν
10 ῥητόν.

Ἡ ΓΔ ἄρα μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσά
ἐστίν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

ρζ'.

Ἡ τῇ μετὰ μέσου μέσον τὸ ὅλον ποιούσῃ
15 σύμμετρος καὶ αὐτῇ μετὰ μέσου μέσον τὸ ὅλον
ποιοῦσά ἐστίν.

Ἐστω μετὰ μέσου μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα ἡ ΑΒ,
καὶ τῇ ΑΒ ἔστω σύμμετρος ἡ ΓΔ· λέγω, ὅτι καὶ ἡ
ΓΔ μετὰ μέσου μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσά ἐστίν.

20 Ἐστω γὰρ τῇ ΑΒ προσαρμόζουσα ἡ ΒΕ, καὶ τὰ
αὐτὰ κατεσκευάσθω· αἱ ΑΕ, ΕΒ ἄρα δυνάμει εἰσὶν
ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὸ τε συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ'
αὐτῶν τετραγώνων μέσον καὶ τὸ ὑπ' αὐτῶν μέσον
καὶ ἔτι ἀσύμμετρον το συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν
25 τετραγώνων τῷ ὑπ' αὐτῶν. καὶ εἰσιν, ὥς ἐδείχθη,
αἱ ΑΕ, ΕΒ σύμμετροι ταῖς ΓΖ, ΖΔ, καὶ τὸ συγκεί-
μενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΕ, ΕΒ τετραγώνων τῷ συγ-

3. τῷ] e corr. V. εἰσὶν B. 4. τό] τὸ μὲν Bb, μὲν
supra scr. m. 2 F. 5. τῶν ΓΖ — 6. ΕΒ] mg. m. 2 B (τῶν
ΑΕ, ΕΒ etiam in textu sunt a m. 1). 6. δ' Fb. 12. ὅπερ

$\begin{array}{l} A \\ B \\ E \end{array} \left| \begin{array}{l} \Gamma \\ \Delta \\ Z \end{array} \right|$ medium, $AE \times EB$ autem rationale [prop. LXXVII]. et eadem comparentur. similiter igitur atque antea [p. 336, 20 sq.] demonstrabimus, esse $\Gamma Z : ZA = AE : EB$, et $AE^2 + EB^2, \Gamma Z^2 + ZA^2$ ac $AE \times EB, \Gamma Z \times ZA$ commensurabilia esse. quare etiam $\Gamma Z, ZA$ potentia incommensurabiles sunt efficientes $\Gamma Z^2 + ZA^2$ medium, $\Gamma Z \times ZA$ autem rationale.

Ergo ΓA recta est cum rationali totum medium efficiens [prop. LXXVII]; quod erat demonstrandum.

CVII.

Recta rectae cum medio totum medium efficienti commensurabilis et ipsa recta cum medio totum medium efficiens est.

Sit AB recta cum medio totum medium efficiens, et rectae AB commensurabilis sit ΓA . dico, etiam ΓA rectam esse cum medio totum medium efficientem.

$\begin{array}{l} A \\ B \\ E \end{array} \left| \begin{array}{l} \Gamma \\ \Delta \\ Z \end{array} \right|$ nam BE rectae AB congruens sit, et eadem comparentur. itaque AE, EB potentia incommensurabiles sunt efficientes summam quadratorum mediam et rectangulum medium praetereaue summam quadratorum rectangulo incommensurabilem [prop. LXXVIII]. sunt autem, ut demonstratum est [p. 334, 14 sq.], AE, EB rectis $\Gamma Z, ZA$ commensurabiles, et $AE^2 + EB^2, \Gamma Z^2 + ZA^2$ ac $AE \times EB, \Gamma Z \times ZA$

$\xi\delta\epsilon\iota\ \delta\epsilon\iota\chi\alpha\iota$] comp. P, om. BFb. De V u. app. nr. 25. 14.
 $\pi\omicron\iota\omicron\upsilon\sigma\eta\ \mu\eta\mu\epsilon\iota$ F. 18. $\xi\sigma\tau\omega$] om. BFb. 21. $\alpha\phi\alpha$] m. 2
 euan. F. 25. $\alpha\phi\tau\acute{o}\nu$ F.

κειμένῳ ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΓZ , $Z\Delta$, τὸ δὲ ὑπο τῶν AE , EB τῷ ὑπὸ τῶν ΓZ , $Z\Delta$ καὶ αἱ ΓZ , $Z\Delta$ ἄρα δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὸ τε συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων μέσον καὶ τὸ ὑπ' αὐτῶν
 5 μέσον καὶ ἔτι ἀσύμμετρον τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν [τετραγώνων] τῷ ὑπ' αὐτῶν.

Ἡ $\Gamma\Delta$ ἄρα μετὰ μέσου μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσά ἐστιν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

ρη'.

10 Ἀπὸ ῥητοῦ μέσου ἀφαιρουμένου ἢ τὸ λοιπὸν χωρίον δυναμένη μία δύο ἀλόγων γίνεται ἥτοι ἀποτομή ἢ ἐλάσσων.

Ἀπὸ γὰρ ῥητοῦ τοῦ $B\Gamma$ μέσον ἀφηρήσθω τὸ $B\Delta$ λέγω, ὅτι ἢ τὸ λοιπὸν δυναμένη τὸ $E\Gamma$ μία δύο
 15 ἀλόγων γίνεται ἥτοι ἀποτομή ἢ ἐλάσσων.

Ἐκκείσθω γὰρ ῥητὴ ἢ ZH , καὶ τῷ μὲν $B\Gamma$ ἴσον παρὰ τὴν ZH παραβεβλήσθω ὀρθογώνιον παραλληλό-
 γραμμον τὸ $H\Theta$, τῷ δὲ ΔB ἴσον ἀφηρήσθω τὸ HK ·
 λοιπὸν ἄρα τὸ $E\Gamma$ ἴσον ἐστὶ τῷ $\Delta\Theta$. ἐπεὶ οὖν ῥητὸν
 20 μὲν ἐστὶ τὸ $B\Gamma$, μέσον δὲ τὸ $B\Delta$, ἴσον δὲ τὸ μὲν $B\Gamma$ τῷ $H\Theta$, τὸ δὲ $B\Delta$ τῷ HK , ῥητὸν μὲν ἄρα ἐστὶ τὸ $H\Theta$, μέσον δὲ τὸ HK . καὶ παρὰ ῥητὴν τὴν ZH παράκειται ῥητὴ μὲν ἄρα ἢ $Z\Theta$ καὶ σύμμετρος τῇ

1. τὸ δέ — 2. καί] mg. m. 2 F. 3. τε] om. P. 6. τε-
 τραγώνων] om. P. 8. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. BFb.

10. Post ῥητοῦ del. καί F. 11. γίνεταί BFb. 12. ἐλάτ-
 των PVb. 13. $B\Gamma$] in ras. V. 14. λοιπὸν χωρίον BFb.
 τὸ $E\Gamma$ δυναμένη BFb. 15. λόγων F, corr. m. 2. γί-
 νεταί BFb. ἐλάττων B. 17. Post παραβεβλήσθω del. τὸ
 HB m. 1 P, ras. 4 litt. V. 18. ΔB] e corr. V, $B\Delta$ P. 19.
 $E\Gamma$] ΓE B. $\Delta\Theta$] $\Theta\Delta$ F. 20. μὲν] (prius) om. b. 21.
 ῥητὸν] bis b. 23. παράκειται BF. ἄρα ἐστὶν BFb.

commensurabilia. quare etiam ΓZ , $Z\Delta$ potentia incommensurabiles sunt efficientes summam quadratorum mediam et rectangulum medium praetereaue summam quadratorum rectangulo incommensurabilem.


Ergo $\Gamma\Delta$ recta est cum medio totum medium efficiens [prop. LXXVIII]; quod erat demonstrandum.

CVIII.

Spatio medio a rationali ablato recta reliquo spatio aequalis quadrata alterutra rectarum irrationalium est aut apotome aut minor.

nam a spatio rationali $B\Gamma$ medium auferatur $B\Delta$. dico, rectam reliquo $E\Gamma$ aequalem quadratam alterutra rectarum irrationalium esse aut apotomen aut minorem.

ponatur enim rationalis ZH , et spatio $B\Gamma$ aequale rectae ZH adplicetur rectangulum $H\Theta$, spatio autem ΔB aequale auferatur HK . itaque reliquum $E\Gamma = \Delta\Theta$.



iam quoniam $B\Gamma$ rationale est, $B\Delta$ autem medium, et $B\Gamma = H\Theta$, $B\Delta = HK$, $H\Theta$ rationale est, HK autem medium. et rationali ZH adplicata sunt. itaque $Z\Theta$ rationalis est et rectae ZH longitudine commensura-

bilis [prop. XX], ZK autem rationalis et rectae ZH longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. quare $Z\Theta$, ZK longitudine incommensurabiles sunt [prop.

ZH μήκει, $\phi\eta\tau\eta$ δὲ ἡ ZK καὶ ἀσύμμετρος τῇ ZH μήκει· ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ $Z\Theta$ τῇ ZK μήκει. αὖ $Z\Theta$, ZK ἄρα $\phi\eta\tau\alpha\iota$ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἀποτομὴ ἄρα ἐστὶν ἡ $K\Theta$, προσαρμόζουσα δὲ αὐτῇ ἡ
 5 KZ . ἦτοι δὴ ἡ ΘZ τῆς ZK μείζον δύναται τῷ ἀπὸ
 συμμέτρου ἢ οὐ.

Δυνάσθω πρότερον τῷ ἀπὸ συμμέτρου. καὶ ἐστὶν ὅλη ἡ ΘZ σύμμετρος τῇ ἐκκειμένη $\phi\eta\tau\eta$ μήκει τῇ ZH · ἀποτομὴ ἄρα πρώτη ἐστὶν ἡ $K\Theta$. τὸ δ' ὑπὸ $\phi\eta\tau\eta\varsigma$
 10 καὶ ἀποτομῆς πρώτης περιεχόμενον ἡ δυναμένη ἀποτομὴ ἐστὶν. ἡ ἄρα τὸ $A\Theta$, τουτέστι το $E\Gamma$, δυναμένη ἀποτομὴ ἐστὶν.

Εἰ δὲ ἡ ΘZ τῆς ZK μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἐαυτῇ, καὶ ἐστὶν ὅλη ἡ $Z\Theta$ σύμμετρος τῇ ἐκ-
 15 κειμένη $\phi\eta\tau\eta$ μήκει τῇ ZH , ἀποτομὴ τετάρτη ἐστὶν ἡ $K\Theta$. τὸ δ' ὑπὸ $\phi\eta\tau\eta\varsigma$ καὶ ἀποτομῆς τετάρτης περιεχόμενον ἡ δυναμένη ἐλάσσων ἐστὶν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

ρδ'.

Ἀπὸ μέσου $\phi\eta\tau\omicron\upsilon$ ἀφαιρουμένου ἄλλαι δύο
 20 ἄλογοι γίνονται ἦτοι μέσης ἀποτομὴ πρώτη ἡ μετὰ $\phi\eta\tau\omicron\upsilon$ μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα.

Ἀπὸ γὰρ μέσου τοῦ $B\Gamma$ $\phi\eta\tau\omicron\varsigma$ ἀφηρησθῶ τὸ BA . λέγω, ὅτι ἡ τὸ λοιπὸν τὸ $E\Gamma$ δυναμένη μία δύο ἀλόγων

1. ZH] (prius) HZ F. 2. Post μήκει (alt.) add. καὶ εἰσιν ἀμφοτέραι $\phi\eta\tau\alpha\iota$ b. 3. $Z\Theta$] ΘZ BF. εἰσιν P. 4. δέ] δ' P. 5. ZK φ. δὴ] P, δέ BFb, et supra scr. m. 2 V. ΘZ] $Z\Theta$ b. 6. ἀσύμμετρον P. ἡ οὐ] ἐαυτῇ ἢ τῷ ἀπὸ ἀσύμμετρου BFb. ἦ — 7. συμμέτρου] mg. m. 1 P. 7. τῷ corr. ex τό m. 1 b, m. rec. P. ἀσύμμετρον P. 8. ΘZ] corr. ex $Z\Theta$ V, $Z\Theta$ F. 9. δέ BFb. 10. περιεχόμενον] om. BFb. 11. ἡ] ins. m. 1 B. τό] (prius) ins. m. 2 V. 13. ΘZ] in ras. b, $Z\Theta$ F. τῆς] τῇ b. συμμέτρου V, corr.

XIII]. itaque $Z\Theta$, ZK rationales sunt potentia tantum commensurabiles. quare $K\Theta$ apotome est [prop. LXXIII], KZ autem ei congruens. iam ΘZ^2 excedit ZK^2 quadrato rectae aut commensurabilis aut incommensurabilis.

Prius excedat quadrato commensurabilis. et tota ΘZ rationali propositae ZH longitudine commensurabilis est. quare $K\Theta$ apotome est prima [deff. tert. 1]. recta autem spatio comprehenso recta rationali et apotome prima aequalis quadrata apotome est [prop. XCI]. ergo recta spatio $A\Theta$, hoc est $E\Gamma$, aequalis quadrata apotome est.

sin ΘZ^2 excedit ZK^2 quadrato rectae sibi incommensurabilis, et tota $Z\Theta$ rationali propositae ZH longitudine commensurabilis est, $K\Theta$ apotome est quarta [deff. tert. 4]. recta autem spatio comprehenso recta rationali et apotome quarta aequalis quadrata minor est [prop. XCIV]; quod erat demonstrandum.

CIX.

Spatio rationali a medio ablato aliae duae rectae irrationales oriuntur aut mediae apotome prima aut recta cum rationali totum medium efficiens.

A medio enim $B\Gamma$ rationale auferatur $B\Delta$. dico, rectam spatio reliquo $E\Gamma$ aequalem quadratam alterutram rectarum irrationalium esse aut mediae apotomen

m. 2. 14. ΘZ BF. 15. ZH] corr. ex $Z\Theta$ m. 1 F. ἀπο-
τουμῇ ἄρα BFb. 16. δέ B. 17. Post ἐστίν add. ἡ ἄρα τὸ
(om. b) $A\Theta$, τουτέστι τὸ $E\Gamma$, δυναμένη ἐλάσσων ἐστίν BF, mg.
m. 1 b. ὅπερ εἶδει δεῖξαι] comp. P, om. BFb. 19. Post
ἀπό add. τοῦ b, m. 2 F. 20. γίνονται B. μέση B. 22.
ἀπό] corr. ex ἐπὶ V. ἀπό — $B\Delta$] bis b. 23. μίαν] om. b.
λόγων b.

γίνεται ἥτοι μέσης ἀποτομὴ πρώτη ἢ μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιουῖσα.

Ἐκκείσθω γὰρ ῥητὴ ἡ ZH , καὶ παραβελήσθω ὁμοίως τὰ χωρία. ἔστι δὲ ἀκολουθῶς ῥητὴ μὲν ἡ $Z\Theta$
 5 καὶ ἀσύμμετρος τῇ ZH μήκει, ῥητὴ δὲ ἡ KZ καὶ σύμμετρος τῇ ZH μήκει· αἱ $Z\Theta$, ZK ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἀποτομὴ ἄρα ἐστὶν ἡ $K\Theta$, προσαρμόζουσα δὲ ταύτῃ ἡ ZK . ἥτοι δὲ ἡ ΘZ τῆς ZK μείζον δύνатаι τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ ἢ τῷ
 10 ἀπὸ ἀσυνμέτρου.

Εἰ μὲν οὖν ἡ ΘZ τῆς ZK μείζον δύνатаι τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ, καὶ ἐστὶν ἡ προσαρμόζουσα ἡ ZK σύμμετρος τῇ ἐκκειμένη ῥητῇ μήκει τῇ ZH , ἀποτομὴ δευτέρα ἐστὶν ἡ $K\Theta$. ῥητὴ δὲ ἡ ZH · ὥστε ἡ τὸ $\Lambda\Theta$,
 15 τουτέστι τὸ $E\Gamma$, δυναμένη μέσης ἀποτομὴ πρώτη ἐστὶν.

Εἰ δὲ ἡ ΘZ τῆς ZK μείζον δύνатаι τῷ ἀπὸ ἀσυνμέτρου, καὶ ἐστὶν ἡ προσαρμόζουσα ἡ ZK σύμμετρος τῇ ἐκκειμένη ῥητῇ μήκει τῇ ZH , ἀποτομὴ πέμπτη ἐστὶν ἡ $K\Theta$ · ὥστε ἡ τὸ $E\Gamma$ δυναμένη μετὰ ῥητοῦ μέσον
 20 τὸ ὅλον ποιουῖσά ἐστὶν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.



ρι'.

Ἀπὸ μέσου μέσου ἀφαιρουμένου ἀσυνμέ-

1. γίνεταί Bb. μέση Bb. 4. ἔστιν P. δὴ] corr. ex δέ m. 2 B, δέ Fb. 5. καί] om. φ. ZH] ZI b. ZK B. 6. $Z\Theta$] ΘZ P. εἰσιν P. 8. αὐτῇ BFb. δὴ] δέ BV. ΘZ] in ras. m. 1 b. 10. συμμέτρου V, corr. m. 1. 11. ΘZ] $Z\Theta$ V. 14. Post ZH add. τὸ δὲ ὑπὸ ῥητῆς καὶ ἀποτομῆς δευτέρας ἡ δυναμένη μέσης ἀποτομὴ ἐστὶ πρώτη b, F mg. m. 2. 15. τουτέστιν P. μέση BF. ἐστὶ πρώτη V. 16. ΘZ] in ras. V, $Z\Theta$ P. 17. καί] ἑαυτῇ, καὶ BFb. 18. μήκει] om. b. 19. $K\Theta$] ΘK F. Post $E\Gamma$ del. χωρίων m. 1 P. 20. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. BFb. 22. μέσου] (alt.) supra scr. m. 1 P, μέσον supra scr. m. 2 F.

primam aut rectam cum rationali totum medium effici-
cientem.

ponatur enim rationalis ZH , et spatia similiter
adplicentur. itaque eodem modo [p. 342, 19 sq.] se-



quitur, $ZΘ$ rationalem esse
et rectae ZH longitudine in-
commensurabilem, KZ autem
rationalem et rectae ZH lon-
gitudine commensurabilem.
itaque $ZΘ$, ZK rationales
sunt potentia tantum com-
mensurabiles [prop. XIII].
ergo $KΘ$ apotome est [prop.
LXXIII], ei autem congruens

ZK . iam $ΘZ^2$ excedit ZK^2 quadrato rectae aut sibi
commensurabilis aut incommensurabilis.

iam si $ΘZ^2$ excedit ZK^2 quadrato rectae sibi com-
mensurabilis, et congruens ZK rationali propositae
 ZH longitudine commensurabilis est, $KΘ$ apotome est
secunda [def. tert. 2]. ZH autem rationalis est. quare
recta spatio $AΘ$, hoc est $EΓ$, aequalis quadrata mediae
apotome est prima [prop. XCII]. sin $ΘZ^2$ excedit ZK^2
quadrato rectae incommensurabilis, et congruens ZK
rationali propositae ZH longitudine commensurabilis
est, $KΘ$ apotome est quinta [def. tert. 5]. quare recta
spatio $EΓ$ aequalis quadrata recta est cum rationali
totum medium efficiens [prop. XCV]; quod erat de-
monstrandum.

CX.

Spatio medio a medio ablato toti incommensurabili
reliquae duae irrationales oriuntur aut mediae apo-

τρον τῷ ὅλῳ αἱ λοιπαὶ δύο ἄλλοι γίνονται
ἤτοι μέσης ἀποτομῇ δευτέρα ἢ μετὰ μέσον
μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα.

Ἀφηγήσθω γὰρ ὥς ἐπὶ τῶν προκειμένων κατα-
5 γραφῶν ἀπὸ μέσου τοῦ ΒΓ μέσον τὸ ΒΔ ἀσύμμετρον
τῷ ὅλῳ· λέγω, ὅτι ἡ τὸ ΕΓ δυναμένη μὴ ἐστὶ δύο
ἀλόγων ἤτοι μέσης ἀποτομῇ δευτέρα ἢ μετὰ μέσον
μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα.

Ἐπεὶ γὰρ μέσον ἐστὶν ἐκάτερον τῶν ΒΓ, ΒΔ, καὶ
10 ἀσύμμετρον τὸ ΒΓ τῷ ΒΔ, ἐστὶ ἀκολούθως φητὴ
ἐκατέρα τῶν ΖΘ, ΖΚ καὶ ἀσύμμετρος τῇ ΖΗ μήκει.
καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρόν ἐστι τὸ ΒΓ τῷ ΒΔ, τουτέστι τὸ
ΗΘ τῷ ΗΚ, ἀσύμμετρος καὶ ἡ ΘΖ τῇ ΖΚ· αἱ ΖΘ,
ΖΚ ἄρα φηταὶ εἶσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἀπο-
15 τομῇ ἄρα ἐστὶν ἡ ΚΘ [προσαρμόζουσα δὲ ἡ ΖΚ. ἤτοι
δὴ ἡ ΖΘ τῆς ΖΚ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου
ἡ τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ].

Εἰ μὲν δὴ ἡ ΖΘ τῆς ΖΚ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ
συμμέτρου ἑαυτῇ, καὶ οὐδετέρα τῶν ΖΘ, ΖΚ σύμ-
20 μετρὸς ἐστὶ τῇ ἐκκειμένη φητὴ μήκει τῇ ΖΗ, ἀποτομῇ
τρίτῃ ἐστὶν ἡ ΚΘ. φητὴ δὲ ἡ ΚΑ, τὸ δ' ὑπὸ φητῆς
καὶ ἀποτομῆς τρίτης περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἄλογόν
ἐστίν, καὶ ἡ δυναμένη αὐτὸ ἄλογός ἐστιν, καλεῖται δὲ


1. γίνονται B. 2. μέση Bb. 5. ΒΔ] B e corr. V. 6. ἐστὶν B. 7. μέση Bb. μετὰ] μετὰ τοῦ P. 12. ἐστὶν P. Deinde add. ὑπόκειται P, et V, sed del. 13. καὶ] ἐστὶ καὶ b, ἐστὶν καὶ B. αἱ] καὶ ἡ b. ΖΘ] ΘΖ FV. 14. ΖΚ] ΘΚ P. 15. ἐστὶν] om. Bb. προσαρμόζουσα — 17. ἑαυτῇ] om. P, mg. V. 16. δὴ] δέ BV. 18. δὴ] οὖν BFb. ΖΘ] ΘΖ B. ΖΚ] Ζ postea ins. V. 19. οὐδετέρα V. τῶν] corr. ex τῷ m. 2 V. ΖΘ] ΘΖ Bb et in ras. V. 20. ἐστὶ] om. Fb. 21. ΚΑ] corr. ex ΚΑ m. 2 F. δ'] δέ BFb. 23. ἐστὶ PBV, comp. Fb; item alt.

tome secunda aut recta cum medio totum medium efficiens.

Auferatur enim ut in figuris iam propositis [p. 347] a medio $B\Gamma$ spatium medium $B\Delta$ toti incommensurabile. dico, rectam spatio $E\Gamma$ aequalem quadratam alterutram esse rectarum irrationalium aut mediae apotomen secundam aut rectam cum medio totum medium efficientem.

nam quoniam utrumque $B\Gamma$, $B\Delta$ medium est, et $B\Gamma$, $B\Delta$ incommensurabilia¹⁾, similiter concludemus [p. 342, 19 sq.], utramque $Z\Theta$, ZK rationalem esse et rectae ZH longitudine incommensurabilem [prop. XXII]. et quoniam $B\Gamma$, $B\Delta$, hoc est $H\Theta$, HK , incommensurabilia sunt, etiam ΘZ , ZK incommensurabiles sunt [VI, 1; prop. XI]. itaque $Z\Theta$, ZK rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo $K\Theta$ apotome est [prop. LXXIII].

iam si $Z\Theta^2$ excedit ZK^2 quadrato rectae sibi commensurabilis, et neutra rectarum $Z\Theta$, ZK rationali propositae ZH longitudine commensurabilis est, $K\Theta$ apotome est tertia [deff. tert. 3]. uerum $K\Delta$ rationalis est, rectangulum autem recta rationali et apotome tertia comprehensum irrationale est, et recta ei aequalis quadrata irrationalis est, uocatur autem mediae apotome se-



1) Cum uerba καὶ ἀσύμμετρον τὸ $B\Gamma$ τῷ $B\Delta$ lin. 9 — 10 nihil faciant ad demonstrandum id, quod sequitur, non immerito ab Augusto omittuntur. Gregorius omisit ἔσται lin. 10 — τῷ $B\Delta$ lin. 12.

μέσης ἀποτομή δευτέρα· ὥστε ἡ τὸ $\Delta\Theta$, τουτέστι τὸ $E\Gamma$, δυναμένη μέσης ἀποτομή ἐστὶ δευτέρα.

Εἰ δὲ ἡ $Z\Theta$ τῆς ZK μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἐαυτῇ [μήκει], καὶ οὐδετέρα τῶν ΘZ , ZK 5 σύμμετρός ἐστι τῇ ZH μήκει, ἀποτομή ἕκτη ἐστὶν ἡ $K\Theta$. τὸ δ' ὑπὸ φητῆς καὶ ἀποτομῆς ἕκτης ἡ δυναμένη ἐστὶ μετὰ μέσου μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα. ἡ τὸ $\Delta\Theta$ ἄρα, τουτέστι τὸ $E\Gamma$, δυναμένη μετὰ μέσου μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσά ἐστιν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

10 ρια'.

Ἡ ἀποτομή οὐκ ἐστὶν ἡ αὐτὴ τῇ ἐκ δύο ὀνομάτων.

Ἔστω ἀποτομή ἡ AB · λέγω, ὅτι ἡ AB οὐκ ἐστὶν ἡ αὐτὴ τῇ ἐκ δύο ὀνομάτων.

15 Εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω· καὶ ἐκκείσθω φητὴ ἡ $\Delta\Gamma$, καὶ τῷ ἀπὸ τῆς AB ἴσον παρὰ τὴν $\Gamma\Delta$ παραβελλήσθω ὀρθογώνιον τὸ ΓE πλάτος ποιοῦν τὴν ΔE . ἐπεὶ οὖν ἀποτομή ἐστὶν ἡ AB , ἀποτομή πρώτη ἐστὶν ἡ ΔE . ἔστω αὐτῇ προσαρμόζουσα ἡ EZ · αἱ ΔZ , ZE ἄρα 20 φηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ ἡ ΔZ τῆς ZE μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμέτρου ἐαυτῇ, καὶ ἡ ΔZ σύμμετρός ἐστι τῇ ἐκκειμένη φητῇ μήκει τῇ $\Delta\Gamma$. πάλιν, ἐπεὶ ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶν ἡ AB , ἐκ δύο ἄρα

1. ἀποτομὴ μέση B. ὥσπερ FV. τό] om. b. τουτέστιν B. τό] ἡ τὸ Bb. 2. μέση B. ἐστὶν ἀποτομή Fb.

3. $Z\Theta$] ΘZ Bb et in ras. V. συμέτρου V, corr. m. 1. 4. μήκει] om. PV. οὐδετέρα FV. 5. ἐστὶ] om. Bbφ. 6. δὲ Bb. 7. ἐστὶ] ἐστὶν ἡ BFb. ἡ] ὥστε ἡ BFb, et e corr. V.

8. ἄρα] del. V, om. BFb. τουτέστιν PB. Ante τό add. ἡ m. 2 F. ἡ μετὰ F. 9. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. B.

11. τῇ] supra scr. m. 1 b. 13. ἡ AB] (alt.) om. φ. 15. $\Delta\Gamma$] in ras. m. 1 P. 16. φητὴν τὴν BFb. In sequentibus multa renouata et euan. in F. 18. ἄρα πρώτη b. 19. αὐτῇ] αὐτῇ ἡ b. 21. ἀσυμέτρου B, sed ἀ- eras. 23. ἄρα] om. Bb.

cunda [prop. XCIII]. ergo recta spatio $\Delta\Theta$, hoc est $E\Gamma$, aequalis quadrata mediae apotome est secunda.

sin $Z\Theta^2$ excedit ZK^2 quadrato rectae sibi incommensurabilis, et neutra rectarum ΘZ , ZK rectae ZH commensurabilis est longitudine, $K\Theta$ sexta est apotome [deff. tert. 6]. recta autem spatio comprehenso recta rationali et apotome sexta aequalis quadrata recta est cum medio totum medium efficiens [prop. XCVI]. ergo recta spatio $\Delta\Theta$, hoc est $E\Gamma$, aequalis quadrata recta est cum medio totum medium efficiens; quod erat demonstrandum.


CXI.

Apotome eadem non est ac recta ex duobus nominibus.

Sit AB apotome. dico, AB eandem non esse ac rectam ex duobus nominibus.

nam, si fieri potest, sit. et ponatur rationalis $\Delta\Gamma$ et quadrato AB^2 aequale rectae $\Gamma\Delta$ adplicetur rectangulum ΓE latitudinem efficiens ΔE . quoniam igitur

AB apotome est, ΔE apotome est prima [prop. XCVII]. sit EZ ei congruens. itaque ΔZ , ZE rationales sunt potentia tantum commensurabiles, et ΔZ^2 excedit ZE^2 quadrato rectae sibi commensurabilis, et ΔZ rationali propositae $\Delta\Gamma$ longitudine commensurabilis est [deff. tert. 1]. rursus quoniam AB ex duobus nominibus est, ΔE ex duobus nominibus est prima [prop. LX]. in H in nomina diuidatur, et ΔH maius



ὀνομάτων πρώτη ἐστὶν ἡ ΔΕ. διηρησθῶ εἰς τὰ ὀνό-
 ματα κατὰ τὸ Η, καὶ ἔστω μείζων ὄνομα τὸ ΔΗ· αἱ
 ΔΗ, ΗΕ ἄρα φηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι,
 καὶ ἡ ΔΗ τῆς ΗΕ μείζων δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου
 5 ἐαυτῇ, καὶ τὸ μείζων ἡ ΔΗ σύμμετρός ἐστι τῇ ἐκκει-
 μένῃ φητῇ μήκει τῇ ΔΓ. καὶ ἡ ΔΖ ἄρα τῇ ΔΗ σύμ-
 μετρός ἐστι μήκει· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΗΖ σύμμετρός
 ἐστι τῇ ΔΖ μήκει. [ἐπεὶ οὖν σύμμετρός ἐστὶν ἡ ΔΖ
 τῇ ΗΖ, φητὴ δὲ ἐστὶν ἡ ΔΖ, φητὴ ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ
 10 ΗΖ. ἐπεὶ οὖν σύμμετρός ἐστὶν ἡ ΔΖ τῇ ΗΖ μήκει]
 ἀσύμμετρος δὲ ἡ ΔΖ τῇ ΕΖ μήκει· ἀσύμμετρος ἄρα
 ἐστὶ καὶ ἡ ΖΗ τῇ ΕΖ μήκει. αἱ ΗΖ, ΖΕ ἄρα
 φηταὶ [εἰσι] δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἀποτομὴ ἄρα
 ἐστὶν ἡ ΕΗ. ἀλλὰ καὶ φητὴ· ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον.
 15 Ἡ ἄρα ἀποτομὴ οὐκ ἐστὶν ἡ αὐτὴ τῇ ἐκ δύο ὀνο-
 μάτων· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

[Πόρισμα].

Ἡ ἀποτομὴ καὶ αἱ μετ' αὐτὴν ἄλογοι οὔτε
 τῇ μέσῃ οὔτε ἀλλήλαις εἰσὶν αἱ αὐταί.
 20 Τὸ μὲν γὰρ ἀπὸ μέσης παρὰ φητὴν παραβαλλό-
 μενον πλάτος ποιεῖ φητὴν καὶ ἀσύμμετρον τῇ, παρ'
 ἣν παράκειται, μήκει, τὸ δὲ ἀπὸ ἀποτομῆς παρὰ φητὴν

1. ὀνομάτων ἄρα Bb. ἐστὶ πρώτη F?, πρώτη supra scr.
 m. 2 V. διηρημένη b, mg. m. 1: γο. διηρησθῶ. 4. ΗΕ]
 ΕΗ F. τῷ τὸ φ. 5. τὸ μείζων] P, et V, supra scr. ἡ;
 om. b, ἡ μείζων B; om. φ, sed post ΔΗ lacuna est 6 litt.
 7. Ante μήκει del. τῇ ἐκκειμένη φητῇ μήκει τῇ ΔΓ m. 1 b.
 λοιπὴ ἄρα τῇ BFV. ΗΖ] in ras. m. 1 b; ΖΗ F, seq. ras.
 1 litt. 8. ἐστὶ τῇ] ἐστὶν ἡ BVb et supra scr. ἡ φ. ἐπεὶ —
 10. ΗΖ (prius)] om. P, mg. V. 9. ΗΖ] Ζ ante ras. 1 litt. V.
 ἐστὶν] om. V. Post φητῇ in mg. m. 1 add. μήκει ἀσύμ-
 μετρος m. 1 b. ἐστὶν B, om. V. 10. ἐπεὶ — μήκει] om.

nomen sit. itaque ΔH , HE rationales sunt potentia tantum commensurabiles, et ΔH^2 excedit HE^2 quadrato rectae sibi commensurabilis, et maius nomen ΔH rationali propositae $\Delta \Gamma$ longitudine commensurabile est [deff. alt. 1]. itaque etiam ΔZ rectae ΔH longitudine commensurabilis est [prop. XII]. quare etiam reliqua HZ rectae ΔZ longitudine commensurabilis est [prop. XV]. uerum ΔZ , EZ longitudine incommensurabiles sunt. quare etiam ZH , EZ longitudine incommensurabiles sunt [prop. XIII]. itaque HZ , ZE rationales sunt potentia tantum commensurabiles. EH igitur apotome est [prop. LXXIII]. uerum eadem rationalis est; quod fieri non potest.

Ergo apotome eadem non est ac recta ex duobus nominibus; quod erat demonstrandum.

Apotome et irrationales eam sequentes neque mediae neque inter se eadem sunt. nam quadratum mediae rectae rationali adplicatum latitudinem efficit rationalem et rectae, cui adplicatum est, longitudine incommensurabilem [prop. XXII], quadratum autem apotomes rationali adplicatum latitudinem efficit apotomen primam [prop. XCVII], quadratum autem mediae apotomes primae rationali adplicatum latitudinem efficit apotomen secundam [prop. XCVIII], quadratum autem

PV. 11. EZ] mut. in ZE V. $\alpha\beta\alpha$ $\epsilon\sigma\tau\iota$] $\delta\epsilon$ in ras. 4 litt. ϕ . 12. $\epsilon\sigma\tau\iota\nu$ P. Post $\mu\eta\kappa\epsilon\iota$ add. $\kappa\alpha\iota$ $\epsilon\iota\sigma\iota$ $\delta\eta\tau\alpha\iota$ mg. m. 2 B. 13. $\epsilon\iota\sigma\iota$] om. PV. 14. EH] corr. ex HE V, HE P, EN ϕ . 15. η] (alt.) om. b. 16. $\delta\pi\epsilon\rho$ $\epsilon\delta\epsilon\iota$ $\delta\epsilon\iota\chi\alpha\iota$] comp. P, om. B F b. 17. $\pi\acute{o}\tau\epsilon\iota\sigma\mu\alpha$] om. P, $\phi\upsilon\gamma'$ B V b, $\phi\iota\alpha'$ F. 21. $\tau\eta$] $\tau\iota$ b. 22. $\alpha\pi\acute{o}$] om. F.

παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ ἀποτομὴν πρώτην, τὸ
 δὲ ἀπὸ μέσης ἀποτομῆς πρώτης παρὰ ῥητὴν παραβαλ-
 λόμενον πλάτος ποιεῖ ἀποτομὴν δευτέραν, τὸ δὲ ἀπὸ
 μέσης ἀποτομῆς δευτέρας παρὰ ῥητὴν παραβαλλόμενον
 5 πλάτος ποιεῖ ἀποτομὴν τρίτην, τὸ δὲ ἀπὸ ἐλάττωστος
 παρὰ ῥητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ ἀποτομὴν
 τετάρτην, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον
 ποιούσης παρὰ ῥητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ
 ἀποτομὴν πέμπτην, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς μετὰ μέσου μέσον
 10 τὸ ὅλον ποιούσης παρὰ ῥητὴν παραβαλλόμενον πλάτος
 ποιεῖ ἀποτομὴν ἕκτην. ἐπεὶ οὖν τὰ εἰρημένα πλάτη
 διαφέρει τοῦ τε πρώτου καὶ ἀλλήλων, τοῦ μὲν πρώτου,
 ὅτι ῥητὴ ἔστιν, ἀλλήλων δὲ, ἐπεὶ τῇ τάξει οὐκ εἰσὶν
 αἱ αὐταί, δῆλον, ὥς καὶ αὐταὶ αἱ ἄλλοι διαφέρουσιν
 15 ἀλλήλων. καὶ ἐπεὶ δέδεικται ἡ ἀποτομὴ οὐκ οὐσα ἡ
 αὐτὴ τῇ ἐκ δύο ὀνομάτων, ποιούσι δὲ πλάτη παρὰ
 ῥητὴν παραβαλλόμενα αἱ μετὰ τὴν ἀποτομὴν ἀποτομὰς
 ἀκολουθῶς ἐκάστη τῇ τάξει τῇ καθ' αὐτήν, αἱ δὲ
 μετὰ τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων τὰς ἐκ δύο ὀνομάτων καὶ
 20 αὐταὶ τῇ τάξει ἀκολουθῶς, ἔτεροι ἄρα εἰσὶν αἱ μετὰ
 τὴν ἀποτομὴν καὶ ἔτεροι αἱ μετὰ τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων,
 ὥς εἶναι τῇ τάξει πάσας ἀλόγους ἰγ,

Μέσην,

Ἐκ δύο ὀνομάτων,

25 Ἐκ δύο μέσων πρώτην,

Ἐκ δύο μέσων δευτέραν,

Μείζονα,

Ῥητὸν καὶ μέσον δυναμένην,

1. τὸ δέ — 3. δευτέραν] mg. m. 1 V. 5. ἐλάττωστος Bb,
 comp. F. 9. μετὰ] om. F. 11. οὖν] corr. ex οὐ m. 1 P.
 12. πρώτου] (prius) in ras. V. 13. ἐπεὶ] ὅτι B. 17.
 παραβαλλόμενα F, corr. m. 2. αἱ] om. P, supra scr. m. 1 V,

mediae apotomes secundae rationali adplicatum latitudinem efficit apotomen tertiam [prop. XCIX], quadratum autem minoris rationali adplicatum latitudinem efficit apotomen quartam [prop. C], quadratum autem rectae cum rationali totum medium efficientis rationali adplicatum latitudinem efficit apotomen quintam [prop. CI], quadratum autem rectae cum medio totum medium efficientis rationali adplicatum latitudinem efficit apotomen sextam [prop. CII]. iam quoniam latitudines, quas diximus, et a prima et inter se differunt, a prima, quia rationalis est, inter se autem, quia ordine eadem non sunt, adparet, ipsas quoque irrationales inter se differre. Et quoniam demonstrauius, apotomen eandem non esse ac rectam ex duobus nominibus [prop. CXI], et rationali adplicatae rectae irrationales apotomen sequentes latitudines efficiunt apotomas secundum suum quaeque ordinem, irrationales autem rectam ex duobus nominibus sequentes rectas ex duobus nominibus et ipsae secundum suum quaeque ordinem, aliae sunt irrationales apotomen sequentes, aliae irrationales rectam ex duobus nominibus sequentes, ita ut omnes XIII irrationales ordine hae sint:

1. Media.
2. Recta ex duobus nominibus.
3. Ex duobus mediis prima.
4. Ex duobus mediis secunda.
5. Maior.
6. Recta spatio rationali et medio aequalis quadrata.

μέν B, *αί μέν* b, *μέν* supra add. m. 2 F. 19. *τάς ἐκ δύο ὀνομάτων*] om. V. 20. *αὐτάς* b. *εἶναι ἄρα* V. 21. *αἱ*] om. F. *μετά*] *κατά* P.

- Δύο μέσα δυναμένην,
 Ἀποτομήν,
 Μέσης ἀποτομήν πρώτην,
 Μέσης ἀποτομήν δευτέραν,
 5 Ἐλάσσονα,
 Μετὰ φητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιούσαν,
 Μετὰ μέσον μέσον τὸ ὅλον ποιούσαν.

[ριβ'.

- Τὸ ἀπὸ φητῆς παρὰ τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων
 10 παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ ἀποτομήν, ἥς
 τὰ ὀνόματα σύμμετρά ἐστι τοῖς τῆς ἐκ δύο ὀνο-
 μάτων ὀνόμασι καὶ ἔτι ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, καὶ
 ἔτι ἡ γινομένη ἀποτομή τὴν αὐτὴν ἔξει τάξιν
 τῇ ἐκ δύο ὀνομάτων.
 15 Ἐστω φητὴ μὲν ἡ Α, ἐκ δύο ὀνομάτων. δὲ ἡ ΒΓ,
 ἥς μετξον ὄνομα ἔστω ἡ ΔΓ, καὶ τῷ ἀπὸ τῆς Α ἴσον
 ἔστω τὸ ὑπὸ τῶν ΒΓ, ΕΖ· λέγω, ὅτι ἡ ΕΖ ἀποτομή
 ἐστίν, ἥς τὰ ὀνόματα σύμμετρά ἐστι τοῖς ΓΔ, ΔΒ,
 καὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, καὶ ἔτι ἡ ΕΖ τὴν αὐτὴν ἔξει
 20 τάξιν τῇ ΒΓ.

Ἐστω γὰρ πάλιν τῷ ἀπὸ τῆς Α ἴσον τὸ ὑπὸ τῶν
 ΒΔ, Η. ἐπεὶ οὖν τὸ ὑπὸ τῶν ΒΓ, ΕΖ ἴσον ἐστὶ τῷ
 ὑπὸ τῶν ΒΔ, Η, ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΓΒ πρὸς τὴν ΒΔ,

De his 13 irrationalibus cfr. Martianus Capella VI, 720.

5. ἐλάττωνα B F b. 8. ριβ'] om. b, ρια' F, ριδ' B V. 11.
 τέ ἐστι F. 12. ὀνόμασιν P B F. 15. δὲ ὀνομάτων V. 16.
 ΔΓ] ΓΔ F. 17. ΒΓ] ΓΒ F. 18. ἐστι] ἐστίν P. ΓΔ] Γ
 e corr. V. ΔΒ] Δ supra scr. m. 2 V. 19. τάξιν ἔξει V.
 ἔξει] ἔχει B F b, in B supra scr. ξ m. 2. 22. ΒΔ] Δ e
 corr. V, ΔΒ F. τό] τῷ P V. τῷ] mut. in τό m. 1 P, τό V.
 23. Post τῶν ras. 1 litt. P. ΓΒ] ΒΓ F.


7. Recta duobus spatiis mediis aequalis quadrata.
8. Apotome.
9. Mediae apotome prima.
10. Mediae apotome secunda.
11. Minor.
12. Recta cum rationali totum medium efficiens.
13. Recta cum medio totum medium efficiens.

CXII.¹⁾

Quadratum rectae rationalis rectae ex duobus nominibus adplicatum latitudinem efficit apotomen, cuius nomina nominibus rectae ex duobus nominibus commensurabilia sunt praetereaue in eadem proportionem, et praeterea apotome ita orta eundem ordinem habebit ac recta ex duobus nominibus.

Sit A rationalis, $B\Gamma$ autem ex duobus nominibus, cuius maius nomen sit $A\Gamma$, et sit $B\Gamma \times EZ = A^2$. dico, EZ apotomen esse, cuius nomina rectis ΓA , $A B$ commensurabilia et in eadem proportionem sint, et praeterea rectam EZ eundem ordinem habere ac $B\Gamma$.

nam rursus sit $B A \times H = A^2$. iam quoniam est $B\Gamma \times EZ = B A \times H$, erit $\Gamma B : B A = H : EZ$ [VI, 16].



uerum $\Gamma B > B A$. itaque etiam $H > EZ$ [V, 16; V, 14].

1) Dubito, an haec propositio et sequentes Euclidis non sint. sed de hac re alibi uiderimus.

οὕτως ἡ H πρὸς τὴν EZ . μείζων δὲ ἡ ΓB τῆς $B\Delta$.
 μείζων ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ H τῆς EZ . ἔστω τῇ H ἴση
 ἡ $E\Theta$. ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ ΓB πρὸς τὴν $B\Delta$, οὕτως ἡ
 ΘE πρὸς τὴν EZ . διελόντι ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ $\Gamma\Delta$ πρὸς
 5 τὴν $B\Delta$, οὕτως ἡ ΘZ πρὸς τὴν ZE . γεγονέτω ὡς
 ἡ ΘZ πρὸς τὴν ZE , οὕτως ἡ ZK πρὸς τὴν KE . καὶ
 ὅλη ἄρα ἡ ΘK πρὸς ὅλην τὴν KZ ἐστὶν, ὡς ἡ ZK
 πρὸς KE . ὡς γὰρ ἐν τῶν ἡγουμένων πρὸς ἐν τῶν
 ἐπομένων, οὕτως ἅπαντα τὰ ἡγούμενα πρὸς ἅπαντα
 10 τὰ ἐπόμενα. ὡς δὲ ἡ ZK πρὸς KE , οὕτως ἐστὶν ἡ
 $\Gamma\Delta$ πρὸς τὴν ΔB . καὶ ὡς ἄρα ἡ ΘK πρὸς KZ , οὕτως ἡ
 $\Gamma\Delta$ πρὸς τὴν ΔB . σύμμετρον δὲ τὸ ἀπὸ τῆς $\Gamma\Delta$ τῷ
 ἀπὸ τῆς ΔB . σύμμετρον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΘK
 τῷ ἀπὸ τῆς KZ . καὶ ἐστὶν ὡς τὸ ἀπὸ τῆς ΘK πρὸς
 15 τὸ ἀπὸ τῆς KZ , οὕτως ἡ ΘK πρὸς τὴν KE , ἐπεὶ αἱ
 τρεῖς αἱ ΘK , KZ , KE ἀνάλογόν εἰσιν. σύμμετρος
 ἄρα ἡ ΘK τῇ KE μήκει. ὥστε καὶ ἡ ΘE τῇ EK
 σύμμετρος ἐστὶ μήκει. καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς A ἴσον
 ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν $E\Theta$, $B\Delta$, φητὸν δὲ ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς
 20 A , φητὸν ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν $E\Theta$, $B\Delta$. καὶ
 παρὰ φητὴν τὴν $B\Delta$ παράκειται. φητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ
 $E\Theta$ καὶ σύμμετρος τῇ $B\Delta$ μήκει. ὥστε καὶ ἡ σύμ-
 μετρος αὐτῇ ἡ EK φητὴ ἐστὶ καὶ σύμμετρος τῇ $B\Delta$
 μήκει. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ἡ $\Gamma\Delta$ πρὸς ΔB , οὕτως ἡ
 25 ZK πρὸς KE , αἱ δὲ $\Gamma\Delta$, ΔB δυνάμει μόνον εἰσι

1. μείζων — 2. ἔστω] in ras. V. 1. ΓB] $B\Gamma P$. 2.
 ἐστὶ] om. V. 3. ΓB] $B\Gamma PV$. 4. τήν] om. Bb. 5. τήν]
 om. Bb. ΔB FVb. τήν] om. BFb. γεγονέτω — 6.
 ZE] om. b. 6. τήν] om. BF. ZK] $KZ B$. τήν] om.
 BFb. 7. πρὸς] bis φ. 8. τήν KE FV. ὡς γὰρ] om. P,
 supra scr. V. τῶν] om. P. ἡγούμενον P. 10. τήν KE V.
 11. ΔB] $B\Delta F$. τήν KZ BFb. 12. ΔB] e corr. V.

sit $E\Theta = H$. itaque $\Gamma B : B\Delta = \Theta E : EZ$. quare dirimendo [V, 17] $\Gamma\Delta : B\Delta = \Theta Z : ZE$. fiat $\Theta Z : ZE = ZK : KE$. quare etiam $\Theta K : KZ = ZK : KE$; nam ut unum praecedentium ad unum sequentium, ita omnia praecedentia ad omnia sequentia [V, 12]. est autem $ZK : KE = \Gamma\Delta : \Delta B$. quare etiam $\Theta K : KZ = \Gamma\Delta : \Delta B$. uerum $\Gamma\Delta^2$, ΔB^2 commensurabilia sunt [prop. XXXVI]. itaque etiam ΘK^2 , KZ^2 commensurabilia sunt [VI, 20 coroll.; prop. XI]. est autem $\Theta K^2 : KZ^2 = \Theta K : KE$, quoniam tres rectae ΘK , KZ , KE proportionales sunt [V def. 9]. itaque ΘK , KE longitudine commensurabiles sunt [prop. XI]. quare etiam ΘE , EK longitudine commensurabiles sunt [prop. XV]. et quoniam $A^2 = E\Theta \times B\Delta$, et A^2 rationale est, etiam $E\Theta \times B\Delta$ rationale est. et rationali $B\Delta$ adplicatum est. itaque $E\Theta$ rationalis est et rectae $B\Delta$ longitudine commensurabilis [prop. XX]. quare etiam EK , quae ei commensurabilis est, rationalis est [def. 3] et rectae $B\Delta$ longitudine commensurabilis [prop. XII]. iam quoniam est $\Gamma\Delta : \Delta B = ZK : KE$, et $\Gamma\Delta$, ΔB potentia tantum commensurabiles sunt, etiam ZK , KE potentia tantum

$B\Delta$ F. 13. ΘK] $\Gamma\Delta$ φ. 14. KZ] ZK in ras. V. 15. Post KZ add. *ἐδείχθη γὰρ ὡς ἡ $\Gamma\Delta$ πρὸς ΔB , οὕτως ἡ ZK πρὸς $K\Theta$. ἀλλὰ καὶ ὡς ἡ $\Gamma\Delta$ πρὸς ΔB , οὕτως ἡ ΘK πρὸς KE . τρεῖς οὖν εὐθεῖαι εἰσιν ἀνάλογον πρώτῃ μὲν ἡ ΘK , δευτέρᾳ δὲ ἡ KZ , τρίτῃ ἡ KE . ἔστιν οὖν ὡς τὸ ἀπὸ τῆς πρώτης πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς δευτέρας εἶδος, οὕτως ἡ πρώτη πρὸς τὴν τρίτην, τουτέστιν ὡς τὸ ἀπὸ ΘK πρὸς τὸ ἀπὸ KZ b. τήν] om. b. 16. εἰσι BVb, comp. F. 17. ἄρα ἐστὶν BFb. ΘK] K e corr. V. Post *μῆκει* add. καὶ διαλόγου b, m. 2 F. ὥστε] -τε e corr. V. EK] $E\Theta$ b. 19. $E\Theta$] ΘE V. ἐστὶν L. 20. ἐστὶν L. ΔB LBFB, e corr. V. 21. ΔB BF. 22. Post ὥστε ras. 1 litt. V. 23. ἐστὶν L. ΔB F. 24. ὡς] om. L, supra scr. m. 2 B. 25. ZK] corr. ex ZH m. 2 F. δέ] m. 2 F. $\Gamma\Delta$] $\Delta\Gamma$ F. εἰσὶν L.*

σύμμετροι, καὶ αὖ ZK , KE δυνάμει μόνον εἰσὶ σύμμετροι. φητὴ δὲ ἐστὶν ἡ KE . φητὴ ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ ZK . αὖ ZK , KE ἄρα φηταὶ δυνάμει μένον εἰσὶ σύμμετροι· ἀποτομὴ ἄρα ἐστὶν ἡ EZ .

5 Ἦτοι δὲ ἡ $\Gamma\Delta$ τῆς ΔB μείζον δύνανται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ ἢ τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου.

~~Ἦτοι~~ Εἰ μὲν οὖν ἡ $\Gamma\Delta$ τῆς ΔB μείζον δύνανται τῷ ἀπὸ συμμέτρου [ἑαυτῇ], καὶ ἡ ZK τῆς KE μείζον δυνήσεται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ. καὶ εἰ μὲν σύμμετρός
10 ἐστὶν ἡ $\Gamma\Delta$ τῇ ἐκκειμένῃ φητῇ μήκει, καὶ ἡ ZK . εἰ δὲ ἡ $B\Delta$, καὶ ἡ KE . εἰ δὲ οὐδετέρα τῶν $\Gamma\Delta$, ΔB , καὶ οὐδετέρα τῶν ZK , KE .

Εἰ δὲ ἡ $\Gamma\Delta$ τῆς ΔB μείζον δύνανται τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ, καὶ ἡ ZK τῆς KE μείζον δυνήσεται
15 τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ. καὶ εἰ μὲν ἡ $\Gamma\Delta$ σύμμετρός ἐστι τῇ ἐκκειμένῃ φητῇ μήκει, καὶ ἡ ZK . εἰ δὲ ἡ $B\Delta$, καὶ ἡ KE . εἰ δὲ οὐδετέρα τῶν $\Gamma\Delta$, ΔB , καὶ οὐδετέρα τῶν ZK , KE . ὥστε ἀποτομὴ ἐστὶν ἡ ZE , ἧς τὰ ὀνόματα τὰ ZK , KE σύμμετρά ἐστι τοῖς
20 τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων ὀνόμασι τοῖς $\Gamma\Delta$, ΔB καὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, καὶ τὴν αὐτὴν τάξιν· ἔχει τῇ $B\Gamma$. ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

οἷγ'.

Τὸ ἀπὸ φητῆς παρὰ ἀποτομὴν παραβαλλό-
25 μενον πλάτος ποιεῖ τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων, ἧς

1. KE ἄρα LBF. 2. Post KE add. καὶ σύμμετρός τῇ $B\Delta$ μήκει LBFb. ἐστὶν ἄρα V. ἐστὶν LPB. 3. ZK] (prius) KZ BFb (de L non liquet). Deinde add. καὶ σύμμετρός τῇ $\Gamma\Delta$ μήκει LBFb. φηταὶ εἰσὶν L, φηταὶ εἰσι BFb. εἰσὶ] om. LBFb. 4. EZ] ZE in ras. V. 6. τῷ] supra scr. m. rec. V. συμμέτρου V, sed corr. 8. ἀσυμμέτρου L, et V, sed ἀ- eras. ἑαυτῇ] om. P. ZK] KZ B. 11. $B\Delta$] mut. in ΔB V, ΔB b. οὐδετέρα P. 12. καὶ — 13. ΔB] mg. m. 2 F. 12. οὐδετέρα P. KE] E in ras. m. 1 P. 13.

commensurabiles sunt [prop. XI]. uerum KE rationalis est; itaque etiam ZK rationalis est. itaque ZK , KE rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo EZ apotome est [prop. LXXIII].

Iam ΓA^2 excedit ΔB^2 quadrato rectae aut sibi commensurabilis aut incommensurabilis.

si igitur ΓA^2 excedit ΔB^2 quadrato rectae commensurabilis, etiam ZK^2 excedit KE^2 quadrato rectae sibi commensurabilis [prop. XIV]. et siue ΓA rationali propositae longitudine commensurabilis est, etiam ZK ei commensurabilis est [prop. XI, XII], siue BA , etiam KE [prop. XII], siue neutra rectarum ΓA , ΔB , neutra rectarum ZK , KE . sin ΓA^2 excedit ΔB^2 quadrato rectae sibi incommensurabilis, etiam ZK^2 excedit KE^2 quadrato rectae sibi incommensurabilis [prop. XIV]. et siue ΓA rationali propositae longitudine commensurabilis est, etiam ZK ei commensurabilis est, siue BA , etiam KE , siue neutra rectarum ΓA , ΔB , neutra rectarum ZK , KE . ergo ZE apotome est, cuius nomina ZK , KE nominibus ΓA , ΔB rectae ex duobus nominibus commensurabilia sunt et in eadem proportionem, et eundem ordinem habet ac BF [deff. alt. et tert.]; quod erat demonstrandum.

CXIII.

Quadratum rectae rationalis apotomae adplicatum latitudinem efficit rectam ex duobus nominibus, cuius

ΔB] BA ? L. 14. καὶ — 15. εἰς τὴν] om. P, mg. m. 2 V.
16. εἰσιν L. Ante ZK eras. H V. 17. οὐδετέρα V. 18. οὐδετέρα PVφ (non F). ὥστε] -s in ras. V. 19. τὰ] (alt.) om. P, m. 2 V. εἰσιν L. 20. ἐκ] ἐκ τῶν V. ὀνόμασιν LPBF. 21. ἔχει τὰς LBFb. $B\Gamma$] BB P. 23. εἰς] PL, εἰς' F, εἰς' b, εἰς' BV. 24. παρὰ] ἀπὸ L.


τὰ ὀνόματα σύμμετρά ἐστι τοῖς τῆς ἀποτομῆς ὀνόμασι καὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, ἔτι δὲ ἡ γινομένη ἐκ δύο ὀνομάτων τὴν αὐτὴν τάξιν ἔχει τῇ ἀποτομῇ.

- 5 Ἐστω φητὴ μὲν ἡ A , ἀποτομή δὲ ἡ $B\Delta$, καὶ τῷ ἀπὸ τῆς A ἴσον ἔστω τὸ ὑπὸ τῶν $B\Delta$, $K\Theta$, ὥστε τὸ ἀπὸ τῆς A φητῆς παρὰ τὴν $B\Delta$ ἀποτομὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ τὴν $K\Theta$. λέγω, ὅτι ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶν ἡ $K\Theta$, ἥς τὰ ὀνόματα σύμμετρά ἐστι
10 τοῖς τῆς $B\Delta$ ὀνόμασι καὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, καὶ ἔτι ἡ $K\Theta$ τὴν αὐτὴν ἔχει τάξιν τῇ $B\Delta$.

- Ἐστω γὰρ τῇ $B\Delta$ προσαρμόζουσα ἡ $\Delta\Gamma$. αἱ $B\Gamma$, $\Gamma\Delta$ ἄρα φηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι. καὶ τῷ ἀπὸ τῆς A ἴσον ἔστω καὶ τὸ ὑπὸ τῶν $B\Gamma$, H . φητὸν
15 δὲ τὸ ἀπὸ τῆς A φητὸν ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν $B\Gamma$, H . καὶ παρὰ φητὴν τὴν $B\Gamma$ παραβέβληται· φητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ H καὶ σύμμετρος τῇ $B\Gamma$ μήκει. ἐπεὶ οὖν τὸ ὑπὸ τῶν $B\Gamma$, H ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν $B\Delta$, $K\Theta$, ἀνάλογον ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ ΓB πρὸς $B\Delta$, οὕτως ἡ $K\Theta$ πρὸς H .
20 μείζων δὲ ἡ $B\Gamma$ τῆς $B\Delta$ · μείζων ἄρα καὶ ἡ $K\Theta$ τῆς H . κείσθω τῇ H ἴση ἡ KE · σύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ KE τῇ $B\Gamma$ μήκει. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ ΓB πρὸς $B\Delta$, οὕτως ἡ ΘK πρὸς KE , ἀναστρέψαντι ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ $B\Gamma$ πρὸς τὴν $\Gamma\Delta$, οὕτως ἡ $K\Theta$ πρὸς ΘE . γεγυμένω
25 ὡς ἡ $K\Theta$ πρὸς ΘE , οὕτως ἡ ΘZ πρὸς ZE · καὶ λοιπῇ

1. ἐστὶν L. 2. ὀνόμασιν PLBF. γιγνομένη LBb, γενομένη PVφ. 3. ἔχει] supra add. ξ m. 2 B. 6. Δ] ΔB b. ὥστε] -ε in ras. V. 7. $B\Delta$] ΔB φ. 8. ποιεῖν LFB, e corr. m. 1 B. ὅτι] ὅτι καὶ PV. 9. ἐστὶ] ἐστὶν L. 10. ὀνόμασιν PLBF. ἔτι] ὅτι LFBb. 11. ἔξει LB. 13. εἰσιν L. 14. καὶ] om. LBFVb. 15. H] m. 2 F. 18. ἐστὶν PV, om. LFBb. 19. ΓB] $B\Gamma$ PV. 20. τῆς] (prius) πρὸς b.

nomina nominibus apotomes commensurabilia sunt et in eadem proportionione, et praeterea recta ex duobus nominibus ita orta eundem ordinem habet atque apotome.



Sit A rationalis, $B\Delta$ autem apotome, et sit $B\Delta \times K\Theta = A^2$, ita ut quadratum rectae rationalis A apotomae $B\Delta$ adplicatum latitudinem efficiat $K\Theta$. dico, $K\Theta$ ex duobus nominibus esse, cuius nomina nominibus rectae $B\Delta$ commensurabilia sint et in eadem proportionione, et praeterea $K\Theta$ eundem ordinem habere ac $B\Delta$.

nam $A\Gamma$ rectae $B\Delta$ congruens sit. itaque $B\Gamma$, $\Gamma\Delta$ rationales sunt potentia tantum commensurabiles [prop. LXXIII]. sit etiam $B\Gamma \times H = A^2$. uerum A^2 rationale est. itaque etiam $B\Gamma \times H$ rationale est. et rationali $B\Gamma$ adplicatum est. itaque H rationalis est et rectae $B\Gamma$ longitudine commensurabilis [prop. XX]. iam quoniam est $B\Gamma \times H = B\Delta \times K\Theta$, erit [VI, 16] $\Gamma B : B\Delta = K\Theta : H$. est autem $B\Gamma > B\Delta$. itaque etiam $K\Theta > H$ [V, 16; V, 14]. ponatur $KE = H$. itaque KE , $B\Gamma$ longitudine commensurabiles sunt. et quoniam est $\Gamma B : B\Delta = \Theta K : KE$, conuertendo [V, 19 coroll.] est $B\Gamma : \Gamma\Delta = K\Theta : \Theta E$. fiat $K\Theta : \Theta E = \Theta Z : ZE$. itaque etiam $KZ : Z\Theta = K\Theta : \Theta E = B\Gamma : \Gamma\Delta$ [V, 19]. uerum $B\Gamma$, $\Gamma\Delta$ potentia tantum commensurabiles sunt. itaque etiam KZ , $Z\Theta$ potentia tantum commensura-

$\alpha\theta\alpha$ ἐστὶ BFb. 21. KE] e corr. V, EK P. 22. $\tau\eta\nu$ $B\Delta$ BFb. 23. $\tau\eta\nu$ KE BFb. 25. $K\Theta$] corr. ex. KH m. 2 F.

ἄρα ἡ KZ πρὸς $Z\Theta$ ἐστίν, ὡς ἡ $K\Theta$ πρὸς ΘE , τουτ-
 ἐστίν [ὡς] ἡ $B\Gamma$ πρὸς $\Gamma\Delta$. αἱ δὲ $B\Gamma$, $\Gamma\Delta$ δυνάμει
 μόνον [εἰσὶ] σύμμετροι· καὶ αἱ KZ , $Z\Theta$ ἄρα δυνάμει
 μόνον εἰσὶ σύμμετροι. καὶ ἐπεὶ ἐστίν ὡς ἡ $K\Theta$ πρὸς
 5 ΘE , ἡ KZ πρὸς $Z\Theta$, ἀλλ' ὡς ἡ $K\Theta$ πρὸς ΘE , ἡ ΘZ
 πρὸς ZE , καὶ ὡς ἄρα ἡ KZ πρὸς $Z\Theta$, ἡ ΘZ πρὸς
 ZE . ὥστε καὶ ὡς ἡ πρώτη πρὸς τὴν τρίτην, τὸ ἀπὸ
 τῆς πρώτης πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς δευτέρας· καὶ ὡς ἄρα ἡ
 KZ πρὸς ZE , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς KZ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς
 10 $Z\Theta$. σύμμετρον δὲ ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς KZ τῷ ἀπὸ τῆς
 $Z\Theta$. αἱ γὰρ KZ , $Z\Theta$ δυνάμει εἰσὶ σύμμετροι· σύμ-
 μετρος ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ KZ τῇ ZE μήκει· ὥστε ἡ KZ
 καὶ τῇ KE σύμμετρος [ἐστὶ] μήκει. ῥητὴ δὲ ἐστίν ἡ
 KE καὶ σύμμετρος τῇ $B\Gamma$ μήκει· ῥητὴ ἄρα καὶ ἡ
 15 KZ καὶ σύμμετρος τῇ $B\Gamma$ μήκει. καὶ ἐπεὶ ἐστίν ὡς
 ἡ $B\Gamma$ πρὸς $\Gamma\Delta$, οὕτως ἡ KZ πρὸς $Z\Theta$, ἐναλλάξ ὡς
 ἡ $B\Gamma$ πρὸς KZ , οὕτως ἡ $\Delta\Gamma$ πρὸς $Z\Theta$. σύμμετρος
 δὲ ἡ $B\Gamma$ τῇ KZ · σύμμετρος ἄρα καὶ ἡ $Z\Theta$ τῇ $\Gamma\Delta$
 μήκει. αἱ $B\Gamma$, $\Gamma\Delta$ δὲ ῥηταὶ εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμ-
 20 μετροι· καὶ αἱ KZ , $Z\Theta$ ἄρα ῥηταὶ εἰσὶ δυνάμει μόνον
 σύμμετροι· ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶν ἄρα ἡ $K\Theta$.

Εἰ μὲν οὖν ἡ $B\Gamma$ τῆς $\Gamma\Delta$ μείζον δύνатаι τῷ ἀπὸ
 συμμέτρου ἐαυτῇ, καὶ ἡ KZ τῆς $Z\Theta$ μείζον δυνήσεται
 τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἐαυτῇ. καὶ εἰ μὲν σύμμετρος ἐστίν
 25 ἡ $B\Gamma$ τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ μήκει, καὶ ἡ KZ , εἰ δὲ ἡ

1. $Z\Theta$] ΘZ F et in ras. V. ΘE] corr. ex ZE V. τουτ-
 ἐστίν — 2. πρὸς] in ras. V. 2. ὡς] om. P, supra scr. V.
 δέ] om. BF. $\Gamma\Delta$] $\Gamma\Delta$, ΔE BF. 3. εἰσὶ] om. P V. σύμ-
 μετροι — 4. εἰσὶ] mg. m. 2 B. 3. KZ] ZK P. 5. $Z\Theta$] ΘZ in ras. V. ΘZ] in ras. m. rec. B. 6. $Z\Theta$] in ras. m.
 rec. B, " ΘZ b. οὕτως ἡ B. ΘZ] $Z\Theta$ b. 7. ZE] EZ F.
 ὥστε] -ε in ras. V. ὡς] m. 2 F. οὕτως τό BFb. 8.
 πρώτης] eras. F. πρὸς — δευτέρας] mg. m. 2 F. 9. ZE]

biles sunt [prop. XI]. et quoniam est $K\Theta:\Theta E = KZ:Z\Theta$,
 $K\Theta:\Theta E = \Theta Z:ZE$, erit etiam

$$KZ:Z\Theta = \Theta Z:ZE.$$

quare etiam ut primum ad tertium, ita quadratum
 primi ad quadratum secundi [V def. 9]. itaque etiam
 $KZ:ZE = KZ^2:Z\Theta^2$. uerum KZ^2 , $Z\Theta^2$ commensu-
 rabilia sunt; nam KZ , $Z\Theta$ potentia commensurabiles
 sunt. itaque etiam KZ , ZE longitudine commensu-
 rabiles sunt [prop. XI]. quare etiam KZ , KE longi-
 tudine commensurabiles sunt [prop. XV]. KE autem
 rationalis est et rectae $B\Gamma$ longitudine commensura-
 bilis. itaque etiam KZ rationalis est et rectae $B\Gamma$
 longitudine commensurabilis [prop. XII]. et quoniam
 est $B\Gamma:\Gamma\Delta = KZ:Z\Theta$, permutando [V, 16] est
 $B\Gamma:KZ = \Delta\Gamma:Z\Theta$. uerum $B\Gamma$, KZ commensura-
 biles sunt. itaque etiam $Z\Theta$, $\Delta\Gamma$ longitudine com-
 mensurabiles sunt [prop. XI]. $B\Gamma$, $\Gamma\Delta$ autem ratio-
 nales sunt potentia tantum commensurabiles. itaque
 etiam KZ , $Z\Theta$ rationales sunt [def. 3] potentia tantum
 commensurabiles [prop. XIII]. ergo $K\Theta$ ex duobus
 nominibus est [prop. XXXVI].

Iam si $B\Gamma^2$ excedit $\Gamma\Delta^2$ quadrato rectae sibi com-
 mensurabilis, etiam KZ^2 excedit $Z\Theta^2$ quadrato rectae
 sibi commensurabilis [prop. XIV]. et siue $B\Gamma$ rationali
 propositae longitudine commensurabilis est, etiam KZ

corr. ex $Z\Theta$ P. 11. γάρ] ἄρα B. 12. τῇ] τῆς Vb. ὥστε]
 -ε in ras. V, ὥστε καὶ b. 13. ἐστε] om. PV. 14. ἀσύμ-
 μετρος b. 16. πρὸς] (prius) bis b. 17. οὐτως — 18. KZ]
 bis F. 17. ΔΓ] ΓΔ P. 18. ZΘ] in ras. V, ΘΖ P. ΓΔ]
 in ras. V, ΔΓ P. 19. αὖ] αὖ δέ V. δέ] om. FV, ΔΕ Bb.
 20. καὶ — 21. KΘ] mg. m. 1 V. 20. KZ] KΘ B. 21.
 δύο ἄρα Bfb. ἄρα] om. Bfb. 22. ΓΔ] ΒΔ Pfb et B
 eras. V. 23. ἀσύμμετρον F, sed corr. 24. ἀσύμμετρον P.

$\Gamma\Delta$ σύμμετρός ἐστι τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ μήκει, καὶ ἡ $Z\Theta$, εἰ δὲ οὐδετέρα τῶν $B\Gamma$, $\Gamma\Delta$, οὐδετέρα τῶν KZ , $Z\Theta$.

Εἰ δὲ ἡ $B\Gamma$ τῆς $\Gamma\Delta$ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ
 5 ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ, καὶ ἡ KZ τῆς $Z\Theta$ μείζον δυνή-
 σεται τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ. καὶ εἰ μὲν σύμμετρός
 ἐστὶν ἡ $B\Gamma$ τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ μήκει, καὶ ἡ KZ , εἰ
 δὲ ἡ $\Gamma\Delta$, καὶ ἡ $Z\Theta$, εἰ δὲ οὐδετέρα τῶν $B\Gamma$, $\Gamma\Delta$,
 οὐδετέρα τῶν KZ , $Z\Theta$.

10 Ἐκ δύο ἄρα ὀνομάτων ἐστὶν ἡ $K\Theta$, ἥς τὰ ὀνόματα
 τὰ KZ , $Z\Theta$ σύμμετρά [ἐστὶ] τοῖς τῆς ἀποτομῆς ὀνό-
 μασι τοῖς $B\Gamma$, $\Gamma\Delta$ καὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, καὶ ἔτι ἡ
 $K\Theta$ τῇ $B\Gamma$ τὴν αὐτὴν ἔξει τάξιν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

ριδ'.

15 Ἐὰν χωρίον περιέχεται ὑπὸ ἀποτομῆς καὶ
 τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων, ἥς τὰ ὀνόματα σύμ-
 μετρά τέ ἐστι τοῖς τῆς ἀποτομῆς ὀνόμασι καὶ
 ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, ἡ τὸ χωρίον δυναμένη ῥητὴ
 ἐστὶν.

20 Περιχέσθω γὰρ χωρίον τὸ ὑπὸ τῶν AB , $\Gamma\Delta$ ὑπὸ
 ἀποτομῆς τῆς AB καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων τῆς $\Gamma\Delta$,
 ἥς μείζον ὄνομα ἔστω τὸ ΓE , καὶ ἔστω τὰ ὀνόματα
 τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων τὰ ΓE , $E\Delta$ σύμμετρά τε τοῖς
 τῆς ἀποτομῆς ὀνόμασι τοῖς AZ , ZB καὶ ἐν τῷ αὐτῷ

1. $\Gamma\Delta$] $\Delta\Gamma$ B et e corr. V. 2. $B\Gamma$ — τῶν] postea add.
 m. 1 P. Post $\Gamma\Delta$ add. καὶ b, m. 2 F. 4. δύνηται Bb.
 5. συμμέτρου V, sed. corr. KZ] Z e corr. V, KΔ P. ZΘ]
 ΘZ in ras. V. 6. συμμέτρου V, sed. corr. 7. ἐστὶν] m.
 2 F. 8. ZΘ] ΘZ F. $\Gamma\Delta$ καὶ b. 11. σύμμετα B. ἐστὶ]
 om. P, supra scr. V. ὀνόμασιν B. 13. BΓ] BΔ PFB.
 ὅπερ ἔδει δεῖξαι] om. BFB. 14. ριε' b et e corr. F,
 ρις' BV. 17. τε] om. BFB. ὀνόμασιν PFB. 19. ἐστι

ei commensurabilis est [prop. XII], siue $\Gamma\Delta$ rationali propositae longitudine commensurabilis est, etiam $Z\Theta$ ei commensurabilis est [id.], siue neutra rectarum $B\Gamma$, $\Gamma\Delta$, etiam neutra rectarum KZ , $Z\Theta$ [prop. XIII]. sin $B\Gamma^2$ excedit $\Gamma\Delta^2$ quadrato rectae sibi incommensurabilis, etiam KZ^2 excedit $Z\Theta^2$ quadrato rectae sibi incommensurabilis [prop. XIV]. et siue $B\Gamma$ rationali propositae longitudine commensurabilis est, etiam KZ ei commensurabilis est, siue $\Gamma\Delta$, etiam $Z\Theta$ [prop. XII], siue neutra rectarum $B\Gamma$, $\Gamma\Delta$, neutra rectarum KZ , $Z\Theta$.


Ergo $K\Theta$ ex duobus nominibus est, cuius nomina KZ , $Z\Theta$ nominibus apotomes $B\Gamma$, $\Gamma\Delta$ commensurabilia sunt et in eadem proportionem, et praeterea $K\Theta$ eundem ordinem habet ac $B\Gamma$ [cfr. deff. alt. et tert.]; quod erat demonstrandum.

CXIV.

Si spatium comprehenditur apotome et recta ex duobus nominibus, cuius nomina nominibus apotomes et commensurabilia sunt et in eadem proportionem,

recta spatio aequalis quadrata rationalis est.

Spatium enim $AB \times \Gamma\Delta$ comprehendatur apotome AB et recta ex duobus nominibus $\Gamma\Delta$, cuius nomen maius sit ΓE , et ΓE , $E\Delta$ nomina rectae ex duobus nominibus nominibus apotomes AZ , ZB et commensurabilia sint et in eadem



B, comp. FVb.
(prius) $\xi\sigma\tau\iota$ BFb.
24. $\acute{\alpha}\nu\acute{\omicron}\mu\alpha\sigma\iota\nu$ B.

20. $\gamma\acute{\alpha}\rho$] corr. ex $\tau\acute{o}$ m. 1 V. 22. $\xi\sigma\tau\omega$] $\tau\epsilon$] m. 2 B.
23. $E\Delta$] Δ e corr. m. 1 b.

λόγῳ, καὶ ἔστω ἡ τὸ ὑπὸ τῶν AB , ΓA δυναμένη ἡ H λέγῳ, ὅτι ρητὴ ἐστὶν ἡ H .

Ἐκκείσθω γὰρ ρητὴ ἡ Θ , καὶ τῷ ἀπὸ τῆς Θ ἴσον παρὰ τὴν ΓA παραβελήσθω πλάτος ποιοῦν τὴν KA .
 5 ἀποτομὴ ἄρα ἐστὶν ἡ KA , ἥς τὰ ὀνόματα ἔστω τὰ KM , MA σύμμετρα τοῖς τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων ὀνόμασι τοῖς GE , EA καὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ. ἀλλὰ καὶ αἱ GE , EA σύμμετροί τε εἰσι ταῖς AZ , ZB καὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ· ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ AZ πρὸς τὴν ZB ,
 10 οὕτως ἡ KM πρὸς MA . ἐναλλάξ ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ AZ πρὸς τὴν KM , οὕτως ἡ BZ πρὸς τὴν AM · καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ AB πρὸς λοιπὴν τὴν KA ἐστὶν ὡς ἡ AZ πρὸς KM . σύμμετρος δὲ ἡ AZ τῇ KM · σύμμετρος ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ AB τῇ KA . καὶ ἐστὶν ὡς ἡ AB πρὸς
 15 KA , οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν ΓA , AB πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΓA , KA · σύμμετρον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΓA , AB τῷ ὑπὸ τῶν ΓA , KA . ἴσον δὲ τὸ ὑπὸ τῶν ΓA , KA τῷ ἀπὸ τῆς Θ · σύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΓA , AB τῷ ἀπὸ τῆς Θ . τῷ δὲ ὑπὸ τῶν ΓA , AB ἴσον ἐστὶ τὸ
 20 ἀπὸ τῆς H · σύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς H τῷ ἀπὸ τῆς Θ . ρητὸν δὲ τὸ ἀπὸ τῆς Θ · ρητὸν ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς H · ρητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ H . καὶ δύναται τὸ ὑπὸ τῶν ΓA , AB .

Ἐὰν ἄρα χωρίον περιέχεται ὑπὸ ἀποτομῆς καὶ τῆς
 25 ἐκ δύο ὀνομάτων, ἥς τὰ ὀνόματα σύμμετρά ἐστι τοῖς τῆς ἀποτομῆς ὀνόμασι καὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, ἡ τὸ χωρίον δυναμένη ρητὴ ἐστὶν.

1. ἡ] om. BFb. ἡ] e corr. V. H] HA b. 3. Θ] (prius) BΘ F. 4. τὴν] (prius) m. 2 F. 6. τῆς ἐκ] ἐκ τῶν V. 7. ἀλλὰ — 9. λόγῳ] mg. m. 1 F. 8. τοῖς b. 9. AZ] corr. ex AG V. 11. BZ] ZB B. 12. ἡ] (prius) post ras. 1 litt. F. 13. πρὸς — AZ] om. F. τὴν KM BFb.

proportione, et sit $H^2 = AB \times \Gamma A$. dico, H rationalem esse.

ponatur enim rationalis Θ , et spatium quadrato Θ^2 aequale rectae ΓA adplicetur latitudinem efficiens KA . itaque KA apotome est, cuius nomina sint KM , MA commensurabilia ΓE , EA nominibus rectae ex duobus nominibus et in eadem proportionem [prop. XCII]. uerum ΓE , EA etiam rectis AZ , ZB et commensurabilia sunt et in eadem proportionem. itaque $AZ:ZB = KM:MA$. quare permutando [V, 16] $AZ:KM = BZ:AM$. itaque etiam $AB:KA = AZ:KM$ [V, 19]. uerum AZ , KM commensurabiles sunt [prop. XII]. itaque etiam AB , KA commensurabiles sunt [prop. XI]. est autem $AB:KA = \Gamma A \times AB:\Gamma A \times KA$ [VI, 1]. itaque etiam $\Gamma A \times AB$ et $\Gamma A \times KA$ commensurabilia sunt [prop. IX]. uerum $\Gamma A \times KA = \Theta^2$. itaque $\Gamma A \times AB$ et Θ^2 commensurabilia sunt. est autem $H^2 = \Gamma A \times AB$. quare H^2 , Θ^2 commensurabilia sunt. uerum Θ^2 rationale est. itaque etiam H^2 rationale est. quare H rationalis est; et spatio $\Gamma A \times AB$ aequalis est quadrata.

Ergo si spatium comprehenditur apotome et recta ex duobus nominibus, cuius nomina nominibus apotomes et commensurabilia sunt et in eadem proportionem, recta spatio aequalis quadrata rationalis est.

14. *ἐστίν* B. *AB*] *KM* σύμμετρος ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ *AB* φ (et F?). 15. *τὴν KA* BFb. *οὕτω* B. *ΓA*] ante lacunam 2 litt. F, *AΓ* b. *AB*] *AB* b. *πρὸς τὸ* om. φ. 16. *τὸ* m. 2 V. 17. *τῶν*] (prius) om. P. 18. *Θ*] *ΘZ* B, sed corr. 19. *ἀπό*] corr. ex *ὑπό* m. 2 F. *τῶ*] corr. ex *τό* m. 1 F. *τό*] corr. ex *τῶ* m. 1 F. 20. *τὸ*] καὶ *τό* BFb. 22. *ἐκτὴ*] corr. ex *ἐκτόν* V. 25. *ἐστίν* P. 26. *ὀνόμασιν* PB. 27. *ἐστὶ* BV, comp. Fb. Deinde add. *ὅπερ ἔδει δεῖξαι* F.

Πόρισμα.

Καὶ γέγονεν ἡμῖν καὶ διὰ τούτου φανερόν, ὅτι
δυνατόν ἐστι φητὸν χωρίον ὑπὸ ἀλόγων εὐθειῶν περι-
έχεσθαι. ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

5

ριε'.

Ἀπὸ μέσης ἄπειροι ἄλογοι γίνονται, καὶ
οὐδεμία οὐδεμιᾶ τῶν πρότερον ἢ αὐτή.

Ἔστω μέση ἢ *A*. λέγω, ὅτι ἀπὸ τῆς *A* ἄπειροι
ἄλογοι γίνονται, καὶ οὐδεμία οὐδεμιᾶ τῶν πρότερον
10 ἢ αὐτή.

Ἐκκείσθω φητὴ ἢ *B*, καὶ τῷ ὑπὸ τῶν *B*, *A* ἴσον
ἔστω τὸ ἀπὸ τῆς *Γ*. ἄλογος ἄρα ἐστὶν ἢ *Γ*. τὸ γὰρ
ὑπὸ ἀλόγου καὶ φητῆς ἄλογόν ἐστιν. καὶ οὐδεμιᾶ τῶν
πρότερον ἢ αὐτή· τὸ γὰρ ἀπ' οὐδεμιᾶς τῶν πρότερον
15 παρὰ φητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ μέσην. πάλιν
δὴ τῷ ὑπο τῶν *B*, *Γ* ἴσον ἔστω τὸ ἀπὸ τῆς *Δ*. ἄλογον
ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς *Δ*. ἄλογος ἄρα ἐστὶν ἢ *Δ*. καὶ
οὐδεμιᾶ τῶν πρότερον ἢ αὐτή· τὸ γὰρ ἀπ' οὐδεμιᾶς
τῶν πρότερον παρὰ φητὴν παραβαλλόμενον πλάτος
20 ποιεῖ τὴν *Γ*. ὁμοίως δὴ τῆς τοιαύτης τάξεως ἐπ' ἄπειρον
προβαινούσης φανερόν, ὅτι ἀπὸ τῆς μέσης ἄπειροι
ἄλογοι γίνονται, καὶ οὐδεμία οὐδεμιᾶ τῶν πρότερον
ἢ αὐτή· ὅπερ ἔδει δεῖξαι].

1. πόρισμα] mg. PV, om. BFb. 4. ὅπερ ἔδει δεῖξαι]
om. BFb. 5. ριε'] om. V, ριε' b et corr. ex ριδ' F, ριζ' B.
6. γίνονται B, γ supra add. m. 1 P. 7. οὐδεμία] om.
PFVb. Post πρότερον add. δεκατριῶν ἀλόγων m. rec. F.
9. γίνονται PFB. οὐδεμία] om. PFVb. 10. ἢ] ἐστὶν ἢ BF.
11. Ante B ras. 1 litt. B. B, Δ] A, B F. 12. ἔστω] m. 2 F.
τό] (prius) τῷ F. 13. ἐστὶ PB, comp. FVb. 14. ἀπὸ B.
16. ἄλογον — 17. Δ (prius)] om. FV. 17. ἐστὶν P. τό — ἐστὶν]
om. P. ἄλογος — 18. αὐτή] in ras. m. 1 F. 18. ἀπὸ B.

Corollarium.

Et hinc quoque nobis adparuit, fieri posse, ut spatium rationale rectis irrationalibus comprehendatur. — quod erat demonstrandum.

CXV.

A media irrationales infinitae multitudinis oriuntur, et nulla eadem est atque ulla priorum.

Sit A media. dico, ab A irrationales infinitae multitudinis oriri et nullam eandem esse atque ullam priorum.

ponatur rationalis B , et sit $\Gamma^2 = B \times A$. itaque Γ irrationalis est [def. 4]; nam spatium recta irrationali et rationali comprehensum A ————
 B —————
 Γ ————
 A ————
 irrationalis est [prop. XX]. nec eadem est atque ulla priorum; neque enim ullius priorum quadratum rectae rationali adplicatum latitudinem efficit mediam. rursus sit $A^2 = B \times \Gamma$. itaque A^2 irrationale est [prop. XX]. quare A irrationalis est [def. 4]. nec eadem est atque ulla priorum; neque enim ullius priorum quadratum rectae rationali adplicatum latitudinem efficit Γ . iam hac ordinatione similiter in infinitum progrediente adparet, a media irrationales infinitae multitudinis oriri, et nullam eandem esse atque ullam priorum; quod erat demonstrandum.

20. τῆς τοιαύτης] τοῖς τῆς αὐτῆς φ. 21. προβαίνουσαι B, corr. m. 2. 22. γίνονται B. οὐδεμία] om. PFVb. 23. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] om. BFb, comp. P. Seq. additamenta quaedam, u. app. In fine libri Εὐκλείδου στοιχείων ἰ P, τέλος τοῦ ἰ τῶν Εὐκλείδου στοιχείων m. 2 B, τέλος τοῦ ἰ τῶν Εὐκλείδου στοιχείων τῆς Θέωνος ἐκδόσεως F, Εὐκλείδου λόγος ἰ τῆς Θέωνος ἐκδόσεως b.

1

2

3

4

APPENDIX.

1.

Ad libr. X prop. 1.

Ἄλλως τὸ α' θεωρημα.

Ἐκκείσθω δύο μεγέθη ἄνισα τὰ AB , Γ · καὶ ἐπεὶ
ἐλασσὸν ἐστὶ τὸ Γ , πολλαπλασιαζόμενον ἐστὶ ποτὲ τοῦ
 AB μεγέθους μείζον. γεγονέτω ὥς τὸ ZM καὶ διη-
5 ρήσθω εἰς $[\tau\acute{\alpha}]$ ἴσα τῷ Γ , καὶ ἔστω τὰ $M\Theta$, ΘH , HZ ,
καὶ ἀπὸ τοῦ AB ἀφηγήσθω μείζον ἢ τὸ ἥμισυ τὸ
 BE , καὶ ἀπὸ τοῦ EA μείζον ἢ τὸ ἥμισυ τὸ $E\Delta$, καὶ
τοῦτο ἀεὶ γινέσθω, ἕως αἱ ἐν τῷ ZM διαιρέσεις ἴσαι
γίνωνται ταῖς ἐν τῷ AB διαιρέσεσιν. γεγονέτωσαν
10 ὥς αἱ BE , $E\Delta$, ΔA , καὶ τῷ ΔA ἕκαστον τῶν KA ,
 AN , $N\Xi$ ἔστω ἴσον, καὶ τοῦτο γινέσθω, ἕως αἱ διαι-
ρέσεις τοῦ $K\Xi$ ἴσαι γίνωνται ταῖς τοῦ ZM .

Καὶ ἐπεὶ τὸ BE μείζον ἢ τὸ ἥμισυ ἐστὶ τοῦ BA ,
τὸ BE μείζον ἐστὶ τοῦ EA · πολλῷ ἄρα μείζον ἐστὶ
15 τοῦ ΔA . ἀλλὰ τὸ ΔA ἴσον ἐστὶ τῷ ΞN · τὸ BE ἄρα
μείζον ἐστὶ τοῦ $N\Xi$. πάλιν, ἐπεὶ τὸ $E\Delta$ μείζον ἢ τὸ
ἥμισυ ἐστὶ τοῦ EA , μείζον ἐστὶ τοῦ ΔA . ἀλλὰ τὸ
 ΔA ἐστὶν ἴσον τῷ NA · τὸ $E\Delta$ ἄρα μείζον ἐστὶ τοῦ

1. Post ἀφαιρούμενα p. 6, 10 habent BFVb, mg. m. 1
postea add. P.


1. τὸ α' θεωρημα] om. V, τὸ αὐτό BFb (mg. α B). 2.
κείσθω V. 3. ἐλάττων F. 5. τὰ] (prius) om. P. Γ] corr.
ex AB . καὶ ἔστω] om. FVb. HZ] IZ F. 6. ἦ] m.
2 P. 7. BE] in ras. V. καὶ — $E\Delta$] mg. m. 2 V. EA]

1.


Ad libr. X prop. 1.

Aliter primum theorema.

Ponantur duae magnitudines inaequales AB , Γ .
et quoniam est $\Gamma < AB$, multiplicata aliquando Γ



maior erit magnitudine AB . fiat
 ZM et in partes magnitudini Γ
aequales diuidatur, et sint $M\Theta$,
 ΘH , HZ , et ab AB auferatur
 BE maior dimidia et ab EA



maior dimidia $E\Delta$, et hoc semper deinceps fiat, donec
diuisiones rectae ZM diuisionibus rectae AB numero
aequales sint. sint BE , $E\Delta$, ΔA , et sit

$$KA = AN = N\Xi = \Delta A,$$

et hoc fiat, donec diuisiones magnitudinis $K\Xi$ diui-
sionibus rectae ZM numero aequales sint.

et quoniam $BE > \frac{1}{2}BA$, erit $BE > EA$. itaque
multo magis $BE > \Delta A$. uerum $\Delta A = \Xi N$. itaque
 $BE > N\Xi$. rursus quoniam $E\Delta > \frac{1}{2}EA$, erit $E\Delta > \Delta A$.
uerum $\Delta A = NA$. itaque $E\Delta > NA$. itaque tota

AE P. 8. $\acute{\alpha}\sigma\lambda$] om. BFVb. $\gamma\gamma\nu\acute{\epsilon}\sigma\theta\omega$ F. 9. $\delta\iota\alpha\iota\rho\acute{\epsilon}\sigma\sigma\epsilon\iota$
BFVb. 10. $\tau\omega$] corr. ex τό m. 2 V. 11. $\gamma\gamma\nu\acute{\epsilon}\sigma\theta\omega$ φ. $\xi\omega\varsigma$] $\xi\omega\varsigma$ $\acute{\alpha}\nu$ V φ. $\acute{\alpha}\lambda$] om. φ. 12. $\gamma\acute{\epsilon}\nu\omicron\nu\tau\alpha\iota$ P φ. $\tau\alpha\iota\varsigma$] $\epsilon\iota\varsigma$
 $\tau\acute{\alpha}\varsigma$ φ. 13. BA] corr. ex AB m. 2 V. 14. $\tau\acute{o}$] $\tau\acute{o}$ $\delta\acute{\epsilon}$ B,
 $\tau\omicron\upsilon$ φ. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$] (prius) om. F. 16. $\tau\omicron\upsilon$ — $\mu\epsilon\iota\zeta\omicron\nu$] om. B.
17. $\tau\omicron\upsilon$ ΔA — 18. $\iota\sigma\omicron\nu$] $\tau\acute{o}$ EA — $\mu\epsilon\iota\zeta\omicron\nu$ $\delta\acute{\epsilon}$ $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ $\tau\acute{o}$ ΔA φ.
18. $\iota\sigma\omicron\nu$ $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ Vb. $E\Delta$] in ras. V.

NA . ὅλον ἄρα τὸ AB μείζον ἐστὶ τοῦ ΞA . ἴσον
 δὲ τὸ AA τῷ AK . ὅλον ἄρα τὸ BA μείζον ἐστὶ
 τοῦ ΞK . ἀλλὰ τοῦ BA μείζον ἐστὶ τὸ MZ . πολλῶ
 ἄρα τὸ MZ μείζον ἐστὶ τοῦ ΞK . καὶ ἐπεὶ τὰ ΞN ,
 5 NA , AK ἴσα ἀλλήλοις ἐστίν, ἐστὶ δὲ καὶ τὰ $M\Theta$, ΘH ,
 HZ ἴσα ἀλλήλοις, καὶ ἐστὶν ἴσον το πλῆθος τῶν ἐν
 τῷ MZ τῷ πλήθει τῶν ἐν τῷ ΞK , ἐστὶν ἄρα ὡς τὸ
 KA πρὸς τὸ ZH , οὕτως τὸ $K\Xi$ πρὸς τὸ ZM . μείζον
 δὲ τὸ ZM τοῦ $K\Xi$. μείζον ἄρα καὶ τὸ HZ τοῦ AK .
 10 καὶ ἐστὶ τὸ μὲν ZH ἴσον τῷ Γ , τὸ δὲ KA τῷ AD .
 τὸ Γ ἄρα μείζον ἐστὶ τοῦ AD . ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

2.

Ad libr. X prop. 6.

Ἄλλως τὸ ε'.

Δύο γὰρ μεγέθη τὰ A , B πρὸς ἄλληλα λόγον ἔχτω,
 ὃν ἀριθμὸς ὁ Γ πρὸς ἀριθμὸν τὸν Δ . λέγω, ὅτι σύμ-
 15 μετρὰ ἐστὶ τὰ μεγέθη.

Ὅσαι γὰρ εἰσιν ἐν τῷ Γ μονάδες, εἰς τοσαῦτα ἴσα
 διηγήσθω τὸ A , καὶ ἐνὶ αὐτῶν ἴσον ἔστω τὸ E . ἐστὶν
 ἄρα ὡς ἡ μονὰς πρὸς τὸν Γ ἀριθμὸν, τὸ E πρὸς τὸ A .
 ἐστὶ δὲ καὶ ὡς ὁ Γ πρὸς τὸν Δ , τὸ A πρὸς τὸ B .
 20 δι' ἴσον ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ μονὰς πρὸς τὸν Δ , τὸ E
 πρὸς τὸ B . μετρεῖ δὲ καὶ ἡ μονὰς τὸν Δ . μετρεῖ
 ἄρα καὶ τὸ E τὸ B . μετρεῖ δὲ καὶ τὸ E τὸ A , ἐπεὶ
 καὶ ἡ μονὰς τὸν Γ . τὸ E ἄρα ἐκάτερον τῶν A , B

2. Post δεῖξαι p. 22, 2 B F V b, mg. m. 1 P.

1. AB] BA P. 2. τό] (prius) τῷ B. τῷ] τοῦ b. 3.
 τό] corr. ex τοῦ m. 1 F. 4. μείζον ἐστὶ τὸ MZ b. 5. AK]
 KA in ras. V. 6. HZ] ZH F. τῶν ἐν τῷ MZ] m. 2 V.
 7. τῷ] (alt.) ἴσον τῷ P B F b. ΞK] Ξ in ras. V. 8. τό]

$\angle B > \angle A$. est autem $\angle A = \angle K$. itaque tota $BA > \angle K$. uerum $MZ > BA$. itaque multo magis $MZ > \angle K$. et quoniam $\angle N = NA = \angle K$, et $M\Theta = \Theta H = HZ$, et numerus partium rectae MZ numero partium rectae $\angle K$ aequalis est, erit

$$KA : ZH = K\angle : ZM$$

[V, 15]. est autem $ZM > K\angle$. itaque etiam $HZ > \angle K$ [V, 14]. et $ZH = \Gamma$, $KA = A\angle$. ergo $\Gamma > A\angle$; quod erat demonstrandum.

2.

Ad libr. X prop. 6.

Aliter propositio VI.

Duae enim magnitudines A , B rationem inter se habeant, quam numerus Γ ad numerum \angle . dico, magnitudines commensurabiles esse.

A ————— |
 B ————— | E ——— |
 Γ ————— | \angle ————— |

nam quot sunt in Γ unitates, in totidem partes aequales diuidatur A , et unicarum aequalis sit E . itaque $1 : \Gamma = E : A$ [V, 15]. uerum etiam $\Gamma : \angle = A : B$. itaque ex aequo est [V, 22] $1 : \angle = E : B$. unitas autem \angle metitur. itaque etiam E magnitudinem B metitur. uerum etiam magnitudinem A metitur E , quoniam unitas numerum Γ metitur. itaque E utramque A , B metitur. ergo A , B commensurabiles sunt, et

(primum) om. F. $K\angle$] corr. ex $\angle K$ m. 2 V. 10. $A\angle$] A V e corr. 12. $\tau\acute{o}$] $\tau\acute{o}$ $\alpha\upsilon\tau\acute{o}$ F. 15. $\epsilon\lambda\acute{o}\iota$ F. 18. $\tau\acute{o}\nu$ A PB.

19. $\tau\acute{o}\nu$] $\tau\acute{o}$ FV, om. b. A] B ϕ . $\tau\acute{o}$] $\tau\acute{o}\nu$ B. B] A F.

21. $\tau\acute{o}\nu$ B B. $\kappa\alpha\iota$] om. FV b. \angle] m. 2 F, seq. $\acute{\alpha}\rho\iota\theta\mu\acute{o}\nu$ corr. ex $\acute{\alpha}\rho\iota\theta\mu\acute{o}\varsigma$. 22. $\mu\epsilon\tau\rho\epsilon\iota$ $\delta\acute{\epsilon}$ — $\acute{\epsilon}\pi\epsilon\iota$] om. PB, $\acute{\epsilon}\mu\acute{\epsilon}\tau\rho\epsilon\iota$ $\delta\acute{\epsilon}$ $\kappa\alpha\iota$ $\tau\acute{o}$ A , $\acute{\epsilon}\pi\epsilon\iota$ $\kappa\alpha\iota$ η $\mu\omicron\nu\acute{\alpha}\varsigma$ $\tau\acute{o}\nu$ Γ mg. m. 2 B.

μετρεῖ· τὰ A, B ἄρα σύμμετρά ἐστιν, καὶ ἐστὶν αὐτῶν κοινὸν μέτρον τὸ E · ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

3.

Ad libr. X prop. 9.

Ἄλλως τὸ θ' .

Ἐπεὶ γὰρ σύμμετρός ἐστιν ἡ A τῇ B , λόγον ἔχει,
 5 ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν. ἐχέτω, ὃν ὁ Γ πρὸς τὸν
 Δ , καὶ ὁ Γ ἑαυτὸν μὲν πολλαπλασιάσας τὸν E ποιεῖτω,
 ὁ δὲ Γ τὸν Δ πολλαπλασιάσας τὸν Z ποιεῖτω, ὁ δὲ
 Δ ἑαυτὸν πολλαπλασιάσας τὸν H ποιεῖτω. ἐπεὶ οὖν
 ὁ Γ ἑαυτὸν μὲν πολλαπλασιάσας τὸν E πεποίηκεν,
 10 τὸν δὲ Δ πολλαπλασιάσας τὸν Z πεποίηκεν, ἔστιν ἄρα
 ὡς ὁ Γ πρὸς τὸν Δ , τουτέστιν ὡς ἡ A πρὸς τὴν B ,
 [οὕτως] ὁ E πρὸς τὸν Z . ἀλλ' ὡς ἡ A πρὸς τὴν B ,
 οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς A πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν A, B · ἔστιν
 ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ τῆς A πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν A, B , οὕτως
 15 ὁ E πρὸς τὸν Z . πάλιν, ἐπεὶ ὁ Δ ἑαυτὸν πολλα-
 πλασιάσας τὸν H πεποίηκεν, ὁ δὲ Γ τὸν Δ πολλα-
 πλασιάσας τὸν Z πεποίηκεν, ἔστιν ἄρα ὡς ὁ Γ πρὸς
 τὸν Δ , τουτέστιν ὡς ἡ A πρὸς τὴν B , οὕτως ὁ Z
 πρὸς τὸν H . ἀλλ' ὡς ἡ A πρὸς τὴν B , οὕτως τὸ
 20 ὑπὸ τῶν A, B πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς B · ἔστιν ἄρα ὡς τὸ
 ὑπὸ τῶν A, B πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς B , οὕτως ὁ Z πρὸς
 τὸν H . ἀλλ' ὡς τὸ ἀπὸ τῆς A πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν A, B ,
 οὕτως ἦν ὁ E πρὸς τὸν Z · δι' ἴσου ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ
 τῆς A πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς B , οὕτως ὁ E πρὸς τὸν H .
 25 ἔστι δὲ ἐκάτερος τῶν E, H τετράγωνος· ὁ μὲν γὰρ E

3. Post ἀριθμὸν p. 32, 3 BFVb, mg. m. 1 P.

1. ἐστὶν] (prius) ἐστι BV, comp. Fb. 2. ὅπερ ἔδει δεῖξαι]
 comp. F?, om. BVb. 3. τὸ θ'] om. B. 5. Γ πρὸς τὸν Δ]

communis earum mensura est E ; quod erat demonstrandum.

3.

Ad libr. X prop. 9.

Aliter propositio IX.

Nam quoniam A, B commensurabiles sunt, rationem habent, quam numerus ad numerum [prop. VI]. sit

A ——— ——— ——— ———	$A : B = \Gamma : \Delta$, et Γ se ipsum
B ——— ——— ———	multiplicans efficiat E , Γ autem
Γ ———	numerus Δ multiplicans Z , Δ
Δ ———	autem se ipsum multiplicans H .
E ———	iam quoniam est $\Gamma \times \Gamma = E$,
Z ———	$\Gamma \times \Delta = Z$, erit $\Gamma : \Delta = E : Z$
H ———	[VII, 17], hoc est $E : Z = A : B$.

uerum $A : B = A^2 : A \times B$. itaque
 $A^2 : A \times B = E : Z$. rursus quoniam est $\Delta \times \Delta = H$,
 $\Gamma \times \Delta = Z$, erit $\Gamma : \Delta = Z : H$ [VII, 17], hoc est
 $A : B = Z : H$. uerum $A : B = A \times B : B^2$. itaque
 $A \times B : B^2 = Z : H$. erat autem $A^2 : A \times B = E : Z$.
 itaque ex aequo [V, 22] $A^2 : B^2 = E : H$. uerum uterque

$\tau\acute{\eta}\lambda\alpha$ πρὸς τὸν Δ τέσσαρα F, sed corr. m. 1. 7. ὁ δὲ Γ τόν] τὸν δὲ BFVb. ποιεῖται] om. BFb. 9. πεποίηκε b. 10. τόν] (prius) corr. ex ὅν m. 1 V. 12. οὕτως] om. P. οὕτως — τῇν B] om. B. 20. ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ τῶν A, B πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς B mg. b. 22. ἀπὸ τῆς A πρὸς τό] m. 2 V (τοῦ pro τῆς). B', A' F. Deinde del. m. 2 πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς B V. 23. Z] mut. in H F. Post ἄρα add. ἔστιν b, m. 2 F. 25. ἔστιν B.

ἀπὸ τοῦ Γ ἐστίν, ὁ δὲ H ἀπὸ τοῦ Δ · τὸ ἀπὸ τῆς A ἄρα πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς B λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν. ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

Ἀλλὰ δὴ ἐχέτω τὸ ἀπὸ τῆς A πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς B 5 λόγον, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς ὁ E πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν τὸν H · λέγω, ὅτι σύμμετρός ἐστιν ἡ A τῇ B .

Ἔστω γὰρ τοῦ μὲν E πλευρὰ ὁ Γ , τοῦ δὲ H ὁ Δ , καὶ ὁ Γ τὸν Δ πολλαπλασιάσας τὸν Z ποιεῖτω· οἱ E , Z , H ἄρα ἐξῆς εἰσιν ἀνάλογον ἐν τῷ τοῦ Γ πρὸς τὸν 10 Δ λόγῳ. καὶ ἐπεὶ τῶν ἀπὸ τῶν A , B μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ ὑπὸ τῶν A , B , τῶν δὲ E , H ὁ Z , ἐστίν ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ τῆς A πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν A , B , οὕτως ὁ E πρὸς τὸν Z . ὡς δὲ τὸ ὑπὸ τῶν A , B πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς B , οὕτως ὁ Z πρὸς τὸν H , ἀλλ' ὡς τὸ ἀπὸ τῆς A 15 πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν A , B , οὕτως ἡ A πρὸς τὴν B . αἱ A , B ἄρα σύμμετροί εἰσιν· λόγον γὰρ ἔχουσιν, ὃν ἀριθμὸς ὁ E πρὸς ἀριθμὸν τὸν Z , τουτέστιν ὃν ὁ Γ πρὸς τὸν Δ · ὡς γὰρ ὁ Γ πρὸς τὸν Δ , ὁ E πρὸς τὸν Z · ὁ γὰρ Γ ἑαυτὸν μὲν πολλαπλασιάσας τὸν E πεποίηκεν, 20 τὸν δὲ Δ πολλαπλασιάσας τὸν Z πεποίηκεν· ἐστίν ἄρα ὡς ὁ Γ πρὸς τὸν Δ , ὁ E πρὸς τὸν Z .

4.

Ad libr. X prop. 10.

Τῇ ἄρα προτεθείσῃ εὐθείᾳ τῇ ῥητῇ, ἀφ' ἧς ἔφραμεν τὰ μέτρα λαμβάνεσθαι, οἷον τῇ A , προσεῦρηται δυνάμει μὲν σύμμετρος ἡ Δ , τουτέστι ῥητὴ δυνάμει μόνον .

4. Post ἡ E p. 34, 5 PBFb; mg. m. 1 V, add. *κεῖμενον*.

3. ἀριθμός] comp. corr. ex comp. πρὸς m. 1 F. 6. Post B add. *μήκει* V, m. 2 B. 7. *μέν*] om. b. ὁ] (prius) ἡ corr. ex ὁ, supra scr. ὁ F; ἡ b. 10. *τῶν*] corr. ex *τό* B.

E, H numerus quadratus est; est enim $E = \Gamma^2, H = \Delta^2$. ergo $A^2 : B^2$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum; quod erat demonstrandum.

Iam uero $A^2 : B^2$ rationem habeat, quam numerus quadratus E ad numerum quadratum H . dico, A et B commensurabiles esse.

sit enim Γ latus numeri E , Δ autem numeri H . et sit $\Gamma \times \Delta = Z$. itaque E, Z, H deinceps proportionales sunt in ratione $\Gamma : \Delta$ [VIII, 11]. et quoniam est $A^2 : A \times B = A \times B : B^2$ et $E : Z = Z : H$, erit $A^2 : A \times B = E : Z$. est autem $A \times B : B^2 = Z : H$ et $A^2 : A \times B = A : B$. ergo A, B commensurabiles sunt; rationem enim habent, quam numerus E ad numerum Z [prop. VI], hoc est $\Gamma : \Delta$. nam $\Gamma : \Delta = E : Z$; est enim $\Gamma \times \Gamma = E, \Gamma \times \Delta = Z$ [VII, 17]; quare $\Gamma : \Delta = E : Z$.¹⁾

4.

Ad libr. X prop. 10.

Ergo ad rectam propositam rationalem, unde diximus mensuras sumi [cfr. p. 2, 10 not. crit.], uelut A , inuenta est Δ potentia commensurabilis, hoc est rationalis potentia tantum commensurabilis, irrationalis

1) Hae ambages, ὡς δέ lin. 13 — H lin. 14 et ὡς γάρ lin. 18 — τὸν Z lin. 21, a Gregorio in codd. deesse dicuntur; in meis tamen omnibus leguntur.

11. ἐστι] εἰσιν P. 16. εἰσι V, comp. Fb. γάρ] m. 2 F. 17. ὅν] om. F. 18. Z] e corr. m. 1 b. 19. Post Γ ras. 1 litt. F. πεπολήκει V. 21. οὕτως δ' E V. Post Z add. ὅπερ ἔδει δεῖξαι FV. 22. προστεθείσῃ PV. ἐπ' ἑ] ὅη- eras., deinde mg. m. rec. κείμενον. προσεύχεται p. 34, 3 — ἡ E p. 34, 5 B addito ὅπερ ἔδει δεῖξαι et deleta reliqua parte propositionis. 23. οἶον B Vb, γρ. οἶόν ἐστιν ἡ A mg. Fb. προσεύχεται BFb. 24. μὲν] μόνον B, μὲν ἡ F.

σύμμετρος, ἄλογος δὲ ἡ *E*. ἀλόγους γὰρ καθόλου
καλεῖ τὰς καὶ μήκει καὶ δυνάμει ἀσύμμετρος τῇ *ζητῇ*.

5.

Uulgo X, 13.

Εἰς τὸ ιγ' λήμμα ἐκ τῆς εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῆς.

Ἐὰν ἡ δύο μεγέθη, καὶ τὸ μὲν σύμμετρον ἡ τῷ
5 αὐτῷ, τὸ δὲ ἕτερον ἀσύμμετρον, ἀσύμμετρα ἔσται τὰ
μεγέθη.

Ἔστω γὰρ δύο μεγέθη τὰ *A*, *B*, ἄλλο δὲ τὸ *Γ*,
καὶ τὸ μὲν *A* τῷ *Γ* σύμμετρον ἔστω, τὸ δὲ *B* τῷ *Γ*
ἀσύμμετρον. λέγω, ὅτι καὶ τὸ *A* τῷ *B* ἀσύμμετρόν
10 ἔστιν.

Εἰ γάρ ἐστι σύμμετρον τὸ *A* τῷ *B*, ἔστι δὲ καὶ
τὸ *Γ* τῷ *A*, καὶ τὸ *Γ* ἄρα τῷ *B* σύμμετρόν ἐστιν·
ὅπερ οὐχ ὑπόκειται.*

6.

Ad libr. X prop. 18.

Ῥητὰς γὰρ καλεῖ τὰς τῇ ἐκκειμένη *ζητῇ* ἦτοι μήκει
15 καὶ δυνάμει συμμέτρους ἢ καὶ δυνάμει μόνον. εἰσὶ
δὲ καὶ ἄλλαι εὐθεῖαι, αἱ μήκει μὲν ἀσύμμετροί εἰσι τῇ
ἐκκειμένη *ζητῇ*, δυνάμει δὲ μόνον σύμμετροι, καὶ διὰ
τοῦτο πάλιν λέγονται *ζηταὶ* καὶ σύμμετροι πρὸς ἀλ-
λήλας, καθ' ὃ *ζηταί*, ἀλλὰ σύμμετροι πρὸς ἀλλήλας

5. Post δεῖξαι p. 38, 6 B F V b, mg. m. 2 P. 6. Post
σύμμετρος p. 58, 3 P B F V b.

1. σύμμετρος] om. V, m. rec. P. δέ] γάρ F. 2. Post *ζητῇ*
eras. οὕτως P. 3. εἰς τὸ ιγ'] om. F V b. εἰς — ἀπαγωγῆς]
mg. F, ιγ' in ras. B, mg. ἐν ἄλλῳ λήμμα; in F numerus eras.
4. δύο μεγέθη ἡ F. τῷ αὐτῷ] postea add. F m. 1. 5.
δ' B F b. 8. Γ'] (prius) γάμμα F. 11. ἀσύμμετρον F, sed
ἀ- eras. 12. Γ'] (prius) corr. ex A V. A] corr. ex Γ V.


autem E ; irrationales enim omnino uocat rectas rationali incommensurabiles et longitudine et potentia.

5.

Uulgo X, 13.

Ad prop. XIII lemma ex reductione in absurdum.

Si duae magnitudines sunt, et altera commensurabilis, altera incommensurabilis eidem magnitudini est, magnitudines incommensurabiles erunt.



sint enim A, B duae magnitudines, alia autem Γ , et A, Γ commensurabiles sint, B, Γ autem incommensurabiles. dico, etiam A, B incommensurabiles esse.

nam si A, B commensurabiles sunt, et etiam Γ, A commensurabiles sunt, etiam Γ, B commensurabiles sunt [prop. XII]; quod contra hypothesin est.

6.

Ad libr. X. prop. 18.

Rationales enim uocat rectas rationali propositae commensurabiles aut longitudine et potentia aut potentia tantum. sunt autem aliae¹⁾ quoque rectae, quae rationali propositae longitudine incommensurabiles sunt, potentia autem tantum commensurabiles; quare rursus uocantur rationales et inter se commensurabiles, quatenus rationales sunt, commensurabiles autem inter se aut longitudine et potentia aut po-

1) Hoc quid sibi uelit, non intellego.

B] A ? P. ἀσύμμετρον F, sed corr. 15. κατ] (alt.) om. b.
16. εἰσιν ἀσύμμετροι F. εἰσιν B.

ἤτοι μήκει δηλαδὴ καὶ δυνάμει ἢ δυνάμει μόνον. καὶ εἰ μὲν μήκει, λέγονται καὶ αὐταὶ φηταὶ μήκει σύμμετροι ἐπακουομένον, ὅτι καὶ δυνάμει· εἰ δὲ δυνάμει μόνον πρὸς ἀλλήλας εἰσὶ σύμμετροι, λέγονται καὶ
 5 αὐταὶ οὕτως φηταὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι. ὅτι δὲ αἱ φηταὶ σύμμετροί εἰσιν, ἐντεῦθεν δῆλον· ἐπεὶ γὰρ φηταὶ εἰσιν αἱ τῇ ἐκκειμένῃ φητῇ σύμμετροι, τὰ δὲ τῷ αὐτῷ σύμμετρα καὶ ἀλλήλοις ἐστὶ σύμμετρα, αἱ ἄρα φηταὶ σύμμετροί εἰσιν.

7.

Ad libr. X prop. 20.

Λῆμμα.

10

Ἡ δυνάμενη ἄλογον χωρίον ἄλογός ἐστιν.

Δυνάσθω γὰρ ἡ *A* ἄλογον χωρίον, τουτέστι τὸ ἀπὸ τῆς *A* τετράγωνον ἴσον ἔστω ἀλόγῳ χωρίῳ. λέγω, ὅτι ἡ *A* ἄλογός ἐστιν.

15 Εἰ γὰρ ἔσται φητὴ ἡ *A*, φητὸν ἔσται καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς τετράγωνον· οὕτως γὰρ [ἐστίν] ἐν τοῖς ὅροις. οὐκ ἔστι δέ· ἄλογος ἄρα ἐστὶν ἡ *A*. ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

8.

Ad libr. X prop. 23 corollarium.

Εἰσὶ δὲ πάλιν καὶ ἄλλαι εὐθεῖαι, αἱ μήκει μὲν

7. Post ἐξῆς p. 60, 13 PBFVb. 8. Post σύμμετροι p. 68, 22 PV, mg. m 2 B.

1. καί] (alt.) om. b. 2. φηταί] om. V. 3. εἰ] om. b.
 5. οὕτως] om. BFVb. Post σύμμετροι del. εἰσιν m. 1 P.
 ὅτι — 6. εἰσιν] mg. m. 1 P. 6. ἐντεῦθεν] ἐν- in ras. m.
 1 P. δῆλον ἐντεῦθεν F. ἐπεὶ] ὅτι b, mg. m. 1 γρ. ἐπεὶ
 γὰρ διὰ τὸ βί' τοῦ ι'. 9. εἰσιν] εἰσι b, εἰσιν· ὅπερ ἔδει
 δεῖξαι V. 11. Ἡ] om. V, add. num. β'. ἔστι BV, comp.
 Fb. 13. ἴσον ἔστω] supra scr. m. 2 V; om. BFb. ἀλόγῳ
 χωρίῳ corr. ex ἄλογον ἔστω V, ἄλογον ἔστω Bb, ἔστω ἄλογον F.

tentia tantum. et si longitudine commensurabiles sunt, et ipsae rationales longitudine commensurabiles uocantur, subaudito, eas potentia quoque commensurabiles esse; sin potentia tantum inter se commensurabiles sunt, et ipsae sic rationales potentia tantum commensurabiles uocantur. rationales autem commensurabiles esse, hinc manifestum est: quoniam enim rationales sunt, quae rationali propositae commensurabiles sunt, et quae eidem commensurabilia sunt, etiam inter se commensurabilia sunt [prop. XII], rectae rationales commensurabiles sunt.

7.

Ad libr. X prop. 20.

Lemma.

Recta spatio irrationali aequalis quadrata irrationalis est.

nam A^2 spatio irrationali sit aequale. dico, A irrationalem esse.

A ————— nam si A rationalis est, etiam A^2
 B ————— rationale erit; ita enim in definitio-
 Γ ————— nibus est [def. 4]. at non est. ergo
 A irrationalis est; quod erat demonstrandum.

8.

Ad libr. X prop. 23 coroll.

Sunt autem rursus aliae¹⁾ quoque rectae, quae

1) Sc. praeter rationales, de quibus u. app. nr. 6.

15. $\xi\sigma\tau\alpha\iota$] $\xi\sigma\tau\iota$ V. 16. $\xi\sigma\tau\iota\nu$] om. BFVb. 17. $\xi\sigma\tau\iota\nu$ B.
 $\alpha\rho\alpha$] m. 2 F. η A $\xi\sigma\tau\iota\nu$ BFVb. $\delta\pi\epsilon\rho$ $\xi\delta\epsilon\iota$ $\delta\epsilon\iota\chi\alpha\iota$
om. B. 18. $\epsilon\lambda\sigma\iota\nu$ P. $\epsilon\lambda\sigma\iota$ $\delta\epsilon$ — p. 386, 7. $\delta\upsilon\nu\acute{\alpha}\mu\epsilon\iota$ (prius)]
punctis del. V (cfr. p. 69 not. crit.).

- ἀσύμμετροί εἰσι τῇ μέσῃ, δυνάμει δὲ μόνον σύμμετροι, καὶ λέγονται πάλιν μέσαι διὰ τὸ σύμμετροι εἶναι δυνάμει τῇ μέσῃ καὶ σύμμετροι πρὸς ἀλλήλας, καθὼς μέσαι, ἀλλὰ σύμμετροι πρὸς ἀλλήλας ἦτοι μήκει δηλαδὴ
 5 καὶ δυνάμει ἢ δυνάμει μόνον. καὶ εἰ μὲν μήκει, λέγονται καὶ αὐταὶ μέσαι μήκει σύμμετροι ἐπομένον τοῦ, ὅτι καὶ δυνάμει· εἰ δὲ δυνάμει μόνον εἰσὶ σύμμετροι, λέγονται καὶ οὕτως μέσαι δυνάμει μόνον σύμμετροι.
 Ὅτι δὲ αἱ μέσαι σύμμετροί εἰσιν, οὕτως δεικτέον.
 10 ἐπεὶ αἱ μέσαι μέσῃ τινὶ σύμμετροί εἰσιν, τὰ δὲ τῷ αὐτῷ σύμμετρα καὶ ἀλλήλοις ἐστὶ σύμμετρα, αἱ ἄρα μέσαι σύμμετροί εἰσιν.

9.

Ad libr. X prop. 27.

Λήμμα.

- Δύο ἀριθμῶν δοθέντων ἐν λόγῳ ὁποιοῦν καὶ
 15 ἄλλον τινὸς δέον ποιῆσαι ὥς τὸν ἀριθμὸν πρὸς τὸν ἀριθμὸν οὕτως τοῦτον πρὸς ἄλλον τινά.
 Ἔστωσαν οἱ δοθέντες δύο ἀριθμοὶ οἱ AB , ΓA λόγον ἔχοντες πρὸς ἀλλήλους ὁποιοῦν, ἄλλος δὲ τις ὁ ΓE . δεῖ ποιῆσαι τὸ προκείμενον.
 20 Ἀναγεγράφθω γὰρ ὑπὸ τῶν $\Delta \Gamma$, ΓE παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον τὸ ΔE , καὶ τῷ ΔE ἴσον παρὰ τὸν AB παραβεβλήσθω παραλληλόγραμμον τὸ BZ πλάτος ποιοῦν τὴν AZ . ἐπεὶ οὖν ἴσον ἐστὶ τὸ ΔE

 9. Post δεῖξαι p. 78, 13 V.

 1. εἰσιν P. 9. ὅτι — 12. εἰσιν] etiam in mg. sup. m.
 rec. B. 10. εἰσι BV. 13. λήμμα] m. 2 V.

mediae longitudine incommensurabiles sunt, potentia autem tantum commensurabiles, et rursus mediae uocantur, quia mediae commensurabiles sunt potentia, et inter se commensurabiles, quatenus mediae sunt, commensurabiles autem inter se aut longitudine et potentia aut potentia tantum. et si longitudine commensurabiles sunt, et ipsae mediae longitudine commensurabiles uocantur, cum per se sequatur, eas potentia quoque commensurabiles esse; sin potentia tantum commensurabiles sunt, sic quoque mediae uocantur potentia tantum commensurabiles.

Medias autem commensurabiles esse, sic demonstrandum: quoniam mediae alicui mediae commensurabiles sunt, et quae eidem commensurabilia sunt, inter se quoque commensurabilia sunt [prop. XII], mediae sunt commensurabiles.


9.

Ad libr. X prop. 27.

Lemma.

Datis duobus numeris in quavis ratione et alio quodam numero oportet efficere, ut sit, ut numerus ad numerum, ita hic ad alium quendam.

Sint AB , ΓA numeri dati rationem quamuis inter se habentes, alius autem aliquis ΓE . oportet efficere, quod propositum est.



describatur enim parallelogrammum rectangulum $\Delta E = \Delta \Gamma \times \Gamma E$, et spatio ΔE aequale rectae AB adplicetur parallelogrammum BZ latitudinem efficiens AZ . iam

παραλληλόγραμμον τῷ BZ παραλληλογράμμῳ, ἔστι δὲ αὐτῷ καὶ ἰσογώνιον, τῶν δὲ ἴσων καὶ ἰσογωνίων παραλληλογράμμων ἀντιπεπόνθασιν αἱ πλευραὶ αἱ περὶ τὰς ἴσας γωνίας, ἀνάλογον ἄρα ἔστιν ὡς ὁ AB πρὸς
 5 τὸν $ΓΔ$, οὕτως ὁ $ΓΕ$ πρὸς τὸν AZ . ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

10.

Ad libr. X prop. 29.

Λήμμα εἰς τὸ κθ'.

Δύο ἀριθμῶν δοθέντων καὶ εὐθείας δέον ποιῆσαι ὡς τὸν ἀριθμὸν πρὸς τὸν ἀριθμόν, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς εὐθείας τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπ' ἄλλης τινός.
 10 Ἐστῶσαν οἱ δοθέντες δύο ἀριθμοὶ οἱ A, B , εὐθεῖα δὲ ἡ $Γ$, καὶ δέον ἔστι ποιῆσαι τὸ προκείμενον. πεποιθήσθω γὰρ ὡς ὁ A πρὸς τὸν B , ἡ $Γ$ εὐθεῖα πρὸς ἄλλην τινὰ τὴν $Δ$, καὶ εἰλήφθω τῶν $Γ, Δ$ μέση ἀνάλογον ἡ E . ἐπεὶ οὖν ἔστιν ὡς ὁ A πρὸς τὸν B ,
 15 ἡ $Γ$ εὐθεῖα πρὸς τὴν $Δ$, ἀλλ' ὡς ἡ $Γ$ πρὸς τὴν $Δ$, τὸ ἀπὸ τῆς $Γ$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς E , ὡς ἄρα ὁ A πρὸς τὸν B , τὸ ἀπὸ τῆς $Γ$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς E τετράγωνον.

11.

Ad libr. X prop. 31.

Λήμμα εἰς τὸ λα'.

Ἐὰν ᾧσι δύο εὐθεῖαι ἐν λόγῳ τινί, ἔσται ὡς ἡ
 20 εὐθεῖα πρὸς τὴν εὐθεῖαν, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν δύο πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ἐλαχίστης.

Ἐστῶσαν δὴ δύο εὐθεῖαι αἱ AB, BG ἐν λόγῳ τινί· λέγω, ὅτι ἔστιν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν BG , οὕτως τὸ

10. Post prop. XXIX p. 88, 18 V. 11. Post prop. XXXI p. 92, 24 V.

4. AB] e corr. V.

quoniam $\angle E = \angle Z$, et eadem aequiangula sunt, et parallelogrammorum aequalium et aequiangulorum latera angulos aequales comprehendunt in contraria proportionem sunt [VI, 14], erit $AB : \Gamma A = \Gamma E : AZ$; quod erat demonstrandum.

10.

Ad libr. X prop. 29.

Lemma ad prop. XXIX.

Datis duobus numeris et recta oportet efficere, ut sit, ut numerus ad numerum, ita quadratum rectae ad quadratum alius alicuius rectae.

Sint duo numeri dati A , B , recta
 A |————| autem Γ ; et oportet efficere, quod
 B |————| propositum est. fiat enim $A : B = \Gamma : \Delta$
 Γ |————| [prop. VI coroll.], et rectarum Γ , Δ
 Δ |————| media proportionalis sumatur E [VI, 13].
 E |————| iam quoniam est $A : B = \Gamma : \Delta$,
 $\Gamma : \Delta = \Gamma^2 : E^2$ [V def. 9], erit $A : B = \Gamma^2 : E^2$.

11.

Ad libr. X prop. 31.

Lemma ad prop. XXXI.

Si duae rectae in ratione aliqua sunt, erit ut recta ad rectam, ita rectangulum duarum rectarum ad quadratum minimae.

Duae igitur rectae AB , $B\Gamma$ in ratione aliqua sint. dico, esse $AB : B\Gamma = AB \times B\Gamma : B\Gamma^2$. describatur

ὑπὸ τῶν $AB, B\Gamma$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $B\Gamma$. ἀναγεγράφθω γὰρ ἀπὸ τῆς $B\Gamma$ τετράγωνον τὸ $B\Delta E\Gamma$, καὶ συμπληρώσθω τὸ $A\Delta$ παραλληλόγραμμον. φανερόν δὴ, ὅτι ἐστὶν ὡς η AB πρὸς τὴν $B\Gamma$, οὕτως τὸ $A\Delta$
 5 παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ BE παραλληλόγραμμον. καὶ ἐστὶ τὸ μὲν $A\Delta$ τὸ ὑπὸ τῶν $AB, B\Gamma$. ἴση γὰρ ὁ $B\Gamma$ τῇ $B\Delta$. τὸ δὲ BE τὸ ἀπὸ τῆς $B\Gamma$. ὡς ἄρα ἡ AB πρὸς τὴν $B\Gamma$, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν $AB, B\Gamma$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $B\Gamma$. ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

12.

Ad libr. X prop. 32.

10

 $\Delta\eta\mu\mu\alpha$ εἰς τὸ $\lambda\beta'$.


Ἐὰν ὧσι τρεῖς εὐθεῖαι ἐν λόγῳ τινὶ, ἔσται ὡς ἡ πρώτη πρὸς τὴν τρίτην, οὕτως τὸ ὑπὸ τῆς πρώτης καὶ μέσης πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς μέσης καὶ ἐλαχίστης.

Ἔστωσαν τρεῖς εὐθεῖαι ἐν λόγῳ τινὶ αἱ $AB, B\Gamma$,
 15 $\Gamma\Delta$. λέγω, ὅτι ἐστὶν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν $\Gamma\Delta$, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν $AB, B\Gamma$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $B\Gamma, \Gamma\Delta$.

Ἦχθω γὰρ ἀπὸ τοῦ A σημείου τῇ AB πρὸς ὀρθὰς ἡ AE , καὶ κείσθω τῇ $B\Gamma$ ἴση ἡ AE , καὶ διὰ τοῦ E σημείου τῇ $A\Delta$ εὐθείᾳ παράλληλος ἡχθῶ ἡ $E\kappa$,
 20 διὰ δὲ τῶν B, Γ, Δ σημείων τῇ AE παράλληλοι ἡχθώσαν αἱ $ZB, \Gamma\Theta, \Delta K$. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν $B\Gamma$, οὕτως τὸ AZ παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ $B\Theta$ παραλληλόγραμμον, ὡς δὲ ἡ $B\Gamma$ πρὸς τὴν $\Gamma\Delta$, οὕτως τὸ $B\Theta$ πρὸς τὸ ΓK , δι' ἴσου ἄρα ὡς ἡ AB
 25 πρὸς τὴν $\Gamma\Delta$, οὕτως τὸ AZ παραλληλόγραμμον πρὸς

12. Post prop. XXXII p. 96, 8 V, mg. m. rec. B.

3. Post $A\Delta$ ins. Γ m. 1 V. 4. $A\Delta$] A eras. V. 7. τῆς]
 in ras. V. $B\Gamma$] Γ e corr. V. 12. τὸ ὑπὸ] in ras. V.



enim in $B\Gamma$ quadratum $B\Delta E\Gamma$, et expleatur parallelogrammum $A\Delta$. manifestum igitur est, esse

$$AB : B\Gamma = A\Delta : BE \text{ [VI, 1].}$$

et est $A\Delta = AB \times B\Gamma$ (nam $B\Gamma = B\Delta$), $BE = B\Gamma^2$. itaque erit $AB : B\Gamma = AB \times B\Gamma : B\Gamma^2$; quod erat demonstrandum.

12.

Ad libr. X prop. 32.


Lemma ad prop. XXXII.

Si tres rectae in ratione aliqua sunt, erit ut prima ad tertiam, ita rectangulum primae ac mediae ad rectangulum mediae ac minimae.

Tres rectae AB , $B\Gamma$, $\Gamma\Delta$ in ratione aliqua sint. dico, esse

$$AB : \Gamma\Delta = AB \times B\Gamma : B\Gamma \times \Gamma\Delta.$$

ducatur enim ab A puncto ad AB perpendicularis AE , et ponatur $AE = B\Gamma$, et per E punctum rectae



AE parallela ducatur EK , per puncta autem B , Γ , Δ rectae AE parallelae ducantur ZB , $\Gamma\Theta$, ΔK .

et quoniam est $AB : B\Gamma = AZ : B\Theta$ [VI, 1], et $B\Gamma : \Gamma\Delta = B\Theta : \Gamma K$ [VI, 1], ex aequo erit

τὸ ΓΚ παραλληλόγραμμον. καὶ ἐστὶ τὸ μὲν ΑΖ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ· ἴση γὰρ ἡ ΑΕ τῇ ΒΓ· τὸ δὲ ΓΚ τὸ ὑπὸ τῶν ΒΓ, ΓΔ· ἴση γὰρ ἡ ΒΓ τῇ ΓΘ.

Ἐὰν ἄρα τρεῖς ὥσιν εὐθεῖαι ἐν λόγῳ τινί, ἔσται
5 ὡς ἡ πρώτη πρὸς τὴν τρίτην, οὕτως τὸ ὑπὸ τῆς πρώτης
καὶ μέσης πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς μέσης καὶ τρίτης· ὅπερ
ἔδει δεῖξαι.

13.

Ad libr. X prop. 32 lemma.

Ἡ καὶ δι, ἐὰν ἀναγράψωμεν τὸ ΕΓ ὀρθογώνιον
παραλληλόγραμμον καὶ συμπληρώσωμεν τὸ ΑΖ, ἴσον
10 ἔσται τὸ ΕΓ τῷ ΑΖ· ἐκάτερον γὰρ αὐτῶν διπλάσιόν
ἐστὶ τοῦ ΑΒΓ τριγώνου. καὶ ἐστὶ τὸ μὲν ΕΓ τὸ ὑπὸ
τῶν ΒΓ, ΑΔ, τὸ δὲ ΑΖ τὸ ὑπὸ τῶν ΒΑ, ΑΓ. τὸ
ἄρα ὑπὸ τῶν ΒΓ, ΑΔ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν ΒΑ, ΑΓ.

14.

Ad libr. X prop. 33.

Ἀῆμα εἰς τὸ λγ'.

Ἐὰν εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῇ εἰς ἄνισα, ἔσται ὡς ἡ
εὐθεῖα πρὸς τὴν εὐθείαν, οὕτως τὸ ὑπὸ τῆς ὅλης καὶ
τῆς μείζονος πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς ὅλης καὶ τῆς ἐλάττωτος.

Εὐθεῖα γάρ τις ἡ ΑΒ τετμήσθω εἰς ἄνισα κατὰ
τὸ Ε· λέγω, ὅτι ὡς ἡ ΑΕ πρὸς τὴν ΕΒ, οὕτως τὸ
20 ὑπὸ τῶν ΒΑ, ΑΕ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΕ.

Ἀναγεγράφθω γὰρ ἀπὸ τῆς ΑΒ τετράγωνον τὸ
ΑΓΔΒ, καὶ διὰ τοῦ Ε σημείου ὁποτέρῃ τῶν ΑΓ, ΒΔ

13. Inter ΑΓ et ὅπερ p. 98, 15 PBFVb. 14. Post
prop. XXXIII p. 102, 4 V, mg. m. rec. B.

3. ΓΔ] Δ in ras. V. 5. πρὸς — 7. δεῖξαι] καὶ ἐξῆς B.
8. ῆ] om. FV. καί] καὶ ἦνται b. 9. συμπληρώσωμεν P,
corr. m. 2. 10. τό] corr. ex. τῷ V. 11. ΕΓ] e corr. V.

$AB: \Gamma A = AZ: \Gamma K$ [V, 22]. et $AZ = AB \times B\Gamma$ (nam $AE = B\Gamma$), $\Gamma K = B\Gamma \times \Gamma A$ (nam $B\Gamma = \Gamma\Theta$). ergo si tres rectae in ratione aliqua sunt, erit ut prima ad tertiam, ita rectangulum primae ac mediae ad rectangulum mediae ac tertiae; quod erat demonstrandum.¹⁾

13.

Ad libr. X prop. 32 lemma.

Uel etiam quod, si rectangulum $E\Gamma$ describerimus, et AZ expleuerimus [u. fig. p. 97], erit $E\Gamma = AZ$; nam utrumque $= 2 AB\Gamma$ [I, 41]. et $E\Gamma = B\Gamma \times A\Delta$, $AZ = BA \times A\Gamma$. ergo est

$$B\Gamma \times A\Delta = BA \times A\Gamma.$$

14.

Ad libr. X prop. 33.

Lemma ad prop. XXXIII.

Si recta in partes inaequales secatur, erit ut recta ad rectam, ita rectangulum totius ac maioris ad rectangulum totius ac minoris.

Recta enim AB in E in partes inaequales secetur. dico, esse

$$AE: EB = BA \times AE: AB \times BE.$$

describatur enim in AB quadratum $A\Gamma\Delta B$, et per punctum E alterutri rectarum $A\Gamma$, $B\Delta$ paral-

1) In B in pag. seq. figura est nostrae similis, nisi quod litterae A , E omissae sunt, et pro B est Θ ; adduntur numeri quidam et $\sigma\chi\eta\mu\alpha$ τοῦ λήμματος τοῦ προγραφέντος, omnia m. rec. in textu prop. 32 (ad καὶ ἐπεὶ p. 94, 11) signo quodam ad hoc lemma reuocamur.

τό] τῷ b. 12. τῶν] (prius) om. P. τό] (sec.) τῷ b. 14.
εἰς τὸ λγ' πρὸ τοῦ λδ' postea add. B. 15. ἔσται] in ras. V.
18. τὺς ἦ] e corr. V m. 2.

παράλληλος ἤχθω ἡ EZ . φανερόν οὖν, ὅτι ὡς ἡ AE πρὸς τὴν EB , οὕτως τὸ AZ παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ ZB παραλληλόγραμμον. καὶ ἐστὶ τὸ μὲν AZ τὸ ὑπὸ τῶν BA, AE ἴση γὰρ ἡ AG τῇ AB . τὸ δὲ ZB
 5 τὸ ὑπὸ τῶν AB, BE ἴση γὰρ ἡ BD τῇ AB . ὥς ἄρα ἡ AE πρὸς τὴν EB , οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν BA, AE πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν AB, BE . ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

15.

Ad libr. X prop. 34.

Λήμμα.

Ἐὰν ὧσι δύο εὐθεῖαι ἄνισοι, τμηθῇ δὲ ἡ ἐλαχίστη
 10 αὐτῶν εἰς ἴσα, τὸ ὑπὸ τῶν δύο εὐθειῶν διπλάσιον
 ἔσται τοῦ τῆς μείζονος καὶ τῆς ἡμισείας τῆς ἐλαχίστης.


Ἔστωσαν δύο εὐθεῖαι ἄνισοι αἱ AB, BG , ὧν μείζων
 ἔστω ἡ AB , καὶ τετμήσθω ἡ BG δίχα κατὰ τὸ Δ .
 λέγω, ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν AB, BG διπλάσιόν ἐστι τοῦ
 15 ὑπὸ τῶν AB, BD .

Ἦχθω γὰρ ἀπὸ τοῦ B σημείου τῇ BG πρὸς ὀρθὰς
 ἡ BE , καὶ κείσθω τῇ BA ἴση ἡ BE , καὶ κατα-
 γεγράφθω τὸ σχῆμα. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ἡ AB πρὸς
 τὴν AG , οὕτως τὸ BZ πρὸς τὸ AH , συνθέντι ἄρα
 20 ὡς ἡ BG πρὸς τὴν AG , οὕτως τὸ BH πρὸς τὸ AH .
 διπλασίον δὲ ἐστὶν ἡ BG τῆς AG . διπλάσιον ἄρα
 ἐστὶ καὶ τὸ BH τοῦ AH . καὶ ἐστὶ τὸ μὲν BH τὸ
 ὑπὸ τῶν AB, BG . ἴση γὰρ ἡ AB τῇ BE . τὸ δὲ
 AH τὸ ὑπὸ τῶν AB, BD . ἴση γὰρ τῇ μὲν BD ἡ AG ,
 25 τῇ δὲ AB ἡ AZ . ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

15. Post prop. XXXIV p. 104, 9 V, mg. m. rec. B (uix legi potest).

4. ZB] BZ B. 5. τῶν] om. V. AB] (prius) e corr. V.

8. λήμμα προγραφόμενον B. 19. τῇ] om. V. 21. ΔG] $\Gamma \Delta$ B.




lela ducatur EZ . manifestum igitur est, esse $AE:EB = AZ:ZB$ [VI, 1]. et $AZ = BA \times AE$ (nam $A\Gamma = AB$), $ZB = AB \times BE$ (nam $\Delta B = AB$). itaque erit $AE:EB = BA \times AE:AB \times BE$; quod erat demonstrandum.

15.

Ad libr. X prop. 34.

Lemma.

Si sunt duae rectae inaequales, et minor in partes aequales secatur, rectangulum duarum rectarum duplo maius erit rectangulo maioris et dimidia minoris.



Sint duae rectae inaequales AB , $B\Gamma$, quarum maior sit AB , et $B\Gamma$ in duas partes aequales secatur in Δ . dico, esse $AB \times B\Gamma = 2 AB \times B\Delta$.

ducatur enim a puncto B ad $B\Gamma$ perpendicularis BE , et ponatur $BE = BA$, et describatur figura. iam quoniam est $\Delta B:\Delta\Gamma = BZ:\Delta H$ [VI, 1], componendo [V, 18] erit $B\Gamma:\Delta\Gamma = BH:\Delta H$. uerum $B\Gamma = 2\Delta\Gamma$. itaque etiam $BH = 2\Delta H$. et $BH = AB \times B\Gamma$ (nam $AB = BE$), $\Delta H = AB \times B\Delta$ (nam $B\Delta = \Delta\Gamma$, $AB = \Delta Z$); quod erat demonstrandum.

16.

Ad libr. X prop. 36.

Ἐκάλεσε δὲ αὐτὴν ἐκ δύο ὀνομάτων διὰ τὸ ἐκ
 δύο ῥητῶν αὐτὴν συγκεῖσθαι κύριον ὄνομα καλῶν
 τὸ ῥητόν, καθ' ὃ ῥητόν.

17.

Ad libr. X prop. 37.

Ἐκάλεσε δὲ αὐτὴν ἐκ δύο μέσων πρώτην διὰ τὸ
 5 ῥητόν περιέχειν καὶ προτερεῖν τὸ ῥητόν.

18.

Ad libr. X prop. 38.

Ἐκάλεσε δὲ αὐτὴν ἐκ δύο μέσων δευτέραν διὰ το
 μέσον περιέχειν τὸ ὑπ' αὐτῶν καὶ μὴ ῥητόν, δευ-
 τερεῦειν δὲ τὸ μέσον τοῦ ῥητοῦ. ὅτι δὲ τὸ ὑπὸ ῥητῆς
 καὶ ἀλόγου περιεχόμενον ἄλογόν ἐστιν, δῆλον. εἰ γὰρ
 10 ἔσται ῥητόν καὶ παραβέβληται παρὰ ῥητὴν, εἴη ἂν καὶ
 ἡ ἑτέρα αὐτοῦ πλευρὰ ῥητή. ἀλλὰ καὶ ἄλογος ὅπερ
 ἄτοπον. τὸ ἄρα ὑπὸ ῥητῆς καὶ ἀλόγου ἄλογόν ἐστιν.

19.

Ad libr. X prop. 39.

Ἐκάλεσε δὲ αὐτὴν μείζονα διὰ το τὰ ἀπὸ τῶν *AB*,
BΓ ῥητὰ μείζονα εἶναι τοῦ δις ὑπὸ τῶν *AB*, *BΓ*
 15 μέσου, καὶ θέον εἶναι ἀπὸ τῆς τῶν ῥητῶν οἰκειότητος

16. Inter ὀνομάτων et ὅπερ p. 108, 15 PBFb. 17. Inter
 πρώτη et ὅπερ p. 110, 8 PBFb. 18. Inter δευτέρα et ὅπερ
 p. 114, 2 PBFb, pro scholio V m. 1. 19. Inter μείζων et
 ὅπερ p. 114, 22 PBFb, mg. V.

1. ἐκάλεσεν PBF. 2. ῥητῶν] ὀνομάτων F. συγκεῖσθαι]
 καλεῖσθαι F (sed corr. mg.). 4. ἐκάλεσεν PBF. 5. πρω-

16.

Ad libr. X prop. 36.

Uocauit autem eam ex duobus nominibus, quia ex duabus rationalibus composita est, proprie rationale, quatenus rationale est, nomen uocans.

17.

Ad libr. X prop. 37.

Uocauit autem eam ex duabus mediis primam, quia spatium rationale comprehendunt, et rationale principatum habet.

18.

Ad libr. X prop. 38.

Uocauit autem eam ex duabus mediis secundam, quia medium comprehendunt rectangulum, et medium rationali postponitur.

Spatium autem rectis rationali et irrationali comprehensum irrationale esse, adparet. nam si rationale est et rectae rationali adplicatum est, etiam alterum eius latus rationale est [prop. XX]. at idem irrationale est; quod absurdum est. ergo spatium rectis rationali et irrationali comprehensum irrationale est.

19.

Ad libr. X prop. 39.

Uocauit autem eam maiorem, quia rationalia $AB^2 + B\Gamma^2$ maiora sunt medio $2AB \times B\Gamma$, et

$\tau\epsilon\rho\epsilon\upsilon\sigma\iota\nu$ F. 6. $\acute{\epsilon}\kappa\acute{\alpha}\lambda\epsilon\sigma\epsilon\nu$ PBF. $\tau\acute{o}$] $\tau\acute{o}$ $\tau\acute{o}$ FV. 8. $\delta\acute{\epsilon}$] (prius) om. V. 9. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ BV, comp. Fb. 11. $\pi\lambda\epsilon\nu\rho\acute{\alpha}$ $\alpha\upsilon\tau\omicron\upsilon$ F. 13. $\acute{\epsilon}\kappa\acute{\alpha}\lambda\epsilon\sigma\epsilon\nu$ PBF. 15. $\mu\acute{\epsilon}\sigma\omega\nu$ PBFb.

τὴν ὀνομασίαν τάττεσθαι. ὅτι δὲ μείζονά ἐστι τὰ ἀπο
τῶν AB , $B\Gamma$ τοῦ δις ὑπὸ τῶν AB , $B\Gamma$, οὕτως δεικτέον.

Φανερόν μὲν οὖν, ὅτι ἄνισοί εἰσιν αἱ AB , $B\Gamma$.
εἰ γὰρ ἦσαν ἴσαι, ἴσα ἂν ἦν καὶ τὰ ἀπὸ τῶν AB , $B\Gamma$
5 τῷ δις ὑπὸ τῶν AB , $B\Gamma$, καὶ ἦν ἂν καὶ τὸ ὑπὸ τῶν
 AB , $B\Gamma$ ῥητόν· ὅπερ οὐχ ὑπόκειται· ἄνισοι ἄρα εἰσὶν
αἱ AB , $B\Gamma$. ὑποκείσθω μείζων ἡ AB , καὶ κείσθω
τῇ $B\Gamma$ ἴση ἡ $B\Delta$. τὰ ἄρα ἀπὸ τῶν AB , $B\Delta$ ἴσα ἐστὶ
τῷ τε δις ὑπὸ τῶν AB , $B\Delta$ καὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΔA .
10 ἴση δὲ ἡ ΔB τῇ $B\Gamma$. τὰ ἄρα ἀπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ ἴσα
ἐστὶ τῷ τε δις ὑπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ καὶ τῷ ἀπὸ τῆς
 ΔA . ὥστε τὰ ἀπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ μείζονα εἶναι τοῦ
δις ὑπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ τῷ ἀπὸ ΔA .

20.

Ad libr. X prop. 40.

Ῥητον δὲ καὶ μέσον δυναμένη καλεῖται αὕτη διὰ
15 τὸ δύνασθαι δύο χωρία, τὸ μὲν ῥητόν, τὸ δὲ μέσον·
καὶ διὰ τὴν τοῦ ῥητοῦ προύπαρξιν πρῶτον ἐκάλεσεν.

21.

Ad libr. X prop. 41.

Καλεῖ δὲ αὐτὴν δύο μέσα δυναμένην διὰ το δύ-
νασθαι αὐτὴν δύο μέσα χωρία τό τε συγκείμενον ἐκ
τῶν ἀπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ καὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν AB , $B\Gamma$.

20. Inter δυναμένη et ὅπερ p. 116, 13 PBFb, mg. V.

21. Inter δυναμένη et ὅπερ p. 118, 17 PBFVb.

1. δέ] δὲ καὶ P. ἀπό] corr. ex ὑπό m. 2 F. 2. οὕτω
BVb. 3. οὖν] οὖν ἐστὶν F. 8. ἀπό] ὑπό V. BΔ] corr.
ex BΓ V. 9. ἀπό] ὑπό F. τῆς] τῶν F, om. Bb. ΔA]

oportet nomen a proprietate rationalium dari. esse autem $AB^2 + B\Gamma^2 > 2 AB \times B\Gamma$, sic demonstrandum est.

iam manifestum est, AB , $B\Gamma$ inaequales esse. nam si aequales essent, esset etiam $AB^2 + B\Gamma^2 = 2 AB \times B\Gamma$, et $AB \times B\Gamma$ et ipsum rationale esset; quod contra hypothesin est. supponatur $AB > B\Gamma$, et ponatur $B\Delta = B\Gamma$. itaque $AB^2 + B\Delta^2 = 2 AB \times B\Delta + \Delta A^2$ [II, 7]. uerum $\Delta B = B\Gamma$. itaque

$$AB^2 + B\Gamma^2 = 2 AB \times B\Gamma + \Delta A^2.$$

ergo $AB^2 + B\Gamma^2$ excedit $2 AB \times B\Gamma$ quadrato ΔA^2 .

20.

Ad libr. X prop. 40.

Spatio autem rationali ac medio aequalis quadrata uocatur haec, quia quadrata duobus spatiis aequalis est, alteri rationali, alteri medio, et propter principatum rationalis primum hoc nominauit.

21.

Ad libr. X prop. 41.

Uocat autem eam duobus spatiis mediis aequalem quadratam, quia duobus spatiis mediis quadrata est aequalis, $AB^2 + B\Gamma^2$ et $2 AB \times B\Gamma$ [u. fig. p. 119].

ΔA P. 10. ἀπό] ὑπό F. ἴσα — 12. ΔA] m. 2 V. 11. ἀπό] corr. ex ὑπό m. 2 F. 12. τὰ] τό F. εἶναι] ἐστι BFVb. 13. ἀπό] corr. ex ὑπό m. 2 F. ΔA] τῆς ΔA b et corr. ex τῶν ΔA F. 14. φητόν — αὐτῇ] καλεῖται δὲ αὐτῇ? V. δυναμένην BFb, et P, corr. m. 2. καλεῖται αὐτῇ] αὐτὴν καλεῖ BFb. 16. τῇ] τόν V. Post πρῶτον add. τὸ φητόν BFb, m. rec. P. ἐκάλεσε V. 17. καλεῖ — δυναμένην] om. V. 19. ἀπὸ τῶν] om. V. τό] τοῦ P.

22.

Ad libr. X deff. alt.

Ἐξ οὖν οὐσῶν τῶν οὐτως καταλαμβανομένων ἐν-
 θεῖων τάττει πρώτας τῇ τάξει τρεῖς, ἐφ' ὧν ἡ μείζων
 τῆς ἐλάσσονος μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ,
 δευτέρας δὲ τῇ τάξει τὰς λοιπὰς τρεῖς, ἐφ' ὧν τῷ ἀπὸ
 5 ἀσυμμέτρου, διὰ τὸ προτερεῖν τὸ σύμμετρον τοῦ ἀσυμ-
 μέτρου· καὶ ἐτι πρώτην μὲν, ἐφ' ἧς τὸ μείζον ὄνομα
 σύμμετρόν ἐστι τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ, δευτέραν δέ, ἐφ'
 ἧς τὸ ἐλάσσον, διὰ τὸ πάλιν προτερεῖν τὸ μείζον τοῦ
 ἐλάσσονος τῷ ἐμπεριέχειν τὸ ἐλάσσον, τρίτην δέ, ἐφ'
 10 ὧν μηδέτερον τῶν ὀνομάτων σύμμετρόν ἐστι τῇ ἐκ-
 κειμένῃ ῥητῇ. καὶ ἐπὶ τῶν ἐξῆς τριῶν ὁμοίως τὴν
 πρώτην τῆς εἰρημένης δευτέρας τάξεως τετάρτην καλῶν
 καὶ τὴν δευτέραν πέμπτην καὶ τὴν τρίτην ἕκτην.

23.

Ad libr. X prop. 90.

Ἔστι δὲ καὶ συντομώτερον δεῖξαι τὴν εὕρεσιν τῶν
 15 εἰρημένων ἕξ ἀποτομῶν. καὶ δὴ ἔστω εὕρεῖν τὴν
 πρώτην. ἐκκείσθω ἡ ἐκ δύο ὀνομάτων πρώτη ἡ $ΑΓ$,
 ἧς μείζον ὄνομα ἡ $ΑΒ$, καὶ τῇ $ΒΓ$ ἴση κείσθω ἡ $ΒΔ$.
 αἱ $ΑΒ$, $ΒΓ$ ἄρα, τουτέστιν αἱ $ΑΒ$, $ΒΔ$, ῥηταὶ εἰσι
 δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ ἡ $ΑΒ$ τῆς $ΒΓ$, τουτ-
 20 ἐστι τῆς $ΒΔ$, μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ,

22. Post ἕκτη p. 136, 19 PBFb; mg. V, sed add. κείμενον.

23. Post δεῖξαι p. 274, 15 PBFVb.

1. οὖν] m. 2 F. οὕτω Bfb. 3. Ante συμμέτρου ras.
 1 litt. B. 4. τῷ] mut. in τό m. rec. P, corr. ex τό F, τό b.
 5. ἀσυμμέτρου] ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ V. ἀσυμμέτρου] συμμέτρου V.
 6. πρώτῃ B, sed corr. m. 1. 7. δεύτερον P, corr. m. rec. 8.
 ἑλαττον Bb, comp. F. 9. ἐλάττονος Bb, comp. F. τῷ] e corr. V.

22.

Ad libr. X deff. alt.

Cum igitur rectae ita inuentae sex sint, ordine primas tres ponit, in quibus maior quadrata minorem excedit quadrato rectae sibi commensurabilis, secundas autem ordine tres reliquas, in quibus quadrato rectae sibi incommensurabilis excedit, quia commensurabile antecedit incommensurabile; et praeterea primam, in qua maius nomen rationali propositae commensurabile est, secundam autem, in qua minus, quia rursus maius antecedit minus, quia minus comprehendit; tertiam autem, in qua neutrum nomen rationali propositae commensurabile est. et in sequentibus tribus similiter, primam secundae classis, quam nominauimus, quartam uocans, secundam quintam, tertiam sextam.

23.

Ad libr. X prop. 90.

Licet autem breuius quoque inuentionem sex apotomiarum, quas diximus, demonstrare. sit enim propositum primam inuenire. ponatur $A\Gamma$ recta ex duobus nominibus prima, cuius maius nomen sit AB , et ponatur $B\Delta = B\Gamma$. itaque AB , $B\Gamma$, hoc est AB , $B\Delta$, rationales sunt potentia tantum commensurabiles [prop. XXXVI], et AB^2 excedit $B\Gamma^2$, hoc est $B\Delta^2$, quadrato rectae sibi commensurabilis, et AB rationali propositae commensu-

10. ἐστὶ σύμμετρον BFb. 11. ἐπὶ] corr. ex ἐπεί V. 14. κα' BVb. 12. ἐστὶν B. 13. εὐθεῖαν FV? 15. ξξ] om. b.
 16. ἡ] (prins) om. PV. 17. ἐκκελεῖσθαι V. 18. εἶσιν B.
 Euclides, edd. Heiberg et Menge. III. 28

καὶ ἡ AB σύμμετρός ἐστι τῇ ἐκκειμένη ρητῇ μήκει· ἀποτομὴ ἄρα πρώτη ἐστὶν ἡ AA . ὁμοίως δὴ καὶ τὰς λοιπὰς ἀποτομὰς εὐρήσομεν ἐκθέμενοι τὰς ἰσαριθμούς ἐκ δύο ὀνομάτων· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

24.

Ad libr. X prop. 115.

5

Ἄλλως.

Ἐστω μέση ἡ AG · λέγω, ὅτι ἀπὸ τῆς AG ἄπειροι ἄλογοι γίνονται, καὶ οὐδεμία οὐδεμιᾶ τῶν πρότερον ἡ αὐτή.

- Ἦχθω τῇ AG πρὸς ὀρθὰς ἡ AB , καὶ ἔστω ρητὴ
 10 ἡ AB , καὶ συμπληρώσθω τὸ $BΓ$ · ἄλογον ἄρα ἐστὶ τὸ $BΓ$, καὶ ἡ δυναμένη αὐτὸ ἄλογός ἐστιν. δυνάσθω αὐτὸ ἡ $ΓΔ$ · ἄλογος ἄρα ἐστὶν ἡ $ΓΔ$. καὶ οὐδεμιᾶ τῶν πρότερον ἡ αὐτή· το γὰρ ἀπ' οὐδεμιᾶς τῶν πρότερον παρὰ ρητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ μέσην.
 15 πάλιν συμπληρώσθω τὸ $ΕΔ$ · ἄλογον ἄρα ἐστὶ τὸ $ΕΔ$, καὶ ἡ δυναμένη αὐτὸ ἄλογός ἐστιν. δυνάσθω αὐτὸ ἡ $ΔΖ$ · ἄλογος ἄρα ἐστὶν ἡ $ΔΖ$. καὶ οὐδεμιᾶ τῶν πρότερον ἡ αὐτή· το γὰρ ἀπ' οὐδεμιᾶς τῶν πρότερον παρὰ ρητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ τὴν $ΓΔ$.
 20 Ἀπὸ μέσης ἄρα ἄπειροι ἄλογοι γίνονται, καὶ οὐδεμία οὐδεμιᾶ τῶν πρότερον ἡ αὐτή ἐστὶν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

24. Post δεῖξαι p. 370, 23 PBFVb.

- | | |
|--|------------------|
| 3. ἐκθέμενοι] ν e corr. P. τὰς] om. V. | εἰσαριθμούς B. |
| 4. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] om. B F V b, comp. P. | 7. γίνονται V. |
| οὐδεμία] om. P F V. | 8. ἡ] ἐστὶν ἡ B. |
| ras. φ. ἄλογον — 11. $BΓ$] mg. m. 1 P. | 10. ἄλογον] in |
| | 11. ἐστὶ P B V, |

rabilis est [deff. alt. 1]. ergo AA apotome est prima. similiter igitur reliquas quoque apotomas inuenimus expositis rectis ex duobus nominibus eiusdem numeri; quod erat demonstrandum.

24.


Ad libr. X prop. 115.

Aliter.

Sit AG media. dico, ab AG irrationales infinitas numero oriri, et nullam ulli priorum similem esse.

Ducatur AB ad AG perpendicularis, et rationalis sit AB , et expleatur BG . itaque BG irrationale est [prop. XX], et recta ei aequalis quadrata irrationalis

$A \quad G \quad \Delta \quad Z$



$B \quad E$

est. sit $GA^2 = BG$. itaque GA irrationalis est. nec ulli priorum similis est. neque enim ullius priorum quadratum rectae rationali applicatum latitudinem efficit mediam. rursus expleatur $EΔ$. itaque $EΔ$ irrationale est [prop. XX], et recta ei aequalis quadrata irrationalis est. sit $ΔZ^2 = EΔ$. itaque $ΔZ$ irrationalis est. nec ulli priorum similis est. neque enim ullius priorum quadratum rationali applicatum latitudinem efficit GA .

Ergo a media irrationales numero infinitae oriuntur, et nulla ulli priorum similis est; quod erat demonstrandum.

comp. Fb. 16. $\xi\sigma\tau\iota\nu$] comp. Fb, $\xi\sigma\tau\iota$ PBV. 20. $\acute{\alpha}\pi\omicron\delta\ \tau\eta\varsigma$
Bb, $\tau\eta\varsigma$ add. m. 2 F. $\gamma\acute{\iota}\gamma\nu\nu\nu\alpha\iota$ B. $\omicron\upsilon\delta\epsilon\mu\acute{\iota}\alpha$] om. PFVb.
21. $\omicron\upsilon\delta\epsilon\mu\acute{\iota}\alpha\nu$ φ. $\xi\sigma\tau\iota\nu$ · $\omicron\pi\epsilon\rho\ \xi\delta\epsilon\iota\ \delta\epsilon\iota\chi\alpha\iota$] om. BFb.

25.

Ἡ τῇ ἐλάσσονι σύμμετρος ἐλάσσων ἐστίν.

Ἔστω ἐλάσσων ἡ A , καὶ τῇ A σύμμετρος [ἔστω]
ἡ B . λέγω, ὅτι ἡ B ἐλάσσων ἐστίν.

Κεῖσθω φητὴ ἡ $\Gamma\Delta$ καὶ τῷ ἀπὸ τῆς A ἴσον παρὰ
5 τὴν $\Gamma\Delta$ παραβεβλήσθω τὸ ΓE πλάτος ποιοῦν τὴν
 ΓZ . ἀποτομὴ ἄρα ἐστὶ τετάρτη ἡ ΓZ . τῷ δὲ ἀπὸ τῆς
 B ἴσον παρὰ τὴν ZE παραβεβλήσθω τὸ ZH πλάτος
ποιοῦν τὴν $Z\Theta$. ἐπεὶ οὖν σύμμετρός ἐστιν ἡ A τῇ B ,
σύμμετρον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς A τῷ ἀπὸ τῆς B .
10 ἀλλὰ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς A ἴσον ἐστὶ τὸ ΓE , τῷ δὲ
ἀπὸ τῆς B ἴσον ἐστὶ τὸ ZH . σύμμετρον ἄρα ἐστὶ
τὸ ΓE τῷ ZH . ὥς δὲ τὸ ΓE πρὸς τὸ ZH , οὕτως
ἐστὶν ἡ ΓZ πρὸς τὴν $Z\Theta$. σύμμετρος ἄρα ἐστὶν
ἡ ΓZ τῇ $Z\Theta$ μῆκει. ἀποτομὴ δὲ ἐστὶ τετάρτη ἡ ΓZ .
15 ἀποτομὴ ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ $Z\Theta$ τετάρτη. τὸ HZ ἄρα
περιέχεται ὑπὸ φητῆς τῆς ZE καὶ ἀποτομῆς τετάρτης
τῆς $Z\Theta$. ἐὰν δὲ χωρίον περιέχεται ὑπὸ φητῆς καὶ
ἀποτομῆς τετάρτης, ἡ τὸ χωρίον δυναμένη ἐλάσσων
ἐστίν. δύναται δὲ τὸ ZH ἡ B . ἐλάσσων ἄρα ἐστὶν
20 ἡ B . Ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

25. Alia demonstr. prop. 105, post nr. 24 PFV, mg. m.
1 b, m. 2 B, in V etiam ad prop. 105 mg. m. 1 (V_2).

1. ἄλλως τὸ ρς' V_2 , ριζ' b, ριη' B; ριε' F, ριζ' m. 2.
ἐλάττων F. 2. ἐλάττων F. ἔστω] om. PV. 3. ἐστὶ P,
comp. V, et postea ins. φ. 4. ἐκκείσθω BbV₂. φητὴ ἡ
 $\Gamma\Delta$] γὰρ ἡ $\Gamma\Delta$ φητὴ BV₂, ἡ $\Gamma\Delta$ φητὴ b, ἡ $\Gamma\Delta$ F. A] Δ φ.
6. τῷ] τὸ PB. 7. Post ZE add. $\Gamma\Delta$ P, et V, sed del. 8.
τῇ B] corr. ex BHB m. 1 V. 9. ἐστὶ] om. BFbV₂. τῷ]
corr. ex τό B, mut. in τό V₂. 10. ἐστὶν P, om. V₂. τό]
τῷ V₂ et B, sed corr. 11. ἐστὶ] om. BFbV₂. τό] corr.
ex τῷ V₂. ZH] in ras. m. 1 P. 13. ἐστὶν] om. FV₂.
 ΓZ] in ras. m. 1 P. ἐστὶν] om. V₂. 14. ἡ ΓZ] postea

25.

Recta minori commensurabilis minor est.

Sit minor A , et rectae A commensurabilis B . dico, B minorem esse.

ponatur ΓA rationalis, et quadrato A^2 aequale rectae ΓA adplicetur ΓE latitudinem efficiens ΓZ .

itaque ΓZ apotome est quarta [prop. C]. et quadrato B^2 aequale rectae ZE adplicetur ZH latitudinem efficiens $Z\Theta$. iam quoniam A, B commensurabiles sunt, etiam A^2, B^2 commensurabilia sunt. est autem $\Gamma E = A^2, ZH = B^2$. itaque $\Gamma E, ZH$ commensurabilia sunt. est autem $\Gamma E : ZH = \Gamma Z : Z\Theta$. itaque $\Gamma Z, Z\Theta$ longitudine commensurabiles sunt [prop. XI]. ΓZ autem apotome est quarta. itaque etiam $Z\Theta$ apotome est quarta [prop. CIII]. itaque HZ rationali ZE et apotome quarta $Z\Theta$ comprehenditur. sin spatium recta rationali et apotome quarta comprehenditur, recta spatio aequalis quadrata minor est [prop. XCIV]. et $B^2 = ZH$. ergo B minor est; quod erat demonstrandum.

add. V_2 . 15. ἐστὶ] ἐστίν P. $Z\Theta$] ΘZ P. τό HZ — 16. ZE] mg. m. 2 B, ὅγητ' δὲ ἡ ZE Bb, ὅγητ' ὅγητ' δὲ ἡ ZE F.

18. ἐλάττων B. 19. ἐστὶ $PV V_2$, comp. B Fb. ἐλάσσων — 20. δεῖξαι] om. F. 19. ἀρα] om. P. 20. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. Bb V_2 . In b add. ἰστέον, ὅτι ἡ τούτου τοῦ θεωρήματος πρότασις ἡ αὐτὴ ἐστὶ τῇ τοῦ ρς', ὅθεν καὶ ἐν τοῖς ἔσω παραλέλειπται, ἡ δὲ καταγραφὴ καὶ τὸ σχῆμα οὐ τὰ αὐτὰ εἰσιν· γέγραπται δὲ ἐν ἄλλῳ καὶ ριζ', διὸ καὶ ἡμεῖς τοῦτο παρατεθένκαμεν.

26.

Ἡ τῇ μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιούσῃ
σύμμετρος μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιούσά
ἐστίν.

Ἐστω μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιούσα ἡ *A*,
5 σύμμετρος δὲ αὐτῇ ἡ *B*. λέγω, ὅτι ἡ *B* μετὰ ῥητοῦ
μέσον τὸ ὅλον ποιούσα ἐστίν.

Ἐκκείσθω ῥητὴ ἡ *ΓΔ*, καὶ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς *A* ἴσον
παρὰ τὴν *ΓΔ* παραβεβλήσθω τὸ *ΓΕ* πλάτος ποιοῦν
τὴν *ΓΖ*. ἀποτομὴ ἄρα ἐστὶ πέμπτῃ ἡ *ΓΖ*. τῷ δὲ ἀπὸ
10 τῆς *B* ἴσον παρὰ τὴν *ΖΕ* παραβεβλήσθω τὸ *ΖΗ* πλάτος
ποιοῦν τὴν *ΖΘ*. ἐπεὶ οὖν σύμμετρός ἐστίν ἡ *A* τῇ *B*,
σύμμετρόν ἐστι καὶ τὸ ἀπὸ τῆς *A* τῷ ἀπὸ τῆς *B*. ἀλλὰ
τῷ μὲν ἀπὸ τῆς *A* ἴσον τὸ *ΓΕ*, τῷ δὲ ἀπὸ τῆς *B*
ἴσον τὸ *ΖΗ*. σύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ *ΓΕ* τῷ *ΖΗ*.
15 σύμμετρος ἄρα καὶ ἡ *ΓΖ* τῇ *ΖΘ* μήκει. ἀποτομὴ δὲ
πέμπτῃ ἡ *ΓΖ*. ἀποτομὴ ἄρα ἐστὶ πέμπτῃ καὶ ἡ *ΖΘ*.
ῥητὴ δὲ ἡ *ΖΕ*. ἐὰν δὲ χωρίον περιέχεται ὑπὸ ῥητῆς
καὶ ἀποτομῆς πέμπτῃς, ἡ τὸ χωρίον δυναμένη μετὰ
ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιούσά ἐστίν. δύναται δὲ τὸ
20 *ΖΗ* ἢ *B*. ἡ *B* ἄρα ἡ μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποι-
ούσά ἐστίν. ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

26. Alia demonstr. prop. 106, post nr. 25 PFV, mg. m.
1 b, m. 2 B, in V etiam ad prop. 106 mg. m. 1 (V₂).


1. ἄλλως τὸ ρξ' V₂, ριθ' Fb, ριθ' B. ἡ — 3. ἐστίν]
om. V₂. 2. Ante μετὰ add. καὶ αὐτῇ m. 2 F, καὶ αὐτῇ ἡ b,
ἡ F. 4. ἔστω ἡ BFb V₂. 5. καὶ τῇ *A* σύμμετρος ἡ *B* V₂.
λέγω — 6. ἐστίν] mg. V₂. 5. ἡ *B*] supra scr. m. 1 F.
9. ἐστίν P. πέμπτῃ ἐστίν F. 12. B] BΔ φ. 13. ΓΕ]
corr. ex ZE V, ZE b. 15. καὶ] ἐστὶ καὶ V₂. ΖΘ] corr. ex
ΓΘ V, ΓΘ P. 16. πέμπτῃ] (prius) om. b. ἡ] ἐστίν ἡ b V₂.
17. ῥητόν P. ῥητὴ δὲ ἡ ZE] om. V₂. 19. ἐστὶ Vb V₂,

26.

Recta rectae cum rationali totum medium efficienti commensurabilis cum rationali totum medium efficiens est.

Sit A recta cum rationali totum medium efficiens, ei autem commensurabilis B . dico, B rectam esse cum rationali totum medium efficientem.

ponatur rationalis $\Gamma\Delta$, et quadrato A^2 aequale rectae $\Gamma\Delta$ adplicetur ΓE latitudinem efficiens ΓZ .



itaque ΓZ apotome est quinta [prop. CI]. quadrato autem B^2 aequale rectae $Z\Theta$ adplicetur ZH latitudinem efficiens $Z\Theta$. iam quoniam A, B commensurabiles

sunt, etiam A^2, B^2 commensurabilia sunt. est autem $\Gamma E = A^2$, $ZH = B^2$. itaque $\Gamma E, ZH$ commensurabilia sunt. quare etiam $\Gamma Z, Z\Theta$ longitudine commensurabiles sunt [VI, 1; prop. XI]. ΓZ autem apotome est quinta. itaque etiam $Z\Theta$ apotome est quinta [prop. CIII]; $Z\Theta$ autem rationalis est. sin spatium recta rationali et apotome quinta comprehenditur, recta spatio aequalis quadrata recta est cum rationali totum medium efficiens [prop. XCV]. est autem $B^2 = ZH$. ergo B recta est cum rationali totum medium efficiens; quod erat demonstrandum.

comp. BF. $\delta\epsilon$] om. V. 20. η] (tert.) P V V₂, om. BFb.

21. $\epsilon\sigma\tau\iota\eta$] supra scr. V₂. $\delta\pi\epsilon\rho$ $\epsilon\delta\epsilon\iota$ $\delta\epsilon\iota\chi\alpha\iota$] comp. P, om. BFb V₂. In b add. m. 1: $\omega\sigma\alpha\nu\tau\omega\varsigma$ $\kappa\alpha\iota$ $\tau\acute{o}\upsilon\tau\omicron\nu$ $\tau\omicron\upsilon$ $\theta\epsilon\omega\rho\eta\mu\alpha\tau\omicron\varsigma$ η $\pi\rho\acute{o}\tau\alpha\iota\varsigma$ η $\alpha\nu\tau\eta$ $\epsilon\sigma\tau\iota$ $\tau\eta$ $\tau\omicron\upsilon$ $\rho\acute{\epsilon}$, $\sigma\acute{\upsilon}$ $\mu\eta$ η $\kappa\alpha\tau\alpha\gamma\rho\alpha\phi\eta$ $\kappa\alpha\iota$ $\tau\acute{o}$ $\sigma\chi\eta\mu\alpha$ $\epsilon\kappa\epsilon\lambda\iota\nu\omega$ $\tau\acute{\alpha}$ $\alpha\nu\tau\acute{\alpha}$ $\epsilon\iota\sigma\iota\nu$. $\epsilon\sigma\tau\iota$ $\delta\epsilon$ $\epsilon\nu$ $\epsilon\tau\epsilon\rho\omega$ $\kappa\alpha\iota$ $\rho\iota\eta$, $\delta\iota\omicron$ $\kappa\alpha\iota$ $\eta\mu\acute{\iota}\nu$ $\pi\alpha\rho\alpha\gamma\acute{\epsilon}\gamma\rho\alpha\pi\tau\alpha\iota$. $\epsilon\iota\tau\alpha$ $\tau\acute{o}$ $\epsilon\nu\delta\omicron\nu$ $\rho\iota\acute{\epsilon}$ $\epsilon\nu$ $\epsilon\kappa\epsilon\lambda\iota\nu\omega$ $\epsilon\sigma\tau\iota$ $\rho\iota\delta$ $\kappa\alpha\iota$ $\epsilon\acute{\xi}\eta\varsigma$ $\tau\acute{\alpha}$ $\lambda\omicron\upsilon\pi\acute{\alpha}$.

27.

Προκείσθω ἡμῖν δεῖξαι, ὅτι ἐπὶ τῶν τετραγώνων σχημάτων ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ διάμετρος τῇ πλευρᾷ μήκει.

Ἐστω τετράγωνον τὸ $ABΓΔ$, διάμετρος δὲ αὐτοῦ
5 ἡ $ΑΓ$. λέγω, ὅτι ἡ $ΓΑ$ ἀσύμμετρός ἐστι τῇ $ΑΒ$ μήκει.

Εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω σύμμετρος· λέγω, ὅτι συμβήσεται τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν ἄρτιον εἶναι καὶ περισσόν. φανερόν μὲν οὖν, ὅτι τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$ διπλάσιον τοῦ ἀπὸ τῆς $ΑΒ$. καὶ ἐπεὶ σύμμετρός ἐστιν ἡ $ΓΑ$ τῇ $ΑΒ$,
10 ἡ $ΓΑ$ ἄρα πρὸς τὴν $ΑΒ$ λόγον ἔχει, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν. ἐχέτω, ὃν ὁ $ΕΖ$ πρὸς $Η$, καὶ ἔστωσαν οἱ $ΕΖ$, $Η$ ἐλάχιστοι τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐχόντων αὐτοῖς· οὐκ ἄρα μονὰς ἐστὶν ὁ $ΕΖ$. εἰ γὰρ ἔσται μονὰς ὁ $ΕΖ$, ἔχει δὲ λόγον πρὸς τὸν $Η$, ὃν ἔχει ἡ $ΑΓ$ πρὸς
15 τὴν $ΑΒ$, καὶ μείζων ἡ $ΑΓ$ τῆς $ΑΒ$, μείζων ἄρα καὶ ἡ $ΕΖ$ τοῦ $Η$ ἀριθμοῦ· ὅπερ ἄτοπον. οὐκ ἄρα μονὰς ἐστὶν ὁ $ΕΖ$ · ἀριθμὸς ἄρα. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ $ΓΑ$ πρὸς τὴν $ΑΒ$, οὕτως ὁ $ΕΖ$ πρὸς τὸν $Η$, καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς $ΓΑ$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΒ$, οὕτως ὁ ἀπὸ
20 τοῦ $ΕΖ$ πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ $Η$. διπλάσιον δὲ τὸ ἀπὸ τῆς $ΓΑ$ τοῦ ἀπὸ τῆς $ΑΒ$ · διπλασίων ἄρα καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ $ΕΖ$ τοῦ ἀπὸ τοῦ $Η$ · ἄρτιος ἄρα ἐστὶν ὁ ἀπὸ τοῦ $ΕΖ$ · ὥστε καὶ αὐτὸς ὁ $ΕΖ$ ἄρτιός ἐστιν. εἰ γὰρ ἦν περισσός, καὶ ὁ ἀπ' αὐτοῦ τετράγωνος περισσός ἦν,

Post. nr. 26 PBFVb.


ριξ' b, ρκ' B; ρις' corr. in ριθ' m. 2 F. 1. ὅτι] m. 2 B.
2. σύμμετρος F, corr. m. 2. 5. $ΓΑ$] $ΑΓ$ FV. σύμμετρος
F, corr. m. 2. 7. περιττόν V. 8. ἐστὶ τοῦ Bb, ἐστὶ add.
m. 2 F. 9. τῆς] corr. ex. τοῦ m. 1 b. $ΓΑ$] $ΑΓ$ F. 10.
 $ΓΑ$] in ras. V, $ΑΓ$ F. ἄρα] om. V. 11. ὃν] in ras. B.

27.

Propositum sit nobis demonstrare, in figuris quadratis diametrum latusque longitudine incommensurabilia esse.

Sit $AB\Gamma A$ quadratum, diametrus autem eius $A\Gamma$. dico, ΓA , AB longitudine incommensurabiles esse.

nam si fieri potest, commensurabiles sint. dico, fore, ut idem numerus et par et impar sit. manifestum igitur, esse $A\Gamma^2 = 2 AB^2$ [I, 47]. et quoniam ΓA , AB commensurabiles sunt, $\Gamma A : AB$ rationem habet,



quam numerus ad numerum [prop. VI]. sit

$$\Gamma A : AB = EZ : H,$$

et EZ , H minimi sint eorum, qui eandem rationem habent

[cfr. VII, 33]. itaque EZ unitas non est. si enim est unitas, et $EZ : H = A\Gamma : AB$, et $A\Gamma > AB$, erit etiam $EZ > H$, unitas numero [V, 14]; quod absurdum est. quare EZ unitas non est. ergo numerus est. et quoniam est $\Gamma A : AB = EZ : H$, erit etiam $\Gamma A^2 : AB^2 = EZ^2 : H^2$ [VI, 20 coroll.; VIII, 11]. uerum $\Gamma A^2 = 2 AB^2$. itaque etiam $EZ^2 = 2 H^2$. quare EZ^2 par est. itaque etiam ipse EZ par est. nam si impar esset, etiam quadratum eius impar esset,

EZ] E in ras. m. 1 P. τὸν H B F b. 12. H] om. b.
 14. ἔχει δέ] καὶ ἔχει B F b. πρὸς] (prius) comp. corr. ex
 comp. καὶ m. 1 F. 16. Post EZ add. μονάς B b, m. rec. V.
 17. ἔστιν] (prius) m. 2 F. ΓA] $A\Gamma$ B. 18. τὸν] o in
 ras. B. 19. ΓA] Γ in ras. V. AB] B in ras. m. 1 P. 21.
 τῆς] τοῦ P F V. ἀπὸ τῆς] m. rec. V. τῆς] τοῦ P. δι-
 πλάσιον F, διπλάσιος V. δ] τό F b. 22. τοῦ] (primum)
 τῆς F. 23. ὥστε] -ε e corr. V. 24. ἦν] ἂν ἦν V.

ἐπειδήπερ, ἐὰν περισσοὶ ἀριθμοὶ ὁποσοιοῦν συντεθῶσιν, τὸ δὲ πλῆθος αὐτῶν περισσὸν ἦ, ὁ ὅλος περισσὸς ἐστίν· ὁ EZ ἄρα ἄρτιός ἐστιν. τετμήσθω δίχα κατὰ τὸ Θ. καὶ ἐπεὶ οἱ EZ, H ἐλάχιστοι εἰσι τῶν τὸν αὐτὸν λόγον
 5 ἔχόντων [αὐτοῖς], πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους εἰσίν. καὶ ὁ EZ ἄρτιος· περισσὸς ἄρα ἐστὶν ὁ H. εἰ γὰρ ἦν ἄρτιος, τοὺς EZ, H δυὰς ἐμέτρει· πᾶς γὰρ ἄρτιος ἔχει μέρος ἡμισυ· πρῶτους ὄντας πρὸς ἀλλήλους· ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ ἄρα ἄρτιός ἐστιν ὁ H· περισσὸς
 10 ἄρα. καὶ ἐπεὶ διπλάσιος ὁ EZ τοῦ EΘ, τετραπλάσιος ἄρα ὁ ἀπὸ EZ τοῦ ἀπὸ EΘ. διπλάσιος δὲ ὁ ἀπὸ τοῦ EZ τοῦ ἀπὸ τοῦ H· διπλάσιος ἄρα ὁ ἀπὸ τοῦ H τοῦ ἀπὸ EΘ· ἄρτιος ἄρα ἐστὶν ὁ ἀπὸ τοῦ H. ἄρτιος ἄρα διὰ τὰ εἰρημένα ὁ H· ἀλλὰ καὶ περισσὸς· ὅπερ ἐστὶν
 15 ἀδύνατον. οὐκ ἄρα σύμμετρός ἐστιν ἡ ΓΑ τῇ AB μήκει· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

Ἄλλως.

[Δεικτέον καὶ ἐτέρως, ὅτι ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ τοῦ τετραγώνου διάμετρος τῇ πλευρᾷ].
 20 Ἔστω ἀντὶ μὲν τῆς διαμέτρου ἡ A, ἀντὶ δὲ τῆς πλευρᾶς ἡ B· λέγω, ὅτι ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ A τῇ B μήκει. εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω [σύμμετρος· καὶ γερονέτω] πάλιν ὥς ἡ A πρὸς τὴν B, οὕτως ὁ EZ ἀριθμὸς πρὸς τὸν H, καὶ ἔστωσαν ἐλάχιστοι τῶν τὸν αὐτὸν λόγον
 25 ἔχόντων αὐτοῖς οἱ EZ, H· οἱ EZ, H ἄρα πρῶτοι πρὸς

1. συντεθῶσι PFV. 2. ὁ] om. B, καὶ ὁ FV. 3. ἐστίν] comp. Fb, ἐστι PBV. Θ] e corr. B. 4. H ἀριθμοὶ BFb.
 5. αὐτοῖς] om. P. εἰσὶ PVb, comp. F. καὶ] καὶ ἐστίν BFb.
 7. μετρεῖ F, corr. m. 2; ἂν ἐμέτρει bene edd. 10. διπλάσιος] διπλάσιός ἐστιν F, διπλάσιων ἐστίν Bb. 11. ἀπό]

quoniam, si numeri impares componuntur, et multitudo eorum impar est, totus impar est [IX, 23]. ergo EZ par est. in Θ in duas partes aequales secetur. et quoniam EZ , H minimi sunt eorum, qui eandem rationem habent, inter se primi sunt [VII, 21]. et EZ par est. itaque H impar est. *nam si par esset, binas numeros EZ , H metiretur (omnis enim numerus par partem dimidiam habet [VII def. 6]), qui inter se primi sunt; quod fieri non potest. ergo H par non est. impar igitur est. et quoniam $EZ = 2E\Theta$, erit [VIII, 11] $EZ^2 = 4E\Theta^2$. est autem $EZ^2 = 2H^2$. itaque $H^2 = 2E\Theta^2$. quare H^2 par est. itaque propter ea, quae diximus [p. 408, 23 sq.], H par est. at idem impar est; quod fieri non potest. ergo ΓA , AB longitudine commensurabiles non sunt; quod erat demonstrandum.

Aliter.

Sit pro diametro A , pro latere autem B . dico, A et B longitudine incommensurabiles esse. nam si fieri potest, sit rursus ut $A:B$, ita numerus EZ ad H [cfr. prop. VI], et EZ , H minimi sint eorum, qui eandem rationem habent [cfr. VII, 33]. itaque EZ , H primi sunt inter se [VII, 21]. primum dico, H unitatem

m. 2 F. EZ] τοῦ EZ Bb, m. 2 F. $E\Theta$] τοῦ $E\Theta$ Bbφ.
 12. H] (prius) H ἡ b. 13. $E\Theta$] ΘE in ras. V, τοῦ $E\Theta$ BFb.
 14. ἐστίν] om. V. 15. ΓA] in ras. V, supra scr. Δ b.
 16. Post μήκει add. ἀσύμμετρος ἄρα (ἄρα m. 2 F) BFb.
 ὅπερ εἶδει δεῖξαι] comp. P, om. b, σὴ :~ B. 17. ἄλλως]
 om. BFVb, οὐδ' mg. F. 18. δεικτέον — 19. πλεονεξί] om. P,
 mg. V. 20. ἔστω γάρ BFb. 22. σύμμετρος· καὶ γεγονέντω]
 om. PV, m. 2 F. 25. αὐτοῖς] om. Fb, m. 2 B. ol] (prius)
 e corr. V. πρῶτοι] supra scr. m. 1 F.

ἀλλήλους εἰσίν. λέγω πρῶτον, ὅτι ὁ *H* οὐκ ἐστι μονάς.
 εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω μονάς. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ *A*
 πρὸς τὴν *B*, οὕτως ὁ *EZ* πρὸς τὸν *H*, καὶ ὡς ἄρα
 τὸ ἀπὸ τῆς *A* πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *B*, οὕτως ὁ ἀπὸ τοῦ
 5 *EZ* πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ *H*. διπλάσιον δὲ τὸ ἀπὸ τῆς
A τοῦ ἀπὸ τῆς *B*· διπλάσιος ἄρα καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ *EZ*
 τοῦ ἀπὸ τοῦ *H*. καὶ ἐστι μονάς ὁ *H*· δυάς ἄρα ὁ
 ἀπὸ *EZ* τετραγώνος· ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ ἄρα
 μόνάς ἐστὶν ὁ *H*· ἀριθμὸς ἄρα. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς
 10 τὸ ἀπὸ τῆς *A* πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *B*, οὕτως ὁ ἀπὸ *EZ*
 πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ *H*, καὶ ἀνάπαλιν ὡς τὸ ἀπὸ τῆς
B πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *A*, οὕτως ὁ ἀπὸ τοῦ *H* πρὸς τὸν
 ἀπὸ τοῦ *EZ*, μετρεῖ δὲ τὸ ἀπὸ τῆς *B* τὸ ἀπὸ τῆς *A*,
 μετρεῖ ἄρα καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ *H* τετραγώνος τὸν ἀπὸ τοῦ
 15 *EZ*· ὥστε καὶ ἡ πλευρὰ αὐτῇ ὁ *H* τὸν *EZ* μετρεῖ.
 μετρεῖ δὲ καὶ ἐαυτὸν ὁ *H*· ὁ *H* ἄρα τοὺς *EZ*, *H*
 μετρεῖ πρώτους ὄντας πρὸς ἀλλήλους· ὅπερ ἐστὶν
 ἀδύνατον. οὐκ ἄρα σύμμετρός ἐστιν ἡ *A* τῇ *B* μήκει·
 ἀσύμμετρος ἄρα ἐστίν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.


28.

Σχόλιον.

20 Εὐρημένων δὴ τῶν μήκει ἀσυμμέτρων εὐθειῶν,
 ὡς τῶν *A*, *B*, εὐρίσκεται καὶ ἄλλα πλείστα μεγέθη ἐκ
 δύο διαστάσεων, λέγω δὴ ἐπίπεδα, ἀσύμμετρα ἀλλήλοις.
 ἐὰν γὰρ τῶν *A*, *B* εὐθειῶν μέσην ἀνάλογον λάβωμεν
 25 τὴν *Γ*, ἔσται ὡς ἡ *A* πρὸς τὴν *B*, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς

28. Post. nr. 27 PBFVb.

1. εἰσὶ PVb, comp. F. ὅτι" πρῶτον b. 3. ὁ] ἡ F.
 τόν] τήν Fb. 4. τό] ὁ P. τό] τόν P. τοῦ] τῆς PV.



non esse. nam si fieri potest, sit unitas. et quoniam est $A:B = EZ:H$, erit etiam $A^2:B^2 = EZ^2:H^2$ [VI, 20 coroll.; VIII, 11]. uerum $A^2 = 2 B^2$ [I, 47]. itaque etiam $EZ^2 = 2 H^2$. et H unitas est. itaque numerus qua-

dratus EZ^2 binas est; quod fieri non potest. quare H unitas non est; ergo numerus est. et quoniam est $A^2:B^2 = EZ^2:H^2$, et e contrario [V, 7 coroll.] $B^2:A^2 = H^2:EZ^2$, et B^2 metitur A^2 , etiam H^2 metitur EZ^2 . quare etiam latus ipsum H numerum EZ metitur. uerum H etiam se ipsum metitur. itaque H numeros EZ , H metitur inter se primos; quod fieri non potest. quare A , B longitudine commensurabiles non sunt. ergo incommensurabiles sunt; quod erat demonstrandum.

28.

Scholium.

Inuentis igitur rectis longitudine incommensurabilibus, uelut A , B , etiam plurimae aliae magnitudines duarum dimensionum, scilicet planae, inter se incommensurabiles inueniuntur. nam si inter rectas A , B mediam proportionalem sumpserimus Γ , erit ut $A:B$, ita figura plana in A descripta ad figuram in Γ si-


6. διπλάσιον P. 7. ὁ ἀπό] ἐστίν ὁ Fb, ἐστίν ὁ ἀπὸ τοῦ B.
 10. τό] (prius) supra m. 1 V. ἀπό] (tert.) om. BFb. 11. ἀπὸ τοῦ] om. BFb. 13. τό] (alt.) corr. ex τῷ m. 1 F. 14. δ] τό F. 15. αὐτῆς B. 18. ἡ A] e corr. V. 19. ἐστίν] om. BFb. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. BFb. 20. σχόλιον] om. FVb (in fig. ριγ' F), ρκα' B. 22. εὐρίσκονται B (corr. m. 2) Fb. 23. δῆ] δῆ ὅτι F. ἐπίπεδον F. σύμμετρα B, sed corr. 24. εὐθεῖων] om. BF.

Α ἐπίπεδον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *Γ* τὸ ὅμοιον καὶ ὁμοίως ἀναγραφόμενον, εἴτε τετράγωνα εἴη τὰ ἀναγραφόμενα εἴτε ἕτερα εὐθύγραμμα ὅμοια εἴτε κύκλοι περὶ διαμέτρους τὰς *Α*, *Γ*, ἐπεὶπερ οἱ κύκλοι πρὸς ἀλλήλους
 5 εἰσὶν ὡς τὰ ἀπὸ τῶν διαμέτρων τετράγωνα. εὐρηνται ἄρα καὶ ἐπίπεδα χωρία ἀσύμμετρα ἀλλήλοις· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

Δεδειγμένων δὴ καὶ τῶν ἐκ δύο διαστάσεων διαφορῶν ἀσύμμετρων χωρίων δείξομεν τοῖς ἀπὸ τῆς τῶν
 10 στερεῶν θεωρίας, ὡς ἔστι καὶ στερεὰ σύμμετρά τε καὶ ἀσίμμετρα ἀλλήλοις. ἐὰν γὰρ ἐπὶ τῶν ἀπὸ τῶν *Α*, *Β* τετραγώνων ἢ τῶν ἰσων αὐτοῖς εὐθυγράμμων ἀναστήσωμεν ἰσοϋψῇ στερεὰ παραλληλεπίπεδα ἢ πυραμίδας ἢ πρίσματα, ἔσται τὰ ἀνασταθέντα πρὸς ἄλληλα ὡς αἱ
 15 βάσεις. καὶ εἰ μὲν σύμμετροί εἰσιν αἱ βάσεις, σύμμετρα ἔσται καὶ τὰ στερεά, εἰ δὲ ἀσύμμετροι, ἀσύμμετρα. ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

Ἀλλὰ μὴν καὶ δύο κύκλων ὄντων τῶν *Α*, *Β* ἐὰν ἀπ' αὐτῶν ἰσοῦψεῖς κώνους ἢ κυλίνδρους ἀναγράψωμεν,
 20 ἔσονται πρὸς ἀλλήλους ὡς αἱ βάσεις, τοιούτεστιν ὡς οἱ *Α*, *Β* κύκλοι. καὶ εἰ μὲν σύμμετροί εἰσιν οἱ κύκλοι, σύμμετροι ἔσονται καὶ οἱ τε κῶνοι πρὸς ἀλλήλους καὶ

1. ἐπίπεδον] εἶδος BFb. τῆς] om. P. καί] τε καὶ V.
 2. ἀναγεγραμμένον BF, mg. b. ἀναγεγραμμένα BFb. 3. εἴτε] (prius) εἴτε καὶ P. 4. ἐπεὶ γὰρ, supra scr. περ m. 1 F. Mg. μαθητῇ τοῦτο ἐν τῷ β' τοῦ ιβ' ἐν τοῖς στερεοῖς m. rec. B. 6. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] :~ BFb, et P, sed supra scr. m. 1 comp. 8. ρκβ' B. 9. χωρίων ἀσύμμετρων B. τοῖς] ἐν τοῖς Vb. 11. ἀπὸ τῶν] om. F. 12. ἀναστήσω V, deinde supra scr. αὐτοῖς m. 1. 13. ἰσονψῇ] ἰ- in ras. m. 1 B. ἰσονψῇ στερεὰ παραλληλεπίπεδα] mg. V, in textu del. ἰσονψῇ γραμμὰς ἢ παραλληλεπίπεδα. παραλληλοεπίπεδα F, παράλληλα ἐπίπεδα b. ἢ] e corr. F; οἶον, supra scr. ἢ m. 1 b. 14. ὡς] postea ins. m.

milem et similiter descriptam [VI, 19 coroll.], siue quadrata sunt figurae descriptae siue aliae rectilineae

 similes siue circuli circum diametros A , Γ , quoniam circuli eam inter se rationem habent, quam quadrata diametrorum [XII, 2]. ergo etiam plana spatia inter se incommensurabilia inuenta sunt; quod erat demonstrandum.

Inuentis iam spatiis quoque diuersis duarum dimensionum incommensurabilibus per ea, quae ad theoriam solidorum pertinent, demonstrabimus, solida quoque esse inter se commensurabilia et incommensurabilia. si enim in quadratis rectarum A , B uel figuris rectilineis iis aequalibus solida construxerimus eiusdem altitudinis uel parallelepipeda uel pyramidas uel prismata, solida constructa eam inter se rationem habebunt, quam bases [XI, 32. XII, 5; 6]. et si bases commensurabiles sunt, etiam solida commensurabilia erunt, sin incommensurabiles, incommensurabilia. [prop. XI]; quod erat demonstrandum.


praeterea si A , B duo circuli sunt, si in iis conos uel cylindros eiusdem altitudinis construxerimus, eam inter se rationem habebunt, quam bases, hoc est quam circuli A , B [XII, 11]. et si circuli commensurabiles sunt, etiam cono cylindrique inter se commensurabiles

1 V. 16. ἀσύμμετροί εἰσιν αἱ βάσεις V. 17. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] om. B F b. 18. ὅγ' B. κύκλων] in ras. V. 20. ὥς] om. P, m. 2 V. Post alt. ὥς ras. 3 litt. V. 21. εἰσιν] εἴεν V. 22. καὶ] om. B. τε] om. b. πρὸς ἀλλήλους] ἀλλήλοις B F b.

οἱ κύλινδροι, εἰ δὲ ἀσύμμετροί εἰσιν οἱ κύκλοι, ἀσύμμετροι ἔσονται καὶ οἱ κῶνοι καὶ οἱ κύλινδροι. καὶ φανερόν ἡμῖν γέγονεν, ὅτι οὐ μόνον ἐπὶ γραμμῶν καὶ ἐπιφανειῶν ἔστι συμμετρία τε καὶ ἀσυμμετρία,
 5 ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν στερεῶν σχημάτων.

1. δέ] δ' F. εἰσιν] εἶεν b. 3. γέγονε V. ὅτι] δι' ὃ
 P V. ἐπὶ] ἐπὶ τε P. 4. καί] ἢ P. ἔστιν σύμμετρα P.
 ἀσύμμετρα P. Mg. γρ. σύμμετρα καὶ ἀσύμμετρα m. 1 b. 5.
 στερεῶν] ἐτέρων F.

erunt, sin incommensurabiles sunt circuli, etiam conicylindrique incommensurabiles erunt [prop. XI]. et nobis adparuit, commensurabilitatem incommensurabilitatemque non solum in lineis planisque esse, sed etiam in corporibus solidis.







1

2

3

4





UNIVERSITY OF MICHIGAN



3 9015 02597 9033

