

B I B L I O T H E C A
S C R I P T O R V M G R A E C O R V M E T R O M A N O R V M
T E V B N E R I A N A

APOLLONIUS
PERGAEUS

EDIDIT

I. L. HEIBERG

I



STUTTGARDIAE IN AEDIBVS B. G. TEUBNERI

APOLLONII PERGAEI

QVAE GRAECE EXSTANT

CVM COMMENTARIIS ANTIQVIS

EDIDIT ET LATINE INTERPRETATVS EST

I. L. HEIBERG

I

EDITIO STEREOTYPA EDITIONIS

ANNI MDCCCXCI



STVTGARDIAE IN AEDIBVS B. G. TEVBNERI MCMLXXIV

ISBN 3-519-01051-8

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, besonders die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Bildentnahme, der Funksendung, der Wiedergabe auf photomechanischem oder ähnlichem Wege, der Speicherung und Auswertung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei Verwertung von Teilen des Werkes, dem Verlag vorbehalten.

Bei gewerblichen Zwecken dienender Vervielfältigung ist an den Verlag gemäß § 54 UrhG eine Vergütung zu zahlen, deren Höhe mit dem Verlag zu vereinbaren ist.

© B. G. Teubner, Stuttgart 1974
Printed in Germany
Druck: Julius Beltz, Hemsbach/Bergstr.

PRAEFATIO.

Conica Apollonii Pergaei, quae mathematicorum consensu summis iustissimisque efferuntur laudibus, post Halleium neminem editorem inuenerunt. et fortasse mathematicis, qui res solas spectant, aliquatenus interpretationibus satis fit; sed ne de iis dicam, quorum interest scire, quibus uerbis Apollonius ipse usus sit, et qua ratione formulas signaque nostrorum mathematicorum aequare potuerit, ipsis illis interpretationibus fundamentum certum tandem aliquando iactum esse oportet; quod Halleius, qui adhuc solus Conica Graece edidit, neque uoluit facere neque potuit, quae erat illis temporibus ratio artis criticae. itaque nouam editionem Conicorum codicibus Graecis perlustratis et collatis parare decreui, praesertim cum uiderem, editionem Halleii tam raram esse, ut etiam immodico pretio uix ac ne uix quidem posset comparari. sed ab initio mihi constabat, eos tantum libros, qui Graece exstarent, mihi tractandos esse. nam quamquam me non fugiebat, editionem ita mancam et quasi detruncatam fore, tamen a me impetrare non potui, ut interpretationem librorum V—VII, quam ex Arabico fecerat Halleius, nullis subsidiis criticis adiutus repeterem. et codices Arabicos propter linguae illius ignorantiam ipse adire non potui. imperfectum igitur maneat opus, donec aliquis linguae Arabicae

peritus codicibus Arabicis collatis nouam recensio-
nē illorum librorum instituerit. et ut sperare possimus,
hoc breui futurum esse, effecit L. L. M. Nixius edita
dissertatione, quae inscribitur *Das fünfte Buch der
Conica des Apollonius von Perga in der arabischen
Uebersetzung des Thabit Ibn Corrah* (Lipsiae 1889).
qui ut opus bene et utiliter inceptum ad finem per-
ducat, mecum optabunt, quicumque scripta mathema-
tica Graecorum nouerunt coluntque.

Quattuor libris Conicorum, qui Graece supersunt,
in uolumine altero adiungam fragmenta et Conicorum
et reliquorum operum Apollonii, quae Graece habemus,
et praeterea lemmata Pappi et commentaria Eutocii.
constat, huius uiri recensio-
nem librorum I—IV solam
relictam esse; quare id primum mihi agendum erat,
ut ea e codicibus restitueretur. quantum de pristina
Conicorum forma ueri similiter statui potest, in pro-
legomenis criticis uoluminis alterius colligam; ibidem
de cognatione codicum uberius exponam. hic breuiter
indicabo, quibus codicibus nitatur recensio mea, et
quanti quisque aestimandus sit. sunt igitur hi:

V — cod. Vatican. Gr. 206 bombyc. saec. XII—XIII,
fol., duobus uoluminibus constans; continet
fol. 1—160 Conicorum libros I—IV, fol. 161—239
Sereni opuscula. in fine mutilus est et omnino
pessime habitus; singula folia plerumque charta
pellucida inducta sunt. manus recentior (m. 2)
lacunas quasdam (in Sereno) expleuit et in
Apollonio nonnulla addidit et emendauit, manus
recentissima (m. rec.) in margine nonnulla
adscripsit. contuli Romae 1887.

- v — cod. Vatic. Gr. 203, bombyc. saec. XIII, fol.; inter alia Conica continet fol. 56—84 e V descripta. cum e V descriptus sit, antequam is tempore et situ male habitus est, utilis est ad eos locos supplendos, qui in V evanuerunt uel correcti sunt; etiam figurae, quae interdum in V cum marginibus sublatae uel detruncatae sunt, saepe e v restitui potuerunt. inspexi codicem Romae 1887 et enotavi, quae opus esse uidebantur.
- c — cod. Constantinopolitanus palatii ueteris nr. 40 bombyc. saec. XIII—XIV, fol., situ et madore paene pessumdatum, ceterum codicis V gemellus. is, cum a Fr. Blassio protractus esset et descriptus (Hermes XXIII p. 622 sq.), intercedente Ministerio nostro, quod res rationesque externas moderatur, Hauniam missus est et totus a me collatus 1889, sed cum plerumque cum V consentiat, scripturam plenam in adparatu non dedi, sed ea tantum, quae meliora praebet, sane paucissima; reliquam scripturae discrepantiam in prolegomenis criticis notabo. Conica habet fol. 349—516.
- p — cod. Paris. Gr. 2342 chartac. saec. XIII, fol. totum contuli Hauniae 1888, sed cum ab homine sermonis mathematicorum Graecorum peritissimo impudenter interpolatus sit, in adparatum eas tantum scripturas recepi, quae ad uerba Apollonii emendanda facerent; reliquas prolegomenis seruavi. quae meliora habet, sine dubio pleraque coniectura inuenta sunt.

ceterorum codicum nullum prorsus usum esse, in prolegomenis demonstrabo, nisi quod e cod. Paris. 2356 chartac. saec. XVI unam et alteram coniecturam probam recepi.

itaque recensio Conicorum tota codice V nititur, cuius scripturas omnes in adparatu indicaui. sicubi eius scriptura retineri non poterat, auctorem scripturae receptae nominaui („corr.“). qua in re praeter codices mihi praesto fuere:

Memus — Apollonii Pergei philosophi mathematiciqve excellentissimi Opera per Doctissimum Philosophum Ioannem Baptistam Memum Patrium Venetum Mathematicarumque Artium in Vrbe Veneta Lectorem Publicum De Graeco in Latinum Traducta et nouiter impressa. Venet. MDXXXVII fol.

Comm. uel Command. — Apollonii Pergaei conicorum libri quattuor... F. Commandinus Vrbinas mendis quamplurimis expurgata e Graeco conuertit et commentariis illustrauit. Bononiae MDLXVI fol.

Halley — Apollonii Pergaei Conicorum libri octo et Sereni Antissensis de sectione cylindri et conici libri duo, ed. E. Halleius. Oxoniae MDCCX fol.
de fontibus horum librorum in prolegomenis uidebimus. Memo et Commandino emendationem tum quoque tribui, ubi tacite ueram scripturam interpretantur, nisi etiam errore non perspecto eodem modo interpretati essent.

in interpretatione mea propositiones Apollonii citaui libro et propositionis numero, ubi eiusdem

libri sunt, solo numero propositionis indicato; „Eucl.“ Elementa, „dat.“ Data Euclidis significat; lemmata Pappi numeris in Graeco ab Hultschio positos citantur.

Dixi infra p. 293 et alibi, in V interdum rectangula rectasque descripta esse; quae figurae quid significant, hic exponam. explicandi uiam mihi monstrauit Hieronymus G. Zeuthen, uir de Apollonio optime meritus. primum igitur in II, 50 inueniuntur hae figurae*):

$\begin{array}{ c } \hline \chi \\ \hline \varepsilon \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \gamma \\ \hline \varepsilon \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \chi \\ \hline \delta \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{ c } \hline \mu \\ \hline \kappa \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \eta \\ \hline \kappa \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \mu \\ \hline \vartheta \\ \hline \end{array}$

$\begin{array}{|c|} \hline \gamma \\ \hline \varepsilon \\ \hline \end{array}$
 $\begin{array}{|c|} \hline \chi \\ \hline \delta \\ \hline \end{array}$
 $\begin{array}{|c|} \hline \eta \\ \hline \kappa \\ \hline \end{array}$

hoc est

$\varepsilon\chi^2 : \varepsilon\gamma^2 : \chi\varepsilon \times \varepsilon\delta =$
 $\mu\kappa^2 : \eta\kappa^2 : \mu\kappa \times \kappa\vartheta,$
 itaque $\gamma\varepsilon : \varepsilon\chi : \varepsilon\delta =$
 $\eta\kappa : \kappa\mu : \kappa\vartheta,$

quae est ratiocinatio Apollonii p. 292, 27—294, 9. ergo figuras illas aliquis adscripsit ad ratiocinationem Apollonii illustrandam oculisque subiiciendam.

eodem modo paullo infra:

$\begin{array}{ c } \hline \chi \\ \hline \varepsilon \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \varepsilon \\ \hline \gamma \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \chi \\ \hline \delta \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \chi \\ \hline \varepsilon \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \gamma \\ \hline \delta \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{ c } \hline \kappa \\ \hline \vartheta \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \vartheta \\ \hline \zeta \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \kappa \\ \hline \eta \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \vartheta \\ \hline \kappa \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \zeta \\ \hline \vartheta \\ \hline \end{array}$

*) Ubi V mutilus est, figuras e v supplui; c eadem fere habet

quae figurarum series ad p. 296, 17 sq. pertinet, sed tam mutila est, ut difficile sit dictu, quo modo ordinanda sit. nam in V sola secunda series rectangulorum exstat, quorum unum litteris caret; reliqua e v petita sunt. omnia ordine decurrent, si quattuor illae rectae primo loco ponentur et pro duobus quadratis litteris * carentibus describentur hae rectae

$$\begin{array}{c} \delta \\ \left| \begin{array}{c} \chi \\ \varepsilon \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} \varepsilon \\ \gamma \end{array} \right| \end{array} \quad \text{uel} \quad \begin{array}{c} \delta \\ \left| \begin{array}{c} \chi \\ \varepsilon \end{array} \right| \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \eta \\ \left| \begin{array}{c} \kappa \\ \vartheta \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} \xi \\ \vartheta \end{array} \right| \end{array} \quad \text{uel} \quad \begin{array}{c} \eta \\ \left| \begin{array}{c} \kappa \\ \vartheta \end{array} \right| \end{array}$$

tum enim habebimus: quoniam $\chi\varepsilon : \gamma\varepsilon = \kappa\vartheta : \vartheta\xi$, erit $\chi\varepsilon^2 : \varepsilon\gamma^2 : \chi\varepsilon \times \varepsilon\delta = \kappa\vartheta^2 : \vartheta\xi^2 : \kappa\vartheta \times \vartheta\eta$; quare $\delta\varepsilon : \chi\varepsilon : \varepsilon\gamma = \eta\vartheta : \kappa\vartheta : \xi\vartheta$ (uel $\delta\varepsilon : \chi\varepsilon = \eta\vartheta : \kappa\vartheta$).

Ad II, 51:

$$\begin{array}{c} \varepsilon \\ \left| \begin{array}{c} \eta \\ \gamma \end{array} \right| \end{array} \quad \begin{array}{c} \eta \\ \left| \begin{array}{c} \gamma \\ \eta \end{array} \right| \end{array} \quad \begin{array}{c} \xi \\ \left| \begin{array}{c} \lambda \\ \lambda \end{array} \right| \end{array} \quad \begin{array}{c} \kappa \\ \left| \begin{array}{c} \lambda \\ \lambda \end{array} \right| \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \varepsilon \quad \eta \\ \left| \begin{array}{c} \delta \end{array} \right| \end{array} \quad \begin{array}{c} \eta \quad \gamma \\ \left| \begin{array}{c} \eta \end{array} \right| \end{array} \quad \begin{array}{c} \xi \quad \lambda \\ \left| \begin{array}{c} \vartheta \end{array} \right| \end{array} \quad \begin{array}{c} \kappa \quad \lambda \\ \left| \begin{array}{c} \kappa \end{array} \right| \end{array}$$


haec Vv, nisi quod V in $\xi\lambda$ pro λ habet κ . praeterea in vc post quattuor rectas adduntur hae

$\begin{array}{c} \eta \\ \left| \begin{array}{c} \gamma \end{array} \right| \end{array} \quad \begin{array}{c} \lambda \\ \left| \begin{array}{c} \vartheta \end{array} \right| \end{array} \quad \begin{array}{c} \kappa \\ \left| \begin{array}{c} \lambda \end{array} \right| \end{array}$ (in $\lambda\vartheta$ littera ϑ in solo c seruata est).
has rectas si cum Zeuthenio ultimo loco ponemus, habebimus


$$\varepsilon\eta : \eta\gamma = \xi\lambda : \kappa\lambda \quad \text{et} \quad \varepsilon\eta \times \eta\delta : \eta\gamma^2 = \xi\lambda \times \lambda\vartheta : \kappa\lambda^2;$$

quare $\eta\delta : \eta\gamma = \lambda\vartheta : \kappa\lambda$, h. e. demonstrationem ab Apollonio omissam, triangulos $\kappa\vartheta\lambda$, $\gamma\eta\delta$ similes esse, u. p. 304, 17—19 et conf. Pappi lemma VII.


III, 15:



haec series figurarum illustrat, quae habet Apollonius p. 344, 14—24. in codicibus Vvc hae sunt discrepantiae: ante primas rectas habet V




in quadrato $\delta\beta^2$ inferius β hab. vc, om. V, pro inferiore δ hab. ϵ Vvc; rectam $\gamma\beta$ solus c habet; in rectangulo $\beta\vartheta \times \mu\pi$ in latere inferiore add. litt. $\eta - \vartheta$ Vvc; rectangulum $\beta\gamma \times \beta\vartheta$ solus habet c; in quadrato $\eta\vartheta^2$ omnes litteras om. V, superiores η, ϑ vc; pro rectangulo $\gamma\beta \times \beta\vartheta$, quod omisit V, triangulum $\gamma\beta\vartheta$ habent vc; deinde v solus addit



erroribus emendatis hoc efficitur:

$$\begin{aligned} \delta\beta : \beta\epsilon &= \delta\beta^2 : \delta\beta \times \beta\epsilon = \mu\pi : \gamma\beta \\ &= \mu\pi \times \beta\vartheta : \beta\gamma \times \beta\vartheta = \vartheta\eta^2 : \beta\gamma \times \beta\vartheta. \end{aligned}$$


III, 16:



hunc ordinem praebet c, in V binae figurae componuntur. in primo rectangulo δ om. V; in priore triangulo ε et η permutat c, in altero γ om. V; in quadrato αγ² litteras inferiores om. V, α inferius c. illustrantur uerba Apollonii p. 350, 5 sq.

$$\xi\varepsilon \times \varepsilon\delta : \alpha\varepsilon\eta : \alpha\varepsilon^2 = \gamma\beta^2 : \alpha\vartheta\gamma : \alpha\gamma^2.$$


III, 19 (in extrema prop. 17 leguntur):



hanc seriem om. c, primas tres figuras hab. v, om. V; in αξ² litteras inferiores om. v; in ηλ × λι litteras η, λ om. V, μ et α earum loco hab. v; in ρκλξ litt. ξ om. V, pro ea ξ hab. v; in μλ × λξ litt. μ, λ hab. v, om. V. illustratur, ut uidit Zeuthen, locus p. 358, 2 sq.

$$\alpha\xi^2 : \delta\tau\xi : \delta\xi^2 = \eta\lambda \times \lambda\iota : \rho\xi\lambda\kappa : \mu\lambda \times \lambda\xi.$$

III, 21:




ordinem restituit Zeuthen; in c est $\frac{1}{4} \frac{2}{3} 5$, fig. 6 hab. v,

om. Vc. in fig. 1 pro inferiore α litt. δ hab. Vvc; in fig. 2 β om. Vvc, ξ om. Vv, hab. c; in fig. 3 δ om. V; in fig. 4 pro o hab. ϑ v; in fig. 5 o hab. c, ϑ v, om. V, q om. V, τ hab. c, om. Vv; in fig. 6 ω om. v, pro κ , o hab. β , ϑ . illustratur p. 362, 11 sq.

$$\alpha\xi^2 : \beta\xi v : \beta\xi \times \xi\delta = v o \times o\eta : \kappa o q\tau : \kappa o \times o\omega.$$


III, 54:



has om. c; in prima recta $\kappa\alpha$ litt. κ om. V, hab. v; in fig. 2 α , μ ad partes dextras om. V, hab. v; fig. 3 om. V, α om. v, pro γ hab. α . demonstratio

est proportionis p. 442, 12—13 ab Apollonio usurpatae; legenda enim

$\nu\gamma:\mu\alpha=\lambda\gamma:\kappa\alpha$ itaque $\nu\gamma\times\mu\alpha:\mu\alpha^2=\lambda\gamma\times\kappa\alpha:\kappa\alpha^2$.
 $\mu\alpha:\mu\alpha=\kappa\alpha:\kappa\alpha$



has om. c, posteriores tres om. V, hab. v; in $\nu\beta\times\beta\mu$ pro μ hab. ν uel α V; in $\lambda\theta\kappa$ pro λ litt. α hab. v. legenda

$\nu\gamma\times\mu\alpha:\mu\alpha^2:\nu\beta\times\beta\mu=\gamma\lambda\times\alpha\kappa:\alpha\kappa^2:\lambda\theta\times\theta\kappa$,
 quae illustrent uerba Apollonii p. 442, 14—15.

Praefandi finem faciam gratias quam maximas agens et praefectis bibliothecarum Parisiensis, cuius liberalitatem non semel expertus sum, et imperatoris Turcici, qui permisit, ut codex Constantinopolitanus hucusque peregrinaretur, et iis uiris, quibus intercedentibus mihi licuit codices illos Hauniam transmissos commode peruoluere, Christiano Bruun, bibliothecae regiae Hauniensis praefecto, et Petro A. F. S. Vedel, praeposito nostris cum populis externis rationibus.

Ser. Hauniae mense Octobri a. MDCCCXC.

I. L. Heiberg.

APOLLONII CONICA.

ΚΩΝΙΚΩΝ α'.

Ἀπολλώνιος Εὐδήμῳ χαίρειν.

Εἰ τῷ τε σώματι εὖ ἐπανάγεις καὶ τὰ ἄλλα κατὰ
 γνώμην ἐστὶ σοι, καλῶς ἂν ἔχοι, μετρίως δὲ ἔχομεν
 5 καὶ αὐτοί. καθ' ὃν δὲ καιρὸν ἤμην μετὰ σου ἐν
 Περγάμῳ, ἐθεώρουν σε σπεύδοντα μετασχεῖν τῶν πε-
 πραγμένων ἡμῖν κωνικῶν· πέπομφα οὖν σοι τὸ πρῶτον
 βιβλίον διορθωσάμενος, τὰ δὲ λοιπά, ὅταν εὐαρεστή-
 σωμεν, ἐξαποστελοῦμεν· οὐκ ἀμνημονεῖν γὰρ οἴομαι
 10 σε παρ' ἐμοῦ ἀκηκοότα, διότι τὴν περὶ ταῦτα ἔφοδον
 ἐποίησάμην ἀξιωθεὶς ὑπὸ Ναυκράτους τοῦ γεωμέτρου,
 καθ' ὃν καιρὸν ἐσχόλαζε παρ' ἡμῖν παραγενηθεὶς εἰς
 Ἀλεξάνδρειαν, καὶ διότι πραγματεύσαντες αὐτὰ ἐν ὀκτὼ
 βιβλίοις ἐξ αὐτῆς μεταδεδώκαμεν αὐτὰ εἰς τὸ σπου-
 15 δαιότερον διὰ τὸ πρὸς ἐκπλῶ αὐτὸν εἶναι οὐ διακαθά-
 ραντες, ἀλλὰ πάντα τὰ ὑποπίπτοντα ἡμῖν θέντες ὡς
 ἔσχατον ἐπελευσόμενοι. ὅθεν καιρὸν νῦν λαβόντες ἀεὶ
 τὸ τυγχάνον διορθώσεως ἐκδίδομεν. καὶ ἐπεὶ συμ-
 βέβηκε καὶ ἄλλους τινὰς τῶν συμμεμιχότων ἡμῖν
 20 μετεिल्φέναι τὸ πρῶτον καὶ τὸ δεύτερον βιβλίον πρὶν
 ἢ διορθωθῆναι, μὴ θαυμάσης, ἐὰν περιπίπτῃς αὐτοῖς
 ἑτέρως ἔχουσιν. ἀπὸ δὲ τῶν ὀκτὼ βιβλίων τὰ πρῶτα

1. Ἀπολλωνίου Περγαίου κωνικῶν α' V. 8. εὐαρεστήσωμεν]
 in V est litterae ita coniunctae, ut similes fiant et. 15. διὰ
 — 16. τὰ] rep. mg. m. rec. V (15. εὐπλῶ) addito Ἰ̃ ἐξ ἀπογραφου

CONICORUM LIBER I.

Apollonius Eudemo s.

Si corpore conualescis ceteraque tibi ex sententia sunt, bene est, equidem satis ualeo. quo autem tempore tecum Pergami eram, uidebam te cupidum esse conica a me elaborata cognoscendi. quare primum librum ad te misi, postquam eum emendaui, reliquos autem, quando iis contenti erimus, mittemus. neque enim credo, te oblitum esse, quod a me audisti, me ad haec adcessisse rogatu Naucratis geometrae, quo tempore Alexandriam profectus nobiscum degeret, nosque ea in octo libris elaborata statim festinantius paullo cum eo communicasse, quod in eo esset, ut discederet, ita ut ea non perpurgaremus, sed omnia, quae nobis in mentem uenirent, poneremus sperantes fore, ut postea perpoliremus. quare iam occasionem nacti, prout correctae sunt, ea edimus. et quoniam accidit, ut etiam alii quidam eorum, qui nobiscum uersati sunt, primum alterumque libros nacti sint, priusquam correcti essent, miratus ne sis, si in eos aliam habentes formam incideris. horum uero octo librorum quattuor priores ad institutionem elementarem

ἐκονικοῦ. γε., quia magna ex parte euan.; sed quae dedimus, hab. cv. 15. *ἐκπλοῦν* cp, fort. recte. 16. *ὡς* — 17. *ἐπελευσόμενοι*] cv; euan. V., rep. mg. m. rec.

τέσσαρα πέπτωκεν εἰς ἀγωγὴν στοιχειώδη, περιέχει δὲ
τὸ μὲν πρῶτον τὰς γενέσεις τῶν τριῶν τομῶν καὶ τῶν
ἀντικειμένων καὶ τὰ ἐν αὐταῖς ἀρχικὰ συμπτώματα ἐπὶ
πλέον καὶ καθόλου μᾶλλον ἐξεργασμένα παρὰ τὰ ὑπὸ
5 τῶν ἄλλων γεγραμμένα, τὸ δὲ δεύτερον τὰ περὶ τὰς
διαμέτρους καὶ τοὺς ἄξονας τῶν τομῶν συμβαίνοντα
καὶ τὰς ἀσυμπτώτους καὶ ἄλλα γενικὴν καὶ ἀναγκαίαν
χρεῖαν παρεχόμενα πρὸς τοὺς διορισμούς· τίνας δὲ
διαμέτρους καὶ τίνας ἄξονας καλῶ, εἰδήσεις ἐκ τούτου
10 τοῦ βιβλίου. τὸ δὲ τρίτον πολλὰ καὶ παράδοξα θεω-
ρήματα χρήσιμα πρὸς τε τὰς συνθέσεις τῶν στερεῶν
τόπων καὶ τοὺς διορισμούς, ὧν τὰ πλεῖστα καὶ ἀλλιότα
ξένα, ἃ καὶ κατανοήσαντες συνείδωμεν μὴ συντιθέμενον
ὑπὸ Εὐκλείδου τὸν ἐπὶ τρεῖς καὶ τέσσαρας γραμμὰς
15 τόπον, ἀλλὰ μόριον τὸ τυχὸν αὐτοῦ καὶ τοῦτο οὐκ
εὐτυχῶς· οὐ γὰρ ἦν δυνατὸν ἄνευ τῶν προσευρη-
μένων ἡμῖν τελειωθῆναι τὴν σύνθεσιν. τὸ δὲ τέταρτον,
ποσαχῶς αἱ τῶν κώνων τομαὶ ἀλλήλαις τε καὶ τῇ τοῦ
κύκλου περιφερεία συμβάλλουσι, καὶ ἄλλα ἐκ περισσοῦ,
20 ὧν οὐδέτερον ὑπὸ τῶν πρὸ ἡμῶν γέγραπται, κώνου
τομὴ ἢ κύκλου περιφέρεια κατὰ πόσα σημεῖα συμ-
βάλλουσι. τὰ δὲ λοιπὰ ἐστὶ περιουσιαστικώτερα· ἔστι
γὰρ τὸ μὲν περὶ ἐλαχίστων καὶ μεγίστων ἐπὶ πλέον,
τὸ δὲ περὶ ἴσων καὶ ὁμοίων κώνου τομῶν, τὸ δὲ περὶ
25 διοριστικῶν θεωρημάτων, τὸ δὲ προβλημάτων κωνικῶν
διωρισμένων. οὐ μὲν ἀλλὰ καὶ πάντων ἐκδοθέντων
ἔξεστι τοῖς περιτυγχάνουσι κρίνειν αὐτά, ὥς ἂν αὐτῶν
ἐκαστος αἰρῇται. εὐτύχει.

1. πέπτωκεν] cp, πέπτωκε V. 5. τὰς] τοὺς V, corr. p.
9. καὶ] scripsi, ἢ V. 13. συνείδωμεν V (fort. recte; cfr.
εἶπα); corr. v. 17. -νων ἡμῖν — τό] cv; euan. V, rep. mg. m.

pertinent, continet autem primus origines trium sectionum oppositarumque et proprietates earum principales latius uniuersaliusque expositas, quam quae ceteri de iis scripserunt, alter, quae diametri axesque sectionum et asymptotae propria habent aliaque, quae usum generalem necessariumque ad determinationes praebent; quas autem diametros quosque axes adpellem, ex hoc libro comperies. tertius uero plurima et mira continet theoremata et ad compositionem locorum solidorum et ad determinationes utilia, quorum pleraque et pulcherrima noua sunt; quibus inuentis cognoui, locum ad tres et quattuor lineas minime ab Euclide componi, sed partem tantum fortuitam eius, et id quidem non optime; neque enim fieri potuit, ut compositio sine propositionibus a nobis adiectis perficeretur. quartus autem continet, quot modis sectiones conorum et inter se et cum ambitu circuli concurrant, et praeterea alia quaedam, quorum neutrum genus a prioribus tractatum est, in quot punctis sectio coni uel ambitus circuli concurrant [cum oppositis sectionibus]. reliqui autem libri ulterius progrediuntur. primus enim eorum de minimis et maximis latius tractat, secundus de coni sectionibus aequalibus et similibus, tertius de theorematis ad determinationem pertinentibus, quartus problemata conica habet determinata. uerum enimuero omnibus editis iis, qui legent, licet, eos pro cuiusque uoluntate aestimare. uale.

rec. (add. γρ^{αι}). 18. κώνων] c v; euan. V, rep. mg. m. rec.
21. κατὰ] scr. ταῖς ἀντικειμέναις κατὰ; cfr. IV praef.

Ὅροι πρώτοι.

Ἐὰν ἀπὸ τινος σημείου πρὸς κύκλου περιφέρειαν, ὅς οὐκ ἔστιν ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ τῷ σημείῳ, εὐθεία ἐπιξευχθεῖσα ἐφ' ἐκάτερα προσεκβληθῇ, καὶ μένοντος
 5 τοῦ σημείου ἢ εὐθεία περιεγεχθεῖσα περὶ τὴν τοῦ κύκλου περιφέρειαν εἰς τὸ αὐτὸ πάλιν ἀποκατασταθῇ, ὅθεν ἤρξατο φέρεσθαι, τὴν γραφεῖσαν ὑπὸ τῆς εὐθείας ἐπιφάνειαν, ἢ σύγκειται ἐκ δύο ἐπιφανειῶν κατὰ κορυφὴν ἀλλήλαις κειμένων, ὧν ἑκατέρα εἰς ἄπειρον
 10 αὖξεται τῆς γραφούσης εὐθείας εἰς ἄπειρον προσεκβαλλομένης, καλῶ κωνικὴν ἐπιφάνειαν, κορυφὴν δὲ αὐτῆς τὸ μεμενηκὸς σημεῖον, ἄξονα δὲ τὴν διὰ τοῦ σημείου καὶ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου ἀγομένην εὐθεῖαν.

κῶνον δὲ τὸ περιεχόμενον σχῆμα ὑπὸ τε τοῦ κύκλου
 15 καὶ τῆς μεταξὺ τῆς τε κορυφῆς καὶ τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας κωνικῆς ἐπιφανείας, κορυφὴν δὲ τοῦ κώνου τὸ σημεῖον, ὃ καὶ τῆς ἐπιφανείας ἐστὶ κορυφή, ἄξονα δὲ τὴν ἀπὸ τῆς κορυφῆς ἐπὶ τὸ κέντρον τοῦ κύκλου ἀγομένην εὐθεῖαν, βάσιν δὲ τὸν κύκλον.

20 τῶν δὲ κῶνων ὀρθοὺς μὲν καλῶ τοὺς πρὸς ὀρθὰς ἔχοντας ταῖς βάσεσι τοὺς ἄξονας, σκαληνοὺς δὲ τοὺς μὴ πρὸς ὀρθὰς ἔχοντας ταῖς βάσεσι τοὺς ἄξονας.

πάσης καμπύλης γραμμῆς, ἥτις ἐστὶν ἐν ἐνὶ ἐπιπέδῳ, διάμετρον μὲν καλῶ εὐθεῖαν, ἥτις ἡγμένη ἀπὸ
 25 τῆς καμπύλης γραμμῆς πᾶσας τὰς ἀγομένας ἐν τῇ γραμμῇ εὐθείας εὐθείας τινὶ παραλλήλους δίχα διαιρεῖ, κορυφὴν δὲ τῆς γραμμῆς τὸ πέρας τῆς εὐθείας τὸ πρὸς τῇ γραμμῇ, τεταγμένως δὲ ἐπὶ τὴν διάμετρον κατῆχθαι ἐκάστην τῶν παραλλήλων.

29. κατῆχθαι] syll. αἰ comp. V, mg. m. rec. „χθαι ... 17^α.

Definitiones I.

1. Si a puncto aliquo ad ambitum circuli, qui in eodem plano, in quo punctum, positus non est, ducta recta in utramque partem producit, et manente puncto recta per ambitum circuli circumacta in eundem rursus locum restituitur, unde ferri coepta est, superficiem recta descriptam, ex duabus superficiebus ad uerticem inter se positis compositam, quarum utraque in infinitum crescit recta describente in infinitum producta, superficiem conicam adpello, uerticem autem eius punctum manens, axem autem rectam per punctum et centrum circuli ductam.

2. Conum autem figuram comprehensam circulo et superficie conica inter uerticem ambitumque circuli posita, uerticem autem coni punctum, quod idem est uertex superficiei, axem autem rectam a uertice ad centrum circuli ductam, basim autem circulum.

3. Conorum uero rectos adpello, qui axes ad bases perpendiculares habent, obliquos autem, qui axes ad bases perpendiculares non habent.

4. Omnis lineae curuae, quae in uno plano posita est, diametrum adpello rectam, quae a linea curua ducta omnes rectas in linea illa rectae alicui parallelas ductas in binas partes aequales secat, uerticem autem lineae terminum huius rectae in linea, singulas autem rectas parallelas ad diametrum ordinate ductas esse.

ὁμοίως δὲ καὶ δύο καμπύλων γραμμῶν ἐν ἐνὶ ἐπι-
πέδῳ κειμένων διάμετρον καλῶ πλάγιαν μὲν, ἥτις
εὐθεῖα τέμνουσα τὰς δύο γραμμὰς πάσας τὰς ἀγομένους
ἐν ἐκατέρᾳ τῶν γραμμῶν παρὰ τινὰ εὐθεῖαν δίχα
5 τέμνει, κορυφὰς δὲ τῶν γραμμῶν τὰ πρὸς ταῖς γραμ-
μαῖς πέρατα τῆς διαμέτρου, ὀρθίαν δέ, ἥτις κειμένη
μεταξὺ τῶν δύο γραμμῶν πάσας τὰς ἀγομένους παρ-
αλλήλους εὐθείας εὐθεία τινὶ καὶ ἀπολαμβανομένης
μεταξὺ τῶν γραμμῶν δίχα τέμνει, τεταγμένως δὲ ἐπὶ
10 τὴν διάμετρον κατῆχθαι ἐκάστην τῶν παραλλήλων.

συζυγεῖς καλῶ διαμέτρους [δύο] καμπύλης γραμμῆς
καὶ δύο καμπύλων γραμμῶν εὐθείας, ὧν ἐκατέρα διά-
μετρος οὖσα τὰς τῇ ἑτέρᾳ παραλλήλους δίχα διαιρεῖ.

ἄξονα δὲ καλῶ καμπύλης γραμμῆς καὶ δύο καμ-
15 πύλων γραμμῶν εὐθεῖαν, ἥτις διάμετρος οὖσα τῆς
γραμμῆς ἢ τῶν γραμμῶν πρὸς ὀρθὰς τέμνει τὰς παρ-
αλλήλους.

συζυγεῖς καλῶ ἄξονας καμπύλης γραμμῆς καὶ δύο
καμπύλων γραμμῶν εὐθείας, αἵτινες διάμετροι οὖσαι
20 συζυγεῖς πρὸς ὀρθὰς τέμνουσι τὰς ἀλλήλων παραλλήλους.

α'.

Αὶ ἀπὸ τῆς κορυφῆς τῆς κωνικῆς ἐπιφανείας ἀγό-
μεναι εὐθεῖαι ἐπὶ τὰ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ σημεῖα ἐν τῇ
ἐπιφανείᾳ εἰσὶν.

25 ἔστω κωνικὴ ἐπιφάνεια, ἥς κορυφὴ τὸ A σημεῖον,
καὶ εἰλήφθω τι σημεῖον ἐπὶ τῆς κωνικῆς ἐπιφανείας
τὸ B , καὶ ἐπεζεύχθω τις εὐθεῖα ἢ $ΑΓΒ$. λέγω, ὅτι
ἢ $ΑΓΒ$ εὐθεῖα ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ ἐστίν.

5. πρὸς] προσ' seq. lineola fortuita V. 6. ὀρθίαν] p; ὀρ-
θείαν V, mg. m. rec. „ὀρθίαν ut infra“. 9. τέμνει] p, τέμνη V.
11. δύο] om. Halley cum Comm. 21. α'] cv, om. V.

5. Similiter uero etiam duarum linearum curuarum in uno plano positarum diametrum transuersam adpello rectam, quae duas illas lineas secans omnes rectas in utraque linea rectae alicui parallelas ductas in binas partes aequales secat, uertices autem linearum terminos diametri in linea positos, rectam autem, quae inter duas lineas posita omnes rectas rectae alicui parallelas ductas et inter lineas abscisas in binas partes aequales secat, singulas autem parallelas ad diametrum ordinate ductas esse.


6. Coniugatas diametros adpello lineae curuae duarumque linearum curuarum rectas, quarum utraque diametrus est et rectas alteri parallelas in binas partes aequales secat.

7. Axem uero lineae curuae duarumque linearum curuarum rectam adpello, quae diametrus est lineae linearumue et parallelas ad angulos rectos secat.

8. Axes coniugatos adpello lineae curuae duarumque linearum curuarum rectas, quae diametri coniugatae sunt et altera alterius parallelas ad rectos angulos secant.

I.

Rectae a uertice superficiei conicae ad puncta superficiei ductae in superficie sunt.



sit superficies conica, cuius uertex sit A punctum, et sumatur in superficie conica punctum aliquod B , et ducatur recta aliqua $A\Gamma B$. dico, rectam $A\Gamma B$ in superficie esse.

εἰ γὰρ δυνατόν, μὴ ἔστω, καὶ ἔστω ἡ γεγραφυῖα τὴν ἐπιφάνειαν εὐθεῖα ἡ ΔE , ὁ δὲ κύκλος, καθ' οὗ φέρεται ἡ $E\Delta$, ὁ EZ . ἂν δὲ μένοντος τοῦ A σημείου ἡ ΔE εὐθεῖα φέρεται κατὰ τῆς τοῦ EZ κύκλου περι-
 5 φερείας, ἥξει καὶ διὰ τοῦ B σημείου, καὶ ἔσται δύο εὐθειῶν τὰ αὐτὰ πέρατα· ὅπερ ἄτοπον.

οὐκ ἄρα ἡ ἀπὸ τοῦ A ἐπὶ τὸ B ἐπιξεννυμένη εὐθεῖα οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ· ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ ἄρα ἐστί.

10 πόρισμα.

καὶ φανερόν, ὅτι, ἂν ἀπὸ τῆς κορυφῆς ἐπὶ τι σημεῖον τῶν ἐντὸς τῆς ἐπιφανείας ἐπιξεννυθῇ εὐθεῖα, ἐντὸς πεσεῖται τῆς κωνικῆς ἐπιφανείας, καὶ ἂν ἐπὶ τι τῶν ἐκτὸς ἐπιξεννυθῇ, ἐκτὸς ἔσται τῆς ἐπιφανείας.

15 β'.

Ἐὰν ἐφ' ὁποτερασοῦν τῶν κατὰ κορυφὴν ἐπιφανειῶν δύο σημεῖα ληφθῇ, ἡ δὲ ἐπὶ τὰ σημεῖα ἐπιξεννυμένη εὐθεῖα μὴ νεύῃ ἐπὶ τὴν κορυφὴν, ἐντὸς πεσεῖται τῆς ἐπιφανείας, ἡ δὲ ἐπ' εὐθείας αὐτῇ ἐκτός.

20 ἔστω κωνικὴ ἐπιφάνεια, ἥς κορυφὴ μὲν τὸ A σημείον, ὁ δὲ κύκλος, καθ' οὗ φέρεται ἡ τὴν ἐπιφάνειαν γράφουσα εὐθεῖα, ὁ $B\Gamma$, καὶ εἰλήφθω ἐφ' ὁποτερασοῦν τῶν κατὰ κορυφὴν ἐπιφανειῶν δύο σημεῖα τὰ Δ , E , καὶ ἐπιξεννυθεῖσα ἡ ΔE μὴ νεύετω ἐπὶ τὸ A σημείον.
 25 λέγω, ὅτι ἡ ΔE ἐντὸς ἔσται τῆς ἐπιφανείας καὶ ἡ ἐπ' εὐθείας αὐτῇ ἐκτός.

ἐπεξεύχθωσαν αἱ AE , $\Delta\Delta$ καὶ ἐκβεβλήσθωσαν· πεσοῦνται δὲ ἐπὶ τὴν τοῦ κύκλου περιφέρειαν. πιπτέ-

2. καθ'] cv; κα- euan. V, rep. mg. m. rec. 10. πόρισμα] om. V.

nam si fieri potest, ne sit, et $\angle E$ sit recta superficiem describens, circulus autem, per quem fertur, sit EZ . itaque, si manente puncto A recta $\angle E$ per ambitum circuli EZ fertur, etiam per punctum B ueniet, et duae rectae eosdem terminos habebunt; quod fieri non potest.

ergo fieri non potest, ut recta ab A ad B ducta in superficie non sit. ergo est in superficie.

Corollarium.

et manifestum est, si a uertice ad punctum aliquod eorum, quae intra superficiem sunt, recta ducatur, eam intra superficiem conicam casuram esse, et si ad aliquod eorum ducatur, quae extra sunt, extra superficiem casuram.

II.

Si in utralibet superficie earum, quae ad uerticem inter se positae sunt, duo puncta sumuntur, et recta puncta illa coniungens ad uerticem non cadit, intra superficiem cadet, producta uero in directum extra.

sit superficies conica, cuius uertex sit A , circulus autem, per quem recta superficiem describens fertur, sit $B\Gamma$, et in utralibet superficie earum, quae ad uerticem sunt inter se, duo puncta sumantur $\angle$, E , et ducta $\angle E$ ne cadat ad punctum A . dico, $\angle E$ intra superficiem esse, productam autem in directum extra.

ducantur AE , $A\angle$ et producantur; cadent igitur ad ambitum circuli [prop. I]. cadant in B , Γ , et ducatur $B\Gamma$; $B\Gamma$ igitur intra circulum erit; quare etiam intra superficiem conicam. iam in $\angle E$ sumatur punctum aliquod Z , et ducta AZ producat; cadet igitur

τωσαν κατὰ τὰ B, Γ , καὶ ἐπεξεύχθω ἡ $B\Gamma$. ἔσται ἄρα
 ἡ $B\Gamma$ ἐντὸς τοῦ κύκλου· ὥστε καὶ τῆς κωνικῆς ἐπι-
 φανείας. εἰλήφθω δὴ ἐπὶ τῆς $\angle E$ τυχὸν σημείον τὸ Z ,
 καὶ ἐπιξευχθεῖσα ἡ AZ ἐμβεβλήσθω. πεσεῖται δὴ ἐπὶ
 5 τὴν $B\Gamma$ εὐθείαν· τὸ γὰρ $B\Gamma A$ τρίγωνον ἐν ἐνὶ ἔστιν
 ἐπιπέδῳ. πιπτέτω κατὰ τὸ H . ἐπεὶ οὖν τὸ H ἐντὸς
 ἐστὶ τῆς κωνικῆς ἐπιφανείας, καὶ ἡ AH ἄρα ἐντὸς
 ἐστὶ τῆς κωνικῆς ἐπιφανείας· ὥστε καὶ τὸ Z ἐντὸς ἐστὶ
 τῆς κωνικῆς ἐπιφανείας. ὁμοίως δὴ δειχθήσεται, ὅτι
 10 καὶ πάντα τὰ ἐπὶ τῆς $\angle E$ σημεία ἐντὸς ἐστὶ τῆς ἐπι-
 φανείας· ἡ ἄρα $\angle E$ ἐντὸς ἐστὶ τῆς ἐπιφανείας.

ἐμβεβλήσθω δὴ ἡ $\angle E$ ἐπὶ τὸ Θ . λέγω δὴ, ὅτι
 ἐκτὸς πεσεῖται τῆς κωνικῆς ἐπιφανείας. εἰ γὰρ δυνατὸν,
 ἔστω τι αὐτῆς τὸ Θ μὴ ἐκτὸς τῆς κωνικῆς ἐπιφανείας,
 15 καὶ ἐπιξευχθεῖσα ἡ $A\Theta$ ἐμβεβλήσθω· πεσεῖται δὴ ἡ ἐπὶ
 τὴν περιφέρειαν τοῦ κύκλου ἢ ἐντὸς· ὅπερ ἐστὶν ἀδύνα-
 τον· πίπτει γὰρ ἐπὶ τὴν $B\Gamma$ ἐμβαλλομένην ὡς κατὰ
 τὸ K . ἡ $E\Theta$ ἄρα ἐκτὸς ἐστὶ τῆς ἐπιφανείας.

ἡ ἄρα $\angle E$ ἐντὸς ἐστὶ τῆς κωνικῆς ἐπιφανείας, καὶ
 20 ἡ ἐπ' εὐθείας αὐτῇ ἐκτός.


γ'.

Ἐὰν κῶνος ἐπιπέδῳ τμηθῇ διὰ τῆς κορυφῆς, ἡ
 τομὴ τρίγωνόν ἐστίν.

ἔστω κῶνος, οὗ κορυφὴ μὲν τὸ A σημείον, βάσις
 25 δὲ ὁ $B\Gamma$ κύκλος, καὶ τετμήσθω ἐπιπέδῳ τινὶ διὰ τοῦ A
 σημείου, καὶ ποιείτω τομὰς ἐπὶ μὲν τῆς ἐπιφανείας
 τὰς $AB, A\Gamma$ γραμμὰς, ἐν δὲ τῇ βάσει τὴν $B\Gamma$ εὐθεῖαν.
 λέγω, ὅτι τὸ $AB\Gamma$ τρίγωνόν ἐστίν.

1. ἄρα] *ev*; *euan.* V, *rep. mg. m. rec.* 16. περιφέρειαν V
 (in alt. φ inc. fol. 3^u), *corr. m. rec.* ἀδύνατον] *ev*, -τον
euan. V. 20. ἐκτός] ἐκτός:— V. 28. $AB\Gamma$] *p*, $A\Gamma V$, *corr. m. 2 v.*

ad rectam $B\Gamma$; triangulus enim $B\Gamma A$ in uno plano positus est [Eucl. XI, 2]. cadat in H . iam quoniam H intra superficiem conicam est, etiam AH intra superficiem conicam est [prop. I coroll.]; quare etiam Z intra superficiem conicam est. similiter igitur demonstrabimus, etiam omnia puncta rectae ΔE intra superficiem esse; itaque ΔE intra superficiem est.



iam ΔE ad Θ producat. dico, eam extra superficiem conicam cadere. nam si fieri potest, pars eius aliqua uelut Θ extra superficiem conicam ne sit, et ducta $A\Theta$ producat. cadet igitur aut in ambitum circuli aut intra [prop. I et coroll.]; quod fieri non potest. cadit enim in $B\Gamma$ productam ut in K . itaque $E\Theta$ extra superficiem est.

ergo ΔE intra superficiem conicam est, producta autem in directum extra.

III.

Si conus per uerticem plano secatur, sectio triangulus est.

sit conus, cuius uertex sit A punctum, basis autem circulus $B\Gamma$, et secetur plano aliquo per A punctum, et hoc sectiones efficiat in superficie lineas AB , $A\Gamma$, in basi autem rectam $B\Gamma$. dico, $AB\Gamma$ triangulum esse.

ἐπεὶ γὰρ ἡ ἀπὸ τοῦ A ἐπὶ τὸ B ἐπιξευγνυμένη
κοινὴ τομὴ ἐστὶ τοῦ τέμνοντος ἐπιπέδου καὶ τῆς τοῦ
κῶνου ἐπιφανείας, εὐθεῖα ἄρα ἐστὶν ἡ AB · ὁμοίως
δὲ καὶ ἡ AG . ἔστι δὲ καὶ ἡ $BΓ$ εὐθεῖα. τρίγωνον
5 ἄρα ἐστὶ τὸ $ABΓ$.

ἐὰν ἄρα κῶνος ἐπιπέδῳ τινὶ τμηθῇ διὰ τῆς κορυ-
φῆς, ἡ τομὴ τρίγωνόν ἐστίν.


δ'.

Ἐὰν ὁποτεροαὖν τῶν κατὰ κορυφὴν ἐπιφανειῶν
10 ἐπιπέδῳ τινὶ τμηθῇ παραλλήλῳ τῷ κύκλῳ, καθ' οὗ
φέρεται ἡ γράφουσα τὴν ἐπιφάνειαν εὐθεῖα, τὸ ἐναπο-
λαμβανόμενον ἐπίπεδον μεταξὺ τῆς ἐπιφανείας κύκλος
ἔσται τὸ κέντρον ἔχων ἐπὶ τοῦ ἄξονος, τὸ δὲ περι-
εχόμενον σχῆμα ὑπὸ τε τοῦ κύκλου καὶ τῆς ἀπολαμβανο-
15 μένης ὑπὸ τοῦ τέμνοντος ἐπιπέδου κωνικῆς ἐπιφανείας
πρὸς τῇ κορυφῇ κῶνος ἔσται.

ἔστω κωνικὴ ἐπιφάνεια, ἥς κορυφὴ μὲν τὸ A ση-
μεῖον, ὃ δὲ κύκλος, καθ' οὗ φέρεται ἡ τὴν ἐπιφάνειαν
γράφουσα εὐθεῖα, ὃ $BΓ$, καὶ τετμήσθω ἐπιπέδῳ τινὶ
20 παραλλήλῳ τῷ $BΓ$ κύκλῳ, καὶ ποιείτω ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ
τομὴν τὴν AE γραμμὴν. λέγω, ὅτι ἡ AE γραμμὴ
κύκλος ἐστὶν ἐπὶ τοῦ ἄξονος ἔχων τὸ κέντρον.

εἰλήφθω γὰρ τὸ κέντρον τοῦ $BΓ$ κύκλου τὸ Z ,
καὶ ἐπεξεύχθω ἡ AZ . ἄξων ἄρα ἐστὶ καὶ συμβάλλει
25 τῷ τέμνοντι ἐπιπέδῳ. συμβαλλέτω κατὰ τὸ H , καὶ
ἐκβεβλήσθω τι διὰ τῆς AZ ἐπίπεδον. ἔσται δὲ ἡ
τομὴ τρίγωνον τὸ $ABΓ$. καὶ ἐπεὶ τὰ A , H , E σημεία
ἐν τῷ τέμνοντι ἐστὶν ἐπιπέδῳ, ἔστι δὲ καὶ ἐν τῷ τοῦ

7. ἐστίν] ἐστὶ :— V.




nam quoniam linea ab A ad B ducta communis est sectio plani secantis et superficiei conicae, recta est AB . et eadem de causa $A\Gamma$. uerum etiam $B\Gamma$ recta est. itaque $AB\Gamma$ triangulus est.

ergo si conus plano per uerticem secatur, sectio triangulus est.

IV.

Si utralibet superficies earum, quae ad uerticem sunt inter se, plano secatur aliquo ei circulo parallelo, per quem fertur recta superficiem describens, planum intra superficiem comprehensum circulus erit centrum in axe habens, figura autem a circulo et superficie conica plano secante abscisa ad uerticem comprehensa conus erit.

sit superficies conica, cuius uertex sit A punctum, circulus autem, per quem fertur recta superficiem



describens, $B\Gamma$, et secetur plano aliquo circulo $B\Gamma$ parallelo, et hoc in superficie sectionem efficiat lineam ΔE . dico, lineam ΔE circulum esse centrum in axe habentem.

sumatur enim Z centrum circuli $B\Gamma$, et ducatur AZ . axis igitur est [def. 1] et cum plano secante

$AB\Gamma$ ἐπιπέδῳ, εὐθείᾳ ἄρα ἐστὶν ἡ $\angle HE$. εἰλήφθω
 δὴ τι σημείον ἐπὶ τῆς $\angle E$ γραμμῆς τὸ Θ , καὶ ἐπι-
 ξευχθεῖσα ἡ $A\Theta$ ἐκβεβλήσθω. συμβαλεῖ δὲ τῇ $B\Gamma$
 περιφερείᾳ. συμβαλλέτω κατὰ τὸ K , καὶ ἐπεξεύχθωσαν
 5 αἱ $H\Theta$, ZK . καὶ ἐπεὶ δύο ἐπίπεδα παράλληλα τὰ
 $\angle E$, $B\Gamma$ ὑπὸ ἐπιπέδου τινὸς τέμνεται τοῦ $AB\Gamma$, αἱ
 κοιναὶ αὐτῶν τομαὶ παράλληλοι εἰσι· παράλληλος ἄρα
 ἐστὶν ἡ $\angle E$ τῇ $B\Gamma$. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ἡ $H\Theta$ τῇ
 KZ παράλληλος. ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ZA πρὸς τὴν AH ,
 10 οὕτως ἡ τε ZB πρὸς $\angle H$ καὶ ἡ $Z\Gamma$ πρὸς HE καὶ
 ἡ ZK πρὸς $H\Theta$. καὶ εἰσιν αἱ τρεῖς αἱ BZ , KZ , $Z\Gamma$
 ἴσαι ἀλλήλαις· καὶ αἱ τρεῖς ἄρα αἱ $\angle H$, $H\Theta$, HE ἴσαι
 εἰσὶν ἀλλήλαις. ὁμοίως δὲ δεῖξομεν, ὅτι καὶ πᾶσαι αἱ
 15 πίπτουσιν εὐθεῖαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσί.

κύκλος ἄρα ἐστὶν ἡ $\angle E$ γραμμὴ τὸ κέντρον ἔχων
 ἐπὶ τοῦ ἄξονος.

καὶ φανερόν, ὅτι τὸ περιεχόμενον σχῆμα ὑπὸ τε
 τοῦ $\angle E$ κύκλου καὶ τῆς ἀπολαμβανομένης ὑπ' αὐτοῦ
 20 πρὸς τῷ A σημείῳ κωνικῆς ἐπιφανείας κωνός ἐστι.

καὶ συναποδέδεικται, ὅτι ἡ κοινὴ τομὴ τοῦ τέμνον-
 τος ἐπιπέδου καὶ τοῦ διὰ τοῦ ἄξονος τριγώνου διά-
 μετρός ἐστι τοῦ κύκλου.

ε'.

25 Ἐὰν κωνος σκαληνὸς ἐπιπέδῳ τμηθῇ διὰ τοῦ ἄξονος
 πρὸς ὀρθᾶς τῇ βάσει, τμηθῇ δὲ καὶ ἑτέρῳ ἐπιπέδῳ
 πρὸς ὀρθᾶς μὲν τῷ διὰ τοῦ ἄξονος τριγώνῳ, ἀφαιροῦντι
 δὲ πρὸς τῇ κορυφῇ τριγώνον ὅμοιον μὲν τῷ διὰ τοῦ

6. τέμνεται τοῦ] bis (in extr. et pr. fol.) V, corr. m. 1.
 11. αἱ] (alt.) p, om. V, corr. m. 2 v. 20. τῷ A σημείῳ]
 sine causa rep. mg. m. rec. V.

concidit. concidat in H , et per AZ planum ducatur. sectio igitur $AB\Gamma$ triangulus erit [prop. III]. et quoniam puncta A, H, E in plano secanti sunt, uerum etiam in plano $AB\Gamma$, $\angle HE$ recta est [Eucl. XI, 3]. sumatur igitur in linea AE punctum aliquod Θ , et ducta $A\Theta$ producat. concidet igitur cum ambitu $B\Gamma$. concidat in K , et ducantur $H\Theta, ZK$. et quoniam duo plana parallela $AE, B\Gamma$ plano $AB\Gamma$ secantur, communes eorum sectiones parallelae sunt [Eucl. XI, 16]. itaque AE rectae $B\Gamma$ parallela est. eadem de causa etiam $H\Theta$ rectae KZ parallela est. itaque [Eucl. VI, 4] $ZA : AH = ZB : \angle H = Z\Gamma : HE = ZK : H\Theta$. et $BZ = KZ = Z\Gamma$. quare etiam $\angle H = H\Theta = HE$ [Eucl. V, 9]. iam similiter demonstrabimus, etiam omnes rectas ab H puncto ad lineam AE adcurrentes inter se aequales esse.

ergo linea AE circulus est centrum in axe habens.

et manifestum est, figuram circulo AE et superficie conica ab eo abscisa ad A punctum comprehensam conum esse.

et simul demonstratum est, sectionem communem plani secantis triangulique per axem positi diametrum circuli esse.

V.

Si conus obliquus per axem plano ad basim perpendiculari secatur et simul alio plano secatur ad triangulum per axem positum perpendiculari, quod ad uerticem triangulum abscindat triangulo per axem posito similem, sed e contrario positum, sectio circulus erit; adpelletur autem talis sectio contraria.


ἄξονος τριγώνῳ, ὑπεναντίως δὲ κείμενον, ἢ τομὴ κύκλος ἐστὶ, καλείσθω δὲ ἡ τοιαύτη τομὴ ὑπεναντία.

ἔστω κῶνος σκαληνός, οὗ κορυφὴ μὲν τὸ A σημείον, βάσις δὲ ὁ $BΓ$ κύκλος, καὶ τετμήσθω ἐπιπέδῳ 5 διὰ τοῦ ἄξονος ὁρθῶς πρὸς τὸν $BΓ$ κύκλον, καὶ ποιεῖται τομὴν τὸ $ABΓ$ τρίγωνον. τετμήσθω δὲ καὶ ἑτέρῳ ἐπιπέδῳ πρὸς ὁρθὰς ὄντι τῷ $ABΓ$ τριγώνῳ, ἀφαιροῦντι δὲ τρίγωνον πρὸς τῷ A σημείῳ τὸ AKH ὅμοιον μὲν τῷ $ABΓ$ τριγώνῳ, ὑπεναντίως δὲ κείμενον, τουτέστιν 10 ὥστε ἴσην εἶναι τὴν ὑπὸ AKH γωνίαν τῇ ὑπὸ $ABΓ$. καὶ ποιεῖται τομὴν ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τὴν $HΘK$ γραμμὴν. λέγω, ὅτι κύκλος ἐστὶν ἡ $HΘK$ γραμμὴ.

εἰλήφθω γάρ τινα σημεία ἐπὶ τῶν $HΘK$, $BΓ$ γραμμῶν τὰ $Θ$, $Λ$, καὶ ἀπὸ τῶν $Θ$, $Λ$ σημείων ἐπὶ τὸ διὰ 15 τοῦ $ABΓ$ τριγώνου ἐπίπεδον ἀάθετοι ἤχθωσαν· πεσοῦνται δὲ ἐπὶ τὰς κοινὰς τομὰς τῶν ἐπιπέδων. πιπτέτωσαν ὥς αἱ $ZΘ$, $ΛΜ$. παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ $ZΘ$ τῇ $ΛΜ$. ἤχθω δὲ διὰ τοῦ Z τῇ $BΓ$ παράλληλος ἡ $ΛΖΕ$. ἔστι δὲ καὶ ἡ $ZΘ$ τῇ $ΛΜ$ παράλληλος· τὸ 20 ἄρα διὰ τῶν $ZΘ$, $ΛΕ$ ἐπίπεδον παράλληλόν ἐστι τῇ βάσει τοῦ κῶνου. κύκλος ἄρα ἐστὶν, οὗ διάμετρος ἡ $ΛΕ$. ἴσον ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν $ΛΖ$, $ΖΕ$ τῷ ἀπὸ τῆς $ZΘ$. καὶ ἐπεὶ παράλληλός ἐστιν ἡ $ΕΛ$ τῇ $BΓ$, ἡ ὑπὸ $ΛΛΕ$ γωνία ἴση ἐστὶ τῇ ὑπὸ $ABΓ$. ἡ δὲ ὑπὸ AKH τῇ 25 ὑπὸ $ABΓ$ ὑπόκειται ἴση· καὶ ἡ ὑπὸ AKH ἄρα τῇ ὑπὸ $ΛΛΕ$ ἐστὶν ἴση. εἰσὶ δὲ καὶ αἱ πρὸς τῷ Z σημείῳ ἴσαι [κατὰ κορυφὴν]. ὅμοιον ἄρα ἐστὶ τὸ $ΛΖΗ$ τρίγωνον τῷ $KΖΕ$ τριγώνῳ· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ $ΕΖ$ πρὸς τὴν ZK , οὕτως ἡ $HΖ$ πρὸς $ΖΛ$. τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν

6. δὴ] δέ Eutocius. 8. AKH] p , KH V. 27. κατὰ κορυφὴν] deleo; κατὰ κορυφὴν γὰρ p , in ras. m. 2 v.

sit conus obliquus, cuius uertex sit A punctum, basis autem circulus $B\Gamma$, et per axem secetur plano ad circulum $B\Gamma$ perpendiculari, et hoc sectionem efficiat triangulum $AB\Gamma$ [prop. III]. iam etiam alio plano secetur ad triangulum $AB\Gamma$ perpendiculari, quod ad A punctum abscindat triangulum AKH simile triangulo $AB\Gamma$, sed e contrario positum, h. e. ita ut sit



$$\angle AKH = \angle AB\Gamma.$$

et in superficie efficiat sectionem lineam $H\Theta K$. dico, lineam $H\Theta K$ circulum esse.

sumantur enim in lineis $H\Theta K$, $B\Gamma$ puncta aliqua Θ , A , et a punctis Θ , A ad planum trianguli $AB\Gamma$ perpendiculares ducantur; cadent igitur ad communes sectiones planorum [Eucl. XI def. 6]. cadant ut $Z\Theta$, AM . itaque $Z\Theta$, AM parallelae sunt [Eucl. XI, 6]. ducatur igitur per Z rectae $B\Gamma$ parallela AZE . uerum etiam $Z\Theta$ rectae AM parallela est. itaque planum rectarum $Z\Theta$, AZ basi coni parallelum est [Eucl. XI, 15]. quare circulus est, cuius diametrus est AZ [prop. IV]. itaque est [Eucl. VI, 8] $AZ \times ZE = Z\Theta^2$. et quoniam EA , $B\Gamma$ parallelae sunt, erit $\angle AZE = \angle AB\Gamma$ [Eucl. I, 29]. uerum supposuimus, esse $\angle AKH = \angle AB\Gamma$; quare etiam $\angle AKH = \angle AZE$. uerum etiam anguli ad Z punctum positi aequales sunt [Eucl. I, 15]. itaque $AZH \sim KZE$. quare [Eucl. VI, 4]

$$EZ : ZK = HZ : ZA.$$

itaque $EZ \times ZA = KZ \times ZH$ [Eucl. VI, 17].

$EZ\Delta$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν KZH . ἀλλὰ τῷ ὑπὸ
 τῶν $EZ\Delta$ ἴσον ἐδείχθη τὸ ἀπὸ τῆς $Z\Theta$ · καὶ τὸ ὑπὸ
 τῶν KZ , ZH ἄρα ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς $Z\Theta$. ὁμοίως
 δὴ δειχθήσονται καὶ πᾶσαι αἱ ἀπὸ τῆς $H\Theta K$ γραμμῆς
 5 ἐπὶ τὴν HK ἡγμέναι κάθετοι ἴσον δυνάμεναι τῷ ὑπὸ
 τῶν τμημάτων τῆς HK .

κύκλος ἄρα ἐστὶν ἡ τομή, οὗ διάμετρος ἡ HK .

ς'.

Ἐὰν κῶνος ἐπιπέδῳ τμηθῇ διὰ τοῦ ἄξονος, ληφθῇ
 10 δέ τι σημεῖον ἐπὶ τῆς τοῦ κώνου ἐπιφανείας, ὃ μὴ
 ἐστὶν ἐπὶ τῆς πλευρᾶς τοῦ διὰ τοῦ ἄξονος τριγώνου,
 καὶ ἀπ' αὐτοῦ ἀχθῇ παράλληλος εὐθεῖα τινί, ἥ ἐστὶ
 κάθετος ἀπὸ τῆς περιφερείας τοῦ κύκλου ἐπὶ τὴν βάσιν
 τοῦ τριγώνου, συμβαλεῖ τῷ διὰ τοῦ ἄξονος τριγώνῳ
 15 καὶ προσεκβαλλομένη ἕως τοῦ ἑτέρου μέρους τῆς ἐπι-
 φανείας δίχα τμηθήσεται ὑπὸ τοῦ τριγώνου.

ἔστω κῶνος, οὗ κορυφή μὲν τὸ A σημεῖον, βάσις
 δὲ ὁ $B\Gamma$ κύκλος, καὶ τετμήσθω ὁ κῶνος ἐπιπέδῳ διὰ
 τοῦ ἄξονος, καὶ ποιείτω κοινὴν τομὴν τὸ $AB\Gamma$ τρι-
 20 γωνον, καὶ ἀπὸ τίνος σημείου τῶν ἐπὶ τῆς $B\Gamma$ περι-
 φερείας τοῦ M κάθετος ἦχθῳ ἐπὶ τὴν $B\Gamma$ ἢ MN .
 εἰλήφθω δὴ ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τοῦ κώνου σημεῖόν τι
 τὸ Δ , καὶ διὰ τοῦ Δ τῇ MN παράλληλος ἦχθῳ ἡ ΔE .
 λέγω, ὅτι ἡ ΔE ἐκβαλλομένη συμπέσεται τῷ ἐπιπέδῳ
 25 τοῦ $AB\Gamma$ τριγώνου καὶ προσεκβαλλομένη ἐπὶ τὸ ἕτερον
 μέρος τοῦ κώνου, ἄχρις ἂν συμπέσῃ τῇ ἐπιφανείᾳ αὐτοῦ,
 δίχα τμηθήσεται ὑπὸ τοῦ ἐπιπέδου τοῦ $AB\Gamma$ τριγώνου.

1. ἐστὶ — 2. ἴσον] om. V, corr. p (KZ , ZH et EZ , $Z\Delta$). 2.
 $Z\Theta$] $E\Theta$ V; corr. p. 5. HK] p, $H\Gamma$ V, corr. m. 2 v. 12.
 εὐθεῖα] rep. mg. m. rec. V. 14. συμβαλεῖ V, sed corr.

demonstrauimus autem, esse $EZ \times ZA = ZO^2$. quare etiam $KZ \times ZH = ZO^2$.


iam similiter demonstrabimus, etiam omnes rectas a linea HO ad HK perpendiculares ductas quadratas aequales esse rectangulo partium rectae HK .

ergo sectio circulus est, cuius diametrus est HK .

VI.

Si conus plano per axem secatur, et in superficie conij punctum aliquod sumitur, quod in latere trianguli per axem positi non est, et ab eo recta ducitur parallela rectae ab ambitu circuli ad basim trianguli perpendiculari, ea cum triangulo per axem posito concurrent et usque ad alteram partem superficiei producta a triangulo in duas partes aequales secabitur.

sit conus, cuius uertex sit A punctum, basis autem $B\Gamma$ circulus, et secetur conus plano per axem, et hoc communem sectionem efficiat $AB\Gamma$ triangulum, et a



puncto M ambitus $B\Gamma$ ad $B\Gamma$ perpendicularis ducatur MN . iam in superficie conij punctum aliquod sumatur A , et per A rectae MN parallela ducatur AE . dico, rectam AE productam cum plano trianguli $AB\Gamma$

ἐπεξεύχθω ἡ $ΑΔ$ καὶ ἐκβεβλήσθω· συμπεσεῖται ἄρα
 τῇ περιφερείᾳ τοῦ $ΒΓ$ κύκλου. συμπιπτέτω κατὰ τὸ K ,
 καὶ ἀπὸ τοῦ K ἐπὶ τὴν $ΒΓ$ κάθετος ἡχθῶ ἡ $KΘΑ$.
 παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ $KΘ$ τῇ MN . καὶ τῇ $ΔΕ$ ἄρα.
 5 ἐπεξεύχθω ἀπὸ τοῦ A ἐπὶ τὸ $Θ$ ἡ $AΘ$. ἐπεὶ οὖν ἐν
 τριγώνῳ τῷ $AΘK$ τῇ $ΘK$ παράλληλός ἐστὶν ἡ $ΔΕ$,
 ἡ $ΔΕ$ ἄρα ἐκβαλλομένη συμπεσεῖται τῇ $AΘ$. ἡ δὲ $AΘ$
 ἐν τῷ τοῦ $ΑΒΓ$ ἐστὶν ἐπιπέδῳ· συμπεσεῖται ἄρα ἡ $ΔΕ$
 τῷ τοῦ $ΑΒΓ$ τριγώνου ἐπιπέδῳ. διὰ τὰ αὐτὰ καὶ τῇ
 10 $AΘ$ συμπίπτει· συμπιπτέτω κατὰ τὸ Z , καὶ ἐκβεβλήσθω
 ἡ $ΔΖ$ ἐπ' εὐθείας, ἄχρις ἂν συμπέσῃ τῇ τοῦ κώνου
 ἐπιφανείᾳ. συμπιπτέτω κατὰ τὸ H . λέγω, ὅτι ἴση
 ἐστὶν ἡ $ΔΖ$ τῇ ZH .

ἐπεὶ γὰρ τὰ $A, H, Δ$ σημεία ἐν τῇ τοῦ κώνου
 15 ἐστὶν ἐπιφανείᾳ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ ἐπιπέδῳ τῷ διὰ τῶν
 $AΘ, AK, ΔH, KA$ ἐκβαλλομένῳ, ὅπερ διὰ τῆς κορυφῆς
 τοῦ κώνου τριγωνόν ἐστι, τὰ $A, H, Δ$ ἄρα σημεία ἐπὶ
 τῆς κοινῆς ἐστὶ τομῆς τῆς τοῦ κώνου ἐπιφανείας καὶ
 τοῦ τριγώνου. εὐθεῖα ἄρα ἐστὶν ἡ διὰ τῶν $A, H, Δ$.
 20 ἐπεὶ οὖν ἐν τριγώνῳ τῷ $ΑΔΚ$ τῇ $KΘΑ$ βάσει παρ-
 ἀλληλος ἦναι ἡ $ΔH$, καὶ διηκταί τις ἀπὸ τοῦ A ἡ
 $ΑΖΘ$, ἔστιν ὡς ἡ $KΘ$ πρὸς $ΘΑ$, ἡ $ΔΖ$ πρὸς ZH .
 ἴση δὲ ἡ $KΘ$ τῇ $ΘΑ$, ἐπείπερ ἐν κύκλῳ τῷ $ΒΓ$ κάθε-
 τός ἐστὶν ἐπὶ τὴν διάμετρον ἡ KA . ἴση ἄρα καὶ
 25 ἡ $ΔΖ$ τῇ ZH .

ζ'.

Ἐὰν κώνος ἐπιπέδῳ τμηθῇ διὰ τοῦ ἄξονος, τμηθῇ
 δὲ καὶ ἐτέρῳ ἐπιπέδῳ τέμνοντι τὸ ἐπίπεδον, ἐν ᾧ ἐστὶν
 ἡ βάσις τοῦ κώνου, κατ' εὐθεΐαν πρὸς ὁρθὰς οὖσαν

21. ἀπὸ τοῦ] cp, ἀποῦ V. 23. ἐν] ἐκ V; corr. p.

concurrere et ad alteram partem coni productam, donec cum superficie eius concurrat, a plano trianguli $AB\Gamma$ in duas partes aequales secari.

ducatur AA et producat; concurrent igitur cum ambitu circuli $B\Gamma$ [prop. I]. concurrat in K , et a K ad $B\Gamma$ perpendicularis ducatur $K\Theta A$; itaque $K\Theta$ rectae MN parallela est [Eucl. I, 28]; quare etiam rectae $\angle E$ [Eucl. XI, 9]. ducatur ab A ad Θ recta $A\Theta$. iam quoniam in triangulo $A\Theta K$ rectae ΘK parallela est $\angle E$, $\angle E$ producta cum $A\Theta$ concurrent [Eucl. VI, 2]. uerum $A\Theta$ in plano trianguli $AB\Gamma$ posita est. itaque $\angle E$ cum plano trianguli $AB\Gamma$ concurrent.

simul demonstrauius, eam etiam cum $A\Theta$ concurrere. concurrat in Z , et $\angle Z$ in directum producat, donec cum superficie coni concurrat. concurrat in H . dico, esse $\angle Z = ZH$.


nam quoniam puncta A , H , A in superficie coni sunt, uerum etiam in plano per $A\Theta$, AK , $\angle H$, KA ducto, quod triangulus est per uerticem coni [prop. III], puncta A , H , A in communi sectione superficiei coni triangulique sunt. itaque linea per A , H , A ducta recta est. iam quoniam in triangulo AAK basi $K\Theta A$ parallela ducta est $\angle H$, et ab A producta est $AZ\Theta$, erit $K\Theta : \Theta A = \angle Z : ZH$. est autem $K\Theta = \Theta A$, quoniam in circulo $B\Gamma$ ad diametrum perpendicularis est KA [Eucl. III, 3]. ergo etiam $\angle Z = ZH$.

VII.

Si conus per axem plano secatur et alio quoque plano secatur, quod id planum, in quo est basis coni, secundum rectam secat aut ad basim trianguli per

ἤτοι τῇ βάσει τοῦ διὰ τοῦ ἄξονος τριγώνου ἢ τῇ ἐπ' εὐθείας αὐτῇ, αἱ ἀγόμεναι εὐθεῖαι ἀπὸ τῆς γενηθείσης τομῆς ἐν τῇ τοῦ κώνου ἐπιφανείᾳ, ἣν ἐποίησε τὸ τέμνον ἐπίπεδον, παράλληλοι τῇ πρὸς ὀρθὰς τῇ βάσει τοῦ
 5 τριγώνου εὐθείᾳ ἐπὶ τὴν κοινὴν τομὴν πεσοῦνται τοῦ τέμνοντος ἐπιπέδου καὶ τοῦ διὰ τοῦ ἄξονος τριγώνου καὶ προσεμβαλλόμεναι ἕως τοῦ ἑτέρου μέρους τῆς τομῆς δίχα τμηθήσονται ὑπ' αὐτῆς, καὶ ἂν μὲν ὀρθὸς ᾖ ὁ κῶνος, ἢ ἐν τῇ βάσει εὐθεῖα πρὸς ὀρθὰς ἔσται τῇ
 10 κοινῇ τομῇ τοῦ τέμνοντος ἐπιπέδου καὶ τοῦ διὰ τοῦ ἄξονος τριγώνου, ἂν δὲ σκαληνός, οὐκ αἰεὶ πρὸς ὀρθὰς ἔσται, ἀλλ' ὅταν τὸ διὰ τοῦ ἄξονος ἐπίπεδον πρὸς ὀρθὰς ᾖ τῇ βάσει τοῦ κώνου.

ἔστω κῶνος, οὗ κορυφὴ μὲν τὸ A σημεῖον, βάσις
 15 δὲ ὁ $B\Gamma$ κύκλος, καὶ τετμήσθω ἐπίπεδον διὰ τοῦ ἄξονος, καὶ ποιεῖτω τομὴν τὸ $AB\Gamma$ τρίγωνον. τε-
 τμήσθω δὲ καὶ ἑτέρω ἐπίπεδον τέμνοντι τὸ
 20 ἐπίπεδον, ἐν ᾧ ἔστιν ὁ $B\Gamma$ κύκλος, κατ' εὐθεῖαν τὴν ΔE ἥτοι πρὸς ὀρθὰς οὖσαν τῇ $B\Gamma$ ἢ τῇ ἐπ' εὐθείας
 25 αὐτῇ, καὶ ποιεῖτω τομὴν ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ κώνου τὴν ΔZE . κοινὴ δὲ τομὴ τοῦ τέμνοντος ἐπιπέδου καὶ τοῦ $AB\Gamma$ τριγώνου ἡ ZH . καὶ εἰλήφθω τι σημεῖον ἐπὶ τῆς ΔZE




1. τοῦ] τῇ V; corr. p.
 27. δὴ] scripsi; δέ V.

22. ἤτοι] ἡτ V, ἤτοι mg. m. rec.

axem positi aut ad eandem productam perpendicularem, rectae a sectione in superficie conï orta, quam planum secans effecit, parallelæ ductæ rectæ ad basim trianguli perpendiculari cadent in communem sectionem plani secantis triangulique per axem positi et ad alteram partem sectionis productæ in binas partes æquales ab ea secabuntur, et si conus rectus est, recta in basi posita perpendicularis erit ad communem sectionem plani secantis triangulique per axem positi, sin obliquus est, non semper perpendicularis erit, sed ita tantum, si planum per axem ductum ad basim conï perpendiculare est.

sit conus, cuius uertex sit A punctum, basis autem $B\Gamma$ circulus, et plano per axem secetur, et hoc sectionem faciat triangulum $AB\Gamma$. secetur autem etiam



alio plano, quod planum, in quo est circulus $B\Gamma$, secundum rectam AE secat aut ad $B\Gamma$ aut ad eandem productam perpendicularem, et hoc in superficie conï sectionem efficiat AZE ; communis igitur

sectio plani secantis triangulique $AB\Gamma$ est ZH . et sumatur in sectione AZE punctum aliquod Θ , ducaturque per Θ rectæ AE parallela ΘK . dico, ΘK cum recta ZH concurrere et ad alteram partem sectionis AZE productam a recta ZH in duas partes æquales secari.

τομῆς τὸ Θ , καὶ ἤχθω διὰ τοῦ Θ τῇ ΔE παράλληλος ἢ ΘK . λέγω, ὅτι ἡ ΘK συμβαλεῖ τῇ ZH καὶ ἐκβαλλομένη ἕως τοῦ ἑτέρου μέρους τῆς ΔZE τομῆς δίχα τμηθήσεται ὑπὸ τῆς ZH εὐθείας.

- 5 ἐπεὶ γὰρ κῶνος, οὗ κορυφὴ μὲν τὸ A σημεῖον, βάσις δὲ ὁ $B\Gamma$ κύκλος, τέτμηται ἐπιπέδῳ διὰ τοῦ ἄξονος, καὶ ποιεῖ τομὴν τὸ $AB\Gamma$ τριγώνον, εἴληπται δέ τι σημεῖον ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας, ὃ μὴ ἐστὶν ἐπὶ πλευρᾶς τοῦ $AB\Gamma$ τριγώνου, τὸ Θ , καὶ ἐστὶ κάθετος ἡ ΔH
 10 ἐπὶ τὴν $B\Gamma$, ἡ ἄρα διὰ τοῦ Θ τῇ ΔH παράλληλος ἀγομένη, τουτέστιν ἡ ΘK , συμβαλεῖ τῷ $AB\Gamma$ τριγώνῳ καὶ προσεκβαλλομένη ἕως τοῦ ἑτέρου μέρους τῆς ἐπιφανείας δίχα τμηθήσεται ὑπὸ τοῦ τριγώνου. ἐπεὶ οὖν ἡ διὰ τοῦ Θ τῇ ΔE παράλληλος ἀγομένη συμβάλλει
 15 τῷ $AB\Gamma$ τριγώνῳ καὶ ἐστὶν ἐν τῷ διὰ τῆς ΔZE τομῆς ἐπιπέδῳ, ἐπὶ τὴν κοινὴν ἄρα τομὴν πεσεῖται τοῦ τέμνοντος ἐπιπέδου καὶ τοῦ $AB\Gamma$ τριγώνου. κοινὴ δὲ τομὴ ἐστὶ τῶν ἐπιπέδων ἡ ZH . ἡ ἄρα διὰ τοῦ Θ τῇ ΔE παράλληλος ἀγομένη πεσεῖται ἐπὶ τὴν ZH .
 20 καὶ προσεκβαλλομένη ἕως τοῦ ἑτέρου μέρους τῆς ΔZE τομῆς δίχα τμηθήσεται ὑπὸ τῆς ZH εὐθείας.

ἦτοι δὴ ὁ κῶνος ὀρθός ἐστίν, ἡ τὸ διὰ τοῦ ἄξονος τριγώνον τὸ $AB\Gamma$ ὀρθόν ἐστὶ πρὸς τὸν $B\Gamma$ κύκλον, ἢ οὐδέτερον.

- 25 ἔστω πρότερον ὁ κῶνος ὀρθός· εἴη ἂν οὖν καὶ τὸ $AB\Gamma$ τριγώνον ὀρθὸν πρὸς τὸν $B\Gamma$ κύκλον. ἐπεὶ οὖν ἐπίπεδον τὸ $AB\Gamma$ πρὸς ἐπίπεδον τὸ $B\Gamma$ ὀρθόν ἐστὶ, καὶ τῇ κοινῇ αὐτῶν τομῇ τῇ $B\Gamma$ ἐν ἐνὶ τῶν ἐπιπέδων τῷ $B\Gamma$ πρὸς ὀρθὰς ἦκται ἡ ΔE , ἡ ΔE ἄρα τῷ $AB\Gamma$
 30 τριγώνῳ ἐστὶ πρὸς ὀρθὰς· καὶ πρὸς πάσας ἄρα τὰς ἀπτομένας αὐτῆς εὐθείας καὶ οὕσας ἐν τῷ $AB\Gamma$

nam quoniam conus, cuius uertex est A punctum, basis autem circulus $B\Gamma$, plano per axem secatur, et hoc sectionem efficit triangulum $AB\Gamma$, in superficie autem sumptum est punctum Θ , quod in latere trianguli $AB\Gamma$ non est, et $\angle H$ ad $B\Gamma$ perpendicularis est, recta per Θ rectae $\angle H$ parallela ducta, hoc est ΘK , cum triangulo $AB\Gamma$ concurret et ad alteram partem superficiei producta a triangulo in duas partes aequales secabitur [prop. VI]. iam quoniam recta per Θ rectae $\angle E$ parallela ducta cum triangulo $AB\Gamma$ concurret et in plano sectionis $\angle ZE$ est, in communem sectionem plani secantis triangulique $AB\Gamma$ cadet. communis autem planorum sectio est ZH ; itaque recta per Θ rectae $\angle E$ parallela ducta in ZH cadet; et ad alteram partem sectionis $\angle ZE$ producta a recta ZH in duas partes aequales secabitur.

iam igitur aut rectus est conus, aut triangulus $AB\Gamma$ per axem positus ad circulum $B\Gamma$ perpendicularis est, aut neutrum.

prius conus rectus sit. itaque etiam triangulus $AB\Gamma$ ad circulum $B\Gamma$ perpendicularis est [def. 3; Eucl. XI, 18]. quoniam igitur planum $AB\Gamma$ ad planum $B\Gamma$ perpendiculare est, et in plano altero $B\Gamma$ ad communem eorum sectionem $B\Gamma$ perpendicularis ducta est $\angle E$, $\angle E$ ad triangulum $AB\Gamma$ perpendicularis est [Eucl. XI def. 4]. quare etiam ad omnes rectas eam tangentes et in triangulo $AB\Gamma$ positas perpendicularis est [Eucl. XI def. 3]. ergo etiam ad ZH perpendicularis est.

τριγώνῳ ὀρθῇ ἐστίν. ὥστε καὶ πρὸς τὴν ZH ἐστὶ πρὸς ὀρθάς.

μὴ ἔστω δὴ ὁ κῶνος ὀρθός. εἰ μὲν οὖν τὸ διὰ τοῦ ἄξονος τρίγωνον ὀρθόν ἐστὶ πρὸς τὸν $BΓ$ κύκλον, ὁμοίως δείξομεν, ὅτι καὶ ἡ $\angle E$ τῇ ZH ἐστὶ πρὸς ὀρθάς. μὴ ἔστω δὴ τὸ διὰ τοῦ ἄξονος τρίγωνον τὸ $ABΓ$ ὀρθὸν πρὸς τὸν $BΓ$ κύκλον. λέγω, ὅτι οὐδὲ ἡ $\angle E$ τῇ ZH ἐστὶ πρὸς ὀρθάς. εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω· ἔστι δὲ καὶ τῇ $BΓ$ πρὸς ὀρθάς· ἡ ἄρα $\angle E$ ἐκατέρω τῶν $BΓ, ZH$ ἐστὶ πρὸς ὀρθάς. καὶ τῷ διὰ τῶν $BΓ, ZH$ ἐπιπέδῳ ἄρα πρὸς ὀρθάς ἔσται. τὸ δὲ διὰ τῶν $BΓ, HZ$ ἐπίπεδόν ἐστὶ τὸ $ABΓ$ · καὶ ἡ $\angle E$ ἄρα τῷ $ABΓ$ τριγώνῳ ἐστὶ πρὸς ὀρθάς. καὶ πάντα ἄρα τὰ δι' αὐτῆς ἐπίπεδα τῷ $ABΓ$ τριγώνῳ ἐστὶ πρὸς ὀρθάς. ἐν δὲ τι τῶν διὰ τῆς $\angle E$ ἐπιπέδων ἐστὶν ὁ $BΓ$ κύκλος· ὁ $BΓ$ ἄρα κύκλος πρὸς ὀρθάς ἐστὶ τῷ $ABΓ$ τριγώνῳ. ὥστε καὶ τὸ $ABΓ$ τρίγωνον ὀρθὸν ἔσται πρὸς τὸν $BΓ$ κύκλον· ὅπερ οὐχ ὑπόκειται. οὐκ ἄρα ἡ $\angle E$ τῇ ZH ἐστὶ πρὸς ὀρθάς.

20

πόρισμα.

ἐκ δὴ τούτου φανερόν, ὅτι τῆς $\angle ZE$ τομῆς διάμετρος ἐστὶν ἡ ZH , ἐπεὶ περ τὰς ἀγομένους παραλλήλους εὐθείαι τινὶ τῇ $\angle E$ δίχα τέμνει, καὶ ὅτι δυνατόν ἐστὶν ὑπὸ τῆς διαμέτρου τῆς ZH παραλλήλους τινὰς δίχα τέμνεσθαι καὶ μὴ πρὸς ὀρθάς.

25

η'.

Ἐὰν κῶνος ἐπιπέδῳ τμηθῇ δια τοῦ ἄξονος, τμηθῇ δὲ καὶ ἑτέρῳ ἐπιπέδῳ τέμνοντι τὴν βάσιν τοῦ κῶνου

1. ὥστε] ὥστ' V. 3. τό] bis V in extr. et init. pag.; corr. cyp. 16. ὥστε] ὥστ' V, ὥστε mg. m. rec. 20. πόρισμα] p, om. V.

ne sit igitur rectus conus. iam si triangulus per axem positus ad circulum $B\Gamma$ perpendicularis est, eodem modo demonstrabimus, etiam $\angle E$ ad ZH perpendicularem esse. ne sit igitur triangulus per axem positus $AB\Gamma$ ad circulum $B\Gamma$ perpendicularis. dico, ne $\angle E$ quidem ad ZH perpendicularem esse. nam si fieri potest, sit. uerum etiam ad $B\Gamma$ perpendicularis est. $\angle E$ igitur ad utramque $B\Gamma, ZH$ perpendicularis est; quare etiam ad planum per $B\Gamma, ZH$ ductum perpendicularis erit [Eucl. XI, 4]. planum autem rectorum $B\Gamma, HZ$ est $AB\Gamma$; quare $\angle E$ etiam ad triangulum $AB\Gamma$ perpendicularis est. itaque etiam omnia plana per eam ducta ad triangulum $AB\Gamma$ perpendicularia sunt [Eucl. XI, 18]. uerum inter plana per $\angle E$ ducta est circulus $B\Gamma$; quare circulus $B\Gamma$ ad triangulum $AB\Gamma$ perpendicularis est. itaque etiam triangulus $AB\Gamma$ ad circulum $B\Gamma$ perpendicularis erit; quod contra hypothesim est. ergo $\angle E$ ad ZH perpendicularis non est.

Corollarium.

hinc manifestum est, ZH diametrum esse sectionis $\angle ZE$ [def. 4], quoniam rectas rectae alicui $\angle E$ parallelas ductas in binas partes aequales secat, et fieri posse, ut parallelae a diametro ZH in binas partes aequales secantur, etiam si ad angulos rectos non fiat.

VIII.

Si conus per axem plano secatur et alio quoque plano secatur, quod basim coni secundum rectam secat ad basim trianguli per axem positi perpendicularem,

κατ' εὐθείαν πρὸς ὀρθὰς οὕσαν τῇ βάσει τοῦ διὰ τοῦ
 ἄξονος τριγώνου, ἣ δὲ διάμετρος τῆς γινομένης ἐν τῇ
 ἐπιφανείᾳ τομῆς ἦτοι παρὰ μίαν ἢ τῶν τοῦ τριγώνου
 πλευρῶν ἢ συμπίπτῃ αὐτῇ ἐκτὸς τῆς κορυφῆς τοῦ
 5 κώνου, προσεκβάλλεται δὲ ἥ τε τοῦ κώνου ἐπιφάνεια
 καὶ τὸ τέμνον ἐπίπεδον εἰς ἄπειρον, καὶ ἡ τομὴ εἰς
 ἄπειρον αὐξηθήσεται, καὶ ἀπὸ τῆς διαμέτρου τῆς τομῆς
 πρὸς τῇ κορυφῇ πάσῃ τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ ἴσην ἀπο-
 λήψεται τις εὐθεῖα ἀγομένη ἀπὸ τῆς τοῦ κώνου τομῆς
 10 παρὰ τὴν ἐν τῇ βάσει τοῦ κώνου εὐθεῖαν.


ἔστω κώνος, οὗ κορυφὴ μὲν τὸ A σημεῖον, βάσις
 δὲ ὁ $BΓ$ κύκλος, καὶ τετμήσθω ἐπιπέδῳ διὰ τοῦ ἄξονος,
 καὶ ποιείτω τομὴν τὸ $ΑΒΓ$ τρίγωνον· τετμήσθω δὲ
 καὶ ἑτέρῳ ἐπιπέδῳ τέμνοντι τὸν $BΓ$ κύκλον κατ'
 15 εὐθεῖαν τὴν $ΔΕ$ πρὸς ὀρθὰς οὕσαν τῇ $BΓ$, καὶ ποιείτω
 τομὴν ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τὴν $ΔΖΕ$ γραμμὴν· ἣ δὲ διά-
 μετρος τῆς $ΔΖΕ$ τομῆς ἡ ZH ἦτοι παράλληλος ἔστω
 τῇ $ΑΓ$ ἢ ἐμβαλλομένην συμπίπτει αὐτῇ ἐκτὸς τοῦ A
 σημείου. λέγω, ὅτι καί, ἐὰν ἡ τε τοῦ κώνου ἐπιφάνεια
 20 καὶ τὸ τέμνον ἐπίπεδον ἐκβάλλεται εἰς ἄπειρον, καὶ ἡ
 $ΔΖΕ$ τομὴ εἰς ἄπειρον αὐξηθήσεται.

ἐκβεβλήσθω γὰρ ἡ τε τοῦ κώνου ἐπιφάνεια καὶ το
 τέμνον ἐπίπεδον· φανερόν δὲ, ὅτι καὶ αἱ $ΑΒ$, $ΑΓ$, ZH
 συνεκβληθήσονται. ἐπεὶ ἡ ZH τῇ $ΑΓ$ ἦτοι παράλλη-
 25 λός ἐστιν ἢ ἐμβαλλομένην συμπίπτει αὐτῇ ἐκτὸς τοῦ A
 σημείου, αἱ ZH , $ΑΓ$ ἄρα ἐκβαλλόμεναι ὥς ἐπὶ τὰ $Γ$, H
 μέρη οὐδέποτε συμπεσοῦνται. ἐκβεβλήσθωσαν οὖν, καὶ
 εἰλήφθω τι σημεῖον ἐπὶ τῆς ZH τυχόν τὸ $Θ$, καὶ διὰ

4. συμπίπτῃ] p; συμπίπτει V. 5. προσεκβάλλεται] scripsi;
 προσεκβαλῆται V. 20. ἐκβαλῆται V, corr. Halley. 28. τῆς]
 op; τῇ V.

diametrus autem sectionis in superficie ortae aut lateri
alicui trianguli parallela est, aut extra uerticem coni
cum eo concurrat, producitur autem in infinitum et
superficies coni et planum secans, etiam sectio in
infinitum crescet, et recta a sectione coni rectae in
basi coni positae parallela ducta a diametro sectionis
ad uerticem rectam cuilibet rectae datae aequalem
abscindet.

sit conus, cuius uertex sit punctum A , basis autem
circulus $B\Gamma$, et plano per axem secetur, quod sectionem



efficiat triangulum $AB\Gamma$; secetur autem etiam alio plano, quod circulum $B\Gamma$ secundum rectam ΔE secet ad $B\Gamma$ perpendiculararem et in superficie conii sectionem efficiat lineam ΔZE . diametrus autem ZH sectionis ΔZE aut rectae $A\Gamma$ parallela sit aut producta cum ea extra punctum A concurrat. dico, si et superficies conii et planum secans in in-

finitum producantur, etiam sectionem ΔZE in infinitum crescere.

producatur enim et superficies conii et planum
 secans. manifestum igitur est, etiam rectas AB , AG , ZH
 simul produci. iam quoniam ZH aut rectae AG par-
 allela est aut producta cum ea extra punctum A con-
 currit, rectae ZH , AG productae ad partes Γ , H uersus
 nunquam concurrent. producantur igitur, et in ZH
 punctum aliquod sumatur Θ , et per Θ punctum rectae

τοῦ Θ σημείου τῇ μὲν $B\Gamma$ παράλληλος ἡχθῶ ἡ $K\Theta A$,
 τῇ δὲ AE παράλληλος ἡ $M\Theta N$. τὸ ἄρα διὰ τῶν KA, MN
 ἐπίπεδον παράλληλόν ἐστι τῷ διὰ τῶν $B\Gamma, AE$. κύκλος
 ἄρα ἐστὶ τὸ $KAMN$ ἐπίπεδον. καὶ ἐπεὶ τὰ A, E, M, N
 5 σημεῖα ἐν τῷ τέμνοντι ἐστὶν ἐπιπέδῳ, ἔστι δὲ καὶ ἐν
 τῷ ἐπιφανείᾳ τοῦ κώνου, ἐπὶ τῆς κοινῆς ἄρα τομῆς
 ἐστὶν· ἠϋξῆται ἄρα ἡ AZE μέχρι τῶν M, N σημείων.
 ἀϋξηθείσης ἄρα τῆς ἐπιφανείας τοῦ κώνου καὶ τοῦ
 τέμνοντος ἐπιπέδου μέχρι τοῦ $KAMN$ κύκλου ἠϋξῆται
 10 καὶ ἡ AZE τομὴ μέχρι τῶν M, N σημείων. ὁμοίως
 δὴ δείξομεν, ὅτι καί, ἐὰν εἰς ἄπειρον ἐκβάλληται ἡ τε
 τοῦ κώνου ἐπιφάνεια καὶ τὸ τέμνον ἐπίπεδον, καὶ ἡ
 $MAZEN$ τομὴ εἰς ἄπειρον ἀϋξηθήσεται.

καὶ φανερόν, ὅτι πάσῃ τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ ἴσην
 15 ἀπολήψεται τις ἀπὸ τῆς $Z\Theta$ εὐθείας πρὸς τῷ Z σημείῳ.
 ἐὰν γὰρ τῇ δοθείσῃ ἴσην θῶμεν τὴν $Z\Xi$ καὶ διὰ τοῦ Ξ
 τῇ AE παράλληλον ἀγῶγῳμεν, συμπεσεῖται τῇ τομῇ,
 ὥσπερ καὶ ἡ διὰ τοῦ Θ ἀπεδείχθη συμπίπτουσα τῇ
 τομῇ κατὰ τὰ M, N σημεῖα· ὥστε ἄγεται τις εὐθεῖα
 20 συμπίπτουσα τῇ τομῇ παράλληλος οὖσα τῇ AE ἀπο-
 λαμβάνουσα ἀπὸ τῆς ZH εὐθείαν ἴσην τῇ δοθείσῃ
 πρὸς τῷ Z σημείῳ.

θ'.

Ἐὰν κῶνος ἐπιπέδῳ τμηθῇ συμπίπτοντι μὲν ἐκατέρᾳ
 25 πλευρᾷ τοῦ διὰ τοῦ ἄξονος τριγώνου, μήτε δὲ παρὰ
 τὴν βάσιν ἡγμένῳ μήτε ὑπεναντίως, ἡ τομὴ οὐκ ἔσται
 κύκλος.

ἔστω κῶνος, οὗ κορυφὴ μὲν τὸ A σημεῖον, βάσεις
 δὲ ὁ $B\Gamma$ κύκλος, καὶ τετμήσθω ἐπιπέδῳ τινὶ μήτε

2. $M\Theta N$] p, ΘMN v. 6. τομῆς] cp, τομῇ v.

$B\Gamma$ parallela ducatur $K\Theta A$, rectae autem ΔE parallela $M\Theta N$; itaque planum rectarum KA , MN plano rectarum $B\Gamma$, ΔE parallelum est [Eucl. XI, 15]. itaque planum $KAMN$ circulus est [prop. IV]. et quoniam puncta Δ , E , M , N in plano secanti sunt, uerum etiam in superficie conici, in communi sectione sunt; quare ΔZE ad puncta M , N creuit. itaque crescente superficie conici planoque secanti ad circulum $KAMN$ etiam sectio ΔZE ad puncta M , N creuit. similiter igitur demonstrabimus, si et superficies conici et planum secans in infinitum producantur, etiam sectionem $M\Delta ZEN$ in infinitum crescere.

et manifestum est, rectam quandam a $Z\Theta$ recta ad Z punctum rectam cuius datae rectae aequalem abscisuram esse. nam si $Z\xi$ rectae datae aequalem ponimus et per ξ rectae ΔE parallelam ducimus, cum sectione concurrent, sicut etiam rectam per Θ ductam cum sectione in punctis M , N concurrere demonstrauimus. ergo recta quaedam cum sectione concurrens rectae ΔE parallela ducitur, quae a ZH ad punctum Z rectam datae aequalem abscindat.

IX.

Si conus plano secatur cum utroque latere trianguli per axem positi concurrenti, sed neque basi parallelo neque e contrario ducto, sectio circulus non erit.

sit conus, cuius uertex sit A punctum, basis autem circulus $B\Gamma$, et secetur plano neque basi parallelo neque e contrario posito, quod in superficie sectionem efficiat lineam ΔKE . dico, lineam ΔKE circulum non esse.

παραλλήλῳ ὄντι τῇ βάσει μήτε ὑπεναντίως, καὶ ποιεῖται
τομὴν ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τὴν $\triangle KE$ γραμμὴν. λέγω, ὅτι
ἡ $\triangle KE$ γραμμὴ οὐκ ἔσται κύκλος.

εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω, καὶ συμπίπτει τὸ τέμνον
5 ἐπίπεδον τῇ βάσει, καὶ ἔστω τῶν ἐπιπέδων κοινὴ τομὴ
ἡ ZH , τὸ δὲ κέντρον τοῦ $B\Gamma$ κύκλου ἔστω τὸ Θ , καὶ
ἀπ' αὐτοῦ ἀάθετος ἦχθῶ ἐπὶ τὴν ZH ἢ ΘH , καὶ ἐκ-
βεβλήσθῳ διὰ τῆς $H\Theta$ καὶ τοῦ ἄξονος ἐπίπεδον καὶ
ποιεῖται τομὰς ἐν τῇ κωνικῇ ἐπιφανείᾳ τὰς BA , AG
10 εὐθείας. ἐπεὶ οὖν τὰ A , E , H σημεῖα ἐν τε τῷ διὰ
τῆς $\triangle KE$ ἐπιπέδῳ ἐστίν, ἔστι δὲ καὶ ἐν τῷ διὰ τῶν
 A , B , Γ , τὰ ἄρα A , E , H σημεῖα ἐπὶ τῆς κοινῆς τομῆς
τῶν ἐπιπέδων ἐστίν· εὐθεῖα ἄρα ἐστὶν ἡ HEA . εἰλήφθῳ
δὴ τι ἐπὶ τῆς $\triangle KE$ γραμμῆς σημεῖον τὸ K , καὶ διὰ
15 τοῦ K τῇ ZH παράλληλος ἦχθῶ ἡ KA · ἔσται δὴ ἴση
ἡ KM τῇ MA . ἡ ἄρα AE διάμετρος ἐστὶ τοῦ $\triangle KAE$
κύκλου. ἦχθῳ δὴ διὰ τοῦ M τῇ $B\Gamma$ παράλληλος ἡ
 $NM\Xi$ · ἔστι δὲ καὶ ἡ KA τῇ ZH παράλληλος· ὥστε
τὸ διὰ τῶν $N\Xi$, KM ἐπίπεδον παράλληλόν ἐστι τῷ
20 διὰ τῶν $B\Gamma$, ZH , τουτέστι τῇ βάσει, καὶ ἔσται ἡ τομὴ
κύκλος. ἔστω ὁ $NK\Xi$. καὶ ἐπεὶ ἡ ZH τῇ BH πρὸς
ὀρθὰς ἐστὶ, καὶ ἡ KM τῇ $N\Xi$ πρὸς ὀρθὰς ἐστὶν· ὥστε
τὸ ὑπὸ τῶν $NM\Xi$ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς KM . ἔστι
δὲ τὸ ὑπὸ τῶν $\triangle ME$ ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς KM · κύκλος
25 γὰρ ὑπόκειται ἡ $\triangle KEA$ γραμμὴ, καὶ διάμετρος αὐτοῦ
ἡ AE . τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν $NM\Xi$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ $\triangle ME$.
ἔστιν ἄρα ὡς ἡ MN πρὸς MA , οὕτως ἡ EM πρὸς $M\Xi$.
ὅμοιον ἄρα ἐστὶ τὸ $\triangle MN$ τρίγωνον τῷ $\triangle ME$ τρι-
γώνῳ, καὶ ἡ ὑπὸ $\triangle NM$ γωνία ἴση ἐστὶ τῇ ὑπὸ $ME\Xi$.

16. $\triangle KAE$] $\triangle KEA$ p. 20. $B\Gamma$] p, corr. ex B m. 2 V.
21. ὁ] cp; om. V. 23. ἐστὶ] c, ἐστὶν V.

ἀλλὰ ἡ ὑπὸ $\angle NM$ γωνία τῇ ὑπὸ $AB\Gamma$ ἐστὶν ἴση·
 παράλληλος γὰρ ἡ $N\Xi$ τῇ $B\Gamma$ · καὶ ἡ ὑπὸ $AB\Gamma$ ἄρα
 ἴση ἐστὶ τῇ ὑπὸ $ME\Xi$. ὑπεναντία ἄρα ἐστὶν ἡ τομὴ·
 ὅπερ οὐχ ὑπόκειται. οὐκ ἄρα κύκλος ἐστὶν ἡ $\angle KE$
 5 γραμμὴ.

ι'.

Ἐὰν ἐπὶ κώνου τομῆς ληφθῇ δύο σημεῖα, ἡ μὲν
 ἐπὶ τὰ σημεῖα ἐπιξεννυμένη εὐθεῖα ἐντὸς πεσεῖται τῆς
 τομῆς, ἡ δὲ ἐπ' εὐθείας αὐτῇ ἐκτός.

10 ἔστω κῶνος, οὗ κορυφὴ μὲν τὸ A σημεῖον, βάσις
 δὲ ὁ $B\Gamma$ κύκλος, καὶ τετμήσθω ἐπιπέδῳ διὰ τοῦ ἄξονος,
 καὶ ποιείτω τομὴν τὸ $AB\Gamma$ τρίγωνον. τετμήσθω δὲ
 καὶ ἑτέρῳ ἐπιπέδῳ, καὶ ποιείτω τομὴν ἐν τῇ τοῦ κώνου
 ἐπιφανείᾳ τὴν $\angle EZ$ γραμμὴν, καὶ εἰλήφθω ἐπὶ τῆς
 15 $\angle EZ$ δύο σημεῖα τὰ H, Θ . λέγω, ὅτι ἡ μὲν ἐπὶ τὰ
 H, Θ ἐπιξεννυμένη εὐθεῖα ἐντὸς πεσεῖται τῆς $\angle EZ$
 γραμμῆς, ἡ δὲ ἐπ' εὐθείας αὐτῇ ἐκτός.

ἐπεὶ γὰρ κῶνος, οὗ κορυφὴ μὲν τὸ A σημεῖον,
 βάσις δὲ ὁ $B\Gamma$ κύκλος, τέτμηται ἐπιπέδῳ διὰ τοῦ ἄξονος,
 20 εἴληπται δὲ τινὰ σημεῖα ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ τὰ
 H, Θ , ἃ μὴ ἐστὶν ἐπὶ τῆς πλευρᾶς τοῦ διὰ τοῦ ἄξονος
 τριγώνου, καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ H ἐπὶ τὸ Θ ἐπιξεννυμένη
 εὐθεῖα μὴ νεύη ἐπὶ τὸ A , ἡ ἄρα ἐπὶ τὰ H, Θ ἐπι-
 ξεννυμένη εὐθεῖα ἐντὸς πεσεῖται τοῦ κώνου καὶ ἡ ἐπ'
 25 εὐθείᾳ αὐτῇ ἐκτός· ὥστε καὶ τῆς $\angle ZE$ τομῆς.

ια'.

Ἐὰν κῶνος ἐπιπέδῳ τμηθῇ διὰ τοῦ ἄξονος, τμηθῇ
 δὲ καὶ ἑτέρῳ ἐπιπέδῳ τέμνοντι τὴν βάσιν τοῦ κώνου


15. τὰ] (pr.) cp, corr. ex τῇ m. 2 V. 16. $\angle EZ$] p,
 $\angle Z$ V. 22. τριγώνου] τοῦ τριγώνου V; corr. p. 23. μὴ] c,
 supra scr. m. 2 V, οὐ p.

$\angle AB\Gamma = \angle ME\Xi$. itaque sectio e contrario est [prop. V]; quod contra hypothesim est. ergo linea $\angle KE$ circulus non est.

X.

Si in sectione conici duo puncta sumuntur, recta ad puncta ducta intra sectionem cadit, in directum autem producta extra.

sit conus, cuius uertex sit A punctum, basis autem circulus $B\Gamma$, et per axem plano secetur, quod sectionem efficiat $AB\Gamma$ triangulum. iam alio quoque plano secetur, quod in superficie conici sectionem efficiat lineam $\angle EZ$, et in $\angle EZ$ duo puncta sumantur H , Θ . dico, rectam ad H , Θ ductam intra lineam $\angle EZ$ cadere, in directum autem productam extra.



nam quoniam conus, cuius uertex est A punctum, basis autem circulus $B\Gamma$, plano per axem sectus est, et in superficie eius sumpta sunt puncta quaedam H , Θ , quae in latere trianguli per axem positi non sunt, et recta ab H ad Θ ducta ad A non cadit, recta ad H , Θ ducta intra conum cadet, in directum autem producta extra [prop. II]. ergo etiam intra sectionem $\angle ZE$, producta autem extra eam.

XI.

Si conus per axem plano secatur et alio quoque plano secatur, quod basim conici secundum rectam ad

κατ' εὐθείαν πρὸς ὀρθὰς οὕσαν τῇ βάσει τοῦ διὰ τοῦ
 ἄξονος τριγώνου, ἔτι δὲ ἡ διάμετρος τῆς τομῆς παρ-
 ἀλληλος ἢ μιᾷ πλευρᾷ τοῦ διὰ τοῦ ἄξονος τριγώνου,
 ἥτις ἂν ἀπὸ τῆς τομῆς τοῦ κώνου παράλληλος ἀχθῇ
 5 τῇ κοινῇ τομῇ τοῦ τέμνοντος ἐπιπέδου καὶ τῆς βάσεως
 τοῦ κώνου μέχρι τῆς διαμέτρου τῆς τομῆς, δυνήσεται
 τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τε τῆς ἀπολαμβανομένης ὑπ' αὐτῆς
 ἀπὸ τῆς διαμέτρου πρὸς τῇ κορυφῇ τῆς τομῆς καὶ ἄλλης
 τινὸς εὐθείας, ἢ λόγον ἔχει πρὸς τὴν μεταξὺ τῆς τοῦ
 10 κώνου γωνίας καὶ τῆς κορυφῆς τῆς τομῆς, ὃν τὸ τετρά-
 γωνον τὸ ἀπὸ τῆς βάσεως τοῦ διὰ τοῦ ἄξονος τρι-
 γώνου πρὸς τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τῶν λοιπῶν τοῦ
 τριγώνου δύο πλευρῶν· καλεῖσθω δὲ ἡ τοιαύτη τομῇ
 παραβολή.

15 ἔστω κώνος, οὗ τὸ A σημεῖον κορυφή, βάσις δὲ
 ὁ $B\Gamma$ κύκλος, καὶ τετμήσθω ἐπιπέδῳ διὰ τοῦ ἄξονος,
 καὶ ποιείτω τομὴν τὸ $AB\Gamma$ τρίγωνον, τετμήσθω δὲ
 καὶ ἑτέρῳ ἐπιπέδῳ τέμνοντι τὴν βάσιν τοῦ κώνου κατ'
 εὐθείαν τὴν AE πρὸς ὀρθὰς οὕσαν τῇ $B\Gamma$, καὶ ποιείτω
 20 τομὴν ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ κώνου τὴν AZE , ἣ δὲ
 διάμετρος τῆς τομῆς ἡ ZH παράλληλος ἔστω μιᾷ πλευρᾷ
 τοῦ διὰ τοῦ ἄξονος τριγώνου τῇ AG , καὶ ἀπὸ τοῦ Z
 σημείου τῇ ZH εὐθείᾳ πρὸς ὀρθὰς ἦχθω ἡ $Z\Theta$, καὶ
 πεποιήσθω, ὥς τὸ ἀπὸ $B\Gamma$ πρὸς τὸ ὑπὸ $BA\Gamma$, οὕτως
 25 ἡ $Z\Theta$ πρὸς ZA , καὶ εἰλήφθω τι σημεῖον ἐπὶ τῆς τομῆς
 τυχόν τὸ K , καὶ διὰ τοῦ K τῇ AE παράλληλος ἡ KA .
 λέγω, ὅτι τὸ ἀπὸ τῆς KA ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν ΘZA .
 ἦχθω γὰρ διὰ τοῦ A τῇ $B\Gamma$ παράλληλος ἡ MN .
 ἔστι δὲ καὶ ἡ KA τῇ AE παράλληλος· τὸ ἄρα διὰ


14. Mg. m. rec. ol' ... V. 24. πεποιήσθω] cp;
 πεποιείσθω V, corr. m. 2.

basim trianguli per axem positi perpendicularem secat, et si praeterea diametrus sectionis lateri alterutri trianguli per axem positi parallela est, quaelibet recta, quae a sectione conici parallela ducitur communi sectioni plani secantis basisque conici, usque ad diametrum sumpta quadrata aequalis erit rectangulo comprehenso recta ex diametro ab ea ad uerticem abscisa sectionis aliaque quadam recta, quae ad rectam inter angulum conici uerticemque sectionis positam rationem habet, quam quadratum basis trianguli per axem positi ad rectangulum reliquis duobus lateribus trianguli comprehensum; uocetur autem talis sectio parabola.

sit conus, cuius uertex sit A punctum, basis autem $B\Gamma$ circulus, et per axem plano secetur, quod sectionem efficiat triangulum $AB\Gamma$, secetur autem alio quoque plano, quod basim conici secundum rectam AE secat ad $B\Gamma$ perpendicularem et in superficie conici sectionem efficit AZE , diametrus autem sectionis ZH parallela sit $A\Gamma$ lateri trianguli per axem positi, et a puncto Z ad rectam ZH perpendicularis ducatur $Z\Theta$, et fiat $B\Gamma^2 : BA \times A\Gamma = Z\Theta : ZA$, et in sectione punctum quodlibet K sumatur, et per K rectae AE parallela ducatur KA . dico, esse

$$KA^2 = \Theta Z \times ZA.$$

ducatur enim per A rectae $B\Gamma$ parallela MN . uerum etiam KA rectae AE parallela est. itaque planum recta-



τῶν KA , MN ἐπίπεδον παράλληλόν ἐστι τῷ διὰ τῶν
 $BΓ$, $ΔE$ ἐπιπέδῳ, τουτέστι τῇ βάσει τοῦ κώνου. τὸ
 ἄρα διὰ τῶν KA , MN ἐπίπεδον κύκλος ἐστίν, οὗ
 διάμετρος ἡ MN . καὶ ἔστι κάθετος ἐπὶ τὴν MN ἡ
 5 KA , ἐπεὶ καὶ ἡ $ΔE$ ἐπὶ τὴν $BΓ$. τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν
 MAN ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς KA . καὶ ἐπεὶ ἐστίν, ὥς
 τὸ ἀπὸ τῆς $BΓ$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν BAG , οὕτως ἡ $ΘZ$
 πρὸς ZA , τὸ δὲ ἀπὸ τῆς $BΓ$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν BAG
 λόγον ἔχει τὸν συγκείμενον ἐκ τε τοῦ, ὃν ἔχει ἡ $BΓ$
 10 πρὸς $ΓA$ καὶ ἡ $BΓ$ πρὸς BA , ὁ ἄρα τῆς $ΘZ$ πρὸς
 ZA λόγος σύγκειται ἐκ τοῦ τῆς $BΓ$ πρὸς $ΓA$ καὶ τοῦ
 τῆς $ΓB$ πρὸς BA . ἀλλ' ὥς μὲν ἡ $BΓ$ πρὸς $ΓA$, οὕτως
 ἡ MN πρὸς NA , τουτέστιν ἡ MA πρὸς AZ , ὥς δὲ
 ἡ $BΓ$ πρὸς BA , οὕτως ἡ MN πρὸς MA , τουτέστιν ἡ
 15 AM πρὸς MZ , καὶ λοιπὴ ἡ NA πρὸς ZA . ὁ ἄρα τῆς
 $ΘZ$ πρὸς ZA λόγος σύγκειται ἐκ τοῦ τῆς MA πρὸς AZ
 καὶ τοῦ τῆς NA πρὸς ZA . ὁ δὲ συγκείμενος λόγος ἐκ
 τοῦ τῆς MA πρὸς AZ καὶ τοῦ τῆς AN πρὸς ZA ὁ
 τοῦ ὑπὸ MAN ἐστὶ πρὸς τὸ ὑπὸ AZA . ὥς ἄρα ἡ $ΘZ$
 20 πρὸς ZA , οὕτως τὸ ὑπὸ MAN πρὸς τὸ ὑπὸ AZA . ὥς δὲ
 ἡ $ΘZ$ πρὸς ZA , τῆς ZA κοινοῦ ὕψους λαμβανομένης
 οὕτως τὸ ὑπὸ $ΘZA$ πρὸς τὸ ὑπὸ AZA . ὥς ἄρα τὸ ὑπὸ
 MAN πρὸς τὸ ὑπὸ AZA , οὕτως τὸ ὑπὸ $ΘZA$ πρὸς
 τὸ ὑπὸ AZA . ἴσον ἄρα ἐστὶ τὸ ὑπὸ MAN τῷ ὑπὸ
 25 $ΘZA$. τὸ δὲ ὑπὸ MAN ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς KA .
 καὶ τὸ ἀπὸ τῆς KA ἄρα ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν $ΘZA$.

1. παράλληλον — 3. ἐπίπεδον] bis V (in repetitione τῷ διὰ
 lin. 1 bis), corr. m. 2. 13. NA] cyp et e corr. (et m. 2 et
 m. rec.) V. 14. MA] p, M corr. ex N m. 2 V. 15. ἡ] cp,
 m. 2 V. 18. τοῦ] (alt.) om. V, corr. Halley. 23. οὕτως
 — 24. AZA] om. V, corr. Memus. 25. $ΘZA$] $ΘAZ$ V, corr. p
 (τῶν $ΘZ$, ZA).

rum KA , MN plano rectarum $B\Gamma$, ΔE parallelum est [Eucl. XI, 15], hoc est basi coni. quare planum rectarum KA , MN circulus est, cuius diametrus est MN [prop. IV]. et KA ad MN perpendicularis est, quia etiam ΔE ad $B\Gamma$ perpendicularis [Eucl. XI, 10]; quare $MA \times AN = KA^2$. et quoniam est

$$B\Gamma^2 : BA \times A\Gamma = \Theta Z : ZA,$$

et est

$$B\Gamma^2 : BA \times A\Gamma = (B\Gamma : \Gamma A) \times (B\Gamma : BA),$$

erit

$$\Theta Z : ZA = (B\Gamma : \Gamma A) \times (\Gamma B : BA).$$

uerum

$$B\Gamma : \Gamma A = MN : NA = MA : AZ \text{ [Eucl. VI, 4]}$$

et

$$B\Gamma : BA = MN : MA = AM : MZ \text{ [ib.]} = NA : ZA \text{ [Eucl. VI, 2].}$$

quare

$$\Theta Z : ZA = (MA : AZ) \times (NA : ZA).$$

est autem

$$(MA : AZ) \times (AN : ZA) = MA \times AN : AZ \times ZA.$$

quare

$$\Theta Z : ZA = MA \times AN : AZ \times ZA.$$

est autem ZA communi altitudine sumpta

$$\Theta Z : ZA = \Theta Z \times ZA : AZ \times ZA.$$

itaque

$$MA \times AN : AZ \times ZA = \Theta Z \times ZA : AZ \times ZA.$$

itaque

$$MA \times AN = \Theta Z \times ZA \text{ [Eucl. V, 9].}$$

uerum $MA \times AN = KA^2$. quare etiam

$$KA^2 = \Theta Z \times ZA.$$

καλείσθω δὲ ἡ μὲν τοιαύτη τομὴ παραβολή, ἡ δὲ
 ΘΖ παρ' ἣν δύνανται αἱ καταγόμεναι τεταγμένως ἐπὶ
 τὴν ΖΗ διάμετρον, καλείσθω δὲ καὶ ὀρθία.

ιβ'.

5 Ἐὰν κῶνος ἐπιπέδῳ τμηθῇ διὰ τοῦ ἄξονος, τμηθῇ
 δὲ καὶ ἐτέρῳ ἐπιπέδῳ τέμνοντι τὴν βάσιν τοῦ κώνου
 κατ' εὐθείαν πρὸς ὀρθὰς οὖσαν τῇ βάσει τοῦ διὰ τοῦ
 ἄξονος τριγώνου, καὶ ἡ διάμετρος τῆς τομῆς ἐκβαλ-
 λομένη συμπίπτῃ μιᾷ πλευρᾷ τοῦ διὰ τοῦ ἄξονος
 10 τριγώνου ἐκτὸς τῆς τοῦ κώνου κορυφῆς, ἥτις ἂν ἀπὸ
 τῆς τομῆς ἀχθῇ παράλληλος τῇ κοινῇ τομῇ τοῦ
 τέμνοντος ἐπιπέδου καὶ τῆς βάσεως τοῦ κώνου, ἕως
 τῆς διαμέτρου τῆς τομῆς δυνήσεται τι χωρίου πα-
 ρακείμενον παρὰ τινὰ εὐθείαν, πρὸς ἣν λόγον ἔχει ἡ
 15 ἐπ' εὐθείας μὲν οὖσα τῇ διαμέτρῳ τῆς τομῆς, ὑπο-
 τείνουσα δὲ τὴν ἐκτὸς τοῦ τριγώνου γωνίαν, ὃν τὸ
 τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς ἡγμένης ἀπὸ τῆς κορυφῆς τοῦ
 κώνου παρὰ τὴν διάμετρον τῆς τομῆς ἕως τῆς βάσεως
 τοῦ τριγώνου πρὸς τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τῶν τῆς
 20 βάσεως τμημάτων, ὧν ποιεῖ ἡ ἀχθεῖσα, πλάτος ἔχον
 τὴν ἀπολαμβανομένην ὑπ' αὐτῆς ἀπὸ τῆς διαμέτρου
 πρὸς τῇ κορυφῇ τῆς τομῆς, ὑπερβάλλον εἶδει ὁμοίῳ
 τε καὶ ὁμοίως κειμένῳ τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τε τῆς
 ὑποτείνουσας τὴν ἐκτὸς γωνίαν τοῦ τριγώνου καὶ τῆς
 25 παρ' ἣν δύνανται αἱ καταγόμεναι· καλείσθω δὲ ἡ
 τοιαύτη τομὴ ὑπερβολή.

ἔστω κῶνος, οὗ κορυφὴ μὲν τὸ Α σημεῖον, βάσις
 δὲ ὁ ΒΓ κύκλος, καὶ τετμήσθω ἐπιπέδῳ διὰ τοῦ

4. ιβ'] p, om. V, m. 2 v. 15. εὐθείας] comp. V. μένουσα V,
 corr. Command.

uocetur autem talis sectio parabola, ΘZ autem recta parametrus rectorum ad ZH diametrum ordinate ductarum, uocetur autem etiam latus rectum.

XII.


Si conus per axem plano secatur, secatur autem alio quoque plano, quod basim conici secundum rectam secat ad basim trianguli per axem positi perpendicularem, et diametrus sectionis producta cum latere aliquo trianguli per axem positi extra uerticem conici concurrat, quaelibet recta, quae a sectione ducitur parallela communi sectioni plani secantis basisque conici, ad diametrum sectionis sumpta quadrata aequalis erit spatio cuidam rectae adplicato, ad quam recta in producta diametro sectionis posita, subtendens autem sub angulo trianguli extrinsecus posito, rationem habet, quam quadratum rectae a uertice conici ad basim trianguli diametro sectionis parallelae ductae ad rectangulum comprehensum partibus basis, quas efficit recta ducta, latitudinem habens rectam ab ea ex diametro ad uerticem sectionis abscisam, excedens figura simili similiterque posita rectangulo comprehenso recta sub angulo trianguli extrinsecus posito subtendenti parametroque; uocetur autem talis sectio hyperbola.

sit conus, cuius uertex sit A punctum, basis autem circulus $B\Gamma$, et per axem plano secetur, quod sectionem efficiat $AB\Gamma$ triangulum, secetur autem alio quoque plano basim conici secanti secundum rectam AE ad $B\Gamma$ basim trianguli $AB\Gamma$ perpendicularem, et in superficie conici sectionem efficiat lineam AZE , diametrus autem sectionis ZH producta cum $A\Gamma$ latere trianguli

ἄξονος, καὶ ποιεῖτω τομὴν τὸ $ABΓ$ τριγώνου, τετμήσθω
 δὲ καὶ ἑτέρῳ ἐπιπέδῳ τέμνοντι τὴν βάσιν τοῦ κώνου
 κατ' εὐθείαν τὴν $ΔΕ$ πρὸς ὁρθὰς οὖσαν τῇ $ΒΓ$ βάσει
 τοῦ $ABΓ$ τριγώνου, καὶ ποιεῖτω τομὴν ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ
 5 τοῦ κώνου τὴν $ΔΖΕ$ γραμμὴν, ἣ δὲ διάμετρος τῆς τομῆς
 ἢ ZH ἐκβαλλομένη συμπιπτέτω μιᾷ πλευρᾷ τοῦ $ABΓ$
 τριγώνου τῇ $ΑΓ$ ἐκτὸς τῆς τοῦ κώνου κορυφῆς κατα
 τὸ $Θ$, καὶ διὰ τοῦ A τῇ διαμέτρῳ τῆς τομῆς τῇ ZH
 παράλληλος ἦχθω ἢ AK , καὶ τεμνέτω τὴν $ΒΓ$, καὶ
 10 ἀπὸ τοῦ Z τῇ ZH πρὸς ὁρθὰς ἦχθω ἢ ZA , καὶ
 πεποιήσθω, ὥς τὸ ἀπὸ KA πρὸς τὸ ὑπὸ $BKΓ$, οὕτως
 ἢ $ZΘ$ πρὸς ZA , καὶ εἰλήφθω τι σημεῖον ἐπὶ τῆς τομῆς
 τυχὸν τὸ M , καὶ διὰ τοῦ M τῇ $ΔΕ$ παράλληλος
 ἦχθω ἢ MN , διὰ δὲ τοῦ N τῇ ZA παράλληλος ἢ
 15 $NOΞ$, καὶ ἐπιξευχθεῖσα ἢ $ΘA$ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ $Ξ$,
 καὶ διὰ τῶν A , $Ξ$ τῇ ZN παράλληλοι ἦχθωσαν αἱ
 AO , $ΞΠ$. λέγω, ὅτι ἢ MN δύναται τὸ $ZΞ$, ὃ παρὰ-
 κείται παρὰ τὴν ZA πλάτος ἔχον τὴν ZN ὑπερβάλλον
 εἶδει τῷ $AΞ$ ὁμοίῳ ὄντι τῷ ὑπὸ τῶν $ΘZA$.
 20 ἦχθω γὰρ διὰ τοῦ N τῇ $ΒΓ$ παράλληλος ἢ $PNΣ$.
 ἔστι δὲ καὶ ἢ NM τῇ $ΔΕ$ παράλληλος· τὸ ἄρα διὰ
 τῶν MN , $PΣ$ ἐπίπεδον παράλληλόν ἐστι τῷ διὰ τῶν
 $ΒΓ$, $ΔΕ$, τουτέστι τῇ βάσει τοῦ κώνου. ἐὰν ἄρα
 ἐκβληθῇ τὸ διὰ τῶν MN , $PΣ$ ἐπίπεδον, ἢ τομὴ
 25 κύκλος ἔσται, οὗ διάμετρος ἢ $PNΣ$. καὶ ἔστιν ἐπ'
 αὐτὴν κάθετος ἢ MN . τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν $PNΣ$ ἴσον
 ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς MN . καὶ ἐπεὶ ἔστιν, ὥς τὸ ἀπὸ AK
 πρὸς τὸ ὑπὸ $BKΓ$, οὕτως ἢ $ZΘ$ πρὸς ZA , ὁ δὲ τοῦ

2. Ante τέμνοντι del. διὰ τοῦ ἄξονος m. 1 V. 11. πε-
 ποιήσθω V, corr. p. KA] p, KA V, corr. m. 2 v. 15. NOΞ] p;
 OΞ corr. ex ΩΞ post ras. unius litt. V, ΩΞ supra scr. N m. 2 v.

$AB\Gamma$ extra uerticem conici concurrat in Θ , et per A diametro sectionis ZH parallela ducatur AK secetque $B\Gamma$, et a Z ad ZH perpendicularis ducatur ZA , fiatque



$KA^2 : BK \times K\Gamma = Z\Theta : ZA$,
et in sectione sumatur punctum
aliquod M , et per M rectae AE
parallela ducatur MN , per N
autem rectae ZA parallela $NOXi$,
et ducta ΘA producat ad Xi ,
et per puncta A , Xi rectae ZN
parallelae ducantur AO , XiH . dico,
esse $MN^2 = ZXi$, quod rectae ZA

adplicatum est latitudinem habens ZN et excedens
figura AXi simili rectangulo $\Theta Z \times ZA$ [Eucl. I, 26].

ducatur enim per N rectae $B\Gamma$ parallela $PN\Sigma$;
est autem etiam NM rectae AE parallela; quare
planum rectarum MN , $P\Sigma$ plano rectarum $B\Gamma$, AE
parallelum est [Eucl. XI, 15], hoc est basi conici. ita-
que ducto plano rectarum MN , $P\Sigma$ sectio circulus
erit, cuius diameter est $PN\Sigma$ [prop. IV]. et ad eam
perpendicularis est MN . itaque $PN \times N\Sigma = MN^2$.
et quoniam est

$$AK^2 : BK \times K\Gamma = Z\Theta : ZA,$$

et est

$$AK^2 : BK \times K\Gamma = (AK : K\Gamma) \times (AK : KB),$$

erit etiam

$$Z\Theta : ZA = (AK : K\Gamma) \times (AK : KB).$$

est autem

$$AK : K\Gamma = \Theta H : H\Gamma = \Theta N : N\Sigma \text{ [Eucl. VI, 4]}$$

ἀπὸ τῆς AK πρὸς τὸ ὑπὸ $BKΓ$ λόγος σύγκειται ἐκ
 τε τοῦ, ὃν ἔχει ἡ AK πρὸς $KΓ$ καὶ ἡ AK πρὸς KB ,
 καὶ ὁ τῆς $ZΘ$ ἄρα πρὸς τὴν ZA λόγος σύγκειται ἐκ
 τοῦ, ὃν ἔχει ἡ AK πρὸς $KΓ$ καὶ ἡ AK πρὸς KB .
 5 ἀλλ' ὥς μὲν ἡ AK πρὸς $KΓ$, οὕτως ἡ $ΘH$ πρὸς $HΓ$,
 τουτέστιν ἡ $ΘN$ πρὸς $NΣ$, ὥς δὲ ἡ AK πρὸς KB ,
 οὕτως ἡ ZH πρὸς HB , τουτέστιν ἡ ZN πρὸς NP .
 ὁ ἄρα τῆς $ΘZ$ πρὸς ZA λόγος σύγκειται ἐκ τε τοῦ
 τῆς $ΘN$ πρὸς $NΣ$ καὶ τοῦ τῆς ZN πρὸς NP . ὁ δὲ
 10 συγκείμενος λόγος ἐκ τοῦ τῆς $ΘN$ πρὸς $NΣ$ καὶ τοῦ
 τῆς ZN πρὸς NP ὁ τοῦ ὑπὸ τῶν $ΘNZ$ ἐστὶ πρὸς
 τὸ ὑπὸ τῶν $ΣNP$ καὶ ὥς ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν $ΘNZ$
 πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $ΣNP$, οὕτως ἡ $ΘZ$ πρὸς ZA ,
 τουτέστιν ἡ $ΘN$ πρὸς $NΞ$. ἀλλ' ὥς ἡ $ΘN$ πρὸς $NΞ$,
 15 τῆς ZN κοινού ὕψους λαμβανομένης οὕτως τὸ ὑπὸ
 τῶν $ΘNZ$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $ZNΞ$. καὶ ὥς ἄρα τὸ
 ὑπὸ τῶν $ΘNZ$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $ΣNP$, οὕτως τὸ
 ὑπὸ τῶν $ΘNZ$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $ΞNZ$. τὸ ἄρα ὑπὸ
 $ΣNP$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ $ΞNZ$. τὸ δὲ ἀπὸ MN ἴσον
 20 ἐδείχθη τῷ ὑπὸ $ΣNP$ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς MN ἄρα ἴσον
 ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν $ΞNZ$. τὸ δὲ ὑπὸ $ΞNZ$ ἐστὶ τὸ $ΞZ$
 παραλληλόγραμμον. ἡ ἄρα MN δύναται τὸ $ΞZ$, ὃ
 παράκειται παρὰ τὴν ZA πλάτος ἔχον τὴν ZN ὑπερ-
 βάλλον τῷ $AΞ$ ὁμοίῳ ὄντι τῷ ὑπὸ τῶν $ΘZA$. καλείσθω
 25 δὲ ἡ μὲν τοιαύτη τομὴ ὑπερβολή, ἡ δὲ AZ παρ' ἣν
 δύνανται αἱ ἐπὶ τὴν ZH καταγόμεναι τεταγμένως
 καλείσθω δὲ ἡ αὐτὴ καὶ ὀρθία, πλαγία δὲ ἡ $ZΘ$.

10. τοῦ] (alt.) p, om. V. 11. NP] HP V; corr. p. 17.
 ΣNP — 18. τῶν (alt.)] om. V; ego addidi praeunte Commandino;
 ZN, NΞ, οὕτω τὸ ὑπὸ τῶν ΘN, NZ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν PN, NΣ p.
 26. δύναται V; corr. p.

et

$$AK:KB = ZH:HB = ZN:NP \text{ [ib.]}$$

itaque

$$\Theta Z:ZA = (\Theta N:N\Sigma) \times (ZN:NP).$$

est autem

$$(\Theta N:N\Sigma) \times (ZN:NP) = \Theta N \times NZ : \Sigma N \times NP.$$

quare

$$\Theta N \times NZ : \Sigma N \times NP = \Theta Z:ZA = \Theta N:N\xi \text{ [ib.]}$$

sumpta autem communi altitudine ZN est

$$\Theta N:N\xi = \Theta N \times NZ : ZN \times N\xi.$$

quare etiam

$$\Theta N \times NZ : \Sigma N \times NP = \Theta N \times NZ : \xi N \times NZ.$$

itaque

$$\Sigma N \times NP = \xi N \times NZ \text{ [Eucl. V, 9].}$$

demonstrauimus autem, esse

$$MN^2 = \Sigma N \times NP.$$

itaque etiam

$$MN^2 = \xi N \times NZ.$$

uerum

$$\xi N \times NZ = \xi Z.$$

ergo MN quadrata aequalis est rectangulo ξZ , quod rectae ZA adplicatum est latitudinem habens ZN et excedens spatio $A\xi$ simili rectangulo ΘZA . uocetur autem talis sectio hyperbola, AZ autem parametrum rectarum ad ZH ordinate ductarum; uocetur autem eadem latus rectum, transuersum uero $Z\Theta$.

ιγ'.

Ἐὰν κῶνος ἐπιπέδῳ τμηθῇ διὰ τοῦ ἄξονος, τμηθῇ
 δὲ καὶ ἑτέρῳ ἐπιπέδῳ συμπίπτουντι μὲν ἑκατέρῳ πλευρᾷ
 τοῦ διὰ τοῦ ἄξονος τριγώνου, μήτε δὲ παρὰ τὴν βάσιν
 5 τοῦ κώνου ἡγμένῳ μήτε ὑπεναντίως, τὸ δὲ ἐπίπεδον,
 ἐν ᾧ ἐστὶν ἡ βάσις τοῦ κώνου, καὶ τὸ τέμνον ἐπίπεδον
 συμπίπτῃ κατ' εὐθείαν πρὸς ὁρθὰς οὖσαν ἥτοι τῇ
 βάσει τοῦ διὰ τοῦ ἄξονος τριγώνου ἢ τῇ ἐπ' εὐθείας
 αὐτῇ, ἥτις ἂν ἀπὸ τῆς τομῆς τοῦ κώνου παραλλήλος
 10 ἀχθῇ τῇ κοινῇ τομῇ τῶν ἐπιπέδων ἕως τῆς διαμέτρου
 τῆς τομῆς, θυνήσεται τι χωρίον παρακείμενον παρὰ τινα
 εὐθείαν, πρὸς ἣν λόγον ἔχει ἡ διάμετρος τῆς τομῆς,
 ὃν τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς ἡγμένης ἀπὸ τῆς κορυφῆς
 τοῦ κώνου παρὰ τὴν διάμετρον τῆς τομῆς ἕως τῆς βάσεως
 15 τοῦ τριγώνου πρὸς τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τῶν ἀπολαμ-
 βανομένων ὑπ' αὐτῆς πρὸς ταῖς τοῦ τριγώνου εὐθείαις
 πλάτος ἔχον τὴν ἀπολαμβανομένην ὑπ' αὐτῆς ἀπὸ τῆς
 διαμέτρου πρὸς τῇ κορυφῇ τῆς τομῆς ἐλλείπον εἶδει
 ὁμοίῳ τε καὶ ὁμοίως κειμένῳ τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τε
 20 τῆς διαμέτρου καὶ τῆς παρ' ἣν δύνανται· καλείσθω δὲ
 ἡ τοιαύτη τομὴ ἑλλειψις.

ἔστω κῶνος, οὗ κορυφή μὲν τὸ A σημεῖον, βάσις
 δὲ ὁ $B\Gamma$ κύκλος, καὶ τετμήσθω ἐπιπέδῳ διὰ τοῦ
 ἄξονος, καὶ ποιείτω τομὴν τὸ $AB\Gamma$ τρίγωνον, τετμήσθω
 25 δὲ καὶ ἑτέρῳ ἐπιπέδῳ συμπίπτουντι μὲν ἑκατέρῳ πλευρᾷ
 τοῦ διὰ τοῦ ἄξονος τριγώνου, μήτε δὲ παραλλήλῳ τῇ
 βάσει τοῦ κώνου μήτε ὑπεναντίως ἡγμένῳ, καὶ ποιείτω
 τομὴν ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ κώνου τὴν AE γραμμὴν·

1. ιγ'] om. V, m. 2 v. 13. τετράγωνον] cv; τε- euan. V,
 τετρα- rep. mg. m. rec. 16. εὐθείαις] V, γωνίαις cvp. 20.
 δύνανται V; corr. Memus.

XIII.

Si conus per axem plano secatur, secatur autem alio quoque plano, quod cum utroque latere trianguli per axem positi concurrat, sed neque basi conici parallelum ducitur neque e contrario, et si planum, in quo est basis conici, planumque secans concurrunt in recta perpendiculari aut ad basim trianguli per axem positi aut ad eam productam, quaelibet recta, quae a sectione conici communi sectioni planorum parallela ducitur, ad diametrum sectionis sumpta quadrata aequalis erit spatio adplicato rectae cuidam, ad quam diametrus sectionis rationem habet, quam habet quadratum rectae a uertice conici diametro sectionis parallelae ductae usque ad basim trianguli ad rectangulum comprehensum rectis ab ea ad latera trianguli abscisis, latitudinem habens rectam ab ea e diametro ad uerticem sectionis abscisam et figura deficiens simili similiterque posita rectangulo a diametro parametroque comprehenso; uocetur autem talis sectio ellipsis.


sit conus, cuius uertex sit A punctum, basis autem $B\Gamma$ circulus, et per axem plano secetur, quod sectionem efficiat triangulum $AB\Gamma$, secetur autem alio quoque plano, quod cum utroque latere trianguli per axem positi concurrat, sed neque basi conici parallelum neque e contrario ductum sit, et in superficie conici sectionem efficiat lineam AE ; communis autem sectio plani secantis eiusque plani, in quo est basis conici, sit ZH ad $B\Gamma$ perpendicularis, diametrus autem sectionis sit $E\Delta$, et ab E ad $E\Delta$ perpendicularis ducatur $E\Theta$, per A autem rectae $E\Delta$ parallela ducatur AK , et fiat

κοινή δὲ τομὴ τοῦ τέμνοντος ἐπιπέδου καὶ τοῦ, ἐν ᾧ
 ἐστὶν ἡ βάσις τοῦ κώνου, ἔστω ἡ ZH πρὸς ὀρθὰς
 οὖσα τῇ $BΓ$, ἡ δὲ διάμετρος τῆς τομῆς ἔστω ἡ $EΔ$,
 καὶ ἀπὸ τοῦ E τῇ $EΔ$ πρὸς ὀρθὰς ἤχθω ἡ $EΘ$, καὶ
 5 διὰ τοῦ A τῇ $EΔ$ παράλληλος ἤχθω ἡ AK , καὶ
 πεποιήσθω ὥς τὸ ἀπὸ AK πρὸς τὸ ὑπὸ $BKΓ$, οὕτως
 ἡ $ΔE$ πρὸς τὴν $EΘ$, καὶ εἰλήφθω τι σημεῖον ἐπὶ τῆς
 τομῆς τὸ A , καὶ διὰ τοῦ A τῇ ZH παράλληλος ἤχθω
 ἡ AM . λέγω, ὅτι ἡ AM δύναται τι χωρίον, ὃ παρὰ-
 10 κείται παρὰ τὴν $EΘ$ πλάτος ἔχον τὴν EM ἐλλείπον
 εἶδει ὁμοίῳ τῷ ὑπὸ τῶν $ΔEΘ$.

ἐπεξεύχθω γὰρ ἡ $ΔΘ$, καὶ διὰ μὲν τοῦ M τῇ $ΘE$
 παράλληλος ἤχθω ἡ $MΞN$, διὰ δὲ τῶν $Θ$, $Ξ$ τῇ EM
 παράλληλοι ἤχθωσαν αἱ $ΘN$, $ΞO$, καὶ διὰ τοῦ M τῇ
 15 $BΓ$ παράλληλος ἤχθω ἡ $ΠMP$. ἐπεὶ οὖν ἡ $ΠP$ τῇ
 $BΓ$ παράλληλός ἐστιν, ἔστι δὲ καὶ ἡ $ΔM$ τῇ ZH
 παράλληλος, τὸ ἄρα διὰ τῶν $ΔM$, $ΠP$ ἐπίπεδον παρ-
 ἀλληλόν ἐστι τῷ διὰ τῶν ZH , $BΓ$ ἐπιπέδῳ, τουτέστι
 τῇ βάσει τοῦ κώνου. ἐὰν ἄρα ἐκβληθῇ διὰ τῶν $ΔM$,
 20 $ΠP$ ἐπίπεδον, ἡ τομὴ κύκλος ἔσται, οὗ διάμετρος ἡ
 $ΠP$. καὶ ἐστὶ κἀκεῖτος ἐπ' αὐτὴν ἡ $ΔM$. τὸ ἄρα ὑπὸ
 τῶν $ΠMP$ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς $ΔM$. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν,
 ὥς τὸ ἀπὸ τῆς AK πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $BKΓ$, οὕτως
 ἡ $EΔ$ πρὸς τὴν $EΘ$, ὃ δὲ τοῦ ἀπὸ τῆς AK πρὸς τὸ
 25 ὑπὸ τῶν $BKΓ$ λόγος σύγκειται ἐκ τοῦ, ὃν ἔχει ἡ AK
 πρὸς KB , καὶ ἡ AK πρὸς $KΓ$, ἀλλ' ὥς μὲν ἡ AK
 πρὸς KB , οὕτως ἡ EH πρὸς HB , τουτέστιν ἡ EM
 πρὸς $MΠ$, ὥς δὲ ἡ AK πρὸς $KΓ$, οὕτως ἡ $ΔH$ πρὸς
 $HΓ$, τουτέστιν ἡ $ΔM$ πρὸς MP , ὃ ἄρα τῆς $ΔE$ πρὸς

4. $EΘ$] e corr. m. 1 V. 6. πεποιεῖσθω V; corr. p. 13.
 $MΞN$] $MNΞ$ V; corr. Command. 15. ἡ] (pr.) om. V; corr. p.

$\angle E : E\Theta = AK^2 : BK \times K\Gamma$, et in sectione sumatur punctum aliquod Λ , et per Λ rectae ZH parallela ducatur ΛM . dico, ΛM quadratam aequalem esse spatio rectae $E\Theta$ adplicato, quod latitudinem habeat EM et figura deficiat simili rectangulo $\angle E \times E\Theta$.



ducatur enim $\angle \Theta$, et per M rectae ΘE parallela ducatur $M\Xi N$, per Θ , Ξ autem rectae EM parallelae ducantur ΘN , ΞO , et per M rectae $B\Gamma$ parallela ducatur ΠMP . iam quoniam ΠP rectae $B\Gamma$ parallela est, et etiam ΛM rectae ZH parallela, planum rectarum ΛM , ΠP plano rectarum ZH , $B\Gamma$ parallelum est [Eucl. XI, 15], hoc est basi con. itaque si per ΛM , ΠP planum ducitur, sectio circulus erit, cuius diametrus erit ΠP [prop. IV]. et ad eam perpendicularis est ΛM ; itaque erit $\Lambda M^2 = \Pi M \times MP$. et quoniam est

$$AK^2 : BK \times K\Gamma = E\angle : E\Theta,$$

et est

$$AK^2 : BK \times K\Gamma = (AK : KB) \times (AK : K\Gamma),$$

et est

$$AK : KB = EH : HB = EM : M\Pi \text{ [Eucl. VI, 4],}$$

$$AK : K\Gamma = \angle H : H\Gamma = \angle M : MP \text{ [ib.],}$$

τὴν $EΘ$ λόγος σύγκειται ἐκ τε τοῦ τῆς EM πρὸς $ΜΠ$
καὶ τοῦ τῆς $ΔΜ$ πρὸς $ΜΡ$. ὁ δὲ συγκείμενος λόγος
ἐκ τε τοῦ, ὃν ἔχει ἡ EM πρὸς $ΜΠ$, καὶ ἡ $ΔΜ$ πρὸς
 $ΜΡ$, ὁ τοῦ ὑπὸ τῶν $EMΔ$ ἐστὶ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν
5 $ΠΜΡ$. ἔστιν ἄρα ὥς τὸ ὑπὸ τῶν $EMΔ$ πρὸς τὸ
ὑπὸ τῶν $ΠΜΡ$, οὕτως ἡ $ΔΕ$ πρὸς τὴν $EΘ$, τουτέστιν
ἡ $ΔΜ$ πρὸς τὴν $ΜΞ$. ὥς δὲ ἡ $ΔΜ$ πρὸς $ΜΞ$, τῆς
 $ΜΕ$ κοινοῦ ὕψους λαμβανομένης οὕτως τὸ ὑπὸ $ΔΜΕ$
πρὸς τὸ ὑπὸ $ΞΜΕ$. καὶ ὥς ἄρα τὸ ὑπὸ $ΔΜΕ$ πρὸς
10 τὸ ὑπὸ $ΠΜΡ$, οὕτως τὸ ὑπὸ $ΔΜΕ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΞΜΕ$.
ἴσον ἄρα ἐστὶ τὸ ὑπὸ $ΠΜΡ$ τῷ ὑπὸ $ΞΜΕ$. τὸ δὲ
ὑπὸ $ΠΜΡ$ ἴσον ἐδείχθη τῷ ἀπὸ τῆς $ΔΜ$. καὶ τὸ
ὑπὸ $ΞΜΕ$ ἄρα ἐστὶν ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς $ΔΜ$. ἡ $ΔΜ$
ἄρα δύναται τὸ $ΜΟ$, ὃ παράκειται παρὰ τὴν $ΘΕ$ πλάτος
15 ἔχον τὴν EM ἐλλείπον εἶδει τῷ $ΟΝ$ ὁμοίῳ ὄντι τῷ
ὑπὸ $ΔΕΘ$. καλείσθω δὲ ἡ μὲν τοιαύτη τομὴ ἑλλειψις,
ἡ δὲ $EΘ$ παρ' ἣν δύνανται αἱ καταγόμεναι ἐπὶ τὴν
 $ΔΕ$ τεταγμένως, ἡ δὲ αὐτὴ καὶ ὀρθία, πλαγία δὲ
ἡ $ΕΔ$.

20

ιδ'.

Ἐὰν αἱ κατὰ κορυφὴν ἐπιφάνειαι ἐπιπέδῳ τμηθῶσι
μὴ διὰ τῆς κορυφῆς, ἔσται ἐν ἑκατέρῃ τῶν ἐπιφανειῶν
τομὴ ἡ καλουμένη ὑπερβολή, καὶ τῶν δύο τομῶν ἥ
τε διάμετρος ἡ αὐτὴ ἔσται, καὶ παρ' ἧς δύνανται αἱ
25 ἐπὶ τὴν διάμετρον καταγόμεναι παράλληλοι τῇ ἐν τῇ
βάσει τοῦ κώνου εὐθείᾳ ἴσαι, καὶ τοῦ εἶδους ἡ πλα-
γία πλευρὰ κοινὴ ἡ μεταξὺ τῶν κορυφῶν τῶν τομῶν.
καλείσθωσαν δὲ αἱ τοιαῦται τομαὶ ἀντικείμεναι.

4. ὁ τοῦ — 5. $ΠΜΡ$] bis V, corr. cp et m. 2 v. 20. ιδ'] p,
om. V, m. 2 v. 25. ἐπὶ] παρὰ V p; corr. Halley. 26. εὐθείᾳ]
ego, εὐθεῖαι V.

erit

$$\angle E : E\Theta = (EM : M\Pi) \times (\angle M : MP).$$

est autem

$$(EM : M\Pi) \times (\angle M : MP) = EM \times M\angle : \Pi M \times MP.$$

itaque

$$EM \times M\angle : \Pi M \times MP = \angle E : E\Theta = \angle M : M\xi$$

[ib.]. sed sumpta communi altitudine ME est

$$\angle M : M\xi = \angle M \times ME : \xi M \times ME.$$

quare etiam

$$\angle M \times ME : \Pi M \times MP = \angle M \times ME : \xi M \times ME.$$

itaque

$$\Pi M \times MP = \xi M \times ME \text{ [Eucl. V, 9].}$$

demonstrauimus autem, esse

$$\Pi M \times MP = AM^2.$$

quare etiam $\xi M \times ME = AM^2$.

ergo AM quadrata aequalis est spatio MO ad ΘE adplicato, quod latitudinem habet EM et spatio ON deficit simili rectangulo $\angle E \times E\Theta$; uocetur autem talis sectio ellipsis, $E\Theta$ autem parametrum rectarum ad $\angle E$ ordinate ductarum, eadem autem etiam latus rectum, transuersum uero $E\angle$.

XIV.

Si superficies ad uerticem inter se positae plano secantur per uerticem non ducto, in utraque superficie sectio orietur hyperbola, quae uocatur, et ambarum sectionum diametrum eadem erit, et parametri rectarum ad diametrum rectae in basi conii positae parallelarum ductarum aequales, et transuersum figurae latus commune recta inter uertices sectionum posita; uocentur autem tales sectiones oppositae.

ἔστωσαν αἱ κατὰ κορυφὴν ἐπιφάνειαι, ὧν κορυφὴ
τὸ A σημείον, καὶ τετμήσθωσαν ἐπιπέδῳ μὴ διὰ τῆς
κορυφῆς, καὶ ποιείτω ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τομὰς τὰς
 ΔEZ , $H\Theta K$. λέγω, ὅτι ἑκατέρω τῶν ΔEZ , $H\Theta K$
5 τομῶν ἐστὶν ἡ καλουμένη ὑπερβολή.

ἔστω γὰρ ὁ κύκλος, καθ' οὗ φέρεται ἡ τὴν ἐπι-
φάνειαν γράφουσα εὐθεΐα, ὁ $B\Delta\Gamma Z$, καὶ ἦχθω ἐν τῇ
κατὰ κορυφὴν ἐπιφανείᾳ παράλληλον αὐτῷ ἐπίπεδον
τὸ ΞHOK . κοινὰ δὲ τομαὶ τῶν $H\Theta K$, $ZE\Delta$ τομῶν
10 καὶ τῶν κύκλων αἱ $Z\Delta$, HK . ἔσονται δὴ παράλ-
ληλοι. ἄξων δὲ ἔστω τῆς κωνικῆς ἐπιφανείας ἡ $\Delta A\Gamma$
εὐθεΐα, κέντρον δὲ τῶν κύκλων τὰ A , Γ , καὶ ἀπὸ τοῦ
 A ἐπὶ τὴν $Z\Delta$ κάθετος ἄχθεισα ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὰ
 B , Γ σημεία, καὶ διὰ τῆς $B\Gamma$ καὶ τοῦ ἄξωνος ἐπίπεδον
15 ἐκβεβλήσθω· ποιήσει δὴ τομὰς ἐν μὲν τοῖς κύκλοις
παράλληλους εὐθείας τὰς ΞO , $B\Gamma$, ἐν δὲ τῇ ἐπιφανείᾳ
τὰς BAO , $\Gamma A\Xi$. ἔσται δὴ καὶ ἡ ΞO τῇ HK πρὸς
ὀρθάς, ἐπειδὴ καὶ ἡ $B\Gamma$ τῇ $Z\Delta$ ἐστὶ πρὸς ὀρθάς, καὶ
ἐστὶν ἑκατέρω παράλληλος. καὶ ἐπεὶ τὸ διὰ τοῦ ἄξωνος
20 ἐπίπεδον ταῖς τομαῖς συμβάλλει κατὰ τὰ M , N σημεία
ἐντὸς τῶν γραμμῶν, δῆλον, ὡς καὶ τὰς γραμμὰς τέμνει
τὸ ἐπίπεδον. τεμνέτω κατὰ τὰ Θ , E · τὰ ἄρα M , E , Θ , N
σημεῖα ἐν τε τῷ διὰ τοῦ ἄξωνός ἐστὶν ἐπιπέδῳ καὶ
ἐν τῷ ἐπιπέδῳ, ἐν ᾧ εἰσιν αἱ γραμμαὶ· εὐθεΐα ἄρα
25 ἐστὶν ἡ $ME\Theta N$ γραμμὴ. καὶ φανερόν, ὅτι τὰ τε
 Ξ , Θ , A , Γ ἐπ' εὐθείας ἐστὶ καὶ τὰ B , E , A , O ἐν
τε γὰρ τῇ κωνικῇ ἐπιφανείᾳ ἐστὶ καὶ ἐν τῷ διὰ τοῦ
ἄξωνος ἐπιπέδῳ. ἦχθωσαν δὲ ἀπὸ μὲν τῶν Θ , E τῇ

3. ποιείτω] scripsi, ποιείτωσαν Vp. 9. $ZE\Delta$, $H\Theta K$ Halley
cum Command. 20. συμβάλλει] συμ- contorte V, συμβ- rep.
mg. m. rec.

ΘE πρὸς ὀρθὰς αἰ ΘP , $E\Pi$, διὰ δὲ τοῦ A τῇ $ME\Theta N$
 παράλληλος ἦχθω ἡ ΣAT , καὶ πεποιήσθω, ὥς μὲν
 τὸ ἀπὸ τῆς AS πρὸς τὸ ὑπὸ $B\Sigma\Gamma$, οὕτως ἡ ΘE
 πρὸς $E\Pi$, ὥς δὲ τὸ ἀπὸ τῆς AT πρὸς τὸ ὑπὸ $OT\Xi$,
 5 οὕτως ἡ $E\Theta$ πρὸς ΘP . ἐπεὶ οὖν κῶνος, οὗ κορυφή
 μὲν τὸ A σημεῖον, βάσις δὲ ὁ $B\Gamma$ κύκλος, τέτμηται
 ἐπιπέδῳ διὰ τοῦ ἄξονος, καὶ πεποίηκε τομὴν τὸ $AB\Gamma$
 τριγώνον, τέτμηται δὲ καὶ ἐτέρῳ ἐπιπέδῳ τέμνοντι
 τὴν βάσιν τοῦ κώνου κατ' εὐθείαν τὴν ΔMZ πρὸς
 10 ὀρθὰς οὖσαν τῇ $B\Gamma$, καὶ πεποίηκε τομὴν ἐν τῇ ἐπι-
 φανείᾳ τὴν ΔEZ , ἡ δὲ διάμετρος ἡ ME ἐκβαλλομένη
 συμπέπτωκε μιᾷ πλευρᾷ τοῦ διὰ τοῦ ἄξονος τριγώνου
 ἐκτὸς τῆς κορυφῆς τοῦ κώνου, καὶ διὰ τοῦ A σημείου
 τῇ διαμέτρῳ τῆς τομῆς τῇ EM παράλληλος ἦκται ἡ
 15 AS , καὶ ἀπὸ τοῦ E τῇ EM πρὸς ὀρθὰς ἦκται ἡ
 $E\Pi$, καὶ ἐστὶν ὥς τὸ ἀπὸ AS πρὸς τὸ ὑπὸ $B\Sigma\Gamma$,
 οὕτως ἡ $E\Theta$ πρὸς $E\Pi$, ἡ μὲν ΔEZ ἄρα τομὴ ὑπερ-
 βολὴ ἐστὶν, ἡ δὲ $E\Pi$ παρ' ἣν δύνανται αἱ ἐπὶ τὴν
 EM καταγόμεναι τεταγμένως, πλαγία δὲ τοῦ εἵδους
 20 πλευρὰ ἡ ΘE . ὁμοίως δὲ καὶ ἡ $H\Theta K$ ὑπερβολὴ
 ἐστὶν, ἥς διάμετρος μὲν ἡ ΘN , ἡ δὲ ΘP παρ' ἣν
 δύνανται αἱ ἐπὶ τὴν ΘN καταγόμεναι τεταγμένως,
 πλαγία δὲ τοῦ εἵδους πλευρὰ ἡ ΘE .

λέγω, ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΘP τῇ $E\Pi$. ἐπεὶ γὰρ παράλ-
 25 λήλως ἐστὶν ἡ $B\Gamma$ τῇ ΞO , ἐστὶν ὥς ἡ AS πρὸς $\Sigma\Gamma$,
 οὕτως ἡ AT πρὸς $T\Xi$, καὶ ὥς ἡ AS πρὸς ΣB , οὕτως
 ἡ AT πρὸς TO . ἀλλ' ὁ τῆς AS πρὸς $\Sigma\Gamma$ λόγος
 μετὰ τοῦ τῆς AS πρὸς ΣB ὁ τοῦ ἀπὸ AS ἐστὶ πρὸς
 τὸ ὑπὸ $B\Sigma\Gamma$, ὁ δὲ τῆς AT πρὸς $T\Xi$ μετὰ τοῦ τῆς

2. πεποιήσθω V; corr. p. 3. $B\Sigma\Gamma$] $B\Gamma\Sigma$ V; corr. Memus.
 16. καὶ — 17. $E\Pi$] bis V; corr. cp. 16. $B\Sigma\Gamma$] $B\Gamma\Sigma$ V

plano per axem ducto. ducantur igitur a Θ , E ad rectam ΘE perpendiculares ΘP , $E\Pi$, per A autem rectae $ME\Theta N$ parallela ducatur ΣAT , et fiat

$$\Theta E : E\Pi = A\Sigma^2 : B\Sigma \times \Sigma\Gamma,$$

$$E\Theta : \Theta P = AT^2 : OT \times T\Xi.$$

iam quoniam conus, cuius uertex est punctum A , basis autem $B\Gamma$ circulus, plano per axem sectus est, quod sectionem effecit triangulum $AB\Gamma$, et alio quoque plano sectus est, quod basim coni secundum rectam ΔMZ secat ad $B\Gamma$ perpendicularem et in superficie sectionem effecit ΔEZ , et diametrus ME producta cum latere trianguli per axem positi extra uerticem coni concurrat, et per A punctum EM diametro sectionis parallela ducta est $A\Sigma$, et ab E ad EM perpendicularis ducta est $E\Pi$, et est

$$E\Theta : E\Pi = A\Sigma^2 : B\Sigma \times \Sigma\Gamma,$$

sectio ΔEZ hyperbola est, $E\Pi$ autem parametrum rectarum ad EM ordinate ductarum, transuersum autem latus figurae ΘE [prop. XII]. et eodem modo etiam $H\Theta K$ hyperbola est, cuius diametrus est ΘN , parametrum autem rectarum ad ΘN ordinate ductarum ΘP , transuersum autem latus figurae ΘE .

dico, esse $\Theta P = E\Pi$. nam quoniam $B\Gamma$ rectae ΞO parallela est, erit

$$A\Sigma : \Sigma\Gamma = AT : T\Xi, \quad A\Sigma : \Sigma B = AT : TO$$

[Eucl. VI, 4]. uerum

$$(A\Sigma : \Sigma\Gamma) \times (A\Sigma : \Sigma B) = A\Sigma^2 : B\Sigma \times \Sigma\Gamma,$$

$$(AT : T\Xi) \times (AT : TO) = AT^2 : \Xi T \times TO.$$

(utroque loco); corr. Memus. 19. τεταγμένης] τετ- contorte V, τετα... mg. m. rec. 27. $\Sigma\Gamma$] Γ V, corr. p. 28. ΣB] B V; corr. p. 29. τό] cv, supra scr. m. 1 V.

AT πρὸς TO ὁ τοῦ ἀπὸ AT πρὸς τὸ ὑπὸ ΞTO ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ AS πρὸς τὸ ὑπὸ $B\Sigma\Gamma$, οὕτως τὸ ἀπὸ AT πρὸς τὸ ὑπὸ ΞTO . καὶ ἔστιν ὡς μὲν τὸ ἀπὸ AS πρὸς τὸ ὑπὸ $B\Sigma\Gamma$, ἡ ΘE πρὸς $E\Pi$, ὡς δὲ
 5 τὸ ἀπὸ AT πρὸς τὸ ὑπὸ ΞTO , ἡ ΘE πρὸς ΘP . καὶ ὡς ἄρα ἡ ΘE πρὸς $E\Pi$, ἡ $E\Theta$ πρὸς ΘP . ἴση ἄρα ἔστιν ἡ $E\Pi$ τῇ ΘP .

ιε'.

Ἐὰν ἐν ἐλλείψει ἀπὸ τῆς διχοτομίας τῆς διαμέτρου
 10 ἀχθεῖσα εὐθεῖα τεταγμένως ἐκβληθῇ ἐφ' ἐκάτερα ἕως τῆς τομῆς, καὶ ποιηθῇ ὡς ἡ ἐκβληθεῖσα πρὸς τὴν διάμετρον, ἡ διάμετρος πρὸς τινὰ εὐθεῖαν, ἥτις ἂν ἀπὸ τῆς τομῆς ἀχθῇ ἐπὶ τὴν ἐκβληθεῖσαν παράλληλος τῇ διαμέτρῳ, δυνήσεται τὸ παρακείμενον παρὰ τὴν
 15 τρίτην ἀνάλογον πλάτος ἔχον τὴν ὑπ' αὐτῆς ἀπολαμβάνομένην πρὸς τῇ τομῇ ἐλλείπον εἶδει ὁμοίῳ τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τε τῆς ἐφ' ἣν ἄγονται καὶ τῆς παρ' ἣν δύνανται, καὶ προσεμβαλλομένη ἕως τοῦ ἐτέρου μέρους τῆς τομῆς δίχα τμηθῇσεται ὑπὸ τῆς ἐφ' ἣν
 20 κατῆκται.

ἔστω ἑλλειψις, ἥς διάμετρος ἡ AB , καὶ τετμήσθω ἡ AB δίχα κατὰ τὸ Γ σημεῖον, καὶ διὰ τοῦ Γ ἤχθω τεταγμένως καὶ ἐκβεβλήσθω ἐφ' ἐκάτερα ἕως τῆς τομῆς ἡ $\Delta\Gamma E$, καὶ ἀπὸ τοῦ Δ σημείου τῇ ΔE πρὸς ὀρθὰς
 25 ἤχθω ἡ ΔZ , καὶ ποιείσθω ὡς ἡ ΔE πρὸς AB , οὕτως ἡ AB πρὸς τὴν ΔZ , καὶ εἰλήφθω τι σημεῖον ἐπὶ τῆς τομῆς τὸ H , καὶ διὰ τοῦ H τῇ AB παράλληλος ἤχθω ἡ $H\Theta$, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ EZ , καὶ διὰ μὲν τοῦ Θ τῇ

8. ιε'] p, om. V, m. 2 v. 11. ποιήση V, corr. Halley. 19. μέρους] μέτρον V, corr. p et m. 2 v. 23. ἐκβεβλήσθω] cp, ἐκβλήσθω V, corr. m. rec. 24. τοῦ] p, om. V.

ΔZ παράλληλος ἤχθω ἡ ΘA , δια δὲ τῶν Z, A τῇ ΘA
 παράλληλοι ἤχθωσαν αἱ ZK, AM . λέγω, ὅτι ἡ $H\Theta$
 δύναται τὸ ΔA , ὃ παράκειται παρὰ τὴν ΔZ πλάτος ἔχον
 τὴν $\Delta\Theta$ ἐλλεῖπον εἶδει τῷ ΔZ ὁμοίῳ ὅντι τῷ ὑπὸ $E\Delta Z$.
 5 ἔστω γὰρ παρ' ἣν δύνανται αἱ ἐπὶ τὴν AB κατ-
 αρόμεναι τεταγμένως ἡ AN , καὶ ἐπεξεύχθω ἡ BN , καὶ
 διὰ μὲν τοῦ H τῇ ΔE παράλληλος ἤχθω ἡ $H\Xi$, δια
 δὲ τῶν Ξ, Γ τῇ AN παράλληλοι ἤχθωσαν αἱ $\Xi O, \Gamma\P$,
 διὰ δὲ τῶν N, O, Π τῇ AB παράλληλοι ἤχθωσαν αἱ
 10 $NT, O\Sigma, T\P$. ἴσον ἄρα ἐστὶ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς $\Delta\Gamma$ τῷ
 $\Delta\P$, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς $H\Xi$ τῷ AO . καὶ ἐπεὶ ἐστίν, ὥς ἡ
 BA πρὸς AN , οὕτως ἡ $B\Gamma$ πρὸς $\Gamma\P$, καὶ ἡ ΠT πρὸς TN ,
 ἴση δὲ ἡ $B\Gamma$ τῇ ΓA , τουτέστι τῇ $T\P$, καὶ ἡ $\Gamma\P$ τῇ TA ,
 ἴσον ἄρα ἐστὶ τὸ μὲν $\Delta\P$ τῷ TP , τὸ δὲ ΞT τῷ $T\P$.
 15 καὶ ἐπεὶ το OT τῷ OP ἐστίν ἴσον, κοινὸν δὲ τὸ NO ,
 τὸ $T\P$ ἄρα ἴσον ἐστὶ τῷ $N\Sigma$. ἀλλὰ τὸ $T\P$ τῷ $T\Xi$ ἐστίν
 ἴσον, κοινὸν δὲ τὸ $T\Sigma$. ὅλον ἄρα τὸ $N\P$, τουτέστι τὸ
 ΠA , ἴσον ἐστὶ τῷ AO μετὰ τοῦ $ΠΟ$. ὥστε τὸ ΠA τοῦ
 AO ὑπερέχει τῷ OP . καὶ ἐστὶ τὸ μὲν $\Delta\P$ ἴσον τῷ ἀπο
 20 τῆς ΓA , τὸ δὲ AO ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς ΞH , τὸ δὲ OP ἴσον
 τῷ ὑπὸ $O\Sigma\P$. τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς ΓA τοῦ ἀπο τῆς $H\Xi$
 ὑπερέχει τῷ ὑπὸ τῶν $O\Sigma\P$. καὶ ἐπεὶ ἡ ΔE τέτμηται
 εἰς μὲν ἴσα κατὰ τὸ Γ , εἰς δὲ ἄνισα κατὰ τὸ Θ , τὸ ἄρα
 ὑπὸ τῶν $E\Theta A$ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς $\Gamma\Theta$, τουτέστι τῆς
 25 ΞH , ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΓA . τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς ΓA
 τοῦ ἀπὸ τῆς ΞH ὑπερέχει τῷ ὑπὸ τῶν $E\Theta A$. ὑπερεῖχε
 δὲ τὸ ἀπὸ τῆς ΓA τοῦ ἀπὸ τῆς $H\Xi$ τῷ ὑπὸ τῶν
 $O\Sigma\P$. τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν $E\Theta A$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν
 $O\Sigma\P$. καὶ ἐπεὶ ἐστίν, ὥς ἡ ΔE πρὸς AB , οὕτως ἡ

1. ΘA] $\Theta A \vee$; corr. p. 10. NT] NTP Halley cum
 Command., NP p. 12. διὰ τὸ δ' [τοῦ] ε' mg. m. 1 $\vee$

ZK, AM . dico, esse $H\Theta^2 = \mathcal{A}A$, quod rectae $\mathcal{A}Z$ adplicatum est latitudinem habens $\mathcal{A}\Theta$ et figura deficiens $\mathcal{A}Z$ simili rectangulo $E\mathcal{A}Z$.

sit enim parametrus rectarum ad AB ordinate ductarum AN , ducaturque BN , et per H rectae $\mathcal{A}E$ parallela ducatur $H\xi$, per ξ , Γ autem rectae AN parallelae ducantur $\xi O, \Gamma\Pi$, per N, O, Π autem rectae AB parallelae ducantur $NT, O\Sigma, T\Pi$; itaque

$$\mathcal{A}\Gamma^2 = \mathcal{A}\Pi, H\xi^2 = \mathcal{A}O \text{ [prop. XIII].}$$

et quoniam est

$BA : AN = B\Gamma : \Gamma\Pi = \Pi T : TN$ [Eucl. VI, 4],
et $B\Gamma = \Gamma A = T\Pi$, $\Gamma\Pi = TA$, erit $\mathcal{A}\Pi = TP$,
 $\xi T = TP$ [Eucl. VI, 1]. et quoniam $OT = OP$
[Eucl. I, 43], et NO commune est, erit $TT = N\Sigma$.
est autem $TT = T\xi$, et $T\Sigma$ commune. quare
 $N\Pi = \mathcal{A}O + \Pi O$, hoc est $\Pi A = \mathcal{A}O + \Pi O$. itaque
 $\Pi A \div \mathcal{A}O = O\Pi$. est autem

$$\mathcal{A}\Pi = \Gamma\mathcal{A}^2, \mathcal{A}O = \xi H^2, O\Pi = O\Sigma \times \Sigma\Pi;$$

itaque

$$\Gamma\mathcal{A}^2 \div H\xi^2 = O\Sigma \times \Sigma\Pi.$$

et quoniam $\mathcal{A}E$ in Γ in partes aequales, in Θ autem in inaequales secta est, erit $E\Theta \times \Theta\mathcal{A} + \Gamma\Theta^2 = \Gamma\mathcal{A}^2$
[Eucl. II, 5] = $E\Theta \times \Theta\mathcal{A} + \xi H^2$. quare

$$\Gamma\mathcal{A}^2 \div \xi H^2 = E\Theta \times \Theta\mathcal{A}.$$

erat autem

$$\Gamma\mathcal{A}^2 \div H\xi^2 = O\Sigma \times \Sigma\Pi.$$

quare

$$E\Theta \times \Theta\mathcal{A} = O\Sigma \times \Sigma\Pi.$$

στοιχείων add. m. rec. 13. $\Gamma\Pi$] $B\Pi$ V; corr. Memus. TA] scripsi; ΠN V, TN *ἔστιν ἰση* Halley, *tn* Command. et Memus.

AB πρὸς τὴν ΔZ , ἔστιν ἄρα καὶ ὡς ἡ ΔE πρὸς τὴν ΔZ , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΔE πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς AB , τουτέστι τὸ ἀπὸ ΓA πρὸς τὸ ἀπὸ ΓB . καὶ ἔστι τῷ ἀπὸ ΓA ἴσον τὸ ὑπὸ $\Pi \Gamma A$, τουτέστι τοῦ ὑπὸ $\Pi \Gamma B$.
 5 καὶ ὡς ἄρα ἡ $E A$ πρὸς ΔZ , τουτέστιν ὡς ἡ $E \Theta$ πρὸς ΘA , τουτέστι τὸ ὑπὸ τῶν $E \Theta A$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $\Delta \Theta A$, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν $\Pi \Gamma B$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓB , τουτέστι τὸ ὑπὸ $\Pi \Sigma O$ πρὸς τὸ ἀπὸ $O \Sigma$. καὶ ἔστιν ἴσον τὸ ὑπὸ $E \Theta A$ τῷ ὑπὸ $\Pi \Sigma O$. ἴσον ἄρα
 10 καὶ τὸ ὑπὸ $\Delta \Theta A$ τῷ ἀπὸ τῆς $O \Sigma$, τουτέστι τῷ ἀπὸ τῆς $H \Theta$. ἡ $H \Theta$ ἄρα δύναιται τὸ ΔA , ὃ παράκειται παρὰ τὴν ΔZ ἐλλείπον εἶδει τῷ $Z A$ ὁμοίῳ ὄντι τῷ ὑπὸ τῶν $E A Z$.

λέγω δὴ, ὅτι καὶ ἐκβαλλομένη ἡ ΘH ἕως τοῦ
 15 ἐτέρου μέρους τῆς τομῆς δίχα τμηθήσεται ὑπὸ τῆς ΔE .
 ἐκβεβλήσθω γὰρ καὶ συμβαλλέτω τῇ τομῇ κατὰ τὸ Φ , καὶ διὰ μὲν τοῦ Φ τῇ $H \Xi$ παράλληλος ἦχθω ἡ ΦX , διὰ δὲ τοῦ X τῇ $A N$ παράλληλος ἦχθω ἡ $X \Psi$. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ $H \Xi$ τῇ ΦX , ἴσον ἄρα καὶ τὸ
 20 ἀπὸ τῆς $H \Xi$ τῷ ἀπὸ τῆς ΦX . ἀλλὰ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς $H \Xi$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν $A \Xi O$, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ΦX ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν $A X \Psi$. ἀνάλογον ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ $O \Xi$ πρὸς τὴν ΨX , οὕτως ἡ $X A$ πρὸς $A \Xi$. καὶ ἔστιν ὡς ἡ $O \Xi$ πρὸς τὴν ΨX , οὕτως ἡ ΞB πρὸς
 25 $B X$. καὶ ὡς ἄρα ἡ $X A$ πρὸς $A \Xi$, οὕτως ἡ ΞB πρὸς $B X$. καὶ διελόντι ὡς ἡ $X \Xi$ πρὸς ΞA , οὕτως ἡ $X \Xi$ πρὸς $X B$. ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ $A \Xi$ τῇ $X B$. ἔστι δὲ καὶ ἡ $A \Gamma$ τῇ ΓB ἴση· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ $\Xi \Gamma$ τῇ ΓX ἐστὶν

1. διὰ τὸ [πόρισμα τοῦ] ἰθ' τοῦ [ε'] mg. m. 1 V. 3. διὰ τὸ ἰε' [τοῦ ε'] mg. m. 1 V. Ad lineas seqq. haec mg. m. 1 V: διὰ τὸ . . . ε' στοιχε . . . , διὰ τὸ στοιχ. διὰ τὸ δ' ε' ε'

et quoniam est $\angle E : AB = AB : \angle Z$, erit etiam
[Eucl. V def. 9]

$\angle E : \angle Z = \angle E^2 : AB^2 = \Gamma \angle^2 : \Gamma B^2$ [Eucl. V, 15].
est autem

$$\Gamma \angle^2 = \Pi \Gamma \times \Gamma A = \Pi \Gamma \times \Gamma B.$$

quare etiam

$$\begin{aligned} E \angle : \angle Z &= \Pi \Gamma \times \Gamma B : \Gamma B^2 = E \Theta : \Theta A \\ [\text{Eucl. VI, 4}] &= E \Theta \times \Theta A : \angle \Theta \times \Theta A = \Pi \Sigma \times \Sigma O : O \Sigma^2 \\ [\text{ib.}] \quad \text{et est} \end{aligned}$$

$$E \Theta \times \Theta A = \Pi \Sigma \times \Sigma O.$$

quare [Eucl. V, 9]

$$\angle \Theta \times \Theta A = O \Sigma^2 = H \Theta^2.$$

ergo $H \Theta$ quadrata aequalis est rectangulo $\angle A$ ad $\angle Z$
adplicato, quod deficit figura $Z A$ rectangulo $E \angle \times \angle Z$
simili.

iam dico, ΘH ad alteram partem sectionis produc-
tam a $\angle E$ in duas partes aequales secari.

producatur enim et cum sectione in Φ concurrat,
per Φ autem rectae $H \Xi$ parallela ducatur ΦX , per X
autem rectae AN parallela ducatur $X \Psi$. et quoniam
est $H \Xi = \Phi X$ [Eucl. I, 34], erit etiam $H \Xi^2 = \Phi X^2$.
uerum

$$H \Xi^2 = A \Xi \times \Xi O, \quad \Phi X^2 = AX \times X \Psi \quad [\text{prop. XIII}].$$

itaque [Eucl. VI, 16]

$$O \Xi : \Psi X = X A : A \Xi.$$

et $O \Xi : \Psi X = \Xi B : B X$ [Eucl. VI, 4]. quare etiam
 $X A : A \Xi = \Xi B : B X$. et subtrahendo $X \Xi : \Xi A = X \Xi : X B$
[Eucl. V, 17]. itaque $A \Xi = X B$ [Eucl. V, 9]. est

$\tau\acute{o} \alpha' \delta\iota \dots \tau\omicron\upsilon \varsigma' \varsigma'$. 8. $\varsigma\varsigma \delta\iota\alpha \tau\acute{o} \delta' \tau\omicron\upsilon \varsigma' \kappa\alpha\iota \tau\acute{o} \alpha' \text{ mg.}$
m. 1 V. 14. $\Theta H]$ ΘN V; corr. p ($H \Theta$).

ἴση· ὥστε καὶ ἡ $HΘ$ τῇ $ΘΦ$. ἡ ἄρα $ΘH$ ἐμβαλλο-
μένη ἕως τοῦ ἑτέρου μέρους τῆς τομῆς δίχα τέμνεται
ὑπὸ τῆς $ΑΘ$.

ις'.

5 Ἐὰν διὰ τῆς διχοτομίας τῆς πλαγίας πλευρᾶς τῶν
ἀντικειμένων ἄχθῃ τις εὐθεΐα παρὰ τεταγμένως κατ-
ηγμένην, διάμετρος ἔσται τῶν ἀντικειμένων συζυγῆς
τῇ προὑπαρχούσῃ διαμέτρῳ.

ἔστωσαν ἀντικείμενοι, ὧν διάμετρος ἡ AB , καὶ
10 τετμήσθω δίχα ἡ AB κατὰ τὸ $Γ$, καὶ διὰ τοῦ $Γ$ ἤχθῃ
παρὰ τεταγμένως κατηγμένην ἡ $ΓΔ$. λέγω, ὅτι διά-
μετρος ἔστιν ἡ $ΓΔ$ συζυγῆς τῇ AB .

ἔστωσαν γὰρ παρ' αὐς δύνανται αἱ καταγόμεναι αἱ
 AE, BZ εὐθεΐαι, καὶ ἐπιξευχθεῖσαι αἱ AZ, BE ἐκ-
15 βεβλήσθωσαν, καὶ εἰλήφθω τι ἐπὶ τῆς ἑτέρας τῶν τομῶν
τυχὸν σημεῖον τὸ H , καὶ διὰ μὲν τοῦ H τῇ AB παρ-
άλληλος ἤχθῃ ἡ $HΘ$, ἀπὸ δὲ τῶν $H, Θ$ κατήχθωσαν
τεταγμένως αἱ $HK, ΘΑ$, διὰ δὲ τῶν $K, Α$ ταῖς AE, BZ
παράλληλοι ἤχθωσαν αἱ KM, AN . ἐπεὶ οὖν ἴση ἔστιν
20 ἡ HK τῇ $ΘΑ$, ἴσον ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς HK τῷ ἀπὸ
τῆς $ΘΑ$. ἀλλὰ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς HK ἴσον ἔστι τῷ ὑπὸ
τῶν AKM , τὸ δὲ ἀπὸ τῆς $ΘΑ$ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν BAN .
τὸ ἄρα ὑπὸ AKM ἴσον ἔστι τῷ ὑπὸ BAN . καὶ ἐπεὶ
ἴση ἔστιν ἡ AE τῇ BZ , ἔστιν ἄρα, ὥς ἡ AE πρὸς AB ,
25 οὕτως ἡ BZ πρὸς BA . ἀλλ' ὥς μὲν ἡ AE πρὸς AB ,
οὕτως ἡ MK πρὸς KB , ὥς δὲ ἡ ZB πρὸς BA , οὕτως
ἡ NA πρὸς AA . καὶ ὥς ἄρα ἡ MK πρὸς KB , οὕτως

1. ἡ] (pr.) p, om. V. 4. ις'] p, om. V, m. 2 v. 6. παρα-
τεταγμένως κατηγμένη V; corr. Halley. 11. παρατεταγμένως
κατηγμένη V; corr. Halley. 21. ἴσον] om. V; corr. p.


autem etiam $A\Gamma = \Gamma B$. quare etiam $\Xi\Gamma = \Gamma X$.
itaque etiam $H\Theta = \Theta\Phi$. ergo ΘH ad alteram partem
sectionis producta in duas partes aequales secatur a $\Lambda\Theta$.

XVI.

Si per punctum medium lateris transuersi opposi-
tarum recta rectae ordinate ductae parallela ducitur,
diametrus erit oppositarum cum diametro proposita
coniugata.

sint oppositae, quarum diametrus sit AB , et AB
in Γ in duas partes aequales secetur, per Γ autem
rectae ordinate ductae parallela ducatur $\Gamma\Lambda$. dico,
 $\Gamma\Lambda$ diametrum esse cum diametro AB coniugatam.

sint enim parametri rectae AE , BZ , et ductae
 AZ , BE producantur, sumaturque in alterutra sectione



quoduis punctum H , et per H
rectae AB parallela ducatur $H\Theta$,
ab H, Θ autem ordinate ducantur
 $HK, \Theta A$, per K, A autem rectis
 AE, BZ parallelae ducantur
 KM, AN . quoniam igitur

$$HK = \Theta A \text{ [Eucl. I, 34],}$$

erit etiam $HK^2 = \Theta A^2$. est autem

$$HK^2 = AK \times KM,$$

$$\Theta A^2 = BA \times AN \text{ [prop. XII;}$$

Eucl. I, 34]. quare $AK \times KM = BA \times AN$. et
quoniam $AE = BZ$ [prop. XIV], erit

$$AE : AB = BZ : BA \text{ [Eucl. V, 9].}$$

22. $AKM - \tau\omega\nu$] om. V; corr. p (KA, AE ; corr. Memus). 23.
 $\delta\iota\alpha\ \tau\omega\upsilon\ \lambda\delta'\ \tau\omega\upsilon\ \alpha'\ \tau\omega\upsilon\ \sigma\tau\omicron\iota\chi\epsilon\iota\omega\nu$ mg. m. 1 V. 19. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\acute{\iota}\nu$] c,
- $\acute{\iota}\nu$ in ras. m. 1 V. 25. BZ] c, B eras. V; ZB p.

ἡ NA πρὸς τὴν AA . ἀλλ' ὥς ἡ MK πρὸς τὴν KB ,
 τῆς KA κοινοῦ ὕψους λαμβανομένης οὕτως τὸ ὑπὸ
 MKA πρὸς τὸ ὑπὸ BKA , ὥς δὲ ἡ NA πρὸς AA ,
 τῆς BA κοινοῦ ὕψους λαμβανομένης οὕτως τὸ ὑπὸ
 5 NAB πρὸς τὸ ὑπὸ AAB . καὶ ὥς ἄρα τὸ ὑπὸ MKA
 πρὸς τὸ ὑπὸ BKA , οὕτως τὸ ὑπὸ NAB πρὸς τὸ ὑπὸ
 AAB . καὶ ἐναλλάξ, ὥς τὸ ὑπὸ MKA πρὸς τὸ ὑπὸ
 NAB , οὕτως τὸ ὑπὸ BKA πρὸς τὸ ὑπὸ AAB . καὶ
 ἐστὶν ἴσον τὸ ὑπὸ MKA τῷ ὑπὸ NAB . ἴσον ἄρα
 10 ἐστὶ καὶ τὸ ὑπὸ BKA τῷ ὑπὸ AAB . ἴση ἄρα ἡ AK
 τῇ AB . ἔστι δὲ καὶ ἡ AG τῇ GB ἴση· καὶ ὅλη ἄρα
 ἡ $KΓ$ ὅλη τῇ $ΓA$ ἴση ἐστίν· ὥστε καὶ ἡ $HΞ$ τῇ $ΞΘ$.
 ἡ $HΘ$ ἄρα δίχα τέτμηται ὑπὸ τῆς $ΞΓA$ · καὶ ἐστὶ παρ-
 ἀλληλος τῇ AB · διάμετρος ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ $ΞΓA$ συ-
 15 ξυγῆς τῇ AB .

ὄροι β'.

Τῆς ὑπερβολῆς καὶ τῆς ἐλλείψεως ἐκατέρας ἡ διχο-
 τομία τῆς διαμέτρου κέντρον τῆς τομῆς καλεῖσθαι, ἡ
 δὲ ἀπὸ τοῦ κέντρον πρὸς τὴν τομὴν προσπίπτουσα ἐκ
 20 τοῦ κέντρον τῆς τομῆς.

ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἀντικειμένων ἡ διχοτομία τῆς
 πλαγίας πλευρᾶς κέντρον καλεῖσθαι.

ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ κέντρον ἡγμένη παρὰ τεταγμένως
 κατηγμένην μέσον τε λόγον ἔχουσα τῶν τοῦ εἵδους
 25 πλευρῶν καὶ δίχα τεμνομένη ὑπὸ τοῦ κέντρον δευτέρα
 διάμετρος καλεῖσθαι.

3. NA] cv, NA uel MA V, KA p. 10. ἄρα] ἄρα καὶ cv,
 ἄρα ἐστίν Eutocius. 13. $ΞΓA$] cv, $Γ$ ins. m. 1 V; $AGΞ$ p.
 21. ἀντικειμένων V; corr. cvp. 23. παρὰτεταγμένως V,
 ut uulgo.

uerum $AE:AB = MK:KB$, $ZB:BA = NA:AA$
[Eucl. VI, 4]. itaque etiam

$$MK:KB = NA:AA.$$

est autem communi altitudine sumpta KA

$$MK:KB = MK \times KA : BK \times KA,$$

et communi altitudine BA sumpta

$$NA:AA = NA \times AB : AA \times AB.$$

quare etiam

$$MK \times KA : BK \times KA = NA \times AB : AA \times AB.$$

et permutando

$$MK \times KA : NA \times AB = BK \times KA : AA \times AB$$

[Eucl. V, 16]. et

$$MK \times KA = NA \times AB.$$

quare etiam $BK \times KA = AA \times AB$. itaque $AK = AB$
[u. Eutocius]. uerum etiam $AG = GB$. quare est
 $KG = GA$. quare etiam $H\Xi = \Xi\Theta$ [Eucl. I, 34].
itaque $H\Theta$ a $\Xi\Gamma A$ in duas partes aequales secta est;
et rectae AB parallela est. ergo etiam $\Xi\Gamma A$ dia-
metrus est et cum diametro AB coniugata [def. 6].

Definitiones alterae.

1. Et in hyperbola et in ellipsi punctum medium
diametri centrum sectionis uocetur, recta autem a
centro ad sectionem ducta radius sectionis.

2. et similiter etiam in oppositis punctum medium
lateris transuersi centrum uocetur.

3. recta autem a centro rectae ordinate ductae
parallela ducta, quae et mediam rationem habet laterum
figurae et a centro in duas partes aequales secatur,
diametrus altera uocetur.

ιξ'.

Ἐὰν ἐν κώνου τομῇ ἀπὸ τῆς κορυφῆς τῆς γραμμῆς ἀχθῇ εὐθεΐα παρὰ τεταγμένως κατηγμένην, ἐκτὸς πεσεῖται τῆς τομῆς.

5 ἔστω κώνου τομή, ἥς διάμετρος ἡ AB . λέγω, ὅτι ἡ ἀπὸ τῆς κορυφῆς, τουτέστι τοῦ A σημείου, παρὰ τεταγμένως κατηγμένην ἀγομένη εὐθεΐα ἐκτὸς πεσεῖται τῆς τομῆς.

εἰ γὰρ δυνατόν, πιπτέτω ἐντὸς ὡς ἡ AG . ἐπεὶ οὖν
10 ἐν κώνου τομῇ εἴληπται τυχὸν σημεῖον τὸ Γ , ἡ ἄρα ἀπὸ τοῦ Γ σημείου ἐντὸς τῆς τομῆς ἀγομένη παρὰ τεταγμένως κατηγμένην συμβαλεῖ τῇ AB διαμέτρῳ καὶ δίχα τμηθήσεται ὑπ' αὐτῆς. ἡ AG ἄρα ἐκβαλλομένη δίχα τμηθήσεται ὑπὸ τῆς AB · ὅπερ ἄτοπον· ἐκβαλλο-
15 μένη γὰρ ἡ AG ἐκτὸς πίπτει τῆς τομῆς. οὐκ ἄρα ἡ ἀπὸ τοῦ A σημείου παρὰ τεταγμένως κατηγμένην ἀγομένη εὐθεΐα ἐντὸς πεσεῖται τῆς γραμμῆς· ἐκτὸς ἄρα πεσεῖται· διόπερ ἐφάπτεται τῆς τομῆς.

ιη'.

20 Ἐὰν κώνου τομῇ εὐθεΐα συμπέπτουσα ἐκβαλλομένη ἐφ' ἐκάτερα ἐκτὸς πίπτῃ τῆς τομῆς, ληφθῇ δέ τι σημεῖον ἐντὸς τῆς τομῆς, καὶ δι' αὐτοῦ παράλληλος ἀχθῇ τῇ συμπίπτουσῃ, ἡ ἀχθεῖσα ἐκβαλλομένη ἐφ' ἐκάτερα συμπεσεῖται τῇ τομῇ.


25 ἔστω κώνου τομή καὶ συμπέπτουσα αὐτῇ ἡ AZB εὐθεΐα, καὶ ἐκβαλλομένη ἐφ' ἐκάτερα ἐκτὸς πιπτέτω τῆς τομῆς, καὶ εἰλήφθω τι σημεῖον ἐντὸς τῆς τομῆς τὸ Γ , καὶ διὰ τοῦ Γ τῇ AB παράλληλος ἡχθῶ ἡ GA .

1. ιξ'] p, om. V, m. 2 v. 9. AG] evp, A e corr. m. 1 V.
19. ιη'] p, om. V, m. 2 v.

XVII.

Si in sectione conici a uertice lineae rectae rectae ordinate ductae parallela ducitur, extra sectionem cadet. sit conici sectio, cuius diametrus sit AB . dico, rectam a uertice, hoc est a puncto A , rectae ordinate ductae parallelam ductam extra sectionem cadere.

nam si fieri potest, intra cadat ut $A\Gamma$. iam quoniam in conici sectione sumptum est punctum aliquod



Γ , recta a Γ puncto intra sectionem ducta rectae ordinate ductae parallela cum diametro AB concurret et ab ea in duas partes aequales secabitur [prop. VII]. itaque $A\Gamma$ producta ab AB in duas partes aequales secabitur; quod fieri non potest; producta enim $A\Gamma$ extra sectionem

cadit [prop. X]. itaque recta ab A puncto rectae ordinate ductae parallela ducta intra lineam non cadet. ergo extra cadet; quare sectionem contingit.

XVIII.

Si recta cum conici sectione concurrens in utramque partem producta extra sectionem cadit, et intra sectionem punctum aliquod sumitur, et per hoc rectae concurrenti parallela ducitur recta, recta ita ducta in utramque partem producta cum sectione concurret.

sit conici sectio et cum ea concurrens recta AZB , et in utramque partem producta extra sectionem cadat,

λέγω, ὅτι ἡ $\Gamma\Delta$ ἐκβαλλομένη ἐφ' ἐκότερα συμπεσεῖται τῇ τομῇ.


εἰλήφθω γάρ τι σημεῖον ἐπὶ τῆς τομῆς τὸ E , καὶ ἐπεξεύχθω ἡ EZ . καὶ ἐπεὶ παράλληλός ἐστιν ἡ AB 5 τῇ $\Gamma\Delta$, καὶ τῇ AB συμπίπτει τις εὐθεῖα ἡ EZ , καὶ ἡ $\Gamma\Delta$ ἄρα ἐκβαλλομένη συμπεσεῖται τῇ EZ . καὶ εἰ μὲν μεταξὺ τῶν E, Z , φανερόν, ὅτι καὶ τῇ τομῇ συμπίπτει, ἐὰν δὲ ἐκτὸς τοῦ E σημείου, πρότερον τῇ τομῇ συμπεσεῖται. ἡ ἄρα $\Gamma\Delta$ ἐκβαλλομένη ὥς ἐπὶ τὰ Δ, E 10 μέρη συμπίπτει τῇ τομῇ. ὁμοίως δὲ δείξομεν, ὅτι καὶ ὥς ἐπὶ τὰ Z, B ἐκβαλλομένη συμπίπτει. ἡ $\Gamma\Delta$ ἄρα ἐκβαλλομένη ἐφ' ἐκότερα συμπεσεῖται τῇ τομῇ.

ιθ'.

Ἐν πάσῃ κώνου τομῇ, ἣτις ἂν ἀπὸ τῆς διαμέτρου 15 παρὰ τεταγμένως κατηγμένην ἀχθῇ, συμπεσεῖται τῇ τομῇ.

ἔστω κώνου τομή, ἥς διάμετρος ἡ AB , καὶ εἰλήφθω τι σημεῖον ἐπὶ τῆς διαμέτρου τὸ B , καὶ διὰ τοῦ B 20 παρὰ τεταγμένως κατηγμένην ἄχθω ἡ $B\Gamma$. λέγω, ὅτι ἡ $B\Gamma$ ἐκβαλλομένη συμπεσεῖται τῇ τομῇ.


εἰλήφθω γάρ τι σημεῖον ἐπὶ τῆς τομῆς τὸ Δ . ἔστι δὲ καὶ τὸ A ἐπὶ 25 τῆς τομῆς. ἡ ἄρα ἀπὸ τοῦ A ἐπὶ τὸ Δ ἐπιζευγνυμένη εὐθεῖα ἐντὸς πεσεῖται τῆς τομῆς. καὶ ἐπεὶ ἡ ἀπὸ τοῦ A παρὰ τεταγμένως κατηγμένην ἀγομένη εὐθεῖα ἐκτὸς πίπτει τῆς τομῆς, καὶ



11. ἐμπίπτει V; corr. p. 13. ιθ' p, om. V, m. 2 v.

et intra sectionem punctum aliquod Γ sumatur, et per Γ rectae AB parallela ducatur ΓA . dico, ΓA in utramque partem productam cum sectione concurrere.

sumatur enim in sectione punctum aliquod E , et ducatur EZ . et quoniam AB rectae ΓA parallela



est, et cum AB recta EZ concurrat, etiam ΓA producta cum EZ concurrat. et siue inter E, Z concurrat, manifestum est, eam etiam cum sectione concurrere, siue extra punctum E , prius cum sectione concurrat. itaque ΓA ad partes A, E uersus producta cum sectione concurrat. similiter demonstrabimus, eam etiam ad Z, B uersus productam concurrere. ergo ΓA in utramque partem producta cum sectione concurrat.

XIX.

In qualibet conici sectione recta, quaecunque a diametro rectae ordinate ductae parallela ducitur, cum sectione concurrat.

sit conici sectio, cuius diameter sit AB , et in diametro punctum aliquod B sumatur, et per B rectae ordinate ductae parallela ducatur $B\Gamma$. dico, $B\Gamma$ productam cum sectione concurrere.

sumatur enim in sectione punctum aliquod A ; uerum etiam A in sectione est; itaque recta ab A ad A ducta intra sectionem cadet [prop. X]. et quoniam

In figura priore litteras A, B permutavi, altera in prop. 19 hab. V, sed numerus 18 (e corr.) additus ei est.

συμπίπτει αὐτῇ ἢ AA , καὶ ἐστὶ τῇ κατηγμένη παρ-
 ἄλληλος ἢ $BΓ$, καὶ ἢ $BΓ$ ἄρα συμπεσεῖται τῇ AA . καὶ
 εἰ μὲν μεταξὺ τῶν A, A σημείων, φανερόν, ὅτι καὶ
 τῇ τομῇ συμπεσεῖται, εἰ δὲ ἐκτὸς τοῦ A ὡς κατὰ τὸ E ,
 5 πρότερον τῇ τομῇ συμπεσεῖται. ἢ ἄρα ἀπὸ τοῦ B παρὰ
 τεταγμένως κατηγμένην ἀγομένη εὐθεῖα συμπεσεῖται τῇ
 τομῇ.

κ'.

Ἐὰν ἐν παραβολῇ ἀπὸ τῆς τομῆς καταχθῶσι δύο
 εὐθεῖαι ἐπὶ τὴν διάμετρον τεταγμένως, ἔσται ὡς τὰ
 10 ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα πρὸς ἄλληλα, οὕτως αἱ ἀπο-
 τεμνόμεναι ὑπ' αὐτῶν ἀπὸ τῆς διαμέτρου πρὸς τῇ
 κορυφῇ τῆς τομῆς.

ἔστω παραβολή, ἥς διάμετρος ἢ AB , καὶ εἰλήφθω
 τινὰ σημεία ἐπ' αὐτῆς τὰ $Γ, Δ$, καὶ ἀπὸ τῶν $Γ, Δ$
 15 τεταγμένως κατήχθωσαν ἐπὶ τὴν AB αἱ $ΓΕ, ΔΖ$.
 λέγω, ὅτι ἐστὶν, ὡς τὸ ἀπὸ $ΔΖ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΓΕ$,
 οὕτως ἢ $ΖΑ$ πρὸς $ΑΕ$.

ἔστω γὰρ παρ' ἣν δύνανται αἱ καταγόμεναι ἢ AH .
 ἴσον ἄρα ἐστὶ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς $ΔΖ$ τῷ ὑπὸ $ΖΑΗ$,
 20 τὸ δὲ ἀπὸ τῆς $ΓΕ$ τῷ ὑπὸ τῶν $ΕΑΗ$. ἔστιν ἄρα,
 ὡς τὸ ἀπὸ $ΔΖ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΓΕ$, οὕτως τὸ ὑπὸ $ΖΑΗ$
 πρὸς τὸ ὑπὸ $ΕΑΗ$. ὡς δὲ τὸ ὑπὸ $ΖΑΗ$ πρὸς τὸ ὑπὸ
 $ΕΑΗ$, οὕτως ἢ $ΖΑ$ πρὸς $ΑΕ$ καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ $ΔΖ$
 πρὸς τὸ ἀπὸ $ΓΕ$, οὕτως ἢ $ΖΑ$ πρὸς $ΑΕ$.

25

κα'.


Ἐὰν ἐν ὑπερβολῇ ἢ ἐλλείψει ἢ κύκλου περιφερείᾳ
 εὐθεῖαι ἀχθῶσι τεταγμένως ἐπὶ τὴν διάμετρον, ἔσται

7. κ'] p, om. V, m. 2 v. 25. κα'] p, om. V, m. 2 v. 26.
 ἡ] (alt.) ἢ V; corr. p. περιφέρεια V; corr. p.

recta ab A rectae ordinate ductae parallela ducta extra sectionem cadit [prop XVII], et cum illa concurrat AA , et $B\Gamma$ rectae ordinate ductae parallela est, etiam $B\Gamma$ cum AA concurret. et siue inter puncta A , Δ concurrat, manifestum est, eam etiam cum sectione concurrere, siue extra Δ concurrat ut in E , prius cum sectione concurret. ergo recta a B rectae ordinate ductae parallela ducta cum sectione concurret.

XX.

Si in parabola a sectione duae rectae ad diametrum ordinate ducuntur, erunt, ut quadrata earum inter se, ita rectae ab iis e diametro ad uerticem sectionis abscisae.



sit parabola, cuius diametrus sit AB , et in ea puncta aliqua sumantur Γ , Δ , et a Γ , Δ ad AB ordinate ducantur ΓE , ΔZ . dico, esse

$$\Delta Z^2 : \Gamma E^2 = ZA : AE.$$

sit enim parametrum AH . est igitur [prop. XI] $\Delta Z^2 = ZA \times AH$, $\Gamma E^2 = EA \times AH$. quare

$$\Delta Z^2 : \Gamma E^2 = ZA \times AH : EA \times AH.$$

est autem

$$ZA \times AH : EA \times AH = ZA : AE.$$

ergo etiam $\Delta Z^2 : \Gamma E^2 = ZA : AE$.

XXI.

Si in hyperbola uel ellipsi uel ambitu circuli rectae ad diametrum ordinate ducuntur, quadrata earum ad spatia comprehensa rectis ab iis ad terminos lateris


τὰ ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα πρὸς μὲν τὰ περιεχόμενα
χωρία ὑπὸ τῶν ἀπολαμβανομένων ὑπ' αὐτῶν πρὸς τοῖς
πέρασιν τῆς πλαγίας πλευρᾶς τοῦ εἶδους ὡς τοῦ εἶδους
ἢ ὀρθία πλευρὰ πρὸς τὴν πλαγίαν, πρὸς ἄλληλα δέ,
5 ὡς τὰ περιεχόμενα χωρία ὑπὸ τῶν, ὡς εἴρηται, ἀπο-
λαμβανομένων εὐθειῶν.

ἔστω ὑπερβολὴ ἢ ἔλλειψις ἢ κύκλου περιφέρεια, ἣς
διάμετρος μὲν ἡ AB , παρ' ἣν δὲ δύνανται αἱ κατ-
αγόμεναι ἡ AG , καὶ κατήχθωσαν ἐπὶ τὴν διάμετρον
10 τεταγμένως αἱ AE , ZH . λέγω, ὅτι ἐστίν, ὡς μὲν τὸ
ἀπὸ τῆς ZH πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν AHB , οὕτως ἡ AG
πρὸς AB , ὡς δὲ τὸ ἀπὸ τῆς ZH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς AE ,
οὕτω τὸ ὑπὸ τῶν AHB πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν AEB .

ἐπεξεύχθω γὰρ ἡ $BΓ$ διορίζουσα τὸ εἶδος, καὶ διὰ
15 τῶν E , H τῇ AG παράλληλοι ἡχθωσαν αἱ $EΘ$, HK .
ἴσον ἄρα ἐστὶ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ZH τῷ ὑπὸ KHA , τὸ
δὲ ἀπὸ τῆς AE τῷ ὑπὸ $ΘEA$. καὶ ἐπεὶ ἐστίν, ὡς
ἡ KH πρὸς HB , οὕτως ἡ $ΓA$ πρὸς AB , ὡς δὲ ἡ KH
πρὸς HB , τῆς AH κοινοῦ ὕψους λαμβανομένης οὕτως
20 τὸ ὑπὸ KHA πρὸς τὸ ὑπὸ BHA , ὡς ἄρα ἡ $ΓA$
πρὸς AB , οὕτως τὸ ὑπὸ KHA , τουτέστι τὸ ἀπὸ ZH ,
πρὸς τὸ ὑπὸ BHA . διὰ τὰ αὐτὰ δὴ ἐστὶ καὶ, ὡς τὸ
ἀπὸ AE πρὸς τὸ ὑπὸ BEA , οὕτως ἡ $ΓA$ πρὸς AB .
καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ZH πρὸς τὸ ὑπὸ BHA , οὕτως
25 τὸ ἀπὸ AE πρὸς τὸ ὑπὸ BEA . ἐναλλάξ, ὡς τὸ ἀπὸ
 ZH πρὸς τὸ ἀπὸ AE , οὕτως τὸ ὑπὸ BHA πρὸς τὸ
ὑπὸ BEA .

2. ἀπολαμβανομένων V; corr. p. 7. ἦ] ἡ V; corr. p. ἦ]
ἡ V; corr. p. 10. μὲν] cp, supra ser. m. 1 V. 14. BΓ]
HBΓ V; corr. p. 16. KHA] KAH V; corr. Memus. 22.
τά] om. V; corr. p. 23. ἦ] p, om. V in extr. lin. 24. πρὸς]
π in ras. m. 1 V. 27. BEA] BE, EA V; corr. Memus.

transuersi figurae abscisis rationem habent, quam latus rectum figurae ad transuersum, inter se autem, quam spatia comprehensa rectis, uti diximus, abscisis.



sit hyperbola uel ellipsis uel ambitus circuli, cuius diametrus sit AB , parametrum autem $A\Gamma$, et ad diametrum ordinate ducantur ΔE , ZH . dico, esse

$$ZH^2 : AH \times HB = A\Gamma : AB,$$

$$ZH^2 : \Delta E^2 = AH \times HB : AE \times EB.$$

ducatur enim $B\Gamma$ diagonalis figurae, et per E , H rectae $A\Gamma$ parallelae ducantur $E\Theta$, HK . est igitur [prop. XII—XIII; de circulo u. Eutocius]

$ZH^2 = KH \times HA$, $\Delta E^2 = \Theta E \times EA$. et quoniam est $KH : HB = \Gamma A : AB$ [Eucl. VI, 4], et AH communi altitudine sumpta

$$KH : HB = KH \times HA : BH \times HA,$$

erit

$$\Gamma A : AB = KH \times HA : BH \times HA = ZH^2 : BH \times HA.$$

iam eodem modo erit $\Delta E^2 : BE \times EA = \Gamma A : AB$.

quare etiam $ZH^2 : BH \times HA = \Delta E^2 : BE \times EA$.

et permutando [Eucl. V, 16]

$$ZH^2 : \Delta E^2 = BH \times HA : BE \times EA.$$

κβ'.

Ἐὰν παραβολὴν ἢ ὑπερβολὴν εὐθεΐα τέμνη κατα
 δύο σημεία μὴ συμπίπτουσα τῇ διαμέτρῳ ἐντός, ἐκ-
 βαλλομένη συμπεσεῖται τῇ διαμέτρῳ τῆς τομῆς ἐκτός
 5 τῆς τομῆς.

ἔστω παραβολὴ ἢ ὑπερβολή, ἥς διάμετρος ἡ AB ,
 καὶ τεμνέτω τις εὐθεΐα τὴν τομὴν κατὰ δύο σημεία
 τὰ Γ , Δ . λέγω, ὅτι ἡ $\Gamma\Delta$ ἐκβαλλομένη συμπεσεῖται
 ἐκτός τῆς τομῆς τῇ AB .

10 κατήχθωσαν ἀπὸ τῶν Γ , Δ τεταγμένως αἱ ΓE , ΔB .
 ἔστω δὲ προῶτον ἡ τομὴ παραβολῆς. ἐπεὶ οὖν ἐν τῇ
 παραβολῇ ἔστιν, ὥς τὸ ἀπὸ τῆς ΓE πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς
 ΔB , οὕτως ἡ EA πρὸς AB , μείζων δὲ ἡ AE τῆς AB ,
 μείζον ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΓE τοῦ ἀπὸ τῆς ΔB .
 15 ὥστε καὶ ἡ ΓE τῆς ΔB μείζων ἐστί. καὶ εἰσι παρ-
 ἀλληλοι· ἡ $\Gamma\Delta$ ἄρα ἐκβαλλομένη συμπεσεῖται τῇ AB
 διαμέτρῳ ἐκτός τῆς τομῆς.

ἀλλὰ δὴ ἔστω ὑπερβολή. ἐπεὶ οὖν ἐν τῇ ὑπερ-
 βολεῇ ἔστιν, ὥς τὸ ἀπὸ τῆς ΓE πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $B\Delta$,
 20 οὕτως τὸ ὑπὸ ZEA πρὸς τὸ ὑπὸ ZBA , μείζον ἄρα
 καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΓE τοῦ ἀπὸ τῆς ΔB . καὶ εἰσι παρ-
 ἀλληλοι· ἡ $\Gamma\Delta$ ἄρα ἐκβαλλομένη συμπεσεῖται τῇ δια-
 μέτρῳ τῆς τομῆς ἐκτός τῆς τομῆς.

κγ'.


25 Ἐὰν ἑλλειψιν εὐθεΐα τέμνη μεταξὺ κειμένη τῶν
 δύο διαμέτρων, ἐκβαλλομένη συμπεσεῖται ἑκατέρῃ τῶν
 διαμέτρων ἐκτός τῆς τομῆς.

1. κβ'] p, om. V, m. 2 v. 13. ΔE] AB V; EA p (Δ e
 corr.). 15. ΔB] AB V; corr. p. 16. ἄρα] p, om. V. 18.
 Mg. m. 1 Δ ι.... V. 24. κγ'] p, om. V, m. 2 v.

XXII.

Si recta cum diametro non concurrens intra sectionem parabolam uel hyperbolam in duobus punctis secat, producta cum diametro sectionis extra sectionem concurret.

sit parabola uel hyperbola, cuius diameter sit AB , et recta aliqua sectionem secet in duobus punctis



Γ , Δ . dico, rectam $\Gamma\Delta$ productam cum diametro AB extra sectionem concurrere.

a Γ , Δ enim ordinate ducantur ΓE , ΔB ; prius autem sectio sit parabola. iam quoniam in parabola est $\Gamma E^2 : \Delta B^2 = EA : AB$ [prop. XX], et $AE > AB$, erit etiam $\Gamma E^2 > \Delta B^2$. quare etiam $\Gamma E > \Delta B$. et sunt parallelae; itaque $\Gamma\Delta$ producta cum diametro AB extra sectionem concurret.

iam uero sit hyperbola. quoniam igitur in hyperbola est $\Gamma E^2 : B\Delta^2 = ZE \times EA : ZB \times BA$ [prop. XXI], erit etiam $\Gamma E^2 > \Delta B^2$. et sunt parallelae; itaque $\Gamma\Delta$ producta cum diametro sectionis extra sectionem concurret.

XXIII.

Si recta ellipsim secat inter ambas diametros posita, producta cum utraque diametro extra sectionem concurret.

ἔστω ἔλλειψις, ἥς διάμετροι αἱ AB , ΓA , καὶ τεμνέτω
τις εὐθεΐα τὴν τομὴν ἢ EZ μεταξὺ κειμένη τῶν AB , ΓA
διαμέτρων. λέγω, ὅτι ἡ EZ ἐκβαλλομένη συμπεσεῖται
ἐκατέρω τῶν AB , ΓA ἐκτὸς τῆς τομῆς.

5 κατήχθωσαν γὰρ ἀπὸ τῶν E , Z τεταγμένως ἐπὶ
μὲν τὴν AB αἱ HE , $Z\Theta$, ἐπὶ δὲ τὴν $\Delta\Gamma$ αἱ EK , ZA .
ἔστιν ἄρα, ὥς μὲν τὸ ἀπὸ τῆς EH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς
 $Z\Theta$, οὕτως τὸ ὑπὸ BHA πρὸς τὸ ὑπὸ $B\Theta A$, ὥς δὲ
τὸ ἀπὸ ZA πρὸς τὸ ἀπὸ EK , οὕτως τὸ ὑπὸ $\Delta A\Gamma$
10 πρὸς τὸ ὑπὸ $\Delta K\Gamma$. καὶ ἐστὶ τὸ μὲν ὑπὸ BHA μείζον
τοῦ ὑπὸ $B\Theta A$. ἔργιον γὰρ τὸ H τῆς διχοτομίας· τὸ
δὲ ὑπὸ $\Delta A\Gamma$ τοῦ ὑπὸ $\Delta K\Gamma$ μείζον· μείζον ἄρα καὶ
τὸ μὲν ἀπὸ τῆς HE τοῦ ἀπὸ $Z\Theta$, τὸ δὲ ἀπὸ ZA τοῦ
ἀπὸ EK . μείζων ἄρα καὶ ἡ μὲν HE τῆς $Z\Theta$, ἡ δὲ
15 ZA τῆς EK . καὶ ἐστὶ παράλληλος ἡ μὲν HE τῇ $Z\Theta$,
ἡ δὲ ZA τῇ EK . ἡ EZ ἄρα ἐκβαλλομένη συμπεσεῖται
ἐκατέρω τῶν AB , ΓA διαμέτρων ἐκτὸς τῆς τομῆς.

κδ'.


Ἐὰν παραβολῇ ἢ ὑπερβολῇ εὐθεΐα καθ' ἓν σημεῖον
20 συμπίπτουσα ἐκβαλλομένη ἐφ' ἐκάτερα ἐκτὸς πίπτῃ τῆς
τομῆς, συμπεσεῖται τῇ διαμέτρῳ.

ἔστω παραβολῇ ἢ ὑπερβολῇ, ἥς διάμετρος ἡ AB ,
καὶ συμπίπτει αὐτῇ εὐθεΐα ἢ $\Gamma A E$ κατὰ τὸ A καὶ
ἐκβαλλομένη ἐφ' ἐκάτερα ἐκτὸς πίπτει τῆς τομῆς.
25 λέγω, ὅτι συμπεσεῖται τῇ AB διαμέτρῳ.

εἰλήφθω γὰρ τι σημεῖον ἐπὶ τῆς τομῆς τὸ Z , καὶ

1. αἱ] p, om. V. 6. διὰ κα' τούτου τοῦ βιβλίου mg.
m. 1 V. 6. ZA] ZN V; corr. p. 10. ἐστὶ] c, ἐστὶν V.
11. διὰ τὸ ε' τοῦ β' στοιχ. mg. m. 1 V. 18. κδ'] p, om. V,
m. 2 v.

sit ellipsis, cuius diametri sint AB , ΓA , et recta EZ inter diametros AB , ΓA posita sectionem secet. dico, rectam EZ productam cum utraque diametro AB , ΓA extra sectionem concurrere.



ducantur enim ab E , Z ad AB ordinate HE , $ZΘ$, ad ΓA autem EK , ZA . erit igitur [prop. XXI]

$$EH^2 : ZΘ^2 = BH \times HA : BΘ \times ΘA,$$

$$ZA^2 : EK^2 = \Gamma A \times \Gamma A : \Gamma K \times K\Gamma.$$


est autem $BH \times HA > BΘ \times ΘA$; H enim puncto medio propius est [Eucl. II, 5]; et

$$\Gamma A \times \Gamma A > \Gamma K \times K\Gamma \text{ [ib.]}$$

quare etiam $HE^2 > ZΘ^2$, $ZA^2 > EK^2$. itaque etiam $HE > ZΘ$, $ZA > EK$. et HE rectae $ZΘ$, ZA rectae EK parallela est. ergo EZ producta cum utraque diametro AB , ΓA extra sectionem concurrent.

XXIV.

Si recta cum parabola uel hyperbola in uno puncto concurrens in utramque partem producta extra sectionem cadit, cum diametro concurrent.



sit parabola uel hyperbola, cuius diametrus sit AB , et recta ΓAE cum ea in A concurrat, et in utramque partem producta extra sectionem cadat.

dico, eam cum diametro AB concurrere.

sumatur enim in sectione punctum aliquod Z , et

ἐπεξεύχθω ἡ $\angle Z$. ἡ $\angle Z$ ἄρα ἐκβαλλομένη συμπεσεῖται
τῇ διαμέτρῳ τῆς τομῆς. συμπιπτεῖται κατὰ τὸ A . καὶ
ἐστὶ μεταξὺ τῆς τε τομῆς καὶ τῆς $Z\Delta A$ ἢ $\Gamma\Delta E$. καὶ
ἡ $\Gamma\Delta E$ ἄρα ἐκβαλλομένη συμπεσεῖται τῇ διαμέτρῳ
ἐκτὸς τῆς τομῆς.

κε'.

Ἐὰν ἐλλείψει εὐθεῖα συμπύκνουσα μεταξὺ τῶν δύο
διαμέτρων ἐκβαλλομένη ἐφ' ἐκάτερα ἐκτὸς πίπτῃ τῆς
τομῆς, συμπεσεῖται ἐκατέρῃ τῶν διαμέτρων.

10 ἔστω ἔλλειψις, ἣς διάμετροι αἱ $AB, \Gamma\Delta$, καὶ ταύτῃ
συμπιπτεῖται τις εὐθεῖα μεταξὺ τῶν δύο διαμέτρων ἡ
 EZ κατὰ τὸ H καὶ ἐκβαλλομένη ἐφ' ἐκάτερα ἐκτὸς
πιπτεῖται τῆς τομῆς. λέγω, ὅτι ἡ EZ συμπεσεῖται ἐκατέρῃ
τῶν $AB, \Gamma\Delta$.

15 κατήχθωσαν ἀπὸ τοῦ H ἐπὶ τὰς $AB, \Gamma\Delta$ τεταγμένως
αἱ $H\Theta, HK$. ἐπεὶ παράλληλός ἐστιν ἡ HK τῇ AB ,
συμπέπτωκε δὲ τις τῇ HK ἢ HZ , καὶ τῇ AB ἄρα
συμπεσεῖται. ὁμοίως δὲ καὶ τῇ $\Gamma\Delta$ συμπεσεῖται ἡ EZ .

κς'.

20 Ἐὰν ἐν παραβολῇ ἢ ὑπερβολῇ εὐθεῖα ἀχθῇ παρὰ
τὴν διάμετρον τῆς τομῆς, συμπεσεῖται τῇ τομῇ καθ'
ἐν μόνον σημείον.

ἔστω πρότερον παραβολή, ἣς διάμετρος ἡ $AB\Gamma$,
ὁρθία δὲ ἡ $A\Delta$, καὶ τῇ AB παράλληλος ἡχθῶ ἡ
25 EZ . λέγω, ὅτι ἡ EZ ἐκβαλλομένη συμπεσεῖται τῇ
τομῇ.


2. τῆς] ἐκτὸς τῆς Halley. 5. τῆς] om. in extr. lin. V,
corr. v p. 6. κς'] p, om. V, m. 2 v. 16. HK] (pr.) p,
corr. ex ΘK m. 1 V. 18. ἡ] p, om. V. 19. κς'] p, om. V,
m. 2 v. 20. ἐν] addidi; om. V. 23. ἡ] p, om. V.

ducatur ΔZ . ΔZ igitur producta cum diametro sectionis concurret [prop. XXII]. concurrat in A . et $\Gamma \Delta E$ inter sectionem et rectam $Z \Delta A$ posita est. ergo etiam $\Gamma \Delta E$ producta cum diametro extra sectionem concurret.

XXV.

Si recta cum ellipsi inter ambas diametros concurrens in utramque partem producta extra sectionem cadit, cum utraque diametro concurret.

sit ellipsis, cuius diametri sint AB , $\Gamma \Delta$, et cum ea recta EZ inter ambas diametros concurret in H



et in utramque partem producta extra sectionem cadat. dico, EZ cum utraque diametro AB , $\Gamma \Delta$ concurrere.

ab H ad AB , $\Gamma \Delta$ ordinate ducantur $H\Theta$, HK . quoniam HK rectae AB parallela est, et recta aliqua HZ cum HK concurrat, etiam cum AB concurret. et eadem de causa etiam EZ cum $\Gamma \Delta$ concurret.

XXVI.

Si in parabola uel hyperbola recta diametro sectionis parallela ducitur, cum sectione in uno puncto solo concurret.


sit prius parabola, cuius diametrus sit $AB\Gamma$, latus autem rectum $\Delta \Delta$, et rectae AB parallela ducatur EZ . dico, EZ productam cum sectione concurrere.

εἰλήφθω γάρ τι σημεῖον ἐπὶ τῆς EZ τὸ E , καὶ ἀπὸ τοῦ E παρὰ τεταγμένως κατηγμένην ἤχθω ἡ EH , καὶ τοῦ ἀπὸ τῆς HE μείζον ἔστω τὸ ὑπὸ $\angle A\Gamma$, καὶ ἀπὸ τοῦ Γ τεταγμένως ἀνήχθω ἡ $\Gamma\Theta$. τὸ ἄρα
 5 ἀπὸ τῆς $\Theta\Gamma$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν $\angle A\Gamma$. μείζον δὲ τὸ ὑπὸ $\angle A\Gamma$ τοῦ ἀπὸ EH . μείζον ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ $\Theta\Gamma$ τοῦ ἀπὸ EH . μείζων ἄρα καὶ ἡ $\Theta\Gamma$ τῆς EH . καὶ εἰσι παράλληλοι· ἡ EZ ἄρα ἐκβαλλομένη τέμνει τὴν $\Theta\Gamma$. ὥστε καὶ τῇ τομῇ συμπεσεῖται.

10 συμπιπτέτω κατὰ τὸ K .

λέγω δὴ, ὅτι καὶ καθ' ἓν μόνον σημεῖον τὸ K συμπεσεῖται. εἰ γὰρ δυνατόν, συμπιπτέτω καὶ κατὰ τὸ Λ . ἐπεὶ οὖν παραβολὴν εὐθεῖα τέμνει κατὰ δύο σημεῖα, ἐκβαλλομένη συμπεσεῖται τῇ διαμέτρῳ τῆς
 15 τομῆς· ὅπερ ἄτοπον· ὑπόκειται γὰρ παράλληλος. ἡ EZ ἄρα ἐκβαλλομένη καθ' ἓν μόνον σημεῖον συμπέπτει τῇ τομῇ.

ἔστω δὴ ἡ τομὴ ὑπερβολή, πλαγία δὲ τοῦ εἶδους πλευρὰ ἡ AB , ὁρθία δὲ ἡ AA , καὶ ἐπεξεύχθω ἡ AB
 20 καὶ ἐκβεβλήσθω. τῶν αὐτῶν δὴ κατασκευασθέντων ἤχθω ἀπὸ τοῦ Γ τῇ AA παράλληλος ἡ ΓM . ἐπεὶ οὖν τὸ ὑπὸ $M\Gamma A$ μείζον ἐστὶ τοῦ ὑπὸ $\angle A\Gamma$, καὶ
 25 ἐστὶ τῷ μὲν ὑπὸ $M\Gamma A$ ἴσον τὸ ἀπὸ $\Gamma\Theta$, τὸ δὲ ὑπὸ $\angle A\Gamma$ μείζον τοῦ ἀπὸ HE , μείζον ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ $\Gamma\Theta$ τοῦ ἀπὸ EH . ὥστε καὶ ἡ $\Gamma\Theta$ τῆς EH μείζων ἐστί, καὶ τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον συμβήσεται.



4. τοῦ] insertum m. 1 V. 10. K] Γ V; corr. p. 18. τοῦ εἶδους] cvp, ob pergam. ruptum incerta in V.

κξ'.

Ἐὰν παραβολῆς τὴν διάμετρον εὐθεῖα τέμνη, ἐκβαλλομένη ἐφ' ἑκάτερα συμπεσεῖται τῇ τομῇ.

ἔστω παραβολή, ἥς διάμετρος ἡ AB , καὶ ταύτην
 5 τεμνέτω τις εὐθεῖα ἐντὸς τῆς τομῆς ἡ $\Gamma\Delta$. λέγω,
 ὅτι ἡ $\Gamma\Delta$ ἐκβαλλομένη ἐφ' ἑκάτερα τὰ μέρη συμπεσεῖται
 τῇ τομῇ.

ἤχθω γὰρ τις ἀπὸ τοῦ A παρὰ τεταγμένως κατηγ-
 μένην ἡ AE . ἡ AE ἄρα ἐκτὸς πεσεῖται τῆς τομῆς.

10 ἦτοι δὴ ἡ $\Gamma\Delta$ τῇ AE παράλληλός ἐστιν ἢ οὐ.

εἰ μὲν οὖν παράλληλός ἐστιν αὐτῇ, τεταγμένως
 κατῆκται, ὥστε ἐκβαλλομένη ἐφ' ἑκάτερα συμπεσεῖται
 τῇ τομῇ.

μὴ ἐστω δὴ παράλληλος τῇ AE , ἀλλ' ἐκβαλλομένη
 15 συμπίπτει τῇ AE κατὰ τὸ E . ὅτι μὲν οὖν τῇ τομῇ
 συμπίπτει ἐπὶ τὰ μέρη, ἐφ' ἃ ἐστὶ τὸ E , φανερόν· εἰ
 γὰρ τῇ AE συμβάλλει, πολὺ πρότερον τέμνει τὴν τομήν.

λέγω, ὅτι καὶ ἐπὶ τὰ ἕτερα μέρη ἐκβαλλομένη
 συμπίπτει τῇ τομῇ. ἔστω γὰρ παρ' ἣν δύνανται ἡ
 20 MA καὶ τεταγμένως ἡ HZ , καὶ τὸ ἀπὸ $A\Delta$ ἴσον
 ἔστω τῷ ὑπὸ BAZ , καὶ παρατεταγμένως ἡ BK συμ-
 πιπτέτω τῇ $\Delta\Gamma$ κατὰ τὸ Γ . ἐπεὶ ἴσον ἐστὶ τὸ ὑπὸ
 ZAB τῷ ἀπὸ $A\Delta$, ἐστὶν ὥς ἡ AB πρὸς $A\Delta$, ἡ ΔA
 πρὸς AZ . καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ $B\Delta$ πρὸς λοιπὴν τὴν
 25 ΔZ ἐστὶν, ὥς ἡ BA πρὸς $A\Delta$. καὶ ὥς ἄρα τὸ ἀπὸ
 $B\Delta$ πρὸς τὸ ἀπὸ $Z\Delta$, οὕτως τὸ ἀπὸ BA πρὸς τὸ
 ἀπὸ $A\Delta$. ἐπειδὴ δὲ ἴσον τὸ ἀπὸ $A\Delta$ τῷ ὑπὸ BAZ ,

1. κξ'] p, om. V, m. 2 v. 21. BAZ] BZA V; corr. p (τῶν BA, AZ). BK] scripsi cum Memo; ΓK V; $B\Gamma$ p; ΓB Halley, sed in fig. K habet cum V. 23. διὰ ιξ' τοῦ ε' στοιχ. mg. m. 1 V.


XXVII.

Si recta diametrum parabolae secat, in utramque partem producta cum sectione concurret.

sit parabola, cuius diametrus sit AB , et hanc recta aliqua ΓA intra sectionem secet. dico, ΓA in utramque partem productam cum sectione concurrere.

ducatur enim ab A rectae ordinate ductae parallela AE ; AE igitur extra sectionem cadet [prop. XVII]. ΓA igitur rectae AE aut parallela est aut non parallela.

si igitur ei parallela est, ordinate ducta est; quare in utramque partem producta cum sectione concurret [prop. XIX]. ne sit igitur rectae AE parallela, et producta cum AE in E concurrat. iam igitur eam ad partes E uersus cum sectione concurrere, manifestum est; nam si cum AE concurrat, multo prius sectionem secat.



dico, eam etiam ad alteram partem productam cum sectione concurrere. sit enim MA parametris et HZ ordinate ducta, et sit $A\Delta^2 = BA \times AZ$, et BK rectae ordinate ductae parallela concurrat cum $\Delta\Gamma$ in Γ . quoniam $ZA \times AB = A\Delta^2$, erit $AB : A\Delta = \Delta A : AZ$ [Eucl. VI, 17]. quare etiam $B\Delta : \Delta Z = BA : A\Delta$ [Eucl. V, 19]. quare etiam

$$B\Delta^2 : Z\Delta^2 = BA^2 : A\Delta^2.$$

24. διὰ τοῦ ε' στοιχ. mg. m. 1 V. 25. διὰ τοῦ ζ' στοιχ. mg. m. 1 V. 27. διὰ τοῦ ιθ' τοῦ ε' στοιχ. mg. m. 1 V.

ἔστιν ὥς ἡ BA πρὸς AZ , οὕτως τὸ ἀπὸ BA πρὸς
τὸ ἀπὸ AA , τουτέστι τὸ ἀπὸ BA πρὸς τὸ ἀπὸ AZ .
ὥς δὲ τὸ ἀπὸ BA πρὸς τὸ ἀπὸ AZ , οὕτως τὸ ἀπὸ
 $BΓ$ πρὸς τὸ ἀπὸ ZH , ὥς δὲ ἡ AB πρὸς AZ , οὕτως
5 το ὑπὸ BAM πρὸς τὸ ὑπὸ ZAM . ὥς ἄρα τὸ ἀπὸ $BΓ$
πρὸς τὸ ἀπὸ ZH , οὕτως τὸ ὑπὸ BAM πρὸς τὸ ὑπὸ
 ZAM · καὶ ἐναλλάξ, ὥς τὸ ἀπὸ $BΓ$ πρὸς τὸ ὑπὸ BAM ,
οὕτως τὸ ἀπὸ ZH πρὸς τὸ ὑπὸ ZAM . τὸ δὲ ἀπὸ ZH
ἴσον τῷ ὑπὸ ZAM διὰ τὴν τομὴν· καὶ τὸ ἀπὸ $BΓ$ ἄρα
10 ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ BAM . πλαγία δὲ ἡ AM , παρα-
τεταγμένως δὲ ἡ $BΓ$. ἡ ἄρα τομὴ ἔρχεται διὰ τοῦ $Γ$,
καὶ συμπιπτει τῇ τομῇ ἡ $ΓA$ κατὰ τὸ $Γ$.

κη'.

Ἐὰν εὐθεῖα ἐφάπτεται μιᾷς τῶν ἀντικειμένων,
15 ληφθῇ δέ τι σημεῖον ἐντὸς τῆς ἐτέρας τομῆς, καὶ δι'
αὐτοῦ παράλληλος ἀχθῇ τῇ ἐφαπτομένῃ εὐθεῖα, ἐκ-
βαλλομένη ἐφ' ἐκάτερα συμπεσεῖται τῇ τομῇ.

ἔστωσαν ἀντικείμεναι, ὧν ἡ AB διάμετρος, καὶ τῆς
 A τομῆς ἐφαπτέσθω τις εὐθεῖα ἡ $ΓA$, καὶ εἰλήφθω
20 τι σημεῖον ἐντὸς τῆς ἐτέρας τομῆς τὸ E , καὶ διὰ τοῦ
 E τῇ $ΓA$ παράλληλος ἡχθῶ ἡ EZ . λέγω, ὅτι ἡ EZ
ἐκβαλλομένη ἐφ' ἐκάτερα συμπεσεῖται τῇ τομῇ.

ἐπεὶ οὖν δέδεικται, ὅτι ἡ $ΓA$ ἐκβαλλομένη συμ-
πεσεῖται τῇ AB διαμέτρῳ, καὶ ἐστὶ παράλληλος αὐτῇ
25 ἡ EZ , ἡ EZ ἄρα ἐκβαλλομένη συμπεσεῖται τῇ διαμέ-
τρῳ· συμπιπτέτω κατὰ τὸ H , καὶ τῇ HB ἴση κείσθω
ἡ $AΘ$, καὶ διὰ τοῦ $Θ$ τῇ ZE παράλληλος ἡχθῶ ἡ

1. AZ] sic V, sed pro Z alia forma eiusdem litterae re-
stitutata manu 1. 2. τουτέστι — AZ] bis V; corr. cp. 3. Mg.
[διὰ δ'] τοῦ ε' m. 1 V. 5. BAM] ABM V; corr. Memus.

quoniam autem est $AA^2 = BA \times AZ$, erit

$$BA : AZ = BA^2 : AA^2 \text{ [Eucl. V def. 9],}$$

hoc est $BA : AZ = BA^2 : AZ^2$. est autem

$$BA^2 : AZ^2 = B\Gamma^2 : ZH^2 \text{ [Eucl. VI, 4],}$$

et $AB : AZ = BA \times AM : ZA \times AM$. itaque

$$B\Gamma^2 : ZH^2 = BA \times AM : ZA \times AM.$$

et permutando [Eucl. V, 16]

$$B\Gamma^2 : BA \times AM = ZH^2 : ZA \times AM.$$

uerum propter sectionem est $ZH^2 = ZA \times AM$ [prop. XI]. quare etiam $B\Gamma^2 = BA \times AM$. uerum AM latus transuersum est et $B\Gamma$ rectae ordinate ductae parallela. ergo sectio per Γ ueniet [prop. XX], et ΓA cum sectione concurrit in Γ .

XXVIII.

Si recta alterutram oppositarum contingit et intra alteram sectionem punctum aliquod sumitur, et per id recta contingenti parallela ducitur, haec in utramque partem producta cum sectione concurret.

sint oppositae, quarum diametrus sit AB , et sectionem A contingat recta ΓA , et intra alteram sectionem punctum aliquod E sumatur, et per E rectae ΓA parallela ducatur EZ . dico, EZ in utramque partem productam cum sectione concurrere.

quoniam igitur demonstrauius, ΓA productam cum diametro AB concurrere [prop. XXIV], eique parallela est EZ , EZ producta cum diametro concurret; concurrat in H , et ponatur $A\Theta = HB$, et per Θ rectae ZE parallela ducatur ΘK , ordinateque ducatur

8. πρὸς — ZH] bis V; corr. p. 11. [δὲ] καὶ τοῦ τοῦ βελίου] mg. m. 1 V. 13. καὶ] p, om. V, m. 2 v.

ΘK , καὶ τεταγμένως κατήχθω ἡ KA , καὶ τῇ $A\Theta$ ἴση
 κείσθω ἡ HM , καὶ παρατεταγμένως ἡχθω ἡ MN ,
 καὶ προσεκβεβλήσθω ἐπ' εὐθείας ἡ HN . καὶ ἐπεὶ
 παράλληλός ἐστιν ἡ KA τῇ MN , ἡ δὲ $K\Theta$ τῇ HN ,
 5 καὶ μία εὐθεῖα ἐστὶν ἡ AM , ὁμοίον ἐστὶ τὸ $K\Theta A$
 τρίγωνον τῷ HMN τριγώνῳ. καὶ ἴση ἐστὶν ἡ $A\Theta$
 τῇ HM . ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ KA τῇ MN . ὥστε καὶ
 τὸ ἀπὸ KA τῷ ἀπὸ MN ἴσον ἐστὶ. καὶ ἐπεὶ ἴση
 ἐστὶν ἡ $A\Theta$ τῇ HM , ἡ δὲ $A\Theta$ τῇ BH , κοινὴ δὲ ἡ
 10 AB , ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ BA τῇ AM . ἴσον ἄρα ἐστὶ
 τὸ ὑπὸ BAA τῷ ὑπὸ AMB . ὥς ἄρα τὸ ὑπὸ BAA
 πρὸς τὸ ἀπὸ KA , οὕτως τὸ ὑπὸ AMB πρὸς τὸ ἀπὸ
 MN . καὶ ἐστὶν, ὥς τὸ ὑπὸ BAA πρὸς τὸ ἀπὸ AK ,
 ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὀρθίαν· καὶ ὥς ἄρα τὸ ὑπὸ AMB
 15 πρὸς τὸ ἀπὸ MN , ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὀρθίαν. τὸ N
 ἄρα πρὸς τῇ τομῇ ἐστὶν. ἡ EZ ἄρα ἐκβαλλομένη
 συμπεσεῖται τῇ τομῇ κατὰ τὸ N .

ὁμοίως δὴ δειχθήσεται, ὅτι καὶ ἐπὶ τὰ ἕτερα μέρη
 ἐκβαλλομένη συμπεσεῖται τῇ τομῇ.

20


κθ'.

Ἐὰν ἐν ἀντικειμέναις εὐθεῖα προσπίπτῃ διὰ τοῦ
 κέντρου πρὸς ὁποτέραν τῶν τομῶν, ἐκβαλλομένη τεμεῖ
 τὴν ἑτέραν τομήν.

25 ἔστωσαν ἀντικείμεναι, ὧν διάμετρος ἡ AB , κέντρον
 δὲ τὸ Γ , καὶ ἡ ΓA τεμνέτω τὴν AA τομήν. λέγω,
 ὅτι καὶ τὴν ἑτέραν τομήν τεμεῖ.

1. KA] $\sigma\upsilon\rho$, ΘK e corr. m. 1 V. 9. BH] c , B e corr.
 m. 1 V. 11. BAA] BAA V; corr. p (BA , AA). BAA]
 BAA V; corr. p (τῶν BA , AA). 20. κθ'] p, om. V, m. 2 v.
 21. διὰ] $\epsilon\upsilon\alpha\nu$. V. 22. τέμει V; corr. p.

KA , et ponatur $HM = A\Theta$, et rectae ordinate ductae parallela ducatur MN , et in directum producat EH ,



ut fiat HN . iam quoniam KA rectae MN , $K\Theta$ rectae HN parallela est, et AM una est recta, erit

$$K\Theta A \sim HMN.$$

et $A\Theta = HM$; quare

$$KA = MN$$

[Eucl. VI, 4]. quare etiam $KA^2 = MN^2$. et quoniam $A\Theta = HM$, $A\Theta = BH$, et AB communis est, erit $BA = AM$. itaque erit

$$BA \times AA = AM \times MB.$$

quare

$$BA \times AA : KA^2 = AM \times MB : MN^2.$$

est autem ut $BA \times AA$ ad KA^2 , ita latus transuersum ad latus rectum [prop. XXI]. quare etiam ut

$$AM \times MB : MN^2,$$

ita latus transuersum ad latus rectum. ergo N in sectione est [ib.]. ergo EZ producta cum sectione in N concurret.

iam similiter demonstrabimus, eam etiam ad alteram partem productam cum sectione concurrere.

XXIX.

Si in oppositis recta per centrum ad utramvis sectionum adcidit, producta alteram sectionem secabit.


sint oppositae, quarum diametrus sit AB , centrum autem Γ , et ΓA sectionem AA secet. dico, eam etiam alteram sectionem secaturam esse.

τεταγμένως γὰρ κατήχθω ἡ EA , καὶ τῇ AE ἴση
 κείσθω ἡ BZ , καὶ τεταγμένως ἴχθω ἡ ZH . καὶ ἐπεὶ
 ἴση ἐστὶν ἡ EA τῇ BZ , κοινὴ δὲ ἡ AB , ἴσον ἄρα
 τὸ ὑπὸ BEA τῷ ὑπὸ AZB . καὶ ἐπεὶ ἐστὶν, ὥς τὸ
 5 ὑπὸ BEA πρὸς τὸ ἀπὸ AE , ἡ πλαγία πρὸς τὴν
 ὀρθίαν, ἀλλὰ καὶ ὥς τὸ ὑπὸ AZB πρὸς τὸ ἀπὸ ZH ,
 ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὀρθίαν, καὶ ὥς ἄρα τὸ ὑπὸ BEA
 πρὸς τὸ ἀπὸ AE , οὕτως τὸ ὑπὸ AZB πρὸς τὸ ἀπὸ
 ZH . ἴσον δὲ τὸ ὑπὸ BEA τῷ ὑπὸ AZB . ἴσον ἄρα
 10 καὶ τὸ ἀπὸ EA τῷ ἀπὸ ZH . ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ
 μὲν EG τῇ GZ , ἡ δὲ AE τῇ ZH , καὶ εὐθεία ἐστὶν
 ἡ EZ , καὶ παράλληλος ἡ EA τῇ ZH , καὶ ἡ EH ἄρα
 εὐθεία ἐστὶ. καὶ ἡ GA ἄρα τεμεῖ καὶ τὴν ἐτέραν τομὴν.

λ'.

15 Ἐὰν ἐν ἐλλείψει ἢ ἀντικειμέναις εὐθείαι ἀχθῇ ἐφ'
 ἐκάτερα τοῦ κέντρου συμπέπουσα τῇ τομῇ, δίχα τμη-
 θήσεται κατὰ τὸ κέντρον.


ἔστω ἐλλειψις ἢ ἀντικείμεναι, διάμετρος δὲ αὐτῶν
 ἡ AB , κέντρον δὲ τὸ Γ , καὶ διὰ τοῦ Γ ἴχθω τις
 20 εὐθεία ἡ AE . λέγω, ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ GA τῇ GE .



ἴχθωσαν γὰρ τεταγμένως αἱ AZ , EH . καὶ ἐπεὶ
 ἐστὶν ὥς τὸ ὑπὸ BZA πρὸς τὸ ἀπὸ ZA , ἡ πλαγία

6. ἀλλά — 7. ὀρθίαν] om. V; corr. Memus; cfr. p. 92, 1.
 10. ἀπό] (pr.) ὑπό V; corr. p. 14. λ'] p, om. V, m. 2 v.

ordinate enim ducatur EA , et ponatur $BZ = AE$,
ordinateque ducatur ZH . iam quoniam est $EA = BZ$,



et AB communis est, erit
 $BE \times EA = AZ \times ZB$.

et quoniam est, ut

$$BE \times EA : AE^2,$$

ita latus transuersum ad
latus rectum, uerum etiam

ut $AZ \times ZB : ZH^2$, ita latus transuersum ad latus
rectum [prop. XXI], erit etiam

$$BE \times EA : AE^2 = AZ \times ZB : ZH^2.$$

est autem $BE \times EA = AZ \times ZB$. quare etiam
 $EA^2 = ZH^2$ [Eucl. V, 9].

quoniam igitur est $EF = FZ$, $AE = ZH$, et EZ
recta est, et EA rectae ZH parallela, etiam AH
recta est [cfr. Eucl. VI, 32]. ergo etiam FA alteram
quoque sectionem secabit.

.XXX.

Si in ellipsi uel oppositis recta ducitur ad utram-
que partem centri cum sectione concurrens, in centro
in duas partes aequales secabitur.

sint ellipsis uel oppositae, earumque diametrus AB ,
centrum autem F , et per F recta ducatur AFE . dico,
esse $FA = FE$.

ordinate enim ducantur AZ , EH . et quoniam
est, ut $BZ \times ZA : ZA^2$, ita latus transuersum ad
latus rectum, uerum etiam ut $AH \times HB : HE^2$, ita
latus transuersum ad latus rectum [prop. XXI], erit

πρὸς τὴν ὀρθίαν, ἀλλὰ καὶ ὥς τὸ ὑπὸ AHB πρὸς τὸ
 ἀπὸ HE , ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὀρθίαν, καὶ ὥς ἄρα τὸ
 ὑπὸ BZA πρὸς τὸ ἀπὸ $Z\Delta$, οὕτως τὸ ὑπὸ AHB
 πρὸς τὸ ἀπὸ HE . καὶ ἐναλλάξ, ὥς τὸ ὑπὸ BZA
 5 πρὸς τὸ ὑπὸ AHB , οὕτως τὸ ἀπὸ ΔZ πρὸς τὸ ἀπὸ
 HE . ὥς δὲ τὸ ἀπὸ ΔZ πρὸς τὸ ἀπὸ HE , οὕτως τὸ
 ἀπὸ $Z\Gamma$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓH . ἐναλλάξ ἄρα, ὥς τὸ ὑπὸ
 BZA πρὸς τὸ ἀπὸ $Z\Gamma$, οὕτως τὸ ὑπὸ AHB πρὸς τὸ
 ἀπὸ ΓH . καὶ ὥς ἄρα ἐπὶ μὲν τῆς ἐλλείψεως συνθέντι,
 10 ἐπὶ δὲ τῶν ἀντικειμένων ἀνάπαλιν καὶ ἀναστρέφοντι
 τὸ ἀπὸ $\Delta\Gamma$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓZ , οὕτως τὸ ἀπὸ $B\Gamma$ πρὸς
 τὸ ἀπὸ ΓH . καὶ ἐναλλάξ. ἴσον δὲ τῷ ἀπὸ $\Delta\Gamma$ τὸ
 ἀπὸ ΓB . ἴσον ἄρα καὶ τῷ ἀπὸ $Z\Gamma$ τὸ ἀπὸ ΓH . ἴση
 ἄρα ἡ $Z\Gamma$ τῇ ΓH . καὶ εἰσι παράλληλοι αἱ ΔZ , HE .
 15 ἴση ἄρα καὶ ἡ $\Delta\Gamma$ τῇ ΓE .

λα'.

Ἐὰν ὑπερβολῆς ἐπὶ τῆς πλαγίας πλευρᾶς τοῦ εἵδους
 ληφθῇ τι σημεῖον μὴ ἐλάττονα ἀπολαμβάνον πρὸς τῇ
 κορυφῇ τῆς τομῆς τῆς ἡμισείας τῆς πλαγίας τοῦ εἵδους
 20 πλευρᾶς, καὶ ἀπ' αὐτοῦ προσπέσῃ εὐθεῖα πρὸς τὴν
 τομὴν, προσεκβληθεῖσα ἐντὸς πεσεῖται τῆς τομῆς κατὰ
 τὰ ἐπόμενα μέρη τῆς τομῆς.

ἔστω ὑπερβολή, ἥς διάμετρος ἡ AB , καὶ εἰλήφθω
 ἐπ' αὐτῆς σημεῖον ὅν τι τὸ Γ μὴ ἐλάττονα ἀπολαμ-
 25 βάνον τὴν ΓB τῆς ἡμισείας τῆς AB , καὶ προσπιπτέτω
 τις εὐθεῖα πρὸς τὴν τομὴν ἡ $\Gamma\Delta$. λέγω, ὅτι ἡ $\Gamma\Delta$
 ἐκβαλλομένη ἐντὸς πεσεῖται τῆς τομῆς.

11. τό] (pr.) ὥς τό V; corr. p. Ante $\Delta\Gamma$ del. 1 litt. m. 1
 V; $\Delta\Gamma$ c.p. ΓZ — 12. ἀπό (pr.)] bis V; corr. v.p. 12. καὶ
 ἐναλλάξ] om. p, del. Halley. 16. λα'] p, om. V, m. 2 v. 21.
 προσεκβληθεῖσα] scripsi; ἡ προσβληθεῖσα V.

εἰ γὰρ δυνατόν, ἐκτὸς πιπτέτω τῆς τομῆς ὡς ἰ
 $\Gamma\Delta E$, καὶ ἀπὸ τυχόντος σημείου τοῦ E τεταγμένως
κατήχθω ἡ EH , καὶ ἡ $\Delta\Theta$, καὶ ἔστω πρότερον ἴση
ἡ AG τῇ GB . καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ EH πρὸς τὸ ἀπὸ $\Delta\Theta$
5 μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ἀπὸ ZH πρὸς τὸ ἀπὸ $\Delta\Theta$,
ἀλλ' ὥς μὲν τὸ ἀπὸ EH πρὸς τὸ ἀπὸ $\Delta\Theta$, οὕτως τὸ
ἀπὸ $H\Gamma$ πρὸς τὸ ἀπὸ $\Gamma\Theta$ διὰ τὸ παράλληλον εἶναι
τὴν EH τῇ $\Delta\Theta$, ὥς δὲ τὸ ἀπὸ ZH πρὸς τὸ ἀπὸ $\Delta\Theta$,
οὕτως τὸ ὑπὸ AHB πρὸς τὸ ὑπὸ $A\Theta B$ διὰ τὴν τομήν,
10 τὸ ἄρα ἀπὸ $H\Gamma$ πρὸς τὸ ἀπὸ $\Gamma\Theta$ μείζονα λόγον ἔχει
ἥπερ τὸ ὑπὸ AHB πρὸς τὸ ὑπὸ $A\Theta B$. ἐναλλάξ ἄρα
τὸ ἀπὸ ΓH πρὸς τὸ ὑπὸ AHB μείζονα λόγον ἔχει
ἥπερ τὸ ἀπὸ $\Gamma\Theta$ πρὸς τὸ ὑπὸ $A\Theta B$. διελόντι ἄρα
τὸ ἀπὸ ΓB πρὸς τὸ ὑπὸ AHB μείζονα λόγον ἔχει
15 ἥπερ τὸ ἀπὸ ΓB πρὸς τὸ ὑπὸ $A\Theta B$. ὅπερ ἀδύνατον.
οὐκ ἄρα ἡ $\Gamma\Delta E$ ἐκτὸς πεσεῖται τῆς τομῆς· ἐντὸς
ἄρα. καὶ διὰ τοῦτο ἡ ἀπὸ τινος τῶν ἐπὶ τῆς AG
σημείων πολλῶ μᾶλλον ἐντὸς πεσεῖται, ἐπειδὴ καὶ τῆς
 $\Gamma\Delta$ ἐντὸς πεσεῖται.

20

λβ'.

Ἐὰν κώνου τομῆς διὰ τῆς κορυφῆς εὐθεία παρὰ
τεταγμένως κατηγμένην ἀχθῇ, ἐφάπτεται τῆς τομῆς,
καὶ εἰς τὸν μεταξὺ τόπον τῆς τε κώνου τομῆς καὶ τῆς
εὐθείας ἑτέρα εὐθεῖα οὐ παρεμπεσεῖται.
25 ἔστω κώνου τομὴ πρότερον ἢ καλουμένη παραβολή,
ἥς διάμετρος ἡ AB , καὶ ἀπὸ τοῦ A παρατεταγμένως
ἤχθω ἡ AG .
ὅτι μὲν οὖν ἐκτὸς πίπτει τῆς τομῆς, δέδεικται.

5. ἀπό] (alt.) om. V; corr. p. 9. AHB] c, B e corr.
m. 1 V. 11. τό] (pr.) τὸ ὑπὲρ τό V; corr. p. $A\Theta B$] c,
B e corr. m. 1 V. 20. λβ'] p, om. V, m. 2 v.

nam si fieri potest, extra sectionem cadat ut $\Gamma\Delta E$,
et a puncto aliquo E ordinate ducatur EH , et item
ducatur $\Delta\Theta$, et prius sit $A\Gamma = \Gamma B$. quoniam igitur
est

$$EH^2 : \Delta\Theta^2 > ZH^2 : \Delta\Theta^2 \text{ [Eucl. V, 8],}$$

est autem

$$EH^2 : \Delta\Theta^2 = H\Gamma^2 : \Gamma\Theta^2,$$

quia EH , $\Delta\Theta$ parallelae sunt [Eucl. VI, 4], et

$$ZH^2 : \Delta\Theta^2 = AH \times HB : A\Theta \times \Theta B$$

propter sectionem [prop. XXI], erit

$$H\Gamma^2 : \Gamma\Theta^2 > AH \times HB : A\Theta \times \Theta B.$$

permutando igitur

$$\Gamma H^2 : AH \times HB > \Gamma\Theta^2 : A\Theta \times \Theta B.$$

dirimendo igitur $\Gamma B^2 : AH \times HB > \Gamma B^2 : A\Theta \times \Theta B$
[u. Eutocius]; quod fieri non potest [Eucl. V, 8]. ergo
 $\Gamma\Delta E$ extra sectionem non cadet; intra igitur. qua
de causa recta a puncto aliquo rectae $A\Gamma$ ducta
multo magis intra sectionem cadet, quoniam etiam
intra $\Gamma\Delta$ cadet.

XXXII.

Si per uerticem sectionis conici recta rectae ordinate
ductae parallela ducitur, sectionem contingit, nec in
spatium inter sectionem conici et rectam positum alia
recta incidet.

prius conici sectio sit parabola, quae uocatur, cuius
diametrus sit AB , et ab A rectae ordinate ductae
parallela ducatur $A\Gamma$.

iam eam extra sectionem cadere, demonstraui-
mus [prop. XVII]. dico igitur, in spatium inter rectam
 $A\Gamma$ et sectionem positum nullam aliam rectam incidere.

λέγω δὴ, ὅτι καὶ εἰς τὸν μεταξὺ τόπον τῆς $ΑΓ$ εὐθείας καὶ τῆς τομῆς ἑτέρα εὐθεῖα οὐ παρεμπεσείται.


εἰ γὰρ δυνατόν, παρεμπιπτεύω ὥς ἡ $ΑΔ$, καὶ εἰλήφθω τι σημεῖον ἐπ' αὐτῆς τυχόν τὸ $Δ$, καὶ τεταγ-
 5 μένως κατήχθω ἡ $ΔΕ$, καὶ ἔστω παρ' ἣν δύνανται αἱ καταρόμεναι τεταγμένως ἡ $ΑΖ$. καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ $ΔΕ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΕΑ$ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ἀπὸ $ΗΕ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΕΑ$, τὸ δὲ ἀπὸ $ΗΕ$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ $ΖΑΕ$, καὶ τὸ ἀπὸ $ΔΕ$ ἄρα πρὸς τὸ ἀπὸ $ΕΑ$
 10 μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ὑπὸ $ΖΑΕ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΕΑ$, τουτέστιν ἡ $ΖΑ$ πρὸς $ΑΕ$. πεποιήσθω οὖν, ὥς τὸ ἀπὸ $ΔΕ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΕΑ$, οὕτως ἡ $ΖΑ$ πρὸς $ΑΘ$, καὶ διὰ τοῦ $Θ$ παράλληλος ἦχθω τῇ $ΕΔ$ ἡ $ΘΑΚ$. ἐπεὶ οὖν ἐστίν, ὥς τὸ ἀπὸ $ΔΕ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΕΑ$, ἡ
 15 $ΖΑ$ πρὸς $ΑΘ$, τουτέστι τὸ ὑπὸ $ΖΑΘ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΑΘ$, καὶ ἐστίν, ὥς μὲν τὸ ἀπὸ $ΔΕ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΕΑ$, οὕτως τὸ ἀπὸ $ΚΘ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΘΑ$, τῷ δὲ ὑπὸ $ΖΑΘ$ ἴσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ $ΘΑ$, καὶ ὥς ἄρα τὸ ἀπὸ $ΚΘ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΘΑ$, οὕτως τὸ ἀπὸ $ΑΘ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΘΑ$. ἴση
 20 ἄρα ἡ $ΚΘ$ τῇ $ΘΑ$. ὅπερ ἄτοπον. οὐκ ἄρα εἰς τὸν μεταξὺ τόπον τῆς $ΑΓ$ εὐθείας καὶ τῆς τομῆς ἑτέρα εὐθεῖα παρεμπεσείται.

ἔστω δὴ ἡ τομὴ ὑπερβολὴ ἢ ἑλλειψις ἢ κύκλου περιφέρεια, ἥς διάμετρος ἡ $ΑΒ$, ὁρθία δὲ ἡ $ΑΖ$, καὶ
 25 ἐπιζευχθεῖσα ἡ $ΒΖ$ ἐκβεβλήσθω, καὶ ἀπὸ τοῦ $Α$ παρατεταγμένως ἦχθω ἡ $ΑΓ$.

ὅτι μὲν οὖν ἐκτὸς πίπτει τῆς τομῆς, δέδεικται.

7. μείζονα — 8. $ΕΑ$] om. V; corr. p (τῆς $ΗΕ$ et τῆς $ΕΑ$).
 11. πεποιήσθω V; corr. p. 13. $ΕΔ$] $ΕΘ$ V; corr. p. 18.
 τό] (pr.) τῷ V; corr. p. 23. ἦ] ἡ V; corr. p. ἦ] ἡ V;
 corr. p.

nam si fieri potest, incidat ut AA , et in ea sumatur punctum aliquod A , et ordinate ducatur AE , parametris autem rectarum ordinate ductarum sit AZ . et quoniam est $AE^2 : EA^2 > HE^2 : EA^2$ [Eucl. V, 8], et $HE^2 = ZA \times AE$ [prop. XI], erit etiam




$AE^2 : EA^2 > ZA \times AE : EA^2$,
hoc est $AE^2 : EA^2 > ZA : AE$. fiat
igitur $AE^2 : EA^2 = ZA : A\Theta$, et per Θ

rectae EA parallela ducatur ΘAK . quoniam igitur est $AE^2 : EA^2 = ZA : A\Theta = ZA \times A\Theta : A\Theta^2$, est autem [Eucl. VI, 4] $AE^2 : EA^2 = K\Theta^2 : \Theta A^2$, et

$$ZA \times A\Theta = \Theta A^2 \text{ [prop. XI],}$$

erit etiam $K\Theta^2 : \Theta A^2 = A\Theta^2 : \Theta A^2$. quare $K\Theta = \Theta A$ [Eucl. V, 9]; quod absurdum est. ergo in spatium inter rectam AG et sectionem positum nulla recta alia incidet.

iam sit sectio hyperbola uel ellipsis uel ambitus circuli, cuius diametrus sit AB , latus autem rectum



AZ , et ducta BZ producat, ab A autem rectae ordinate ductae parallela ducatur AG .

λέγω δὴ, ὅτι καὶ εἰς τὸν μεταξὺ τόπον τῆς $ΑΓ$ εὐθείας καὶ τῆς τομῆς ἑτέρα εὐθεῖα οὐ παρεμπεσείται.

εἰ γὰρ δυνατόν, παρεμπιπτέτω ὥς ἡ $ΑΔ$, καὶ εἰλήφθω τι σημεῖον ἐπ' αὐτῆς τυχόν τὸ $Δ$, καὶ τεταγ-
 5 μένως ἀπ' αὐτοῦ κατήχθω ἡ $ΔΕ$, καὶ διὰ τοῦ $Ε$ τῇ $ΑΖ$ παράλληλος ἦχθω ἡ $ΕΜ$. καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ $ΗΕ$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ $ΑΕΜ$, πεποιήσθω τῷ ἀπὸ $ΔΕ$ ἴσον τὸ ὑπὸ $ΑΕΝ$, καὶ ἐπιξυχθεῖσα ἡ $ΑΝ$ τεμνέτω τὴν $ΖΜ$ κατὰ τὸ $Ξ$, καὶ διὰ μὲν τοῦ $Ξ$ τῇ $ΖΑ$ παράλ-
 10 ληλος ἦχθω ἡ $ΞΘ$, διὰ δὲ τοῦ $Θ$ τῇ $ΑΓ$ ἡ $ΘΑΚ$. ἐπεὶ οὖν τὸ ἀπὸ $ΔΕ$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπο $ΑΕΝ$, ἔστιν ὥς ἡ $ΝΕ$ πρὸς $ΕΔ$, ἡ $ΔΕ$ πρὸς $ΕΑ$. καὶ ὥς ἄρα ἡ $ΝΕ$ πρὸς $ΕΑ$, τὸ ἀπὸ $ΔΕ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΕΑ$. ἀλλ' ὥς μὲν ἡ $ΝΕ$ πρὸς $ΕΑ$, ἡ $ΞΘ$ πρὸς $ΘΑ$, ὥς δὲ τὸ
 15 ἀπὸ $ΔΕ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΕΑ$, τὸ ἀπὸ $ΚΘ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΘΑ$. ὥς ἄρα ἡ $ΞΘ$ πρὸς $ΘΑ$, τὸ ἀπὸ $ΚΘ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΘΑ$. μέση ἄρα ἀνάλογόν ἐστιν ἡ $ΚΘ$ τῶν $ΞΘΑ$. τὸ ἄρα ἀπὸ $ΘΚ$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ $ΑΘΞ$. ἔστι δὲ καὶ τὸ ἀπὸ $ΑΘ$ τῷ ὑπὸ $ΑΘΞ$ ἴσον διὰ τὴν τομὴν. τὸ
 20 ἄρα ἀπὸ $ΚΘ$ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ $ΘΑ$. ὅπερ ἄτοπον. οὐκ ἄρα εἰς τὸν μεταξὺ τόπον τῆς τε $ΑΓ$ εὐθείας καὶ τῆς τομῆς ἑτέρα εὐθεῖα παρεμπεσείται.

λγ'.

Ἐὰν ἐν παραβολῇ ληφθῇ τι σημεῖον, καὶ ἀπ' αὐτοῦ
 25 τεταγμένως ἐπὶ τὴν διάμετρον καταχθῇ, καὶ τῇ ἀπο-
 λαμβανομένῃ ὑπ' αὐτῆς ἀπὸ τῆς διαμέτρου πρὸς τῇ
 κορυφῇ τεθῇ ἴση ἐπ' εὐθείας ἀπ' ἄκρας αὐτῆς, ἡ ἀπὸ
 τοῦ γενομένου σημείου ἐπὶ τὸ ληφθὲν σημεῖον ἐπι-
 ξευννυμένη ἐφάπτεται τῆς τομῆς.

7. πεποιήσθω V; corr. p. τῷ] cvp, corr. ex τό m. 1 V.
 23. λγ'] p, om. V, m. 2 v.

iam igitur eam extra sectionem cadere, demonstratum est [prop. XVII; Eucl. III, 16]. dico etiam, in spatium inter rectam AG et sectionem positum nullam aliam rectam incidere.

nam si fieri potest, incidat ut AA , et in ea punctum aliquod sumatur A , et ab eo ordinate ducatur AE , per E autem rectae AZ parallela ducatur EM . et quoniam est $HE^2 = AE \times EM$ [prop. XII—XIII], fiat $AE \times EN = AE^2$, et ducta AN rectam ZM in E secet, et per E rectae ZA parallela ducatur EX , per X autem rectae AG parallela XK . quoniam igitur $AE^2 = AE \times EN$, erit $NE : EA = AE : EA$ [Eucl. VI, 17]; quare etiam $NE : EA = AE^2 : EA^2$. uerum $NE : EA = EX : XA$, $AE^2 : EA^2 = KX^2 : XA^2$ [Eucl. VI, 4]. itaque $EX : XA = KX^2 : XA^2$. media igitur proportionalis est KX inter EX , XA . itaque [Eucl. VI, 17] $XK^2 = AX \times XE$. est autem etiam propter sectionem [prop. XII—XIII] $AX^2 = AX \times XE$. quare erit $KX^2 = AX^2$; quod absurdum est. ergo in spatium inter rectam AG et sectionem alia recta non incidet.

XXXIII.

Si in parabola punctum aliquod sumitur, et ab eo ad diametrum recta ordinate ducitur, et rectae ab ea de diametro ad uerticem abscisae aequalis recta a termino eius in directum ponitur, recta a puncto ita orto ad sumptum punctum ducta sectionem continget.

sit parabola, cuius diametrus sit AB , et ordinate ducatur GA , ponaturque $AE = EA$, et ducatur AG . dico, AG productam extra sectionem cadere.

ἔστω παραβολή, ἥς διάμετρος ἡ AB , καὶ κατήχθω τεταγμένως ἡ $\Gamma\Delta$, καὶ τῇ $E\Delta$ ἴση κείσθω ἡ AE , καὶ ἐπεξεύχθω ἡ AG . λέγω, ὅτι ἡ AG ἐκβαλλομένη ἐκτὸς πεσεῖται τῆς τομῆς.

5 εἰ γὰρ δυνατόν, πιπτέτω ἐντὸς ὡς ἡ ΓZ , καὶ τεταγμένως κατήχθω ἡ HB . καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ BH πρὸς τὸ ἀπὸ $\Gamma\Delta$ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ἀπὸ ZB πρὸς τὸ ἀπὸ $\Gamma\Delta$, ἀλλ' ὡς μὲν τὸ ἀπὸ ZB πρὸς τὸ ἀπὸ $\Gamma\Delta$, τὸ ἀπὸ BA πρὸς τὸ ἀπὸ AA , ὡς δὲ τὸ ἀπὸ
10 HB πρὸς τὸ ἀπὸ $\Gamma\Delta$, ἡ BE πρὸς AE , ἡ BE ἄρα πρὸς $E\Delta$ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ἀπὸ BA πρὸς τὸ ἀπὸ AA . ἀλλ' ὡς ἡ BE πρὸς $E\Delta$, τὸ τετράκις ὑπὸ BEA πρὸς τὸ τετράκις ὑπὸ AEA . καὶ τὸ τετράκις ἄρα ὑπὸ τῶν BEA πρὸς τὸ τετράκις ὑπὸ AEA μεί-
15 ζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ἀπὸ BA πρὸς τὸ ἀπὸ AA . ἐναλλὰξ ἄρα τὸ τετράκις ὑπὸ BEA πρὸς τὸ ἀπὸ AB μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ τετράκις ὑπὸ AEA πρὸς τὸ ἀπὸ AA . ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. ἴσης γὰρ οὔσης τῆς AE τῇ $E\Delta$ τὸ τετράκις ὑπὸ AEA τῷ ἀπὸ AA
20 ἐστὶν ἴσον, τὸ δὲ τετράκις ὑπὸ BEA τοῦ ἀπὸ BA ἐστὶν ἑλασσον· τῆς γὰρ AB οὐκ ἔστι διχοτομία τὸ E σημείον. οὐκ ἄρα ἡ AG ἐντὸς πίπτει τῆς τομῆς· ἐφάπτεται ἄρα.

λδ'.

25 Ἐὰν ἐπὶ ὑπερβολῆς ἢ ἐλλείψεως ἡ κύκλου περιφερείας ληφθῇ τι σημείον, καὶ ἀπ' αὐτοῦ καταχθῇ εὐθεῖα ἐπὶ τὴν διάμετρον τεταγμένως, καὶ ὃν ἔχουσι λόγον πρὸς ἀλλήλας αἱ ἀποτεμνόμεναι ὑπὸ τῆς κατηγμένης πρὸς τοῖς πέρασι τῆς πλαγίας τοῦ εἵδους

12. τό] (alt.) om. V; corr. p.


20. τράκις V; corr. cp.

24. λδ'] p, om. V, m. 2 v.

14. ὑπό] (alt.) ἄρα ὑπό V;

22. ἐντός] ἐκτός V; corr. p.

πλευρᾶς, τοῦτον ἔχη τὰ τμήματα τῆς πλαγίας πλευρᾶς,
 ὥστε ὁμόλογα εἶναι τὰ πρὸς τῇ κορυφῇ τμήματα, ἢ
 τὸ ἐπὶ τῆς πλαγίας πλευρᾶς ληφθὲν σημεῖον καὶ τὸ ἐπὶ
 τῆς τομῆς ἐπιζευγνύουσα εὐθεῖα ἐφάπτεται τῆς τομῆς.
 5 ἔστω ὑπερβολὴ ἢ ἔλλειψις ἢ κύκλου περιφέρεια, ἥς
 διάμετρος ἡ AB , καὶ εἰλήφθω τι σημεῖον ἐπὶ τῆς
 τομῆς τὸ Γ , καὶ ἀπὸ
 τοῦ Γ τεταγμένως ἦχθω
 ἡ ΓA , καὶ πεποιήσθω
 10 ὡς ἡ $B A$ πρὸς $A A$, οὕτως ἡ $B E$ πρὸς $E A$,
 οὕτως ἡ $B E$ πρὸς $E A$, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ $E \Gamma$.
 λέγω, ὅτι ἡ ΓE ἐφ-
 άπτεται τῆς τομῆς.



15 εἰ γὰρ δυνατόν, τεμνέτω ὡς ἡ $E \Gamma Z$, καὶ εἰλήφθω
 τι σημεῖον ἐπ' αὐτῆς τὸ Z , καὶ τεταγμένως κατήχθω
 ἡ $H Z \Theta$, καὶ ἦχθωσαν διὰ τῶν A, B τῇ $E \Gamma$ παράλληλοι
 αἱ $A A, B K$, καὶ ἐπιζευχθεῖσαι αἱ $A \Gamma, B \Gamma, H \Gamma$ ἐκ-
 βεβλήσθωσαν ἐπὶ τὰ M, Ξ, K σημεία. καὶ ἐπεὶ ἐστίν,
 20 ὡς ἡ $B A$ πρὸς $A A$, οὕτως ἡ $B E$ πρὸς $E A$, ἀλλ' ὡς
 μὲν ἡ $B A$ πρὸς $A A$, οὕτως ἡ $B K$ πρὸς $A N$, ὡς δὲ
 ἡ $B E$ πρὸς $A E$, οὕτως ἡ $B \Gamma$ πρὸς $\Gamma \Xi$, τουτέστιν ἡ
 $B K$ πρὸς ΞN , ὡς ἄρα ἡ $B K$ πρὸς $A N$, ἡ $B K$ πρὸς $N \Xi$.
 ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ $A N$ τῇ $N \Xi$. τὸ ἄρα ὑπὸ $A N \Xi$
 25 μείζον ἐστὶ τοῦ ὑπὸ $A O \Xi$. ἡ $N \Xi$ ἄρα πρὸς ΞO μεί-
 ζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ $O A$ πρὸς $A N$. ἀλλ' ὡς ἡ $N \Xi$
 πρὸς ΞO , ἡ $K B$ πρὸς $B M$. ἡ $K B$ ἄρα πρὸς $B M$
 μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ $O A$ πρὸς $A N$. τὸ ἄρα ὑπὸ
 $K B, A N$ μείζον ἐστὶ τοῦ ὑπὸ $M B, A O$. ὥστε τὸ

5. ἦ] ἢ V; corr. p. ἦ] ἢ V; corr. p. 9. πεποιήσθω V;
 corr. p. 17. $H Z \Theta$] $H \Xi \Theta$ V; corr. Memus; $\Theta Z H$ p.

ὑπὸ KB , AN πρὸς τὸ ἀπὸ $ΓΕ$ μείζονα λόγον ἔχει
 ἥπερ τὸ ὑπὸ MB , AO πρὸς τὸ ἀπὸ $ΓΕ$. ἀλλ' ὥς μὲν
 τὸ ὑπὸ KB , AN πρὸς τὸ ἀπὸ $ΓΕ$, οὕτως τὸ ὑπὸ BAA
 πρὸς τὸ ἀπὸ $ΔΕ$ διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν BKA , EGA ,
 5 $NAΔ$ τριγώνων, ὥς δὲ τὸ ὑπὸ MB , AO πρὸς τὸ ἀπὸ
 $ΓΕ$, οὕτως ἐστὶ τὸ ὑπὸ BHA πρὸς τὸ ἀπὸ HE . τὸ
 ἄρα ὑπὸ BAA πρὸς τὸ ἀπὸ $ΔΕ$ μείζονα λόγον ἔχει
 ἥπερ τὸ ὑπὸ BHA πρὸς τὸ ἀπὸ HE . ἐναλλαξ τὸ
 ἄρα ὑπὸ BAA πρὸς τὸ ὑπὸ AH , BH μείζονα λόγον ἔχει
 10 ἥπερ τὸ ἀπὸ $ΔΕ$ πρὸς τὸ ἀπὸ EH . ἀλλ' ὥς μὲν τὸ
 ὑπὸ BAA πρὸς τὸ ὑπὸ AHB , οὕτως τὸ ἀπὸ $ΓΔ$ πρὸς
 τὸ ἀπὸ $HΘ$, ὥς δὲ τὸ ἀπὸ $ΔΕ$ πρὸς τὸ ἀπὸ EH ,
 οὕτως τὸ ἀπὸ $ΓΔ$ πρὸς τὸ ἀπὸ ZH . καὶ τὸ ἀπὸ $ΓΔ$
 ἄρα πρὸς τὸ ἀπὸ $ΘH$ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ
 15 ἀπὸ $ΓΔ$ πρὸς τὸ ἀπὸ ZH . ἐλάσσων ἄρα ἐστὶν ἡ $ΘH$
 τῆς ZH . ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ ἄρα ἡ $ΕΓ$ τέμνει
 τὴν τομήν· ἐφάπτεται ἄρα.

λε'.

Ἐὰν παραβολῆς εὐθεία ἐφάπτεται συμπίπτουσα τῇ
 20 διαμέτρῳ ἐκτὸς τῆς τομῆς, ἡ ἀπὸ τῆς ἀφῆς εὐθεία
 ἀχθεῖσα τεταγμένης ἐπὶ τὴν διάμετρον ἴσην ἀπολήψε-
 ται ἀπὸ τῆς διαμέτρου πρὸς τῇ κορυφῇ τῆς τομῆς τῇ
 μεταξὺ αὐτῆς καὶ τῆς ἐφαπτομένης, καὶ εἰς τὸν μεταξὺ
 τόπον τῆς ἐφαπτομένης καὶ τῆς τομῆς οὐδεμία εὐθεία
 25 παρεμπεσεῖται.


ἔστω παραβολή, ἥς διάμετρος ἡ AB , καὶ τεταγμένης
 ἀνήχθω ἡ $BΓ$, καὶ ἔστω ἐφαπτομένη τῆς τομῆς ἡ $ΑΓ$.
 λέγω, ὅτι ἡ AH ἴση ἐστὶ τῇ HB .

13. ZH — 14. ἀπό] bis V; corr. p. 18. λε'] p, om. V,
 m. 2 v. 23. αὐτῆς] αὐτῇ V; corr. p.

est autem propter similitudinem triangulorum $BK\Delta$, $E\Gamma\Delta$, $NA\Delta$ [u. Eutocius]

$$KB \times AN : \Gamma E^2 = B\Delta \times \Delta A : \Delta E^2,$$

et $MB \times AO : \Gamma E^2 = BH \times HA : HE^2$. itaque erit $B\Delta \times \Delta A : \Delta E^2 > BH \times HA : HE^2$. permutando



igitur $B\Delta \times \Delta A : BH \times HA > \Delta E^2 : EH^2$. est autem $B\Delta \times \Delta A : BH \times HA = \Gamma\Delta^2 : H\Theta^2$ [prop. XXI] et $\Delta E^2 : EH^2 = \Gamma\Delta^2 : ZH^2$ [Eucl. VI, 4]. itaque etiam $\Gamma\Delta^2 : \Theta H^2 > \Gamma\Delta^2 : ZH^2$. quare $\Theta H < ZH$ [Eucl. V, 8]; quod fieri non potest. ergo $E\Gamma$ sectionem non secat; contingit igitur.

XXXV.

Si parabolam recta contingit cum diametro extra sectionem concurrens, recta a puncto contactus ad diametrum ordinate ducta de diametro ad uerticem sectionis rectam abscindet aequalem rectae inter eum contingentemque positae, et in spatium inter contingentem et sectionem positum nulla recta incidet.

sit parabola, cuius diametrus sit AB , et ordinate ducatur $B\Gamma$, contingatque sectionem $A\Gamma$. dico, esse $AH = HB$.

nam si fieri potest, sit inaequalis, et ponatur $HE = AH$, ducaturque ordinate EZ , et ducatur AZ . AZ igitur

εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω ἄνισος αὐτῇ, καὶ τῇ AH
 ἴση κείσθω ἡ HE , καὶ τεταγμένως ἀνήχθω ἡ EZ ,
 καὶ ἐπεζεύχθω ἡ AZ . ἡ AZ ἄρα ἐκβαλλομένη συμπε-
 5 ἔσται εὐθειῶν τὰ αὐτὰ πέρατα. οὐκ ἄρα ἄνισός ἐστιν
 ἡ AH τῇ HB . ἴση ἄρα.

λέγω δὴ, ὅτι εἰς τὸν μεταξὺ τόπον τῆς τε AG
 εὐθείας καὶ τῆς τομῆς οὐδεμία εὐθεῖα παρεμπεσείται.


εἰ γὰρ δυνατόν, παρεμπίπτει τῇ GA , καὶ τῇ HA
 10 ἴση κείσθω ἡ HE , καὶ τεταγμένως ἀνήχθω ἡ EZ . ἡ
 ἄρα ἀπὸ τοῦ A ἐπὶ τὸ Z ἐπιγεγνημένη εὐθεῖα ἐφάπ-
 τεταται τῆς τομῆς. ἐκβαλλομένη ἄρα ἐκτὸς πεσείται
 αὐτῆς. ὥστε συμπεσείται τῇ AG , καὶ δυεῖν εὐθειῶν
 15 ἔσται τὰ αὐτὰ πέρατα. ὅπερ ἄτοπον. οὐκ ἄρα εἰς
 τὸν μεταξὺ τόπον τῆς τε τομῆς καὶ τῆς AG εὐθείας
 παρεμπεσείται εὐθεῖα.

λς'.

Ἐὰν ὑπερβολῆς ἢ ἐλλείψεως ἢ κύκλου περιφερείας
 ἐφάπτηται τις εὐθεῖα συμπύπτουσα τῇ πλαγίᾳ τοῦ εἵδους
 20 πλευρᾶς, καὶ ἀπὸ τῆς ἀφῆς καταχθῇ εὐθεῖα τεταγμένως
 ἐπὶ τὴν διάμετρον, ἔσται ὥς ἡ ἀπολαμβανομένη ὑπὸ
 τῆς ἐφαπτομένης πρὸς τῷ πέρατι τῆς πλαγίας πλευρᾶς
 πρὸς τὴν ἀπολαμβανομένην ὑπὸ τῆς ἐφαπτομένης
 πρὸς τῷ ἐτέρῳ πέρατι τῆς πλευρᾶς, οὕτως ἡ ἀπολαμ-
 25 βανομένη ὑπὸ τῆς κατηγμένης πρὸς τῷ πέρατι τῆς
 πλευρᾶς πρὸς τὴν ἀπολαμβανομένην ὑπὸ τῆς κατηγ-
 μένης πρὸς τῷ ἐτέρῳ πέρατι τῆς πλευρᾶς, ὥστε τὰς
 ὁμολόγους συνεχεῖς εἶναι, καὶ εἰς τὸν μεταξὺ τόπον
 τῆς ἐφαπτομένης καὶ τῆς τοῦ κώνου τομῆς ἐτέρα εὐθεῖα
 30 οὐ παρεμπεσείται.

2. ἡ] (alt.) p, om. V. 17. λς'] p, om. V, m. 2 v.

producta cum recta AF concurret [prop. XXXIII];
quod fieri non potest; ita enim duarum rectarum iidem



termini erunt, itaque AH
rectae HB inaequalis non
est. ergo aequalis est.

iam dico, in spatium
inter rectam AF et sectio-
nem positum nullam rec-
tam incidere.

nam si fieri potest,
incidat FD , ponaturque

$HE = HA$, et ordinate ducatur EZ . recta igitur a
 A ad Z ducta sectionem contingit [prop. XXXIII];
producta igitur extra eam cadet. quare cum AF
concurret, et duarum rectarum iidem termini erunt;
quod absurdum est. ergo in spatium inter sectionem
et rectam AF positum nulla recta incidet.

XXXVI.

Si hyperbolam uel ellipsim uel ambitum circuli
recta contingit cum latere transverso figurae con-
currens, et a puncto contactus ad diametrum ordinate
ducitur recta, erit, ut recta a contingenti ad terminum
lateris transversi abscisa ad rectam a contingenti ad
alterum terminum lateris transversi abscisam, ita
recta ab ordinate ducta ad terminum lateris abscisa
ad rectam ab ordinate ducta ad alterum terminum
lateris abscisam, ita ut rectae inter se correspondentes
continuae sint, et in spatium inter contingentem et
sectionem conici positum alia recta non incidet.

ἔστω υπερβολὴ ἢ ἑλλειψις ἢ κύκλου περιφέρεια, ἥς διάμετρος ἡ AB , ἐφαπτομένη δὲ ἔστω ἡ ΓA , καὶ τεταγμένως κατήχθω ἡ ΓE . λέγω, ὅτι ἔστιν ὡς ἡ BE πρὸς EA , οὕτως ἡ $B A$ πρὸς $A A$.

5 εἰ γὰρ μή ἐστιν, ἔστω ὡς ἡ $B A$ πρὸς $A A$, ἡ $B H$ πρὸς HA , καὶ τεταγμένως ἀνήχθω ἡ $H Z$. ἡ ἄρα ἀπὸ τοῦ A ἐπὶ τὸ Z ἐπιξεννυμένη εὐθεῖα ἐφάπτεται τῆς τομῆς· ἐκβαλλομένη ἄρα συμπεσεῖται τῇ ΓA .
 10 δυεῖν ἄρα εὐθειῶν τὰ αὐτὰ πέρατά ἐστιν· ὅπερ ἄτοπον.

λέγω, ὅτι μεταξὺ τῆς τομῆς καὶ τῆς ΓA εὐθείας οὐδεμία εὐθεῖα παρεμπεσεῖται.

εἰ γὰρ δυνατόν, παρεμπίπτειτω ὡς ἡ $\Gamma \Theta$, καὶ πεποιήσθω ὡς ἡ $B \Theta$ πρὸς ΘA , ἡ $B H$ πρὸς HA , καὶ
 15 τεταγμένως ἀνήχθω ἡ $H Z$. ἡ ἄρα ἀπὸ τοῦ Θ ἐπὶ τὸ Z ἐπιξεννυμένη εὐθεῖα ἐκβαλλομένη συμπεσεῖται τῇ $\Theta \Gamma$. δυεῖν ἄρα εὐθειῶν τὰ αὐτὰ πέρατα ἔσται· ὅπερ ἀδύνατον. οὐκ ἄρα εἰς τὸν μεταξὺ τόπον τῆς τε τομῆς καὶ τῆς ΓA εὐθείας παρεμπεσεῖται εὐθεῖα.

20

λζ'.

Ἐὰν ὑπερβολῆς ἢ ἑλλείψεως ἢ κύκλου περιφέρειας εὐθεῖα ἐπιψάνουσα συμπίπτῃ τῇ διαμέτρῳ, καὶ ἀπὸ τῆς ἀφῆς ἐπὶ τὴν διάμετρον καταχθῇ εὐθεῖα τεταγμένως, ἡ ἀπολαμβανομένη εὐθεῖα ὑπὸ τῆς κατηγμένης πρὸς τῷ
 25 κέντρῳ τῆς τομῆς μετὰ μὲν τῆς ἀπολαμβανομένης ὑπὸ τῆς ἐφαπτομένης πρὸς τῷ κέντρῳ τῆς τομῆς ἴσον περιέξει τῷ ἀπὸ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τῆς τομῆς, μετὰ δὲ τῆς

6. HZ] HΞ c v et ut uidetur V; corr. p. 14. πεποιείσθω V
 corr. p. 15. ἡ] (alt.) om. V; corr. p. 17. $\Theta \Gamma$] $A \Gamma$ V

sit hyperbola uel ellipsis uel ambitus circuli, cuius diametrus sit AB , contingat autem ΓA , et ordinate ducatur ΓE . dico, esse $BE:EA = BA:AA$.


nam si minus, sit $BA:AA = BH:HA$, et ordinate ducatur HZ . itaque recta a A ad Z ducta sectionem continget [prop. XXXIV]; producta igitur cum ΓA concurret. itaque duarum rectarum iidem termini erunt; quod absurdum est.

dico, inter sectionem et rectam ΓA nullam rectam incidere.

nam si fieri potest, incidat ut $\Gamma \Theta$, et fiat

$$B\Theta:\Theta A = BH:HA,$$

ordinateque ducatur HZ ; recta igitur a Θ ad Z ducta



producta concurret cum $\Theta \Gamma$. itaque duarum rectarum iidem termini erunt; quod fieri non potest. ergo in spatium inter sectionem et rectam ΓA nulla recta incidet.

XXXVII.

Si recta hyperbolam uel ellipsim uel ambitum circuli contingens cum diametro concurrat, et a puncto contactus ad diametrum recta ordinate ducitur, recta ab ordinate ducta ad centrum sectionis abscisa cum recta a contingenti ad centrum sectionis abscisa spatium

corr. p. 20. $\lambda\xi'$] p, om. V, m. 2 v. 22. $\sigma\mu\pi\acute{\iota}\pi\tau\epsilon\iota$ V; corr.
m. 1. 27. $\tau\omicron\upsilon$] cp, corr. ex $\tau\eta\varsigma$ m. 1 V.


μεταξὺ τῆς κατηγμένης καὶ τῆς ἐφαπτομένης περιέξει
χωρίον λόγον ἔχον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς κατηγμένης
τετραγώνου, ὃν ἡ πλαγία πλευρὰ πρὸς τὴν ὀρθίαν.

ἔστω ὑπερβολὴ ἡ ἑλλειψις ἡ κύκλου περιφέρειαν,
5 ἥς διάμετρος ἡ AB , καὶ ἐφαπτομένη ἡ $\chi\theta$ ἡ $\Gamma\Delta$,
καὶ κατήχθω τεταγμένως ἡ ΓE , κέντρον δὲ ἔστω τὸ
 Z . λέγω, ὅτι ἴσον ἐστὶ τὸ ὑπὸ ΔZE τῷ ἀπὸ ZB ,
καὶ ὡς τὸ ὑπὸ ΔEZ πρὸς τὸ ἀπὸ $E\Gamma$, ἡ πλαγία πρὸς
τὴν ὀρθίαν.

10 ἐπεὶ γὰρ ἐφάπτεται ἡ $\Gamma\Delta$ τῆς τομῆς, καὶ τεταγ-
μένως κατήχεται ἡ ΓE , ἔσται, ὡς ἡ $A\Delta$ πρὸς ΔB , ἡ
 AE πρὸς EB . συνθέντι ἄρα ἐστίν, ὡς συναμφοτέρος
ἡ $A\Delta$, ΔB πρὸς ΔB , οὕτως συναμφοτέρος ἡ AE , EB
πρὸς EB . καὶ τῶν ἡγουμένων τὰ ἡμίση· ἐπὶ μὲν
15 τῆς ὑπερβολῆς ἐροῦμεν· ἀλλὰ συναμφοτέρου μὲν τῆς
 AE , EB ἡμίσειά ἐστὶν ἡ ZE , τῆς δὲ AB ἡ ZB .
ὡς ἄρα ἡ ZE πρὸς EB , ἡ ZB πρὸς $B\Delta$. ἀναστρέ-
ψαντι ἄρα ἐστίν, ὡς ἡ EZ πρὸς ZB , ἡ ZB πρὸς $Z\Delta$.
ἴσον ἄρα ἐστὶ τὸ ὑπὸ $EZ\Delta$ τῷ ἀπὸ ZB . καὶ ἐπεὶ
20 ἐστὶν, ὡς ἡ ZE πρὸς EB , ἡ ZB πρὸς $B\Delta$, τουτέστιν
ἡ AZ πρὸς ΔB , ἐναλλάξ, ὡς ἡ AZ πρὸς ZE , ἡ ΔB
πρὸς BE . συνθέντι, ὡς ἡ AE πρὸς EZ , ἡ ΔE πρὸς
 EB . ὥστε τὸ ὑπὸ AEB ἴσον τῷ ὑπὸ $ZE\Delta$. ἔστι
δὲ ὡς τὸ ὑπὸ AEB πρὸς τὸ ἀπὸ ΓE , ἡ πλαγία πρὸς
25 τὴν ὀρθίαν· καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ $ZE\Delta$ πρὸς τὸ ἀπὸ
 ΓE , ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὀρθίαν. ἐπὶ δὲ τῆς ἐλλείψεως
καὶ τοῦ κύκλου· ἀλλὰ συναμφοτέρου μὲν τῆς $A\Delta$, ΔB
ἡμίσειά ἐστὶν ἡ ΔZ , τῆς δὲ AB ἡμίσειά ἐστὶν ἡ

8. ΔEZ] $E\Delta Z$ V; corr. Memus. 11. ΓE] E V; corr.
Memus. 13. $A\Delta$ — AE] om. V; corr. Memus. 14. μέν]
scr. μὲν οὐν.

comprehendet aequale quadrato radii sectionis, cum
 recta autem inter ordinate ductam et contingentem
 posita spatium comprehendet, quod ad quadratum
 ordinate ductae rationem habet,
 quam latus transuersum ad
 rectum.



sit hyperbola uel ellipsis
 uel ambitus circuli, cuius dia-
 metrus sit AB , et contingens

ducatur ΓA , ducaturque ordinate ΓE , centrum autem
 sit Z . dico, esse $AZ \times ZE = ZB^2$, et ut

$$AE \times EZ : E\Gamma^2,$$

ita latus transuersum ad rectum.

nam quoniam ΓA sectionem contingit, et ΓE ordinate
 ducta est, erit $AZ : AB = AE : EB$ [prop. XXXVI].
 componendo igitur $AZ + AB : AB = AE + EB : EB$
 [Eucl. V, 18]. et praecedentium dimidia sumantur
 [Eucl. V, 15]. in hyperbola igitur sic ratiocinabimur:
 est autem $ZE = \frac{1}{2}(AE + EB)$, $ZB = \frac{1}{2}AB$. itaque
 $ZE : EB = ZB : AB$. conuertendo igitur [Eucl. V, 19
 coroll.] $EZ : ZB = ZB : ZA$. itaque [Eucl. VI, 17]
 $EZ \times ZA = ZB^2$. et quoniam est

$$ZE : EB = ZB : AB = AZ : AB,$$

permutando est [Eucl. V, 16] $AZ : ZE = AB : BE$.
 et componendo $AE : EZ = AE : EB$ [Eucl. V, 18].
 quare $AE \times EB = ZE \times EA$ [Eucl. VI, 16]. est autem
 ut $AE \times EB : \Gamma E^2$, ita latus transuersum ad rectum
 [prop. XXI]. quare etiam ut $ZE \times EA : \Gamma E^2$, ita
 latus transuersum ad rectum.

ZB · ὥς ἄρα ἡ $Z\Delta$ πρὸς ΔB , ἡ ZB πρὸς BE . ἀνα-
στρέψαντι ἄρα ἐστίν, ὥς ἡ ΔZ πρὸς ZB , ἡ BZ
πρὸς ZE . ἴσον ἄρα ἐστὶ
τὸ ὑπὸ ΔZE τῷ ἀπὸ BZ .

5 ἀλλὰ τὸ μὲν ὑπὸ ΔZE

ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΔEZ

καὶ τῷ ἀπὸ ZE , τὸ δὲ

ἀπὸ BZ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ AEB μετὰ τοῦ ἀπὸ ZE .

κοινὸν ἀφαιρεθέντω τὸ ἀπὸ EZ · λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ


10 ΔEZ λοιπῷ τῷ ὑπὸ AEB ἴσον ἔσται. ὥς ἄρα τὸ

ὑπὸ ΔEZ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓE , οὕτως τὸ ὑπὸ AEB πρὸς

τὸ ἀπὸ ΓE . ἀλλ' ὥς τὸ ὑπὸ AEB πρὸς τὸ ἀπὸ ΓE ,

ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὀρθίαν. ὥς ἄρα τὸ ὑπὸ ΔEZ

πρὸς τὸ ἀπὸ $E\Gamma$, ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὀρθίαν.



λη'.

15

Ἐὰν ὑπερβολῆς ἢ ἐλλείψεως ἢ κύκλου περιφερείας
εὐθεῖα ἐπιφανύουσα συμπίπτῃ τῇ δευτέρᾳ διαμέτρῳ,
καὶ ἀπὸ τῆς ἀφῆς εὐθεῖα καταχθῇ ἐπὶ τὴν αὐτὴν
διάμετρον παράλληλος τῇ ἐτέρᾳ διαμέτρῳ, ἡ ἀπολαμ-
20 βανομένη εὐθεῖα ὑπὸ τῆς κατηγμένης πρὸς τῷ κέντρῳ
τῆς τομῆς μετὰ μὲν τῆς ἀπολαμβανομένης ὑπὸ τῆς
ἐφαπτομένης πρὸς τῷ κέντρῳ τῆς τομῆς ἴσον περιέξει
τῷ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς δευτέρας διαμέτρου τετρα-
γώνῳ, μετὰ δὲ τῆς μεταξὺ τῆς κατηγμένης καὶ τῆς
25 ἐφαπτομένης περιέξει χωρίον λόγον ἔχον πρὸς τὸ ἀπὸ
τῆς κατηγμένης, ὃν ἔχει ἡ ὀρθία τοῦ εἵδους πλευρὰ
πρὸς τὴν πλαγίαν.

3. ἴσον ἄρα ἐστὶ] c; euan. V, rep. mg. m. rec. 4. τῷ
ἀπὸ] c; euan. V, rep. mg. m. rec. 10. λοιπῷ — 11. ΔEZ
om. V; corr. Halley. 15. λη'] p, om. V, m. 2 v. 21. μετὰ

in ellipsi autem et circulo sic: est autem

$$AZ = \frac{1}{2}(AA + AB), \quad ZB = \frac{1}{2}AB.$$

erit igitur $ZA : AB = ZB : BE$. conuertendo igitur est [Eucl. V, 19 coroll.] $AZ : ZB = BZ : ZE$. itaque [Eucl. VI, 17] $AZ \times ZE = BZ^2$. est autem

$$AZ \times ZE = AE \times EZ + ZE^2$$

[Eucl. II, 3] et $BZ^2 = AE \times EB + ZE^2$ [Eucl. II, 5]. auferatur, quod commune est, EZ^2 . itaque erit

$$AE \times EZ = AE \times EB.$$

erit igitur $AE \times EZ : \Gamma E^2 = AE \times EB : \Gamma E^2$ [Eucl. V, 7]. uerum ut $AE \times EB : \Gamma E^2$, ita latus transuersum ad rectum [prop. XXI]. ergo ut

$$AE \times EZ : E\Gamma^2,$$

ita latus transuersum ad rectum.

XXXVIII.

Si recta hyperbolam uel ellipsim uel ambitum circuli contingens cum altera diametro concurrat, et a puncto contactus recta ad eandem diametrum ducitur alteri diametro parallela, recta a recta ita ducta ad centrum sectionis abscisa cum recta a contingenti ad centrum sectionis abscisa spatium comprehendet aequale quadrato dimidia alterius diametri, cum recta autem inter rectam ad diametrum ductam et contingentem posita spatium comprehendet, quod ad quadratum rectae ad diametrum ductae eam rationem habet, quam habet latus rectum figurae ad transuersum.

$\mu\acute{\epsilon}\nu$] c; euan. V, rep. mg. m. rec. 22. $\acute{\epsilon}\varphi\alpha\pi\tau\omicron\mu\acute{\epsilon}\nu\eta\varsigma$] cv;
 $\acute{\epsilon}\varphi\alpha\pi\tau\omicron$ euan., rep. mg. m. rec. V; $\nu\eta\varsigma$ om. in extr. pag.

Apollonius, ed. Heiberg.

ἔστω ὑπερβολὴ ἢ ἔλλειψις ἢ κύκλου περιφέρεια,
ἣς διάμετρος ἡ AHB , δευτέρα δὲ διάμετρος ἡ $ΓΗΔ$,
ἐφαπτομένη δὲ ἔστω τῆς τομῆς ἡ $ΕΑΖ$ συμπίπτουσα
τῇ $ΓΔ$ κατὰ τὸ Z , παράλληλος δὲ ἔστω τῇ $ΑΒ$ ἡ
5 $ΘΕ$. λέγω, ὅτι τὸ ὑπὸ $ZHΘ$ τῷ ἀπὸ $HΓ$ ἔστιν ἴσον,
καὶ ἔστιν ὡς τὸ ὑπὸ $HΘZ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΘΕ$, ἡ ὁρθία
πρὸς τὴν πλαγίαν.

ἦχθω τεταγμένως ἡ ME . ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ
 HMA πρὸς τὸ ἀπὸ ME , ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὁρθίαν.
10 ἀλλ' ἔστιν ὡς ἡ πλαγία ἡ BA πρὸς $ΓΔ$, ἡ $ΓΔ$ πρὸς
τὴν ὁρθίαν· καὶ ὡς ἄρα ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὁρθίαν,
τὸ ἀπὸ AB πρὸς τὸ ἀπὸ $ΓΔ$ · καὶ τὰ τέταρτα, τουτ-
έστι τὸ ἀπὸ HA πρὸς τὸ ἀπὸ $HΓ$ · καὶ ὡς ἄρα τὸ
ὑπὸ HMA πρὸς τὸ ἀπὸ ME , τὸ ἀπὸ HA πρὸς τὸ
15 ἀπὸ $HΓ$. τὸ δὲ ὑπὸ HMA πρὸς τὸ ἀπὸ ME τὸν
συγκείμενον ἔχει λόγον ἔκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ HM πρὸς
 ME , τουτέστι πρὸς $HΘ$, καὶ ἔκ τοῦ ὄν ἔχει ἡ AM
πρὸς ME . ἀνάπαλιν ἄρα ὁ τοῦ ἀπὸ $ΓH$ πρὸς τὸ
ἀπὸ HA λόγος συνῆπται ἔκ τοῦ ὄν ἔχει ἡ EM πρὸς
20 MH , τουτέστιν ἡ $ΘH$ πρὸς HM , καὶ ἔκ τοῦ ὄν ἔχει
ἡ EM πρὸς MA , τουτέστιν ἡ ZH πρὸς HA . τὸ ἄρα
ἀπὸ $HΓ$ πρὸς τὸ ἀπὸ HA τὸν συγκείμενον ἔχει λόγον
ἐκ τοῦ ὄν ἔχει ἡ $ΘH$ πρὸς HM καὶ ἔκ τοῦ ὄν ἔχει
ἡ ZH πρὸς HA , ὅς ἐστιν ὁ αὐτὸς τῷ ὄν ἔχει τὸ ὑπὸ
25 $ZHΘ$ πρὸς τὸ ὑπὸ MHA . ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ $ZHΘ$
πρὸς τὸ ὑπὸ MHA , τὸ ἀπὸ $ΓH$ πρὸς τὸ ἀπὸ HA .
καὶ ἐναλλάξ ἄρα ἔστιν ὡς τὸ ὑπὸ $ZHΘ$ πρὸς τὸ ἀπὸ


3. $ΕΑΖ$] AZ V; corr. Comm. 6. τό] (pr.) cv, ins.
m. 1 V. 10. ἡ BA] scripsi, BA V. πρὸς $ΓΔ$] om. V;
corr. Memus. 14. ὑπὸ] ἀπὸ V; corr. p. 17. ἐκ τοῦ] scripsi,
ἐξ οὗ V. 18. τοῦ] om. V; corr. p. τό] om. V; corr. p.

sit hyperbola uel ellipsis uel ambitus circuli, cuius diametrus sit AHB , altera autem diametrus $\Gamma H\Delta$, et sectionem contingat $E\Delta Z$ cum $\Gamma\Delta$ in Z concurrans, et ΘE rectae AB parallela sit. dico, esse

$$ZH \times H\Theta = H\Gamma^2,$$

et ut $H\Theta \times \Theta Z : \Theta E^2$, ita latus rectum ad transuersum.

ordinate ducatur ME . erit igitur [prop. XXXVII] ut $HM \times MA : ME^2$, ita latus transuersum ad rectum. est autem, ut latus transuersum BA ad $\Gamma\Delta$, ita $\Gamma\Delta$



ad latus rectum [def. alt. 3]. quare etiam, ut latus transuersum ad latus rectum, ita $AB^2 : \Gamma\Delta^2$ [Eucl. V def. 9]; et partes quartae quoque [Eucl. V, 15], h. e. $HA^2 : H\Gamma^2$. quare etiam

$$HM \times MA : ME^2 = HA^2 : H\Gamma^2.$$

est autem

$HM \times MA : ME^2 = (HM : ME) \times (MA : ME)$
 $= (HM : H\Theta) \times (MA : ME)$ [Eucl. I, 34]. itaque e contrario $\Gamma H^2 : HA^2 = (EM : MH) \times (EM : MA)$
 $= (\Theta H : HM) \times (ZH : HA)$ [Eucl. VI, 4]. est autem $(\Theta H : HM) \times (ZH : HA) = ZH \times H\Theta : MH \times HA$. erit igitur $ZH \times H\Theta : MH \times HA = \Gamma H^2 : HA^2$. et permutando [Eucl. V, 16] igitur

$$ZH \times H\Theta : \Gamma H^2 = MH \times HA : HA^2.$$

20. $\acute{\epsilon}\nu\ \tau\omicron\upsilon\tilde{\nu}$] $\acute{\epsilon}\xi\ \omicron\upsilon\tilde{\nu}$ V; corr. Halley. 23. $\acute{\epsilon}\nu\ \tau\omicron\upsilon\tilde{\nu}$] (alt.) scripsi; $\acute{\epsilon}\xi\ \omicron\upsilon\tilde{\nu}$ V.

ΓH , τὸ ὑπὸ MHA πρὸς τὸ ἀπὸ HA . ἴσον δὲ τὸ
ὑπὸ MHA τῷ ἀπὸ HA . ἴσον ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ $ZH\Theta$
τῷ ἀπὸ HG .

πάλιν ἐπεὶ ἐστίν, ὥς ἡ ὀρθία πρὸς τὴν πλαγίαν,
5 τὸ ἀπὸ EM πρὸς τὸ ὑπὸ HMA , καὶ τὸ ἀπὸ EM
πρὸς τὸ ὑπὸ HMA τὸν συγκείμενον ἔχει λόγον ἕκ τε
τοῦ ὃν ἔχει ἡ EM πρὸς HM , τουτέστιν ἡ ΘH πρὸς
 ΘE , καὶ τοῦ ὃν ἔχει ἡ EM πρὸς MA , τουτέστιν ἡ
 ZH πρὸς HA , τουτέστιν ἡ $Z\Theta$ πρὸς ΘE , ὅς ἐστιν ὁ
10 αὐτὸς τῷ ὃν ἔχει τὸ ὑπὸ $Z\Theta H$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘE ,
ὥς ἄρα τὸ ὑπὸ $Z\Theta H$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘE , ἡ ὀρθία πρὸς
τὴν πλαγίαν.

Τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων δεικτέον, ὅτι ἐστίν, ὥς ἡ
μεταξὺ τῆς ἐφαπτομένης καὶ τοῦ πέρατος τῆς διαμέτρου
15 ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῇ κατηγμένη πρὸς τὴν μεταξὺ τῆς ἐφαπ-
τομένης καὶ τῆς δευτέρας διαμέτρου, ἡ μεταξὺ τοῦ
ἐτέρου πέρατος καὶ τῆς κατηγμένης πρὸς τὴν μεταξὺ
τοῦ ἐτέρου πέρατος καὶ τῆς κατηγμένης.

ἐπεὶ γὰρ ἴσον ἐστὶ τὸ ὑπὸ $ZH\Theta$ τῷ ἀπὸ HG ,
20 τουτέστι τῷ ὑπὸ $\Gamma H\Delta$. ἴση γὰρ ἡ ΓH τῇ $H\Delta$. τὸ
ἄρα ὑπὸ $ZH\Theta$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ $\Gamma H\Delta$. ἐστὶν ἄρα
ὥς ἡ ZH πρὸς $H\Delta$, ἡ ΓH πρὸς $H\Theta$. καὶ ἀναστρέ-
ψαντι, ὥς ἡ HZ πρὸς $Z\Delta$, ἡ $H\Gamma$ πρὸς $\Gamma\Theta$. καὶ τὰ
διπλά τῶν ἡγουμένων. ἐστὶ δὲ διπλασία τῆς HZ
25 συναμφοτέρως ἡ ΓZ , $Z\Delta$ διὰ τὸ ἴσην εἶναι τὴν ΓH
τῇ $H\Delta$, τῆς δὲ $H\Gamma$ διπλασία ἡ $\Gamma\Delta$. ὥς ἄρα συναμ-
φοτέρως ἡ $\Gamma Z\Delta$ πρὸς $Z\Delta$, ἡ $\Delta\Gamma$ πρὸς $\Gamma\Theta$. καὶ
διελόντι ὥς ἡ ΓZ πρὸς $Z\Delta$, ἡ $\Delta\Theta$ πρὸς $\Theta\Gamma$. ὁπερ
ἔδει δεῖξαι.

5. καὶ τό — 6. HMA] om. V; corr. Memus. 19. $ZH\Theta$] $Z\Theta H$ V; corr. Memus. 23. HZ] p, Z V, Z H c. 25. Ante

est autem $MH \times HA = HA^2$ [prop. XXXVII]. ergo etiam $ZH \times H\Theta = H\Gamma^2$.

rursus quoniam est, ut latus rectum ad transuersum, ita $EM^2 : HM \times MA$, et $EM^2 : HM \times MA = (EM : HM) \times (EM : MA) = (\Theta H : \Theta E) \times (ZH : HA) = (\Theta H : \Theta E) \times (Z\Theta : \Theta E)$

[Eucl. VI, 4] $= Z\Theta \times \Theta H : \Theta E^2$,

erit, ut $Z\Theta \times \Theta H : \Theta E^2$, ita latus rectum ad transuersum.

Iisdem suppositis demonstrandum, quam rationem habeat recta inter contingentem et terminum diametri ad easdem partes uersus posita, in quibus est recta ordinate ducta, ad rectam inter contingentem et alteram diametrum positam, eam habere rectam inter alterum terminum et rectam ordinate ductam positam ad rectam inter alterum terminum et rectam ordinate ductam positam.

nam quoniam est $ZH \times H\Theta = H\Gamma^2$ [u. lin. 2], h. e. $ZH \times H\Theta = \Gamma H \times HA$ (nam $\Gamma H = HA$), erit [Eucl. VI, 16] $ZH : HA = \Gamma H : H\Theta$. et conuertendo [Eucl. V, 19 coroll.] $ZH : ZA = H\Gamma : \Gamma\Theta$. et praecedentium dupla sumantur [Eucl. V, 15]; est autem $\Gamma Z + ZA = 2HZ$, quia $\Gamma H = HA$, et $\Gamma A = 2H\Gamma$. itaque $\Gamma Z + ZA : ZA = A\Gamma : \Gamma\Theta$. et dirimendo [Eucl. V, 17] $\Gamma Z : ZA = A\Theta : \Theta\Gamma$; quod erat demonstrandum.

Corollarium.

manifestum igitur ex iis, quae diximus, rectam EZ sectionem contingere, siue sit $ZH \times H\Theta = H\Gamma^2$,

$\delta\alpha$ interponitur in extr. lin. .V. in V, cui signo nihil nunc respondet. 26. η ΓA] HA V; corr. p.

φανερὸν δὴ ἐκ τῶν εἰρημένων, ὅτι ἡ EZ ἐφάπτεται τῆς τομῆς, ἐάν τε ἴσον ᾗ τὸ ὑπὸ $ZH\Theta$ τῷ ἀπὸ τῆς $H\Gamma$, ἐάν τε λόγον ἔχῃ τὸ ὑπὸ $Z\Theta H$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘE τὸν εἰρημένον· δειχθήσεται γὰρ ἀντιστρόφως.

5

λθ'.

Ἐὰν ὑπερβολῆς ᾗ ἐλλείψεως ἡ κύκλου περιφερείας εὐθεῖα ἐπιψαύουσα συμπίπτῃ τῇ διαμέτρῳ, καὶ ἀπὸ τῆς ἀφῆς καταχθῇ εὐθεῖα ἐπὶ τὴν διάμετρον τεταγμένως, ἥτις ἂν ληφθῇ τῶν δύο εὐθειῶν, ὧν ἐστὶν ἡ
 10 μὲν μεταξὺ τῆς κατηγμένης καὶ τοῦ κέντρου τῆς τομῆς, ἡ δὲ μεταξὺ τῆς κατηγμένης καὶ τῆς ἐφαπτομένης, ἔξει πρὸς αὐτὴν ἡ κατηγμένη τὸν συγκείμενον λόγον ἐκ τε τοῦ ὃν ἔχει ἡ ἑτέρα τῶν δύο εὐθειῶν πρὸς τὴν κατηγμένην, καὶ ἐκ τοῦ ὃν ἔχει ἡ τοῦ εἰδους ὀρθία
 15 πλευρὰ πρὸς τὴν πλαγίαν.

ἔστω ὑπερβολὴ ἡ ἐλλειψις ἡ κύκλου περιφέρεια, ἥς διάμετρος ἡ AB , κέντρον δὲ αὐτῆς τὸ Z , καὶ ἐφαπτομένη ἡχθῶ τῆς τομῆς ἡ ΓA , καὶ τεταγμένως κατήχθῶ ἡ ΓE . λέγω, ὅτι ἡ ΓE πρὸς τὴν ἑτέραν
 20 τῶν ZE , EA τὸν συγκείμενον ἔχει λόγον ἐκ τε τοῦ ὃν ἔχει ἡ ὀρθία πρὸς τὴν πλαγίαν, καὶ ἐκ τοῦ ὃν ἔχει ἡ ἑτέρα τῶν ZE , EA πρὸς τὴν EF .

ἔστω γὰρ ἴσον τὸ ὑπὸ $ZE A$ τῷ ὑπὸ EF , H . καὶ ἐπεὶ ἐστὶν, ὡς τὸ ὑπὸ $ZE A$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓE , ἡ
 25 πλαγία πρὸς τὴν ὀρθίαν, ἴσον δὲ ἐστὶ τὸ ὑπὸ $ZE A$ τῷ ὑπὸ ΓE , H , ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ ΓE , H πρὸς τὸ ἀπὸ ΓE , τουτέστιν ἡ H πρὸς EF , ἡ πλαγία πρὸς τὴν

3. $Z\Theta H$] $ZH\Theta$ V; corr. Memus. 5. λθ'] p, om. V, m. 2 v.


9. δόο] p, β Vc. 13. ὅν] cp, o e corr. m. 1 V. 14. ἐκ τοῦ] ἐξ οὗ V; corr. Halley. 21. ἐκ τοῦ] ἐξ οὗ V; corr. Halley. 26. τῷ ὑπὸ ΓE , H] om. V; corr. p (τῶν $\epsilon\gamma$ η).

siue $Z\Theta \times \Theta H$ ad ΘE^2 rationem habeat, quam diximus; e contrario enim demonstrabitur.

XXXIX.

Si recta hyperbolam uel ellipsim uel ambitum circuli contingens cum diametro concurrat, et a puncto contactus ad diametrum recta ordinate ducitur, utraque recta sumpta erit, aut quae inter rectam ordinate ductam centrumque sectionis posita est, aut quae inter ordinate ductam contingentemque, recta ordinate ducta ad eam rationem habebit compositam ex ea, quam habet altera rectarum illarum ad ordinate ductam, eaque, quam habet latus rectum figurae ad transuersum.

sit hyperbola uel ellipsis uel ambitus circuli, cuius diametrus sit AB , centrum autem eius sit Z , et ducatur sectionem contingens ΓA , ordinateque ducatur ΓE .



dico, ΓE ad alterutram rectarum ZE , EA rationem habere compositam ex ea, quam habet latus rectum ad transuersum, eaque, quam habet altera rectarum ZE , EA ad EA .

sit enim $ZE \times EA = EA \times H$. et quoniam est [prop. XXXVII], ut $ZE \times EA : \Gamma E^2$, ita latus transuersum ad rectum, et $ZE \times EA = \Gamma E \times H$, erit

ὀρθίαν. καὶ ἐπεὶ ἴσον ἐστὶ τὸ ὑπὸ $ZEΔ$ τῷ ὑπο
 $ΓΕ, H$, ἔστιν ὥς ἡ EZ πρὸς $ΕΓ$, ἡ H πρὸς $ΕΔ$.
καὶ ἐπεὶ ἡ $ΓΕ$ πρὸς $ΕΔ$ τὸν συγκείμενον ἔχει λόγον
ἐκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ $ΓΕ$ πρὸς H καὶ τοῦ ὄν ἔχει ἡ
5 H πρὸς $ΕΔ$, ἀλλ' ἔστιν ὥς μὲν ἡ $ΓΕ$ πρὸς H , ἡ
ὀρθία πρὸς τὴν πλαγίαν, ὥς δὲ ἡ H πρὸς $ΕΔ$, ἡ
 ZE πρὸς $ΕΓ$, ἡ $ΓΕ$ ἄρα πρὸς $ΕΔ$ τὸν συγκείμενον
ἔχει λόγον ἐκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ ὀρθία πρὸς τὴν πλαγίαν
καὶ ἡ ZE πρὸς $ΕΓ$.

10

μ'.

Ἐὰν ὑπερβολῆς ἢ ἐλλείψεως ἢ κύκλου περιφερείας
εὐθεῖα ἐπιψάνουσα συμπίπτῃ τῇ δευτέρᾳ διαμέτρῳ,
καὶ ἀπὸ τῆς ἀφῆς καταχθῇ εὐθεῖα ἐπὶ τὴν αὐτὴν διά-
μετρον παράλληλος τῇ ἑτέρᾳ διαμέτρῳ, ἥτις ἂν ληφθῇ
15 τῶν δύο εὐθειῶν, ὧν ἐστὶν ἡ μὲν μεταξὺ τῆς κατηγ-
μένης καὶ τοῦ κέντρου τῆς τομῆς, ἡ δὲ μεταξὺ τῆς
κατηγμένης καὶ τῆς ἐφαπτομένης, ἔξει πρὸς αὐτὴν ἡ
κατηγμένη τὸν συγκείμενον λόγον ἐκ τε τοῦ ὄν ἔχει
ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὀρθίαν, καὶ ἐκ τοῦ ὄν ἔχει ἡ ἑτέρα
20 τῶν δύο εὐθειῶν πρὸς τὴν κατηγμένην.

ἔστω ὑπερβολῆς ἢ ἑλλειψιδ ἢ κύκλου περιφέρεια ἡ
 AB , διάμετρος δὲ αὐτῆς ἡ $BZΓ$, δευτέρα δὲ ἡ $ΔZE$,
καὶ ἐφαπτομένη ἡ $ΘΑΑ$, καὶ τῇ $BΓ$ παράλληλος
ἡ $ΑΗ$. λέγω, ὅτι ἡ $ΑΗ$ πρὸς τὴν ἑτέραν τῶν $ΘΗ, ΖΗ$
25 τὸν συγκείμενον ἔχει λόγον ἐκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ πλα-
γία πρὸς τὴν ὀρθίαν καὶ ἡ ἑτέρα τῶν $ΘΗ, ΖΗ$ πρὸς
τὴν $ΗΑ$.

2. $H]$ (pr.) $Δ V$; corr. p. 6. $Δ E]$ $Δ EΓ$ uel $Δ EΔ V$,
 $Δ EΔ c$; corr. p. 10. $μ']$ p, om. V, m. 2 v. 17. $ἔξει]$ om. V;
corr. Memus. 19. $ἐκ τοῦ]$ scripsi; $ἐξ οὗ V$. 23. $BΓ]$ $ΑΓ V$;
corr. p (B e corr.).

ut $\Gamma E \times H : \Gamma E^2$, h. e. ut $H : E\Gamma$, ita latus transuersum ad rectum. et quoniam est

$$ZE \times EA = \Gamma E \times H,$$


erit [Eucl. VI, 16] $EZ : E\Gamma = H : EA$. et quoniam est $\Gamma E : EA = (\Gamma E : H) \times (H : EA)$, et est, ut $\Gamma E : H$, ita latus rectum ad transuersum, et

$$H : AE = ZE : E\Gamma,$$

$\Gamma E : EA$ rationem habet compositam ex ea, quam habet latus rectum ad transuersum, eaque, quam habet ZE ad $E\Gamma$.

XL.

Si recta hyperbolam uel ellipsim uel ambitum circuli contingens cum altera diametro concurrat, et a puncto contactus recta ad eandem diametrum ducitur alteri diametro parallela, utracunque recta sumpta erit, aut quae inter rectam ad diametrum ductam centrumque sectionis posita est, aut quae inter rectam illam contingentemque est, ad eam recta ad diametrum ducta rationem habebit compositam ex ea, quam habet latus transuersum ad rectum, eaque, quam habet altera rectarum illarum ad rectam ad diametrum ductam.



sit hyperbola uel ellipsis uel ambitus circuli AB , diametrus autem eius $BZ\Gamma$ et diametrus altera AZE , ducaturque contingens ΘAA et rectae $B\Gamma$ parallela

ἔστω τῷ ὑπὸ ΘHZ ἴσον τὸ ὑπὸ HA, K . καὶ ἐπεὶ
 ἔστιν, ὥς ἡ ὀρθία πρὸς τὴν πλαγίαν, τὸ ὑπὸ ΘHZ
 πρὸς τὸ ἀπὸ HA , τῷ δὲ ὑπὸ ΘHZ ἴσον τὸ ὑπὸ
 HA, K , καὶ τὸ ὑπὸ HA, K ἄρα πρὸς τὸ ἀπὸ HA ,
 5 τουτέστιν ἡ K πρὸς AH , ἔστιν ὥς ἡ ὀρθία πρὸς τὴν
 πλαγίαν. καὶ ἐπεὶ ἡ AH πρὸς HZ τὸν συγκείμενον
 ἔχει λόγον ἔκ τε τοῦ ὅν ἔχει ἡ AH πρὸς K καὶ ἔκ
 τοῦ ὅν ἔχει ἡ K πρὸς HZ , ἀλλ' ὥς μὲν ἡ HA πρὸς
 K , ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὀρθίαν, ὥς δὲ ἡ K πρὸς HZ ,
 10 ἡ ΘH πρὸς HA διὰ τὸ ἴσον εἶναι τὸ ὑπὸ ΘHZ τῷ
 ὑπὸ AH, K , ἡ AH ἄρα πρὸς HZ τὸν συγκείμενον
 ἔχει λόγον ἔκ τε τοῦ ὅν ἔχει ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὀρθίαν,
 καὶ ἔκ τοῦ ὅν ἔχει ἡ $H\Theta$ πρὸς HA .

μα'.

15 Ἐὰν ἐν ὑπερβολῇ ἢ ἐλλείψει ἡ κύκλου περιφερεία
 εὐθεῖα καταχθῇ τεταγμένως ἐπὶ τὴν διάμετρον, καὶ
 ἀπὸ τε τῆς τεταγμένης καὶ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου ἀνα-
 γραφῇ εἶδη παραλληλόγραμμα ἰσογώνια, ἔχῃ δὲ ἡ
 καταγμένη πλευρὰ πρὸς τὴν λοιπὴν τοῦ εἶδους πλευρὰν
 20 τὸν συγκείμενον λόγον ἔκ τε τοῦ ὅν ἔχει ἡ ἐκ τοῦ
 κέντρου πρὸς τὴν λοιπὴν τοῦ εἶδους πλευρὰν, καὶ ἔκ
 τοῦ ὅν ἔχει ἡ τοῦ εἶδους τῆς τομῆς ὀρθία πλευρὰ
 πρὸς τὴν πλαγίαν, τὸ ἀπὸ τῆς μεταξὺ τοῦ κέντρου
 καὶ τῆς καταγμένης εἶδος τὸ ὅμοιον τῷ ἀπὸ τῆς ἐκ
 25 τοῦ κέντρου εἶδει ἐπὶ μὲν τῆς ὑπερβολῆς μείζον ἔστι
 τοῦ ἀπὸ τῆς καταγμένης εἶδους τῷ ἀπὸ τῆς ἐκ τοῦ
 κέντρου εἶδει, ἐπὶ δὲ τῆς ἐλλείψεως καὶ τῆς τοῦ κύκλου

1. ΘHZ] ΘZH V; corr. p (τῶν $\Theta H, HZ$). 7. ἐκ τοῦ]
 ἐξ οὗ V; corr. Halley. 13. ἐκ τοῦ] ἐξ οὗ V; corr. Halley.
 14. μα'] p, om. V, m. 2 v. 21. τήν] p, om. V. λοιπὴν τήν c.
 ἐκ τοῦ] ἐξ οὗ V; corr. Halley.

AH. dico, *AH* ad alterutram rectarum *ΘH*, *ZH* rationem habere compositam ex ea, quam habet latus transuersum ad rectum, eaque, quam habet altera rectarum *ΘH*, *ZH* ad *HA*.

sit $HA \times K = \Theta H \times HZ$. et quoniam est, ut latus rectum ad transuersum, ita $\Theta H \times HZ : HA^2$ [prop. XXXVIII], et $HA \times K = \Theta H \times HZ$, erit etiam, ut $HA \times K : HA^2$, h. e. ut $K : AH$, ita latus rectum ad transuersum. et quoniam est

$$AH : HZ = (AH : K) \times (K : HZ),$$

et ut $HA : K$, ita latus transuersum ad rectum, et $K : HZ = \Theta H : HA$, quia $\Theta H \times HZ = AH \times K$ [Eucl. VI, 16], $AH : HZ$ rationem habet compositam ex ea, quam habet latus transuersum ad rectum, eaque, quam habet $H\Theta$ ad HA .

XLI.

Si in hyperbola uel ellipsi uel ambitu circuli recta ad diametrum ordinate ducitur, et in recta ordinate ducta radioque figurae parallelogrammae aequiangularae describuntur, latus autem ordinate ductum ad reliquum latus figurae rationem habet compositam ex ea, quam habet radius ad reliquum latus figurae, eaque, quam habet latus rectum figurae sectionis ad transuersum, figura in recta inter centrum rectaque ordinate ductam posita descripta similis figurae in radio descriptae in hyperbola excedit figuram in ordinate ducta descriptam figura in radio descripta, in ellipsi uero ambituque circuli adiuncta figura in ordinate ducta descripta aequalis est figurae in radio descriptae.


περιφερείας μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς κατηγμένης εἰδους ἴσον
ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου εἶδει.

ἔστω ὑπερβολὴ ἢ ἑλλειψις ἢ κύκλου περιφέρεια, ἥς
διάμετρος ἡ AB , κέντρον δὲ τὸ E , καὶ τεταγμένως
5 κατήχθω ἡ $ΓΔ$, καὶ ἀπὸ τῶν EA , $ΓΔ$ ἰσογώνια εἶδη
ἀναγεγράφθω τὰ AZ , $ΔH$, καὶ ἡ $ΓΔ$ πρὸς τὴν $ΓH$
τὸν συγκείμενον ἔχέτω λόγον ἐκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ AE
πρὸς EZ , καὶ ἐκ τοῦ ὄν ἔχει ἡ ὀρθία πρὸς τὴν πλα-
γίαν. λέγω, ὅτι ἐπὶ μὲν τῆς ὑπερβολῆς τὸ ἀπὸ τῆς EA
10 εἶδος τὸ ὅμοιον τῷ AZ ἴσον ἐστὶ τοῖς AZ , $HΔ$, ἐπὶ
δὲ τῆς ἑλλείψεως καὶ τοῦ κύκλου τὸ ἀπὸ τῆς EA
ὅμοιον τῷ AZ μετὰ τοῦ $HΔ$ ἴσον ἐστὶ τῷ AZ .

πεποιήσθω γάρ, ὥς ἡ ὀρθία πρὸς τὴν πλαγίαν,
ἡ $ΔΓ$ πρὸς $ΓΘ$. καὶ ἐπεὶ ἐστίν, ὥς ἡ $ΔΓ$ πρὸς $ΓΘ$,
15 ἡ ὀρθία πρὸς τὴν πλαγίαν, ἀλλ' ὥς ἡ $ΔΓ$ πρὸς $ΓΘ$,
τὸ ἀπὸ τῆς $ΔΓ$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $ΔΓΘ$, ὥς δὲ ἡ
ὀρθία πρὸς τὴν πλαγίαν, τὸ ἀπὸ $ΔΓ$ πρὸς τὸ ὑπὸ
 $BΔA$, ἴσον ἄρα τὸ ὑπὸ $BΔA$ τῷ ὑπὸ $ΔΓΘ$. καὶ
ἐπεὶ ἡ $ΔΓ$ πρὸς $ΓH$ τὸν συγκείμενον ἔχει λόγον ἐκ
20 τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ AE πρὸς EZ καὶ τοῦ ὄν ἔχει ἡ
ὀρθία πρὸς τὴν πλαγίαν, τουτέστιν ἡ $ΔΓ$ πρὸς $ΓΘ$,
ἔτι δὲ ἡ $ΔΓ$ πρὸς $ΓH$ τὸν συγκείμενον ἔχει λόγον
ἐκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ $ΔΓ$ πρὸς $ΓΘ$ καὶ ἐκ τοῦ ὄν ἔχει
ἡ $ΘΓ$ πρὸς $ΓH$, ὁ ἄρα συγκείμενος λόγος ἐκ τε τοῦ
25 ὄν ἔχει ἡ AE πρὸς EZ καὶ ἐκ τοῦ ὄν ἔχει ἡ $ΔΓ$
πρὸς $ΓΘ$ ὁ αὐτός ἐστι τῷ συγκειμένῳ λόγῳ ἐκ τε τοῦ
ὄν ἔχει ἡ $ΔΓ$ πρὸς $ΓΘ$ καὶ ἐκ τοῦ ὄν ἔχει ἡ $ΘΓ$
πρὸς $ΓH$. κοινὸς ἀφηρήσθω ὁ τῆς $ΓΔ$ πρὸς $ΓΘ$.

8. ἐκ τοῦ] ἐξ οὗ V; corr. Halley. 13. πεποιείσθω V;
corr. p. 23. ἐκ τοῦ] ἐξ οὗ V; corr. Halley. 25. ἐκ τοῦ]
ἐξ οὗ V; corr. Halley. 27. ἐκ τοῦ] ἐξ οὗ V; corr. Halley.

sit hyperbola uel ellipsis uel ambitus circuli, cuius diametrus sit AB , centrum autem E , et ordinate ducatur ΓA , et in EA , ΓA figurae aequiangularae describantur AZ , ΔH , rationemque habeat $\Gamma A : \Gamma H$ compositam ex ea, quam habet $AE : EZ$, eaque, quam



habet latus rectum ad transuersum. dico, in hyperbola figuram in EA descriptam similem figurae AZ aequalem esse figuris $AZ + H\Delta$, in ellipsi autem et circulo figuram in EA descriptam figurae AZ similem adiuncta figura $H\Delta$ aequalem esse figurae AZ .

fiat enim, ut latus rectum ad transuersum, ita $\Delta\Gamma$ ad $\Gamma\Theta$. et quoniam est, ut $\Delta\Gamma : \Gamma\Theta$, ita latus rectum ad transuersum, est autem $\Delta\Gamma : \Gamma\Theta = \Delta\Gamma^2 : \Delta\Gamma \times \Gamma\Theta$, et ut latus rectum ad transuersum, ita $\Delta\Gamma^2$ ad $BA \times \Delta A$ [prop. XXI], erit $BA \times \Delta A = \Delta\Gamma \times \Gamma\Theta$ [Eucl. V, 9]. et quoniam $\Delta\Gamma : \Gamma H$ rationem habet compositam ex ea, quam habet $AE : EZ$, eaque, quam habet latus rectum ad transuersum, h. e. $\Delta\Gamma : \Gamma\Theta$, et praeterea est $\Delta\Gamma : \Gamma H = (\Delta\Gamma : \Gamma\Theta) \times (\Theta\Gamma : \Gamma H)$, erit $(AE : EZ) \times (\Delta\Gamma : \Gamma\Theta) = (\Delta\Gamma : \Gamma\Theta) \times (\Theta\Gamma : \Gamma H)$. auferatur, quae communis est, ratio $\Gamma A : \Gamma\Theta$. itaque $AE : EZ = \Theta\Gamma : \Gamma H$. est autem

$$\Theta\Gamma : \Gamma H = \Theta\Gamma \times \Gamma A : H\Gamma \times \Gamma A,$$

- λοιπὸς ἄρα ὁ τῆς AE πρὸς EZ λόγος λοιπὸν τῷ τῆς
 $\Theta\Gamma$ πρὸς ΓH λόγῳ ἐστὶν ὁ αὐτός. ἀλλ' ὥς μὲν ἡ $\Theta\Gamma$
 πρὸς ΓH , τὸ ὑπὸ $\Theta\Gamma A$ πρὸς τὸ ὑπὸ $H\Gamma A$, ὥς δὲ
 ἡ AE πρὸς EZ , τὸ ἀπὸ AE πρὸς τὸ ὑπὸ AEZ . ὥς
 5 ἄρα τὸ ὑπὸ $\Theta\Gamma A$ πρὸς τὸ ὑπὸ $H\Gamma A$, τὸ ἀπὸ EA
 πρὸς τὸ ὑπὸ AEZ . τὸ δὲ ὑπὸ $\Theta\Gamma A$ ἴσον ἐδείχθη τῷ
 ὑπὸ BAA . ὥς ἄρα τὸ ὑπὸ BAA πρὸς τὸ ὑπὸ $H\Gamma A$,
 τὸ ἀπὸ AE πρὸς τὸ ὑπὸ AEZ . ἐναλλάξ, ὥς τὸ ὑπὸ
 BAA πρὸς τὸ ἀπὸ AE , τὸ ὑπὸ $H\Gamma A$ πρὸς τὸ ὑπὸ
 10 AEZ . ὥς δὲ τὸ ὑπὸ $H\Gamma A$ πρὸς τὸ ὑπὸ AEZ , τὸ ΔH
 παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ ZA . ἰσογώνια γάρ ἐστι
 καὶ λόγον ἔχει τὸν συγκείμενον ἐκ τῶν πλευρῶν τῆς
 $H\Gamma$ πρὸς AE καὶ τῆς ΓA πρὸς EZ . καὶ ὥς ἄρα τὸ
 ὑπὸ BAA πρὸς τὸ ἀπὸ EA , τὸ HA πρὸς AZ .
- 15 λεκτέον τοίνυν ἐπὶ μὲν τῆς ὑπερβολῆς· [ὥς πάντα
 πρὸς πάντα, ἐν πρὸς ἔν] ὥς ἄρα τὸ ὑπὸ BAA μετὰ
 τοῦ ἀπὸ AE πρὸς τὸ ἀπὸ AE , τουτέστι τὸ ἀπὸ ΔE
 πρὸς τὸ ἀπὸ EA , οὕτως τὰ HA , AZ πρὸς τὸ AZ .
 ὥς δὲ τὸ ἀπὸ EA πρὸς τὸ ἀπὸ EA , οὕτως τὸ ἀπὸ EA
 20 εἶδος τὸ ὅμοιον καὶ ὁμοίως ἀναγεγραμμένον τῷ AZ
 πρὸς τὸ AZ . ὥς ἄρα τὰ HA , AZ πρὸς τὸ AZ , οὕτως
 τὸ ἀπὸ EA εἶδος ὅμοιον τῷ AZ πρὸς τὸ AZ . τὸ
 ἀπὸ EA ἄρα εἶδος τὸ ὅμοιον τῷ AZ ἴσον ἐστὶ τοῖς
 HA , AZ .
- 25 ἐπὶ δὲ τῆς ἐλλείψεως καὶ τῆς τοῦ κύκλου περι-
 φερείας ἐροῦμεν· ἐπεὶ οὖν ὥς ὅλον ἐστὶ τὸ ἀπὸ AE
 πρὸς ὅλον τὸ AZ , οὕτως ἀφαιρεθὲν τὸ ὑπὸ AAB
 πρὸς ἀφαιρεθὲν τὸ ΔH , καὶ λοιπὸν ἐστὶ πρὸς λοιπόν,
 ὥς ὅλον πρὸς ὅλον. ἀπὸ δὲ τοῦ ἀπὸ EA ἐὼν ἀφ-

15. ὥς πάντα — 16. ἐν] falsa sunt; debuit enim συνθέντι
 dici; del. Comm. in notis fol. 30^v. 17. τουτέστι — 18. EA]

$AE : EZ = AE^2 : AE \times EZ$. itaque erit

$$\odot \Gamma \times \Gamma \Delta : H\Gamma \times \Gamma \Delta = EA^2 : AE \times EZ.$$

demonstrauimus autem, esse $\odot \Gamma \times \Gamma \Delta = B\Delta \times \Delta A$.
erit igitur $B\Delta \times \Delta A : H\Gamma \times \Gamma \Delta = AE^2 : AE \times EZ$.
permutando [Eucl. V, 16]

$$B\Delta \times \Delta A : AE^2 = H\Gamma \times \Gamma \Delta : AE \times EZ.$$

est autem $H\Gamma \times \Gamma \Delta : AE \times EZ = \Delta H : ZA$
[Eucl. VI, 23]; nam parallelogramma aequiangula sunt
et rationem habent ex lateribus compositam $H\Gamma : AE$
et $\Gamma \Delta : EZ$. quare etiam $B\Delta \times \Delta A : EA^2 = H\Delta : AZ$.

dicendum igitur in hyperbola:

$$B\Delta \times \Delta A + AE^2 : AE^2 = H\Delta + AZ : AZ$$

[Eucl. V, 18], h. e. [Eucl. II, 6]

$$\Delta E^2 : EA^2 = H\Delta + AZ : AZ.$$

est autem, ut $EA^2 : EA^2$, ita figura in $E\Delta$ similis et
similiter descripta figurae AZ ad AZ [Eucl. VI, 20
coroll.]. itaque ut $H\Delta + AZ : AZ$, ita figura in $E\Delta$
descripta figurae AZ similis ad AZ . ergo figura in
 $E\Delta$ descripta figurae AZ similis figuris $H\Delta + AZ$
aequalis est.

in ellipsi uero et ambitu circuli dicemus: quoniam
est $AE^2 : AZ = A\Delta \times \Delta B : \Delta H$ [Eucl. V, 16], erit
etiam, ut totum ad totum, ita reliquum ad reliquum
[Eucl. V, 19]. sin ab EA^2 aufertur $B\Delta \times \Delta A$, relin-
quitur ΔE^2 [Eucl. II, 5]. itaque

$$\Delta E^2 : AZ \div \Delta H = AE^2 : AZ.$$

est autem, ut $AE^2 : AZ$, ita ΔE^2 ad figuram in ΔE

bis V (altero loco $E\Delta$ pro ΔE); corr. p. 23. $E\Delta$] EZ V;
corr. p ($\tau\eta\varsigma$ $E\Delta$).

αιρεθῇ τὸ ὑπὸ $B\Delta A$, λοιπὸν ἐστὶ τὸ ἀπὸ ΔE · ὥς
 ἄρα τὸ ἀπὸ ΔE πρὸς τὴν ὑπεροχὴν, ἣν ὑπερέχει τὸ
 AZ τοῦ ΔH , οὕτως τὸ ἀπὸ ΔE πρὸς τὸ AZ . ἀλλ'
 ὥς τὸ ἀπὸ ΔE πρὸς τὸ AZ , οὕτως τὸ ἀπὸ ΔE πρὸς
 5 τὸ ἀπὸ ΔE εἶδος ὅμοιον τῷ AZ · ὥς ἄρα τὸ ἀπὸ ΔE
 πρὸς τὴν ὑπεροχὴν, ἣν ὑπερέχει τὸ AZ τοῦ ΔH ,
 οὕτως τὸ ἀπὸ ΔE πρὸς τὸ ἀπὸ ΔE εἶδος τὸ ὅμοιον
 τῷ AZ . ἴσον ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ΔE εἶδος ὅμοιον τῷ
 AZ τῇ ὑπεροχῇ, ἣν ὑπερέχει τὸ AZ τοῦ ΔH . μετὰ
 10 τοῦ ΔH ἄρα ἴσον ἐστὶ τῷ AZ .

μβ'.

Ἐὰν παραβολῆς εὐθεΐα ἐπιψαύουσα συμπύπτῃ τῇ
 διαμέτρῳ, καὶ ἀπὸ τῆς ἀφῆς εὐθεΐα καταχθῇ ἐπὶ τὴν
 διάμετρον τεταγμένως, ληφθέντος δέ τινος ἐπὶ τῆς τομῆς
 15 σημείου καταχθῶσιν ἐπὶ τὴν διάμετρον δύο εὐθεΐαι,
 καὶ ἡ μὲν αὐτῶν παρὰ τὴν ἐφαπτομένην, ἡ δὲ παρὰ τὴν
 ἀπὸ τῆς ἀφῆς κατηγμένην, τὸ γινόμενον ὑπ' αὐτῶν τρί-
 γωνον ἴσον ἐστὶ τῷ περιεχομένῳ παραλληλογράμῳ ὑπό
 τε τῆς ἀπὸ τῆς ἀφῆς κατηγμένης καὶ τῆς ἀπολαμβανο-
 20 μένης ὑπὸ τῆς παραλλήλου πρὸς τῇ κορυφῇ τῆς τομῆς.

ἔστω παραβολή, ἥς διάμετρος ἡ AB , καὶ ἥχθω
 ἐφαπτομένη τῆς τομῆς ἡ AG , καὶ τεταγμένως κατήχθω
 ἡ $\Gamma\Theta$, καὶ ἀπὸ τινος σημείου τυχόντος κατήχθω ἡ AZ ,
 καὶ διὰ μὲν τοῦ A τῇ AG παράλληλος ἥχθω ἡ ΔE ,
 25 διὰ δὲ τοῦ Γ τῇ BZ ἡ ΓH , διὰ δὲ τοῦ B τῇ $\Theta\Gamma$
 ἡ BH . λέγω, ὅτι τὸ ΔEZ τρίγωνον ἴσον ἐστὶ τῷ HZ
 παραλληλογράμῳ.

ἐπεὶ γὰρ τῆς τομῆς ἐφάπτεται ἡ AG , καὶ τεταγμένως

2. ἄρα] ἄρα οὖν V; corr. Halley. ἡ p, Halley. 3. τό]
 (pr.) τοῦ V; corr. p. AZ] $\epsilon\nu$, α $\alpha\xi$ V, mg. α m. rec.

descriptam figurae AZ similem [Eucl. VI, 20 coroll.; V, 16]. quare ut $\Delta E^2 : AZ \div \Delta H$, ita ΔE^2 ad figuram in ΔE descriptam figurae AZ similem. itaque figura in ΔE descripta figurae AZ similis aequalis est differentiae $AZ \div \Delta H$ [Eucl. V, 9]. ergo adiuncta figura ΔH figurae AZ aequalis est.

XLII.

Si recta parabolam contingens cum diametro concurrat, et a puncto contactus recta ad diametrum ordinate ducitur, sumpto autem in sectione puncto aliquo ad diametrum ducuntur duae rectae, altera contingenti, altera rectae a puncto contactus ordinate ductae parallela, triangulus ab his effectus aequalis est parallelogrammo comprehenso recta a puncto contactus ordinate ducta rectaque a parallela ad uerticem sectionis abscisa.

sit parabola, cuius diametrus sit AB , et sectionem contingens ducatur AG , ordinateque ducatur $\Gamma\Theta$, et a puncto aliquo ducatur AZ , ducaturque per Δ rectae AG parallela ΔE , per Γ autem rectae BZ parallela ΓH , per B autem rectae $\Theta\Gamma$ parallela BH . dico, esse $\Delta EZ = HZ$.

nam quoniam AG sectionem contingit, et $\Gamma\Theta$ ordinate ducta est, erit [prop. XXXV] $AB = B\Theta$. itaque $A\Theta = 2\Theta B$. quare $A\Theta\Gamma = B\Gamma$

6. $\frac{1}{2}$ Halley. 9. $\frac{1}{2}$ p, Halley. 10. $\alpha\theta\alpha$] addidi; om. V; ante $\mu\epsilon\tau\alpha$ lin. 9 add. $\tau\omicron \alpha\theta\alpha \alpha\pi\omicron \Delta E \epsilon\iota\delta\omicron\varsigma \tau\omicron \delta\omicron\mu\omicron\iota\omicron\nu \tau\tilde{\omega} AZ$ Halley cum Memo. 11. $\mu\beta'$] p, om. V, m. 2 v. 12. $\pi\alpha\theta\alpha\beta\omicron\lambda\tilde{\eta}$ V; corr. Halley. 14. $\epsilon\pi\iota \tau\tilde{\eta}\varsigma$] c, insert. m. 1 V.

κατῆκται ἡ $\Gamma\Theta$, ἴση ἐστὶν ἡ AB τῇ $B\Theta$. διπλασία
 ἄρα ἐστὶν ἡ $A\Theta$ τῆς ΘB . τὸ $A\Theta\Gamma$ ἄρα τρίγωνον
 τῷ $B\Gamma$ παραλληλογράμῳ ἐστὶν ἴσον. καὶ ἐπεὶ ἐστίν,
 ὥς τὸ ἀπὸ $\Gamma\Theta$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔZ , ἡ ΘB πρὸς BZ διὰ
 5 τὴν τομήν, ἀλλ' ὥς μὲν τὸ ἀπὸ $\Gamma\Theta$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔZ ,
 τὸ $A\Gamma\Theta$ τρίγωνον πρὸς τὸ $E\Delta Z$ τρίγωνον, ὥς δὲ ἡ
 ΘB πρὸς BZ , τὸ $H\Theta$ παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ HZ
 παραλληλόγραμμον, ἐστὶν ἄρα ὥς τὸ $A\Gamma\Theta$ τρίγωνον
 πρὸς τὸ $E\Delta Z$ τρίγωνον, τὸ ΘH παραλληλόγραμμον
 10 πρὸς τὸ ZH παραλληλόγραμμον. ἐναλλάξ ἄρα ἐστίν,
 ὥς τὸ $A\Theta\Gamma$ τρίγωνον πρὸς τὸ $B\Gamma$ παραλληλόγραμμον,
 τὸ $E\Delta Z$ τρίγωνον πρὸς τὸ HZ παραλληλόγραμμον.
 ἴσον δὲ τὸ $A\Gamma\Theta$ τρίγωνον τῷ $H\Theta$ παραλληλογράμῳ·
 ἴσον ἄρα ἐστὶ τὸ $E\Delta Z$ τρίγωνον τῷ HZ παραλληλο-
 15 γράμῳ.

μγ'.

Ἐὰν ὑπερβολῆς ἢ ἐλλείψεως ἡ κύκλου περιφερείας
 εὐθεΐα ἐπιφανύουσα συμπίπτῃ τῇ διαμέτρῳ, καὶ ἀπὸ τῆς
 ἀφῆς καταχθῇ εὐθεΐα τεταγμένως ἐπὶ τὴν διάμετρον,
 20 καὶ ταύτῃ διὰ τῆς κορυφῆς παράλληλος ἀχθῇ συμ-
 πύπτουσα τῇ διὰ τῆς ἀφῆς καὶ τοῦ κέντρου ἡγμένη
 εὐθείᾳ, ληφθέντος δὲ τινος σημείου ἐπὶ τῆς τομῆς
 ἀχθῶσι δύο εὐθεΐαι ἐπὶ τὴν διάμετρον, ὧν ἡ μὲν
 παρὰ τὴν ἐφαπτομένην, ἡ δὲ παρὰ τὴν ἀπὸ τῆς ἀφῆς
 25 κατηγμένην, τὸ γινόμενον ὑπ' αὐτῶν τρίγωνον ἐπὶ τῆς
 ὑπερβολῆς, οὗ ἀποτεμένει τριγώνου ἢ διὰ τοῦ κέντρου
 καὶ τῆς ἀφῆς, ἔλασσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ἐκ τοῦ κέν-
 τρου τῷ ὁμοίῳ τῷ ἀποτεμνομένῳ, ἐπὶ δὲ τῆς ἐλλείψεως
 καὶ τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας μετὰ τοῦ ἀποτεμνο-

2. ΘB] $\tau\theta\beta$ V; corr. p. 7. πρὸς τὸ HZ παραλληλόγραμ-
 μον] om. V; corr. p. 10. πρὸς] τῆς πρὸς V; corr. p.

[Eucl. I, 41]. et quoniam est $\Gamma\Theta^2 : \Delta Z^2 = \Theta B : BZ$
 proper sectionem [prop. XX], et

$$\Gamma\Theta^2 : \Delta Z^2 = A\Gamma\Theta : E\Delta Z \text{ [Eucl. VI, 19],}$$

$$\Theta B : BZ = H\Theta : HZ \text{ [Eucl. VI, 1],}$$

erit

$$A\Gamma\Theta : E\Delta Z = \Theta H : ZH.$$

permutando igitur [Eucl. V, 16]

$$A\Theta\Gamma : B\Gamma = E\Delta Z : HZ.$$

est autem $A\Gamma\Theta = H\Theta$. ergo $E\Delta Z = HZ$.

XLIII.

Si recta hyperbolam uel ellipsim uel ambitum circuli contingens cum diametro concurrit, et a puncto contactus recta ad diametrum ordinate ducitur, per uerticem autem huic parallela ducitur recta cum recta per punctum contactus centrumque ducta concurrens, et sumpto in sectione puncto aliquo duae rectae ad diametrum ducuntur, quarum altera rectae contingenti, altera rectae a puncto contactus ordinate ductae parallela est, triangulus ab his effectus in hyperbola triangulo a recta per centrum punctumque contactus ducta absciso minor erit triangulo in radio descripto simili triangulo illi absciso, in ellipsi autem ambituque circuli adiuncto triangulo ad centrum absciso aequalis erit triangulo in radio descripto simili triangulo illi absciso.

12. $\tau\acute{o}$ (pr.) — $\pi\alpha\rho\alpha\lambda\lambda\eta\lambda\acute{o}\gamma\epsilon\alpha\mu\mu\omicron\nu$] om. V; corr. p ($\sigma\acute{\upsilon}\tau\omega\ \tau\acute{o}$).
 16. $\mu\gamma$] p, om. V, m. 2 v. 26. η] η V; corr. p. 27. $\tau\phi$] $\tau\omicron\upsilon$ V; corr. p („ei“ Memus).

μένου πρὸς τῷ κέντρῳ τριγώνου ἴσον ἔσται τῷ ἀπὸ
τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τριγώνου ὁμοίῳ τῷ ἀποτεμνομένῳ.

ἔστω ὑπερβολὴ ἢ ἑλλειψις ἢ κύκλου περιφέρεια, ἥς
διάμετρος ἡ AB , κέντρον δὲ τὸ Γ , καὶ ἤχθῃ ἐφαπτο-
5 μένη τῆς τομῆς ἡ AE , καὶ ἐπεζεύχθῃ ἡ $ΓE$, καὶ
τεταγμένως κατήχθῃ ἡ EZ , καὶ εἰλήφθῃ τι σημεῖον
ἐπὶ τῆς τομῆς τὸ H , καὶ τῇ ἐφαπτομένῃ παραάλληλος
ἤχθῃ ἡ $HΘ$, καὶ τεταγμένως κατήχθῃ ἡ HK , διὰ δὲ
τοῦ B τεταγμένως ἀνήχθῃ ἡ BA . λέγω, ὅτι τὸ KMG
10 τρίγωνον τοῦ $ΓAB$ τριγώνου διαφέρει τῷ $HKΘ$ τρι-
γώνῳ.


ἐπεὶ γὰρ ἐφάπτεται μὲν ἡ EA , κατηγμένη δὲ ἐστὶν
ἡ EZ , ἡ EZ πρὸς ZA τὸν συγκείμενον ἔχει λόγον
ἐκ τοῦ τῆς $ΓZ$ πρὸς ZE καὶ τῆς ὀρθίας πρὸς τὴν
15 πλαγίαν. ἀλλ' ὥς μὲν ἡ EZ πρὸς ZA , ἡ HK πρὸς
 $KΘ$, ὥς δὲ ἡ $ΓZ$ πρὸς ZE , ἡ $ΓB$ πρὸς BA . ἔξει
ἄρα ἡ HK πρὸς $KΘ$ τὸν συγκείμενον λόγον ἐκ τοῦ
τῆς $BΓ$ πρὸς BA καὶ τῆς ὀρθίας πρὸς τὴν πλαγίαν.
καὶ διὰ τὰ δεδειγμένα ἐν τῷ τεσσαρακοστῷ πρώτῳ
20 θεωρήματι τὸ $ΓKM$ τρίγωνον τοῦ $BΓA$ τριγώνου
διαφέρει τῷ $HΘK$ καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν διπλασίων αὐτῶν
παραλληλογράμμων τὰ αὐτὰ δέδεικται.

μδ'.

Ἐὰν μιᾶς τῶν ἀντικειμένων εὐθεΐα ἐπιψάουσα
25 συμπίπτῃ τῇ διαμέτρῳ, καὶ ἀπὸ τῆς ἀφῆς καταχθῇ τις
εὐθεΐα τεταγμένως ἐπὶ τὴν διάμετρον, καὶ ταύτῃ διὰ

8. HK] scripsi; HKM V, KHM p. 10. τῷ] ὡς sequente
macula (fort. littera v macula obscurata) V, τῶν v; τῷ p.c.
22. τὰ] om. V; corr. Memus. 23. μδ'] p, om. V, m. 2 v.
25. ἀπό] c, corr. ex ὑπό m. 1 V. τῆς] c, σ euan. V.

sit hyperbola uel ellipsis uel ambitus circuli, cuius diametrus sit AB , centrum autem Γ , et sectionem contingens ducatur ΔE , ducaturque ΓE , et ordinate ducatur



tur EZ , sumatur autem in sectione punctum aliquod H , et contingenti parallela ducatur $H\Theta$, ordinateque ducatur HK , per B autem ordinate ducatur $B\Delta$. dico, triangulum $KM\Gamma$ a triangulo $\Gamma\Delta B$ differre triangulo $HK\Theta$.

nam quoniam $E\Delta$ contingit, EZ autem ordinate ducta est, $EZ : Z\Delta$ rationem habet compositam e ratione $\Gamma Z : ZE$ eaque, quam habet latus rectum ad transuersum [prop. XXXIX]. est autem

$$EZ : Z\Delta = HK : K\Theta$$

[Eucl. VI, 4] et $\Gamma Z : ZE = \Gamma B : B\Delta$ [ib.]. itaque $HK : K\Theta$ rationem habebit compositam ex ratione $B\Gamma : B\Delta$ eaque, quam habet latus rectum ad transuersum. et propter ea, quae in propositione XLI demonstrata sunt, triangulus ΓKM a triangulo $B\Gamma\Delta$ differt triangulo $H\Theta K$; nam etiam de parallelogrammis, quae iis duplo maiora sunt, eadem demonstrata sunt [u. Eutocius].

XLIV.


Si recta alterutram oppositarum contingens cum diametro concurrat, et a puncto contactus recta ad

- τῆς κορυφῆς τῆς ἐτέρας τομῆς παράλληλος ἄχθῃ συμ-
πίπτουσα τῇ διὰ τῆς ἀφῆς καὶ τοῦ κέντρου ἡγμένη
εὐθείᾳ, ληφθέντος δὲ ἐπὶ τῆς τομῆς, οὗ ἔτυχε σημείου,
καταχθῶσιν εὐθεῖαι ἐπὶ τὴν διάμετρον, ὧν ἡ μὲν
5 παρὰ τὴν ἐφαπτομένην, ἡ δὲ παρὰ τὴν κατηγμένην
ἀπὸ τῆς ἀφῆς τεταγμένως, τὸ γινόμενον ὑπ' αὐτῶν
τρίγωνον, οὗ ἀποτεμνεί τριγώνου ἡ κατηγμένη πρὸς
τῷ κέντρῳ τῆς τομῆς, ἔλασσον ἔσται τῷ ἀπὸ τῆς ἐκ
τοῦ κέντρου τριγώνου ὁμοίῳ τῷ ἀποτεμνομένῳ.
- 10 ἔστωσαν ἀντικείμεναι αἱ AZ , BE , διάμετρος δὲ
αὐτῶν ἡ AB , κέντρον δὲ τὸ Γ , καὶ ἀπὸ τινος ση-
μείου τῶν ἐπὶ τῆς ZA τομῆς τοῦ Z ἐφαπτομένη ἡχθῶ
τῆς τομῆς ἡ ZH , τεταγμένως δὲ ἡ ZO , καὶ ἐπεζεύχθῳ
ἡ ΓZ καὶ ἐκβεβλήσθῳ ὡς ἡ ΓE , καὶ διὰ τοῦ B τῇ ZO
15 παράλληλος ἡ BA , καὶ σημείον τι ἐπὶ τῆς BE τομῆς
τὸ N , καὶ ἀπὸ τοῦ N τεταγμένως κατήχθῳ ἡ $N\Theta$, τῇ
δὲ ZH παράλληλος ἡχθῶ ἡ NK . λέγω, ὅτι τὸ ΘKN
τρίγωνον τοῦ $\Gamma M\Theta$ τριγώνου ἔλασσόν ἐστι τῷ ΓBA
τριγώνῳ.
- 20 διὰ γὰρ τοῦ E τῆς BE τομῆς ἐφαπτομένη ἡχθῶ
ἡ EA , τεταγμένως δὲ ἡ $E\Xi$. ἐπεὶ οὖν ἀντικείμεναι
εἰσιν αἱ ZA , BE , ὧν διάμετρος ἡ AB , ἡ δὲ διὰ τοῦ
κέντρου ἡ ΓE , καὶ ἐφαπτόμεναι τῶν τομῶν αἱ ZH , EA ,
τῇ ZH παράλληλός ἐστιν ἡ AE . ἡ δὲ NK παράλληλός
25 ἐστι τῇ ZH καὶ τῇ EA ἄρα παράλληλός ἐστιν ἡ NK ,
ἡ δὲ $M\Theta$ τῇ BA . ἐπεὶ οὖν ὑπερβολή ἐστιν ἡ BE ,

8. ἐκ τοῦ] om. V; corr. p. 14. ἡ ΓZ καὶ ἐκβεβλήσθῳ]
bis V; corr. p. 15. καὶ] καὶ εἰλήφθῳ Halley praeunte Com-
mandino („relictum sit“ Memus). 17. ΘKN] p, ΘK V.
21. $E\Xi$] EZ V; corr. p. 23. $Z\Gamma E$] p, Eutocius; $ZE\Gamma$ V.
25. ἄρα] p; om. V. NK] pvc; in V pro certo legi non
potest.

diametrum ordinate ducitur, huic autem parallela per uerticem alterius sectionis ducitur recta cum recta per punctum contactus centrumque ducta concurrens, sumpto autem in sectione puncto aliquo ad diametrum rectae ducuntur, quarum altera contingenti, altera rectae a puncto contactus ordinate ductae parallela est, triangulus ab his effectus triangulo, quem recta ordinate ducta ad centrum sectionis abscindit, minor erit triangulo in radio descripto simili triangulo absciso.

sint oppositae AZ , BE , diametrus autem earum AB , centrum autem Γ , et a Z puncto aliquo sectionis



ZA sectionem contingens ducatur ZH , ordinate autem ZO , et ducatur ΓZ producatumque, ut fiat ΓE , et per B rectae ZO parallela ducatur BA , in

sectione autem BE punctum aliquod sit N , et ab N ordinate ducatur $N\Theta$, rectae autem ZH parallela ducatur NK . dico, esse $N\Theta K = \Gamma M\Theta \div \Gamma B A$.

per E enim sectionem BE contingens ducatur $E\Delta$, ordinate autem $E\Xi$. quoniam igitur ZA , BE oppositae sunt, quarum diametrus est AB , recta autem per centrum ducta $Z\Gamma E$, sectionesque contingentes ZH , $E\Delta$, rectae ZH parallela est ΔE [u. Eutocius]. est autem NK rectae ZH parallela; quare etiam rectae $E\Delta$ parallela est NK [Eucl. I, 30], $M\Theta$ autem rectae BA parallela. quoniam igitur hyperbola est BE , cuius diametrus est AB , centrum autem Γ , sectionem autem contingens ΔE et ordinate ducta $E\Xi$,

ἥς διάμετρος ἡ AB , κέντρον δὲ τὸ Γ , ἐφαπτομένη δὲ
 τῆς τομῆς ἡ ΔE , τεταγμένως δὲ ἡ $E\Xi$, καὶ τῇ $E\Xi$
 παράλληλός ἐστιν ἡ BA , καὶ εἴληπται ἐπὶ τῆς τομῆς
 σημείου τὸ N , ὅφ' οὗ τεταγμένως μὲν κατῆται ἡ $N\Theta$,
 5 παράλληλος δὲ ἦται τῇ ΔE ἡ KN , τὸ ἄρα $N\Theta K$
 τρίγωνον τοῦ $\Theta M \Gamma$ τριγώνου ἑλασσόν ἐστι τῷ $B \Gamma \Delta$
 τριγώνῳ· τοῦτο γὰρ ἐν τῷ $\mu\gamma'$ θεωρήματι δέδεικται.

με'.

Ἐὰν ὑπερβολῆς ἢ ἐλλείψεως ἢ κύκλου περιφερείας
 10 εὐθεῖα ἐπιψαύουσα συμπίπτῃ τῇ δευτέρᾳ διαμέτρῳ,
 καὶ ἀπὸ τῆς ἀφῆς καταχθῇ τις εὐθεῖα ἐπὶ τὴν αὐτὴν
 διάμετρον παράλληλος τῇ ἑτέρᾳ διαμέτρῳ, καὶ διὰ τῆς
 ἀφῆς καὶ τοῦ κέντρον εὐθεῖα ἐκβληθῇ, ληφθέντος δέ,
 οὗ ἔτυχεν, ἐπὶ τῆς τομῆς σημείου ἀχθῶσι δύο εὐθεῖαι
 15 ἐπὶ τὴν δευτέραν διάμετρον, ὧν ἡ μὲν παρὰ τὴν ἐφαπτομένην,
 ἡ δὲ παρὰ τὴν κατηγμένην, τὸ γινόμενον
 ὑπ' αὐτῶν τριγώνων, οὗ ἀποτεμένει τριγώνου ἢ κατ-
 ηγμένη πρὸς τῷ κέντρῳ, ἐπὶ μὲν τῆς ὑπερβολῆς μείζον
 ἐστὶ τῷ τριγώνῳ, οὗ βάσις μὲν ἡ ἐφαπτομένη, κορυφὴ
 20 δὲ τὸ κέντρον τῆς τομῆς, ἐπὶ δὲ τῆς ἐλλείψεως καὶ
 τοῦ κύκλου μετὰ τοῦ ἀποτεμνομένου ἴσον ἐστὶ τῷ
 τριγώνῳ, οὗ βάσις μὲν ἡ ἐφαπτομένη, κορυφὴ δὲ τὸ
 κέντρον τῆς τομῆς.

ἔστω ὑπερβολὴ ἢ ἑλλειψις ἢ κύκλου περιφέρεια ἡ
 25 $AB \Gamma$, ἥς διάμετρος μὲν ἡ $A\Theta$, δευτέρα δὲ ἡ $\Theta \Delta$,
 κέντρον δὲ τὸ Θ , καὶ ἡ μὲν $\Gamma M \Delta$ ἐφαπτέσθω κατὰ
 τὸ Γ , ἡ δὲ $\Gamma \Delta$ ἥχθω παρὰ τὴν $A\Theta$, καὶ ἐπιευχθεῖσα
 ἡ $\Theta \Gamma$ ἐκβεβλήσθω, καὶ εἰλήφθω ἐπὶ τῆς τομῆς τυχόν

6. $B \Gamma \Delta$] $\Gamma B \Gamma \Delta$ V; corr. p.

8. $\mu\epsilon'$] p, om. V, m. 2 v.

10. τῇ δευτέρᾳ] bis V (in extr. et prima pag.); corr. cvp.

BA autem rectae $E\Xi$ parallela est, et in sectione sumptum est punctum N , a quo ordinate ducta est $N\Theta$, rectae autem AE parallela KN , erit

$$N\Theta K = \Theta M \Gamma \div B \Gamma A;$$

hoc enim in propositione XLIII demonstratum est.

XLV.


Si recta hyperbolam uel ellipsim uel ambitum circuli contingens cum altera diametro concurrat, et a puncto contactus recta ad eandem diametrum alteri diametro parallela ducitur, per punctum autem contactus centrumque recta producitur, et sumpto in sectione puncto aliquo duae rectae ad alteram diametrum ducuntur, quarum altera contingenti, altera rectae ordinate ductae parallela est, triangulus ab his effectus triangulo, quem recta ordinate ducta ad centrum abscindit, in hyperbola maior erit triangulo, cuius basis est recta contingens, uertex autem centrum sectionis, in ellipsi autem circuloque adiuncto triangulo absciso aequalis erit triangulo, cuius basis est recta contingens, uertex autem centrum sectionis.

sit hyperbola uel ellipsis uel ambitus circuli $AB\Gamma$, cuius diametrus sit $A\Theta$, altera autem ΘA , centrum autem Θ , et $\Gamma M A$ in Γ contingat, ΓA autem rectae $A\Theta$ parallela ducatur, et ducta $\Theta \Gamma$ producat, sumatur autem in sectione punctum aliquod B , et a B rectis $A\Gamma$, ΓA parallelae ducantur BE , BZ . dico, esse

17. $\tau\epsilon\lambda\gamma\omega\sigma\sigma\upsilon\upsilon$] $A\Gamma'$ V (h. e. A'). 25. η] (alt.) c, om. V. ΘA] $A\Theta A$ Halley.

σημείον τὸ B , καὶ ἀπὸ τοῦ B ἤχθωσαν αἱ BE , BZ
 παρὰ τὰς AG , GA . λέγω, ὅτι ἐπὶ μὲν τῆς ὑπερβολῆς
 τὸ BEZ τρίγωνον τοῦ $H\Theta Z$ μεῖζόν ἐστι τῷ $AG\Theta$,
 ἐπὶ δὲ τῆς ἐλλείψεως καὶ τοῦ κύκλου μετὰ τοῦ $ZH\Theta$
 5 ἴσον ἐστὶ τῷ $GA\Theta$.

ἤχθωσαν γὰρ αἱ GK , BN παρὰ τὴν $A\Theta$. ἐπεὶ οὖν
 ἐφάπτεται ἡ GM , κατῆκται δὲ ἡ GK , ἡ GK πρὸς $K\Theta$
 τὸν συγκείμενον λόγον ἔχει ἐκ τοῦ ὅν ἔχει ἡ MK
 πρὸς $K\Gamma$, καὶ τοῦ ὅν ἔχει τοῦ εἰδους ἡ ὀρθία πλευρὰ
 10 πρὸς τὴν πλαγίαν· ὥς δὲ ἡ MK πρὸς $K\Gamma$, ἡ GA
 πρὸς AA · ἡ GK ἄρα πρὸς $K\Theta$ λόγον ἔχει τὸν συγ-
 κείμενον ἐκ τοῦ τῆς GA πρὸς AA καὶ τῆς ὀρθίας
 πρὸς τὴν πλαγίαν. καὶ ἐστὶ τὸ GAA τρίγωνον τὸ ἀπὸ
 τῆς $K\Theta$ εἰδος, τὸ δὲ $GK\Theta$, τουτέστι τὸ $GA\Theta$, τὸ ἀπὸ
 15 τῆς GK , τουτέστι τῆς $A\Theta$ · τὸ GAA ἄρα τρίγωνον
 τοῦ $GK\Theta$ ἐπὶ μὲν τῆς ὑπερβολῆς μεῖζόν ἐστι τῷ ἀπὸ
 τῆς $A\Theta$ τριγώνῳ ὁμοίῳ τῷ GAA , ἐπὶ δὲ τῆς ἐλλείψεως
 καὶ τοῦ κύκλου τὸ $GA\Theta$ μετὰ τοῦ GAA ἴσον ἐστὶ τῷ
 αὐτῷ· καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν διπλασίων αὐτῶν τοῦτο ἐδείχθη
 20 ἐν τῷ τεσσαρακοστῷ πρώτῳ θεωρήματι. ἐπεὶ οὖν τὸ
 GAA τρίγωνον τοῦ $GK\Theta$ ἥτοι τοῦ $GA\Theta$ διαφέρει




τῷ ἀπὸ τῆς $A\Theta$ τριγώνῳ ὁμοίῳ τῷ GAA , διαφέρει
 δὲ καὶ τῷ $G\Theta A$ τριγώνῳ, ἴσον ἄρα τὸ $G\Theta A$ τρίγωνον


Fig. priorem bis hab. V.

in hyperbola $BEZ = H\Theta Z + \Lambda\Gamma\Theta$, in ellipsi autem et circulo $BEZ + ZH\Theta = \Gamma\Lambda\Theta$.

ducantur enim rectae $\Lambda\Theta$ parallelae ΓK , BN . quoniam igitur ΓM contingit, ΓK autem ordinate ducta est, $\Gamma K : K\Theta$ rationem habebit compositam ex



ratione, quam habet $MK : K\Gamma$, eaque, quam habet latus rectum figurae ad transversum [prop. XXXIX]. est autem [Eucl. VI, 4] $MK : K\Gamma = \Gamma\Lambda : \Lambda\Lambda$. quare $\Gamma K : K\Theta$ rationem habet compositam ex ratione $\Gamma\Lambda : \Lambda\Lambda$ eaque, quam habet latus rectum ad transversum. et triangulus $\Gamma\Lambda\Lambda$ figura est in $K\Theta$ descripta, $\Gamma K\Theta$ autem siue $\Gamma\Lambda\Theta$ figura in ΓK siue $\Lambda\Theta$ descripta. itaque in hyperbola $\Gamma\Lambda\Lambda$ triangulus triangulo $\Gamma K\Theta$



maior est triangulo in $\Lambda\Theta$ descripto simili triangulo $\Gamma\Lambda\Lambda$, in ellipsi autem circuloque $\Gamma\Lambda\Theta$ adiuncto $\Gamma\Lambda\Lambda$


Fig. primam bis V.

τῷ ἀπὸ τῆς $A\Theta$ ὁμοίῳ τῷ $\Gamma\Delta\Delta$ τριγώνῳ. ἐπεὶ οὖν
τὸ μὲν BZE τρίγωνον ὁμοίον ἐστὶ τῷ $\Gamma\Delta\Delta$, τὸ δὲ
 $HZ\Theta$ τῷ $\Gamma\Delta\Theta$, τὸν αὐτὸν ἄρα λόγον ἔχει. καὶ ἐστὶ
τὸ μὲν BZE τὸ ἀπὸ τῆς $N\Theta$ μεταξὺ τῆς κατηγμένης
καὶ τοῦ κέντρου, τὸ δὲ $HZ\Theta$ τὸ ἀπὸ τῆς BN κα-
τηγμένης, τουτέστι τῆς $Z\Theta$. καὶ διὰ τὰ δεδειγμένα
πρότερον τὸ BZE τοῦ $H\Theta Z$ διαφέρει τῷ ἀπὸ τῆς $A\Theta$
ὁμοίῳ τῷ $\Gamma\Delta\Delta$. ὥστε καὶ τῷ $\Gamma\Delta\Theta$.

μς'.

10 Ἐὰν παραβολῆς εὐθεΐα ἐπιψάνουσα συμπίπτῃ τῇ
διαμέτρῳ, ἢ διὰ τῆς ἀφῆς παράλληλος ἀγομένη τῇ
διαμέτρῳ ἐπὶ ταῦτά τῇ τομῇ τὰς ἀγομένας ἐν τῇ τομῇ
παρὰ τὴν ἐφαπτομένην δίχα τέμνει.

ἔστω παραβολή, ἥς διάμετρος ἡ $AB\Delta$, καὶ ἐφ-
15 απτέσθω τῆς τομῆς ἡ AG , διὰ δὲ τοῦ Γ τῇ AD
παράλληλος ἡ $\Theta\Gamma M$,
καὶ εἰλήφθω ἐπὶ τῆς τομῆς
τυχὸν σημεῖον τὸ Δ , καὶ
ἡχθῶ τῇ AG παράλληλος
20 ἡ $ANZE$. λέγω, ὅτι ἐστὶν
ἴση ἡ AN τῇ NZ .



ἡχθῶσαν τεταγμένως αὖ
 $B\Theta$, KZH , $\Delta M\Delta$. ἐπεὶ
οὖν διὰ τὰ δεδειγμένα ἐν τῷ τεσσαρακοστῷ δευτέρῳ
25 θεωρήματι ἴσον ἐστὶ τὸ $E\Delta\Delta$ τρίγωνον τῷ BM παρ-
αλληλογράμμῳ, τὸ δὲ EZH τῷ BK , λοιπὸν ἄρα τὸ

4. τὸ] (alt.) om. V; corr. Halley. $N\Theta$] p v c; N incertum est
in V. 8. $\Gamma\Delta\Delta$] $\Gamma\Delta\Delta$ V; corr. p. 9. μς'] p, om. V, m. 2 v.
12. ταύτά] ταῦτα V; corr. p. 23. KZH] ZHK V; corr. p.
 $\Delta M\Delta$] ΔM V; corr. Comm.

eidem aequalis est; nam in figuris, quae iis duplo maiores sunt, hoc demonstratum est in propositione XLI. quoniam igitur triangulus $\Gamma\Delta\Delta$ a $\Gamma K\Theta$ siue $\Gamma\Delta\Theta$ differt triangulo in $A\Theta$ descripto simili triangulo $\Gamma\Delta\Delta$, uerum etiam triangulo $\Gamma\Theta\Delta$ differt, triangulus $\Gamma\Theta\Delta$ triangulo in $A\Theta$ descripto simili triangulo $\Gamma\Delta\Delta$ aequalis est. quoniam igitur triangulus BZE triangulo $\Gamma\Delta\Delta$ similis est [Eucl. I, 29] et $HZ\Theta$ triangulo $\Gamma\Delta\Theta$, eandem rationem habent¹⁾. et BZE in $N\Theta$ descriptus est inter rectam ordinatam centrumque, $HZ\Theta$ autem in BN ordinate ducta siue $Z\Theta$; et propter ea, quae antea demonstrata sunt [prop. XLI], BZE ab $H\Theta Z$ differt triangulo in $A\Theta$ descripto simili triangulo $\Gamma\Delta\Delta$. ergo etiam triangulo $\Gamma\Delta\Theta$ differt.

XLVI.

Si recta parabolam contingens cum diametro concurrat, recta per punctum contactus diametro parallela ducta ad partes sectionis uersus rectas in sectione contingenti parallelas ductas in binas partes aequales secabit.

sit parabola, cuius diametrus sit $AB\Delta$, et sectionem contingat AF , per F autem rectae AA parallela ducatur ΘFM , et in sectione sumatur punctum aliquod Δ , ducaturque rectae AF parallela $ANZE$. dico, esse $AN = NZ$.

ducantur ordinate $B\Theta$, HZK , $AM\Delta$. quoniam igitur propter ea, quae in propositione XLII demon-


1) Hoc est: latera eandem inter se rationem habent (Eucl. VI, 4); itaque in proportionem $\Gamma K : K\Theta$ cet. substitui possunt rationes laterum triangulorum BZE , $HZ\Theta$, ita ut conditioni propositionis 41 satis fiat.

HM παραλληλόγραμμον λοιπὸν τῷ $\angle ZH\Delta$ τετραπλεύρῳ
 ἐστὶν ἴσον, κοινὸν ἀφηγήσθω τὸ $M\Delta HZN$ πεντά-
 πλευρον· λοιπὸν ἄρα τὸ KZN τρίγωνον τῷ ΔMN
 ἴσον ἐστὶ. καὶ ἐστὶ παράλληλος ἡ KZ τῇ ΔM . ἴση
 5 ἄρα ἡ ZN τῇ ΔN .

μζ'.

Ἐὰν ὑπερβολῆς ἢ ἐλλείψεως ἢ κύκλου περιφερείας
 εὐθεῖα ἐπιψαύουσα συμπίπτῃ τῇ διαμέτρῳ, καὶ διὰ
 τῆς ἀφῆς καὶ τοῦ κέντρου εὐθεῖα ἀχθῇ ἐπὶ ταῦτά τῃ
 10 τομῇ, δίχα τεμεῖ τὰς ἀγομένους ἐν τῇ τομῇ παρὰ τὴν
 ἐφαπτομένην.

ἔστω ὑπερβολῇ ἢ ἐλλειψις ἢ κύκλου περιφέρεια, ἥς
 διάμετρος μὲν ἡ AB , κέντρον δὲ τὸ Γ , καὶ ἐφαπτομένη



τῆς τομῆς ἄχθω ἡ ΔE , καὶ ἐπεξεύχθω ἡ ΓE καὶ ἐκ-
 15 βεβλήσθω, καὶ εἰλήφθω τυχὸν ἐπὶ τῆς τομῆς σημεῖον
 τὸ N , καὶ διὰ τοῦ N παράλληλος ἄχθω ἡ ΘNOH .
 λέγω, ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ NO τῇ OH .

κατήχθωσαν γὰρ τεταγμένως αἱ ΞNZ , BA , HMK .
 διὰ τὰ δεδειγμένα ἄρα ἐν τῷ μγ' θεωρήματι ἴσον ἐστὶ
 20 τὸ μὲν ΘNZ τρίγωνον τῷ $\Delta BZ\Xi$ τετραπλεύρῳ, τὸ

2. $M\Delta HZH$ εν et, ut uidetur, V; corr. p. 4. ΔM
 ΔN V; corr. p. 6. μζ'] p, om. V, m. 2 v. 9. ταῦτά] ταῦτα V;

strata sunt, $EA\Delta = BM$ et $EZH = BK$, erit


$$HM = AZH\Delta.$$

auferatur, quod commune est, pentagonum $M\Delta HZN$; itaque $KZN = AMN$. est autem KZ rectae AM parallela. ergo $ZN = AN$ [Eucl. VI, 22 coroll.].

XLVII.

Si recta hyperbolam uel ellipsim uel ambitum circuli contingens cum diametro concurrit, et per punctum contactus centrumque recta ad partes sectionis uersus ducitur, rectas in sectione contingenti parallelas ductas in binas partes aequales secabit.

sit hyperbola uel ellipsis uel ambitus circuli, cuius diametrus sit AB , centrum autem Γ , et sectionem



contingens ducatur ΔE , ducaturque ΓE et producat, et in sectione sumatur punctum aliquod N , et per N parallela ducatur ΘNOH . dico, esse $NO = OH$.

ordinate enim ducantur ΞNZ , BA , HMK . itaque propter ea, quae in propositione XLIII demonstrata sunt, erit $\Theta NZ = ABZ\Xi$, $H\Theta K = ABKM$. quare etiam $NHKZ = MKZ\Xi$. auferatur, quod commune

corr. p. 16. $\Theta NOH\Delta$ V; corr. p. 20. ΘNZ] BNZ V;
corr. p. $AB\Xi Z$ V; corr. p.

δὲ $HΘK$ τρίγωνον τῷ $ABKM$ · καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ
 $NHKZ$ τετράπλευρον λοιπῷ τῷ $MKZΞ$ ἐστὶν ἴσον.
 κοινὸν ἀφηρήσθω τὸ $ONZKM$ πεντάπλευρον· λοιπὸν
 ἄρα τὸ OMH τρίγωνον λοιπῷ τῷ $NΞO$ ἐστὶν ἴσον.
 5 καὶ ἐστὶ παράλληλος ἡ MH τῇ $NΞ$ · ἴση ἄρα ἡ NO
 τῇ OH .

μη'.

Ἐὰν μιᾶς τῶν ἀντικειμένων εὐθεΐα ἐπιψαύουσα
 συμπίπτῃ τῇ διαμέτρῳ, καὶ διὰ τῆς ἀφῆς καὶ τοῦ
 10 κέντρου εὐθεΐα ἐκβληθεῖσα τέμῃ τὴν ἑτέραν τομὴν,
 ἥτις ἂν ἀχθῇ ἐν τῇ ἑτέρᾳ τομῇ παρὰ τὴν ἐφαπτομένην,
 δίχα τμηθήσεται ὑπὸ τῆς ἐκβληθείσης.

ἔστωσαν ἀντικείμεναι, ὧν διάμετρος μὲν ἡ AB ,
 κέντρον δὲ τὸ Γ , καὶ τῆς A τομῆς ἐφαπτέσθω ἡ KA ,
 15 καὶ ἐπεξέχθω ἡ AG καὶ ἐκβεβλήσθω, καὶ εἰλήφθω τι
 σημεῖον ἐπὶ τῆς B τομῆς τὸ N , καὶ διὰ τοῦ N τῇ AK
 παράλληλος ἡχθῶ ἡ NH . λέγω, ὅτι ἡ NO τῇ OH
 ἐστὶν ἴση.

ἡχθῶ γὰρ διὰ τοῦ E ἐφαπτομένη τῆς τομῆς ἡ EA .
 20 ἡ EA ἄρα τῇ AK παράλληλός ἐστὶν. ὥστε καὶ τῇ
 NH . ἐπεὶ οὖν ὑπερβολή ἐστὶν ἡ BNH , ἥς κέντρον
 τὸ Γ , καὶ ἐφαπτομένη ἡ AE , καὶ ἐπέξενκται ἡ GE ,
 καὶ εἴληπται ἐπὶ τῆς τομῆς σημεῖον τὸ N , καὶ δι'
 αὐτοῦ παράλληλος τῇ AE ἦνται ἡ NH , διὰ τὸ προ-
 25 δεδειγμένον ἐπὶ τῆς ὑπερβολῆς ἴση ἐστὶν ἡ NO
 τῇ OH .

2. $MKΞZ$ V; corr. Comm. 4. $NΞO$] $ONΞO$ V; corr. p.
 6. OH] $ΣH$ V; corr. p. 7. μη'] p, om. V, m. 2 v.


est, pentagonum $ONZKM$. erit igitur $OMH = N\Xi O$. et MH rectae $N\Xi$ parallela est; ergo est $NO = OH$ [Eucl. VI, 22 coroll.].

XLVIII.

Si recta alterutram oppositarum contingens cum diametro concurrit, et per punctum contactus centrumque producta recta alteram sectionem secat, quaecunque recta in altera sectione ducitur contingenti parallela, a recta illa producta in duas partes aequales secabitur.

sint oppositae, quarum diametrus sit AB , centrum autem Γ , et sectionem A contingat KA , ducaturque $A\Gamma$ et producatur, in B autem sectione punctum aliquod sumatur N , et per N rectae AK parallela ducatur NH . dico, esse $NO = OH$.

ducatur enim per E sectionem contingens EA ; EA igitur rectae AK parallela est [u. Eutocius ad



prop. XLIV]. quare etiam rectae NH [Eucl. I, 30]. quoniam igitur BNH hyperbola est, cuius centrum est Γ , et contingit AE , et ducta est ΓE , in sectione autem sumptum est

punctum N , et per id rectae AE parallela ducta est NH , propter id, quod de hyperbola antea demonstratum est [prop. XLVII], erit $NO = OH$.

μθ'.

Ἐὰν παραβολῆς εὐθεία ἐπιψάβουσα συμπύπτῃ τῇ
 διαμέτρῳ, καὶ διὰ μὲν τῆς ἀφῆς ἀχθῇ παράλληλος τῇ
 διαμέτρῳ, ἀπὸ δὲ τῆς κορυφῆς ἀχθῇ παρὰ τεταγμένως
 5 κατηγμένην, καὶ ποιηθῇ, ὥς τὸ τεμῆμα τῆς ἐφαπτο-
 μένης τὸ μεταξὺ τῆς ἀνηγμένης καὶ τῆς ἀφῆς πρὸς τὸ
 τεμῆμα τῆς παραλλήλου τὸ μεταξὺ τῆς ἀφῆς καὶ τῆς
 ἀνηγμένης, οὕτως εὐθεῖά τις πρὸς τὴν διπλάσιαν τῆς
 ἐφαπτομένης, ἥτις ἂν ἀπὸ τῆς τομῆς ἀχθῇ ἐπὶ τὴν
 10 διὰ τῆς ἀφῆς ἡγμένην εὐθείαν παράλληλον τῇ δια-
 μέτρῳ, δυνήσεται τὸ περιεχόμενον ὀρθογώνιον ὑπὸ
 τῆς πεπορισμένης εὐθείας καὶ τῆς ἀπολαμβανομένης
 ὑπ' αὐτῆς πρὸς τῇ ἀφῇ.

ἔστω παραβολή, ἥς διάμετρος ἡ $MBΓ$, ἐφαπτομένη
 15 δὲ ἡ $ΓΔ$, καὶ διὰ τοῦ $Δ$ τῇ $BΓ$ παράλληλος ἡχθῶ
 ἡ $ZΔN$, τεταγμένως δὲ ἀνήχθῶ ἡ ZB , καὶ πεποιήσθῶ
 ὥς ἡ $EΔ$ πρὸς $ΔZ$, εὐθεῖά τις ἡ H πρὸς τὴν δι-
 πλάσιαν τῆς $ΓΔ$, καὶ εἰλήφθῶ τι σημεῖον ἐπὶ τῆς
 τομῆς τὸ K , καὶ ἡχθῶ διὰ τοῦ K τῇ $ΓΔ$ παράλληλος
 20 ἡ $KΔΠ$. λέγω, ὅτι τὸ ἀπὸ τῆς $KΔ$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ
 τῆς H καὶ τῆς $ΔΔ$, τουτέστιν ὅτι διαμέτρου οὐσης
 τῆς $ΔΔ$ ὀρθία ἐστὶν ἡ H .


κατήχθωσαν γὰρ τεταγμένως αἱ $ΔΞ$, KNM . καὶ
 ἐπεὶ ἡ $ΓΔ$ ἐφάπτεται τῆς τομῆς, τεταγμένως δὲ κατ-
 25 ἡκται ἡ $ΔΞ$, ἴση ἐστὶν ἡ $ΓB$ τῇ $BΞ$. ἡ δὲ $BΞ$ τῇ
 $ZΔ$ ἴση ἐστὶ· καὶ ἡ $ΓB$ ἄρα τῇ $ZΔ$ ἐστὶν ἴση. ὥστε
 καὶ τὸ $EΓB$ τρίγωνον τῷ $EZΔ$ τριγώνῳ. κοινὸν
 προσκείμεθω τὸ $ΔEBMN$ σχῆμα· τὸ ἄρα $ΔΓMN$

1. μθ'] p, om. V, m. 2 v. 5. κατηγμένη V; corr. Halley.
 9. Hic alicubi desiderari παρὰ τὴν ἐφαπτομένην, iam Memus

XLIX.

Si recta parabolam contingens cum diametro concurrat, per contactum autem recta diametro parallela ducitur, a uertice autem recta ordinate ductae parallela, et fit, ut pars contingentis inter ordinate ductam punctumque contactus posita ad partem parallelae inter punctum contactus et ordinate ductam positam, ita recta aliqua ad duplam contingentis, quaecunque recta a sectione [contingenti parallela] ad rectam per punctum contactus diametro parallelam ductam ducitur, quadrata aequalis est rectangulo comprehenso recta adsumpta rectaque ab illa ad punctum contactus abscisa.

sit parabola, cuius diameter sit $MB\Gamma$, contingens autem $\Gamma\Delta$, et per Δ rectae $B\Gamma$ parallela ducatur $Z\Delta N$,



ordinate autem ducatur ZB , et fiat

$$E\Delta : \Delta Z = H : 2\Gamma\Delta,$$

sumaturque punctum aliquod K in sectione, per K autem rectae $\Gamma\Delta$ parallela ducatur

KA II. dico, esse

$KA^2 = H \times \Delta A$, h. e. si ΔA diameter sit, latus rectum esse H [prop. XI].

ordinate enim ducantur ΔE , KNM . et quoniam $\Gamma\Delta$ contingit sectionem, ΔE autem ordinate ducta est, erit $\Gamma B = B E$ [prop. XXXV]. est autem $B E = Z\Delta$ [Eucl. I, 34]; itaque etiam $\Gamma B = Z\Delta$. quare etiam

senserat. 16. $\pi\epsilon\pi\omega\iota\epsilon\iota\sigma\theta\omega$ V; corr p. 27. $EZ\Delta$] pvc, Z
corr. ex Δ m. 1 V. 28. $\pi\rho\sigma\kappa\epsilon\iota\sigma\theta\omega$] p; $\pi\rho\omega\kappa\epsilon\iota\sigma\theta\omega$ V.

τετράπλευρον τῷ ZM παραλληλογράμῳ ἐστὶν ἴσον,
 τουτέστι τῷ $KΠM$ τριγώνῳ. κοινὸν ἀφηρήσθω τὸ
 $ΑΠΜΝ$ τετράπλευρον· λοιπὸν ἔρα τὸ $KΑΝ$ τρίγωνον
 τῷ $ΑΓ$ παραλληλογράμῳ ἐστὶν ἴσον. καὶ ἐστὶν ἴση
 5 ἡ ὑπὸ $ΑΑΠ$ γωνία τῇ ὑπὸ $KΑΝ$ · διπλάσιον ἔρα ἐστὶ
 τὸ ὑπὸ $KΑΝ$ τοῦ ὑπὸ $ΑΑΓ$. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν, ὥς ἡ
 $EΑ$ πρὸς $ΑΖ$, ἡ H πρὸς τὴν διπλασίαν τῆς $ΓΑ$, ἐστὶ
 δὲ καὶ ὥς ἡ $EΑ$ πρὸς $ΑΖ$, ἡ $KΑ$ πρὸς $ΑΝ$, καὶ ὥς
 ἔρα ἡ H πρὸς τὴν διπλασίαν τῆς $ΓΑ$, ἡ $KΑ$ πρὸς
 10 $ΑΝ$. ἀλλ' ὥς μὲν ἡ $KΑ$ πρὸς $ΑΝ$, τὸ ἀπὸ $KΑ$ πρὸς
 τὸ ὑπὸ $KΑΝ$, ὥς δὲ ἡ H πρὸς τὴν διπλασίαν τῆς $ΑΓ$,
 τὸ ὑπὸ H , $ΑΑ$ πρὸς τὸ δις ὑπὸ $ΓΑΑ$ · ὥς ἔρα τὸ ἀπὸ
 $KΑ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $KΑΝ$, τὸ ὑπὸ H , $ΑΑ$ πρὸς τὸ δις
 ὑπὸ $ΓΑΑ$. καὶ ἐναλλάξ· ἴσον δὲ ἐστὶ τὸ ὑπὸ $KΑΝ$
 15 τῷ δις ὑπὸ $ΓΑΑ$ · ἴσον ἔρα καὶ τὸ ἀπὸ $KΑ$ τῷ
 ὑπὸ H , $ΑΑ$.

ν'.

Ἐὰν ὑπερβολῆς ἢ ἐλλείψεως ἢ κύκλου περιφερείας
 εὐθεῖα ἐπιψάνουσα συμπίπτῃ τῇ διαμέτρῳ, καὶ διὰ
 20 τῆς ἀφῆς καὶ τοῦ κέντρου εὐθεῖα ἐκβληθῇ, ἀπὸ δὲ
 τῆς κορυφῆς ἀναχθεῖσα εὐθεῖα παρὰ τεταγμένως κατ-
 ηγμένην συμπίπτῃ τῇ διὰ τῆς ἀφῆς καὶ τοῦ κέντρου
 ἡγμένῃ εὐθείᾳ, καὶ ποιηθῇ, ὥς τὸ τμήμα τῆς ἐφαπτο-
 μένης τὸ μεταξὺ τῆς ἀφῆς καὶ τῆς ἀνηγμένης πρὸς τὸ
 25 τμήμα τῆς ἡγμένης διὰ τῆς ἀφῆς καὶ τοῦ κέντρου τὸ
 μεταξὺ τῆς ἀφῆς καὶ τῆς ἀνηγμένης, εὐθεῖα τις πρὸς
 τὴν διπλασίαν τῆς ἐφαπτομένης, ἥτις ἂν ἀπὸ τῆς τομῆς
 ἀχθῇ ἐπὶ τὴν διὰ τῆς ἀφῆς καὶ τοῦ κέντρου ἡγμένην

6. τοῦ] p, corr. ex τό m. 1 V, τῇ c. 14. καί — 15. $ΓΑΑ$] bis V; corr. p. 17. ν'] p, om. V, m. 2 v. 21. κατηγμένη V; corr. p.

$E\Gamma B = EZ\Delta$ [Eucl. VI, 19]. communis adiciatur figura $\Delta EBMN$; erit igitur $\Delta\Gamma MN = ZM = K\Gamma M$ [prop. XLII]. auferatur, quod commune est, quadrangulum $\Delta\Gamma MN$. erit igitur $K\Delta N = \Delta\Gamma$. est autem $\angle \Delta\Delta\Gamma = \angle K\Delta N$ [Eucl. I, 15]. itaque erit [u. Eutocius] $K\Delta \times \Delta N = 2\Delta\Delta \times \Delta\Gamma$. et quoniam est $E\Delta : \Delta Z = H : 2\Gamma\Delta$, est autem etiam [Eucl. VI, 4] $E\Delta : \Delta Z = K\Delta : \Delta N$, erit etiam $H : 2\Gamma\Delta = K\Delta : \Delta N$. uerum $K\Delta : \Delta N = K\Delta^2 : K\Delta \times \Delta N$,

$$H : 2\Gamma\Delta = H \times \Delta\Delta : 2\Gamma\Delta \times \Delta\Delta.$$

itaque $K\Delta^2 : K\Delta \times \Delta N = H \times \Delta\Delta : 2\Gamma\Delta \times \Delta\Delta$. et permutando [Eucl. V, 16]; est autem

$$K\Delta \times \Delta N = 2\Gamma\Delta \times \Delta\Delta.$$


ergo etiam $K\Delta^2 = H \times \Delta\Delta$.

L.

Si recta hyperbolam uel ellipsim uel ambitum circuli contingens cum diametro concurrit, et per punctum contactus centrumque recta producit, a uertice autem recta ordinate ductae parallela cum recta per punctum contactus centrumque ducta concurrit, et fit, ut pars contingentis inter punctum contactus et ordinate ductam posita ad partem rectae per punctum contactus centrumque ductae inter punctum contactus et ordinate ductam positam, ita recta aliqua ad duplam contingentis, quaecunque recta a sectione ad rectam per punctum contactus centrumque ductam contingentem parallela ducitur, quadrata aequalis erit spatio rectangulo rectae adsumptae adplicato latitudinem habenti rectam ab illa ad punctum contactus abscisam, in hyperbola figura excedenti simili

εὐθείαν παράλληλος τῇ ἐφαπτομένῃ, δυνήσεται τι χωρίου
 ὀρθογώνιον παρακείμενον παρὰ τὴν πορισθεῖσαν πλά-
 τος ἔχον τὴν ἀπολαμβανομένην ὑπ' αὐτῆς πρὸς τῇ
 ἀφῇ ἐπὶ μὲν τῆς ὑπερβολῆς ὑπερβάλλον εἶδει ὁμοίῳ
 5 τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τῆς διπλασίας τῆς μεταξὺ τοῦ
 κέντρου καὶ τῆς ἀφῆς καὶ τῆς πορισθείσης εὐθείας,
 ἐπὶ δὲ τῆς ἐλλείψεως καὶ τοῦ κύκλου ἐλλείπον.

ἔστω ὑπερβολὴ ἢ ἑλλειψις ἢ κύκλου περιφέρεια,
 ἣς διάμετρος ἡ AB , κέντρον δὲ τὸ Γ , ἐφαπτομένη δὲ
 10 ἡ ΔE , καὶ ἐπι-
 ζευχθεῖσα ἡ ΓE
 ἐκβεβλήσθω ἐφ'
 ἐκάτερα, καὶ κεί-
 σθω τῇ $E\Gamma$ ἴση
 15 ἡ ΓK , καὶ διὰ τοῦ
 B τεταγμένως ἀν-
 ήχθω ἡ BZH ,
 διὰ δὲ τοῦ E τῇ
 $E\Gamma$ πρὸς ὀρθὰς
 20 ἡχθω ἡ $E\Theta$, καὶ




γινέσθω, ὥς ἡ ZE πρὸς EH , οὕτως ἡ $E\Theta$ πρὸς τὴν
 διπλασίαν τῆς $E\Delta$, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΘK ἐκβεβλήσθω,
 καὶ εἰλήφθω τι ἐπὶ τῆς τομῆς σημεῖον τὸ Λ , καὶ δι'
 αὐτοῦ τῇ $E\Delta$ παράλληλος ἡχθω ἡ $\Lambda M\Xi$, τῇ δὲ BH
 25 ἡ ΛPN , τῇ δὲ $E\Theta$ ἡ $M\Pi$. λέγω, ὅτι τὸ ἀπὸ ΛM
 ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ $EM\Pi$.

ἡχθω γὰρ διὰ τοῦ Γ τῇ $K\Pi$ παράλληλος ἡ $\Gamma\Sigma O$.
 καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ $E\Gamma$ τῇ ΓK , ὥς δὲ ἡ $E\Gamma$ πρὸς
 $K\Gamma$, ἡ $E\Sigma$ πρὸς $\Sigma\Theta$, ἴση ἄρα καὶ ἡ $E\Sigma$ τῇ $\Sigma\Theta$.

21. $ZE]$ p; $\Xi E \vee v$; corr. postea $\vee$. $EH]$ p; $H \vee v$;
 corr. postea $\vee$.

spatio comprehenso dupla rectae inter centrum punctum-
que contactus positae et recta adsumpta, in ellipsi
autem circuloque eadem deficienti.

sit hyperbola uel ellipsis uel ambitus circuli, cuius
diametrus sit AB , centrum autem Γ , contingatque
 ΔE , et ducta ΓE producat in utramque partem,
ponaturque $\Gamma K = E\Gamma$, et per B ordinate ducatur
 BZH , per E autem ad $E\Gamma$ perpendicularis ducatur
 $E\Theta$, et fiat $ZE:EH = E\Theta:2E\Delta$, ductaque ΘK
producat, sumatur autem in sectione punctum aliquod



Λ , et per id rectae $E\Delta$ parallela ducatur $\Lambda M\Xi$, rectae
 BH autem parallela ΛPN , et rectae $E\Theta$ parallela $M\Pi$.
dico, esse $\Lambda M^2 = EM \times M\Pi$.

per Γ enim rectae $K\Pi$ parallela ducatur $\Gamma\Sigma O$.
et quoniam est $E\Gamma = \Gamma K$, et $E\Gamma:K\Gamma = E\Sigma:\Sigma\Theta$
[Eucl. VI, 2], erit etiam $E\Sigma = \Sigma\Theta$. et quoniam est
 $ZE:EH = \Theta E:2E\Delta$, et $E\Sigma = \frac{1}{2}E\Theta$, erit

$$ZE:EH = \Sigma E:E\Delta.$$

est autem

$$ZE:EH = \Lambda M:MP \text{ [Eucl. VI, 4];}$$

itaque $\Lambda M:MP = \Sigma E:E\Delta$. et quoniam demon-
strauimus [prop. XLIII], esse in hyperbola

$$PN\Gamma = HB\Gamma + \Lambda N\Xi,$$

καὶ ἐπεὶ ἐστὶν, ὥς ἡ ZE πρὸς EH , ἡ ΘE πρὸς τὴν
 διπλασίαν τῆς $E\Delta$, καὶ ἐστὶ τῆς $E\Theta$ ἡμίσεια ἡ $E\Sigma$,
 ἔστιν ἄρα, ὥς ἡ ZE πρὸς EH , ἡ ΣE πρὸς $E\Delta$. ὥς
 δὲ ἡ ZE πρὸς EH , ἡ AM πρὸς MP . ὥς ἄρα ἡ AM
 5 πρὸς MP , ἡ ΣE πρὸς $E\Delta$. καὶ ἐπεὶ τὸ $PN\Gamma$ τρι-
 γωνον τοῦ $H\beta\Gamma$ τριγώνου, τουτέστι τοῦ $\Gamma\Delta E$, ἐπὶ
 μὲν τῆς ὑπερβολῆς μεῖζον ἐδείχθη, ἐπὶ δὲ τῆς ἐλλείψεως
 καὶ τοῦ κύκλου ἔλασσον τῷ $AN\Xi$, κοινῶν ἀφαιρεθέν-
 των ἐπὶ μὲν τῆς ὑπερβολῆς τοῦ τε $E\Gamma\Delta$ τριγώνου
 10 καὶ τοῦ $NPM\Xi$ τετραπλεύρου, ἐπὶ δὲ τῆς ἐλλείψεως
 καὶ τοῦ κύκλου τοῦ $M\Xi\Gamma$ τριγώνου, τὸ AMP τρι-
 γωνον τῷ $ME\Delta\Xi$ τετραπλεύρῳ ἐστὶν ἴσον. καὶ ἐστὶ
 παρόλληλος ἡ $M\Xi$ τῇ ΔE , ἡ δὲ ὑπὸ AMP τῇ ὑπὸ
 $EM\Xi$ ἐστὶν ἴση· ἴσον ἄρα ἐστὶ τὸ ὑπὸ AMP τῷ
 15 ὑπὸ τῆς EM καὶ συναμφοτέρου τῆς $E\Delta$, $M\Xi$. καὶ
 ἐπεὶ ἐστὶν, ὥς ἡ MT πρὸς TE , ἡ τε $M\Xi$ πρὸς $E\Delta$
 καὶ ἡ MO πρὸς $E\Sigma$, ὥς ἄρα ἡ MO πρὸς $E\Sigma$, ἡ $M\Xi$
 πρὸς ΔE . καὶ συνθέντι, ὥς συναμφοτέρος ἡ MO , ΣE
 πρὸς $E\Sigma$, οὕτως συναμφοτέρος ἡ $M\Xi$, $E\Delta$ πρὸς $E\Delta$.
 20 ἐναλλάξ, ὥς συναμφοτέρος ἡ MO , ΣE πρὸς συναμφο-
 τέρον τὴν ΞM , $E\Delta$, ἡ ΣE πρὸς $E\Delta$. ἀλλ' ὥς μὲν
 συναμφοτέρος ἡ MO , $E\Sigma$ πρὸς συναμφοτέρον τὴν
 $M\Xi$, ΔE , τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς MO , $E\Sigma$ καὶ τῆς
 EM πρὸς τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς $M\Xi$, $E\Delta$ καὶ
 25 τῆς EM , ὥς δὲ ἡ ΣE πρὸς $E\Delta$, ἡ ZE πρὸς EH ,
 τουτέστιν ἡ AM πρὸς MP , τουτέστι τὸ ἀπὸ AM πρὸς
 τὸ ὑπὸ AMP . ὥς ἄρα τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς
 MO , $E\Sigma$ καὶ τῆς ME πρὸς τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου
 τῆς $M\Xi$, $E\Delta$ καὶ τῆς EM , τὸ ἀπὸ AM πρὸς τὸ ὑπὸ

2. ἐστὶ] ἐστὶν V; corr. p.c. 12. τῷ] τό V; corr. p.

h. e. $PN\Gamma = \Gamma\Delta E + AN\Xi$ [u. Eutocius ad prop. XLIII],
 in ellipsi autem circuloque $PN\Gamma = HB\Gamma - AN\Xi$,
 h. e. [u. ibidem] $PN\Gamma + AN\Xi = \Gamma\Delta E$, ablati, quae
 communia sunt, in hyperbola $E\Gamma\Delta$ et $NPM\Xi$, in
 ellipsi autem circuloque $M\Xi\Gamma$, erit $AMP = ME\Delta\Xi$.
 est autem $M\Xi$ rectae ΔE parallela, et

$$\angle AMP = EM\Xi \text{ [Eucl. I, 15];}$$

itaque erit [u. Eutocius ad prop. XLIX]

$$AM \times MP = EM \times (E\Delta + M\Xi).$$

et quoniam est

$$M\Gamma : \Gamma E = M\Xi : E\Delta, \quad M\Gamma : \Gamma E = MO : E\Sigma$$

[Eucl. VI, 4], erit

$$MO : E\Sigma = M\Xi : \Delta E.$$

et componendo [Eucl. V, 18]

$$MO + \Sigma E : E\Sigma = M\Xi + E\Delta : E\Delta;$$

permutando [Eucl. V, 16]

$$MO + \Sigma E : \Xi M + E\Delta = \Sigma E : E\Delta.$$

est autem

$$\begin{aligned} MO + E\Sigma : M\Xi + \Delta E &= (MO + E\Sigma) \\ &\times EM : (M\Xi + E\Delta) \times EM, \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} \Sigma E : E\Delta &= ZE : EH = AM : MP \text{ [Eucl. VI, 4]} \\ &= AM^2 : AM \times MP; \end{aligned}$$

itaque erit

$$\begin{aligned} (MO + E\Sigma) \times ME : (M\Xi + E\Delta) \times EM \\ = AM^2 : AM \times MP. \end{aligned}$$

et permutando

$$\begin{aligned} (MO + E\Sigma) \times ME : MA^2 \\ = (M\Xi + E\Delta) \times ME : AM \times MP \text{ [Eucl. V, 16].} \end{aligned}$$

AMP. καὶ ἐναλλάξ, ὥς τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς *MO*, *ΕΣ* καὶ τῆς *ME* πρὸς τὸ ἀπὸ *MA*, οὕτως τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς *MΞ*, *EA* καὶ τῆς *ME* πρὸς τὸ ὑπὸ *AMP*. ἴσον δὲ τὸ ὑπὸ *AMP* τῷ ὑπὸ τῆς *ME*
 5 καὶ συναμφοτέρου τῆς *MΞ*, *EA*. ἴσον ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ *AM* τῷ ὑπὸ *EM* καὶ συναμφοτέρου τῆς *MO*, *ΕΣ*. καὶ ἐστὶν ἡ μὲν *ΣΕ* τῇ *ΣΘ* ἴση, ἡ δὲ *ΣΘ* τῇ *ΟΠ*. ἴσον ἄρα τὸ ἀπὸ *AM* τῷ ὑπὸ *EMP*.

να'.

- 10 Ἐὰν ὁποτερασθῶν τῶν ἀντικειμένων εὐθεία ἐπιψάουσα συμπίπτῃ τῇ διαμέτρῳ, καὶ διὰ μὲν τῆς ἀφῆς καὶ τοῦ κέντρου ἐκβληθῇ τις εὐθεῖα ἕως τῆς ἐτέρας τομῆς, ἀπὸ δὲ τῆς κορυφῆς εὐθεῖα ἀναχθῇ παρὰ τεταγμένως κατηγμένην καὶ συμπίπτῃ τῇ διὰ τῆς ἀφῆς
 15 καὶ τοῦ κέντρου ἡγμένην εὐθεία, καὶ γενηθῇ, ὥς τὸ τμήμα τῆς ἐφαπτομένης τὸ μεταξὺ τῆς ἀνηγμένης καὶ τῆς ἀφῆς πρὸς τὸ τμήμα τῆς ἡγμένης διὰ τῆς ἀφῆς καὶ τοῦ κέντρου τὸ μεταξὺ τῆς ἀφῆς καὶ τῆς ἀνηγμένης, εὐθεία τις πρὸς τὴν διπλασίαν τῆς ἐφαπτο-
 20 μένης, ἥτις ἂν ἐν τῇ ἐτέρᾳ τῶν τομῶν ἀχθῇ ἐπὶ τὴν διὰ τῆς ἀφῆς καὶ τοῦ κέντρου ἡγμένην εὐθείαν παρὰ ἄλληλος τῇ ἐφαπτομένῃ, δυνήσεται τὸ παρακείμενον ὀρθογώνιον παρὰ τὴν προσπορισθεῖσαν πλάτος ἔχον τὴν ἀπολαμβανομένην ὑπ' αὐτῆς πρὸς τῇ ἀφῇ ὑπερ-
 25 βάλλον εἶδει ὁμοίῳ τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τῆς μεταξὺ τῶν ἀντικειμένων καὶ τῆς προσπορισθείσης εὐθείας.
 ἔστωσαν ἀντικείμεναι, ὧν διάμετρος ἡ *AB*, κέντρον

2. ἀπό] ὑπό V; corr. p (ἀπὸ τῆς). 9. να'] p, om. V, m. 2 v. 14. κατηγμένη V; corr. p. 23. προσπορισθεῖσαν] scripsi; προσπορισθείσαν V.

est autem

$$AM \times MP = ME \times (ME + EA);$$

quare etiam

$$AM^2 = EM \times (MO + ES).$$

et $SE = SO$, $SO = OP$ [Eucl. I, 34]. ergo

$$AM^2 = EM \times MP.$$

LI.

Si recta alterutram oppositarum contingens cum diametro concurrat, et per punctum contactus centrumque recta usque ad alteram sectionem producat, a vertice autem recta ordinate ductae parallela ducitur et cum recta per punctum contactus centrumque ducta concurrat, et fit, ut pars contingentis inter ordinate ductam punctumque contactus posita ad partem rectae per punctum contactus centrumque ductae inter punctum contactus et ordinate ductam positam, ita recta aliqua ad duplam contingentis, quaecunque recta in alterutra sectione ad rectam per punctum contactus centrumque ductam contingenti parallela ducitur, quadrata aequalis erit rectangulo rectae adsumptae adplicato latitudinem habenti rectam ab illa ad punctum contactus abscisam excedenti figura simili spatio comprehenso recta inter oppositas posita rectaque adsumpta.

sint oppositae, quarum diametrus sit AB , centrum autem E , et sectionem B contingens ducatur GA , ducaturque GE et producat, ordinate autem ducatur BAH , et fiat $AG:GH = K:2GA$. iam rectas in sectione BG rectae GA parallelas ad EG productas ductas quadratas aequales esse spatiis rectae K ad-

δὲ τὸ E , καὶ ἤχθω τῆς B τομῆς ἐφαπτομένη ἡ ΓA , καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΓE καὶ ἐκβεβλήσθω, καὶ ἤχθω τεταγμένως ἡ $B A H$, καὶ πεποιήσθω, ὥς ἡ $A \Gamma$ πρὸς ΓH , εὐθείᾳ τις ἡ K πρὸς τὴν διπλασίαν τῆς ΓA .

5 ὅτι μὲν οὖν αἱ ἐν τῇ $B \Gamma$ τομῇ παράλληλοι τῇ ΓA ἐπὶ τὴν ἐπ' εὐθείας τῇ $E \Gamma$ δύνανται τὰ παρὰ τὴν K παρακείμενα χωρία πλάτη ἔχοντα τὴν ἀπολαμβανομένην ὑπ' αὐτῶν πρὸς τῇ ἀφ' ἣς ὑπερβάλλοντα εἶδει ὁμοίῳ τῷ ὑπὸ $\Gamma Z, K$, φανερόν· διπλασία γάρ ἐστιν ἡ $Z \Gamma$ τῆς ΓE .
10 λέγω δὴ, ὅτι καὶ ἐν τῇ $Z A$ τομῇ τὸ αὐτὸ συμβήσεται.

ἤχθω γὰρ διὰ τοῦ Z ἐφαπτομένη τῆς $A Z$ τομῆς ἡ $M Z$, καὶ τεταγμένως ἀνήχθω ἡ $A \Xi N$. καὶ ἐπεὶ ἀντικείμεναί εἰσιν αἱ $B \Gamma, A Z$, ἐφαπτόμεναι δὲ αὐτῶν
15 αἱ $\Gamma A, M Z$, ἴση ἄρα καὶ παράλληλός ἐστιν ἡ ΓA τῇ $M Z$. ἴση δὲ καὶ ἡ ΓE τῇ $E Z$ · καὶ ἡ $E A$ ἄρα τῇ $E M$ ἐστιν ἴση. καὶ ἐπεὶ ἐστιν, ὥς ἡ $A \Gamma$ πρὸς ΓH , ἡ K πρὸς τὴν διπλασίαν τῆς ΓA , τουτέστι τῆς $M Z$, καὶ ὥς ἄρα ἡ ΞZ πρὸς $Z N$, ἡ K πρὸς τὴν διπλασίαν
20 τῆς $M Z$. ἐπεὶ οὖν ὑπερβολή ἐστιν ἡ $A Z$, ἥς διάμετρος ἡ $A B$, ἐφαπτομένη δὲ ἡ $M Z$, καὶ τεταγμένως ἤκται ἡ $A N$, καὶ ἐστιν, ὥς ἡ ΞZ πρὸς $Z N$, ἡ K πρὸς τὴν διπλασίαν τῆς $Z M$, ὅσαι ἂν ἀπὸ τῆς τομῆς παράλληλοι τῇ $Z M$ ἀχθῶσιν ἐπὶ τὴν ἐπ' εὐθείας τῇ $E Z$, δυνήσονται
25 τὸ περιεχόμενον ὀρθογώνιον ὑπὸ τῆς K εὐθείας καὶ τῆς ἀπολαμβανομένης ὑπ' αὐτῶν πρὸς τῷ Z σημείῳ ὑπερβάλλον εἶδει ὁμοίῳ τῷ ὑπὸ $\Gamma Z, K$.

3. πεποιήσθω V ; corr. p. 13. $A \Xi N$] $AN \Xi$ V ; corr. p.
18. ἡ K] HK V ; corr. p. 22. ἡ K] cp, HK V , sed corr.
m. 1. 27. ὑπερβάλλοντα V ; corr. Memus, sed nescio, an ferri
possit. $\Gamma Z, K$] $\Gamma K Z$ V ; corr. p.

Δεδειγμένων δὲ τούτων συμφανές, ὅτι ἐν μὲν τῇ
 παραβολῇ ἐκάστη τῶν παρὰ τὴν ἐκ τῆς γενέσεως διά-
 μετρον ἀπαγομένων εὐθειῶν διάμετρος ἐστίν, ἐν δὲ
 τῇ ὑπερβολῇ καὶ τῇ ἐλλείψει καὶ ταῖς ἀντικειμέναις
 5 ἐκάστη τῶν διὰ τοῦ κέντρου ἀγομένων εὐθειῶν, καὶ
 διότι ἐν μὲν τῇ παραβολῇ αἱ καταγόμεναι ἐφ' ἐκάστην
 τῶν διαμέτρων παρὰ τὰς ἐφαπτομένας τὰ παρὰ τὴν
 αὐτὴν παρακείμενα ὀρθογώνια δυνήσονται, ἐν δὲ τῇ
 ὑπερβολῇ καὶ ταῖς ἀντικειμέναις τὰ παρὰ τὴν αὐτὴν
 10 παρακείμενα χωρία καὶ ὑπερβάλλοντα τῷ αὐτῷ εἶδει,
 ἐν δὲ τῇ ἐλλείψει τὰ παρὰ τὴν αὐτὴν παρακείμενα
 καὶ ἐλλείποντα τῷ αὐτῷ εἶδει, καὶ διότι πάντα, ὅσα
 προδεδείκται περὶ τὰς τομὰς συμβαίνοντα συμπαρα-
 βαλλομένων τῶν ἀρχικῶν διαμέτρων, καὶ τῶν ἄλλων
 15 διαμέτρων παραλαμβανομένων τὰ αὐτὰ συμβήσεται.

νβ'.

Εὐθείας δοθείσης ἐν ἐπιπέδῳ καθ' ἐν σημεῖον
 πεπερασμένης εὐρεῖν ἐν τῷ ἐπιπέδῳ κώνου τομὴν τὴν
 καλουμένην παραβολήν, ἥς διάμετρος ἡ δοθεῖσα εὐθεῖα,
 20 κορυφὴ δὲ τὸ πέρας τῆς εὐθείας, ἥτις δὲ ἂν ἀπὸ τῆς
 τομῆς καταχθῇ ἐπὶ τὴν διάμετρον ἐν δοθείσῃ γωνίᾳ,
 δυνήσεται τὸ περιεχόμενον ὀρθογώνιον ὑπὸ τε τῆς ἀπο-
 λαμβανομένης ὑπ' αὐτῆς πρὸς τῇ κορυφῇ τῆς τομῆς
 καὶ ἑτέρας τινὸς δοθείσης εὐθείας.
 25 ἔστω θέσει δεδομένη εὐθεῖα ἡ AB πεπερασμένη
 κατὰ τὸ A , ἑτέρα δὲ ἡ ΓA τῷ μεγέθει, ἡ δὲ δοθεῖσα
 γωνία ἔστω πρότερον ὀρθή· δεῖ δὲ εὐρεῖν ἐν τῷ ὑπο-

1. πόρισμα add. p. 3. ἀγομένων p. 13. συμπαρα-
 βαλλομένων] συμπαραλαμβανομένων Halley. 16. νβ'] p, om. V,
 m. 2 v. 23. αὐτῆς] c p, αὐτῇ supra scripto σ m. 1 V.

His autem demonstratis simul adparet, in parabola omnes rectas diametro originali parallelas diametros esse [prop. XLVI], in hyperbola autem et ellipsi et oppositis omnes rectas per centrum ductas [prop. XLVII—XLVIII], et in parabola rectas ad singulas diametros contingentibus parallelas ductas quadratas aequales esse rectangulis adplicatis eidem rectae [prop. XLIX], in hyperbola autem oppositisque spatiis eidem rectae adplicatis et eadem figura excedentibus [prop. L—LI], in ellipsi autem spatiis eidem rectae adplicatis et eadem figura deficientibus [prop. L], et omnia, quae antea demonstraui in sectionibus addicere adhibitis diametris principalibus, etiam ceteris diametris adsumptis eadem addicere.

LII.

Data in plano recta in uno puncto terminata in plano inuenire conic sectionem, parabola quae uocatur, ita ut eius diameter sit data recta, uertex autem terminus rectae, et quaecunque recta a sectione in dato angulo ad diametrum ducitur, quadrata aequalis sit rectangulo comprehenso recta ab ea ad uerticem sectionis abscisa aliaque recta data.

positione data sit recta AB in A terminata, magnitudine autem alia ΓA , angulus autem datus prius sit rectus. oportet igitur in plano subiacenti parabolam inuenire, ita ut eius diameter sit AB , uertex autem A , latus autem rectum ΓA , et rectae ordinate ductae in recto angulo ducantur, h. e. ita ut AB axis sit.


producatur AB ad E , et sumatur $\Gamma H = \frac{1}{4}\Gamma A$, et sit $EA > \Gamma H$, sumatur autem Θ media rectarum

κειμένω ἐπιπέδῳ παραβολήν, ἥς διάμετρος μὲν ἡ AB , κορυφή δὲ τὸ A , ὀρθία δὲ ἡ ΓA , αἱ δὲ καταγόμεναι τεταγμένως ἐν ὀρθῇ γωνίᾳ καταχθήσονται, τουτέστιν ἵνα ἄξων ᾖ ἡ AB .

- 5 ἐκβεβλήσθω ἡ AB ἐπὶ τὸ E , καὶ εἰλήφθω τῆς ΓA τέταρτον μέρος ἡ ΓH , τῆς δὲ ΓH μείζων ἔστω ἡ EA , καὶ τῶν ΓA , EA μέση ἀνάλογον εἰλήφθω ἡ Θ . ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΓA πρὸς EA , τὸ ἀπὸ Θ πρὸς τὸ ἀπὸ EA . ἡ δὲ ΓA τῆς EA ἐλάττων ἔστιν ἢ τετραπλασία· καὶ
 10 τὸ ἀπὸ Θ ἄρα τοῦ ἀπὸ EA ἐλαττόν ἔστιν ἢ τετραπλάσιον. ἡ Θ ἄρα τῆς EA ἐλάττων ἔστιν ἢ διπλῇ· ὥστε δύο αἱ EA τῆς Θ μείζονές εἰσι. δυνατόν ἄρα ἔστιν ἐκ τῆς Θ καὶ δύο τῶν EA τρίγωνον συστήσασθαι. συνεστήτω τοίνυν ἐπὶ τῆς EA τρίγωνον τὸ EAZ
 15 ὀρθὸν πρὸς τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον ὥστε ἴσην εἶναι τὴν μὲν EA τῇ AZ , τὴν δὲ Θ τῇ ZE , καὶ ἦχθω τῇ μὲν ZE παράλληλος ἡ AK , τῇ δὲ EA ἡ ZK , καὶ νοείσθω κῶνος, οὗ κορυφή τὸ Z σημεῖον, βάσις δὲ ὁ περὶ διάμετρον τὴν KA κύκλος ὀρθὸς ὢν πρὸς τὸ διὰ
 20 τῶν AZK ἐπίπεδον. ἔσται δὴ ὀρθὸς ὁ κῶνος· ἴση γὰρ ἡ AZ τῇ ZK . τετμήσθω δὲ ὁ κῶνος ἐπιπέδῳ παραλλήλῳ τῷ KA κύκλῳ, καὶ ποιεῖτω τομὴν τὸν $MNΞ$ κύκλον, ὀρθὸν δηλονότι πρὸς τὸ διὰ τῶν MZN ἐπίπεδον, καὶ ἔστω τοῦ $MNΞ$ κύκλου καὶ τοῦ MZN
 25 τριγώνου κοινὴ τομὴ ἡ MN · διάμετρος ἄρα ἐστὶ τοῦ κύκλου. ἔστω δὲ τοῦ ὑποκειμένου ἐπιπέδου καὶ τοῦ κύκλου κοινὴ τομὴ ἡ ΞA . ἐπεὶ οὖν ὁ $MNΞ$ κύκλος ὀρθός ἐστι πρὸς τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον, ὀρθὸς δὲ ἔστι καὶ πρὸς τὸ MZN τρίγωνον, ἡ κοινὴ ἄρα αὐτῶν

10. ἄρα] scripsi; A V . ἐλαττον] ἐλάττων V ; corr. Halley.

ΓA , EA proportionalis. itaque $\Gamma A : EA = \Theta^3 : EA^2$ [Eucl. V .def. 9]. est autem $\Gamma A < 4EA$; quare etiam $\Theta^2 < 4EA^2$; itaque $\Theta < 2EA$; quare $EA + EA > \Theta$. itaque fieri potest, ut ex Θ et duabus EA triangulus construatur [Eucl. I, 22]. construatur igitur in EA triangulus EAZ ad planum subiacens perpendicularis,



ita ut sit $EA = AZ$ et $\Theta = ZE$, et ducatur AK rectae ZE , ZK autem rectae EA parallela, et fingatur conus, cuius uertex sit punctum Z , basis autem circulus circum KA diametrum descriptus ad planum per rectas AZ , ZK perpendicularis. hic igitur conus rectus erit [def. 3]; nam $AZ = ZK$. secetur autem conus plano circulo KA parallelo, quod sectionem efficiat circulum MNE [prop. IV], perpendicularem scilicet ad planum rectarum MZ , ZN , et circuli MNE triangulique MZN communis sectio sit MN ; diametrus igitur erit circuli. communis autem sectio plani subiacentis circuli sit EA . quoniam igitur MNE circulus ad planum subiacens perpendicularis¹⁾ est,

1) Hoc quidem falsum est; neque enim $MN\xi$ ad planum
subiacens perpendicularis esse potest. hoc intellegens Halleius
scripsit lin. 28 sq.: $\delta\epsilon\theta\acute{o}\varsigma \xi\sigma\tau\iota \pi\rho\acute{o}\varsigma \tau\acute{o} MZN \tau\rho\acute{\iota}\gamma\omega\nu\omicron\nu, \delta\epsilon\theta\acute{o}\nu$
Apollonius, ed. Heiberg. 11

τομή ἡ ΞA ὀρθή ἐστὶ πρὸς τὸ MZN τρίγωνον, τουτ-
 ἐστὶ τὸ KZA · καὶ πρὸς πάσας ἄρα τὰς ἀποτομένας
 αὐτῆς εὐθείας καὶ οὕτως ἐν τῷ τριγώνῳ ὀρθή ἐστίν·
 ὥστε καὶ πρὸς ἑκατέραν τῶν MN , AB . πάλιν ἐπεὶ
 5 κῶνος, οὗ βάσις μὲν ὁ $MN\Xi$ κύκλος, κορυφή δὲ τὸ Z
 σημεῖον, τέτμηται ἐπιπέδῳ ὀρθῷ πρὸς τὸ MZN τρί-
 γωνον, καὶ ποιεῖ τομὴν τὸν $MN\Xi$ κύκλον, τέτμηται
 δὲ καὶ ἐτέρῳ ἐπιπέδῳ τῷ ὑποκειμένῳ τέμνοντι τὴν
 βάσιν τοῦ κώνου κατ' εὐθεΐαν τὴν ΞA πρὸς ὀρθὰς
 10 οὕτως τῇ MN , ἣ κοινὴ ἐστὶ τομὴ τοῦ τε $MN\Xi$ κύκλου
 καὶ τοῦ MZN τριγώνου, ἣ δὲ κοινὴ τομὴ τοῦ ὑπο-
 κειμένου ἐπιπέδου καὶ τοῦ MZN τριγώνου ἡ AB
 παράλληλός ἐστὶ τῇ ZKM πλευρᾷ τοῦ κώνου, ἣ ἄρα
 γινομένη ἐν τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ τομὴ τοῦ κώνου
 15 παραβολὴ ἐστὶ, διάμετρος δὲ αὐτῆς ἡ AB , αἱ δὲ κατ-
 αρόμεναι ἀπὸ τῆς τομῆς ἐπὶ τὴν AB τεταγμένως ἐν
 ὀρθῇ καταχθῆσονται γωνία· παράλληλοι γὰρ εἰσι τῇ
 ΞA πρὸς ὀρθὰς οὕση τῇ AB . καὶ ἐπεὶ αἱ τρεῖς ἀνά-
 λογόν εἰσιν αἱ ΓA , Θ , EA , ἴση δὲ ἡ μὲν EA τῇ AZ
 20 καὶ τῇ ZK , ἣ δὲ Θ τῇ EZ καὶ τῇ AK , ἐστὶν ἄρα,
 ὥς ἡ ΓA πρὸς AK , ἣ AK πρὸς AZ . καὶ ὥς ἄρα ἡ
 ΓA πρὸς AZ , τὸ ἀπὸ AK πρὸς τὸ ἀπὸ AZ , τουτέστι
 τὸ ὑπὸ AZK . ὀρθία ἄρα ἐστὶν ἡ ΓA τῆς τομῆς·
 τοῦτο γὰρ δέδεικται ἐν τῷ ια' θεωρήματι.

25

νγ'.

Τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων μὴ ἔστω ἡ δοθεῖσα γωνία
 ὀρθή, καὶ κείσθω αὐτῇ ἴση ἡ ὑπὸ ΘAE , καὶ τῆς ΓA

17. γωνία] γωνία V (qui alibi fere ι omittit, raro ad-
 scriptum habet); corr. p. 24. ια'] αζ V v; corr p. 25.
 νγ'] cum Eutocio, om. V; νγ mg. p.

idem autem ad triangulum MZN perpendicularis est, communis eorum sectio ΞA perpendicularis est ad triangulum MZN [Eucl. XI, 19], h. e. ad KZA ; quare etiam ad omnes rectas eam tangentes et in triangulo positas perpendicularis est [Eucl. XI def. 3]. itaque etiam ad utramque MN , AB perpendicularis est. rursus quoniam conus, cuius basis est $MN\Xi$ circulus, uertex autem Z punctum, plano sectus est ad triangulum MZN perpendiculari, quod sectionem efficit circulum $MN\Xi$, uerum etiam alio plano sectus est, subiacenti scilicet, basim conici secundum rectam ΞA secanti perpendicularem ad MN , quae communis est sectio circuli $MN\Xi$ triangulique MZN , et AB communis sectio plani subiacentis triangulique MZN lateri conici ZKM parallela est, sectio conici in plano subiacenti orta parabola est, diametrus autem eius AB [prop. XI], et rectae a sectione ad AB ordinate ductae in angulo recto ducentur; nam parallelae sunt rectae ΞA ad AB perpendiculari. et quoniam est $\Gamma A : \Theta = \Theta : EA$, et $EA = AZ = ZK$, $\Theta = EZ = AK$, erit

$$\Gamma A : AK = AK : AZ.$$

quare etiam $\Gamma A : AZ = AK^2 : AZ^2$ [Eucl. V def. 9] $= AK^2 : AZ \times ZK$. ergo ΓA latus rectum sectionis est; hoc enim in propositione XI demonstratum est.

LIII.


Iisdem suppositis ne sit rectus datus angulus, eique aequalis ponatur $\angle \Theta AE$, sit autem $A\Theta = \frac{1}{2} \Gamma A$,

δὲ καὶ τὸ ὑποκείμενον ἐπιπεδὸν πρὸς τὸ MZN τρίγωνον (prae-eunte Memo). quae mutatio cum parum probabilis sit, prae-tulerim uerba *ἐπεὶ οὖν* lin. 27 — *τρίγωνον* lin. 29 delere; sed fortasse interpolatio peius etiam grassata est. etiam uerba *τοῦτ' ἐστὶ τὸ KZA* p. 162 lin. 1—2 inutilia sunt.

ἔστω ἡμίσεια ἡ $A\Theta$, καὶ ἀπὸ τοῦ Θ ἐπὶ τὴν AE
κάθετος ἡχθῶ ἡ ΘE , καὶ διὰ τοῦ E τῇ $B\Theta$ παράλ-
ληλος ἡ EA , καὶ ἀπὸ τοῦ A ἐπὶ τὴν EA κάθετος
ἡχθῶ ἡ AA , καὶ τετμήσθω ἡ EA δίχα κατὰ τὸ K ,
5 καὶ ἀπὸ τοῦ K τῇ EA πρὸς ὀρθὰς ἡχθῶ ἡ KM καὶ
ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὰ Z, H , καὶ τῷ ἀπὸ τῆς AA ἴσον
ἔστω τὸ ὑπὸ AKM . καὶ δύο δοθεῖσων εὐθειῶν τῶν
 AK, KM , τῆς μὲν KA θέσει πεπερασμένης κατὰ τὸ
 K , τῆς δὲ KM μεγέθει, καὶ γωνίας ὀρθῆς γεγράφθω
10 παραβολή, ἥς διάμετρος ἡ KA , κορυφή δὲ τὸ K ,
ὀρθία δὲ ἡ KM , ὥς προδεδεικται· ἥξει δὲ διὰ τοῦ
 A διὰ τὸ ἴσον εἶναι τὸ ἀπὸ AA τῷ ὑπὸ AKM , καὶ
ἐφάπτεται τῆς τομῆς ἡ EA διὰ τὸ ἴσην εἶναι τὴν EK
τῇ KA . καὶ ἔστιν ἡ ΘA τῇ EKA παράλληλος· ἡ
15 ΘAB διάμετρος ἄρα ἐστὶ τῆς τομῆς, αἱ δὲ ἐπ' αὐτὴν
ἀπὸ τῆς τομῆς καταγόμεναι παράλληλοι τῇ AE δίχα
τμηθήσονται ὑπὸ τῆς AB . καταχθήσονται δὲ ἐν γω-
νίᾳ τῇ ὑπὸ ΘAE . καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ $AE\Theta$
γωνία τῇ ὑπὸ AHZ , κοινὴ δὲ ἡ πρὸς τῷ A , ὅμοιον
20 ἄρα ἐστὶ τὸ $A\Theta E$ τρίγωνον τῷ AHZ . ὥς ἄρα ἡ
 ΘA πρὸς EA , ἡ ZA πρὸς AH · ὥς ἄρα ἡ διπλασία
τῆς $A\Theta$ πρὸς τὴν διπλασίαν τῆς AE , ἡ ZA πρὸς
 AH . ἡ δὲ ΓA τῆς ΘA διπλῇ· ὥς ἄρα ἡ ZA
πρὸς AH , ἡ ΓA πρὸς τὴν διπλασίαν τῆς AE .
25 διὰ δὲ τὰ δεδειγμένα ἐν τῷ μθ' θεωρήματι ὀρθία ἐστὶν
ἡ ΓA .

11. δέ] (alt.) fort. δή. 13. EK] EKT V; corr. p. 15.
ἄρα διάμετρος p, Halley. 18. ΘAE — 19. τῇ ὑπό] bis V;
corr. p.

et a Θ ad AE perpendicularis ducatur ΘE , per E autem rectae $B\Theta$ parallela EA , et ab A ad EA perpendicularis ducatur AA , EA autem in K in duas



partes aequales sece-
tur, et a K ad EA
perpendicularis duca-
tur KM producatumque
ad Z , H , et sit

$$AK \times KM = AA^2.$$

dati autem duabus
rectis AK , KM , qua-
rum KA positione
data est ad K termi-
nata, KM autem ma-

gnitudine, et angulo recto describatur parabola, cuius
diametrus sit KA , uertex autem K , et latus rectum KM ,
ita ut supra demonstratum est [prop. LII]; per A igitur
ueniet, quia $AK \times KM = AA^2$ [prop. XI], et EA
sectionem continget, quia $EK = KA$ [prop. XXXIII].
et ΘA rectae EKA parallela est; itaque ΘAB dia-
metrus sectionis est, et rectae a sectione ad eam ductae
rectae AE parallelae ab AB in binas partes aequales
secabuntur [prop. XLVI]. ducentur autem in angulo
• ΘAE [Eucl. I, 29]. et quoniam est $\angle AEO = \angle AHZ$,
communis autem angulus ad A positus, erit

$$\angle AEO \sim \angle AHZ.$$

quare [Eucl. VI, 4] $\Theta A : EA = ZA : AH$. itaque
 $2\Theta A : 2AE = ZA : AH$ [Eucl. V, 15]. est autem
 $\Gamma A = 2\Theta A$; itaque $ZA : AH = \Gamma A : 2AE$. ergo
propter ea, quae in propositione XLIX demonstrata
sunt, ΓA latus rectum est.

νδ'.

Δύο δοθεισῶν εὐθειῶν πεπερασμένων πρὸς ὀρθὰς ἀλλήλαις τῆς ἐτέρας ἐκβαλλομένης ἐπὶ ταῦτά τῃ ὀρθῇ γωνίᾳ εὐρεῖν ἐπὶ τῆς προσεκβληθείσης κώνου τομὴν
 5 τὴν καλουμένην ὑπερβολὴν ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ ταῖς εὐθείαις, ὅπως ἡ μὲν προσεκβληθεῖσα διάμετρος εἴη τῆς τομῆς, κορυφὴ δὲ τὸ πρὸς τῇ γωνίᾳ σημεῖον, ἥτις δὲ ἂν καταχθῇ ἀπὸ τῆς τομῆς ἐπὶ τὴν διάμετρον γωνίαν ποιοῦσα ἴσην τῇ δοθείσῃ, δυνήσεται παρα-
 10 κείμενον ὀρθογώνιον παρὰ τὴν ἐτέραν εὐθεῖαν πλάτος ἔχον τὴν ἀπολαμβανομένην ὑπὸ τῆς κατηγμένης πρὸς τῇ κορυφῇ ὑπερβάλλον εἶδει ὁμοίῳ καὶ ὁμοίως κειμένῳ τῷ ὑπὸ τῶν ἐξ ἀρχῆς εὐθειῶν.

ἔστωσαν αἱ δοθεῖσαι δύο εὐθεῖαι πεπερασμέναι
 15 πρὸς ὀρθὰς ἀλλήλαις αἱ AB , $BΓ$, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ AB ἐπὶ τὸ $Δ$. δεῖ δὲ εὐρεῖν ἐν τῷ διὰ τῶν $ABΓ$ ἐπιπέδῳ ὑπερβολήν, ἥς διάμετρος μὲν ἔσται ἡ $ABΔ$, κορυφὴ δὲ τὸ B , ὀρθία δὲ ἡ $BΓ$, αἱ δὲ καταγόμεναι ἀπὸ τῆς τομῆς ἐπὶ τὴν $BΔ$ ἐν τῇ δοθείσῃ γωνίᾳ
 20 δυνύσσονται τὰ παρὰ τὴν $BΓ$ παρακείμενα πλάτη ἔχοντα τὰς ἀπολαμβανομένας ὑπ' αὐτῶν πρὸς τῷ B ὑπερβάλλοντα εἶδει ὁμοίῳ καὶ ὁμοίως κειμένῳ τῷ ὑπὸ τῶν $ABΓ$.

ἔστω ἡ δοθεῖσα γωνία πρότερον ὀρθή, καὶ ἀνε-
 25 στάτω ἀπὸ τῆς AB ἐπίπεδον ὀρθὸν πρὸς τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον, καὶ ἐν αὐτῷ περὶ τὴν AB κύκλος γεγράφθω ὁ $ΑΕΒΖ$, ὥστε τὸ τμήμα τῆς διαμέτρου τοῦ κύκλου τὸ ἐν τῷ $ΑΕΒ$ τμήματι πρὸς τὸ τμήμα τῆς διαμέτρου

1. νδ' [p, om. V. 3. ταῦτά] ταῦτα V; corr. p. 4. ἐπὶ τῆς προσεκβληθείσης] superuacua uidebantur Commandino

LIV.

Datis duabus rectis terminatis inter se perpendicularibus altera ad angulum rectum uersus producta in recta producta sectionem conici inuenire, hyperbola quae uocatur, in plano rectarum posita, ita ut recta producta diametrus sectionis sit, uertex autem punctum ad angulum positum, et quaecunque recta a sectione ad diametrum ducitur angulum efficiens dato aequalem, quadrata aequalis sit rectangulo alteri rectae adplicato latitudinem habenti rectam ab ordinate ducta ad uerticem abscisam excedenti figura simili similiterque posita figurae rectis a principio datis comprehensae.

sint datae duae rectae terminatae inter se perpendiculares AB , $B\Gamma$, producanturque AB ad Δ . oportet igitur in plano rectarum AB , $B\Gamma$ hyperbolam inuenire, cuius diametrus sit $AB\Delta$, uertex autem B , latus rectum autem $B\Gamma$, et rectae a sectione ad $B\Delta$ in dato angulo ductae quadratae aequales sint spatiis rectae $B\Gamma$ adplicatis latitudines habentibus rectas ab iis ad B abscisas excedentibus figura simili similiterque posita rectangulo $AB \times B\Gamma$.

prius igitur angulus datus rectus sit, et in AB planum ad planum subiacens perpendiculare erigatur, et in eo circum AB circulus describatur $AEBZ$, ita ut pars diametri circuli in segmento AEB posita ad partem diametri in AZB positam maiorem rationem non habeat quam $AB : B\Gamma$ [u. Eutocius], et AEB in puncto E in duas partes aequales secetur, ab E

fol. 34^v. 6. $\epsilon\lambda\eta$] η p. 13. $\tau\phi$] om. V; corr. p. 19. $\tau\eta\varsigma$] $\epsilon\upsilon\psi$, in V litt. σ in ras. est m. 1. 21. $\tau\phi$] $\tau\phi$ V; corr. p.


τὸ ἐν τῷ AZB μὴ μείζονα λόγον ἔχειν τοῦ ὄν ἔχει
 ἢ AB πρὸς $BΓ$, καὶ τετμήσθω ἡ AEB δίχα κατὰ
 τὸ E , καὶ ἡχθῶ ἀπὸ τοῦ E ἐπὶ τὴν AB κάθετος ἡ
 EK καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ A διάμετρος ἄρα ἐστὶν
 5 ἡ EA . εἰ μὲν οὖν ἐστὶν, ὥς ἡ AB πρὸς $BΓ$, ἡ EK
 πρὸς KA , τῷ A ἂν ἐχρησάμεθα, εἰ δὲ μὴ, γινέσθω
 ὥς ἡ AB πρὸς $BΓ$, ἡ EK πρὸς ἐλάσσονα τῆς KA
 τὴν KM , καὶ διὰ τοῦ M τῇ AB παράλληλος ἡχθῶ
 ἡ MZ , καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ AZ , EZ , ZB , καὶ διὰ
 10 τοῦ B τῇ ZE παράλληλος ἡ $BΞ$. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν
 ἡ ὑπὸ AZE γωνία τῇ ὑπὸ EZB , ἀλλ' ἡ μὲν ὑπὸ
 AZE τῇ ὑπὸ $AΞB$ ἐστὶν ἴση, ἡ δὲ ὑπὸ EZB τῇ
 ὑπὸ $ΞBZ$ ἐστὶν ἴση, καὶ ἡ ὑπὸ $ΞBZ$ ἄρα τῇ ὑπὸ
 $ZΞB$ ἐστὶν ἴση. ἴση ἄρα καὶ ἡ ZB τῇ $ZΞ$. νοεῖσθω
 15 κῶνος, οὗ κορυφή μὲν τὸ Z σημεῖον, βάσις δὲ ὁ περὶ
 τὴν $BΞ$ διάμετρον κύκλος ὁρθὸς ὢν πρὸς τὸ $BZΞ$
 τρίγωνον. ἔσται δὴ ὁ κῶνος ὁρθός. ἴση γὰρ ἡ ZB
 τῇ $ZΞ$. ἐκβεβλήσθωσαν δὴ αἱ BZ , $ZΞ$, MZ , καὶ
 τετμήσθω ὁ κῶνος ἐπιπέδῳ παραλλήλῳ τῷ $BΞ$ κύκλῳ.
 20 ἔσται δὴ ἡ τομὴ κύκλος. ἔστω ὁ $ΗΠΡ$. ὥστε διά-
 μετρος ἔσται τοῦ κύκλου ἡ $ΗΘ$. κοινὴ δὲ τομὴ τοῦ
 $ΗΘ$ κύκλου καὶ τοῦ ὑποκειμένου ἐπιπέδου ἔστω ἡ
 $ΠΔΡ$. ἔσται δὴ ἡ $ΠΔΡ$ πρὸς ἐκατέραν τῶν $ΗΘ$, $ΔB$
 ὁρθή. ἐκάτερος γὰρ τῶν $ΞB$, $ΘH$ κύκλος ὁρθός ἐστι
 25 πρὸς τὸ $ZHΘ$ τρίγωνον, ἔστι δὲ καὶ τὸ ὑποκείμενον
 ἐπίπεδον ὁρθὸν πρὸς τὸ $ZHΘ$. καὶ ἡ κοινὴ ἄρα
 αὐτῶν τομὴ ἡ $ΠΔΡ$ ὁρθή ἐστι πρὸς τὸ $ZHΘ$. καὶ
 πρὸς πάσας ἄρα τὰς ἀπτομένας αὐτῆς εὐθείας καὶ
 οὐσας ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ ὁρθὰς ποιεῖ γωνίας. καὶ

1. μείζονα λόγον] p, μείζον ἀνάλογον V; corr. v (in i
 circumflexus in acutum mut. m. 1). 17. ZB] c, B e corr.

autem ad AB perpendicularis ducatur EK producaturque ad A ; EA igitur diametrus est [Eucl. III, 1]. iam si sit $AB:BF = EK:KA$, puncto A utamur; sin minus, fiat $AB:BF = EK:KM$ minorem quam KA , et per M rectae AB parallela ducatur MZ , ducanturque AZ , EZ , ZB , et per B rectae ZE parallela ducatur $BΞ$. quoniam igitur est

$$\angle AZE = \angle EZB \text{ [Eucl. III, 27]},$$

est autem $\angle AZE = \angle AΞB$, $\angle EZB = \angle ΞBZ$ [Eucl. I, 29], erit etiam $\angle ΞBZ = \angle ZΞB$; quare etiam $ZB = ZΞ$ [Eucl. I, 6]. fingatur conus, cuius uertex sit Z punctum, basis autem circulus circum $BΞ$ diametrum descriptus ad triangulum $BZΞ$ perpendi-



cularis. is conus igitur rectus erit [def. 3]; nam $ZB = ZΞ$. producantur igitur BZ , $ZΞ$, MZ , conusque plano circulo $BΞ$ parallelo secetur; sectio igitur circulus erit [prop. IV]. sit $HΠP$. $HΘ$ igitur diametrus circuli erit [prop. IV

coroll.]. communis autem sectio circuli $HΘ$ planique subiacentis sit $ΠΔP$; erit igitur $ΠΔP$ ad utramque $HΘ$, $ΔB$ perpendicularis; nam uterque circulus $ΞB$, $ΘH$ ad triangulum $ZHΘ$ perpendicularis est, planum autem subiacens et ipsum ad $ZHΘ$ perpendiculare est; itaque

m. 1 V. 18. $ZΞ$] (pr.) c, $Ξ$ e corr. m. 1 V. 24. $ἐκείνου$
— 29. $γωνίας$] mihi suspecta.

ἐπεὶ κῶνος, οὗ βάσις μὲν ὁ $HΘ$ κύκλος, κορυφή δὲ
 τὸ Z , τέτμηται ἐπιπέδῳ ὀρθῷ πρὸς τὸ $ZHΘ$ τρίγωνον,
 τέτμηται δὲ καὶ ἑτέρῳ ἐπιπέδῳ τῷ ὑποκειμένῳ κατ'
 εὐθείαν τὴν $ΠΔΡ$ πρὸς ὀρθὰς τῇ $ΗΔΘ$, ἣ δὲ κοινὴ
 5 τομὴ τοῦ τε ὑποκειμένου ἐπιπέδου καὶ τοῦ $HZΘ$,
 τουτέστιν ἡ $ΔΒ$, ἐκβαλλομένη ἐπὶ τὸ B συμπίπτει τῇ
 HZ κατὰ τὸ A , ὑπερβολὴ ἄρα ἔσται ἡ τομὴ διὰ τὰ
 προοδευγμένα ἡ $ΠΒΡ$, ἥς κορυφὴ μὲν ἔστι τὸ B
 σημεῖον, αἱ δὲ καταγόμεναι ἐπὶ τὴν $ΒΔ$ τεταγμένως
 10 ἐν ὀρθῇ γωνίᾳ καταχθῆσονται· παράλληλοι γάρ εἰσι
 τῇ $ΠΔΡ$. καὶ ἐπεὶ ἔστιν, ὥς ἡ $ΑΒ$ πρὸς $ΒΓ$, ἡ $ΕΚ$
 πρὸς $ΚΜ$, ὥς δὲ ἡ $ΕΚ$ πρὸς $ΚΜ$, ἡ $ΕΝ$ πρὸς $ΝΖ$,
 τουτέστι τὸ ὑπὸ $ΕΝΖ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΝΖ$, ὥς ἄρα ἡ
 $ΑΒ$ πρὸς $ΒΓ$, τὸ ὑπὸ $ΕΝΖ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΝΖ$. Ἦσον
 15 δὲ τὸ ὑπὸ $ΕΝΖ$ τῷ ὑπὸ $ΑΝΒ$. ὥς ἄρα ἡ $ΑΒ$ πρὸς
 $ΓΒ$, τὸ ὑπὸ $ΑΝΒ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΝΖ$. τὸ δὲ ὑπὸ
 $ΑΝΒ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΝΖ$ τὸν συγκείμενον ἔχει λόγον
 ἐκ τοῦ τῆς $ΑΝ$ πρὸς $ΝΖ$ καὶ τῆς $ΒΝ$ πρὸς $ΝΖ$.
 ἀλλ' ὥς μὲν ἡ $ΑΝ$ πρὸς $ΝΖ$, ἡ $ΑΔ$ πρὸς $ΔΗ$ καὶ
 20 ἡ $ΖΟ$ πρὸς $ΟΗ$, ὥς δὲ ἡ $ΒΝ$ πρὸς $ΝΖ$, ἡ $ΖΟ$ πρὸς
 $ΟΘ$. ἡ ἄρα $ΑΒ$ πρὸς $ΒΓ$ τὸν συγκείμενον ἔχει λόγον
 ἐκ τοῦ ὃν ἔχει ἡ $ΖΟ$ πρὸς $ΟΗ$ καὶ ἡ $ΖΟ$ πρὸς $ΟΘ$,
 τουτέστι τὸ ἀπὸ $ΖΟ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΗΟΘ$. ἔστιν ἄρα,
 ὥς ἡ $ΑΒ$ πρὸς $ΒΓ$, τὸ ἀπὸ $ΖΟ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΗΟΘ$.
 25 καὶ ἔστι παράλληλος ἡ $ΖΟ$ τῇ $ΑΔ$. πλαγία μὲν ἄρα
 πλευρά ἔστιν ἡ $ΑΒ$, ὀρθία δὲ ἡ $ΒΓ$. ταῦτα γὰρ ἐν
 τῷ $ιβ'$ θεωρήματι δέδεικται.

2. ἐπιπέδῳ — 3. τέτμηται] om. V; addidi praeaeuntibus
 Memo et Halleio (qui praeterea addunt καὶ ποιεῖ τομὴν τὸν
 $ΗΠΘΡ$ κύκλον, cfr. p. 162, 6 sq., et lin. 3 post ὑποκειμένῳ
 uerba τέμνοντι τὴν βάσιν τοῦ κῶνου), 27. τῷ $ιβ'$] ξ β' V;
 corr. p.

etiam communis eorum sectio $\Pi\Delta P$ ad $ZH\Theta$ perpendicularis est [Eucl. XI, 19]; quare etiam ad omnes rectas eam tangentes et in eodem plano positas rectos angulos efficit [Eucl. XI def. 3]. et quoniam conus, cuius basis est $H\Theta$ circulus, uertex autem Z , plano sectus est ad triangulum $ZH\Theta$ perpendiculari, uerum etiam alio plano sectus est, subiacenti scilicet, secundum rectam $\Pi\Delta P$ ad $H\Delta\Theta$ perpendicularem, et communis sectio plani subiacentis triangulique $HZ\Theta$, hoc est ΔB , ad B uersus producta cum HZ in Δ concurrat, propter ea, quae antea demonstraui[mus] [prop. XII], hyperbola erit ΠBP , cuius uertex est B punctum, rectae autem ad $B\Delta$ ordinate ductae in recto angulo ducentur; nam rectae $\Pi\Delta P$ parallelae erunt. et quoniam est $AB : B\Gamma = EK : KM$, et $EK : KM = EN : NZ$ [Eucl. VI, 2] $= EN \times NZ : NZ^2$, erit

$$AB : B\Gamma = EN \times NZ : NZ^2.$$

est autem

$$EN \times NZ = AN \times NB \text{ [Eucl. III, 35].}$$

quare

$$AB : \Gamma B = AN \times NB : NZ^2.$$

est autem

$$AN \times NB : NZ^2 = (AN : NZ) \times (BN : NZ),$$

et

$$AN : NZ = A\Delta : \Delta H = ZO : OH \text{ [Eucl. VI, 4],}$$

et [ib.] $BN : NZ = ZO : O\Theta$. itaque

$$AB : B\Gamma = (ZO : OH) \times (ZO : O\Theta) = ZO^2 : HO \times O\Theta.$$

quare $AB : B\Gamma = ZO^2 : HO \times O\Theta$. et ZO rectae $A\Delta$ parallela est. ergo AB latus transuersum est, rectum autem $B\Gamma$; haec enim in propositione XII demonstrata sunt.

νε'.

Μὴ ἔστω δὴ ἡ δεδομένη γωνία ὀρθή, καὶ ἔστωσαν αἱ δοθεῖσαι εὐθεῖαι αἱ AB, AG , ἡ δὲ δοθεῖσα γωνία ἔστω ἴση τῇ ὑπὸ τῶν $BA\Theta$. δεῖ δὴ γράψαι ὑπερ-
 5 βολήν, ἥς διάμετρος μὲν ἔσται ἡ AB , ὀρθία δὲ ἡ AG , αἱ δὲ καταγόμεναι ἐν τῇ ὑπὸ ΘAB γωνίᾳ καταχθήσονται.

τετμήσθω ἡ AB δίχα κατὰ τὸ A , καὶ ἐπὶ τῆς AA γεγράφθω ἡμικύκλιον τὸ AZA , καὶ ἤχθω τις εἰς τὸ
 10 ἡμικύκλιον παράλληλος τῇ $A\Theta$ ἡ ZH ποιούσα τὸν τοῦ ἀπὸ ZH πρὸς τὸ ὑπὸ AHA λόγον τὸν αὐτὸν τῷ τῆς AG πρὸς AB , καὶ ἐπεξέχθω ἡ $Z\Theta A$ καὶ ἐμβεβλήσθω ἐπὶ τὸ A , καὶ τῶν $ZA\Theta$ μέση ἀνάλογον ἔστω ἡ AA , καὶ κείσθω τῇ AA ἴση ἡ AK , τῷ δὲ
 15 ἀπὸ τῆς AZ ἴσον ἔστω τὸ ὑπὸ AZM , καὶ ἐπεξέχθω ἡ KM , καὶ διὰ τοῦ A πρὸς ὀρθας ἤχθω τῇ KZ ἡ AN καὶ ἐμβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Ξ . καὶ δύο δοθεισῶν εὐθειῶν πεπερασμένων πρὸς ὀρθὰς ἀλλήλαις τῶν KA, AN γεγράφθω ὑπερβολή, ἥς πλαγία μὲν πλευρὰ
 20 ἔσται ἡ KA , ὀρθία δὲ ἡ AN , αἱ δὲ καταγόμεναι ἐπὶ τὴν διάμετρον ἀπὸ τῆς τομῆς ἐν ὀρθῇ γωνίᾳ καταχθήσονται πλάτη ἔχουσαι τὰς ἀπολαμβανομένας ὑπ' αὐτῶν πρὸς τῷ A ὑπερβάλλοντα εἶδει ὁμοίῳ τῷ ὑπὸ KAN . ἥξει δὲ ἡ τομὴ διὰ τοῦ A . ἴσον γὰρ ἔστι
 25 τὸ ἀπὸ AZ τῷ ὑπὸ AZM . καὶ ἐφάπεται αὐτῆς ἡ $A\Theta$. τὸ γὰρ ὑπὸ $ZA\Theta$ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ AA . ὥστε ἡ AB διάμετρος ἔστι τῆς τομῆς. καὶ ἐπεὶ ἔστιν ὥς

1. νε' p, Eutocius; om. V. 3. αἱ] (alt.) p; om. V (ἡ Halley). 9. AZA] A e corr. m. 1 V. 12. AB] τὴν διπλασίαν τῆς AA Comm. fol. 38^v cum Eutocio. 13. ἐπὶ τὸ A] scripsi coll. p. 170, 6; ἴση ἡ A V, ἡ ZA p; om. Memus,

LV.


Iam igitur datus angulus rectus ne sit, et datae rectae sint AB , AG , datus autem angulus angulo $BA\Theta$ aequalis sit. oportet igitur hyperbolam describere, ita ut diameter sit AB , latus rectum autem AG , et ordinate ductae in angulo ΘAB ducantur.

secetur AB in duas partes aequales in A , et in AA semicirculus describatur AZA , ad semicirculum autem recta ducatur ZH rectae AG parallela, quae faciat $ZH^2 : AH \times HA = AG : AB$, ducaturque $Z\Theta A$ et ad A uersus producat, et sit AA rectarum ZA , $A\Theta$ media proportionalis, fiatque $AK = AA$,

$$AZ \times ZM = AZ^2,$$

et ducatur KM , per A autem ad KZ perpendicularis ducatur AN producat, et datis duabus rectis terminatis inter se perpendicularibus KA , AN

hyperbola describatur, cuius latus transuersum sit KA , rectum autem AN , et rectae a sectione ad diametrum ductae in angulo recto ducantur latitudines habentes



rectas ab iis ad A abscisas excedentes figura simili rectangulo $KA \times AN$ [prop. LIV]; sectio igitur ea per A

Comm., Halley. 14. $\iota\sigma\eta$] c, ι corr. ex η V. 15. $\tau\eta\varsigma AZ$ $\iota\sigma\omega\nu$] $\iota\sigma\omega\nu$ V; corr. p. 17. $\acute{\epsilon}\pi\iota\ \tau\acute{o}\ \Xi$] $\acute{\epsilon}\pi\iota\ \tau\acute{\alpha}\ O, \Xi$ Halley.
 20. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\alpha\iota$] $\acute{\epsilon}\sigma\tau\omega$ Halley praeunte Comm. 22. $\acute{\epsilon}\chi\omicron\nu\sigma\alpha\iota$] $\kappa\alpha\iota$ $\delta\upsilon\nu\eta\delta\omicron\nu\nu\alpha\iota\ \tau\acute{\alpha}\ \pi\alpha\rho\acute{\alpha}\ \tau\eta\nu\ AN\ \pi\alpha\rho\alpha\kappa\epsilon\acute{\iota}\mu\epsilon\nu\alpha\ \acute{\epsilon}\rho\theta\omicron\gamma\acute{\omega}\nu\iota\alpha\ \pi\lambda\acute{\alpha}\tau\eta$ $\acute{\epsilon}\chi\omicron\nu\tau\alpha$ Halley praeunte Commandino. 24. $\delta\acute{\epsilon}$] c et, ut uidetur, V; $\delta\eta$ p, Halley.

ἡ ΓA πρὸς τὴν διπλασίαν τῆς $A\Delta$, τουτέστι τὴν
 AB , τὸ ἀπὸ ZH πρὸς τὸ ὑπὸ ΔHA , ἀλλ' ἡ μὲν
 ΓA πρὸς τὴν διπλασίαν τῆς $A\Delta$ τὸν συγκείμενον
 ἔχει λόγον ἐκ τοῦ ὃν ἔχει ἡ ΓA πρὸς τὴν διπλασίαν
 5 τῆς $A\Theta$ καὶ ἐκ τοῦ ὃν ἔχει ἡ διπλασία τῆς $A\Theta$ πρὸς
 τὴν διπλασίαν τῆς ΔA , τουτέστιν ἡ ΘA πρὸς $A\Delta$,
 τουτέστιν ἡ ZH πρὸς $H\Delta$, ἡ ΓA ἄρα πρὸς AB τὸν
 συγκείμενον ἔχει λόγον ἐκ τε τοῦ τῆς ΓA πρὸς τὴν
 διπλασίαν τῆς $A\Theta$ καὶ τοῦ τῆς ZH πρὸς $H\Delta$. ἔχει
 10 δὲ καὶ τὸ ἀπὸ ZH πρὸς τὸ ὑπὸ ΔHA τὸν συγκεί-
 μενον λόγον ἐκ τοῦ ὃν ἔχει ἡ ZH πρὸς $H\Delta$ καὶ ἡ
 ZH πρὸς HA . ὁ ἄρα συγκείμενος λόγος ἐκ τοῦ τῆς
 ΓA πρὸς τὴν διπλασίαν τῆς $A\Theta$ καὶ τοῦ τῆς ZH
 πρὸς $H\Delta$ ὁ αὐτός ἐστι τῷ συγκειμένῳ ἐκ τοῦ τῆς
 15 ZH πρὸς HA καὶ τοῦ τῆς ZH πρὸς $H\Delta$. κοινὸς
 ἀφηγήσθω ὁ τῆς ZH πρὸς $H\Delta$ λόγος· ἔστιν ἄρα
 ὥς ἡ ΓA πρὸς τὴν διπλασίαν τῆς $A\Theta$, ἡ ZH πρὸς
 HA . ὥς δὲ ἡ ZH πρὸς HA , ἡ OA πρὸς $A\Xi$. ὥς
 ἄρα ἡ ΓA πρὸς τὴν διπλασίαν τῆς $A\Theta$, ἡ OA πρὸς
 20 $A\Xi$. ὅταν δὲ τοῦτο ᾗ, παρ' ἣν δύνανται ἐστὶν ἡ
 $A\Gamma$. τοῦτο γὰρ δέδεικται ἐν τῷ ν' θεωρήματι.

νς'.

Δύο δοθεισῶν εὐθειῶν πεπερασμένων πρὸς ὀρθὰς
 ἀλλήλαις εὐρεῖν περὶ διάμετρον τὴν ἐτέραν αὐτῶν
 25 κώνου τομὴν τὴν καλουμένην ἔλλειψιν ἐν τῷ αὐτῷ
 ἐπιπέδῳ ταῖς εὐθείαις, ἥς κορυφὴ ἔσται τὸ πρὸς τῇ
 ὀρθῇ γωνίᾳ σημείου, αἱ δὲ καταγόμεναι ἀπὸ τῆς τομῆς
 ἐπὶ τὴν διάμετρον ἐν γωνίᾳ δοθείσῃ δυνήσονται τα

5. ἐκ τοῦ] ἐξ οὗ V; corr. Halley. 22. νς'] p, Eutocius;
 om. V. 24. εὐρεῖν] εὑρη V; corr. p.

ueniet, quia $AZ^2 = AZ \times ZM$ [prop. XII]. et eam
continget $A\Theta$ [prop. XXXVII]; nam $Z\Delta \times \Delta\Theta = \Delta A^2$.
quare AB diametrus sectionis est [prop. LI coroll.].
et quoniam est

$$\Gamma A : 2\Delta A = \Gamma A : AB = ZH^2 : \Delta H \times HA,$$

et

$$\Gamma A : 2\Delta A = (\Gamma A : 2A\Theta) \times (2A\Theta : 2\Delta A),$$

et

$$2A\Theta : 2\Delta A = \Theta A : \Delta A = ZH : H\Delta \text{ [Eucl. VI, 4],}$$

erit

$$\Gamma A : AB = (\Gamma A : 2A\Theta) \times (ZH : H\Delta).$$

uerum etiam

$$ZH^2 : \Delta H \times HA = (ZH : H\Delta) \times (ZH : HA).$$

itaque

$$(\Gamma A : 2A\Theta) \times (ZH : H\Delta) = (ZH : HA) \times (ZH : H\Delta).$$

auferatur, quae communis est, ratio $ZH : H\Delta$. itaque

$$\Gamma A : 2A\Theta = ZH : HA. \text{ est autem [Eucl. VI, 4]}$$

$$ZH : HA = OA : A\Xi. \text{ itaque erit}$$

$$\Gamma A : 2A\Theta = OA : A\Xi.$$

sin hoc est, parametrum est $A\Gamma$; hoc enim in propo-
sitione L demonstratum est.

LVI.

Datis duabus rectis terminatis inter se perpendi-
cularibus circum alteram earum diametrum descriptam
coni sectionem inuenire, ellipsis quae uocatur, in plano
rectarum positam, ita ut uertex sit punctum ad rectum
angulum positum, rectae autem a sectione ad diametrum
in dato angulo ductae quadratae aequales sint rectan-
gulis alteri rectae adplicatis latitudinem habentibus

παρακείμενα ὀρθογώνια παρὰ τὴν ἑτέραν εὐθεΐαν
πλάτος ἔχοντα τὴν ἀπολαμβανομένην ὑπ' αὐτῶν πρὸς
τῇ κορυφῇ τῆς τομῆς ἐλλείποντα εἶδει ὁμοίῳ τε καὶ
ὁμοίως κειμένῳ τῷ ὑπὸ τῶν δοθεῖσθαι εὐθειῶν πε-
5 ριεχομένῳ.


ἔστωσαν αὖ δοθεῖσαι δύο εὐθεΐαι αὖ AB , AG
πρὸς ὀρθὰς ἀλλήλαις, ὧν μείζων ἡ AB . δεῖ δὲ ἐν
τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ γράψαι ἑλλειψιν, ἥς διάμετρος
μὲν ἔσται ἡ AB , κορυφή δὲ τὸ A , ὀρθία δὲ ἡ AG ,
10 αὖ δὲ καταγόμεναι καταχθῆσονται ἀπὸ τῆς τομῆς ἐπὶ
τὴν AB ἐν δεδομένη γωνίᾳ καὶ δυνήσονται τὰ παρὰ
τὴν AG παρακείμενα πλάτη ἔχοντα τὰς ἀπολαμβανο-
μένους ὑπ' αὐτῶν πρὸς τῷ A ἐλλείποντα εἶδει ὁμοίῳ
τε καὶ ὁμοίως κειμένῳ τῷ ὑπὸ τῶν BAG .

15 ἔστω δὲ ἡ δοθεῖσα γωνία πρότερον ὀρθή, καὶ
ἀνιστάτω ἀπὸ τῆς AB ἐπίπεδον ὀρθὸν πρὸς τὸ ὑπο-
κείμενον, καὶ ἐν αὐτῷ ἐπὶ τῆς AB τμήμα κύκλου
γεγράφθω τὸ ADB , οὗ διχοτομία ἔστω τὸ A , καὶ
ἐπεξεύχθωσαν αὖ AA , AB , καὶ κείσθω τῇ AG ἴση
20 ἡ $A\Xi$, καὶ διὰ τοῦ Ξ τῇ AB παράλληλος ἦχθω ἡ
 ΞO , διὰ δὲ τοῦ O τῇ AB παράλληλος ἡ OZ , καὶ ἐπε-
ξεύχθω ἡ AZ καὶ συμπίπττω τῇ AB ἐκβληθείσῃ
κατὰ τὸ E . ἔσται δὲ, ὥς ἡ AB πρὸς AG , ἡ BA
πρὸς $A\Xi$, τουτέστιν ἡ AA πρὸς AO , τουτέστιν ἡ
25 AE πρὸς EZ . καὶ ἐπεξεύχθωσαν αὖ AZ , ZB καὶ
ἐκβεβλήσθωσαν, καὶ εἰλήφθω ἐπὶ τῆς ZA τυχὸν ση-
μεῖον τὸ H , καὶ δι' αὐτοῦ τῇ AE παράλληλος ἦχθω
ἡ HA καὶ συμπίπττω τῇ AB ἐκβληθείσῃ κατὰ τὸ K .
ἐκβεβλήσθω δὲ ἡ ZO καὶ συμπίπττω τῇ HK κατὰ

13. τῷ] c, corr. ex τό m. 1 V. 15. δε] fort. δή. δο-
θεῖσαι] c, δ corr. ex δ m. 1 V.

rectam ab iis ad uerticem sectionis abscisam deficientibus figura simili similiterque posita rectangulo datis rectis comprehenso.

sint datae duae rectae AB , AG inter se perpendiculares, quarum maior sit AB . oportet igitur in plano



subiacenti ellipsim
describere, ita ut eius
diametrus sit AB ,
uertex autem A , latus
rectum autem AT , et
rectae ordinate a sec-
tione ad AB ductae
in dato angulo du-
cantur et quadratae
aequales sint spatiis

rectae AF adplicatis latitudines habentibus rectas ab
iis ad A abscisas deficientibus figura simili similiterque
posita rectangulo $BA \times AF$.

prius igitur angulus datus rectus sit, et in AB planum ad subiaccens perpendicularare erigatur, in eoque in AB segmentum circuli describatur AAB , cuius punctum medium sit A , ducanturque AA , AB , et ponatur $AE = AG$, per E autem rectae AB parallela ducatur EO , per O autem rectae AB parallela OZ , et ducatur AZ concurratque cum AB producta in E . erit igitur [Eucl. V, 7]

$$AB: A\Gamma = BA: A\Xi = \angle A: AO \text{ [Eucl. VI, 4]} \\ = \angle E: EZ \text{ [Eucl. VI, 2].}$$

ducantur AZ , ZB producanturque, et in ZA punctum

τὸ A . ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ AA περιφέρεια τῇ AB ,
 ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ABA γωνία τῇ ὑπὸ AZB . καὶ ἐπεὶ
 ἡ ὑπὸ EZA γωνία δυσὶ ταῖς ὑπὸ ZAA , ZAA ἐστὶν
 ἴση, ἀλλ' ἡ μὲν ὑπὸ ZAA τῇ ὑπὸ ZBA ἐστὶν ἴση,
 5 ἡ δὲ ὑπὸ ZAA τῇ ὑπὸ ZBA , καὶ ἡ ὑπὸ EZA ἄρα
 τῇ ὑπὸ ABA ἐστὶν ἴση, τουτέστι τῇ ὑπὸ BZA . ἔστι
 δὲ καὶ παράλληλος ἡ AE τῇ AH . ἡ ἄρα ὑπὸ EZA
 τῇ ὑπὸ $ZH\Theta$ ἐστὶν ἴση, ἡ δὲ ὑπὸ AZB τῇ ὑπὸ
 $Z\Theta H$. ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ $ZH\Theta$ τῇ ὑπὸ $Z\Theta H$ ἐστὶν
 10 ἴση, καὶ ἡ ZH τῇ $Z\Theta$ ἐστὶν ἴση.

γεγράφθω δὲ περὶ τὴν ΘH κύκλος ὁ $H\Theta N$ ὀρθὸς
 πρὸς τὸ ΘHZ τρίγωνον, καὶ νοείσθω κῶνος, οὗ βάσις
 μὲν ὁ $H\Theta N$ κύκλος, κορυφή δὲ τὸ Z σημεῖον· ἐστὶ δὲ ὁ
 κῶνος ὀρθὸς διὰ τὸ ἴσην εἶναι τὴν HZ τῇ $Z\Theta$. καὶ ἐπεὶ
 15 ὁ $H\Theta N$ κύκλος ὀρθὸς ἐστὶ πρὸς τὸ ΘHZ ἐπίπεδον,
 ἔστι δὲ καὶ τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον ὀρθὸν πρὸς τὸ
 διὰ τῶν $H\Theta Z$ ἐπίπεδον, καὶ ἡ κοινὴ τομὴ αὐτῶν ἄρα
 πρὸς τὸ διὰ τῶν $H\Theta Z$ ἐπίπεδον ὀρθὴ ἐστὶ. ἔστω
 δὲ ἡ κοινὴ τομὴ αὐτῶν ἡ KM . ἡ KM ἄρα ὀρθή
 20 ἐστὶ πρὸς ἐκατέραν τῶν AK , KH . καὶ ἐπεὶ κῶνος,
 οὗ βάσις μὲν ὁ $H\Theta N$ κύκλος, κορυφή δὲ τὸ Z σημεῖον,
 τέτμηται ἐπιπέδῳ διὰ τοῦ ἄξονος καὶ ποιεῖ τομὴν τὸ
 $H\Theta Z$ τρίγωνον, τέτμηται δὲ καὶ ἑτέρῳ ἐπιπέδῳ τῷ
 διὰ τῶν AK , KM , ὅ ἐστι τὸ ὑποκείμενον, κατ' εὐ-
 25 θεΐαν τὴν KM πρὸς ὀρθὰς οὖσαν τῇ HK , καὶ τὸ
 ἐπίπεδον συμπίπτει ταῖς ZH , $Z\Theta$ πλευραῖς τοῦ κῶνου,
 ἡ ἄρα γινομένη τομὴ ἑλλειψὶς ἐστὶν, ἣς διάμετρος

3. ZAA , ZAA] scripsi; ΞAA V (ZAA , AAZ p; ZAA , ZAA
 iam Halley praeunte Memo). 4. ZAA] ZAA V; corr. p.
 ZBA] vp; B e corr. m. 1 Vc. 5. ZBA] pvc; B e corr.
 m. 1 V. 9. $Z\Theta H$] (pr.) pvc; H e corr. m. 1 V. $Z\Theta H$] (alt.)
 pvc; H e corr. m. 1 V. 13. $H\Theta N$] $H\Theta K$ V; corr. p.

aliquod H sumatur, per id autem rectae AE parallela ducatur HA , quae cum AB producta in K concurrat. producat igitur ZO et cum HK in A concurrat. quoniam igitur arcus AA arcui AB aequalis est, erit [Eucl. III, 27] $\angle ABA = \angle AZB$. et quoniam est [Eucl. I, 32] $\angle EZA = \angle A + \angle ZAA$, et

$$\angle ZAA = \angle ZBA,$$

$\angle ZAA = \angle ZBA$ [Eucl. III, 27], erit etiam

$$\angle EZA = \angle ABA = \angle BZA.$$

uerum etiam AE parallela est rectae AH . quare $\angle EZA = \angle ZH\theta$, $\angle AZB = \angle Z\theta H$ [Eucl. I, 29]. quare etiam $\angle ZH\theta = \angle Z\theta H$ et [Eucl. I, 6] $ZH = Z\theta$.

describatur igitur circum θH circulus $H\theta N$ ad triangulum θHZ perpendicularis, et fingatur conus, cuius basis sit $H\theta N$ circulus, uertex autem Z punctum; conus igitur rectus erit, quia $HZ = Z\theta$ [def. 3]. et quoniam circulus $H\theta N$ ad planum θHZ perpendicularis est, uerum etiam planum subiacens ad planum rectarum $H\theta$, θZ perpendiculare est, etiam communis eorum sectio ad planum rectarum $H\theta$, θZ perpendicularis erit [Eucl. XI, 19]. KM igitur communis eorum sectio sit. itaque KM ad utramque AK , KH perpendicularis est [Eucl. XI def. 3]. et quoniam conus, cuius basis est $H\theta N$ circulus, uertex autem Z punctum, plano per axem sectus est, quod sectionem efficit triangulum $H\theta Z$, uerum etiam alio plano rectarum AK , KM , quod est planum subiacens, sectus est secundum rectam KM ad HK perpendicularem, et hoc planum cum ZH , $Z\theta$ lateribus coni concurrat, sectio orta ellipsis est, cuius diametrus est AB , ordinate ductae autem in recto angulo ducentur

ἐστὶν ἡ AB , αὐτὴ δὲ καταγόμενα καταχθήσονται ἐν
 ὀρθῇ γωνίᾳ· παράλληλοι γάρ εἰσι τῇ KM . καὶ ἐπεὶ
 ἐστὶν, ὥς ἡ AE πρὸς EZ , τὸ ὑπὸ AEZ , τουτέστι
 τὸ ὑπὸ BEA , πρὸς τὸ ἀπὸ EZ , τὸ δὲ ὑπὸ BEA
 5 πρὸς τὸ ἀπὸ EZ τὸν συγκείμενον ἔχει λόγον ἐκ τοῦ
 τῆς BE πρὸς EZ καὶ τοῦ τῆς AE πρὸς EZ , ἀλλ'
 ὥς μὲν ἡ BE πρὸς EZ , ἡ BK πρὸς $KΘ$, ὥς δὲ ἡ
 AE πρὸς EZ , ἡ AK πρὸς KH , τουτέστιν ἡ ZA
 πρὸς AH , ἡ BA ἄρα πρὸς AG τὸν συγκείμενον ἔχει
 10 λόγον ἐκ τοῦ τῆς ZA πρὸς AH καὶ τοῦ τῆς ZA πρὸς
 $AΘ$, ὅς ἐστιν ὁ αὐτὸς τῷ ὃν ἔχει τὸ ἀπὸ ZA πρὸς
 τὸ ὑπὸ $HAAΘ$. ὥς ἄρα ἡ BA πρὸς AG , τὸ ἀπὸ ZA
 πρὸς τὸ ὑπὸ $HAAΘ$. ὅταν δὲ τοῦτο ᾗ, ὀρθία τοῦ
 εἰδους πλευρά ἐστὶν ἡ AG , ὥς δέδεικται ἐν τῷ ιγ'
 15 θεωρήματι.

νζ'.

Τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων ἔστω ἡ AB ἐλάσσων τῆς
 AG , καὶ δέον ἔστω περὶ διάμετρον τὴν AB γράψαι
 ἑλλειψιν, ὥστε ὀρθίαν εἶναι τὴν AG .
 20 τετμήσθω ἡ AB δίχα κατὰ τὸ A , καὶ ἀπὸ τοῦ A
 τῇ AB πρὸς ὀρθὰς ἤχθω ἡ EAZ , καὶ τῷ ὑπὸ BAG
 ἴσον ἔστω τὸ ἀπὸ ZE , ὥστε ἴσην εἶναι τὴν ZA τῇ
 AE , καὶ τῇ AB παράλληλος ἤχθω ἡ ZH , καὶ
 πεποιήσθω, ὥς ἡ AG πρὸς AB , ἡ EZ πρὸς ZH .
 25 μετέξω ἄρα καὶ ἡ EZ τῆς ZH . καὶ ἐπεὶ ἴσον ἐστὶ
 τὸ ὑπὸ GAB τῷ ἀπὸ EZ , ἐστὶν ὥς ἡ GA πρὸς AB ,
 τὸ ἀπὸ ZE πρὸς τὸ ἀπὸ AB καὶ τὸ ἀπὸ AZ πρὸς

7. Post $KΘ$ add. τουτέστιν ἡ ZA πρὸς $AΘ$ Halley prae-
 eunte Memo. 14. τῷ ιγ' ᾗ $\bar{\Gamma}$ V; corr. p. 16. νζ'] p,
 Eutocius; om. V. 18. περὶ] pε; ἐπὶ V? 24. πεποιείσθω V;
 corr. p. 26. ἀπὸ] pε, πὸ post ras. 1 litt. V.

[op. XIII]; sunt enim rectae KM parallelae. et
oniam est

$$\Delta E : EZ = \Delta E \times EZ : EZ^2 = BE \times EA : EZ^2$$

[fr. Eucl. III, 36], et

$$BE \times EA : EZ^2 = (BE : EZ) \times (AE : EZ),$$

est autem $BE : EZ = BK : K\Theta$,

$$AE : EZ = AK : KH = ZA : AH \text{ [Eucl. VI, 4],}$$


erit $BA : A\Gamma = (ZA : AH) \times (ZA : A\Theta)$ [ibid.], et

$$(ZA : AH) \times (ZA : A\Theta) = ZA^2 : HA \times A\Theta. \text{ quare}$$

$BA : A\Gamma = ZA^2 : HA \times A\Theta$. sin hoc est, $A\Gamma$ latus
rectum est sectionis, ut in propositione XIII demon-
stratum est.

LVII.

Iisdem suppositis sit $AB < A\Gamma$, et oporteat cir-
cum AB diametrum ellipsim describere, ita ut $A\Gamma$
latus rectum sit.



AB in Δ in duas partes aequales
secetur, et a Δ ad AB perpendicularis
ducatur $E\Delta Z$, et sit

$$ZE^2 = BA \times A\Gamma,$$

ita ut sit $ZA = \Delta E$, rectae autem
 AB parallela ducatur ZH , et fiat

$$A\Gamma : AB = EZ : ZH;$$

itaque $EZ > ZH$ [Eucl. V, 14]. et quoniam est
 $\Gamma A \times AB = EZ^2$, erit

$$\Gamma A : AB = ZE^2 : AB^2 \text{ [Eucl. VI, 17; V def. 9]}$$

$$= \Delta Z^2 : \Delta A^2 \text{ [Eucl. V, 15].}$$

est autem $\Gamma A : AB = EZ : ZH$. quare etiam

τὸ ἀπὸ ΔA . ὥς δὲ ἡ ΓA πρὸς AB , ἡ EZ πρὸς ZH .
 ὥς ἄρα ἡ EZ πρὸς ZH , τὸ ἀπὸ $Z\Delta$ πρὸς τὸ ἀπὸ
 ΔA . τὸ δὲ ἀπὸ $Z\Delta$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ $Z\Delta E$. ὥς
 ἄρα ἡ EZ πρὸς ZH , τὸ ὑπὸ $E\Delta Z$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔA .
 5 δύο οὖν εὐθειῶν πεπερασμένων πρὸς ὁρθὰς ἀλλήλαις
 κειμένων καὶ μείζονος οὔσης τῆς EZ γεγραφθῶ ἑλλειψις,
 ἧς διάμετρος μὲν ἡ EZ , ὁρθία δὲ ἡ ZH . ἥξει δὴ
 ἡ τομὴ διὰ τοῦ A διὰ τὸ εἶναι ὥς τὸ ὑπὸ $Z\Delta E$ πρὸς
 τὸ ἀπὸ ΔA , ἡ EZ πρὸς ZH . καὶ ἐστὶν ἴση ἡ $\Delta\Delta$
 10 τῇ ΔB . ἐλεύσεται οὖν καὶ διὰ τοῦ B . γέγραπται
 οὖν ἑλλειψις περὶ τὴν AB . καὶ ἐπεὶ ἐστὶν, ὥς ἡ ΓA
 πρὸς AB , τὸ ἀπὸ $Z\Delta$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔA , το δὲ ἀπο
 ΔA ἴσον τῷ ὑπὸ $\Delta\Delta B$, ὥς ἄρα ἡ ΓA πρὸς AB , τὸ
 ἀπὸ ΔZ πρὸς τὸ ὑπὸ $\Delta\Delta B$. ὥστε ὁρθία ἐστὶν
 15 ἡ $\Delta\Gamma$.

νη'.

Ἀλλὰ δὴ μὴ ἔστω ἡ δοθεῖσα γωνία ὁρθή, καὶ
 ἔστω αὐτῇ ἴση ἡ ὑπὸ $B\Delta\Delta$, καὶ τετμήσθω ἡ AB
 δίχα κατὰ τὸ E , καὶ ἐπὶ τῆς AE γεγραφθῶ ἡμικύκλιον
 20 τὸ AZE , καὶ ἐν αὐτῷ τῇ $\Delta\Delta$ παράλληλος ἦχθω ἡ
 ZH ποιοῦσα τὸν τοῦ ἀπὸ ZH πρὸς τὸ ὑπὸ AHE
 λόγον τὸν αὐτὸν τῷ τῆς ΓA πρὸς τὴν AB , καὶ ἐπε-
 ξεύχθωσαν αἱ AZ , EZ καὶ ἐκβεβλήσθωσαν, καὶ εἰ-
 λήφθω τῶν ΔEZ μέση ἀνάλογον ἡ $E\Theta$, καὶ τῇ $E\Theta$
 25 ἴση κείσθω ἡ EK , καὶ πεποιήσθω τῷ ἀπὸ AZ ἴσον
 τὸ ὑπὸ $\Theta Z\Delta$, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ $K\Delta$, καὶ ἀπὸ τοῦ Θ
 τῇ ΘZ πρὸς ὁρθὰς ἦχθω ἡ $\Theta M\Xi$ παράλληλος γινομένη
 τῇ $AZ\Delta$. ὁρθὴ γὰρ ἡ πρὸς τῷ Z . καὶ δύο δοθεισῶν
 εὐθειῶν πεπερασμένων πρὸς ὁρθὰς ἀλλήλαις τῶν


9. ἡ] (pr.) debuit τήν. 16. νη'] p, Eutocius; om. V. 27.
 $\Theta M\Xi$] fort. ΘM ; $\mu\delta$, δ e corr., p.

$EZ:ZH = ZA^2:AA^2$. est autem $ZA^2 = ZA \times AE$; itaque $EZ:ZH = EA \times AZ:AA^2$. duabus igitur rectis terminatis inter se perpendicularibus positis, quarum maior est EZ , describatur ellipsis, cuius diametrus sit EZ , latus rectum autem ZH [prop. LVI]; sectio igitur per A ueniet, quia est

$Z\Delta \times \Delta E : \Delta A^2 = EZ : ZH$ [prop. XXI].
et $\Delta A = \Delta B$; quare etiam per B ueniet [ibid.]. itaque circum AB ellipsis descripta est. et quoniam est $\Gamma A : AB = Z\Delta^2 : \Delta A^2$, et $\Delta A^2 = \Delta A \times \Delta B$, erit $\Gamma A : AB = \Delta Z^2 : \Delta A \times \Delta B$. ergo $A\Gamma$ latus rectum est [prop. XXI].

LVIII.

Iam uero datus angulus rectus ne sit, eique aequalis sit $\angle BAA$, et AB in E in duas partes aequales sectetur, in AE autem semicirculus describatur AZE ,



et in eo rectae AA parallela ducatur ZH , quae efficiat $ZH^2 : AH \times HE = \Gamma A : AB$, et ducantur AZ , EZ producanturque, et inter AE , EZ media proportionalis sit $E\Theta$, ponaturque $EK = E\Theta$, et fiat $\Theta Z \times ZA = AZ^2$,

ducaturque $K\mathcal{A}$, a $\mathcal{O}$ autem ad rectam $\mathcal{O}Z$ perpendicularis ducatur $\mathcal{O}M\mathcal{E}$, quae rectae AZA parallela fit [Eucl. I, 28]; nam angulus ad Z positus rectus est [Eucl. III, 31]. et datis duabus rectis terminatis inter se perpendicularibus $K\mathcal{O}$, $\mathcal{O}M$ describatur ellipsis,

$KΘ$, $ΘΜ$ γεγραφθῶ ελλειψεις, ἥς διάμετρος πλαγία ἡ
 $KΘ$, ὁρθία δὲ τοῦ εἵδους πλευρὰ ἡ $ΘΜ$, αἱ δὲ κατ-
 αγόμεναι ἐπὶ τὴν $ΘΚ$ ἐν ὁρθῇ γωνίᾳ καταχθίσονται·
 ἥξει δὲ ἡ τομὴ διὰ τοῦ A διὰ τὸ ἴσον εἶναι τὸ ἀπὸ
 5 ZA τῷ ὑπὸ $ΘZA$. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ μὲν $ΘE$
 τῇ EK , ἡ δὲ AE τῇ EB , ἥξει καὶ διὰ τοῦ B ἡ τομὴ,
 καὶ ἔσται κέντρον μὲν τὸ E , διάμετρος δὲ ἡ AEB .
 καὶ ἐφάπεται τῆς τομῆς ἡ AA διὰ τὸ ἴσον εἶναι τὸ
 ὑπὸ AEZ τῷ ἀπὸ $EΘ$. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν, ὥς ἡ $ΓA$
 10 πρὸς AB , τὸ ἀπὸ ZH πρὸς τὸ ὑπὸ AHE , ἀλλ' ἡ μὲν
 $ΓA$ πρὸς AB τὸν συγκείμενον ἔχει λόγον ἐκ τοῦ τῆς
 $ΓA$ πρὸς τὴν διπλασίαν τῆς AA καὶ τοῦ τῆς διπλασίας
 τῆς AA πρὸς τὴν AB , τουτέστι τῆς AA πρὸς AE ,
 τὸ δὲ ἀπὸ ZH πρὸς τὸ ὑπὸ AHE τὸν συγκείμενον
 15 ἔχει λόγον ἐκ τοῦ τῆς ZH πρὸς HE καὶ τοῦ τῆς ZH
 πρὸς HA , ὁ ἄρα συγκείμενος λόγος ἐκ τοῦ τῆς $ΓA$
 πρὸς τὴν διπλασίαν τῆς AA καὶ τοῦ τῆς AA πρὸς
 AE ὁ αὐτός ἐστι τῷ συγκειμένῳ ἐκ τοῦ τῆς ZH
 πρὸς HE καὶ τοῦ τῆς ZH πρὸς HA . ἀλλ' ὥς ἡ AA
 20 πρὸς AE , ἡ ZH πρὸς HE · καὶ κοινοῦ ἀφαιρεθέντος
 τούτου τοῦ λόγου ἔσται ὥς ἡ $ΓA$ πρὸς τὴν διπλασίαν
 τῆς AA , ἡ ZH πρὸς HA , τουτέστιν ἡ $ΞA$ πρὸς AN .
 ὅταν δὲ τοῦτο ᾗ, ὁρθία τοῦ εἵδους πλευρὰ ἐστὶν ἡ $ΑΓ$.

νθ'.

25 Δύο δοθεισῶν εὐθειῶν πρὸς ὁρθὰς ἀλλήλαις πε-
 περασμένων εὐρεῖν ἀντικειμένας, ὧν διάμετρος ἐστὶ μία
 τῶν δοθεισῶν εὐθειῶν, κορυφὴ δὲ τὰ πέρατα τῆς
 εὐθείας, αἱ δὲ καταγόμεναι ἐν ἑκατέρᾳ τῶν τομῶν ἐν

18. ZH] p e, Z e corr. m. 1 V. 20. καὶ κοινοῦ] p, κοι-
 νοῦ V, κοινοῦ ἄρα Comm. 24. νθ'] p, Eutocius; om. V.
 27. κορυφαί p.

ita ut diametrus transuersa sit $K\Theta$, latus autem rectum figurae ΘM , et rectae ad ΘK ordinate ductae in angulo recto ducantur [prop. LVI—LVII]. sectio igitur per A ueniet, quia $ZA^2 = \Theta Z \times ZA$ [prop. XIII]. et quoniam est $\Theta E = EK$, $AE = EB$, sectio etiam per B ueniet, et E centrum erit, diametrus autem AEB [prop. LI coroll.]. et AA sectionem continget [prop. XXXVIII], quia $AE \times EZ = E\Theta^2$. et quoniam est

$$\Gamma A : AB = ZH^2 : AH \times HE,$$

est autem

$$\begin{aligned} \Gamma A : AB &= (\Gamma A : 2AA) \times (2AA : AB) \\ &= (\Gamma A : 2AA) \times (AA : AE), \end{aligned}$$

et

$$ZH^2 : AH \times HE = (ZH : HE) \times (ZH : HA),$$

erit

$$(\Gamma A : 2AA) \times (AA : AE) = (ZH : HE) \times (ZH : HA).$$

uerum

$$AA : AE = ZH : HE \text{ [Eucl. VI, 4].}$$

hac igitur ratione, quae communis est, ablata erit

$$\Gamma A : 2AA = ZH : HA = EA : AN \text{ [Eucl. VI, 4].}$$

sin hoc est, latus rectum figurae est AF [prop. L].

LIX.

Datis duabus rectis terminatis inter se perpendicularibus oppositas inuenire, ita ut earum diametrus sit alterutra datarum rectarum, uertex autem termini rectae, et rectae in alterutra sectionum in angulo dato ductae quadratae aequales sint spatiis alteri adplicatis et

τῇ δοθείσῃ γωνίᾳ δυνήσονται τὰ παρὰ τὴν ἑτέραν
παρακείμενα καὶ ὑπερβάλλοντα ὁμοίῳ τῷ ὑπὸ τῶν δο-
θεισῶν εὐθειῶν περιεχομένῳ.

ἔστωσαν αἱ δοθεῖσαι δύο εὐθεῖαι πρὸς ὁρθὰς ἀλλή-
5 λαις πεπερασμέναι αἱ $BE, B\Theta$, ἡ δὲ δοθεῖσα γωνία
ἔστω ἡ H . δεῖ δὴ γράψαι ἀντικειμένης περὶ μίαν τῶν
 $BE, B\Theta$, ὥστε τὰς καταγομένης κατὰγεσθαι ἐν γωνίᾳ
τῇ H .

καὶ δύο δοθεισῶν εὐθειῶν τῶν $BE, B\Theta$ γεγράφθω
10 ὑπερβολή, ἥς διάμετρος ἔσται πλαγία ἡ BE , ὁρθία δὲ
τοῦ εἰδους πλευρὰ ἡ ΘB , αἱ δὲ καταγόμεναι ἐπὶ τὴν
ἐπ' εὐθείας τῇ BE καταχθήσονται ἐν γωνίᾳ τῇ H ,
καὶ ἔστω ἡ $AB\Gamma$. τοῦτο γὰρ ὥς δεῖ γενέσθαι, προ-
γέγραπται. ἤχθω δὴ διὰ τοῦ E τῇ BE πρὸς ὁρθὰς
15 ἡ EK ἴση οὖσα τῇ $B\Theta$, καὶ γεγράφθω ὁμοίως ἄλλη
ὑπερβολή ἡ ΔEZ , ἥς διάμετρος μὲν ἡ BE , ὁρθία δὲ
τοῦ εἰδους πλευρὰ ἡ EK , αἱ δὲ καταγόμεναι ἀπὸ τῆς
τομῆς τεταγμένως καταχθήσονται ἐν τῇ ἐφεξῆς γωνίᾳ
τῇ H . φανερόν δὴ, ὅτι αἱ B, E εἰσιν ἀντικείμεναι,
20 διάμετρος δὲ αὐτῶν μία ἐστί, καὶ αἱ ὁρθίαι ἴσαι.

ξ'.

Δύο δοθεισῶν εὐθειῶν δίχα τεμνουσῶν ἀλλήλας
γράψαι περὶ ἑκατέραν αὐτῶν ἀντικειμένης τομάς, ὥστε
εἶναι αὐτῶν συζυγεῖς διαμέτρους τὰς εὐθείας, καὶ τὴν
25 τῶν δύο ἀντικειμένων διαμέτρον τὸ τῶν ἑτέρων ἀντι-

6. δῆ] c, δῆ uel δέ corr. ex δεῖ p („utique“ Comm.),
δεῖ V; om. Halley cum Memo. 18. ἐφεξῆς] male del. Halley.

19. δῆ] corr. ex δέ m. 1 V. 20. αἱ ὁρθίαι] scripsi; διορθίαι
(sic) V; ὁρθίαι p et post lacunam c, Halley. 21. ξ'] p, Eu-
tocius; om. V.

sint datae duae rectae terminatae inter se perpendiculares BE , $B\Theta$, datus autem angulus sit H . oportet igitur circum alterutram rectarum BE , $B\Theta$ oppositas describere, ita ut rectae ordinatae in angulo H ducantur.

Diagram illustrating the geometric construction for the proof of Proposition LV. It shows two curves, AFB and EHZ , with tangents AB and EH meeting at B and E respectively. A horizontal line BE connects the points of tangency. A right angle is marked at B , and an angle H is marked at E . The diagram illustrates the relationship between the tangents and the curves.

LX.

Datis duabus rectis inter se in binas partes aequales secantibus circum utramque sectiones oppositas describere, ita ut diametri earum coniugatae sint rectae datae, et diametrus duarum oppositarum quadrata aequalis sit figurae alterarum oppositarum, similiter-

κειμένων δύνασθαι εἶδος, ὁμοίως δὲ καὶ τὴν τῶν ἰσῶν ἀντικειμένων διάμετρον τὸ τῶν ἐτέρων ἀντικειμένων δύνασθαι εἶδος.


ἔστωσαν αὖ δοθεῖσαι δύο εὐθεῖαι δίχα τέμνουσες ἀλλήλας αὖ $ΑΓ$, $ΔΕ$. δεῖ δὴ περὶ ἑκατέραν αὐτῶν διάμετρον γράψαι ἀντικείμενας, ἵνα ὅσιν αὖ $ΑΓ$, $ΔΕ$ συζυγεῖς ἐν αὐταῖς, καὶ ἡ μὲν $ΔΕ$ τὸ τῶν περὶ τὴν $ΑΓ$ εἶδος δύνηται, ἡ δὲ $ΑΓ$ τὸ τῶν περὶ τὴν $ΔΕ$ εἶδος ἴσον τὸ ὑπὸ $ΑΓΔ$, πρὸς ὀρθὰς
 10 ἔστω $Γ$ $ΑΓ$ τῇ $ΓΔ$. καὶ δύο δοθεισῶν εὐθειῶν περὶ ὀρθὰς ἀλλήλαις τῶν $ΑΓ$, $ΓΔ$ γεγραφθῶσαν ἀντικείμεναι αὖ $ΖΑΗ$, $ΘΓΚ$, ὧν διάμετρος μὲν ἔσται πλαγία ἡ $ΔΕ$ ὀρθία δὲ ἡ $ΓΔ$, αὖ δὲ καταγόμεναι ἀπὸ τῶν τομῶν ἐπὶ τὴν $ΓΔ$ καταχθήσονται ἐν τῇ γωνίᾳ τῇ δοθείᾳ
 15 ἔσται δὲ ἡ $ΔΕ$ δευτέρα διάμετρος τῶν ἀντικειμένων μέσων τε γὰρ λόγον ἔχει τῶν τοῦ εἶδους πλευρῶν παρὰ τεταγμένως κατηγμένην οὔσα δίχα τέτμηται καὶ τὸ $Β$. ἔστω δὲ πάλιν τῶν ἀπὸ $ΑΓ$ ἴσον τὸ ὑπὸ $ΔΕ$, $ΔΕ$ πρὸς ὀρθὰς δὲ ἔστω ἡ $ΔΖ$ τῇ $ΔΕ$. καὶ δύο δοθεισῶν εὐθειῶν πρὸς ὀρθὰς ἀλλήλαις κειμένων τῶν $ΕΔ$, $ΔΕ$ γεγραφθῶσαν ἀντικείμεναι αὖ $ΜΔΝ$, $ΟΕΞ$, ὧν δίαμετρος μὲν πλαγία ἡ $ΔΕ$, ὀρθία δὲ τοῦ εἶδους πλευρῶν ἡ $ΔΖ$, αὖ δὲ καταγόμεναι ἀπὸ τῶν τομῶν καταχθήσονται ἐπὶ τὴν $ΔΕ$ ἐν τῇ δοθείσῃ γωνίᾳ· ἔσται
 25 καὶ τῶν $ΜΔΝ$, $ΞΕΟ$ δευτέρα διάμετρος ἡ $ΑΓ$. ὧν

6. $ΑΓ$] $ΑΒ$ V; corr. p. 10. $ΑΓ$] $ΑΓ$ V; corr. Memus („g.
 12. $ΓΔ$] $ΓΔ$ V; corr. p. 15. δὲ] Halley, δὲ V p.c. 17. πα
 τεταγμένως, litt. s. euan., V. κατηγμένην] scripsi; κατηγμένην
 18. $ΔΖ$] $ΔΡ$ Halley cum Comm. 19. $ΔΖ$] $ΔΡ$ Halley cu
 Comm. 20. $ΔΖ$] $ΔΡ$ Halley cum Comm. 21. $ΜΔΝ$, $ΟΕ$,
 $ΜΔ$, $ΝΟΞ$ V; corr. p. 23. $ΔΖ$] $ΔΡ$ Halley cum Comm. (etis
 in figura litteram Z bis habet V). 25. καὶ] καὶ περὶ V; corr.
 fort. scr. καὶ ἐπὶ.

que etiam diameter alterarum oppositarum quadrata aequalis sit figurae alterarum oppositarum.

sint datae duae rectae inter se in binas partes aequales secantes AG , AE . oportet igitur circum utramque diametrum oppositas describere, ita ut AG , AE in iis coniugatae sint, et AE^2 aequalis sit figurae oppositarum circum AG descriptarum, AG^2 autem figurae oppositarum circum AE .

sit $AG \times GA = AE^2$, et AG ad GA perpendicularis sit. et datis duabus rectis inter se perpendicularibus AG , GA describantur oppositae ZAH , ΘGK , ita ut diameter sit transversa GA , latus autem rectum GA , et rectae a sectionibus ad GA ordinate ductae in dato angulo ducantur [prop. LIX]. erit igitur AE altera diameter oppositarum [def. alt. 3]; nam et mediam habet rationem inter latera figurae



[Eucl. VI, 17] et rectae ordinate ductae parallela in B in duas partes aequales secta est. rursus igitur sit $AE \times EZ = AG^2$, et AZ ad AE perpendicularis sit. et datis duabus rectis inter se perpendicularibus positae EA , AZ oppositae describantur MAN , OEZ , ita ut diameter transversa sit AE , latus autem rectum figurae AZ , et rectae a sectionibus ordinate

ἡ μὲν $ΑΓ$ τὰς τῆς $ΔΕ$ παραλλήλους μεταξὺ τῶν
 $ΖΑΗ, ΘΓΚ$ τομῶν δίχα τέμνει, ἡ δὲ $ΔΕ$ τὰς τῆς $ΑΓ$
ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.

καλείσθωσαν δὲ αὗται αἱ τομαὶ συζυγεῖς.

In fine: Ἀπολλωνίου κωνικῶν α' m. 2 V.

ductae ad $\angle E$ in dato angulo ducantur [prop. LIX];
 erit igitur etiam AF altera diametrus sectionum
 MAN , EEO [def. alt. 3]. ergo AF rectas rectae
 $\angle E$ parallelas inter sectiones ZAH , OK positas in
 binas partes aequales secat, $\angle E$ autem rectas rectae
 AF parallelas [prop. XVI]; quod oportebat fieri
 [cfr. def. 6].

tales autem sectiones coniugatae uocentur.

ΚΩΝΙΚΩΝ β'.

Ἀπολλώνιος Εὐδήμῳ χαίρειν.

Εἰ ὑγιαίνεις, ἔχοι ἂν καλῶς· καὶ αὐτὸς δὲ μετρίως ἔχω.

5 Ἀπολλώνιον τὸν υἱόν μου πέπομφα πρὸς σε κομίζοντά σοι τὸ β' βιβλίον τῶν συντεταγμένων ἡμῖν κωνικῶν. δίδελθε οὖν αὐτὸ ἐπιμελῶς καὶ τοῖς ἀξίοις τῶν τοιούτων κοινωνεῖν μεταδίδου· καὶ Φιλωνίδης δὲ ὁ γεωμέτρης, ὃν καὶ συνέστησά σοι ἐν Ἐφέσῳ, ἐάν
10 ποτε ἐπιβαλῇ εἰς τοὺς κατὰ Πέργαμον τόπους, μεταδὸς αὐτῷ, καὶ σεαυτοῦ ἐπιμελοῦ, ἵνα ὑγιαίνης. εὐτύχει.

α'.

Ἐὰν ὑπερβολῇς κατὰ κορυφὴν εὐθείᾳ ἐφάπτεται, καὶ ἀπ' αὐτῆς ἐφ' ἑκάτερα τῆς διαμέτρου ἀποληφθῇ
15 ἴση τῇ δυναμένη τὸ τέταρτον τοῦ εἵδους, αἱ ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς τομῆς ἐπὶ τὰ ληφθέντα πέρατα τῆς ἐφαπτομένης ἀγόμεναι εὐθεῖαι οὐ συμπεσοῦνται τῇ τομῇ.

ἔστω ὑπερβολή, ἥς διάμετρος ἡ AB , κέντρον δὲ τὸ Γ , ὀρθία δὲ ἡ BZ , καὶ ἐφαπτέσθω τῆς τομῆς κατὰ
20 τὸ B ἡ AE , καὶ τῷ τετάρτῳ τοῦ ὑπὸ τῶν ABZ εἵδους ἴσον ἔστω τὸ ἀφ' ἑκατέρας τῶν BA , BE , καὶ ἐπι-

Ἀπολλωνίου κωνικῶν β'ον (β m. 2) V, et v (β corr. ex α m. 2).
3. ὑγιαίνεις p. 12. α'] v p, om. V, ut deinceps.

CONICORUM LIBER II.


Apollonius Eudemo s.

Si uales, bene est; equidem satis ualeo.

Apollonium filium ad te misi secundum librum conicorum a me conscriptorum perlaturum. eum igitur diligenter peruolue et cum iis communica, qui talibus rebus digni sunt. et cum Philonide quoque geometra, quem tibi Ephesi commendauī, si quando ad uiciniam Pergami uenerit, eum communica, atque cura, ut ualeas. uale.

I.

Si recta hyperbolam in uertice contingit, et ex ea
in utramque partem diametri recta aufertur aequalis



rectae, quae quadrata quartae parti figurae aequalis est,
rectae a centro sectionis ad terminos sumptos con-
tingentis ductae cum sectione non concurrent.

ξευχθεῖσαι αὐτὰ $\Gamma\Delta$, ΓE ἐκβεβλήσθωσαν. λέγω, ὅτι οὐ
 συμπεσοῦνται τῇ τομῇ.

εἰ γὰρ δυνατόν, συμπιπτέτω ἡ $\Gamma\Delta$ τῇ τομῇ κατὰ
 τὸ H , καὶ ἀπὸ τοῦ H τεταγμένως κατήχθω ἡ $H\Theta$.
 5 παράλληλος ἄρα ἐστὶ τῇ ΔB . ἐπεὶ οὖν ἐστὶν, ὥς ἡ
 AB πρὸς BZ , τὸ ἀπὸ AB πρὸς τὸ ὑπὸ ABZ , ἀλλὰ
 τοῦ μὲν ἀπὸ AB τέταρτον μέρος τὸ ἀπὸ ΓB , τοῦ δὲ
 ὑπὸ ABZ τέταρτον τὸ ἀπὸ $B\Delta$, ὥς ἄρα ἡ AB πρὸς
 BZ , τὸ ἀπὸ ΓB πρὸς τὸ ἀπὸ ΔB , τουτέστι τὸ ἀπὸ
 10 $\Gamma\Theta$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘH . ἐστὶ δὲ καὶ ὥς ἡ AB πρὸς BZ ,
 τὸ ὑπὸ $A\Theta B$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘH . ὥς ἄρα τὸ ἀπὸ $\Gamma\Theta$
 πρὸς τὸ ἀπὸ ΘH , τὸ ὑπὸ $A\Theta B$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘH .
 ἴσον ἄρα τὸ ὑπὸ $A\Theta B$ τῷ ἀπὸ $\Gamma\Theta$. ὅπερ ἄτοπον.
 οὐκ ἄρα ἡ $\Gamma\Delta$ συμπεσεῖται τῇ τομῇ. ὁμοίως δὲ δει-
 15 ξομεν, ὅτι οὐδὲ ἡ ΓE ἀσύμπτωτοι ἄρα εἰσὶ τῇ
 τομῇ αὐτὰ $\Gamma\Delta$, ΓE .

β'.

Τῶν αὐτῶν ὄντων δεικτέον, ὅτι ἑτέρα ἀσύμπτωτος
 οὐκ ἔστι τέμνουσα τὴν περιεχομένην γωνίαν ὑπὸ τῶν
 20 $\Delta\Gamma E$.

εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω ἡ $\Gamma\Theta$, καὶ διὰ τοῦ B τῇ
 $\Gamma\Delta$ παράλληλος ἡχθῶ ἡ $B\Theta$ καὶ συμπιπτέτω τῇ $\Gamma\Theta$
 κατὰ τὸ Θ , καὶ τῇ $B\Theta$ ἴση κείσθω ἡ ΔH , καὶ ἐπι-
 ξευχθεῖσα ἡ $H\Theta$ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὰ K , A , M . ἐπεὶ
 25 οὖν αὐτὰ $B\Theta$, ΔH ἴσαι εἰσὶ καὶ παράλληλοι, καὶ αὐτὰ
 ΔB , $H\Theta$ ἴσαι εἰσὶ καὶ παράλληλοι. καὶ ἐπεὶ ἡ AB
 δίχα τέμνεται κατὰ τὸ Γ , καὶ πρόσκειται αὐτῇ τις ἡ
 $B\Delta$, τὸ ὑπὸ ΔAB μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓB ἴσον ἐστὶ τῷ

4. τοῦ] p, τῆς V. 5. ἡ] p, om. V. 10. ΘH] c, e corr.
 m. 1 V. 11. $A\Theta B$] $AB\Theta$ V; $A\Theta$, ΘB p.

sit hyperbola, cuius diametrus sit AB , centrum autem Γ , latus rectum autem BZ , et ΔE sectionem in B contingat, sit autem

$$B\Delta^2 = BE^2 = \frac{1}{4}AB \times BZ,$$

et ductae $\Gamma\Delta$, ΓE producantur. dico, eas cum sectione non concurrere.

nam si fieri potest, $\Gamma\Delta$ cum sectione in H concurrat, et ab H ordinate ducatur $H\Theta$; erit igitur rectae ΔB parallela [cfr. I, 17]. quoniam igitur est $AB : BZ = AB^2 : AB \times BZ$, et $\Gamma B^2 = \frac{1}{4}AB^2$,

$$B\Delta^2 = \frac{1}{4}AB \times BZ,$$

erit $AB : BZ = \Gamma B^2 : \Delta B^2 = \Gamma\Theta^2 : \Theta H^2$ [Eucl. VI, 4]. est autem etiam $AB : BZ = A\Theta \times \Theta B : \Theta H^2$ [I, 21]. itaque $\Gamma\Theta^2 : \Theta H^2 = A\Theta \times \Theta B : \Theta H^2$. quare

$$A\Theta \times \Theta B = \Gamma\Theta^2 \text{ [Eucl. V, 9];}$$

quod absurdum est [Eucl. II, 6]. ergo $\Gamma\Delta$ cum sectione non concurret. iam similiter demonstrabimus, ne ΓE quidem concurrere. ergo $\Gamma\Delta$, ΓE asymptotae sectionis sunt.

II.

Iisdem positis demonstrandum, aliam asymptotam non esse secantem angulum rectis $\Delta\Gamma$, ΓE comprehensum.

nam si fieri potest, sit $\Gamma\Theta$, et per B rectae $\Gamma\Delta$ parallela ducatur $B\Theta$ et cum $\Gamma\Theta$ in Θ concurrat, ponaturque $\Delta H = B\Theta$, et ducta $H\Theta$ ad K , A , M producat. iam quoniam $B\Theta$, ΔH aequales sunt et parallelae, etiam ΔB , $H\Theta$ aequales sunt et parallelae [Eucl. I, 33]. et quoniam AB in Γ in duas partes

ἀπὸ $\Gamma\Delta$. ὁμοίως δὴ ἐπειδὴ παράλληλός ἐστιν ἡ HM
 τῇ ΔE , καὶ ἴση ἡ ΔB τῇ BE , ἴση ἄρα καὶ ἡ $H\Delta$
 τῇ AM . καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ $H\Theta$ τῇ ΔB , μείζων
 ἄρα ἡ HK τῆς ΔB . ἔστι δὲ καὶ ἡ KM τῆς BE
 5 μείζων, ἐπεὶ καὶ ἡ AM . τὸ ἄρα ὑπὸ MKH μείζον
 ἐστὶ τοῦ ὑπὸ ΔBE , τουτέστι τοῦ ἀπὸ ΔB . ἐπεὶ οὖν
 ἐστὶν, ὥς ἡ AB πρὸς BZ , τὸ ἀπὸ ΓB πρὸς τὸ ἀπὸ
 $B\Delta$, ἀλλ' ὥς μὲν ἡ AB πρὸς BZ , τὸ ὑπὸ ΔAB πρὸς
 τὸ ἀπὸ ΔK , ὥς δὲ τὸ ἀπὸ ΓB πρὸς τὸ ἀπὸ $B\Delta$, τὸ
 10 ἀπὸ $\Gamma\Delta$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔH , καὶ ὥς ἄρα τὸ ἀπὸ $\Gamma\Delta$
 πρὸς τὸ ἀπὸ ΔH , τὸ ὑπὸ ΔAB πρὸς τὸ ἀπὸ ΔK .
 ἐπεὶ οὖν ἐστὶν, ὥς ὅλον τὸ ἀπὸ $\Delta\Gamma$ πρὸς ὅλον τὸ ἀπὸ
 ΔH , οὕτως ἀφαιρεθὲν τὸ ὑπὸ ΔAB πρὸς ἀφαιρεθὲν
 τὸ ἀπὸ ΔK , καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ ἀπὸ ΓB πρὸς λοιπὸν
 15 τὸ ὑπὸ MKH ἐστὶν, ὥς τὸ ἀπὸ $\Gamma\Delta$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔH ,
 τουτέστι τὸ ἀπὸ ΓB πρὸς τὸ ἀπὸ ΔB . ἴσον ἄρα τὸ
 ἀπὸ ΔB τῷ ὑπὸ MKH . ὅπερ ἄτοπον· μείζον γὰρ
 αὐτοῦ δέδεικται. οὐκ ἄρα ἡ $\Gamma\Theta$ ἀσύμπτωτός ἐστι
 τῇ τομῇ.

20

γ'.

Ἐὰν ὑπερβολῆς εὐθεΐα ἐφάπτεται, συμπεσεῖται ἑκα-
 τέρα τῶν ἀσυμπτῶτων καὶ δίχα τμηθήσεται κατὰ τὴν
 ἀφῆν, καὶ τὸ ἀφ' ἑκατέρας τῶν τμημάτων αὐτῆς τετρά-
 γωνον ἴσον ἔσται τῷ τετάρτῳ τοῦ γινομένου εἵδους
 25 πρὸς τῇ διὰ τῆς ἀφῆς ἀγομένη διαμέτρῳ.

ἔστω ὑπερβολῆς ἡ $AB\Gamma$, κέντρον δὲ αὐτῆς τὸ E
 καὶ ἀσύμπτωτοι αἱ ZE , EH , καὶ ἐφαπτέσθω τις αὐτῆς


9. Post pr. ἀπό ins. ΔH καὶ ὥς ἄρα τὸ ἀπὸ $\Gamma\Delta$ πρὸς τὸ
 ἀπὸ ΔH τὸ ὑπὸ ΔAB πρὸς τὸ ἀπὸ V (ex lin. 10—11 petita).

15. MKH] ante H eras. 1 litt. V . τῷ] (pr.) τ supra scr.
 m. 1 V . 18. $\Gamma\Theta$] p , $\Gamma\Delta$ V .

aequales secta est, eique adiecta est BA , erit

$$AA \times AB + \Gamma B^2 = \Gamma A^2 \text{ [Eucl. II, 6].}$$

iam eodem modo, quoniam HM rectae AE parallela est, et $AB = BE$, erit etiam $HA = AM$ [Eucl. VI, 1].



et quoniam est $H\Theta = AB$, erit $HK > AB$. uerum etiam $KM > BE$, quoniam etiam $AM > BE$. itaque

$MK \times KH > AB \times BE$,
h. e. $> AB^2$. quoniam igitur
 $AB:BZ = \Gamma B^2:BA^2$ [prop. I],
uerum [I, 21]

$AB:BZ = AA \times AB:AK^2$,
et [Eucl. VI, 4]

$\Gamma B^2:BA^2 = \Gamma A^2:AH^2$,
erit etiam

$$\Gamma A^2:AH^2 = AA \times AB:AK^2.$$

quoniam igitur est, ut totum

$AA \times AB$ ad totum AK^2 , ita ablatum $AA \times AB$ ad ablatum AK^2 , erit etiam reliquum $\Gamma B^2:MK \times KH$ [Eucl. II, 5] $= \Gamma A^2:AH^2$ [Eucl. V, 19] $= \Gamma B^2:AB^2$. itaque $AB^2 = MK \times KH$ [Eucl. V, 9]; quod absurdum est; demonstraui enim, esse $MK \times KH > AB^2$. ergo $\Gamma\Theta$ asymptota sectionis non est.

III.

Si recta hyperbolam contingit, utrique asymptotae concurret et in puncto contactus in duas partes aequales secabitur, quadratumque utriusque partis eius aequale erit quartae parti figurae ad diametrum per punctum contactus ductam effectae.

sit hyperbola ABI , centrum autem eius E et asymptotae ZE, EH , eamque contingat in B recta aliqua ΘK . dico, ΘK productam cum ZE, EH concurrere.

nam si fieri potest, ne concurrat, et ducta EB producat, ponaturque $EA = BE$; BA igitur diameter est. ponatur igitur ΘB^2 et BK^2 quartae parti figurae ad BA effectae aequale, ducanturque $E\Theta, EK$. hae igitur asymptotae sunt [prop. I]; quod absurdum est [prop. II]; supposuimus enim, ZE, EH asymptotas esse. ergo $K\Theta$ producta cum asymptotis EZ, EH in Z, H concurret.

iam dico, esse etiam BZ^2 et BH^2 quartae parti figurae ad BA effectae aequalia.

ne sint enim, sed, si fieri potest, sit $B\Theta^2$ et BK^2 quartae parti figurae aequale. itaque $\Theta E, EK$ asymptotae sunt [prop. I]; quod absurdum est [prop. II]. ergo BZ^2 et BH^2 quartae parti figurae ad BA effectae aequalia sunt.

IV.

Datis duabus rectis angulum comprehendentibus punctoque intra angulum posito per punctum coni sectionem, hyperbola quae uocatur, ita describere, ut datae rectae asymptotae sint.

sint duae rectae AI, AB quemuis angulum comprehendentes ad A positum, datumque sit punctum aliquod Δ , et oporteat per Δ in asymptotis AI, AB hyperbolam describere.

ἔστωσαν δύο εὐθεῖαι αἱ $ΑΓ, ΑΒ$ τυχοῦσαν γωνίαν περιέχουσιν τὴν πρὸς τῷ $Α$, καὶ δεδύσθω σημείον τι τὸ $Δ$, καὶ δέον ἔστω διὰ τοῦ $Δ$ τὰς $ΓΑΒ$ γράψαι εἰς ἀσύμπτωτους ὑπερβολήν.

5 ἐπεξεύχθω ἡ $ΑΔ$ καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ $Ε$, καὶ κείσθω τῇ $ΔΑ$ ἴση ἡ $ΑΕ$, καὶ διὰ τοῦ $Δ$ τῇ $ΑΒ$ παράλληλος ἡχθω ἡ $ΔΖ$, καὶ κείσθω τῇ $ΑΖ$ ἴση ἡ $ΖΓ$, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ $ΓΔ$ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ $Β$, καὶ τῷ ἀπὸ τῆς $ΓΒ$ ἴσον γεγυμένω τὸ ὑπὸ $ΔΕ, Η$, καὶ ἐκ-
10 βληθείσης τῆς $ΑΔ$ γεγράφθω περὶ αὐτὴν διὰ τοῦ $Δ$ ὑπερβολή, ὥστε τὰς καταγομένας δύνασθαι τὰ παρὰ τὴν $Η$ ὑπερβάλλοντα εἶδει ὁμοίῳ τῷ ὑπὸ $ΔΕ, Η$. ἐπεὶ οὖν παράλληλός ἐστιν ἡ $ΔΖ$ τῇ $ΒΑ$, καὶ ἴση ἡ $ΓΖ$ τῇ $ΖΑ$, ἴση ἄρα καὶ ἡ $ΓΔ$ τῇ $ΔΒ$. ὥστε τὸ ἀπὸ τῆς
15 $ΓΒ$ τετραπλάσιόν ἐστι τοῦ ἀπὸ $ΓΔ$. καὶ ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς $ΓΒ$ ἴσον τῷ ὑπὸ $ΔΕ, Η$. ἐκάτερον ἄρα τῶν ἀπὸ $ΓΔ, ΔΒ$ τέταρτον μέρος ἐστὶ τοῦ ὑπὸ $ΔΕ, Η$ εἰδους. αἱ ἄρα $ΑΒ, ΑΓ$ ἀσύμπτωτοί εἰσι τῆς γραφείσης ὑπερ-
βολῆς.

20

ε'.

Ἐὰν παραβολῆς ἢ ὑπερβολῆς ἡ διάμετρος εὐθεῖαν τινα τέμνῃ δίχα, ἢ κατὰ τὸ πέρας τῆς διαμέτρου ἐπιψαύουσα τῆς τομῆς παράλληλος ἔσται τῇ δίχα τεμνομένην εὐθείᾳ.

25 ἔστω παραβολὴ ἢ ὑπερβολὴ ἡ $ΑΒΓ$, ἥς διάμετρος ἡ $ΔΒΕ$, καὶ ἐφαπτέσθω τῆς τομῆς ἡ $ΖΒΗ$, ἡχθω δέ τις εὐθεῖα ἐν τῇ τομῇ ἡ $ΑΕΓ$ ἴσην ποιοῦσα τὴν $ΑΕ$ τῇ $ΕΓ$. λέγω, ὅτι παράλληλός ἐστιν ἡ $ΑΓ$ τῇ $ΖΗ$.

2. τῷ] p, τό V. 3. εἰς ἀσύμπτωτους τὰς $ΓΑΒ$ γράψαι p; Halley. 8. ἐπιζευχθεῖσα V, corr. cv. τῷ] c, corr. ex το m. 1 V. 18. σύμπτωτοι V, corr. p. 21. ἡ] ἢ V; corr. p,

ducatur AA et ad E producat, ponaturque $AE = AA$, et per A rectae AB parallela ducatur AZ , ponaturque $Z\Gamma = AZ$, et ducta ΓA ad B producat, fiatque

$$AE \times H = \Gamma B^2,$$

et producta AA circum eam per A hyperbola ita describatur, ut rectae ordinate ductae quadratae aequales sint spatiis rectae H adplicatis excedentibus

figura rectangulo $AE \times H$ simili [I, 53]. iam quoniam AZ rectae BA parallela est, et $\Gamma Z = ZA$, erit etiam $\Gamma A = AB$ [Eucl. VI, 2]. quare $\Gamma B^2 = 4\Gamma A^2$. est autem $\Gamma B^2 = AE \times H$. itaque


$$\Gamma A^2 = AB^2 = \frac{1}{4} AE \times H.$$

ergo AB , $A\Gamma$ asymptotae sunt hyperbolae descriptae [prop. I].

V.

Si diametrus parabolae uel hyperbolae rectam aliquam in duas partes aequales secat, recta in termino diametri sectionem contingens rectae in duas partes aequales sectae parallela erit.

sit $AB\Gamma$ parabola uel hyperbola, cuius diametrus sit ABE , et ZBH sectionem contingat, ducatur autem in sectione recta aliqua AET efficiens $AE = ET$ dico, $A\Gamma$ et ZH parallelas esse.



nam si minus, per Γ rectae ZH parallela ducatur $\Gamma\Theta$, ducaturque ΘA . iam quoniam $AB\Gamma$ parabola uel hyperbola est, cuius diametrus est ΔE , contingens autem ZH , eique parallela $\Gamma\Theta$, erit $\Gamma K = K\Theta$ [I, 46–47]. uerum etiam $\Gamma E = EA$.

que $A\Theta$, KE parallelae erunt [Eucl. VI, 2]; quod i non potest; nam $A\Theta$ producta cum BA concurrit 22].

VI.

Si diametrus ellipsis uel circuli ambitus rectam quam non per centrum ductam in duas partes quales secat, recta in termino diametri sectionem attingens rectae in duas partes aequales sectae parallela erit.

sit ellipsis uel circuli ambitus, cuius diametrus sit AB , et ΔB rectam $\Gamma\Delta$ non per centrum ductam in duas partes aequales secet in E . dico, rectam in A sectionem contingentem rectae $\Gamma\Delta$ parallelam esse.

ne sit enim, sed, si fieri potest, sit ΔZ rectae in contingenti parallela. itaque erit $\Delta H = ZH$ [I, 47]. rum etiam $\Delta E = E\Gamma$. itaque ΓZ , HE parallelae sunt [Eucl. VI, 2]; quod absurdum est. nam siue H punctum centrum est sectionis AB , ΓZ cum AB concurret [I, 23], siue non est, supponatur K centrum, producta ΔK producat ad Θ , ducaturque $\Gamma\Theta$. quoniam igitur $\Delta K = K\Theta$ et etiam $\Delta E = E\Gamma$, $\Gamma\Theta$ rectae

ἡ ΔE τῇ EG , παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ $\Gamma\Theta$ τῇ AB .
ἀλλὰ καὶ ἡ ΓZ ὅπερ ἄτοπον. ἡ ἄρα κατὰ τὸ A ἐφαπτομένη παράλληλός ἐστι τῇ $\Gamma\Delta$.

ξ'.

- 5 Ἐὰν κώνου τομῆς ἡ κύκλου περιφερείας εὐθεῖα ἐφάπτεται, καὶ ταύτῃ παράλληλος ἀχθῇ ἐν τῇ τομῇ καὶ δίχα τμηθῇ, ἡ ἀπὸ τῆς ἀφῆς ἐπὶ τὴν διχοτομίαν ἐπιζευχθεῖσα εὐθεῖα διάμετρος ἔσται τῆς τομῆς.
ἔστω κώνου τομὴ ἡ κύκλου περιφέρεια ἡ $AB\Gamma$,
10 ἐφαπτομένη δὲ αὐτῆς ἡ ZH , καὶ τῇ ZH παράλληλος ἡ AG καὶ δίχα τετμήσθω κατὰ τὸ E , καὶ ἐπεζεύχθω ἡ BE . λέγω, ὅτι ἡ BE διάμετρος ἐστὶ τῆς τομῆς.
μὴ γάρ, ἀλλὰ, εἰ δυνατόν, ἔστω διάμετρος τῆς τομῆς ἡ $B\Theta$. ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ $A\Theta$ τῇ $\Theta\Gamma$. ὅπερ
15 ἄτοπον· ἡ γὰρ AE τῇ EG ἴση ἐστίν. οὐκ ἄρα ἡ $B\Theta$ διάμετρος ἔσται τῆς τομῆς. ὁμοίως δὲ δείξομεν, ὅτι οὐδὲ ἄλλη τις πλὴν τῆς BE .

η'.

- Ἐὰν ὑπερβολῇ εὐθεῖα συμπίπτῃ κατὰ δύο σημεία,
20 ἐμβαλλομένη ἐφ' ἑκάτερα συμπεσεῖται ταῖς ἀσυμπτώτοις, καὶ αἱ ἀπολαμβανόμεναι ἀπ' αὐτῆς ὑπὸ τῆς τομῆς πρὸς ταῖς ἀσυμπτώτοις ἴσαι ἔσονται.
ἔστω ὑπερβολὴ ἡ $AB\Gamma$, ἀσύμπτωτοι δὲ αἱ EA, AZ , καὶ τῇ $AB\Gamma$ συμπίπτει τις ἡ AG . λέγω, ὅτι ἐκ-
25 βαλλομένη ἐφ' ἑκάτερα συμπεσεῖται ταῖς ἀσυμπτώτοις. τετμήσθω ἡ AG δίχα κατὰ τὸ H , καὶ ἐπεζεύχθω

1. $\Gamma\Theta$] cnp, euan. V.
δυνατόν] cv, -όν euan. V.


8. διάμετρον V; corr. p.
21. αἱ] om. V, corr. p.

13.

AB parallela est [Eucl. VI, 2]. uerum etiam ΓZ ei parallela est; quod absurdum est [Eucl. I, 30]. ergo recta in A contingens rectae ΓA parallela est.

VII.

Si recta coni sectionem uel circuli ambitum contingit, et in sectione recta huic parallela ducitur et in duas partes aequales secatur, recta a puncto



contactus ad medium punctum ducta diametrus sectionis erit.

sit coni sectio uel circuli
ambitus $AB\Gamma$, contingens
autem ZH , et rectae ZH
parallela AF , quae in E in
duas partes aequales secetur,
ducaturque BE . dico, BE diametrum sectionis esse.

ne sit enim, sed, si fieri potest, diametrus sectionis sit $B\Theta$. itaque $A\Theta = \Theta\Gamma$ [I deff. pr. 4]; quod absurdum est; nam $AE = E\Gamma$. ergo $B\Theta$ diametrus sectionis non erit. iam eodem modo demonstrabimus, ne aliam quidem ullam diametrum esse praeter BE .

VIII.

Si recta cum hyperbola in duobus punctis concurrat, in utramque partem producta cum asymptotis concurrent, et rectae ex ea ad asymptotas a sectione abscissae aequales erunt.

sit hyperbola $AB\Gamma$, asymptotae autem EA , AZ ,
et cum $AB\Gamma$ concurrat recta aliqua $A\Gamma$. dico, eam
in utramque partem productam cum asymptotis con-
currere.

ἡ ΔH . διάμετρος ἄρα ἐστὶ τῆς τομῆς· ἡ ἄρα κατὰ
τὸ B ἐφαπτομένη παράλληλός ἐστι τῇ AG . ἔστω οὖν
ἐφαπτομένη ἡ ΘBK · συμπεσεῖται δὴ ταῖς $E\Delta$, ΔZ .
ἐπεὶ οὖν παράλληλός ἐστιν ἡ AG τῇ $K\Theta$, καὶ ἡ $K\Theta$
5 συμπίπτει ταῖς ΔK , $\Delta\Theta$, καὶ ἡ AG ἄρα συμπεσεῖται
ταῖς ΔE , ΔZ .


συμπίπτει κατὰ τὰ E , Z · καὶ ἐστὶν ἴση ἡ ΘB
τῇ BK · ἴση ἄρα καὶ ἡ ZH τῇ HE . ὥστε καὶ ἡ ΓZ
τῇ AE .

θ'.

10

Ἐὰν εὐθεῖα συμπίπτουσα ταῖς ἀσυμπτώτοις δίχα
τέμνηται ὑπὸ τῆς ὑπερβολῆς, καθ' ἓν μόνον σημεῖον
ἄπτεται τῆς τομῆς.

εὐθεῖα γὰρ ἡ $\Gamma\Delta$ συμπί-
15 πτουσα ταῖς $\Gamma A\Delta$ ἀσυμπτώτοις
δίχα τεμνέσθω ὑπὸ τῆς ὑπερ-
βολῆς κατὰ τὸ E σημεῖον. λέγω,
ὅτι κατ' ἄλλο σημεῖον οὐχ ἄπ-
τεται τῆς τομῆς.




20 εἰ γὰρ δυνατόν, ἄπτεσθω
κατὰ τὸ B . ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΓE τῇ $B\Delta$ · ὅπερ ἄτοπον·
ὑπόκειται γὰρ ἡ ΓE τῇ $E\Delta$ ἴση. οὐκ ἄρα καθ' ἕτερον
σημεῖον ἄπτεται τῆς τομῆς.

ι'.

25 Ἐὰν εὐθεῖά τις τέμνουσα τὴν τομὴν συμπίπτῃ
ἐκατέρω τῶν ἀσυμπτῶτων, τὸ περιεχόμενον ὀρθογώνιον
ὑπὸ τῶν ἀπολαμβανομένων εὐθειῶν μεταξὺ τῶν ἀσυμ-
πτῶτων καὶ τῆς τομῆς ἴσον ἐστὶ τῷ τετάρτῳ τοῦ γυνο-

1. ἡ] (alt.) c, renouat. m. rec. V. 5. $\Delta\Theta$] $K\Theta$ V, corr. p.
15. $\Gamma A\Delta$] c, Δ e corr. m. 1 V.

$A\Gamma$ in H in duas partes aequales secetur, et ducatur ΔH ; ea igitur diameter sectionis est [prop. VII].



itaque recta in B contingens rectae $A\Gamma$ parallela est [prop. V—VI]. contingat igitur $\Theta B K$. itaque cum $E\Delta$, ΔZ concurrat [prop. III]. quoniam igitur $A\Gamma$ et $K\Theta$ parallelae sunt, et $K\Theta$ cum ΔK , $\Delta\Theta$ concurrat, etiam $A\Gamma$ cum ΔE , ΔZ concurrat.

concurrat in E , Z . et $\Theta B = BK$; quare etiam [Eucl. VI, 4] $ZH = HE$. ergo etiam $\Gamma Z = AE$.

IX.

Si recta cum asymptotis concurrens ab hyperbola in duas partes aequales secatur, in uno puncto solo sectionem tangit.

recta enim $\Gamma\Delta$ cum asymptotis $\Gamma A\Delta$ concurrens ab hyperbola in puncto E in duas partes aequales secatur. dico, eam in nullo alio puncto sectionem tangere.

nam si fieri potest, tangat in B . itaque $\Gamma E = B\Delta$ [prop. VIII]; quod absurdum est; supposuimus enim, esse $\Gamma E = E\Delta$. ergo $\Gamma\Delta$ in nullo alio puncto sectionem tangit.

X.

Si recta aliqua sectionem secans cum utraque asymptota concurrat, rectangulum comprehensum rectis inter asymptotas sectionemque abscisis aequale est quartae parti figurae ad diametrum effectae, quae

rectas ductae rectae parallelas in binas partes aequales secat.

sit hyperbola $AB\Gamma$, asymptotae autem eius AE , EZ , et ducatur recta aliqua AZ sectionem asymptotasque secans, et $A\Gamma$ in H in duas partes aequales secetur, ducaturque HE , et ponatur $E\Theta = BE$, ducaturque a B ad ΘEB perpendicularis BM ; itaque $B\Theta$ diametrus est [prop. VII], BM autem latus rectum.¹⁾ dico, esse

$$AA \times AZ = \frac{1}{4} \Theta B \times BM = A\Gamma \times \Gamma Z.$$

ducatur enim per B sectionem contingens KA ; ea igitur rectae AZ parallela est [prop. V]. et quoniam demonstrauius, esse

$$\Theta B : BM = EB^2 : BK^2 \text{ [prop. I] } = EH^2 : HA^2$$

[Eucl. VI, 4], et

$$\Theta B : BM = \Theta H \times HB : HA^2 \text{ [I, 21],}$$

erit etiam

$$EH^2 : HA^2 = \Theta H \times HB : HA^2.$$

iam quoniam est, ut totum EH^2 ad totum HA^2 , ita ablatum $\Theta H \times HB$ ad ablatum HA^2 , erit etiam [Eucl. V, 19] reliquum EB^2 [Eucl. II, 6] ad reliquum $AA \times AZ$ [Eucl. II, 5] $= EH^2 : HA^2 = EB^2 : BK^2$ [Eucl. VI, 4]. itaque [Eucl. V, 9]

$$ZA \times AA = BK^2$$

[tum u. prop. III].

1) Intellegitur igitur factum esse, ut sit

$$\Theta B : BM = \Theta H \times HB : HA^2,$$

nec opus est hoc cum Memo diserte adiicere, ut fecit Halley.

Apollonius, ed. Heiberg.

λοιπὸν τὸ ὑπὸ $\Delta A Z$ ἐστίν, ὥς τὸ ἀπὸ $E H$ πρὸς τὸ ἀπὸ $H A$, τουτέστι τὸ ἀπὸ $E B$ πρὸς τὸ ἀπὸ $B K$. ἴσον ἄρα τὸ ὑπὸ $Z A A$ τῷ ἀπὸ $B K$.

ὁμοίως δὲ δειχθήσεται καὶ τὸ ὑπὸ $\Delta \Gamma Z$ τῷ ἀπὸ $B A$. ἴσον δὲ τὸ ἀπὸ $K B$ τῷ ἀπὸ $B A$. ἴσον ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ $Z A A$ τῷ ὑπὸ $Z \Gamma A$.

ια'.

Ἐὰν ἐκατέρωθεν τῶν περιεχουσῶν τὴν ἐφεξῆς γωνίαν τῆς περιεχοῦσης τὴν ὑπερβολὴν τέμνῃ τις εὐθεΐα, συμ-
10 πεσεῖται τῇ τομῇ καθ' ἓν μόνον σημεῖον, καὶ τὸ περι-
εχόμενον ὑπὸ τῶν ἀπολαμβανομένων εὐθειῶν μεταξὺ
τῶν περιεχουσῶν καὶ τῆς τομῆς ἴσον ἔσται τῷ τετάρτῳ
μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ἡγμένης διαμέτρου παρὰ τὴν τέμνου-
σαν εὐθείαν.

15 ἔστω ὑπερβολή, ἥς ἀσύμπτωτοι αἱ ΓA , $A A$, καὶ
ἐκβεβλήσθω ἡ ΔA ἐπὶ τὸ E , καὶ διὰ τινος σημείου
τοῦ E διέλθω ἡ $E Z$ τέμνουσα τὰς $E A$, $A \Gamma$.

ὅτι μὲν οὖν συμπίπτει τῇ τομῇ καθ' ἓν μόνον
σημεῖον, φανερόν· ἡ γὰρ διὰ τοῦ A τῇ $E Z$ παράλληλος
20 ἀγομένη ὥς ἡ $A B$ τεμεῖ τὴν ὑπὸ $\Gamma A A$ γωνίαν καὶ
συμπεσεῖται τῇ τομῇ καὶ διάμετρος αὐτῆς ἔσται· ἡ $E Z$
ἄρα συμπεσεῖται τῇ τομῇ καθ' ἓν μόνον σημεῖον.

συμπιπτέτω κατὰ τὸ H .

λέγω δὲ, ὅτι καὶ τὸ ὑπὸ τῶν $E H Z$ ἴσον ἐστὶ τῷ
25 ἀπὸ τῆς $A B$.

ἤχθω γὰρ διὰ τοῦ H τεταγμένως ἡ $\Theta H A K$ · ἡ ἄρα
διὰ τοῦ B ἐφαπτομένη παράλληλός ἐστι τῇ $H \Theta$. ἔστω

4. τῷ] cnp, corr. ex τό m. 1 V. 5. B A ἴσον? 15.
A A] cnp, corr. ex Γ A m. 1 V. 24. δὲ] δέ V; corr. Halley.

iam similiter demonstrabimus, esse etiam

$$\Delta\Gamma \times \Gamma Z = BA^2.$$

uerum $KB^2 = BA^2$ [prop. III]. ergo etiam

$$ZA \times AA = Z\Gamma \times \Gamma A.$$

XI.

Si recta aliqua utramque rectam, quae angulum ad angulum hyperbolam continentem deinceps positum comprehendunt, secat, cum sectione in uno solo puncto concurrent, et rectangulum comprehensum rectis inter rectas comprehendentes sectionemque abscisis aequale

erit quartae parti quadrati diametri rectae secanti parallelae ductae.

sit hyperbola, cuius asymptotae sint ΓA , AA , producaturque AA ad E , et per punctum aliquod E ducatur EZ rectas EA , $A\Gamma$ secans.

iam eam in uno solo puncto cum sectione concurrere, manifestum est; nam recta per A rectae EZ parallela ducta ut AB angulum ΓAA secabit et cum sectione concurrent [prop. II] diametrusque eius erit [I, 51 coroll.]; itaque EZ in uno solo puncto cum sectione concurrent [I, 26].


In figura A in v om., in V posita est m. 2 in intersectione rectarum AB , ΘK .

ἡ $\Gamma\Delta$. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ ΓB τῇ $B\Delta$, τὸ ἄρα ἀπὸ
 ΓB , τουτέστι τὸ ὑπὸ $\Gamma B\Delta$, πρὸς τὸ ἀπὸ BA λόγον
 ἔχει τὸν συγκείμενον ἐκ τοῦ τῆς ΓB πρὸς BA καὶ
 τοῦ τῆς ΔB πρὸς BA . ἀλλ' ὥς μὲν ἡ ΓB πρὸς BA ,
 5 ἡ ΘH πρὸς HZ , ὥς δὲ ἡ ΔB πρὸς BA , ἡ HK πρὸς
 HE . ὁ ἄρα τοῦ ἀπὸ ΓB πρὸς τὸ ἀπὸ BA λόγος σύγ-
 κειται ἐκ τοῦ τῆς ΘH πρὸς HZ καὶ τῆς KH πρὸς
 HE . ἀλλὰ καὶ ὁ τοῦ ὑπὸ $KH\Theta$ πρὸς τὸ ὑπὸ EHZ
 λόγος σύγκειται ἐκ τῶν αὐτῶν· ὥς ἄρα τὸ ὑπὸ $KH\Theta$
 10 πρὸς τὸ ὑπὸ EHZ , τὸ ἀπὸ ΓB πρὸς τὸ ἀπὸ BA .
 ἐναλλάξ, ὥς τὸ ὑπὸ $KH\Theta$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓB , τὸ ὑπὸ
 EHZ πρὸς τὸ ἀπὸ AB . ἴσον δὲ τὸ ὑπὸ $KH\Theta$ τῷ
 ἀπὸ ΓB ἐδέχθη· ἴσον ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ EHZ τῷ
 ἀπὸ AB .

15

ιβ'.

Ἐὰν ἐπὶ τὰς ἀσυμπτώτους ἀπὸ τινος σημείου τῶν
 ἐπὶ τῆς τομῆς β εὐθεῖαι ἀχθῶσιν ἐν τυχούσαις γω-
 νίαις, καὶ ταύταις παράλλη-
 λοι ἀχθῶσιν ἀπὸ τινος ση-
 20 μείου τῶν ἐπὶ τῆς τομῆς, τὸ
 ὑπὸ τῶν παραλλήλων περι-
 εχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον
 ἔσται τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ
 τῶν, αἷς αἱ παράλληλοι ἤχ-
 25 θησαν.



ἔστω ὑπερβολή, ἥς ἀσύμ-
 πτωτοι αἱ AB , $B\Gamma$, καὶ
 εἰλήφθω τι σημεῖον ἐπὶ τῆς τομῆς το A , καὶ ἀπ' αὐτοῦ
 ἐπὶ τὰς AB , $B\Gamma$ κατήχθωσαν αἱ ΔE , ΔZ , εἰλήφθω

10. EHZ] corr. ex EZH m. 2 V, EZH ev; τῶν EH , HZ p.
 17. ἀχθῶσι V, corr. pc.

concurrat in H .

iam dico, esse etiam $EH \times HZ = AB^2$.

per H enim ordinate ducatur ΘHAK ; itaque recta in B contingens rectae $H\Theta$ parallela est [prop. V]. sit ΓA . iam quoniam $\Gamma B = BA$ [prop. III], erit

$$\begin{aligned} \Gamma B^2 : BA^2 &= \Gamma B \times BA : BA^2 \\ &= (\Gamma B : BA) \times (BA : BA). \end{aligned}$$

est autem [Eucl. VI, 4] $\Gamma B : BA = \Theta H : HZ$,

$$BA : BA = HK : HE.$$

itaque erit $\Gamma B^2 : BA^2 = (\Theta H : HZ) \times (KH : HE)$.

est autem etiam

$$KH \times H\Theta : EH \times HZ = (\Theta H : HZ) \times (KH : HE).$$

quare $KH \times H\Theta : EH \times HZ = \Gamma B^2 : BA^2$. permutando [Eucl. V, 16]

$$KH \times H\Theta : \Gamma B^2 = EH \times HZ : AB^2.$$

demonstrauimus autem, esse $KH \times H\Theta = \Gamma B^2$ [prop. X].

ergo etiam $EH \times HZ = AB^2$ [Eucl. V, 14].

XII.

Si ab aliquo puncto sectionis duae rectae ad asymptotas ducuntur angulos quoslibet efficientes, iisque parallelae ab aliquo puncto sectionis ducuntur, rectangulum rectis parallelis comprehensum aequale erit rectangulo comprehenso rectis, quibus parallelae ductae sunt.

sit hyperbola, cuius asymptotae sint AB , BF , et in sectione sumatur punctum aliquod A , ab eoque ad AB , BF ducantur AE , AZ , et in sectione aliud sumatur punctum H , et per H rectis EA , AZ parallelae ducantur $H\Theta$, HK . dico, esse

$$EA \times AZ = \Theta H \times HK.$$

δέ τι σημείον ἕτερον ἐπὶ τῆς τομῆς τὸ H , καὶ διὰ τοῦ H τὰς EA , AZ παράλληλοι ἤχθωσαν αἱ $H\Theta$, HK . λέγω, ὅτι ἴσον ἐστὶ τὸ ὑπὸ EAZ τῷ ὑπὸ ΘHK .

ἐπεξεύχθω γὰρ ἡ AH καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὰ A , Γ .
 5 ἐπεὶ οὖν ἴσον ἐστὶ τὸ ὑπὸ $AA\Gamma$ τῷ ὑπὸ AHG , ἔστιν ἄρα ὡς ἡ AH πρὸς AA , ἡ $A\Gamma$ πρὸς ΓH . ἀλλ' ὡς μὲν ἡ AH πρὸς AA , ἡ $H\Theta$ πρὸς EA , ὡς δὲ ἡ $A\Gamma$ πρὸς ΓH , ἡ AZ πρὸς HK . ὡς ἄρα ἡ ΘH πρὸς AE , ἡ AZ πρὸς HK . ἴσον ἄρα ἐστὶ τὸ ὑπὸ EAZ τῷ
 10 ὑπὸ ΘHK .

ιγ'.

Ἐὰν ἐν τῷ ἀφοριζομένῳ τόπῳ ὑπὸ τῶν ἀσυμπτώ-
 των καὶ τῆς τομῆς παράλληλος ἀχθῇ τις εὐθεῖα τῇ
 ἐτέρᾳ τῶν ἀσυμπτῶτων, συμπεσεῖται τῇ τομῇ καθ' ἐν
 15 μόνον σημείον.

ἔστω ὑπερβολή, ἥς ἀσύμπτωτοι αἱ ΓA , AB , καὶ εἰλήφθω τι σημείον τὸ E , καὶ δι' αὐτοῦ τῇ AB παρ-
 ἀλληλος ἤχθω ἡ EZ . λέγω, ὅτι συμπεσεῖται τῇ τομῇ.

εἰ γὰρ δυνατόν, μὴ συμπιπτέτω, καὶ εἰλήφθω τι
 20 σημείον ἐπὶ τῆς τομῆς τὸ H , καὶ διὰ τοῦ H παρὰ τὰς ΓA , AB ἤχθωσαν αἱ $H\Gamma$, $H\Theta$, καὶ τὸ ὑπὸ $\Gamma H\Theta$ ἴσον ἔστω τῷ ὑπὸ AEZ , καὶ ἐπεξεύχθω ἡ AZ καὶ ἐκβεβλήσθω· συμπεσεῖται δὲ τῇ τομῇ. συμπιπτέτω κατὰ τὸ K , καὶ διὰ τοῦ K παρὰ τὰς ΓAB ἤχθωσαν
 25 αἱ KA , KA' . τὸ ἄρα ὑπὸ $\Gamma H\Theta$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ AKA . ὑπόκειται δὲ καὶ τῷ ὑπὸ AEZ ἴσον· τὸ ἄρα ὑπὸ AKA , τουτέστι τὸ ὑπὸ KAA , ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ AEZ . ὁπερ

5. Post pr. ὑπό rep. EAZ lin. 3 — ὑπό lin. 5 (pr.) V v; corr. V m. 2, p.c. 7. EA] τὸ EA V ; corr. p. 16. ΓA] ΓA v et ut uidetur e corr. m. 1 V ; corr. p.c. 24. παρὰ] c, π corr. ex x m. 1 V .

ducatur enim ΔH et producatur ad A , Γ . iam quoniam est $A\Delta \times \Delta\Gamma = AH \times H\Gamma$ [prop. X], erit [Eucl. VI, 16] $AH : A\Delta = \Delta\Gamma : \Gamma H$. est autem [Eucl. VI, 4] $AH : A\Delta = H\Theta : E\Delta$,

$$\Delta\Gamma:\Gamma H=\Delta Z:HK.$$


itaque $\odot H : \Delta E = \Delta Z : HK$. ergo erit [Eucl. VI, 16]
 $E\Delta \times \Delta Z = \odot H \times HK$.

XIII.

Si in loco asymptotis sectioneque comprehenso
 recta aliqua alteri asymptotae parallela ducitur, cum
 sectione in uno puncto solo concurrent.

sit hyperbola, cuius asymptotae sint ΓA , AB , et sumatur punctum aliquod E , et per E rectae AB parallela ducatur EZ . dico, eam cum sectione concurrere.

nam, si fieri potest, ne concurrat, et in sectione
sumatur punctum aliquod H , et per H rectis ΓA ,



AB parallelae ducantur $H\Gamma$, $H\Theta$, fiatque $\Gamma H \times H\Theta = AE \times EZ$, et ducatur AZ producaturque; concurret igitur cum sectione [prop. II]. concurrat in K , et rectis ΓA , AB parallelae per K ducantur $K\Delta$, $K\Lambda$; itaque $\Gamma H \times H\Theta = AK \times K\Delta$ [prop. XII]. supposuimus autem, esse etiam $\Gamma H \times H\Theta = AE \times EZ$.

itaque erit $\angle K \times KA = AE \times EZ = KA \times AA$
[Eucl. I, 34]; quod fieri non potest; est enim et

Figura in V_v imperfecta est.

ἀδύνατον· μείζων γάρ ἐστι καὶ ἡ KA τῆς EZ καὶ ἡ AA τῆς AE . συμπεσεῖται ἄρα ἡ EZ τῇ τομῇ.

συμπιπτέτω κατὰ τὸ M .

λέγω δὴ, ὅτι κατ' ἄλλο οὐ συμπεσεῖται. εἰ γάρ
5 δυνάτον, συμπιπτέτω καὶ κατὰ τὸ N , καὶ διὰ τῶν M, N
τῇ GA παράλληλοι ἤχθωσαν αἱ $MΞ, NB$. τὸ ἄρα
ὑπὸ $EMΞ$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ENB . ὅπερ ἀδύνατον.
οὐκ ἄρα καθ' ἕτερον σημεῖον συμπεσεῖται τῇ τομῇ.

ιδ'.

10 Αἱ ἀσύμπτωτοι καὶ ἡ τομὴ εἰς ἄπειρον ἐκβαλλό-
μεναι ἔγγιόν τε προσάγουσιν ἑαυταῖς καὶ παντὸς τοῦ
δοθέντος διαστήματος εἰς ἕλαττον ἀφικνοῦνται διά-
στημα.

ἔστω ὑπερβολή, ἥς ἀσύμπτωτοι αἱ AB, AG , δοθὲν
15 δὲ διάστημα τὸ K . λέγω, ὅτι αἱ AB, AG καὶ ἡ τομὴ
ἐκβαλλόμεναι ἔγγιόν τε προσάγουσιν ἑαυταῖς καὶ εἰς
ἕλασσον ἀφίξονται διάστημα τοῦ K .

ἤχθωσαν γάρ τῇ ἐφαπτομένῃ παράλληλοι αἱ $EΘZ,$
 $ΓΗΔ$, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ $AΘ$ καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ $Ξ$.
20 ἐπεὶ οὖν τὸ ὑπὸ $ΓΗΔ$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ $ZΘE$, ἔστιν
ἄρα, ὡς ἡ $ΔH$ πρὸς $ZΘ$, ἡ $ΘE$ πρὸς $ΓH$. μείζων
δὲ ἡ $ΔH$ τῆς $ZΘ$. μείζων ἄρα καὶ ἡ $EΘ$ τῆς $ΓH$.
ὁμοίως δὲ δειξομεν, ὅτι καὶ αἱ κατὰ τὸ ἐξῆς ἐλάττονές
εἰσιν.

25 εἰλήφθω δὲ τοῦ K διαστήματος ἕλαττον τὸ EA ,
καὶ διὰ τοῦ A τῇ AG παράλληλος ἤχθω ἡ AN . συμ-

4. ὅτι] addidi; om. V. 5. καί] (pr.) om. cp. 7. $EMΞ$] c,
 $Ξ$ corr. ex Z m. 1 V. 19. $AΘ$] p, A incertum V, $EΘ$ c. 23.
ἕλαττον V; corr. p.

πεσεῖται ἄρα τῇ τομῇ. συμπιπτεύω κατὰ τὸ N , καὶ διὰ τοῦ N τῇ EZ παράλληλος ἦχθω ἡ MNB . ἡ ἄρα MN ἴση ἐστὶ τῇ EA καὶ διὰ τοῦτο ἐλάττων τῆς K .

πόρισμα.

- 5 ἐκ δὲ τούτου φανερόν, ὅτι πασῶν τῶν ἀσυμπτῶτων τῇ τομῇ ἐγγιόν εἰσιν αἱ AB , AG , καὶ ἡ ὑπὸ τῶν BAG περιεχομένη γωνία ἐλάσσων ἐστὶ δηλαδὴ τῆς ὑπὸ ἐτέ-
ρων ἀσυμπτῶτων τῇ τομῇ περιεχομένης.

ιε'.

- 10 Τῶν ἀντικειμένων τομῶν κοιναὶ εἰσιν αἱ ἀσύμ-
πτωτοι.

ἔστωσαν ἀντικείμεναι τομαί, ὧν διάμετρος ἡ AB , κέντρον δὲ τὸ Γ . λέγω, ὅτι τῶν A , B τομῶν κοιναὶ εἰσιν αἱ ἀσύμπτωτοι.

- 15 ἦχθωσαν διὰ τῶν A , B σημείων ἐφαπτόμεναι τῶν τομῶν αἱ AE , ZBH . παράλληλοι ἄρα εἰσὶν. ἀπ-
ελήφθω δὲ ἐκάστη τῶν AA , AE , ZB , BH ἴσον δυ-
ναμένη τῷ τετάρτῳ τοῦ παρὰ τὴν AB εἰδους. ἴσαι
ἄρα αἱ AA , AE , ZB , BH . ἐπεξεύχθωσαν δὲ αἱ
20 GA , GE , GZ , GH . φανερόν δὲ, ὅτι ἐπ' εὐθείας ἐστὶν
ἡ AG τῇ GH καὶ ἡ GE τῇ GZ διὰ τὰς παραλλήλους.
ἐπεὶ οὖν ὑπερβολή ἐστίν, ἥς διάμετρος ἡ AB , ἐφ-
απτομένη δὲ ἡ AE , καὶ ἐκατέρα τῶν AA , AE δύνανται
τὸ τέταρτον τοῦ παρὰ τὴν AB εἰδους, ἀσύμπτωτοι
25 ἄρα εἰσὶν αἱ AG , GE . διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ τῇ B
ἀσύμπτωτοί εἰσιν αἱ ZG , GH . τῶν ἀντικειμένων ἄρα
κοιναὶ εἰσιν ἀσύμπτωτοι.

2. MNB] NMB V; corr. p. 4. πόρισμα] om. V. 5.
ἀσυμπτῶτων] c, ἀ- supra scr. m. 1 V. 21. ΓZ] EZ V, corr. p.

ducatur AN ; concurrent igitur cum sectione [prop. XIII]. concurrat in N , et per N rectae EZ parallela ducatur MNB . ergo erit [Eucl. I, 34] $MN = EA < K$.


Corollarium.

Iam hinc manifestum est, omnibus rectis cum sectione non concurrentibus propiores esse AB , AI , et proinde angulum BAI minorem esse quouis angulo ab aliis rectis cum sectione non concurrentibus comprehenso.

XV.

Sectionum oppositarum communes sunt asymptotae. sint sectiones oppositae, quarum diametrus sit AB , centrum autem Γ . dico, sectionum A , B communes esse asymptotas.

per puncta A , B sectiones contingentes ducantur AAE , ZBH ; parallelae igitur sunt [prop. V]. ponantur



igitur AA , AE , ZB , BH singulae quartae parti figurae rectae AB adplicatae aequales quadratae; est igitur $AA = AE = ZB = BH$.

iam ducantur ΓA , ΓE , ΓZ , ΓH . manifestum igitur est propter parallelas [Eucl. I, 33], in eadem recta esse $\angle \Gamma$, ΓH et ΓE , ΓZ . iam quoniam hyperbola est, cuius diametrus est AB , contingens autem $\angle E$, et utraque AA , AE quartae parti figurae rectae AB adplicatae quadrata aequalis est, asymptotae sunt $\angle \Gamma$, ΓE [prop. I]. eadem igitur de causa sectionis B asymptotae sunt $Z\Gamma$, ΓH . ergo oppositarum communes sunt asymptotae.

ις'.

Ἐὰν ἐν ἀντικειμέναις ἀχθῇ τις εὐθεία τέμνουσα
ἐκατέραν τῶν περιεχουσῶν τὴν ἐφεξῆς γωνίαν τῶν
περιεχουσῶν τὰς τομὰς, συμπεσεῖται ἐκατέρω τῶν ἀντι-
5 κειμένων καθ' ἓν μόνον σημεῖον, καὶ αἱ ἀπολαμβάνο-
μεναι ἀπ' αὐτῆς ὑπὸ τῶν τομῶν πρὸς ταῖς ἀσυμπτώτοις
ἴσαι ἔσονται.

ἔστωσαν γὰρ ἀντικείμεναι αἱ A, B , ὧν κέντρον μὲν
τὸ Γ , ἀσύμπτωτοι δὲ αἱ $\Delta\Gamma H, E\Gamma Z$, καὶ διήχθω τις
10 εὐθεία τέμνουσα ἐκατέραν τῶν $\Delta\Gamma, \Gamma Z$ ἢ ΘK . λέγω,
ὅτι ἐκβαλλομένη συμπεσεῖται ἐκατέρω τῶν τομῶν καθ'
ἓν σημεῖον μόνον.

ἔπει γὰρ τῆς A τομῆς ἀσύμπτωτοί εἰσιν αἱ $\Delta\Gamma, \Gamma E$,
καὶ διήκται τις εὐθεία ἢ ΘK τέμνουσα ἐκατέραν τῶν
15 περιεχουσῶν τὴν ἐφεξῆς γωνίαν τὴν ὑπὸ $\Delta\Gamma Z$, ἢ $K\Theta$
ἄρα ἐκβαλλομένη συμπεσεῖται τῇ τομῇ. ὁμοίως δὲ
καὶ τῇ B .

συμπιπτεῖτω κατὰ τὰ A, M .

ἤχθω διὰ τοῦ Γ τῇ AM παράλληλος ἢ $A\Gamma B$. ἴσον
20 ἄρα ἐστὶ τὸ μὲν ὑπὸ $K\Lambda\Theta$ τῷ ἀπὸ $\Delta\Gamma$, τὸ δὲ ὑπὸ
 ΘMK τῷ ἀπὸ ΓB . ὥστε καὶ τὸ ὑπὸ $K\Lambda\Theta$ τῷ ὑπὸ
 ΘMK ἐστὶν ἴσον, καὶ ἢ $\Lambda\Theta$ τῇ KM .

ις'.

Τῶν κατὰ συζυγίαν ἀντικειμένων κοιναί εἰσιν αἱ
25 ἀσύμπτωτοι.


ἔστωσαν συζυγεῖς ἀντικείμεναι, ὧν αἱ διάμετροι
συζυγεῖς αἱ $AB, \Gamma\Delta$, κέντρον δὲ τὸ E . λέγω, ὅτι
κοιναὶ αὐτῶν εἰσιν αἱ ἀσύμπτωτοι.

9. $\Delta\Gamma H, E\Gamma Z$] $\Delta\Gamma$ ἢ EZ V; corr. p. 10. ΓZ] e, corr.
ex ΔZ m. 1 V. 18. τὰ] τό V; corr. p.

XVI.

Si in oppositis recta ducitur utramque rectam secans, quae angulum angulis sectiones continentibus deinceps positum comprehendunt, cum utraque opposita in uno solo puncto concurret, et rectae ex ea a sectionibus ad asymptotas abscisae aequales erunt.

sint enim oppositae A, B , quarum centrum sit Γ , asymptotae autem $\Delta\Gamma H, E\Gamma Z$ [prop. XV], ducaturque



recta aliqua ΘK utramque $\Delta\Gamma, \Gamma Z$ secans. dico, eam productam cum utraque sectione in uno solo puncto concurrere.

nam quoniam sectionis A asymptotae sunt $\Delta\Gamma, \Gamma E$, et ducta est recta aliqua ΘK utramque rectarum angulum $\Delta\Gamma Z$ deinceps positum comprehendentium secans, $K\Theta$ producta cum sectione concurret [prop. XI]. similiter igitur etiam cum B concurret.

concurrat in Δ, M .

per Γ rectae ΔM parallela ducatur $\Delta\Gamma B$; itaque [prop. XI] $K\Delta \times \Delta\Theta = \Delta\Gamma^2$, $\Theta M \times MK = \Gamma B^2$. quare etiam $K\Delta \times \Delta\Theta = \Theta M \times MK$ et $\Delta\Theta = KM$.

XVII.


Oppositarum coniugarum communes sunt asymptotae.

sint oppositae coniugatae, quarum diametri coniugatae sint $AB, \Gamma\Delta$, centrum autem E . dico, earum asymptotas communes esse.

ἤχθωσαν γὰρ ἐφαπτόμεναι τῶν τομῶν διὰ τῶν
 A, B, Γ, Δ σημείων αἱ $ZAH, H\Delta\Theta, \Theta BK, K\Gamma Z$.
 παραλληλόγραμμον ἄρα ἐστὶ τὸ $ZH\Theta K$. ἐπεξεύχθωσαν
 οὖν αἱ $ZE\Theta, KEH$. εὐθεῖαι ἄρα εἰσὶ καὶ διάμετροι
 5 τοῦ παραλληλογράμμου, καὶ δίχα τέμνονται πᾶσαι
 κατὰ τὸ E σημεῖον. καὶ ἐπεὶ τὸ πρὸς τῇ AB εἶδος
 ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς $\Gamma\Delta$ τετραγώνῳ, ἴση δὲ ἡ ΓE
 τῇ $E\Delta$, ἕκαστον ἄρα τῶν ἀπὸ $ZA, AH, KB, B\Theta$
 τέταρτόν ἐστι τοῦ πρὸς τῇ AB εἶδους. ἀσύμπτωτοι
 10 ἄρα εἰσὶ τῶν A, B τομῶν αἱ $ZE\Theta, KEH$. ὁμοίως
 δὴ δεῖξομεν, ὅτι καὶ τῶν Γ, Δ τομῶν αἱ αὐταὶ εἰσιν
 ἀσύμπτωτοι. τῶν ἄρα κατὰ συζυγίαν ἀντικειμένων
 κοιναὶ εἰσιν ἀσύμπτωτοι.

ιη'.


- 15 Ἐὰν μιᾷ τῶν κατὰ συζυγίαν ἀντικειμένων συμ-
 πίπτουσα εὐθεῖα ἐκβαλλομένη ἐφ' ἑκάτερα ἐκτὸς πίπτῃ
 τῆς τομῆς, συμπεσεῖται ἐκα-
 τέρα τῶν ἐφεξῆς τομῶν καθ'
 ἐν μόνον σημεῖον.
- 20 ἔστωσαν κατὰ συζυγίαν
 ἀντικείμεναι τομαὶ αἱ A, B ,
 Γ, Δ , καὶ τῇ Γ τις εὐθεῖα
 συμπίπτει ἢ EZ καὶ ἐκ-
 βαλλομένη ἐφ' ἑκάτερα ἐκτὸς πίπτει τῆς τομῆς. λέγω,
 25 ὅτι συμπεσεῖται ἐκατέρῃ τῶν A, B τομῶν καθ' ἐν
 μόνον σημεῖον.



ἔστωσαν γὰρ ἀσύμπτωτοι τῶν τομῶν αἱ $H\Theta, KA$.

8. ἀπό] ὑπό V; corr. Memus. 15. Ἐάν] ἐν V; corr.
 Paris, gr. 2356; ἐάν ἐν cp. 16. πίπτῃ] c, corr. ex πίπη
 m. 1 V.

nam sectionem contingentes per puncta A, B, Γ, Δ ducantur $ZAH, H\Delta\Theta, \Theta BK, K\Gamma Z$; parallelogrammum igitur est $ZH\Theta K$ [prop. V]. ducantur igitur



$ZE\Theta, KEH$; rectae igitur sunt diametricae parallelogrammi, et in puncto E omnes in binas partes aequales secantur [cfr. prop. XV]. et quoniam figura rectae AB adplicata

aequalis est $\Gamma\Delta^2$ [I, 56], et $\Gamma E = E\Delta$, singula quadrata $ZA^2, AH^2, KB^2, B\Theta^2$ quarta pars sunt figurae ad AB adplicatae. itaque $ZE\Theta, KEH$ asymptotae sunt sectionum A, B [prop. I]. iam similiter demonstrabimus, easdem etiam sectionum Γ, Δ asymptotas esse. ergo oppositarum coniugarum communes sunt asymptotae.

XVIII.

Si recta cum una oppositarum coniugarum concurrens in utramque partem producta extra sectionem cadit, cum utraque deinceps positarum sectionum in uno solo puncto concurret.

sint sectiones oppositae coniugatae A, B, Γ, Δ , et cum Γ recta aliqua EZ concurrat productaque in utramque partem extra sectionem cadat. dico, eam cum utraque sectione A, B in uno solo puncto concurrere.

sint enim $H\Theta, K\Delta$ asymptotae sectionum. itaque

ἡ EZ ἄρα συμπίπτει ἐκατέρω τῶν $HΘ$, KA . φανερόν οὖν, ὥς καὶ ταῖς A , B τομαῖς συμπεσεῖται καθ' ἓν μόνον σημεῖον.

ιθ'.

Ἐὰν τῶν κατὰ συζυγίαν ἀντικειμένων ἀχθῇ τις εὐθεῖα ἐπιφανύουσα, ἥς ἔτυχε τῶν τομῶν, συμπεσεῖται ταῖς ἐφεξῆς τομαῖς καὶ δίχα τμηθήσεται κατὰ τὴν ἀφήν.

ἔστωσαν κατὰ συζυγίαν

ἀντικείμεναι αἱ A , B , Γ , Δ , καὶ τῆς Γ ἐφαπτόμενη τις εὐθεῖα ἡ $EΓZ$. λέγω, ὅτι ἐκβαλλομένη συμπεσεῖται ταῖς A , B τομαῖς καὶ δίχα τμηθήσεται κατὰ τὸ Γ .

ὅτι μὲν οὖν συμπεσεῖται

ταῖς A , B τομαῖς, φανερόν· συμπιπτέτω κατὰ τὰ H , Θ .

λέγω, ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΓH τῇ $\Gamma\Theta$.


ἤχθωσαν γὰρ αἱ ἀσύμπτωτοι τῶν τομῶν αἱ

KA , MN . ἴση ἄρα ἡ EH τῇ $Z\Theta$ καὶ ἡ ΓE τῇ ΓZ , καὶ ὅλη ἡ ΓH τῇ $\Gamma\Theta$ ἐστὶν ἴση.

κ'.

Ἐὰν μιᾶς τῶν κατὰ συζυγίαν ἀντικειμένων εὐθεῖα ἐφαπτήται, καὶ διὰ τοῦ κέντρου αὐτῶν ἀχθῶσι δύο εὐθεῖαι, αἷν ἡ μὲν διὰ τῆς ἀφῆς, ἡ δὲ παρὰ τὴν ἐφαπτομένην, ἕως οὗ σύμπεσῃ μιᾶ τῶν ἐφεξῆς τομῶν, ἡ κατὰ τὴν σύμπτωσιν ἐφαπτομένη τῆς τομῆς εὐθεῖα παρὰλλήλος ἔσται τῇ διὰ τῆς ἀφῆς καὶ τοῦ κέντρου

12. $E\Gamma Z$] scripsi; ΓEZ V p. 25. ἡ] (alt.) c, ἡ ἡ V, ἡ ἡ p. 27. κατὰ] κατὰ τὰ V; corr. p.c.



EZ cum utraque $H\Theta$, KA concurrit [prop. III]. manifestum igitur, eam etiam cum sectionibus A , B in uno solo puncto concurrere [prop. XVI].

XIX.

Si in oppositis coniugatis recta aliqua ducitur quamlibet sectionum contingens, cum sectionibus deinceps positae concurret et in puncto contactus in duas partes aequales secabitur.

sint A , B , Γ , Δ oppositae coniugatae, et sectionem Γ contingat recta aliqua $E\Gamma Z$. dico, eam productam cum sectionibus A , B concurrere et in Γ in duas partes aequales secari.

iam eam cum sectionibus A , B concurrere, manifestum est [prop. XVIII]. concurrat in H , Θ .

dico, esse $\Gamma H = \Gamma \Theta$.

ducantur enim asymptotae sectionum KA , MN . itaque $EH = Z\Theta$ [prop. XVI], $\Gamma E = \Gamma Z$ [prop. III] et $\Gamma H = \Gamma \Theta$.

XX.

Si recta unam oppositarum coniugarum contingit, et per centrum earum duae rectae ducuntur, quarum altera per punctum contactus, altera contingenti parallela est, dum cum altera sectionum deinceps positarum conueniat, recta in puncto concursus sectionem contingens rectae per punctum contactus centrumque ductae parallela erit, rectae autem per puncta contactus centrumque ductae diametri coniugatae oppositarum erunt.

sint oppositae coniugatae, quarum diametri coniugatae sint AB , ΓA , centrum autem X , et sectionem


ἡγμένη, αἱ δὲ διὰ τῶν ἀφῶν καὶ τοῦ κέντρου συζυγεῖς
ἔσονται διάμετροι τῶν ἀντικειμένων.

ἔστωσαν κατὰ συζυγίαν ἀντικείμεναι, ὧν διάμετροι
συζυγεῖς αἱ AB , ΓA , κέντρον δὲ τὸ X , καὶ τῆς A
5 τομῆς ἡχθῶ ἐφαπτομένη ἡ EZ καὶ ἐκβληθεῖσα συμ-
πιπτέτω τῇ ΓX κατὰ τὸ T , καὶ ἐπεξεύχθῶ ἡ EX καὶ
ἐκβεβλήσθῳ ἐπὶ τὸ Ξ , καὶ διὰ τοῦ X τῇ EZ παράλ-
ληλος ἡχθῶ ἡ XH , καὶ διὰ τοῦ H ἐφαπτομένη τῆς
τομῆς ἡχθῶ ἡ ΘH . λέγω, ὅτι παράλληλός ἐστιν ἡ
10 ΘH τῇ XE , αἱ δὲ HO , $E\Xi$ συζυγεῖς εἰσι διάμετροι.

ἡχθῶσαν γὰρ τεταγμένως αἱ KE , HA , $\Gamma\Pi$,
παρ' αἷς δὲ δύνανται αἱ καταγόμεναι, ἔστωσαν αἱ
 AM , ΓN . ἐπεὶ οὖν ἐστίν, ὥς ἡ BA πρὸς AM , ἡ
 $N\Gamma$ πρὸς ΓA , ἀλλ' ὥς μὲν ἡ BA πρὸς AM , τὸ ὑπὸ
15 XKZ πρὸς τὸ ἀπὸ KE , ὥς δὲ ἡ $N\Gamma$ πρὸς ΓA , τὸ
ἀπὸ HA πρὸς τὸ ὑπὸ $X\Lambda\Theta$, καὶ ὥς ἄρα τὸ ὑπὸ
 XKZ πρὸς τὸ ἀπὸ EK , τὸ ἀπὸ HA πρὸς τὸ ὑπὸ
 $X\Lambda\Theta$. ἀλλὰ τὸ μὲν ὑπὸ XKZ πρὸς τὸ ἀπὸ KE τὸν
συγκείμενον ἔχει λόγον ἐκ τοῦ τῆς XK πρὸς KE
20 καὶ τοῦ τῆς ZK πρὸς KE , τὸ δὲ ἀπὸ HA πρὸς τὸ
ὑπὸ $X\Lambda\Theta$ τὸν συγκείμενον ἔχει λόγον ἐκ τοῦ, ὃν ἔχει
ἡ HA πρὸς AX , καὶ ἡ HA πρὸς $\Lambda\Theta$. ὁ ἄρα συγ-
κείμενος λόγος ἐκ τοῦ τῆς XK πρὸς KE καὶ τῆς ZK
πρὸς KE ὁ αὐτός ἐστι τῷ συγκειμένῳ λόγῳ ἐκ τοῦ τῆς
25 HA πρὸς AX καὶ τοῦ τῆς HA πρὸς $\Lambda\Theta$. ὧν ὁ τῆς ZK
πρὸς KE λόγος ὁ αὐτός ἐστι τῷ τῆς HA πρὸς AX λόγῳ.
ἐκάστη γὰρ τῶν EK , KZ , ZE ἐκάστη τῶν XA , AH , HX
παράλληλός ἐστι. λοιπὸς ἄρα ὁ τῆς XK πρὸς KE

6. τό] p, om. V, add. e corr. vc. 9. ἐστι V; corr. pc.
10. $E\Xi$] $EZ\Xi$ V; corr. p? ($\xi\xi$?). 15. ἡ] c, e corr. m. 1 V.

A contingens ducatur *EZ* productaque cum *ΓX* in *T* concurrat, et ducatur *EX* producaturque ad *Ξ*, et per *X* rectae *EZ* parallela ducatur *XH*, per *H* autem



sectionem contingens ducatur ΘH . dico, esse ΘH rectae XE parallelam et HO , $E\Xi$ coniugatas esse diametros.

ducantur enim ordinate $KE, HA, \Gamma\Pi$, parametri
autem sint $AM, \Gamma N$. iam quoniam est

$$BA : AM = N\Gamma : \Gamma\Delta \text{ [I, 56],}$$

et $BA:AM = XK \times KZ:KE^2$,

$$N\Gamma: \Gamma\Delta = H\Delta^2: X\Delta \times \Delta^{\otimes} \text{ [I, 37],}$$

erit etiam $XK \times KZ : EK^2 = HA^2 : XA \times A\Theta$.

uerum $XK \times KZ : KE^2 = (XK : KE) \times (ZK : KE)$

et $H\mathcal{A}^2 : X\mathcal{A} \times \mathcal{A}^{\otimes 2} = (H\mathcal{A} : \mathcal{A}X) \times (H\mathcal{A} : \mathcal{A}^{\otimes 2})$.

itaque

$$(XK:KE) \times (ZK:KE) = (HA:AX) \times (HA:A^{\otimes}).$$

quarum rationum est $ZK:KE = HA:AX$ [Eucl. I, 29;

VI, 4]; nam singulae EK, KZ, ZE singulis $XA, AH,$

HX parallelae sunt [I def. 6]. itaque

$$XK:KE=H\Lambda:\Lambda\mathcal{O}.$$

λόγος ὁ αὐτός ἐστὶ τῷ τῆς HA πρὸς $AΘ$. καὶ περὶ
 ἴσας γωνίας τὰς πρὸς τοῖς K , A ἀνάλογόν εἰσιν αἱ
 πλευραί· ὅμοιον ἄρα ἐστὶ τὸ EKK τρίγωνον τῷ
 $HΘA$ καὶ ἴσας ἔξει τὰς γωνίας, ὅφ' αἱ ὁμόλογοι
 5 πλευραὶ ὑποτείνουσιν. ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ EKK
 τῇ ὑπὸ $AHΘ$. ἐστὶ δὲ καὶ ὅλη ἡ ὑπὸ KXH τῇ ὑπὸ
 AHX ἴση· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ EXH τῇ ὑπὸ
 $ΘHX$ ἐστὶν ἴση. παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ EX
 τῇ $HΘ$.

10 πεποιήσθω δὴ, ὥς ἡ $ΠH$ πρὸς HP , οὕτως ἡ $ΘH$
 πρὸς $Σ$. ἡ $Σ$ ἄρα ἡμίσειά ἐστὶ τῆς παρ' ἣν δύνανται
 αἱ ἐπὶ τὴν HO διάμετρον καταγόμεναι ἐν ταῖς $Γ$, A
 τομαῖς. καὶ ἐπεὶ τῶν A , B τομῶν δευτέρα διάμετρος
 ἐστὶν ἡ $ΓA$, καὶ συμπίπτει αὐτῇ ἡ ET , τὸ ἄρα ὑπὸ
 15 τῆς TX καὶ τῆς EK ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ $ΓX$. ἐὰν γὰρ
 ἀπὸ τοῦ E τῇ KX παράλληλον ἄγωμεν, τὸ ὑπὸ τῆς
 TX καὶ τῆς ἀπολαμβανομένης ὑπὸ τῆς παραλλήλου
 ἴσον ἔσται τῷ ἀπὸ $ΓX$. διὰ δὲ τοῦτο ἐστὶν, ὥς ἡ
 TX πρὸς EK , τὸ ἀπὸ TX πρὸς τὸ ἀπὸ $XΓ$. ἀλλ'
 20 ὥς μὲν ἡ TX πρὸς EK , ἡ TZ πρὸς ZE , τουτέστι
 τὸ TXZ τρίγωνον πρὸς τὸ EZX , ὥς δὲ τὸ ἀπὸ TX
 πρὸς τὸ ἀπὸ $ΓX$, τὸ XTZ τρίγωνον πρὸς τὸ $XΓΠ$,
 τουτέστι πρὸς τὸ $HΘX$. ὥς ἄρα τὸ TXZ πρὸς τὸ
 EZX , τὸ TZX πρὸς τὸ $XHΘ$. ἴσον ἄρα τὸ $HΘX$
 25 τρίγωνον τῷ XEZ . ἔχει δὲ καὶ τὴν ὑπὸ $ΘHX$
 γωνίαν τῇ ὑπὸ XEZ γωνίᾳ ἴσην· παράλληλος γάρ ἐστὶν
 ἡ μὲν EX τῇ $HΘ$, ἡ δὲ EZ τῇ HX . ἀντιπεπόνθασιν
 ἄρα αἱ πλευραὶ αἱ περὶ τὰς ἴσας γωνίας. ἐστὶν ἄρα

10. πεποιήσθω V; corr. p.c. 14. συμπίπτει V; corr. p. 16.
 ἄγωμεν] ἀγομένην V; corr. Halley; ἀγάγωμεν p. 26. ὑπό] p,
 om. V. ἴσην] om. V; corr. p.

et latera angulos aequales ad K, A positos comprehendentia proportionalia sunt; similes igitur sunt trianguli $EKX, H\Theta A$ et angulos aequales habebunt, sub quibus latera correspondentia subtendunt [Eucl. VI, 6]. erit igitur $\angle EXK = \angle AH\Theta$. est autem etiam

$$\angle KXH = \angle AHX \text{ [Eucl. I, 29];}$$

quare etiam $\angle EXH = \angle \Theta HX$. ergo EX rectae $H\Theta$ parallela est [Eucl. I, 27].

iam fiat $\Pi H : HP = \Theta H : \Sigma$. itaque Σ dimidia est parametrum diametri HO in sectionibus Γ, A [I, 51]. et quoniam sectionum A, B altera diametrum est ΓA [I, 56], et cum ea concurrat ET , erit

$$TX \times EK = \Gamma X^2;$$

nam si ab E rectam rectae KX parallelam duxerimus, rectangulum comprehensum recta TX rectaque a parallela abscisa aequale erit quadrato ΓX [I, 38]. propterea autem est $TX : EK = TX^2 : X\Gamma^2$ [Eucl. VI, 17; V def. 9]. est autem [Eucl. VI, 4]

$$TX : EK = TZ : ZE = \triangle TXZ : EZX \text{ [Eucl. VI, 1],}$$

et [Eucl. VI, 19]

$$TX^2 : \Gamma X^2 = XTZ : X\Gamma\Pi = XTZ : H\Theta X \text{ [u. I, 43].}$$

itaque $TXZ : EZX = TZ X : XH\Theta$. quare [Eucl. V, 9] $H\Theta X = XEZ$. habent autem etiam $\angle \Theta HX = XEZ$ [Eucl. I, 29]; nam parallelae sunt $EX, H\Theta$ et EZ, HX . itaque latera aequales angulos comprehendentia in contraria proportione sunt [Eucl. VI, 15]; est igitur $H\Theta : EX = EZ : HX$; quare [Eucl. VI, 16]

$$\Theta H \times HX = XE \times EZ.$$

et quoniam est $\Sigma : \Theta H = PH : H\Pi$, et

$$PH : H\Pi = XE : EZ \text{ [Eucl. VI, 4]}$$

(parallelae enim sunt), erit etiam $\Sigma : \Theta H = XE : EZ$.

ὥς ἡ $HΘ$ πρὸς τὴν EX , ἡ EZ πρὸς τὴν HX . ἴσον
 ἄρα τὸ ὑπὸ $ΘHX$ τῷ ὑπὸ XEZ . καὶ ἐπεὶ ἐστίν, ὥς
 ἡ $Σ$ πρὸς τὴν $ΘH$, ἡ PH πρὸς $HΠ$, ὥς δὲ ἡ PH
 πρὸς $HΠ$, ἡ XE πρὸς EZ . παράλληλοι γάρ· καὶ
 5 ὥς ἄρα ἡ $Σ$ πρὸς τὴν $ΘH$, ἡ XE πρὸς EZ . ἀλλ'
 ὥς μὲν ἡ $Σ$ πρὸς $ΘH$, τῆς XH κοινοῦ ὕψους λαμ-
 βανομένης τὸ ὑπὸ $Σ$, XH πρὸς τὸ ὑπὸ $ΘHX$, ὥς δὲ
 ἡ XE πρὸς EZ , τὸ ἀπὸ XE πρὸς τὸ ὑπὸ XEZ . καὶ
 ὥς ἄρα τὸ ὑπὸ $Σ$, XH πρὸς τὸ ὑπὸ $ΘHX$, τὸ ἀπὸ
 10 XE πρὸς τὸ ὑπὸ XEZ . ἐναλλάξ, ὥς τὸ ὑπὸ $Σ$, HX
 πρὸς τὸ ἀπὸ EX , τὸ ὑπὸ $ΘHX$ πρὸς τὸ ὑπὸ ZEX .
 ἴσον δὲ τὸ ὑπὸ $ΘHX$ τῷ ὑπὸ XEZ . ἴσον ἄρα καὶ
 τὸ ὑπὸ $Σ$, HX τῷ ἀπὸ EX . καὶ ἐστὶ τὸ μὲν ὑπὸ
 $Σ$, HX τέταρτον τοῦ παρὰ τὴν HO εἰδους· ἥ τε
 15 γὰρ HX τῆς HO ἐστὶν ἡμίσεια, καὶ ἡ $Σ$ τῆς παρ'
 ἣν δύνανται· τὸ δὲ ἀπὸ EX τέταρτον τοῦ ἀπὸ τῆς
 $EΞ$. ἴση γὰρ ἡ EX τῇ $XΞ$. τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς $EΞ$
 ἴσον ἐστὶ τῷ πρὸς τῇ HO εἶδει. ὁμοίως δὲ δειξομεν,
 ὅτι καὶ ἡ HO δύναται τὸ παρὰ τὴν $EΞ$ εἶδος. αἱ
 20 ἄρα $EΞ$, HO συζυγεῖς εἰσι διάμετροι τῶν $A, B, Γ, Δ$
 ἀντικειμένων.

κα'.

Τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων δεικτέον, ὅτι ἡ σύμπτωσις
 τῶν ἐφαπτομένων πρὸς μίαν τῶν ἀσυμπτῶτων ἐστίν.
 25 ἔστωσαν κατὰ συζυγίαν ἀντικείμεναι τομαί, ὧν αἱ
 διάμετροι αἱ $AB, ΓΔ$, καὶ ἐφαπτόμεναι ἡχθῶσαν
 αἱ $AE, ΕΓ$. λέγω, ὅτι το E σημεῖον πρὸς τῇ ἀσυμ-
 πτώτῳ ἐστίν.

1. ἡ] (pr.) om. V; corr. p. ἡ] (alt.) τῇ $HΘ$ ἡ V; corr. p.
 11. ZEX] c, E e corr. m. 1 V. 15. ἡ $Σ$] ἡς V; corr. p.
 19. ἡ] om. V; corr. p. 20. HO] $HOΣ$ V; corr. p. 24.
 μίαν] μιᾶ? 25. τομαί] p v, αἱ τομαί c et delete αἱ V.

est autem, communi altitudine sumpta XH ,

$$\Sigma : \Theta H = \Sigma \times XH : \Theta H \times HX,$$

et $XE : EZ = XE^2 : XE \times EZ$. quare etiam

$$\Sigma \times XH : \Theta H \times HX = XE^2 : XE \times EZ.$$

permutando [Eucl. V, 16]

$$\Sigma \times XH : EX^2 = \Theta H \times HX : ZE \times EX.$$

uerum $\Theta H \times HX = XE \times EZ$. quare etiam [Eucl. V, 14]


$\Sigma \times HX = EX^2$. et $\Sigma \times HX$ quarta pars est figurae rectae HO adplicatae; nam et HX rectae HO [I, 30] et Σ parametri dimidia est; et

$$EX^2 = \frac{1}{4} E\Xi^2;$$

nam $EX = X\Xi$ [I, 30]. itaque $E\Xi^2$ aequale est figurae rectae HO adplicatae. iam similiter demonstrabimus, etiam HO quadratam aequalem esse figurae rectae $E\Xi$ adplicatae. ergo $E\Xi$, HO diametri coniugatae sunt oppositarum A , B , Γ , Δ [I, 56].

XXI.

Iisdem suppositis demonstrandum, concursum contingentium in una asymptotarum esse.



sint sectiones oppositae coniugatae, quarum diametri sint AB , $\Gamma\Delta$, et contingentes ducantur AE , $E\Gamma$. dico, punctum E in asymptota esse.

nam quoniam ΓX^2 aequale est quartae parti figurae ad AB adplicatae [I, 56], et $\Gamma X^2 = AE^2$, etiam AE^2 quartae parti figurae ad AB adplicatae aequale est. ducatur EX ;

ἐπεὶ γὰρ τὸ ἀπὸ ΓX ἴσον ἐστὶ τῷ τετάρτῳ τοῦ
 πρὸς τῇ AB εἰδους, τῷ δὲ ἀπὸ ΓX ἴσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ
 AE , καὶ τὸ ἀπὸ AE ἄρα ἴσον ἐστὶ τῷ τετάρτῳ μέρει
 τοῦ πρὸς τῇ AB εἰδους. ἐπεξεύχθω ἡ EX . ἀσύμ-
 5 πτωτος ἄρα ἐστὶν ἡ EX . τὸ ἄρα E σημεῖον πρὸς τῇ
 ἀσυμπτώτῳ ἐστίν.

κβ'.

Ἐὰν ἐν ταῖς κατὰ συζυγίαν ἀντικειμέναις ἐκ τοῦ
 κέντρου εὐθεῖα ἀχθῇ πρὸς ὁποιοῦν τῶν τομῶν, καὶ
 10 ταύτῃ παράλληλος ἀχθῇ συμπίπτουσα μιᾷ τῶν ἐφεξῆς
 τομῶν καὶ ταῖς ἀσυμπτώτοις, τὸ περιεχόμενον ὑπὸ
 τῶν τῆς ἀχθείσης τμημάτων τῶν γινομένων μεταξὺ
 τῆς τομῆς καὶ τῶν ἀσυμππτώτων ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς
 ἐκ τοῦ κέντρου τετραγώνῳ.

15 ἔστωσαν κατὰ συζυγίαν ἀντικείμεναι τομαὶ αἱ
 A, B, Γ, Δ , ἀσύμπωτοι δὲ τῶν τομῶν ἔστωσαν αἱ
 $XEZ, XH\Theta$, καὶ ἀπὸ τοῦ κέντρου τοῦ X διήχθω τις
 εὐθεῖα ἡ $X\Gamma\Delta$, καὶ παράλληλος αὐτῇ ἡχθῶ τέμνουσα
 τὴν τε ἐφεξῆς τομὴν καὶ τὰς ἀσυμππτώτους ἡ ΘE .
 20 λέγω, ὅτι τὸ ὑπὸ $E\Theta$ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ ΓX .

τετμήσθω δίχα ἡ KA κατὰ τὸ M , καὶ ἐπιευχ-
 θεῖσα ἡ MX ἐκβεβλήσθω· διάμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ
 AB τῶν A, B τομῶν. καὶ ἐπεὶ ἡ κατὰ τὸ A ἐφαπ-
 τομένη παράλληλός ἐστι τῇ $E\Theta$, ἡ ἄρα $E\Theta$ ἐπὶ τὴν
 25 AB τεταγμένως ἐστὶ κατηγμένη. καὶ κέντρον τὸ X .
 αἱ $AB, \Gamma\Delta$ ἄρα συζυγεῖς εἰσι διάμετροι. τὸ ἄρα
 ἀπὸ ΓX ἴσον ἐστὶ τῷ τετάρτῳ τοῦ παρὰ τὴν AB
 εἰδους. τῷ δὲ τετάρτῳ μέρει τοῦ παρὰ τὴν AB εἰδους

4. τοῦ] bis V, corr. cyp. 12. τῶν] (alt.) addidi; om. V.
 17. $XEZ, XH\Theta$] $EXZ, HX\Theta$ p, Halley cum Commandino;
 sed cfr. lin. 18. 19. ΘE] ΘX V; corr. Memus (et); ΘKE p.


ea igitur asymptota est [prop. I]. ergo E punctum in asymptota est.

XXII.

Si in oppositis coniugatis e centro recta ad quamvis sectionum ducitur, eique parallela recta ducitur cum una sectionum deinceps positarum asymptotisque concurrens, rectangulum comprehensum partibus rectae ductae inter sectionem asymptotasque ortis aequale est quadrato radii.

sint A, B, Γ, Δ sectiones oppositae coniugatae, asymptotae autem sectionum sint $XEZ, XH\Theta$, et a centro X ducatur recta $X\Gamma\Delta$, eique parallela ducatur ΘE secans et sectionem deinceps positam et asymptotas. dico, esse $EK \times K\Theta = \Gamma X^2$.

KA in M in duas partes aequales secetur, ductaque MX producat; AB igitur diametrus est sec-



tionum A, B [I, 51 coroll.]. et quoniam recta in A contingens rectae $E\Theta$ parallela est [prop. V], $E\Theta$ ad AB ordinate ducta est. et X centrum est; itaque $AB, \Gamma\Delta$ diametri

coniugatae sunt [I def. 6]. quare ΓX^2 aequale est quartae parti figurae ad AB adplicatae [I, 56]. uerum quartae parti figurae ad AB adplicatae aequale est $\Theta K \times KE$ [prop. X]. ergo etiam

$$\Theta K \times KE = \Gamma X^2.$$

ἴσον ἐστὶ τὸ ὑπὸ ΘKE . καὶ τὸ ὑπὸ ΘKE ἄρα ἴσον
ἐστὶ τῷ ἀπὸ ΓX .

κγ'.

Ἐὰν ἐν ταῖς κατὰ συζυγίαν ἀντικείμεναις ἐκ τοῦ
5 κέντρου τις ἀχθῇ πρὸς ὁποιοῦν τῶν τομῶν, καὶ
ταύτῃ παράλληλος ἀχθῇ συμπίπτουσα ταῖς ἐφεξῆς
τριῶν τομαῖς, τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τῶν τῆς ἀχθείσης
τμημάτων τῶν γινομένων μεταξὺ τῶν τριῶν τομῶν
διπλάσιόν ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τετραγώνου.
10 ἔστωσαν κατὰ συζυγίαν ἀντικείμεναι τομαὶ αἱ
 A, B, Γ, Δ , κέντρον δὲ τῶν τομῶν ἔστω τὸ X , καὶ
ἀπὸ τοῦ X πρὸς ὁποιοῦν τῶν τομῶν προσπιπτέτω
τις εὐθεῖα ἢ ΓX , καὶ τῇ ΓX παράλληλος ἤχθῃ τέμ-
νουσα τὰς ἐφεξῆς τρεῖς τομαὶς ἢ $K\Delta$. λέγω, ὅτι τὸ
15 ὑπὸ KMA διπλάσιόν ἐστι τοῦ ἀπὸ ΓX .

ἤχθωσαν ἀσύμπτωτοι τῶν τομῶν αἱ $EZ, H\Theta$. τὸ
ἄρα ἀπὸ ΓX ἴσον ἐστὶν ἑκατέρω τῶν ὑπὸ $\Theta ME, \Theta KE$.
τὸ δὲ ὑπὸ ΘME μετὰ τοῦ ὑπὸ ΘKE ἴσον ἐστὶ τῷ
ὑπὸ AMK διὰ τὸ τὰς ἄκρας ἴσας εἶναι. καὶ τὸ ὑπο
20 AMK ἄρα διπλάσιόν ἐστι τοῦ ἀπὸ ΓX .

κδ'.


Ἐὰν παραβολῇ δύο εὐθεῖαι συμπίπτωσιν ἑκατέρα
κατὰ δύο σημεία, μηδετέρας δὲ αὐτῶν ἢ σύμπτωσις
ὑπὸ τῶν τῆς ἐτέρας συμπτώσεων περιέχεται, συμπε-
25 σοῦνται ἀλλήλαις αἱ εὐθεῖαι ἐκτὸς τῆς τομῆς.

ἔστω παραβολῇ ἡ $AB\Gamma\Delta$, καὶ τῇ $AB\Gamma\Delta$ δύο
εὐθεῖαι συμπίπτέτωσαν αἱ $AB, \Gamma\Delta$, μηδετέρας δὲ
αὐτῶν ἢ σύμπτωσις ὑπὸ τῶν τῆς ἐτέρας συμπτώσεων

12. ὁποιοῦν] ποιανοῦν V; corr. p. 16. σύμπτωτοι V;
corr. p. 28. συμπτώσεως V; corr. m. 2 v.

XXIII.

Si in oppositis coniugatis e centro recta ad quamvis sectionum ducitur, eique parallela recta ducitur cum tribus sectionibus deinceps positis concurrens, rectangulum comprehensum partibus rectae ductae inter tres sectiones ortis duplo maius est quadrato radii.



sint A, B, Γ, Δ sectiones oppositae coniugatae, centrum autem sectionum sit X , et a X ad quamvis sectionum addidat recta aliqua ΓX , rectaeque ΓX

parallela ducatur KA tres sectiones deinceps positae secans. dico, esse $KM \times MA = 2 \Gamma X^2$.

ducantur asymptotae sectionum $EZ, H\Theta$; itaque $\Gamma X^2 = \Theta M \times ME$ [prop. XXII] $= \Theta K \times KE$ [prop. XI]. est autem $\Theta M \times ME + \Theta K \times KE = AM \times MK$ [u. Eutocius], quia extrema aequalia sunt [prop. VIII et XVI]. ergo etiam $AM \times MK = \Gamma X^2$.

XXIV.

Si cum parabola duae rectae concurrunt singulae in binis punctis, neutriusque earum punctum concursus punctis concursus alterius continetur, rectae inter se extra sectionem concurrent.

sit parabola $AB\Gamma\Delta$, et cum $AB\Gamma\Delta$ duae rectae concurrant $AB, \Gamma\Delta$, neutriusque earum punctum

περιεχέσθω. λέγω, ὅτι ἐκβαλλόμεναι συμπεσοῦνται ἀλλήλαις.

ἤχθωσαν διὰ τῶν B, Γ διάμετροι τῆς τομῆς αἱ $EBZ, H\Gamma\Theta$. παράλληλοι ἄρα εἰσὶ καὶ καθ' ἓν μόνον σημεῖον ἑκατέρω τὴν τομὴν τέμνει. ἐπεξεύχθω δὴ ἡ $B\Gamma$. αἱ ἄρα ὑπὸ $EB\Gamma, B\Gamma H$ γωνίαι δύο ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶν, αἱ δὲ $\angle \Gamma, BA$ ἐκβαλλόμεναι ἐλάττωνας ποιοῦσι δύο ὀρθῶν. συμπεσοῦνται ἄρα ἀλλήλαις ἐκτὸς τῆς τομῆς.

10

κε'.


Ἐὰν ὑπερβολῇ δύο εὐθεῖαι συμπίπτωσιν ἑκατέρω κατὰ δύο σημεῖα, μηδετέρας δὲ αὐτῶν ἡ σύμπτωσις ὑπὸ τῶν τῆς ἐτέρας συμπτώσεων περιέχεται, συμπεσοῦνται ἀλλήλαις αἱ εὐθεῖαι ἐκτὸς μὲν τῆς τομῆς, ἐντὸς δὲ τῆς περιχοῦσης τὴν τομὴν γωνίας.

15

ἔστω ὑπερβολή, ἥς ἀσύμπτωτοι αἱ $AB, A\Gamma$, καὶ τεμνέτωσαν δύο εὐθεῖαι τὴν τομὴν αἱ $EZ, H\Theta$, καὶ μηδετέρας αὐτῶν ἡ σύμπτωσις ὑπὸ τῶν τῆς ἐτέρας περιεχέσθω. λέγω, ὅτι αἱ $EZ, H\Theta$ ἐκβαλλόμεναι συμπεσοῦνται ἐκτὸς μὲν τῆς τομῆς, ἐντὸς δὲ τῆς ὑπὸ ΓAB γωνίας.

20

25




ἐπιζευχθεῖσαι γὰρ αἱ $AZ, A\Theta$ ἐκβεβλήσθωσαν, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ $Z\Theta$. καὶ ἐπεὶ αἱ $EZ, H\Theta$ ἐκβαλλόμεναι τέμνουσι τὰς ὑπὸ $AZ\Theta, A\Theta Z$ γωνίας, εἰσὶ δὲ αἱ

6. $B\Gamma H$] p, om. V. 13. συμπτώσεως V; corr. Memus.
15. γωνίαν V; corr. p.

concursum punctis concursus alterius contineatur. dico, eas productas demum inter se concursuras esse.

per B , Γ diametri sectionis ducantur EBZ , $H\Gamma\Theta$; itaque parallelae sunt [I, 51 coroll.] et in uno tantum



puncto singulae sectionem secant [I, 26]. iam ducatur $B\Gamma$; itaque $\angle EBF + H\Gamma B$ duobus rectis aequales sunt [Eucl. I, 29], $\angle \Gamma$ et BA autem productae angulos duobus rectis minores efficiunt. ergo extra sectionem inter se concurrent [Eucl. I *αλτ.* 5].

XXV.

Si cum hyperbola duae rectae concurrunt singulae in binis punctis, neutriusque earum punctum concursus punctis concursus alterius continetur, rectae inter se concurrent extra sectionem, sed intra angulum sectionem comprehendentem.

sit hyperbola, cuius asymptotae sint AB , $A\Gamma$, duaeque rectae EZ , $H\Theta$ sectionem secent, neutriusque earum punctum concursus punctis concursus alterius contineatur. dico, EZ , $H\Theta$ productas extra sectionem, sed intra angulum ΓAB concursuras esse.

είρημῆναι γωνίαι δύο ὁρθῶν ἐλάσσονες, αἱ EZ , $H\Theta$
ἐκβαλλόμεναι συμπεσοῦνται ἀλλήλαις ἐκτὸς μὲν τῆς
τομῆς, ἐντὸς δὲ τῆς ὑπὸ BAG γωνίας.

ὁμοίως δὲ δείξομεν, ὡς ἐφαπτόμεναι ὧσι τῶν τομῶν
5 αἱ EZ , $H\Theta$.

κς'.

Ἐὰν ἐν ἐλλείψει ἢ κύκλου περιφερείᾳ δύο εὐθεΐαι
τέμνωσιν ἀλλήλας μὴ διὰ τοῦ κέντρου οὔσαι, οὐ τέμ-
νουσιν ἀλλήλας δίχα.

10 εἰ γὰρ δυνατόν, ἐν ἐλλείψει ἢ κύκλου περιφερείᾳ
δύο εὐθεΐαι αἱ $ΓΔ$, EZ μὴ διὰ τοῦ κέντρου οὔσαι
τεμνέτωσαν ἀλλήλας δίχα κατὰ τὸ H , καὶ ἔστω κέν-
τρον τῆς τομῆς τὸ Θ , καὶ ἐπιγευχθεῖσα ἡ $H\Theta$ ἐκβε-
βλήσθω ἐπὶ τὰ A , B .

15 ἐπεὶ οὖν διάμετρος ἐστὶν ἡ AB τὴν EZ δίχα
τέμνουσα, ἡ ἄρα κατὰ τὸ A ἐφαπτομένη παράλληλός
ἐστὶ τῇ EZ . ὁμοίως δὲ δείξομεν, ὅτι καὶ τῇ $ΓΔ$.
ὥστε καὶ ἡ EZ παράλληλός ἐστὶ τῇ $ΓΔ$. ὅπερ ἀδύ-
νατον. οὐκ ἄρα αἱ $ΓΔ$, EZ δίχα τέμνουσιν ἀλλήλας.

κζ'.

20 Ἐὰν ἐλλείψεως ἢ κύκλου περιφερείας δύο εὐθεΐαι
ἐπιψαύωσιν, ἐὰν μὲν ἡ τὰς ἀφ' αὐτῶν ἐπιγευγνύουσα διὰ
τοῦ κέντρου τῆς τομῆς ἢ, παράλληλοι ἔσονται αἱ
ἐφαπτόμεναι, ἐὰν δὲ μὴ, συμπεσοῦνται ἐπὶ τὰ αὐτὰ
25 μέρη τοῦ κέντρου.

ἔστω ἑλλειψις ἢ κύκλου περιφέρεια ἡ AB , καὶ
ἐφαπτέσθωσαν αὐτῆς αἱ $ΓΔ$, EBZ , καὶ ἐπεξεύχθω

4. καὶ V; corr. p. 14. τὰ] τό V; corr. p. 19.
δίχα] om. V; corr. p. 27. EBZ] BEZ V; corr. p.


ductae enim AZ , $A\Theta$ producantur, ducaturque $Z\Theta$.
et quoniam EZ , $H\Theta$ productae angulos $AZ\Theta$, $A\Theta Z$
secant, hi autem anguli duobus rectis minores sunt
[Eucl. I, 17], EZ , $H\Theta$ productae inter se concurrent
extra sectionem, sed intra angulum $B\Lambda\Gamma$.

iam similiter hoc demonstrabimus, etiam si EZ ,
 $H\Theta$ sectiones contingunt.

XXVI.

Si in ellipsi uel circulo duae rectae inter se secant
non per centrum positae, non in binas partes aequales
inter se secant.

nam si fieri potest, in ellipsi uel circulo duae
rectae ΓA , EZ non per centrum positae inter se in



binas partes aequales se-
cent in H , centrum autem
sectionis sit Θ , ductaque
 $H\Theta$ ad A , B producat.

iam quoniam AB dia-
metrus est rectam EZ in
duas partes aequales se-

cans, recta in A contingens rectae EZ parallela est
[prop. VI]. similiter igitur demonstrabimus, eam etiam
rectae ΓA parallelam esse. quare etiam EZ rectae ΓA
parallela est [Eucl. I, 30]; quod fieri non potest.
ergo ΓA , EZ inter se in binas partes aequales non
secant.

XXVII.

Si ellipsim uel circulum duae rectae contingunt,
rectae contingentes parallelae erunt, si recta puncta
contactus coniungens per centrum sectionis cadit, sin-
minus, in eadem parte centri concurrent.

ἡ AB καὶ ἔστω πρότερον διὰ τοῦ κέντρου. λέγω, ὅτι
παράλληλός ἐστιν ἡ ΓA τῇ EZ .

ἐπεὶ γὰρ διάμετρος ἐστὶν ἡ AB τῆς τομῆς, καὶ
ἐφάπτεται κατὰ τὸ A ἡ ΓA , ἡ ΓA ἄρα παράλληλός
5 ἐστὶ ταῖς ἐπὶ τὴν AB τεταγμένως κατηγμέναις. διὰ
τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ἡ BZ παράλληλός ἐστὶ ταῖς αὐταῖς.
καὶ ἡ ΓA ἄρα τῇ EZ παράλληλός ἐστι.


μὴ ἐρχέσθω δὲ ἡ AB διὰ τοῦ κέντρου, ὥς ἔχει
ἐπὶ τῆς δευτέρας καταγραφῆς, καὶ ἦχθω διάμετρος ἡ
10 $A\Theta$, καὶ διὰ τοῦ Θ ἐφαπτομένη ἡ $K\Theta A$. παράλληλος
ἄρα ἐστὶν ἡ KA τῇ ΓA . ἡ ἄρα EZ ἐκβαλλομένη
συμπεσεῖται τῇ ΓA ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τοῦ κέντρου,
ἐν οἷς ἐστὶν ἡ AB .

κη'.

15 Ἐὰν ἐν κώνου τομῇ ἡ κύκλου περιφερεία δύο
παράλληλους εὐθείας εὐθεῖά τις δίχα τέμνῃ, διάμετρος
ἔσται τῆς τομῆς.



ἐν γὰρ κώνου τομῇ δύο εὐθεῖαι
παράλληλοι αἱ AB , ΓA δίχα τετμή-
20 σθωσαν κατὰ τὰ E , Z , καὶ ἐπιξενχ-
θεῖσα ἡ EZ ἐκβεβλήσθω. λέγω, ὅτι
διάμετρος ἐστὶ τῆς τομῆς.

εἰ γὰρ μὴ, ἔστω, εἰ δυνατόν, ἡ
 $HZ\Theta$. ἡ ἄρα κατὰ τὸ H ἐφαπτο-
25 μένη παράλληλός ἐστὶ τῇ AB . ὥστε
ἡ αὐτὴ παράλληλός ἐστὶ τῇ ΓA . καὶ ἐστὶ διάμετρος
ἡ $H\Theta$. ἴση ἄρα ἡ $\Gamma\Theta$ τῇ ΘA . ὅπερ ἄτοπον. ὑπό-
κειται γὰρ ἡ ΓE τῇ $E A$ ἴση. οὐκ ἄρα διάμετρος ἐστὶν



sit ellipsis uel circulus AB , contingantque $\Gamma A \Delta$, EBZ , et ducatur AB cadatque prius per centrum. dico, ΓA et EZ parallelas esse.

nam quoniam AB diametrus sectionis est, ΓA autem in A contingit, ΓA rectis ad AB ordinate



ductis parallela est [I, 17]. eadem igitur de causa etiam BZ iisdem parallela est. ergo etiam ΓA et EZ parallelae sunt [Eucl. I, 30].

iam AB per centrum ne cadat, ut in secunda figura est, et ducatur diametrus $A\Theta$, per Θ autem contingens $K\Theta A$; itaque KA et ΓA parallelae sunt [u. supra]. ergo EZ producta cum ΓA concurret in eadem parte centri, in qua est AB [Eucl. I *alr.* 5].

XXVIII.

Si in conic sectione uel circulo recta aliqua duas rectas parallelas in binas partes secat, diametrus sectionis erit.

in conic sectione enim duae rectae parallelae AB , ΓA in E , Z in binas partes aequales secantur, et ducta EZ producat. dico, eam diametrum sectionis esse.

nam si minus, sit $H\Theta Z$, si fieri potest. itaque recta in H contingens rectae AB parallela est [prop. V—VI]. quare eadem rectae ΓA parallela est


ἢ $HΘ$. ὁμοίως δὴ δείξομεν, ὅτι οὐδὲ ἄλλη τις πλήν
τῆς EZ . ἢ EZ ἄρα διάμετρος ἔσται τῆς τομῆς.

καθ'.

Ἐὰν ἐν κώνου τομῇ ἢ κύκλου περιφερεία δύο
5 εὐθεῖαι ἐφαπτόμεναι συμπίπτωσιν, ἀπὸ τῆς συμπτώ-
σεως αὐτῶν ἐπὶ τὴν διχοτομίαν τῆς τὰς ἀφ'ἑς ἐπι-
ξευγνυούσης ἀγομένη εὐθεῖα διάμετρος ἔσται τῆς τομῆς.

ἔστω κώνου τομῇ ἢ κύκλου περιφέρεια, ἣς ἐφ-
απτόμεναι εὐθεῖαι ἤχθωσαν αἱ AB , AG συμπίπτουσιν
10 κατὰ τὸ A , καὶ ἐπιξευχθεῖσα ἢ $BΓ$ δίχα τετμήσθω
κατὰ τὸ Δ , καὶ ἐπεξεύχθω ἢ $A\Delta$. λέγω, ὅτι διάμετρος
ἔσται τῆς τομῆς.

εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω διάμετρος ἢ ΔE , καὶ ἐπε-
ξεύχθω ἢ $EΓ$. τεμεῖ δὴ τὴν τομὴν. τεμνέτω κατὰ
15 τὸ Z , καὶ διὰ τοῦ Z τῇ $\Gamma\Delta B$
παράλληλος ἤχθω ἢ ZKH . ἐπεὶ
οὖν ἴση ἐστὶν ἢ $\Gamma\Delta$ τῇ ΔB ,
ἴση καὶ ἢ $ZΘ$ τῇ $ΘH$. καὶ ἐπεὶ
ἢ κατὰ τὸ A ἐφαπτομένη παρ-
20 ἀλληλός ἐσται τῇ $BΓ$, ἔσται δὲ
καὶ ἢ ZH τῇ $BΓ$ παράλληλος,
καὶ ἢ ZH ἄρα παράλληλός ἐσται
τῇ κατὰ τὸ A ἐφαπτομένῃ. ἴση
ἄρα ἢ $ZΘ$ τῇ $ΘK$. ὅπερ ἀδύνατον. οὐκ ἄρα διά-
25 μετρος ἐστὶν ἢ ΔE . ὁμοίως δὴ δείξομεν, ὅτι οὐδὲ
ἄλλη τις πλήν τῆς $A\Delta$.



5. ἀπό] ἢ ἀπό p. 13. ΔE] corr. ex BE m. 1. V, BE
cv, $E\Delta$ p. 16. ZKH] ZHK V, $Z\Theta H$ p et Comm.; corr.

[Eucl. I, 30]. et $H\Theta$ diametrus est; itaque $\Gamma\Theta = \Theta A$ [I def. 4]. quod absurdum est; supposuimus enim, esse $\Gamma E = EA$. itaque $H\Theta$ diametrus non est. iam similiter demonstrabimus, ne aliam quidem ullam diametrum esse praeter EZ . ergo EZ diametrus sectionis erit.

XXIX.

Si in conic sectione uel circulo duae rectae contingentes concurrunt, recta a puncto earum concursus ad punctum medium rectae puncta contactus coniungentis ducta diametrus sectionis est.

sit conic sectio uel circulus, quam contingentes ducantur rectae AB , AG in A concurrentes, et ducta $B\Gamma$ in A in duas partes aequales secetur, ducaturque AA . dico, eam diametrum sectionis esse.

nam si fieri potest, sit AE diametrus, ducaturque EG ; ea igitur sectionem secabit [I, 35—36]. secet in Z , et per Z rectae ΓAB parallela ducatur ZKH . iam quoniam $\Gamma A = AB$, erit etiam [Eucl. VI, 4] $Z\Theta = \Theta H$. et quoniam recta in A contingens rectae $B\Gamma$ parallela est [prop. V—VI], et etiam ZH rectae $B\Gamma$ parallela est, erit etiam ZH rectae in A contingenti parallela. itaque $Z\Theta = \Theta K$ [I, 46—47]; quod fieri non potest. itaque AE diametrus non est. iam similiter demonstrabimus, ne aliam quidem ullam diametrum esse praeter AA .


Halley. 17. $\xi\sigma\tau\iota\nu$ — 18. $\xi\sigma\eta$] om. V, corr. Memus. 19. A] cv, corr. ex A m. 1 V. 20. $\xi\sigma\tau\iota$] καὶ $\xi\sigma\tau\iota$ V, corr. Memus.

λ'.

Ἐὰν κώνου τομῆς ἢ κύκλου περιφερείας δύο εὐθεῖαι
ἐφαπτόμεναι συμπίπτωσιν, ἢ ἀπὸ τῆς συμπτώσεως ἀγο-
μένη διάμετρος δίχα τεμεῖ τὴν τὰς ἀφὰς ἐπιξενγνύουσαν
5 εὐθεΐαν.

ἔστω κώνου τομὴ ἢ κύκλου περιφέρεια ἡ $BΓ$, καὶ
ἤχθωσαν αὐτῆς δύο ἐφαπτόμεναι αἱ $ΒΑ$, $ΑΓ$ συμ-
πίπτουσιν κατὰ τὴν A , καὶ ἐπεξεύχθω ἡ $BΓ$, καὶ ἤχθω
διὰ τοῦ A διάμετρος τῆς τομῆς ἡ $ΑΔ$. λέγω, ὅτι
10 ἔστιν ἴση ἡ $ΑΒ$ τῇ $ΑΓ$.

μὴ γάρ, ἀλλ' εἰ δυνατόν, ἔστω ἴση ἡ $ΒΕ$ τῇ $ΕΓ$,
καὶ ἐπεξεύχθω ἡ $ΑΕ$. ἡ $ΑΕ$ ἄρα διάμετρος ἐστὶ τῆς
τομῆς. ἔστι δὲ καὶ ἡ $ΑΔ$. ὅπερ
ἄτοπον. εἴτε γὰρ ἑλλειψίς ἐστὶν
15 ἡ τομὴ, τὸ A , καθ' ὃ συμ-
βάλλουσιν ἀλλήλαις αἱ διάμετροι,
κέντρον ἔσται τῆς τομῆς ἐκτός·
ὅπερ ἀδύνατον· εἴτε παραβολή
ἐστὶν ἡ τομὴ, συμπίπτουσιν
20 ἀλλήλαις αἱ διάμετροι· εἴτε ὑπερβολή ἐστὶ, καὶ συμ-
πίπτουσι τῇ τομῇ αἱ $ΒΑ$, $ΑΓ$ μὴ περιέχουσαι τὰς
ἐαυτῶν συμπτώσεις, ἐντός ἐστὶ τῆς περιεχούσης τὴν
ὑπερβολὴν γωνίας· ἀλλὰ καὶ ἐπ' αὐτῆς· κέντρον
γὰρ ὑπόκειται διαμέτρων οὐσῶν τῶν $ΑΔ$, $ΑΕ$. ὅπερ
25 ἄτοπον. οὐκ ἄρα ἡ $ΒΕ$ τῇ $ΕΓ$ ἐστὶν ἴση.



λα'.

Ἐὰν ἐκατέρας τῶν ἀντικειμένων δύο εὐθεῖαι ἐφ-
άπτονται, ἐὰν μὲν ἡ τὰς ἀφὰς ἐπιξενγνύουσα διὰ τοῦ

11. εἰ] ἢ V; corr. p. 17. ἐκτός] ἐκτός ὄν?

XXX.

Si conici sectionem uel circulum duae rectae contingentes concurrunt, diametrus a puncto concursus ducta rectam puncta contactus coniungentem in duas partes aequales secabit.

sit $B\Gamma$ conici sectio uel circulus, eamque contingentes duae rectae ducantur BA , $A\Gamma$ in A concurrentes, et ducatur $B\Gamma$, per A autem diametrus sectionis ducatur AA . dico, esse $\angle B = \angle \Gamma$.

ne sit enim, sed, si fieri potest, sit $BE = E\Gamma$, ducaturque AE ; AE igitur diametrus est sectionis [prop. XXIX]. uerum etiam AA diametrus est; quod absurdum est. nam siue ellipsis est sectio, A punctum, in quo diametri inter se concurrunt, centrum erit sectionis extra sectionem positum; quod fieri non potest; siue sectio parabola est, diametri inter se concurrunt [contra I, 51 coroll.]; siue hyperbola est, et BA , $A\Gamma$ cum sectione concurrunt puncta concursus non comprehendentes, punctum earum concursus intra angulum hyperbolam comprehendentem positum est [prop. XXV extr.]; uerum etiam in eo positum est; nam supposuimus, centrum id esse, si quidem diametri sunt AA , AE ; quod absurdum est. ergo non est $BE = E\Gamma$.

XXXI.

Si utramque oppositam duae rectae contingunt, contingentes parallelae erunt, si recta puncta contactus coniungens per centrum cadit, sin minus, in eadem parte concurrent, in qua est centrum.

sint sectiones oppositae A , B , easque contingant

κέντρου πίπτῃ, παράλληλοι ἔσονται αἱ ἐφαπτόμεναι, ἂν δὲ μὴ, συμπεσοῦνται ἐπὶ τὰντὰ τῷ κέντρῳ.

ἔστωσαν ἀντικείμεναι τομαὶ αἱ A, B , καὶ ἐφαπτόμεναι αὐτῶν ἔστωσαν αἱ $\Gamma A \Delta, EBZ$ κατὰ τὰ A, B , ἢ δὲ ἀπὸ τοῦ A ἐπὶ τὸ B ἐπιζευγνυμένη πιπτέτω
5 πρότερον διὰ τοῦ κέντρου τῶν τομῶν. λέγω, ὅτι παρ-
άλληλός ἐστιν ἡ ΓA τῇ EZ .

ἐπεὶ γὰρ ἀντικείμεναι εἰσι τομαί, ὧν διάμετρος ἐστιν ἡ AB , καὶ μιᾶς αὐτῶν ἐφάπτεται ἡ ΓA κατὰ
10 τὸ A , ἡ ἄρα διὰ τοῦ B τῇ ΓA παράλληλος ἀγομένη ἐφάπτεται τῆς τομῆς. ἐφάπτεται δὲ καὶ ἡ EZ . παρ-
άλληλός ἐστιν ἄρα ἡ ΓA τῇ EZ .

μὴ ἔστω δὴ ἡ ἀπὸ τοῦ A ἐπὶ τὸ B διὰ τοῦ κέντρου τῶν τομῶν, καὶ ἦχθῳ διάμετρος τῶν τομῶν ἡ AH ,
15 καὶ ἐφαπτομένη τῆς τομῆς ἦχθῳ ἡ ΘK . ἡ ΘK ἄρα παράλληλός ἐστι τῇ ΓA . καὶ ἐπεὶ ὑπερβολῆς εὐθεΐαι ἐφάπτονται αἱ $EZ, \Theta K$, συμπεσοῦνται ἄρα. καὶ ἐστι παράλληλος ἡ ΘK τῇ ΓA . καὶ αἱ $\Gamma A, EZ$ ἄρα ἐκβαλλόμεναι συμπεσοῦνται. καὶ φανερόν, ὅτι ἐπὶ τὰντὰ
20 τῷ κέντρῳ.

λβ'.


Ἐὰν ἑκατέρῃ τῶν ἀντικειμένων εὐθεΐαι συμπίπτωσι καθ' ἓν ἐφαπτόμεναι ἢ κατὰ δύο τέμνουσαι, ἐκβληθεῖσαι δὲ αἱ εὐθεΐαι συμπίπτωσιν, ἢ σύμπτωσις αὐτῶν ἐστὶ
25 ἐν τῇ ἐφεξῆς γωνίᾳ τῆς περιεχούσης τὴν τομὴν γωνίας.

ἔστωσαν ἀντικείμεναι τομαὶ καὶ τῶν ἀντικειμένων ἦτοι καθ' ἓν ἐφαπτόμεναι ἦτοι κατὰ δύο τέμνουσαι εὐθεΐαι αἱ $AB, \Gamma A$, καὶ ἐκβαλλόμεναι συμπιπτέτωσαν.

1. αἱ] om. V; corr. p. 22. συμπίπτουσι V; corr. p. 24. συμπίπτουσιν V; corr. p.

$\Gamma A \Delta$, EBZ in punctis A , B , recta autem ab A ad B ducta prius per centrum cadat. dico, parallelas esse ΓA et EZ .

nam quoniam sectiones oppositae sunt, quarum diameter est AB , alteramque earum contingit ΓA in A , recta per B rectae ΓA parallela ducta sectionem contingit [I, 44]. uerum etiam EZ contingit. ergo ΓA , EZ parallelae sunt.




iam recta ab A ad B ducta per centrum sectionum ne cadat, ducaturque diameter sectionum AH , et sectionem contingens ducatur ΘK ; itaque ΘK et ΓA parallelae sunt [u. supra]. et quoniam rectae EZ , ΘK hyperbolam contingunt, coincident [prop. XXV extr.]. et ΘK , ΓA parallelae sunt. ergo etiam ΓA , EZ productae concurrent. et manifestum est, eas concurrere in eadem parte, in qua sit centrum.

XXXII.

Si cum utraque opposita rectae concurrunt aut in singulis punctis contingentes aut in binis secantes, et productae rectae illae concurrunt, punctum earum concursus in angulo deinceps posito angulo sectionem comprehendenti erit positum.

λέγω, ὅτι ἡ σύμπτωσις αὐτῶν ἔσται ἐν τῇ ἐφεξῆς γωνίᾳ τῆς περιεχούσης τὴν τομὴν γωνίας.



ἔστωσαν ἀσύμπτωτοι τῶν τομῶν αἱ ZH , ΘK . ἡ AB ἄρα ἐκβαλλομένη συμπεσεῖται ταῖς ἀσύμπτωτοις. 5 συμπίπτει κατὰ τὰ Θ , H . καὶ ἐπεὶ ὑπόκεινται συμπίπτουσαι αἱ ZK , ΘH , φανερόν, ὅτι ἦτοι ἐν τῷ ὑπὸ τὴν ΘAZ γωνίαν τόπως συμπεσοῦνται ἢ ἐν τῷ ὑπὸ τὴν KAH . ὁμοίως δὲ καί, ἐὰν ἐφάπτανται.

λγ'.

- 10 Ἐὰν μιᾷ τῶν ἀντικειμένων εὐθεΐα συμπίπτουσα ἐκβληθεῖσα ἐφ' ἑκάτερα ἐκτὸς πίπτῃ τῆς τομῆς, οὐ συμπεσεῖται τῇ ἑτέρᾳ τομῇ, ἀλλὰ πεσεῖται διὰ τῶν τριῶν τόπων, ὧν ἔστιν εἷς μὲν ὁ ὑπὸ τὴν περιέχουσαν γωνίαν τὴν τομὴν, δύο δὲ οἱ ὑπὸ τὰς γωνίας τὰς ἐφεξῆς 15 τῆς περιεχούσης τὴν τομὴν γωνίας.

ἔστωσαν ἀντικείμεναι τομαὶ αἱ A , B , καὶ τὴν A τεμνέτω τις εὐθεΐα ἡ ΓA καὶ ἐκβαλλομένη ἐφ' ἑκάτερα ἐκτὸς πίπτει τῆς τομῆς. λέγω, ὅτι ἡ ΓA οὐ συμπίπτει τῇ B τομῇ.

ἡχθωσαν γὰρ ἀσύμπτωτοι τῶν τομῶν αἱ EZ , $H\Theta$.

3. σύμπτωτοι V; corr. p. 6. ZK] ZH V; corr. Halley.
8. τήν] p, om. V.


sint sectiones oppositae sectionesque oppositas aut in singulis punctis contingentes aut in binis secantes rectae AB , ΓA , eaeque productae concurrant. dico, punctum earum concursus in angulo deinceps posito angulo sectionem comprehendenti esse positum.

asymptotae sectionum sint ZH , ΘK ; itaque AB producta cum asymptotis concurret [prop. VIII]. concurrat in Θ , H . et quoniam supposuimus, ZK et ΘH concurrere, manifestum est, eas aut in spatio sub angulo ΘAZ concurrere aut in spatio sub KAH . et similiter etiam, si contingunt [prop. III].

XXXIII.

Si recta, quae cum altera opposita concurrat, in utramque partem producta extra sectionem cadit, cum altera sectione non concurret, sed per tria spatia cadet, quorum unum est spatium sub angulo sectionem comprehendenti positum, duo autem spatia sub angulis angulo sectionem comprehendenti deinceps positis.

sint oppositae sectiones A , B , sectionemque A secet recta aliqua ΓA et in utramque partem producta extra



sectionem cadat. dico, rectam ΓA cum B sectione non concurrere.

ducantur enim asymptotae sectionum EZ , $H\Theta$; ΓA igitur producta cum asymptotis concurret [prop. VIII].

concurrat autem in E , Θ solis. ergo cum B sectione non concurret.

ἡ $\Gamma\Delta$ ἄρα ἐκβαλλομένη συμπεσεῖται ταῖς ἀσυμπτώτοις. οὐ συμπίπτει δὲ κατ' ἄλλα ἢ τὰ E, Θ . ὥστε οὐ συμπεσεῖται οὐδὲ τῇ B τομῇ.

καὶ φανερόν, ὅτι διὰ τῶν τριῶν τόπων πεσεῖται.
 5 ἐὰν γὰρ ἑκατέρω τῶν ἀντικειμένων συμπίπτῃ τις εὐθεΐα, οὐδεμιᾷ τῶν ἀντικειμένων συμπεσεῖται κατὰ δύο σημεία. εἰ γὰρ συμπεσεῖται κατὰ δύο σημεία, διὰ τὸ προοδεδειγμένον τῇ ἑτέρω τομῇ οὐ συμπεσεῖται.

λδ'.

10 Ἐὰν μιᾷς τῶν ἀντικειμένων εὐθεΐα τις ἐπιψαύῃ, καὶ ταύτῃ παράλληλος ἄχθῃ ἐν τῇ ἑτέρω τομῇ, ἡ ἀπὸ τῆς ἀφῆς ἐπὶ μέσῃ τὴν παράλληλον ἀγομένη εὐθεΐα διάμετρος ἔσται τῶν ἀντικειμένων.

ἔστωσαν ἀντικείμεναι τομαὶ αἱ A, B , καὶ μιᾷς
 15 αὐτῶν τῆς A ἐφαπτέσθω τις εὐθεΐα ἡ $\Gamma\Delta$ κατὰ τὸ A , καὶ τῇ $\Gamma\Delta$ παράλληλος ἦχθω ἐν τῇ ἑτέρω τομῇ ἡ EZ , καὶ τετμήσθω δίχα κατὰ τὸ H , καὶ ἐπεξέχθω ἡ AH . λέγω, ὅτι ἡ AH διάμετρος ἔστι τῶν ἀντικειμένων.

εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω ἡ $A\Theta K$. ἡ ἄρα κατὰ τὸ Θ
 20 ἐφαπτομένη παράλληλός ἐστι τῇ $\Gamma\Delta$. ἀλλὰ καὶ ἡ $\Gamma\Delta$ παράλληλός ἐστι τῇ EZ . καὶ ἡ κατὰ τὸ Θ ἄρα ἐφαπτομένη παράλληλός ἐστι τῇ EZ . ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ EK τῇ KZ . ὅπερ ἀδύνατον. ἡ γὰρ EH τῇ HZ ἐστὶν ἴση. οὐκ ἄρα διάμετρος ἐστὶν ἡ $A\Theta$ τῶν ἀντικειμέ-
 25 νων. ἡ AB ἄρα.

λε'.

Ἐὰν ἡ διάμετρος ἐν μιᾷ τῶν ἀντικειμένων εὐθεϊάν τινα δίχα τέμνῃ, ἡ ἐπιψαύουσα τῆς ἑτέρας τομῆς κατὰ


13. διάμετρον V; corr. p. 17. τό] bis V; corr. cnp.

et manifestum est, eam per tria illa spatia cadere. nam si recta cum utraque opposita concurrat, cum neutra oppositarum in duobus punctis concurrat; si enim in duobus punctis concurrat, propter id, quod supra demonstratum est, cum altera sectione non concurrat.

XXXIV.

Si recta alteram oppositarum contingit, eique parallela in altera sectione ducitur recta, recta a puncto contactus ad mediam parallelam ducta diameter erit oppositarum.

sint sectiones oppositae A , B , et alteram earum A contingat recta aliqua ΓA in A , rectaeque ΓA



parallela in altera sectione ducatur EZ et in H in duas partes aequales secetur, ducaturque AH . dico, AH diametrum esse oppositarum.

nam si fieri potest, sit $A\Theta K$. recta igitur in Θ contingens rectae ΓA parallela est [prop. XXXI]. est autem etiam ΓA rectae EZ parallela; quare recta in Θ contingens rectae EZ parallela est [Eucl. I, 30]. itaque $EK = KZ$ [I, 47]; quod fieri non potest; est enim $EH = HZ$. itaque $A\Theta$ diametrum oppositarum non est. ergo AB diametrum est.

XXXV.

Si diameter in altera oppositarum rectam aliquam in duas partes aequales secat, recta alteram sectionem

τὸ πέρας τῆς διαμέτρου παράλληλος ἔσται τῇ δίχα τεμνομένη εὐθείᾳ.

ἔστωσαν ἀντικείμεναι τομαὶ αἱ A, B , ἡ δὲ διάμετρος αὐτῶν ἡ AB τεμνέτω ἐν τῇ B τομῇ δίχα τὴν $ΓΔ$ εὐθεῖαν κατὰ τὸ E . λέγω, ὅτι ἡ κατὰ τὸ A ἐφαπτομένη τῆς τομῆς παράλληλός ἐστι τῇ $ΓΔ$.


εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω τῇ κατὰ τὸ A ἐφαπτομένη τῆς τομῆς παράλληλος ἡ $ΔΖ$. ἴση ἄρα ἡ $ΔΗ$ τῇ $ΗΖ$. ἔστι δὲ καὶ ἡ $ΔΕ$ τῇ $ΕΓ$ ἴση. παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ $ΓΖ$ τῇ $ΕΗ$. ὅπερ ἀδύνατον· ἐκβαλλομένη γὰρ αὐτῇ συμπίπτει. οὐκ ἄρα παράλληλός ἐστιν ἡ $ΔΖ$ τῇ κατὰ τὸ A ἐφαπτομένη τῆς τομῆς οὐδὲ ἄλλη τις πλὴν τῆς $ΓΔ$.

λς'.

Ἐὰν ἐν ἑκατέρᾳ τῶν ἀντικειμένων εὐθεῖαι ἀχθῶσι παράλληλοι οὖσαι, ἡ τὰς διχοτομίας αὐτῶν ἐπιζευγνύουσα εὐθεῖα διάμετρος ἔσται τῶν ἀντικειμένων.

ἔστωσαν ἀντικείμεναι τομαὶ αἱ A, B , καὶ ἐν ἑκατέρᾳ αὐτῶν ἡχθῶσαν εὐθεῖαι αἱ $ΓΔ, ΕΖ$, καὶ ἔστωσαν παράλληλοι, καὶ τετμήσθω ἑκατέρᾳ αὐτῶν δίχα κατὰ τὰ $H, Θ$ σημεία, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ $ΗΘ$. λέγω, ὅτι ἡ $ΗΘ$ διάμετρος ἐστὶ τῶν ἀντικειμένων.


εἰ γὰρ μή, ἔστω ἡ $ΗΚ$. ἡ ἄρα κατὰ τὸ A ἐφαπτομένη παράλληλός ἐστι τῇ $ΓΔ$. ὥστε καὶ τῇ $ΕΖ$. ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ $ΕΚ$ τῇ $ΚΖ$. ὅπερ ἀδύνατον, ἐπεὶ καὶ



4. B] δίχα V; corr. p.

in termino diametri contingens rectae in duas partes aequales sectae parallela erit.

sint A, B sectiones oppositae, diametrus autem earum AB in sectione B rectam ΓA in E in duas



partes aequales secet. dico, rectam in A sectionem contingentem rectae ΓA parallelam esse.

nam si fieri potest, sit ΔZ rectae in A sectionem contingentem parallela; itaque $\Delta H = HZ$ [I, 48]. est autem etiam $\Delta E = E\Gamma$. itaque $\Gamma Z, EH$ parallelae sunt [Eucl. VI, 2]; quod fieri non potest; nam ΓZ producta cum EH concurrat [I, 22]. ergo ΔZ rectae in A sectionem contingentem parallela non est nec ulla alia praeter ΓA .

XXXVI.

Si in utraque opposita rectae ducuntur parallelae, recta puncta media earum coniungens diametrus oppositarum erit.

sint A, B sectiones oppositae, et in utraque ducantur rectae $\Gamma A, EZ$ sintque parallelae, et utraque earum in punctis H, Θ in binas partes aequales secetur, ducaturque $H\Theta$. dico, $H\Theta$ diametrum esse oppositarum.


nam si minus, sit HK . recta igitur in A contingens rectae ΓA parallela est [prop. V]; quare etiam rectae EZ [Eucl. I, 30]. itaque erit $EK = KZ$ [I, 48]; quod fieri non potest, quoniam est $E\Theta = \Theta Z$. ita-

ἡ $EΘ$ τῇ $ΘΖ$ ἐστὶν ἴση. οὐκ ἄρα ἡ HK διάμετρος ἐστὶ τῶν ἀντικειμένων. ἡ $HΘ$ ἄρα.

λξ'.

Ἐὰν ἀντικειμένους εὐθεῖα τέμνῃ μὴ διὰ τοῦ κέντρου, ἡ ἀπὸ τῆς διχοτομίας αὐτῆς ἐπὶ τὸ κέντρον ἐπιξευγνυμένη διάμετρος ἐστὶ τῶν ἀντικειμένων ἡ λεγομένη ὀρθία, πλαγία δὲ συζυγῆς αὐτῇ ἡ ἀπὸ τοῦ κέντρου ἀγομένη παράλληλος τῇ δίχῃ τεμνομένη.

ἔστωσαν ἀντικείμεναι τομαὶ αἱ A, B , καὶ τὰς A, B 10 τεμνέτω τις εὐθεῖα ἡ $ΓΔ$ μὴ διὰ τοῦ κέντρου οὕσα καὶ τετμήσθω δίχῃ κατὰ τὸ E , καὶ τὸ κέντρον τῶν τομῶν ἔστω τὸ X , καὶ ἐπεζεύχθω ἡ XE , καὶ διὰ 15 τοῦ X τῇ $ΓΔ$ παράλληλος ἡ AB . λέγω, ὅτι αἱ AB, EX συζυγεῖς εἰσὶ διάμετροι τῶν τομῶν.



ἐπεζεύχθω γάρ ἡ $ΔX$ καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Z , 20 καὶ ἐπεζεύχθω ἡ $ΓΖ$. ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ $ΔX$ τῇ XZ . ἐστὶ δὲ καὶ ἡ $ΔE$ τῇ $EΓ$ ἴση· παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ EX τῇ $ΖΓ$. ἐκβεβλήσθω ἡ BA ἐπὶ τὸ H . καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ $ΔX$ τῇ XZ , ἴση ἄρα καὶ ἡ EX τῇ ZH . ὥστε καὶ ἡ $ΓH$ ἴση τῇ ZH . ἡ ἄρα κατὰ τὸ A 25 ἐφαπτομένη παράλληλός ἐστι τῇ $ΓΖ$. ὥστε καὶ τῇ EX . αἱ EX, AB ἄρα συζυγεῖς εἰσὶ διάμετροι.

λη'.

Ἐὰν τῶν ἀντικειμένων δύο εὐθεῖαι ἐπιψαύωσι συμπίπτουσιν, ἡ ἀπὸ τῆς συμπτώσεως ἐπιξευγνυμένη ἐπὶ

que HK diametrus oppositarum non est. ergo $H\Theta$ diametrus est.

XXXVII.

Si recta non per centrum ducta oppositas secat, recta a puncto eius medio ad centrum ducta diametrus est oppositarum, recta quae uocatur, transuersa autem cum ea coniugata recta est a centro ducta rectae in duas partes aequales sectae parallela.

sint A, B sectiones oppositae, sectionesque A, B secet recta ΓA non per centrum ducta et in E in duas partes aequales secetur, centrum autem sectionum sit X , ducaturque XE , et per X rectae ΓA parallela ducatur AB . dico, AB et EX diametros coniugatas esse sectionum.

ducatur enim AX et ad Z producat, ducaturque ΓZ . itaque $AX = XZ$ [I, 30]. uerum etiam $AE = E\Gamma$; itaque EX et $Z\Gamma$ parallelae sunt [Eucl. VI, 2]. producat BA ad H . et quoniam est $AX = XZ$, erit etiam $EX = ZH$ [Eucl. VI, 4; V, 14]; quare etiam $\Gamma H = ZH$ [Eucl. I, 34]. itaque recta in A contingens rectae ΓZ parallela est [prop. V]; quare etiam rectae EX parallela est [Eucl. I, 30]. ergo EX, AB diametri coniugatae sunt [I, 16].

XXXVIII.

Si duae rectae concurrentes oppositas contingunt, recta a puncto concursus ad mediam rectam puncta contactus coniungentem ducta diametrus erit oppositarum, recta quae uocatur, transuersa autem cum ea

μέσῃν τὴν τὰς ἀφὰς ἐπιξευγνύουσας διάμετρος ἔσται τῶν ἀντικειμένων ἢ λεγομένη ὀρθία, πλαγία δὲ συζυγῆς αὐτῇ ἢ διὰ τοῦ κέντρου ἀγομένη παρὰ τὴν τὰς ἀφὰς ἐπιξευγνύουσας.

5 ἔστωσαν ἀντικείμεναι τομαὶ αἱ A, B , ἐφαπτόμεναι δὲ τῶν τομῶν αἱ $\Gamma X, X\Delta$, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ $\Gamma\Delta$ καὶ τετμήσθω δίχα κατὰ τὸ E , καὶ ἐπεξεύχθω ἡ EX . λέγω, ὅτι ἡ EX διάμετρος ἔστιν ἢ λεγομένη ὀρθία, πλαγία δὲ συζυγῆς αὐτῇ ἢ διὰ τοῦ κέντρου τῇ $\Gamma\Delta$ παράλληλος
10 ἀγομένη.

ἔστω γάρ, εἰ δυνατόν, διάμετρος ἡ EZ , καὶ εἰλήφθω τυχὸν σημεῖον τὸ Z . συμπεσεῖται ἄρα ἡ ΔX τῇ EZ . συμπίπτει κατὰ τὸ Z , καὶ ἐπεξεύχθω ἡ ΓZ . συμβαλεῖ ἄρα ἡ ΓZ τῇ τομῇ. συμβαλέτω κατὰ τὸ A , καὶ
15 διὰ τοῦ A τῇ $\Gamma\Delta$ παράλληλος ἦχθω ἡ AB . ἐπεὶ οὖν διάμετρος ἔστιν ἡ EZ , καὶ τὴν $\Gamma\Delta$ δίχα τέμνει, καὶ τὰς παραλλήλους αὐτῇ δίχα τέμνει. ἴση ἄρα ἔστιν ἡ AH τῇ HB . καὶ ἐπεὶ ἴση ἔστιν ἡ ΓE τῇ $E\Delta$, καὶ ἔστιν ἐν τριγώνῳ τῷ $\Gamma Z\Delta$, ἴση ἄρα καὶ ἡ AH τῇ HK .
20 ὥστε καὶ ἡ HK τῇ HB ἔστιν ἴση· ὅπερ ἀδύνατον. οὐκ ἄρα ἡ EZ διάμετρος ἔσται.

λθ'.


Ἐὰν τῶν ἀντικειμένων δύο εὐθεῖαι ἐφάπτονται συμπίπτουσιν, ἢ διὰ τοῦ κέντρου καὶ τῆς συμπτώσεως
25 τῶν ἐφαπτομένων ἀγομένη δίχα τέμνει τὴν τὰς ἀφὰς ἐπιξευγνύουσας εὐθεῖαν.

ἔστωσαν ἀντικείμεναι τομαὶ αἱ A, B , καὶ τῶν A, B δύο εὐθεῖαι ἥχθωσαν ἐφαπτόμεναι αἱ $\Gamma E, E\Delta$, καὶ

14. ΓZ] cp, corr. ex $\Gamma\Delta$ V, sed obscure. 19. $\Gamma Z\Delta$] $Z\Delta$ V; corr. p.

coniugata recta erit per centrum ducta rectae puncta contactus coniungenti parallela.

sint A, B sectiones oppositae, sectionesque contingant $\Gamma X, X\Delta$, et ducatur $\Gamma\Delta$ seceturque in duas partes aequales in E , et ducatur EX . dico, EX diametrum esse, recta quae uocatur, transuersam autem



cum ea coniugatam rectam per centrum rectae $\Gamma\Delta$ parallelam ductam.

sit enim, si fieri potest, EZ diametrus, et sumatur punctum aliquod Z ; ΔX igitur cum EZ concurret. concurrat in

Z , ducaturque ΓZ ; ΓZ igitur cum sectione concurret [I, 32]. concurrat in A , et per A rectae $\Gamma\Delta$ parallela ducatur AB . iam quoniam EZ diametrus est et rectam $\Gamma\Delta$ in duas partes aequales secat, etiam rectas ei parallelas in binas partes aequales secat [I def. 4]. itaque $AH = HB$. et quoniam est $\Gamma E = E\Delta$, et in triangulo sunt $\Gamma Z\Delta$, erit etiam $AH = HK$ [Eucl. VI, 4]. quare etiam $HK = HB$; quod fieri non potest. ergo EZ diametrus non erit.

XXXIX.


Si duae rectae concurrentes oppositas contingunt, recta per centrum punctumque concursus contingentium ducta rectam puncta contactus coniungentem in duas partes aequales secat.

ἐπεξεύχθω ἡ $\Gamma\Delta$, καὶ διάμετρος ἡχθω ἡ EZ . λέγω,
ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΓZ τῇ $Z\Delta$.

εἰ γὰρ μή, τετμήσθω ἡ $\Gamma\Delta$ δίχα κατὰ τὸ H , καὶ
ἐπεξεύχθω ἡ HE . ἡ HE ἄρα διάμετρος ἐστίν. ἐστὶ
5 δὲ καὶ ἡ EZ κέντρον ἄρα ἐστὶ τὸ E . ἡ ἄρα σύμ-
πτωσις τῶν ἐφαπτομένων ἐπὶ τοῦ κέντρου ἐστὶ τῶν
τομῶν· ὅπερ ἄτοπον. οὐκ ἄρα ἄνισός ἐστὶν ἡ ΓZ
τῇ $Z\Delta$. ἴση ἄρα.

μ'.


10 Ἐὰν τῶν ἀντικειμένων δύο εὐθεῖαι ἐφαπτόμεναι
συμπίπτωσι, καὶ διὰ τῆς συμπτώσεως εὐθεῖα ἀχθῇ
παρὰ τὴν τὰς ἀφὰς ἐπιξενυνούσαν συμπίπτουσα ταῖς
τομαῖς, αἱ ἀπὸ τῶν συμπτώσεων ἀγόμεναι ἐπὶ μέσῃν
τὴν τὰς ἀφὰς ἐπιξενυνούσαν ἐφάπτονται τῶν τομῶν.
15 ἔστωσαν ἀντικείμεναι τομαὶ αἱ A, B , καὶ τῶν A, B
δύο εὐθεῖαι ἡχθῶσαν ἐφαπτόμεναι αἱ $\Gamma E, E\Delta$, καὶ
ἐπεξεύχθω ἡ $\Gamma\Delta$, καὶ
διὰ τοῦ E τῇ $\Gamma\Delta$ παρ-
ἀλληλος ἡχθω ἡ ZEH ,
20 καὶ τετμήσθω ἡ $\Gamma\Delta$
δίχα κατὰ τὸ Θ , καὶ ἐπε-
ξεύχθωσαν αἱ $Z\Theta, \Theta H$.
λέγω, ὅτι αἱ $Z\Theta, \Theta H$
ἐφάπτονται τῶν τομῶν.



25 ἐπεξεύχθω ἡ $E\Theta$. διάμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ $E\Theta$ ὀρθία,
πλαγία δὲ συζυγὴς αὐτῇ ἡ διὰ τοῦ κέντρου τῇ $\Gamma\Delta$
παράλληλος ἀγομένη. εἰλήφθω τὸ κέντρον τὸ X , καὶ

4. ἡ HE] om. V; corr. p. 7. οὐκ ἄρα ἄνισός] addidi;
om. V. 14. ἐφάπτονται V; corr. pc. 24. ἐφάπτονται V;
infra ω macula est (o?); corr. p.

sint A, B sectiones oppositae, sectionesque A, B contingentes duae rectae ducantur $\Gamma E, E\Delta$, ducaturque $\Gamma\Delta$, et diameter ducatur EZ . dico, esse $\Gamma Z = Z\Delta$.



nam si minus, $\Gamma\Delta$ in H in duas partes aequales secetur, ducaturque HE ; HE igitur diameter est [prop. XXXVIII]. uerum etiam EZ

diameter est; centrum igitur est E . itaque concursus contingentium in centro est sectionum; quod absurdum est [prop. XXXII]. itaque $\Gamma Z, Z\Delta$ inaequales non sunt. ergo $\Gamma Z = Z\Delta$.

XL.

Si duae rectae oppositae contingentes concurrunt, et per punctum concursus recta ducitur rectae puncta contactus coniungenti parallela cum sectionibus concurrens, rectae a punctis concursus ad mediam rectam puncta contactus coniungentem ductae sectiones contingunt.

sint A, B sectiones oppositae, ducanturque duae rectae sectiones A, B contingentes $\Gamma E, E\Delta$, et ducatur $\Gamma\Delta$, per E autem rectae $\Gamma\Delta$ parallela ducatur ZEH , et $\Gamma\Delta$ in Θ in duas partes aequales secetur, ducanturque $Z\Theta, \Theta H$. dico, rectas $Z\Theta, \Theta H$ sectiones contingere.

ducatur $E\Theta$; $E\Theta$ igitur diameter est recta, transversa autem cum ea coniugata recta est per centrum rectae $\Gamma\Delta$ parallela ducta [prop. XXXVIII]. sumatur centrum X , et rectae $\Gamma\Delta$ parallela ducatur AXB . itaque ΘE ,

τῇ ΓA παράλληλος ἤχθω ἡ AXB . αἱ ΘE , AB ἄρα
 συζυγεῖς εἰσι διάμετροι. καὶ τεταγμένως ἤκται ἡ $\Gamma\Theta$
 ἐπὶ τὴν δευτέραν διάμετρον, ἐφαπτομένη δὲ τῆς τομῆς
 ἡ ΓE συμπίπτουσα τῇ δευτέρᾳ διαμέτρῳ. τὸ ἄρα
 5 ὑπὸ $EX\Theta$ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς δευτέρας
 διαμέτρου, τουτέστι τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ παρὰ τὴν
 AB εἵδους. καὶ ἐπεὶ τεταγμένως μὲν ἤκται ἡ ZE ,
 ἐπέξευκται δὲ ἡ $Z\Theta$, διὰ τουτο ἐφάπτεται ἡ $Z\Theta$ τῆς
 A τομῆς. ὁμοίως δὲ καὶ ἡ $H\Theta$ ἐφάπτεται τῆς B
 10 τομῆς. αἱ $Z\Theta$, ΘH ἄρα ἐφάπτονται τῶν A , B τομῶν.

μα'.

Ἐὰν ἐν ταῖς ἀντικειμέναις δύο εὐθεῖαι τέμνωσιν
 ἀλλήλας μὴ διὰ τοῦ κέντρου, οὐ τέμνουσιν ἀλλή-
 λας δίχα.

15 ἔστωσαν ἀντικείμεναι τομαὶ αἱ A , B , καὶ ἐν ταῖς
 A , B δύο εὐθεῖαι τεμνέτωσαν ἀλλήλας αἱ ΓB , $A\Delta$
 κατὰ τὸ E μὴ διὰ τοῦ κέντρου οὔσαι. λέγω, ὅτι οὐ
 τέμνουσιν ἀλλήλας δίχα.

εἰ γὰρ δυνατόν, τεμνέτωσαν, καὶ τὸ κέντρον τῶν
 20 τομῶν ἔστω τὸ X , καὶ ἐπεξέυχθω ἡ EX . διάμετρος ἄρα
 ἐστὶν ἡ EX . ἤχθω διὰ τοῦ X τῇ $B\Gamma$ παράλληλος ἡ XZ .
 ἡ XZ ἄρα διάμετρος ἐστὶ καὶ συζυγὴς τῇ EX . ἡ ἄρα
 κατὰ τὸ Z ἐφαπτομένη παράλληλός ἐστὶ τῇ EX . κατὰ
 τὰ αὐτὰ δὲ παραλλήλου ἀχθείσης τῆς ΘK τῇ $A\Delta$ ἡ κατὰ
 25 τὸ Θ ἐφαπτομένη παράλληλός ἐστὶ τῇ EX . ὥστε καὶ ἡ
 κατὰ τὸ Z ἐφαπτομένη παράλληλός ἐστὶ τῇ κατὰ τὸ
 Θ ἐφαπτομένῃ. ὅπερ ἄτοπον. ἐδείχθη γὰρ καὶ συμ-

1. AXB] XAB V; corr. p. 7. ἐπεὶ] p, ἐπὶ V. 16.
 ἀλλήλαις V; corr. p.


AB diametri sunt coniugatae. et $\Gamma\Theta$ ad diametrum secundam ordinate ducta est, sectionem contingens autem ΓE cum secunda diametro concurrens; itaque [I, 38] rectangulum $EX \times X\Theta$ aequale est quadrato dimidia secunda diametri, hoc est quartae parti figurae ad AB adplicatae [I def. alt. 3]. et quoniam ZE ordinate ducta est, et ducta est $Z\Theta$, propterea $Z\Theta$ sectionem A contingit [I, 38]. eadem de causa etiam $H\Theta$ sectionem B contingit. ergo $Z\Theta$, ΘH sectiones A , B contingunt.

XLI.

Si in oppositis duae rectae inter se secant non per centrum ductae, in binas partes aequales inter se non secant.

sint A , B sectiones oppositae, et in A , B duae rectae ΓB , $A\Delta$ non per centrum ductae in E inter se secant. dico, eas in binas partes aequales inter se non secare.

nam si fieri potest, secant, centrum autem sectionum sit X , et ducatur EX ; EX igitur diametrus



est [prop. XXXVII]. ducatur per X rectae $B\Gamma$ parallela XZ ; XZ igitur diametrus est et cum EX coniugata [ibid.]. itaque recta in Z contingens rectae

EX parallela est [I def. 6]. iam eadem de causa ducta ΘK rectae $A\Delta$ parallela recta in Θ contingens rectae EX parallela est; quare etiam recta in Z contingens rectae in Θ contingenti parallela est [Eucl. I, 30];

πίπτουσα. οὐκ ἄρα αἱ ΓB , $A\Delta$ μὴ διὰ τοῦ κέντρου οὐσαι τέμνουσι ἀλλήλας δίχα.

μβ'.

Ἐὰν ἐν ταῖς κατὰ συζυγίαν ἀντικειμέναις δύο εὐ-
5 θείαι τέμνωσιν ἀλλήλας μὴ διὰ τοῦ κέντρου οὐσαι,
οὐ τέμνουσιν ἀλλήλας δίχα.

ἔστωσαν κατὰ συζυγίαν ἀντικείμεναι τομαὶ αἱ
 A , B , Γ , Δ , καὶ ἐν ταῖς A , B , Γ , Δ τομαῖς δύο εὐ-

10 EZ , $H\Theta$ κατὰ τὸ K μὴ διὰ
τοῦ κέντρου οὐσαι. λέγω, ὅτι
οὐ τέμνουσιν ἀλλήλας δίχα.


εἰ γὰρ δυνατόν, τέμνέτωσαν,
καὶ το κέντρον τῶν τομῶν ἔστω

15 τὸ X , καὶ τῇ μὲν EZ ἥχθω
παράλληλος ἡ AB , τῇ δὲ ΘH

ἡ $\Gamma\Delta$, καὶ ἐπεξέχθω ἡ KX . αἱ KX , AB ἄρα συ-
ζυγεῖς εἰσι διάμετροι. ὁμοίως καὶ αἱ XK , $\Gamma\Delta$ συζυγεῖς
εἰσι διάμετροι. ὥστε καὶ ἡ κατὰ τὸ A ἐφαπτομένη τῇ
20 κατὰ τὸ Γ ἐφαπτομένη παράλληλός ἐστιν. ὅπερ ἀδύ-
νατον· συμπίπτει γάρ, ἐπειδὴ ἡ μὲν κατὰ τὸ Γ ἐφ-
απτομένη τέμνει τὰς A , B τομάς, ἡ δὲ κατὰ τὸ A
τὰς Δ , Γ , καὶ φανερόν, ὅτι ἡ σύμπτωσης αὐτῶν ἐν τῷ
ὑπὸ τὴν $AX\Gamma$ γωνίαν τόπων ἐστίν. οὐκ ἄρα αἱ EZ ,
25 $H\Theta$ μὴ διὰ τοῦ κέντρου οὐσαι τέμνουσιν ἀλλήλας δίχα.

μγ'.

Ἐὰν μίαν τῶν κατὰ συζυγίαν ἀντικειμένων εὐθεΐα
τέμνη κατὰ δύο σημεία, διὰ δὲ τοῦ κέντρου ἡ μὲν



10. τό] τοῦ V; corr. p. 25. δίχα] om. V; corr. p.

quod absurdum est; nam demonstrāuimus [prop. XXXI], easdem concurrere. ergo ΓB , $A\Delta$ per centrum non ductae in binas partes aequales inter se non secant.

XLII.

Si in oppositis coniugatis duae rectae inter se secant non per centrum ductae, in binas partes aequales inter se non secant.

sint A , B , Γ , Δ sectiones oppositae coniugatae, et in sectionibus A , B , Γ , Δ duae rectae EZ , $H\Theta$ non per centrum ductae in K inter se secent. dico, eas in binas partes aequales inter se non secare.


nam si fieri potest, secent, centrum autem sectionum sit X , et ducatur rectae EZ parallela AB , rectae ΘH autem parallela $\Gamma\Delta$, ducaturque KX ; KX et AB igitur diametri sunt coniugatae [prop. XXXVII]. eadem de causa etiam XK et $\Gamma\Delta$ diametri sunt coniugatae. quare etiam recta in A contingens rectae in Γ contingenti parallela est [I def. 6; Eucl. I, 30]; quod fieri non potest; concurrunt enim, quoniam recta in Γ contingens sectiones A , B secat, recta autem in A contingens sectiones Δ , Γ [prop. XIX], et manifestum est, punctum concursus earum in spatio sub angulo $AX\Gamma$ posito esse [prop. XXI]. ergo EZ , $H\Theta$ non per centrum ductae in binas partes aequales inter se non secant.

XLIII.

Si recta unam oppositarum coniugarum in duobus punctis secat, per centrum autem recta ad mediam secantem ducitur, alia autem secanti parallela, hae diametri coniugatae oppositarum erunt.

ἐπὶ μέσῃ τὴν τέμνουσαν ἀχθῇ, ἣ δὲ παρὰ τὴν τέμνουσαν, συζυγεῖς ἔσονται διάμετροι τῶν ἀντικειμένων.

ἔστωσαν κατὰ συζυγίαν ἀντικείμεναι τομαὶ αἱ A, B, Γ, Δ , καὶ τεμνέτω τὴν A εὐθεΐά τις κατὰ δύο
 5 σημεία τὰ E, Z , καὶ τετμήσθω δίχα ἡ ZE τῷ H , καὶ ἔστω κέντρον τὸ X , καὶ ἐπε-
 ζεύχθω ἡ XH , παράλληλος δὲ ἡχθῶ τῇ EZ ἡ ΓX . λέγω, ὅτι αἱ $AX, X\Gamma$ συζυγεῖς εἰσι διά-
 10 μετροι.



ἐπεὶ γὰρ διάμετρος ἡ AX , καὶ τὴν EZ δίχα τέμνει, ἡ κατὰ τὸ A ἐφαπτομένη παράλληλός ἐστι τῇ EZ . ὥστε καὶ τῇ ΓX . ἐπεὶ οὖν ἀντικείμεναί εἰσι τομαί, καὶ
 15 μιᾶς αὐτῶν τῆς A ἡκται ἐφαπτομένη κατὰ τὸ A , ἀπὸ δὲ τοῦ κέντρου τοῦ X ἡ μὲν ἐπὶ τὴν ἀφὴν ἐπιζεύγνυται ἡ XA , ἡ δὲ παρὰ τὴν ἐφαπτομένην ἡκται ἡ ΓX , αἱ $XA, \Gamma X$ ἄρα συζυγεῖς εἰσι διάμετροι· τοῦτο γὰρ προδεδεικται.

μδ'.

20

Τῆς δοθείσης κώνου τομῆς τὴν διάμετρον εὗρεῖν.

ἔστω ἡ δοθεῖσα κώνου τομή, ἐφ' ἧς τὰ A, B, Γ, Δ, E σημεία. δεῖ δὴ αὐτῆς τὴν διάμετρον εὗρεῖν.

γεγονέτω, καὶ ἔστω ἡ $\Gamma\Theta$. ἀχθειςῶν δὲ τεταγ-
 25 μένωσ τῶν $\Delta Z, E\Theta$ καὶ ἐκβληθειςῶν ἔσται ἴση ἡ μὲν ΔZ τῇ ZB , ἡ δὲ $E\Theta$ τῇ ΘA . ἐὰν οὖν τάξωμεν τὰς $B\Delta, EA$ θέσει οὐσας παραλλήλους, ἔσται δοθέντα τὰ Θ, Z σημεία. ὥστε θέσει ἔσται ἡ $\Theta Z\Gamma$.

6. ἔστω] τό V; corr. p (ἔστω τῶν τομῶν τό). 18. XA] ΓA V; corr. Halley; AX p, Comm. 22. E] om. V; corr. Comm.


sint A, B, Γ, Δ sectiones oppositae coniugatae, et recta aliqua sectionem A in duobus punctis E, Z secet, seceturque EZ in H in duas partes aequales, centrum autem sit X , et ducatur XH , rectae autem EZ parallela ducatur ΓX . dico, rectas $AX, X\Gamma$ diametros coniugatas esse.

nam quoniam AX diametrus est et rectam EZ in duas partes aequales secat, recta in A contingens rectae EZ parallela est [prop. V]; quare etiam rectae ΓX [Eucl. I, 30]. quoniam igitur sectiones oppositae sunt, et unam earum A in A contingens ducta est recta, a centro autem X ad punctum contactus ducta est XA , contingenti autem parallela ducta est ΓX , rectae $XA, \Gamma X$ diametri coniugatae sunt; hoc enim antea demonstratum est [prop. XX].

XLIV.

Datae coni sectionis diametrum inuenire.

sit data sectio coni, in qua sunt puncta A, B, Γ, Δ, E . oportet igitur diametrum eius inuenire.



factum sit, sitque $\Gamma\Theta$. itaque rectis $\Delta Z, E\Theta$ ordinate ductis productisque erit $\Delta Z = ZB, E\Theta = \Theta A$ [I def. 4]. itaque si rectas $B\Delta, EA$, quae parallelae sunt, positione fixerimus, data erunt puncta Θ, Z . ergo $\Theta Z\Gamma$ positione data erit.

componetur hoc modo: sit data coni sectio, in qua sunt puncta A, B, Γ, Δ, E , et parallelae ducantur rectae $B\Delta, AE$ secenturque

συντεθίσεται δὴ οὕτως· ἔστω ἡ δοθεῖσα κώνου
τομῇ, ἐφ' ἧς τὰ A, B, Γ, Δ, E σημεία, καὶ ἡχθῶσαν
παράλληλοι αἱ $B\Delta, AE$ καὶ τεμνέσθωσαν δίχα κατὰ
τὰ Z, Θ . καὶ ἐπιξευχθεῖσα ἡ $Z\Theta$ διάμετρος ἔσται τῆς
5 τομῆς. τῷ δὲ αὐτῷ τρόπῳ καὶ ἀπείρους εὐρήσομεν
διαμέτρους.

με'.

Τῆς δοθείσης ἐλλείψεως ἡ ὑπερβολῆς τὸ κέντρον
εὐρεῖν.

10 τοῦτο δὲ φανερόν· ἐὰν γὰρ διαχθῶσι δύο διά-
μετροι τῆς τομῆς αἱ $AB, \Gamma\Delta$, καθ' ὃ τέμνουσιν ἀλ-
λήλας, ἔσται τῆς τομῆς τὸ κέντρον, ὥς ὑπόκειται.

μς'.

Τῆς δοθείσης κώνου τομῆς τὸν ἄξονα εὐρεῖν.


15 ἔστω ἡ δοθεῖσα κώνου τομῇ πρότερον παραβολή,
ἐφ' ἧς τὰ Z, Γ, E . δεῖ δὴ αὐτῆς τὸν ἄξονα εὐρεῖν.
ἡχθῶ γὰρ αὐτῆς διάμετρος ἡ AB . εἰ μὲν οὖν ἡ
 AB ἄξων ἐστί, γεγονὸς ἂν εἴη τὸ ἐπιταχθέν· εἰ δὲ
οὐ, γεγυῖται, καὶ ἔστω ἄξων ὁ $\Gamma\Delta$. ὁ $\Gamma\Delta$ ἄρα ἄξων
20 παράλληλός ἐστι τῇ AB καὶ τὰς ἀγομένας ἐπ' αὐτὴν
καθέτους δίχα τέμνει. αἱ δὲ ἐπὶ τὴν $\Gamma\Delta$ κάθετοι
καὶ ἐπὶ τὴν AB κάθετοί εἰσιν· ὥστε ἡ $\Gamma\Delta$ τὰς ἐπὶ
τὴν AB κάθετους δίχα τέμνει. ἐὰν οὖν τάξω τὴν
 EZ κάθετον ἐπὶ τὴν AB , ἔσται θέσει, καὶ διὰ τοῦτο
25 ἴση ἐστὶν ἡ $E\Delta$ τῇ ΔZ . δοθέν ἄρα ἐστὶ τὸ Δ . διὰ
δεδομένου ἄρα τοῦ Δ παρὰ θέσει τὴν AB ἵκται ἡ
 $\Gamma\Delta$. θέσει ἄρα ἐστὶν ἡ $\Gamma\Delta$.

συντεθίσεται δὴ οὕτως· ἔστω ἡ δοθεῖσα παρα-

in binas partes aequales in Z , Θ . et ducta $Z\Theta$ diametrus sectionis erit [I def. 4]. eodem autem modo etiam innumerabiles diametros inueniemus.

XLV.

Datae ellipsis uel hyperbolae centrum inuenire.
hoc autem manifestum est. nam si duae diametri



sectionis ducuntur AB , $\Gamma\Delta$ [prop. XLIV], ubi inter se secant, centrum erit sectionis, ut infra descriptum est.

XLVI.


Datae conic sectionis axem inuenire.

sit data conic sectio prius parabola, in qua sunt Z , Γ , E . oportet igitur axem eius inuenire.

ducatur enim diametrus eius AB [prop. XLIV]. iam si AB axis est, factum erit propositum; sin minus, factum sit, et axis sit $\Gamma\Delta$; axis igitur $\Gamma\Delta$ rectae AB parallela est [I, 51 coroll.] et rectas ad eam perpendiculares ductas in binas partes aequales secat [I def. 7]. rectae autem ad $\Gamma\Delta$ perpendiculares etiam ad AB perpendiculares sunt; quare $\Gamma\Delta$ rectas ad AB perpendiculares in binas partes aequales secat. iam si fixero EZ ad AB perpendicularem, positione data

Figuras prop. XLV in prop. XLIV habet V; in prop. XLV mg. ἐγράφη τὸ σχῆμα ἄνω m. 1.

βολή, ἐφ' ἧς τὰ Z, E, A , καὶ ἡχθῶ αὐτῆς διάμετρος
 ἡ AB , καὶ ἐπ' αὐτὴν κάθετος ἡχθῶ ἡ BE καὶ ἐκ-
 βεβλήσθω ἐπὶ τὸ Z . εἰ μὲν οὖν ἴση ἐστὶν ἡ EB τῇ
 BZ , φανερόν, ὅτι ἡ AB ἄξων
 5 ἐστίν· εἰ δὲ οὐ, τεταμήσθω ἡ
 EZ δίχα τῷ Δ , καὶ τῇ AB
 παράλληλος ἡχθῶ ἡ $\Gamma\Delta$. φα-
 νερόν δὲ, ὅτι ἡ $\Gamma\Delta$ ἄξων ἐστὶ
 τῆς τομῆς· παράλληλος γὰρ
 10 οὖσα τῇ διαμέτρῳ, τουτέστι
 διάμετρος οὖσα, τὴν EZ δίχα
 τε καὶ πρὸς ὀρθὰς τέμνει. τῆς
 ἄρα δοθείσης παραβολῆς ὁ ἄξων ηὔρηται ὁ $\Gamma\Delta$.
 καὶ φανερόν, ὅτι εἰς ἄξων ἐστὶ τῆς παραβολῆς. εἰ
 15 γὰρ ἄλλος ἔσται ὥς ὁ AB , ἔσται τῇ $\Gamma\Delta$ παράλληλος.
 καὶ τὴν EZ τέμνει· ὥστε καὶ δίχα. ἴση ἄρα ἐστὶν
 ἡ BE τῇ BZ . ὅπερ ἄτοπον.



μζ'.

Τῆς δοθείσης ὑπερβολῆς ἢ ἐλλείψεως τὸν ἄξωνα
 20 εὕρεῖν.

ἔστω ὑπερβολῆς ἢ ἐλλείψεως ἡ $AB\Gamma$. δεῖ δὲ αὐτῆς
 τὸν ἄξωνα εὕρεῖν.

εὐρήσθω καὶ ἔστω ὁ $K\Delta$, κέντρον δὲ τῆς τομῆς
 τὸ K . ἡ ἄρα $K\Delta$ τὰς ἐπ' αὐτὴν τεταγμένως κατα-
 25 γομένας δίχα καὶ πρὸς ὀρθὰς τέμνει.

ἡχθῶ κάθετος ἡ $\Gamma\Delta A$, καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ $KA, K\Gamma$.
 ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ $\Gamma\Delta$ τῇ ΔA , ἴση ἄρα ἡ ΓK τῇ $K A$.

3. ἐπὶ] om. V; corr. p. 13. εὔρηται cp. 21. ἐλλείψης] c,
 ἐλείψης, supra scr. l m. 1, V. 23. $K\Delta$] $A\Delta$ V; corr. p. 26.
 KA] $K\Delta$ V; corr. p.

erit [Eucl. dat. 30], et ob causam, quam indicauimus, erit $EA = AZ$. quare A datum est. per datum igitur punctum A rectae AB positione datae parallela ducta est ΓA ; ergo ΓA positione data est [Eucl. dat. 28].

componetur hoc modo: sit data parabola, in qua sunt puncta Z, E, A , et eius diametrus ducatur AB [prop. XLIV], ad eamque perpendicularis ducatur BE et ad Z producat. iam si $EB = BZ$, manifestum est, AB axem esse [I def. 7]; sin minus, EZ in A in duas partes aequales secetur, et rectae AB parallela ducatur ΓA . manifestum igitur, ΓA axem esse sectionis. nam diametro parallela ducta, h. e. ipsa diametrus [I, 51 coroll.], rectam EZ et in duas partes aequales et ad angulos rectos secat [I def. 7]. ergo datae parabolae axis inuentus est ΓA .

et manifestum est, unum solum axem esse parabolae. nam si alius quoque erit ut AB , rectae ΓA parallela erit [I, 51 coroll.]. et rectam EZ secat; quare etiam in duas partes aequales eam secat [I def. 4]. itaque $BE = BZ$; quod absurdum est.

XLVII.

Datae hyperbolae uel ellipsis axem inuenire.


sit $AB\Gamma$ hyperbola uel ellipsis. oportet igitur axem eius inuenire.

inuentus sit et sit $K A$, centrum autem sectionis sit K ; itaque $K A$ rectas ad eam ordinate ductas in binas partes aequales et ad angulos rectos secat [I def. 7].

ducatur perpendicularis $\Gamma A A$, ducanturque $K A$, $K \Gamma$. iam quoniam est $\Gamma A = A A$, erit etiam $\Gamma K = K A$

ἐὰν οὖν τάξωμεν δοθέν τὸ Γ , ἔσται δοθεῖσα ἡ ΓK .
 ὥστε ὁ κέντρον τῷ K , διαστήματι δὲ τῷ $K\Gamma$ κύκλος
 γραφόμενος ἥξει καὶ διὰ τοῦ A καὶ ἔσται θέσει δε-
 δομένος. ἔστι δὲ καὶ ἡ $AB\Gamma$ τομὴ δοθεῖσα θέσει.
 5 δοθέν ἄρα τὸ A . ἔστι δὲ καὶ τὸ Γ δοθέν. θέσει
 ἄρα ἡ ΓA . καὶ ἐστὶν ἴση ἡ ΓA τῇ AA . δοθέν
 ἄρα τὸ A . ἀλλὰ καὶ τὸ K δοθέν. δοθεῖσα ἄρα τῇ
 θέσει ἡ AK .

συντεθήσεται δὴ οὕτως. ἔστω ἡ δοθεῖσα ὑπερ-
 10 βολὴ ἢ ἔλλειψις ἡ $AB\Gamma$, καὶ εἰλήφθω αὐτῆς κέντρον
 τὸ K . εἰλήφθω δὲ ἐπὶ τῆς τομῆς τυχὸν σημεῖον τὸ
 Γ , καὶ κέντρον τῷ K , δια-
 στήματι δὲ τῷ $K\Gamma$ κύκλος
 γεγράφθω ὁ ΓEA , καὶ
 15 ἐπεξεύχθω ἡ ΓA καὶ δίχα
 τετμήσθω κατὰ τὸ A , καὶ
 ἐπεξεύχθωσαν αἱ $K\Gamma, KA$,
 KA , καὶ διήχθω ἡ KA
 ἐπὶ τὸ B .



20 ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ AA τῇ AA , κοινὴ δὲ ἡ
 AK , δύο ἄρα αἱ ΓAK δύο ταῖς AAK ἴσαι εἰσὶ, καὶ
 βάσεις ἡ KA τῇ $K\Gamma$ ἴση. ἡ ἄρα KB τὴν $AA\Gamma$
 δίχα τε καὶ πρὸς ὀρθὰς τέμνει. ἄξων ἄρα ἐστὶν ἡ KA .
 ἦχθω διὰ τοῦ K τῇ ΓA παράλληλος ἡ MKN . ἡ
 25 ἄρα MN ἄξων ἐστὶ τῆς τομῆς συζυγῆς τῇ BK .


μη'.

Λεδειγμένων δὲ τούτων ἐξῆς ἔστω δεῖξαι, ὅτι ἄλ-
 λοι ἄξονες τῶν αὐτῶν τομῶν οὐκ εἰσὶν.

7. δοθεῖσα] om. V; corr. p (δοθέν om.). 9. δὴ] p, δέ V.
 17. KA] καὶ V; corr. p; del. Halley.

[Eucl. I, 4]. iam si Γ punctum datum fixerimus, data erit ΓK [Eucl. dat. 26]. quare circulus centro K , radio autem $K\Gamma$ descriptus etiam per A ueniet et positione datus erit [dat. def. 6]. uerum etiam sectio $AB\Gamma$ positione data est. itaque A datum est [dat. 25]. uerum etiam Γ datum est; itaque ΓA positione data est [dat. 26]. et $\Gamma A = AA$; itaque A datum est [dat. 7]. uerum etiam K datum est. ergo AK positione data est [dat. 26].

componetur hoc modo: sit data hyperbola uel ellipsis $AB\Gamma$, et sumatur centrum eius K [prop.



XLV]; sumatur autem in sectione punctum aliquod Γ , et centro K , radio autem $K\Gamma$ circulus describatur ΓEA , ducaturque ΓA et in A in duas partes aequales secetur, ducanturque $K\Gamma$,

KA , et KA ad B producat.

iam quoniam est $AA = A\Gamma$, et communis AK , erunt duae rectae ΓA , AK duabus AA , AK aequales, et basis KA basi $K\Gamma$ aequalis [Eucl. I, 4]. itaque $KB\Delta$ rectam $AA\Gamma$ et in duas partes aequales et ad rectos angulos secat. ergo KA axis est [I def. 7].

ducatur per K rectae ΓA parallela MKN ; itaque MN axis sectionis est cum BK coniugatus [I def. 8].

XLVIII.

Iam his demonstratis deinde sit demonstrandum, alios axes earundem sectionum non esse.


εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω καὶ ἕτερος ἄξων ὁ KH .
κατὰ τὰ αὐτὰ δὴ τοῖς ἔμπροσθεν ἀχθείσης καθέτου
τῆς $AΘ$ ἴση ἔσται ἡ $AΘ$ τῇ $ΘΑ$. ὥστε καὶ ἡ AK
τῇ KA . ἀλλὰ καὶ τῇ $KΓ$. ἴση ἔσται ἡ KA τῇ $KΓ$.
5 ὅπερ ἄτοπον.

ὅτι μὲν οὖν καὶ ὁ $ΑΕΓ$ κύκλος κατ' ἄλλο σημεῖον
μεταξὺ τῶν $A, B, Γ$ οὐ συμβάλλει τῇ τομῇ, ἐπὶ μὲν
τῆς ὑπερβολῆς φανερόν· ἐπὶ δὲ τῆς ἐλλείψεως κάθε-
τοι ἠχθῶσαν αἱ $ΓΡ, ΑΣ$. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ $KΓ$
10 τῇ KA · ἐκ κέντρου γάρ· ἴσον ἐστὶ καὶ τὸ ἀπὸ $ΓΚ$
τῷ ἀπὸ KA . ἀλλὰ τῷ μὲν ἀπὸ $ΓΚ$ ἴσα ἐστὶ τὰ ἀπὸ
 $ΓΡ, PK$, τῷ δὲ ἀπὸ AK ἴσα τὰ ἀπὸ $KΣ, ΣΑ$. τὰ
ἄρα ἀπὸ $ΓΡ, PK$ τοῖς ἀπὸ $ΑΣ, ΣΚ$ ἐστὶν ἴσα. ᾧ
ἄρα διαφέρει τὸ ἀπὸ $ΓΡ$ τοῦ ἀπὸ $ΑΣ$, τούτῳ δια-
15 φέρεται τὸ ἀπὸ $ΣΚ$ τοῦ ἀπὸ $KΡ$. πάλιν ἐπειδὴ τὸ
ὑπὸ MPN μετὰ τοῦ ἀπὸ PK ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ KM ,
ἔστι δὲ καὶ τὸ ὑπὸ $MΣN$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $ΣΚ$ ἴσον
τῷ ἀπὸ KM , τὸ ἄρα ὑπὸ MPN μετὰ τοῦ ἀπὸ PK
ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ $MΣN$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $ΣΚ$. ᾧ ἄρα
20 διαφέρει τὸ ἀπὸ $ΣΚ$ τοῦ ἀπὸ $KΡ$, τούτῳ διαφέρει
τὸ ὑπὸ MPN τοῦ ὑπὸ $MΣN$. ἐδείχθη δέ, ὅτι, ᾧ
διαφέρει τὸ ἀπὸ $ΣΚ$ τοῦ ἀπὸ $KΡ$, τούτῳ διαφέρει
τὸ ἀπὸ $ΓΡ$ τοῦ ἀπὸ $ΑΣ$. ᾧ ἄρα διαφέρει τὸ ἀπὸ
 $ΓΡ$ τοῦ ἀπὸ $ΑΣ$, τούτῳ διαφέρει τὸ ὑπὸ MPN τοῦ
25 ὑπὸ $MΣN$. καὶ ἐπεὶ κατηγμέναι εἶσιν αἱ $ΓΡ, ΑΣ$,
ἔστιν, ὥς τὸ ἀπὸ $ΓΡ$ πρὸς τὸ ὑπὸ MPN , τὸ ἀπὸ $ΑΣ$
πρὸς τὸ ὑπὸ $MΣN$. ἐδείχθη δὲ καὶ ἐν ἀμφοτέροις
ἡ αὐτὴ ὑπεροχή· ἴσον ἄρα τὸ μὲν ἀπὸ $ΓΡ$ τῷ ὑπὸ

2. τὰ] bis V; corr. cnp. 10. καί] pν, om. c, supra ser.
m. 1 V. 11. τῷ] (alt.) p c, corr. ex τό m. 1 V. 18. τῷ] p c,
corr. ex τό m. 1 V.

nam si fieri potest, etiam alius axis sit KH . eodem igitur modo, quo antea, ducta perpendiculari $A\Theta$ erit $A\Theta = \Theta A$ [I def. 4]; quare etiam $AK = KA$ [Eucl. I, 4]. uerum etiam $AK = K\Gamma$ [ibid.]. itaque etiam $KA = K\Gamma$; quod absurdum est.

iam circulum $AE\Gamma$ in alio puncto inter A, B, Γ cum sectione non concurrere, in hyperbola manifestum



est; in ellipsi autem perpendiculares ducantur ΓP , $A\Sigma$. quoniam igitur est $K\Gamma = KA$ (nam radii sunt), est etiam $\Gamma K^2 = KA^2$. est autem

$$\Gamma P^2 + PK^2 = \Gamma K^2$$

et $K\Sigma^2 + \Sigma A^2 = AK^2$ [Eucl. I, 47]. itaque

$$\Gamma P^2 + PK^2 = A\Sigma^2 + \Sigma K^2.$$

quare $\Gamma P^2 \div A\Sigma^2 = \Sigma K^2 \div KP^2$. rursus quoniam est $MP \times PN + PK^2 = KM^2$ [Eucl. II, 5], et etiam $M\Sigma \times \Sigma N + \Sigma K^2 = KM^2$ [ibid.], erit

$$MP \times PN + PK^2 = M\Sigma \times \Sigma N + \Sigma K^2.$$

itaque $\Sigma K^2 \div KP^2 = MP \times PN \div M\Sigma \times \Sigma N$. demonstrauius autem, esse

$$\Sigma K^2 \div KP^2 = \Gamma P^2 \div A\Sigma^2;$$

itaque $\Gamma P^2 \div A\Sigma^2 = MP \times PN \div M\Sigma \times \Sigma N$. et quoniam ΓP , $A\Sigma$ ordinate ductae sunt, erit

$$\Gamma P^2 : MP \times PN = A\Sigma^2 : M\Sigma \times \Sigma N$$
 [I, 21];

MPN , τὸ δὲ ἀπὸ $ΑΣ$ τῷ ὑπὸ $ΜΣΝ$. κύκλος ἄρα ἐστὶν ἡ $ΑΓΜ$ γραμμή· ὅπερ ἄτοπον· ὑπόκειται γὰρ ἑλλειψις.

μθ'.

5 Κώνου τομῆς δοθείσης καὶ σημείου μὴ ἐντὸς τῆς τομῆς ἀγαγεῖν ἀπὸ τοῦ σημείου εὐθεῖαν καθ' ἓν ἐπιψάφουσιν τῆς τομῆς.


ἔστω ἡ δοθεῖσα κώνου τομὴ πρότερον παραβολή, ἥς ἄξων ὁ $ΒΑ$. δεῖ δὴ ἀπὸ τοῦ δοθέντος σημείου, 10 ὃ μὴ ἐστὶν ἐντὸς τῆς τομῆς, ἀγαγεῖν εὐθεῖαν, ὡς πρόκειται.

τὸ δὴ δοθὲν σημεῖον ἦτοι ἐπὶ τῆς γραμμῆς ἐστὶν ἢ ἐπὶ τοῦ ἄξωνος ἢ ἐν τῷ λοιπῷ ἐκτὸς τόπῳ.

ἔστω οὖν ἐπὶ τῆς γραμμῆς, καὶ ἔστω τὸ $Α$, καὶ 15 γεγονέτω, καὶ ἔστω ἡ $ΑΕ$, καὶ κάθετος ἡχθῶ ἡ $ΑΔ$. ἔσται δὴ θέσει. καὶ ἴση ἐστὶν ἡ $ΒΕ$ τῇ $ΒΔ$. καὶ ἐστὶ δοθεῖσα ἡ $ΒΔ$. δοθεῖσα ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ $ΒΕ$. καὶ ἐστὶ τὸ $Β$ δοθέν· δοθὲν ἄρα καὶ τὸ $Ε$. 20 ἀλλὰ καὶ τὸ $Α$ · θέσει ἄρα ἡ $ΑΕ$.

συντεθήσεται δὴ οὕτως· ἡχθῶ ἀπὸ τοῦ $Α$ κάθετος ἡ $ΑΔ$, καὶ κείσθω τῇ $ΒΔ$ ἴση ἡ $ΒΕ$, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ $ΑΕ$. φανερόν δὴ, ὅτι ἐφάπτεται τῆς τομῆς.

25 ἔστω πάλιν τὸ δοθὲν σημεῖον ἐπὶ τοῦ ἄξωνος τὸ $Ε$, καὶ γεγονέτω, καὶ ἡχθῶ ἐφαπτομένη ἡ $ΑΕ$, καὶ κάθετος ἡχθῶ ἡ $ΑΔ$. ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ $ΒΕ$ τῇ $ΒΔ$. καὶ δοθεῖσα ἡ $ΒΕ$. δοθεῖσα ἄρα καὶ ἡ $ΒΔ$. καὶ ἐστὶ δοθὲν τὸ $Β$. δοθὲν ἄρα καὶ τὸ $Δ$. καὶ ἐστὶν ὁρθή



17. $ΒΔ$] (alt.) p, corr. ex $ΓΔ$ m. 2 v; $ΓΔ$ cv.

demonstrauimus autem, in utrisque etiam eandem differentiam esse; itaque erit [Eucl. V, 16, 17, 9] $\Gamma P^2 = MP \times PN$, $\Lambda \Sigma^2 = M\Sigma \times \Sigma N$. itaque linea $\Lambda \Gamma M$ circulus est [Eutocius ad I, 5]; quod absurdum est; supposuimus enim, ellipsim eam esse.

XLIX.

Data coni sectione et puncto non intra sectionem posito ab hoc puncto rectam ducere in uno puncto sectionem contingentem.

data sectio coni primum parabola sit, cuius axis sit $B\Delta$. oportet igitur a dato puncto intra sectionem non posito rectam ducere, ut propositum est.

punctum datum igitur aut in ipsa linea est aut in axe aut in reliquo spatio extra posito.

sit positum in linea ipsa sitque A , et factum sit, sitque AE , et ducatur perpendicularis $A\Delta$; positione igitur data erit [Eucl. dat. 30]. est autem $BE = B\Delta$ [I, 35]; et $B\Delta$ data est; itaque etiam BE data est. et B datum est; itaque etiam E datum est [dat. 27]. uerum etiam A datum est; itaque AE positione data est [dat. 26].

componetur hoc modo: ab A perpendicularis ducatur $A\Delta$, et ponatur $BE = B\Delta$, ducaturque AE . manifestum igitur, eam sectionem contingere [I, 35].

rursus datum punctum in axe sit E , et factum sit, et AE contingens ducta sit, et perpendicularis ducatur $A\Delta$. itaque $BE = B\Delta$ [I, 35]. et data est BE [dat. 26]; itaque etiam $B\Delta$ data est. et B datum est; itaque etiam Δ datum est [dat. 27]. et ΔA perpendicularis est; itaque ΔA positione data est

ἡ $\angle A$. θέσει ἄρα ἡ $\angle A$. δοθὲν ἄρα τὸ A . ἀλλὰ καὶ τὸ E . θέσει ἄρα ἡ AE .

συντεθήσεται δὴ οὕτως· κείσθω τῇ BE ἴση ἡ BA , καὶ ἀπὸ τοῦ A τῇ EA ὀρθὴ ἡ $\angle A$, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ AE . φανερόν δὴ, ὅτι ἐφάπτεται ἡ AE .

φανερόν δέ, ὅτι καὶ ἐὰν τὸ δοθὲν σημείον τὸ αὐτὸ ᾗ τῷ B , ὅτι ἡ ἀπὸ τοῦ B ὀρθὴ ἀγομένη ἐφάπτεται τῆς τομῆς.

ἔστω δὴ τὸ δοθὲν σημείον τὸ Γ , καὶ γερονέτω, 10 καὶ ἔστω ἡ ΓA , καὶ διὰ τοῦ Γ τῷ ἄξονι, τουτέστι τῇ BA , παράλληλος ἡχθῶ ἡ ΓZ . θέσει ἄρα ἐστὶν ἡ ΓZ . καὶ ἀπὸ τοῦ A ἐπὶ τὴν ΓZ τεταγμένως ἡχθῶ ἡ AZ . ἔσται δὴ ἴση ἡ ΓH τῇ ZH . καὶ ἐστὶ δοθὲν τὸ H . δοθὲν ἄρα καὶ τὸ Z . καὶ ἀνῆκται ἡ ZA 15 τεταγμένως, τουτέστι παράλληλος τῇ κατὰ τὸ H ἐφαπτομένη· θέσει ἄρα ἐστὶν ἡ ZA . δοθὲν ἄρα καὶ τὸ A . ἀλλὰ καὶ τὸ Γ . θέσει ἄρα ἐστὶν ἡ ΓA .

συντεθήσεται οὕτως· ἡχθῶ διὰ τοῦ Γ παράλληλος τῇ BA ἡ ΓZ , καὶ κείσθω τῇ ΓH ἡ ZH ἴση, καὶ τῇ 20 κατὰ τὸ H ἐφαπτομένη παράλληλος ἡχθῶ ἡ ZA , καὶ ἐπεξεύχθω ἡ AG . φανερόν δὴ, ὅτι ποιήσῃ τὸ πρόβλημα.

Ἔστω πάλιν ὑπερβολή, ἥς ἄξων ὁ $\angle B\Gamma$, κέντρον δὲ τὸ Θ , ἀσύμπτωτοι δὲ αἱ ΘE , ΘZ . τὸ δὴ διδόμενον σημείον ἥτοι ἐπὶ τῆς τομῆς δοθήσεται ἡ ἐπὶ τοῦ ἄξωνος 25 ἡ ἐντὸς τῆς ὑπὸ τῶν $E\Theta Z$ γωνίας ἡ ἐν τῷ ἐφεξῆς τόπῳ ἡ ἐπὶ μιᾷς τῶν ἀσυμπτῶτων τῶν περιεχουσῶν τὴν τομὴν ἡ ἐν τῷ μεταξὺ τῶν περιεχουσῶν τὴν κατὰ κορυφὴν τῆς ὑπὸ $Z\Theta E$ γωνίας.

6. ὅτι] del. Halley. τό] (pr.) addidi; om. V. 10. ἡ] p c, corr. ex n m. 1 V. 22. $\angle B\Gamma$] $B\Delta\Gamma$ V; corr. p. 23. δὴ] scripsi; δέ V p.

[dat. 29]. quare A datum est [dat. 25]. uerum etiam E datum est. ergo AE positione data est [dat. 26].

componetur hoc modo: ponatur $BA = BE$, et a A ad E perpendicularis erigatur AA , ducaturque AE . manifestum igitur, AE contingere [I, 35].


et manifestum est, etiam si datum punctum idem sit ac B , rectam a B perpendicularem ductam sectionem contingere [I, 17].

iam sit Γ punctum datum, et factum sit, sitque ΓA , per Γ autem axi, hoc est rectae BA , parallela ducatur ΓZ ; itaque ΓZ positione data est [dat. 28]. et ab A ad ΓZ ordinate ducatur AZ ; itaque erit [I, 35] $\Gamma H = ZH$. et H datum est [dat. 25]; itaque etiam Z datum est [dat. 27]. et ZA ordinate erecta est, hoc est rectae in H contingenti parallela; itaque ZA positione data est [dat. 28]. quare A datum est [dat. 25]. uerum etiam Γ datum est. ergo ΓA positione data est [dat. 26].

componetur hoc modo: per Γ rectae BA parallela ducatur ΓZ , et ponatur $ZH = \Gamma H$, rectaeque in H contingenti parallela ducatur ZA , ducaturque $A\Gamma$. manifestum igitur [I, 35], hanc problema effecturam esse.

Rursus sit hyperbola, cuius axis sit $AB\Gamma$, centrum autem Θ , asymptotae autem ΘE , ΘZ . datum igitur punctum aut in sectione dabitur aut in axe aut intra angulum $E\Theta Z$ aut in spatio deinceps posito aut in altera asymptotarum sectionem continentium aut in spatio inter rectas posito, quae angulum angulo $Z\Theta E$ ad uerticem positum continent.

ἔστω πρότερον ἐπὶ τῆς τομῆς ὡς τὸ A , καὶ γε-
 νέτω, καὶ ἔστω ἐφαπτομένη ἡ AH , καὶ ἤχθῃ κάθετος
 ἡ AA' , πλαγία δὲ τοῦ
 εἰδους πλευρὰ ἔστω ἡ
 5 $BΓ$. ἔσται δὴ, ὡς ἡ $ΓΔ$
 πρὸς $ΔB$, οὕτως ἡ $ΓH$
 πρὸς HB . λόγος δὲ τῆς
 $ΓΔ$ πρὸς $ΔB$ δοθείς· δο-
 θεῖσα γὰρ ἑκατέρα· λόγος
 10 ἄρα καὶ τῆς $ΓH$ πρὸς HB δοθείς. καὶ ἐστὶ δοθεῖσα
 ἡ $BΓ$. δοθέν ἄρα τὸ H . ἀλλὰ καὶ τὸ A . θέσει· ἄρα
 ἡ AH .



συντεθήσεται οὕτως· ἤχθῃ ἀπὸ τοῦ A κάθετος
 ἡ AA' , καὶ τῷ τῆς $ΓΔ$ πρὸς $ΔB$ λόγῳ ὁ αὐτὸς ἔστω
 15 ὁ τῆς $ΓH$ πρὸς HB , καὶ ἐπεζεύχθῃ ἡ AH . φανερόν
 δὴ, ὅτι ἡ AH ἐφάπτεται τῆς τομῆς.

πάλιν δὴ ἔστω τὸ δοθέν σημεῖον ἐπὶ τοῦ ἄξονος
 τὸ H , καὶ γεγονέτω, καὶ ἤχθῃ ἡ AH ἐφαπτομένη, καὶ
 κάθετος ἤχθῃ ἡ AA' . κατὰ τὰ αὐτὰ δὴ ἔσται, ὡς ἡ
 20 $ΓH$ πρὸς HB , οὕτως ἡ $ΓΔ$ πρὸς $ΔB$. καὶ ἐστὶ δο-
 θεῖσα ἡ $BΓ$. δοθέν ἄρα τὸ $Δ$. καὶ ἐστὶν ὀρθὴ ἡ
 $ΔA$. θέσει ἄρα ἐστὶν ἡ $ΔA$. θέσει δὲ καὶ ἡ τομὴ·
 δοθέν ἄρα τὸ A . ἀλλὰ καὶ τὸ H . θέσει ἄρα ἐστὶν ἡ AH .

συντεθήσεται δὴ οὕτως· ὑποκείσθω τὰ μὲν ἄλλα
 25 τὰ αὐτὰ, καὶ τῷ τῆς $ΓH$ πρὸς HB λόγῳ ὁ αὐτὸς
 πεποιήσθω ὁ τῆς $ΓΔ$ πρὸς $ΔB$, καὶ ὀρθὴ ἤχθῃ ἡ $ΔA$,
 καὶ ἐπεζεύχθῃ ἡ AH . φανερόν δὴ, ὅτι ἡ AH ποιεῖ τὸ
 πρόβλημα, καὶ ὅτι ἀπὸ τοῦ H ἀχθήσεται ἑτέρα ἐφαπ-
 τομένη τῆς τομῆς ἐπὶ τὰ ἕτερα μέρη.

8. $ΔB$] AB V; corr. p. 21. $BΓ$] $BΓΔ$ V; corr. Halley
 ($ΓB$). 24. δὴ] δέ Halley.

primum in sectione sit ut A , et factum sit, sitque contingens AH , et perpendicularis ducatur AA , transversum autem figurae latus sit $B\Gamma$. erit igitur [I, 36] $\Gamma A : AB = \Gamma H : HB$. uerum ratio $\Gamma A : AB$ data est [dat. 1]; nam utraque data est; itaque etiam ratio $\Gamma H : HB$ data est. et $B\Gamma$ data est; itaque H datum est [dat. 7]. uerum etiam A datum est; ergo AH positione data est [dat. 26].

componetur hoc modo: ab A perpendicularis ducatur AA , sitque $\Gamma H : HB = \Gamma A : AB$, et ducatur AH . manifestum igitur [I, 34], rectam AH sectionem contingere.

iam rursus in axe sit datum punctum H , et factum sit, et AH contingens ducta sit, ducaturque perpendicularis AA . eadem igitur de causa [I, 36] erit $\Gamma H : HB = \Gamma A : AB$. et $B\Gamma$ data est; itaque A datum est [dat. 7]. et AA perpendicularis erecta est; itaque AA positione data est [dat. 29]. uerum etiam sectio positione data est; itaque A datum est [dat. 25]. uerum etiam H ; ergo AH positione data est [dat. 26].

componetur hoc modo: supponantur cetera eadem, et fiat $\Gamma A : AB = \Gamma H : HB$, perpendicularisque erigatur AA , et ducatur AH . manifestum igitur, rectam AH problema efficere [I, 34], et ab H aliam rectam sectionem contingentem ad alteram partem duci posse.

iisdem suppositis datum punctum K in spatio intra angulum $E\Theta Z$ posito sit, et oporteat a K rectam ducere sectionem contingentem. factum sit, sitque KA , et ducta $K\Theta$ producat, ponatur-

τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων ἔστω τὸ δοθὲν σημεῖον
 ἐν τῷ ἐντὸς τῆς ὑπὸ τῶν $EΘZ$ γωνίας τόπω τὸ K ,
 καὶ δέον ἔστω ἀπὸ τοῦ K ἀγαγεῖν ἐφαπτομένην τῆς
 τομῆς. γεγυμένω, καὶ ἔστω ἡ KA , καὶ ἐπιζευχθεῖσα
 5 ἡ $KΘ$ ἐκβεβλήσθω, καὶ κείσθω τῇ $ΑΘ$ ἴση ἡ $ΘN$.
 πάντα ἄρα δοθέντα. ἔσται δὴ καὶ ἡ AN δοθεῖσα.
 ἦχθω δὴ τεταγμένως ἡ AM ἐπὶ τὴν MN . ἔσται δὴ
 καί, ὥς ἡ NK πρὸς KA , οὕτως ἡ MN πρὸς MA .
 λόγος δὲ τῆς NK πρὸς KA δοθείς· λόγος ἄρα καὶ
 10 τῆς NM πρὸς MA δοθείς. καὶ ἔστι δοθὲν τὸ A .
 δοθὲν ἄρα καὶ τὸ M . καὶ [παρατεταγμένως] ἀνήκται
 ἡ MA τῇ κατὰ τὸ A ἐφαπτομένῃ παράλληλος· θέσει
 ἄρα ἐστὶν ἡ MA . θέσει δὲ καὶ ἡ AB τομή· δοθὲν
 ἄρα τὸ A . ἀλλὰ καὶ τὸ K δοθέν· δοθεῖσα ἄρα ἡ AK .
 15 συντεθήσεται δὴ οὕτως· ὑποκείσθω τὰ μὲν ἄλλα
 τὰ αὐτὰ καὶ τὸ δοθὲν σημεῖον τὸ K , καὶ ἐπιζευχθεῖσα
 ἡ $KΘ$ ἐκβεβλήσθω, καὶ τῇ $ΘA$ ἴση κείσθω ἡ $ΘN$,
 καὶ πεποιήσθω ὥς ἡ NK πρὸς KA , οὕτως ἡ NM
 πρὸς MA , καὶ τῇ κατὰ τὸ A ἐφαπτομένῃ παράλληλος
 20 ἦχθω ἡ MA , καὶ ἐπεζεύχθω ἡ KA . ἡ KA ἄρα ἐφάπ-
 τεταται τῆς τομῆς.
 καὶ φανερόν, ὅτι καὶ ἑτέρα ἀχθήσεται ἀπὸ τοῦ K
 ἐφαπτομένη τῆς τομῆς ἐπὶ τὰ ἕτερα μέρη.
 τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων ἔστω τὸ δοθὲν σημεῖον
 25 ἐπὶ μιᾷ τῶν ἀσυμπτῶτων τῶν περιεχουσῶν τὴν τομὴν
 τὸ Z , καὶ δέον ἔστω ἀγαγεῖν ἀπὸ τοῦ Z ἐφαπτομένην
 τῆς τομῆς. καὶ γεγυμένω, καὶ ἔστω ἡ ZAE , καὶ διὰ

2. ἐν τῷ] om. V; corr. p (ἐντός om.). 9. καὶ τῆς] bis V (in extr. et init. uers.); corr. p v c. 10. MA] MA V; corr. p.


11. παρατεταγμένως] deleo. 15. δὴ] p, δέ V, Halley. 17. καὶ — κείσθω] om. V; ego addidi praeaeuntibus Memo et Halleio.

que $\Theta N = A\Theta$; itaque omnia data erunt. quare etiam AN data erit. iam ordinate ducatur AM ad MN ; erit igitur etiam $NK:KA = MN:MA$ [I, 36]. uerum ratio $NK:KA$ data est [dat. 1]; itaque etiam ratio $NM:MA$ data est. et A datum est [dat. 25]; itaque etiam M datum est [dat. 27]. et MA rectae in A contingenti parallela ducta est; itaque positione data est MA [dat. 28]. uerum etiam sectio AAB positione data est; itaque A datum est [dat. 25]. uerum etiam K datum est; ergo AK data est [dat. 26].

componetur hoc modo: supponantur cetera eadem et datum punctum K , et ducta $K\Theta$ producat, ponaturque $\Theta N = \Theta A$, et fiat $NK:KA = NM:MA$, rectaeque in A contingenti parallela ducatur MA , ducaturque KA . ergo KA sectionem contingit [I, 34].

et manifestum est, etiam aliam rectam a K sectionem contingentem ad alteram partem duci posse.

iisdem suppositis datum punctum Z in altera asymptotarum sit, quae sectionem continent, et oporteat



a Z rectam sectionem contingentem ducere. et sit factum, sitque ZA , et per A rectae $E\Theta$ parallela ducatur AA . erit igitur $\angle\Theta = \angle Z$ [Eucl. VI, 2], quoniam etiam

$$ZA = AE \text{ [prop. III].}$$

et $Z\Theta$ data est; itaque $\angle$ datum est [dat. 7]. et per datum punctum $\angle$ rectae $E\Theta$ positione datae parallela ducta est $\angle A$; itaque $\angle A$ positione data est [dat. 28]. uerum etiam sectio

τοῦ A τῇ $E\Theta$ παράλληλος ἤχθω ἡ AA' . ἔσται δὲ ἴση ἡ $\Delta\Theta$ τῇ ΔZ , ἐπεὶ καὶ ἡ ZA τῇ AE ἴση ἐστί. καὶ ἐστὶ δοθεῖσα ἡ $Z\Theta$. δοθὲν ἄρα τὸ Δ . καὶ διὰ δεδομένου τοῦ Δ παρὰ θέσει τὴν $E\Theta$ παράλληλος ἡκται ἡ AA' . θέσει ἄρα ἐστὶν ἡ AA' . θέσει δὲ καὶ ἡ τομὴ· δοθὲν ἄρα τὸ A . ἀλλὰ καὶ τὸ Z . θέσει ἄρα ἡ ZAE .

συντεθήσεται δὲ οὕτως· ἔστω ἡ τομὴ ἡ AB , καὶ αὐτὴ $E\Theta$, ΘZ ἀσύμπτωτοι, καὶ τὸ δοθὲν σημεῖον ἐπὶ 10 μιᾷ τῶν ἀσυμπτῶτων τῶν περιεχουσῶν τὴν τομὴν τὸ Z , καὶ τετμήσθω ἡ $Z\Theta$ δίχα κατὰ τὸ Δ , καὶ διὰ τοῦ Δ τῇ ΘE παράλληλος ἤχθω ἡ AA' , καὶ ἐπεξεύχθω ἡ ZA . καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ZA τῇ $\Delta\Theta$, ἴση ἄρα καὶ ἡ ZA τῇ AE . ὥστε διὰ τὰ προοδευγμένα ἡ ZAE 15 ἐφάπτεται τῆς τομῆς.


τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων ἔστω τὸ δοθὲν σημεῖον ἐν τῷ ὑπὸ τὴν γωνίαν τὴν ἐξῆς τόπῳ τῶν περιεχουσῶν τὴν τομὴν, καὶ ἔστω τὸ K . δεῖ δὲ ἀπὸ τοῦ K ἀγαγεῖν ἐφαπτομένην τῆς τομῆς. καὶ γερονέτω, καὶ 20 ἔστω ἡ KA , καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ $K\Theta$ ἐκβεβλήσθω· ἔσται δὲ θέσει. ἐὰν δὲ ἐπὶ τῆς τομῆς ληφθῇ δοθὲν σημεῖον τὸ Γ , καὶ διὰ τοῦ Γ τῇ $K\Theta$ παράλληλος ἀχθῇ ἡ $\Gamma\Delta$, ἔσται θέσει. καὶ ἐὰν τμηθῇ ἡ $\Gamma\Delta$ δίχα κατὰ τὸ E , καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΘE ἐκβληθῇ, ἔσται 25 θέσει διάμετρος οὕσα συζυγῆς τῇ $K\Theta$. κείσθω δὲ τῇ $B\Theta$ ἴση ἡ ΘH , καὶ διὰ τοῦ A τῇ $B\Theta$ παράλληλος ἤχθω ἡ AA' . ἔσται δὲ διὰ τὸ εἶναι τὰς KA , BH συζυγεῖς διαμέτρους καὶ ἐφαπτομένην τὴν AK καὶ τὴν AA' ἀχθεῖσαν παρὰ τὴν BH τὸ ὑπὸ τῶν $K\Theta A$

8. δὴ] p, δέ V. 10. τῶν] (alt.) καὶ Vp; corr. Comm. 14. ZAE] scripsi, ZA Vp. 24. ΘE] ΘEA V; corr. Memus; ΘEB c, EB p.

positione data est; quare A datum est [dat. 25]. uerum etiam Z datum est; ergo positione data est ZAE [dat. 26].

componetur hoc modo: sit AB sectio, et $E\Theta$, ΘZ asymptotae, et datum punctum Z in altera asymptotarum sectionem continentium positum, seceturque in A in duas partes aequales $Z\Theta$, et per A rectae ΘE parallela ducatur AA , ducaturque ZA . et quoniam est $Z\Theta = \Theta A$, erit etiam $ZA = AE$ [Eucl. VI, 2]. ergo propter ea, quae supra demonstraui[mus] [prop. IX], ZAE sectionem contingit.

iisdem suppositis datum punctum in spatio sub angulo posito, qui deinceps est rectis sectionem continentibus, positum sit, et sit K .



oportet igitur a K rectam sectionem contingentem ducere. et factum sit, sitque KA , et ducta $K\Theta$ producat; itaque positione data erit [dat. 26]. si igitur in sectione

datum punctum Γ sumitur, et per Γ rectae $K\Theta$ parallela ducitur ΓA , positione data erit [dat. 28]. et si ΓA in E in duas partes aequales secatur, ductaque ΘE producit, positione data erit [dat. 7, 26], et diameter erit cum $K\Theta$ coniugata [I def. 6]. ponatur igitur $\Theta H = B\Theta$, et per A rectae $B\Theta$ parallela ducatur AA . itaque quoniam KA , BH diametri coniugatae sunt, et AK contingens, AA autem rectae BH parallela, erit [I, 38; deff. alt. 3] $K\Theta \propto \Theta A$

ἴσον τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ πρὸς τῇ BH εἵδους. δοθὲν ἄρα τὸ ὑπὸ $K\Theta A$. καὶ ἐστὶ δοθεῖσα ἡ $K\Theta$. δοθεῖσα ἄρα καὶ ἡ ΘA . ἀλλὰ καὶ τῇ θέσει· καὶ ἐστὶ δοθὲν τὸ Θ . δοθὲν ἄρα καὶ τὸ A . καὶ διὰ τοῦ A παρὰ
 5 θέσει τὴν BH ῥηται ἡ AA . θέσει ἄρα ἡ AA . θέσει δὲ καὶ ἡ τομὴ· δοθὲν ἄρα τὸ A . ἀλλὰ καὶ τὸ K . θέσει ἄρα ἡ AK .

συντεθήσεται δὴ οὕτως· ὑποκείσθω τὰ μὲν ἄλλα τὰ αὐτά, τὸ δὲ δοθὲν σημείον τὸ K ἐν τῷ προειρη-
 10 μένῳ τόπῳ, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ $K\Theta$ ἐκβεβλήσθω, καὶ εἰλήφθω τι σημείον τὸ Γ , καὶ τῇ $K\Theta$ παράλληλος ῥχθῶ ἡ ΓA , καὶ τετμήσθω ἡ ΓA δίχα τῷ E , καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ $E\Theta$ ἐκβεβλήσθω, καὶ τῇ $B\Theta$ ἴση κείσθω ἡ ΘH . ἡ ἄρα HB πλαγία διάμετρος ἐστὶ
 15 συζυγὴς τῇ $K\Theta A$. κείσθω δὴ τῷ τετάρτῳ τοῦ παρὰ τὴν BH εἵδους ἴσον τὸ ὑπὸ $K\Theta A$, καὶ διὰ τοῦ A τῇ BH παράλληλος ῥχθῶ ἡ AA , καὶ ἐπεζεύχθω ἡ KA . φανερόν δὴ, ὅτι ἡ KA ἐφάπτεται τῆς τομῆς διὰ τὴν ἀντιστροφὴν τοῦ θεωρήματος.

20 ἔαν δὲ ἐν τῷ μεταξὺ τόπῳ τῶν $Z\Theta\Pi$ δοθῇ, ἀδύνατον ἔσται τὸ πρόβλημα. ἡ γὰρ ἐφαπτομένη τεμεῖ τὴν $H\Theta$. ὥστε συμπεσεῖται ἐκατέρωτ' τῶν $Z\Theta\Pi$. ὅπερ ἀδύνατον διὰ τὰ δεδειγμένα ἐν τῷ λα' τοῦ πρώτου καὶ ἐν τῷ τρίτῳ τούτου τοῦ βιβλίου.

25 Τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων ἔστω ἡ τομὴ ἑλλειψις, τὸ δὲ δοθὲν σημείον ἐπὶ τῆς τομῆς τὸ A , καὶ δεῖν ἔστω ἀπὸ τοῦ A ἀγαγεῖν ἐφαπτομένην τῆς τομῆς. γερονέτω, καὶ ἔστω ἡ AH , καὶ τεταγμένως ἀπὸ τοῦ A ἐπὶ τὸν $B\Gamma$ ἄξονα ῥχθῶ ἡ AA . ἔσται δὴ δοθὲν τὸ A , καὶ

8. δὴ] δέ Halley. 19. ἀναστροφὴν V p; corr. Halley. τοῦ λη' θεωρήματος τοῦ πρώτου βιβλίου Halley cum Commandino.

quartae parti figurae ad BH adplicatae aequale. itaque $K\Theta \times \Theta A$ datum est. et $K\Theta$ data est [dat. 26]; itaque etiam ΘA data est [dat. 57]. uerum etiam positione data est; et Θ datum est; itaque etiam A datum est [dat. 27]. et per A rectae BH positione datae parallela ducta est AA ; itaque AA positione data est [dat. 28]. uerum etiam sectio positione data est; itaque A datum est [dat. 25]. uerum etiam K datum est; ergo AK positione data est [dat. 26].


componetur hoc modo: cetera eadem supponantur, datum autem punctum K in spatio positum, quod significauimus, et ducta $K\Theta$ producat, sumaturque punctum aliquod Γ , et rectae $K\Theta$ parallela ducatur ΓA , seceturque in E in duas partes aequales ΓA , et ducta $E\Theta$ producat, ponaturque $\Theta H = B\Theta$; itaque HB diametrus transuersa est cum $K\Theta A$ coniugata [I def. 6]. ponatur igitur $K\Theta \times \Theta A$ quartae parti figurae ad BH adplicatae aequale, et per A rectae BH parallela ducatur AA , ducaturque KA . manifestum igitur propter conuersionem theorematis supra citati [I, 38], rectam KA sectionem contingere.

sin punctum in spatio inter $Z\Theta$, $\Theta\Pi$ posito datum erit, problema effici non poterit. nam recta contingens rectam $H\Theta$ secabit; quare cum utraque $Z\Theta$, $\Theta\Pi$ concidet; quod fieri non potest propter ea, quae demonstraui in prop. XXXI libri primi et in tertia huius libri.

Iisdem suppositis sectio ellipsis sit datumque punctum A in sectione positum, et oporteat ab A rectam sectionem contingentem ducere. factum sit, sitque AH , et ab A ad axem $B\Gamma$ ordinate ducatur

ἔσται, ὥς ἡ $\Gamma\Delta$ πρὸς ΔB , οὕτως ἡ ΓH πρὸς $H B$. καὶ ἔστι λόγος τῆς $\Gamma\Delta$ πρὸς ΔB δοθείς· λόγος ἄρα καὶ τῆς ΓH πρὸς $H B$ δοθείς. δοθέν ἄρα τὸ H . ἀλλὰ καὶ τὸ A . θέσει ἄρα ἔστιν ἡ AH .

5 συντεθήσεται δὴ οὕτως· ἤχθω κάθετος ἡ $A\Delta$, καὶ τῷ τῆς $\Gamma\Delta$ πρὸς ΔB λόγῳ ὁ αὐτὸς ἔστω ὁ τῆς ΓH πρὸς $H B$, καὶ ἐπεξέχθω ἡ AH . φανερόν δ' ἡ, ὅτι
10 ἡ AH ἐφάπτεται, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῆς ὑπερβολῆς.



ἔστω δὴ πάλιν τὸ δοθέν σημείον τὸ K , καὶ δέον ἔστω ἀγαγεῖν ἐφαπτομένην. γεγυμένω, καὶ ἔστω ἡ
15 KA , καὶ ἐπιξενχθεῖσα ἡ $K\Delta\Theta$ ἐπὶ τὸ Θ κέντρον ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ N . ἔσται δὴ θέσει. καὶ ἐὰν ἀχθῇ ἡ AM τεταγμένως, ἔσται ὥς ἡ NK πρὸς KA , οὕτως ἡ NM πρὸς MA . λόγος δὲ τῆς KN πρὸς KA δοθείς· λόγος ἄρα καὶ τῆς MN πρὸς AM δοθείς.
20 δοθέν ἄρα τὸ M . καὶ ἀνῆκται ἡ MA . παράλληλος γάρ ἐστι τῇ κατὰ τὸ A ἐφαπτομένῃ· θέσει ἄρα ἡ MA . δοθέν ἄρα τὸ A . ἀλλὰ καὶ τὸ K . θέσει ἄρα ἡ KA .

ἡ δὲ σύνθεσις ἡ αὕτη τῇ πρὸ αὐτοῦ.

25

ν'.

Τῆς δοθείσης κώνου τομῆς ἐφαπτομένην ἀγαγεῖν, ἥτις πρὸς τῷ ἄξονι γωνίαν ποιήσει ἐπὶ ταῦτά τῇ τομῇ ἴσην τῇ δοθείσῃ ὀξείᾳ γωνίᾳ.

5. δὴ] δέ Halley.

AA ; itaque A datum est [dat. 28, 25], eritque [I, 36] $\Gamma A : AB = \Gamma H : HB$. et ratio $\Gamma A : AB$ data est [dat. 1]; itaque etiam ratio $\Gamma H : HB$ data est. quare H datum est. uerum etiam A datum est. ergo positione data est AH [dat. 26].

componetur hoc modo: ducatur perpendicularis AA , sitque $\Gamma H : HB = \Gamma A : AB$, et ducatur AH . manifestum igitur, ut in hyperbola, rectam AH contingere [I, 34].'

iam rursus datum punctum sit K , et oporteat contingentem ducere. factum sit, sitque KA , et ducta ad centrum Θ recta $KA \Theta$ ad N producat; positione igitur data erit [dat. 26]. et si AM ordinate ducitur, erit $NM : MA = NK : KA$ [I, 36]. uerum ratio $NK : KA$ data est [dat. 1]; quare etiam ratio $MN : AM$ data est. itaque M datum est [dat. 7]. et erecta¹⁾ est MA ; rectae enim in A contingenti parallela est. itaque MA positione data est [dat. 29]. quare A datum est [dat. 25]. uerum etiam K datum est. ergo KA positione data est [dat. 26].

compositio autem eadem est ac in praecedenti [I, 34].

L.

Datam conici sectionem contingentem ducere rectam, quae ad axem ad easdem partes, in quibus est sectio, angulum efficiat dato angulo acuto aequalem.

conici sectio prius sit parabola, cuius axis sit AB . oportet igitur sectionem contingentem rectam ducere, quae ad axem AB ad easdem partes, in quibus est sectio, angulum efficiat dato angulo acuto aequalem.

1) Sc. in dato angulo.

ἔστω κώνου τομὴ πρότερον παραβολή, ἥς ἄξων ὁ AB . δεῖ δὴ ἀγαγεῖν ἐφαπτομένην τῆς τομῆς, ἥτις πρὸς τῷ AB ἄξονι γωνίαν ποιήσῃ ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῇ τομῇ ἴσην τῇ δοθείσῃ ὀξείᾳ.

5 γεγονέτω, καὶ ἔστω ἡ $ΓΔ$. δοθεῖσα ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ $ΒΔΓ$ γωνία. ἤχθω κάθετος ἡ $ΒΓ$. ἔστι δὴ καὶ ἡ πρὸς τῷ $Β$ δοθεῖσα. λόγος ἄρα τῆς $ΔΒ$ πρὸς $ΒΓ$ δοθείς. τῆς δὲ $ΒΔ$ πρὸς $ΒΑ$ λόγος ἐστὶ δοθείς. καὶ τῆς $ΑΒ$ ἄρα πρὸς $ΒΓ$ λόγος ἐστὶ δοθείς. καὶ ἐστὶ
10 δοθεῖσα ἡ πρὸς τῷ $Β$ γωνία. δοθεῖσα ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ $ΒΑΓ$. καὶ ἐστὶ πρὸς θέσει τῇ $ΒΑ$ καὶ δοθέντι τῷ $Α$. θέσει ἄρα ἡ $ΓΑ$. θέσει δὲ καὶ ἡ τομή. δοθέν ἄρα τὸ $Γ$. καὶ ἐφάπτεται ἡ $ΓΔ$. θέσει ἄρα ἐστὶν ἡ $ΓΔ$.


15 συντεθίγεται δὴ τὸ πρόβλημα οὕτως. ἔστω ἡ δοθεῖσα κώνου τομὴ πρότερον παραβολή, ἥς ἄξων ὁ $ΑΒ$, ἡ δὲ δοθεῖσα γωνία ὀξεία ἡ ὑπὸ $ΕΖΗ$, καὶ εἰλήφθω σημεῖον ἐπὶ τῆς $ΕΖ$ τὸ $Ε$, καὶ κάθετος ἤχθω ἡ $ΕΗ$, καὶ τετμήσθω δίχα ἡ $ΖΗ$ τῷ $Θ$, καὶ ἐπεξέχθω
20 ἡ $ΘΕ$, καὶ τῇ ὑπὸ τῶν $ΗΘΕ$ γωνία ἴση συνεστάτω ἡ ὑπὸ τῶν $ΒΑΓ$, καὶ ἤχθω κάθετος ἡ $ΒΓ$, καὶ τῇ $ΒΑ$ ἴση κείσθω ἡ $ΑΔ$, καὶ ἐπεξέχθω ἡ $ΓΔ$. ἐφαπτομένη ἄρα ἐστὶν ἡ $ΓΔ$ τῆς τομῆς.

λέγω δὴ, ὅτι ἡ ὑπὸ τῶν $ΓΔΒ$ τῇ ὑπὸ τῶν $ΕΖΗ$
25 ἐστὶν ἴση.

ἐπεὶ γὰρ ἐστὶν, ὥς ἡ $ΖΗ$ πρὸς $ΗΘ$, οὕτως ἡ $ΔΒ$ πρὸς $ΒΑ$, ἔστι δὲ καὶ ὥς ἡ $ΘΗ$ πρὸς $ΗΕ$, οὕτως ἡ $ΑΒ$ πρὸς $ΒΓ$, δι' ἴσου ἄρα ἐστὶν, ὥς ἡ $ΖΗ$ πρὸς $ΗΕ$, οὕτως ἡ $ΔΒ$ πρὸς τὴν $ΒΓ$. καὶ εἰσιν ὀρθαὶ αἱ

6. δὴ] δέ Vp; corr. Halley.

factum sit, sitque $\Gamma\Delta$; itaque $\angle B\Delta\Gamma$ datus est. perpendicularis ducatur $B\Gamma$; itaque etiam angulus ad B positus datus est. quare ratio $\Delta B : B\Gamma$ data est [dat. 40]. uerum ratio $B\Delta : B\Gamma$ data est [dat. 1].



itaque etiam ratio $\Delta B : B\Gamma$ data est [dat. 8]. et angulus ad B positus datus est; quare etiam $\angle B\Delta\Gamma$ datus est [dat. 41]. et ad rectam $B\Delta$ positione datam punctumque datum Δ positus est; itaque $\Gamma\Delta$ positione data est [dat. 29]. uerum etiam sectio positione data est; itaque Γ datum est [dat. 25]. et $\Gamma\Delta$ contingit; ergo $\Gamma\Delta$ positione data est.

componetur problema hoc modo: sit data conic sectio prius parabola, cuius axis sit AB , angulus autem acutus datus sit EZH , sumaturque in EZ punctum E , et perpendicularis ducatur EH , seceturque ZH in Θ in duas partes aequales, et ducatur ΘE , construatur autem $\angle B\Delta\Gamma = H\Theta E$, et perpendicularis ducatur $B\Gamma$, ponaturque $\Delta\Delta = B\Delta$, et ducatur $\Gamma\Delta$. itaque $\Gamma\Delta$ sectionem contingit [I, 35].

iam dico, esse $\angle \Gamma\Delta B = EZH$.

nam quoniam est $ZH : H\Theta = \Delta B : B\Delta$, et [Eucl. VI, 2] etiam $\Theta H : HE = \Delta B : B\Gamma$, ex aequo

πρὸς τοῖς H, B γωνίαι· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ Z γωνία
τῇ Δ γωνίᾳ.

Ἐστω ἡ τομὴ ὑπερβολή, καὶ γεγονέτω, καὶ ἔστω
ἐφαπτομένη ἡ $\Gamma\Delta$, καὶ εἰλήφθω τὸ κέντρον τῆς τομῆς
5 τὸ X , καὶ ἐπεξεύχθω ἡ ΓX καὶ κάθετος ἡ ΓE · λόγος
ἄρα τοῦ ὑπὸ τῶν $XE\Delta$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $E\Gamma$ δοθείς·
ὁ αὐτὸς γάρ ἐστι τῷ τῆς πλαγίας πρὸς τὴν ὀρθίαν.
τοῦ δὲ ἀπὸ τῆς ΓE πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $E\Delta$ λόγος ἐστὶ
δοθείς· δοθεῖσα γὰρ ἑκατέρα τῶν ὑπὸ $\Gamma\Delta E, \Delta E\Gamma$.
10 λόγος ἄρα καὶ τοῦ ὑπὸ $XE\Delta$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $E\Delta$
δοθείς· ὥστε καὶ τῆς XE πρὸς $E\Delta$ λόγος ἐστὶ
δοθείς. καὶ δοθεῖσα ἡ πρὸς τῷ E · δοθεῖσα ἄρα καὶ
ἡ πρὸς τῷ X . πρὸς δὴ θέσει εὐθείᾳ τῇ XE καὶ
δοθέντι τῷ X διήκται τις ἡ ΓX ἐν δεδομένη γωνίᾳ·
15 θέσει ἄρα ἡ ΓX . θέσει δὲ καὶ ἡ τομὴ· δοθὲν ἄρα
τὸ Γ . καὶ διήκται ἐφαπτομένη ἡ $\Gamma\Delta$ · θέσει ἄρα
ἡ $\Gamma\Delta$.


ἦχθω ἀσύμπτωτος τῆς τομῆς ἡ ZX · ἡ $\Gamma\Delta$ ἄρα
ἐκβληθεῖσα συμπεσεῖται τῇ ἀσυμπτώτῳ. συμπίπτει
20 κατὰ τὸ Z . μείζων ἄρα ἔσται ἡ ὑπὸ $Z\Delta E$ γωνία
τῆς ὑπὸ $ZX\Delta$. δεήσει ἄρα εἰς τὴν σύνθεσιν τὴν
δεδομένην ὀξεῖαν γωνίαν μείζονα εἶναι τῆς ἡμισείας
τῆς περιεχομένης ὑπὸ τῶν ἀσυμπτώτων.

συντεθήσεται δὴ τὸ πρόβλημα οὕτως· ἔστω ἡ μὲν
25 δοθεῖσα ὑπερβολή, ἥς ἄξων ὁ AB , ἀσύμπτωτος δὲ ἡ
 XZ , ἡ δὲ δοθεῖσα γωνία ὀξεῖα μείζων οὔσα τῆς ὑπὸ
τῶν AXZ ἢ ὑπὸ $K\Theta H$, καὶ ἔστω τῇ ὑπὸ τῶν AXZ
ἴση ἡ ὑπὸ $K\Theta A$, καὶ ἦχθω ἀπὸ τοῦ A τῇ AB πρὸς
ὀρθῶς ἡ AZ , εἰλήφθω δὲ τι σημεῖον ἐπὶ τῆς $H\Theta$ τὸ

1. ἴση] εἴση V; corr. cnp.

est [Eucl. V, 20] $ZH:HE = AB:BI$. et anguli ad H, B positi recti sunt; ergo $\angle Z = \angle A$ [Eucl. VI, 6].

Iam sit data sectio hyperbola, et sit factum, contingatque ΓA , et sumatur X centrum sectionis, ducaturque ΓX et perpendicularis ΓE ; itaque ratio $XE \times EA : E\Gamma^2$ data est; eadem enim est ac ratio lateris transversi ad rectum [I, 37]. data autem ratio $\Gamma E^2 : EA^2$ [dat. 40, 50]; nam uterque angulus ΓAE , $AE\Gamma$ datus est. itaque etiam ratio $XE \times EA : EA^2$ data est [dat. 8]; quare etiam ratio $XE : EA$ data est [Eucl. VI, 1]. et angulus ad E positus datus



est; itaque etiam angulus ad X positus [dat. 8, 41]. itaque ad rectam XE positione datam punctumque datum X in angulo dato ducta est recta ΓX ; ΓX igitur positione data est [dat. 29].

uerum etiam sectio positione data est; itaque Γ datum est [dat. 25]. et ΓA contingens ducta est; ergo ΓA positione data est.

ducatur asymptota sectionis ZX ; ΓA igitur producta cum asymptota concurret [prop. III]. concurrat in Z . itaque erit $\angle ZAE > ZXA$ [Eucl. I, 16]. ad compositionem igitur necesse erit, angulum acutum datum maiorem esse dimidio angulo ab asymptotis comprehenso.

componetur problema hoc modo: sit data hyper-

H , καὶ ἡχθῶ ἀπ' αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ΘK κάθετος ἡ HK .
ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ZXA τῇ ὑπὸ $A\Theta K$, εἰσι
δὲ καὶ αἱ πρὸς τοῖς A , K γωνίαι ὀρθαί, ἔστιν ἄρα,
ὥς ἡ XA πρὸς AZ , ἡ ΘK πρὸς KA . ἡ δὲ ΘK πρὸς
5 KA μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ πρὸς τὴν HK . καὶ ἡ XA
πρὸς AZ ἄρα μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ ΘK πρὸς
 KH . ὥστε καὶ τὸ ἀπὸ XA πρὸς τὸ ἀπὸ AZ μείζονα
λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ἀπὸ ΘK πρὸς τὸ ἀπὸ KH . ὥς
δὲ τὸ ἀπὸ XA πρὸς τὸ ἀπὸ AZ , ἡ πλαγία πρὸς τὴν
10 ὀρθίαν· καὶ ἡ πλαγία ἄρα πρὸς τὴν ὀρθίαν μείζονα
λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ἀπὸ ΘK πρὸς τὸ ἀπὸ KH . ἐὰν
δὴ ποιήσωμεν, ὥς τὸ ἀπὸ XA πρὸς τὸ ἀπὸ AZ , οὕτως
ἄλλο τι πρὸς τὸ ἀπὸ KH , μείζον ἐστὶ τοῦ ἀπὸ ΘK .
ἔστω τὸ ὑπὸ $MK\Theta$. καὶ ἐπεζεύχθω ἡ HM . ἐπεὶ
15 οὖν μείζον ἐστὶ τὸ ἀπὸ MK τοῦ ὑπὸ $MK\Theta$, τὸ ἄρα
ἀπὸ MK πρὸς τὸ ἀπὸ KH μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ
τὸ ὑπὸ $MK\Theta$ πρὸς τὸ ἀπὸ KH , τουτέστι τὸ ἀπὸ XA
πρὸς τὸ ἀπὸ AZ . καὶ ἐὰν ποιήσωμεν, ὥς τὸ ἀπὸ
 MK πρὸς τὸ ἀπὸ KH , οὕτως τὸ ἀπὸ XA πρὸς ἄλλο
20 τι, ἔσται πρὸς ἑλαττον τοῦ ἀπὸ AZ . καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ
 X ἐπὶ τὸ ληφθὲν σημεῖον ἐπιξεννυμένη εὐθεῖα ὅμοια
ποιήσει τὰ τρίγωνα, καὶ διὰ τοῦτο μείζων ἐστὶν ἡ
ὑπὸ ZXA τῇς ὑπὸ HMK . κείσθω δὴ τῇ ὑπὸ HMK
ἴση ἡ ὑπὸ $AX\Gamma$. ἡ ἄρα $X\Gamma$ τεμεῖ τὴν τομήν. τεμ-
25 νέτω κατὰ τὸ Γ , καὶ ἀπὸ τοῦ Γ ἐφαπτομένη τῇς
τομῆς ἡχθῶ ἡ ΓA , καὶ κάθετος ἡ ΓE . ὅμοιον ἄρα
ἐστὶ τὸ ΓXE τρίγωνον τῷ HMK . ἔστιν ἄρα, ὥς τὸ
ἀπὸ XE πρὸς τὸ ἀπὸ $E\Gamma$, τὸ ἀπὸ MK πρὸς τὸ ἀπὸ

15. τοῦ] pc, corr. ex τό m. 1 V. 20. AZ] c, AZ uel AA
(littera Z obscura) V; AA vp. 26. ὅμοια cv et, ut uidetur,
V; corr. p.

bola, cuius axis sit AB , asymptota autem XZ , et datus angulus acutus $K\Theta H > AXZ$, et sit

$$\angle K\Theta A = AXZ,$$

ducaturque ab A ad AB perpendicularis AZ , in $H\Theta$ autem punctum aliquod sumatur H , ducaturque ab eo ad ΘK perpendicularis HK . iam quoniam est

$$\angle ZXA = A\Theta K,$$


et etiam anguli ad A , K positi recti sunt, erit

$$XA : AZ = \Theta K : KA \text{ [Eucl. VI, 4].}$$

est autem $\Theta K : KA > \Theta K : KH$ [Eucl. V, 8]. itaque etiam $XA : AZ > \Theta K : KH$. quare etiam

$$XA^2 : AZ^2 > \Theta K^2 : KH^2.$$

est autem, ut $XA^2 : AZ^2$, ita latus transuersum ad rectum [prop. I]; quare etiam latus transuersum ad



latus rectum maiorem rationem habet quam $\Theta K^2 : KH^2$. itaque si fecerimus, ut $XA^2 : AZ^2$, ita aliam magnitudinem ad KH^2 , ea maior erit quam ΘK^2 [Eucl. V, 8]. sit $MK \times K\Theta$, et ducatur HM . iam quoniam est $MK^2 > MK \times K\Theta$, erit [Eucl. V, 8]

$$MK^2 : KH^2 > MK \times K\Theta : KH^2,$$


hoc est $MK^2 : KH^2 > XA^2 : AZ^2$. et si fecerimus,

In V^o figurae huic adiectae sunt VI rectae totidemque rectangula, quae quid sibi uelint, in praefatione exponam; om. p.

KH . ἔστι δὲ καί, ὥς ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὀρθίαν, τό
 τε ὑπὸ XEA πρὸς τὸ ἀπὸ $EΓ$ καὶ το ὑπὸ $MKΘ$
 πρὸς το ἀπὸ KH . καὶ ἀνάπαλιν, ὥς τὸ ἀπὸ $ΓE$ πρὸς
 τὸ ὑπο XEA , τὸ ἀπὸ HK πρὸς τὸ ὑπὸ $MKΘ$. δι'
 5 ἴσου ἄρα, ὥς τὸ ἀπὸ XE πρὸς τὸ ὑπὸ XEA , τὸ ἀπὸ
 MK πρὸς τὸ ὑπὸ $MKΘ$. καὶ ὥς ἄρα ἡ XE πρὸς
 EA , ἡ MK πρὸς $KΘ$. ἣν δὲ καί, ὥς ἡ $ΓE$ πρὸς
 EX , ἡ HK πρὸς KM . δι' ἴσου ἄρα, ὥς ἡ $ΓE$ πρὸς
 EA , ἡ HK πρὸς $KΘ$. καὶ εἰσιν ὀρθαὶ αἱ πρὸς τοῖς
 10 E, K γωνίαι. ἴση ἄρα ἡ πρὸς τῷ A γωνία τῇ
 ὑπὸ $HΘK$.

Ἔστω ἡ τομὴ ἑλλειψις, ἣς ἄξων ὁ AB . δεῖ δὲ
 ἐφαπτομένην ἀγαγεῖν τῆς τομῆς, ἣτις πρὸς τῷ ἄξονι
 ἐπὶ ταῦτά τῇ τομῇ ἴσην γωνίαν περιέξει τῇ δοθείσῃ
 15 ὀξείᾳ γωνίᾳ.

γεγονέτω, καὶ ἔστω ἡ $ΓA$. δοθείσα ἄρα ἔστω ἡ
 ὑπὸ τῶν $ΓAA$ γωνία. ἤχθω κάθετος ἡ $ΓE$. λόγος



ἄρα τοῦ ἀπὸ τῆς AE πρὸς τὸ ἀπὸ $EΓ$ δοθείς. ἔστω
 κέντρον τῆς τομῆς τὸ X , καὶ ἐπεζεύχθω ἡ $ΓX$. τοῦ
 20 δὲ ἀπὸ τῆς $ΓE$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν AEX λόγος ἐστὶ
 δοθείς· ὁ γὰρ αὐτός ἐστι τῷ τῆς ὀρθίας πρὸς τὴν
 πλαγίαν· καὶ τοῦ ἀπὸ τῆς AE ἄρα πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν AEX
 λόγος ἐστὶ δοθείς· καὶ τῆς AE ἄρα πρὸς EX λόγος

4. πρὸς] om. V; corr. p. 13. ἣτις] ἡ τῆς V; corr. p. 16.
 ἡ] (alt.) om. V; corr. p. 20. δὲ] δε V; corr. Halley.

ut $MK^2:KH^2$, ita XA^2 ad aliam magnitudinem, erit ad magnitudinem minorem quam AZ^2 [Eucl. V, 8]; et recta a X ad punctum sumptum ducta triangulos similes efficiet [Eucl. VI, 6], et ideo erit

$$\angle ZXA > HMK.^1)$$

ponatur igitur $\angle AX\Gamma = HMK$; $X\Gamma$ igitur sectionem secabit [prop. II]. secet in Γ , et a Γ sectionem contingens ducatur $\Gamma\Delta$ [prop. XLIX], et ΓE perpendicularis; itaque triangulus ΓXE triangulo HMK similis est. quare $XE^2:E\Gamma^2 = MK^2:KH^2$ [Eucl. VI, 4]. est autem etiam, ut latus transversum ad rectum, ita $XE \times E\Delta:E\Gamma^2$ [I, 37] et $MK \times K\Theta:KH^2$. et e contrario [Eucl. V, 7 coroll.] erit

$$\Gamma E^2:XE \times E\Delta = HK^2:MK \times K\Theta.$$

ex aequo igitur [Eucl. V, 20]

$$XE^2:XE \times E\Delta = MK^2:MK \times K\Theta.$$

quare etiam $XE:E\Delta = MK:K\Theta$. erat autem etiam $\Gamma E:EX = HK:KM$. ex aequo igitur [Eucl. V, 20] $\Gamma E:E\Delta = HK:K\Theta$. et anguli ad E, K positi recti sunt; itaque $\angle \Delta = H\Theta K$ [Eucl. VI, 6].

Iam sit sectio ellipsis, cuius axis sit AB . oportet igitur rectam sectionem contingentem ducere, quae ad axem ad easdem partes, in quibus est sectio, angulum comprehendat dato angulo acuto aequalem.

factum sit, sitque $\Gamma\Delta$; itaque $\angle \Gamma\Delta A$ datus est. perpendicularis ducatur ΓE ; itaque ratio $\Delta E^2:E\Gamma^2$ data est [dat. 1]. sit X centrum sectionis, et ducatur ΓX . itaque ratio $\Gamma E^2:\Delta E \times EX$ data est; nam

1) Nam ob similitudinem trianguli HMK eiusque, quem efficit recta a X ad sumptum punctum (x) ducta, erit $\angle HMK = AXx$; et $\angle AXx < AXZ$, quia $Ax < AZ$.

ἐστὶ δοθεῖς. τῆς δὲ $\angle E$ πρὸς $E\Gamma$ · καὶ τῆς ΓE ἄρα
 πρὸς EX λόγος ἐστὶ δοθεῖς. καὶ ἐστὶν ὁρθή ἢ πρὸς
 τῷ E · δοθεῖσα ἄρα ἢ πρὸς τῷ X γωνία. καὶ ἐστὶ
 πρὸς θέσει καὶ δοθέντι σημείῳ· δοθέν ἄρα ἐστὶ τὸ
 5 Γ σημείου. καὶ ἀπὸ δεδομένου τοῦ Γ ἐφαπτομένη ἢ
 $\Gamma\Delta$ · θέσει ἄρα ἢ $\Gamma\Delta$.

συντεθήσεται δὴ τὸ πρόβλημα οὕτως· ἔστω ἢ μὲν
 δοθεῖσα γωνία ὀξεῖα ἢ ὑπὸ τῶν $ZH\Theta$, καὶ εἰλήφθω
 ἐπὶ τῆς ZH τὸ Z , καὶ κάθετος ἤχθω ἢ $Z\Theta$, καὶ πε-
 10 ποιήσθω, ὥς ἢ ὁρθία πρὸς τὴν πλαγίαν, τὸ ἀπὸ τῆς
 $Z\Theta$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $H\Theta K$, καὶ ἐπεξεύχθω ἢ KZ ,
 καὶ ἔστω κέντρον τῆς τομῆς τὸ X , καὶ τῇ ὑπὸ τῶν
 HKZ γωνία ἴση συνεστήτω ἢ ὑπὸ τῶν $AX\Gamma$, καὶ
 ἤχθω ἐφαπτομένη τῆς τομῆς ἢ $\Gamma\Delta$. λέγω, ὅτι ἢ $\Gamma\Delta$
 15 ποιεῖ τὸ πρόβλημα, τουτέστιν, ὅτι ἴση ἐστὶν ἢ ὑπὸ
 τῶν $\Gamma\Delta E$ γωνία τῇ ὑπὸ τῶν $ZH\Theta$.

ἐπεὶ γὰρ ἐστὶν, ὥς ἢ XE πρὸς $E\Gamma$, οὕτως ἢ $K\Theta$
 πρὸς $Z\Theta$, καὶ ὥς ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς XE πρὸς τὸ ἀπὸ
 τῆς $E\Gamma$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς $K\Theta$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $Z\Theta$.
 20 ἔστι δὲ καί, ὥς τὸ ἀπὸ τῆς ΓE πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν
 ΔEX , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς $Z\Theta$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $K\Theta H$.
 ἐκότερος γὰρ ὁ αὐτός ἐστὶ τῷ τῆς ὁρθίας πρὸς τὴν
 πλαγίαν. καὶ δι' ἴσου· ὥς ἄρα τὸ ἀπὸ XE πρὸς τὸ
 ὑπὸ $XE\Delta$, οὕτως τὸ ἀπὸ $K\Theta$ πρὸς τὸ ὑπὸ $H\Theta K$.
 25 καὶ ὥς ἄρα ἢ XE πρὸς τὴν $E\Delta$, οὕτως ἢ $K\Theta$ πρὸς
 τὴν ΘH . ἔστι δὲ καί, ὥς ἢ XE πρὸς ΓE , ἢ $K\Theta$
 πρὸς $Z\Theta$ · δι' ἴσου ἄρα ἐστὶν, ὥς ἢ ΔE πρὸς $E\Gamma$,
 οὕτως ἢ $H\Theta$ πρὸς τὴν $Z\Theta$. καὶ περὶ ὁρθῆς γωνίας

1. Post $E\Gamma$ add. λόγος ἐστὶ δοθεῖς p. ΓE] XE Vp;
 corr. Memus. 12. ἔστω] τό V; correxi praeunte Halleio
 (del. καὶ τό). 13. HKZ] HZ V; corr. p (HK , KZ). 22. ὅ]

eadem est ac ratio lateris recti ad transuersum [I, 37].
quare etiam ratio $\angle E^2 : \angle E \times EX$ data est [dat. 8].
itaque etiam ratio $\angle E : EX$ data est. uerum ratio
 $\angle E : E\Gamma$ data; quare etiam ratio $\Gamma E : EX$ data est
[dat. 8]. et angulus ad E positus rectus est; itaque
angulus ad X positus datus est [dat. 41]. et ad
rectam positione datam punctumque datum positus
est; itaque punctum Γ datum est [dat. 29, 25]. et
a dato puncto Γ contingens ducta est $\Gamma\Delta$; ergo $\Gamma\Delta$
positione data est.

componetur problema hoc modo: sit $ZH\Theta$ datus
angulus acutus, sumaturque in ZH punctum Z , et
perpendicularis ducatur $Z\Theta$, fiatque, ut latus rectum
ad transuersum, ita $Z\Theta^2$ ad $H\Theta \times \Theta K$, ducaturque
 KZ , centrum autem sectionis sit X , et construatur
 $\angle AX\Gamma = \angle HKZ$, ducaturque sectionem contingens
 $\Gamma\Delta$ [prop. XLIX]. dico, $\Gamma\Delta$ problema efficere, hoc
est, esse $\angle \Gamma\Delta E = ZH\Theta$.

nam quoniam est [Eucl. VI, 4] $XE : E\Gamma = K\Theta : Z\Theta$,
erit etiam $XE^2 : E\Gamma^2 = K\Theta^2 : Z\Theta^2$. est autem etiam

$$\Gamma E^2 : \angle E \times EX = Z\Theta^2 : K\Theta \times \Theta H;$$

utraque enim eadem est ac ratio lateris recti ad
transuersum [I, 37]. et ex aequo [Eucl. V, 20]; erit
igitur $XE^2 : XE \times E\Delta = K\Theta^2 : H\Theta \times \Theta K$. quare
etiam $XE : E\Delta = K\Theta : \Theta H$. est autem etiam

$$XE : \Gamma E = K\Theta : Z\Theta.$$

itaque ex aequo [Eucl. V, 20] $\angle E : E\Gamma = H\Theta : Z\Theta$.

om. V; corr. p. 24. οὐτως] οὐ Vv, οὐτως p. KΘ] p,
KΘ uel KO V; KO cv. HΘK] KHΘ Vv, τὸν KΘ, ΘH p;
corr. Memus.

αὶ πλευραὶ ἀνάλογον· ἡ ἄρα ὑπὸ $\Gamma\Delta E$ γωνία τῇ
 ὑπὸ $ZH\Theta$ γωνίᾳ ἐστὶν ἴση. ἡ $\Gamma\Delta$ ἄρα ποιεῖ τὸ
 πρόβλημα.

να'.

5 Τῆς δοθείσης κώνου τομῆς ἀγαγεῖν ἐφαπτομένην,
 ἥτις πρὸς τῇ διὰ τῆς ἀφῆς ἡγμένη διαμέτρῳ ἴσην περι-
 ἔξει γωνίαν τῇ δοθείσῃ ὀξείᾳ.

ἔστω ἡ δοθεῖσα κώνου τομὴ πρότερον παραβολή,
 ἥς ἄξων ὁ AB , ἡ δὲ δοθεῖσα γωνία ἡ Θ . δεῖ δὴ
 10 ἀγαγεῖν τῆς παραβολῆς ἐφαπτομένην, ἥτις μετὰ τῆς
 ἀπὸ τῆς ἀφῆς διαμέτρου ἴσην περιέξει γωνίαν τῇ
 πρὸς τῷ Θ .

γεγονέτω, καὶ ἡχθῶ ἐφαπτομένη ἡ $\Gamma\Delta$ ποιοῦσα
 πρὸς τῇ διὰ τῆς ἀφῆς ἡγμένη διαμέτρῳ τῇ EF τὴν
 15 ὑπὸ $E\Gamma\Delta$ γωνίαν ἴσην τῇ Θ , καὶ συμπιπτέτω ἡ $\Gamma\Delta$
 τῷ ἄξονι κατὰ τὸ A . ἐπεὶ οὖν παράλληλός ἐστιν ἡ
 AA τῇ EF , ἡ ὑπὸ $AA\Gamma$ γωνία τῇ ὑπὸ $E\Gamma\Delta$ ἴση
 ἐστί. δοθεῖσα δὲ ἡ ὑπὸ $E\Gamma\Delta$ ἴση γὰρ ἐστὶ τῇ Θ .
 δοθεῖσα ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ $AA\Gamma$.

20 συντεθήσεται δὴ οὕτως· ἔστω παραβολή, ἥς ἄξων
 ὁ AB , ἡ δὲ δοθεῖσα γωνία ἡ Θ . ἡχθῶ ἐφαπτομένη
 τῆς τομῆς ἡ $\Gamma\Delta$ ποιοῦσα πρὸς τῷ ἄξονι τὴν ὑπὸ τῶν
 $AA\Gamma$ γωνίαν ἴσην τῇ Θ , καὶ διὰ τοῦ Γ τῇ AB παρ-
 ἀλληλος ἡχθῶ ἡ EF . ἐπεὶ οὖν ἡ Θ γωνία ἴση ἐστὶ
 25 τῇ ὑπὸ $AA\Gamma$, ἡ δὲ ὑπὸ $AA\Gamma$ ἴση τῇ ὑπὸ $E\Gamma\Delta$, καὶ
 ἡ Θ ἄρα ἴση ἐστὶ τῇ ὑπὸ $E\Gamma\Delta$.

Ἔστω ἡ τομὴ ὑπερβολή, ἥς ἄξων ὁ AB , κέντρον
 δὲ τὸ E , ἀσύμπτωτος δὲ ἡ ET , ἡ δὲ δοθεῖσα γωνία

9. ἡ Θ] $H\Theta$ V; corr. Memus. 15. $E\Gamma\Delta$] $E\Gamma A$ V; corr. p.
 23. $AA\Gamma$] $AA\Gamma$ V; corr. p ($\Gamma A A$).


et latera rectos angulos comprehendentia proportionalia sunt; itaque $\angle \Gamma \Delta E = \angle H \Theta$ [Eucl. VI, 6]. ergo $\Gamma \Delta$ problema efficit.

LI.

Datam conic sectionem contingentem rectam ducere, quae cum diametro per punctum contactus ducta angulum comprehendat dato angulo acuto aequalem.

data conic sectio prius sit parabola, cuius axis sit AB , datus autem angulus sit Θ . oportet igitur parabola contingentem rectam ducere, quae cum diametro a puncto contactus ducta angulum comprehendat angulo Θ aequalem.

sit factum, contingensque ducta sit $\Gamma \Delta$ ad $E\Gamma$ diametrum per punctum contactus ductam angulum $E\Gamma \Delta$ efficiens angulo Θ aequalem, et $\Gamma \Delta$ cum axe



concurrat in Δ . iam quoniam $\Delta \Delta$ rectae $E\Gamma$ parallela est [I, 51 coroll.], erit $\angle \Delta \Delta \Gamma = \angle E\Gamma \Delta$ [Eucl. I, 29]. uerum $\angle E\Gamma \Delta$ datus est; est enim $\angle E\Gamma \Delta = \Theta$; ergo etiam $\angle \Delta \Delta \Gamma$ datus est.

componetur hoc modo: sit parabola, cuius axis sit AB , datus autem angulus sit Θ . ducatur sectionem contingens $\Gamma \Delta$ ad axem efficiens angulum $\Delta \Delta \Gamma$

Hic quoque figurae adiecta sunt quattuor rectangula rectaeque in Vvc; om. p.


angulo $\odot$ aequalem [prop. L], per Γ autem rectae AB parallela ducatur EF . iam quoniam est

$$L^{\oplus} = A \Delta \Gamma$$

et $\angle A\Delta\Gamma = E\Gamma\Delta$ [Eucl. I, 29], erit etiam

$$/ \oplus = E \Gamma \Delta.$$

Sit sectio hyperbola, cuius axis sit AB , centrum autem E , et asymptota ET , datus autem angulus acutus Ω , et contingens ΓA , ducaturque ΓE problema



efficiens, et perpendicularis ducatur ΓH . ratio igitur lateris transuersi ad rectum data est; quare etiam ratio $EH \times HA : \Gamma H^2$ data est [I, 37]. sumatur igitur data recta $Z\Theta$, in eaque segmentum circuli describatur angulum angulo Ω aequalem capiens [Eucl. III, 33]; erit igitur semicirculo maius [Eucl. III, 31]. et a puncto aliquo ambitus K perpendicularis ducatur KA rationem $ZA \times A\Theta : AK^2$ aequalem efficiens rationi lateris transuersi ad rectum, ducanturque $ZK, K\Theta$. iam quoniam est $\angle ZK\Theta = E\Gamma A$, et ut latus transuersum ad rectum, ita et $EH \times HA : H\Gamma^2$ et $ZA \times A\Theta : AK^2$, trianguli $KZA, E\Gamma H$ et $Z\Theta K, E\Gamma A$ similes erunt [u. Pappi lemma IX]. ergo

$$L \otimes ZK = \Gamma E \Delta.$$

componetur hoc modo: sit data hyperbola AT ,
axis autem AB , et centrum E , datus uero angulus
acutus sit Ω , et data ratio lateris transuersi ad

rectum aequalis sit rationi $X\Psi : X\Phi$, seceturque in Γ in duas partes aequales $\Psi\Phi$, et sumatur data recta $Z\Theta$, in eaque segmentum circuli semicirculo maius describatur angulum angulo $\mathcal{Q}$ aequalem capiens [Eucl. III, 33], sitque $ZK\Theta$, et sumatur centrum circuli N , et ab N ad $Z\Theta$ perpendicularis ducatur NO , et NO in Π secundum rationem $\Gamma\Phi : \Phi X$ secetur, per Π autem rectae $Z\Theta$ parallela ducatur ΠK , et a K ad $Z\Theta$ productam perpendicularis ducatur KA , ducanturque ZK , $K\Theta$, et AK ad M producantur, ab N autem ad eam perpendicularis ducatur $N\Xi$; ea igitur rectae $Z\Theta$ parallela est [Eucl. I, 27]. qua de causa est

$$N\Pi : \Pi O = \Xi K : KA \text{ [Eucl. VI, 2] } = \Gamma\Phi : \Phi X.$$

et sumptis duplis antecedentium [Eucl. V, 15] erit $\Psi\Phi : \Phi X = MK : KA$ [Eucl. III, 3]. componendo [Eucl. V, 18] $\Psi X : X\Phi = MA : AK$. uerum

$$MA : AK = MA \times AK : AK^2;$$

quare etiam

$$\Psi X : X\Phi = MA \times AK : AK^2 = ZA \times A\Theta : AK^2$$

[Eucl. III, 36]. uerum ut $\Psi X : X\Phi$, ita latus transuersum ad rectum; itaque etiam ut

$$ZA \times A\Theta : AK^2,$$

ita latus transuersum ad rectum. iam ab A ad AB perpen-

Ad figuras codicis V quod adtinet, in hyperbola praeter nostras (omissa tamen priore segmenti descriptione in analysi) duas figuras segmenti habet, alteram ita ut Π in N cadat addito $\epsilon\pi\iota \ell, \dots$ m. 1, alteram ita ut supra N cadat adscripto m. 1: $\delta\tau\alpha\nu \eta \mu\epsilon\iota\zeta\omega\nu \eta \delta\epsilon\theta\iota\alpha \pi\lambda\epsilon\nu\rho\acute{\alpha}$; secundam nostram segmenti descriptionem bis habet et praeterea solita illa IV rectangula rectasque. omnia eadem c, in priore figura: $\epsilon\pi\iota \iota\sigma\acute{o}\tau\eta\tau\omicron\varsigma \delta\upsilon\omicron \pi\lambda\epsilon\nu\rho\acute{\omega}\nu$, in altera $\delta\tau\epsilon \eta \kappa\lambda$.

καὶ ὥς ἄρα τὸ ὑπὸ $Z\Lambda\Theta$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΛK , ἡ πλαγία
 πρὸς τὴν ὀρθίαν. ἤχθω δὲ ἀπὸ τοῦ A τῇ AB πρὸς
 ὀρθὰς ἡ AT . ἐπεὶ οὖν ἐστὶν, ὥς τὸ ἀπὸ EA πρὸς
 τὸ ἀπὸ AT , ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὀρθίαν, ἐστὶ δὲ καί,
 5 ὥς ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὀρθίαν, τὸ ὑπὸ $Z\Lambda\Theta$ πρὸς τὸ
 ἀπὸ ΛK , τὸ δὲ ἀπὸ $Z\Lambda$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΛK μείζονα
 λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ὑπὸ $Z\Lambda\Theta$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΛK , καὶ
 τὸ ἀπὸ $Z\Lambda$ ἄρα πρὸς τὸ ἀπὸ ΛK μείζονα λόγον ἔχει
 ἥπερ τὸ ἀπὸ EA πρὸς τὸ ἀπὸ AT . καὶ εἰσὶν αἱ
 10 πρὸς τοῖς A, Λ γωνίαι ὀρθαί· ἐλάσσων ἄρα ἐστὶν ἡ
 Z γωνία τῆς E . συνεστάτω οὖν τῇ ὑπὸ AZK γωνία
 ἴση ἡ ὑπὸ $AE\Gamma$. συμπεσεῖται ἄρα ἡ $E\Gamma$ τῇ τομῇ.
 συμπιπτέτω κατὰ τὸ Γ . ἤχθω δὲ ἀπὸ τοῦ Γ ἐφαπ-
 τομένη ἡ ΓA , κάθετος δὲ ἡ ΓH . ἐστὶ δὲ, ὥς ἡ
 15 πλαγία πρὸς τὴν ὀρθίαν, οὕτως τὸ ὑπὸ $EH\Lambda$ πρὸς
 τὸ ἀπὸ ΓH . καὶ ὥς ἄρα τὸ ὑπὸ $Z\Lambda\Theta$ πρὸς τὸ ἀπὸ
 ΛK , τὸ ὑπὸ $EH\Lambda$ πρὸς τὸ ἀπὸ $H\Gamma$. ὅμοιον ἄρα
 ἐστὶ τὸ $KZ\Lambda$ τρίγωνον τῷ $E\Gamma H$ τριγώνῳ καὶ τὸ
 $K\Theta\Lambda$ τῷ $\Gamma H\Lambda$ καὶ τὸ $KZ\Theta$ τῷ $\Gamma E\Lambda$. ὥστε ἡ ὑπὸ
 20 $E\Gamma\Lambda$ γωνία ἴση ἐστὶ τῇ ὑπὸ $ZK\Theta$, τουτέστι τῇ Ω .
 εἰν δὲ ὁ τῆς πλαγίας πρὸς τὴν ὀρθίαν λόγος ἴσος
 ἢ πρὸς ἴσον, ἡ $K\Lambda$ ἐφάπτεται τοῦ $ZK\Theta$ κύκλου, καὶ
 ἡ ἀπὸ τοῦ κέντρου ἐπὶ τὸ K ἐπιξενυγμένη παράλ-
 ληλος ἐστὶ τῇ $Z\Theta$ καὶ αὐτὴ ποιήσῃ τὸ πρόβλημα.

25

νβ'.

Ἐὰν ἐλλείψεως εὐθεῖα ἐπιψαύῃ, ἣν ποιεῖ γωνίαν
 πρὸς τῇ διὰ τῆς ἀφῆς ἀγομένη διαμέτρῳ, οὐκ ἐλάσσων
 ἐστὶ τῆς ἐφεξῆς τῇ περιεχομένη ὑπὸ τῶν πρὸς μέσην
 τὴν τομὴν κλωμένων εὐθειῶν.

1. καὶ ὥς — 2. ὀρθίαν] bis V, sed corr. 8. $Z\Lambda$] $Z\Delta$ V;
 corr. p. 15. πρὸς] (alt.) repet. mg. m. rec. V. 16. ὑπὸ

dicularis ducatur AT . quoniam igitur est, ut $EA^2:AT^2$, ita latus transuersum ad rectum [prop. I], uerum etiam ut latus transuersum ad rectum, ita

$$ZA \times A\Theta : AK^2,$$

et $ZA^2:AK^2 > ZA \times A\Theta : AK^2$, erit etiam

$$ZA^2:AK^2 > EA^2:AT^2.$$

et anguli ad A , Δ positi recti sunt; itaque erit $\angle Z < E$ [u. Pappi lemma VI]. construatur igitur $\angle AEF = AZK$; EF igitur cum sectione concurret [prop. II]. concurrat in Γ . a Γ igitur contingens ducatur $\Gamma\Delta$ [prop. XLIX], perpendicularis autem ΓH ; erit igitur, ut latus transuersum ad rectum, ita $EH \times H\Delta : \Gamma H^2$ [I, 37]. quare etiam

$$ZA \times A\Theta : AK^2 = EH \times H\Delta : H\Gamma^2.$$

itaque similes sunt trianguli KZA , $E\Gamma H$ et $K\Theta A$, $\Gamma H\Delta$ et $KZ\Theta$, $\Gamma E\Delta$ [u. Pappi lemma IX]. ergo

$$\angle E\Gamma\Delta = \angle ZK\Theta = \Omega.$$

sin ratio lateris transuersi ad rectum aequalis est ad aequale, KA circulum $ZK\Theta$ contingit [Eucl. III, 16], et recta a centro ad K ducta rectae $Z\Theta$ parallela erit et ipsa problema efficiet.

LII.

Si recta ellipsim contingit, angulus, quem ad diametrum per punctum contactus ductam efficit, minor non est eo, qui deinceps est angulo a rectis ad mediam sectionem fractis comprehenso.

sit ellipsis, cuius axes sint AB , $\Gamma\Delta$, centrum autem E , et maior axis sit AB , contingatque sectionem

$ZA\Theta$] $v\zeta\lambda\theta$ V; corr. Memus. 20. $ZK\Theta$] $Z\Theta K$ V; corr. Comm. 21. $\lambda\sigma\sigma$] $\lambda\sigma\sigma$ Halley. 27. $\tau\eta$] $\tau\eta\nu$ V; corr. p.

Apollonius, ed. Heiberg.

ἔστω ἑλλειψις, ἣς ἄξονες μὲν οἱ AB , $ΓΔ$, κέντρον δὲ τὸ E , μείζων δὲ ἔστω τῶν ἀξόνων ἡ AB , καὶ ἐφαπτέσθω τῆς τομῆς ἡ HZA , καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ $ΑΓ$, $ΓΒ$, ZE , καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ $BΓ$ ἐπὶ τὸ A . λέγω,
 5 ὅτι οὐκ ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ὑπὸ AZE γωνία τῆς ὑπὸ $ΑΓΑ$.

ἡ γὰρ ZE τῇ AB ἴτοι παράλληλος ἐστὶν ἢ οὐ.


ἔστω πρότερον παράλληλος· καὶ ἐστὶν ἴση ἡ AE τῇ EB . ἴση ἄρα καὶ ἡ $ΑΘ$ τῇ $ΘΓ$. καὶ ἐστὶ διά-
 10 μετρος ἡ ZE . ἡ ἄρα κατὰ τὸ Z ἐφαπτομένη παράλληλος ἐστὶ τῇ $ΑΓ$. ἐστὶ δὲ καὶ ἡ ZE τῇ AB παράλληλος· παραλληλόγραμμον ἄρα ἐστὶ τὸ $ZΘΓΑ$, καὶ διὰ τοῦτο ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ $AZΘ$ τῇ ὑπὸ $ΑΓΘ$.

καὶ ἐπεὶ μείζων ἐστὶν ἑκατέρω τῶν AE , EB τῆς
 15 $ΕΓ$, ἀμβλεία ἐστὶν ἡ ὑπὸ $ΑΓΒ$. ὁξεῖα ἄρα ἡ ὑπὸ $ΑΓΑ$. ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ AZE . καὶ διὰ τοῦτο ἀμβλεία ἐστὶν ἡ ὑπὸ HZE .

μὴ ἔστω δὲ ἡ EZ τῇ AB παράλληλος, καὶ ἦχθω κάθετος ἡ ZK . οὐκ ἄρα ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ABE τῇ
 20 ὑπὸ $ZEΑ$. ὀρθὴ δὲ ἡ πρὸς τῷ E ὀρθῇ τῇ πρὸς τῷ K ἐστὶν ἴση [οὐκ ἄρα ὁμοίον ἐστὶ τὸ $ΓΕΒ$ τρίγωνον τῷ $ΖΕΚ$]. οὐκ ἄρα ἐστίν, ὥς τὸ ἀπὸ BE πρὸς τὸ ἀπὸ $ΕΓ$, τὸ ἀπὸ EK πρὸς τὸ ἀπὸ KZ . ἀλλ' ὥς τὸ ἀπὸ BE πρὸς τὸ ἀπὸ $ΕΓ$, τὸ ὑπὸ $ΑΕΒ$ πρὸς τὸ ἀπὸ
 25 $ΕΓ$ καὶ ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὀρθίαν καὶ τὸ ὑπὸ HKE πρὸς τὸ ἀπὸ KZ . οὐκ ἄρα ἐστίν, ὥς τὸ ἀπὸ HKE πρὸς τὸ ἀπὸ KZ , τὸ ἀπὸ KE πρὸς τὸ ἀπὸ KZ . οὐκ

2. μείζων V; corr. p. ἡ] ὁ p. 16. $ΑΓΑ$] $ΑΓΔ$, $Δ$ e corr. m. 1, V; corr. p. 17. HZE] ZHE V; corr. p. 18. AB] c, AA v, et fort. V, in quo α et β difficulter distinguuntur; B A p. 23. τὸ ἀπὸ EK — 24. $ΕΓ$] om. V; corr. Comm.

HZA , et ducantur AG , GB , ZE , et BG ad A producantur. dico, non esse $\angle AZE < \angle GA$.



ZE enim aut
 rectae AB parallela
 est aut non parallela.

prius sit par-
allela; et

$$AE = EB;$$

itaque etiam

$$A\mathbb{H} = \mathbb{H}\Gamma$$

[Eucl. VI, 2]. et

ZE diametrus est; itaque recta in Z contingens rectae AG parallela est [prop. VI]. uerum etiam ZE rectae AB parallela est; $Z\Theta GA$ igitur parallelogrammum est; quare $\angle AZ\Theta = AG\Theta$ [Eucl. I, 34].

et quoniam est $AE = EB > EF$, $\angle AFB$ obtusus est [Eucl. II, 12]; itaque $\angle AFA$ acutus est. quare etiam $\angle AZE$ acutus. ergo $\angle HZE$ obtusus est.

iam EZ rectae AB parallela ne sit, et perpendicularis ducatur ZK ; itaque non est $\angle ABE = ZEA$.
uerum angulus rectus ad E positus angulo recto ad K posito aequalis est¹⁾); itaque non est [u. Pappi lemma XII] $BE^2 : E\Gamma^2 = EK^2 : KZ^2$. est autem $BE^2 : E\Gamma^2 = AE \times EB : E\Gamma^2 =$ latus transversum ad rectum [I, 21] $= HK \times KE : KZ^2$ [I, 37]. itaque non est $HK \times KE : KZ^2 = KE^2 : KZ^2$. ergo non est $HK = KE$. sumatur segmentum circuli

1) Verba οὐκ ἄρα — ZEK lin. 21—22 falsa sunt (possunt enim esse similes) et sine dubio subditiua.

25. τὴν ὁρθίαν] repet. mg. m. rec. V. 26. οὐκ ἔρα — 27.
KZ (pr.)] om. V; corr. Halley praeunte Commandino.

σονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ $XΞ$ πρὸς $ΤΞ$. ἀλλ' ὥς μὲν
 ἡ $ΠΤ$ πρὸς $ΤΟ$, τὸ ἀπὸ TN πρὸς τὸ ἀπὸ $ΤΟ$ καὶ
 τὸ ἀπὸ $ΒΕ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΕΓ$ καὶ ἡ πλαγία πρὸς τὴν
 ὀρθίαν καὶ τὸ ὑπὸ $ΗΚΕ$ πρὸς τὸ ἀπὸ KZ . τὸ ἄρα
 5 ὑπὸ $ΗΚΕ$ πρὸς τὸ ἀπὸ KZ ἐλάσσονα λόγον ἔχει
 ἥπερ ἡ $XΞ$ πρὸς $ΞΤ$, τουτέστι τὸ ὑπὸ $XΞΤ$ πρὸς τὸ
 ἀπὸ $ΞΤ$, τουτέστι τὸ ὑπὸ $NΞΜ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΞΤ$.
 εἰν ἄρα ποιήσωμεν, ὥς τὸ ὑπὸ $ΗΚΕ$ πρὸς τὸ ἀπὸ
 KZ , οὕτως τὸ ὑπὸ $MΞN$ πρὸς ἄλλο τι, ἔσται πρὸς
 10 μείζον τοῦ ἀπὸ $ΞΤ$. ἔστω πρὸς τὸ ἀπὸ $ΞΦ$. ἐπεὶ
 οὖν ἔστιν, ὥς ἡ HK πρὸς KE , οὕτως ἡ $NΞ$ πρὸς
 $ΞΜ$, καὶ πρὸς ὀρθάς εἰσιν αἱ KZ , $ΞΦ$, καὶ ἔστιν,
 ὥς τὸ ὑπὸ $ΗΚΕ$ πρὸς τὸ ἀπὸ KZ , τὸ ὑπὸ $MΞN$
 πρὸς τὸ ἀπὸ $ΞΦ$, διὰ ταῦτα ἴση ἔστιν ἡ ὑπὸ HZE γωνία
 15 τῇ ὑπὸ $MΦN$. μείζων ἄρα ἡ ὑπὸ MTN , τουτέστιν
 ἡ ὑπὸ $ΑΓΒ$, τῆς ὑπὸ HZE γωνίας, ἡ δὲ ἐφεξῆς ἡ
 ὑπὸ $AZΘ$ μείζων ἔστι τῆς ὑπὸ $ΑΓΘ$.
 οὖν ἐλάσσων ἄρα ἡ ὑπὸ $AZΘ$ τῆς ὑπὸ $ΑΓΘ$.

νγ'.

20 Τῆς δοθείσης ἐλλείψεως ἐφαπτομένην ἀγαγεῖν, ἥτις
 πρὸς τῇ διὰ τῆς ἀφῆς ἀγομένη διαμέτρῳ γωνίαν
 ποιήσει ἴσην τῇ δοθείσῃ ὀξείᾳ· δεῖ δὴ τὴν διδομένην
 ὀξείαν γωνίαν μὴ ἐλάσσονα εἶναι τῆς ἐφεξῆς τῇ περι-
 εχομένῃ ὑπὸ τῶν πρὸς μέσῃ τὴν τομὴν κλωμένων
 25 εὐθειῶν.

ἔστω ἡ δοθεῖσα ἐλλειψις, ἥς μείζων μὲν ἄξων ὁ
 AB , ἐλάσσων δὲ ὁ $ΓΔ$, κέντρον δὲ τὸ E , καὶ ἐπε-
 ζεύχθωσαν αἱ $ΑΓ$, $ΓΒ$, ἡ δὲ δοθεῖσα γωνία ἔστω ἡ

1. $XΞ$] p c, corr. ex XT m. 1 V. 7. $NΞM$] c, $Ξ$ corr.
 ex $Γ$ m. 1 V. 9. $MΞN$] $MNΞ$ V; corr. p (τῶν $NΞ$, $ΞΜ$).

$IT:TO = TN^2:TO^2$ [Eucl. VI, 8 coroll.; VI, 19 coroll.]
 $= BE^2:EI^2 =$ latus transuersum ad rectum [I, 21] =
 $HK \times KE:KZ^2$ [I, 37]. itaque

$$HK \times KE:KZ^2 < XE:ET,$$

hoc est $< XE \times ET:ET^2$, hoc est [Eucl. III, 35]
 $HK \times KE:KZ^2 < NE \times EM:ET^2$. itaque si fe-
 cerimus, ut $HK \times KE:KZ^2$, ita $ME \times EN$ ad aliam
 aliquam magnitudinem, erit ad maiorem quam ET^2
 [Eucl. V, 10]. sit

$$HK \times KE:KZ^2 = ME \times EN:EP^2.$$

iam quoniam est $HK:KE = NE:EM$, perpendi-
 cularesque sunt KZ , EP , et est

$$HK \times KE:KZ^2 = ME \times EN:EP^2,$$

erit [u. Pappi lemma XI] $\angle HZE = M\Phi N$. itaque
 $\angle MTN > HZE$ [Eucl. I, 21], hoc est

$$\angle A\Gamma B > HZE,$$

et angulus deinceps positus $\angle AZ\Theta > A\Gamma\Theta$ [Eucl. I, 13].

ergo non est $\angle AZ\Theta < A\Gamma\Theta$.

LIII.

Datam ellipsim contingentem rectam ducere, quae
 ad diametrum per punctum contactus ductam angulum
 efficiat aequalem dato angulo acuto; oportet igitur,
 datum angulum acutum non minorem esse angulo,
 qui deinceps positus est angulo rectis ad mediam sec-
 tionem fractis comprehenso [prop. LII].

sit data ellipsis, cuius maior axis sit AB , minor
 autem ΓA , et centrum E , ducanturque $A\Gamma$, ΓB ,

13. KZ] p.c., corr. ex KH m. 1 V. $ME \times EN$] $MN \times EN$ V; $\tau\omega\nu$
 NE , EM p. 14. $\delta\sigma\eta$] om. V; correxi cum Memo. 16.
 HZE] p, H postea ins. m. 1 V; e corr. c. 19. $\nu\gamma'$] $\xi\gamma'$ m. rec. V

Τ οὐκ ἐλάσσων τῆς ὑπὸ $ΑΓΗ$. ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ $ΑΓΒ$ οὐκ ἐλάσσων ἐστὶ τῆς X .

ἡ $Τ$ ἄρα τῆς ὑπὸ $ΑΓΗ$ ἢ μελίων ἐστὶν ἢ ἴση.


ἔστω πρότερον ἴση· καὶ διὰ τοῦ E τῇ $ΒΓ$ παρ-
 5 ἄλληλος ἦχθω ἡ EK , καὶ διὰ τοῦ K ἐφαπτομένη τῆς
 τομῆς ἦχθω ἡ $KΘ$. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ $ΑΕ$ τῇ
 $ΕΒ$, καὶ ἐστὶν, ὥς ἡ $ΑΕ$ πρὸς $ΕΒ$, ἡ $ΑΖ$ πρὸς $ΖΓ$,
 ἴση ἄρα ἡ $ΑΖ$ τῇ $ΓΖ$. καὶ ἐστὶ διάμετρος ἡ $ΚΕ$.
 ἡ ἄρα κατὰ τὸ K ἐφαπτομένη τῆς τομῆς, τουτέστιν
 10 ἡ $ΘΚΗ$, παράλληλός ἐστι τῇ $ΓΑ$. ἔστι δὲ καὶ ἡ EK
 τῇ $ΗΒ$ παράλληλος· παραλληλόγραμμον ἄρα ἐστὶ τὸ
 $KΖΓΗ$. καὶ διὰ τοῦτο ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ $ΗΚΖ$ γωνία
 τῇ ὑπὸ $ΗΓΖ$ γωνίᾳ. ἡ δὲ ὑπὸ $ΗΓΖ$ τῇ δοθείσῃ,
 τουτέστι τῇ $Τ$, ἴση ἐστὶ· καὶ ἡ ὑπὸ $ΗΚΕ$ ἄρα ἐστὶν
 15 ἴση τῇ $Τ$.

ἔστω δὴ μελίων ἡ $Τ$ γωνία τῆς ὑπὸ $ΑΓΗ$. ἀνά-
 παλιν δὴ ἡ X τῆς ὑπὸ $ΑΓΒ$ ἐλάσσων ἐστὶν.

ἐκκείσθω κύκλος, καὶ ἀφρηθήσθω ἀπ' αὐτοῦ τμήμα,
 καὶ ἔστω τὸ $MNΠ$, δεχόμενον γωνίαν ἴσην τῇ X , καὶ
 20 τετυγμένω ἡ $MΠ$ δίχα κατὰ τὸ O , καὶ ἀπὸ τοῦ O τῇ
 $MΠ$ πρὸς ὀρθὰς ἦχθω ἡ $ΝΟΡ$, καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ
 NM , $NΠ$. ἡ ἄρα ὑπὸ $MNΠ$ γωνία τῆς ὑπὸ $ΑΓΒ$
 ἐλάσσων ἐστὶν. ἀλλὰ τῆς μὲν ὑπὸ $MNΠ$ ἡμίσειά
 ἐστὶν ἡ ὑπὸ MNO , τῆς δὲ ὑπὸ $ΑΓΒ$ ἡ ὑπὸ $ΑΓΕ$.
 25 ἐλάσσων ἄρα ἡ ὑπὸ MNO τῆς ὑπὸ $ΑΓΕ$. καὶ ὀρ-
 θαὶ αἱ πρὸς τοῖς E , O . ἡ ἄρα $ΑΕ$ πρὸς $ΕΓ$ μέλιονα
 λόγον ἔχει ἥπερ ἡ $ΟΜ$ πρὸς $ΟΝ$. ὥστε καὶ τὸ ἀπὸ

1. ὥστε] p c, ω e corr. m. 1 V. 8. τῇ $ΓΖ$] om. V; corr. p
 (τῇ $ΖΓ$). 13. $ΗΓΖ$] (pr.) p c, Γ corr. ex K m. 1 V. 14. ἐστὶν]
 c, ἐστὶ V. 19. τὸ $MNΠ$] τομὴ π V; corr. p. 24. MNO] p c,
 O e corr. m. 1 V.

[Eucl. I, 4]; itaque $MNO < AGE$. et anguli ad E , O positi recti sunt; itaque $AE:EG > OM:ON$ [u.



Pappi lemma V]. quare etiam $AE^2:EG^2 > MO^2:NO^2$. est autem $AE^2 = AE \times EB$ et $MO^2 = MO \times OH$ $= NO \times OP$ [Eucl. III, 35].

itaque

$AE \times EB:EG^2 > PO:ON$, hoc est [I, 21] latus transversum ad rectum maiorem rationem habet quam $PO:ON$.

fiat igitur, ut latus transversum ad rectum, ita $QA':A'\varsigma$, seceturque $Q\varsigma$ in ς in duas partes aequales. iam quoniam latus transversum ad rectum maiorem rationem habet quam $PO:ON$, erit etiam

$$QA':A'\varsigma > PO:ON.$$

et componendo

$$Q\varsigma:\varsigma A' > PN:NO.$$

sit Φ centrum circuli; itaque etiam

$$Q\varsigma:\varsigma A' > \Phi N:NO.$$

et dirimendo $A'Q:A'\varsigma > \Phi O:ON$. fiat igitur

$$A'Q:A'\varsigma = \Phi O:IO,$$

quae minor est quam ON [Eucl. V, 8], ducanturque parallelae $I\Xi$, ΞT , $\Phi\Psi$. erit igitur

$$A'Q:A'\varsigma = \Phi O:OI = \Psi\Sigma:\Sigma\Xi$$
 [Eucl. I, 34];

et componendo $Q\varsigma:\varsigma A' = \Psi\Xi:\Xi\Sigma$ [Eucl. V, 18].

In his figuris om. V angulos X , T et rectam $Q\varsigma$.

13. $\tilde{\omega}\sigma\tau\epsilon$] bis V (in alt. ω corr. ex κ m. 1); corr. pvc.

16. $A'\varsigma$] $\overline{\alpha\varsigma}$ V; corr. p. 19. $A'\varsigma$] $\overline{\alpha\varsigma}$ V; corr. p.

πρὸς $\Sigma\Xi$. καὶ συνθέντι, ὥς ἡ ς πρὸς $\varsigma A'$, ἡ $\Psi\Xi$
 πρὸς $\Xi\Sigma$. καὶ τῶν ἡγουμένων τὰ διπλάσια, ὥς ἡ
 $\Omega\varsigma$ πρὸς $\varsigma A'$, ἡ $T\Xi$ πρὸς $\Xi\Sigma$. καὶ διελόντι, ὥς ἡ
 $\Omega A'$ πρὸς $A'\varsigma$, τουτέστιν ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὀρθίαν,
 5 ἡ $T\Sigma$ πρὸς $\Sigma\Xi$. ἐπεξεύχθωσαν δὲ αἱ $M\Xi$, $\Xi\Pi$, καὶ
 συνεστάτω πρὸς τῇ AE εὐθείᾳ καὶ τῷ E σημείῳ τῇ
 ὑπὸ $M\Pi\Xi$ γωνίᾳ ἴση ἡ ὑπὸ AEK , καὶ διὰ τοῦ K
 ἐφαπτομένη τῆς τομῆς ἡχθῶ ἡ $K\Theta$, καὶ τεταγμένως
 κατῆχθῶ ἡ KA . ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ $M\Pi\Xi$
 10 γωνία τῇ ὑπὸ AEK , ὀρθὴ δὲ ἡ πρὸς τῷ Σ ὀρθῇ
 τῇ πρὸς τῷ A ἴση, ἰσογώνιον ἄρα ἐστὶ τὸ $\Xi\Sigma\Pi$ τῷ
 KEA τριγώνῳ. καὶ ἐστίν, ὥς ἡ πλαγία πρὸς τὴν
 ὀρθίαν, ἡ $T\Sigma$ πρὸς $\Sigma\Xi$, τουτέστι τὸ ὑπὸ $T\Sigma\Xi$ πρὸς
 τὸ ἄπὸ $\Xi\Sigma$, τουτέστι τὸ ὑπὸ $M\Sigma\Pi$ πρὸς τὸ ἄπὸ $\Xi\Sigma$.
 15 ὅμοιον ἄρα ἐστὶ τὸ $KA E$ τριγώνον τῷ $\Sigma\Xi\Pi$ τριγώνῳ
 καὶ τῷ $K\Theta E$ τὸ $M\Xi\Pi$, καὶ διὰ τοῦτο ἴση ἐστὶν ἡ
 ὑπὸ $M\Xi\Pi$ γωνία τῇ ὑπὸ ΘKE . ἡ δὲ ὑπὸ $M\Xi\Pi$ τῇ
 ὑπὸ $MN\Pi$ ἐστὶν ἴση, τουτέστι τῇ X . καὶ ἡ ὑπὸ
 ΘKE ἄρα τῇ X ἐστὶν ἴση. καὶ ἡ ἐφεξῆς ἄρα ἡ ὑπὸ
 20 HKE τῇ ἐφεξῆς τῇ T ἐστὶν ἴση.

διηκται ἄρα τῆς τομῆς ἐφαπτομένη ἡ $H\Theta$ πρὸς τῇ
 διὰ τῆς ἀφῆς ἀγομένη διαμέτρῳ τῇ KE γωνίαν ποι-
 οῦσα τὴν ὑπὸ HKE ἴσην τῇ δοθείσῃ τῇ T . ὅπερ
 ἔδει ποιῆσαι.

1. $\Sigma\Xi$] in ras. p, $E\Xi$ V. ἡ] (pr.) om. V; corr. p. $\varsigma A'$
 $\xi\alpha$ c et corr. ex ς α m. 1 V; corr. Memus; qz p. A et A' (α)
 inter se simillimas hab. V. 5. $\Sigma\Xi$] e corr. p, ΣZ V. 6.
 $\kappa\alpha\iota$] om. V; corr. p. 7. AEK] EAK V; corr. p. 10.
 τῇ] pvc, τ euan. in V. τῷ] τό V; corr. p. Σ] K V;
 corr. p. 11. τῷ] (pr.) τό V; corr. p. τῷ KEA] mg. repet.
 m. rec. V. 13. τουτέστι — 14. $\Xi\Sigma$ (pr.)] bis V (altero loco
 $T\Sigma Z$ pro $T\Sigma\Xi$); corr. p. 20. T] $\bar{\eta}$ V, ut lin. 23. 23.
 Ante ἴσην del. γωνίαν m. 1 V (om. pcv). ὅπερ ἔδει ποιῆσαι]

et sumptis duplis antecedentium [Eucl. V, 15]

$$\Omega\varsigma : \varsigma A' = T\Xi : \Xi\Sigma \text{ [Eucl. III, 3].}$$

et dirimendo [Eucl. V, 17] $\Omega A' : A'\varsigma = T\Sigma : \Sigma\Xi =$ latius transversum ad rectum. iam ducantur $M\Xi$, $\Xi\Pi$, et ad AE rectam punctumque eius E construatur $\angle AEK = M\Pi\Xi$ [Eucl. I, 23], per K autem sectionem contingens ducatur $K\Theta$ [prop XLIX], et ordinate ducatur KA . iam quoniam est $\angle M\Pi\Xi = AEK$, et rectus angulus ad Σ positus recto angulo ad A posito aequalis, aequianguli sunt trianguli $\Xi\Sigma\Pi$, KEA . est autem, ut latius transversum ad rectum, ita

$$T\Sigma : \Sigma\Xi = T\Sigma \times \Sigma\Xi : \Xi\Sigma^2 = \text{[Eucl. III, 35]}$$

$$M\Sigma \times \Sigma\Pi : \Xi\Sigma^2.$$

itaque¹⁾ trianguli $KA E$, $\Sigma\Xi\Pi$ et $K\Theta E$, $M\Xi\Pi$ similes sunt; quare erit $\angle M\Xi\Pi = \Theta KE$. est autem

$$\angle M\Xi\Pi = MN\Pi \text{ [Eucl. III, 21]} = X;$$

itaque etiam $\angle \Theta KE = X$. ergo etiam anguli iis deinceps positi aequales sunt [Eucl. I, 13] $HKE = \Upsilon$.

ergo sectionem contingens ducta est $H\Theta$ ad diametrum per punctum contactus ductam KE angulum efficiens HKE dato angulo Υ aequalem; quod oportebat fieri.

1) E lemme XI Pappi; nam ut latius transversum ad rectum, ita $\Theta A \times AE : KA^2$ (I, 37).


om. p. In fine (fol. 92^v; fol. 93^r occupant figurae huius prop.): *ἐνταῦθα δοκεῖ εἶναι τέλος τοῦ δευτέρου τῶν κωνικῶν Ἀπολλωνίου* m. 2 V.

ΚΩΝΙΚΩΝ γ'.

α'.

Ἐὰν κώνου τομῆς ἢ κύκλου περιφερείας εὐθεΐαι ἐπιψαύουσαι συμπίπτωσιν, ἄχθῳσι δὲ διὰ τῶν ἀφῶν διάμετροι συμπίπτουσιν ταῖς ἐφαπτομέναις, ἴσα ἔσται
5 τὰ γινόμενα κατὰ κορυφὴν τριγώνου.

Ἐστω κώνου τομὴ ἢ κύκλου περιφέρεια ἡ AB , καὶ τῆς AB ἐφαπτέσθωσαν ἡ τε AG καὶ ἡ BA συμπίπτουσιν κατὰ τὸ E , καὶ ἡχθῶσαν διὰ τῶν A, B διάμετροι
10 τῆς τομῆς αἱ GB, BA συμπίπτουσιν ταῖς ἐφαπτομέναις κατὰ τὰ G, A . λέγω, ὅτι ἴσον ἔστί τὸ $A\Delta E$ τριγώνον τῷ EBG .



ἡχθῶ γὰρ ἀπὸ τοῦ A παρὰ τὴν BA ἢ AZ . τεταγμένως ἄρα κατῆκται. ἔσται δὲ ἐπὶ μὲν τῆς παραβολῆς ἴσον τὸ $A\Delta BZ$ παραλληλόγραμμον τῷ AGZ τριγώνῳ, καὶ κοινοῖ ἀφαιρουμένου τοῦ $AEBZ$ λοιπὸν τὸ $A\Delta E$ τριγώνον ἴσον ἔστί τῷ GBE τριγώνῳ.

ἐπὶ δὲ τῶν λοιπῶν συμπιπτεύωσαν αἱ διάμετροι
20 κατὰ τὸ H κέντρον.


Titulum non habet V, in quo liber incipit fol. 93^v; Ἀπολλωνίου τοῦ Περργαίου κωνικῶν τρίτον p. 1. α'] m. rec. V, ut semper deinceps. 16. $A\Delta BZ$] $AB\Delta Z$ V; corr. Halley.

CONICORUM LIBER III.

I.

Si rectae coni sectionem uel circuli ambitum contingentes inter se concurrunt, et per puncta contactus diametri ducuntur cum contingentibus concurrentes, trianguli ita orti, qui ad uerticem inter se positi sunt, aequales erunt.

sit AB coni sectio uel ambitus circuli, et lineam AB contingant $A\Gamma$, $B\Delta$ in E concurrentes, per A ,




B autem diametri sectionis ducantur ΓB , ΔA cum contingentibus in Γ , Δ concurrentes. dico, esse

$$A\Delta E = EBG.$$

ducatur enim ab A rectae $B\Delta$ parallela AZ ; ordinate igitur ducta est [I def. 5]. in parabola igitur erit [I, 42] $A\Delta BZ = A\Gamma Z$, et ablato, quod commune est, $AEBZ$ reliquum erit $A\Delta E = \Gamma BE$.

in reliquis autem diametri in H centro concurrent.


ἐπεὶ οὖν κατῆκται ἡ AZ , καὶ ἐφάπτεται ἡ AG ,
τὸ ὑπὸ ZHG ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ BH . ἔστιν ἄρα, ὥς
ἡ ZH πρὸς HB , ἡ BH πρὸς HG . καὶ ὥς ἄρα ἡ



ZH πρὸς HG , τὸ ἀπὸ ZH πρὸς τὸ ἀπὸ HB . ἀλλ'
ὥς τὸ ἀπὸ ZH πρὸς τὸ ἀπὸ HB , τὸ AHZ πρὸς τὸ
 ΔHB , ὥς δὲ ἡ ZH πρὸς HG , τὸ AHZ πρὸς AHG .
καὶ ὥς ἄρα τὸ AHZ πρὸς τὸ AHG , τὸ AHZ πρὸς
 ΔHB . ἴσον ἄρα τὸ AHG τῷ ΔHB . κοινὸν ἀφ-
10 ῆσθω τὸ ΔHGE . λοιπὸν ἄρα τὸ AED τρίγωνον
ἴσον ἐστὶ τῷ GEB .

β'.

Τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων ἐὰν ἐπὶ τῆς τομῆς ἢ τῆς
τοῦ κύκλου περιφερείας ληφθῇ τι σημεῖον, καὶ δι'
αὐτοῦ παράλληλοι ἀχθῶσι
15 ταῖς ἐφαπτομέναις ἕως τῶν
διαμέτρων, τὸ γινόμενον
τετράπλευρον πρὸς τε μιᾶ
τῶν ἐφαπτομένων καὶ μιᾶ
τῶν διαμέτρων ἴσον ἔσται
20 τῷ γινόμενῳ τριγώνῳ πρὸς τε τῇ αὐτῇ ἐφαπτομένῃ καὶ
τῇ ἑτέρᾳ τῶν διαμέτρων.



ἔστω γὰρ κώνου τομὴ ἢ κύκλου περιφέρεια ἡ AB

5. ὥς] pc, corr. ex ó m. 1 V.

καὶ ἐφαπτόμεναι αἱ $ΑΕΓ$, $ΒΕΔ$, διάμετροι δὲ αἱ $ΑΔ$, $ΒΓ$, καὶ εἰλήφθω τι σημεῖον ἐπὶ τῆς τομῆς τὸ $Η$, καὶ ἤχθωσαν παρὰ τὰς ἐφαπτομένας αἱ $ΗΚΑ$, $ΗΜΖ$. λέγω, ὅτι ἴσον ἐστὶ τὸ $ΑΙΜ$ τρίγωνον τῷ $ΓΑΗΙ$ τε-
5 τετραπλεύρῳ.


ἐπεὶ γὰρ δέδεικται τὸ $ΗΚΜ$ τρίγωνον τῷ $ΑΔ$ τετραπλεύρῳ ἴσον, κοινὸν προσκείσθω ἢ ἀφηρήσθω τὸ $ΙΚ$ τετράπλευρον, καὶ γίνεται τὸ $ΑΙΜ$ τρίγωνον ἴσον τῷ $ΓΗ$ τετραπλεύρῳ.

10

γ'.

Τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων ἐὰν ἐπὶ τῆς τομῆς ἢ τῆς περιφερείας β' σημεῖα ληφθῇ, καὶ δι' αὐτῶν παράλληλοι ἀχθῶσι ταῖς ἐφαπτομέναις ἕως τῶν διαμέτρων, τα γινόμενα ὑπὸ τῶν ἀχθεισῶν τετράπλευρα, βεβηκότα
15 δὲ ἐπὶ τῶν διαμέτρων, ἴσα ἔσται ἀλλήλοις.


ἔστω γὰρ ἡ τομὴ καὶ αἱ ἐφαπτόμεναι καὶ αἱ διάμετροι, ὡς προείρηται, καὶ εἰλήφθω ἐπὶ τῆς τομῆς δύο τυχίντα σημεῖα τὰ $Ζ$, $Η$, καὶ διὰ μὲν τοῦ $Ζ$ ταῖς ἐφαπτομέναις παράλληλοι ἤχθωσαν ἢ τε $ΖΘΚΑ$ καὶ



20 ἢ $ΝΖΙΜ$, διὰ δὲ τοῦ $Η$ ἢ τε $ΗΞΟ$ καὶ ἢ $ΘΠΡ$. λέγω, ὅτι ἴσον ἐστὶ τὸ μὲν $ΑΗ$ τετράπλευρον τῷ $ΜΘ$, τὸ δὲ $ΑΝ$ τῷ $ΡΝ$.

4. $ΓΑΗΓ$] $V?$, p ; $ΓΑΗ$ c , et v , sed corr. $m. 2$. V in prop. Π quinque praeterea figg. habet.


et sumatur in sectione punctum aliquod H , ducanturque contingentibus parallelae $HK A$, $HM Z$. dico, esse $AIM = \Gamma AHI$.



nam quoniam demonstratum est [I, 42—43], esse $HKM = AA$, commune adiciatur uel auferatur quadrangulus IK . tum erit $AIM = \Gamma H$.

III.

Iisdem suppositis si in sectione uel ambitu circuli duo puncta sumuntur, et per ea rectae contingentibus parallelae usque ad diametros ducuntur, quadranguli



rectis ita ductis effecti et in diametris collocati inter se aequales erunt.

sit enim sectio et contingentes et diametri, sicut

ἐπεὶ γὰρ προδεδεικται ἴσον τὸ $P\Gamma A$ τρίγωνον
 τῷ ΓH τετραπλεύρῳ, τὸ δὲ AMI τῷ ΓZ , τὸ δὲ
 API τοῦ AMI μεῖζόν ἐστὶ τῷ PM τετραπλεύρῳ,
 καὶ τὸ ΓH ἄρα τοῦ ΓZ μεῖζόν ἐστὶ τῷ MP τετρα-
 5 πλεύρῳ· ὥστε τὸ ΓH ἴσον ἐστὶ τῷ ΓZ καὶ τῷ PM ,
 τουτέστι τῷ $\Gamma\Theta$ καὶ τῷ PZ . κοινὸν ἀφηγήσθω τὸ
 $\Gamma\Theta$. λοιπὸν ἄρα τὸ AH ἴσον ἐστὶ τῷ ΘM . καὶ ὅλον
 ἄρα τὸ AN τῷ PN ἴσον ἐστίν.

δ'.

10 Ἐὰν τῶν ἀντικειμένων δύο εὐθεῖαι ἐπιψαύουσαι
 συμπέπτωσιν ἀλλήλαις, ἀχθῶσι δὲ διὰ τῶν ἀφῶν διά-
 μετροι συμπέπτουσιν ταῖς ἐφαπτομέναις, ἴσα ἔσται τα
 πρὸς ταῖς ἐφαπτομέναις τρίγωνα.

ἔστωσαν ἀντικείμεναι αἱ A, B , αἱ δὲ ἐφαπτόμεναι
 15 αὐτῶν αἱ AG, BG συμπίπτουσιν κατὰ τὸ Γ , κέντρον
 δὲ ἔστω τῶν τομῶν τὸ Δ , καὶ ἐπεζεύχθω ἡ AB καὶ
 ἡ $\Gamma\Delta$ καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ E , ἐπεζεύχθωσαν δὲ
 καὶ αἱ $\Delta A, \Delta B$ καὶ ἐκβεβλήσθωσαν ἐπὶ τὰ Z, H .
 λέγω, ὅτι ἴσον ἐστὶ τὸ $AH\Delta$ τρίγωνον τῷ $B\Delta Z$, τὸ
 20 δὲ AGZ τῷ BGH .

ἤχθω γὰρ διὰ τοῦ Θ ἐφαπτομένη τῆς τομῆς ἡ
 ΘA . παράλληλος ἄρα ἐστὶ τῇ AH . καὶ ἐπεὶ ἴση
 ἐστὶν ἡ ΔA τῇ $\Delta\Theta$, ἴσον ἂν εἴη τὸ $AH\Delta$ τρίγωνον
 τῷ $\Theta\Delta A$. ἀλλὰ τὸ $\Delta\Theta A$ τῷ $B\Delta Z$ ἐστὶν ἴσον· καὶ
 25 τὸ $AH\Delta$ ἄρα τῷ $B\Delta Z$ ἐστὶν ἴσον. ὥστε καὶ τὸ AGZ
 τῷ BGH ἴσον.


antea diximus, sumantur autem in sectione duo quaelibet puncta Z, H , et per Z contingentibus parallelae ducantur $Z\Theta KA$, $NZIM$, per H autem $H\Xi O$, $\Theta\Pi P$. dico, esse $AH = M\Theta$, $AN = PN$.

quoniam enim antea demonstraui[mus] [prop. II], esse $P\Pi A = \Gamma H$, $AMI = \Gamma Z$, et $AP\Pi = AMI + \Pi M$, erit etiam $\Gamma H = \Gamma Z + \Pi M$. itaque $\Gamma H = \Gamma\Theta + PZ$. auferatur, quod commune est, $\Gamma\Theta$; reliquum igitur $AH = \Theta M$. ergo $AN = PN$.

IV.

Si duae rectae sectiones oppositas contingentes inter se concurrunt, et per puncta contactus diametri ducuntur cum contingentibus concurrentes, trianguli ad contingentes positi aequales erunt.

sint A, B sectiones oppositae, easque contingentes $A\Gamma$, $B\Gamma$ in Γ concurrant, centrum autem sectionum



sit Δ , ducaturque AB et $\Gamma\Delta$, quae ad E producat, et ducantur etiam ΔA , $B\Delta$ producanturque ad Z, H . dico, esse

$$AH\Delta = B\Delta Z$$

$$\text{et } A\Gamma Z = B\Gamma H.$$

per Θ enim sectionem contingens ducatur ΘA ; ea igitur rectae AH parallela est [Eutocius ad I, 44]. et quoniam est [I, 30] $A\Delta = \Delta\Theta$, erit $AH\Delta = \Theta A\Delta$ [Eucl. VI, 19]. est autem $\Delta\Theta A = B\Delta Z$ [prop. I]; quare etiam $AH\Delta = B\Delta Z$. ergo etiam $A\Gamma Z = B\Gamma H$.

ε'.

Ἐὰν τῶν ἀντικειμένων δύο εὐθεῖαι ἐπιψάφουσιν
 συμπίπτωσι, καὶ ληφθῇ ἐφ' ὁποτέρᾳ τῶν τομῶν ση-
 μεῖόν τι, καὶ ἀπ' αὐτοῦ ἄχθῶσι δύο εὐθεῖαι, ἡ μὲν
 5 παρὰ τὴν ἐφαπτομένην, ἡ δὲ παρὰ τὴν τὰς ἀφᾶς
 ἐπιξενγνύουσιν, τὸ γινόμενον ὑπ' αὐτῶν τριγώνον
 πρὸς τῇ διὰ τῆς συμπτώσεως ἡγμένη διαμέτρῳ τοῦ
 ἀπολαμβανομένου τριγώνου πρὸς τῇ συμπτώσει τῶν
 ἐφαπτομένων διαφέρει τῷ ἀπολαμβανομένῳ τριγώνῳ
 10 πρὸς τε τῇ ἐφαπτομένῃ καὶ τῇ διὰ τῆς ἀφῆς ἀγομένη
 διαμέτρῳ.

Ἔστωσαν ἀντικείμεναι αἱ A, B , ὧν κέντρον τὸ Γ ,
 καὶ ἐφαπτόμεναι αἱ EA, AZ συμπίπτουσιν κατὰ τὸ
 A , καὶ ἐπεξεύχθω ἡ EZ καὶ ἡ ΓA καὶ ἐκβεβλήσθω,
 15 καὶ αἱ $Z\Gamma, E\Gamma$ ἐπιξενχθεῖσαι ἐκβεβλήσθωσαν, καὶ
 εἰλήφθω τι σημεῖον ἐπὶ τῆς τομῆς τὸ H , καὶ δι' αὐτοῦ
 ἤχθω παρὰ μὲν τὴν EZ ἡ ΘHKA , παρὰ δὲ τὴν AZ
 ἡ HM . λέγω, ὅτι τὸ $H\Theta M$ τρίγωνον τοῦ $K\Theta A$ δια-
 φέρει τῷ KAZ .

20 ἐπεὶ γὰρ δέδεικται ἡ ΓA διάμετρος τῶν ἀντικει-
 μένων, ἡ δὲ EZ τεταγμένως ἐπ' αὐτὴν κατηγμένη, καὶ
 ἡ μὲν $H\Theta$ παρὰ τὴν EZ , ἡ δὲ MH παρὰ τὴν AZ ,
 τὸ ἄρα $MH\Theta$ τρίγωνον τοῦ $\Gamma A\Theta$ τριγώνου διαφέρει
 τῷ ΓAZ . ὥστε τὸ $MH\Theta$ τοῦ $K\Theta A$ τριγώνου δια-
 25 φέρει τῷ KZA .


καὶ φανερόν, ὅτι ἴσον γίνεται τὸ KZA τρίγωνον
 τῷ $MHK A$ τετραπλεύρῳ.

3. συμπίπτουσι V; corr. pc. 17. ΘHKA] V; $H\Theta KA$ p.

V.

Si duae rectae oppositas contingentes inter se concurrunt, et in utraque sectione punctum aliquod sumitur, ab eoque duae rectae ducuntur altera contingenti parallela, altera rectae puncta contactus coniungenti parallela, triangulus ab iis ad diametrum per punctum concursus ductam effectus a triangulo ad punctum concursus contingentium absciso differt triangulo ad contingentem diametrumque per punctum contactus ductam absciso.

sint oppositae A, B , quarum centrum sit Γ , et contingentes $E\Delta, \Delta Z$ in Δ concurrant, ducaturque EZ et $\Gamma\Delta$, quae producat, et $Z\Gamma, E\Gamma$ ductae pro-



ducantur, sumaturque in sectione punctum aliquod H , et per id ducatur $\Theta H K \Delta$ rectae EZ parallela, HM autem rectae ΔZ parallela. dico, esse

$$H\Theta M = K\Theta \Delta + K\Delta Z.$$

quoniam enim demonstrauius [II, 39 et 38], $\Gamma\Delta$ diametrum esse oppositarum, et EZ ad eam ordinate ducta est, et $H\Theta$ rectae EZ parallela, MH autem rectae ΔZ parallela, erit [I, 45]

$$MH\Theta = \Gamma\Delta\Theta + \Gamma\Delta Z.$$

ergo $MH\Theta = K\Theta \Delta + K\Delta Z$.

et manifestum est, esse $KZ\Delta = MHK\Delta$.

ς'.

Τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων ἐὰν ἐπὶ μιᾷ τῶν ἀντικειμένων ληφθῇ τι σημεῖον, καὶ ἀπ' αὐτοῦ παράλληλοι ἀχθῶσι ταῖς ἐφαπτομέναις συμπίπτουσαι ταῖς τε ἐφαπτομέναις καὶ ταῖς διαμέτροις, τὸ γινόμενον ὑπ' αὐτῶν
5 τετράπλευρον πρὸς τῇ μιᾷ τῶν ἐφαπτομένων καὶ τῇ μιᾷ τῶν διαμέτρων ἴσον ἔσται τῷ γινομένῳ τριγώνῳ πρὸς τε τῇ αὐτῇ ἐφαπτομένῃ καὶ τῇ ἐτέρᾳ τῶν διαμέτρων.

ἔστωσαν ἀντικείμεναι, ὧν διάμετροι αἱ $ΑΕΓ$, $ΒΕΔ$,
10 καὶ τῆς $ΑΒ$ τομῆς ἐφαπτέσθωσαν αἱ $ΑΖ$, $ΒΗ$ συμπίπτουσαι ἀλλήλαις κατὰ τὸ $Θ$, εἰλήφθω δέ τι σημεῖον ἐπὶ τῆς τομῆς τὸ $Κ$, καὶ ἀπ' αὐτοῦ ταῖς ἐφαπτομέναις παράλληλοι ἡχθῶσαν αἱ $ΚΜΑ$, $ΚΝΞ$. λέγω, ὅτι τὸ $ΚΖ$ τετράπλευρον τῷ $ΑΙΝ$ τριγώνῳ ἔσται ἴσον.
15 ἐπεὶ οὖν ἀντικείμεναι αἱ $ΑΒ$, $ΓΔ$, καὶ τῆς $ΑΒ$ ἐφάπτεται ἡ $ΑΖ$ συμπίπτουσα τῇ $ΒΔ$, καὶ παρὰ τὴν $ΑΖ$ ἡκται ἡ $ΚΑ$, ἴσον ἔσται τὸ $ΑΙΝ$ τριγώνον τῷ $ΚΖ$ τετραπλεύρῳ.

ξ'.

20 Τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων ἐὰν ἐφ' ἑκατέρας τῶν τομῶν σημεία τινα ληφθῇ, καὶ ἀπ' αὐτῶν παράλληλοι ἀχθῶσι ταῖς ἐφαπτομέναις συμπίπτουσαι ταῖς τε ἐφαπτομέναις καὶ ταῖς διαμέτροις, τὰ γινόμενα ὑπὸ τῶν ἀχθεισῶν τετράπλευρα, βεβηκότα δὲ ἐπὶ τῶν διαμέτρων,
25 ἴσα ἔσται ἀλλήλοις.


ὑποκείσθω γὰρ τὰ προειρημένα, καὶ εἰλήφθω ἐφ' ἑκατέρας τῶν τομῶν σημεία τὰ $Κ$, $Α$, καὶ δι' αὐτῶν

2. ὑποκειμένων] repet. mg. m. rec. V. 8. τῇ] (alt.) om. V;
corr. p. 13. $ΚΜΑ$] $ΚΑΜ$ V; corr. p. 22. συμπίπτουσαι]
pcv; euan. V, rep. mg. m. rec.

VI.

Iisdem suppositis si in altera oppositarum punctum aliquod sumitur, et ab eo rectae contingentibus parallelae ducuntur et cum contingentibus et cum diametris concurrentes, quadrangulus ab iis ad alteram contingentium alteramque diametrum effectus aequalis erit triangulo ad eandem contingentem alteramque diametrum orto.

sint oppositae, quarum diametri sint AET , $BE\Delta$, et sectionem AB contingant AZ , BH inter se in Θ



concurrentes, sumatur autem in sectione punctum aliquod K , ab eoque contingentibus parallelae ducantur KMA , $KN\Xi$. dico, esse $KZ = AIN$.


iam quoniam AB , $\Gamma\Delta$ sectiones oppositae sunt, et sectionem AB contingit AZ cum $B\Delta$ concurrens, rectae autem AZ parallela ducta est KA , erit [prop. II] $AIN = KZ$.

VII.

Iisdem suppositis si in utraque sectione puncta aliqua sumuntur, et ab iis contingentibus parallelae ducuntur rectae et cum contingentibus et cum diametris concurrentes, quadranguli rectis ita ductis effecti et in diametris collocati inter se aequales erunt.

παρὰ μὲν τὴν AZ ἤχθωσαν ἡ $MKΠΡΧ$ καὶ ἡ $NΣΤΑΩ$,
παρὰ δὲ τὴν BH ἡ $NIOKΞ$ καὶ ἡ $XΦΤΑΨ$. λέγω,
ὅτι ἔσται τὰ τῆς προτάσεως.

ἐπεὶ γὰρ τὸ AOI τρί-
5 γωνον τῷ PO τετραπλεύρῳ
ἐστὶν ἴσον, κοινὸν προσ-
κείσθω τὸ EO . ὅλον ἄρα τὸ
 AEZ τρίγωνον ἴσον ἐστὶ
τῷ KE . ἔστι δὲ καὶ τὸ



10 BEH τρίγωνον ἴσον τῷ AE τετραπλεύρῳ, καὶ ἐστὶ
τὸ AEZ τρίγωνον ἴσον τῷ BHE . καὶ τὸ AE ἄρα
ἴσον ἐστὶ τῷ $IKPE$. κοινὸν προσκείσθω τὸ NE .
ὅλον ἄρα τὸ TK ἴσον ἐστὶ τῷ IA , καὶ τὸ $KΓ$ τῷ PA .

η'.

15 $Τῶν$ αὐτῶν ὑποκειμένων εἰλήφθω ἀντὶ τῶν K, A
τὰ $Γ, Δ$, καθ' ἃ συμβάλλουσιν αἱ διάμετροι ταῖς τομαῖς,
καὶ δι' αὐτῶν ἤχθωσαν αἱ παράλληλοι ταῖς ἐφαπ-
τομέναις.

λέγω, ὅτι ἴσον ἐστὶ τὸ $ΔΗ$ τετράπλευρον τῷ $ZΓ$
20 καὶ τὸ $ΞΙ$ τῷ OT .

ἐπεὶ γὰρ ἴσον ἐδείχθη τὸ $AHΘ$ τρίγωνον τῷ
 $ΘBZ$, καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ A ἐπὶ τὸ B παράλληλος τῇ ἀπὸ
τοῦ H ἐπὶ τὸ Z , ἀνάλογον ἄρα ἐστὶν, ὥς ἡ AE πρὸς
 EH , ἡ BE πρὸς EZ . καὶ ἀναστρέψαντι, ὥς ἡ EA
25 πρὸς AH , ἡ EB πρὸς BZ . ἔστι δὲ καί, ὥς ἡ $ΓΑ$
πρὸς AE , ἡ $ΔB$ πρὸς BE . ἐκατέρα γὰρ ἐκατέρας
διπλῇ· δι' ἴσου ἄρα, ὥς ἡ $ΓΑ$ πρὸς AH , ἡ $ΔB$

4. γάρ] cp, et V, sed deinde del. 1 litt. m. 1. 12. τὸ
NE] cp, corr. ex τὸν ε V. 20. τό] τῷ V; corr. Halley. τῷ]
τό cp. 21. τῷ] cp, corr. ex τό m. 1 V. 23. H] p c v, euan. V.

supponantur enim, quae antea diximus, et in utraque sectione puncta sumantur K, A , per eaque rectae AZ parallelae ducantur $MK\Pi PX$, $N\Sigma T A\Omega$, rectae autem BH parallelae $NIOK\xi$, $X\Phi T A\Psi$. dico, euenire, quae in propositione dicta sunt.


nam quoniam est $AOI = PO$ [prop. II], commune adiciatur EO ; itaque erit $AEZ = KE$. est autem etiam [u. Eutocius ad prop. VI] $BEH = AE$, et [prop. I] $AEZ = BHE$; itaque etiam $AE = IKPE$. commune adiciatur NE ; ergo $TK = IA$; et etiam $KT = PA$.

VIII.

Iisdem suppositis pro K, A sumantur Γ, A , in quibus diametri cum sectionibus concurrant, per eaque ducantur rectae contingentibus parallelae.

dico, esse $\angle H = \angle \Gamma$, $\xi I = OT$.

quoniam enim demonstrauius, esse $AH\Theta = \Theta BZ$ [prop. I], et recta ab A ad B ducta rectae ab H ad



Z ductae parallela est [II, 39 et Pappi lemma I], erit [Eucl. VI, 4]

$$AE : EH = BE : EZ;$$

et conuertendo

$$EA : AH = EB : BZ$$

[Eucl. V, 19 coroll.]. est

autem etiam

$$\Gamma A : AE = \angle B : BE;$$

nam utraque utraque duplo maior est [I, 30]. ex aequo igitur [Eucl. V, 20] $\Gamma A : AH = \angle B : BZ$. et trianguli similes sunt propter parallelas; itaque

$$\Gamma T A : A\Theta H = \xi B A : \Theta B Z \text{ [Eucl. VI, 19].}$$

πρὸς BZ . καὶ ἐστὶν ὅμοια τὰ τρίγωνα διὰ τὰς παρ-
αλλήλους· ὥς ἄρα τὸ $\Gamma T A$ τρίγωνον πρὸς τὸ $A \Theta H$,
τὸ $\Xi B A$ πρὸς τὸ $\Theta B Z$. καὶ ἐναλλάξ· ἴσον δὲ τὸ
 $A H \Theta$ τῷ $\Theta Z B$. ἴσον ἄρα καὶ τὸ $T A \Gamma$ τῷ $A B \Xi$.
5 ὥν τὸ $A H \Theta$ ἴσον ἐδείχθη τῷ $B \Theta Z$. λοιπὸν ἄρα τὸ
 $A \Theta$ τετραπλευρον ἴσον τῷ $\Gamma \Theta$. ὥστε καὶ τὸ $A H$
τῷ ΓZ .

καὶ ἐπεὶ παράλληλός ἐστὶν ἡ ΓO τῇ $A Z$, ἴσον
ἐστὶ τὸ $\Gamma O E$ τρίγωνον τῷ $A E Z$. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ
10 $A E I$ τῷ $B E H$. ἀλλὰ τὸ $B E H$ τῷ $A E Z$ ἴσον· καὶ
τὸ $\Gamma O E$ ἄρα ἴσον τῷ $A E I$. ἐστὶ δὲ καὶ τὸ $H A$ τε-
τραπλευρον ἴσον τῷ $Z \Gamma$. ὅλον ἄρα τὸ ΞI ἴσον ἐστὶ
τῷ $O T$.

θ'.

15 $T\omega\upsilon\alpha\upsilon\tau\omega\upsilon\iota\upsilon$ ὑποκειμένων ἐὰν τὸ μὲν ἕτερον τῶν
σημείων μεταξὺ ἧ τῶν διαμέτρων, οἷον τὸ K , τὸ δὲ
ἕτερον ἐν τῶν Γ, A ταυτόν, οἷον τὸ Γ , καὶ ἀχθῶσιν
αἱ παράλληλοι, λέγω, ὅτι ἴσον ἐστὶ τὸ $\Gamma E O$ τρίγωνον
τῷ $K E$ τετραπλεύρῳ καὶ τὸ $A O$ τῷ $A M$.
20 τοῦτο δὲ φανερόν. ἐπεὶ γὰρ ἴσον ἐδείχθη τὸ $\Gamma E O$
τρίγωνον τῷ $A E Z$, τὸ δὲ $A E Z$ ἴσον τῷ $K E$ τε-
τραπλεύρῳ, καὶ τὸ $\Gamma E O$ ἄρα ἴσον τῷ $K E$ τετραπλεύρῳ.
ὥστε καὶ τὸ $\Gamma P M$ ἴσον ἐστὶ τῷ $K O$, καὶ τὸ $K \Gamma$ ἴσον
τῷ $A O$.

ι'.

25 $T\omega\upsilon\alpha\upsilon\tau\omega\upsilon\iota\upsilon$ ὑποκειμένων εἰλήφθω τὰ K, A σημεία
μὴ καθ' ὃ συμβάλλουσιν αἱ διάμετροι ταῖς τομαῖς.
δεικτέον δὴ, ὅτι ἴσον ἐστὶ τὸ $A T P X$ τετραπλευρον
τῷ $\Omega X K I$ τετραπλεύρῳ.

4. $A B \Xi$] $A E \Xi$ V; corr. p ($\Xi A B$).

et permutando [Eucl. V, 16]; est autem [prop. I] $\angle H\Theta = \Theta ZB$; quare etiam $\angle A\Gamma = \angle B\Xi$.

quorum est $\angle H\Theta = \angle \Theta Z$, ut demonstraui-
mus; itaque reliquum $\angle \Theta = \angle \Gamma\Theta$. quare etiam $\angle H = \angle \Gamma Z$.

et quoniam $\Gamma O, AZ$ parallelae sunt, erit [Eucl. VI, 19] $\angle O E = \angle E Z$.¹⁾ eodem autem modo etiam

$$\angle E I = \angle B E H.$$


est autem $\angle B E H = \angle A E Z$ [prop. I]; quare etiam

$$\angle O E = \angle E I.$$

est autem etiam $\angle H A = \angle \Gamma Z$; ergo $\angle \Xi I = \angle O T$.

IX.

Iisdem suppositis si alterum punctum inter diametros est ut K , alterum autem idem atque alterutrum punctorum Γ, A ut Γ , et ducuntur parallelae, dico, esse $\angle E O = \angle K E$, $\angle O = \angle A M$.



et hoc manifestum est. quoniam enim demonstraui-
mus [Eucl. VI, 19; cfr. prop. VIII], esse $\angle E O = \angle A E Z$,

et est $\angle A E Z = \angle K E$ [Eutocius ad prop. VI], erit etiam $\angle E O = \angle K E$. ergo etiam $\angle P M = \angle K O$ et $\angle \Gamma^2 = \angle A O$.

X.

Iisdem suppositis puncta K, A ne sumantur, ubi diametri cum sectionibus concurrunt.

demonstrandum igitur, esse $\angle T P X = \angle X K I$.

1) Nam $\angle E = \angle A$ (I, 30).

2) H. e. $\angle K M \Gamma A$.


ἐπεὶ γὰρ ἐφάπτονται αἱ AZ , BH , καὶ διὰ τῶν
 ἀφῶν διάμετροί εἰσιν αἱ AE , BE , καὶ παρὰ τὰς
 ἐφαπτομένας εἰσὶν αἱ AT ,
 KI , μετρίον ἐστὶ τὸ TTE
 5 τρίγωνον τοῦ $\Gamma\Omega A$ τῷ
 EZA . ὁμοίως δὲ καὶ τὸ
 ΞEI τοῦ ΞPK μετρίον ἐστὶ
 τῷ BEH . ἴσον δὲ τὸ AEZ
 τῷ BEH · τῷ αὐτῷ ἄρα
 10 ὑπερέχει τό τε $TE\Gamma$ τοῦ
 $\Gamma\Omega A$ καὶ τὸ ΞEI τοῦ
 ΞPK . τὸ TTE ἄρα μετὰ
 τοῦ ΞPK ἴσον ἐστὶ τῷ
 ΞEI μετὰ τοῦ $\Gamma\Omega A$. κοινὸν προσκείσθω τὸ $K\Xi ETAX$.
 15 τὸ $ATPX$ ἄρα τετράπλευρον ἴσον ἐστὶ τῷ ΩXKI
 τετραπλεύρῳ.

ια'.

Τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων ἔαν ἐφ' ὁποτέρας τῶν
 τομῶν σημείον τι ληφθῇ, καὶ ἀπ' αὐτοῦ παράλληλοι
 20 ἀχθῶσιν ἡ μὲν παρὰ τὴν ἐφαπτομένην, ἡ δὲ παρὰ τὴν
 τὰς ἀφὰς ἐπιξενγνίσουσιν, τὸ γινόμενον ὑπ' αὐτῶν
 τρίγωνον πρὸς τῇ διὰ τῆς συμπτώσεως τῶν ἐφαπτομένων
 ἡγμένη διαμέτρῳ διαφέρει τοῦ ἀπολαμβανομένου τρι-
 γώνου πρὸς τε τῇ ἐφαπτομένῃ καὶ τῇ διὰ τῆς ἀφῆς
 25 ἡγμένη διαμέτρῳ τῷ ἀπολαμβανομένῳ τριγώνῳ πρὸς
 τῇ συμπτώσει τῶν ἐφαπτομένων.

ἔστωσαν ἀντικείμεναι αἱ AB , ΓA , καὶ ἐφαπτόμεναι
 αἱ AE , $A\Gamma$ συμπιπτεύσαν κατὰ τὸ E , καὶ ἔστω

5. $\Gamma\Omega A$] $\rho\epsilon\nu$, Ω e corr. m. 1 V. 9. τῷ] (alt.) $\rho\epsilon$, corr. ex
 τό m. 1 V. αὐτῷ] $\rho\epsilon$, corr. ex αὐτό m. 1 V. 14. $K\Xi ETX$
 Vp; corr. Memus.



nam quoniam AZ , BH contingunt, et AE , BE
 diametri sunt per puncta contactus ductae, contingen-
 tibusque parallelae sunt AT , KI , erit

$$TTE = r\Omega A + EZA,$$


et eodem modo etiam $\angle E I = \angle P K + \angle B E H$ [I, 44].
est autem $\angle A E Z = \angle B E H$ [prop. I]. itaque erit

$$TER \div r\Omega A = \mathbb{E}EI \div \mathbb{E}PK.$$

quare erit $TPE + \angle PK = \angle EI + \angle Q A$. commune
adiiciatur $K\angle E P A X$; ergo erit $ATPX = \angle XKI$.

XI.

Iisdem suppositis si in utralibet sectione punctum aliquod sumitur, et ab eo rectae ducuntur parallelae altera contingenti, altera rectae puncta contactus coniungenti, triangulus ab iis ad diametrum per punctum concursus contingentium ductam effectus a triangulo absciso ad contingentem diametrumque per punctum



contactus ductam differt
triangulo ad punctum
concursum contingen-
tium absciso.

sint oppositae AB , $\Gamma\Delta$, et contingentes AE , ΔE in E concurrant, centrum autem sit Θ , ducanturque $A\Delta$,

EOH , et in sectione AB punctum aliquod sumatur B , et per id ducatur BZA rectae AH parallela, BM autem rectae AE parallela. dico, esse $BZM = AK\Lambda + KEZ$.

In V duae praeterea ad prop. XI figurae sunt.

κέντρον τὸ Θ , καὶ ἐπεξεύχθωσαν ἡ τε $ΑΔ$ καὶ ἡ $ΕΘΗ$, εἰλήφθω δὲ ἐπὶ τῆς $ΑΒ$ τομῆς τυχὸν σημεῖον τὸ $Β$, καὶ δι' αὐτοῦ ἤχθωσαν παρὰ μὲν τὴν $ΑΗ$ ἢ $ΒΖΑ$, παρὰ δὲ τὴν $ΑΕ$ ἢ $ΒΜ$. λέγω, ὅτι τὸ $ΒΖΜ$
 5 τριγώνον τοῦ $ΑΚΑ$ διαφέρει τῷ $ΚΕΖ$.

ὅτι μὲν γὰρ ἡ $ΑΔ$ δίχα τέμνεται ὑπὸ τῆς $ΕΘ$, φανερόν, καὶ ὅτι ἡ $ΕΘ$ διάμετρος ἐστὶ συζυγῆς τῇ διὰ τοῦ Θ παρὰ τὴν $ΑΔ$ ἀρομένη· ὥστε κατηγμένη ἐστὶν ἡ $ΑΗ$ ἐπὶ τὴν $ΕΗ$.

10 ἐπεὶ οὖν διάμετρος ἐστὶν ἡ $ΗΕ$, καὶ ἐφάπτεται μὲν ἡ $ΑΕ$, κατηγμένη δὲ ἡ $ΑΗ$, ληφθέντος δὲ ἐπὶ τῆς τομῆς τοῦ $Β$ σημείου κατήχθησαν ἐπὶ τὴν $ΕΗ$ ἢ μὲν $ΒΖ$ παρὰ τὴν $ΑΗ$, ἢ δὲ $ΒΜ$ παρὰ τὴν $ΑΕ$, δῆλον, ὅτι τὸ $ΒΜΖ$ τριγώνον τοῦ $ΑΘΖ$ διαφέρει
 15 τῷ $\Theta ΑΕ$. ὥστε καὶ τὸ $ΒΖΜ$ τοῦ $ΑΚΑ$ διαφέρει τῷ $ΚΖΕ$.

καὶ συναποδέδεικται, ὅτι τὸ $ΒΚΕΜ$ τετράπλευρον ἴσον ἐστὶ τῷ $ΑΚΑ$ τριγώνῳ.

ιβ'.

20 Τῶν αὐτῶν ὄντων ἐὰν ἐπὶ μιᾷ τῶν τομῶν β σημεία ληφθῇ, καὶ ἀφ' ἑκατέρου παράλληλοι ἀχθῶσιν, ὁμοίως ἴσα ἔσται τὰ γινόμενα ὑπ' αὐτῶν τετράπλευρα.

ἔστω γὰρ τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον, καὶ εἰλήφθω ἐπὶ τῆς $ΑΒ$ τομῆς τυχόντα σημεία τὰ $Β, Κ$, καὶ δι' αὐτῶν
 25 ἤχθωσαν παράλληλοι τῇ $ΑΔ$ αἱ $ΑΒΜΝ$, $ΚΞΟΤΠ$, τῇ δὲ $ΑΕ$ αἱ $ΒΞΡ$, $ΑΚΣ$. λέγω, ὅτι ἴσον ἐστὶ τὸ $ΒΠ$ τῷ $ΚΡ$.

25. $ΑΒΜΝ$] $ΒΑΜΝ$ V; corr. p. 26. $ΑΚΣ$] $ΚΑΣ$ V; corr. p.

ἐπεὶ γὰρ δέδεικται ἴσον τὸ μὲν $ΑΟΠ$ τρίγωνον
 τῷ $ΚΟΕΣ$ τετραπλεύρῳ, τὸ δὲ $ΑΜΝ$ τῷ $ΒΜΕΡ$,
 λοιπὸν ἄρα τὸ $ΚΡ$ λιπὸν ἢ προσλαβὸν τὸ $ΒΟ$ ἴσον
 ἐστὶ τῷ $ΜΠ$. καὶ κοινοῦ προστεθέντος ἢ ἀφαιρου-
 5 μένου τοῦ $ΒΟ$ τὸ $ΒΠ$ ἴσον ἐστὶ τῷ $ΞΣ$.

ιγ'.

Ἐὰν ἐν ταῖς κατὰ συζυρίαν ἀντικειμέναις τῶν
 ἐφεξῆς τομῶν εὐθεῖαι ἐφαπτόμεναι συμπίπτωσι, καὶ
 διὰ τῶν ἀφῶν διάμετροι ἀχθῶσιν, ἴσα ἔσται τὰ τρι-
 10 γωνα, ὧν κορυφὴ κοινὴ τὸ κέντρον ἐστὶ τῶν ἀντι-
 κειμένων.

ἔστωσαν συζυγεῖς ἀντικείμεναι, ἐφ' ὧν τὰ $Α$, $Β$,
 $Γ$, $Δ$ σημεία, καὶ τῶν $Α$, $Β$ τομῶν ἐφαπτέσθωσαν
 αἱ $ΒΕ$, $ΑΕ$ συμπίπτουσαι κατὰ τὸ $Ε$, καὶ ἔστω κέν-
 15 τρον τὸ $Θ$, καὶ ἐπιζευχθεῖσαι αἱ $ΑΘ$, $ΒΘ$ ἐκβεβλή-
 σθωσαν ἐπὶ τὰ $Δ$, $Γ$. λέγω, ὅτι ἴσον ἐστὶ τὸ $ΒΖΘ$
 τρίγωνον τῷ $ΑΗΘ$ τριγώνῳ.

ἤχθωσαν γὰρ διὰ τῶν $Α$, $Θ$ παρὰ τὴν $ΒΕ$ αἱ
 $ΑΚ$, $ΑΘΜ$. ἐπεὶ οὖν ἐφάπτεται τῆς $Β$ τομῆς ἡ $ΒΖΕ$,
 20 καὶ διὰ τῆς ἀφῆς διάμετρος ἐστὶν ἡ $ΔΘΒ$, καὶ παρὰ
 τὴν $ΒΕ$ ἐστὶν ἡ $ΑΜ$, συζυγῆς ἐστὶν ἡ $ΑΜ$ διάμετρος
 τῇ $ΒΔ$ διαμέτρῳ ἡ καλουμένη δευτέρα διάμετρος·
 διὰ δὲ τοῦτο κατῆκται ἡ $ΑΚ$ τεταγμένως ἐπὶ τὴν
 $ΒΔ$. καὶ ἐφάπτεται ἡ $ΑΗ$ τὸ ἄρα ὑπὸ $ΚΘΗ$ ἴσον
 25 ἐστὶ τῷ ἀπὸ $ΒΘ$. ἔστιν ἄρα, ὥς ἡ $ΚΘ$ πρὸς $ΘΒ$, ἡ
 $ΒΘ$ πρὸς $ΗΘ$. ἀλλ' ὥς ἡ $ΚΘ$ πρὸς $ΘΒ$, ἡ $ΚΑ$ πρὸς

3. λειπόν V; corr. p. 4. προστιθεῖ V, προστιθέντος cv,
 corr. p; fort. προστιθεμένου. Deinde del. ἡ m. 1 V. 13.
 σημεία] delendum? 19. $ΑΘΜ$] $ΘΑΜ$ V; corr. p. 24. $ΚΘΗ$]
 $ΚΗΘ$ V; corr. Memus. 25. ἀπό] om. V; corr. p.

$ABMN, KΞOTΠ$ rectae AA parallelae, rectae autem AE parallelae $BΞP, AKΣ$. dico, esse $BΠ = KP$.

nam quoniam demonstratum est [prop. XI coroll.], esse $AOΠ = KOEΣ$ et $AMN = BMEP$, erit


$$KP \div BO = MΠ$$

uel¹⁾ $KP + BO = MΠ$. et communi adiecto uel ablato BO , erit $BΠ = ΞΣ$.

XIII.

Si in oppositis coniugatis rectae sectiones deinceps positas contingentes inter se concurrunt, et per puncta contactus diametri ducuntur, aequales erunt trianguli, quorum uertex communis centrum est oppositarum.

sint oppositae coniugatae, in quibus sint puncta $A, B, Γ, Δ$, et sectiones A, B contingant BE, AE



in E concurrentes, centrum autem sit $Θ$, et ductae $AΘ, BΘ$ ad $Δ, Γ$ producantur. dico, esse $BZΘ = AHΘ$.

ducantur enim per $A, Θ$ rectae BE parallelae AK ,

$AΘM$. iam quoniam sectionem B contingit BZE , et per punctum contactus diametrus ducta est $ΔΘB$, et rectae BE parallela est AM , AM diametrus est cum diametro $BΔ$ coniugata, secunda diametrus quae uocatur [II, 20]; qua de causa AK ad $BΔ$ ordinate ducta est [I def. 6]. et AH contingit; itaque erit [I, 38] $KΘ \times ΘH = BΘ^2$. quare [Eucl. VI, 17]

$$KΘ : ΘB = BΘ : HΘ.$$

nerum $KΘ : ΘB = KA : BZ = AΘ : ΘZ$ [Eucl. VI, 4];

1) In secunda figura.

BZ καὶ ἡ $A\Theta$ πρὸς ΘZ . καὶ ὥς ἄρα ἡ $A\Theta$ πρὸς $Z\Theta$, ἡ $B\Theta$ πρὸς $H\Theta$. καὶ εἰσιν αἱ ὑπὸ $B\Theta Z$, $H\Theta Z$ δυσὲν ὀρθαῖς ἴσαι. ἴσον ἄρα τὸ $AH\Theta$ τριγώνου τῷ $B\Theta Z$ τριγώνῳ.

5

ιδ'.

Τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων ἐὰν ἐφ' ὁποτέρᾳ τῶν τομῶν σημειόν τι ληφθῇ, καὶ ἀπ' αὐτοῦ παράλληλοι ἀχθῶσι ταῖς ἐφαπτομέναις ἕως τῶν διαμέτρων, τὸ γινόμενον πρὸς τῷ κέντρῳ τριγώνου τοῦ γινομένου περὶ τὴν αὐτὴν γωνίαν τριγώνου διοίσει τριγώνῳ τῷ βάσει μὲν ἔχοντι τὴν ἐφαπτομένην, κορυφὴν δὲ τὸ κέντρον.

ἔστω τὰ μὲν ἄλλα τὰ αὐτά, εἰλήφθω δὲ τι σημεῖον ἐπὶ τῆς B τομῆς τὸ Ξ , καὶ δι' αὐτοῦ παρὰ μὲν τὴν AH ἡχθῶσαν ἡ $\Xi P\Sigma$, παρὰ δὲ τὴν BE ἡ ΞTO . λέγω, ὅτι τὸ $O\Theta T$ τριγώνου τοῦ $\Xi\Sigma T$ διὰφέρει τῷ ΘBZ .

ἡχθῶ γὰρ ἀπὸ τοῦ A παρὰ τὴν BZ ἡ AT . ἐπεὶ οὖν διὰ τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον τῆς AA τομῆς διάμετρος μὲν ἐστὶν ἡ $A\Theta M$, συζυγῆς δὲ αὐτῇ καὶ δευτέρᾳ διάμετρος ἡ $A\Theta B$, καὶ ἀπὸ τοῦ A ἐφάπτεται ἡ AH , κατῆκται δὲ παρὰ τὴν AM ἡ AT , ἔξει ἡ AT πρὸς τὴν TH τὸν συγκείμενον λόγον ἐκ τῶν ὅν ἔχει ἡ ΘT πρὸς TA καὶ ἐκ τοῦ ὅν ἔχει ἡ τοῦ πρὸς τῇ AM εἰδους πλαγία πλευρὰ πρὸς τὴν ὀρθίαν. ἀλλ' ὥς ἡ AT πρὸς TH , ἡ ΞT πρὸς $T\Sigma$, ὥς δὲ ἡ ΘT πρὸς TA , ἡ ΘT πρὸς TO καὶ ἡ ΘB πρὸς BZ ,

4. $B\Theta Z$] $A\Theta Z$ V; corr. Memus. 15. ἡχθῶ? ΞTO] ΞOT V; corr. p. 18. BZ] cnp; in V obscurum est B. 22. AM] p, A e corr. m. 1 V; corr. ex AM c; AM v. 24. ἐκ τοῦ] ἐξ οὗ V; corr. ego; τοῦ p. 27. TO] cnp, O obscuratum in V.

ὥς δὲ ἡ τοῦ πρὸς τῇ AM εἵδους πλαγία πρὸς τὴν
 ὀρθίαν, ἡ τοῦ πρὸς τῇ BA ὀρθία πρὸς τὴν πλαγίαν.
 ἔξει ἄρα ἡ ΞT πρὸς $T\Sigma$ τὸν συνημμένον λόγον ἔκ-
 τε τοῦ ὅν ἔχει ἡ ΘB πρὸς BZ , τουτέστιν ἡ ΘT
 5 πρὸς TO , καὶ τοῦ ὅν ἔχει ἡ τοῦ πρὸς τῇ BA εἵδους
 ὀρθία πλευρὰ πρὸς τὴν πλαγίαν. καὶ διὰ τὰ δεδειγ-
 μένα ἐν τῷ μ' τοῦ α' βιβλίου τὸ $T\Theta O$ τρίγωνον
 τοῦ $\Xi T\Sigma$ διαφέρει τῷ $BZ\Theta$.
 ὥστε καὶ τῷ $AH\Theta$.

10

ιε'.

Ἐὰν μιᾶς τῶν κατὰ συζυγίαν ἀντικειμένων εὐθεΐαι
 ἐπιψάνουσαι συμπέτωσι, καὶ διὰ τῶν ἁπλῶν διαμέτρων
 ἀχθῶσι, ληφθῇ δέ τι σημεῖον ἐφ' ὁποτέρας τῶν συ-
 ζυγῶν τομῶν, καὶ ἀπ' αὐτοῦ παράλληλοι ἀχθῶσι ταῖς
 15 ἐφαπτομέναις ἕως τῶν διαμέτρων, τὸ γινόμενον ὑπ'
 αὐτῶν πρὸς τῇ τομῇ τριγώνον τοῦ γινομένου τρι-
 γώνου πρὸς τῷ κέντρῳ μεζζόν ἐστι τριγώνῳ τῷ βάσει
 μὲν ἔχοντι τὴν ἐφαπτομένην, κορυφὴν δὲ τὸ κέντρον
 τῶν ἀντικειμένων.
 20 ἔστωσαν κατὰ συζυγίαν ἀντικείμεναι αἱ AB , $H\Sigma$,
 T , Ξ , ὧν κέντρον τὸ Θ , καὶ τῆς AB τομῆς ἐφαπτέ-
 σθωσαν αἱ $A\Delta E$, $B\Delta \Gamma$, καὶ διὰ τῶν A , B ἁπλῶν
 ἤχθωσαν διάμετροι αἱ $A\Theta Z\Phi$, $B\Theta T$, καὶ εἰλήφθω
 ἐπὶ τῆς $H\Sigma$ τομῆς σημείον τι τὸ Σ , καὶ δι' αὐτοῦ
 25 ἤχθω παρὰ μὲν τὴν $B\Gamma$ ἢ $\Sigma Z\Lambda$, παρὰ δὲ τὴν AE
 ἢ ΣT . λέγω, ὅτι τὸ $\Sigma\Lambda T$ τριγώνον τοῦ $\Theta\Lambda Z$ τρι-
 γώνου μεζζόν ἐστι τῷ $\Theta\Gamma B$.
 ἤχθω γὰρ διὰ τοῦ Θ παρὰ τὴν $B\Gamma$ ἢ $\Xi\Theta H$, παρὰ

5. TO] $T\Theta V$; corr. Memus. 23. $B\Theta T$] $T V$; corr. p.
 28. τήν] νp , τή V ; τό c.

rectum, ita latus rectum figurae ad $B\Delta$ adplicatae ad transuersum [I, 56]. itaque ratio $\Xi T : T\Sigma$ rationem habebit compositam ex ratione $\Theta B : BZ$ siue $\Theta T : TO$ et ea, quam habet latus rectum figurae ad $B\Delta$ adplicatae ad transuersum. et propter ea, quae in propositione XLI libri primi demonstrauius, erit

$$T\Theta O = \Xi T\Sigma + BZ\Theta.$$

quare etiam $T\Theta O = \Xi T\Sigma + AH\Theta$ [prop. XIII].

XV.

Si rectae unam sectionum oppositarum coniugarum contingentes concurrunt, et per puncta contactus diametri ducuntur, in quauis autem sectionum coniugarum punctum aliquod sumitur, et ab eo contingentibus parallelae rectae usque ad diametros ducuntur, triangulus ab iis ad sectionem effectus triangulo ad centrum orto maior est triangulo basim habenti contingentem, uerticem autem centrum oppositarum.


sint oppositae coniugatae AB , $H\Sigma$, T , Ξ , quarum centrum sit Θ , et sectionem AB contingant $A\Delta E$, $B\Delta\Gamma$, per A , B autem puncta contactus ducantur diametri $A\Theta Z\Phi$, $B\Theta T$, et in sectione $H\Sigma$ sumatur punctum aliquod Σ , et per id rectae $B\Gamma$ parallela ducatur ΣZA , rectae autem AE parallela ΣT . dico, esse $\Sigma AT = \Theta AZ + \Theta\Gamma B$.

ducatur enim per Θ rectae $B\Gamma$ parallela $\Xi\Theta H$, per H autem rectae AE parallela KIH , et rectae BT parallela ΣO ; manifestum igitur, esse ΞH , BT diametros coniugatas [II, 20], et rectam ΣO rectae BT parallelam ad ΘHO ordinate ductam esse [I def. 6], et $\Sigma A\Theta O$ parallelogrammum esse.

δὲ τὴν AE διὰ τοῦ H ἢ KIH , παρὰ δὲ τὴν BT ἢ ΣO · φανερόν δ' ἡ, ὅτι συζυγὴς ἐστὶ διάμετρος ἢ ΞH τῇ BT , καὶ ὅτι ἡ ΣO παράλληλος οὖσα τῇ BT κατῆκται τεταγμένως ἐπὶ τὴν ΘHO , καὶ ὅτι παραλ-
 5 ληλόγραμμόν ἐστὶ τὸ $\Sigma A \Theta O$.

ἐπεὶ οὖν ἐφάπτεται ἡ $B\Gamma$, καὶ διὰ τῆς ἀφῆς ἐστὶν ἡ $B\Theta$, καὶ ἑτέρα ἐφαπτομένη ἐστὶν ἡ AE , γεγυμένως ὡς ἡ $\angle B$ πρὸς BE , ἡ MN πρὸς τὴν διπλασίαν τῆς $B\Gamma$ ἢ ἄρα MN ἐστὶν ἡ καλουμένη ὀρθία τοῦ παρὰ
 10 τὴν BT εἰδους. διότι τετμήσθω ἡ MN κατὰ τὸ Π · ἐστὶν ἄρα, ὡς ἡ $\angle B$ πρὸς BE , ἡ $M\Pi$ πρὸς $B\Gamma$. πεποιήσθω δ' ἡ, ὡς ἡ ΞH πρὸς TB , ἡ TB πρὸς P · ἐστὶ δ' ἡ καὶ ἡ P ἡ καλουμένη ὀρθία τοῦ παρὰ τὴν ΞH εἰδους. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν, ὡς ἡ $\angle B$ πρὸς BE , ἡ
 15 $M\Pi$ πρὸς ΓB , ἀλλ' ὡς μὲν ἡ $\angle B$ πρὸς BE , τὸ ἀπὸ $\angle B$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\angle BE$, ὡς δὲ ἡ $M\Pi$ πρὸς ΓB , τὸ ὑπὸ $M\Pi$, $B\Theta$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\Gamma B\Theta$, ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ $\angle B$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\angle BE$, τὸ ὑπὸ ΠM , $B\Theta$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\Gamma B\Theta$. ἴσον δὲ τὸ ὑπὸ $M\Pi$, $B\Theta$ τῷ ἀπὸ ΘH ,
 20 διότι τὸ μὲν ἀπὸ ΞH ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ TB , MN , καὶ τὸ μὲν ὑπὸ $M\Pi$, $B\Theta$ τέταρτον τοῦ ὑπὸ TB , MN , τὸ δὲ ἀπὸ $H\Theta$ τέταρτον τοῦ ἀπὸ $H\Xi$ · ἐστὶν ἄρα, ὡς τὸ ἀπὸ $\angle B$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\angle BE$, τὸ ἀπὸ $H\Theta$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\Gamma B\Theta$. ἐναλλάξ, ὡς τὸ ἀπὸ $\angle B$ πρὸς τὸ
 25 ἀπὸ $H\Theta$, τὸ ὑπὸ $\angle BE$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\Gamma B\Theta$. ἀλλ' ὡς μὲν τὸ ἀπὸ $\angle B$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘH , τὸ $\angle BE$ τριγώνου πρὸς τὸ $H\Theta I$ · ὅμοια γάρ· ὡς δὲ τὸ ὑπὸ $\angle BE$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\Gamma B\Theta$, τὸ $\angle BE$ τριγώνου πρὸς τὸ $\Gamma B\Theta$ · ὡς ἄρα τὸ $\angle BE$ τριγώνου πρὸς τὸ $H\Theta I$, τὸ $\angle BE$ πρὸς

iam quoniam $B\Gamma$ contingit, et $B\Theta$ per punctum contactus ducta est, et alia contingens est AE , fiat



$\angle B : BE = MN : 2B\Gamma$; MN igitur latus est, rectum quod uocatur, figurae ad BT adplicatae [I, 50]. secetur MN in Π in duas partes aequales; itaque

$$\angle B : BE = M\Pi : B\Gamma.$$

fiat igitur $\Xi H : TB = TB : P$; itaque etiam P latus erit, rectum quod uocatur, figurae ad ΞH adplicatae [I, 56]. iam quoniam $\angle B : BE = M\Pi : \Gamma B$, uerum $\angle B : BE = \angle B^2 : \angle B \times BE$ et

$$M\Pi : \Gamma B = M\Pi \times B\Theta : \Gamma B \times B\Theta,$$

erit $\angle B^2 : \angle B \times BE = \Pi M \times B\Theta : \Gamma B \times B\Theta$. est autem $M\Pi \times B\Theta = \Theta H^2$, quia $\Xi H^2 = TB \times MN$ [I, 56], et [I, 30] $M\Pi \times B\Theta = \frac{1}{4} TB \times MN$,

$$H\Theta^2 = \frac{1}{4} H\Xi^2;$$

itaque erit $\angle B^2 : \angle B \times BE = H\Theta^2 : \Gamma B \times B\Theta$. permutando [Eucl. V, 16]

$$\angle B^2 : H\Theta^2 = \angle B \times BE : \Gamma B \times B\Theta.$$

In V praeter hanc figuram rectangula quaedam triangulique inueniuntur.

τὸ $\Gamma B \Theta$. ἴσον ἄρα ἐστὶ τὸ $H \Theta I$ τῷ $\Gamma B \Theta$ [τὸ ἄρα
 $H \Theta K$ τρίγωνον τοῦ $\Theta I K$ διαφέρει τῷ $I \Theta H$, τουτ-
ἐστὶ τῷ $\Gamma B \Theta$]. πάλιν ἐπεὶ ἡ ΘB πρὸς $B \Gamma$ τὸν συν-
ημμένον ἔχει λόγον ἕκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ ΘB πρὸς
5 $M \Pi$ καὶ ἡ ΠM πρὸς $B \Gamma$, ἀλλ' ὥς ἡ ΘB πρὸς $M \Pi$,
ἡ $T B$ πρὸς $M N$ καὶ ἡ P πρὸς ΞH , ὥς δὲ ἡ $M \Pi$
πρὸς $B \Gamma$, ἡ $\angle B$ πρὸς $B E$, ἔξει ἄρα ἡ ΘB πρὸς $B \Gamma$
τὸν συγκείμενον λόγον ἕκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ $\angle B$ πρὸς
 $B E$ καὶ ἡ P πρὸς ΞH . καὶ ἐπεὶ παράλληλός ἐστιν
10 ἡ $B \Gamma$ τῇ $\Sigma \Delta$, καὶ ὅμοιον τὸ $\Theta \Gamma B$ τρίγωνον τῷ
 $\Theta \Delta Z$, καὶ ἐστὶν, ὥς ἡ ΘB πρὸς ΓB , ἡ $\Theta \Delta$ πρὸς
 ΔZ , ἔξει ἄρα ἡ $\Theta \Delta$ πρὸς ΔZ τὸν συνημμένον λόγον
ἕκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ P πρὸς ΞH καὶ ἡ $\angle B$ πρὸς $B E$,
τουτέστιν ἡ ΘH πρὸς ΘI . ἐπεὶ οὖν ὑπερβολή ἐστιν
15 ἡ $H \Sigma$ διάμετρον ἔχουσα τὴν ΞH , ὁρθίαν δὲ τὴν P ,
καὶ ἀπὸ τινος σημείου τοῦ Σ κατῆκται ἡ ΣO , καὶ
ἀναγράφεται ἀπὸ μὲν τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τῆς ΘH
εἵδος τὸ $\Theta I H$, ἀπὸ δὲ τῆς κατηγμένης τῆς ΣO ἥτοι
τῆς $\Theta \Delta$ ἴσης αὐτῇ τὸ $\Theta \Delta Z$, ἀπὸ δὲ τῆς ΘO μεταξὺ
20 τοῦ κέντρου καὶ τῆς κατηγμένης ἥτοι τῆς $\Sigma \Delta$ ἴσης
αὐτῇ τὸ $\Sigma \Delta T$ εἶδος ὅμοιον τῷ ἀπὸ τῆς ἐκ τοῦ κέν-
τρου τῷ $\Theta I H$, καὶ ἔχει τοὺς συγκειμένους λόγους, ὥς
εἴρηται, τὸ $\Sigma \Delta T$ τρίγωνον τοῦ $\Theta \Delta Z$ μετ' ὅν ἐστι
τῷ $\Theta \Gamma B$.

25

ις'.

Ἐὰν κώνου τομῆς ἢ κύκλου περιφερείας δύο εὐ-
θεῖαι ἐπιψαύουσai συμπίπτωσιν, ἀπὸ δέ τινος σημείου

1. τὸ ἄρα — 3. $\Gamma B \Theta$] deleo; nam inutilia sunt. 2. τῷ
 $I \Theta H$] Ξ Θ η V; corr. pc. 6. ἡ P] η ρ V; corr. p. ΞH]
 ΞN V; corr. Memus. 7. $B E$] cp, $B E$ uel $K E$ V, $K E$ v. 9.
 ΞH] ΞN V; corr. Memus. 10. $B \Gamma$] B V; corr. p. καὶ]
bis V; corr. cp v. 19. ἴση V; corr. Memus.

est autem [Eucl. VI, 19] $\angle B^2 : \Theta H^2 = \angle BE : H\Theta I$; trianguli enim hi similes sunt [Eucl. I, 29]; et $\angle B \times BE : \Gamma B \times B\Theta = \angle BE : \Gamma B\Theta$ [Eucl. VI, 23]. itaque $\angle BE : H\Theta I = \angle BE : \Gamma B\Theta$. quare $H\Theta I = \Gamma B\Theta$ [Eucl. V, 9]. itaque erit

$$H\Theta K = \Theta IK + I\Theta H = \Theta IK + \Gamma B\Theta.$$

rursus quoniam est

$$\Theta B : B\Gamma = (\Theta B : M\Pi) \times (M\Pi : B\Gamma)$$

et $\Theta B : M\Pi = TB : MN$ [I, 30] $= P : \Xi H$ et

$$M\Pi : B\Gamma = \angle B : BE,$$

erit $\Theta B : B\Gamma = (\angle B : BE) \times (P : \Xi H)$. et quoniam $B\Gamma$, ΣA parallelae sunt, et trianguli $\Theta \Gamma B$, $\Theta A Z$ similes [Eucl. I, 29], et $\Theta B : \Gamma B = \Theta A : AZ$ [Eucl. VI, 4], erit

$$\begin{aligned} \Theta A : AZ &= (P : \Xi H) \times (\angle B : BE) \\ &= [\text{Eucl. VI, 4}] (P : \Xi H) \times (\Theta H : \Theta I). \end{aligned}$$

iam quoniam hyperbola est $H\Sigma$ diametrum habens ΞH , latus rectum autem P , et a puncto aliquo Σ ordinate ducta est ΣO , et in radio ΘH figura descripta est ΘIH , in ordinata autem ΣO siue ΘA [Eucl. I, 34] ei aequali ΘAZ , et in ΘO inter centrum ordinatamque posita siue in ΣA ei aequali ΣAT figurae ΘIH in radio descriptae similis, et rationes compositas habet, ut diximus, erit [I, 41] $\Sigma AT = \Theta AZ + \Theta \Gamma B$.

XVI.

Si duae rectae coni sectionem uel circuli ambitum contingentes concurrunt, et a puncto aliquo in sectione

posito recta alteri contingentium parallela ducitur sectionem alteramque contingentem secans, erit, ut quadrata contingentium inter se, ita spatium comprehensum rectis inter sectionem contingentemque

positis ad quadratum rectae ad punctum contactus abscisae.

sit AB conic sectionis uel ambitus circuli, et contingant AG, GB in Γ concurrentes, sumaturque in sectione AB punctum aliquod Δ , et per id ducatur $E\Delta Z$ rectae GB parallela.

dico, esse
 $B\Gamma^2 : A\Gamma^2 = ZE \times E\Delta : EA^2$.

ducantur enim per A, B

diametri $AH\Theta, KBA$, per Δ autem rectae AA parallela ΔMN ; statim igitur adparet, esse $\Delta K = KZ$ [I, 46–47] et $AEH = \Delta\Delta$ [prop. II] et $B\Delta\Gamma = A\Gamma\Theta$ [prop. I].


iam quoniam est $ZK = K\Delta$, et adiecta est ΔE , erit [Eucl. II, 6] $ZE \times E\Delta + \Delta K^2 = KE^2$. et quoniam trianguli $EAK, \Delta NK$ similes sunt, erit [Eucl. VI, 19]

$$EK^2 : K\Delta^2 = EKA : \Delta NK.$$

et permutando [Eucl. V, 16]

$$EK^2 : EAK = \Delta K^2 : \Delta NK;$$

In V praeter nostras figuras et tria rectangula totidemque triangulos duae figurae adsunt alium casum in parabola et hyperbola repraesentantes.



τὸ EAK τρίγωνον. ἀλλ' ὥς τὸ ἀπὸ EK πρὸς τὸ EAK ,
οὕτως τὸ ἀπὸ $ΓB$ πρὸς τὸ $ΑΓB$. καὶ ὥς ἄρα τὸ
ὑπὸ $ZEΔ$ πρὸς τὸ $ΑΔ$ τετράπλευρον, τὸ ἀπὸ $ΓB$
πρὸς τὸ $ΑΓB$ τρίγωνον. ἴσον δὲ τὸ μὲν $ΑΔ$ τῷ
5 AEH τριγώνῳ, τὸ δὲ $ΑΓB$ τῷ $ΑΘΓ$. καὶ ὥς ἄρα
τὸ ὑπὸ $ZEΔ$ πρὸς τὸ AEH τρίγωνον, τὸ ἀπὸ $ΓB$
πρὸς τὸ $ΑΘΓ$. ἐναλλάξ, ὥς τὸ ὑπὸ $ZEΔ$ πρὸς τὸ
ἀπὸ $ΓB$, τὸ AEH τρίγωνον πρὸς τὸ $ΑΘΓ$. ὥς δὲ
τὸ AHE πρὸς τὸ $ΑΘΓ$, τὸ ἀπὸ EA πρὸς τὸ ἀπὸ
10 $ΑΓ$. καὶ ὥς ἄρα τὸ ὑπὸ $ZEΔ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΓB$, τὸ
ἀπὸ EA πρὸς τὸ ἀπὸ $ΑΓ$. καὶ ἐναλλάξ.

ιξ'.

Ἐὰν κώνου τομῆς ἢ κύκλου περιφερείας δύο εὐ-
θεῖαι ἐπιψαύουσαι συμπίπτωσι, ληφθῇ δὲ ἐπὶ τῆς
15 τομῆς δύο τυχόντα σημεῖα, καὶ ἀπ' αὐτῶν ἀχθῶσιν
ἐν τῇ τομῇ παρὰ τὰς ἐφαπτομένας τέμνουσαι ἀλλήλας
τε καὶ τὴν γραμμὴν, ἔσται, ὥς τὰ ἀπὸ τῶν ἐφαπτο-
μένων τετράγωνα πρὸς ἀλλήλα, τὰ περιεχόμενα ὑπὸ
τῶν ὁμοίως λαμβανομένων εὐθειῶν.

20 ἔστω κώνου τομῆς ἢ κύκλου περιφέρεια ἡ AB , καὶ
τῆς AB ἐφαπτόμεναι αἱ $ΑΓ$, $ΓB$ συμπίπτουσιν κατὰ
τὸ $Γ$, καὶ εἰλήφθω ἐπὶ τῆς τομῆς τυχόντα σημεῖα τὰ
 $Δ$, E , καὶ δι' αὐτῶν παρὰ τὰς $ΑΓ$, $ΓB$ ἤχθωσαν αἱ
 $EZIK$, $ΔZHΘ$. λέγω, ὅτι ἐστίν, ὥς τὸ ἀπὸ $ΑΓ$
25 πρὸς τὸ ἀπὸ $ΓB$, τὸ ὑπὸ KZE πρὸς τὸ ὑπὸ $ΘZΔ$.

ἤχθωσαν γὰρ διὰ τῶν A , B διάμετροι αἱ $ΑΑΜΝ$,
 $ΒΟΞΠ$, καὶ ἐμβεβλήσθωσαν αἱ τε ἐφαπτόμεναι καὶ αἱ
παράλληλοι μέχρι τῶν διαμέτρων, καὶ ἤχθωσαν ἀπὸ

8. $ΓB$] $\forall \rho e$, corr. ex $ΓEB$ m. 1 V. 24. ἀπὸ $ΑΓ$] $ΑΓV$;
corr. p.

quare etiam [Eucl. V, 19] reliquum

$$ZE \times EA : AA = EK^2 : EAK.$$

est autem $EK^2 : EAK = \Gamma B^2 : \Lambda \Gamma B$ [Eucl. VI, 4];
quare etiam $ZE \times EA : AA = \Gamma B^2 : \Lambda \Gamma B$. est autem
 $AA = AEH$ et $\Lambda \Gamma B = A\Theta \Gamma$; itaque etiam

$$ZE \times EA : AEH = \Gamma B^2 : A\Theta \Gamma.$$

permutando [Eucl. V, 16]

$$ZE \times EA : \Gamma B^2 = AEH : A\Theta \Gamma.$$

est autem [Eucl. VI, 4] $AHE : A\Theta \Gamma = EA^2 : A\Gamma^2$;
itaque etiam $ZE \times EA : \Gamma B^2 = EA^2 : A\Gamma^2$. et per-
mutando [Eucl. V, 16].

XVII.


Si duae rectae coni sectionem uel ambitum circuli
contingentes concurrunt, et in sectione duo quaelibet
puncta sumuntur, ab iisque in sectione contingentibus
parallelae ducuntur rectae et inter se et lineam se-
cantes, erunt, ut quadrata contingentium inter se, ita
rectangula comprehensa rectis eodem modo sumptis.

sit AB coni sectio uel ambitus circuli et AB con-
tingentes $AG, \Gamma B$ in Γ concurrentes, sumanturque in
sectione puncta quaelibet A, E , et per ea rectis AG ,
 ΓB parallelae ducantur $EZIK, AZH\Theta$. dico, esse
 $A\Gamma^2 : \Gamma B^2 = KZ \times ZE : \Theta Z \times ZA$.

ducantur enim per A, B diametri $AA'MN, BO\Xi\Pi$,
producanturque et contingentes et parallelae usque ad
diametros, et a A, E contingentibus parallelae ducantur
 $A\Xi, EM$; manifestum igitur, esse $KI = IE, \Theta H = HA$
[I, 46—47].

τῶν Δ, E παρὰ τὰς ἐφαπτομένης αἱ $\Delta\Xi, EM$. φανερόν δὲ, ὅτι ἡ KI τῇ IE ἐστὶν ἴση καὶ ἡ ΘH τῇ $H\Delta$.

ἐπεὶ οὖν ἡ KE τέμνεται εἰς μὲν ἴσα κατὰ τὸ I ,
 5 εἰς δὲ ἄνισα κατὰ τὸ Z , τὸ ὑπὸ KZE μετὰ τοῦ ἀπὸ
 ZI ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ EI . καὶ ἐπεὶ ὁμοιά ἐστι τὰ
 τρίγωνα διὰ τὰς παραλλήλους, ἐστὶν, ὥς ὅλον τὸ ἀπὸ
 EI πρὸς ὅλον τὸ IME τρίγωνον, οὕτως ἀφαιρεθὲν
 τὸ ἀπὸ IZ πρὸς
 10 ἀφαιρεθὲν τὸ ZIA
 τρίγωνον. καὶ λοι-
 πὸν ἔσται τὸ ὑπὸ
 KZE πρὸς λοιπὸν
 τὸ ZM τετρά-
 15 πλευρόν ἐστὶν, ὥς
 ὅλον τὸ ἀπὸ EI
 πρὸς ὅλον τὸ MEI



τρίγωνον. ἀλλ' ὥς τὸ ἀπὸ EI πρὸς τὸ IME τρί-
 γωνον, τὸ ἀπὸ ΓA πρὸς τὸ ΓAN . ὥς ἄρα τὸ
 20 ὑπὸ KZE πρὸς τὸ ZM τετράπλευρον, οὕτως τὸ ἀπὸ
 $\Delta\Gamma$ πρὸς τὸ ΓAN . ἴσον δὲ τὸ μὲν $\Delta\Gamma N$ τῷ $\Gamma\Pi B$,
 τὸ δὲ ZM τῷ $Z\Xi$. ὥς ἄρα τὸ ὑπὸ KZE πρὸς τὸ
 $Z\Xi$, τὸ ἀπὸ $\Delta\Gamma$ πρὸς τὸ $\Gamma B\Pi$. ὁμοίως δὲ δειχθήσεται
 καί, ὥς τὸ ὑπὸ $\Theta Z\Delta$ πρὸς τὸ ΞZ , οὕτως τὸ ἀπὸ ΓB
 25 πρὸς τὸ $\Gamma\Pi B$. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν, ὥς μὲν τὸ ὑπὸ KZE
 πρὸς τὸ $Z\Xi$ τετράπλευρον, τὸ ἀπὸ $\Delta\Gamma$ πρὸς $\Gamma\Pi B$,
 διὰ δὲ τὸ ἀνάπαλιν, ὥς τὸ $Z\Xi$ τετράπλευρον πρὸς τὸ
 ὑπὸ $\Theta Z\Delta$, τὸ $\Gamma\Pi B$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓB , δι' ἴσον ἔσται,

1. $\Delta\Xi$] c, corr. ex ΔZ m. 1 V. 5. KZE] ZKE V;
 corr. Memus. 18. IME] V?, $IE M$ cp. 19. ΓAN] ἀπὸ
 ΓAN V; corr. p. 25. $\Gamma\Pi B$] $\Gamma\Pi$ V; corr. Memus (g b p).


quoniam igitur KE in I in partes aequales secta est, in Z autem in inaequales, erit

$$KZ \times ZE + ZI^2 = EI^2 \text{ [Eucl. II, 5].}$$

et quoniam trianguli propter parallelas similes sunt [Eucl. I, 29], erit $EI^2 : IME = IZ^2 : ZIA$ [Eucl. VI, 19; V, 16]. itaque etiam reliquum [Eucl. V, 19]

$$KZ \times ZE : ZM = EI^2 : MEI.$$

est autem $EI^2 : IME = \Gamma A^2 : \Gamma AN$ [Eucl. VI, 19 V, 16]; itaque $KZ \times ZE : ZM = \Gamma A^2 : \Gamma AN$. est



autem $\Gamma \Gamma N = \Gamma \Pi B$ [prop. I] et $ZM = ZE$ [prop. III]; itaque $KZ \times ZE : ZE = \Gamma A^2 : \Gamma B \Pi$. iam similiter demonstrabimus, esse etiam

$$\Theta Z \times ZA : EZ = \Gamma B^2 : \Gamma \Pi B.$$

iam quoniam est $KZ \times ZE : ZE = \Gamma A^2 : \Gamma \Pi B$ et e contrario [Eucl. V, 7 coroll.]

$$ZE : \Theta Z \times ZA = \Gamma \Pi B : \Gamma B^2,$$

ex aequo erit [Eucl. V, 22]

$$\Gamma A^2 : \Gamma B^2 = KZ \times ZE : \Theta Z \times ZA.$$

In Vve praeterea rectangula et trianguli quidam inveniuntur.

ὥς τὸ ἀπὸ $ΑΓ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΒΓ$, τὸ ὑπὸ $ΚΖΕ$ πρὸς
τὸ ὑπὸ $ΘΖΑ$.

ιη'.

Ἐὰν τῶν ἀντικειμένων δύο εὐθεῖαι ἐπιψαύουσαι
5 συμπίπτωσι, καὶ ληφθῇ τι σημεῖον ἐφ' ὁποτέρᾳ τῶν
τομῶν, καὶ ἀπ' αὐτοῦ ἀχθῇ τις εὐθεῖα παρὰ τινὰ
τῶν ἐφαπτομένων τέμνουσα τὴν τομὴν καὶ τὴν ἑτέραν
ἐφαπτομένην, ἔσται, ὥς τὰ ἀπὸ τῶν ἐφαπτομένων
τετράγωνα πρὸς ἄλληλα, οὕτως τὸ περιεχόμενον ὑπὸ
10 τῶν μεταξὺ τῆς τομῆς καὶ τῆς ἐφαπτομένης πρὸς τὸ
ἀπὸ τῆς ἀπολαμβανομένης πρὸς τῇ ἀφ᾽ ἑτῶν τετράγωνον.

ἔστωσαν ἀντικείμεναι αἱ $ΑΒ$, $ΜΝ$ καὶ ἐφαπτόμεναι
αἱ $ΑΓΑ$, $ΒΓΘ$ καὶ διὰ τῶν ἀφῶν διάμετροι αἱ $ΑΜ$,
 $ΒΝ$, καὶ εἰλήφθω ἐπὶ τῆς $ΜΝ$ τομῆς τυχὸν σημεῖον
15 τὸ $Δ$, καὶ δε' αὐτοῦ ἤχθω παρὰ τὴν $ΒΘ$ ἡ $ΕΔΖ$.
λέγω, ὅτι ἔστιν, ὥς τὸ ἀπὸ $ΒΓ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΓΑ$, τὸ
ὑπὸ $ΖΕΑ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΑΕ$.


ἤχθω γὰρ διὰ τοῦ $Δ$ τῇ $ΑΕ$ παράλληλος ἡ $ΔΞ$.
ἐπεὶ οὖν ὑπερβολὴ ἔστιν ἡ $ΑΒ$ καὶ διάμετρος αὐτῆς
20 ἡ $ΒΝ$ καὶ ἐφαπτομένη ἡ $ΒΘ$ καὶ τῇ $ΒΘ$ παράλληλος
ἡ $ΔΖ$, ἴση ἄρα ἔστιν ἡ $ΖΟ$ τῇ $ΟΔ$. καὶ πρόσκειται
ἡ $ΕΔ$. τὸ ἄρα ὑπὸ $ΖΕΑ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $ΔΟ$ ἴσον
ἐστὶ τῷ ἀπὸ $ΕΟ$. καὶ ἐπεὶ παράλληλός ἐστιν ἡ $ΕΑ$
τῇ $ΔΞ$, ὁμοίον ἐστὶ τὸ $ΕΟΑ$ τρίγωνον τῷ $ΔΞΟ$.
25 ἔστιν ἄρα, ὥς ὅλον τὸ ἀπὸ $ΕΟ$ πρὸς τὸ $ΕΟΑ$, οὕτως
ἀφαιρεθὲν τὸ ἀπὸ $ΔΟ$ πρὸς ἀφαιρεθὲν τὸ $ΞΔΟ$ τρί-
γωνον· καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ $ΔΕΖ$ πρὸς τὸ $ΔΑ$
τετράπλευρόν ἐστιν, ὥς τὸ ἀπὸ $ΕΟ$ πρὸς τὸ $ΕΟΑ$.
ἀλλ' ὥς τὸ ἀπὸ $ΟΕ$ πρὸς τὸ $ΟΕΑ$ τρίγωνον, τὸ ἀπὸ

1. πρὸς τὸ ἀπὸ $ΒΓ$] om. V; corr. p (τῆς $ΓΒ$). 15. $ΕΔΖ$] $ΔΕΖ$ V; corr. p.

XVIII.

Si duae rectae oppositas contingentes concurrunt, et in alterutra sectionum sumitur punctum aliquod, ab eoque recta alteri contingentium parallela ducitur sectionem alteramque contingentem secans, erit, ut quadrata contingentium inter se, ita rectangulum comprehensum rectis inter sectionem contingentemque positis ad quadratum rectae ad punctum contactus abscisae.

sint oppositae AB , MN contingentesque AG , $B\Theta$ et per puncta contactus diametri AM , BN ,



sumaturque in sectione MN punctum aliquod Δ , et per id rectae $B\Theta$ parallela ducatur $E\Delta Z$. dico, esse $B\Gamma^2 : \Gamma A^2 = ZE \times E\Delta : AE^2$.

ducatur enim per Δ rectae AE parallela $\Delta\Xi$. iam quoniam hyperbola est AB et diametrus eius BN contingensque $B\Theta$ et rectae $B\Theta$ parallela ΔZ , erit [I, 48] $ZO = O\Delta$. et adiecta est $E\Delta$; itaque erit [Eucl. II, 6] $ZE \times E\Delta + \Delta O^2 = EO^2$. et quoniam EA , $\Delta\Xi$ parallelae sunt, trianguli EOA , $\Delta\Xi O$ similes sunt [Eucl. I, 29]; itaque $EO^2 : EO\Delta = \Delta O^2 : \Xi\Delta O$ [Eucl. VI, 19; V, 16]; quare etiam reliquum

$\Delta E \times EZ : \Delta\Delta = EO^2 : EO\Delta$ [Eucl. V, 19].

est autem $OE^2 : OE\Delta = B\Gamma^2 : B\Gamma A$ [Eucl. VI, 19;

$B\Gamma$ πρὸς τὸ $B\Gamma A$ τρίγωνον· καὶ ὥς ἄρα τὸ ὑπὸ $ZE\Delta$ πρὸς τὸ ΔA τετράπλευρον, τὸ ἀπὸ $B\Gamma$ πρὸς τὸ $B\Gamma A$ τρίγωνον. ἴσον δὲ τὸ ΔA τετράπλευρον τῷ AEH τριγώνῳ, τὸ δὲ $B\Delta\Gamma$ τῷ $A\Gamma\Theta$. ὥς ἄρα
 5 τὸ ὑπὸ $ZE\Delta$ πρὸς τὸ AEH , τὸ ἀπὸ $B\Gamma$ πρὸς τὸ $A\Gamma\Theta$. ἔστι δὲ καὶ ὥς τὸ AEH πρὸς τὸ ἀπὸ EA , οὕτως τὸ $A\Gamma\Theta$ πρὸς τὸ ἀπὸ $A\Gamma$. δι' ἴσου ἄρα ἐστίν, ὥς τὸ ἀπὸ $B\Gamma$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓA , τὸ ὑπὸ $ZE\Delta$ πρὸς τὸ ἀπὸ EA .

ιθ'.

10

Ἐὰν τῶν ἀντικειμένων δύο εὐθεῖαι ἐφαπτόμεναι συμπίπτωσιν, ἀχθῶσι δὲ παράλληλοι ταῖς ἐφαπτομέναις ἀλλήλας τέμνουσαι καὶ τὴν τομήν, ἔσται, ὥς τὰ ἀπὸ τῶν ἐφαπτομένων τετράγωνα πρὸς ἄλληλα, οὕτως
 15 τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τῶν μεταξὺ τῆς τομῆς καὶ τῆς συμπτώσεως τῶν εὐθειῶν πρὸς τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τῶν ὁμοίως λαμβανομένων εὐθειῶν.

ἔστωσαν ἀντικείμεναι, ὧν διάμετροι αἱ $A\Gamma$, $B\Delta$, κέντρον δὲ τὸ E , καὶ ἐφαπτόμεναι αἱ AZ , $Z\Delta$ συμ-
 20 πιπτόμεναι κατὰ τὸ Z , καὶ ἀπὸ τινων σημείων ἤχθωσαν παρὰ τὰς $AZ\Delta$ αἱ $H\Theta IK\Delta$, $MN\Xi O\Delta$. λέγω, ὅτι ἐστίν, ὥς τὸ ἀπὸ AZ πρὸς τὸ ἀπὸ $Z\Delta$, τὸ ὑπὸ $H\Delta I$ πρὸς τὸ ὑπὸ $M\Delta\Xi$.

ἤχθωσαν παρὰ τὰς $AZ\Delta$ διὰ τῶν Ξ , I αἱ $I\Pi$,
 25 ΞP . καὶ ἐπεὶ ἐστίν, ὥς τὸ ἀπὸ AZ πρὸς τὸ $AZ\Xi$ τρίγωνον, τὸ ἀπὸ $\Theta\Delta$ πρὸς τὸ $\Theta\Delta O$ καὶ τὸ ἀπὸ ΘI πρὸς τὸ $\Theta I\Pi$, καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ $H\Delta I$ πρὸς λοιπὸν τὸ $I\Pi O\Delta$ τετράπλευρόν ἐστιν, ὥς τὸ ἀπὸ AZ


3. $B\Gamma A$] $B\Gamma V$; corr. p. 18. αἱ] bis V ; corr. ενρ. 21. $MN\Xi O\Delta$] $MN\Xi O V$; corr. p. 23. $H\Delta I$] $HM V$; corr. p. 24. $I\Pi$, ΞP] $I\Xi$, $PP V$; corr. p.

16]; quare etiam $ZE \times EA : AA = B\Gamma^2 : B\Gamma A$.
 ; autem $AA = AEH$ [prop. VI], $BA\Gamma = A\Gamma\Theta$
 [prop. I]; itaque $ZE \times EA : AEH = B\Gamma^2 : A\Gamma\Theta$.
 ; autem etiam $AEH : EA^2 = A\Gamma\Theta : A\Gamma^2$ [Eucl. VI, 19;
 , 16]. ex aequo igitur [Eucl. V, 22]

$$B\Gamma^2 : \Gamma A^2 = ZE \times EA : EA^2.$$

XIX.

Si duae rectae oppositas contingentes concurrunt,
 ducuntur rectae contingentibus parallelae inter se
 sectionemque secantes, erit, ut quadrata contingentium



inter se, ita rectangulum
 comprehensum rectis inter
 sectionem punctumque con-
 cursus rectarum positum ad
 rectangulum comprehen-
 sum rectis eodem modo
 sumptis.

sint oppositae, quarum
 diametri sint AG , BA ,
 centrum autem E , et con-
 tingentes AZ , ZA con-
 currant in Z , et a punctis
 quibilibet rectis AZ , ZA parallelae ducantur $H\Theta IK A$,
 $MN\Xi O A$. dico, esse

$$AZ^2 : ZA^2 = HA \times AI : MA \times A\Xi.$$

per Ξ , I rectis AZ , ZA parallelae ducantur II ,
 IP . et quoniam est

$$AZ^2 : AZ\Xi = \Theta A^2 : \Theta AO = \Theta I^2 : \Theta II$$
 [Eucl. VI, 19;

, 16], erit etiam reliquum [I, 48; Eucl. II, 6]

$$HA \times AI : IPOA = AZ^2 : AZ\Xi$$
 [Eucl. V, 19].

πρὸς τὸ $AZ\Sigma$ τρίγωνον. ἴσον δὲ τὸ $AZ\Sigma$ τῷ ΔZT
καὶ τὸ $\Pi O \Lambda I$ τῷ $KP\Xi A$. καὶ ὥς ἄρα τὸ ἀπὸ AZ
πρὸς τὸ ΔTZ , τὸ ὑπὸ $H \Lambda I$ πρὸς τὸ $P\Xi AK$. ὥς
δὲ τὸ ΔTZ πρὸς τὸ ἀπὸ $Z \Delta$, τὸ $P\Xi AK$ πρὸς τὸ
5 ὑπὸ $M \Lambda \Xi$. καὶ δι' ἴσου ἄρα, ὥς τὸ ἀπὸ AZ πρὸς
τὸ ἀπὸ $Z \Delta$, τὸ ὑπὸ $H \Lambda I$ πρὸς τὸ ὑπὸ $M \Lambda \Xi$.

κ'.

Ἐὰν τῶν ἀντικειμένων δύο εὐθεῖαι ἐφαπτόμεναι
συμπίπτωσι, καὶ διὰ τῆς συμπτώσεως ἀχθῇ τις εὐθεῖα
10 παρὰ τὴν τὰς ἀφ' ἑξεννύουσας συμπίπτουσα ἑκατέρω
τῶν τομῶν, ἀχθῇ δέ τις ἑτέρα εὐθεῖα παρὰ τὴν αὐτὴν
τέμνουσα τὰς τε τομὰς καὶ τὰς ἐφαπτομένας, ἔσται, ὥς τὸ
περιεχόμενον ὑπὸ τῶν ἀπὸ τῆς συμπτώσεως ταῖς τομαῖς
προσπιπτουσῶν εὐθειῶν πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ἐφαπτομένης
15 τετραγώνου, τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τῶν μεταξὺ τῶν
τομῶν καὶ τῆς ἐφαπτομένης εὐθειῶν πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς
ἀπολαμβανομένης πρὸς τῇ ἀφ' ἣς τετραγώνου.

ἔστωσαν ἀντικείμεναι αἱ AB , $\Gamma \Delta$, ὧν κέντρον
τὸ E , ἐφαπτόμεναι δὲ αἱ AZ , ΓZ , καὶ ἐπεξεύχθω ἡ
20 $A \Gamma$ καὶ αἱ EZ , AE καὶ ἐκβεβλήσθωσαν, καὶ ἤχθω
διὰ τοῦ Z παρὰ τὴν $A \Gamma$ ἡ $BZ\Theta$, καὶ εἰλήφθω, ὃ
ἔτυχε, σημεῖον τὸ K , καὶ δι' αὐτοῦ παρὰ τὴν $A \Gamma$
ἤχθω ἡ $K \Lambda \Sigma M N \Xi$. λέγω, ὅτι ἔστιν, ὥς τὸ ὑπὸ
 $BZ \Delta$ πρὸς τὸ ἀπὸ $Z \Delta$, τὸ ὑπὸ $K \Lambda \Xi$ πρὸς τὸ
25 ἀπὸ $A \Lambda$.

ἤχθωσαν γὰρ ἀπὸ τῶν K , B παρὰ τὴν AZ αἱ
 $K \Pi$, $B \Pi$. ἐπεὶ οὖν ἔστιν, ὥς τὸ ἀπὸ BZ πρὸς τὸ

3. $H \Lambda I$] $HM \vee$; corr. Memus. 16. εὐθειῶν] εὐθείας $\vee$;
corr. Comm. 24. $K \Lambda \Xi$] $\Lambda K \Xi \vee$; corr. Memus (hlx).

est autem $AZ\Sigma = AZT$ [prop. IV] et [prop. VII]
 $HOAI = KP\Xi A$; quare etiam


$$AZ^2 : ATZ = HA \times AI : P\Xi AK.$$

est autem $ATZ : ZA^2 = P\Xi AK : MA \times A\Xi$. ergo
 etiam ex aequo [Eucl. V, 22]

$$AZ^2 : ZA^2 = HA \times AI : MA \times A\Xi.$$

XX.

Si duae rectae oppositas contingentes concurrunt, et per punctum concursus recta ducitur rectae puncta contactus coniungenti parallela cum utraque sectione concurrens, et alia quoque recta eidem parallela ducitur et sectiones et contingentes secans, erit, ut rectangulum rectis a puncto concursus ad sectiones addidentibus comprehensum ad quadratum contingentis, ita rectangulum comprehensum rectis inter sectiones contingentemque positis ad quadratum rectae ad punctum contactus abscisae.



sint oppositae $AB, \Gamma A$, quarum centrum sit E , contingentes autem $AZ, \Gamma Z$, ducaturque $A\Gamma$ et EZ, AE et producantur, per Z autem rectae $A\Gamma$ parallela ducatur $BZ\Theta$, et sumatur quodvis punctum K , et per id rectae $A\Gamma$ parallela ducatur $K\Lambda\Sigma MN\Xi$. dico, esse $BZ \times ZA : ZA^2 = KA \times A\Xi : AA^2$.

ducantur enim a K, B rectae AZ parallelae $K\Pi, BP$. iam quoniam est

In fig. pro K (Vp) posuerunt H Memus aliique.

BZP τρίγωνον, τὸ ἀπὸ $KΣ$ πρὸς τὸ $KΣΠ$ καὶ τὸ
ἀπὸ $ΛΣ$ πρὸς τὸ $ΛΣΖ$, καὶ λοιπὸν τὸ ὑπὸ $ΚΑΞ$
πρὸς τὸ $ΚΑΖΠ$ τετράπλευρον, ἴσον δὲ τὸ μὲν ἀπὸ
 BZ τῷ ὑπὸ $BZΔ$, τὸ δὲ BPZ τρίγωνον τῷ
5 $AZΘ$, τὸ δὲ $ΚΑΖΠ$ τετράπλευρον τῷ $ΑΑΝ$ τρι-
γώνῳ, ἔστιν ἄρα, ὥς τὸ ὑπὸ $BZΔ$ πρὸς τὸ $AZΘ$
τρίγωνον, τὸ ὑπὸ $ΚΑΞ$ πρὸς τὸ $ΑΑΝ$. ὥς δὲ τὸ
 $AZΘ$ πρὸς τὸ ἀπὸ AZ , τὸ $ΑΑΝ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΑΑ$.
δι' ἴσου ἄρα, ὥς τὸ ὑπὸ $BZΔ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΖΑ$, τὸ
10 ὑπὸ $ΚΑΞ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΑΑ$.

κα'.

Τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων ἐὰν ἐπὶ τῆς τομῆς δύο
σημεῖα ληφθῇ, καὶ δι' αὐτῶν ἄχθῶσιν εὐθεῖαι ἡ μὲν
παρὰ τὴν ἐφαπτομένην, ἡ δὲ παρὰ τὴν τὰς ἀφ' ἃς
15 ἐπιξενγνύουσιν, τέμνουσαι ἀλλήλας τε καὶ τὰς τομὰς,
ἔσται, ὥς τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τῶν ἀπὸ τῆς συμπτώ-
σεως ταῖς τομαῖς προσπιπτουσῶν πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς
ἐφαπτομένης τετράγωνον, τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τῶν
μεταξὺ τῶν τομῶν καὶ τῆς συμπτώσεως πρὸς τὸ
20 περιεχόμενον ὑπὸ τῶν μεταξὺ τῆς τομῆς καὶ τῆς συμ-
πτώσεως εὐθειῶν.

ἔστω γὰρ τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον, εἰλήφθω δὲ τὰ
 H, K σημεῖα, καὶ δι' αὐτῶν ἄχθωσαν παρὰ μὲν τὴν
 AZ αὖ $NΞHOP$, $KΣT$, παρὰ δὲ τὴν $ΑΓ$ αὖ

1. $KΣΠ$] ἀπὸ $KΣΠ$ V; corr. p. 2. $ΛΣΖ$] $ΛΕΖ$ V;
corr. p ($ΛΣΖ$). $ΚΑΞ$] $ΔΚΞ$ corr. ex $ΔΚΖ$ m. 1 V; corr.
Memus (hlx). 3. Ante ἴσον add. ἔσται ὥς τὸ ἀπὸ BZ πρὸς
τὸ BZP Halley cum Command.; lacunam p. 6. ὑπὸ $BZΔ$]
ἀπὸ BZ V; corr. Memus. τό] (alt.) om. V; corr. p. 7.
 $ΚΑΞ$] $ΔΚΞ$ V; corr. Memus (hlx). $ΑΑΝ$] $ΑΑΜ$ V; corr. p.
10. $ΚΑΞ$] $ΔΚΞ$ V; corr. Memus (hlx). 19. πρὸς — 20.
συμπτώσεως] om. V; corr. Comm.

$BZ^2 : BZP = K\Sigma^2 : K\Sigma\Pi$
 $= A\Sigma^2 : A\Sigma Z$ [Eucl. VI, 19; V, 16]
 $= KA \times A\xi$ [Eucl. II, 5] : $KAZ\Pi$ [Eucl. V, 19],
 et $BZ^2 = BZ \times ZA$ [II, 39, 38], $BPZ = AZ\Theta$
 [prop. XI], $KAZ\Pi = AAN$ [prop. V], erit


$$BZ \times ZA : AZ\Theta = KA \times A\xi : AAN.$$

est autem $AZ\Theta : AZ^2 = AAN : AA^2$ [Eucl. VI, 19;
 V, 16]; ergo ex aequo [Eucl. V, 22]

$$BZ \times ZA : ZA^2 = KA \times A\xi : AA^2.$$

XXI.

Iisdem suppositis si in sectione duo puncta su-
 muntur, et per ea rectae ducuntur, altera contingenti



parallela, secantes et
 inter se et sectiones,
 erit, ut rectangulum
 comprehensum rectis a
 puncto concursus ad
 sectiones adidentibus
 ad quadratum contin-
 gentis, ita rectangulum
 comprehensum rectis
 inter sectiones
 punctumque concursus

positus ad rectangulum comprehensum rectis inter
 sectionem punctumque concursus positus.

sint enim eadem, quae antea, et sumantur H, K
 puncta, per eaque rectae AZ parallelae ducantur

HAM, *KOΦIXΨΩ*. λέγω, ὅτι ἐστίν, ὡς τὸ ὑπὸ *BZA* πρὸς τὸ ἀπὸ *ZA*, οὕτως τὸ ὑπὸ *KOΩ* πρὸς τὸ ὑπὸ *NOH*.

ἐπεὶ γάρ ἐστιν, ὡς τὸ ἀπὸ *AZ* πρὸς τὸ *AZΘ*
 5 *τρύγωνον*, τὸ ἀπὸ *AA* πρὸς τὸ *AAM* καὶ τὸ ἀπὸ *ΞO*
 πρὸς τὸ *ΞOΨ* καὶ τὸ ἀπὸ *ΞH* πρὸς τὸ *ΞHM*, ὡς ἄρα
 ὅλον τὸ ἀπὸ *ΞO* πρὸς ὅλον τὸ *ΞOΨ*, οὕτως ἀφαιρεθὲν
 τὸ ἀπὸ *ΞH* πρὸς ἀφαιρεθὲν τὸ *ΞHM*. καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ
 ὑπὸ *NOH* πρὸς λοιπὸν τὸ *HOΨM* τετράπλευρόν ἐστιν,
 10 ὡς τὸ ἀπὸ *AZ* πρὸς τὸ *AZΘ*. ἴσον δὲ τὸ μὲν *AZΘ* τῷ
BTZ, τὸ δὲ *HOΨM* τῷ *KOPT*. ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ
AZ πρὸς τὸ *BZT*, τὸ ὑπὸ *NOH* πρὸς τὸ *KOPT*.
 ὡς δὲ τὸ *BTZ* τρίγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ *BZ*, τουτέστι
 τὸ ὑπὸ *BZA*, οὕτως ἐδείχθη τὸ *KOPT* πρὸς τὸ ὑπὸ
 15 *KOΩ*. δι' ἴσου ἄρα, ὡς τὸ ἀπὸ *AZ* πρὸς τὸ ὑπὸ
BZA, τὸ ὑπὸ *NOH* πρὸς τὸ ὑπὸ *KOΩ*. καὶ ἀνάπαλιν,
 ὡς τὸ ὑπὸ *BZA* πρὸς τὸ ἀπὸ *ZA*, τὸ ὑπὸ *KOΩ*
 πρὸς τὸ ὑπὸ *NOH*.

κβ'.

20 Ἐὰν τῶν ἀντικειμένων δύο εὐθεῖαι παράλληλοι
 ἐπιψάωσιν, ἀχθῶσι δέ τινες εὐθεῖαι τέμνουσαι ἀλ-
 λήλας καὶ τὰς τομὰς, ἡ μὲν παρὰ τὴν ἐφαπτομένην,
 ἡ δὲ παρὰ τὴν τὰς ἀφὰς ἐπιξενυγνύουσαν, ἔσται, ὡς
 ἡ τοῦ πρὸς τῇ τὰς ἀφὰς ἐπιξενυγνυούσῃ εἰδους πλαγία
 25 πλευρὰ πρὸς τὴν ὀρθίαν, τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τῶν
 μεταξὺ τῶν τομῶν καὶ τῆς συμπτώσεως πρὸς τὸ
 περιεχόμενον ὑπὸ τῶν μεταξὺ τῆς τομῆς καὶ τῆς συμ-
 πτώσεως.

7. τό] (alt.) p c v, e corr. m. 1 V. 12. *KOPT* V; corr. Memus.
 14. *KOPT*] p c, T corr. ex II m. 1 V. 17. *KOΩ*] c, corr.
 ex *KO*, *OΩ* m. 1 V. 24. ἡ] p, om. V. 25. *πλευρᾷ* V; corr. p.
 26. *τῶν τομῶν* — 27. *μεταξὺ*] om. V; corr. Paris. 2355 mg.

$N\Xi H O \Pi P, K \Sigma T$, rectae autem $A\Gamma$ parallelae HAM , $KO\Phi IX\Psi\Omega$ ¹⁾. dico, esse

$$BZ \times ZA : ZA^2 = KO \times O\Omega : NO \times OH.$$

quoniam enim est

$$AZ^2 : AZ\Theta = AA^2 : AAM$$

$= \Xi O^2 : \Xi O\Psi = \Xi H^2 : \Xi HM$ [Eucl. VI, 19; V, 16],
erit, ut totum ΞO^2 ad totum $\Xi O\Psi$, ita ablatum ΞH^2
ad ablatum ΞHM . itaque etiam reliquum [I, 47;
Eucl. II, 6] $NO \times OH : HO\Psi M = AZ^2 : AZ\Theta$
[Eucl. V, 19]. est autem $AZ\Theta = BTZ$ [prop. XI],
 $HO\Psi M = KOPT$ [prop. XII]; itaque

$$AZ^2 : BTZ = NO \times OH : KOPT.$$

demonstrauimus autem, esse

$$BTZ : BZ^2 = KOPT : KO \times O\Omega \text{ [prop. XX]}$$

$$= [I, 39, 38] BTZ : BZ \times ZA;$$

itaque ex aequo [Eucl. V, 22]

$$AZ^2 : BZ \times ZA = NO \times OH : KO \times O\Omega.$$

et e contrario [Eucl. V, 7 coroll.]

$$BZ \times ZA : ZA^2 = KO \times O\Omega : NO \times OH.$$

XXII.

Si sectiones oppositas duae rectae parallelae contingunt, et ducuntur rectae quaedam secantes et inter se et sectiones, altera contingenti parallela, altera rectae puncta contactus coniungenti parallela, erit, ut latus transuersum figurae rectae puncta contactus coniungenti adplicatae ad rectum, ita rectangulum comprehensum rectis inter sectiones punctumque con-

1) In figura codicis V punctum Ψ intra sectionem ΓA cedit, ita ut haec recta dicenda esset $KO\Phi IX\Omega\Psi$. adiecta sunt sex rectangula.

ἔστωσαν ἀντικείμεναι αἱ A, B , ἐφαπτόμεναι δὲ αὐτῶν αἱ $ΑΓ, ΒΔ$ παράλληλοι ἔστωσαν, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ AB . διήχθωσαν δὴ ἡ μὲν $ΕΞΗ$ παρὰ τὴν AB , ἡ δὲ $ΚΕΛΜ$ παρὰ τὴν $ΑΓ$. λέγω, ὅτι ἐστίν, ὥς ἡ
 5 AB πρὸς τὴν ὀρθίαν τοῦ εἰδους πλευράν, το ὑπὸ $HEΞ$ πρὸς τὸ ὑπὸ KEM .

ἤχθωσαν διὰ τῶν $H, Ξ$ παρὰ τὴν $ΑΓ$ αἱ $ΞΝ, ΗΖ$.


ἐπεὶ γὰρ αἱ $ΑΓ, ΒΔ$ ἐφαπτόμεναι τῶν τομῶν παράλληλοι εἰσι, διάμετρος μὲν ἡ AB , τεταγμένως
 10 δὲ ἐπ' αὐτὴν κατηγμέναι αἱ $ΚΑ, ΞΝ, ΗΖ$. ἔσται οὖν, ὥς ἡ AB πρὸς τὴν ὀρθίαν πλευράν, τό τε ὑπὸ $ΒΑΑ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΑΚ$ καὶ τὸ ὑπὸ $ΒΝΑ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΝΞ$, τουτέστι τὸ ἀπὸ $ΑΕ$. ἔστιν ἄρα, ὥς ὅλον τὸ ὑπὸ $ΒΑΑ$ πρὸς ὅλον τὸ ἀπὸ $ΚΑ$, οὕτως ἀφαι-
 15 ρεθὲν τὸ ὑπὸ $ΒΝΑ$, τουτέστι τὸ ὑπὸ $ΖΑΝ$. ἴση γὰρ ἡ $ΝΑ$ τῇ $ΒΖ$. πρὸς ἀφαιρεθὲν τὸ ἀπὸ $ΑΕ$ καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ $ΖΑΝ$ πρὸς λοιπὸν τὸ ὑπὸ $ΚΕΜ$ ἐστίν, ὥς ἡ AB πρὸς τὴν ὀρθίαν. ἴσον δὲ τὸ ὑπὸ $ΖΑΝ$ τῷ ὑπὸ $HEΞ$. ὥς ἄρα ἡ AB τοῦ
 20 εἰδους πλαγία πλευρὰ πρὸς τὴν ὀρθίαν, τὸ ὑπὸ $HEΞ$ πρὸς τὸ ὑπὸ KEM .

κγ'.

Ἐὰν ἐν ταῖς κατα συζυγίαν ἀντικειμέναις δύο εὐθεῖαι τῶν κατ' ἐναντίον τομῶν ἐπιψάφουσαι συμ-
 25 πίπτωσιν ἐπὶ μιᾷ, ἥς ἔτυχον, τομῆς, ἀχθῶσι δὲ τινες παρὰ τὰς ἐφαπτομένας τέμνουσαι ἀλλήλας καὶ τὰς ἐτέρας ἀντικειμένας, ἔσται, ὥς τὰ ἀπὸ τῶν ἐφαπτομένων

3. δὴ] δέ Halley. 4. $EKAM$ V, corr. p. 8. γάρ] οὐν?
 24. συμπίπτουσιν v, V (ou corr. in ω?); corr. p.c.

cursus positus ad rectangulum comprehensum rectis inter sectionem punctumque concursus positus.



sint oppositae A, B ,
easque contingentes
 $AT, B\Delta$ parallelae sint,
et ducatur AB . du-
cantur igitur rectae AB
parallelae $E\Xi, H'$, rectae
 AT autem parallela

$KE \Delta M$. dico, esse, ut AB ad latus rectum
figurae, ita $HE \times E\Xi : KE \times EM$.

per H, Ξ rectae AT parallelae ducantur $\Xi N, HZ$.
iam quoniam $AT, B\Delta$ sectiones contingentes par-
allelae sunt, diameter est AB et ad eam ordinate
ductae $KA, \Xi N, HZ$ [II, 31]; erit igitur [I, 21] AB :
latus rectum

$$\begin{aligned} &= BA \times AA : AK^2 = BN \times NA : N\Xi^2 \\ &= BN \times NA : AE^2 \text{ [Eucl. I, 34].} \end{aligned}$$

est igitur, ut totum $BA \times AA$ ad totum AK^2 , ita
ablatum $BN \times NA$, hoc est $ZA \times AN$ (nam
 $NA = BZ$ [I, 21]), ad ablatum AE^2 ; quare etiam
reliquum [u. Pappi lemma IV] $ZA \times AN$ ad reliquum
[I, 47; Eucl. II, 5] $KE \times EM$ est, ut AB ad latus
rectum. est autem $ZA \times AN = HE \times E\Xi$ [Eucl. I, 34];
ergo ut AB latus figurae transuersum ad rectum, ita
 $HE \times E\Xi : KE \times EM$.

XXIII.

Si in oppositis coniugatis duae rectae sectiones
inter se oppositas contingentes in quavis sectionum
concurrunt, et contingentibus parallelae rectae du-

τετράγωνα πρὸς ἄλληλα, τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τῶν μεταξὺ τῶν τομῶν καὶ τῆς συμπτώσεως εὐθειῶν πρὸς τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τῶν ὁμοίως λαμβανομένων εὐθειῶν.

5 ἔστωσαν κατὰ συζυγίαν ἀντικείμεναι αἱ $AB, \Gamma A, EZ, H\Theta$, κέντρον δὲ αὐτῶν τὸ K , καὶ τῶν AB, EZ τομῶν ἐφαπτόμεναι αἱ $A\Phi\Gamma A, EX\Lambda A$ συμπιπτεύσαν κατὰ τὸ A , καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ AK, EK καὶ ἐκβεβλήσθωσαν ἐπὶ τὰ B, Z , καὶ ἀπὸ τοῦ H παρὰ
10 τὴν AA ἡχθῶ ἡ $HMN\Xi O$, ἀπὸ δὲ τοῦ Θ παρὰ τὴν EA ἡ $\Theta\Pi\rho\Xi\Sigma$. λέγω, ὅτι ἐστίν, ὥς τὸ ἀπὸ EA πρὸς τὸ ἀπὸ AA , τὸ ὑπο $\Theta\Xi\Sigma$ πρὸς τὸ ὑπὸ $H\Xi O$.

ἡχθῶ γὰρ διὰ τοῦ Σ παρὰ μὲν τὴν AA ἡ ΣT ,
15 παρὰ δὲ τὴν EA ἀπὸ τοῦ O ἡ OT . ἐπεὶ οὖν συζυγῶν ἀντικειμένων τῶν $AB, \Gamma A, EZ, H\Theta$ διάμετρος ἐστὶν ἡ BE , καὶ ἐφάπτεται τῆς τομῆς ἡ EA , καὶ παρ' αὐτὴν ἡκται ἡ $\Theta\Sigma$, ἴση ἐστὶν ἡ $\Theta\Pi$ τῇ $\Pi\Sigma$, καὶ διὰ τὰ αὐτὰ ἡ HM τῇ MO . καὶ ἐπεὶ ἐστίν, ὥς
20 τὸ ἀπὸ EA πρὸς τὸ $E\Phi A$ τρίγωνον, τὸ ἀπὸ $\Pi\Sigma$ πρὸς τὸ $\Pi T\Sigma$ καὶ τὸ ἀπὸ $\Pi\Xi$ πρὸς τὸ $\Pi N\Xi$, καὶ λοιπὸν τὸ ὑπὸ $\Theta\Xi\Sigma$ πρὸς τὸ $TN\Xi\Sigma$ τετράπλευρόν ἐστίν, ὥς τὸ ἀπὸ EA πρὸς τὸ $\Phi\Lambda E$ τρίγωνον. ἴσον δὲ τὸ μὲν $E\Phi A$ τρίγωνον τῷ $AA X$, τὸ δὲ $TN\Xi\Sigma$
25 τετράπλευρον τῷ $\Xi P T O$. ἐστὶν ἄρα, ὥς τὸ ἀπὸ EA πρὸς τὸ $AA X$, τὸ ὑπὸ $\Theta\Xi\Sigma$ πρὸς τὸ $\Xi O T P$ τετράπλευρον. ἐστὶ δέ, ὥς τὸ AXA τρίγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ AA , τὸ $\Xi P T O$ πρὸς τὸ ὑπὸ $H\Xi O$. δι' ἴσου


10. $MN\Xi O$ V; corr. p. 11. EA] p e v, corr. ex $E\Theta$ m. 1 V. 15. O ἡ OT] $\overline{o\eta} \overline{o\eta}$ V; corr. 2355 mg. 22. $\Theta\Xi\Sigma$] $\Theta\Sigma\Xi$ corr. ex $\Theta\Gamma\Xi$ m. 1 V; corr. Memus.

cuntur secantes et inter se et sectiones oppositas alteras, erit, ut quadrata contingentium inter se, ita rectangulum comprehensum rectis inter sectiones punctumque concursus positum ad rectangulum comprehensum rectis eodem modo sumptis.

sint oppositae coniugatae AB , ΓA , EZ , $H\Theta$, centrum autem earum K , et $A\Phi\Gamma A$, $EXAA$ sectiones AB , EZ contingentes in A concurrant, ducanturque AK , EK et producantur ad B , Z , ab H autem rectae AA parallela ducatur $HMN\Xi O$ et a Θ rectae EA parallela $\Theta\Pi\Xi\Sigma$. dico, esse

$$EA^2 : AA^2 = \Theta\Xi \times \Xi\Sigma : H\Xi \times \Xi O.$$

per Σ enim ducatur ΣT rectae AA parallela, ab O autem OT rectae EA parallela. iam quoniam oppo-



sitarum coniugarum AB , ΓA , EZ , $H\Theta$ diametrus est BE , et EA sectionem contingit, eique parallela ducta est $\Theta\Sigma$, erit [II, 20; I def. 5] $\Theta\Pi = \Pi\Sigma$ et eadem de causa $HM = MO$. et quoniam est

$$EA^2 : E\Phi A = \Pi\Sigma^2 : \Pi T\Sigma = \Pi\Xi^2 : \Pi N\Xi$$

[Eucl. VI, 19; V, 16], erit etiam reliquum [Eucl. II, 5]

$\Theta\Xi \times \Xi\Sigma : TN\Xi\Sigma = EA^2 : \Phi AE$ [Eucl. V, 19]. est autem [prop. IV] $E\Phi A = AA X$ et¹⁾

$$TN\Xi\Sigma = \Xi PTO;$$

itaque $EA^2 : AA X = \Theta\Xi \times \Xi\Sigma : \Xi O T P$. est autem

1) Ex prop. XV, quae tum quoque ualet, cum rectae contingentes suam quaeque sectionum oppositarum contingunt.

ἄρα, ὥς τὸ ἀπὸ EA πρὸς τὸ ἀπὸ AA , τὸ ὑπὸ $\Theta\Xi\Sigma$
πρὸς τὸ ὑπὸ $H\Xi O$.

καδ'.

Ἐὰν ἐν ταῖς κατὰ συζυγίαν ἀντικειμέναις ἀπὸ τοῦ
5 κέντρου διαχθῶσι πρὸς τὰς τομὰς δύο εὐθεῖαι, καὶ
λέγῃται αὐτῶν ἡ μὲν πλαγία διάμετρος, ἡ δὲ ὀρθία,
ἀχθῶσι δέ τινες παρὰ τὰς δύο διαμέτρους συμπίπτου-
σαι ἀλλήλαις καὶ ταῖς τομαῖς, ἡ δὲ σύμπτωσις ἥ τῶν
εὐθειῶν ἐν τῷ μεταξὺ τόπῳ τῶν τεσσάρων τομῶν, τὸ
10 περιεχόμενον ὑπὸ τῶν τμημάτων τῆς παραλλήλου τῇ
πλαγίᾳ μετὰ τοῦ πρὸς ὃ λόγον ἔχει τὸ ὑπὸ τῶν
τμημάτων τῆς παραλλήλου τῇ ὀρθίᾳ, ὃν το ἀπὸ τῆς
ὀρθίας πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς πλαγίας τετράγωνον, ἴσον
ἔσται τῷ δις ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς πλαγίας τετραγώνῳ.
15 ἔστωσαν κατὰ συζυγίαν ἀντικείμεναι αἱ A, B, Γ, Δ ,
ὧν κέντρον το E , καὶ ἀπὸ τοῦ E διήχθωσαν ἡ τε
 $AE\Gamma$ πλαγία καὶ ἡ ΔEB ὀρθία, καὶ παρὰ τὰς AG ,
 ΔB ἤχθωσαν αἱ $ZH\Theta IKA, MN\Xi O\Pi P$ συμπίπτου-
σαι ἀλλήλαις κατὰ τὸ Ξ . ἔστω δὲ πρότερον τὸ Ξ
20 ἐντὸς τῆς ὑπὸ $\Sigma E\Phi$ γωνίας ἢ τῆς ὑπὸ ΥET . λέγω,
ὅτι τὸ ὑπὸ $Z\Xi A$ μετὰ τοῦ πρὸς ὃ λόγον ἔχει τὸ
ὑπὸ $M\Xi P$, ὃν τὸ ἀπὸ ΔB πρὸς τὸ ἀπὸ AG , ἴσον
ἔστι τῷ δις ἀπὸ AE .

ἤχθωσαν γὰρ ἀσύμπτωτοι τῶν τομῶν αἱ ΣET ,
25 $\Upsilon E\Phi$, καὶ διὰ τοῦ A ἐφαπτομένη τῆς τομῆς ἢ
 $\Sigma H A \Phi$. ἐπεὶ οὖν τὸ ὑπὸ $\Sigma A \Phi$ ἴσον ἔστι τῷ ἀπὸ
 ΔE , ἔστιν ἄρα, ὥς τὸ ὑπὸ $\Sigma A \Phi$ πρὸς τὸ ἀπὸ EA ,
οὕτως τὸ ἀπὸ ΔE πρὸς τὸ ἀπὸ EA . τὸ δὲ ὑπὸ

1. τὸ ὑπὸ] τοῦ V ; corr. p. 9. ἐν] εν, euan. V . 11. ὃ
λόγον] ὅλον V ; corr. p. 26. $\Sigma H A \Phi$] $AH\Sigma\Phi$ V ; corr. p
($\Phi A H \Sigma$).


[eodem modo] $AXA : AA^2 = \Xi PTO : H\Xi \times \Xi O$. ergo
ex aequo [Eucl. V, 22]

$$EA^2 : AA^2 = \Theta \Xi \times \Xi \Sigma : H\Xi \times \Xi O.$$

XXIV.

Si in oppositis coniugatis a centro ad sectiones duae rectae ducuntur, et altera earum diametrus transversa, altera recta sumitur, duabus autem diametris illis parallelae rectae quaedam ducuntur et inter se et cum sectionibus concurrentes, et punctum concursus in spatio inter quattuor sectiones posito est, rectangulum comprehensum partibus rectae diametro transversae parallelae cum spatio, ad quod rectangulum comprehensum partibus rectae diametro rectae parallelae rationem habet, quam quadratum diametri rectae ad quadratum transversae, aequale erit duplo quadrato dimidiaie diametri transversae.

sint A, B, Γ, Δ oppositae coniugatae, quarum centrum sit E , et ab E ducatur AEG diametrus



transversa et ΔEB recta, rectisque $A\Gamma, \Delta B$ parallelae ducantur $ZH\Theta IKA, MN\Xi O\Pi P$ in Ξ inter se concurrentes; Ξ autem prius intra angulum $\Sigma E\Phi$ uel τET positum sit. dico, $Z\Xi \times \Xi A$ cum spatio, ad quod $M\Xi \times \Xi P$ rationem

habet, quam $\Delta B^2 : A\Gamma^2$, aequale esse spatio $2AE^2$.

ducantur enim $\Sigma ET, \tau E\Phi$ asymptotae sectionum, et

In hac propositione duas tantum figuras habet V.

$\Sigma A \Phi$ πρὸς τὸ ἀπὸ AE λόγον ἔχει τὸν συγκείμενον
ἐκ τε τοῦ τῆς ΣA πρὸς AE καὶ τοῦ τῆς ΦA πρὸς
 AE . ἀλλ' ὥς μὲν ἡ ΣA πρὸς AE , ἡ $N \Xi$ πρὸς $\Xi \Theta$,
ὥς δὲ ἡ ΦA πρὸς AE , ἡ $\Pi \Xi$ πρὸς ΞK . ὁ ἄρα
5 τοῦ ἀπὸ AE πρὸς τὸ ἀπὸ AE λόγος σύγκειται ἐκ τε
τοῦ τῆς $N \Xi$ πρὸς $\Xi \Theta$ καὶ τοῦ τῆς $\Pi \Xi$ πρὸς ΞK .
σύγκειται δὲ ἐκ τῶν αὐτῶν ὁ τοῦ ὑπὸ $\Pi \Xi N$ πρὸς τὸ
ὑπὸ $K \Xi \Theta$. ὥς ἄρα τὸ ἀπὸ AE πρὸς τὸ ἀπὸ AE , τὸ
ὑπὸ $\Pi \Xi N$ πρὸς τὸ ὑπὸ $K \Xi \Theta$. καὶ ὥς ἄρα τὸ ἀπὸ AE
10 πρὸς τὸ ἀπὸ AE , τὸ ἀπὸ AE μετὰ τοῦ ὑπὸ $\Pi \Xi N$ πρὸς
τὸ ἀπὸ AE μετὰ τοῦ ὑπὸ $K \Xi \Theta$. ἴσον δὲ τὸ μὲν ἀπο
 AE τῷ ὑπὸ ΠMN , τουτέστι τῷ ὑπὸ PNM , τὸ δὲ ἐπὶ
 AE ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ $KZ \Theta$, τουτέστι τῷ ὑπὸ $A \Theta Z$.
ὥς ἄρα τὸ ἀπο AE πρὸς τὸ ἀπὸ EA , τὸ ὑπὸ $\Pi \Xi N$
15 μετὰ τοῦ ὑπὸ PNM πρὸς τὸ ὑπὸ $K \Xi \Theta$ μετὰ τοῦ
ὑπὸ $A \Theta Z$. ἴσον δὲ τὸ ὑπὸ $\Pi \Xi N$ μετὰ τοῦ ὑπο
 PNM τῷ ὑπὸ $P \Xi M$. ὥς ἄρα τὸ ἀπὸ AE πρὸς τὸ
ἀπὸ EA , τὸ ὑπο $P \Xi M$ πρὸς τὸ ὑπὸ $K \Xi \Theta$ μετὰ τοῦ
ὑπὸ $KZ \Theta$. δεικτέον οἶν, ὅτι τὸ ὑπὸ $Z \Xi A$ μετὰ τοῦ
20 ὑπὸ $K \Xi \Theta$ καὶ τοῦ ὑπὸ $KZ \Theta$ ἴσον ἐστὶ τῷ δις ἀπὸ
 EA . κοινὸν ἀφηροήσθω τὸ ἀπὸ AE , τουτέστι τὸ ὑπὸ
 $KZ \Theta$. λοιπὸν ἄρα δεικτέον, ὅτι τὸ ὑπὸ $K \Xi \Theta$ μετὰ
τοῦ ὑπὸ $A \Xi Z$ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ AE . ἐστὶ δέ· τὸ
γὰρ ὑπὸ $K \Xi \Theta$ μετὰ τοῦ ὑπὸ $A \Xi Z$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ
25 $A \Theta Z$, τουτέστι τῷ ὑπὸ $KZ \Theta$, τουτέστι τῷ ἀπὸ AE .
συμπιπτεύσαν δὴ αἱ ZA , MP ἐπὶ μιᾷς τῶν
ἀσυμπτῶτων κατὰ τὸ Θ . ἴσον δὴ ἐστὶ τὸ ὑπὸ $Z \Theta A$
τῷ ἀπὸ AE καὶ τὸ ὑπὸ $M \Theta P$ τῷ ἀπὸ AE . ἐστὶν

13. $A \Theta Z$] $A \Theta \Xi$ V; corr. Memus. 16. $A \Theta Z$] $A \Theta \Xi$ V;
corr. Memus. 17. PNM] PMN V; corr. p (τῶν PN , NM).
25. $A \Theta Z$] $AZ \Theta$ V; corr. Memus.

per A sectionem contingens $\Sigma H A \Phi$. iam quoniam
est $\Sigma A \times A \Phi = \Delta E^2$ [I, 56; II, 1], erit [Eucl. V, 7]
 $\Sigma A \times A \Phi : EA^2 = \Delta E^2 : EA^2$. est autem

$$\Sigma A \times A \Phi : AE^2 = (\Sigma A : AE) \times (\Phi A : AE).$$

uerum $\Sigma A : AE = N\Xi : \Xi\Theta$, $\Phi A : AE = \Pi\Xi : \Xi K$
[Eucl. VI, 4]; itaque

$$\begin{aligned} \Delta E^2 : AE^2 &= (N\Xi : \Xi\Theta) \times (\Pi\Xi : \Xi K) \\ &= \Pi\Xi \times \Xi N : K\Xi \times \Xi\Theta \end{aligned}$$

$= \Delta E^2 + \Pi\Xi \times \Xi N : AE^2 + K\Xi \times \Xi\Theta$ [Eucl. V, 12].
est autem $\Delta E^2 = \Pi M \times MN$ [II, 11] $= PN \times NM$
[II, 16], et [eodem modo]

$$AE^2 = KZ \times Z\Theta = A\Theta \times \Theta Z;$$

erit igitur

$$\Delta E^2 : EA^2$$

$$= \Pi\Xi \times \Xi N + PN \times NM : K\Xi \times \Xi\Theta + A\Theta \times \Theta Z.$$

est autem $\Pi\Xi \times \Xi N + PN \times NM = P\Xi \times \Xi M$
[u. Pappi lemma V, 2]; itaque

$$\Delta E^2 : EA^2 = P\Xi \times \Xi M : K\Xi \times \Xi\Theta + KZ \times Z\Theta.$$

demonstrandum igitur, esse

$$Z\Xi \times \Xi A + K\Xi \times \Xi\Theta + KZ \times Z\Theta = 2EA^2.$$

auferatur, quod commune est, $AE^2 = KZ \times Z\Theta$.
itaque reliquum est, ut demonstremus, esse

$$K\Xi \times \Xi\Theta + A\Xi \times \Xi Z = AE^2.$$

et est; nam

$$K\Xi \times \Xi\Theta + A\Xi \times \Xi Z = A\Theta \times \Theta Z$$

$$= KZ \times Z\Theta \text{ [u. Pappi lemma V, 1]} = AE^2.$$

iam uero ZA , MP in altera asymptotarum con-
current in Θ . itaque $Z\Theta \times \Theta A = AE^2$ et

$$M\Theta \times \Theta P = \Delta E^2 \text{ [II, 11, 16];}$$

itaque $\Delta E^2 : EA^2 = M\Theta \times \Theta P : Z\Theta \times \Theta A$. uolu-
mus igitur, esse $2Z\Theta \times \Theta A = 2AE^2$. et est.

ἄρα, ὥς το ΔE πρὸς τὸ ΔB , τὸ ὑπὸ $M\Theta P$ πρὸς τὸ ὑπὸ $Z\Theta A$. ὥστε τὸ δις ὑπὸ $Z\Theta A$ ἴσον ζητοῦμεν τῷ δις ἀπὸ AE . ἔστι δέ.

ἔστω δὲ τὸ Ξ ἐντὸς τῆς ὑπὸ ΣEK γωνίας ἢ τῆς
 5 ὑπὸ ΦET . ἔσται δὲ ὁμοίως διὰ τὴν συναφὴν τῶν λόγων, ὥς τὸ ΔE πρὸς τὸ ΔB , τὸ ὑπὸ $\Pi \Xi N$ πρὸς τὸ ὑπὸ $K \Xi \Theta$. τῷ δὲ ἀπὸ AE ἴσον ἐστὶ τὸ ὑπὸ ΠMN , τουτέστι τὸ ὑπὸ PNM , τῷ δὲ ἀπὸ AE ἴσον ἐστὶ τὸ ὑπὸ $A\Theta Z$. ἔστιν ἄρα, ὥς τὸ ὑπὸ
 10 PNM πρὸς τὸ ὑπὸ $A\Theta Z$, οὕτως ἀφαιρεθὲν τὸ ὑπὸ $\Pi \Xi N$ πρὸς ἀφαιρεθὲν τὸ ὑπὸ $K \Xi \Theta$. καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ $P \Xi M$ πρὸς λοιπὴν τὴν ὑπεροχὴν, ἣ ὑπερέχει τὸ ἀπὸ AE τοῦ ὑπὸ $K \Xi \Theta$. δεικτέον ἄρα, ὅτι τὸ ὑπὸ $Z \Xi A$ προσλαβὼν τὴν ὑπεροχὴν, ἣ ὑπερ-
 15 ἔχει τὸ ἀπὸ AE τοῦ ὑπὸ $K \Xi \Theta$, ἴσον ἐστὶ τῷ δις ἀπὸ AE . κοινὸν ἀφηρήσθω τὸ ἀπὸ AE , τουτέστι τὸ ὑπὸ $Z\Theta A$. λοιπὸν ἄρα δεικτέον, ὅτι τὸ ὑπὸ $K \Xi \Theta$ μετα τῆς ὑπεροχῆς, ἣ ὑπερέχει τὸ ἀπὸ AE τοῦ ὑπὸ $K \Xi \Theta$, ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ AE . ἔστι δέ· τὸ γὰρ ἔλασσον το
 20 ὑπὸ $K \Xi \Theta$ προσλαβὼν τὴν ὑπεροχὴν ἴσον ἐστὶ τῷ μείζονι τῷ ἀπὸ AE .


κε'.

Τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων ἔστω ἡ σύμπτωσις τῶν παραλλήλων ταῖς AG , BA ἐντὸς μιᾶς τῶν A , B το-
 25 μῶν, ὥς ὑπόκειται, κατὰ τὸ Ξ .

λέγω, ὅτι τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τῶν τμημάτων τῆς παραλλήλου τῇ πλαγίᾳ, τουτέστι τὸ ὑπὸ $O \Xi N$, τοῦ πρὸς ὃ λόγον ἔχει τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τῶν τμημά-

8. τό] (pr.) τῷ V; corr. p. 9. τό] (pr.) c, τῷ V p. 10. $A\Theta Z$] ΘAZ V; corr. Memus. 13. Post $K \Xi \Theta$ add. ἔστιν ὥς

iam uero Ξ intra angulum ΣEK uel ΦET positum sit. itaque eodem modo propter compositionem rationum erit $\angle E^2 : EA^2 = \Pi \Xi \times \Xi N : K \Xi \times \Xi \Theta$.



est autem $\Pi M \times MN = \angle E^2$ [II, 11] $= PN \times NM$ [II, 16], et $\angle \Theta \times \Theta Z = AE^2$ [II, 11, 16]. itaque est $PN \times NM : \angle \Theta \times \Theta Z = \Pi \Xi \times \Xi N : K \Xi \times \Xi \Theta$. quare etiam reliquum [u. Pappi lemma V, 1]

$P \Xi \times \Xi M : AE^2 \div K \Xi \times \Xi \Theta = \angle E^2 : EA^2$
[Eucl. V, 19]. demonstrandum igitur, esse

$$Z \Xi \times \Xi A + (AE^2 \div K \Xi \times \Xi \Theta) = 2 AE^2.$$

auferatur, quod commune est, $AE^2 = Z \Theta \times \Theta A$. itaque reliquum est, ut demonstremus, esse [u. Pappi lemma V, 2] $K \Xi \times \Xi \Theta + (AE^2 \div K \Xi \times \Xi \Theta) = AE^2$. et est; nam $K \Xi \times \Xi \Theta + AE^2 \div K \Xi \times \Xi \Theta = AE^2$.

XXV.

Iisdem suppositis punctum concursus rectarum rectis AG , BA parallelarum intra alterutram sectionum A , B positum sit, sicut infra descriptum est, in Ξ .

dico, rectangulum comprehensum partibus rectae diametro transuersae parallelae, hoc est $O \Xi \times \Xi N$,

$\tau\omicron \acute{\alpha}\pi\omicron \angle E \pi\rho\acute{o}s \tau\omicron \acute{\alpha}\pi\omicron EA$ Halley praeunte Commandino.
18. $\tau\omicron\upsilon\upsilon - 19. AE$] bis V; corr. p.c.

spatio, ad quod rectangulum comprehensum partibus rectae diametro rectae parallelae, hoc est $P\Xi \times \Xi M$, rationem habet, quam quadratum diametri rectae ad quadratum transversae, maius erit duplo quadrato dimidiaae diametri transversae.

eadem enim de causa est

$$\angle E^2 : EA^2 = \Pi\Xi \times \Xi\Theta : \Sigma\Xi \times \Xi A.$$

est autem [II, 11] $\angle E^2 = \Pi M \times M\Theta$, $AE^2 = AO \times O\Sigma$.

quare etiam $\angle E^2 : AE^2 = \Pi M \times M\Theta : AO \times O\Sigma$.

et quoniam est

$$\begin{aligned} \Pi\Xi \times \Theta\Xi : \angle E^2 \times \Xi\Sigma &= \Pi M \times M\Theta : AO \times O\Sigma \\ &= \Pi M \times M\Theta : \Sigma T \times TA \quad [\text{II, 22}], \end{aligned}$$

erit etiam reliquum [II, 16; Pappi lemma IV]

$$\begin{aligned} P\Xi \times \Xi M : T\Xi \times \Xi K &[\text{u. Pappi lemma V, 2 et II, 8}] \\ &= \angle E^2 : AE^2 \quad [\text{Eucl. V, 19}]. \end{aligned}$$

demonstrandum igitur, esse

$$O\Xi \times \Xi N = T\Xi \times \Xi K + 2AE^2.$$

auferatur, quod commune est, $T\Xi \times \Xi K$; reliquum igitur est, ut demonstramus, esse $OT \times TN = 2AE^2$ [II, 8, 16 et Pappi lemma V, 2]. et est [II, 23].

XXVI.

Sin punctum concursus parallelarum Ξ intra alterutram sectionum A, Γ positum est, sicut infra descriptum est, rectangulum comprehensum partibus rectae diametro transversae parallelae, hoc est $\angle\Xi \times \Xi Z$, spatio, ad quod rectangulum comprehensum partibus alterius, hoc est $P\Xi \times \Xi H$, rationem habet, quam quadratum diametri rectae ad quadratum transversae, minus erit duplo quadrato dimidiaae diametri transversae.

nam quoniam eadem de causa, qua antea, est

$\angle E^2 : EA^2 = \Phi \Xi \times \Xi \Sigma : K \Xi \times \Xi \Theta$, erit etiam totum
[u. Pappi lemma V, 2, coll. II, 11, 16]

$P \Xi \times \Xi H : K \Xi \times \Xi \Theta + AE^2 = \angle E^2 : EA^2$ [Eucl. V, 12].
demonstrandum igitur, esse

$$A \Xi \times \Xi Z + 2 AE^2 = K \Xi \times \Xi \Theta + AE^2.$$

auferatur, quod commune est, AE^2 ; itaque reli-
quum est, ut demonstremus, esse

$$A \Xi \times \Xi Z + AE^2 = K \Xi \times \Xi \Theta,$$

hoc est [II, 11, 16] $A \Xi \times \Xi Z = K \Xi \times \Xi \Theta + A \Theta \times \Theta Z$.
et est; nam $A \Theta \times \Theta Z + A \Xi \times \Xi Z = K \Xi \times \Xi \Theta$
[u. Pappi lemma IV, coll. II, 16].

XXVII.

Si ellipsis uel ambitus circuli diametri coniugatae
ducuntur, et altera earum diametrus recta sumitur,
altera transuersa, iisque parallelae duae rectae ducuntur
inter se et cum linea concurrentes, quadrata rectarum
in recta diametro transuersae parallela ducta inter
punctum concursus rectarum lineamque abscisarum ad-
sumptis figuris descriptis in rectis in recta diametro
rectae parallela ducta inter punctum concursus recta-
rum lineamque abscisis, quae figurae similes simili-
terque descriptae sunt figurae ad diametrum rectam
suppositae, aequalia erunt quadrato diametri trans-
uersae.

sit enim ellipsis uel ambitus circuli $AB\Gamma A$, cuius
centrum sit E , et ducantur duae eius diametri con-
iugatae, recta $AE\Gamma$, transuersa autem BEA , rectisque
 $A\Gamma$, BA parallelae ducantur $NZH\Theta$, $KZAM$. dico,
 $NZ^2 + Z\Theta^2$ adsumptis figuris in KZ , ZM similibus

διάμετροι, ὀρθία μὲν ἡ $ΑΕΓ$, πλαγία δὲ ἡ $ΒΕΔ$, καὶ
 παρὰ τὰς $ΑΓ$, $ΒΔ$ ἤχθωσαν αἱ NZ , $HΘ$, KZ , $ΑΜ$.
 λέγω, ὅτι τὰ ἀπὸ τῶν NZ , $ZΘ$ τετράγωνα προσλαμβάνοντα
 τὰ ἀπὸ τῶν KZ , ZM εἶδη ὅμοια καὶ ὁμοίως ἀναγε-
 5 γραμμένα τῷ πρὸς τῇ $ΑΓ$ εἶδει ἴσα ἔσται τῷ ἀπὸ τῆς
 $ΒΔ$ τετραγώνῳ.

ἤχθω ἀπὸ τοῦ N παρὰ τὴν $ΑΕ$ ἡ $NΞ$ τεταγμέ-
 νως ἄρα κατῆκται ἐπὶ τὴν $ΒΔ$. καὶ ἔστω ὀρθία ἡ $ΒΠ$.
 ἐπεὶ οὖν ἔστιν, ὥς ἡ $ΒΠ$ πρὸς $ΑΓ$, ἡ $ΑΓ$ πρὸς $ΒΔ$,
 10 καὶ ὥς ἄρα ἡ $ΒΠ$ πρὸς $ΒΔ$, τὸ ἀπὸ $ΑΓ$ πρὸς τὸ
 ἀπὸ $ΒΔ$. τὸ δὲ ἀπὸ $ΒΔ$ ἴσον ἐστὶ τῷ πρὸς τῇ
 $ΑΓ$ εἶδει· ἔστιν ἄρα, ὥς ἡ $ΒΠ$ πρὸς $ΒΔ$, τὸ ἀπὸ
 $ΑΓ$ τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ $ΑΓ$ εἶδος. ὥς δὲ τὸ
 ἀπὸ $ΑΓ$ τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ $ΑΓ$ εἶδος, τὸ
 15 ἀπὸ $NΞ$ τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ $NΞ$ εἶδος ὅμοιον
 τῷ πρὸς τῇ $ΑΓ$ εἶδει· καὶ ὥς ἄρα ἡ $ΠΒ$ πρὸς $ΒΔ$,
 τὸ ἀπὸ $NΞ$ τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ $NΞ$ εἶδος
 ὅμοιον τῷ πρὸς τῇ $ΑΓ$ εἶδει. ἔστι δὲ καί, ὥς ἡ
 $ΠΒ$ πρὸς $ΒΔ$, τὸ ἀπὸ $NΞ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $BΞΔ$ · ἴσον
 20 ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ $NΞ$ εἶδος, τουτέστι τὸ ἀπὸ $ZΔ$,
 ὅμοιον τῷ πρὸς τῇ $ΑΓ$ εἶδει, τῷ ὑπὸ $BΞΔ$. ὁμοίως
 δὴ δείξομεν, ὅτι τὸ ἀπὸ $ΚΑ$ εἶδος ὅμοιον τῷ πρὸς
 τῇ $ΑΓ$ εἶδει ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ $ΒΑΔ$. καὶ ἐπεὶ εὐθεία
 ἡ $NΘ$ τέμνεται εἰς μὲν ἴσα κατὰ τὸ H , εἰς δὲ ἄνισα
 25 κατὰ τὸ Z , τὰ ἀπὸ τῶν $ΘZ$, ZN τετράγωνα διπλάσιά
 εἰσι τῶν ἀπὸ $ΘH$, HZ , τουτέστι τῶν ἀπὸ NH , HZ .
 διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ τὰ ἀπὸ MZ , ZK τετράγωνα δι-
 πλάσιά ἐστι τῶν ἀπὸ $ΚΑΖ$ τετραγώνων, καὶ τὰ ἀπὸ


3. NZ] p, corr. ex $NΞ$ m. 1 V. 13. τό] (pr.) om. V;
 corr. p. 17. $NΞ$] (alt.) pc, corr. ex NZ m. 1 V. 26. τῶν]
 (pr.) pc, corr. ex τῷ m. 1 V.

similiterque descriptis figurae ad AG adplicatae esse $= B\Delta^2$.

ducatur ab N rectae AE parallela $N\xi$; ea igitur ad $B\Delta$ ordinate ducta est [I def. 6]. et latus rectum sit $B\Pi$. iam quoniam est [I def. alt. 3]

$$B\Pi : AG = AG : B\Delta,$$

erit etiam $B\Pi : B\Delta = AG^2 : B\Delta^2$ [Eucl. V def. 9]. uerum $B\Delta^2$ figurae ad AG adplicatae aequale est [I, 15]. itaque ut $B\Pi : B\Delta$, ita AG^2 ad figuram



ad AG adplicatam. uerum ut AG^2 ad figuram ad AG adplicatam, ita $N\xi^2$ ad figuram ad $N\xi$ adplicatam figurae ad AG adplicatae similem [Eucl. VI, 22]. quare etiam, ut $\Pi B : B\Delta$, ita $N\xi^2$ ad figuram ad $N\xi$ adplicatam figurae ad AG adplicatae similem. uerum etiam [I, 21] $\Pi B : B\Delta = N\xi^2 : B\xi \times \xi\Delta$. itaque [Eucl. V, 9] figura ad $N\xi$, hoc est [Eucl. I, 34] ad $Z\Delta$, adplicata figurae ad AG adplicatae similis aequalis est rectangulo $B\xi \times \xi\Delta$. iam similiter demonstrabimus, figuram ad $K\Delta$ adplicatam figurae ad AG adplicatae similem aequalem esse rectangulo $B\Delta \times \Delta\Delta$. et quoniam recta $N\theta$ in H in partes aequales [I def. 6], in Z autem in inaequales secta est,

MZK εἶδη ὅμοια τῷ πρὸς τῇ $ΑΓ$ εἶδει διπλάσιά ἐστι
 τῶν ἀπὸ KAZ ὁμοίων εἰδῶν. ἴσα δὲ ἐστὶ τὰ μὲν
 ἀπὸ KAZ εἶδη τοῖς ὑπὸ $BΞΔ$, $BAΔ$, τὰ δὲ ἀπὸ NHZ
 τετράγωνα τοῖς ἀπὸ $ΞΕΑ$. τὰ ἄρα ἀπὸ $NZΘ$ τετρά-
 5 γωνα μετὰ τῶν ἀπὸ KZM εἰδῶν ὁμοίων τῷ πρὸς τῇ
 $ΑΓ$ εἶδει διπλάσιά ἐστι τῶν ὑπὸ $BΞΔ$, $BAΔ$ καὶ
 τῶν ἀπὸ $ΞΕΑ$. καὶ ἐπεὶ εὐθεΐα ἡ BA τέμνεται εἰς
 μὲν ἴσα κατὰ τὸ E , εἰς δὲ ἄνισα κατὰ τὸ $Ξ$, τὸ ὑπὸ
 $BΞΔ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $ΞΕ$ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ BE . ὁμοίως
 10 δὲ καὶ τὸ ὑπὸ $BAΔ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ AE ἴσον ἐστὶ τῷ
 ἀπὸ BE . ὥστε τὰ ὑπὸ $BΞΔ$ καὶ ὑπὸ $BAΔ$ καὶ τὰ
 ἀπὸ $ΞΕ$, AE ἴσα ἐστὶ τῷ δις ἀπὸ BE . τὰ ἄρα ἀπὸ
 $NZΘ$ τετράγωνα μετὰ τῶν ἀπὸ KZM εἰδῶν ὁμοίων
 τῷ πρὸς τῇ $ΓΑ$ εἶδει διπλάσιά ἐστι τοῦ δις ἀπὸ BE .
 15 ἐστὶ δὲ καὶ τὸ ἀπὸ BA διπλάσιον τοῦ δις ἀπὸ BE .
 τὰ ἄρα ἀπὸ $NZΘ$ τετράγωνα προσλαβόντα τὰ ἀπὸ
 KZM εἶδη ὅμοια τῷ πρὸς τῇ $ΑΓ$ εἶδει ἴσα ἐστὶ τῷ
 ἀπὸ BA .

κη'.

20 Ἐὰν ἐν ταῖς κατὰ συζυγίαν ἀντικειμέναις συζυγεῖς
 διάμετροι ἀχθῶσι, καὶ λέγεται αὐτῶν ἡ μὲν ὀρθία,
 ἡ δὲ πλαγία, ἀχθῶσι δὲ παρ' αὐτάς δύο εὐθεΐαι συμ-
 πύπτουσιν ἀλλήλαις καὶ ταῖς τομαῖς, τὰ ἀπὸ τῶν λαμ-
 βανομένων εὐθειῶν ἐπ' εὐθείας τῆς παρὰ τὴν ὀρθίαν
 25 ἡγμένης μεταξὺ τῆς συμπτώσεως τῶν εὐθειῶν καὶ τῶν
 τομῶν τετράγωνα πρὸς τὰ ἀπὸ τῶν ἀπολαμβανομένων
 εὐθειῶν ἐπ' εὐθείας τῆς παρὰ τὴν πλαγίαν ἡγμένης
 μεταξὺ τῆς συμπτώσεως τῶν εὐθειῶν καὶ τῶν τομῶν

9. μετά] pc, μ e corr. m. 1 V. 10. δέ] δὴ Halley. 23.
 ἀπολαμβανομένων Halley. 26. τὰ] τό V; corr. p. 27. ἡγ-
 μένης] τῆς ἡγμένης V; corr. p.

erit [Eucl. II, 9]

$$\Theta Z^2 + ZN^2 = 2(\Theta H^2 + HZ^2) = 2(NH^2 + HZ^2).$$

eadem de causa erit etiam

$$MZ^2 + ZK^2 = 2(KA^2 + AZ^2),$$

et figurae in MZ , ZK descriptae figurae in AK , AZ descriptae similes duplo maiores sunt figuris in KA , AZ similibus descriptis [Eucl. VI, 22]. uerum figurae in KA , AZ descriptae rectangulis $B\Xi \times \Xi A$, $BA \times AA$ aequales sunt, et $NH^2 + HZ^2 = \Xi E^2 + EA^2$ [Eucl. I, 34]; itaque $NZ^2 + Z\Theta^2$ cum figuris in KZ , ZM figurae ad AK adplicatae similibus descriptis duplo maiora sunt quam $B\Xi \times \Xi A + BA \times AA + \Xi E^2 + EA^2$. et quoniam recta BA in E in partes aequales, in Ξ autem in partes inaequales secta est, erit [Eucl. II, 5] $B\Xi \times \Xi A + \Xi E^2 = BE^2$. et eodem modo

$$BA \times AA + AE^2 = BE^2.$$

quare erit

$$B\Xi \times \Xi A + BA \times AA + \Xi E^2 + AE^2 = 2BE^2.$$

itaque $NZ^2 + Z\Theta^2$ cum figuris in KZ , ZM figurae ad AK adplicatae similibus descriptis aequalia sunt $4BE^2$. uerum etiam $BA^2 = 4BE^2$. itaque $NZ^2 + Z\Theta^2$ adsumptis figuris in KZ , ZM figurae ad AK adplicatae similibus descriptis quadrato BA^2 aequalia sunt.


XXVIII.

Si in oppositis coniugatis diametri coniugatae ducuntur, et altera earum diametrus recta sumitur, altera transversa, iisque parallelae duae rectae ducuntur inter se et cum sectionibus concurrentes, quadrata rectarum in recta diametro rectae parallela ducta inter punctum concursus rectarum sectionesque sumptarum ad qua-

τετράγωνα λόγον ἔχουσιν, ὃν τὸ ἀπὸ τῆς ὀρθίας τετρά-
γωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς πλαγίας τετράγωνον.

ἔστωσαν κατὰ συζυγίαν ἀντικείμεναι αἱ A, B, Γ, Δ ,
διάμετροι δὲ αὐτῶν ὀρθία μὲν ἡ $AE\Gamma$, πλαγία δὲ ἡ
5 $BE\Delta$, καὶ παρ' αὐτάς ἤχθωσαν αἱ $ZH\Theta K, \Lambda HMN$
τέμνουσαι ἀλλήλας καὶ
τὰς τομάς. λέγω, ὅτι τὰ
ἀπὸ τῶν ΛHN τετρά-
γωνα πρὸς τὰ ἀπὸ ZHK
10 λόγον ἔχει, ὃν τὸ ἀπὸ τῆς
 $A\Gamma$ πρὸς τὸ ἀπὸ $B\Delta$.

ἤχθωσαν γὰρ ἀπὸ
τῶν Z, Λ τεταγμένως αἱ
 $\Lambda\Xi, ZO$. παράλληλοι ἄρα εἰσὶ ταῖς $A\Gamma, B\Delta$. ἀπὸ
15 δὲ τοῦ B ἤχθω ἡ ὀρθία τῆς $B\Delta$ ἡ $B\Pi$. φανερόν
δὴ, ὅτι ἐστίν, ὡς ἡ ΠB πρὸς $B\Delta$, τὸ ἀπὸ $A\Gamma$ πρὸς
τὸ ἀπὸ $B\Delta$ καὶ τὸ ἀπὸ AE πρὸς τὸ ἀπὸ EB καὶ
τὸ ἀπὸ ZO πρὸς τὸ ὑπὸ $BO\Delta$ καὶ τὸ ὑπὸ $\Gamma\Xi\Lambda$
πρὸς τὸ ἀπὸ $\Lambda\Xi$. ἔστιν ἄρα, ὡς ἐν τῶν ἡγουμένων
20 πρὸς ἐν τῶν ἐπομένων, οὕτως ἅπαντα τὰ ἡγούμενα
πρὸς ἅπαντα τὰ ἐπόμενα· ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ $A\Gamma$ πρὸς
τὸ ἀπὸ $B\Delta$, τὸ ὑπὸ $\Gamma\Xi\Lambda$ μετὰ τοῦ ἀπὸ AE καὶ τοῦ
ἀπὸ OZ , τουτέστι τοῦ ἀπὸ $E\Theta$, πρὸς τὸ ὑπὸ ΔOB
μετὰ τοῦ ἀπὸ BE καὶ τοῦ ἀπὸ $\Lambda\Xi$, τουτέστι τοῦ ἀπὸ
25 ME . ἀλλὰ τὸ μὲν ὑπὸ $\Gamma\Xi\Lambda$ μετὰ τοῦ ἀπὸ AE ἴσον
ἐστὶ τῷ ἀπὸ ΞE , τὸ δὲ ὑπὸ ΔOB μετὰ τοῦ ἀπὸ BE
ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ OE . ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ $A\Gamma$ πρὸς τὸ
ἀπὸ $B\Delta$, τὰ ἀπὸ $\Xi E\Theta$ πρὸς τὰ ἀπὸ OEM , τουτέστι
τὰ ἀπὸ ΛMH πρὸς τὰ ἀπὸ $Z\Theta H$. καὶ ἐστὶ τῶν μὲν



5. $BE\Delta$] $AE\Delta$ V; corr. p. ΛHMN] $H\Lambda MN$ V;
corr. p. 14. $A\Gamma, B\Delta$] $AB, \Gamma\Delta$ V; corr. p. 19. $\Lambda\Xi$] p;

drata rectarum in recta diametro transversae parallela ducta inter punctum concursus rectarum sectionesque abscisarum eam rationem habent, quam quadratum diametri rectae ad quadratum diametri transversae.

sint oppositae coniugatae A, B, Γ, Δ , diametri autem earum recta $AE\Gamma$, transversa $BE\Delta$, iisque parallelae ducantur $ZH\Theta K$, $AHMN$ inter se sectionesque secantes. dico, esse

$$AH^2 + HN^2 : ZH^2 + HK^2 = A\Gamma^2 : B\Delta^2.$$

ducantur enim a Z, Δ ordinate $A\Xi, ZO$; eae igitur rectis $A\Gamma, B\Delta$ parallelae erunt [I def. 6]. a B autem latus rectum transversae lateris $B\Delta$ ducatur $B\Pi$. manifestum igitur, esse

$$\begin{aligned} \Pi B : B\Delta &= A\Gamma^2 : B\Delta^2 \text{ [I def. alt. 3; Eucl. V def. 9]} \\ &= AE^2 : EB^2 \text{ [Eucl. V, 15]} = ZO^2 : BO \times O\Delta \text{ [I, 21]} \\ &= \Gamma\Xi \times \Xi A : A\Xi^2 \text{ [I, 56]}. \end{aligned}$$

itaque, ut unum praecedentium ad unum sequentium, ita omnia praecedentia ad omnia sequentia [Eucl. V, 12]; quare erit

$$\begin{aligned} &A\Gamma^2 : B\Delta^2 \\ &= \Gamma\Xi \times \Xi A + AE^2 + OZ^2 : \Delta O \times OB + BE^2 + A\Xi^2 \\ &= \Gamma\Xi \times \Xi A + AE^2 + E\Theta^2 : \Delta O \times OB + BE^2 + ME^2 \\ &\text{[Eucl. I, 34]. est autem} \\ &\Gamma\Xi \times \Xi A + AE^2 = \Xi E^2, \Delta O \times OB + BE^2 = OE^2 \\ &\text{[Eucl. II, 6]; itaque} \\ &A\Gamma^2 : B\Delta^2 = \Xi E^2 + E\Theta^2 : OE^2 + EM^2 \\ &= AM^2 + MH^2 : Z\Theta^2 + \Theta H^2 \text{ [Eucl. I, 34]}. \end{aligned}$$

$A\Xi$ c et corr. m. 1 ex ΔZ V. 23. $\tau\theta\upsilon$] p v; euan. V. 29.
 $Z\Theta H$] $ZH\Theta$ V; corr. Memus.

est autem, ut demonstrauius [prop. XXVII ex Eucl. II, 9]

$$NH^2 + HA^2 = 2(AM^2 + MH^2),$$

$$ZH^2 + HK^2 = 2(Z\Theta^2 + \Theta H^2).$$

ergo etiam

$$A\Gamma^2 : B\Delta^2 = AH^2 + HN^2 : ZH^2 + HK^2.$$

XXIX.

Iisdem suppositis si recta diametro rectae parallela asymptotas secat, quadrata rectarum in recta diametro rectae parallela ducta inter punctum concursus rectarum asymptotasque abscisarum adsumpto dimidio quadrato diametri rectae ad quadrata rectarum in recta diametro transuersae parallela ducta inter punctum concursus rectarum sectionesque abscisarum rationem habent, quam quadratum diametri rectae ad quadratum diametri transuersae.

sint enim eadem, quae in propositione praecedenti, NA autem asymptotas secet in Ξ, O . demonstrandum, esse

$$\begin{aligned} \Xi H^2 + HO^2 + \frac{1}{2} A\Gamma^2 : ZH^2 + HK^2 &= A\Gamma^2 : B\Delta^2 \\ &= \Xi H^2 + HO^2 + 2EA^2 : ZH^2 + HK^2. \end{aligned}$$

nam quoniam est $A\Xi = ON$ [II, 16], erit [u. Pappi lemma VII et Eutocius]

$$\begin{aligned} AH^2 + HN^2 &= \Xi H^2 + HO^2 + 2N\Xi \times \Xi A \\ &= \Xi H^2 + HO^2 + 2AE^2 \text{ [II, 11, 16].} \end{aligned}$$

MA V; corr. p (AN). 20. $\tau\acute{\alpha}$] $\tau\acute{o}$ V; corr. p. 21. ΞHO] ΞNO V; corr. Memus. 23. $\tau\omicron\upsilon\tau\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ — $OA\Xi$] deleo. 26. $\tau\acute{\omega}$] $\tau\acute{o}$ V; corr. p.

λόγον ἔχει, ὃν τὸ ἀπὸ $ΑΓ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΒΔ$ · καὶ τὰ ἀπὸ $ΞΗΟ$ ἄρα μετὰ τοῦ δις ἀπὸ $ΕΑ$ πρὸς τὰ ἀπὸ $ΖΗΚ$ λόγον ἔχει, ὃν τὸ ἀπὸ $ΑΓ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΒΔ$.

λ'.


- 5 Ἐὰν ὑπερβολῆς δύο εὐθεῖαι ἐφαπτόμεναι συμπίπτωσι, καὶ διὰ μὲν τῶν ἀφῶν εὐθεῖα ἐκβληθῇ, διὰ δὲ τῆς συμπτώσεως ἄχθῃ εὐθεῖα παρὰ τινὰ τῶν ἀσυμπτῶτων τέμνουσα τὴν τε τομὴν καὶ τὴν τὰς ἀφὰς ἐπιξευγνύουσαν, ἥ μεταξὺ τῆς συμπτώσεως καὶ τῆς τὰς ἀφὰς ἐπιξευγνυούσης δίχα τμηθήσεται ὑπὸ τῆς τομῆς.
- 10 ἔστω ὑπερβολὴ ἡ $ΑΒΓ$, καὶ ἐφαπτόμεναι μὲν αἱ $ΑΔΓ$, ἀσύμπτωτοι δὲ αἱ $ΕΖΗ$, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ $ΑΓ$, καὶ διὰ τοῦ $Δ$ παρὰ τὴν $ΖΕ$ ἡχθῶ ἡ $ΔΚΑ$. λέγω, ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ $ΔΚ$ τῇ $ΚΑ$.
- 15 ἐπεζεύχθω γὰρ ἡ $ΖΔΒΜ$ καὶ ἐκβεβλήσθω ἐφ' ἐκάτερα, καὶ κείσθω τῇ $ΒΖ$ ἴση ἡ $ΖΘ$, καὶ διὰ τῶν $Β, Κ$ σημείων παρὰ τὴν $ΑΓ$ ἡχθῶσαν αἱ $ΒΕ, ΚΝ$. τεταγμένως ἄρα κατηγμέναι εἰσὶ. καὶ ἐπεὶ ὁμοίον ἐστὶ το $ΒΕΖ$ τρίγωνον τῷ $ΔΝΚ$, ἔστιν ἄρα, ὥς τὸ ἀπὸ $ΔΝ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΝΚ$, τὸ ἀπὸ $ΒΖ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΒΕ$.
- 20 ὥς δὲ τὸ ἀπὸ $ΒΖ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΒΕ$, οὕτως ἡ $ΘΒ$ πρὸς τὴν ὀρθίαν· καὶ ὥς ἄρα τὸ ἀπὸ $ΔΝ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΝΚ$, ἡ $ΘΒ$ πρὸς τὴν ὀρθίαν. ἀλλ' ὥς ἡ $ΘΒ$ πρὸς τὴν ὀρθίαν, οὕτως τὸ ὑπὸ $ΘΝΒ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΝΚ$.
- 25 καὶ ὥς ἄρα τὸ ἀπὸ $ΔΝ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΝΚ$, τὸ ὑπὸ $ΘΝΒ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΝΚ$. ἴσον ἄρα ἐστὶ τὸ ὑπὸ $ΘΝΒ$ τῷ ἀπὸ $ΔΝ$. ἔστι δὲ καὶ τὸ ὑπὸ $ΜΖΔ$ ἴσον τῷ ἀπὸ

3. ἀπ.] (alt.) om. V; corr. p. 13. ΖΕ] ΖΗ V; corr. Comm. (ef). 23. ἀλλ' — 24. ὀρθίαν] om. V; corr. Memus.

uerum $AH^2 + HN^2 : ZH^2 + HK^2 = A\Gamma^2 : B\Delta^2$
 [prop. XXVIII]; quare etiam
 $EH^2 + HO^2 + 2EA^2 : ZH^2 + HK^2 = A\Gamma^2 : B\Delta^2$.

XXX.

Si duae rectae hyperbolam contingentes concurrunt, et per puncta contactus recta ducitur, per punctum concursus autem recta alterutri asymptotarum parallela ducitur secans et sectionem et rectam puncta contactus coniungentem, recta inter punctum concursus rectamque puncta contactus coniungentem posita a sectione in duas partes aequales secabitur.



sit hyperbola $AB\Gamma$
 et contingentes AE ,
 $A\Gamma$, asymptotae autem
 EZ , ZH , ducaturque
 $A\Gamma$, et per Δ rectae
 ZE parallela ducatur
 $\Delta K\Lambda$. dico, esse

$$\Delta K = K\Lambda.$$

ducatur enim $Z\Delta BM$
 et in utramque partem
 producat, ponaturque
 $Z\Theta = BZ$, per puncta

B , K autem rectae $A\Gamma$ parallelae ducantur BE , KN ;
 eae igitur ordinate ductae sunt [I def. 4]. et quoniam
 trianguli BEZ , ΔNK similes sunt [Eucl. I, 29], erit
 $\Delta N^2 : NK^2 = BZ^2 : BE^2$ [Eucl. VI, 4].

uerum ut $BZ^2 : BE^2$, ita ΘB ad latus rectum [II, 1];
 itaque etiam, ut $\Delta N^2 : NK^2$, ita ΘB ad latus rectum.
 est autem, ut ΘB ad latus rectum, ita $\Theta N \times NB : NK^2$

ZB , διότι ἡ μὲν AA ἐφάπτεται, ἡ δὲ AM κατῆκται· ὥστε καὶ τὸ ὑπὸ ΘNB μετὰ τοῦ ἀπὸ ZB ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ MZA μετὰ τοῦ ἀπὸ AN . τὸ δὲ ὑπὸ ΘNB μετὰ τοῦ ἀπὸ ZB ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ ZN · καὶ τὸ ὑπὸ
 5 MZA ἄρα μετὰ τοῦ ἀπὸ AN ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ZN . ἡ ἄρα AM δίχα τέμνεται κατὰ τὸ N προσκειμένην ἔχουσα τὴν AZ . καὶ παράλληλοι εἰσιν αἱ KN , AM · ἴση ἔρα ἡ AK τῇ KA .


λα'.

10 Ἐάν τῶν ἀντικειμένων δύο εὐθεῖαι ἐφαπτόμεναι συμπίπτωσι, καὶ διὰ μὲν τῶν ἀφῶν εὐθεῖα ἐκβληθῇ, διὰ δὲ τῆς συμπτώσεως ἀχθῇ εὐθεῖα παρὰ τὴν ἀσύμπτωτον τέμνουσα τὴν τε τομὴν καὶ τὴν τὰς ἀφὰς ἐπι-
 15 ξευγνύουσαν, ἡ μεταξὺ τῆς συμπτώσεως καὶ τῆς τὰς ἀφὰς ἐπιξευγνυούσης δίχα τμηθῇσεται ὑπὸ τῆς τομῆς.

ἔστωσαν ἀντικείμεναι αἱ A , B , ἐφαπτόμεναι δὲ αἱ AGB , καὶ ἐπιξευχθεῖσα ἡ AB ἐκβεβλήσθω, ἀσύμπτωτος δὲ ἔστω ἡ ZE , καὶ διὰ
 20 τοῦ Γ παρὰ τὴν ZE ἤχθω ἡ $\Gamma H\Theta$. λέγω, ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΓH τῇ $H\Theta$.

ἐπεξεύχθω ἡ ΓE καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ A , καὶ διὰ τῶν E , H παρὰ τὴν
 25 AB ἤχθωσαν ἡ $NEKM$ καὶ ἡ $H\Xi$, διὰ δὲ τῶν H , K παρὰ τὴν GA αἱ KZ , HA .

ἐπεὶ ὁμοιόν ἐστὶ τὸ KZE τῷ MAH , ἔστιν, ὥς τὸ ἀπὸ KE πρὸς τὸ ἀπὸ KZ , το ἀπο MA πρὸς τὸ ἀπὸ



17. AGB] AGV ; corr. p (AG, BG). 19. Γ] ΓA V;
 corr. p. 25. $NEKM$] $EK MN$ V; corr. Halley. 28. τὸ]
 (tert.) om. V (in fine lineae); corr. p.

[I, 21]; quare etiam $\angle N^2 : NK^2 = \odot N \times NB : NK^2$.
quare $\odot N \times NB = \angle N^2$ [Eucl. V, 9]. est autem
etiam $MZ \times ZA = ZB^2$ [I, 37], quia AA contingit,
 AM autem ordinate ducta est. itaque etiam

$$\odot N \times NB + ZB^2 = MZ \times ZA + \angle N^2.$$

uerum $\odot N \times NB + ZB^2 = ZN^2$ [Eucl. II, 6]; quare
etiam $MZ \times ZA + \angle N^2 = ZN^2$; itaque AM in N
in duas partes aequales secta est adiectam habens AZ
[Eucl. II, 6]. et KN , AM parallelae sunt; ergo
[Eucl. VI, 2] $\angle K = KA$.

XXXI.

Si duae rectae sectiones oppositas contingentes concurrunt, et per puncta contactus recta ducitur, per punctum concursus autem recta asymptotae parallela ducitur secans et sectionem et rectam puncta contactus coniungentem, recta inter punctum concursus rectamque puncta contactus coniungentem posita a sectione in duas partes aequales secabitur.

sint oppositae A , B , contingentes autem AG , GB ,
et ducta AB producat, asymptota autem sit ZE ,
et per G rectae ZE parallela ducatur $GH\odot$. dico,
esse $GH = H\odot$.

ducatur GE et ad A producat, per E , H autem
rectae AB parallelae ducantur $NEKM$, $H\Xi$ et per
 H , K rectae GA parallelae KZ , HA .

quoniam KZE , MAH similes sunt [Eucl. I, 29],
erit $KE^2 : KZ^2 = MA^2 : AH^2$ [Eucl. VI, 4]. demon-
strauimus autem [prop. XXX ex II, 1 et I, 21], esse
 $EK^2 : KZ^2 = NA \times AK : AH^2$. itaque [Eucl. V, 9]
 $NA \times AK = MA^2$. commune adiiciatur KE^2 ; itaque

ΛH . ὥς δὲ τὸ ἀπὸ EK πρὸς τὸ ἀπὸ KZ , δέδεικται
 τὸ ὑπὸ $N\Lambda K$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΛH . ἴσον ἄρα τὸ ὑπὸ
 $N\Lambda K$ τῷ ἀπὸ $M\Lambda$. κοινὸν προσκείσθω τὸ ἀπὸ KE .
 τὸ ἄρα ὑπὸ $N\Lambda K$ μετὰ τοῦ ἀπὸ KE , τουτέστι τὸ ἀπὸ
 5 ΛE , τουτέστι τὸ ἀπὸ $H\Xi$, ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ $M\Lambda$, KE .
 ὥς δὲ τὸ ἀπὸ $H\Xi$ πρὸς τὰ ἀπὸ $M\Lambda$, KE , οὕτως τὸ
 ἀπὸ $\Xi\Gamma$ πρὸς τὰ ἀπὸ ΛH , KZ . ἴσον ἄρα τὸ ἀπὸ $\Xi\Gamma$
 τοῖς ἀπὸ HA , KZ . ἴσον δὲ τὸ μὲν ἀπὸ ΛH τῷ ἀπὸ
 ΞE , τὸ δὲ ἀπὸ KZ τῷ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς δευτέρας
 10 διαμέτρου, τουτέστι τῷ ὑπὸ $\Gamma E\Delta$. το ἄρα ἀπὸ $\Gamma\Xi$
 ἴσον ἐστὶ τῷ τε ἀπὸ ΞE καὶ τῷ ὑπὸ $\Gamma E\Delta$. ἡ ἄρα
 $\Gamma\Delta$ δίχα μὲν τέτμηται κατὰ τὸ Ξ , εἰς δὲ ἄνισα κατὰ
 τὸ E . καὶ παράλληλος ἡ $\Delta\Theta$ τῇ $H\Xi$. ἴση ἄρα ἡ ΓH
 τῇ $H\Theta$.

15 λβ'.

Ἐὰν ὑπερβολῆς δύο εὐθεῖαι ἐφαπτόμεναι συμ-
 πίπτωσι, καὶ διὰ τῶν ἀφῶν εὐθεῖα ἐκβληθῇ, διὰ δὲ
 τῆς συμπτώσεως τῶν ἐφαπτομένων ἀχθῇ εὐθεῖα παρὰ
 τὴν τὰς ἀφὰς ἐπιξεννύουσαν, διὰ δὲ τῆς διχοτομίας
 20 τῆς τὰς ἀφὰς ἐπιξεννυούσης ἀχθῇ εὐθεῖα παρὰ τινὰ
 τῶν ἀσυμπτῶτων, ἡ μεταξὺ τῆς διχοτομίας καὶ τῆς
 παραλλήλου ἀπολαμβανομένη δίχα τμηθήσεται ὑπὸ τῆς
 τομῆς.

ἔστω ὑπερβολὴ ἡ $AB\Gamma$, ἥς κέντρον τὸ Δ , ἀσύμ-
 25 πτωτος δὲ ἡ ΔE , καὶ ἐφαπτέσθωσαν αἱ AZ , $Z\Gamma$, καὶ
 ἐπεζεύχθω ἡ ΓA καὶ ἡ $Z\Delta$ καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὰ
 H , Θ . φανερόν δὲ, ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ $\Delta\Theta$ τῇ $\Theta\Gamma$. ἤχθω
 δὲ διὰ μὲν τοῦ Z παρὰ τὴν $A\Gamma$ ἡ ZK , διὰ δὲ τοῦ Θ

6. $H\Xi$] p, corr. ex $H\Gamma$ m. 1 V; $H\Gamma\Xi$ c v. τὰ] τό V;
 corr. p. 7. τὰ] τό V; corr. p. 26. $Z\Delta$] $\Xi\Delta$ v c et V?;
 corr. p.

$$NA \times AK + KE^2 = MA^2 + KE^2 = AE^2 \text{ [Eucl. II, 6]} \\ = H\Xi^2 \text{ [Eucl. I, 34].}$$


est autem $H\Xi^2 : MA^2 + KE^2 = \Xi\Gamma^2 : AH^2 + KZ^2$ [Eucl. VI, 4; V, 12]; itaque $\Xi\Gamma^2 = HA^2 + KZ^2$. est autem $HA^2 = \Xi E^2$ [Eucl. I, 34] et KZ^2 quadrato dimidia secundae diametri aequale [II, 1], hoc est $KZ^2 = \Gamma E \times EA$ [I, 38]; itaque

$$\Gamma\Xi^2 = \Xi E^2 + \Gamma E \times EA.$$

ΓA igitur in Ξ in duas partes aequales, in E autem in inaequales secta est [Eucl. II, 5]. et AO , $H\Xi$ parallelae sunt; ergo $\Gamma H = HO$ [Eucl. VI, 2].

XXXII.

Si duae rectae hyperbolam contingentes concurrunt, et per puncta contactus recta ducitur, per punctum autem concursus contingentium recta rectae puncta contactus coniungenti parallela ducitur, et per punctum medium rectae puncta contactus coniungentis recta



alterutri asymptotarum parallela ducitur, recta inter punctum medium parallelamque abs-cisa a sectione in duas partes aequales secabitur.

sit hyperbola $AB\Gamma$, cuius centrum sit Δ , asymptota autem ΔE , et contingant AZ , $Z\Gamma$, ducaturque ΓA et $Z\Delta$, quae ad H , Θ producantur; manifestum igitur, esse $A\Theta = \Theta\Gamma$ [II, 30]. iam per Z rectae $A\Gamma$ par-


παρὰ τὴν ΔE ἢ $\Theta \Delta K$. λέγω, ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ $K\Delta$ τῇ $\Theta \Delta$.

ἤχθωσαν διὰ τῶν B, Δ παρὰ τὴν AG αἱ AM, BE ·
 ἐστὶ δὴ, ὥς προδεδεικται, ὥς τὸ ἀπὸ ΔB πρὸς τὸ
 5 ἀπὸ BE , τό τε ἀπὸ ΘM πρὸς τὸ ἀπὸ MA καὶ τὸ ὑπο
 BMH πρὸς τὸ ἀπὸ MA ἴσον ἄρα τὸ ὑπὸ HMB τῷ
 ἀπὸ $M\Theta$. ἐστὶ δὲ καὶ τὸ ὑπὸ $\Theta \Delta Z$ ἴσον τῷ ἀπὸ ΔB ,
 διότι ἐφάπτεται ἡ AZ , καὶ κατῆκται ἡ $A\Theta$. τὸ ἄρα
 ὑπὸ HMB μετὰ τοῦ ἀπὸ ΔB , ὅ ἐστὶ τὸ ἀπὸ ΔM ,
 10 ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ $\Theta \Delta Z$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $M\Theta$. δὴνα ἄρα
 τέτμηται ἡ $Z\Theta$ κατὰ τὸ M προσκειμένην ἔχουσα τὴν
 ΔZ . καὶ εἰσι παράλληλοι αἱ KZ, AM . ἴση ἄρα ἡ $K\Delta$
 τῇ $\Delta\Theta$.

λγ'.

15 Ἐὰν τῶν ἀντικειμένων δύο εὐθεῖαι ἐφαπτόμεναι
 συμπίπτωσι, καὶ διὰ μὲν τῶν ἀφῶν εὐθεῖα ἐκβληθῇ,
 διὰ δὲ τῆς συμπτώσεως τῶν ἐφαπτομένων ἀχθῇ εὐθεῖα
 παρὰ τὴν τὰς ἀφὰς ἐπιζευγνύουσαν, διὰ δὲ τῆς διχο-
 τομίας τῆς τὰς ἀφὰς ἐπιζευγνυούσης ἀχθῇ εὐθεῖα παρὰ
 20 τινὰ τῶν ἀσυμπτῶτων συμπίπτουσα τῇ τομῇ καὶ τῇ
 διὰ τῆς συμπτώσεως ἡγμένη παραλλήλῳ, ἡ μεταξὺ τῆς
 διχοτομίας καὶ τῆς παρ-
 αλλήλου ὑπὸ τῆς τομῆς
 δὴνα διαιρεθήσεται.

25 ἔστωσαν ἀντικείμεναι
 αἱ $AB\Gamma, \Delta EZ$ καὶ ἐφ-
 απτόμεναι αἱ $AH, \Delta H$,
 κέντρον δὲ τὸ Θ , ἀσύμπτωτος δὲ ἡ $K\Theta$, καὶ ἐπε-
 ζεύχθω ἡ ΘH καὶ ἐκβεβλήσθω, ἐπεζεύχθω δὲ καὶ ἡ



7. τῷ] pc, corr. ex τό m. 1 V. 11. $Z\Theta$] $\Xi\Theta$ V; corr. Memus. 27. ΔH] $H\Delta$ Halley cum Comm.

allela ducatur ZK , per Θ autem rectae AE parallela ΘA . dico, esse $KA = \Theta A$.

per B , A rectae AG parallelae ducantur AM , BE ; erit igitur, ut antea demonstratum est [prop. XXX ex II, 1 et I, 21]

$$\angle B^2 : BE^2 = \Theta M^2 : MA^2 \text{ [Eucl. VI, 4]} = BM \times MH : MA^2.$$

itaque [Eucl. V, 9] $HM \times MB = M\Theta^2$. uerum etiam $\Theta A \times AZ = AB^2$, quia AZ contingit, et $A\Theta$ ordinate ducta est [I, 37]. itaque

$$HM \times MB + AB^2 = \Theta A \times AZ + M\Theta^2 = AM^2$$

[Eucl. II, 6]. $Z\Theta$ igitur in M in duas partes aequales secta est adiectam habens AZ [Eucl. II, 6]. et KZ , AM parallelae sunt; ergo $KA = A\Theta$ [Eucl. VI, 2].

XXXIII.

Si duae rectae oppositas contingentes concurrunt, per puncta autem contactus recta ducitur, et per punctum concursus contingentium recta rectae puncta contactus coniungenti parallela ducitur, per punctum autem medium rectae puncta contactus coniungentis recta alterutri asymptotarum parallela ducitur concurrens cum sectione et cum recta per punctum concursus parallela ducta, recta inter punctum medium parallelamque posita a sectione in duas partes aequales secabitur.

sint oppositae $AB\Gamma$, AEZ contingentesque AH , AH , centrum autem Θ et asymptota $K\Theta$, ducaturque ΘH et producat, ducatur autem etiam AA ; manifestum igitur, eam in A in duas partes aequales secari [II, 30]. iam per H , Θ rectae AA parallelae ducantur $B\Theta E$,

$ΑΔΑ'$ φανερόν δὴ, ὅτι δίχα τέμνεται κατὰ τὸ $Α$. ἤχθωσαν δὲ διὰ τῶν $H, Θ$ παρὰ τὴν $ΑΔ$ αἱ $BΘE, ΓHZ$, παρὰ δὲ τὴν $ΘK$ διὰ τοῦ $Α$ ἡ $ΑΜΝ$. λέγω, ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ $ΑΜ$ τῇ MN .

5 κατήχθωσαν γὰρ ἀπὸ τῶν E, M παρὰ τὴν $HΘ$ αἱ $EK, MΞ$, διὰ δὲ τοῦ M παρὰ τὴν $ΑΔ$ ἡ $MΠ$.
ἐπεὶ οὖν διὰ τὰ δεδειγμένα ἐστίν, ὥς τὸ ἀπὸ $ΘE$ πρὸς τὸ ἀπὸ EK , τὸ ὑπὸ $BΞE$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΞM$, ὥς ἄρα τὸ ἀπὸ $ΘE$ πρὸς τὸ ἀπὸ EK , τὸ ὑπὸ $BΞE$
10 μετὰ τοῦ ἀπὸ $ΘE$, ὅ ἐστι τὸ ἀπὸ $ΘΞ$, πρὸς τὰ ἀπὸ $KE, ΞM$. τὸ δὲ ἀπὸ KE ἴσον δέδεικται τῷ ὑπὸ $HΘΑ$, καὶ τὸ ἀπὸ $ΞM$ τῷ ἀπὸ $ΘΠ$. ἔστιν ἄρα, ὥς τὸ ἀπὸ $ΘE$ πρὸς τὸ ἀπὸ EK , τὸ ἀπὸ $ΘΞ$, τουτέστι το ἀπὸ $MΠ$, πρὸς τὸ ὑπὸ $ΑΘH$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $ΘΠ$. ὥς δὲ
15 τὸ ἀπὸ $ΘE$ πρὸς τὸ ἀπὸ KE , τὸ ἀπὸ $MΠ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΠΑ$. ὥς ἄρα τὸ ἀπὸ $MΠ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΠΑ$, τὸ ἀπὸ $MΠ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $HΘΑ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $ΘΠ$. ἴσον ἄρα τὸ ἀπὸ $ΑΠ$ τῷ ὑπὸ $HΘΑ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $ΘΠ$.
εὐθεῖα ἄρα ἡ $ΑΗ$ τέτμηται εἰς μὲν ἴσα κατὰ τὸ $Π$, εἰς
20 δὲ ἄνισα κατὰ τὸ $Θ$. καὶ εἰσι παράλληλοι αἱ $MΠ, HN$. ἴση ἄρα ἡ $ΑΜ$ τῇ MN .

λδ'.

Ἐὰν ὑπερβολῆς ἐπὶ μιᾷ τῶν ἀσυμπτῶτων ληφθῇ τι σημεῖον, καὶ ἀπ' αὐτοῦ εὐθεῖα ἐφάπτεται τῆς τομῆς,
25 καὶ διὰ τῆς ἀφῆς ἀχθῇ παράλληλος τῇ ἀσυμπτῶτι, ἡ διὰ τοῦ ληφθέντος σημείου ἀγομένη παράλληλος τῇ ἐτέρᾳ τῶν ἀσυμπτῶτων ὑπὸ τῆς τομῆς εἰς ἴσα διαιρεθήσεται.

6. τήν] pc, τ corr. ex δ m. 1 V. 8. BΞE] ΞE V; corr. Memus. 9. BΞE] c, corr. ex BZE m. 1 V. 10. ΘE, δ]

ΓHZ , rectae autem ΘK parallela per A recta AMN . dico, esse $AM = MN$.

ducantur enim ab E , M rectae $H\Theta$ parallelae EK , $M\Xi$, per M autem rectae AA parallela $M\Pi$.

quoniam igitur propter ea, quae demonstrata sunt [prop. XXX ex II, 1 et I, 21],

$$\Theta E^2 : EK^2 = B\Xi \times \Xi E : \Xi M^2,$$

erit

$$\begin{aligned} \Theta E^2 : EK^2 &= B\Xi \times \Xi E + \Theta E^2 : KE^2 + \Xi M^2 \text{ [Eucl. V, 12]} \\ &= \Theta \Xi^2 : KE^2 + \Xi M^2 \text{ [Eucl. II, 6].} \end{aligned}$$

demonstrauimus autem [I, 38 coll. II, 1 et I deff. alt. 3], esse $H\Theta \times \Theta A = KE^2$, et [Eucl. I, 34] $\Xi M^2 = \Theta \Pi^2$; itaque

$$\begin{aligned} \Theta E^2 : EK^2 &= \Theta \Xi^2 : A\Theta \times \Theta H + \Theta \Pi^2 \\ &= M\Pi^2 : A\Theta \times \Theta H + \Theta \Pi^2 \text{ [Eucl. I, 34].} \end{aligned}$$

est autem $\Theta E^2 : KE^2 = M\Pi^2 : \Pi A^2$ [Eucl. VI, 4]; itaque $M\Pi^2 : \Pi A^2 = M\Pi^2 : H\Theta \times \Theta A + \Theta \Pi^2$. quare $A\Pi^2 = H\Theta \times \Theta A + \Theta \Pi^2$ [Eucl. V, 9]. itaque recta AH in Π in partes aequales, in Θ autem in inaequales secta est [Eucl. II, 5]. et $M\Pi$, HN parallelae sunt; ergo $AM = MN$ [Eucl. VI, 2].


XXXIV.

Si in hyperbola in alterutra asymptotarum punctum aliquod sumitur, et ab eo recta sectionem contingit, per punctum contactus autem recta asymptotae parallela ducitur, recta per punctum sumptum alteri asymptotae parallela ducta a sectione in partes aequales secabitur.

$\vartheta\epsilon\bar{o}$ V; corr. p. 11. $H\Theta A$] ΘHA V; corr. p. ($\tau\tilde{\omega}\nu$ $H\Theta$, ΘA).
14. $A\Theta H$] ΘA , ΘH V; corr. p. ($\tau\tilde{\omega}\nu$ $H\Theta$, ΘA).

ἔστω ὑπερβολὴ ἡ AB , ἀσύμπτωτοι δὲ αἱ $\Gamma\Delta E$,
καὶ εἰλήφθω ἐπὶ τῆς $\Gamma\Delta$ τυχὸν σημείου τὸ Γ , καὶ
δι' αὐτοῦ ἡχθῶ ἐφαπτομένη τῆς
τομῆς ἡ ΓBE , καὶ διὰ μὲν τοῦ B
παρὰ τὴν $\Gamma\Delta$ ἡχθῶ ἡ ZBH , διὰ
δὲ τοῦ Γ τῆς ΔE ἡ ΓAH . λέγω,
ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΓA τῇ AH .

ἡχθῶ γὰρ διὰ μὲν τοῦ A τῆς
 $\Gamma\Delta$ παράλληλος ἡ $A\Theta$, διὰ δὲ τοῦ
10 B τῆς ΔE ἡ BK . ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν
ἡ ΓB τῇ BE , ἴση ἔσται καὶ ἡ ΓK τῇ $K\Delta$ καὶ ἡ ΔZ
τῇ ZE . καὶ ἐπεὶ τὸ ὑπὸ KBZ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ
 $\Gamma A\Theta$, ἴση δὲ ἡ BZ τῇ ΔK , τουτέστι τῇ ΓK , καὶ ἡ
 $A\Theta$ τῇ $\Delta \Gamma$, τὸ ἄρα ὑπὸ $\Delta \Gamma A$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ $K\Gamma H$.
15 ἔστιν ἄρα, ὥς ἡ $\Delta \Gamma$ πρὸς ΓK , ἡ ΓH πρὸς $A\Gamma$. διπλῇ
δὲ ἡ $\Delta \Gamma$ τῆς ΓK · διπλῇ ἄρα καὶ ἡ ΓH τῆς $A\Gamma$. ἴση
ἔσται ἡ ΓA τῇ AH .



λε'.

Τῶν αὐτῶν ὄντων ἐὰν ἀπὸ τοῦ ληφθέντος σημείου
20 εὐθεῖα τις ἀχθῇ τέμνουσα τὴν τομὴν κατὰ δύο σημεία,
ἔσται, ὥς ὅλη πρὸς τὴν ἐκτὸς ἀπολαμβανομένην, τὰ
τμήματα τῆς ἐντὸς ἀπολαμβανομένης εὐθείας.

ἔστω γὰρ ἡ AB ὑπερβολὴ καὶ αἱ $\Gamma\Delta E$ ἀσύμπτωτοι
καὶ ἡ ΓBE ἐφαπτομένη καὶ ἡ ΘB παράλληλος, καὶ
25 διὰ τοῦ Γ διήχθω τις εὐθεῖα ἡ $\Gamma A\Delta ZH$ τέμνουσα
τὴν τομὴν κατὰ τὰ A, Z . λέγω, ὅτι ἐστίν, ὥς ἡ $Z\Gamma$
πρὸς ΓA , ἡ $Z\Delta$ πρὸς $A\Delta$.

ἡχθῶσαν γὰρ διὰ τῶν Γ, A, B, Z παρὰ τὴν ΔE

12. KBZ] KZB V; corr. p (τῶν KB, BZ). 17. ΓA] $\overline{\eta\gamma\alpha}$ V; corr. p. 21. ἡ ὅλη?


sit hyperbola AB , asymptotae autem ΓA , ΔE , et in ΓA punctum quodvis sumatur Γ , et per id sectionem contingens ducatur ΓBE , et per B rectae ΓA parallela ducatur ZBH , per Γ autem rectae ΔE parallela ΓAH . dico, esse $\Gamma A = AH$.

ducatur enim per A rectae ΓA parallela $A\Theta$, per B autem rectae ΔE parallela BK . iam quoniam est $\Gamma B = BE$ [II, 3], erit etiam $\Gamma K = KA$ et $\Delta Z = ZE$ [Eucl. VI, 2]. et quoniam $KB \propto BZ = \Gamma A \propto A\Theta$ [II, 12], et $BZ = \Delta K$ [Eucl. I, 34] $= \Gamma K$, et $A\Theta = \Delta \Gamma$ [ib.], erit $\Delta \Gamma \propto \Gamma A = K\Gamma \propto \Gamma H$. itaque [Eucl. VI, 16] $\Delta \Gamma : \Gamma K = \Gamma H : \Gamma \Gamma$. uerum $\Delta \Gamma = 2 \Gamma K$; itaque etiam $\Gamma H = 2 \Delta \Gamma$. ergo $\Gamma A = AH$.

XXXV.

Iisdem positis si a puncto sumpto recta ducitur sectionem in duobus punctis secans, erunt, ut tota ad partem extrinsecus abscisam, ita partes rectae intra abscisae.

sit enim hyperbola AB , asymptotae ΓA , ΔE , contingens ΓBE , parallela ΘB , et per Γ recta ducatur



$\Gamma AAZH$ sectionem secans in A, Z . dico, esse

$$Z\Gamma : \Gamma A = Z\Lambda : A\Lambda.$$

nam per Γ, A, B, Z
 rectae ΔE parallelae
 ducantur $\Gamma N \Xi, K \Lambda M$,
 $O \Pi B P, Z \Upsilon$, per A, Z

autem rectae $\Gamma\Delta$ parallelae $AP\Sigma$, $TZPM\Xi$.

quoniam igitur $A\Gamma = ZH$ [II, 8], erit etiam

αὐτὰ $\Gamma\Lambda$ αὐτὰ $\Lambda\Pi\Sigma$, $TZPM\Xi$.
 τὴν $\Gamma\Lambda$ αὐτὰ $\Lambda\Pi\Sigma$, $TZPM\Xi$.

ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ $\Lambda\Gamma$ τῇ ZH , ἴση ἄρα καὶ ἡ
 KA τῇ TH . ἡ δὲ KA τῇ $\Lambda\Sigma$ · καὶ ἡ TH ἄρα τῇ
 5 $\Lambda\Sigma$ ἴση. ὥστε καὶ ἡ ΓK τῇ ΛT . καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν
 ἡ ΓK τῇ ΛT , ἴση καὶ ἡ ΛK τῇ ΓT · ὥς ἄρα ἡ ΛK
 πρὸς $K\Gamma$, ἡ ΓT πρὸς ΓK . ὥς δὲ ἡ ΓT πρὸς ΓK ,
 ἡ $Z\Gamma$ πρὸς ΓA , ὥς δὲ ἡ $Z\Gamma$ πρὸς ΓA , ἡ MK πρὸς
 KA , ὥς δὲ ἡ MK πρὸς KA , τὸ $M\Lambda$ πρὸς ΛA , ὥς
 10 δὲ ἡ ΛK πρὸς $K\Gamma$, τὸ ΘK πρὸς KN · καὶ ὥς ἄρα
 τὸ $M\Lambda$ πρὸς τὸ ΛA , τὸ ΘK πρὸς KN . ἴσον δὲ τὸ
 $\Lambda\Lambda$ τῷ ΛB , τουτέστι τῷ ON · ἴση γὰρ ἡ ΓB τῇ BE
 καὶ ἡ ΛO τῇ OG . ὥς ἄρα τὸ ΛM πρὸς ON , τὸ $K\Theta$
 πρὸς KN , καὶ λοιπὸν τὸ $M\Theta$ πρὸς λοιπὸν τὸ BK
 15 ἐστίν, ὥς ὅλον τὸ ΛM πρὸς ὅλον τὸ ON . καὶ ἐπεὶ
 ἴσον ἐστὶ τὸ $K\Sigma$ τῷ ΘO , κοινὸν ἀφαιρήσθω τὸ $\Lambda\Pi$ ·
 λοιπὸν ἄρα τὸ $K\Pi$ ἴσον ἐστὶ τῷ $\Pi\Theta$. κοινὸν προσ-
 κείσθω τὸ AB · ὅλον ἄρα τὸ KB ἴσον ἐστὶ τῷ $A\Theta$.
 ἔστιν ἄρα, ὥς τὸ $M\Lambda$ πρὸς ΛA , οὕτως τὸ $M\Theta$ πρὸς
 20 ΘA . ἀλλ' ὥς μὲν τὸ $M\Lambda$ πρὸς ΛA , ἡ MK πρὸς KA ,
 τουτέστιν ἡ $Z\Gamma$ πρὸς ΓA , ὥς δὲ τὸ $M\Theta$ πρὸς ΘA ,
 ἡ $M\Phi$ πρὸς ΦA , τουτέστιν ἡ $Z\Lambda$ πρὸς ΛA · καὶ ὥς
 ἄρα ἡ $Z\Gamma$ πρὸς ΓA , ἡ $Z\Lambda$ πρὸς ΛA .

λς'.

25 Τῶν αὐτῶν ὄντων ἐὰν ἡ ἀπὸ τοῦ σημείου δια-
 γομένη εὐθεῖα μήτε τὴν τομὴν τέμνῃ κατὰ δύο σημεία
 μήτε παράλληλος ᾖ τῇ ἀσυμπτώτῳ, συμπεσεῖται μὲν

2. $Z TPM\Xi$ V; corr. p. 4. KA] (pr.) ΓA V; corr. p. 6.
 ΛK] (pr.) ΛT V; corr. p. 15. ΛM] ΛM V; corr. Comm.
 22. $Z\Lambda$] $X\Lambda$ V; corr. p.

$KA = TH$ [Eucl. VI, 4]. uerum $KA = AS$ [Eucl. I, 34];
itaque etiam $TH = AS$. quare etiam $TK = AT$
[Eucl. VI, 4; I, 34]. et quoniam $TK = AT$, erit
etiam $AK = TG$. itaque $AK : KG = TG : GK$
[Eucl. V, 7]. est autem

$$\begin{aligned} TG : GK &= ZG : GA \text{ [Eucl. VI, 4]} \\ &= MK : KA \text{ [Eucl. VI, 4; V, 12, 16]} = MA : AA \end{aligned}$$

[Eucl. VI, 1], et [ib.] $AK : KG = OK : KN$; quare
etiam $MA : AA = OK : KN$. est autem

$$AA = AB \text{ [II, 12]} = ON \text{ [Eucl. VI, 1];}$$

nam $GB = BE$ [II, 3] et $AO = OG$ [Eucl. VI, 2].
itaque $AM : ON = KO : KN$, et reliquum

$$MO : BK = AM : ON \text{ [Eucl. V, 19].}$$

et quoniam est $K\Sigma = OO$ [II, 12], auferatur, quod
commune est, AP ; itaque reliquum $KP = PO$. com-
mune adiciatur AB ; itaque totum $KB = AO$. quare
 $MA : AA = MO : OA$. uerum

$$MA : AA = MK : KA \text{ [Eucl. VI, 1]} = ZG : GA,$$

et

$$MO : OA = MP : PA \text{ [Eucl. VI, 1]} = ZA : AA \text{ [Eucl. VI, 2].}$$

ergo etiam $ZG : GA = ZA : AA$.

XXXVI.

Iisdem positis si recta a puncto illo ducta neque
sectionem in duobus punctis secat neque asymptotae
parallela est, cum sectione opposita concurret, et ut
tota ad partem inter sectionem parallelamque per
punctum contactus ductam, ita erit recta inter sectio-

τῇ ἀντικειμένη τομῇ, ἔσται δέ, ὥς ὅλη πρὸς τὴν μεταξὺ τῆς τομῆς καὶ τῆς διὰ τῆς ἀφῆς παραλλήλου, ἢ μεταξὺ τῆς ἀντικειμένης καὶ τῆς ἀσυμπύπτου πρὸς τὴν μεταξὺ τῆς ἀσυμπύπτου καὶ τῆς ἐτέρας τομῆς.

5 ἔστωσαν ἀντικείμεναι αἱ A, B , ὧν κέντρον τὸ Γ , ἀσύμπυπτοι δὲ αἱ $\Delta E, ZH$, καὶ ἐπὶ τῆς ΓH σημείων εἰλήφθω τὸ H , καὶ ἀπ' αὐτοῦ ἤχθω ἡ μὲν $HB E$ ἐφαπτομένη, ἡ δὲ $H\Theta$ μήτε παράλληλος οὕσα τῇ ΓE μήτε τὴν τομὴν τέμνουσα κατὰ δύο σημεία.


10 ὅτι μὲν ἡ ΘH ἐκβαλλομένη συμπίπτει τῇ τε $\Gamma \Delta$ καὶ διὰ τοῦτο καὶ τῇ A τομῇ, δέδεικται. συμπίπτει κατὰ τὸ A , καὶ ἤχθω διὰ τοῦ B τῇ ΓH παράλληλος ἡ $KB A$. λέγω, ὅτι ἐστίν, ὥς ἡ AK πρὸς $K\Theta$, οὕτως ἡ AH πρὸς $H\Theta$.

15 ἤχθωσαν γὰρ ἀπὸ τῶν A, Θ σημείων παρὰ τὴν ΓH αἱ $\Theta M, AN$, ἀπὸ δὲ τῶν B, H, Θ παρὰ τὴν ΔE αἱ $B\Xi, H\P, P\Theta \Sigma N$. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ $\Delta \Delta$ τῇ $H\Theta$, ἔστιν, ὥς ἡ AH πρὸς $H\Theta$, ἡ $\Delta \Theta$ πρὸς ΘH . ἀλλ' ὥς μὲν ἡ AH πρὸς $H\Theta$, ἡ $N\Sigma$ πρὸς $\Sigma\Theta$, ὥς δὲ ἡ $\Delta \Theta$ πρὸς ΘH , ἡ $\Gamma \Sigma$ πρὸς ΣH · καὶ ὥς ἄρα ἡ $N\Sigma$ πρὸς $\Sigma\Theta$, ἡ $\Gamma \Sigma$ πρὸς ΣH . ἀλλ' ὥς μὲν ἡ $N\Sigma$ πρὸς $\Sigma\Theta$, τὸ $N\Gamma$ πρὸς $\Gamma\Theta$, ὥς δὲ ἡ $\Gamma \Sigma$ πρὸς ΣH , τὸ $P\Gamma$ πρὸς PH · καὶ ὥς ἄρα τὸ $N\Gamma$ πρὸς τὸ $\Gamma\Theta$, τὸ ΓP πρὸς τὸ PH . καὶ ὥς ἐν πρὸς ἓν, οὕτως ἅπαντα πρὸς
25 ἅπαντα· ὥς ἄρα τὸ $N\Gamma$ πρὸς $\Gamma\Theta$, ὅλον τὸ NA πρὸς $\Gamma\Theta$ καὶ PH . καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ EB τῇ BH , ἴση ἐστὶ καὶ ἡ AB τῇ $B\P$ καὶ τὸ $A\Xi$ τῷ BH . τὸ δὲ $A\Xi$ ἴσον τῷ $\Gamma\Theta$ · καὶ τὸ BH ἄρα ἴσον τῷ $\Gamma\Theta$. ἔστιν ἄρα, ὥς τὸ $N\Gamma$ πρὸς $\Gamma\Theta$, οὕτως ὅλον τὸ AN πρὸς τὸ BH

1. ἡ ὅλη? 2. ἀφῆς] om. V; corr. Memus. 13. $KB A$] BKA V; corr. p (ABK). 17. $P\Theta \Sigma N$] $\Theta P \Sigma N$ V; corr. p.

nem oppositam asymptotamque posita ad rectam inter asymptotam alteramque sectionem positam.

sint oppositae A, B , quarum centrum sit Γ , asymptotae autem $\Delta E, ZH$, et in ΓH sumatur punctum H ,



ab eoque contingens ducatur $HBE, H\Theta$ autem ita, ut neque rectae ΓE parallela sit neque sectionem in duobus punctis secet. iam rectam ΘH productam et cum ΓA concurrere et ea de

causa cum sectione, demonstratum est [II, 11]. concurrat in A , et per B rectae ΓH parallela ducatur KBA . dico, esse $AK:K\Theta = AH:H\Theta$.


ducantur enim a punctis A, Θ rectae ΓH parallelae $\Theta M, AN$, a B, H, Θ autem rectae ΔE parallelae $B\Xi, H\Pi, P\Theta\Sigma N$. quoniam igitur $AA = H\Theta$ [II, 16], erit $AH:H\Theta = \Delta\Theta:\Theta H$ [Eucl. V, 7]. uerum $AH:H\Theta = N\Sigma:\Sigma\Theta$ [Eucl. VI, 2] et $\Delta\Theta:\Theta H = \Gamma\Sigma:\Sigma H$ [Eucl. VI, 4; V, 12, 16]; quare etiam $N\Sigma:\Sigma\Theta = \Gamma\Sigma:\Sigma H$. uerum $N\Sigma:\Sigma\Theta = N\Gamma:\Gamma\Theta$ et $\Gamma\Sigma:\Sigma H = P\Gamma:PH$ [Eucl. VI, 1]; quare etiam $N\Gamma:\Gamma\Theta = P\Gamma:PH$. et ut unum ad unum, ita omnia ad omnia [Eucl. V, 12]; itaque $N\Gamma:\Gamma\Theta = NA:\Gamma\Theta + PH$. et quoniam est $EB = BH$ [II, 3], erit etiam [Eucl. VI, 2; I, 34] $AB = B\Pi, A\Xi = BH$ [Eucl. VI, 1]. est autem $A\Xi = \Gamma\Theta$ [II, 12]; quare etiam $BH = \Gamma\Theta$. itaque

18. $\eta \Delta\Theta$ — 19. $H\Theta$] om. V; corr. Comm. 22. $\tau\delta N\Gamma$
 $\tau\delta\upsilon \bar{\gamma}$ V; corr. pvc. 26. PH] $\eta \bar{\varrho}\eta$ V; corr. p.

καὶ PH , τουτέστι τὸ $PΞ$. ἴσον δὲ τὸ $PΞ$ τῷ $AΘ$,
 ἐπεὶ καὶ τὸ $ΓΘ$ τῷ $BΓ$ καὶ τὸ MB τῷ $ΞΘ$. ἔστιν ἄρα,
 ὥς τὸ $ΝΓ$ πρὸς τὸ $ΓΘ$, οὕτως τὸ $ΝΑ$ πρὸς $AΘ$. ἀλλ'
 ὥς μὲν τὸ $ΝΓ$ πρὸς $ΓΘ$, ἢ $ΝΣ$ πρὸς $ΣΘ$, τουτέστιν
 5 ἢ AH πρὸς $HΘ$, ὥς δὲ τὸ $ΝΑ$ πρὸς $AΘ$, ἢ NP
 πρὸς $PΘ$, τουτέστιν ἢ AK πρὸς $KΘ$ · καὶ ὥς ἄρα ἢ
 AK πρὸς $KΘ$, ἢ AH πρὸς $HΘ$.

λξ'.

Ἐὰν κώνου τομῆς ἢ κύκλου περιφερείας ᾗ, τῶν
 10 ἀντικειμένων δύο εὐθεῖαι ἐφαπτόμεναι συμπέτωσι,
 καὶ ἐπὶ μὲν τὰς ἀφ' αὐτῶν ἐπιζευχθῇ εὐθεῖα, ἀπὸ
 δὲ τῆς συμπτώσεως τῶν ἐφαπτομένων διαχθῇ τις τέμ-
 νουσα τὴν γραμμὴν κατὰ δύο σημεία, ἔσται, ὥς ὅλη
 πρὸς τὴν ἐκτὸς ἀπολαμβανομένην, τὰ γινόμενα τμή-
 15 ματα ὑπὸ τῆς τὰς ἀφ' αὐτῶν ἐπιζευγνυούσης.



ἔστω κώνου τομὴ ἢ AB καὶ ἐφαπτόμεναι αἱ AG, GB ,
 καὶ ἐπεζεύχθω ἡ AB , καὶ διήχθω ἡ $ΓΔΕΖ$. λέγω,
 ὅτι ἐστίν, ὥς ἢ $ΓΖ$ πρὸς $ΓΔ$, ἢ $ΖΕ$ πρὸς $ΕΔ$.

ἤχθωσαν διὰ τῶν $Γ, Α$ διάμετροι τῆς τομῆς αἱ

2. $BΓ$] $BΘ V$; corr. Memus. 13. ἢ ὅλη? 15. τῆς]
 τῆς ἐπὶ V ; corr. Memus. 18. $ΓΖ$] $ΓΔ V$; corr. p ($ΖΓ$).
 $ΓΔ$] $ΓΖ V$; corr. p.

$N\Gamma:\Gamma\Theta = AN:BH + PH = AN:P\Xi$. est autem $P\Xi = A\Theta$, quoniam etiam $\Gamma\Theta = B\Gamma$ [II, 12] et $MB = \Xi\Theta$. itaque $N\Gamma:\Gamma\Theta = NA:A\Theta$. uerum

$$N\Gamma: \Gamma\Theta = N\Sigma: \Sigma\Theta \text{ [Eucl. VI, 1]} = AH: H\Theta \text{ [Eucl. VI, 2], et}$$


$$NA: A^{\Theta} = NP: P^{\Theta} \text{ [Eucl. VI, 1]}$$

$$= AK : K^{\otimes} \text{ [Eucl. VI, 4; V, 12, 16].}$$

ergo etiam $AK:K\Theta = AH:H\Theta$.

XXXVII.

Si duae rectae coni sectionem uel ambitum circuli uel sectiones oppositas contingentes concurrunt, et ad puncta contactus earum recta ducitur, a puncto autem concursus contingentium recta ducitur lineam in duobus punctis secans, erunt, ut tota ad partem extrinsecus abscisam, ita partes a recta puncta contactus coniungenti effectae.



sit coni sectio AB contingentesque $A\Gamma$, ΓB , et
ducatur AB , ducaturque ΓAEZ . dico, esse

$$\Gamma Z : \Gamma \Delta = ZE : E \Delta.$$

per Γ , A diametri sectionis ducantur $\Gamma \odot$, AK ,

Praeter nostras figuras duas habet V alios casus in oppositis repraesentantes.

$\Gamma\Theta$, AK , διὰ δὲ τῶν Z , Δ παρα τὰς $A\Theta$, $\Delta\Gamma$ αἱ
 $\Delta\Pi$, ZP , ΔZM , $N\Delta O$. ἐπεὶ οὖν παράλληλός ἐστιν
 ἡ ΔZM τῇ $\Xi\Delta O$, ἐστίν, ὥς ἡ $Z\Gamma$ πρὸς $\Gamma\Delta$, ἡ ΔZ
 πρὸς $\Xi\Delta$ καὶ ἡ ZM πρὸς ΔO καὶ ἡ ΔM πρὸς ΞO .
 5 καὶ ὥς ἄρα τὸ ἀπὸ ΔM πρὸς τὸ ἀπὸ ΞO , τὸ ἀπὸ ZM
 πρὸς τὸ ἀπὸ ΔO . ἀλλ' ὥς μὲν τὸ ἀπὸ ΔM πρὸς τὸ
 ἀπὸ ΞO , τὸ $\Delta M\Gamma$ τριγώνου πρὸς τὸ $\Xi\Gamma O$, ὥς δὲ τὸ
 ἀπὸ ZM πρὸς τὸ ἀπὸ $O\Delta$, τὸ ZPM τριγώνου πρὸς
 τὸ $\Delta\Pi O$. καὶ ὥς ἄρα τὸ $\Delta\Gamma M$ πρὸς τὸ $\Xi O\Gamma$, τὸ
 10 ZPM πρὸς τὸ $\Delta\Pi O$, καὶ λοιπὸν τὸ $\Delta\Gamma PZ$ τετρά-
 πλευρον πρὸς λοιπὸν τὸ $\Xi\Gamma\Pi\Delta$. ἴσον δὲ τὸ μὲν
 $\Delta\Gamma PZ$ τετράπλευρον τῷ $\Delta\Delta K$ τριγώνῳ, τὸ δὲ $\Xi\Gamma\Pi\Delta$
 τῷ $\Delta N\Xi$. ὥς ἄρα τὸ ἀπὸ ΔM πρὸς τὸ ἀπὸ ΞO , τὸ
 $\Delta\Delta K$ τριγώνου πρὸς τὸ $\Delta N\Xi$. ἀλλ' ὥς μὲν τὸ ἀπὸ
 15 ΔM πρὸς τὸ ἀπὸ ΞO , τὸ ἀπὸ $Z\Gamma$ πρὸς τὸ ἀπὸ $\Gamma\Delta$,
 ὥς δὲ τὸ $\Delta\Delta K$ πρὸς τὸ $\Delta N\Xi$, τὸ ἀπὸ $\Delta\Delta$ πρὸς τὸ
 ἀπὸ $\Delta\Xi$ καὶ τὸ ἀπὸ ZE πρὸς τὸ ἀπὸ $E\Delta$. καὶ ὥς
 ἄρα τὸ ἀπὸ $Z\Gamma$ πρὸς τὸ ἀπὸ $\Gamma\Delta$, τὸ ἀπὸ ZE πρὸς
 τὸ ἀπὸ $E\Delta$. καὶ διὰ τοῦτο ὥς ἡ $Z\Gamma$ πρὸς $\Gamma\Delta$, ἡ ZE
 20 πρὸς ΔE .

λη'.

Τῶν αὐτῶν ὄντων ἔαν διὰ τῆς συμπτώσεως τῶν
 ἐφαπτομένων ἀχθῇ τις εὐθεΐα παρὰ τὴν τὰς ἀφ᾽ ἐπι-
 ξευγνύουσας, καὶ διὰ μέσης τῆς τὰς ἀφ᾽ ἐπιξευγ-
 25 νούσης ἀχθεῖσα εὐθεΐα τέμνῃ τὴν τομὴν κατὰ δύο
 σημεῖα καὶ τὴν διὰ τῆς συμπτώσεως παράλληλον τῇ
 τὰς ἀφ᾽ ἐπιξευγνύουσης, ἔσται, ὥς ὅλη ἡ διηγμένη
 πρὸς τὴν ἐκτὸς ἀπολαμβάνομένην μεταξὺ τῆς τομῆς

10. $\Delta\Gamma PZ$] p, $\Delta\Gamma PZ$ corr. ex $\Delta\Gamma P\Xi$ m. 1 V. 15. ΔM
 — τὸ ἀπὸ (alt.)] om. V; corr. p (τῆς ΔM , τῆς ΞO , ἀπὸ τῆς).

per Z , Δ autem rectis $A\Theta$, $A\Gamma$ parallelae $\Delta\Pi$, ZP , AZM , $N\Delta O$. iam quoniam AZM , $\Xi\Delta O$ parallelae sunt, erit

$$Z\Gamma:\Gamma\Delta = AZ:\Xi\Delta \text{ [Eucl. VI, 4]} = ZM:\Delta O = AM:\Xi O;$$

quare etiam $AM^2:\Xi O^2 = ZM^2:\Delta O^2$. uerum

$$AM^2:\Xi O^2 = AM\Gamma:\Xi\Gamma O \text{ [Eucl. VI, 19]},$$

et $ZM^2:O\Delta^2 = ZPM:\Delta\Pi O$; quare etiam

$$A\Gamma M:\Xi O\Gamma = ZPM:\Delta\Pi O = A\Gamma PZ:\Xi\Gamma\Pi\Delta \text{ [Eucl. V, 19]}.$$

uerum $A\Gamma PZ = AAK$, $\Xi\Gamma\Pi\Delta = AN\Xi$ [II, 30; II, 5–6; III, 2; — III, 11]; itaque

$$AM^2:\Xi O^2 = AAK:AN\Xi.$$

est autem $AM^2:\Xi O^2 = Z\Gamma^2:\Gamma\Delta^2$,

$$AAK:AN\Xi = A\Delta^2:A\Xi^2 \text{ [Eucl. VI, 19]}$$

$$= ZE^2:E\Delta^2 \text{ [Eucl. VI, 2]};$$

quare etiam $Z\Gamma^2:\Gamma\Delta^2 = ZE^2:E\Delta^2$. ergo

$$Z\Gamma:\Gamma\Delta = ZE:E\Delta.$$

XXXVIII.

Iisdem positis si per punctum concursus contingentium recta ducitur rectae puncta contactus coniungenti parallela, rectaque per mediam rectam puncta contactus coniungentem ducta sectionem secat in duobus punctis rectamque per punctum concursus rectae puncta contactus coniungenti parallelam ductam, erunt, ut tota recta ita ducta ad partem extrinsecus inter sectionem parallelamque abscisam, ita partes a recta ad puncta contactus ducta effectae.

καὶ τῆς παραλλήλου, τὰ γινόμενα τμήματα ὑπὸ τῆς ἐπὶ τὰς ἀφὰς ἐπιξεννυμένης.

ἔστω ἡ AB τομὴ καὶ αἱ AG, BG ἐφαπτόμεναι καὶ ἡ AB τὰς ἀφὰς ἐπιξεννύουσα καὶ αἱ AN, GM διά-
5 μετροὶ· φανερόν δ' ἴ, ὅτι ἡ AB δίχα τέμνεται κατὰ τὸ E .


ἤχθω ἀπὸ τοῦ Γ τῇ AB παραάλληλος ἡ ΓO , καὶ διήχθω διὰ τοῦ E ἡ $ZEAO$. λέγω,
10 ὅτι ἐστίν, ὡς ἡ ZO πρὸς OA , ἡ ZE πρὸς EA .

ἤχθωσαν γὰρ ἀπὸ τῶν Z, A παρὰ τὴν AB αἱ $AZKM, A\Theta H\Xi N$, διὰ δὲ
15 τῶν Z, H παρὰ τὴν AG

αἱ ZP, HP . ὁμοίως δὲ τοῖς πρότερον δειχθήσεται, ὅτι ἐστίν, ὡς τὸ ἀπὸ AM πρὸς τὸ ἀπὸ $\Xi\Theta$, τὸ ἀπὸ AA πρὸς τὸ ἀπὸ $A\Xi$. καὶ ἐστίν, ὡς μὲν τὸ ἀπὸ AM πρὸς τὸ ἀπὸ $\Xi\Theta$, τὸ ἀπὸ AG πρὸς τὸ ἀπὸ $\Gamma\Xi$ καὶ
20 τὸ ἀπὸ ZO πρὸς τὸ ἀπὸ OA , ὡς δὲ τὸ ἀπὸ AA πρὸς τὸ ἀπὸ $A\Xi$, τὸ ἀπὸ ZE πρὸς τὸ ἀπὸ EA . ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ZO πρὸς τὸ ἀπὸ OA , τὸ ἀπὸ ZE πρὸς τὸ ἀπὸ EA , καὶ ὡς ἡ ZO πρὸς OA , ἡ ZE πρὸς EA .

λθ'.

25 Ἐὰν τῶν ἀντικειμένων δύο εὐθεῖαι ἐφαπτόμεναι συμπίπτωσι, καὶ διὰ τῶν ἀφῶν εὐθεῖα ἐκβληθῇ, ἀπὸ δὲ τῆς συμπτώσεως τῶν ἐφαπτομένων ἀχθεῖσα εὐθεῖα



9. $ZE OA$ V; corr. p. 13. $Z] \Xi$ V; corr. p. 14.
 $A\Theta HN \Xi N$ V; corr. Memus. 20. $OA] AA$ V; corr. p. 23.
 In EA (alt.) desinit uol. I codicis V (fol. 120).

τέμνη ἑκατέραν τῶν τομῶν καὶ τὴν τὰς ἀφ᾽ ἐπι-
 ξευγνύουσιν, ἔσται, ὥς ὅλη ἡ διηγμένη πρὸς τὴν ἐκτὸς
 ἀπολαμβανομένην μεταξὺ τῆς τομῆς καὶ τῆς τὰς ἀφ᾽
 ἐπιξευγνυούσης, οὕτως τὰ γινόμενα τμήματα τῆς εὐθείας
 5 ὑπὸ τῶν τομῶν καὶ τῆς συμπτώσεως τῶν ἐφαπτομένων.


ἔστωσαν ἀντικείμεναι αἱ A, B , ὧν κέντρον τὸ Γ ,
 ἐφαπτόμεναι δὲ αἱ AA, AB , καὶ ἐπιξευχθεῖσαι αἱ
 $AB, \Gamma A$ ἐκβεβλήσθωσαν, καὶ διὰ τοῦ A διήχθω τις
 εὐθεῖα ἡ $E\Delta ZH$. λέγω, ὅτι ἐστίν, ὥς ἡ EH πρὸς
 10 HZ , ἡ $E\Delta$ πρὸς ΔZ .

ἐπεξεύχθω γὰρ ἡ $A\Gamma$ καὶ ἐκβεβλήσθω, καὶ διὰ τῶν
 E, Z παρὰ μὲν τὴν AB ἤχθωσαν αἱ $E\Theta\Sigma, Z\Lambda MN\Xi O$,
 παρὰ δὲ τὴν AA αἱ $E\Pi, ZP$.

ἐπεὶ οὖν παράλληλοί εἰσιν αἱ $Z\Xi, E\Sigma$ καὶ δι-
 15 ηγμέναι εἰς αὐτὰς αἱ $EZ, \Xi\Sigma, \Theta M$, ἔστιν, ὥς ἡ $E\Theta$
 πρὸς $\Theta\Sigma$, ἡ ZM πρὸς $M\Xi$. καὶ ἐναλλάξ, ὥς ἡ $E\Theta$
 πρὸς ZM , ἡ $\Theta\Sigma$ πρὸς ΞM . καὶ ὥς ἄρα τὸ ἀπὸ ΘE
 πρὸς τὸ ἀπὸ MZ , τὸ ἀπὸ $\Theta\Sigma$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΞM . ἀλλ'
 ὥς μὲν τὸ ἀπὸ $E\Theta$ πρὸς τὸ ἀπὸ MZ , τὸ $E\Theta\Pi$ τρι-
 20 γωνον πρὸς τὸ ZPM , ὥς δὲ τὸ ἀπὸ $\Theta\Sigma$ πρὸς τὸ ἀπὸ
 ΞM , τὸ $\Delta\Theta\Sigma$ τρίγωνον πρὸς τὸ $\Xi M\Delta$. καὶ ὥς ἄρα
 τὸ $E\Theta\Pi$ πρὸς τὸ ZPM , τὸ $\Delta\Theta\Sigma$ πρὸς τὸ $\Xi M\Delta$.
 ἴσον δὲ τὸ μὲν $E\Theta\Pi$ τοῖς $A\Sigma K, \Theta\Delta\Sigma$, τὸ δὲ PMZ
 τοῖς $A\Xi N, \Delta M\Xi$. ὥς ἄρα τὸ $\Delta\Theta\Sigma$ πρὸς τὸ $\Xi M\Delta$,
 25 τὸ $A\Sigma K$ μετὰ τοῦ $\Theta\Delta\Sigma$ πρὸς τὸ $A\Xi N$ μετὰ τοῦ
 $\Xi M\Delta$, καὶ λοιπὸν τὸ $A\Sigma K$ πρὸς λοιπὸν τὸ $AN\Xi$
 ἔστιν, ὥς τὸ $\Delta\Sigma\Theta$ πρὸς τὸ $\Delta\Xi M$. ἀλλ' ὥς μὲν τὸ

4. τῆς] ὑπὸ τῆς V; ἐπὶ τῆς p; corr. Memus. 8. Δ] E V;
 corr. Memus. 12. $\Xi\Lambda MN\Xi O$ V; corr. p. 16. ZM] ΞM V;
 corr. p. 24. $A\Xi N$] $A\Xi M$ V; corr. Memus. 26. τό] (pr.)
 ego; ὥς τό V; ἄρα τό Halley.

nem rectamque puncta contactus coniungentem secat,
erunt, ut tota recta ita ducta ad partem extrinsecus
inter sectionem rectamque puncta contactus coniun-



gentem abscisam,
ita partes rectae
a sectionibus
punctoque concur-
sus contingentium
effectae.

sint oppositae
 A, B , quarum cen-
trum sit Γ , con-
tingentes autem

AA , AB , et ductae AB , ΓA producantur, per A autem ducatur recta aliqua $EAZH$. dico, esse

$$EH:HZ = E\Delta:\Delta Z.$$

ducatur enim AF et producatur, et per E, Z rectae AB parallelae ducantur $E\Theta, Z\Lambda$ $MN\Xi O$, rectae autem AA parallelae $E\Pi, ZP$.

iam quoniam parallelae sunt $Z\xi, E\Sigma$, et in eas incidunt $EZ, \xi\Sigma, \Theta M$, erit [Eucl. VI, 4] $E\Theta : \Theta\Sigma = ZM : M\xi$, et permutando [Eucl. V, 16] $E\Theta : ZM = \Theta\Sigma : \xi M$; quare etiam $\Theta E^2 : MZ^2 = \Theta\Sigma^2 : \xi M^2$. est autem [Eucl. VI, 19]

$E\Theta^2: MZ^2 = E\Theta\Pi: ZPM$, $\Theta\Sigma^2: \Xi M^2 = \Lambda\Theta\Sigma: \Xi M\Lambda$;
 itaque etiam $E\Theta\Pi: ZPM = \Lambda\Theta\Sigma: \Xi M\Lambda$, est autem
 $E\Theta\Pi = A\Sigma K + \Theta\Lambda\Sigma$, $PMZ = A\Xi N + \Lambda M\Xi$
 [prop. XI]; itaque

$\angle\Theta\Sigma:\Xi M\Delta = \angle\Sigma K + \Theta\Delta\Sigma:\Delta\Xi N + \Xi M\Delta$
 et [Eucl. V, 19] $\angle\Sigma K:AN\Xi = \angle\Sigma\Theta:\Delta\Xi M$. est
 autem

$ΑΣΚ$ πρὸς τὸ $ΑΝΞ$, τὸ ἀπὸ $ΚΑ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΑΝ$,
 τουτέστι τὸ ἀπὸ $ΕΗ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΖΗ$, ὥς δὲ τὸ $ΑΘΣ$
 πρὸς τὸ $ΞΑΜ$, τὸ ἀπὸ $ΘΑ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΑΜ$, τουτ-
 5 ἐστι τὸ ἀπὸ $ΕΑ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΑΖ$. καὶ ὥς ἄρα ἡ $ΕΗ$
 πρὸς $ΗΖ$, ἡ $ΕΑ$ πρὸς $ΑΖ$.

μ'.

Τῶν αὐτῶν ὄντων ἐὰν διὰ τῆς συμπτώσεως τῶν
 ἐφαπτομένων ἀχθῇ εὐθεία παρὰ τὴν τὰς ἀφὰς ἐπι-
 ξευγνύουσαν, καὶ ἀπὸ μέσης τῆς τὰς ἀφὰς ἐπιξευγ-
 10 νούσης ἀχθεῖσα εὐθεία τέμνῃ ἑκατέραν τῶν τομῶν
 καὶ τὴν παρὰ τὴν τὰς ἀφὰς ἐπιξευγνύουσαν, ἔσται,
 ὥς ὅλη ἡ διηγμένη πρὸς τὴν ἐκτὸς ἀπολαμβανομένην
 μεταξὺ τῆς παραλλήλου καὶ τῆς τομῆς, οὕτως τὰ γι-
 νόμενα τμήματα τῆς εὐθείας ὑπὸ τῶν τομῶν καὶ τῆς
 15 τὰς ἀφὰς ἐπιξευγνυούσης.

ἔστωσαν ἀντικείμεναι αἱ A, B , ὧν κέντρον τὸ Γ ,
 ἐφαπτόμεναι δὲ αἱ $ΑΔ, ΑΒ$, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ $ΑΒ$
 καὶ ἡ $\Gamma ΑΕ$. ἴση ἔρα ἡ $ΑΕ$ τῇ $ΕΒ$. καὶ ἀπὸ μὲν
 τοῦ $Α$ παρὰ τὴν $ΑΒ$ ἤχθω ἡ $ΖΑΗ$, ἀπὸ δὲ τοῦ $Ε$,
 20 ὥς ἔτυχεν, ἡ $ΑΕ$. λέγω, ὅτι ἐστίν, ὥς ἡ $ΘΑ$ πρὸς
 $ΑΚ$, ἡ $ΘΕ$ πρὸς $ΕΚ$.

ἤχθωσαν ἀπὸ τῶν Θ, K παρὰ μὲν τὴν $ΑΒ$ αἱ
 $NΜΘΞ, ΚΟΠ$, παρὰ δὲ τὴν $ΑΔ$ αἱ $\Theta Ρ, ΚΣ$, καὶ
 διήχθω ἡ $ΞΑΓΤ$.

25 ἐπεὶ οὖν εἰς παραλλήλους τὰς $ΞΜ, ΚΠ$ διηγμέναι
 εἰσὶν αἱ $ΞΑΥ, ΜΑΠ$, ἔστιν, ὥς ἡ $ΞΑ$ πρὸς $ΑΥ$,
 ἡ $ΜΑ$ πρὸς $ΑΠ$. ἀλλ' ὥς ἡ $ΞΑ$ πρὸς $ΑΥ$, ἡ $ΘΕ$


20. $ΑΕ$] ego ; $ΑΕ$ V ; $\Theta ΕΚΑ$ Halley cum Memo. 23.
 $NΜΘΞ$] $\Theta ΜΝΞ$ V ; corr. p ($ΞΘΜΝ$). 24. $ΞΑΓΤ$]
 $ΑΓΞΤ$ V ; corr. p. 26. $ΜΑΠ$] $ΜΑΓ$ V ; corr. p. 27. $ΜΑ$
 $ΜΔ$ V ; corr. p.

$A\Sigma K : AN\Xi = KA^2 : AN^2$ [Eucl. VI, 19]
 $= EH^2 : ZH^2$ [Eucl. VI, 2; VI, 4; V, 12; V, 16],
 et
 $A\Theta\Sigma : \Xi\Delta M = \Theta\Delta^2 : \Delta M^2$ [Eucl. VI, 19]
 $= EA^2 : \Delta Z^2$ [Eucl. VI, 4].
 ergo etiam $EH : HZ = EA : \Delta Z$.

XL.

Iisdem positis si per punctum concursus contin-
 gentium recta ducitur rectae puncta contactus con-
 iungenti parallela, et recta a media recta puncta
 contactus coniungenti ducta utramque sectionem secat
 rectamque rectae puncta contactus coniungenti par-
 allelam, erunt, ut tota recta ita ducta ad partem ex-
 trinsecus inter parallelam sectionemque abscisam, ita
 partes rectae a sectionibus rectaque puncta contactus
 coniungenti effectae.

sint oppositae A, B , quarum centrum sit Γ , con-
 tingentes autem $A\Delta, \Delta B$, et ducantur AB et $\Gamma\Delta E$;



itaque $AE = EB$ [II, 39]. et a Δ rectae AB par-
 allela ducatur $Z\Delta H$, ab E autem quoquo modo ΔE
 dico, esse $\Theta\Delta : \Delta K = \Theta E : EK$.

πρὸς EK . ὥς δὲ ἡ ΘE πρὸς EK , ἡ ΘN πρὸς KO
 διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν ΘEN , KEO τριγώνων. ὥς
 ἄρα ἡ ΘN πρὸς KO , ἡ MA πρὸς AI . καὶ ὥς ἄρα
 τὸ ἀπὸ ΘN πρὸς τὸ ἀπὸ KO , τὸ ἀπὸ MA πρὸς τὸ
 5 ἀπὸ AI . ἀλλ' ὥς μὲν το ἀπὸ ΘN πρὸς τὸ ἀπὸ OK ,
 τὸ ΘPN τριγώνου πρὸς τὸ $K\Sigma O$, ὥς δὲ τὸ ἀπὸ MA
 πρὸς τὸ ἀπὸ AI , τὸ ΞMA τριγώνου πρὸς τὸ $AT\Pi$.
 καὶ ὥς ἄρα τὸ ΘNP πρὸς τὸ $KO\Sigma$, τὸ ΞMA πρὸς
 τὸ $AT\Pi$. ἴσον δὲ τὸ ΘNP τοῖς ΞAM , $MN\Delta$, τὸ
 10 δὲ ΣOK τοῖς $AT\Pi$, $\Delta O\Pi$. καὶ ὥς ἄρα τὸ ΞMA
 μετὰ τοῦ $MN\Delta$ τριγώνου πρὸς τὸ $AT\Pi$ τριγώνου
 μετὰ τοῦ $\Pi\Delta O$ τριγώνου, οὕτως τὸ ΞMA τριγώνου
 πρὸς τὸ $\Pi\Gamma A$ τριγώνου. καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ $NM\Delta$
 πρὸς λοιπὸν τὸ $\Delta O\Pi$ τριγώνον ἔστιν, ὥς ὅλον πρὸς
 15 ὅλον. ἀλλ' ὥς τὸ ΞMA τριγώνου πρὸς τὸ $AT\Pi$
 τριγώνου, τὸ ἀπὸ ΞA πρὸς τὸ ἀπὸ AT , ὥς δὲ τὸ
 $M\Delta N$ πρὸς τὸ $\Pi\Delta O$, τὸ ἀπὸ MN πρὸς τὸ ἀπὸ ΠO .
 καὶ ὥς ἄρα τὸ ἀπὸ MN πρὸς τὸ ἀπὸ ΠO , τὸ ἀπὸ
 ΞA πρὸς τὸ ἀπὸ AT . ὥς δὲ τὸ ἀπὸ MN πρὸς τὸ
 20 ἀπὸ ΠO , τὸ ἀπὸ $N\Delta$ πρὸς τὸ ἀπὸ $O\Delta$, ὥς δὲ τὸ
 ἀπὸ ΞA πρὸς τὸ ἀπὸ AT , τὸ ἀπὸ ΘE πρὸς τὸ ἀπὸ
 EK , ὥς δὲ τὸ ἀπὸ $N\Delta$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔO , τὸ ἀπὸ ΘA
 πρὸς τὸ ἀπὸ AK . καὶ ὥς ἄρα τὸ ἀπὸ ΘE πρὸς τὸ
 ἀπὸ EK , τὸ ἀπὸ ΘA πρὸς τὸ ἀπὸ AK . ἔστιν ἄρα,
 25 ὥς ἡ ΘE πρὸς EK , ἡ ΘA πρὸς AK .

μα'.

Ἐὰν παραβολῆς τρεῖς εὐθεῖαι ἐφαπτόμεναι συμ-
 πίπτωσιν ἀλλήλαις, εἰς τὸν αὐτὸν λόγον τμηθήσονται.

4. πρὸς] (alt.) bis V; corr. p.c. 8. τὸ ΞMA] om. V;
 corr. p. 13. $\Xi NM\Delta$ V; corr. p ($MN\Delta$). 25. ΘE] cp,
 E obscurum in V; $\Theta \Sigma$ v.

a Θ , K rectae AB parallelae ducantur $NM\Theta\xi$, $KO\Pi$, rectae autem AA parallelae ΘP , $K\Sigma$, et ducatur $\xi A\Gamma T$.

quoniam igitur in parallelas ξM , $K\Pi$ incidunt ξAT , $MA\Pi$, erit [Eucl. VI, 4] $\xi A:AT = MA:A\Pi$. uerum $\xi A:AT = \Theta E:EK$ [Eucl. VI, 2]; et

$$\Theta E:EK = \Theta N:KO$$

propter similitudinem triangulorum ΘEN , KEO [Eucl. VI, 4]; itaque $\Theta N:KO = MA:A\Pi$. quare etiam $\Theta N^2:KO^2 = MA^2:A\Pi^2$. uerum $\Theta N^2:OK^2 = \Theta PN:K\Sigma O$, $MA^2:A\Pi^2 = \xi MA:AT\Pi$ [Eucl. VI, 19]; itaque etiam $\Theta NP:KO\Sigma = \xi MA:AT\Pi$. est autem [prop. XI] $\Theta NP = \xi AM + MN\Delta$ et $\Sigma OK = AT\Pi + \Delta O\Pi$; quare etiam

$$\xi MA + MN\Delta:AT\Pi + \Delta O\Pi = \xi MA:\Pi TA.$$

itaque etiam [Eucl. V, 19] $NM\Delta:\Delta O\Pi$, ut totum ad totum. est autem

$$\xi MA:AT\Pi = \xi A^2:AT^2, \quad MN\Delta:\Delta O\Pi = MN^2:\Pi O^2$$

[Eucl. VI, 19]; quare etiam $MN^2:\Pi O^2 = \xi A^2:AT^2$. uerum

$$MN^2:\Pi O^2 = N\Delta^2:O\Delta^2 \text{ [Eucl. VI, 4],}$$

$$\xi A^2:AT^2 = \Theta E^2:EK^2 \text{ [Eucl. VI, 2],}$$

$$N\Delta^2:O\Delta^2 = \Theta A^2:AK^2 \text{ [Eucl. VI, 4; VI, 2; V, 12; V, 16];}$$

itaque etiam $\Theta E^2:EK^2 = \Theta A^2:AK^2$. ergo

$$\Theta E:EK = \Theta A:AK.$$

XLI.

Si tres rectae parabolam contingentes inter se concurrunt, secundum eandem rationem secabuntur.

ἔστω παραβολὴ ἡ $ABΓ$, ἐφαπτόμεναι δὲ αἱ $ΑΔΕ$, $EZΓ$, $ΑΒΖ$. λέγω, ὅτι ἐστίν, ὡς ἡ $ΓΖ$ πρὸς ZE , ἡ $EΔ$ πρὸς $ΑΔ$ καὶ ἡ ZB πρὸς $BΔ$.

ἐπεζεύχθω γὰρ ἡ $ΑΓ$ καὶ τετμήσθω δίχα κατὰ
5 τὸ H .

ὅτι μὲν οὖν ἡ ἀπὸ τοῦ E ἐπὶ τὸ H διάμετρος ἐστὶ
τῆς τομῆς, φανερόν.

εἰ μὲν οὖν διὰ τοῦ B ἔρχεται, παράλληλός ἐστὶν
ἡ $ΔΖ$ τῇ $ΑΓ$ καὶ δίχα τμηθήσεται κατὰ τὸ B ὑπὸ
10 τῆς EH , καὶ διὰ τοῦτο ἴση ἔσται ἡ $ΑΔ$ τῇ $ΔΕ$ καὶ
ἡ $ΓΖ$ τῇ ZE , καὶ φανερόν τὸ ζητούμενον.

μὴ ἐρχέσθω διὰ τοῦ B , ἀλλὰ διὰ τοῦ $Θ$, καὶ ἦχθω
διὰ τοῦ $Θ$ παρὰ τὴν $ΑΓ$ ἡ $KΘΑ$. ἐφάπεται ἄρα τῆς
τομῆς κατὰ τὸ $Θ$, καὶ διὰ τὰ εἰρημένα ἴση ἔσται ἡ AK
15 τῇ KE καὶ ἡ $ΑΓ$ τῇ $ΑΕ$. ἦχθω διὰ μὲν τοῦ B παρὰ
τὴν EH ἡ $MNBΞ$, διὰ δὲ τῶν $A, Γ$ παρὰ τὴν $ΔΖ$
αἱ $ΑΟ, ΓΠ$. ἐπεὶ οὖν παράλληλός ἐστὶν ἡ MB τῇ
 $EΘ$, διάμετρος ἐστὶν ἡ MB . καὶ ἐφάπτεται κατὰ τὸ B
ἡ $ΔΖ$. κατηγμέναι ἄρα εἰσὶν αἱ $ΑΟ, ΓΠ$. καὶ ἐπεὶ
20 διάμετρος ἐστὶν ἡ MB , ἐφαπτομένη δὲ ἡ $ΓΜ$, κατ-
ηγμένη δὲ ἡ $ΓΠ$, ἴση ἔσται ἡ MB τῇ $BΠ$. ὥστε καὶ
ἡ MZ τῇ $ZΓ$. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ MZ τῇ $ZΓ$ καὶ
ἡ $EΔ$ τῇ $ΑΓ$, ἔστιν, ὡς ἡ $MΓ$ πρὸς $ΓΖ$, ἡ $EΓ$ πρὸς
 $ΓΑ$. καὶ ἐναλλάξ, ὡς ἡ $MΓ$ πρὸς $ΓΕ$, ἡ $ZΓ$ πρὸς $ΓΑ$.
25 ἀλλ' ὡς ἡ $MΓ$ πρὸς $ΓΕ$, ἡ $ΞΓ$ πρὸς $ΓΗ$. καὶ ὡς
ἄρα ἡ $ZΓ$ πρὸς $ΓΑ$, ἡ $ΞΓ$ πρὸς $ΓΗ$. ὡς δὲ ἡ $HΓ$
πρὸς $ΓΑ$, ἡ $ΑΓ$ πρὸς $ΓΕ$ [διπλασία γὰρ ἐκατέρω].
δι' ἴσου ἄρα, ὡς ἡ $ΑΓ$ πρὸς $ΓΞ$, ἡ $EΓ$ πρὸς $ΓΖ$,

13. $KΘΑ$] $ΘΚΑ$ V; corr. p. 20. Post MB del. m. 1
τῇ $EΘ$ διάμετρος ἐστὶν ἡ MB V. 21. ἔσται] bis V; corr. pvc.
27. διπλασία γὰρ ἐκατέρω] deleo.

sit parabola $AB\Gamma$, contingentes autem $A\Delta E$, $EZ\Gamma$, ΔBZ . dico, esse $\Gamma Z:ZE = EA:\Delta A = ZB:BA$.

ducatur enim $A\Gamma$ et in H in duas partes aequales secetur.

iam rectam ab E ad H ductam diametrum esse sectionis, manifestum est [II, 29].

iam si ea per B cadit, ΔZ rectae $A\Gamma$ parallela erit [II, 5] et ad B ab EH in duas partes aequales secabitur [Eucl. VI, 4], qua de causa erit $EA = \Delta E$,


$\Gamma Z = ZE$ [I, 35; Eucl. VI, 2], et manifestum est, quod quaerimus.

iam ne cadat per B , sed per Θ , et per Θ rectae $A\Gamma$ parallela ducatur $K\Theta A$; ea igitur sectionem continget in Θ [I, 32], et

propter ea, quae diximus, erit $AK = KE$, $A\Gamma = AE$. iam per B rectae EH parallela ducatur $MNB\Xi$, per A , Γ autem rectae ΔZ parallelae AO , $\Gamma\Pi$. quoniam igitur MB , $E\Theta$ parallelae sunt, diametrus est MB [I, 51 coroll.]; et ΔZ in B contingit; itaque AO , $\Gamma\Pi$ ordinate ductae sunt [I def.4]. et quoniam MB diametrus est, contingens ΓM , ordinate ducta $\Gamma\Pi$, erit $MB = B\Pi$ [I, 35]; quare etiam $MZ = Z\Gamma$ [Eucl. VI, 2]. et quoniam est $MZ = Z\Gamma$, $EA = A\Gamma$, erit

$$M\Gamma:\Gamma Z = E\Gamma:\Gamma A$$

et permutando [Eucl. V, 16] $M\Gamma:\Gamma E = Z\Gamma:\Gamma A$.



καὶ ἀναστρέψαντι, ὥς ἡ $EΓ$ πρὸς EZ , ἡ $ΓΑ$ πρὸς $AΞ$.
 διελόντι, ὥς ἡ $ΓΖ$ πρὸς ZE , ἡ $ΓΞ$ πρὸς $ΞΑ$. πάλιν
 ἐπεὶ διάμετρος ἐστὶν ἡ MB καὶ ἐφαπτομένη ἡ AN
 καὶ κατηγμένη ἡ AO , ἴση ἐστὶν ἡ NB τῇ BO καὶ ἡ
 5 NA τῇ AA . ἔστι δὲ καὶ ἡ EK τῇ KA . ὥς ἄρα ἡ
 AE πρὸς AK , ἡ NA πρὸς AA . ἐναλλάξ, ὥς ἡ EA
 πρὸς AN , ἡ KA πρὸς AA . ἀλλ' ὥς ἡ EA πρὸς AN ,
 ἡ HA πρὸς $AΞ$. καὶ ὥς ἄρα ἡ KA πρὸς AA , ἡ HA
 πρὸς $AΞ$. ἔστι δὲ καὶ, ὥς ἡ $ΓΑ$ πρὸς AH , ἡ EA
 10 πρὸς AK [διπλασία γὰρ ἐκατέρω ἐκατέρως]. δι' ἴσου
 ἄρα, ὥς ἡ $ΓΑ$ πρὸς $AΞ$, ἡ EA πρὸς AA . διελόντι,
 ὥς ἡ $ΓΞ$ πρὸς $ΞΑ$, ἡ EA πρὸς AA . ἐδείχθη δὲ καί,
 ὥς ἡ $ΓΞ$ πρὸς $AΞ$, ἡ $ΓΖ$ πρὸς ZE . ὥς ἄρα ἡ $ΓΖ$
 πρὸς ZE , ἡ EA πρὸς AA . πάλιν ἐπεὶ ἐστὶν, ὥς ἡ
 15 $ΓΞ$ πρὸς $ΞΑ$, ἡ $ΓΠ$ πρὸς AO , καὶ ἐστὶν ἡ μὲν $ΓΠ$
 τῆς BZ διπλῇ, ἐπεὶ καὶ ἡ $ΓM$ τῆς MZ , ἡ δὲ AO
 τῆς BA , ἐπεὶ καὶ ἡ AN τῆς NA , ὥς ἄρα ἡ $ΓΞ$
 πρὸς $ΞΑ$, ἡ ZB πρὸς BA καὶ ἡ $ΓΖ$ πρὸς ZE καὶ
 ἡ EA πρὸς AA .

20

μβ'.

Ἐὰν ἐν ὑπερβολῇ ἢ ἐλλείψει ἢ κύκλου περιφερείᾳ
 ἢ ταῖς ἀντικειμέναις ἀπ' ἑκρας τῆς διαμέτρου ἀχθῶσι
 παρὰ τεταγμένως κατηγμένην, ἄλλη δέ τις, ὥς ἔτυχεν,
 ἀχθῇ ἐφαπτομένη, ἀποτεμεῖ ἀπ' αὐτῶν εὐθείας ἴσον
 25 περιεχούσας τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ πρὸς τῇ αὐτῇ δια-
 μέτρῳ εἶδους.

ἔστω γάρ τις τῶν προειρημένων τομῶν, ἥς δια-
 μέτρος ἡ AB , καὶ ἀπὸ τῶν A, B ἡχθῶσαν παρὰ

1. $AΞ$] νc , corr. ex $AΓ m. 1 V$. 10. διπλασία — ἐκα-
 τέρας] deleo. 21. ἐν] om. V ; corr. p .

uerum $MF:FE = EG:GH$ [Eucl. VI, 4]; itaque etiam $ZG:GA = EG:GH$. est autem

$$HG:GA = AG:FE;$$

nam utraque duplo maior est; ex aequo igitur [Eucl. V, 22] $AG:GE = EG:GZ$, et conuertendo [Eucl. V, 19 coroll.] $EG:EZ = GA:AE$; dirimendo [Eucl. V, 17]

$$GZ:ZE = GE:EA.$$

rursus quoniam diametrus est MB , contingens AN , ordinate ducta AO , erit $NB=BO$ [I, 35] et [Eucl. VI, 2] $NA=AA$. est autem etiam $EK=KA$; quare $AE:AK = NA:AA$, et permutando [Eucl. V, 16] $EA:AN = KA:AA$. est autem $EA:AN = HA:AE$ [Eucl. VI, 4]; quare etiam $KA:AA = HA:AE$. est autem etiam $GA:AH = EA:AK$; nam utraque duplo maior est utraque; itaque ex aequo $GA:AE = EA:AA$ [Eucl. V, 22]; dirimendo [Eucl. V, 17] $GE:EA = EA:AA$. demonstrauius autem etiam, esse $GE:AE = GZ:ZE$; itaque $GZ:ZE = EA:AA$. rursus quoniam est $GE:EA = GH:AO$ [Eucl. VI, 4; V, 16], et $GH=2BZ$ [Eucl. VI, 4], quoniam etiam $GM=2MZ$, et $AO=2BA$ [Eucl. VI, 4], quoniam etiam $AN=2NA$, erit

$$GE:EA = ZB:BA = GZ:ZE = EA:AA.$$


XLII.

Si in hyperbola uel ellipsi uel circulo uel oppositis a terminis diametri rectae ducuntur rectae ordinate ductae parallelae, alia autem aliqua quoquo modo contingens ducitur, haec ab illis rectas abscindet rectangulum comprehendentes aequale quartae parti figurae eidem diametro adplicatae.

sit enim aliqua sectionum, quas diximus, cuius

τεταγμένως κατηγμένην αὐτὴν $ΑΓ$, $ΒΔ$, ἄλλη δὲ τις ἐφαπτέσθω κατὰ τὸ $Ε$ ἢ $ΓΕΔ$. λέγω, ὅτι τὸ ὑπὸ $ΑΓ$, $ΒΔ$ ἴσον ἐστὶ τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ πρὸς τῇ $ΑΒ$ εἰδους.

- 5 ἔστω γὰρ κέντρον τὸ $Ζ$, καὶ δι' αὐτοῦ ἦχθω παρὰ τὰς $ΑΓ$, $ΒΔ$ ἡ $ΖΗΘ$. ἐπεὶ οὖν αὐτὴν $ΑΓ$, $ΒΔ$ παράλληλοί εἰσιν, ἔστι δὲ καὶ ἡ $ΖΗ$ παράλληλος, συζυγῆς




ἄρα διάμετρος ἐστὶ τῇ $ΑΒ$. ὥστε τὸ ἀπὸ $ΖΗ$ ἴσον ἐστὶ τῷ τετάρτῳ τοῦ πρὸς τῇ $ΑΒ$ εἰδους.

- 10 εἰ μὲν οὖν ἡ $ΖΗ$ ἐπὶ τῆς ἐλλείψεως καὶ τοῦ κύκλου διὰ τοῦ $Ε$ ἔρχεται, ἴσαι γίνονται αὐτὴν $ΑΓ$, $ΖΗ$, $ΒΔ$, καὶ φανερόν αὐτόθεν, ὅτι τὸ ὑπὸ $ΑΓ$, $ΒΔ$ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ $ΖΗ$, τουτέστι τῷ τετάρτῳ τοῦ πρὸς τῇ $ΑΒ$ εἰδους.
- 15 μὴ ἐρχέσθω δὲ, καὶ συμπιπτεύσαν αὐτὴν $ΑΓ$, $ΒΔ$ ἐκβαλλόμεναι κατὰ τὸ $Κ$, καὶ διὰ τοῦ $Ε$ παρὰ μὲν τὴν $ΑΓ$ ἦχθω ἡ $ΕΔ$, παρὰ δὲ τὴν $ΑΒ$ ἡ $ΕΜ$. ἐπεὶ οὖν ἴσον ἐστὶ τὸ ὑπὸ $ΚΖΑ$ τῷ ἀπὸ $ΑΖ$, ἔστιν, ὥς ἡ $ΚΖ$ πρὸς $ΖΑ$, ἡ $ΖΑ$ πρὸς $ΖΑ$, καὶ ἡ $ΚΑ$ πρὸς
- 20 $ΑΔ$ ἐστίν, ὥς ἡ $ΚΖ$ πρὸς $ΖΑ$, τουτέστι πρὸς $ΖΒ$.

20. ἐστίν] scripsi, ἔστι δὲ V p. ΖΑ] p c v, Α e corr. m. 1 V. ΖΒ] p c v; Β e corr. m. 1 V.

diametrus sit AB , et ab A, B rectae ordinate ductae parallelae ducantur AG, BA , alia autem recta GEA in E contingat. dico, $AG \times BA$ quartae parti figurae ad AB adplicatae aequale esse.

sit enim centrum Z , et per id rectis AG, BA parallela ducatur $ZH\Theta$. quoniam igitur AG, BA



parallelae sunt, et etiam ZH iis parallela est, diametrus est coniugata cum AB [I def. 6]; quare ZH^2 quartae parti figurae ad AB adplicatae aequale est [I deff. alt. 3].

iam si in ellipsi circuloque ZH per E cadit, erit $AG = ZH = BA$, et statim adparet, esse

$$AG \times BA = ZH^2,$$

hoc est quartae parti figurae ad AB adplicatae aequale.

iam per E ne cadat, et AG, BA productae concurrant in K , per E autem rectae AG parallela ducatur EA et rectae AB parallela EM . iam quoniam est [I, 37] $KZ \times ZA = AZ^2$, erit $KZ : ZA = ZA : ZA$ [Eucl. VI, 17] et

$$\begin{aligned} KA : AA &= KZ : ZA \text{ [Eucl. V, 12; — V, 19 coroll.; V, 16]} \\ &= KZ : ZB. \end{aligned}$$


ἀνάπαλιν, ὥς ἡ BZ πρὸς ZK , ἡ AA πρὸς AK . συν-
 θέντι ἢ διελόντι, ὥς ἡ BK πρὸς KZ , ἡ AK πρὸς KA .
 καὶ ὥς ἄρα ἡ AB πρὸς $ZΘ$, ἡ EA πρὸς $ΓA$. τὸ ἄρα
 ὑπὸ AB , $ΓA$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ $ZΘ$, EA , τουτέστι τῷ
 5 ὑπὸ $ΘZM$. τὸ δὲ ὑπὸ $ΘZM$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ZH ,
 τουτέστι τῷ τετάρτῳ τοῦ πρὸς τῇ AB εἰδους· καὶ τὸ
 ὑπὸ AB , $ΓA$ ἄρα ἴσον ἐστὶ τῷ τετάρτῳ τοῦ πρὸς
 τῇ AB εἰδους.

μγ'.

10 Ἐὰν ὑπερβολῆς εὐθεία ἐπιψαύῃ, ἀποτεμεῖ ἀπὸ τῶν
 ἀσύμπτωτων πρὸς τῷ κέντρῳ τῆς τομῆς εὐθείας ἴσον
 περιεχούσας τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τῶν ἀποτεμνομένων
 εὐθειῶν ὑπὸ τῆς ἐφαπτομένης κατὰ τὴν πρὸς τῷ ἄξονι
 κορυφῇ τῆς τομῆς.

15 ἔστω ὑπερβολῇ ἡ AB , ἀσύμπτωτοι δὲ αἱ $ΓAE$,
 ἄξων δὲ ὁ BA , καὶ ἡχθῶ διὰ τοῦ B ἐφαπτομένη ἡ
 ZBH , ἄλλη δέ τις, ὥς ἔτυχεν,
 ἐφαπτομένη ἡ $ΓAΘ$. λέγω, ὅτι
 τὸ ὑπὸ ZAH ἴσον ἐστὶ τῷ
 20 ὑπὸ $ΓAΘ$.

ἡχθῶσαν γὰρ ἀπὸ τῶν A, B
 παρὰ μὲν τὴν AH αἱ AK, BA ,
 παρὰ δὲ τὴν $ΓA$ αἱ AM, BN .
 ἐπεὶ οὖν ἐφάπτεται ἡ $ΓAΘ$,
 25 ἴση ἡ $ΓA$ τῇ $AΘ$. ὥστε ἡ $ΓΘ$
 τῆς $ΘA$ διπλῇ καὶ ἡ $ΓA$ τῆς
 AM καὶ ἡ $AΘ$ τῆς AK . τὸ ἄρα ὑπὸ $ΓAΘ$ τετρα-
 πλάσιόν ἐστι τοῦ ὑπὸ KAM . ὁμοίως δὲ δειχθήσεται



1. ἡ] (pr.) om. V; corr. p. 10. ἀποτεμεῖ] cp, supra add.
 η m. 1 V. ἀπὸ τῶν] bis V; corr. pc. 16. ἄξων] pcv, ξ e
 corr. m. 1 V. 17. ZBH] BZH V; corr. p.

e contrario [Eucl. V, 7 coroll.] $BZ : ZK = AA : AK$.
 componendo [Eucl. V, 18] uel dirimendo [Eucl. V, 17]
 $BK : KZ = AK : KA$. quare etiam

$$AB : Z\Theta = EA : \Gamma A \text{ [Eucl. VI, 4].}$$

itaque [Eucl. VI, 16] $AB \times \Gamma A = Z\Theta \times EA = \Theta Z \times ZM$
 [Eucl. I, 34]. uerum $\Theta Z \times ZM = ZH^2$ [I, 38], hoc
 est quartae parti figurae ad AB adplicatae aequale.
 ergo etiam $AB \times \Gamma A$ quartae parti figurae ad AB
 adplicatae aequale est.

XLIII.

Si recta hyperbolam contingit, ab asymptotis ad
 centrum sectionis rectas abscindet rectangulum com-
 prehendentes aequale rectangulo comprehenso rectis
 abscisis a recta in uertice sectionis ad axem posito
 contingenti.

sit hyperbola AB , asymptotae autem ΓA , ΔE ,
 axis autem BA , et per B contingens ducatur ZBH ,
 alia autem quaeuis contingens $\Gamma A\Theta$. dico, esse

$$Z\Delta \times \Delta H = \Gamma A \times \Delta \Theta.$$

ducantur enim ab A , B rectae ΔH parallelae AK ,
 BA , rectae autem ΓA parallelae AM , BN . iam
 quoniam $\Gamma A\Theta$ contingit, erit $\Gamma A = A\Theta$ [II, 3]. quare
 erit $\Gamma \Theta = 2\Theta A$, $\Gamma A = 2AM$ [Eucl. VI, 2; I, 34],
 $\Delta \Theta = 2AK$ [Eucl. VI, 4]. itaque erit

$$\Gamma A \times \Delta \Theta = 4KA \times AM.$$

iam eodem modo demonstrabimus, esse

$$Z\Delta \times \Delta H = 4AB \times BN.$$

est autem $KA \times AM = AB \times BN$ [II, 12]. ergo
 etiam $\Gamma A \times \Delta \Theta = Z\Delta \times \Delta H$.

τὸ ὑπὸ $Z\Delta H$ τετραπλάσιον τοῦ ὑπὸ ABN . ἴσον δὲ
τὸ ὑπὸ KAM τῷ ὑπὸ ABN . ἴσον ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ
 $\Gamma\Delta\Theta$ τῷ ὑπὸ $Z\Delta H$.

ὁμοίως δὲ δειχθήσεται, καὶ ἡ ΔB ἑτέρα τις ἢ
5 διάμετρος καὶ μὴ ἄξιων.

μδ'.

Ἐὰν υπερβολῆς ἢ τῶν ἀντικειμένων δύο εὐθεῖαι
ἐφαπτόμεναι συμπέπτωσι ταῖς ἀσυμπτώτοις, αἱ ἐπὶ τὰς
τομὰς ἀγόμεναι παράλληλοι ἔσονται τῇ τὰς ἀφ' αὐτῶν ἐπι-
10 ξευγνυούσῃ.

ἔστω γὰρ ἡ ὑπερβολὴ ἢ ἀντικείμεναι ἡ AB , ἀσύμ-
πτωτοι δὲ αἱ $\Gamma\Delta E$ καὶ ἐφαπτόμεναι αἱ $\Gamma A\Theta Z$, $EB\Theta H$,
καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ AB , ZH ,
 ΓE . λέγω, ὅτι παράλληλοί


15 εἰσιν.

ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ $\Gamma\Delta Z$ ἴσον
τῷ ὑπὸ $H\Delta E$, ἔστιν ἄρα, ὥς
ἡ $\Gamma\Delta$ πρὸς ΔE , ἡ $H\Delta$ πρὸς
 ΔZ . παράλληλος ἄρα ἔστιν ἡ
20 ΓE τῇ ZH . καὶ διὰ τοῦτο
ὥς ἡ ΘZ πρὸς $Z\Gamma$, ἡ ΘH
πρὸς HE . ὥς δὲ ἡ HE πρὸς
 HB , ἡ ΓZ πρὸς AZ . διπλῇ γὰρ ἑκατέρω· δι' ἴσον
ἄρα ὥς ἡ ΘH πρὸς HB , ἡ ΘZ πρὸς ZA . παρ-
25 ἄλληλος ἄρα ἔστιν ἡ ZH τῇ AB .

με'.

Ἐὰν ἐν ὑπερβολῇ ἢ ἐλλείψει ἡ κύκλου περιφερεῖα
ἢ ταῖς ἀντικειμέναις ἀπ' ἄκρου τοῦ ἄξονος ἀχθῶσιν

13. AB] AH V; corr. p. 17. τῷ V; corr. p. c. ἔστιν
— 18. $\Gamma\Delta$] om. V; corr. p.



iam eodem modo hoc demonstrabimus, etiam si ΔB alia aliqua diametrus est, non axis.

XLIV.

Si duae rectae hyperbolam uel oppositas contingentes cum asymptotis concurrunt, rectae ad puncta sectionis ductae parallelae erunt rectae puncta contactus coniungenti.

sit enim AB aut hyperbola aut oppositae, asymptotae autem ΓA , ΔE contingentesque $\Gamma A \Theta Z$, $EB \Theta H$, et ducantur AB , ZH , ΓE . dico, eas parallelas esse.

nam quoniam est

$$\Gamma A \times \Delta Z = H A \times \Delta E$$

[prop. XLIII; cfr. Eutocius],
erit [Eucl. VI, 16]


$$\Gamma A : \Delta E = H A : \Delta Z;$$

itaque [Eucl. VI, 6; I, 27, 28]

ΓE et ZH parallelae sunt. qua
de causa erit

$$\Theta Z : Z\Gamma = \Theta H : HE \text{ [Eucl. VI, 2].}$$


est autem $HE : HB = \Gamma Z : AZ$; nam utraque duplo
maior est utraque [II, 3]. ex aequo igitur [Eucl V, 22]
 $\Theta H : HB = \Theta Z : ZA$. ergo [Eucl. VI, 2] ZH , AB
parallelae sunt.



XLV.

Si in hyperbola uel ellipsi uel circulo uel oppositis a terminis axis rectae perpendiculares ducuntur, et quartae parti figurae aequale axi adplicatur in utramque partem spatium in hyperbola oppositisque figura

εὐθεῖαι πρὸς ὀρθάς, καὶ τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ εἵδους
 ἴσον παρὰ τὸν ἄξονα παραβληθῇ ἐφ' ἑκάτερα ἐπὶ μὲν
 τῆς ὑπερβολῆς καὶ τῶν ἀντικειμένων ὑπερβάλλον εἶδει
 τετραγώνῳ, ἐπὶ δὲ τῆς
 5 ἐλλείψεως ἐλλείπον, ἀχθῇ
 δέ τις εὐθεῖα ἐφαπτομένη
 τῆς τομῆς συμπίπτουσα
 ταῖς πρὸς ὀρθὰς εὐθείαις,
 αἱ ἀπο τῶν συμπτώσεων
 10 ἀγόμεναι εὐθεῖαι ἐπὶ τὰ
 ἐν τῆς παραβολῆς γενη-
 θέντα σημεῖα ὀρθὰς ποι-
 οῦσι γωνίας πρὸς τοῖς
 εἰρημένοις σημείοις.




15 ἔστω μία τῶν εἰρημένων τομῶν, ἥς ἄξων ὁ AB ,
 πρὸς ὀρθὰς δὲ αἱ AG , BA , ἐφαπτομένη δὲ ἡ $ΓΕΔ$,
 καὶ τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ εἵδους ἴσον παραβελήσθω
 ἐφ' ἑκάτερα, ὥς εἴρηται, τὸ ὑπὸ AZB καὶ τὸ ὑπὸ
 AHB , καὶ ἐπεξέχθωσαν αἱ $ΓΖ$, $ΓΗ$, $ΔΖ$, $ΔΗ$. λέγω,
 20 ὅτι ἡ τε ὑπὸ $ΓΖΔ$ καὶ ἡ ὑπὸ $ΓΗΔ$ γωνία ὀρθή
 ἔστιν.

ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ AG , BA ἴσον ἐδείχθη τῷ τετάρτῳ
 μέρει τοῦ πρὸς τῇ AB εἵδους, ἔστι δὲ καὶ τὸ ὑπὸ
 AZB ἴσον τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ εἵδους, τὸ ἄρα ὑπὸ
 25 AG , $ΔB$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ AZB . ἔστιν ἄρα, ὥς ἡ
 $ΓA$ πρὸς AZ , ἡ ZB πρὸς BA . καὶ ὀρθαὶ αἱ πρὸς
 τοῖς A , B σημείοις γωνίαι· ἴση ἄρα ἡ μὲν ὑπὸ AGZ
 γωνία τῇ ὑπὸ BZA , ἡ δὲ ὑπὸ $AZΓ$ τῇ ὑπὸ ZAB .
 καὶ ἐπεὶ ἡ ὑπὸ GAZ ὀρθή ἐστίν, αἱ ἄρα ὑπὸ AGZ ,

20. $ΓΖΔ$] p; $ΓΔΖ$ vc, $ΓΔ''Ζ'$ V (lineolae a manu 2?).
 27. ὑπό] pc, supra scr. m. 1 V.

quadrata excedens, in ellipsi autem deficiens, sectionemque contingens recta ducitur cum rectis perpendicularibus concurrens, rectae a punctis concursus ad puncta



adplicatione orta ductae ad puncta, quae diximus, rectos angulos efficiunt.

sit aliqua sectionum, quas diximus, cuius axis sit AB , perpendiculares autem AF , BA contingensque FEA , et quartae parti figurae aequale in utramque partem adplicitur ita, ut diximus, $AZ \times ZB$ et $AH \times HB$, ducanturque FZ , FH ,

AZ , AH . dico, angulos FZA et FHA rectos esse.

nam quoniam demonstraui, esse $AF \times BA$ quartae parti figurae ad AB adplicatae aequale [prop. XLII], uerum etiam $AZ \times ZB$ quartae parti figurae aequale est, erit $AF \times AB = AZ \times ZB$. itaque $FA : AZ = ZB : BA$ [Eucl. VI, 16]. et anguli ad A , B positi recti sunt; itaque [Eucl. VI, 6] $\angle AFZ = \angle BZA$, $\angle AZF = \angle ZAB$. et quoniam $\angle FAZ$ rectus est, $\angle AFZ + \angle AZF$ uni recto aequales sunt [Eucl. I, 32]. et demonstraui etiam, esse

$$\angle AFZ = \angle ZBA;$$

itaque $\angle FZA + \angle ZBA$ uni recto aequales erunt. ergo

$AZΓ$ μιᾷ ὀρθῇ ἴσαι εἰσίν. ἐδείχθη δὲ καὶ ἡ ὑπὸ $ΑΓΖ$ ἴση τῇ ὑπὸ $ΑΖΒ$. αἱ ἄρα ὑπὸ $ΓΖΑ$, $ΑΖΒ$ μιᾷ ὀρθῇ ἴσαι εἰσίν. λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ $ΑΖΓ$ ὀρθή ἐστίν. ὁμοίως δὲ δειχθήσεται καὶ ἡ ὑπὸ $ΓΗΑ$ ὀρθή.


5

μς'.

Τῶν αὐτῶν ὄντων αἱ ἐπιξενυνόμεναι ἴσας ποιοῦσι γωνίας πρὸς ταῖς ἐφαπτομέναις.

τῶν γὰρ αὐτῶν ὑποκειμένων λέγω, ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ μὲν ὑπὸ $ΑΓΖ$ γωνία τῇ ὑπὸ $ΑΓΗ$, ἡ δὲ ὑπὸ $ΓΑΖ$ 10 τῇ ὑπὸ $ΒΑΗ$.

ἐπεὶ γὰρ ἐδείχθη ὀρθὴ ἑκατέρω τῶν ὑπὸ $ΓΖΑ$, $ΓΗΑ$, ὁ περὶ διάμετρον τὴν $ΓΑ$ γραφόμενος κύκλος ἤξει διὰ τῶν $Ζ$, $Η$ σημείων. ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ 15 ὑπὸ $ΑΓΗ$ τῇ ὑπὸ $ΑΖΗ$. ἐν γὰρ τῷ αὐτῷ τμήματι τοῦ κύκλου εἰσίν. ἡ δὲ ὑπὸ $ΑΖΗ$ ἐδείχθη ἴση τῇ ὑπὸ $ΑΓΖ$. ὥστε ἡ ὑπὸ $ΑΓΗ$ 20 ἴση τῇ ὑπὸ $ΑΓΖ$. ὁμοίως δὲ καὶ ἡ ὑπὸ $ΓΑΖ$ τῇ ὑπὸ $ΒΑΗ$.



μς'.

Τῶν αὐτῶν ὄντων ἡ ἀπὸ τῆς συμπτώσεως τῶν ἐπιξενυχθειςῶν ἐπὶ τὴν ἀφὴν ἀγομένη πρὸς ὀρθὰς ἔσται 25 τῇ ἐφαπτομένῃ.

ὑποκείμεθω γὰρ τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον, καὶ συμπίπτέτωσαν ἀλλήλαις αἱ μὲν $ΓΗ$, $ΖΑ$ κατὰ τὸ $Θ$, αἱ

4. $ΓΗΑ$] p, $ΓΑ''Η'$ v (lineolae a m. 2?), $ΓΑΗ$ vc. 9. $ΓΑΖ$] cp, $ΓΑΞ$ v. 19. $ΑΓΗ$] $ΑΓΖ$ v; corr. p.


reliquus angulus $\angle Z\Gamma$ rectus est [Eucl. I, 13]. iam eodem modo demonstrabimus, etiam $\angle \Gamma H\Delta$ rectum esse.

XLVI.

Iisdem positis rectae ductae ad contingentes angulos aequales efficiunt.

nam iisdem suppositis dico, esse $\angle A\Gamma Z = \angle \Gamma H\Delta$, $\angle \Gamma\Delta Z = \angle B\Delta H$.

quoniam enim demonstrauius, utrumque angulum $\Gamma Z\Delta$, $\Gamma H\Delta$ rectum esse [prop. XLV], circulus circum diametrum $\Gamma\Delta$ descriptus per puncta Z, H ueniet [Eucl. III, 31]; itaque $\angle \Delta\Gamma H = \angle Z\Delta H$ [Eucl. III, 21];



nam in eodem segmento circuli positi sunt. demonstrauius autem, esse $\angle \Delta ZH = \angle A\Gamma Z$ [prop. XLV]; quare etiam $\angle \Delta\Gamma H = \angle A\Gamma Z$. et eodem modo demonstrauius, esse etiam $\angle \Gamma\Delta Z = \angle B\Delta H$.

XLVII.

Iisdem positis recta a puncto concursus rectarum ductarum ad punctum contactus ducta ad contingentem perpendicularis erit.

supponantur enim eadem, quae antea, et $\Gamma H, Z\Delta$

δὲ $\Gamma\Delta$, BA ἐκβαλλόμεναι κατὰ τὸ K , καὶ ἐπεξεύχθω
ἡ $E\Theta$. λέγω, ὅτι κάθετός ἐστιν ἡ $E\Theta$ ἐπὶ τὴν $\Gamma\Delta$.

εἰ γὰρ μή, ἤχ-
θω ἀπὸ τοῦ Θ ἐπὶ

5 τὴν $\Gamma\Delta$ κάθετος

ἡ ΘA . ἐπεὶ οὖν

ἴση ἡ ὑπὸ $\Gamma\Delta Z$

τῇ ὑπὸ $H\Delta B$, ἔστι

δὲ καὶ ὀρθὴ ἡ

10 ὑπὸ ΔBH ὀρθῇ

τῇ ὑπὸ $\Delta A\Theta$ ἴση,

ὁμοιον ἔρα τὸ ΔHB τρι-

γωνον τῷ $\Delta\Theta A$. ὥς ἔρα

ἡ $H\Delta$ πρὸς $\Delta\Theta$, ἡ $B\Delta$

15 πρὸς ΔA . ἀλλ' ὥς ἡ $H\Delta$

πρὸς $\Delta\Theta$, ἡ $Z\Gamma$ πρὸς $\Gamma\Theta$

διὰ τὸ ὀρθὰς εἶναι τὰς

πρὸς τοὺς Z , H καὶ τὰς

πρὸς τῷ Θ ἴσας· ὥς δὲ ἡ

20 ΓZ πρὸς $\Gamma\Theta$, ἡ $A\Gamma$ πρὸς $\Gamma\Delta$ διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν

$AZ\Gamma$, $\Delta\Gamma\Theta$ τριγώνων· καὶ ὡς ἔρα ἡ $B\Delta$ πρὸς ΔA ,

ἡ $A\Gamma$ πρὸς $\Gamma\Delta$. ἐναλλάξ, ὥς ἡ ΔB πρὸς ΓA , ἡ ΔA

πρὸς $A\Gamma$. ἀλλ' ὥς ἡ ΔB πρὸς ΓA , ἡ BK πρὸς KA .



καὶ ὥς ἔρα ἡ ΔA πρὸς ΓA , ἡ BK πρὸς KA . ἤχθω

25 ἀπὸ τοῦ E παρὰ τὴν $A\Gamma$ ἡ EM · τεταγμένως ἔρα

ἔσται κατηγμένη ἐπὶ τὴν AB · καὶ ἔσται, ὥς ἡ BK

πρὸς KA , ἡ BM πρὸς MA . ὥς δὲ ἡ BM πρὸς MA ,

ἡ ΔE πρὸς $E\Gamma$ · καὶ ὥς ἔρα ἡ ΔA πρὸς $A\Gamma$, ἡ ΔE



7. ἴση ἔστιν ἡ cp. $\Gamma\Delta Z$] pvc, in V littera Z mire de-
formata. 10. ΔBH] $B\Delta''H'$ V (lineolae a m. 2); corr. p. 12.
τό] τὸ ὑπό V; corr. p.

πρὸς $EΓ$ ὅπερ ἄτοπον. οὐκ ἄρα ἡ $ΘΑ$ κάθετός ἐστιν, οὐδὲ ἄλλη τις πλὴν τῆς $ΘΕ$.

μη'.

Τῶν αὐτῶν ὄντων δεικνέον, ὅτι αἱ ἀπὸ τῆς ἀφῆς
5 ἐπὶ τὰ ἐκ τῆς παραβολῆς γινόμενα σημεία ἴσας ποιοῦσι
γωνίας πρὸς τῇ ἐφαπτομένῃ.

ὑποκείσθω γὰρ τὰ αὐτά, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ
 EZ , EH . λέγω, ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ $ΓΕΖ$ γωνία
τῇ ὑπὸ $ΗΕΔ$.

10 ἐπεὶ γὰρ ὁρθαὶ εἰσιν αἱ ὑπὸ $ΔΗΘ$, $ΔΕΘ$ γωνίαι,
ὁ περὶ διάμετρον τὴν $ΔΘ$ γραφόμενος κύκλος ἥξει
διὰ τῶν E , H σημείων· ὥστε ἴση ἔσται ἡ ὑπὸ $ΔΘΗ$
τῇ ὑπὸ $ΔΕΗ$ · ἐν γὰρ τῷ αὐτῷ τμήματι. ὁμοίως δὲ
καὶ ἡ ὑπὸ $ΓΕΖ$ τῇ ὑπὸ $ΓΘΖ$ ἐστὶν ἴση. ἡ δὲ ὑπὸ
15 $ΓΘΖ$ τῇ ὑπὸ $ΔΘΗ$ ἴση· κατὰ κορυφὴν γάρ· καὶ ἡ
ὑπὸ $ΓΕΖ$ ἄρα τῇ ὑπὸ $ΔΕΗ$ ἐστὶν ἴση.

μθ'.

Τῶν αὐτῶν ὄντων ἐὰν ἀπὸ τινος τῶν σημείων
κάθετος ἀχθῇ ἐπὶ τὴν ἐφαπτομένην, αἱ ἀπὸ τοῦ γενο-
20 μένου σημείου ἐπὶ τὰ πέρατα τοῦ ἄξονος ὁρθὴν ποιοῦσι
γωνίαν.

υποκείσθω γὰρ τὰ αὐτά, καὶ ἀπὸ τοῦ H ἐπὶ τὴν
 $ΓΔ$ κάθετος ἡχθῇ ἡ $ΗΘ$, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ $ΑΘ$, $ΒΘ$.
λέγω, ὅτι ἡ ὑπὸ $ΑΘΒ$ γωνία ὁρθή ἐστίν.

25 ἐπεὶ γὰρ ὁρθὴ ἡ ὑπὸ $ΔΒΗ$ καὶ ἡ ὑπὸ $ΔΘΗ$, ὁ
περὶ διάμετρον τὴν $ΔΗ$ γραφόμενος κύκλος ἥξει διὰ

4. αΓ] om. V; corr. p. 19. γενομένου] γινομένου Halley.
24. ΑΘΒ] ΑΒΘ V; corr. p.


que etiam $\angle A : \angle \Gamma = \angle E : \angle \Gamma$; quod absurdum est. ergo ΘA perpendicularis non est nec ulla alia praeter ΘE .

XLVIII.

Iisdem positis demonstrandum, rectas a puncto contactus ad puncta adplicatione orta ductas ad contingentem angulos aequales efficere.

supponantur enim eadem, ducanturque EZ , EH . dico, esse $\angle \Gamma EZ = \angle HEA$.

nam quoniam anguli $\angle H\Theta$, $\angle E\Theta$ recti sunt [prop. XLV, XLVII], circulus circum diametrum $\angle \Theta$



descriptus per puncta E , H ueniet [Eucl. III, 31]; quare $\angle \angle \Theta H = \angle E\Theta H$ [Eucl. III, 21]; nam in eodem segmento positi sunt. eadem de causa etiam

$$\angle \Gamma EZ = \angle \Gamma \Theta Z.$$


est autem $\angle \Gamma \Theta Z = \angle \Theta H$ [Eucl. I, 15]; nam ad uerticem positi sunt. ergo etiam $\angle \Gamma EZ = \angle E\Theta H$.

XLIX.

Iisdem positis si ab aliquo punctorum perpendicularis ad contingentem ducitur, rectae a puncto ita orto ad terminos axis ductae rectum angulum efficiunt.

supponantur enim eadem, et ab H ad ΓA perpendicularis ducatur $H\Theta$, ducanturque $A\Theta$, $B\Theta$. dico, angulum $\angle A\Theta B$ rectum esse.

τῶν Θ , B , καὶ ἴση ἔσται ἡ ὑπὸ $H\Theta B$ γωνία τῇ ὑπὸ $B\Lambda H$. ἡ δὲ ὑπὸ $AH\Gamma$ τῇ ὑπὸ $B\Lambda H$ ἐδείχθη ἴση.



καὶ ἡ ὑπὸ $B\Theta H$ ἄρα τῇ ὑπὸ $AH\Gamma$, τουτέστι τῇ ὑπὸ $A\Theta\Gamma$, ἔστιν ἴση. ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ $\Gamma\Theta H$ τῇ ὑπὸ $A\Theta B$.
 5 ὁρθὴ δὲ ἡ ὑπὸ $\Gamma\Theta H$. ὁρθὴ ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ $A\Theta B$.

ν'.

Τῶν αὐτῶν ὄντων ἐὰν ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς τομῆς προσπέσῃ τις τῇ ἐφαπτομένῃ παράλληλος τῇ διὰ τῆς ἀφῆς καὶ ἐνὸς τῶν σημείων ἡγμένην εὐθείᾳ, ἴση ἔσται
 10 τῇ ἡμισείᾳ τοῦ ἄξονος.

ἔστω γὰρ τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον καὶ κέντρον τὸ Θ , καὶ ἐπεξεύχθω ἡ EZ , καὶ αἱ $\Lambda\Gamma$, BA συμπιπτέτωσαν κατὰ τὸ K , καὶ διὰ τοῦ Θ παρὰ τὴν EZ ἴχθω ἡ ΘA . λέγω, ὅτι ἴση ἔστιν ἡ ΘA τῇ ΘB .

15 ἐπεξεύχθωσαν γὰρ αἱ EH , AA , AH , AB , καὶ διὰ τοῦ H παρὰ τὴν EZ ἴχθω ἡ HM . ἐπεὶ οὖν τὸ ὑπὸ AZB ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ AHB , ἴση ἄρα ἡ AZ τῇ HB . ἔστι δὲ καὶ ἡ $A\Theta$ τῇ ΘB ἴση· καὶ ἡ $Z\Theta$ ἄρα τῇ ΘH

3. $AH\Gamma$] $H\Gamma V$; corr. p.


nam quoniam $\angle ABH, \angle \Theta H$ recti sunt, circulus circum diametrum AH descriptus per Θ, B ueniet [Eucl. III, 31], et $\angle H\Theta B = B\angle H$ [Eucl. III, 21]. demonstrauius autem, esse $\angle AH\Gamma = B\angle H$ [prop. XLV]; quare etiam $\angle B\Theta H = AH\Gamma = A\Theta\Gamma$ [Eucl. III, 31, 21]. itaque etiam $\angle \Gamma\Theta H = A\Theta B$. uerum $\angle \Gamma\Theta H$ rectus est; ergo etiam $\angle A\Theta B$ rectus est.

L.

Iisdem positis si a centro sectionis ad contingentem recta ducitur parallela rectae per punctum contactus alterumque punctorum ductae, dimidio axi aequalis erit.

sint enim eadem, quae antea, et centrum sit Θ , ducaturque EZ , et $\angle \Gamma, BA$ in K concurrant, per Θ autem rectae EZ parallela ducatur ΘA . dico, esse $\Theta A = \Theta B$.

ducantur enim EH, AA, AH, AB , et per H rectae EZ parallela ducatur HM . quoniam igitur est $AZ \times ZB = AH \times HB$ [ex hypothesi; cfr. prop XLV],



erit $AZ = HB$. uerum etiam $A\Theta = \Theta B$; quare etiam $Z\Theta = \Theta H$. itaque etiam $EA = AM$ [Eucl. VI, 2].

ἴση. ὥστε καὶ ἡ EA τῇ AM ἴση. καὶ ἐπεὶ ἐδείχθη
 ἡ ὑπὸ GEZ γωνία τῇ ὑπὸ AEH ἴση, ἡ δὲ ὑπὸ GEZ
 ἴση ἐστὶ τῇ ὑπὸ EMH , ἴση ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ EMH
 τῇ ὑπὸ MEH . ἴση ἄρα καὶ ἡ EH τῇ HM . ἀλλὰ
 5 καὶ ἡ EA τῇ AM ἐδείχθη ἴση· ἀνάθετος ἄρα ἡ HA
 ἐπὶ τὴν EM . ὥστε διὰ τὸ προδειχθὲν ὀρθή ἐστὶν ἡ
 ὑπὸ AAB , καὶ ὁ περὶ διάμετρον τὴν AB γραφόμενος
 κύκλος ἥξει διὰ τοῦ A . καὶ ἐστὶν ἴση ἡ ΘA τῇ ΘB .
 10 ἴση ἐστὶ τῇ ΘB .

να'.

Ἐὰν ὑπερβολῆς ἢ τῶν ἀντικειμένων παρὰ τὸν ἄξονα
 ἴσον ἐφ' ἐκάτερα παραβληθῇ τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ
 εἰδούς ὑπερβάλλον εἶδει τετραγώνῳ, καὶ ἀπὸ τῶν γενο-
 15 μένων ἐκ τῆς παραβολῆς σημείων κλάσθωσιν εὐθεῖαι
 πρὸς ὁποτέρωνοῦν τῶν τομῶν, ἡ μείζων τῆς ἐλάσσονος
 ὑπερέχει τῷ ἄξονι.

ἔστω γὰρ ὑπερβολὴ ἢ ἀντικείμεναι, ὧν ἄξων ὁ AB ,
 κέντρον δὲ τὸ Γ , καὶ τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ εἰδούς ἴσον
 20 ἔστω ἐκάτερον τῶν ὑπὸ AAB , AEB , καὶ ἀπὸ τῶν E , A
 σημείων κεκλάσθωσαν πρὸς τὴν γραμμὴν αἱ EZ , ZA .
 λέγω, ὅτι ἡ EZ τῆς ZA ὑπερέχει τῇ AB .

ἥχθω διὰ τοῦ Z ἐφαπτομένη ἡ $ZK\Theta$, διὰ δὲ τοῦ Γ
 παρὰ τὴν ZA ἡ $H\Gamma\Theta$. ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ $K\Theta H$
 25 τῇ ὑπὸ KZA . ἐναλλάξ γάρ. ἡ δὲ ὑπὸ KZA ἴση τῇ
 ὑπὸ $HZ\Theta$. καὶ ἡ ὑπὸ $HZ\Theta$ ἄρα ἴση ἐστὶ τῇ ὑπὸ
 $H\Theta Z$. ἴση ἄρα ἡ HZ τῇ $H\Theta$. ἡ δὲ ZH τῇ HE
 ἴση, ἐπεὶ καὶ ἡ AE τῇ BA καὶ ἡ AG τῇ GB καὶ ἡ


3. EMH] (pr.) EHM V; corr. p. 23. $ZK\Theta$] $Z\Theta K$ V;
 corr. p. Γ] $\rho\epsilon\gamma$; corr. ex K m. 1 V. 27. $H\Theta$ — 28. καὶ
 (alt.)] bis V; corr. p.

et quoniam demonstraui[mus] [prop. XLVIII], esse $\angle \Gamma EZ = \angle EH$, et est [Eucl. I, 29] $\angle \Gamma EZ = \angle EMH$, erit etiam $\angle EMH = \angle MEH$. itaque etiam $EH = HM$ [Eucl. I, 6]. demonstraui[mus] autem, esse etiam $EA = AM$; itaque HA ad EM perpendicularis est [Eucl. I, 8]. quare propter id, quod antea demonstraui[mus] [prop. XLIX], $\angle AAB$ rectus est, et [Eucl. III, 31] circulus circum diametrum AB descriptus per A ueniet. et $\odot A = \odot B$; ergo etiam radius semicirculi $\odot A = \odot B$.

LI.

Si axi hyperbolae uel oppositarum ad utramque partem adplicatur spatium quartae parti figurae aequale figura quadrata excedens, et a punctis adplicatione ortis ad utramuis sectionum franguntur rectae, maior minorem excedit axe.

sit enim hyperbola uel oppositae, quarum axis sit AB , centrum autem Γ , quartaeque parti figurae aequalia sint



$AA \times AB$,

$AE \times EB$,

et a punctis E, Δ ad lineam frangantur $EZ, Z\Delta$. dico, esse

$EZ = Z\Delta + AB$.

nam per Z contingens ducatur $ZK\Theta$, per Γ autem rectae $Z\Delta$ parallela $H\Gamma\Theta$; itaque [Eucl. I, 29] $\angle K\Theta H = \angle KZ\Delta$; nam alterni sunt. uerum [prop. XLVIII] $\angle KZ\Delta = \angle HZ\Theta$; quare etiam $\angle HZ\Theta = \angle H\Theta Z$. ita-

$ΕΓ$ τῇ $ΓΔ$ · καὶ ἡ $ΗΘ$ ἄρα τῇ $ΕΗ$ ἐστὶν ἴση. ὥστε
 ἡ $ΖΕ$ τῆς $ΗΘ$ ἐστὶ διπλῇ. καὶ ἐπεὶ ἡ $ΓΘ$ ἴση δέ-
 δεικται τῇ $ΓΒ$, ἡ $ΕΖ$ ἄρα διπλῇ ἐστὶ συναμφοτέρου
 τῆς $ΗΓΒ$. ἀλλὰ τῆς μὲν $ΗΓ$ διπλῇ ἡ $ΖΔ$, τῆς δὲ
 5 $ΓΒ$ διπλῇ ἡ $ΑΒ$ · ἡ $ΕΖ$ ἄρα ἴση ἐστὶ συναμφοτέρω
 τῇ $ΖΔ$, $ΑΒ$. ὥστε ἡ $ΕΖ$ τῆς $ΖΔ$ ὑπερέχει τῇ $ΑΒ$.

νβ'.

Ἐὰν ἐν ἐλλείψει παρὰ τὸν μείζονα τῶν ἀξόνων τῷ
 τετάρτῳ μέρει τοῦ εἰδους ἴσον ἐφ' ἐκάτερα παραβληθῇ
 10 ἐλλείπον εἶδει τετραγώνῳ, καὶ ἀπὸ τῶν γενομένων ἐκ
 τῆς παραβολῆς σημείων κλασθῶσιν εὐθεῖαι πρὸς τὴν
 γραμμὴν, ἴσαι ἔσονται τῷ ἄξονι.

ἔστω ἐλλειψις, ἥς μείζων τῶν ἀξόνων ὁ $ΑΒ$, καὶ
 τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ εἰδους ἐκάτερον ἴσον ἔστω τῶν
 15 ὑπὸ $ΑΓΒ$, $ΑΔΒ$, καὶ ἀπὸ τῶν $Γ$, $Δ$ κεκλάσθωσαν
 πρὸς τὴν γραμμὴν αἱ $ΓΕΔ$. λέγω, ὅτι αἱ $ΓΕΔ$ ἴσαι
 εἶσι τῇ $ΑΒ$.

ἥχθω ἐφαπτομένη ἡ $ΖΕΘ$, καὶ κέντρον τὸ $Η$, καὶ
 δι' αὐτοῦ παρὰ τὴν $ΓΕ$ ἡ $ΗΚΘ$. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν
 20 ἡ ὑπὸ $ΓΕΖ$ τῇ ὑπὸ $ΘΕΚ$, ἡ δὲ ὑπὸ $ΖΕΓ$ τῇ ὑπὸ
 $ΕΘΚ$ ἴση, καὶ ἡ ὑπὸ $ΕΘΚ$ ἄρα τῇ ὑπὸ $ΘΕΚ$ ἐστὶν
 ἴση. ἴση ἄρα καὶ ἡ $ΘΚ$ τῇ $ΚΕ$. καὶ ἐπεὶ ἡ $ΑΗ$
 τῇ $ΗΒ$ ἴση καὶ ἡ $ΑΓ$ τῇ $ΔΒ$, καὶ ἡ $ΓΗ$ ἄρα τῇ $ΗΔ$
 ἴση· ὥστε καὶ ἡ $ΕΚ$ τῇ $ΚΔ$. καὶ διὰ τοῦτο διπλῇ
 25 ἐστὶν ἡ μὲν $ΕΔ$ τῆς $ΘΚ$, ἡ δὲ $ΕΓ$ τῆς $ΚΗ$, καὶ συν-
 αμφοτέρος ἡ $ΓΕΔ$ διπλῇ ἐστὶ τῆς $ΗΘ$. ἀλλὰ καὶ ἡ
 $ΑΒ$ διπλῇ τῆς $ΗΘ$ · ἴση ἄρα ἡ $ΑΒ$ ταῖς $ΓΕΔ$.

8. ἐν] om. V; corr. p. 10. λείπον V (initio paginae);
 corr. p. 18. $ΖΕΘ$] $ΕΖΘ$ V; corr. p. 19. $ΗΚΘ$] $ΗΘΚ$ V;
 corr. p.

νγ'.

Ἐὰν ἐν ὑπερβολῇ ἢ ἐλλείψει ἢ κύκλου περιφερείᾳ
ἢ ταῖς ἀντικειμέναις ἀπ' ἄκρας τῆς διαμέτρου ἀχθῶσιν
παρὰ τεταγμένως κατηγμένην, καὶ ἀπὸ τῶν αὐτῶν
5 περάτων πρὸς τὸ αὐτὸ σημεῖον τῆς γραμμῆς ἀχθεῖσθαι
εὐθδεῖναι τέμνωσι τὰς παραλλήλους, τὸ περιεχόμενον
ὑπὸ τῶν ἀποτεμνομένων ἴσον ἐστὶ τῷ πρὸς τῇ αὐτῇ
διαμέτρῳ εἶδει.

ἔστω μὴ τῶν εἰρημένων τομῶν ἡ $ABΓ$, ἥς διά-
10 μετρος ἡ $ΑΓ$, καὶ παρὰ τεταγμένως κατηγμένην ἡχθω-
σαν αἱ $ΑΔ$, $ΓΕ$, καὶ διήχθωσαν αἱ $ΑΒΕ$, $ΓΒΔ$.
λέγω, ὅτι τὸ ὑπὸ $ΑΔ$, $ΕΓ$ ἴσον ἐστὶ τῷ εἶδει τῷ πρὸς
τῇ $ΑΓ$.

ἡχθω γὰρ ἀπὸ τοῦ B παρὰ τεταγμένως κατηγμένην
15 ἡ BZ . ἔστιν ἄρα, ὥς τὸ ὑπὸ $AZΓ$ πρὸς τὸ ἀπὸ ZB ,
ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὀρθίαν καὶ πρὸς τὸ εἶδος τὸ ἀπὸ
τῆς $ΑΓ$ τετράγωνον. ὁ δὲ τοῦ ὑπὸ $AZΓ$ πρὸς τὸ
ἀπὸ BZ λόγος σύγκειται ἐκ τοῦ τῆς AZ πρὸς ZB
καὶ τοῦ τῆς $ΓZ$ πρὸς ZB . ὁ ἄρα τοῦ εἶδους πρὸς τὸ
20 ἀπὸ τῆς $ΑΓ$ τετράγωνον λόγος σύγκειται ἐκ τοῦ τῆς
 ZB πρὸς ZA καὶ τοῦ τῆς BZ πρὸς $ΓZ$. ἀλλ' ὥς
μὲν ἡ AZ πρὸς ZB , ἡ $ΑΓ$ πρὸς $ΓΕ$, ὥς δὲ ἡ $ΓZ$
πρὸς ZB , ἡ $ΓΑ$ πρὸς $ΑΔ$. ὁ ἄρα τοῦ εἶδους πρὸς
τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$ τετράγωνον λόγος σύγκειται ἐκ τοῦ
25 τῆς $ΓΕ$ πρὸς $ΓΑ$ καὶ τοῦ τῆς $ΑΔ$ πρὸς $ΓΑ$. σύγ-
κεται δὲ καὶ ὁ τοῦ ὑπὸ $ΑΔ$, $ΓΕ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΑΓ$
τετράγωνον ἐκ τῶν αὐτῶν. ὥς ἄρα τὸ εἶδος πρὸς τὸ


2. ἐν] e corr. p, om. Vc. 10. τεταγμένως κατηγμένην]
τεταγμένην V; corr. Halley. 11. διήχθωσαν] v, διή- corr.
ex η m. 1 V; ἡχθωσαν c. 12. $ΑΔ$] pcv, post A del. B m. 1 V.
21. ZA] BA V; corr. Comm.

et $\Gamma E + EA = 2H\Theta$. uerum etiam $AB = 2H\Theta$
[prop. L]. ergo $AB = \Gamma E + EA$.

LIII.

Si in hyperbola uel ellipsi uel circulo uel oppositis
a terminis diametri rectae ordinate ductae parallelae
rectae ducuntur, et ab iisdem terminis ad idem
punctum lineae ductae rectae parallelas secant, rectan-
gulum comprehensum partibus abscisis figurae eidem
diametro adplicatae aequale est.

sit una sectionum, quas diximus, $AB\Gamma$, cuius dia-
metrus sit $A\Gamma$, et rectae ordinate ductae parallelae



ducantur AA , ΓE ,
ducanturque ABE ,
 ΓBA . dico, esse

$$AA \times E\Gamma$$

figurae ad $A\Gamma$ ad-
plicatae aequale.

nam a B rectae
ordinate ductae par-
allela ducatur BZ .

itaque erit [I, 21], ut $AZ \times Z\Gamma : ZB^2$, ita latus
transuersum ad rectum et $A\Gamma^2$ ad figuram. uerum
 $AZ \times Z\Gamma : ZB^2 = (AZ : ZB) \times (\Gamma Z : ZB)$. itaque
ratio figurae ad $A\Gamma^2$ aequalis est

$$(ZB : ZA) \times (BZ : \Gamma Z).$$

est autem $AZ : ZB = A\Gamma : \Gamma E$, $\Gamma Z : ZB = \Gamma A : AA$
[Eucl. VI, 4]; itaque ratio figurae ad

$$A\Gamma^2 = (\Gamma E : \Gamma A) \times (AA : \Gamma A).$$

Praeter nostram figuram aliam habet V in oppositis, sed
imperfectam et litteris omissis; in nostra quoque litterae a
manu 2 esse uideri possunt.

ἀπὸ τῆς $ΑΓ$ τετράγωνον, οὕτως τὸ ὑπὸ $ΑΔ$, $ΓΕ$ πρὸς
τὸ ἀπὸ $ΑΓ$ τετράγωνον. ἔσον ἄρα τὸ ὑπὸ $ΑΔ$, $ΓΕ$
τῷ παρὰ τὴν $ΑΓ$ εἶδει.

νδ'.

5 Ἐὰν κώνου τομῆς ἢ κύκλου περιφερείας δύο εὐθεῖαι
ἐφαπτόμεναι συμπίπτωσι, διὰ δὲ τῶν ἀφῶν παράλληλοι
ἄχθῳσι ταῖς ἐφαπτομέναις, καὶ ἀπὸ τῶν ἀφῶν πρὸς
τὸ αὐτὸ σημεῖον τῆς γραμμῆς διαχθῳσιν εὐθεῖαι τέμ-
νουσαι τὰς παραλλήλους, τὸ περιεχόμενον ὀρθογώνιον
10 ὑπὸ τῶν ἀποτεμνομένων πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ἐπιξενυ-
γνυούσης τὰς ἀφὰς τετράγωνον λόγον ἔχει τὸν συγ-
κείμενον ἐκ τε τοῦ, ὃν ἔχει τῆς ἐπιξενυγνυούσης τὴν
σύμπτωσιν τῶν ἐφαπτομένων καὶ τὴν διχοτομίαν τῆς
τὰς ἀφὰς ἐπιξενυγνυούσης τὸ ἐντὸς τμήμα πρὸς τὸ
15 λοιπὸν δυνάμει, καὶ τοῦ, ὃν ἔχει τὸ ὑπὸ τῶν ἐφαπτο-
μένων περιεχόμενον ὀρθογώνιον πρὸς τὸ τέταρτον
μέρος τοῦ ἀπὸ τῆς τὰς ἀφὰς ἐπιξενυγνυούσης τετρα-
γώνου.

ἔστω κώνου τομὴ ἢ κύκλου περιφέρεια ἡ $ΑΒΓ$
20 καὶ ἐφαπτόμεναι αἱ $ΑΔ$, $ΓΔ$, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ $ΑΓ$
καὶ δίχα τετμήσθω κατὰ τὸ $Ε$, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ $ΑΒΕ$,
καὶ ἡχθῶ ἀπὸ μὲν τοῦ $Α$ παρὰ τὴν $ΓΔ$ ἡ $ΑΖ$, ἀπὸ
δὲ τοῦ $Γ$ παρὰ τὴν $ΑΔ$ ἡ $ΓΗ$, καὶ εἰλήφθω τι ση-
μεῖον ἐπὶ τῆς γραμμῆς τὸ $Θ$, καὶ ἐπιξενυχθεῖσαι αἱ
25 $ΑΘ$, $ΓΘ$ ἐκβεβλήσθωσαν ἐπὶ τὰ $Η$, $Ζ$. λέγω, ὅτι τὸ
ὑπὸ $ΑΖ$, $ΓΗ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΑΓ$ τὸν συγκείμενον ἔχει
λόγον ἐκ τοῦ, ὃν ἔχει τὸ ἀπὸ $ΕΒ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΒΔ$


26. $ΑΓ$] cnp, in V litt. $Α$ macula obscurata.

est autem etiam

$AA \times \Gamma E : A\Gamma^2 = (\Gamma E : \Gamma A) \times (AA : \Gamma A)$;
itaque ut figura ad $A\Gamma^2$, ita $AA \times \Gamma E : A\Gamma^2$. ergo
 $AA \times \Gamma E$ figurae ad $A\Gamma$ adplicatae aequale est
[Eucl. V, 9].

LIV.

Si duae rectae coni sectionem uel circuli ambitum
contingentes concurrunt, et per puncta contactus con-
tingentibus parallelae ducuntur, et a punctis con-
tactus ad idem punctum lineae ducuntur rectae par-
allelas secantes, rectangulum comprehensum partibus
abscisis ad quadratum rectae puncta contactus coniun-



gentis rationem
habet compositam
ex ea, quam habet
pars interior rec-
tae coniungentis
punctum concur-
sus contingentium
punctumque me-
dium rectae
puncta contactus
coniungentis ad
reliquam potentia,
et ea, quam habet
rectangulum con-

tingentibus comprehensum ad quartam partem qua-
drati rectae puncta contactus coniungentis.

sit coni sectio uel ambitus circuli $AB\Gamma$ contingen-

In Vv figurae adiectae sunt rectae octo et sex rectangula
uel amplius cum litteris.

καὶ τὸ ὑπὸ $ΑΔΓ$ πρὸς τὸ τέταρτον τοῦ ἀπὸ $ΑΓ$,
τουτέστι τὸ ὑπὸ $ΑΕΓ$.

ἤχθω γὰρ ἀπὸ μὲν τοῦ $Θ$ παρὰ τὴν $ΑΓ$ ἡ $ΚΘΟΞΑ$,
ἀπὸ δὲ τοῦ $Β$ ἡ $ΜΒΝ$. φανερόν δὴ, ὅτι ἐφάπτεται
5 ἡ $ΜΝ$. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ $ΑΕ$ τῇ $ΕΓ$, ἴση ἐστὶ
καὶ ἡ $ΜΒ$ τῇ $ΒΝ$ καὶ ἡ $ΚΟ$ τῇ $ΟΑ$ καὶ ἡ $ΘΟ$ τῇ $ΟΞ$
καὶ ἡ $ΚΘ$ τῇ $ΞΑ$. ἐπεὶ οὖν ἐφάπτονται αἱ $ΜΒ$, $ΜΑ$,
καὶ παρὰ τὴν $ΜΒ$ ἤκται ἡ $ΚΘΑ$, ἔστιν, ὥς τὸ ἀπὸ
 $ΑΜ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΜΒ$, τουτέστι τὸ ὑπὸ $ΜΒΝ$, τὸ
10 ἀπὸ $ΑΚ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΞΚΘ$, τουτέστι τὸ ὑπὸ $ΑΘΚ$
[καὶ ἐναλλάξ, ὥς τὸ ἀπὸ $ΑΜ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΑΚ$, το
ὑπὸ $ΝΒΜ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΑΘΚ$]. ὥς δὲ τὸ ὑπὸ $ΝΓ$, $ΜΑ$
πρὸς τὸ ἀπὸ $ΜΑ$, τὸ ὑπὸ $ΑΓ$, $ΚΑ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΚΑ$.
δι' ἴσων ἄρα, ὥς τὸ ὑπὸ $ΝΓ$, $ΜΑ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΝΒΜ$,
15 τὸ ὑπὸ $ΑΓ$, $ΚΑ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΑΘΚ$. τὸ δὲ ὑπὸ
 $ΑΓ$, $ΚΑ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΑΘΚ$ τὸν συγκείμενον ἔχει
λόγον ἐκ τοῦ τῆς $ΓΑ$ πρὸς $ΑΘ$, τουτέστι τῆς $ΖΑ$
πρὸς $ΑΓ$, καὶ τοῦ τῆς $ΑΚ$ πρὸς $ΚΘ$, τουτέστι τῆς $ΗΓ$
πρὸς $ΓΑ$, ὅς ἐστιν ὁ αὐτὸς τῷ, ὃν ἔχει τὸ ὑπὸ $ΗΓ$, $ΖΑ$
20 πρὸς τὸ ἀπὸ $ΓΑ$. ὥς ἄρα τὸ ὑπὸ $ΝΓ$, $ΜΑ$ πρὸς τὸ
ὑπὸ $ΝΒΜ$, τὸ ὑπὸ $ΗΓ$, $ΖΑ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΓΑ$. τὸ δὲ
ὑπὸ $ΓΝ$, $ΜΑ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΝΒΜ$ τοῦ ὑπὸ $ΝΑΜ$
μέσου λαμβανομένου τὸν συγκείμενον ἔχει λόγον ἐκ
τοῦ, ὃν ἔχει τὸ ὑπὸ $ΓΝ$, $ΑΜ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΝΑΜ$
25 καὶ τὸ ὑπὸ $ΝΑΜ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΝΒΜ$. τὸ ἄρα ὑπὸ
 $ΗΓ$, $ΖΑ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΓΑ$ τὸν συγκείμενον ἔχει λόγον
ἐκ τοῦ τοῦ ὑπὸ $ΓΝ$, $ΑΜ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΝΑΜ$ καὶ
τοῦ ὑπὸ $ΝΑΜ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΝΒΜ$. ἀλλ' ὥς μὲν τὸ
ὑπὸ $ΝΓ$, $ΑΜ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΝΑΜ$, τὸ ἀπὸ $ΕΒ$ πρὸς

3. $ΚΘΟΞΑ$] p, $ΘΚΑΞΟ$ V. 4. $ΜΒΝ$] p, $ΒΜΝ$ V. 11.
καί—12. $ΑΘΚ$] deleo cum Halleio. 27. τοῦ τοῦ] scripsi; τοῦ V.

tesque AA , ΓA , et ducatur $A\Gamma$ seceturque in E in duas partes aequales, et ducatur ABE , et ab A rectae ΓA parallela ducatur AZ , a Γ autem rectae AA parallela ΓH , sumaturque in linea punctum aliquod Θ , et ductae $A\Theta$, $\Gamma\Theta$ ad H , Z producantur. dico, esse $AZ \times \Gamma H : A\Gamma^2 = (EB^2 : BA^2) \times (AA \times A\Gamma : \frac{1}{4} A\Gamma^2)$
 $= (EB^2 : BA^2) \times (AA \times A\Gamma : AE \times E\Gamma)$.

ducatur enim a Θ rectae $A\Gamma$ parallela $K\Theta O \Xi A$, a B autem MBN ; manifestum igitur, MN contingere [I, 32]. iam quoniam $AE = E\Gamma$, erit etiam $MB = BN$, $KO = OA$ [Eucl. VI, 4; V, 16] et $\Theta O = O\Xi$ [II, 7; I, 46–47], $K\Theta = \Xi A$. quoniam igitur MB , MA contingunt, et rectae MB parallela ducta est $K\Theta A$, erit [prop. XVI] $AM^2 : MB^2 = AK^2 : \Xi K \times K\Theta$, hoc est $AM^2 : MB \times BN = AK^2 : A\Theta \times \Theta K$. est autem

$$N\Gamma \times MA : MA^2 = A\Gamma \times KA : KA^2$$

[Eucl. VI, 2; V, 18]; ex aequo igitur

$$N\Gamma \times MA : NB \times BM = A\Gamma \times KA : A\Theta \times \Theta K$$

[Eucl. V, 22]. est autem

$$\begin{aligned} A\Gamma \times KA : A\Theta \times \Theta K &= (\Gamma A : A\Theta) \times (AK : K\Theta) \\ &= (ZA : A\Gamma) \times (H\Gamma : \Gamma A) \text{ [Eucl. VI, 4]} \\ &= H\Gamma \times ZA : \Gamma A^2. \end{aligned}$$

itaque $N\Gamma \times MA : NB \times BM = H\Gamma \times ZA : \Gamma A^2$.
est autem

$$\begin{aligned} &\Gamma N \times MA : NB \times BM \\ &= (\Gamma N \times MA : NA \times AM) \times (NA \times AM : NB \times BM) \\ &\text{medio sumpto } NA \times AM. \text{ itaque} \\ &\quad H\Gamma \times ZA : \Gamma A^2 \\ &= (\Gamma N \times AM : NA \times AM) \times (NA \times AM : NB \times BM). \end{aligned}$$

τὸ ἀπὸ BA , ὥς δὲ τὸ ὑπὸ NAM πρὸς τοῦ NBM ,
 τὸ ὑπὸ $ΓΔΑ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΓΕΑ$. τὸ ἄρα ὑπὸ $HΓ$, AZ
 πρὸς τὸ ἀπὸ $ΑΓ$ τὸν συγκείμενον ἔχει λόγον ἐκ τοῦ
 τοῦ ἀπὸ BE πρὸς τὸ ἀπὸ BA καὶ τοῦ ὑπὸ $ΓΔΑ$
 5 πρὸς τὸ ὑπὸ $ΓΕΑ$.

νε'.

Ἐὰν τῶν ἀντικειμένων δύο εὐθεῖαι ἐφαπτόμεναι
 συμπίπτωσι, καὶ διὰ μὲν τῆς συμπτώσεως ἀχθῇ εὐθεῖα
 παρὰ τὴν τὰς ἀφὰς ἐπιξεννύουσαν, ἀπὸ δὲ τῶν ἀφῶν
 10 διαχθῶσι παράλληλοι ταῖς ἐφαπτομέναις, προσβληθῶσι
 δὲ ἀπὸ τῶν ἀφῶν πρὸς τὸ αὐτὸ σημεῖον τῆς ἐτέρας
 τομῆς τέμνουσαι τὰς παραλλήλους, τὸ περιεχόμενον
 ὑπὸ τῶν ἀποτεμνομένων πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς τὰς ἀφὰς
 ἐπιξεννύουσης τετραγώνου λόγον ἔξει, ὃν τοῦ
 15 τῶν ἐφαπτομένων περιεχόμενον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ἡγ-
 μένης διὰ τῆς συμπτώσεως παρὰ τὴν τὰς ἀφὰς ἐπι-
 ξεννύουσας ἕως τῆς τομῆς.

ἔστωσαν ἀντικείμεναι αἱ $ABΓ$, $ΔΕΖ$, ἐφαπτόμεναι
 δὲ αὐτῶν αἱ AH , $HΔ$, καὶ ἐπεξέχθω ἡ $ΑΔ$, καὶ ἀπο
 20 μὲν τοῦ H παρὰ τὴν $ΑΔ$ ἡχθῶ ἡ $ΓHE$, ἀπὸ δὲ τοῦ A
 παρὰ τὴν $ΔH$ ἡ AM , ἀπὸ δὲ τοῦ $Δ$ παρὰ τὴν AH
 ἡ $ΔM$, εἰλήφθω δὲ τι σημεῖον ἐπὶ τῆς $ΔZ$ τομῆς
 τὸ Z , καὶ ἐπεξέχθωσαν αἱ ANZ , $ZΔΘ$. λέγω, ὅτι
 ἐστίν, ὥς τὸ ἀπὸ $ΓH$ πρὸς τὸ ὑπὸ $AHΔ$, τὸ ἀπὸ $ΑΔ$
 25 πρὸς τὸ ὑπὸ $ΑΘ$, $NΔ$.

ἡχθῶ γὰρ διὰ τοῦ Z παρὰ τὴν $ΑΔ$ ἡ $ZAKB$.

ἐπεὶ οὖν δέδεικται, ὅτι ἐστίν, ὥς τὸ ἀπὸ EH
 πρὸς τὸ ἀπὸ $HΔ$, οὕτως τὸ ὑπὸ BAZ πρὸς τοῦ ἀπὸ

3. τοῦ τοῦ] τοῦ V; corr. Halley. 23. Ante λέγω spatium
 4—5 litt. hab. V.


uerum $N\Gamma \times AM : N\Delta \times \Delta M = EB^2 : B\Delta^2$ [u. Eutocius] et

$N\Delta \times \Delta M : NB \times BM = \Gamma\Delta \times \Delta A : \Gamma E \times EA$ [ibid.]; ergo

$$\begin{aligned} & H\Gamma \times AZ : A\Gamma^2 \\ &= (BE^2 : B\Delta^2) \times (\Gamma\Delta \times \Delta A : \Gamma E \times EA). \end{aligned}$$

LV.

Si duae rectae oppositas contingentes concurrunt, et per punctum concursus recta ducitur rectae puncta contactus coniungenti parallela, a punctis contactus autem rectae contingentibus parallelae ducuntur, et a punctis contactus ad idem punctum alterius sectionis



rectae adcidunt parallelas secantes, rectangulum comprehensum partibus abscisis ad quadratum rectae puncta contactus coniungentis rationem habebit, quam rectangulum comprehensum contingentibus ad quadra-

tum rectae per punctum concursus ductae rectae puncta contactus coniungenti parallelae usque ad sectionem.

sint oppositae $AB\Gamma$, ΔEZ easque contingentes AH , $H\Delta$, ducaturque $A\Delta$, et ab H rectae $A\Delta$ par-

$\Delta\Delta$, ἴση δὲ ἴ μὲν ΓH τῇ EH , ἣ δὲ BK τῇ ΔZ ,
 ὥς ἔρα τὸ ἀπὸ ΓH πρὸς τὸ ἀπὸ $\text{H}\Delta$, τὸ ὑπὸ $\text{KZ}\Delta$
 πρὸς τὸ ἀπὸ $\Delta\Delta$. ἔστι δὲ καί, ὥς τὸ ἀπὸ ΔH πρὸς
 τὸ ὑπὸ $\Delta\text{H}\Delta$, τὸ ἀπὸ $\Delta\Delta$ πρὸς τοῦ ὑπὸ $\Delta\Delta$, ΔK .
 5 δι' ἴσου ἔρα, ὥς τὸ ἀπὸ ΓH πρὸς τὸ ὑπὸ $\Delta\text{H}\Delta$, το
 ὑπὸ $\text{KZ}\Delta$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\Delta\Delta$, ΔK . ὁ δὲ τοῦ ὑπο
 $\text{KZ}\Delta$ πρὸς τοῦ ὑπὸ ΔK , $\Delta\Delta$ λόγος ὁ συγκείμενός
 ἐστὶν ἐκ τοῦ τῆς ZK πρὸς KA καὶ τοῦ τῆς $\text{Z}\Delta$ πρὸς
 $\Delta\Delta$. ἀλλ' ὥς μὲν ἡ ZK πρὸς KA , ἡ $\Delta\Delta$ πρὸς ΔN ,
 10 ὥς δὲ ἡ $\text{Z}\Delta$ πρὸς $\Delta\Delta$, ἡ $\Delta\Delta$ πρὸς $\Theta\Delta$. ὁ ἔρα τοῦ
 ἀπὸ ΓH πρὸς τὸ ὑπὸ $\Delta\text{H}\Delta$ λόγος σύγκειται ἐκ τοῦ
 τῆς $\Delta\Delta$ πρὸς ΔN καὶ τοῦ τῆς $\Delta\Delta$ πρὸς $\Delta\Theta$. σύγκει-
 ται δὲ καὶ ὁ τοῦ ἀπὸ $\Delta\Delta$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\Delta\Theta$, $\text{N}\Delta$
 λόγος ἐκ τῶν αὐτῶν. ἔστιν ἔρα, ὥς τὸ ἀπὸ ΓH πρὸς
 15 τὸ ὑπὸ $\Delta\text{H}\Delta$, τὸ ἀπὸ $\Delta\Delta$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\text{N}\Delta$, $\Delta\Theta$.
 [ἀνάπαλιν, ὥς τὸ ὑπὸ $\Delta\text{H}\Delta$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓH , τὸ
 ὑπὸ $\text{N}\Delta$, $\Delta\Theta$ πρὸς τὸ ἀπὸ $\Delta\Delta$].

νς'.

Ἐὰν μιᾶς τῶν ἀντικειμένων δύο εὐθεΐαι ἐφαπ-
 20 τόμεναι συμπίπτωσι, διὰ δὲ τῶν ἀφῶν παράλληλοι
 ἀχθῶσι ταῖς ἐφαπτομέναις, καὶ ἀπὸ τῶν ἀφῶν πρὸς
 το αὐτὸ σημεῖον τῆς ἐτέρας τομῆς ἀχθῶσιν εὐθεΐαι
 τέμνουσαι τὰς παραλλήλους, τὸ περιεχόμενον ὀρθο-
 γώνιον ὑπὸ τῶν ἀποτεμνομένων λόγον ἔξει πρὸς τὸ
 25 ἀπὸ τῆς τᾶς ἀφᾶς ἐπιξενυγνούσης τετραγώνου τὸν
 συγκείμενον ἐκ τε τοῦ, ὃν ἔχει τῆς ἐπιξενυγνούσης
 τὴν σύμπτωσιν καὶ τὴν διχοτομίαν ἢ μεταξὺ τῆς διχοτο-
 μίας καὶ τῆς ἐτέρας τομῆς πρὸς τὴν μεταξὺ τῆς αὐτῆς

16. ἀνάπαλιν — 17. $\Delta\Delta$] deleo. 24. λόγον ἔξει] bis V;
 corr. pc.

allela ducatur ΓHE , ab A autem rectae ΔH parallela AM , a Δ autem rectae AH parallela ΔM , et in sectione ΔZ sumatur punctum aliquod Z , ducanturque ANZ , $Z\Delta\Theta$. dico, esse

$$\Gamma H^2 : AH \times HA = A\Delta^2 : A\Theta \times N\Delta.$$

nam per Z rectae $A\Delta$ parallela ducatur $ZAKB$. quoniam igitur demonstratum est, esse

$$EH^2 : HA^2 = BA \times AZ : \Delta A^2 \text{ [prop. XX],}$$

et $\Gamma H = EH$, $BK = AZ$ [II, 38; Eucl. VI, 4], erit

$$\Gamma H^2 : HA^2 = KZ \times ZA : \Delta A^2. \text{ uerum etiam}$$

$$\Delta H^2 : \Delta H \times HA = \Delta A^2 : \Delta A \times AK \text{ [Eucl. VI, 2];}$$

ex aequo igitur [Eucl. V, 22]

$$\Gamma H^2 : \Delta H \times HA = KZ \times ZA : \Delta A \times AK.$$

uerum

$$KZ \times ZA : AK \times \Delta A = (ZK : KA) \times (ZA : \Delta A).$$

est autem $ZK : KA = \Delta A : \Delta N$,

$$ZA : \Delta A = \Delta A : \Theta A \text{ [Eucl. VI, 4];}$$

$$\text{itaque } \Gamma H^2 : \Delta H \times HA = (\Delta A : \Delta N) \times (\Delta A : A\Theta).$$

est autem

$$\Delta A^2 : A\Theta \times N\Delta = (\Delta A : \Delta N) \times (\Delta A : A\Theta).$$

$$\text{ergo } \Gamma H^2 : AH \times HA = A\Delta^2 : N\Delta \times A\Theta.$$

LVI.

Si duae rectae alteram oppositarum contingentes concurrunt, et per puncta contactus contingentibus parallelae ducuntur, a punctis contactus autem ad idem punctum alterius sectionis rectae ducuntur secantes parallelas, rectangulum comprehensum partibus abs-cisis ad quadratum rectae puncta contactus coniungentis rationem habebit compositam ex ea, quam habet rectae punctum concursus punctumque medium

τομῆς καὶ τῆς συμπτώσεως δυνάμει, καὶ τοῦ, ὃν ἔχει τὸ ὑπο τῶν ἐφαπτομένων περιεχόμενον πρὸς τὸ τέταρτον μέρος τοῦ ἀπὸ τῆς τὰς ἀφ' ἑαυτῶν ἐπιζευγνυούσης.

- ἔστωσαν ἀντικείμεναι αἱ $AB, \Gamma A$, ὧν κέντρον το O ,
 5 ἐφαπτόμεναι δὲ αἱ $A EZH, BE\Theta K$, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ AB καὶ διήχθω τετμήσθω κατὰ τὸ A , καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ AE διήχθω ἐπὶ τὸ A , καὶ ἡχθω ἀπὸ τοῦ A παρὰ τὴν BE ἡ AM , ἀπὸ δὲ τοῦ B παρὰ τὴν AE ἡ BN , εἰλήφθω δὲ τι σημεῖον ἐπὶ τῆς ΓA τομῆς τὸ Γ , καὶ
 10 ἐπεζεύχθωσαν αἱ $\Gamma BM, \Gamma AN$. λέγω, ὅτι τὸ ὑπὸ BN, AM πρὸς τὸ ἀπὸ AB λόγον ἔχει τὸν συγκείμενον ἐκ τοῦ τοῦ ἀπὸ AA πρὸς τὸ ἀπὸ AE καὶ τοῦ ὑπὸ AEB πρὸς τὸ τέταρτον τοῦ ἀπὸ AB , τουτέστι τὸ ὑπὸ $AA B$.
 15 ἡχθωσαν γὰρ ἀπὸ τῶν Γ, A παρὰ τὴν AB αἱ $H \Gamma K, \Theta A Z$. φανερόν δ' ἔστι, ὅτι [ἴση ἐστὶν ἡ AA τῇ AB] ἴση ἐστὶ καὶ ἡ ΘA τῇ $A Z$ καὶ ἡ $K \Xi$ τῇ ΞH . ἔστι δὲ καὶ ἡ $\Xi \Gamma$ τῇ $\Xi \Pi$. ὥστε καὶ ἡ ΓK τῇ $H \Pi$. καὶ ἐπεὶ ἀντικείμεναι εἰσιν αἱ $AB, A \Gamma$, ἐφαπτόμεναι
 20 δὲ αἱ $BE\Theta, \Theta A$, καὶ παρὰ τὴν $A \Theta$ ἡ KH , ἔστιν ἄρα, ὡς τὸ ἀπὸ $B\Theta$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘA , τὸ ἀπὸ BK πρὸς τὸ ὑπὸ $\Pi K \Gamma$. ἴσον δὲ τὸ μὲν ἀπὸ ΘA τῷ ὑπὸ $\Theta A Z$, τὸ δὲ ὑπὸ $\Pi K \Gamma$ τῷ ὑπὸ $K \Gamma H$. ἔστιν ἄρα, ὡς τὸ ἀπὸ $B\Theta$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\Theta A Z$, τὸ ἀπὸ BK πρὸς
 25 τὸ ὑπὸ $K \Gamma H$. ἔστι δὲ καὶ, ὡς τὸ ὑπὸ $ZA, \Theta B$ πρὸς

5. $A EZH$] p; $A EHZ$ V, H e corr. m. 1; $A ENZ$ cv. 12. ἐκ] om. V (extr. lin.); corr. p (ἐκ τε). τοῦ τοῦ] scripsi, τοῦ V.
 14. ὑπό] bis V (extr. et initio lineae); corr. cp. 16. $H \Gamma K$] Halley; $\Gamma H K$ V, $K \Gamma H$ p. $\Theta A Z$] p, $A \Theta Z$ V. ἴση — 17. AB] deleo. 17. ἴση ἐστὶ] om. p. ΘA] $A \delta$ V; corr. p; $A \delta$ c. ΞH] $Z H$ V; corr. p. 18. ΓK] p cv, K e corr. m. 1 V. 19. $A \Gamma$] $A E$ V; corr. p. 20. $BE\Theta$] BE V; corr. Halley. 22. πρὸς] bis V (extr. et init. lin.); corr. pc. 23. $K \Gamma H$] $\Gamma K H$ V; corr. p.

coniungentis pars inter punctum medium alteramque sectionem posita ad rectam inter eandem sectionem punctumque concursus positam potentia, eaque, quam

habet rectangulum contingentibus comprehensum ad quartam partem quadrati rectae puncta contactus coniungentis.


sint oppositae AB , ΓA , quarum centrum sit O , contingentes autem

$AEZH$, $BE\Theta K$, ducaturque AB et in A in duas partes aequales secetur, ducta autem AE ad A producat, et

ab A rectae BE parallela ducatur AM , a B autem rectae AE parallela BN , sumaturque in sectione ΓA punctum aliquod Γ , et ducantur ΓBM , ΓAN . dico, esse $BN \times AM : AB^2 = (AA^2 : AE^2) \times (AE \times EB : \frac{1}{4} AB^2)$
 $= (AA^2 : AE^2) \times (AE \times EB : AA \times AB)$.

ducantur enim a Γ , A rectae AB parallelae $H\Gamma K$, ΘAZ ; manifestum igitur, esse et $\Theta A = AZ$ et $K\Xi = \Xi H$ [Eucl. VI, 4]. uerum etiam $\Xi\Gamma = \Xi\Pi$ [I, 47]; itaque etiam $\Gamma K = H\Pi$. et quoniam oppositae sunt AB , $A\Gamma$, contingentes autem $BE\Theta$, ΘA , et KH rectae $A\Theta$ parallela, erit [prop. XVIII]

$$B\Theta^2 : \Theta A^2 = BK^2 : \Pi K \times K\Gamma.$$



τὸ ἀπὸ ΘB , τὸ ὑπὸ HA , KB πρὸς τὸ ἀπὸ KB . δι'
 ἴσου ἄρα ἐστίν, ὥς τὸ ὑπὸ AZ , ΘB πρὸς τὸ ὑπὸ
 ΘAZ , τὸ ὑπὸ KB , AH πρὸς τὸ ὑπὸ $K\Gamma H$. ὁ δὲ
 τοῦ ὑπὸ AZ , ΘB πρὸς τὸ ὑπὸ ΘAZ λόγος τοῦ ὑπὸ
 5 ΘEZ μέσου λαμβανομένου σύγκειται ἐκ τοῦ τοῦ ὑπὸ
 AZ , ΘB πρὸς τὸ ὑπὸ ΘEZ καὶ τοῦ ὑπὸ ΘEZ πρὸς
 τὸ ὑπὸ ΘAZ . καὶ ἐστίν, ὥς μὲν τὸ ὑπὸ AZ , ΘB
 πρὸς τὸ ὑπὸ ΘEZ , τὸ ἀπὸ AA πρὸς τὸ ἀπὸ AE ,
 ὥς δὲ τὸ ὑπὸ ΘEZ πρὸς τὸ ὑπὸ ΘAZ , τὸ ὑπὸ AEB
 10 πρὸς τὸ ὑπὸ $AA B$. ὁ ἄρα τοῦ ὑπὸ AH , BK πρὸς
 τὸ ὑπὸ $K\Gamma H$ λόγος σύγκειται ἐκ τοῦ τοῦ ἀπὸ AA
 πρὸς τὸ ἀπὸ AE καὶ τοῦ ὑπὸ AEB πρὸς τὸ ὑπὸ
 $AA B$. ἔχει δὲ τὸ ὑπὸ AH , KB πρὸς τὸ ὑπὸ $K\Gamma H$
 τὸν συγκείμενον λόγον ἐκ τοῦ τῆς BK πρὸς $K\Gamma$ καὶ
 15 τοῦ τῆς AH πρὸς $H\Gamma$. ἀλλ' ὥς μὲν ἡ KB πρὸς $K\Gamma$,
 ἡ MA πρὸς AB , ὥς δὲ ἡ AH πρὸς $H\Gamma$, ἡ BN
 πρὸς BA . ὁ ἄρα συγκείμενος λόγος ἐκ τοῦ τῆς MA
 πρὸς AB καὶ τοῦ τῆς NB πρὸς BA , ὅς ἐστιν ὁ αὐτὸς
 τῷ, ὃν ἔχει τὸ ὑπὸ AM , BN πρὸς τὸ ἀπὸ AB ,
 20 σύγκειται ἐκ τοῦ τοῦ ἀπὸ AA πρὸς τὸ ἀπὸ AE καὶ
 τοῦ ὑπὸ AEB πρὸς τὸ ὑπὸ $AA B$.

5. τοῦ τοῦ] τοῦ V; corr. Halley. 11. τοῦ τοῦ] τοῦ V;
 corr. Halley. 17. πρὸς BA] om. V; corr. p. 20. τοῦ τοῦ]
 τοῦ V; corr. Halley. In fine: Ἀπολλωνίου Περιγείου κωνικῶν
 τρίτον m. 2 V, τέλος τοῦ τρίτου τῶν κωνικῶν p.



est autem $\Theta A^2 = \Theta A \times AZ$,

$$HK \times K\Gamma = K\Gamma \times \Gamma H;$$

itaque $B\Theta^2 : \Theta A \times AZ = BK^2 : K\Gamma \times \Gamma H$.

uerum etiam $ZA \times \Theta B : \Theta B^2 = HA \times KB : KB^2$
[Eucl. VI, 2, 4; V, 12]; ex aequo igitur

$AZ \times \Theta B : \Theta A \times AZ = KB \times AH : K\Gamma \times \Gamma H$
[Eucl. V, 22]. est autem, medio sumpto $\Theta E \times EZ$,

$$AZ \times \Theta B : \Theta A \times AZ$$

$$= (AZ \times \Theta B : \Theta E \times EZ) \times (\Theta E \times EZ : \Theta A \times AZ).$$

et $AZ \times \Theta B : \Theta E \times EZ = AA^2 : AE^2$ [Eucl. VI, 4; V, 12, 16],

$\Theta E \times EZ : \Theta A \times AZ = AE \times EB : AA \times AB$
[u. Pappi lemma XIII]; itaque

$$AH \times BK : K\Gamma \times \Gamma H$$

$$= (AA^2 : AE^2) \times (AE \times EB : AA \times AB)^*.$$

est autem

$$AH \times KB : K\Gamma \times \Gamma H = (BK : K\Gamma) \times (AH : \Gamma H).$$

uerum $KB : K\Gamma = MA : AB$, $AH : \Gamma H = BN : BA$
[Eucl. VI, 4]. ergo

$$(MA : AB) \times (NB : BA)$$

$$= (AA^2 : AE^2) \times (AE \times EB : AA \times AB)$$

$$= AM \times BN : AB^2.$$



