

**PAPPI ALEXANDRINI
COLLECTIO.**

VOLUMEN II.

PAPPI ALEXANDRINI
COLLECTIONIS
QUAE SUPERSUNT

E LIBRIS MANU SCRIPTIS EDIDIT
LATINA INTERPRETATIONE ET COMMENTARIIS

INSTRUXIT

FRIDERICUS HULTSCH.



INSUNT LIBRORUM VI ET VII RELIQUAE.

BEROLINI
APUD WEIDMANNOS
MDCCCLXXVII.

PRAEFATIO.

In edenda hac Pappi Alexandrini collectione cum aliae difficultates multae ac permagnae obstabant, tum id sedulo elaborandum erat, ut concinna et recensendi et adnotandi et interpretandi ratio atque etiam aequabilitas quaedam dicendi generis formularumque per omnem operis complexum servaretur. Itaque ne minima quidem totius collectionis pars in publicum prodire potuit, antequam omnis verborum contextus recens, perpolitus, Latina interpretatione et commentariis instructus esset. Sed initio ne hoc quidem constabat, quo ordine pensum per complures annos continuandum absolverem. Nam cum seposito, ut par erat, secundi libri fragmento primum tertii libri initium pertractare coepissem, statim equidem cognovi nudam interpretationem non satis esse ad verba Graeci scriptoris illustranda, sed tamen, quanta commentariis amplitudo concedenda esset, non ita facile deliberanti mihi liquebat. Primum enim necessitate quadam mens et consilium interpretis eo deducebatur, ut quam latissimi commentarii pro tanta rerum a Pappo traditarum et gravitate et difficultate adderentur: at sic intolerabilem in modum horum voluminum ambitum augendum esse mox animadvertēbam, neque tamen medio in opere editoris principis esse videbam ea iam praestare quae, nisi finita editione et omnium prompto adspectu sub oculis posito, commode explicari non possent. Ergo brevitati quidem inprimis in-

serviendum, sed non minorem perspicuitatis curam habendam esse existimavi, quod propositum quo facilius exercere et confirmare possem, ad septimum potius Pappi librum me converti, cui illustrando Halleius, Simsonus, Chasles, viri doctrina et ingenio excellentissimi, atque alii nonnulli, pro sua quisque parte laudabiliter meriti, egregiam iam dudum operam impenderant. Quorum vestigiis insistentem eam interpretandi rationem, quae Graeco scriptori mathematico optime conveniret, aptius in dies me conformaturum esse sperabam. Sic igitur septimum librum primo quasi cursu unoque tenore absolvi; tum priores eiusdem partes, quas antea minus expertus composueram, saepius retractavi et, quantum in me erat, emendare studui.

Et quoniam de nostra interpretandi ratione iam in exordio primi voluminis (p. XXII sq.) satis, ut videtur, dictum est, nunc de interpolandi tantum negotio pauca addamus. Nam plurimi Pappi loci aptissime ac brevissime illustrari poterant ita, ut intermediae argumentationis particulae, quas ipse scriptor tamquam consentaneas omisisset, probabili coniectura restitutae insererentur Latinae interpretationi. Ergo idem saepius committere coacti sumus, quod totiens in Graeco verborum contextu a nonnullis interpolatoribus vetustioribus factum notavimus. Verum equidem in Latina versione et distinctis litterarum ductibus lacunas, ut ita dicam, demonstrationis explere conatus sum: Graeca nimirum verba antiquitus tradita, nisi forte oscitantia librariorum singulos locos corruptos esse appareret, intacta reliqui. At fingas, si placet, veterem virum mathematicum Graeco sermone Pappi theoremata ac problemata aliis sive audientibus sive lecturis explicantem, num ille tandem supersedere potuit, quin suas passim notas, interpretationes, coniecturas adderet? Quae supplementa cum primum marginibus Graecorum Pappi collectionis exemplorum adscripta essent, postea transcripta a librariis medium in contextum migraverunt. Haec igitur po-

stero editori, qui restituendae veteris scriptoris orationi intentus esset, accuratissime indaganda erant et notanda; in quibus multa sine dubio apparuerunt absurda, multa etiam temere composita; sed alia rursus satis probabilia ac minime inconcinna, quae quidem nos, prout cuiusque loci ratio ac natura ferebat, interpolata esse significavimus aut suspensiones certe quasdam adnotavimus, tamen eadem scholiorum instar aestimanda eaque de causa non plane neglegenda esse existimamus. Ne multa, nisi nimiam typorum, quibus libri exprimuntur, varietatem evitare voluissem, haec quae bonorum interpretum scholia esse dico, similiter atque olim in Heronis geometria, diversis litteris ab ipsa Pappi scriptura distinxissem.

Sed ut ad propositum redeam, confectis septimi libri commentariis ac tum interpretationis octavi libri lineamentis primis descriptis, ad initium collectionis redii et reliquos deinceps libros exegi. Ita cum denique ad sextum, qui est de rebus astronomicis, pervenissem, plures quam in omni reliquo opere repperi difficultates, plures haesitandi causas, plures nostrae de veterum mathematicis scientiae lacunas. Quid, quod in iis sexti libri partibus, quibus Pappus scripta quaedam his etiam temporibus servata percensuit ac nonnulla minus recte composita esse demonstravit, multa dubia fuerunt atque obscura? at vero deperditis aut nondum in publicum editis aliis libris, quorum censuram Pappus ibidem egit, cum eos quos ille reprehenderet locos nobis comparare non liceret, quid tandem paulo probabilius conici, quid certius constitui potuit? Sed compertum habebam Autolycei et Theodosii librorum nondum editorum, quos Pappus passim citat, praestantissimum codicem Romae in bibliotheca Vaticana latere; huius igitur apographum, antequam Pappi mei secundum volumen in lucem prodire concederem, illinc repetendum esse decrevi. Itaque anno 1876 in Italiam profectus trimestri spatio cum alia quaedam Pappi scripta adhuc ignota conquisivi, tum illos

quos dixi libros descripsi, emendavi, iterum cum Vaticano codice contuli. Sic in manibus meis sunt Autolycei liber *περὶ κινουμένης σφαίρας*, eiusdem *περὶ ἐπιτολῶν καὶ δόσεων* libri duo, Theodosii *περὶ οὐρανίων* liber unus, eiusdem *περὶ ἡμερῶν καὶ νυκτῶν* duo, suis figuris ac notis geometricis instructi (non perturbatis, ut apud Anriam) et satis, ut opinor, emendati, quorum cunctorum ambitus est versuum quattuor milium trecentorum viginti.

Publici autem iuris eos quos dixi libros fieri et propter ipsorum auctoritatem opus est idemque Pappi etiam causa optandum, cuius oratio nonnullis locis qui sunt de sphaerae conversione ac de ortu et occasu siderum, nisi disertis verbis citabuntur illi vetustiores testes, indigna usque obscuritate laborabit. Sed antequam haec quoque editio lucem adspiciet, excutiendi sunt codices manu scripti, qui in aliis bibliothecis servantur, et, num forte alii vel vetustiores vel praestantiores Vaticano exstent, inquirendum. Atque interim de omnibus rebus quae ad illam futuram editionem pertinent, iudicium retinendum esse duco, nisi quod codicem Hamburgensem, cuius notitiam nuper patefecit Ricardus Hoche*), multo emendatiorem esse commemoro et Monacensi libro et illo, qui olim Sambuci medici fuit, sed eundem tamen a Vaticani integritate aliquanto distare.

Scribebam Dresdae d. XX m. Aprilis a. MDCCCLXXVII.

*) *Αὐτολύκου περὶ κινουμένης σφαίρας καὶ περὶ ἐπιτολῶν καὶ δόσεων*. Recensuit Ricardus Hoche. *Programm der Gelehrtschule des Johanneums zu Hamburg*, 1877. Quo libello editor Autolycei definitiones et propositiones a Dasypodio editas recognovit ac passim emendavit. Theodosii librorum *περὶ οὐρανίων* et *περὶ ἡμερῶν καὶ νυκτῶν* propositiones ex codicis Sambuciani, quo Dasypodius olim usus est, apographo repetivit Franciscus Eyssenhardt in *Fleckeisens annal. philof.* a. 1868 p. 243—248.

ΠΑΠΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗ.

PAPPI ALEXANDRINI
COLLECTIONIS RELIQUIAE.

ΠΑΠΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ 5.

Περιέχει δὲ ἀποριῶν λύσεις τῶν ἐν τῷ μικρῷ ἀστρονομουμένῳ.

- 1 Πολλοὶ τῶν τὸν ἀστρονομούμενον τόπον διδασκόντων ἀμελέστερον τῶν προτάσεων ἀκούοντες τὰ μὲν προστιθέασιν ὡς ἀναγκαῖα, τὰ δὲ παραλείπουσιν ὡς οὐκ ἀναγκαῖα. λέγουσιν γὰρ ἐπὶ τοῦ ἔκτου θεωρήματος τοῦ τρίτου τῶν Θεοδοσίου σφαιρικῶν, ὅτι δεῖ τῶν δύο μεγίστων κύκλων ἐκότερον ὑπὸ τοῦ διὰ τῶν πόλων τῆς σφαίρας τέμνεσθαι πρὸς ὀρθάς· τοῦτο δὲ οὐ πάντως. ὁμοίως δὲ παραλείπουσιν ἐν τῷ β' θεωρήματι τῶν φαινομένων Εὐκλείδου, ποσάκις ὁ ἰσχυρισμὸς [δὲ] ἔσται ὀρθὸς πρὸς τὸν ὀρίζοντα. καὶ τῷ δ' θεωρήματι τοῦ περὶ ἡμερῶν καὶ νυκτῶν ψευδογραφοῦσι τὸν Θεοδοσίον, καὶ ἄλλα δὲ τινα τῶν ἑξῆς ὡς οὐκ ἀναγκαῖα παραλείπουσιν, ὧν ἕκαστον ἐπιδείξομεν ἡμεῖς.
- 2 α'. Ἐὰν ἐπὶ σφαιρικῆς ἐπιφανείας τρεῖς περιφέρειαι μεγίστων κύκλων τέμνωσιν ἀλλήλας, ὧν ἑκάστη ἐλάττω ἐστὶν ἡμικυκλίου, δύο τῆς λοιπῆς μεζιζονές εἰσιν πάντῃ μεταλαμβάνόμεναι.

1. 2. ἔ et in marg. π' εχει τὸ ἔ τ' παππου ἀπορῇ λύσεις τ' ἐν τῷ μικρῷ ἀστρονομουμένῳ A³. πάππου τοῦ ἀλεξανδρείως συναγωγῆς ἔκτου· περιέχει δὲ τῶν ἐν τῷ μικρῷ ἀστρονομουμένῳ θεωρημάτων ἀπόρων λύσεις B, ΠΑΠΠΟΥ ἀλεξανδρείως συναγωγῶν μαθηματικῶν τὸ ἔκτου. περιέχει δὲ ἀποριῶν λύσεις τῶν ἐν τῷ μικρῷ ἀστρονομουμένῳ S
6. ἔκτου ABS, secundo Co (false: vide infra cap. 43. 23 sq.) 8. πο-λ' ων A² ex πολλῶν 10. ἦ A. β' B. δευτέρῳ S 11. ἰσχυρισμὸς ABS, corr. Hu δις del. Hu coll. cap. 104 12. A. τετάρτῳ B, om. S 13. τῷ περὶ BS 13. ὡς add. Hu 15. α A¹ in marg. B, ἑκάστημα πρῶτον S

Pappi Alexandrini collectionis liber VI.

*Continet theorematum difficultum, quae sunt in minore collectione
astronomicorum¹⁾, solutiones.*

Multū qui astronomiae disciplinam profitentur, cum ipsi neglegentius propositiones perceperint, alia tamquam necessaria addunt, alia contra, quasi non sint necessaria, omittunt. Nam ad sextum theorema tertiū Theodosii sphaericorum libri adnotant utrumque duorum maximorum circularum ab eo qui per polos sphaerae transit oportere ad rectos angulos secari; at hoc non semper ita se habet²⁾. Similiter in secundo Euclidis phaenomenon theoremate omittunt, quotiens zodiacus ad horizontem rectus sit³⁾. Et in quarto theoremate Theodosii primi libri de diebus et noctibus⁴⁾ rationem scriptoris falso interpretantur, atque etiam deinceps alia nonnulla tamquam supervacanea praetermittunt, quae nos singillatim demonstrabimus.

IN THEODOSII SPHAERICA.

I. Si in sphaerica superficie tres maximorum circularum Prop. circumferentiae se secant, quarum unaquaeque semicirculo minor sit, binae maiores sunt reliqua, quomodocunque sumptae.


1) "Praeter magnam syntaxin Claudii Ptolemaei — quam *μίσηρ ἀστρονόμος* appellabant, Alexandrinis in pretio fuit alter codex dictus *μικρὸς ἀστρονόμος* sive, ut e Pappo Vossius (lib. de scientiis math. XXXIII § 18 p. 168) observat, *μικρὸς ἀστρονομικὸς*, in qua collectione continebantur hi libri: Theodosii Tripolitae sphaericorum libri III, Euclidis data, optica, catoptrica ac phaenomena, Theodosii Tripolitae de habitationibus et noctibus ac diebus libri II, Autolyei Pitanaei de sphaera mole, et libri II de ortu atque occasu stellarum inerrantium, Aristarchi Samii de magnitudinibus ac distantis solis ac lunae, Hypsiclis Alexandrini *ἀναγογικὸς* sive de ascensionibus, Menelai sphaericorum libri III" Fabricius in Biblioth. Gr. vol. II p. 88 (sive ed. Harles. vol. IV p. 16).

2) Vide huius VI libri cap. 43—32.

3) Ibidem cap. 40—129.

4) Ibidem cap. 48—68.

Τεμνέτωσαν γὰρ ἀλλήλας μεγίστων κύκλων περιφέρειαι κατὰ τὰ $ΑΒΓ$ σημεῖα· λέγω ὅτι αἱ δύο τῆς λοιπῆς μείζονες εἰσιν πάντῃ μεταλαμβάνόμεναι.



Εἰλήφθω γὰρ τὸ κέντρον 5 τῆς σφαίρας, τὸ δ' αὐτὸ καὶ τῶν $ΑΒ ΒΓ ΓΑ$ περιφερειῶν, καὶ ἔστω τὸ $Δ$, καὶ ἐπεξέχθωσαν αἱ $ΔΑ ΔΒ ΔΓ$. ἔπει οὖν στερεὰ γωνία ἢ πρὸς τῇ $Δ$ 10

ἐπὶ $γ'$ γωνιῶν ἐκτείνων τῶν ἐπὶ $ΔΑΒ ΒΔΓ ΓΔΑ$ περιέχεται, δύο τῆς λοιπῆς μείζονες εἰσιν πάντῃ μεταλαμβανόμεναι. καὶ βεβήκασιν αἱ ἐπὶ $ΔΑΒ ΒΔΓ ΓΔΑ$ γωνίαι ἐπὶ τῶν $ΑΒ ΒΓ ΓΑ$ περιφερειῶν· αἱ δύο ἄρα τῆς λοιπῆς μείζονες εἰσιν πάντῃ μεταλαμβανόμεναι. 15

Καλεῖ δὲ τὸ τοιοῦτο σχῆμα Μενέλαος ἐν τοῖς σφαιρικοῖς τρίπλευρον.

- 3 β'. Ἐὰν τριπλεύρου ἐπὶ μιᾷ πλευρᾷ δύο κύκλων μεγίστων περιφέρειαι συσταθῶσιν ἐντός, αἱ συσταθεῖσαι τῶν λοιπῶν τοῦ τριπλείρου δύο πλευρῶν ἐλάττωτες ἔσονται. 20

Τριπλείρου γὰρ τοῦ $ΑΒΓ$ ἐπὶ μιᾷ πλευρᾷ τῆς $ΒΓ$ δύο μεγίστων κύκλων περιφέρειαι συνεστατάωσαν ἐντός αἱ $ΒΔΓ$ · λέγω ὅτι αἱ $ΒΔΓ$ τῶν $ΒΔΓ$ ἐλάττωτες εἰσιν.

Ἐπεὶ παρὸς τριπλεύρου αἱ δύο πλευραὶ τῆς λοιπῆς μείζονες εἰσιν, αἱ ἄρα $ΓΕ ΕΔ$ τῆς $ΓΔ$ μείζονες εἰσιν. κοινὴ 25 προσκείσθω ἡ $ΑΒ$ · αἱ ἄρα $ΓΕΒ$ τῶν $ΓΔΒ$ μείζονες εἰσιν. πάλιν ἐπεὶ παρὸς τριπλείρου αἱ δύο πλευραὶ τῆς λοιπῆς μείζονες εἰσιν, αἱ ἄρα $ΒΑΕ$ τῆς $ΕΒ$ μείζονες εἰσιν. κοινὴ προσκείσθω ἡ $ΕΓ$ · αἱ ἄρα $ΒΑΓ$ τῶν $ΒΕΓ$ μείζονες εἰσιν. ἀλλ' αἱ $ΒΕΓ$ τῶν $ΒΔΓ$ μείζονες εἰσιν· πολλῷ ἄρα αἱ $ΒΑΓ$ 30 τῶν $ΒΔΓ$ μείζονες εἰσιν.


1. Τεμνέτωσαν — 4. μεταλαμβανόμεναι om. S 48. $Β Α'$ in marg. (BS) 21. παντός τριγώνου αἱ S 23. ἄρα add. Hu

Maximorum enim circulorum circumferentiae se secant in punctis $\alpha \beta \gamma$; dico binas reliquas maiores esse quomodocunque sumptas.

Sumatur enim sphaerae centrum, quod item circumferentiarum $\alpha\beta \beta\gamma \gamma\alpha$ centrum est, sitque δ , et iungantur rectae $\delta\alpha \delta\beta \delta\gamma$. Iam quia solidus angulus, qui est ad δ , tribus planis angulis $\alpha\delta\beta \beta\delta\gamma \gamma\delta\alpha$ continetur, bini reliquo maiores sunt quomodocunque sumpti (*elem. 11. 20*). Et anguli $\alpha\delta\beta \beta\delta\gamma \gamma\delta\alpha$ circumferentiis $\alpha\beta \beta\gamma \gamma\alpha$ insistent; ergo propter *elem. 6, 33* binas circumferentiae maiores sunt reliqua, quomodocunque sumptae.

Eiusmodi figuram Menelaus in sphaericis trilaterum appellat¹.

II. Si in uno latere trianguli sphaerici duae maximorum Prop. circulorum circumferentiae intra constituentur, hac reliquis duobus trianguli lateribus minores erunt.



Trianguli enim sphaerici $\alpha\beta\gamma$ in uno latere $\beta\gamma$ duae maximorum circulorum circumferentiae intra constituentur $\beta\delta \delta\gamma$; dico esse circumferentias

$$\beta\delta + \delta\gamma < \beta\alpha + \alpha\gamma.$$

Quoniam omnis trianguli sphaerici bina latera reliquo maiora sunt (*propos. I*), sunt igitur $\gamma\epsilon + \epsilon\delta > \gamma\delta$. Communis apponatur $\delta\beta$; ergo

$$\gamma\epsilon + \epsilon\beta > \gamma\delta + \delta\beta.$$

Rursus quia omnis trianguli sphaerici bina latera reliquo maiora sunt, sunt igitur $\beta\alpha + \alpha\epsilon > \epsilon\beta$. Communis apponatur $\epsilon\gamma$; ergo


$$\beta\alpha + \alpha\gamma > \gamma\epsilon + \epsilon\beta. \text{ Sed demonstratur sunt}$$

$$\gamma\epsilon + \epsilon\beta > \gamma\delta + \delta\beta: \text{ multo igitur sunt}$$

$$\beta\alpha + \alpha\gamma > \beta\delta + \delta\gamma.$$

¹ "Nos multorum exemplo triangulum sphaericum dicemus" Co. Eadem appellatio legitur in Menelai sphaericis ex Hebraico et Arabico sermone conversis ab Edm. Halleio, Oxonii 1758.

- 4 γ'. Τριῶν κύκλων μεγίστων περιφέρειαι αἱ AB $ΑΓ$ $ΑΔ$ μεγίστου κύκλου περιφέρειαν τὴν $ΒΔ$ τεμνέτωσαν, καὶ ἔστω ἐκάστη μὲν τῶν AB $ΑΓ$ $ΑΔ$ ἐλάσσων τεταρτημορίον, ἴση δὲ ἡ $ΒΓ$ τῇ $ΓΔ$. δεῖξαι ὅτι συναμφοτέρος ἡ $ΒΑΔ$ τῆς $ΑΓ$ μείζων ἐστὶν ἢ διπλῇ.



Κεῖσθω τῇ $ΑΓ$ ἴση ἡ $ΓΕ$. ἔπει ἐλάσσων τεταρτημορίον ἡ $ΑΓ$, ἐλάσσων ἄρα τεταρτημορίον καὶ ἡ $ΓΕ$. ἐλάσσων ἄρα ἡμικυκλίον ἡ $ΑΕ$. οὐκ ἄρα ὁ $ΑΔ$ κύκλος προσαναπληροῦ-10 μενος ἦξει διὰ τοῦ $Ε$. γεγράφθω οὖν διὰ τῶν $Ε Δ$ μέγιστος κύκλος ὁ $ΕΔΖ$, καὶ ἔπει ἴση ἐστὶν ἡ μὲν $ΑΓ$ τῇ $ΓΒ$, ἡ δὲ $ΑΓ$ τῇ $ΓΕ$, ἴση, ἄρα ἐστὶν ἡ ἀπὸ τοῦ $Α$ ἐπὶ τὸ $Ε$ τῇ ἀπὸ 15 τοῦ $Α$ ἐπὶ τὸ $Β$. ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ $ΒΑ$ περιφέρεια τῇ $ΑΕ$ περιφερείᾳ. ἔπει δὲ παντὸς τριπλείρου αἱ δύο τῆς λοιπῆς μείζονές εἰσιν, ἴση δὲ ἡ μὲν $ΑΕ$

τῇ $ΑΒ$, ἡ δὲ $ΕΓ$ τῇ $ΓΑ$, συναμφοτέρος ἄρα ἡ $ΒΑΔ$ τῆς $ΑΓ$ 20 μείζων ἐστὶν ἢ διπλῇ.

- 5 δ'. Τεσσάρων κύκλων μεγίστων περιφέρειαι αἱ AB $ΑΓ$ $ΑΔ$ $ΑΕ$ μεγίστου κύκλου περιφέρειαν τὴν $ΒΕ$ τεμνέτωσαν, καὶ ἔστω ἡ μὲν $ΒΓ$ ἴση τῇ $ΔΕ$, ἐκάστη δὲ τῶν AB $ΑΓ$ $ΑΔ$ $ΑΕ$ ἐλάσσων τεταρτημορίον. δεῖξαι ὅτι συναμφοτέρος 25 ἡ $ΒΔΕ$ συναμφοτέρου τῆς $ΓΑΔ$ ἐστὶ μείζων.

Τετμήσθω ἡ $ΓΑ$ δίχα τῇ $Ζ$, καὶ γεγράφθω διὰ τῶν $Α Ζ$ μέγιστος κύκλος ὁ $ΑΖΗ$, καὶ κεῖσθω τῇ $ΑΖ$ ἴση ἡ $ΖΗ$, καὶ γεγράφθω διὰ μὲν τῶν $Η Ε$ μέγιστος κύκλος ὁ $ΗΕΚ$, διὰ δὲ τῶν $Η Δ$ μέγιστος κύκλος ὁ $ΗΔΘ$. καὶ ἔπει 30 ἴση ἐστὶν ἡ μὲν $ΗΖ$ τῇ $ΖΑ$, ἡ δὲ $ΑΖ$ τῇ $ΖΓ$, ἴση, ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ $ΑΗ$ τῇ $ΓΑ$. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ἡ $ΕΗ$ τῇ

1. Γ^{ον} add. B.S

coniunx. BS

12. τῶν $ΕΔΑ$. distinx. BS

in marg. BS

3. τετάρτη μορίον $Α'$ ex τετάρται μορίον.

7. τετάρτη μορίον $Α$, coniunx. BS. item vs. 8 et 25

30. τῆς $ΑΓ$ Hu. τῇ $ΑΓ$ A¹ BS

22. $ΓΑ$ A¹

27—30. τῶν $ΑΖ$ — τῶν $ΗΕ$ — τῶν $ΗΔΑ$, distinx. BS

III. Trium circulorum maximorum circumferentiae $\alpha\beta$ $\alpha\gamma$ $\alpha\delta$ ^{Prop. 3} secant maximi circuli circumferentiam $\beta\delta$, et sint singulae $\alpha\beta$ $\alpha\gamma$ $\alpha\delta$ minores quadrante, $\beta\gamma$ autem aequalis ipsi $\gamma\delta$; demonstretur esse $\beta\alpha + \alpha\delta > 2\alpha\gamma$.

Ponatur $\gamma\epsilon = \alpha\gamma$. Iam quia $\alpha\gamma$ minor est quadrante, minor igitur quadrante etiam $\gamma\epsilon$ est; ergo $\alpha\epsilon$ minor semicirculo; itaque circulus $\alpha\delta$ completus non transibit per ϵ *). Iam per puncta ϵ δ maximus circulus $\epsilon\delta\zeta$ describatur (*sphaeric. 1, 20*), et quia ex *hypothesi* est $\delta\gamma = \gamma\beta$, et ex *constructione* $\alpha\gamma = \gamma\epsilon$, recta igitur a δ ad ϵ aequalis est rectae ab α ad β (*sphaeric. 3, 3*); ergo circumferentiae $\beta\alpha$ $\delta\epsilon$ aequales sunt (*elem. 3, 28*). Iam quia omnis trianguli sphaerici bina latera reliquo maiora sunt (*propos. 1*), sunt igitur

$\alpha\delta + \delta\epsilon > \alpha\epsilon$, id est $> \alpha\gamma + \gamma\epsilon$. Et quia est

$\delta\epsilon = \alpha\beta$, et $\alpha\gamma = \gamma\epsilon$, est igitur


$\beta\alpha + \alpha\delta > 2\alpha\gamma$.

IV. Quattuor circulorum maximorum circumferentiae $\alpha\beta$ $\alpha\gamma$ $\alpha\delta$ $\alpha\epsilon$ ^{Prop. 4}

secant maximi circuli circumferentiam $\beta\epsilon$, et sit $\beta\gamma = \delta\epsilon$, et singulae $\alpha\beta$ $\alpha\gamma$ $\alpha\delta$ $\alpha\epsilon$ minores quadrante; demonstretur esse

$\beta\alpha + \alpha\epsilon > \gamma\alpha + \alpha\delta$.


Circumferentia $\gamma\delta$ bifariam secetur in ζ , et per α ζ maximus circulus $\alpha\zeta\eta$ describatur, ac ponatur $\zeta\eta = \alpha\zeta$, et per η ϵ ducatur maximus circulus $\eta\epsilon\kappa$, et per η δ maximus circulus $\eta\delta\vartheta$. Iam quia est $\alpha\zeta = \zeta\eta$, et $\delta\zeta = \zeta\gamma$, propter ea quae superiore *lemmate* demonstravimus est etiam $\delta\eta = \gamma\alpha$. Eadem ratione etiam demonstratur $\epsilon\eta = \beta\alpha$. Iam quia in trian-



*; Maximos enim circulos in sphaera sese bifariam secare demonstrat Theodosius *sphaeric. 4, 11* (*C6*), qui liber hinc usque omisso auctoris nomine citabitur.

BA ἐστὶν ἴση. ἐπεὶ δὲ τριπλείρου τοῦ HEA ἐπὶ μιᾶς τῶν πλευρῶν τῆς HA δύο συνεστᾶσιν ἐντὸς αἱ AJ JH , αἱ ADH ἄρα τῶν ABH ἐλάσσονές εἰσιν, ὥστε αἱ AEH ὦντ ADH μείζονές εἰσιν. ἴση δὲ ἡ μὲν EH τῇ AB , ἡ δὲ HJ τῇ AG · συναμφοτέρος ἄρα ἡ BAE συναμφοτέρου τῆς $ΓΑΔ$ μείζων ἐστίν, ὅπερ: ~

- 6 ε'. Τούτων προδεδειγμένων ἔστω τὸ ε' θεώρημα τοῦ γ' τῶν Θεοδοσίου σφαιρικῶν ἄλλως δεῖξαι.



Ἐπὶ γὰρ μεγίστου κύκλου περιφερείας τοῦ $ABΓ$ ὁ πόλος ἔστω τῶν παραλλήλων ὁ A , καὶ τοῦτον τεμνέτωσαν δύο μέγιστοι κύκλοι πρὸς ὀρθάς, ὧν ὁ μὲν $BΓ$ τῶν 10 παραλλήλων, ὁ δὲ EZ λοξὸς πρὸς τοὺς παραλλήλους, καὶ ἀπειλίφθωσαν ἀπὸ τοῦ EZ ἴσαι περιφέρεται ἐξῆς ἐπὶ τὰ 20 αὐτὰ μέρη αἱ $HΘK$, καὶ γεγράφθωσαν κύκλοι διὰ

τῶν $HΘK$ σημείων παράλληλοι τῇ $BΓ$ οἱ MN $ΞO$ $ΠΡ$ · δεῖξαι ὅτι μείζων ἐστὶν ἡ $ΠΞ$ τῆς $ΜΞ$.

Γεγράφθωσαν γὰρ διὰ τοῦ A καὶ ἐκάστου τῶν $K H Θ$ 25 μέγιστοι κύκλοι οἱ AK $AΘ$ AH · φανερὸν δὲ ὅτι ἐκάστη τῶν AK $AΘ$ AH περιφερειῶν ἐλάσσων ἐστὶν τεταρτημορίου ἐπειδὴ τεταρτημορίον ἐστὶν ἡ ἀπὸ τοῦ A ἕως τοῦ $BΓ$ μεγίστου κύκλου· ἐπεὶ οὖν τριῶν μεγίστων κύκλων περιφέρεται αἱ AK $AΘ$ AH μεγίστου κύκλου τοῦ EZ 30 περιφέρειαν τέμνουσιν, καὶ ἔστιν ἴση ἡ $KΘ$ τῇ $ΘH$, ἐκάστη

3. τῇ AF (ante συναμφ.) $A'B^3$, τῇ FI A^2B^3 7. ε' add. BS
7. 8. τὸ E — τοῦ F' AB , τὸ πέμπτον — τοῦ τρίτου S 12. ὁ A ; τὸ A
σημεῖον Theodos. sphaer. 2, 5 14. κύκλοι — 34. τῆς $MΞ$] haec paulo aliter enuntiata sunt atque apud Theodos. 19. ἀπὸ Theodos.

guli sphaerici $\eta\alpha$ uno latere $\iota\zeta\alpha$ duae maximorum circulorum circumferentiae $\iota\delta\delta\alpha$ intra constitutae sunt, propter lemma II sunt $\eta\delta + \delta\alpha < \eta\epsilon + \epsilon\alpha$, id est

$$ae + \epsilon\eta > ad + \delta\eta. \text{ Sed est } \epsilon\eta = \beta\alpha, \text{ et}$$

$$\delta\eta = \gamma\alpha; \text{ ergo}$$

$$\beta\alpha + ae > \gamma\alpha + ad, \text{ q. e. d.}$$

V. His praemissis *propositum* sit quintum theorema tertii Theodosii sphaericorum libri¹, aliter demonstrare. Prop. 3

Etenim in circumferentia maximi circuli $\alpha\beta\gamma$ sit parallelorum polus α , et hunc circumulum ad rectos angulos secant duo maximi circuli, quorum alter $\beta\gamma$ sit unus parallelorum, alter autem $\epsilon\zeta$ obliquus ad parallelos, et in circulo $\epsilon\zeta$ aequales circumferentiae continuae $\eta\theta$ $\theta\chi$ ad easdem partes abscindantur, et per puncta χ θ η describantur circuli $\mu\nu$ $\xi\omicron$ $\pi\rho$ paralleli circulo $\beta\gamma$; demonstretur circumferentiam $\pi\xi$ maiorem esse quam $\xi\mu$.

Describantur per α et singula puncta χ θ η maximi circuli $\alpha\chi$ $\alpha\theta$ $\alpha\eta$; apparet singulas circumferentias $\alpha\chi$ $\alpha\theta$ $\alpha\eta$ minores esse quadrante (quoniam ex hypothesi duo maximi circuli $\alpha\beta\gamma$ $\beta\gamma$ ad rectos angulos se secant, itaque propter sphaeric. 1. 13 circumferentia ab α ad maximum circumulum $\beta\gamma$ quadrans est. Iam quia trium maximorum circulorum circumferentiae $\alpha\chi$ $\alpha\theta$ $\alpha\eta$ secant maximi circuli circumferentiam $\epsilon\zeta$, et $\chi\theta$ $\theta\eta$ aequales sunt, ac singulae $\alpha\chi$ $\alpha\theta$ $\alpha\eta$ mi-

1) Ipsam propositionem repetere Pappus supersedit, quae a Theodosio his verbis est enuntiala: 'Ἐὰν ἐπὶ μεγίστου κύκλου περιγεγραμῆς ὁ πόλος ἢ τῶν παραλλήλων, καὶ τοῦτον τέμνωσι δύο μέγιστοι κύκλοι πρὸς ὀρθάς, ὧν ὁ μὲν εἰς τῶν παραλλήλων, ὁ δὲ ἕτερος λοξὸς πρὸς τοὺς παραλλήλους, ἀπὸ δὲ τοῦ λοξοῦ κύκλου ἴσαι περιγεγραμῆαι ἀποληφθῶσιν ἐξῆς ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τοῦ μεγίστου τῶν παραλλήλων, διὰ δὲ τῶν γενομένων σημείων παράλληλοι κύκλοι γεγραμῶσιν, ἀντίστοιχες ἀπολήφονται περιγεγραμῆς τοῦ ἐξ ἀρχῆς μεγίστου κύκλου τὰς μεταξὺ αὐτῶν, καὶ μείζονα ἢ τὴν ἑγγιον τοῦ μεγίστου τῶν παραλλήλων τῆς πορρωτέρας.

Co, ἐπὶ ABS 23. τῶν ΗΘΑ — ol MNE OHP A, distinx. BS
25. τῶν ΚΗΘ A, distinx. BS 27. τετάρτη μοῖρον A, coniunx. BS,
item vs. 28 et p. 482. l. 15

δὲ τῶν AK AO AH ἐλάσσων ἐστὶν τεταρτημορίου, διὰ ἄρα τὸ προοδεδειγμένον συναμφοτέρος ἢ KAH τῆς AO μείζων ἐστὶν ἢ διπλῇ, ὣν συναμφοτέρος ἢ KAT τῆς AS ἐστὶν διπλῇ (αἱ γὰρ τρεῖς αἱ AS AK AT ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν διὰ τοῦ πόλου). λοιπὴ ἄρα ἡ TH τῆς SO μείζων ἐστὶν ἢ διπλῇ. ἴση δὲ ἢ SO τῇ TY ἢ HY ἄρα τῆς TY μείζων ἐστὶν. ἴση δὲ ἢ μὲν HY τῇ HE , ἢ δὲ YT τῇ EM μείζων ἄρα ἢ HE τῆς EM , ὅπερ: ~

7 ζ'. Ἐστω δὲ δεῖξαι μὴ οὐσῶν συνεχῶν τῶν ἴσων περιφερειῶν (τοῦτο γὰρ οὐκ ἔδειξεν Θεοδοσίος, καὶ ἔστω τὸ αὐτὸ σχῆμα, αἱ δὲ ἴσαι περιφέρειαι ἔστωσαν αἱ HO KA , καὶ ἔστωσαν οἱ παράλληλοι κύκλοι οἱ MN EO PR ST , καὶ γεγραφθῶσαν διὰ τοῦ A καὶ ἐκάστου τῶν H O K A μέγιστοι κύκλοι οἱ AH AO AK AA . ἔσονται δὲ ἐλάσσονες τεταρτημορίου. καὶ ἔσται διὰ τὸ ἐπάνω δ' θεωρημα 15 συναμφοτέρος ἢ AH συναμφοτέρου τῆς KAO μείζων, συναμφοτέρος δὲ ἢ AX συναμφοτέρῃ τῇ YAO ἴση ἐστὶν (ἐκ πόλου γὰρ εἰσὶν τοῦ MN κύκλου). λοιπὴ ἄρα ἡ XH συναμφοτέρου τῆς PO YK μείζων ἐστὶν. ἴση δὲ ἢ PO τῇ XP . λοιπὴ ἄρα ἢ PH τῆς YK μείζων ἐστὶν. ἴση δὲ ἢ μὲν PH τῇ SI , ἢ δὲ YK τῇ ME μείζων ἄρα καὶ ἢ SI τῆς ME , ὅπερ: ~


8 ζ'. Ἐστω νῦν ἄλλως τὸ αὐτὸ δεῖξαι. ἐπὶ γὰρ μέγιστον κύκλου περιφερείας τοῦ $ABΓ$ ὁ πόλος ἔστω τῶν παραλλήλων, καὶ τοῦτον τεμνέντωσαν δύο μέγιστοι κύκλοι οἱ AE $BΓ$ πρὸς ὁρθάς, ὧν ὁ μὲν $BΓ$ ἔστω τῶν παραλλήλων, ὁ δὲ AE λοξὸς πρὸς τοὺς παραλλήλους, καὶ ἀπὸ τοῦ AE ἴσαι περιφέρειαι αἱ ZH $ΘK$, καὶ γεγραφθῶσαν παράλληλοι κύκλοι οἱ AM NE OH PS . λέγω ὅτι μείζων ἐστὶν ἢ OP τῆς NA .

30

9. ε Λ^1 in marg. (BS) 12. αἱ παράλληλοι, omissa κύκλοι, B sed ad mutatum ex αἱ cod. Co. αἱ del. Co 13. τῶν HO $K.A$ ABS, distinx. Hu 15. A AB, τεταρτον S 16. μείζωνων A, μείζων ὧν B. corr. S 17. post ἐστιν sic A, quod om. S, add. διὰ τοῦ A ABS, del. Co 18. λοιπῇ A, corr. BS ἢ XII Co pro ἢ XV 20. λοι-

nones quadrante, est igitur propter *lemma* supra (III) demonstratum $\kappa\alpha + \alpha\eta > 2\alpha\vartheta$. Sed quia ex *hypothesi* circuli $\mu\nu$ polus est α , ideoque $\alpha\kappa = \alpha\sigma = \alpha\tau$, est igitur $\kappa\alpha + \alpha\tau = 2\alpha\sigma$; restat igitur $\tau\eta > 2\sigma\vartheta$. Sed est $\sigma\vartheta = \tau\nu$ *sphaeric.* 2, 10; ergo $\tau\eta > \tau\nu$. Et est $\tau\nu = \pi\xi$, et $\tau\nu = \mu\xi$; ergo $\pi\xi > \xi\mu$, q. e. d.

VI. Sed *propositum* sit idem demonstrare, si non con- Prop. 6
tinuae sint circumferentiae (id quod Theodosius omisit), et,




manente *ceteroquin* eadem figura, aequales sint circumferentiae $\eta\vartheta$ $\chi\lambda$, et sint paralleli circuli $\mu\nu$ $\xi\sigma$ $\pi\rho$ $\sigma\tau$, et describantur per α et singula puncta η ϑ χ λ maximorum circulorum circumferentiae $\alpha\eta$ $\alpha\vartheta$ $\alpha\chi$ $\alpha\lambda$; haec igitur minores erunt quadrante Γ . Ac propter superius IV theorema erit

$\lambda\alpha + \alpha\eta > \kappa\alpha + \alpha\vartheta$, et, quia circuli $\mu\nu$ polus est α , $\lambda\alpha + \alpha\chi = \nu\alpha + \alpha\rho$; restat igitur $\chi\eta > \rho\vartheta + \nu\chi$. Sed est $\rho\vartheta = \chi\psi$; restat igitur $\psi\eta > \nu\chi$. Sed est $\psi\eta = \pi\sigma$, et $\nu\chi = \mu\xi$; ergo $\pi\sigma > \mu\xi$, q. e. d.

VII. Iam *propositum* sit idem aliter demonstrare. Et Prop. 7
enim in maximi circuli $\alpha\beta\gamma$ circumferentia sit polus parallelorum, et hunc *circulum* duo maximi circuli $\delta\epsilon$ $\beta\gamma$ ad rectos angulos secant, quorum alter $\beta\gamma$ sit *unus* parallelorum, alter autem $\delta\epsilon$ obliquus ad parallelos, et in circulo $\delta\epsilon$ aequales *abscinduntur* circumferentiae $\xi\eta$ $\vartheta\kappa$, et describantur paralleli circuli $\lambda\mu$ $\nu\xi$ $\sigma\alpha$ $\rho\sigma$; dico circumferentiam $\rho\sigma$ maiorem esse quam $\nu\lambda$.

Ἡ γὰρ ZH τῇ $HΘ$ ἴτοι σύμμετρός ἐστιν ἢ οὐ. ἔστω
πρότερον σύμμετρος. ἴση δὲ ἡ HZ τῇ $ΘΚ$ · καὶ ἡ $ΘΚ$ τῇ



$ΘΗ$ ἄρα σύμμετρός
ἐστιν· αἱ τρεῖς ἄρα
αἱ ZH $HΘ$ $ΘΚ$ σύμ-³
μετροὶ ἀλλήλαις εἰ-
σιν. διηγεῖσθωσαν
οὖν εἰς τὰ μέτρα τοῖς
 $ΤΥΦΧΨ$, καὶ γε-
γράφωσαν διὰ τῶν¹⁰
 $ΤΥΦΧΨ$ παράλ-
ληλοι κύκλοι οἱ $ΩΤ$
 $ΑΥΦΒΧΓΨΔ$,
καὶ ἐπεὶ αἱ ZT $ΤΥ$
 $ΥΗΗΦΦΘΘΧΧΨ$ ¹⁵
 $ΨΚ$ περιφέρειαι ἴσαι

ἀλλήλαις εἰσιν, αἱ ἄρα $ΡΩ$ $ΩΑ$ $ΑΟ$ $ΟΒ$ $ΒΝ$ $ΝΓ$ $ΓΔ$
 $ΔΑ$ ἄνισοι εἰσιν ἐξ ἀρχῆς ἀρχόμεναι ἀπὸ μεγίστης τῆς
 $ΡΩ$. καὶ ἔστιν ἴσον τὸ πλῆθος τῶν $ΡΩ$ $ΩΑ$ $ΑΟ$ τῇ
πλήθει τῶν $ΝΓ$ $ΓΔ$ $ΔΑ$ · μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ $ΡΟ$ τῆς $ΝΑ$.²⁰
9) ἢ. Ἀλλὰ δὴ τῶν αὐτῶν ἐποκειμένων μὴ ἔστω σύμ-
μετρος ἡ ZH τῇ $HΘ$ · λέγω ὅτι καὶ οὕτως μείζων ἐστὶν ἡ
 $ΡΟ$ τῆς $ΑΝ$.

Εἰ γὰρ μή, ἴτοι ἴση ἐστὶν ἢ ἐλάσσων. ἔστω πρότερον
ἐλάσσων, καὶ κείσθω τῇ $ΡΟ$ ἴση ἡ $ΝΓ$, καὶ τριῶν γραμμῶν²⁵
ὁμογενῶν τῶν $ΑΝ$ $ΝΓ$ $ΝΟ$ εἰλήφθω τῇ μὲν $ΝΟ$ σύμμε-
τρος, τῆς δὲ $ΝΓ$ μείζων, τῆς δὲ $ΝΑ$ ἐλάσσων, καὶ ἔστω
ἡ $ΝΔ$, καὶ ἔστωσαν οἱ παράλληλοι κύκλοι οἱ $ΧΓΨΔ$,
καὶ κείσθω τῇ $ΨΘ$ ἴση ἡ $ΗΤ$, καὶ ἔστω ὁ παράλληλος
κύκλος ὁ $ΤΩ$. ἐπεὶ οὖν σύμμετρός ἐστιν ἑκατέρω τῶν $ΨΘ$ ³⁰


8. 9. τοῖς $ΤΥ$ $ΦΧ$ $Ψ$ et 10. 11. τῶν $ΤΥ$ $ΦΧ$ $Ψ$ $ΑΒ$, corr. Paris.
2368 12. 13. οἱ $ΩΤ$ $ΑΥ$ $ΦΒ$ $ΧΓ$ $ΨΔ$ $Α$, ac similiter BS, nisi quod

$ψδ^o$ corr. S 17. 18. ἄρα $ΡΩ$ $ΩΑ$ $ΑΟ$ $ΟΒ$ $ΒΝ$ $ΝΓ$ $ΓΔ$ $ΔΑ$ $Α$,
ac similiter BS, corr. Hu auctore Co 19. ἄνισοι Co pro $ΑΝ$ ἴσοι

ἐξ ἀρχῆς ἐξῆς conl. Hu 20. πλήθει τῶν $ΓΔ$ $ΔΑ$ $Α$, ac simi-
liter B prius $Γ$ om. S., corr. Co 21. $Η$ $Α$ in marg. [BS,

Scilicet circumferentia $\zeta\eta$ ipsi $\eta\theta$ aut commensurabilis est aut non. Sit primum commensurabilis. Et ex hypothesi $\zeta\eta$ $\theta\kappa$ aequales sunt; ergo etiam $\theta\kappa$ ipsi $\eta\theta$ commensurabilis, ideoque tres $\zeta\eta$ $\eta\theta$ $\theta\kappa$ inter se commensurabiles sunt. Hae iam in aequales portiones dividantur, *velut*. si sit $\zeta\eta : \eta\theta = 3 : 2$, in punctis τ v ϕ χ ψ , et per haec paralleli circuli $\omega\tau$ αv $\beta\phi$ $\gamma\chi$ $\delta\psi$ describantur. Et quia circumferentiae $\zeta\tau$ τv $v\eta$ $\eta\phi$ $\phi\theta$ $\theta\chi$ $\chi\psi$ $\psi\kappa$ inter se aequales sunt, circumferentiae igitur $\rho\omega$ ω,α αo o,β βv v,γ γ,δ $\delta\lambda$ propter *lemma* inaequales sunt deinceps a maxima $\rho\omega$ incipientes. Atque est numerus circumferentiarum $\rho\omega$ ω,α αo numero ipsarum v,γ γ,δ $\delta\lambda$ aequalis; ergo propter elem. 5. 18 ρo maior est quam $v\lambda$.

VIII. Sed iisdem suppositis non sit commensurabilis circumferentia $\zeta\eta$ ipsi $\eta\theta$; dico etiam sic ρo maiorem esse quam $v\lambda$. Prop. 8



Nam si non sit, aut aequalis est aut minor. Sit primum minor, et ponatur $v\gamma = \rho o$, et cum tres sint lineae similiter ortae λv $v\gamma$ $v o$, sumatur alia quaedam v,δ , quae ipsi $v o$ commensurabilis, eademque et maior quam $v\gamma$ et minor sit quam $v\lambda$, et sint paralleli circuli $\chi\gamma$ ψ,δ , et ponatur $\eta\tau = \psi\theta$, et


sit parallelus circulus $\tau\omega$. Iam quia singulae $\psi\theta$ $\eta\tau$ ipsi τ,θ

† Sunt enim eiusdem circuli circumferentiae portiones.

26. N,T ante NO , Hu auctore Co pro N,T 27. $\tau\eta\zeta$ $\delta\epsilon$ N,T A
BS; 28. η N,T ABS, lineolam ad T add. Hu 29. η N,T AB. sed
† T simile numerali ζ , quae nota transiit in S 29. η HT HT A.
 NT B cod. Co. corr. S

HT τῇ HΘ, μείζων ἐστὶν καὶ ἡ ΩΘ τῆς ΝΑ· πολλῶν ἄρα
 ἡ ΡΟ τῆς ΝΑ μείζων ἐστίν. ἀλλὰ ἡ ΡΟ ἴση ἐστὶν τῇ ΝΓ·
 ἡ ΝΓ ἄρα τῆς ΝΑ μείζων ἐστὶν ἢ ἐλάσσων τῆς μείζονος,
 ὑπερ ἀδύνατον· οὐκ ἄρα ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ΡΟ τῆς ΝΑ.

10 3'. Τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων λέγω ὅτι οὐδὲ ἴση. εἰς
γὰρ δυνατόν, ἔστω, καὶ τετμήσθωσαν αἱ ΗΖ ΘΚ διὰ τοῖς



Τ Ψ, καὶ ἕστωσαν οἱ
 παράλληλοι κύκλοι οἱ
 ΤΩ ΨΔ. ἔπει οὖν
 αἱ ΤΖ ΤΗ ἴσαι εἰ- 10
 σίν, ἄνισοι ἄρα εἰσὶν
 αἱ ΡΩ ΩΟ ἀρχόμεναι
 ἀπὸ μεγίστης τῆς ΡΩ.
 πάλιν ἔπει αἱ ΘΨΚ
 ἴσαι εἰσὶν, ἄνισοι ἄρα 15
 εἰσὶν αἱ ΝΔ ΔΔ ἀρ-
 χόμεναι ἀπὸ μεγίστης
 τῆς ΝΔ. ἔπει οὖν
 μεῖζων ἔστιν ἢ μὲν
 ΡΩ τῆς ΩΟ, ἢ δὲ 20

ΝΑ τῆς ΔΑ, μείζων ἄρα ἢ διπλῇ ἢ ΡΟ τῆς ΝΑ, ὡπερ ἀδύνατον· προδεδεσται. - - - οὐκ ἄρα ἴση ἐστὶν ἢ ΡΟ τῇ ΝΑ. ἐδείχθη δὲ ὅτι οὐδὲ ἑλάσσων· μείζων ἄρα ἐστὶν ἢ ΡΟ τῆς ΝΑ.

11 ἴ. Πάλιν ἐπὶ μεγίστοις κύκλοι περιφερείας ὁ πόλος²⁵
 ἔστω τῶν παραλλήλων, καὶ αὐτὸν τεμνέτωσαν πρὸς ὁρθὰς
 οἱ ΒΓ ΔΕ, καὶ ἔστωσαν παράλληλοι κύκλοι οἱ ΚΑ ΜΝ
 ΞΟ, καὶ ἔστω ὕψι, ἡ ΕΜ τῇ ΝΚ· λέγω ὅτι ἑλάσσων ἔστιν
 ἡ ΖΗ τῆς ΗΘ.

1. 2. τῆς Ν' — τῆς V, ἴΑΒ τῆς ῥδ utroque loco S' 2. 3. τῆς Ν' ἢ Ν' ἢ ἀγα ABS, corr. Illu auctore Cu 4. τῆς ΝΑ Cu pro τῆς Ν' 5. 6. add. Α' in marg. BS, 6. 7. τοῖς ῥΤ Α. distinx. BS, recte collocavit Co 16. αὖ Ν' ἴΑ Α, ac similiter B, αὖ ῥδ ῥΔ S 17. μυστήριος μυστικός coni. Co: sed scriptor praefer ῥδ ῥΔ alias deinceps sequentes tacite significat 20. 21. ἢ δὲ ΝΑ τῆς ἴΑ ΑΒ, ἢ

commensurabiles sunt, propter lemmata VI et VII maior est $\omega\theta$ quam $\nu\delta$; itaque multo $\rho\theta$ maior est quam $\nu\delta$. Sed $\rho\theta$ ipsi $\nu\gamma$ aequalis est; ergo $\nu\gamma$ maior est quam $\nu\delta$, cum tamen minor sit $\nu\gamma$ et maior $\nu\delta$, id quod fieri non potest: ergo $\rho\theta$ non est minor quam $\nu\lambda$.


IX. Iisdem suppositis nego etiam $\rho\theta$ ipsi $\nu\lambda$ aequalem ^{Prop. 9} esse. Sit enim aequalis, si fieri possit, et circumferentiae $\zeta\eta\theta\kappa$ bifariam in punctis $\tau\psi$ secentur, et sint paralleli circuli $\tau\omega\psi\delta$. Iam quia aequales sunt $\tau\zeta\tau\iota$, inaequales igitur sunt $\rho\omega\omega\theta$ a maxima $\rho\omega$ incipientes (lemm. V). Rursus quia $\theta\psi\psi\kappa$ aequales sunt, inaequales igitur sunt $\nu\delta\delta\lambda$ a maxima $\nu\delta$ incipientes. Iam quia maior est $\rho\omega$ quam $\omega\theta$, et $\nu\delta$ quam $\delta\lambda$, atque etiam $\omega\theta$ maior quam $\nu\delta$ (lemm. VI; nam ex hypothesis lemmatis VII aequales sunt $\zeta\eta\theta\kappa$, itaque etiam $\tau\eta\theta\psi$ aequales), maior igitur est $\rho\theta$ quam dupla $\nu\delta$, id quod fieri non potest (nam ex hypothesis est $\rho\theta = \nu\lambda$, et demonstrata est $\nu\lambda < 2\nu\delta$; ergo non aequalis est $\rho\theta$ ipsi $\nu\lambda$). Sed eandem ne minorem quidem esse demonstravimus quam $\nu\lambda$; ergo $\rho\theta$ maior est quam $\nu\lambda$.

X. Rursus in maximi circuli circumferentia sit polus ^{Prop. 40} parallelorum, eumque circumum ad rectos angulos secent maximi circuli $\beta\gamma\delta\epsilon$, et sint paralleli circuli $\alpha\lambda\mu\nu\xi\omicron$, sitque $\xi\mu = \mu\alpha$: dico $\zeta\iota$ minorem esse quam $\iota\theta$.

*) Haec sic restituere conati sumus verbum $\piροδίδειται$ suo loco servantes et post id ipsum lacunam statuantes. Verum etiam antea quaedam intercidisse videntur; neque tamen his additis demonstrandi ratio satis elegans ac pressa videtur. Ex Commandini sententia inde ab $\epsilon\pi\epsilon\iota\ \omicron\upsilon\tau\ \rho.$ 486, 48 Graecus scriptor sic concluderet: $\epsilon\pi\epsilon\iota\ \omicron\upsilon\tau\ \eta\ N_1 A\ \mu\epsilon\lambda\omega\upsilon\tau\ \epsilon\sigma\tau\iota\nu\ \tau\eta\varsigma\ \Gamma A$, $\epsilon\lambda\acute{\alpha}\sigma\sigma\omega\upsilon\tau\ \acute{\alpha}\rho\alpha\ \eta\ \delta\iota\pi\lambda\acute{\eta}\ \eta\ N_1 A\ \tau\eta\varsigma\ N_1 A$. $\pi\acute{\alpha}\lambda\iota\nu\ \epsilon\pi\epsilon\iota\ \mu\epsilon\lambda\omega\upsilon\tau\ \epsilon\sigma\tau\iota\nu\ \eta\ \mu\acute{\epsilon}\nu\ P\Omega\ \tau\eta\varsigma\ \Omega O$, $\eta\ \delta\epsilon\ N_1 A\ \tau\eta\varsigma\ \Gamma A$, $\delta\epsilon\delta\epsilon\iota\chi\tau\alpha\iota\ \delta\iota\ \kappa\alpha\iota\ \text{lemm. VI etc.}$ $\eta\ \Omega O\ \mu\epsilon\lambda\omega\upsilon\tau\ \tau\eta\varsigma\ N_1 A$, $\mu\epsilon\lambda\omega\upsilon\tau\ \acute{\alpha}\rho\alpha\ \eta\ \delta\iota\pi\lambda\acute{\eta}\ \eta\ P O$, $\tau\omicron\upsilon\tau\epsilon\sigma\tau\alpha\iota\ \eta\ N_1 A\ \epsilon\kappa\ \text{hypothesis}$, $\tau\eta\varsigma\ N_1 A$, $\acute{\alpha}\pi\epsilon\upsilon\ \acute{\alpha}\delta\epsilon\iota\kappa\tau\omicron\nu\ \pi\omicron\upsilon\delta\iota\delta\epsilon\iota\chi\tau\alpha\iota\ \gamma\acute{\alpha}\rho\ \epsilon\lambda\acute{\alpha}\sigma\sigma\omega\upsilon\tau$.

$\delta\epsilon\ \tau\overline{\nu\delta}\ \tau\eta\varsigma\ \overline{\delta\lambda}\ S$ 22. $\pi\omicron\upsilon\delta\iota\delta\epsilon\iota\chi\tau\alpha\iota$. . . lacunam indicavit C. $\pi\omicron\upsilon\delta\iota\delta\epsilon\iota\chi\tau\alpha\iota\ \gamma\acute{\alpha}\rho\ \eta\ N_1 A\ \epsilon\lambda\acute{\alpha}\sigma\sigma\omega\upsilon\tau\ \eta\ \delta\iota\pi\lambda\acute{\eta}\ \tau\eta\varsigma\ N_1 A$ comi. III. vide adnot. ad Lat. 23. $\tau\eta\varsigma\ N_1 A\ AB$. $\tau\eta\ \tau\overline{\nu\delta}\ S$, corr. C. 25. $\iota\ A$ in marg. BS:

Εἰ γὰρ μή, ἦτοι ἴση ἔστιν ἢ μείζων. ἴση μὲν οὖν οὐκ ἔστιν ἡ ZH τῇ $HΘ$. μείζων γὰρ ἂν ἦν ἡ $ΞΜ$ τῆς $ΜΚ$,



οὐκ ἔστιν δέ· οὐκ ἄρα ἴση ἔστιν ἡ ZH τῇ $HΘ$. λέγω δὲ ὅτι οὐδὲ μείζων. εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω, 5 καὶ κείσθω τῇ $ΘΗ$ ἴση ἡ $ΗΠ$. ἐπεὶ οὖν ἴση ἡ $ΗΠ$ τῇ $HΘ$, μείζων ἄρα ἡ $ΡΜ$ τῆς $ΜΚ$. πολλῇ ἄρα μείζων ἔστιν ἡ $ΞΜ$ τῆς $ΜΚ$, ὅπερ ἀδύνατον· ὑπόκειται γὰρ 10 ἴση· οὐκ ἄρα μείζων ἔστιν ἡ ZH τῆς $HΘ$. ἐδείχθη δὲ ὅτι οὐδὲ

ἴση· ἐλάσσων ἄρα ἔστιν ἡ ZH τῆς $HΘ$, ὅπερ: ~

- 12 ια'. Δέδεικται μὲν οὖν ὅτι ἐὰν ἡ κύκλος ὁ $ΑΒΓ$, καὶ τέμνωσιν αὐτὸν δύο μέγιστοι κύκλοι οἱ $ΒΓ ΔΕ$ πρὸς ὀρθὰς 15 καὶ ἀποληφθῶσιν ἴσαι περιφέρειαι αἱ $ZH HΘ$, καὶ γραφῶσιν παράλληλοι κύκλοι οἱ $ΚΑ ΜΝ ΕΟ$, γίνεται μείζων ἡ $ΞΜ$ τῆς $ΜΚ$. ἔστω δὲ μείζων ἡ ZH τῆς $HΘ$. λέγω ὅτι πολλῇ μείζων ἔστιν ἡ $ΞΜ$ τῆς $ΜΚ$.

Ἐπει γὰρ μείζων ἔστιν ἡ ZH τῆς $HΘ$, κείσθω τῇ $HΘ$ 20 ἴση ἡ $ΗΠ$, καὶ γεγραφθῶ παράλληλος κύκλος ὁ $ΠΡ$. ἐπεὶ οὖν ἴση ἔστιν ἡ $ΗΠ$ τῇ $HΘ$, μείζων ἔστιν ἡ $ΡΜ$ τῆς $ΜΚ$. πολλῇ ἄρα μείζων ἔστιν ἡ $ΞΜ$ τῆς $ΜΚ$, ὥστε, ἐὰν μείζων ἡ ZH τῆς $ΘΗ$, γίνεται καὶ ἡ $ΞΜ$ τῆς $ΜΚ$ μείζων, ὅπερ: ~

25

Περὶ τῆς εἰς τὸ ε' θεωρημα ἐναστάσεως τοῦ γ' λήμματα.

- 13 ιβ'. Ἐστω τρίγωνον τὸ $ΑΒΓ$, καὶ διέχθωσαν αἱ $ΑΑ ΑΕ$ ἐν ἴσαις γωνίαις ταῖς ἐπὶ $ΒΑ Α ΕΑΙ$. ὅτι ἔστιν ἕως τὸ ἐπὶ $ΔΓΕ$ πρὸς τὸ ἐπὶ $ΕΒΑ$ περιεχόμενον ὀρθογώνιον, οὕτως τὸ ἀπὸ $ΑΓ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΑΒ$.


30

Περίγεγραφθῶ περὶ τὸ $ΑΙΕ$ τρίγωνον κύκλος, καὶ

43. ὅπερ S. ο Α, om. B 44. ια' A¹ in marg. {BS} δεδεικται
A¹ ex δεδεικται 26. ε Α, ἔχον BS τοῦ Γ Α², τοῦ Τ Α¹, τοῦ τρί-
του B, τοῦ τρίτου τῶν σημειωθῶν S λήμματα Hu pro λήμμα

Nam si non sit, aut aequalis est aut minor. Iam primum non est $\xi\eta = \eta\theta$: sic enim propter lemma V esset $\xi\mu > \mu\kappa$, quod est contra hypothesim; ergo non est $\xi\eta = \eta\theta$. Sed nego etiam esse $\xi\eta > \eta\theta$. Si enim fieri possit, sit $\xi\eta > \eta\theta$, et ponatur $\eta\pi = \theta\eta$, et describatur parallelus $q\pi$. Iam quia est $\pi\eta = \eta\theta$, propter lemma V igitur est $q\mu > \mu\kappa$; itaque multo $\xi\mu > \mu\kappa$, quod fieri non potest; nam ex hypothesi est $\xi\mu = \mu\kappa$; ergo non est $\xi\eta > \eta\theta$. Sed ne aequalem quidem esse demonstravimus; ergo $\xi\eta$ minor est quam $\eta\theta$, q. e. d.

XI. Demonstravimus igitur, si sit maximus circulus $\alpha\beta\gamma$, Prop. 11
eumque circum duo maximi circuli ad rectos angulos secant,
quorum alter $\beta\gamma$ sit unus parallelorum, alter autem $\delta\epsilon$ obli-
quus ad parallelos, et aequales abscindantur circumferentiae
 $\xi\eta$ $\eta\theta$, et describantur paralleli circuli $\kappa\lambda$ $\mu\nu$ $\xi\sigma$, fieri $\xi\mu$
maiolem quam $\mu\kappa$. Sed sit $\xi\eta$ maior quam $\eta\theta$; dico multo
maiolem esse $\xi\mu$ quam $\mu\kappa$.



Nam quia maior est $\xi\eta$ quam $\eta\theta$, ponatur $\eta\pi = \eta\theta$, et describatur parallelus circulus $q\pi$. Iam quia est $\pi\eta = \eta\theta$, propter lemma V igitur $q\mu$ maior est quam $\mu\kappa$; multo igitur $\xi\mu$ maior quam $\mu\kappa$; itaque, si sit $\xi\eta$ maior quam $\eta\theta$, fit etiam $\xi\mu$ maior quam $\mu\kappa$, q. e. d.


Lemmata ad disceptationem de VI theoremate libri III sphaericorum spectantia.

XII. Sit triangulum $\alpha\beta\gamma$, in quo dunc ducantur rectae Prop. 12
 $\delta\alpha$ $\alpha\epsilon$ in aequalibus angulis $\beta\alpha\delta$ $\epsilon\alpha\gamma$; dico esse $\delta\gamma \cdot \gamma\epsilon : \epsilon\beta \cdot \beta\delta$
 $= \alpha\gamma^2 : \alpha\beta^2$.

Describatur circulus circa triangulum $\alpha\delta\epsilon$, et iungatur $\xi\eta$;


*. Hanc propositionem repetit Simsonus de sectione determ. etc.
Opera quaedam reliqua p. 16

ἐπεδείχθω ἡ ZH · παράλληλος ἄρα ἐστὶν τῇ BI' διὰ τὸ ἴσην εἶναι τὴν ZA περιφέρειαν τῇ EH περιφέρειᾳ· ἔστιν



ἄρα ὡς AG πρὸς GH , ἢ AB πρὸς BZ · καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ AG πρὸς τὸ ὑπὸ AGH , οὕτως τὸ ἀπὸ AB πρὸς τὸ ὑπὸ ABZ . ἴσον δὲ τὸ μὲν ὑπὸ AGH τῷ ὑπὸ AGE , τὸ δὲ ὑπὸ ABZ τῷ ὑπὸ EBA · καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ AG πρὸς τὸ ὑπὸ AGE , οὕτως τὸ ἀπὸ AB πρὸς τὸ ὑπὸ EBA · καὶ ἐναλλάξ ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ AG πρὸς τὸ ἀπὸ AB , τὸ ὑπὸ AGE πρὸς τὸ ὑπὸ EBA .

- 14 γ'. Ἐχέτω δὲ τὸ ὑπὸ AGE πρὸς τὸ ὑπὸ EBA μείζονα λόγον, τουτέστι τὸ ὑπὸ AGH πρὸς τὸ ὑπὸ ABZ , ἥπερ τὸ ἀπὸ AG πρὸς τὸ ἀπὸ AB · ὅτι μείζων ἡ ὑπὸ EAG τῆς ὑπὸ BAA .



Ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ AGH πρὸς τὸ ὑπὸ ABZ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ἀπὸ AG πρὸς τὸ ἀπὸ AB , ἐναλλάξ²⁰ τὸ ὑπὸ AGH πρὸς τὸ ἀπὸ AG μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ὑπὸ ABZ πρὸς τὸ ἀπὸ AB . ἀλλ' ὡς μὲν τὸ ὑπὸ

AGH πρὸς τὸ ἀπὸ AG , οὕτως ἡ HG πρὸς AG , ὡς δὲ τὸ ὑπὸ ABZ πρὸς τὸ ἀπὸ AB , οὕτως ἡ ZB πρὸς AB · καὶ ἡ AG ἄρα πρὸς GH ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ AB πρὸς τὴν BZ . ἐὰν ἄρα ποιῶμεν ὡς τὴν AG πρὸς GH , οὕτως τὴν AB πρὸς ἄλλην τινά, ἔσται πρὸς μείζονα τῆς BZ . ἔστω πρὸς τὴν BK , καὶ ἐπιτενχθεῖσα ἡ HK ἐκβεβλήσθω²¹ ἐπὶ τὸ Θ · παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ BI' τῇ $H\Theta$ · ἴση ἄρα


13. $\overline{H\Gamma}$ add. B^S

19. τὸ $\overline{H\Gamma}$ add. A² super vs. B^S), ἀπὸ

add. Hu auctore Co 25. ἡ $H\Gamma$ ἢ $H\Gamma$ A^S, ἡ $\alpha\gamma'$ B, ἡ GH Co

26. ἡ ZB πρὸς ABZ ABS, corr. Co 27 28. πρὸς τὴν BZ πρὸς τὸ BZ AS, πρὸς $\beta\zeta$ B¹, corr. B³

- ἐστὶν ἡ $ΕΗ$ περιφέρεια τῇ $ΑΘ$ περιφερείᾳ· μείζων ἄρα ἢ $ΕΗ$ τῆς $ΑΖ$, ὥστε καὶ γωνία ἡ ὑπὸ $ΓΑΕ$ τῆς ὑπὸ $ΒΑΔ$, ὕπερ: ~
 15 ἰδ'. Τεμνέτωσαν ἀλλήλους δύο μέγιστοι κύκλοι οἱ $ΑΒΓ$ $ΒΕΓ$, καὶ ἔστω τοῦ $ΑΒΓ$ πόλος ὁ $Δ$, καὶ γεγράφωσαν μέγιστοι κύκλοι οἱ $ΑΖ$ $ΑΘ$, καὶ ἔστω ἴση ἢ $ΒΕ$ περιφέρεια τῇ $ΓΗ$ περιφερείᾳ· δεῖξαι ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ἀπὸ τοῦ $Δ$ ἐπὶ τὸ $Ε$ τῇ ἀπὸ τοῦ $Δ$ ἐπὶ τὸ $Η$.



Τεμνέσθω ἡ $ΕΗ$ δίχα τῷ $Κ$, καὶ γεγράφθω διὰ τῶν $Δ$ $Κ$ μέγιστος κύκλος ὁ $ΔΚΑ$. 10 καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ μὲν $ΒΕ$ τῇ $ΗΓ$, ἡ δὲ $ΕΚ$ τῇ $ΚΗ$, ὅλοι ἄρα ἢ $ΒΚ$ τῇ $ΓΚ$ ἴση ἐστίν. ἐπεὶ οὖν διὰ τῆς τοῦ $ΒΓ$ διχοτομίας καὶ τῶν τοῦ $ΑΒΓ$ 15 πόλων γέγραπται μέγιστος κύκλος ὁ $ΔΚΑ$, ὁ $ΔΚΑ$ ἄρα ἦξει διὰ τῶν τοῦ $ΒΕΗ$ πόλων καὶ ὁρθὸς ἔσται πρὸς αὐτόν. ἐπεὶ οὖν κύκλον τοῦ $ΚΒΓ$ ἐπὶ τὸ

- διαμέτρου τῆς ἀπὸ τοῦ $Κ$ ὁρθὸν τμήμα κύκλον ἐφείστικεν τὸ $ΚΙ$, καὶ διήρηται ἡ τοῦ ἐφεστῶτος τμήματος περιφέρεια κατὰ τὸ $Δ$, καὶ ἐστὶν ἴση ἢ $ΕΚ$ τῇ $ΚΗ$, ἴση ἄρα ἐστὶν ἢ ἀπὸ τοῦ $Δ$ ἐπὶ τὸ $Ε$ τῇ ἀπὸ τοῦ $Δ$ ἐπὶ τὸ $Η$, ὕπερ: ~
 16 ἰδ'. Ἐστῶσαν μέγιστοι κύκλοι οἱ $ΑΒΓ$ $ΒΕΗΓ$, καὶ ἔστω τοῦ $ΑΒΓ$ πόλος τὸ $Δ$, καὶ γεγράφωσαν μέγιστοι κύκλοι οἱ $ΑΕΖ$ $ΑΚΑ$ $ΑΗΘ$ διχοτομίας οἷσις τοῦ $Κ$ τῆς $ΗΚΕ$ περιφερείας· λέγω ὅτι, εἰ μὲν ἴση ἐστὶν ἡ $ΒΕ$ τῇ $ΗΓ$, ἴση ἐστὶν καὶ ἡ $ΖΑ$ τῇ $ΑΘ$, εἰ δὲ μείζων ἐστὶν ἢ $ΒΕ$ τῆς $ΗΓ$, μείζων ἐστὶν καὶ ἡ $ΖΑ$ τῆς $ΑΘ$, εἰ δὲ 20

3. ὕπερ Hu . $\overline{AB}$ (sed id in A expunctum), om. S 3. ἰδ' add. B'S 4. $ΒΕΓ$ $\cdot ΒΕΓ$ A, $ΒΕΗΓ$ Co (ut cap. 46 init.) 7. ἐπὶ τὸ $\overline{E}$ τῇ ἀπὸ τοῦ Δ his scripta in AS. corr. B 9 10. τῶν $\overline{AK}$ A, distinct. BS 11. τοῦ $\overline{HG}$ scilicet τμήματος: vide sphaer. 2, 9 20. τοῦ $\overline{HKG}$ ἐπὶ coni. Hu 24. ὕπερ BS. ὁ A 25. α' add. B'S 27. $\overline{AKA}$ Hu . $\overline{AKA}$ ABS, om. Co 29. ἰ om. AS. add. B

circumf. $\epsilon\eta$ = circumf. $\delta\theta^{**}$; ergo

circumf. $\epsilon\eta >$ circumf. $\delta\zeta$; itaque etiam (elem. 6, 33)

$L\epsilon\alpha\gamma > L\beta\alpha\delta$, q. e. d.

XIV. Duo maximi circuli $\alpha\beta\gamma$ $\beta\epsilon\gamma$ invicem se secant, sit- Prop.
que circuli $\alpha\beta\gamma$ polus δ , et describantur maximi circuli $\delta\epsilon\zeta$ ¹⁴
 $\delta\theta$ circumf. $\beta\epsilon\gamma$ secantes in punctis ϵ η , et aequales sint
circumferentiae $\beta\epsilon$ $\gamma\eta$; demonstretur rectam a δ ad ϵ aequa-
lem esse rectae a δ ad η .

Circumferentia $\epsilon\eta$ bifariam secetur in puncto κ , et per
 δ κ describatur maximus circulus $\delta\kappa\lambda$. Quoniam circumfe-
rentiae $\beta\epsilon$ $\gamma\eta$, itemque $\epsilon\kappa$ $\kappa\eta$ inter se aequales sunt, tota
igitur $\beta\kappa$ ipsi $\kappa\gamma$ aequalis est. Iam quia per bipartitam sec-
tionem circumferentiae $\beta\epsilon\eta\gamma$ et polos circuli $\alpha\beta\gamma$ descriptus
est maximus circulus $\delta\kappa\lambda$, hic igitur etiam per polos circuli
 $\beta\epsilon\gamma$ transibit¹⁾ ad eumque rectus erit²⁾. Iam quia in circuli
 $\beta\kappa\gamma$ diametro quae a κ initium habet circuli circumferentia
 $\kappa\delta$ ad rectos angulos insistit, eaque circumferentia in puncto
 δ secta est, et circumferentiae $\epsilon\kappa$ $\kappa\eta$ aequales sunt, propter
sphaer. 2, 12 igitur recta a δ ad ϵ aequalis est rectae a δ
ad η , q. e. d.

XV. Sint maximi circuli $\alpha\beta\gamma$ $\beta\epsilon\eta\gamma$, et sit circuli $\alpha\beta\gamma$ Prop.
polus δ , et maximi circuli $\delta\epsilon\zeta$ $\delta\kappa\lambda$ $\delta\eta\theta$ ita describantur, ut ¹⁵
circumferentia $\epsilon\kappa\eta$ in puncto κ bifariam secetur; dico primum,
si circumferentiae $\beta\epsilon$ $\gamma\eta$ aequales sint, etiam $\zeta\lambda$ $\lambda\theta$ aequales
esse, tum, si $\beta\epsilon$ maior sit quam $\gamma\eta$, etiam $\zeta\lambda$ maiorem esse


** Propter elem. 3, 26, quoniam, iuncta $\delta\epsilon$, anguli $\eta\theta\epsilon$ $\theta\epsilon\delta$ ac-
quales sunt; hic igitur habemus conversum illud lemma, quod ad
propos. 12 adnot. 1 breviter attigimus.

1) Utilit scriptor et hoc loco et paulo post, id quod Commandinus
recte vidit, Theodosii sphaericorum libri II propositione 9 conversa,
quae Graeco sermone sic fore sonuerit: 'Εὰν ἐν σφαίρᾳ δύο κύκλοι
τέμνωσιν ἀλλήλους, διὰ δὲ τῶν τοῦ ἐνὸς πόλων καὶ τῆς διχοτομίας τοῦ
τμήματος τοῦ ἐτέρου κύκλου μέγιστος κύκλος γορευῇ, ἥξει καὶ διὰ τῶν
τοῦ ἐτέρου πόλων. Ergo hoc loco, quia circuli $\alpha\beta\gamma$ et $\beta\epsilon\gamma$ invicem se
secant, maximusque circulus $\delta\kappa\lambda$ et per polos circuli $\alpha\beta\gamma$ et per bipar-
titam sectionem 'διχοτομίας' circumferentiae alterius circuli, quae est
inter puncta sectionis cum circulo $\alpha\beta\gamma$, descriptus est, efficitur circumf.
 $\delta\kappa\lambda$ etiam per polos circuli $\beta\epsilon\gamma$ transire.

2) Quoniam maximus circulus $\delta\kappa\lambda$ circumf. $\beta\epsilon\gamma$, per polos eius
transiens, secat, eundem ad rectos angulos secat propter sphaer. 4, 15.

quam $\lambda\theta$, denique, si $\beta\epsilon$ minor sit quam $\tau\gamma$, etiam $\zeta\lambda$ minorem esse quam $\lambda\theta$.

Primum enim aequales sint circumferentiae $\beta\epsilon$ $\tau\gamma$; dico etiam $\zeta\lambda$ $\lambda\theta$ aequales esse.



Quoniam enim circumferentiae $\beta\epsilon$ $\tau\gamma$ aequales sunt, propter superius lemma etiam recta a δ ad ϵ aequalis est rectae a δ ad η . Ergo circulus ex polo δ et intervallo $\delta\epsilon$ sive $\delta\eta$ descriptus etiam per alterum punctum transibit. Describatur, et sit $\epsilon\mu\zeta$; hic igitur circulo $\alpha\beta\gamma$ parallelus erit (sphaer. 2, 1). Iam quia duo circuli $\epsilon\mu\zeta$ $\epsilon\alpha\eta$ se invicem secant, ac per polos unius et bi-

partitam sectionem α maximus circulus $\delta\alpha\lambda$ descriptus est, hic igitur etiam per polos circuli $\epsilon\alpha\eta$ transit (p. 493 adnot. 1); itaque circumferentiae $\epsilon\mu$ $\mu\zeta$ aequales sunt (sphaer. 2, 9). Sed similis est $\epsilon\mu$ circumferentiae $\zeta\lambda$, et $\mu\zeta$ circumferentiae $\lambda\theta$ (sphaer. 2, 10); ergo etiam $\zeta\lambda$ ipsi $\lambda\theta$ similis est. Et sunt eiusdem circuli; ergo aequales sunt $\zeta\lambda$ $\lambda\theta$, q. e. d.


XVI. Iam eadem figura supponatur, et sit circumferentia $\beta\epsilon$ maior quam $\xi\gamma$, et $\epsilon\alpha = \alpha\xi^*$; dico $\zeta\lambda$ maiorem esse quam $\lambda\theta$. ¹⁶

Ponatur circumferentia $\gamma\mu = \beta\epsilon$, et describatur maximus circulus $\delta\mu\nu$. Iam quia $\beta\epsilon$ $\mu\gamma$ aequales sunt, propter lemma XIV recta a δ ad ϵ aequalis est rectae a δ ad μ ; ergo cir-

*, Haec ipsa verba statim docent fieri non posse, ut plane eadem figura in hac atque in superiore propositione supponatur; nam qui illic est circulus $\beta\epsilon\eta\gamma$ hic transit in $\beta\epsilon\mu\gamma$, et quae illic est $\eta\gamma$ hic sonat $\xi\gamma$. In codicibus autem similis certe superiori figura ita exarata est, ut hemisphaerium, et quicumque in eo sunt circuli ac rectae, in planum circuli $\alpha\beta\gamma$ projecta sint, quae ratio, nisi aut absurdum aut minime perspicuam figuram describere libet, retineri non potest. Itaque Commandinum potius in figura delineanda secuti sumus.

8. 9. δ HME Hu. δ HKE ABS. δ EMH voluit Co. 10. $\alpha\delta$ HKE EMH ABS Co, corr. Hu. 14. $\tau\eta$ 10 post $\alpha\eta\alpha$ Co pro $\tau\eta$ 10

αρα πόλιν τῷ Δ διαστήματι δὲ ἐνὶ τῶν $\Delta E \Delta M$ κύκλος
 γραφόμενος ἥξει καὶ διὰ τοῦ λοιποῦ σημείου. ἐρχέσθω,
 καὶ ἔστω ὁ $\Sigma E M$, καὶ εἰλήφθω τὸ κέντρον τῆς σφαίρας
 τὸ O , καὶ ἐπεξεύχθω ἡ $O \Delta$ · ἔσται δι' ἀνάγκης ἐπὶ τὸ τοῦ
 $\Sigma M E$ κύκλου ἐπιπέδον πόλος γὰρ ἔστιν τὸ Δ τοῦ κύκλου),⁵
 καὶ ἔσται τὸ κέντρον τοῦ $M \Sigma E$ ἐπὶ τῆς ΔO . ἔστω τὸ Π ,
 καὶ ἐπιξευθεῖσα ἡ $E M$ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ T , καὶ ἡ $O E$
 ἐπὶ τὸ T , καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ $E O O P K P P P \Sigma \Pi H H T$.



καὶ ἐπεὶ τὸ Π σημεῖον ἐν τῇ τοῦ $M \Sigma E$ ἔστιν κύκλου ἐπι-
 πέδῳ, ἔστιν δὲ καὶ ἐκάτερον τῶν $P \Sigma$ ἐν τῇ τοῦ $M \Sigma E$ ¹⁰
 κύκλου ἐπιπέδῳ, τὰ τρία ἄρα σημεία ἐν τῇ κύκλῳ ἔστιν.
 πάλιν ἐπεὶ ὁ $O \Delta$ ἐν τῇ τοῦ $\Delta K \Lambda$ ἐπιπέδῳ ἔστιν, καὶ τὸ
 Π ἄρα ἐν τῇ τοῦ $\Delta K \Lambda$ ἐπιπέδῳ ἔστιν. καὶ ἡ $O P K$ εὐ-
 θεῖα· καὶ τὸ P ἄρα ἐν τῇ τοῦ $\Delta K \Lambda$ κύκλου ἔστιν ἐπι-
 πέδῳ. ἔστιν δ' ἐν αὐτῷ καὶ τὸ Σ · εὐθεῖα ἄρα ἔστιν ἡ¹⁵
 $\Pi P \Sigma$. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ἡ $\Pi H T$ εὐθεῖα ἔστιν (τὰ γὰρ
 ΠT ἐν τῇ ἐπιπέδῳ ἔστιν τοῦ $E \Sigma M$ κύκλου· ἀλλὰ καὶ ἐν
 τῇ τοῦ $\Delta H \Xi \Theta$ κύκλου ἐπιπέδῳ, καὶ τὸ H δὲ κατ' αὐτὴν
 ἔστιν τὴν τομὴν τῶν ἐπιπέδων τοῦ $E \Sigma M$ καὶ τοῦ $\Delta \Xi \Theta$
 κύκλου· εὐθεῖα ἄρα ἡ $\Pi H T$). καὶ ἐπεὶ ἴση ἔστιν ἡ $E K$ ²⁰
 περιφέρεια τῇ $K E$ περιφερείᾳ, ἴση ἔστιν καὶ γωνία ἡ
 ἐπὶ $E O K$ τῇ ὑπὸ $K O \Xi$ · ὁ ἄρα τῆς $E O$ πρὸς $O T$ λό-
 18 γος ὁ αὐτός ἐστιν τῇ τῆς $E P$ πρὸς $P T$. ἐπεὶ δὲ ζητῶ

cutus ex polo δ et intervallo $\delta\sigma$ sive $\delta\mu$ descriptus etiam per alterum punctum transibit. Transeat, et sit $\varepsilon\sigma\mu$, et sumatur sphaerae centrum σ , et iungatur $\sigma\delta$; haec igitur perpendicularis erit ad circuli $\varepsilon\sigma\mu$ planum (sphaer. 1, 10; nam circuli $\varepsilon\sigma\mu$ polus est δ), ideoque centrum eiusdem circuli erit in recta $\delta\sigma$. Sit π , et iuncta $\varepsilon\mu$ producat ad τ , itemque iuncta $\sigma\xi$ ad τ^{**} , et iungantur $\sigma\sigma\kappa$ $\pi\varrho$ $\varrho\sigma$ $\pi\eta$ $\eta\tau$. Ac quoniam et punctum π et utrumque punctorum ϱ σ in circuli $\varepsilon\sigma\mu$ plano sunt, tria igitur puncta habemus in eodem circuli plano. Rursus quia recta $\sigma\delta$ in circuli $\delta\chi\lambda$ plano est, punctum igitur π in eodem est plano. Atque item recta $\sigma\kappa$; ergo etiam ϱ in circuli $\delta\chi\lambda$ plano est. Sed in eodem est punctum σ ; ergo $\pi\varrho\sigma$ recta est¹⁾. Eadem ratione etiam $\pi\eta\tau$ recta est (nam puncta π τ sunt in plano circuli $\varepsilon\sigma\mu$; sed etiam in plano circuli $\delta\eta\xi\vartheta$, et punctum η est in ipsa sectione planorum circuli $\varepsilon\sigma\mu$ et $\delta\xi\vartheta$; ergo recta est $\pi\eta\tau$). Et quia circumferentiae ex $\kappa\xi$ aequales sunt, est igitur

$$\angle \sigma\sigma\kappa = \angle \sigma\sigma\xi; \text{ itaque (elem. 6, 3)}$$

$$\varepsilon\varrho : \varrho\tau = \varepsilon\sigma : \sigma\tau.$$

Sed quia quaeritur, quae sit ratio circumferentiae $\zeta\lambda$ ad $\lambda\vartheta^{***}$,

**) Quia recta $\varepsilon\mu$ communis est sectio circularum $\varepsilon\mu\eta$ $\beta\epsilon\mu\gamma$, et punctum ξ inter μ γ positum est, recta $\sigma\xi$, quae est in plano maximi circuli $\beta\epsilon\mu\gamma$, producta concurrat oportet cum producta $\varepsilon\mu$, quod sectionis punctum a Pappo notatur τ .

1) Quoniam propter elem. 44, 3 duorum planorum communis sectio recta linea est, punctorum π ϱ σ , quippe quae planorum $\varepsilon\sigma\mu$ $\delta\chi\lambda$ communia demonstrata sint, nulla alia positio esse potest nisi in communi circularum sectione, id est in recta.

***) Verba Graeca $\tau\acute{\iota}\varsigma \eta \zeta\lambda \pi\epsilon\rho\iota\mu\epsilon\rho\iota\sigma\alpha \tau\eta \lambda\vartheta$ non ipsam quidem proportionem, sed hanc minus definitam quaestionem significant: sitne $\zeta\lambda \geq \lambda\vartheta$, an vero $= \lambda\vartheta$. Nam id tantummodo agitur; neque certa proportionis formula ex hypothesis elici potest. Nos autem nihil impedivi, quin perspicuitatis causa ipsas proportionum formulas poneremus, quas Graecus scriptor etiam hac de causa evitavit, quia formula $\frac{a}{b} : \frac{c}{d}$ a geometrica ratione abhorrebat.

3. δ $\varepsilon\sigma\mu$ et 4 5. $\tau\sigma\delta$ $M\Delta E$ coni. Hu 7. η $O\Xi$ η III Co (et vide adnot. ad Latina) 8. $\xi\pi\iota$ $\tau\sigma$ $T\Lambda^1$ ex $\xi\pi\iota$ $\tau\sigma$ F III HT add. Hu 12-14. $\tau\sigma\delta$ AEI — $\tau\sigma\delta$ AEI — $\tau\sigma\delta$ AEI AB cod. Co. corr. S Co 16. 17. $\tau\sigma$ $\gamma\alpha\rho$ HT A, distinx. BS

id est $\epsilon\sigma$ ad $\sigma\eta$, quaeram igitur, quae sit ratio anguli $\epsilon\pi\sigma$ ad $\sigma\pi\tau$. Ergo quaenam est ratio?

$\frac{\epsilon\pi}{\pi\tau} : \frac{\epsilon\sigma}{\sigma\tau}$? Sed demonstravimus $\frac{\epsilon\sigma}{\sigma\tau} = \frac{\epsilon\sigma}{\sigma\tau}$; ergo quaeram, quae sit

$\frac{\epsilon\sigma}{\sigma\tau} : \frac{\epsilon\pi}{\pi\tau}$; ac porro quaeram, quae sit

$\frac{\epsilon\sigma^2}{\sigma\tau^2} : \frac{\epsilon\pi^2}{\pi\tau^2}$, et vicissim

$\frac{\epsilon\sigma^2}{\epsilon\pi^2} : \frac{\sigma\tau^2}{\pi\tau^2}$, et dirimendo $\frac{\epsilon\sigma^2 - \epsilon\pi^2}{\epsilon\pi^2} : \frac{\sigma\tau^2 - \pi\tau^2}{\pi\tau^2}$, id est

$\frac{\sigma\pi^2}{\epsilon\pi^2} : \frac{\sigma\pi^2}{\pi\tau^2}$. Ergo quaenam est

$\pi\pi^2 : \pi\epsilon^2$? itaque quaenam est $\pi\tau : \pi\epsilon$?

Sed $\pi\epsilon$ aequalis est ipsi $\pi\tau$; rectam autem $\pi\tau$ comparare licet cum $\pi\tau$; nam ex constructione est $\pi\tau > \pi\tau$. Iam quia est

$\pi\tau > \pi\eta$, id est

$> \pi\epsilon$, est igitur (elem. 5. 8.

$\sigma\pi : \pi\epsilon > \sigma\pi : \pi\tau$; itaque etiam

$\sigma\pi^2 : \pi\epsilon^2 > \sigma\pi^2 : \pi\tau^2$, id est componendo VII propos. 3;

$\frac{\sigma\pi^2 + \pi\epsilon^2}{\pi\epsilon^2} > \frac{\sigma\pi^2 + \pi\tau^2}{\pi\tau^2}$; itaque etiam (quia anguli $\epsilon\pi\sigma$ $\sigma\pi\tau$

recti sunt)

$\sigma\epsilon^2 : \pi\epsilon^2 > \sigma\tau^2 : \pi\tau^2$, et vicissim (VII propos. 5.

$\sigma\epsilon^2 : \sigma\tau^2 > \pi\epsilon^2 : \pi\tau^2$; itaque etiam

$\epsilon\sigma : \sigma\tau > \epsilon\pi : \pi\tau$. Sed demonstravimus esse


$\epsilon\sigma : \sigma\tau = \epsilon\sigma : \sigma\tau$; ergo est

$\epsilon\sigma : \sigma\tau > \epsilon\pi : \pi\tau$; itaque ultnot. 2.

$\angle \epsilon\pi\sigma > \angle \sigma\pi\tau$; ergo

circumf. $\epsilon\sigma > \text{circumf. } \sigma\eta$. Sed est

2. Hoc loco scriptor theoremate quodam utitur, quod facile ex



elem. 6, 3 derivatur. Nam si in triangulo $\alpha\beta\gamma$ recta $\alpha\delta$ ad basim ducta angulum α bisariam secet, est $\beta\delta : \delta\gamma = \beta\alpha : \alpha\gamma$. Iam si $\alpha\epsilon$ ita ducatur, ut sit $\angle \beta\alpha\epsilon > \angle \epsilon\alpha\gamma$, fit igitur $\beta\epsilon : \epsilon\gamma > \beta\delta : \delta\gamma$. itaque etiam $\beta\epsilon : \epsilon\gamma > \beta\alpha : \alpha\gamma$. Paulo post conversum theorema adhibetur hunc in modum: si sit $\beta\epsilon : \epsilon\gamma > \beta\alpha : \alpha\gamma$, esse etiam $\angle \beta\alpha\epsilon > \angle \epsilon\alpha\gamma$.

1. 2. $\epsilon\tau \eta$ $\angle A$ περιφέρεια τῆς $\overline{AB}$ — τῆς $\overline{CH}$ — $\epsilon\tau$ γωνία — τῆς ἐπὶ $\overline{PIT}$ $\overline{ABS}$, corr. Co 8. τὸ ante ἀπὸ $\overline{EH}$ add. BS 9. τὸ om. $\overline{ABS}$, add. Hu [conf. ad p. 304, 7] 10. πρὸς τὸ ἀπὸ $\overline{TH}$ πρὸς ἀπὸ $\overline{TH}$ $\overline{AB}$, πρὸς ἀπὸ $\overline{EH}$ S, corr. Co 12. δὲ voluit Co 23. λόγος add. BS

ΤΗ, καὶ ἡ ΕΟ ἄρα πρὸς ΟΤ μείζονα λόγον ἔχει ἢπερ ἡ ΕΠ πρὸς ΠΤ. ἀλλ' ὥς ἡ ΕΟ πρὸς ΟΤ, οὕτως ἡ ΕΡ πρὸς ΡΤ· ἡ ΕΡ ἄρα πρὸς ΡΤ μείζονα λόγον ἔχει ἢπερ ἡ ΕΠ πρὸς ΠΤ. διὰ δὴ τοῦτο μείζων γωνία ἡ ἐπὶ ΕΠΣ τῆς ἐπὶ ΣΠΤ· μείζων ἄρα ἡ ΕΣ περιφέρεια τῆς ΣΗ περι-
φερείας. ἀλλ' ἡ μὲν ΕΣ τῇ ΖΑ ἐστὶν ὁμοία, ἡ δὲ ΣΗ τῇ ΑΘ· μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ ΖΑ τῆς ΑΘ, ὥπερ: ~


- 19 ιζ'. Ἀλλ' ἔστω ἡ ΖΑ ἴση τῇ ΑΘ· λέγω ὅτι ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ΕΚ τῆς ΚΞ.

Ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ ΖΑ τῇ ΑΘ, ἴση ἐστὶν ἡ ἐπὶ 10 ΕΠΣ τῇ ἐπὶ ΣΠΤ· ὁ ἄρα τῆς ΕΠ πρὸς ΠΤ λόγος ὁ αὐτός ἐστιν τῷ τῆς ΕΡ πρὸς ΡΤ. ἐπεὶ δὲ ζητῶ τίς περιφέρεια ἡ ΕΚ τῇ ΚΞ, ζητήσω ἄρα τίς γωνία ἡ ἐπὶ ΕΟΚ τῇ ἐπὶ ΚΟΤ· ζητήσω ἄρα τίς ὁ τῆς ΕΟ πρὸς ΟΤ λόγος τῷ τῆς ΕΡ πρὸς ΡΤ λόγῳ. ἀλλ' ὁ τῆς ΕΡ πρὸς ΡΤ λό-
γος ὁ αὐτός ἐστιν τῷ τῆς ΕΠ πρὸς ΠΤ· ζητήσω ἄρα τίς ὁ τῆς ΕΠ πρὸς ΠΤ τῷ τῆς ΕΟ πρὸς ΟΤ· ἔχει δὲ σύγ-
χρισιν. ἐπεὶ οὖν ἡ ΕΟ πρὸς ΟΤ μείζονα λόγον ἔχει ἢπερ ἡ ΕΠ πρὸς ΠΤ (τοῦτο γὰρ προδεδείχται), ἀλλ' ὥς ἡ ΕΠ πρὸς ΠΤ, οὕτως ἡ ΕΡ πρὸς ΡΤ, ἡ ΕΡ ἄρα πρὸς ΡΤ 20 ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢπερ ἡ ΕΟ πρὸς ΟΤ. διὰ δὴ τοῦτο ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ἐπὶ ΕΟΚ τῆς ἐπὶ ΚΟΤ· ἐλάσσων ἄρα περιφέρεια ἡ ΕΚ τῆς ΚΞ, ὥπερ: ~

- 20 ιη'. Τεμνέντωσαν ἀλλήλους δύο μέγιστοι κύκλοι οἱ ΑΒΓ ΒΡΓ, καὶ ἔστω ὁ πόλος τοῦ ΑΒΓ κύκλου ὁ Α, καὶ γε-
γράφωσαν μέγιστοι κύκλοι οἱ ΑΖ ΑΘ ΑΑ ΑΝ, καὶ ἔστω 25 ἴση ἡ ΕΞ τῇ ΠΜ· λέγω ὅτι, εἰ μὲν ἴση ἐστὶν ἡ ΒΕ τῇ ΜΓ, ἴση ἐστὶν καὶ ἡ ΖΘ τῇ ΑΝ, εἰ δὲ μείζων ἐστὶν ἡ

8. ἴσων add. B'S 13—14. τί περιφέρεια — τί γωνία — τῆς ἐπὶ ΚΟΤ ABS, corr. Co 15. λόγῳ — πρὸς ΡΤ om. S λόγος add. Hu auctore Co 16. ὁ add. RS 24. ιη^{ον} add. B'S 26. ΑΖ ΑΑ ΑΘ ABS, transposuit Co ΑΝ Co, ΝΑ AB; sed cum N in A simile sit H, in S migravit ἡδ^{ον} similiter posthac vs. 28 et p. 302, 1, ubi ΑΝ AB, λῆ S;

BE τῆς $ΜΓ$, μείζων ἐστὶν ἢ $ZΘ$ τῆς $ΑΝ$, εἰ δὲ ἐλάσσων
ἐστὶν ἢ BE τῆς $ΜΓ$, ἐλάσσων ἐστὶν ἢ $ZΘ$ τῆς $ΑΝ$.



ὑποκείσθω ἴσῃ ἢ
 BE τῇ $ΜΓ$. ἴσῃ ἄρα
ἐστὶν ἢ ἀπὸ τοῦ A ἐπὶ 5
τὸ M τῇ ἀπὸ τοῦ A ἐπὶ
τὸ E . ὁ ἄρα πόλῳ τῷ
 A διαστήματι δὲ ἐνὶ τῶν
 AE AM κύκλος γραφόμενος ἔξει καὶ διὰ τοῦ 10
λοιποῦ σημείου. γεγράφθω, καὶ ἔστω ὁ $ΕΤΜ$,
καὶ τετμήσθω διέκῃ ἢ
 $ΕΠ$ τῷ P , καὶ γεγράφθω διὰ τῶν A P μέ- 15
γιστος κύκλος ὁ $ΑΡΣ$.
καὶ ἐπεὶ ἴσῃ ἐστὶν ἢ


$ΕΞ$ τῇ $ΠΜ$, ἀλλὰ καὶ ἢ BE τῇ $ΜΓ$ ἴσῃ ἐστὶν, ὅλῃ ἄρα ἢ
 $BΞ$ τῇ $ΓΗ$ ἴσῃ ἐστὶν. ἴσῃ ἄρα ἢ ἀπὸ τοῦ A ἐπὶ τὸ $Ξ$ τῇ
ἀπὸ τοῦ A ἐπὶ τὸ $Η$. πόλῳ οὖν τῷ A διαστήματι δὲ 20
ἐνὶ τῶν AE $ΑΠ$ κύκλος γεγράφθω ὁ $ΕΟΠ$. καὶ ἐπεὶ ἴσῃ
ἐστὶν ἢ $ΕΟ$ τῇ $ΟΠ$, ἀλλ' ἢ μὲν $ΕΟ$ τῇ $ΘΣ$ ἐστὶν ὁμοία,
ἢ δὲ $ΟΠ$ τῇ $ΣΑ$ ἐστὶν ὁμοία, καὶ ἢ $ΘΣ$ ἄρα τῇ $ΣΑ$ ἐστὶν
ὁμοία. καὶ εἰσὶν τοῦ αὐτοῦ κύκλου. ἴσῃ ἄρα ἐστὶν ἢ $ΘΣ$
τῇ $ΣΑ$. πάλιν ἐπεὶ ἴσῃ ἐστὶν ἢ EB τῇ $ΓΜ$, ἴσῃ ἐστὶν 25
καὶ ἢ $ZΣ$ τῇ $ΣΝ$. καὶ λοιπὴ ἄρα ἢ $ZΘ$ λοιπὴ τῇ $ΝΑ$ ἐστὶν
ἴσῃ, ὅπερ: ~

- 21 Ἀλλὰ δὲ ὑποκείσθω τὸ αὐτὸ σχῆμα. ἔστω δὲ μείζων
ἢ BE τῆς $ΓΞ$, ἴσῃ δὲ ἢ EY τῇ $ΕΨ$, καὶ γεγράφθω διὰ
τῶν A $Ψ$ κύκλος μέγιστος ὁ $ΑΨΚΑ$. λέγω δτι μείζων 30
ἐστὶν ἢ $ZΘ$ τῆς $ΑΟ$.

Κατεσκευάσθω γὰρ τὸ σχῆμα ὁμοίως τοῖς ἐπάνω, καὶ

2. τῆς AN in A prima manus mutavit in τῆς $ΑΗ$, quod propa-
gatum est in S. τῆς $λμ$ B 8. διαστήματι A 18. τῶν AP A, di-
stinx. BS 28. τῇ $ση$ S ἄρα add. Hu λοιπὴ om. S τῇ $ηλ$ S
28. initio 19^o add. B S 30. τῶν AP A, distinx. BS

- ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ BPT γωνία τῇ ὑπὸ XHP , ἐστὶν ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ PH πρὸς τὸ ἀπὸ HB , οὕτως τὸ ὑπὸ TPX πρὸς τὸ ὑπὸ KET . καὶ ἐπεὶ ζητῶ τίς ἡ ZΘ περιφέρεια τῇ ΑΟ , τουτέστιν ἡ EH τῇ ΚΦ , ζητήσω ἄρα τίς γωνία ἡ ἐπὶ EST γωνία τῇ ὑπὸ XSP . ζητήσω ἄρα τίς ὁ τοῦ ἀπὸ ES πρὸς τὸ ἀπὸ SP λόγος τῷ τοῦ ὑπὸ KET πρὸς τὸ ὑπὸ TPX , τουτέστι τῷ ἀπὸ EH πρὸς τὸ ἀπὸ HP . ἔχει δὲ σύγκρισιν. καὶ ἐστὶν ὁ τοῦ ἀπὸ EH πρὸς τὸ ἀπὸ HP μείζων τοῦ ὅν ἔχει τὸ ἀπὸ ES πρὸς τὸ ἀπὸ SP . ὁμοίως γὰρ τῷ ἐπάνω δεῖξομεν. ἀλλ' ὡς τὸ ἀπὸ EH πρὸς τὸ ἀπὸ HP , οὕτως τὸ ὑπὸ KET πρὸς τὸ ὑπὸ TPX . τὸ ἄρα ὑπὸ KET πρὸς τὸ ὑπὸ TPX μείζονα λόγον ἔχει ἢ περὶ τὸ ἀπὸ ES πρὸς τὸ ἀπὸ SP . διὰ δὴ τοῦτο μείζων ἐστὶν ἡ ὑπὸ EST τῆς ὑπὸ XSP . μείζων ἄρα ἡ ZΘ περιφέρεια τῆς ΑΟ περιφερείας.
- 22 Ἐστω δὲ ἴση ἡ ΑΟ τῇ ZΘ . λέγω ὅτι ἐλάττων ἐστὶν ἡ EY τῆς ΨΞ .



Ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν περιφέρεια ἡ ZΘ τῇ ΑΟ , ἴση ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ EH περιφέρεια τῇ ΚΦ ὁμοία γὰρ ἡ μὲν ZΘ τῇ EH , ἡ δὲ ΑΟ τῇ ΚΦ , ὥστε καὶ γωνία ἡ ἐπὶ EST τῇ ὑπὸ XSP ἐστὶν ἴση· ὁ ἄρα τοῦ ἀπὸ SE πρὸς τὸ ἀπὸ SP λόγος ὁ αὐτὸς ἐστὶν τῷ τοῦ ὑπὸ KET πρὸς τὸ ὑπὸ TPX . ἐπεὶ δὲ ζητῶ τίς ἡ EY τῇ ΨΞ , ζητήσω ἄρα τίς ὁ

$\angle \varepsilon \pi \tau = \angle \chi \pi \varrho$, est igitur propter propos. 12

$\pi \varrho^2 : \pi \varepsilon^2 = \tau \varrho \cdot \varrho \chi : \chi \varepsilon \cdot \varepsilon \tau$. Et quia quaero, quae sit ratio circumferentiae

$\zeta \vartheta : \lambda \theta$, id est $\varepsilon \eta : \kappa \varphi$, quaeram igitur, quae sit

$\angle \varepsilon \sigma \tau : \angle \chi \sigma \varrho$; itaque quaeram, quae sit ratio²:

$\frac{\varepsilon \sigma^2}{\sigma \varrho^2} = \frac{\chi \varepsilon \cdot \varepsilon \tau}{\tau \varrho \cdot \varrho \chi}$, id est $\frac{\varepsilon \sigma^2}{\sigma \varrho^2} = \frac{\varepsilon \eta^2}{\pi \varrho^2}$. Haec autem inter se comparari possunt; similiter enim ac supra p. 499 demonstrabimus esse

$\frac{\varepsilon \eta^2}{\pi \varrho^2} > \frac{\varepsilon \sigma^2}{\sigma \varrho^2}$. Sed demonstravimus etiam

$\frac{\varepsilon \eta^2}{\pi \varrho^2} = \frac{\chi \varepsilon \cdot \varepsilon \tau}{\tau \varrho \cdot \varrho \chi}$; ergo est

$\chi \varepsilon \cdot \varepsilon \tau : \tau \varrho \cdot \varrho \chi > \varepsilon \sigma^2 : \sigma \varrho^2$; itaque propter propos. 13

$\angle \varepsilon \sigma \tau > \angle \chi \sigma \varrho$. Ergo est

circumf. $\varepsilon \eta >$ circumf. $\kappa \varphi$, id est

circumf. $\zeta \vartheta >$ circumf. $\lambda \theta$.

Iam sit circumferentia $\lambda \theta = \zeta \vartheta$; dico esse $\varepsilon \nu < \psi \xi$. Prop. 20

Quoniam enim circumferentiae $\zeta \vartheta$ $\lambda \theta$ aequales sunt, et $\zeta \vartheta$ similis circumferentiae $\varepsilon \eta$, et $\lambda \theta$ similis ipsi $\kappa \varphi$, aequales igitur sunt circumferentiae $\varepsilon \eta$ $\kappa \varphi$; itaque est etiam (elem. J. 27)

$\angle \varepsilon \sigma \tau = \angle \chi \sigma \varrho$. Ergo propter propos. 12 est

$\varepsilon \sigma^2 : \sigma \varrho^2 = \chi \varepsilon \cdot \varepsilon \tau : \tau \varrho \cdot \varrho \chi$. Sed quia quaero, quae sit ratio $\varepsilon \nu : \psi \xi$, quaeram igitur

2) Ex huius libri propositione 12, collata etiam propos. 13, facile derivatur lemma huius modi: si extra triangulum $\sigma \tau \chi$ ad productam basim rectae $\sigma \varepsilon$ $\sigma \varrho$ ita ducantur, ut sit $\angle \varepsilon \sigma \tau = \angle \chi \sigma \varrho$, esse etiam $\chi \varepsilon \cdot \varepsilon \tau : \tau \varrho \cdot \varrho \chi = \varepsilon \sigma^2 : \sigma \varrho^2$. Et conf. supra p. 499 adnot. 2.

2. τὸ (ante ἀπὸ ΗΕ; add. Hu auctore Co 3—5. τὶ ἢ ΖΗ — τῆς ΑΘ — τῆς ΚΦ — ἄρα τὶ — γωνίας τῆς ABS, corr. Co 4. γωνία ἢ ὑπὸ et 6. λόγος Α² in rasura 7. τὸ om. ABS, item posthac usque ad finem cap. 22 saepius ante ἀπὸ in formula quadrati: semel etiam (p. 506, 2) ante ὑπὸ in formula rectanguli 12. τὸ ante ἀπὸ ΣΡ add. S, item p. 506, 2. 4 17. τῆς ΗΘ ABS, corr. Co 20. τῆς ὑπὸ ΧΕΡ ABS, corr. Co 21. 22. πρὸς τὸ ὑπὸ ΤΡΑ ABS, corr. idem 22. τὶ ἢ ΕΥ τῆς ΨΞ ABS, corr. idem

τοῦ ἀπὸ ΕΠ πρὸς τὸ ἀπὸ ΠΡ λόγος τῷ τοῦ ὑπὸ ΧΕΤ
πρὸς τὸ ὑπὸ ΤΡΧ, τουτέστιν τῷ τοῦ ἀπὸ ΕΣ πρὸς τὸ ἀπὸ
ΣΡ. ἔχει δὲ σύγκρισιν· ἐπεὶ οὖν τὸ ἀπὸ ΕΠ πρὸς τὸ ἀπὸ
ΠΡ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ἀπὸ ΕΣ πρὸς τὸ ἀπὸ ΣΡ,
τουτέστιν ἥπερ τὸ ὑπὸ ΧΕΤ πρὸς τὸ ὑπὸ ΤΡΧ, καὶ τὸ⁵
ὑπὸ ΧΕΤ ἄρα πρὸς τὸ ὑπὸ ΤΡΧ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ
τὸ ἀπὸ ΕΠ πρὸς τὸ ἀπὸ ΠΡ. διὰ δὲ τοῦτο ἐλάσσων ἐστὶν
ἢ ὑπὸ ΕΠΤ τῆς ὑπὸ ΧΠΡ· ἐλάσσων ἄρα ἢ ΕΥ τῆς ΞΨ,
ὁπερ· ~

- 23 α'. Αεδειγμένων δὴ τούτων ἐξῆς ἀποδείξομεν εἰς δ¹⁰
ταῦτα ἐλήφθη. "ἐὰν ἐπὶ μέγιστον κύκλοι περιφερείας ὁ
πόλος ἢ τῶν παραλλήλων καὶ τοῦτον τέμνωσιν δύο μέγιστοι
κύκλοι, ὧν ὁ μὲν εἰς τῶν παραλλήλων, ὁ δὲ ἕτερος λοξὸς
πρὸς τοὺς παραλλήλους, ἀπὸ δὲ τοῦ λοξοῦ κύκλον ἴσαι
περιφέρεια ἀποληφθῶσιν ἐξῆς ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τοῦ με-¹⁵
γίστου τῶν παραλλήλων, διὰ δὲ τῶν γενομένων σημείων
καὶ τοῦ πόλου μέγιστοι κύκλοι γραφῶσιν, ἀνίσους ἀπολή-
ψονται περιφερείας τοῦ μεγίστου τῶν παραλλήλων, καὶ
μείζονα αὖ τὴν ἔγγιον τοῦ μεγίστου κύκλου τοῦ ἐξ ἀρχῆς
τῆς ἀπώτερων".²⁰

- 24 Ἐνθάδε οἴονται τινες προσκεῖσθαι τὸ πρὸς ὀρθάς,
ἐπειδὴ καὶ εἰς τὸ πρὸ αὐτοῦ ἀποδείκνυται ἐν τοῖς εἰς τὰ
σφαιρικά λαμβανομένοις ὅτι δεῖ προσκεῖσθαι τὸ πρὸς ὀρθάς.
Ἐὰν γὰρ ἐκθώμεθα τὸν διὰ τῶν πόλων τῆς σφαίρας
τὸν ΑΒΓΔ καὶ τοὺς τέμνοντας αὐτὸν δύο μεγίστους κύ-²⁵
κλους τοὺς ΒΕΔ ΑΕΓ, ὧν τὸν μὲν ΒΕΔ τῶν παραλλήλων,
τὸν δὲ ΑΕΓ λοξὸν πρὸς τοῖς παραλλήλους, καὶ ἀπολά-
βωμεν ἀπὸ τοῦ ΑΕΓ ἴσας τὰς ΖΗ ΗΘ, καὶ γράψωμεν
διὰ τῶν Ζ Η Θ παραλλήλους τῷ ΒΕΔ, οὐ πάντως

2. τῷ τοῦ Ηυ pro τὸ 40. 19' add. Ηυ 41. ἐὰν — 20. ἀπώ-
τερων praeis admodum mutatis quae nos hic adnotamus) repetita sunt
e Theodosii sphaer. 3, 6 43. post κύκλοι apud Theodosium vulgo
additur πρὸς ὀρθάς 46. διὰ δὲ καὶ διὰ Theodos. 48. post παρ-
αλλήλων add. τὰς μεταξὺ αὐτῶν Theodos. 49. 20. ἔγγιον τοῦ ἐξ
ἀρχῆς μεγίστου κύκλου τῆς πορωτέρας Theodos. 21. initio x^{oi} add.
B (Paris. 2368; 29. τῶν ΖΗΘ A. corr. BS

tur quae sit ratio $\angle \varepsilon\pi\tau : \angle \chi\pi\rho$, ac porro, quae sit ratio¹⁾

$$\frac{\varepsilon\pi^2}{\pi\rho^2} : \frac{\chi\varepsilon \cdot \varepsilon\tau}{\tau\rho \cdot \rho\chi}, \text{ id est } \frac{\varepsilon\pi^2}{\pi\rho^2} : \frac{\varepsilon\sigma^2}{\sigma\rho^2};$$

haec autem inter se comparari possunt (ut supra p. 499 demonstratum est). Iam quia est

$$\varepsilon\pi^2 : \pi\rho^2 > \varepsilon\sigma^2 : \sigma\rho^2, \text{ id est}$$

$$> \chi\varepsilon \cdot \varepsilon\tau : \tau\rho \cdot \rho\chi, \text{ est igitur}$$

$$\chi\varepsilon \cdot \varepsilon\tau : \tau\rho \cdot \rho\chi < \varepsilon\pi^2 : \pi\rho^2. \text{ Ergo propter propos. 13 est}$$

$$\angle \varepsilon\pi\tau < \angle \chi\pi\rho; \text{ itaque}$$

$$\text{circumf. } \varepsilon\nu < \text{circumf. } \psi\xi, \text{ q. e. d.}$$

XIX. His igitur demonstratis exponemus, quem ad finem haec *lemmata* adsumpserimus. "Si in circumferentia maximi circuli", inquit Theodosius *sphaer.* 3, 6, "sit polus parallelorum, eumque circulum secent duo maximi circuli, quorum alter sit unus parallelorum, alter autem obliquus ad parallelos, atque ab obliquo circulo aequales circumferentiae deinceps ad easdem partes maximi illius paralleli abscindantur, et per puncta quae ita fiunt ac per polum maximi circuli describantur, hi inaequales circumferentias a maximo parallelo abscindent, et maior quidem semper erit ea quae propior est primario maximo circulo, quam illa quae remotior".

Hic nonnulli verba "ad rectos angulos" addenda esse existimant, quoniam item ad quintum *eiusdem libri theorema* inter *lemmata*, quae ad *sphaerica* adduntur, eadem verba "ad rectos angulos" deesse non posse demonstratur.

Nam si circulum $\alpha\beta\gamma\delta$ per polos sphaerae transeuntem Prop. 21 et duos maximos circulos $\beta\delta$ $\alpha\gamma$ eum secantes exponamus, quorum alter $\beta\delta$ sit unus parallelorum, alter autem $\alpha\gamma$ obliquus ad parallelos, et a circumferentia $\alpha\epsilon$ aequales *portiones* $\xi\eta$ $\nu\theta$ abscindamus, et per puncta ξ η θ circulos ipsi $\beta\delta$ parallelos describamus, hi non utique secabunt circumferen-

1) Conf. p. 503 adnot. 2. Quae autem hoc loco nos addidimus, ea Graecus scriptor omisit. quoniam in superiore propositione eadem iam tractata sunt.


τέμνουσιν τὴν AB περιφέρειαν ἵαν δὲ ἢ ἡ AE μὴ μείζων τετραγώνου). εἴτα ἀποδείκνυται ἐν τοῖς εἰς τὰ σφαιρικά ἔτι τὸ πρὸς ὀρθῶς κείμεν, ἵνα ἡ τετραγώνου. εἴτα τὸ αὐτὸ



οἶονται προσκεῖσθαι τῇ ζ' θεωρήματι, διότι διὰ τοῦ πρὸ αὐτοῦ, φασιν, δεικνύται [κεῖ δὲ χρησιμὸν ἔστιν τὸ πρὸς ὀρθῶς]. ἔστιν δὲ τοῦτο σφόδρα εὔηθες· ἐρεῖ γάρ τις "οὐχὶ διὰ τοῦ πρὸ αὐτοῦ, ὅπου χρησιμὸν ἦν αὐτοὺς προσθεῖναι, τοῦτο δεικνύεις· πάντως οὖν καὶ ἑτέρα δεῖξις ἢ μὴ προσ-
χρησαμένη τῷ πρὸ αὐτοῦ δεῖξει τὸ προκείμενον". ἔνιοι δὲ οἶονται διὰ τοῦτο προσκεῖσθαι· γράψαντες γὰρ παραλλή-
λους κύκλους καὶ θέντες τῇ KH ἴσην τὴν HA καὶ διὰ τοῦ
 A γράψαντες παράλληλον κύκλον τὸν AE λέγουσιν "ἐπεὶ
οἱ AEI AEB τὸν ABI πρὸς ὀρθῶς τέμνουσιν, τετρα-
γώνου ἄρα ἔστιν ἡ EB . ἐλάσσων ἄρα τετραγώνου ἡ AE
τοῦ ἰδίου κύκλου", ἵνα εἴπωσιν "ἐπεὶ οὖν κύκλον τοῦ EB
ἐπὶ εὐθείας τῆς ἀπὸ Ξ ὀρθὸν ἱμῆμα ἐφάσθηκε τὸ EA καὶ
τὸ συνεχὲς αὐτῶν, καὶ διήρηται ἰς τοῦ ἑφαστῶτος περιφέρειαν

1. τεμνοῦσιν coni. Hu auctore Co δὲ Hu pro μὴ 2. τετρα-
γώνου] in promptu est τετραγώνου conticere; at scriptor et hoc loco
et passim posthac τετραγώνου circumferentiam eam appellat quam la-
tus quadrati circulo inscripti subtendit 3. εἴτα τὸ αὐτὸ Hu, εἰς δὲ
τοῦς διὰ τῶν πόλων ABS, alii autem ad rectos angulos Co 4. ζ' A,
 ζ B, ἔστιν S 5. $\epsilon\kappa\tau\iota$ -- ὀρθῶς interpolatori quidam addidisse vi-
detur ex vs. 7 6. ἔστιν τὸ Hu auctore Co pro ἐν τῷ 7. αὐτοῖς
forsitan "interpretes theorematum" significet: αὐτὸ voluit Co

tiam ap secant scilicet, si ae non maior sit quadrante. Itaque in lemmatis ad sphaerica ostenditur verba "ad rectos angulos" propterea apposita esse, ut circumferentia ae quadrantis esse significetur. Proinde eadem sexto theoremati addenda esse opinantur, quoniam id ipsum, inquit, ex quinto demonstratur. Hoc autem perquam ineptum est; nam iure aliquis contra dixerit: "minime ex quinto, ubi opus erat ea verba apponere, sextum theorema demonstres necesse est; nam sine dubio alia etiam demonstratio, quae non innitatur superiore theoremate, efficiet id quod propositum est". Alii vero eadem verba his de causis adicienda esse censent. Postquam enim parallelos circulos descripserunt et circumferentiae




$\eta\lambda$ aequalem $\eta\lambda$ posuerunt et per λ parallelum circumculum $\lambda\xi$ descripserunt, sic dicunt: "quoniam maximi circuli $ae\gamma$ $\beta e\delta$ maximum $ab\gamma\delta$ ad rectos angulos secant, circumferentia igitur βe quadrantis est; ergo circumferentia $\lambda\xi$ minor est

quadrante circuli $\lambda\xi$ "; quae praemittunt, ut pergere possint hunc in modum: "quoniam circulo $\xi\theta$ in recta $\xi\gamma$ perpendicularare

*) Ad ea quae tota propositione 21 traduntur una tantummodo figura in codicibus exstat similis illi quam Theodosius sphaer. 3, 6 exhibet; at quinque demum figuris apposis quae supra nostra coniectura descriptae sunt, verba et Pappi et eorum, contra quos disputat, denique etiam interpolatoris cuiusdam, perspicua facta sunt. Atque hoc quidem loco nos, litteris μ ν additis, circumculum $\xi\lambda\mu\nu$ plenum descripsimus; itaque breviter "in recta $\xi\gamma$ ", id est in recta quae circumculum $ae\gamma$ $\xi\lambda\mu\nu$ sectionis puncta iungit, diximus pro Graecis $\epsilon\lambda\lambda\epsilon\gamma\gamma\epsilon\lambda\alpha\varsigma$ $\tau\eta\varsigma$ $\alpha\pi\omicron$ ξ . Item paulo post segmentum $\xi\lambda\mu\nu$ appellavimus quod Graecus scriptor obscurius $\tau\eta\mu\eta\alpha$ $\tau\omicron$ ξ . λ $\chi\alpha\iota$ $\tau\omicron$ $\sigma\tau\epsilon\gamma\chi\epsilon\varsigma$ $\alpha\upsilon\tau\eta\varsigma$ significat. Ceterum ubique proxima propositio 22 conferenda est.

εἰς ἄνισα κατὰ τὸ Λ , καὶ ἔστιν ἐλάσσων ἢ ἡμίσεια ἡ $\Lambda\Xi$,
 ἢ ἄρα ἀπὸ τοῦ Ξ ἐπὶ τὸ Λ ἐλαχίστη ἐστὶ πασῶν". εἰς
 τοῦτ' ὁλονται χρήσιμον εἶναι τὸ πρὸς ὁρθάς, ἵνα ἡ $\Xi\Lambda$
 ἐλάσσων ἢ ἡ ἡμίσεια τοῦ ἐφεστῶτος τμήματος, ἔστιν δὲ
 τοῦτο εἰκαῖον. ἐάν τε γὰρ μείζων ἢ ἡ ἡμίσεια ἐάν τε 5
 25 ἐλάττων ἢ ἡμίσεια, γίνεται τὸ προκείμενον. ἐάν γὰρ εἰς
 κύκλον, ὡς τὸν $\Pi\Theta$, διαχθῇ τις εὐθεῖα παράλληλος τῇ




διαμέτρῳ τῇ ἀπὸ τοῦ Θ ,
 ὥσπερ ἡ ἀπὸ τοῦ Ξ , κοινὴ
 τομὴ τῶν $\Pi\Xi$ $\Lambda\Xi$, καὶ ἐπ' 10
 αὐτῆς τμήμα ἐπισταθῇ, ὡς
 τὸ $\Xi\Lambda$, καὶ ἐπ' αὐτοῦ τυ-
 χὸν σημεῖον ληφθῇ, ὡς τὸ
 Λ , ἡ ἀπὸ τοῦ Λ ἐπὶ τὸ Ξ
 ἐλάσσων ἔστιν πασῶν τῶν 15
 ἀπὸ τοῦ Λ πρὸς τὴν με-
 ταξὺ τῆς τε διαμέτρου καὶ
 τῆς παραλλήλου αὐτῇ προ-
 σπιπτονσῶν εὐθειῶν, ὡς

ἔξῃς δείξομεν· ὥστε οὐδὲ διὰ τοῦτο προσετέθη ἂν τὸ πρὸς 20
 ὁρθάς ἄλλ' ἐπειδὴ συμβαίνει, ὅταν μὲν ἡ $\Lambda\Xi$ τετραγώνου ἢ,
 μείζονα πάντως γίνεσθαι τὴν $ΟΠ$ τῆς ΠP , ὅταν δὲ μείζων
 ἢ ἐλάττων ἢ, ποτὲ μὲν ἡ $ΟΠ$ τῆς PII μείζων, ποτὲ δὲ
 ἐλάσσων ἔσται, ποτὲ δὲ ἴση αὐτῇ· τοῦτο γὰρ ἔξῃς].
 26 κ'. Ἐστω δὲ νῦν δεῖξαι τὸ λημμάτιον τὸ λαμβανόμενον 25
 εἰς αὐτό.

Ἐστω κύκλος ὁ $\Lambda B\Gamma$, διάμετρος δὲ ἡ $B\Gamma$, καὶ ταύτῃ
 παράλληλος ἡ ΔE , καὶ ἐπὶ τῆς ΔE εὐθείας τμήμα ἐφε-
 στάτω τὸ ΛZE ὁρθὸν πρὸς τὸν $\Lambda B\Gamma$, καὶ εἰλήφθω ἐπ'
 αὐτῆς τυχὸν σημεῖον τὸ Z , καὶ ἐπεξείχθω ἡ $Z\Lambda$ · λέγω ὅτι 30
 ἡ $Z\Lambda$ οὐ μόνον ἐλαχίστη ἐστὶν τῶν πρὸς τὴν ΔB περιφέ-

1. ἢ (ante ἡμισ.) Hu ancloro Co pro ἢ 1. 2. ἡ $\Lambda\Xi$ ἢ Hu pro ἡ
 ΛH 5. γὰρ om. S 8. τῇ ἀπὸ τοῦ Θ huc transposuit Hu, cum
 in ABS vs. 10 post τῶν $\Pi\Xi$ $\Lambda\Xi$ addita sint παράλληλος τῇ ἀπὸ τοῦ Θ
 18. αὐτῆς ΛB , corr. S 20. 21. προσετέθησαν αὐτῷ ὁρθὸς ABS, corr.
 Hu 21. ἄλλ' — 24. ἔξῃς interpolatori tribuit Hu 23. ἡ $ΟΠ$ Co

insistit segmentum $\xi\lambda\mu\nu$, eiusque circumferentia inaequaliter divisa est in puncto λ , et portio $\lambda\xi$ minor est quam dimidia pars totius circumferentiae, recta igitur quae a λ ad ξ ducitur omnium minima est¹⁾. Additamentum igitur "ad rectos angulos" ad hoc utile esse existimant, ut $\xi\lambda$ minor sit quam dimidia pars circumferentiae segmenti constituti. At hoc absurdum est. Nam sive $\xi\lambda$ maior sive minor est quam dimidia, contingit id quod propositum est. Nam si in circulo, velut $\pi\theta$, ducatur recta diametro $\pi\theta$ parallela, velut $\xi\nu$ ²⁾, communis sectio circulorum $\pi\nu\xi\theta$ $\xi\mu\lambda\nu$, in eaque segmentum velut $\xi\mu\lambda\nu$ constituitur, et in eo quodlibet punctum λ sumatur, recta $\lambda\xi$ minima est omnium a puncto λ ad circumferentiam quae est inter diametrum $\theta\pi$ et parallelam $\xi\nu$ pertingentium, ut deinceps (propos. 22) demonstrabimus; quapropter ne haec quidem idonea causa fuerit, cur illud "ad rectos angulos" apponeretur (sed quia contingit, ut, si ae quadrans sit, utique maior fiat $o\pi$ quam $\pi\rho$. Sin vero ae maior vel minor quadrante erit, $o\pi$ vel maior erit quam $\pi\rho$, vel minor, vel eidem aequalis: nam haec deinceps (propos. 25—27) ostendentur.



XX. Iam vero lemma, quod huc adsumitur, demonstrandum est. Prop. 22

Sit circulus $\alpha\beta\gamma$, cuius diameter $\beta\gamma$, eique parallela recta $\delta\epsilon$, et in ea segmentum $\delta\zeta\epsilon$ insistat perpendicularare ad circulum $\alpha\beta\gamma$, et in circumferentia eius quodvis punctum ζ sumatur, et iungatur $\zeta\delta$; dico rectam $\zeta\delta$ non solum minimam esse omnium quae ad circumferentiam $\delta\beta$ pertingunt, sed

† Horum quoque verborum sententia proxima propositione illustratur.

** Rursus ut supra adnot. *; perspicuitatis causa litteras μ et addidimus.

etiam, si diametri $\epsilon\theta\lambda$ $\delta\theta\lambda$ ducantur, omnium quae ad circumferentiam $\delta\lambda$ pertinent.

Ducatur enim quaelibet recta $\zeta\nu$, et a ζ ad planum subiectum perpendicularis ducatur, quae in communem sectionem planorum $\delta\zeta\epsilon$ $\alpha\beta\gamma$ cadet (elem. 11, 38). Cadat in punctum μ , et iungatur $\mu\nu$. Et quia quaero, sitne $\zeta\nu$ maior quam $\zeta\delta$, quaeram igitur, sitne

$\zeta\nu^2 > \zeta\delta^2$. Sed est $\zeta\nu^2 = \zeta\mu^2 + \mu\nu^2$, et
 $\zeta\delta^2 = \zeta\mu^2 + \mu\delta^2$; ergo demonstrandum est $\mu\nu^2 > \mu\delta^2$, vel


$\mu\nu > \mu\delta$.

Iungatur $\mu\theta$ et producat ad ξ a puncta circumferentiae; ergo $\alpha\xi$ circuli diametrus erit, et propter elem. 3. 7 $\mu\xi$ maxima, $\mu\alpha$ autem minima erit omnium rectarum quae a μ ad circumferentiam ducuntur, et ea quae centro propior est semper maior remotiore; ergo est $\mu\nu > \mu\delta$, q. e. d.

XXI. His igitur praemissis demonstrandum est theorema, Prop. 28
 in quo per polum et per terminos aequalium circumferentiarum ab obliquo circulo abscissarum *maximi* circuli describuntur¹.

Etenim in sphaera maximum circulum $\alpha\beta\gamma$ duo maximi circuli $\beta\gamma$ $\delta\epsilon$ ad rectos angulos secent, quorum alter $\beta\gamma$ sit unus parallelorum, alter autem $\delta\epsilon$ obliquus ad parallelos, a

quo abscindantur aequales circumferentiae $\zeta\eta$ $\eta\theta$, polum autem parallelorum sit α , et describantur maximi circuli $\alpha\theta\mu$ $\alpha\eta\nu$ $\alpha\zeta\xi$; demonstretur circumferentiam $\mu\nu$ maiorem esse quam $\nu\xi$.



Compleantur circuli $\beta\gamma$ $\delta\epsilon$, atque invicem se secent in punctis κ λ , et quia utraque circumferentiarum $\delta\kappa$ $\delta\lambda$ quadrantis

¹ His verbis apparet idem Theodosii theorema significari, de quo Pappus inde a cap. 13 huius libri agit, scilicet sphaer. 3. 6.

ἡ $\Lambda\Theta$ τῆς ZK . ὅτι οὖν δύο κύκλοι τέμνουσιν ἀλλήλους οἱ $B\Gamma A$ $E\Lambda$ 1, καὶ ἔστιν ὁ τοῦ $B\Gamma A$ πόλος τὸ Λ , καὶ γεγραμμένοι εἰσὶν μέγιστοι κύκλοι οἱ AM AN $A\Xi$, καὶ ἔστιν μείζων ἡ $\Lambda\Theta$ τῆς ZK , ἴση δὲ ἡ ΘH τῇ HZ , μείζων ἄρα καὶ ἡ MN τῆς $N\Xi$ διὰ τὰ προδεδειγμένα, ὅπερ: ~ 5
 κβ'. Λέγω δὴ ὅτι, ἐὰν μὴ πρόσκειται τὸ πρὸς ὀρθάς, οὐ πάντοτε γίνεται τὰ κατὰ τὴν πρότασιν.

- 25 Ὑποκείσθω δὴ τὰ αὐτὰ, καὶ ἔστω ἐλάσσων τετραγώνου ἡ $K\Lambda$. λέγω ὅτι καὶ οὕτως γίνεται τὸ πρόβλημα.

Ἀπειλήφθωσαν γὰρ ἴσαι αἱ $ZH\Theta$, καὶ γεγράφθωσαν 10 οἱ κύκλοι οἱ AM AN $A\Xi$. καὶ ἐπεὶ ἐλάσσων ἐστὶν τετραγώνου ἡ $K\Lambda$, ἡμικυκλίου δὲ ἡ $K\Lambda$, μείζων ἄρα τετραγώνου ἡ $\Lambda\Lambda$. μείζων ἄρα ἡ $\Lambda\Theta$ τῆς KZ . μείζων ἄρα καὶ ἡ MN τῆς $N\Xi$, ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

[Ἀλλὰ δὴ ἐποκείσθω ἡ $K\Lambda$ ἐλάσσων τετραγώνου, καὶ 15 ἀπειλήφθωσαν ἴσαι αἱ ZH $H\Theta$. μείζων ἄρα ἡ $\Lambda\Theta$ τῆς KZ καὶ ἡ MN τῆς $N\Xi$.]


- 29 κγ'. Ἀλλὰ δὴ ἐποκείσθω τὸ αὐτὸ σχῆμα, καὶ ἔστω μείζων τετραγώνου ἡ $K\Lambda$, καὶ ἀπειλήφθω τετραγώνου ἡ KZ . ἔσονται δὴ αἱ ἀπολαμβανόμεναι ἴσαι ἦτοι ἐφ' ἐκά- 20 τερα τοῦ Z ἡ ἐπὶ τὰ $Z\Lambda$ μέρη ἢ ἐπὶ τὰ ZK μέρη.

Ἀπειλήφθω ἐφ' ἐκάτερα τοῦ Z , καὶ ἔστωσαν αἱ ZH ΘZ , καὶ γεγράφθωσαν οἱ μέγιστοι κύκλοι [καὶ προσανα- πεπληρώσθωσαν οἱ ΓB $E\Lambda$ κύκλοι]. καὶ ἐπεὶ ἡμικυκλίου ἐστὶν ἡ $K\Lambda$, ἥς ἡ KZ τεταρτημορίον ἐστίν, λοιπὴ ἡ ΛZ 25

2. οἱ $B\Gamma$ $E\Lambda$ A (item B² ex of βγ, εδ.), corr. S 6. κβ' Hu. ΚΓ A rec. in marg. (BS) πρόσκειται AS, πρόσκειται B de coniunctivi forma in ei vide Bullmann, Ausführliche Grammatik I p. 548 ed. secund., et G. Curtium. Studien zur griechischen und lateinischen Grammatik vol. VII p. 100] 7. πάντοτε add. Hu 8. ἐλάσσων τετραγώνου] expectamus ἐλάσσων η τετρ.; sed etiam posthac scriplor τετράγωνον brevis ponit pro τετραγώνου, i. e. τεταρτημορίον, περιφέρεια 12. μείζω A, corr. BS 14. ἡ om. AB, add. S 15. initio add. κδ' A rec. in marg. (BS) 13. Ἀλλὰ — 17. τῆς $N\Xi$ del. Co 18. κγ' add. Hu 21. τὰ $Z\Lambda$ — τὰ ZK A, distinx. BS 22. 23. καὶ — κύκλοι interpolatori tribuit Hu 25. ἥς Hu pro ὧν τεταρτη μορίον A, corr. BS, item p. 516, 1 λοιπὴ BS, λοιπὸν A, λοιπὴ ἄρα conl. Hu

est, maior igitur est $\lambda\theta$ quam $\zeta\kappa$. Iam quia duo maximi circuli $\beta\gamma\lambda$ $\epsilon\delta\lambda$ invicem se secant, et circuli $\beta\gamma\lambda$ polus est α , et maximi circuli $\alpha\theta\mu$ $\lambda\eta\nu$ $\alpha\zeta\xi$ ita descripti sunt, ut $\lambda\theta$ maior quam $\zeta\kappa$, $\theta\eta$ autem ipsi $\eta\zeta$ aequalis sit, maior igitur est $\mu\nu$ quam $\nu\xi$ propter ea quae supra (propos. 16) demonstrata sunt, q. e. d.

XXII. Iam dico, non additis verbis "ad rectos angulos", non in omni casu id contingere quod propositum est.




Supponantur eadem: Prop.
sit autem $\kappa\delta$ minor qua-
drante; dico etiam sic pro-
blema fieri. ²⁴

Abscendantur enim aequales circumferentiae $\zeta\eta$ $\eta\theta$, et describantur circuli maximi $\alpha\theta\mu$ $\lambda\eta\nu$ $\alpha\zeta\xi$. Et quia $\kappa\delta$ minor quadrante, et $\kappa\lambda$ semicirculus est, $\lambda\delta$ igitur maior est quadrante: itaque $\lambda\theta$ maior quam $\kappa\zeta$;

ergo etiam propter propos. 16 $\mu\nu$ maior quam $\nu\xi$, q. e. d.

XXIII. Sed supponatur eadem figura: sit autem $\kappa\delta$ ma- Prop.
ior quadrante, et abscindatur quadrans $\kappa\zeta$; aequales igitur ²⁵




quae abscinduntur circumferentiae aut ad utramque partem puncti ζ erunt, aut versus punctum δ , aut versus punctum κ .

Abscendantur ad utramque partem puncti ζ aequales circumferentiae $\zeta\eta$ $\zeta\theta$, et describantur, ut supra, maximi circuli. Et quia $\kappa\zeta\lambda$ semicirculus, et $\kappa\zeta$ quadrans est, reliqua

τεταρτημορίου ἐστίν· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ AZ τῇ ZK . ὦν ἡ HZ τῇ ΘZ ἴση ἐστίν· λοιπὴ ἄρα ἡ AH τῇ ΘK ἴση, ἐστίν· ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ NE τῇ ΞM · ὥστε, ἐὰν μείζων ἢ τετραγώνου ἡ $K\Lambda$, καὶ ἀποληφθῇ τετραγώνου ἡ KZ , ἔτι δὲ ἐφ' ἑκάτερα τοῦ Z ἀποληφθῶσιν ἴσαι, οὐ γίνεται τὸ πρό-5 βλημα.

30



κδ'. Ἀλλὰ δὴ ὑπο-
κείσθω τὸ αὐτὸ σχῆμα,
καὶ ἔστω τετραγώνου ἡ
 KZ , καὶ ἴσαι ἀπειλή- 10
φθωσαν ἐπὶ τὰ Z Λ μέρη
αἱ ZH $H\Theta$, καὶ γεγρά-
φθωσαν οἱ μέγιστοι κύ-
κλοι. ἐπειδὴ τετραγώνου
ἡ KZ , μείζων ἄρα ἡ KZ 15
τῆς $\Theta\Lambda$ · μείζων ἄρα καὶ
ἡ ΞM τῆς NE , ὅπερ ἔδει
δεῖξαι.


31 κε'. Ἀλλὰ δὴ ὑποκείσθω τὸ αὐτὸ σχῆμα, καὶ ἀπει-
λήφθωσαν ἴσαι ἐπὶ τὰ Z K μέρη αἱ ZH $H\Theta$, καὶ γεγρά- 20
φθωσαν οἱ μέγιστοι κύκλοι οἱ $A\Theta M$ AZN AHE . καὶ
ἐπεὶ τετραγώνου ἐστὶν ἡ KZ , ἀλλὰ καὶ ἡμικυκλίου ἡ $K\Lambda$,
λοιπὴ ἄρα ἡ $Z\Lambda$ τετραγώνου ἐστίν· ἡ $Z\Lambda$ ἄρα ἴση ἐστὶν
τῇ ZK [ὦν ἡ ΘH τῇ HZ ἴση ἐστίν]· λοιπὴ ἄρα ἡ $K\Theta$
τῆς $Z\Lambda$ ἐστὶν ἐλάσσων· ἐλάσσων ἄρα καὶ ἡ ME τῆς NE , 25
ὅπερ· ~

32 κς'. Ὡστε ἀποδέδεικται ὅτι, ἐὰν μὲν ὁρθοὶ τέμνωσι,
πάντοτε γίνεται τὸ κατὰ τὴν πρότασιν, ἐὰν δὲ μὴ ὁρθοὶ
τέμνωσιν, ἐὰν μὲν ἡ $K\Lambda$ ἐλάσσων ἢ τῆς τοῦ] τετραγώνου
[πλευρᾶς], πάντοτε πάλιν γίνεται τὸ κατὰ τὴν πρότασιν 30

7. $K\Lambda$ Λ in marg., κς' A rec. B', om. S 8. αὐτὸ add. Hu
auctore Co 11. τὰ $Z\Lambda$ A, distinx. BS 14. ἐπὶ δὲ ABS, corr. Hu
auctore Co 19. $K\Lambda$ Λ in marg., κς' A rec. (BS) 20. τὰ ZK
A, distinx. BS αὐτὸ $ZH\Theta$ ABS, corr. Co (vide vs. 12) 22. 23. ἡμι-
κυκλίου — ἄρα add. Hu 24. ὦν — ἐστίν del. Hu 26. post ὅπερ

igitur $\lambda\zeta$ quadrans est, ideoque $\lambda\zeta = \zeta\kappa$. At ex hypothesis est $\zeta\eta = \zeta\vartheta$: restat igitur $\lambda\eta = \kappa\vartheta$; itaque propter propos. 15 erit etiam $\kappa\xi = \xi\mu$. Ergo, si $\kappa\delta$ maior quadrante sit, et quadrans $\kappa\zeta$ abscindatur, atque aequales circumferentiae ad utraque puncti ζ partes abscindantur, non sit problema.

XXIV. Sed supponatur eadem figura, sitque quadrans Prop. 26
 $\kappa\zeta$, et aequales circumferentiae $\zeta\eta$ $\eta\vartheta$ versus punctum δ abscindantur, et describantur, ut supra, maximi circuli¹. Iam quia $\kappa\zeta$ quadrans est, maior igitur est $\kappa\zeta$ quam $\vartheta\lambda$; itaque propter propos. 16 maior et $\mu\xi$ quam $\xi\nu$, q. e. d.



XXV. Sed supponatur Prop. 27
 eadem figura, et abscindantur aequales circumferentiae $\zeta\eta$ $\eta\vartheta$ versus punctum κ , et describantur maximi circuli $\alpha\vartheta\mu$ $\alpha\eta\xi$ $\alpha\zeta\nu$. Et quia $\kappa\zeta$ quadrans est, reliqua igitur $\zeta\lambda$ quadrans est; itaque $\zeta\lambda = \zeta\kappa$; restat igitur $\kappa\vartheta < \zeta\lambda$; ergo propter propos. 16 est etiam $\mu\xi < \xi\nu$, q. e. d.

XXVI. Sic igitur demonstravimus, primum, si ad rectos angulos circuli $\beta\gamma$ $\delta\epsilon$ se secent, utique fieri id quod propositum est, tum, si non ad rectos angulos se secent, si primum $\kappa\delta$ minor sit quadrante, rursus propositum utique fieri:

1) Sed tamen scriplor litteras geometricas hoc et proximo theoremate paulum immutavit. Nam quoniam intererat seriem $\mu\xi$ ex propos. 25 retinere, in hoc theoremate maximus circulus est $\alpha\zeta\mu$, qui in superioribus propositionibus fuerat $\alpha\zeta\xi$; ac similiter cetera.

add. τὸ $\alpha\chi\eta\mu\alpha$ ABS 27 sqq.] cap. 32 aut totum a posteriore scrip-
 tore additum, aut ab ipso quidem Pappo compositum, sed passim inter-
 polatum esse videtur 27. $\kappa\zeta$ A' in marg. $\kappa\zeta$ A rec. BS 28. τὸ
 S. τὰ AB 29. $\eta\zeta$ τοῦ et 30. $\pi\lambda\epsilon\upsilon\rho\alpha\varsigma$ del. Hu auctore Co, dem
 p. 518, l. 2 30. τὸ Hu pro τὰ

τοῦ στοιχείου], ἐὰν δὲ ἡ K.1 μείζων ἢ [τῆς τοῦ] τετραγώνου [πλευρᾶς], οὐ πάντοτε γίνεται. ἀλλὰ ἐὰν ἀπολάβω τὴν KZ τετραγώνου, ἐὰν μὲν αἱ ἀπολαμβάνόμεναι περιφέρειαι ἴσων ἀπέχωνιν τοῦ Z, οἱ γραφόμενοι κύκλοι μέγιστοι ἴσας ἀπολήφονται τὰς μεταξὺ αὐτῶν, ἐὰν δὲ αἱ ἀπολαμβάνόμεναι ἴσαι ἐπὶ τῆς ZA ἀπολαμβάνωνται, οἱ γραφόμενοι κύκλοι διὰ τῶν πόλων ἐλάσσονα ἀπολήφονται τὴν ἔγγιον τοῦ ἐξ ἀρχῆς μεγίστου κύκλου τῆς ἀπώτερον, ἐὰν δὲ αἱ περιφέρειαι ἐπὶ τῆς ZK ἀπολαμβάνωνται, συμβαίνει τὸ κατὰ τὴν πρότασιν, τουτέστιν οἱ διὰ τῶν πόλων γραφόμενοι ἀπολήφονται μείζονα τὴν ἔγγιον τοῦ ἐξ ἀρχῆς μεγίστου κύκλου τῆς ἀπώτερον· ὥστε, ἐὰν μὴ ὁρῶσι τέμνωσιν, γίνεται μὲν τὸ κατὰ τὴν πρότασιν, οὐ πάντοτε δὲ (ἐὰν μὴ αἱ ἀπολαμβάνόμεναι ἐπὶ τῆς ZK ἀπολαμβάνωνται).

- 33 κζ'. Ἐπειδὴ τρεῖς μόναι διαφοραὶ τῆς θέσεως τῶν μεγίστων κύκλων θεωροῦνται ἐν τῇ σφαίρᾳ ἥ γὰρ ὁρθοῦς εἶναι δεῖ αὐτοὺς πρὸς τὸν ἄξονα ἢ διὰ τῶν πόλων τῆς σφαίρας ἢ κεκλιμένους πρὸς τὸν ἄξονα], ἐπὶ τῶν τριῶν τὰς ἀποδείξεις ποιεῖται ὁ Αὐτόλυκος.

Καὶ ἐπεὶ τὸ μὲν α' καὶ β' καὶ γ' θεώρημα ἐπὶ τῶν προειρημένων τριῶν θέσεων τῶν κύκλων θεωρεῖται, διὰ τοῦτο καθολικῶς καὶ περιληπτικῶς ἐπ' αὐτῶν τὴν ὕλην σφαῖραν παραλαμβάνει. ἐὰν τε γὰρ τὸν μέγιστον κύκλον ὁρθὸν πρὸς τὸν ἄξονα ὑποθώμεθα, πάντα τὰ ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας σημεῖα στρεφομένης τῆς σφαίρας κύκλους γράψει παραλλήλους τοὺς αὐτοὺς πόλους ἔχοντας τῇ σφαίρᾳ, καὶ πάλιν ἐν ἴσῳ χρόνῳ τὰς ὁμοίας περιφερείας

4. τοῦ στοιχείου del. C^o 3. KZ Hu pro AΘ, item vs. 4. Z pro Θ, vs. 6. Z.1 pro ΘΔ, vs. 9. ZK pro ΘΚ 5. αὐτῶν Hu pro αὐτῶν 6. ἀπολαμβάνονται AS, corr. B 7. πόλων A² ex πόλων B³ ex πολλῶν ἐλάσσονα Hu pro ἐλασσον 8. ἔγγιον A, corr. BS, item vs. 11 14. τῆς ZK Hu pro τὴν ΘΚ 15. KZ A¹ in marg., KII' A rec. BS 19. ὁ αὐτός κύκλος A¹, corr. A³ 20. τὸ μὲν πρῶτον καὶ δεῦτερον καὶ τρίτον S. ac similiter posthac 23. μέγιστον κύκλον add. Hu anclote C^o 25. κύκλους — 27. σφαῖρα ipsa Αὐτολύκι verba sunt prop. 1

si autem $\alpha\delta$ maior sit quadrante, non in omni casu fieri. Nam si quadrantem $\alpha\zeta$ absciderim, si primum *termini circumferentiarum abscissarum aequaliter a ζ distent*, maximi circuli *per polos descripti aequales circumferentias in maximo parallelo* intra se comprehendent, si autem aequales circumferentiae in ipsa $\zeta\delta$ abscindantur, circuli per polos descripti abscindent minorem eam quae primario circulo maximo propior est quam illam quae remotior; denique si circumferentiae in ipsa $\zeta\alpha$ abscindantur, contingit id quod est propositum, nimirum circuli per polos descripti abscindent maiorem eam quae primario circulo maximo propior est quam illam quae remotior. Ergo, si circuli $\beta\gamma$ $\delta\epsilon$ non ad rectos angulos se secent, contingit id quidem quod propositum est, neque tamen in omni casu (*scilicet non contingit*, nisi si aut $\alpha\delta$ minor quadrante sit aut aequales circumferentiae in ipsa $\zeta\alpha$ abscindantur).

DE AUTOLYCI THEOREMATIS.

XXVII. Quoniam tres tantummodo diversae positiones maximorum in sphaera circulorum considerantur (namque aut perpendiculares eos esse oportet ad axem, aut per polos sphaerae transire, aut ad axem inclinatos esse) sub his tribus rationibus Autolycus¹⁾ demonstrationes suas facit.

Et quia theoremata eius primum secundum tertium ad has tres quas diximus positiones pertinent, in iis totam omnino sphaeram breviter comprehendit. Nam sive maximum circulum axi perpendicularem supposuerimus, omnia in superficie sphaerae puncta, dum sphaera vertitur, circulos parallelos describent, qui eodem cum sphaera polos habebunt, eaque puncta aequali tempore similes parallelorum circulorum

1) Autolyci *περὶ κινουμένων σφαίρας* propositiones edidit Dasypodius in "Sphaerae doctrinae propositionibus Graecis et Latinis". Argentorati 1572, p. 36—40; plenum "Autolyci de sphaera quae movetur librum ex codice Vaticanano in Latinum convertit Ios. Auria, Romae 1887; nos Graecum contextum anno 1876 ex bibliotheca Vaticana repetivimus, itaque in adnotationibus quae mox sequuntur nonnulla emendatius edimus quam apud Dasypodium leguntur.

τῶν παραλλήλων τὰ σημεῖα διεξέρχεται, καὶ ἐπὶ τὰς περι-
φερείας] ὡς διεξέρχεται ἐν ἴσῳ χρόνῳ ὅμοιαι εἰσιν αἱ περι-
φέρειαι, ἴσῳ τε αὐτὸν διὰ τῶν πόλων τῆς σφαίρας ἢ λοξὸν
πρὸς τὸν ἄξονα ὑποθώμεθα, ταῦτά συμβήσεται. Ἐνεκα οὖν
τοῦτου ἐπὶ τῆς ὕλης σφαίρας ἐποιήσατο τὰς ἀποδείξεις ἐπὶ
τοῦτων τῶν θεωρημάτων.

34 Τὸ δὲ δ' θεωρήμα ἐπὶ μόνῃς τῆς μιᾶς θέσεως ἀρμόζει,
ὅταν ὁ μέγιστος κύκλος ὀρθὸς ἢ πρὸς τὸν ἄξονα, ὥστε
πάντα τὰ λαμβανόμενα σημεῖα ἐπὶ τῆς σφαίρας μήτε ἀνα-
τέλλειν μήτε δύναιν, ὃ καὶ χαρακτηριστικὸν καὶ ἰδιὸν ἐστὶν τοῦ
ταύτης τῆς θέσεως.

35 Τὸ δὲ ε' καὶ αὐτὸ χαρακτηριστικὸν ἐστὶν καὶ ἰδιὸν τῆς
διὰ τῶν πόλων τῆς σφαίρας· ἐπ' οὐδεμιᾶς γὰρ ἄλλῃς τῶν
δυεῖν θέσεων πάντα τὰ ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας
σημεῖα καὶ δύνει καὶ ἀνατέλλει, ἀλλ' ἐπὶ μόνῃς ταύτης. 15

36 Τὸ δὲ ε' θεωρήμα χαρακτηριστικὸν ἐστὶν καὶ αὐτὸ τῆς
λοιπῆς θέσεως τῆς λοξῆς πρὸς τὸν ἄξονα οὐδεμία γὰρ τῶν
ἄλλων θέσεων ἔχει τὸν μέγιστον κύκλον ἐξαπτόμενον δύο
κύκλων ἴσων τε καὶ παραλλήλων, καὶ τούτων τὸν μὲν ὄντα
ἐν τῇ φανερῇ ἡμισφαίρει διὰ παντὸς ὄντα φανερόν, τὸν 20
δὲ ἐν τῇ ἀφανεῇ διὰ παντὸς ἀφανή· ἐφάπεται μὲν γὰρ
πᾶς μέγιστος ἐν σφαίρᾳ κύκλος δύο κύκλων ἴσων τε καὶ
παραλλήλων, ἀλλ' οὐκ ἀεὶ φανερῶν οὐδὲ ἀεὶ ἀφανῶν.

37 Πάνυ οὖν καλῶς καὶ κατὰ λόγον πρότερον τὰ καθο-
δικὰ θεωρήματα προειπὼν [ἐν τοῖς ἐφεξῆς τρισὶ πρώτοις 25
θεωρήμασι θεωρεῖται] μετὰ ταῦτα τὰ ἴδια καὶ χαρακτη-
ριστικὰ τῶν εἰρημένων θέσεων ἐκτίθεται ἃ συμβαίνει γίνε-
σθαι ἐφ' ἑκάστης θέσεως [ἴδια], καὶ τὰ λοιπὰ ἅπερ ἐπὶ
κοινῇ πάντα ἐστὶν θεωρήματα καὶ κοινῶς ἐπὶ μιᾶς μό-
νης θέσεως (ἀλλὰ καὶ ἐπὶ δευτέρᾳ) ἐξῆς τῇ τάξει τίθῃσιν. 30

38 Εὐθέως γοῦν τὸ ε' αὐτῷ θεωρήματι σὺνεται ἐπὶ τε ὀρ-
θῆς τῆς διὰ τῶν πόλων θέσεως καὶ ἐπὶ τῆς λοξῆς πρὸς

1. ἐπὶ τὰς περιφερείας interpolatori tribuit Hu 3. αὐτὸν Hu.
αὶ A, αὐ B, om. S 8. ἄξονα, ὥστε: ἀξονατο A, ἄξονα τὸ B, ἄξονα
τότε S, ὥστε corr. Hu nempere Co 25. 26. ἐν τοῖς — θεωρεῖται

circumferentias permeabunt, et circumferentiae, quas aequali tempore absolverent, similes erunt; sive maximum circulum per polos sphaerae sive obliquum ad axem supposuerimus, eadem contingent. Quapropter in his theorematibus de tota sphaera demonstrationes suas composuit.

Quartum autem theorema ad unam tantum positionem aptum est, si maximus circulus ad axem perpendicularis sit, ita ut omnia quae in sphaera sumuntur puncta neque orientur neque occidant, id quod huius positionis peculiare ac proprium est.

Item quintum theorema peculiare ac proprium est positionis per polos sphaerae; minime enim in reliquis duabus positionibus omnia quae sunt in superficie sphaerae puncta et occidunt et oriuntur, sed in hac una.

Item sextum theorema peculiare est alterius positionis, videlicet obliquae ad axem; nam in nulla alia positione maximus circulus duos aequales et parallelos circulos tangit, et ita quidem, ut eorum alter, qui est in conspicuo hemisphaerio, semper conspiciatur, alter autem, qui est in occulto, semper lateat. Omnis enim in sphaera maximus circulus duos aequales ac parallelos circulos tangit, sed eos, praeter illum unum casum, nec semper conspicuos nec semper latentes.

Egregie igitur et subtiliter primum generalia theoremata praemittit, tum propria et peculiaris earum quas diximus positionum, quatenus in unaquaque positione contingunt, explicat, denique reliqua omnia theoremata, quae cum in commune valeant, in una tantum positione (interdum tamen etiam in altera) servantur, suo deinceps ordine proponit.

Nam statim septimum eius theorema et in perpendiculari per polos positione et in ea quae ad axem obliqua est ser-

del. Co 28. Ἰδία del. et τὰ αὐτ. Hu 28. 29. ἐπὶ κοινωροῦντά ἐστιν A, ἐπικοινωροῦντά ἐστιν BS, communia sunt Co. corr. Hu 'nam vix veri similis est coniectura ἐπὶ κοινῇ κοινωμενὰ ἐστιν 31. γὰρ B, γ' αὖ A, οὐ S 31. 32. τε ἀρθῆς et καὶ ἐπὶ — p. 522, 3. κοινῆς θέσεως om. S

τὸν ἄξονα· ἐδείξαμεν γὰρ ἡμεῖς πῶς δύναται σωῆσθαι ἐπὶ τῆς διὰ τῶν πόλων θέσεως τὸ θεώρημα. ἐπὶ μέντοι τῆς λοιπῆς θέσεως οὐ δύναται σωῆσθαι· οὔτε γὰρ ἀνατέλλει τε ἐκεῖ οὔτε δύνει.

39 Τὸ δὲ ἡ' λέγεται θεώρημα ἐπὶ μόνῃς τῆς λοξῆς πρὸς τὸν ἄξονα θέσεως· ἐπὶ γὰρ τῆς θέσεως τῆς διὰ τῶν πόλων τῆς σφαίρας τὰ ἄμα ἀνατέλλοντα σημεῖα ἄμα καὶ δύνει, καὶ τὰ ἄμα δύνοντα ἄμα καὶ ἀνατέλλει· πάντες γὰρ ἐκεῖ οἱ κύκλοι οἱ τέμνοντες τὸν ὁρίζοντα δίχα τέμνονται ἐπ' αὐτοῦ, καὶ ἡμικύκλια ὑπὲρ τε τὸν ὁρίζοντα ἔχουσιν καὶ ὑπὸ τὸν ὁρίζοντα, καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν τὰ ἄμα ἀνατέλλοντα ἄμα καὶ δύνει, καὶ τὸ ἀνάπαλιν.

40 Ὅμοιως δὲ καὶ τὸ θ' ἀντὶ ἐπὶ τῆς αὐτῆς θέσεως μόνῃς παραλαμβάνεται· βοῦλεται γὰρ τοὺς τοῦ αὐτοῦ ἑφαπτομένους μὴ ἄλλον τινὸς ἐφάπτεσθαι ἢ μόνου τοῦ αἰεὶ φανεροῦ.

41 Τὸ δὲ ι' ἐπὶ τε τῆς διὰ τῶν πόλων θέσεως σώζεται καὶ ἐπὶ τῆς λοξῆς πρὸς τὸν ἄξονα, μόνῃς δὲ αὐτὸς τῆς ἐπὶ τῆς λοξῆς θέσεως ἀποδείξεως ἐμνήσθη. ἡμεῖς δὲ προσαπεδείξαμεν σωζόμενον τοῦτο καὶ ἐπ' ἐκείνης τῆς θέσεως· ἐπὶ τοῦ μέντοι τῆς ὁρθῆς πρὸς τὸν ἄξονα ἔφαμεν πῶς δις μὲν οὐκ ἔσται ὁρθὸς πρὸς τὸν ὁρίζοντα ὁ διὰ τῶν πόλων τῆς σφαίρας, αἰεὶ δέ.

42 Ἐπὶ δὲ τοῦ ια' θεωρήματος τὴν χαλεπωτέραν εἴληψε θέσιν τὴν λοξὴν πρὸς τὸν ἄξονα ἐν τῷ λέγειν "λοξὸς ὢν πρὸς τὸν ἄξονα" καὶ "μειζόνων ἐφάπτεται ἢ ὢν ὁ ἐξ ἀρχῆς ἐφήπτετο", ἐπιστάμενος τῆς διὰ τῶν πόλων θέσεως ἐπολειπυμένης ἑαδὴν εἶναι τὴν ἀπόδειξιν· ἐδείξαμεν γὰρ ἡμεῖς πῶς καὶ ἐπ' ἐκείνης τῆς θέσεως κατὰ πάντα τρόπον τοῦ ὁρίζοντος τοῦ μεταξὺ τῶν παραλλήλων ὢν ἐφάπτεται τὰς τε ἀνατολὰς καὶ τὰς δύσεις ποιεῖται.

vatur; nam demonstravimus nos quidem etiam in positione quae est per polos theorema servari posse. Tamen in *tertia* positione servari non potest, quoniam illuc neque oritur quidquam neque occidit.

Sed octavum theorema in una obliqua ad axem positione enuntiatur; nam in positione quae per polos sphaerae est quae puncta simul oriuntur, ea simul etiam occidunt, et quae simul occidunt, ea item simul oriuntur. Omnes enim illic circuli horizontem secantes ab eodem bifariam secantur semicirculosque et super horizontem et infra horizontem habent, ob eamque causam quae puncta simul oriuntur, ea simul etiam occidunt, et vice versa.

Similiter nonum theorema in eadem sola positione *scrip- tor* adsumit; vult enim circulos, qui eundem circumulum tangunt, nullum alium tangere nisi eum qui semper conspicitur.

Decimum autem theorema et in ea positione quae est per polos et in illa quae obliqua ad axem est servatur; ipse tamen unius obliquae ad axem positionis demonstrationem commemoravit¹⁾. Nos autem praeterea demonstravimus idem etiam in altera positione servari. At vero in *tertia*, videlicet perpendiculari ad axem, exposuimus, quemadmodum circulus qui per polos transit non his perpendicularis sit ad horizontem, sed semper.

Sed in undecimo theoremate²⁾ difficiliorem positionem obliquam ad axem adsumpsit sic dicens: "obliquus ad axem" et "maiores tangit quam quos primarius tangebat"³⁾, non ignorans positionis per polos, quam omisit, demonstrationem facilem esse. Etenim nos ostendimus, quemadmodum *circulus* etiam in illa positione per omnem locum horizontis, qui est inter eos parallelos quos tangit, et ortus et occasus efficiat.

1) 'Εάν ἐν σφαίρῃ μέγιστος κύκλος λοξὸς ὦν πρὸς τὸν ἄξονα ὁρίξῃ τό τε φανερὸν τῆς σφαίρας καὶ τὸ ἀγανέξ, ὁ δὲ τῶν πόλων τῆς σφαίρας κύκλος ἐν μιᾷ περιφορᾷ τῆς σφαίρας δις ἔσται ὁρθὸς πρὸς τὸν ὁρίζοντα Aulol. prop. 40.

2) 'Εάν ἐν σφαίρῃ μέγιστος κύκλος λοξὸς ὦν πρὸς τὸν ἄξονα ὁρίξῃ τό τε φανερὸν τῆς σφαίρας καὶ τὸ ἀγανέξ, ἄλλος δὲ τίς λοξὸς μέγιστος κύκλος μειζόνων ἀπτεῖται ἢ ὦν ὁ ὁρίζων ἀπτεταί, κατὰ πᾶσαν τὴν τοῦ ὁρίζοντος περιφέρειαν τὴν μεταξὺ τῶν παραλλήλων κύκλων ὧν ἐγκυπτεται τὰς τε ἀνατολὰς καὶ τὰς δύσεις ποιεῖται. Haec nos e codice Vaticano descripsimus, cum quibus convenit Auriae interpretatio; Basy-podius autem codice mutilato et lacunoso usus est.

3) Graeca μειζόνων — ἐγκυπτετο recte quidem ad sensum, sed verbis liberius mutatis a Pappo citata sunt.

- 43 Ἐπὶ δὲ τοῦ ιβ' θεωρήματος φανερόν ἐστι ἐπὶ μόνῃς τῆς
λοξῆς θέσεως συμβαίνει τε καὶ ἀρμόζει.
- 44 Δεῖ μέντοι καὶ ταῦτο μὴ ἀγνοεῖν ὅτι ὁρθοὶ μὲν πρὸς
τὸν ἄξονα μέγιστοι κύκλοι πολλοὶ οὐ δύνανται ἐποστῆναι,
εἰς δὲ μόνος καὶ μονογενής. διὰ δὲ τῶν πόλων τῆς σφαί-
ρας καὶ λοξοὶ πρὸς τὸν ἄξονα ἄπειροι. καὶ οἱ μὲν διὰ
τῶν πόλων τῆς σφαίρας πάντες στρεφομένης τῆς σφαίρας
ἐφαρμύζουσιν ἑαυτοῖς, οἱ δὲ λοξοὶ πάντες μὲν οὐκέτι, ἐκεί-
νοι δὲ μόνοι οἵτινες τοῦ αὐτοῦ τῶν παραλλήλων ἐφάπτον-
ται (ὡς παράλληλος περὶ τοὺς αὐτοὺς πόλους ἐστὶ τῇ σφαίρᾳ)¹⁰
καὶ ἔτι ὁρθὸς πρὸς τὸν ἄξονα. μήποτε' οὖν διὰ τοῦτο καὶ
ὁ Αὐτόλυκος, ἀρχόμενος τὰ παρακολοιοῦντα ἴδια καὶ
χαρακτηριστικὰ ἐκάστη θέσει ἐκτίθεσθαι, ἀπὸ τῆς ἀπλου-
στάτης καὶ πρώτης ἤρξατο θέσεως. αὕτη δὲ ἐστὶν ἡ τὸν
μέγιστον κύκλον ἔχουσα ὁρθὸν πρὸς τὸν ἄξονα· μονογενής¹⁵
δὲ αὕτη ἐστὶν ἡ θέσις, ὡς ἔφημεν, καὶ μετακίνησιν οὐδ'
ἡντινοῦν ἐπιδεχομένη. μετὰ δὲ ταύτην τὴν τῇ τάξει ἀπλου-
στέραν. αὕτη δὲ ἐστὶν ἡ διὰ τῶν πόλων τῆς σφαίρας, καθ'
ἣν, ἔφημεν, ἄπειροι μὲν δύνανται κύκλοι γράφεσθαι διὰ
τῶν πόλων τῆς σφαίρας, πάντες δ' ἑαυτοῖς ἐφαρμύζοντες²⁰
διὰ τὸ τοὺς πόλους ἐσθῆναι καὶ μὴ μετακίνησθαι. ἡ δ'
ἄλλη θέσις ἔχει μὲν ἐπὶ τινων τοῦτο, ὡς ἔφημεν, ἐπὶ δὲ
τινων οὐκ ἔχει· ταύτην οὖν ταύτην μὲν τρίτην τῇ τάξει ἔθη-
κεν, τὴν δὲ ἑτέραν ἐν δευτέρᾳ χώρᾳ κατέταξεν.]
- 45 καί. Ταῦτα μὲν οὖν εἰρηται λόγῳ περιοχῆς, ζητεῖται²⁵
δ' ἐν τῇ βιβλίῳ, ὅπερ ἀναγκαῖον παραμνηθῆσασθαι, πῶς
τὰ μὴ ἔσω τοῦ ἄξονος ὄντα σημεία, ἀλλ' ἐπὶ τῆς ἐπιφα-
νείας τῆς σφαίρας, κύκλους γράφει συμπεριεγόμενα τῇ
σφαίρᾳ. εἰ μὲν γὰρ τὰ σημεία εἰσθῆκει καὶ μὴ συμπεριή-
γετο τῇ σφαίρᾳ, πιθανὸν ἦν τὸ λέγειν εἶναι ἢ γραμμὴν ἢ γι-
νομένην ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς σφαίρας ὑπὸ τινος σημείου
κύκλου ἐστὶν περιφέρεια, εἰ δ' αὖ πάλιν ἢ τε σφαῖρα ἐστὶν

1. initio A6' add. A rec. (BS; 3 sqq.) totum caput 44 mani-
festa interpolatoris vestigia prodit 13. ἐκτίθεσθαι sic; A, ἐκτίθεται S.
corr. B 21. ἐσθῆναι A, prius κε expunxit prima manus
μετάγεσθαι conl. Hu 25. καί add. Hu

Denique duodecimum theorema in una obliqua positione contingere et congruere apparet.

[Neque tamen hoc ignorare licet, perpendiculares ad axem maximos circulos non plures constitui posse, sed unum tantum et una ratione genitum, per polos autem sphaerae aut ad axem obliquos infinitos numero. Et ii quidem qui per polos sphaerae transeunt, dum sphaera vertitur, ipsi inter se congruunt¹⁾; obliqui autem non item omnes, sed illi tantum qui eundem parallelum tangunt (qui quidem parallelus et eodem cum sphaera polos habet et ad axem perpendicularis est). Ille igitur de causa, nisi fallimur, Autolycus, cum ea quae cuiusque positionis propria et peculiaris sunt exponere incepit, a simplicissima et prima initium fecit; haec autem est, quae maximum circulum perpendicularem habet ad axem. Atque haec quidem positio, ut diximus, una ratione gignitur neque ullam mutationem recipit. Deinceps eam positionem addit quae superiori simplicitate proxima est; haec autem est per sphaerae polos, iuxta quam innumerabiles, ut diximus, circuli per polos sphaerae describi possunt, qui omnes propterea inter se congruunt, quod poli sphaerae stabiles et motus expertes sunt. Reliqua autem positio in aliis hoc proprium habet, ut diximus, in aliis non habet. Quapropter hanc tertiam ex ordine posuit et illam alteram secundo loco collocavit.]

XXVIII. Haec igitur summam dicenda sunt, sed illud in hoc libro quaeritur quod probare opus sit, quomodo puncta, quae non intra axem, sed in superficie sphaerae sunt, dum una cum sphaera circumaguntur, circulos describant. Nam si puncta starent neque cum sphaera circumagerentur, facile fidem haberes ei qui lineam in superficie sphaerae ab aliquo puncto effectam circumferentiam circuli esse diceret; vel si rursus sphaera circumageretur in eaque punctum aliquod si-

¹⁾ Id est, si unus quilibet ex his circulis, dum sphaera vertitur, ipse non moveatur, sed suo loco maneat, omnes reliqui ex ordine in circumactione sphaerae cum hoc congruunt.

φετο καὶ τὸ σημεῖον ὁμαλῶς ἐφέρετο κατ' αὐτῆς συμπερι-
 αρόμενον αὐτῇ, ὑπολειπόμενον μέντοι ἢ ἐπεκτερόχον κατὰ
 τὰ αὐτὰ τῆς σφαίρας, καὶ οὕτως ἂν εἶχε τινα λόγον. ὑπο-
 λειπόμενον τε γὰρ τῆς σφαίρας δὲ ἀνάγκης τόπους μετα-
 μείβον κατὰ συνέχειαν ἂν γραμμὴν τινα ἐγέννα ἐν τῇ ἐπι-
 φανεῖα τῆς σφαίρας, ἐπεκτερόχον δὲ τῇ αὐτῇ λόγῳ κύκλον
 γράψειεν ἂν ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς σφαίρας, μήτε δὲ ὑπο-
 λειπόμενον μήτε ὑπεκτερόχον, ἀεὶ δὲ τὸν αὐτὸν τόπον ἐπέ-
 χον ἐν τῇ σφαίρᾳ στρεφομένης αὐτῆς, θαναταστὸν ἴσως ἂν
 ὁόξειεν πῶς κύκλον γράψειεν· ὁραίλει γὰρ τὸ γράφον περὶ 10
 τι γράφειν ἑστὸς, εἰ δὲ περὶ ὃ γράφει οὐκ ἔστηκεν, πῶς
 γράψει τὸ γράφον; πάντα μὲν οὖν τὰ ἐν τῇ σφαίρᾳ στρε-
 φομένης αὐτῆς οὐκ ἔστηκεν, μόνος δὲ ὁ ἄξων ἔστηκεν, καὶ
 ἐπὶ τὸν ἑστῶτα ἀπὸ τοῦ φερομένου αἰεὶ σημείου κάθετος
 ἄγεται καὶ συμβάλλει τῷ ἄξονι δῆλον ὅτι κατὰ τι σημεῖον· 15
 δεῖ ἄρα τὸ σημεῖον καθ' ὃ συμβάλλουσιν ἀλλήλαις αἱ εὐ-
 θεῖαι ἑστῆναι, ἐπεὶ καὶ ὁ ἄξων ἔστηκεν. καὶ ἐπεὶ τὸ
 μὲν σημεῖον ἐν τῷ ἄξονι ἔστιν, ἡ δὲ ἀχθεῖσα κάθετος ἐν
 τῇ σφαίρᾳ, στρεφομένης τῆς σφαίρας συμπεριάγεται μὲν ἢ
 εὐθεῖα μετὰ τοῦ ἐτέρου πέρατος τοῦ ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας 20
 τῆς σφαίρας, ἔστηκεν δὲ τὸ ἐπὶ τοῦ ἄξονος. ἀνάγκη οὖν
 συμπεριφερομένην ταύτην τὴν εὐθεῖαν σὺν τῇ σφαίρᾳ, καθ'
 ὃ μὲν φέρεται ἢ σφαῖρα κινουμένης αὐτῆς, καθ' ὃ δὲ πε-
 περάτῃται ἐστῶσης, καὶ μὴ μεταμειβοῦσης τὰ πέρατα, κατ'
 ἐπιπέδου φέρεσθαι. ἔστηκεν δ' ἐκεῖνο τὸ ἐπίπεδον, καθ' 25
 οὗ φέρεται [τοῦτο δὲ τὸ ἐπίπεδον οὐκ ἀλλαχόσε ἐστὶν ἢ ἐν
 τῇ σφαίρᾳ]. ἐπεὶ οὖν ἐπίπεδον ἑστὸς ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ, καθ' οὗ
 φέρεται ἢ εἰρημένη εὐθεῖα, καὶ ἔστιν εἰλημμένα ἐπ' αὐτοῖ
 δύο τεχνόντα σημεῖα [τὰ πέρατα τῆς φερομένης εὐθείας τῇ
 τε πρὸς τῷ ἄξονι καὶ τὸ ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας], 30
 δυνατὸν δὲ ἐστὶν ἐν ἐπιπέδῳ παντὶ κέντρῳ καὶ διαστήματι
 κύκλον γράφειν, δῆλον ὅτι ὁ κέντρον μὲν τῷ ἐπὶ τοῦ ἄξονος

3. ἂν add. Hu 6. 7. κύκλον — σφαίρας interpolatori tribuit Hu
 11. ἑστὸς ABS, corr. Hu 22. συμπεριφερομένης ταύτης τῆς εὐθείας
 ABS, corr. Hu auctore Co 23. ὃ δὲ Hu pro α δὲ 25. γίγεται
 ἔστηκεν ἐκεῖνο ABS, corr. Hu auctore Co 26. 27. τοῦτο δὲ — σφαῖρα

mul conversum ferretur, sed id tardiozem aut celeriozem motum, quam sphaera¹, aequabiliter haberet, etiam sic *id quod propositum est* rationem aliquam haberet. Nam et, si tardius quam sphaera punctum procederet, necessario positiones suas continuo mutans lineam quandam in sphaerae superficie describeret, et, si celerius, eodem modo; at vero, si neque relinqueretur neque praecedat semperque eundem locum in sphaera, dum haec convertitur, obtineat, iure mirum videatur, quomodo circulum describere possit. Nam id quod lineam describit in stabili aliqua superficie describat necesse est; sin id, in quo describitur, instabile est, quomodo id quod describit faciat lineam? Omnia quidem in sphaera puncta, dum haec convertitur, locum suum mutant praeter unum axem qui immobilis stat; itaque apparet ad eum axem a puncto quod circumfertur semper perpendiculares duci posse easque axi in aliquo puncto occurrere. Ergo, quoniam axis stat, etiam punctum, in quo illae perpendiculares concurrunt, stare oportet. Et quoniam id punctum in axe, recta autem perpendicularis in sphaera est, eius rectae, dum sphaera convertitur, id punctum, quod est in superficie sphaerae, simul convertitur, id autem, quod est in axe, stat. Itaque cum haec recta simul cum sphaera circumagatur et, quatenus sphaera convertitur, moveatur, quatenus autem in ipso axe terminum habet, loco suo stet, cumque eosdem semper terminos retineat, ipsam in plano circumagi necesse est. Hoc autem planum, in quo fertur, stabile est. Ergo cum stabile planum et in hoc ea quam diximus recta inque ea duo puncta quaelibet supposita sint, atque omni centro et intervallo circulum in plano describere liceat, apparet cum circulum, cuius centrum est punctum in axe, radius autem intervallum ab

¹. Apparet τῆς σφαίρας u scriptore brevius dictum esse pro his: "quam circulus parallelus in sphaerae superficie, in quo id punctum est".

interpolatori tribuit Hu 27. ἐστὶς ABS. corr. Hu. item p. 528, 4
29. 30. τὰ πέρατα — σφαίρας interpolatori tribuit Hu 29. περισ-
μήτης S 34. ἐν add. Hu auctore Co 32. ὁδὸν ὅτι A¹BS

σημείον διαστήματι δὲ τῷ ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας
σημείον κύκλος γραφόμενος ἐν τῷ ἐπιπέδῳ γραφήσεται, ἐφ'
οὗ ἡ εἰρημένη εὐθεία ἐφέρετο· τὸ ἄρα σημείον τὸ ἐπὶ τοῦ
ἄξονος ἐντὸς αὐτοῦ ἐγένετο τοῦ κύκλου γραφῆναι ἐπὶ τοῦ
ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας σημείου (ἀδύνατον γὰρ μὴ⁵
ἐστῶτός τινος αὐτὸν γραφῆναι)· οὗκ ἄρα δυνατόν ἦν τὸ
τροβόλημα γενέσθαι, εἰ μὴ κάθετος ἦν ἀχθεῖσα ἐπὶ τὸν
ἐστῶτα ἄξονα.

- 16 Καὶ τοῦτο δὲ δεῖ εἰδέναι ὅτι, ὅτε κάθετον ἄγει ἐπὶ
τὸν ἄξονα καὶ ἐκβάλλει τὸ διὰ τοῦ ἄξονος καὶ τῆς καθέτου¹⁰
ἐπίπεδον, ὡς ἐπὶ ἐστηκνίας τῆς σφαίρας τοῦτο ποιεῖ. ἀμύ-
χανον γὰρ ἐστὶν στρεφομένης τῆς σφαίρας κάθετον ἄξαι
ἐπὶ τὸν ἄξονα· δεῖ γὰρ προὔποκεῖσθαι ἐπίπεδον, ἵνα ἐν
τῷ ἐπιπέδῳ ὑπαρχοῦσης εὐθείας· τε καὶ σημείον τεχόντος
ἀπὸ τοῦ σημείου κάθετον ἀγάγωμεν ἐπὶ τὴν εὐθεῖαν. φερο-¹⁵
μένον δὲ τοῦ σημείου ἐν τῷ στρέφεσθαι τὴν σφαῖραν καὶ
παριόντος ἀμύθητα ἐπίπεδα, τῆς δὲ εὐθείας ἐστῶσης, οὐ
δύναται κάθετος ἄγεσθαι ἐπὶ τὴν εὐθεῖαν, ὅταν δὲ καὶ τὸ
σημεῖον στῇ καὶ ἡ εὐθεῖα, τότε νοουμένων αὐτῶν ἐν ἐπι-
πέδῳ δυνατόν ἀπὸ τοῦ σημείου ἐπὶ τὴν εὐθεῖαν κάθετον²⁰
ἀγαγεῖν.]

- 17 κη'. Ὅτι δὲ ἡ ἀπὸ τοῦ τεχόντος σημείου τῶν ἐπὶ τῆς
σφαίρας ἐπὶ τὸν ἄξονα κάθετος ἀγομένη ἐντὸς τῆς σφαίρας
αὐτῇ συμπίπτει οὕτως δειχθήσεται.

Ἐστω γὰρ σφαῖρα, ἧς ἄξων ὁ AB , πόλοι δὲ αὐτῆς τὰ²⁵
 A B σημεία, καὶ εἰλήφθω ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας
τεχὸν σημείον τὸ Γ , καὶ ἦχθω κάθετος ἐπὶ τὴν AB · λέγω
ὅτι ἐντὸς τῆς σφαίρας τῇ AB συμπίπτει.


Μὴ γάρ, ἀλλ' εἰ δυνατόν, συμπίπτειω αὐτῇ ἐκτὸς κατὰ
τὸ A σημεῖον, καὶ ἔστω ἡ ΓA ἐπὶ τὴν AB κάθετος, καὶ³⁰
εἰλήφθω τὸ κέντρον τῆς σφαίρας τὸ E σημεῖον, καὶ ἐπε-
ξέχθω ἡ EG . ἐπεὶ οὖν τὸ E σημεῖον κέντρον ἐστὶν τῆς
σφαίρας, ἴση ἐστὶν ἡ EG τῇ EA · μείζων ἄρα ἡ EA τῆς

5. 6. ἀδύνατον — γραφῆναι et totum cap. 46 interpolatori tri-
buit Hu 16. στρέφεσθαι Λ^2 ex στέγγεσθαι 22. 29' add. Hu

eo puncto ad punctum superficiiei, in eodem plano describi, in quo ea quam diximus recta ferebatur. Itaque punctum stabile in axe efficit, ut circulus a puncto quod est in superficie sphaerae describeretur. Ergo problema solvi non poterat, nisi ad stabilem axem recta perpendicularis deducta esset.

[Atque hoc etiam sciendum est, si quis rectam perpendicularem ad axem ducat et planum, quod per axem et eam perpendicularem transit, producat, id nisi stante sphaera fieri non posse. Nam dum sphaera convertitur, recta ad axem perpendicularis duci nequit. Necesse est enim planum antea suppositum sit, ut, cum in plano recta quaedam et quodlibet punctum sint, ab eo puncto perpendicularem ad illam rectam ducamus. Quodsi punctum unà cum sphaera conversa feratur et innumerabilia plana percurrat, illa autem recta stet, perpendicularis ad rectam duci non potest; at vero, si et punctum et recta stent, cum haec in uno plano cogitentur, ab eo puncto ad rectam perpendicularis potest duci.]

XXIX. Sed rectam, quae a quolibet in sphaera puncto perpendicularis ad axem ducitur, intra sphaeram axi occurrere sic demonstrabitur. Prop. 28



Sit enim sphaera, cuius axis $\alpha\beta$ et poli $\alpha\beta$, et in superficie sphaerae quodlibet punctum γ sumatur, unde recta ad $\alpha\beta$ perpendicularis ducatur; dico hanc intra sphaeram ipsi $\alpha\beta$ occurrere.

Etsi non est, tamen, si fieri possit, occurrat extra sphaeram in puncto δ (sit igitur $\gamma\delta$ perpendicularis ad $\beta\alpha$, et sumatur sphaerae centrum ϵ , et iungatur $\epsilon\gamma$. iam quia punctum ϵ centrum sphaerae est, aequales sunt $\epsilon\gamma$ $\epsilon\alpha$: ita-

25. 26. πολλοὶ δὲ καὶ τὰ $\alpha\beta$ A. corr. BS 30. καὶ — καὶ θετός
interpolata potius quam a Pappo scripta esse videntur

que $\alpha\delta > \epsilon\gamma$. Et quia in triangulo $\epsilon\gamma\delta$ est $\alpha\delta > \epsilon\gamma$, angulus etiam $\epsilon\gamma\delta$ maior est angulo $\alpha\delta\gamma$. Sed ex hypothesi angulus $\alpha\delta\gamma$ rectus est; ergo angulus $\epsilon\gamma\delta$ maior quam rectus; trianguli igitur $\epsilon\gamma\delta$ duo anguli maiores sunt duobus rectis, id quod fieri nequit. Ergo recta, quae a γ ad $\alpha\beta$ perpendicularis ducitur, non extra sphaeram ipsi $\alpha\beta$ occurrit. Ac similiter demonstrabimus eandem non occurrere in axis terminis $\alpha\beta$; ergo intra occurrit. Itaque recta, quae a γ ad $\alpha\beta$ perpendicularis ducitur, intra sphaeram cadit, q. e. d.

IN THEODOSII LIBRUM I DE DIEBUS ET NOCTIBUS.

XXX. Theodosium in quarto theoremate libri primi de diebus et noctibus¹⁾ quidam falso interpretantur. Nam cum demonstravisset diem $\nu\theta$ maiorem esse die $\mu\pi$), consentaneum erat ab eodem demonstrari etiam noctem, quae diei $\nu\theta$ praecessit, minorem esse nocte, quae diem $\mu\pi$ secutura est.

Sit enim ρ occasus ante ortum ν , et ponatur $\pi\sigma = \rho\nu$ [ex hypothesi, et fiat ratiocinatio in figura supposita]. Si igitur $\nu\theta$ minor esset quam $\mu\pi$, ex illius ratione etiam tota $\nu\delta$ minor fieret quam tota $\delta\pi$, et permutationes aequalium circumferentiarum $\nu\rho$ $\pi\sigma$ similiter perficerentur. Nunc autem, quoniam $\theta\delta$ minor quam $\delta\mu$ et $\theta\nu$ maior est quam $\mu\pi$, non apparet etiam totam $\delta\nu$ totam $\delta\pi$ minorem esse. Nam fieri potest, ut et aequalis et maior sit. Quodsi $\delta\nu$ non minor sit, iam non licebit dicere circumferentiam $\nu\rho$ minore tempore occultum hemisphaerium permutare quam $\pi\sigma$. Ergo a Theo-

1) Theodosii librorum duorum περί ημερῶν καὶ νυκτῶν propositiones edidit Dasypodius in "Sphaericae doctrinae propositionibus" (conf. supra p. 549 adnot. 4) p. 25—36; plenos "Theodosii Tripolitae de diebus et noctibus" libros in Latinum convertit Ios. Auria, Romae 1591. Sed de iis quae supra a Pappo disseruntur liquido iudicari non poterit ante quam Graecus contextus in lucem prodierit. Quem nos manibus tenemus, atque ex his schedis ea quae proxime sequuntur citamus.

*. λέγω δὲ ὅτι καὶ ἡ πρὸ τῆς θ' ὀψίας ἡμέρα (id est dies $\nu\theta$, μετὰ τὴν τῆς μετὰ τὴν M ἀνατολὴν ἡμέρας (id est die $\mu\pi$). Theodosius manu scriptus.

interpolatori tribuit Hu 24. καὶ del. Hu auctore Co 25. ἐπελάττο AB³ Paris. 2868, ἐπελάττο B¹, ἐπελάττο S

τὸν Θεοδόσιον ὅτι αἰεὶ αἱ συντιθέμεναι περιφέρεται τῶν
 νυκτῶν καὶ τῶν ἡμερῶν ἐπὶ τοῦ ΔΓ μέρους τῶν συντιθε-
 μένων περιφερειῶν ἐπὶ τοῦ ΔΕ μέρους ἐλάσσονές εἰσιν,
 οὕτως ἐπιλέγειν ὅτι καὶ τὰ λοιπὰ δειχθήσεται ὁμοίως
 ταῦτα ἐπὶ τοῦ ὑποκειμένου σχήματος. 5

- 19 λα'. Ἡμεῖς δὲ τὸ παραλειμμένον ἐπὶ τοῦ Θεοδο-
 σίου ἀπεδείξαμεν ἀστρονομικώτατα τοῦτον τὸν τρόπον.

Ἀνατελλέτω γὰρ ὁ ἥλιος πρὸς τῷ Ζ, δυνέτω δὲ πρὸς
 τῷ Η, καὶ ἔστω ἐλάσσων ἡ ΔΖ τῆς ΔΗ, καὶ πάλιν ἔστω
 ἡ μὲν προγεγεννημένη δύσις τῆς Ζ ἀνατολῆς ἡ Θ, ἡ δὲ προ- 10
 γεγεννημένη ἀνατολὴ τῆς Θ δύσειος ἡ Ν, ἔτι δὲ ἔστω ἡ μὲν
 μετὰ τὴν Η δύσιν ἀνατολὴ ἡ Κ, ἡ δὲ μετὰ τὴν Κ ἀνατο-
 λὴν δύσις ἡ Α, καὶ ἔστω ἡ μὲν ΖΘ νῆξ ἐλάσσων τῆς ΗΚ
 νυκτός, ἡ δὲ ΘΝ ἡμέρα μεῖζων τῆς ΚΑ ἡμέρας· λέγω ὅτι
 ὅλη ἡ ΔΝ ὅλης τῆς ΔΑ ἐλάσσων ἔστιν. 15


- 30 Εἰ γὰρ μή, ἦτοι ἴση ἔστιν ἡ μεῖζων. ἔστω πρότερον
 ἴση. ἐπεὶ οὖν ἐλάσσων ἔστιν ἡ μὲν ΔΖ τῆς ΔΗ ἡ δὲ ΖΘ
 τῆς ΗΚ, ὅλη ἄρα ἡ ΔΘ ὅλης τῆς ΔΚ ἐλάσσων ἔστιν.
 ἔστω οὖν αὐτῇ ἴση ἡ ΔΜ. ἔστιν δὲ καὶ ὅλη, ἡ ΝΑ ὅλη τῇ ΔΑ
 ἴση· λοιπὴ ἄρα ἡ ΘΝ λοιπῇ τῇ ΜΑ ἴση ἔστιν. ἐπεὶ οὖν 20
 ὁ ἥλιος ἀνατέλλας μὲν πρὸς τῷ Ν ἔδυνε πρὸς τῷ Θ, ἐν
 ᾧ ὁ ἥλιος τὴν ΘΝ διαπορεύεται, ἡ ΘΝ παραλλάσσει τὸ
 φανερόν ἡμισφαίριον. ἐν ἴσῳ δὲ χρόνῳ ὁ ἥλιος τὴν ΝΘ
 διαπορεύεται καὶ τὴν ἴσην τὴν ΜΑ· ἐν ἴσῳ ἄρα ὁ ἥλιος
 τὴν ΜΑ διαπορεύεται καὶ ἡ ΘΝ παραλλάσσει τὸ φανερόν 25
 ἡμισφαίριον. ἐν ἴσῳ δὲ ἡ ΘΝ παραλλάσσει τὸ φανερόν
 καὶ ἡ ΑΜ ἴσαι γὰρ οὔσαι ἴσον ἀπέχουσιν τῆς θρυτῆς
 συναφῆς· ἐν ἴσῳ ἄρα ὁ ἥλιος τὴν ΜΑ διαπορεύεται καὶ
 ἡ ΜΑ παραλλάσσει τὸ φανερόν. ἀλλ' ὁ μὲν ἥλιος τὴν
 ΜΑ διαπορεύεται ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ ἐν ᾧ ἐκατέραν τῶν 30
 ΜΚ ΚΑ διαπορεύεται, ἡ δὲ ΜΑ παραλλάσσει τὸ φανε-

5. ταῦτα — σχήματος interpolatori tribuit Hu 6. ΔΑ Δ' in
 marg. BS 10. προγεγεννημένη post μὲν; A, corr. BS, item statim
 posthac 12. τὴν Η δύσις AB, τοῦ ἡ δύσις S, corr. Hu auctore Co
 17. ἡ ΖΔ δὲ ABS, corr. Hu 23. τὴν νΘ B, τὴν ΗΘ A'S

dosio primum demonstrari oportebat summas circumferentiarum noctium et dierum in parte $\delta\gamma$ velut $\delta\vartheta + \vartheta\nu$, semper minores esse quam summas circumferentiarum in parte $\delta\epsilon$; tum vero idem addere debebat reliqua etiam similiter demonstratum iri.

XXXI. Nos autem id quod Theodosius omisit ratione plane astronomica demonstravimus hunc in modum.

Oriatur enim sol ad punctum ζ et occidat ad η , et sit ^{Prop. 29} $\delta\zeta$ minor quam $\delta\eta$, ac rursus sit occasus, qui ortum ζ praecessit, ϑ , et ortus, qui occasum ϑ praecessit, ν , ac porro sit ortus, qui occasum η sequitur, κ , et occasus, qui ortum κ sequitur, λ , et sit nox $\zeta\vartheta$ minor nocte $\eta\kappa$, diesque $\vartheta\nu$ maior die $\kappa\lambda$; dico totam $\delta\nu$ tota $\delta\lambda$ minorem esse.



Nam si non minor sit, aut aequalis est aut maior. Sit primum aequalis. Iam quia ex hypothesi $\delta\zeta$ minor est quam $\delta\eta$, et $\zeta\vartheta$ quam $\eta\kappa$, tota igitur $\delta\vartheta$ minor est quam tota $\delta\kappa$. Sit igitur ipsi $\delta\vartheta$ aequalis $\delta\mu$. Sed ex hypothesi etiam totae $\nu\delta$ $\delta\lambda$ aequales sunt: restat igitur $\vartheta\nu = \mu\lambda$. Iam quia sol, postquam ad ν ortus est, occidit ad ϑ , quo igitur tempore ipse

circumferentiam $\nu\vartheta$ permeat, eo circumferentia $\nu\vartheta$ apertum hemisphaerium permutat. Aequali igitur tempore sol et circumferentiam $\nu\vartheta$ et ei aequalem $\mu\lambda$ percurrit; itaque aequali tempore et sol circumferentiam $\mu\lambda$ percurrit et circumferentia $\nu\vartheta$ apertum hemisphaerium permutat. Sed aequali tempore et $\nu\vartheta$ et $\mu\lambda$ apertum hemisphaerium permutant quippe quae aequales sint et aequaliter ab aestivo contactu distent; aequali igitur tempore et sol circumferentiam $\mu\lambda$ percurrit et ipsa $\mu\lambda$ apertum permutat. Sed sol circumferentiam $\mu\lambda$ eodem tempore percurrit quo circumferentias $\mu\kappa + \kappa\lambda$, et $\mu\lambda$


ρὸν ἐν ᾧ ἡ μὲν ΜΚ ἀνατέλλει ἡ δὲ ΚΑ παραλλάσσει
τὸ φανερόν· ἐν ἴσῳ ἄρα χρόνῳ ὁ ἥλιος ἐκατέρωθεν τῶν ΜΚ
ΚΑ διαπορεύεται καὶ ἡ μὲν ΜΚ ἀνατέλλει ἡ δὲ ΚΑ παρ-
αλλάσσει τὸ φανερόν. ὡν ἴσος ὁ χρόνος ἐν ᾧ ὁ ἥλιος τὴν
ΚΑ διαπορεύεται καὶ ἡ ΚΑ παραλλάσσει τὸ φανερόν [ἀνα-⁵
τέλλει μὲν γὰρ πρὸς τῷ Κ, δύνει δὲ πρὸς τῷ Α]. καὶ λοι-
πὸς ἄρα ὁ χρόνος ἐν ᾧ ὁ ἥλιος τὴν ΜΚ διαπορεύεται
ἴσος ἐστὶν τῷ χρόνῳ ἐν ᾧ ἡ ΜΚ ἀνατέλλει. τοῦτο δὲ
ἐστὶν ἀδύνατον· πᾶσαν γὰρ περιφέρειαν ὁ ἥλιος ἐν πλείονι
χρόνῳ διαπορεύεται ἢ περ αὐτῇ ἡ περιφέρεια ἀνατέλλει ἢ¹⁰
πάλιν δύνει τοῦτο γὰρ δεῖξομεν ἐχομένως). οὐκ ἄρα ἴση
ἐστὶν ἡ ΝΑ τῇ ΑΑ.

- 51 Ἐστω δὲ πάλιν μείζων ἡ ΝΑ τῆς ΑΑ, καὶ κείσθω
τῇ ΑΝ ἴση ἡ ΑΞ, ἐτέθη δὲ καὶ ἡ ΑΘ ἴση τῇ ΑΜ· λοιπὴ
ἄρα ἡ ΘΝ λοιπῇ τῇ ΜΞ ἴση ἐστὶν, καὶ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ὁ¹⁵
ἥλιος τὴν ΘΝ διαπορεύεται καὶ ἡ ΘΝ παραλλάσσει τὸ φα-
νερόν. ἐν ᾧ δὲ ὁ ἥλιος τὴν ΘΝ ἐν τούτῳ καὶ τὴν ΜΞ,
καὶ ἐν ᾧ ἡ ΘΝ παραλλάσσει τὸ φανερόν, ἐν τούτῳ καὶ ἡ
ΜΞ· ἐν ἴσῳ ἄρα χρόνῳ ὁ ἥλιος τὴν ΜΞ διαπορεύεται καὶ
ἡ ΜΞ παραλλάσσει τὸ φανερόν. ἀλλ' ὁ μὲν ἥλιος δια-²⁰
πορεύεται τὴν ΜΞ περιφέρειαν ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ ἐν ᾧ
[ὁ ἥλιος] ἐκάστην τῶν ΜΚ ΚΑ ΑΞ διαπορεύεται, ἡ δὲ
ΜΞ παραλλάσσει τὸ φανερόν ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ ἐν ᾧ ἡ
μὲν ΜΚ ἀνατέλλει ἡ δὲ ΚΑ παραλλάσσει ἡ δὲ ΑΞ δύνει
[τὴν δὲ ΑΞ διαπορεύεται]. ἀλλ' ὁ χρόνος ἐν ᾧ ὁ ἥλιος²⁵
τὴν ΚΑ διαπορεύεται ἴσος ἐστὶν τῷ χρόνῳ ἐν ᾧ ἡ ΚΑ
παραλλάσσει τὸ φανερόν· καὶ λοιπὸς ἄρα ὁ χρόνος ἐν ᾧ
ὁ ἥλιος τὴν ΜΚ διαπορεύεται ἴσος ἐστὶν τῷ χρόνῳ ἐν ᾧ
ἡ ΜΚ ἀνατέλλει, καὶ ὁ χρόνος ἐν ᾧ καὶ ὁ ἥλιος τὴν ΑΞ³⁰
διαπορεύεται ἴσος τῷ χρόνῳ ἐν ᾧ ἡ ΑΞ δύνει. τοῦτο δὲ

3. 6. ἀνατέλλει — τῷ Α interpolatori tribuit Hu nam similia alijs
locis tanquam consentanea Pappus omisit; 18. ἡ ΘΗ παραλλάσσει
ABS, corr. Co 22. ὁ ἥλιος del. (Co 25. τὴν δὲ ΑΞ διαπορεύεται
del. Co 27. ὁ χρόνος — 30. ΑΞ δύνει haec sine dubio corrupta
sunt atque hunc fere in modum corrigenda: ὁ χρόνος ἐν ᾧ ὁ ἥλιος

eodem tempore apertum permutat, quo $\mu\kappa$ oritur ac $\chi\lambda$ apertum permutat; aequali igitur tempore et sol circumferentias $\mu\kappa + \chi\lambda$ percurrit; et $\mu\kappa$ oritur ac $\chi\lambda$ apertum permutat. Sed tempus quo sol circumferentiam $\chi\lambda$ percurrit aequale est ei quo ipsa $\chi\lambda$ apertum permutat; ergo per subtractionem tempus quo sol circumferentiam $\mu\kappa$ percurrit aequale est tempori quo $\mu\kappa$ oritur. Sed id fieri non potest; nam omnem circumferentiam sol maiore tempore pereurit quam ipsa circumferentia oritur vel rursus occidit, id quod deinceps (propos. 35) demonstrabimus; ergo circumferentiae $\nu\delta$ $\delta\lambda$ non sunt aequales.

Iam vero sit $\nu\delta > \delta\lambda$, et ponatur $\delta\xi = \delta\nu$; atque posita erat etiam $\delta\mu = \delta\vartheta$; restat igitur $\mu\xi = \nu\vartheta$, et aequali



tempore sol circumferentiam $\nu\vartheta$ percurrit et ipsa $\nu\vartheta$ apertum permutat. Sed eodem tempore sol circumferentiam $\nu\vartheta$ ac $\mu\xi$ percurrit; et quo tempore circumferentia $\nu\vartheta$ apertum permutat, eodem ipsa $\mu\xi$; ergo aequali tempore et sol circumferentiam $\mu\xi$ percurrit et ipsa $\mu\xi$ apertum permutat. Sed sol quidem circumferentiam $\mu\xi$ eodem tempore percurrit quo

ipsas $\mu\kappa + \chi\lambda + \lambda\xi$; circumferentia autem $\mu\xi$ eodem tempore apertum permutat quo circumferentia $\mu\kappa$ oritur ipsaque $\chi\lambda$ permutat ac $\lambda\xi$ occidit. Sed tempus quo sol circumferentiam $\chi\lambda$ percurrit aequale est ei quo $\chi\lambda$ apertum permutat; ergo per subtractionem tempus quo sol circumferentias $\mu\kappa + \lambda\xi$ percurrit aequale est ei quo ipsa $\mu\kappa$ oritur ac $\lambda\xi$ occidit.

ἑκατέραν τῶν $M\kappa$ $A\xi$ διαποιεῖται ἴσος ἐστὶν τῷ χρόνῳ ἐν ᾧ ἡ μὲν $M\kappa$ ἀνατέλλει ἢ δὲ $A\xi$ δύεται 30. post ἴσος add. ἐστὶ A. sed. del. prima m.

ἐστιν ἀδύνατον (πᾶσαν γὰρ περιφέρειαν ὁ ἥλιος ἐν πλείονι χρόνῳ διαπορεύεται ἥπερ αὐτὴ ἀνατέλλει ἢ πάλιν δύνει, ὥστε οὐκ ἂν εἴη μείζων ἢ ΝΑ τῆς ΔΑ· ἐδείχθη δὲ ὅτι οὐδὲ ἴση· ἐλάσσων ἄρα ἐστὶν ἡ ΝΑ τῆς ΔΑ. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἐξῆς δειχθήσεται. τούτων οὖν προδεδειγμένων προβήσεται καὶ ἡ τοῦ Θεοδοσίου ἀπόδειξις κατὰ τὸν εἰρημένον τρόπον.

- 52 λβ'. Ὅτι δὲ πᾶσαν περιφέρειαν ὁ ἥλιος ἐν πλείονι χρόνῳ διαπορεύεται ἥπερ ἐκείνῃ ἡ περιφέρεια ἀνατέλλει ἢ πάλιν δύνει, νῦν δείξομεν. δόξει δὲ τισι φανερόν εἶναι τοῦτο καὶ μὴ προσδεόμενον ἀπυδαίσεως· "ἐπεὶ γὰρ ὁ μὲν ἥλιος ἐνιαυτῷ τὸν κύκλον διαπορεύεται, αὐτὸς δὲ ὁ κύκλος ἐν νυκτὶ καὶ ἡμέρᾳ ἀνατέλλει, γίνεται ὁ χρόνος ἐν ᾧ ὁ ἥλιος τὸν κύκλον διαπορεύεται πολλαπλάσιος τοῦ χρόνου ἐν ᾧ ὁ κύκλος ἀνατέλλει. ἐπεὶ οὖν ἐν μείζονι χρόνῳ ὁ ἥλιος τὸν ὅλον κύκλον διαπορεύεται ἥπερ αὐτὸς ὁ κύκλος ἀνατέλλει, καὶ τὰς κατὰ μέρος τοῦ κύκλου περιφερείας ἐν μείζονι χρόνῳ ὁ ἥλιος διελεύσεται ἥπερ ἐκείναι αἱ περιφρέριαι ἀνατελοῦσιν ἢ δύσονται. ὥστε φανερόν τὸ προ-
- 53 κείμενον καὶ οὐ προσδεόμενον πλείονος ἐπισκέψεως". πρὸς τοὺς ῥητέον διότι, εἰ μὲν αἱ κατὰ μέρος ἴσαι περιφρέριαι τοῦ ζωδιακοῦ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἀνατέλλουσιν ἢ πάλιν δύνουσιν, συμφανὲς ἂν ἡμῖν ὑπῆρχεν τὸ λεγόμενον· αὐτὸς τε γὰρ ὁ κύκλος ὁμαλῶς ἂν ἀνέτελλεν καὶ οὕτως οἱ χρόνοι πρὸς ἀλλήλους συνεκρίνοντο, ἐπειδὴ καὶ ὁ ἥλιος ὁμαλῶς κινου-
 25 μενος ἐν ἴσῳ χρόνῳ τὰς ἴσας περιφερείας διέρχεται. νυνὶ δὲ τοῦ μὲν ἡλίου ὁμαλῶς διαπορευομένου τὸν κύκλον, αὐτοῦ δὲ τοῦ κύκλου ἀνωμαλῶς τὰς ἀνατολὰς καὶ τὰς δύσεις ποιουμένων οὐκ ἐξέσται ἡμῖν λέγειν ὅτι, πλείονος ὄντος τοῦ χρόνου ἐν ᾧ ὁ ἥλιος τὸν κύκλον διαπορεύεται ἥπερ αὐ-
 30 τὸς ὁ κύκλος ἀνατέλλει, πλείων ἔσται ὁ κατὰ μέρος χρόνος ἐν ᾧ ὁ ἥλιος τινὰ περιφέρειαν διαπορεύεται ἐκείνου τοῦ χρόνου ἐν ᾧ ἐκείνῃ ἡ περιφέρεια ἀνατέλλει τε καὶ δύνει.
- 54 τοιούτων δὲ τοιούτων ὑπαρχόντων οὐκ ἐστὶν τρυφήλον καθεστῆ-


At hoc fieri non potest (namque, *ut statim diximus*, omnem circumferentiam sol maiore tempore percurrit quam ipsa oritur vel occidit; ergo non maior est $\nu\delta$ quam $\delta\lambda$. Sed eandem neque aequalem esse demonstravimus; ergo $\nu\delta$ minor est quam $\delta\lambda$. Idem similiter in reliquis ostendetur. His igitur praemissis Theodosii demonstratio ea qua diximus ratione procedet.

XXXII. Sed restat ut demonstremus omnem circumferentiam a sole maiore tempore percurri quam illa circumferentia oritur vel rursus occidit. Quamquam id nonnullis consentaneum esse neque demonstratione egere videbitur. "Quoniam enim sol annuo tempore circulum *zodiacum* percurrit, ipse autem circulus unius diei noctisque spatio oritur, tempus quo sol circulum percurrit multipulum est temporis quo circulus oritur. Iam quia sol maiore tempore totum circulum percurrit quam ipse circulus oritur, item particulares circuli circumferentias maiore tempore sol percurreret quam illae orientur vel occidunt; quapropter id quod proponitur consentaneum est neque subtiliore inquisitione eget". Contra quos sic disserendum est: si particulares zodiaci circumferentiae, quae inter se aequales sunt, aequali tempore orirentur vel rursus occiderent, manifestum nobis esset id quod proponitur: namque et ipse circulus aequabiliter oriretur et tempora item inter se compararentur. quoniam sol, cum aequabiliter feratur, aequali tempore aequales circumferentias percurrit. Nunc vero, cum sol quidem circulum *zodiacum* aequabiliter percurrat, ipse autem circulus inaequabiliter ortus suos et occasus faciat, non licet nobis dicere, propterea quod sol maiore tempore circulum percurrat quam ipse circulus oriatur, particulariter tempus quo sol circumferentiam aliquam percurrit maius esse eo tempore quo illa circumferentia oritur vel occidit. Quae cum ita se habeant, nequaquam manifesto

ABS 23. $\epsilon\upsilon\alpha\iota\tau$ A, $\eta\mu\sigma\iota\tau$ B, corr. S 24. $\alpha\upsilon$ add. Hu 26. $\delta\alpha\epsilon\lambda\alpha\chi\iota\tau\alpha$ S, item p. 538. 4. 6 29. $\epsilon\zeta\epsilon\sigma\tau\iota$ conl. Hu 34. $\delta\eta$ Hu pro $\delta\epsilon$
Pappus II. 15

και διότι πᾶσαν περιφέρειαν ὃ ἥλιος ἐν πλείονι χρόνῳ διαπορεύεται ἥπερ ἡ περιμέτεια ἀνατέλλει ἢ πάλιν δύνει. πόθεν δὲ ὅτι οὐχὶ τὸν μὲν ἥλιον κύκλον ἐν πλείονι χρόνῳ διέρχεται ἥπερ αὐτὸς ὃ κύκλος ἀνατέλλει, οἱ δὲ κατὰ μέρος χρόνοι ἐν οἷς ὃ ἥλιος ἐκάστην περιφέρειαν τοῦ κύκλου διέρχεται, ἐλάττωτες εἰσιν τῶν κατὰ μέρος χρόνων, ἐν οἷς ἐκάστη τῶν τοῦ κύκλου περιφερειῶν ἀνατέλλει; ὅτι γὰρ δυνατόν ἐστιν ἐπὶ τινων κινήσεων γίνεσθαι τοῦτο, φανερόν ἐκ τούτου.

55 "Εἴτω τρίγωνον ὀρθογώνιον τὸ $AB\Delta$ ῥηθὴν ἔχον τὴν B γωνίαν, καὶ ἑκατονταπλασία συναμφοτέρως ἢ ΔA AB τῆς AB , 10 καὶ γεγράφθω περὶ κέντρον τὸ A κύκλος, καὶ ἐκκείσθω



τις εὐθεῖα ἡ $N\Theta$ ἴση τῇ $B\Delta$, καὶ διαπορευέσθω τὸ μὲν N σημεῖον ὁμαλῶς φερόμενον τὴν $N\Theta$ ἐν ὥραις δέκα, ἡ δὲ B συμβολή, καθ' ὃ συμβάλλει ἡ AB τῇ $B\Delta$, διαπορευέσθω τὴν $B\Delta$ ἐν ὥρᾳ μιᾷ, καὶ τετμίσθω ἡ EH περιφέρεια δέκα 15 κατὰ τὸ Z , καὶ ἐπιτευχθεῖσα ἐκβεβλήσθω ἡ $\Lambda Z\Gamma$. ἔπει οὖν ἐν ᾧ χρόνῳ τὸ E σημεῖον τὴν EH διαπορεύεται ἐν τοῦτῳ τῷ χρόνῳ τὸ B τὴν $B\Delta$ διαπορεύεται, ἐν ᾧ δὲ τὸ E τὴν EZ ἐν τοῦτῳ τῷ B τὴν $B\Gamma$, καὶ ἔστιν ὁ χρόνος ἐν ᾧ τὸ E τὴν EH διαπορεύεται τοῦ χρόνου ἐν ᾧ τὸ E τὴν 20 EZ διαπορεύεται διπλάσιος, καὶ ὁ χρόνος ἄρα ἐν ᾧ τὸ B τὴν $B\Delta$ διαπορεύεται τοῦ χρόνου ἐν ᾧ τὸ B τὴν $B\Gamma$ διαπορεύεται διπλάσιος. ἀλλὰ τὸ B τὴν $B\Delta$ διέρχεται ἐν ὥρᾳ μιᾷ· τὸ B ἄρα τὴν $B\Gamma$ διελείσεται ἐν ἡμιωρίῳ. καὶ ἔπει ἴση ἐστὶν ἡ EZ περιφέρεια τῇ ZH , ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ 25 $E\Lambda Z$ γωνία τῇ ὑπὸ $Z\Lambda H$ · ὥς ἄρα συναμφοτέρως ἢ ΔA

constat omnem circumferentiam a sole maiore tempore percurri quam ipsa circumferentia oritur vel occidit. Quid enim impedit quominus statuamus totum quidem circulum maiore tempore a sole percurri quam ipse circulus oriatur, particularia autem tempora, quibus sol singulas circuli circumferentias percurrit minora esse temporibus particularibus quibus singulae circuli circumferentiae oriuntur? Namque in quibusdam motibus hoc fieri posse ex hoc *lemmate* manifestum est.

Sit triangulum orthogonium $\alpha\beta\delta$ recto angulo β , sitque $\delta\alpha + \alpha\beta = 100 \alpha\beta$, et circa centrum α describatur circulus $\epsilon\zeta\eta$, et exponatur recta quaedam $\nu\vartheta = \beta\delta$, et punctum quidem ν aequabiliter procedens rectam $\nu\vartheta$ decem horis percurrat, punctum autem β , in quo scilicet rectae $\alpha\beta$ $\delta\beta$ concurrunt, ipsam $\beta\delta$ una hora percurrat, et circumferentia $\epsilon\eta$ bifariam secetur in puncto ζ , et iuncta $\alpha\zeta$ producat ad γ punctum concursus cum recta $\beta\delta$. Iam quia, quo tempore punctum ϵ circumferentiam $\epsilon\eta$, eodem punctum β rectam $\beta\delta$, et quo tempore punctum ϵ circumferentiam $\epsilon\zeta$, eodem punctum β rectam $\beta\gamma$ percurrit, et punctum ϵ circumferentiam $\epsilon\eta$ duplo maiore tempore quam ipsam $\epsilon\zeta$ absolvit¹⁾, ergo etiam punctum β rectam $\beta\delta$ duplo maiore tempore quam ipsam $\beta\gamma$ percurrit. Sed ex *hypothesi* punctum β rectam $\beta\delta$ una hora permeat; itaque β rectam $\beta\gamma$ dimidia hora permeabit. Et quia circumferentiae $\epsilon\zeta$ $\zeta\eta$ aequales sunt, est etiam

$$L \epsilon\alpha\zeta = L \zeta\alpha\eta; \text{ ergo propter elem. 6. 3}$$

$$\delta\alpha : \alpha\beta = \delta\gamma : \gamma\beta; \text{ itaque componendo}$$

1) Statuit igitur scriptor punctum ζ in circumferentia $\epsilon\eta$ ab ϵ aequabiliter procedens eodem tempore ad η pervenire quo punctum γ rectam $\beta\delta$ percurrit ita, ut, si spatia aequalibus temporibus in utraque linea emensa $\zeta\zeta'$ $\gamma\gamma'$, $\zeta\zeta''$ $\gamma\gamma''$ etc. notentur, semper rectae sint $\alpha\zeta\gamma'$ $\alpha\zeta''\gamma''$ etc.

10. καὶ ἐκαστοῦταπλάσια -- τῆς AB add. Hu auctore Co 12. ἐλ-
θεῖν ἢ ΝΟ AB, corr. S 13. τῆν ΝΟ AB, corr. S 15. περιφέρεια
A, corr. BS 22 initio. τῆν ΒΔ A'B', τῆν ΕΔ A'B'S

AB πρὸς τὴν AB , οὕτως ἢ AB πρὸς τὴν BI . ἑκατοντα-
 πλασία δὲ συναμφότερος ἢ IA AB τῆς AB . ἑκατοντα-
 πλασία ἄρα καὶ ἢ AB τῆς BI ἐὰν ἄρα ποιήσωμεν ὥς
 τὴν AB πρὸς BI , οὕτως τὴν $ΘN$ πρὸς $NΞ$, ἔσται οὖν
 καὶ ἢ $NΘ$ τῆς $NΞ$ ἑκατονταπλασία. καὶ ἔστιν ἴση ἢ BA ³
 ἢ $ΝΘ$. ἴση ἄρα καὶ ἢ BI τῇ $NΞ$. ἐπεὶ οὖν τὸ N ὁμα-
 λῶς κινούμενον διαπορεύεται τὴν $NΘ$ ἐν ὥραις δέκα, τὸ
 ἄρα ἑκατοστὸν αὐτῆς μέρος ἐν ὥρας δεκάτῃ διελεύσεται,
 τὸ δὲ B ἀνωμάλως κινούμενον διέρχεται τὴν BI ἐν ὥρας
 56 ἡμίσει. δύο οὖν ὑπαρχουσῶν κινήσεων καὶ τῆς μὲν ἀνω-10
 μάλου τῆς δὲ ὁμαλῆς, ὁ μὲν ὅλος χρόνος ἐν ᾧ τὸ N τὴν
 $NΘ$ διέρχεται ὁμαλῶς τοῦ ὅλου χρόνου τοῦ ἐν ᾧ τὸ B τὴν
 BA διέρχεται ἀνωμάλως πλείων ἐστίν, ὁ δὲ κατὰ μέρος
 χρόνος ἐν ᾧ τὸ N τὴν $NΞ$ διέρχεται τοῦ κατὰ μέρος χρό-
 νου ἐν ᾧ τὸ B τὴν BI διέρχεται ἐλάσσων ἐστίν. ὥστε 15
 οὐθὲν ἀπέχει καὶ ἐπὶ τῆς τοῦ ἡλίου κινήσεως καὶ τῆς τοῦ
 κύκλου ἀνατολῆς τὸ αὐτὸ γίνεσθαι, τὸν μὲν ἥλιον ἐν μεί-
 ζονι χρόνῳ διαπορεύεσθαι τὸν κύκλον, αὐτὸν δὲ τὸν κύκλον
 ἐν ἐλάσσονι ἀνατέλλειν, πάλιν δὲ ἐκ τῶν ἐναντίων τινὰς
 μὲν περιφερείας τοῦ κύκλου ἐν πλείονι χρόνῳ ἀνατέλλειν, 20
 τὸν δὲ ἥλιον αὐτὰς ἐν ἐλάσσονι χρόνῳ διέρχεσθαι. μειου-
 μένου γὰρ τοῦ τάχους τῆς ἀνατολῆς τοῦ κύκλου, πόθεν ὅτι
 οὐχὶ μειοῦται ἐ.γὶ τοσοῦτον ὥστε τινὰ περιφέρειαν αὐτοῦ
 ἐν μείζονι χρόνῳ ἀνατέλλειν ἢ περὶ ὁ ἥλιος ἐκείνην τὴν περι-
 25 φέρειαν διέρχεται;

57 λγ'. Αἰεὶ οὖν ἡμᾶς ἐπισκέψασθαι πότερον ποτε τοῦ
 ἡριδιακοῦ τὸ τάχος τῶν ἐπ' ἄπειρον αἰξομένων καὶ ἐπ'
 ἄπειρον μειουμένων ἐστίν, ἢ τῶν ἐπ' ἄπειρον μὲν αἰξομέ-
 νων οὐκ ἐπ' ἄπειρον δὲ μειουμένων, ἢ τῶν ἐπ' ἄπειρον
 μὲν μειουμένων οὐκ ἐπ' ἄπειρον δὲ αἰξομένων, ἢ οὔτε τῶν 30
 ἐπ' ἄπειρον μειουμένων οὔτε τῶν ἐπ' ἄπειρον αἰξομένων.
 ὅτι γὰρ περὶ τινα μέγεθος ταῦτα γίνεσθαι συμβαίνει. φε-
 νερὸν ἐκ τούτων.

3. ἄρα add. S, δὴ Hu ποιήσωμεν Hu pro ποιήσω οὖν 4. οὖν
 ἄρα conl. Hu 7. διαπορεύεται τὴν Hu pro ἐπέρχεται τῇ 11. 12. τὸ

$\delta\alpha + \alpha\beta : \alpha\beta = \delta\beta : \gamma\beta$. Sed ex hypothesis est
 $\delta\alpha + \alpha\beta = 100 \alpha\beta$; ergo etiam

$\beta\delta = 100 \beta\gamma$. Si igitur fecerimus $\vartheta\gamma : \gamma\xi = \delta\beta : \beta\gamma$,
 erit etiam


$\gamma\vartheta = 100 \gamma\xi$. Et ex hypothesis est $\gamma\vartheta = \beta\delta$; ergo etiam
 $\gamma\xi = \beta\gamma$.

Iam quia ex hypothesis punctum γ aequabili motu rectam $\gamma\vartheta$ decem horis permeat, centesimam igitur eius rectae partem horae decima parte percurrent; punctum autem β , quod inaequaliter movetur, rectam $\beta\gamma$ dimidia hora percurrit. Itaque cum duo sint motus, alter aequalis, alter inaequalis, totum quidem tempus, quo punctum γ rectam $\gamma\vartheta$ aequabiliter percurrit, maius est toto tempore, quo punctum β rectam $\beta\delta$ inaequaliter; sed particulare tempus, quo punctum γ rectam $\gamma\xi$ percurrit, minus est particulari tempore, quo β rectam $\beta\gamma$ permeat. Quamobrem nihil impedit, quominus in solis motu et circuli zodiaci ortu idem contingat, scilicet ut sol circumulum maiore tempore percurrat, ipse autem circulus minore oriatur, et rursus e contrario quaedam circuli circumferentiae maiore tempore orientur, sol autem eas minore tempore percurrat. Nam si velocitas, qua circulus oritur, magis magisque imminuitur, quid impedit, quin adeo imminuatur, ut quaedam eius circuli pars maiore tempore oriatur, quam eandem sol percurrat?

XXXIII. Ergo nobis considerandum est, sitne zodiaci velocitas ex numero eorum quae in infinitum et augeantur et minuantur, an eorum quae in infinitum quidem augeantur, neque tamen in infinitum minuantur, an eorum quae in infinitum minuantur, neque tamen in infinitum augeantur, an eorum quae neque minuantur neque augeantur in infinitum. Etenim in quibusdam magnitudinibus ea contingere ex his apparet.

$\bar{\nu}$ τη NO A. τὸ ἡ τὴν ῥὸ B, τὸ ἡ τὴν ἡ S, corr. Co 13. ὥστε etc.
 .IT add. A¹ in marg. BS 18. δὲ το πύκλον A, corr. BS 26. ἐγ'
 huc transponit Hu vide ad vs. 43 27. ζωδιακοῦ ABS 28. τοῦ
 ἐπ' ἀπέτρων A, corr. BS 30. μὲν add. Hu

- 55 Παντὸς γὰρ τοῦ προειθεντος μεγέθους μείζονα γίνεται καὶ πάλιν ἐλάττωνα πάντα τὰ ἐπὶ τῶν ἀδιορίστων προβλημάτων γινόμενα.



Λεγμάτων γὰρ ἔστιν περὶ τὴν δοθεῖσαν εὐθείαν παντὸς τοῦ παραβεβλημένου ἴσθι χωρίου ὑπερβάλλοντος τετραγώνῳ μείζον χωρίον παραβάλλειν ὑπερβάλλον τετραγώνῳ καὶ πάλιν ἔλασσον, καὶ τοῦτο γίνεται ἐπ' ἄπειρον. ἐπὶ ταύτης οὖν τὸ μέγεθος τῆς παραβολῆς αὔξεται ἐπ' ἄπειρον καὶ πάλιν μειοῦται.

- 59 Τῶν δὲ ἐπ' ἄπειρον ἀξομέτων οὐκ ἐπ' ἄπειρον δὲ 10 μειοιμέτων ἔστιν τὸ ἐπὶ τοῦ προγεγραμμένου τριγώνου γινόμενον.

Ἐὰν γὰρ ἡ τρίγωνον τὸ $\triangle ABΓ$, καὶ τμηθῇ διὰ ἡ $\triangle AΓ$ κατὰ τὸ E , καὶ διαχθῇ ἀπὸ τοῦ E εὐθεῖα ἡ ZEH , ἔστι μείζον τὸ ZHB τρίγωνον τοῦ $\triangle ABΓ$ τριγώνου. καὶ πάλιν 15 ἔὰν διαχθῇ ἡ $\triangle EK$, μείζον ἔστι τὸ BOK τοῦ $\triangle ZBH$ τριγώνου. καὶ αἰεὶ διαγομέτων ἐπ' ἄπειρον τῶν εὐθειῶν αὐξηθήσεται τὸ τρίγωνον. οὐδέποτε δὲ ἡ διαχθεῖσα εὐθεῖα ποιήσει τρίγωνον ἔλασσον τοῦ $\triangle ABΓ$ τριγώνου. τοῦτο οὖν τὸ μέγεθος αὔξεται μὲν ἐπ' ἄπειρον, μειοῦται δὲ 20 οὐκέτι, ἀλλ' ἔστι τι μέγεθος τοῦ $\triangle ABΓ$ τριγώνου ἔλασσον ὃ οὐκ ἔστιαι τρίγωνον.

- 60 λδ'. Τῶν δὲ ἐπ' ἄπειρον μὲν μὴ ἀξομέτων ἐπ' ἄπει-

7. ἐπὶ — 9. μειοῦται interpolatori tribuit Hu 11. γινόμενον B, γινόμενον A'S 19. τοῦτο — 22. τριγώνου interpolatori tribuit Hu 23. $\triangle AΓ$ A' in marg. [BS]

Ex numero eorum quae in infinitum et augentur et Prop. 31
minuuntur omnes magnitudines, quaecunque in problematis
indeterminatis efficiuntur, vel maiores vel rursus minores sunt
omni magnitudine proposita.

Si enim ad datam rectam, *velut* $\lambda\zeta\alpha\delta$, constructum sit
 rectangulum $\alpha\beta\gamma\delta$ *maiore latere* $\alpha\delta$, eique additum quadra-
 tum $\alpha\beta\epsilon\zeta$, fieri potest, ut maius rectangulum $\alpha\epsilon\theta\delta$ unà cum
 maiore quadrato $\alpha\tau\chi\lambda$ construatur, et rursus rectangulum
 $\alpha\mu\nu\delta$, quod unà cum quadrato $\alpha\mu\xi\sigma$ minus sit quam rectan-
 gulum $\alpha\beta\gamma\delta$ unà cum quadrato $\alpha\beta\epsilon\zeta$ ³¹. Atque utrumque fit
 in infinitum.

Eorum vero quae in infinitum augentur, neque tamen Prop. 32
 in infinitum minuuntur, est hoc quod fit in triangulo ad-
 scripto.



Etenim si sit triangulum $\alpha\beta\gamma$,
 cuius latus $\alpha\gamma$ bifariam secetur in
 ϵ , et si, *producto latere* $\beta\alpha$, du-
 catur per ϵ ad *basim* recta $\zeta\epsilon\eta$,
 triangulum $\zeta\epsilon\theta$ triangulo $\alpha\gamma\beta$ ma-
 ius est³¹. Et rursus, si ducatur
 recta $\theta\alpha\epsilon$, triangulum $\theta\alpha\beta$ maius
 est triangulo $\zeta\epsilon\theta$. Et semper in
productâ $\beta\alpha$ aliis punctis remo-
 tioribus sumptis et per ϵ rectis in
 infinitum ductis triangulum auge-

bitur. Nunquam autem eiusmodi recta triangulum efficiet
 minus triangulo $\alpha\beta\gamma$ ³².

XXXIV. Eorum autem quae in infinitum minuuntur, ne- Prop. 33

³¹ Perspicuitatis causa figuram cum litteris addidimus ad eamque
 interpretationem verborum Graecorum, quae absque figurae ratione
 generaliter composita sunt, conformavimus. Ceterum *conf. elem. 6, 29*,
Archim. de conoidibus et sphaeroid. prop. 3.

³² Ductâ enim $\alpha\lambda \parallel \beta\gamma$, quia ex constructione est $\alpha\epsilon = \epsilon\gamma$, trian-
 gula $\alpha\epsilon\lambda$ $\gamma\epsilon\eta$ aequalia ac similia sunt; itaque $\Delta \alpha\epsilon\zeta > \Delta \gamma\epsilon\eta$; ergo
 etiam $\Delta \zeta\epsilon\theta > \Delta \alpha\gamma\beta$ (Co.).

³³ Namque etiam, si, *productâ* $\beta\gamma$, similiter rectae per ϵ ducantur,
 maiora trianguia fiunt (Co.).

ρον δὲ μειονύμένων ἐστὶ τὸ ἐπὶ τῆς εὐθείας τῆς ἐναρμόζου-
μένης εἰς τὸν κύκλον. οὐ γὰρ πάσις τῆς προτεθείσης δυ-
νατὸν ἐστὶν μείζονα εἰς τὸν κύκλον ἐναρμόσαι. ἐπειδὴ γὰρ
ἐστὶν ὠρισμένον μέγεθος τὸ τῆς διαμέτρου, ταύτης μείζονα
εὐθεῖαν οὐ δυνατὸν ἐναρμόσαι· ἐπὶ μέντοι γε τὸ ἔλασσον ὁ
δυνατὸν ἐστὶν γίνεσθαι ἐπ' ἄπειρον πάσις γὰρ εὐθείας
δυνατὸν ἐστὶν ἐλάσσονα ἐναρμόσαι.

Φανερόν δὲ γίνεται τὸ λεγόμενον καὶ ἐκ τοῦ μὴ πᾶν
τὸ δοθὲν παρὰ τὴν δοθεῖσαν παραβάλλεσθαι ἑλλείπον τε-
τραγώνῃ· τὸ γὰρ παραβαλλόμενον χωρίον οὐκ ἐπ' ἄπειρον¹⁰
δυνησόμεθα αὐξοῦντες παραβάλλειν, ἐπειδὴ ἐστὶν τι χωρίον,
οὐ μείζον οὐκέτι δυνατὸν ἐστὶν παραβάλλειν· μειοῦντες
μέντοι γε δυνησόμεθα παντὸς τοῦ προτεθέντος ἔλασσον
παραβάλλειν. θεωρεῖται γοῦν τοῦτο τὸ μέγεθος τῆς πα-
ραβολῆς ἐπ' ἄπειρον μὴ αὐξόμενον μειούμενον δὲ ἐπ'¹¹
ἄπειρον.

61) Τῶν δὲ μῖτε ἐπ' ἄπειρον δυναμένων αὐξεσθαι μῖτε
ἐπ' ἄπειρον μειονύμένων ἀλλ' ἐπὶ τινα μεγέθη ὠρισμένα,
κατὰ πάντων τούτων ἐστὶν τὸ ἐπογεγραμμένον.

Ἐὰν γὰρ ὥσι δύο κύκλοι ἐφαπτόμενοι ἀλλήλων κατὰ²⁰
τὸ A , ἄλλος δὲ τις κύκλος τοῦ μὲν ἐνὸς ἐφάπτεται κατὰ
τὸ B , τὸν δὲ ἕτερον τέμνῃ κατὰ τὰ Γ , Δ , καὶ ἀπὸ τῶν Γ
 Δ πρὸς τὰς ἀφὰς τῶν κύκλων κλασθῶσιν εὐθεῖαι αἱ $A\Gamma$
 $\Gamma\Delta$ $B\Gamma$ $B\Delta$, ἔστιν πασῶν τῶν κλωμένων γωνιῶν πρὸς τὴν
περιφέρειαν τοῦ $BEAZ$ κύκλου μεγίστη, μὲν ἢ ἐπὶ $\Gamma\Delta\Delta$,²⁵
ἐλαχίστη δὲ ἢ ὑπὸ $\Gamma B\Delta$. ἐπὶ τούτου οὐκ ἐπ' ἄπειρον μειοῦνται, ἀλλ' ἐστὶν
μέγεθος γωνίας ἧς ἔλασσον οὐκέτι δύναται γενέσθαι. καὶ
πάλιν αὐξομένη ἢ γωνία οὐκ ἐπ' ἄπειρον αὐξεται, ἀλλ'

6. 7. πάσης — ἐναρμόσαι interpolatori tribuit Hu 8. Φανερόν
— 14. παραβάλλειν! haec quoque interpolatori potius quam ipsi Pappo
tribuenda esse videntur 41. αὐξον sine spir. et acc. A, αὐξοι B,
αὐξον S. corr. Hu 44. θεωρεῖται — 46. ἄπειρον et 18. 19. ἀλλ' ἐπὶ
— τούτων interpolatori tribuit Hu 26. ἢ ὑπὸ $\Gamma B\Delta$ A, coniunx.
BS 26. ἐπὶ — p. 516, 2. γενέσθαι interpolatori tribuit Hu 26. τοί-
ν BStw invito A

que tamen in infinitum augentur, est *problema* de recta quae in circulo construatur¹. Neque enim, qualibet recta proposita, fieri potest, ut maior in circulo construatur. Nam quia diametri magnitudo definita est, recta diametro maior in circulo construi non potest; ad minus autem hoc fieri potest in infinitum.

Idem etiam inde apparet, quod ad datam rectam non quodvis datum *spatium*, deficiens quadrato, applicari potest. Namque, ut *Euclides docet elem. 6. 28*, spatium applicandum non in infinitum augere poterimus, quoniam est spatium ali-quod, quo maius nullum aliud applicari possit: minuentes autem poterimus *spatium* minus omni proposito applicare.

Eorum denique quae neque augeri in infinitum neque *Prop. 34*
minui possunt est id quod sequitur.



Si enim duo sint circuli in puncto α extrinsecus se tangentes, unum autem ex his alius circulus intus in puncto β tangat, alterumque in $\gamma \delta$ secet, et a $\gamma \delta$ ad contactus puncta $\alpha \beta$ anguli $\gamma \alpha \delta \gamma \beta \delta$ ducantur, omnium angulorum, qui ex $\gamma \delta$ ducti vertex habent in circumferentia circuli $\beta \alpha \zeta$, maximus est $\gamma \alpha \delta$, minimus autem $\gamma \beta \delta$: *ilique an-*

¹ Quomodo eiusmodi recta ab uno diametri termino in circulo ducatur, docet *Euclides elem. 4, 4*, eadem quomodo diametro parallela. *Pappus III propos. 48. Conf. etiam elem. 8, 7.*


* Nam si quilibet alii anguli, vertex in circumferentia $\beta \alpha \zeta$ habentes, velut $\gamma \zeta \delta \gamma \theta \delta$ ducantur, facile demonstratur esse

$\angle \gamma \zeta \delta > \angle \gamma \eta \delta$, id est $> \angle \gamma \beta \delta$, et
 $< \angle \gamma \alpha \delta$; atque item

$\angle \gamma \theta \delta < \angle \gamma \iota \delta$, id est $> \angle \gamma \beta \delta$, et
 $< \angle \gamma \alpha \delta$, id est $< \angle \gamma \alpha \delta$.

ἔστι τι μέγεθος γωνίας ὠρισμένον, ἧς μείζον οὐδέτι δύναται γενέσθαι.

- 62 λέ'. Τοῦτων οὖν προειρημένων ἀποδείξομεν νῦν ὅτι τοῦ ζῳδιακοῦ τὸ τάχος μειούμενον οὐδέποτε ἑλασσόν ἐστιν τοῦ τάχους τοῦ ἡλίου, ἀλλ' αἰετὴν τεχούσαν περιφέρειαν τοῦ ζῳδιακοῦ ὁ ἥλιος ἐν μείζονι χρόνῳ διέρχεται ἢ περ ἐκεῖνη ἀνατέλλει ἢ πάλιν δύνει.



Ἐστω γὰρ ὁρίζων μὲν ὁ AB , θερινὸς δὲ τροπικὸς ὁ $BEΔ$, ζῳδιακὸς δὲ ὁ $ΓΘΛ$, μέγιστος δὲ τῶν παραλλήλων ὁ $ΚΝΜ$, καὶ ἔστω ἡ ἀρχὴ τοῦ καρκίνου ἐπὶ τῆς δύσεως, καὶ ἀπειλήφθω τεχνούσα τις περιφέρεια τοῦ ζῳδιακοῦ ἢ $ΑΘ$. λέγω ὅτι ἐν μείζονι χρόνῳ ὁ ἥλιος τὴν $ΑΘ$ περιφέρειαν διέρχεται ἢ περ ἢ $ΑΘ$ δύνει.

Γεγραφθῶ γὰρ διὰ τοῦ $Θ$ μέγιστος κύκλος ἐφαπτόμενος τοῦ ἀρκτικού ὁ $ΘΞ$, καὶ ἐπεὶ ἡ τῆς σφαίρας διάμετρος πρὸς τὴν τοῦ θερινοῦ κύκλου διάμετρον λόγον ἔχει δυνάμει ὅν τὰ $χκθ'$ πρὸς τὰ $φκθ'$ ἐπεὶ περ ἡ ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας ἐπὶ τὸ κέντρον τοῦ τροπικοῦ λόγον ἔχει μήκει πρὸς τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ τροπικοῦ ὅν τὰ $ι'$ πρὸς τὰ $κγ'$, ἐλάσσων ἄρα ἡ διπλασία ἐστὶν ἡ τῆς σφαίρας διάμετρος τῆς τοῦ τροπικοῦ διαμέτρου· ἡ ἄρα διπλασία τῆς διαμέτρου τῆς σφαίρας ἐλάσσων ἐστὶν ἢ τετραπλασία τῆς τοῦ τροπικοῦ διαμέτρου. ἡ δὲ διπλασία τῆς διαμέτρου τῆς σφαίρας πρὸς τὴν τοῦ $BEΔ$ κύκλου διάμετρον μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἢ MN περιφέρεια πρὸς τὴν $ΑΘ$ περιφέρειαν, ὥς ἐστὶ τῶν σφαιρικῶν τοῦ $γ'$ βιβλίου θεωρήματι ιβ'. πολλῇ ἄρα ἐλάσσων ἐστὶν ἢ τετραπλασία ἢ MN περιφέρεια τῆς $ΑΘ$ περιφερείας. καὶ ἐπεὶ τὸ τοῦ κόσμου τάχος τοῦ τοῦ ἡλίου τάχους μείζον ἐστὶν ἢ τετρα-

guli intra positi. velut $\gamma\zeta\delta$ $\gamma\theta\delta$, ultra hos terminos neque augeri possunt neque minui¹⁾.

XXXV. His igitur praemissis iam demonstrabimus zodiaci velocitatem, quantumcunque imminuatur, nunquam solis velocitate minorem esse, sed quolibet zodiaci circumferentiam a sole permeari maiore tempore quam illa ipsa orienti vel rursus occidit. Prop. 35

Sit enim horizon $\alpha\beta$, aestivus tropicus $\beta\delta$, zodiacus $\delta\lambda$, maximus parallelorum $\kappa\mu$, et sit δ principium cancri in occasu, et abscindatur quaelibet zodiaci circumferentia $\delta\theta$; dico circumferentiam $\delta\theta$ a sole maiore tempore permeari quam ipsa $\delta\theta$ occidit.

Describatur enim per θ maximus circulus $\theta\Xi$ arcticum circulum contingens, et quia quadratum diametri sphaerae ad quadratum diametri aestivi tropici proportionem habet 629 : 529 quoniam recta a sphaerae centro ad tropici centrum ducta ad radium tropici proportionem habet 10 : 23, sphaerae igitur diameter minor est quam dupla tropici diameter²⁾. Ergo dupla sphaerae diameter minor est quam quadrupla tropici diameter. Sed dupla sphaerae diameter ad circuli $\beta\delta$ diametrum maiorem proportionem habet quam circumferentia $\mu\nu$ ad circumferentiam $\delta\theta$, ut est in Theodosii sphaericorum libri III theoremate 12; multo igitur circumferentia $\mu\nu$ minor est quam quadrupla circumferentia $\delta\theta$. Et quoniam mundi velocitas maior est quam quadrupla solis velo-

1) Ergo hoc quoque demonstratum esse scriptor supponit, esse $\angle \gamma\theta\delta > \angle \gamma\zeta\delta$, atque omnino angulum, cuius vertex in circumferentia $\alpha\zeta\beta$ (vel $\alpha\epsilon\beta$) propior est puncto α , maiorem esse angulo, cuius vertex remotior.

2) Apparet proportionem diametri sphaerae ad diametrum tropici a scriptore summi = $\frac{1}{2} 629 : \frac{1}{2} 529 = 25,08 : 23$; qua tamen ratione et hoc et reliqua quae supra posuit ex Ptolemaei tabulis (quibus sine dubio usus est) derivaverit, hic breviter explicari non potest.

3. $\lambda\epsilon$ A¹ in marg. BS

vs. 6. 16
coni. Hu

4. $\zeta\omega\delta\iota\alpha\chi\omega\delta$ A, $\zeta\omega\delta\iota\alpha\chi\omega\delta$ BS, item

10. $\zeta\omega\delta\iota\alpha\chi\omega\delta$ A, $\zeta\omega\delta\iota\alpha\chi\omega\delta$ BS


13. $\epsilon\sigma\tau\iota\eta\ \eta\ \epsilon\sigma\tau\iota\mu$ A

πλάσιον, καὶ ὁ μὲν κόσμος διὰ τοῦ ΚΝΗ κύκλου φέρεται
 ὁ δὲ ἥλιος διὰ τοῦ ΑΘΑ, ἐν ᾧ ἄρα ὁ ἥλιος τὴν ΘΑ περι-
 ριφέρειαν διαπορεύεται, ἐν τοῦτῃ τὸ Ν μεῖζονα τῆς ΝΜ
 περιφέρειαν διέρχεται (ἐπειδὴ τὸ Ν ἰσοσταχῶς φέρεται τῇ
 κόσμῳ)· ἐν μεῖζονι ἄρα χρόνῳ ὁ ἥλιος τὴν ΑΘ περιφέρειαν
 διαπορεύεται ἥπερ τὸ Ν ἐπὶ τὸ Μ παραγίνεται. γεγραφθῶ
 δὴ διὰ τοῦ Θ παράλληλος κύκλος ὁ ΗΘΖ. ἐν ἴσῳ δὲ
 χρόνῳ τὸ Ν ἐπὶ τὸ Μ παραγίνεται καὶ τὸ Θ ἐπὶ τὸ Η
 ὅμοιαι γάρ εἰσιν αἱ ΝΜ ΘΗ περιφέρειαι· ἐν μεῖζονι ἄρα
 χρόνῳ ὁ ἥλιος τὴν ΑΘ περιφέρειαν διαπορεύεται ἥπερ τὸ
 Θ ἐπὶ τὸ Η παραγίνεται. ἐν ᾧ δὲ τὸ Θ ἐπὶ τὸ Η παρα-
 γίνεται, ἡ ΑΘ δύνει· ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ ὁ ἥλιος τὴν
 ΑΘ περιφέρειαν διαπορεύεται ἥπερ ἡ ΑΘ δύνει. ἐν ἴσῳ
 δὲ χρόνῳ ἡ ΑΘ δύνει καὶ ἴση καὶ ἀπεναντίον ἡ μετὰ τὸν
 αἰγόνκερω ἀνατέλλει. καὶ ἴσας οὖσας αὐτὰς ὁ ἥλιος ἐν ἴσῳ
 χρόνῳ διαπορεύεται· ὥστε καὶ ἐν πλείονι χρόνῳ ὁ ἥλιος
 τὴν μετὰ τὸν αἰγόνκερω περιφέρειαν δίδεισιν ἥπερ ἐκείνη
 ἀνατέλλει. πεποιήμαι δὲ τὸν λόγον ἐπὶ τούτων τῶν ἐπὶ
 τοῦ ζῳδιακοῦ περιφερειῶν, ἐπειδὴ ἡ μὲν δοκεῖ ἐν πλείστῃ
 61 χρόνῳ δύνειν, ἡ δὲ ἐν πλείστῃ ἀνατέλλειν. ἐπεὶ δ' ἡ ἀπὸ 20
 τῆς συναρῆς τοῦ καρκίνου ἐν πλείστῃ χρόνῳ δύνουσα πα-
 σῶν τῶν λοιπῶν περιφερειῶν τοῦ ζῳδιακοῦ κύκλου δέδει-
 κται, αὕτη δὲ δέδεικται ἐν ἐλάσσονι χρόνῳ δύνουσα ἥπερ ὁ
 ἥλιος αὐτὴν δίδεισιν, πολὺ μᾶλλον οὖν αἱ λοιπαὶ ἐν ἐλάσ-
 25 σονι χρόνῳ δύνονται ἥπερ ὁ ἥλιος αὐτὰς δίδεισιν. πάλιν 25
 ἐπεὶ ἡ ἀπὸ τῆς συναρῆς τοῦ αἰγόνκερω περιφέρεια ἐν πλεί-
 στῃ χρόνῳ ἀνατέλλει πασῶν τῶν λοιπῶν περιφερειῶν τοῦ
 ζῳδιακοῦ, δέδεικται δὲ ἐν ἐλάσσονι χρόνῳ ἀνατέλλουσα

2. τὴν ΘΑ Α'Β, sed in A Α mutatum in Α incertum, qua manu,
 unde τὴν ΘΑ S 8. ἐπὶ τὸ Ν ante ὅμοιαι. AS, corr. B 9. αἱ ΝΑΙ
 ΘΝ ABS, corr. Co 12. post πλείονι add. ἐν αἱ ABS, del. Hu auc-
 tore Co 13. 14. ἐν ἴσῳ δὲ χρόνῳ ἡ ΑΘ add. A² in marg. BS
 13. αἰγόνκερω AB, αἰγόνκερων S, item vs. 17 18. ἐπὶ ante τοῦ ζῳ-
 διακοῦ, delendum esse videtur 19. ζῳδιακοῦ A, ζῳδιακοῦ BS, item
 vs. 22. 28 et p. 550, 2 20. ἐπειδὴ ἡ AB, ἐπειδὴ S, cum igitur Co.

ἥπερ ὁ ἥλιος αὐτὴν διέρχεται, πολὺ μᾶλλον ἄρα αἱ λοιπαὶ τοῦ ἑρδιακοῦ περιφέρεται ἐν ἐλάσσονι χρόνῳ ἀντελοῦσιν ἥπερ ὁ ἥλιος αὐτὰς διέρχεται, ὅπερ: ~

- 65 λς'. Ἐάν δὲ τὸ μὲν Z ἢ δέσις, ἢ δὲ τὸ H ἀνατολή, ἔσται ὁ τῆς ZH περιφερείας χρόνος, ἐν ᾧ αὐτὴν ὁ ἥλιος διέρχεται, νυκτός. ὅτι δὲ ἀνίσων οὐσῶν τῶν $Z\Delta$ ΔH αὐ γίνεται μέσης νυκτός ἢ τροπῆς, δῆλον [διότι ἀνισός ἐστι καὶ ὁ χρόνος τῆς $Z\Delta$ ἢν δίδειν ὁ ἥλιος]. ὅτι δὲ καὶ μεγίστη ἐστὶν ἡ $Z\Delta H$ [περιφέρεια] νύξ πασῶν τῶν ἐν τῇ ἐνιαυτῇ οὐ ἀρχὴ ἢ θερυνὴ τροπῇ, δῆλον, ἐπεὶ ἐν πλείστῳ 10
- 66 ἡ $Z\Delta H$ παραλλάσσει τὸ ἀφανὲς ἡμισφαίριον. ἔστω δὲ



δεῖξαι καὶ τὰ ἐφ' ἑκάτερα, καὶ ἔστω πρῶτον μείζων ἡ $Z\Delta$ τῆς ΔH , καὶ ἔστω ἀνατολή ἢ πρὸ τῆς Z δέσεως τὸ 15 Θ , καὶ τῇ $Z\Theta$ ἴσῃ ἢ KH ἐν ἴσῳ ἄρα χρόνῳ ὁ ἥλιος τὰς $Z\Theta$ KH διαπορεύεται. ἀλλ' ἐν ᾧ τὴν $Z\Theta$ διαπορεύεται, ἡ $Z\Theta$ παραλλάσσει 20 σει τὸ φανερὸν ἡμισφαίριον, ἐν ἐλάσσονι δὲ χρόνῳ ἡ $Z\Theta$ παραλλάσσει τὸ φανερὸν ἡμισφαίριον τῆς KH . ἐν

ἐλάσσονι ἄρα χρόνῳ ὁ ἥλιος τὴν KH δίδειν ἥπερ ἡ KH 25 ἐξαλλάσσει τὸ φανερὸν ἡμισφαίριον. ἐν ᾧ ἄρα ἡ KH παραλλάσσει τὸ φανερὸν ἡμισφαίριον, ὁ ἥλιος μείζονα τῆς KH περιφερείας περιφέρειαν διελεύσεται. διεληλυθὲν τὴν HA τοῦ ἄρα K σημείου ὄντος ἐπὶ δυσμὰς ὁ ἥλιος πρὸς τῇ A ὧν ἐστὶν ἐπὶ γῆν. Ἦν' οὖν ἐπὶ τῆς δέσεως γένηται, προσ- 30 διελεύσεται ἓνα περιφέρειαν. προσδιερχέσθω τὴν AM . ἐν ᾧ ἄρα ἡ HM ἐξαλλάσσει τὸ φανερὸν ἡμισφαίριον, ἐν

2. ἀνατίλλουσιν ABS , corr. Hu 3. ὅπερ] ο A , om. BS 4. $\Delta\zeta$ A^1 in marg. BS 7. 8. διότι — ἥλιος cf 9. περιφέρεια interpolatori tribuit Hu 15. ἡ πρὸ add. Hu 20. ἡ $Z\Theta$ A^1S , ἡ $\zeta\eta$ B cod. Co 32. post ἄρα add. χρόνῳ S

pore oritur quam omnes reliquae zodiaci circumferentiae, haec ipsa autem minore tempore oriri demonstrata est quam a sole permeatur, multo igitur minore tempore reliquae zodiaci circumferentiae orientur quam a sole permeantur, q. e. d.

XXXVI. Quodsi ζ sit occasus, et η ortus, nocturnum ^{Prop. 26} tempus erit, quo sol circumferentiam $\zeta\eta$ permeat¹⁾. Iam vero apparet, si circumferentiae $\zeta\delta$ $\delta\eta$ inaequales sint, conversionem non fieri media nocte. Atque item apparet noctem $\zeta\delta\eta$, maximam esse omnium in annuo tempore, cuius initium est aestiva conversio, quoniam circumferentia $\zeta\delta\eta$ maximo tempore occultum hemisphaerium permutat²⁾. Tamen utrumque iam *peculiariter* demonstretur.

Sit primum $\zeta\delta$ maior quam $\delta\eta$, et sit ϑ ortus qui oc- ^{Prop. 27} casum ζ antecedit, et ipsi $\zeta\vartheta$ aequalis $\eta\kappa$: aequali igitur tempore sol circumferentias $\zeta\vartheta$ $\eta\kappa$ percurrit. Sed quo tempore sol circumferentiam $\zeta\vartheta$ percurrit, ipsa $\zeta\vartheta$ apertum hemisphaerium permutat; minore autem tempore circumferentia $\zeta\vartheta$ quam $\eta\kappa$ apertum hemisphaerium permutat; ergo minore tempore sol circumferentiam $\eta\kappa$ permeat quam ipsa $\eta\kappa$ apertum hemisphaerium permutat. Itaque quo tempore $\eta\kappa$ apertum hemisphaerium permutat, sol maiorem quam $\eta\kappa$ circumferentiam percurrat. Percurrat ipsam $\iota\lambda$; si igitur punctum κ iam pervenerit ad occasum, sol in puncto λ adhuc super terram est. Ut igitur ad occasum perveniat, aliam insuper circumferentiam percurrat. Percurrat ipsam $\lambda\mu$; quo igitur tempore $\eta\mu$ apertum hemisphaerium permutat, eodem sol ipsam $\iota\mu$ per-

*) Hunc propositionis numerum a Commandino traditum, ne plura turbarentur, retinimus, qui rectius omissus esset.

1) *Χρόνον ἡμέρας καλεῖ Θεοδόσιος, τὸν ἀπὸ ἀνατολῆς ἕως δύσεως, νικτὸς δὲ τὸν ἀπὸ δύσεως ἕως ἀνατολῆς.* Commentator Theodosii de diebus et noctibus initio libri primi.


2) Quae manifesta esse scriptor hoc loco declarat, eorum accurata demonstratio repeli potest ex Theodosii de diebus et noct. I prop. 4, idque Pappum neutiquam fefellit; sed ille alia insuper addenda esse existimavit. Quo de argumento apte disseri non poterit, nisi Theodosii libri in lucem erunt editi.

τοῦτω καὶ ὁ ἥλιος τὴν ΗΜ διέρχεται. καὶ ἔστι μείζων
ἢ ΜΗ τῆς ΖΘ, ὥστε μείζονές εἰσιν αἱ ἡμέραι αἱ ἐν τῇ
67 ΔΕ ἡμικυκλίῳ τῶν ἐν τῷ ΓΔ ἡμικυκλίῳ. [τοῦτο μὲν οὖν
δεικνύοιτ' ἂν ὡσπερ ἐν τῷ στοιχείῳ δεικνύται, ἐπεὶ δὲ
μείζων μὲν ἢ ΖΑ τῆς ΑΗ, ἐλάσσων δὲ ἢ ΖΘ τῆς ΗΜ, ἢ
ΘΔ πρὸς τὴν ΑΜ οὐκ ἔχει σύγκρισιν, ὥστε ἢ ἀποδείξῃς
οὐ προβήσεται ὡσαύτως, ἂν μὴ δείξωμεν τὰς συναμφοτέ-
ρας ἐν τῷ ΓΓ τμήματι ἡμέρας τε καὶ νύκτας τῶν συναμ-
φοτέρων ἐν τῷ ΔΕ τμήματι ἡμερῶν τε καὶ νυκτῶν μείζοντας.]
δεῖ οὖν ἡμᾶς τῇ προγεγραμμένῃ ἀποδείξει χρῆσθαι ἵνα καὶ 10
αἱ νύκτες συγκριθῶσιν.

68 Ἔστω οὖν ἡ πρὸ τῆς Θ ἀνατολῆς δύσις τὸ Π, καὶ
κεῖσθω τῇ μὲν ΖΔ ἴση ἢ ΔΚ, τῇ δὲ ΠΖ ἴση ἢ ΚΞ. ἐπεὶ
ἴση ἐστὶν ἢ ΠΖ τῇ ΚΞ, ἐν ἴσῳ ἄρα χρόνῳ ὁ ἥλιος ἐκάστην
αὐτῶν δίδεισιν. ἐν ᾧ δὲ τὴν ΖΗ, κόσμον περιστροφῇ ἐστὶν 15
καὶ τῆς ΖΗ δύσις. ὁ δὲ χρόνος ἐν ᾧ ἢ ΚΞ ἀνατέλλει
ἴσος τῷ χρόνῳ ἐν ᾧ ἢ ΠΖ δύνει· ὁ ἄρα χρόνος ἐν ᾧ ὁ
ἥλιος τὴν ΚΞ δίδεισιν, ὅς ἐστιν κόσμον περιστροφῇ, καὶ
τῆς ΚΞ περιφερείας ἀνατολῇ. μείζων δὲ ὁ χρόνος ἐν ᾧ
τὴν ΚΗ διέρχεται ὁ ἥλιος τοῦ χρόνου τῆς ἀνατολῆς τῆς 20
ΚΗ· ὁ ἄρα χρόνος ἐν ᾧ ὁ ἥλιος τὴν ΗΞ διέρχεται μείζων
ἐστὶν κόσμον περιστροφῆς καὶ τῆς ἀνατολῆς τῆς ΞΗ· ἐν
ἄρα κόσμον περιστροφῇ καὶ τῆς ΗΞ ἀνατολῇ ὁ ἥλιος ἐλάσ-
σονα τῆς ΞΗ περιφέρειαν διελεύσεται. διεληλυθέντω τὴν
ΗΘ· τοῦ Ξ ἄρα ὄντος ἐπ' ἀνατολῆς ὁ ἥλιος κατὰ τὸ Ο 25
ὦν προανατεταλκῶς ἔσται, ὥστε ἐν ᾧ ἐπὶ τῆς ἀνατολῆς
γίνεται ἐλάσσονα τῆς ΗΘ διελεύσεται. ἔστω ἢ ΗΝ· ὥστε
τὸ Ν ἀνατολικὸν ἔσται σημεῖον τὸ μετὰ τὴν Η ἀνατολὴν,

4. ἥλιος S, Θ A, "Θ B, item vs. 48 3. τῶν ἐν τῷ ΑΔ ABS, corr. Co 3. τοῦτο — 9. μείζονας interpolatori tribuenda esse videntur [vide adnot. ad lat.], 4. δεικνύοιτ' ἂν Hu pro δεικνύοιτο ἐπεὶ δὲ Hu auctore Co pro ἐπειδὴ 3. ἐν τῷ ΑΔ ABS cod. Co. corr. Co 9. ἐν τῷ ΔΕ τμήματι add. Hu auctore Co 43. ΠΖ ἴσης τῇ ΑΞ AB, ἴση corr. S, ἢ Co 45. post δίδεισιν add. διέρχεται ABS. 23. ἀνατολῇ Hu, ἀνατολῆς γίνεται ABS, γίνεται del. Co ἥλιος AS. Θ B 24. περιφερείας ABS, corr. Hu auctore Co 26. προανατεταλκῶς AB, corr. Paris. 2368

currit. Et est $\eta\mu$ maior quam $\zeta\theta$; itaque dies in semicirculo $\delta\alpha$ maiores sunt diebus in semicirculo $\delta\gamma$. Hoc igitur demonstrari posse videtur, ut in elementis traditur³⁾; sed quia $\zeta\delta$ maior est quam $\delta\eta$, et $\zeta\theta$ minor quam $\eta\mu$, circumferentia $\theta\delta$ ad $\delta\mu$ nullam comparationem habet, quare demonstratio non perinde procedet, nisi ostenderimus coniunctos dies noctesque in portione $\delta\gamma$ maiores esse coniunctis diebus et noctibus in portione $\delta\epsilon$. Iam vero superiore demonstratione nos uti oportet, ut etiam noctes comparentur.



Sit igitur π occasus qui Prop. 34
ortum θ antecedit, et ponatur $\delta\alpha = \zeta\delta$, et $\alpha\xi = \pi\zeta$. Quoniam circumferentiae $\pi\zeta$ $z\xi$ aequales sunt, aequali igitur tempore sol utramque permeat. Sed quo tempore ipsam $\pi\zeta$ permeat, et mundi conversio fit et ipsius $\pi\zeta$ occasus. Sed aequalia sunt tempora quibus $\alpha\xi$ oritur ac $\pi\zeta$ occidit. Quo igitur tempore

sol circumferentiam $z\xi$ permeat quo etiam mundi fit conversio), eodem ipsa $\alpha\xi$ oritur. Sed tempus quo sol circumferentiam $\alpha\eta$ permeat maius est eo quo ipsa $\alpha\eta$ oritur (propos. 33); ergo tempus quo sol circumferentiam $\eta\xi$ permeat maius est eo quo mundi conversio fit et circumferentiae $\eta\xi$ ortu sol minorem quam $\eta\xi$ circumferentiam percurrat. Percurrat ipsam $\eta\theta$: ergo, si punctum ξ oriatur, sol, cum ad θ erit, ante ortus erit; itaque, dum in ortu erit, minorem quam $\eta\theta$ circumferentiam percurrat. Sit ν : ergo ν punctum orientale erit quod ortum η sequitur; itaque nox

3: "Per elementum fortasse intelligit Theodosii libros de diebus et noctibus, vel potius Euclidis phaenomena" Cn. Mihi neutrum probabile videtur: sed et huius dicti dubia ratio et proximorum verborum inconiuncta, ne dicam absurda, compositio movent me, ut haec omnia interpolatori tribuam.

ὥστε ἡ νύξ ἥς ἀνατολή ἐστιν τὸ Ν σημεῖον ἐλάσσων ἐστὶ τῆς νυχτὸς ἥς δύνει τὸ Η. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ λοιπὰ δευχθήσεται. [ὁμοίως δὲ καὶ εἰάν τις ἔννοιας ἢ ἐπὶ τῆς γραφῆς ἐφ' ἥς ἡ ἀνατολή ἢ δύνει ἐστὶν ἐπὶ τῆς θερνῆς τροπῆς, ὡσαύτως ἐπιλασόμεθα].

- (6) λζ'. Ἐν τῇ περὶ μεγεθῶν καὶ ἀποστημάτων ὁ Ἀρίσταρχος ἐξ ταῦτα ὑποτίθεται· πρῶτον τὴν σελήνην παρὰ τοῦ ἡλίου φῶς λαμβάνειν, δεύτερον τὴν γῆν σημεῖον τε καὶ κέντρον λόγον ἔχειν πρὸς τὴν τῆς σελήνης σφαῖραν, τρίτον, ὅταν ἡ σελήνη διχότομος ἡμῖν φαίνεται, ρέειν εἰς τὴν ἡμετέραν ὅψιν τὸν διορίζοντα τὸ σκιερὸν καὶ τὸ λαμπρὸν τῆς σελήνης μέγιστον κύκλον, τέταρτον, ὅταν ἡ σελήνη διχότομος ἡμῖν φαίνεται, τότε αὐτὴν ἀπέχειν τοῦ ἡλίου ἐλάσσον τεταρτημορίου τῇ τοῦ τεταρτημορίου τριακοστημορίῳ [ἀντὶ τοῦ ἀπέχειν αὐτὴν μοίρας πζ'. αὐταὶ γὰρ ἐλάσσους εἰσὶν τῶν Γ' μοιρῶν τεταρτημορίου μοίραις γ', αἱ εἰσὶν τῶν Γ' μέρος λζ'. πέμπτον δὲ ὑποτίθεται τὸ τῆς σκιᾶς πλάτος σεληγῶν εἶναι δύο, ἔκτον δὲ τὴν σελήνην ἐποτείνειν ὑπὸ ιε' μέρος ζῳδίου].

- (7) Τοῦτων δὲ τῶν ὑποθέσεων ἡ μὲν πρώτη καὶ τρίτη καὶ τετάρτη σχεδὸν συμφωνοῦσιν ταῖς Ἰππάρχου καὶ Ἱππολεμαίου. φωτίζεται μὲν γὰρ ἡ σελήνη ὑπὸ τοῦ ἡλίου παντὶ χρόνῳ χωρὶς ἐκλείψεως, καὶ ἢ ἀφωτιστος γίνεται ἐμπιπτοῦσα εἰς τὴν σκιάν, ἢ ἐπιπροσθούμενος ὁ ἥλιος ὑπὸ τῆς γῆς ποιεῖ κωνικὸν ἔχονσαν τὸ σχῆμα, καὶ ὁ διορίζων δὲ τὸ γαλακτώδες, ὃ ἐστὶν ἐκ τῆς προσλάμφεως ἡλίου, καὶ τὸ τεφρώδες, ὃ ἐστὶν ἴδιον χρῶμα τῆς σελήνης.

3. ὁμοίως — 5. ἐπιλασόμεθα interpolatori tribuit Hu 6. λζ' A¹ in marg. BS 10. διχότομος AB, acc. corr. S 11. τὸ τε σκιερὸν Aristarch. p. 569 ed. Wa 14. 12. τὸ λαμπρὸν τῆς σελήνης ἢς μέγιστον A, τὸν λαμπρὸν τῆς σελήνης μέγιστον B, τὸ λαμπρὸν τῆς σελήνης, omisso μέγιστον, S 13. διχότομος A, acc. add. BS 14. τετάρτη μορίον (ante τῇ) A, coniuuv. BS τοῦ τοῦ τετάρτου μορίον ABS, corr. Wa τριακοστημορίῳ immo τριακοστῇ Pappus scripsisse videtur cum Aristarcho p. 569 15. ἀντὶ τοῦ — 17. μέρος λ' om. Aristarch., interpolatori tribuit Hu 15. ἀντὶ B Paris. 2368. ἀντὶ A μοίρας

- ἀδιαφορῶν τοῦ μεγίστου κύκλου ἐν ταῖς διχοτόμοις πρὸς
τὸν ἥλιον στάσεις, τεταρτημορίου ἔγγιστα ἐπὶ τοῦ ὥφ-
διαζοῦ θεωρουμένου νεῖει πρὸς τὴν ἡμετέραν ὄψιν· τοῦτο
γὰρ τὸ τοῦ κύκλου εἰσπεδὸν ἐκβαλλόμενον ἔξει καὶ διὰ
τῆς ἡμετέρας ὀφθῆως, ὁποῖαν πότ' ἂν ἔχη θέσιν ἢ σελήνῃ·
71 τῆς πρώτης ἢ δευτέρας διχοτόμου φάσεως. ἀπριτωμένους
δὲ τὰς λοιπὰς ὑποθέσεις κατειλήφασιν οἱ προειρημένοι
μαθηματικοὶ διὰ τὸ μήτε τὴν γῆν σημείον καὶ κέντρον λό-
γον ἔχειν πρὸς τὴν τῆς σελήνης σφαιρᾶν κατ' αὐτούς, ἀλλὰ
πρὸς τὴν τῶν ἀσλανῶν, μήτε τὸ τῆς σκιᾶς πλάτος σελή-
νων εἶναι δύο διαμέτρων, μήτε τὴν διάμετρον αὐτῆς ὑπο-
τείνειν τοῦ κατὰ τὸ αὐτὸ μέσον αὐτῆς ἀπόστημα περιφέ-
ρειαν μεγίστου κύκλου 1^α μέρος ἑρδίου, τοιούστιν μοίρας
3. κατὰ μὲν γὰρ Ἰ. Γ. παρχον ἑξακοσιάναις καὶ πεντηχοιτά-
κις καταμετρεῖται ὁ κύκλος οὗτος ἐπὶ τῆς διαμέτρου τῆς 15
σελήνης, δις δὲ καὶ ἡμισυαῖς ὁ τῆς σκιᾶς κατὰ τὸ ἐν ταῖς
σεξγυγίαις μέσον ἀπόστημα, κατὰ δὲ Ἱπτολεμαῖον ἢ διάμε-
τρος αὐτῆς ὑποτείνει περιφέρειαν κατὰ μὲν τὸ μέγιστον
ἀπόστημα 2 λα' κ', κατὰ δὲ τὸ ἐλάχιστον 3 λέ' κ', ἢ
δὲ διάμετρος τοῦ κύκλου τῆς σκιᾶς κατὰ μὲν τὸ μέγιστον 20
ἀπόστημα τῆς σελήνης ἑξήκοστὰ μ' μ'', κατὰ δὲ τὸ ἐλαχι-
στον ἀπόστημα ἑξήκοστὰ μζ'. ἐντεῦθεν αὐτοῖς οἱ λόγοι
διάφοροι καὶ τῶν ἀποστιμιμάτων καὶ τῶν μεγεθῶν ἡλίου
καὶ σελήνης ἐπιτελογισμένοι εἰσίν.
72 Ὁ μὲν γὰρ Ἀρίσταρχος ἐπάγει ταῖς εἰρημέναις ὑπο- 25
θέσεις λέγων κατὰ λέξιν οὕτως· ἐπιλογίζεται δὲ τὸ τοῦ

2. τετάρτη μοῖρα A. comiunx. BS W a ζωδιαζοῦ A, ζωδιαζοῦ
BS W a 3. ὁποῖαν W a auctore C o, ὅποι ABS 11. διαμέτρων AB
Paris. 2368 Savilianus unus, διαμέτρον S, διάμετρον Savilianus alter
unde κατὰ τὴν διάμετρον coni. W a, del. Hu σελήνης εἶναι δύο δια-
μέτρον voluit C o 42. 43. τοῦ del. W a, reliqua quoque usque ad
κύκλον interpolatori tribuit Hu 42. αὐτῆς W a, γῆς A, αὐγῆς A BS
Saviliani 13. α A, α' B W a, πεντεκαδέκατον S ζωδίου A,
ζωδίου BS W a 13. 14. β B A B, μοίρας δύο S W a 44. καὶ
πεντηχοιτάκις am. S 49. ο λαx — ο λαx A Alem B, nisi quod ο,
distinx. S 21. ζμ μ A B, ἑξήκοστὰ α μ'' μ'' S, ο μ' μ'' voluit
C o, ο αε' λη W a 22. ἑξήκοστὰ μζ' S, ζ μζ A B, ο μζ' W a auc-

haud differens a maximo circulo in dimidiatis ad solem constitutionibus, quam proxime quadrantem in zodiaco conspectum praeuens vergit ad nostrum visum. Hoc enim circuli planum, si producat, etiam per visum nostrum transibit, quaecunque positionem luna primae vel secundae dimidiatae apparitionis habebit. Sed reliquas hypotheses ii quos dixi mathematici diversas statuerunt, propterea quod secundum ipsos neque terra puncti ac centri rationem habet ad lunae sphaeram, sed ad sphaeram stellarum fixarum, neque umbrae latitudo est duarum lunae diametrorum, neque lunae diameter (iuxta mediam eius distantiam) quintadecimam partem signi, id est duos gradus, subtendit. Nam Hipparcho¹⁾ quidem lunae diameter circulum illum, quem ipsa cursu suo describit, metitur sexcentis quinquagies, umbrae autem circulum his et semis secundum mediam distantiam in conjunctionibus; at Ptolemaeo²⁾ lunae diameter in maxima distantia subtendit $0^{\circ} 34' 20''$, in minima $0^{\circ} 35' 20''$, umbrae autem circuli diameter in maxima lunae distantia $0^{\circ} 40' 40''$, in minima $0^{\circ} 46'$. Unde diversas uterque et distantiae et magnitudinis solis ac lunae rationes subduxit.

Aristarchus enim iis quas diximus suppositionibus haec subiungit verbotenus: "Itaque colligitur distantiam solis a

1) Ptolem. compos. 4, 8 p. 265 ed. Halma: ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ πλείους πρότερον μὲν διημαρτάσμεν καὶ αὐτοὶ συγχρωόμενοι κατὰ τὸν Ἰππαρχον τῇ τῇ σιλήρῃ ἐξαποσιάκῃ καὶ περιηχοιτάκῃ ἔγγιστα καταμετρεῖν τὸν ἰδίον κύκλον, δις δὲ καὶ ἡμισιάκῃ τὸν τῆς σιᾶς καιαμετρεῖν κατὰ τὸ ἐν ταῖς σιζυγίαις μέσον ἀπόστημα.

2) Ptolem. 3, 14 p. 343: φανερόν ὅτι καὶ ὅλη ἡ διάμετρος τῆς σιλήρης ὑποτίθεται μέγιστον κύκλον περιμέτρεται ἐξαποσιῶν μιᾷ μοίρᾳ καὶ γ'. εὐκατανόητον δ' αὐτόθεν ὅτι καὶ ἡ ἀδδ. Ην ἐκ τοῦ κέντρον τῆς σιᾶς τῆς κατὰ τὸ αὐτὸ μέγιστον ἀπόστημα τῆς σιλήρης ὑποτίθεται μὲν μιᾷ μοίρᾳ ἐξαποσιᾶ μ' καὶ γ' ἰ. ε. δέμοιρον sive $\frac{2}{3}$.

lore Co 26. κατὰ λέξιν etc.) quamvis Pappus ipsa Aristarchi verba secutur proficatur, tamen scriptura eius longe distat ab emendatiore illa quae in Aristarchi libro legitur apud Wa p. 569 sq.; at non omnia quae minus recte apud Pappum leguntur ipsi scriptori, immo nonnulla eaque graviora librariis imputanda esse videntur

ἡλίον ἀπόστημα τοῦ τῆς σελήνης ἀποστήματος πρὸς τὴν γῆν· μεῖζον μὲν ἢ ὀκτωκαίδεκαπλάσιον· ἔλασσον δὲ ἢ εἰκοσπλάσιον, τὸν αὐτὸν δὲ λόγον ἔχει καὶ ἡ τοῦ ἡλίου διάμετρος πρὸς τὴν τῆς σελήνης διάμετρον, τοῦτο δὲ διὰ τῆς περὶ τὴν διχότομον ὑποθέσεως. τὴν δὲ τοῦ ἡλίου διάμετρον πρὸς τὴν τῆς γῆς διάμετρον ἐν μεῖζονι λόγῳ ἢ ὅν ἰθ' πρὸς γ', ἐν ἐλάσσονι δὲ λόγῳ ἢ ὅν τὰ μγ' πρὸς ε', διὰ τοῦ εὐρεθέντος περὶ τὰ ἀποστήματα λόγου καὶ τῆς περὶ τὴν σιαν ὑποθέσεως καὶ τοῦ τὴν σελήνην ὑποτείνειν ὑπὸ ἰε' μέρος ᾧωδιον". "ἐπιλογίζεται δὲ" εἶπεν "τὰ ἀποστήματα" καὶ τὰ ἐξῆς ὥς αὐτὰ μέλλων ἀποδείξειν προγράψας ἥσα συντείνει πρὸς τὰς ἀποδείξεις αὐτῶν λήμματα. συνάγει δ' ἐκ πάντων ὅτι ὁ μὲν ἥλιος πρὸς τὴν γῆν μεῖζονα λόγον ἔχει ἢ ὅν τὰ ςωνθ' πρὸς κζ', ἐλάσσονα δὲ λόγον ἢ ὅν τὰ μ. ζ' θφζ' πρὸς σισ', ἡ δὲ διάμετρος τῆς γῆς πρὸς τὴν διάμετρον τῆς σελήνης ἐν μεῖζονι μὲν λόγῳ ἢ ὅν τὰ ρή' πρὸς τὰ μγ', ἐν ἐλάσσονι δὲ ἢ ὅν τὰ ε' πρὸς τὰ ἰθ', ἡ δὲ γῆ πρὸς τὴν σελήνην ἐν μεῖζονι λόγῳ ἢ ὅν τὰ μ. ρκε' θψιθ' πρὸς μ. ζ' θφζ', ἐν ἐλάσσονι δὲ ἢ ὅν μ. κα' ς πρὸς ςωνθ'.

20

- 73 Πτολεμαῖος δὲ πέμπτην βιβλίην συντάξας ἀπέδειξεν ὅτι, οἷον ἐστὶν ἐνὸς ἡ ἐκ τοῦ κέντρον τῆς γῆς, τοιοῦτων τὸ μὲν τῆς σελήνης ἐν ταῖς συζυγίαις μέγιστον ἀπόστημα $\xi\delta\iota'$, τὸ δὲ τοῦ ἡλίου, ασι, ἡ δ' ἐκ τοῦ κέντρον τῆς σελήνης $\circ\iota\zeta' \lambda\gamma'$, ἡ δὲ ἐκ τοῦ κέντρον τοῦ ἡλίου $\epsilon\lambda'$, ὥστε καί, οἷον ἐστὶν ἐνὸς ἡ διάμετρος τῆς σελήνης, τοιοῦτων ἡ μὲν τῆς γῆς ἄρα διάμετρος γ' καὶ β' ε', ἡ δὲ τοῦ ἡλίου $\epsilon\theta'$ καὶ δ' ε'', καὶ ἡ μὲν τῆς γῆς ἄρα διάμετρος τῆς σελήνης τριπλασία ἐστὶν καὶ τοῖς β' ε' μεῖζων, ἡ δὲ τοῦ

1. 2. πρὸς τὴν γῆν] ἀπὸ τῆς γῆς rectius Aristarch. 5. διχοτόμον A, διχοτομὸν B, acc. corr. S, διχοτομίαν Aristarch. 10. ἰε' A, ἰε' B Wa, πεντεκαίδεκατον S ᾧωδιον A, ᾧωδιον BS Wa 11. καὶ τὰ Πη pro ὥς 15. ἢ θ φζ' A, ἢ θ φζ' B, μθ θφζ' S apparet μ significare μέγιστον, ut μ^α libro II p. 22 seqq. 18. ἐν: ὅν A B, corr. S μ. ρκε'] μ et superser. 19. μ. ζ' scriptura co-

terra maiorem quidem esse quam duodevigintuplam distantiam lunae, minorem vero quam vigintuplam; atque eandem proportionem solis diametrus habet ad diametrum lunae, idque ex hypothese de dimidiata luna. Solis autem diametrum ad terrae diametrum colligitur in maiore proportionem esse quam $19 : 3$, in minore autem quam $43 : 6$, ex ratione quae de distantis inventa est et propter hypothesim de umbra et quia luna partem quintamdecimam signi subtendit". Scripsit autem "colligitur distantiam" etc., utpote eadem mox demonstraturus, postquam lemmata quaecunque ad demonstrationes pertineant praemisit. Ex quibus omnibus concludit solem ad terram maiorem proportionem habere quam $6859 : 27$, minorem autem quam $79507 : 246$, tum terrae diametrum ad diametrum lunae in maiore proportionem esse quam $108 : 43$, in minore autem quam $60 : 49$, denique terram ad lunam in maiore proportionem quam $1259712 : 79507$, in minore autem quam $216000 : 6859$).

At Ptolemaeus quinto compositionis libro (*cap. 15 sq.*) demonstrat, si radius terrae pro unitate ponatur, eiusmodi unitatum maximam lunae distantiam in coniunctionibus esse $64\frac{40}{60}$, solis 1240, et radium lunae $\frac{17}{60}\frac{33}{60^2}$, radium solis $5\frac{30}{60}$; itaque, si lunae diametrus pro unitate ponatur, eiusmodi unitatum terrae diametrum esse $3\frac{2}{3}$, solis $18\frac{4}{5}$; itaque

$$\text{terrae diam.} = 3\frac{2}{3} \text{ diam. lunae,}$$

Quae supra Pappus affert, ea singillatim demonstrantur ab Aristarcho de magnit. etc. propos. 7. 9. 15—18.

dicum ABS eadem ac supra vs. 45 μ . $\alpha\alpha'$, ξ] rursus μ et superscr. $\alpha\alpha$, tum $\zeta\zeta' A$, item B, nisi quod ζ cum linea transversa habet ut vs. 48, et S, qui eandem notam liberius duxit 20. $\xi\alpha\alpha\alpha'$] rursus nota ζ antecedit in AB[S] 24. $\xi\delta\epsilon'$] $\xi\delta\delta'$ ABS, $\xi\delta\zeta$ Savilliani, corr. Co $\xi\alpha\alpha\eta$ $\delta\epsilon$ $\alpha\alpha'$ A'B], sed in A lineola super η crasa, numerum corr. Co, η $\delta\epsilon$ distinx. S, $\epsilon\alpha$ add. Wa 25. α ζ' λ' μ' A, α ζ' λ' μ' B, α ζ' $\lambda'\gamma$ S ϵ λ' α μ' A B], α μ' μ'' S, corr. Co 27. β' ϵ'' , β' A BS] 28. δ' ϵ'' , β' A, δ'' BS 29. β' ϵ'' μ'' AB, $\mu''\alpha\alpha'$ $\mu''\alpha\alpha'$ S

ἡλίον τῆς μὲν τῆς σελήνης ὀκτωκαιδεκαπλασία καὶ ἔτι τοῖς
 δ' ε' μείζων, τῆς δὲ τῆς γῆς πενταπλασία καὶ ἔτι τῇ S
 μείζων· ἀφ' ὧν καὶ οἱ τῶν στερεῶν σώματων λόγοι δῆλοι,
 ἐπεὶ καὶ ὁ τοῦ α' κύβος τοῦ αὐτοῦ ἐστὶν α', ὁ δ' ἀπὸ τῶν
 γ' καὶ β' ε' τῶν αὐτῶν ἔγγιστα λθ' δ'', ὁ δ' ἀπὸ τῶν ιθ'
 καὶ δ' ε'' ὁμοίως σχυδ' S ἔγγιστα, ὡς συνάγεσθαι ὅτι,
 οἷον ἐστὶν ἑνὸς τὸ τῆς σελήνης στερεὸν μέγεθος, τοιοῦτων
 ἐστὶ τὸ μὲν τῆς γῆς λθ' δ'', τὸ δὲ τοῦ ἡλίου σχυδ' S
 ἑκατοντακαιβδομηκονταπλασίον [μείζων] ἄρα ἔγγιστα τὸ
 τοῦ ἡλίου τοῦ τῆς γῆς. 11 10

- 74 Καὶ ταῦτα μὲν ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσθω συγκρίσεως ἔνε-
 κεν τῶν εἰρημένων μεγεθῶν καὶ ἀποστημάτων, ἔν δέ τι
 λῆμμα γράψομεν ἐκ τῶν φερομένων εἰς τὸ δ' θεώρημα τοῦ
 βιβλίου τῆς ζητήσεως ἄξιον.

Ἐστω κύκλος ὁ ABΓ, διάμετρος δὲ αὐτοῦ ἐκβληθεῖσα 15
 ἡ ΑΓΔ, κέντρον δὲ τὸ Ε, καὶ ἦχθω ἀπὸ τοῦ Ε τῇ ΑΓΔ
 πρὸς ὀρθὰς ἡ BEZ, ἀπὸ δὲ τοῦ Δ τοῦ ABΓ κύκλου ἐφ-
 απτομένη ἡ ΔΘ, καὶ κείσθω τῆς ΖΘ ἡμίσεια ἐφ' ἑκάτερα
 τοῦ Γ ἡ ΚΓ ΓΑ, καὶ ἐπεξέχθωσαν αἱ ΚΔ ΔΖ ΖΑ· λέγω
 ὅτι μείζων ἐστὶν ἡ ἐπὶ ΚΔ Δ τῆς ἐπὶ τῶν ΖΔΘ. 20
 γράφεται δὲ τάδε.

- 75 λγ'. Ἐστω κύκλος ὁ ABΓ, καὶ διάμετρος ἐκβληθεῖσα
 ἡ ΑΓΔ, καὶ ἀπὸ τοῦ Δ ἦχθω τις εὐθεῖα ἡ ΔΕΖ· λέγω
 ὅτι ἡ ΑΖ περιφέρεια μείζων ἐστὶν τῆς ΓΕ περιφέρειας.

Εἰλήφθω γὰρ τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ Η σημεῖον, 25


1. τῆς alterum add. Hu 2. δ' ε''; Δ^α Α'Β, τέτρασι πέμπτοις
 S τῆς δὲ γῆς AS, ἡ τῆς δὲ γῆς B, ἡ δὲ τῆς γῆς W^a, corr. Hu
 S: L' A, ἡμισί BS 3. 4. δῆλοι. Ἐπεὶ γὰρ ὁ etc. W^a 5. β' ε''
 H' A B, β' S 6. δ' ε''; Δ' A B, τοσαύτων
 πέμπτων S ὁμοίως C₁ S χυδ' L' A B, C₁ del. et notam semissis li-
 berius duxit S 7. τοιοῦτον A (τοιαῦτον B), corr. S 8. λθ' δ' ABS
 ἡλίον C₁ σχυδ' A B, σχυδ' S^a Paris. 2368 S 9. μείζων del. Co
 neque id legitur apud Ptolem. 10. Δ A, δ' B, τέταρτον S τοῦ
 τοῦ αὐτοῦ voluit C^o 11. ὁ add. BS Savillani 12. α' K Δ ΔΖ Δ
 A, distinx. BS 13. ΔΔ A¹ in marg. BS

$$\text{solis diam.} = 18\frac{4}{5} \text{ diam. lunae}$$

$$= 5\frac{1}{2} \text{ diam. terrae.}$$

Unde etiam solidorum corporum rationes manifestae sunt: nam quoniam est cubus $1 = 1$, cubus $3\frac{2}{5} = 39\frac{1}{4}$ quam proxime, cubus $18\frac{4}{5} = 6644\frac{1}{2}$ quam proxime, hinc computatur, si lunae solida magnitudo pro unitate ponatur, earum unitatum terrae magnitudinem esse $39\frac{1}{4}$, solis $6644\frac{1}{2}$, itaque solis magnitudinem centies et septuagies quam proxime magnitudinem terrae continere.

Haec quidem comparationis causa earum quas diximus magnitudinum et distantiarum haecenus disputata sint; unum autem lemma inquisitione dignum ex numero eorum, quae ad IV theorema eiusdem libri *Aristarchi* feruntur, iam adscribamus.




Sit circulus $\alpha\beta\gamma$, Prop. 39
eiusque diameter producta $\alpha\gamma\delta$, centrum ϵ ,
et ab ϵ ipsi $\alpha\gamma\delta$ ducatur perpendicularis $\beta\epsilon\zeta$,
et a δ recta $\delta\vartheta$ circulum $\alpha\beta\gamma$ tangens, et ad
utramque partem puncti γ ponatur circumferentia
 $\gamma\chi = \gamma\lambda = \frac{1}{2} \zeta\vartheta$, et
iungantur $\chi\delta$ $\delta\lambda$ $\zeta\delta$; dico angulum $\chi\delta\lambda$ angulo
 $\zeta\delta\vartheta$ maiorem esse.

Praemittuntur autem haec.

XXXVIII. Sit circulus $\alpha\beta\gamma$, eiusque diameter producta Prop. 40
 $\alpha\gamma\delta$, et a δ ducatur quaelibet recta $\delta\epsilon\zeta$; dico circumferentiam $\alpha\zeta$ maiorem esse quam $\gamma\epsilon$.

Sumatur enim circuli centrum ι , et iungantur $\iota\epsilon$ $\iota\zeta$:

καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ HZ HE · καὶ γωνία ἄρα ἡ πρὸς τῇ Z γωνία τῇ πρὸς τῇ E ἴση ἐστίν. καὶ ἐπεὶ τρίγωνον τὸ



HZA καὶ ἐκτὸς γωνία ἡ ἐπὶ AHZ μείζων ἐστίν τῆς ἐντὸς καὶ ἀπεναντίου τῆς πρὸς τῇ Z , ⁵ τουτέστι τῆς πρὸς τῇ B , ἀλλὰ ἡ πρὸς τῇ E μείζων ἐστίν τῆς ἐπὶ AHE διὰ τὸ ἐκτὸς εἶναι τοῦ τριγώνου, καὶ ἡ ἐπὶ AHZ ἄρα μείζων ἐστίν τῆς ἐπὶ BH . ¹⁰ καὶ εἰσὶν πρὸς τῇ κέντρῳ· μείζων ἄρα καὶ περιφέρεια ἡ AZ τῆς $ΓΕ$, ὕπερ: ~

- 76 λθ'. Κύκλος ὁ AB , οὗ κέντρον τὸ A , καὶ ἐκτὸς τοῦ κύκλου σημεῖον τὸ $Γ$, καὶ διήχθω ἡ $ΓΑΔΚ$, καὶ ἐφαπτομένη τοῦ κύκλου ἡ $ΓΖ$ καὶ διὰ τοῦ A κέντρου πρὸς ὁρθὰς ¹⁵ τῇ $ΚΑ$ διαμέτρῳ ἡ $ΑΔ$, καὶ τεμνέσθω ἡ AZ περιφέρεια δίχα τῇ E , καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ $ΓΒΑ$ $ΓΗΕ$ · λέγω ὅτι μείζων ἐστίν ἡ ἐπὶ $ΑΓΕ$ γωνία τῆς ἐπὶ $ΕΓΖ$.


Ἐπεξεύχθωσαν αἱ EB ZH . ἐπεὶ μείζων ἐστίν ἡ EB τῆς ZH , ἐλάσσων δὲ ἡ $BΓ$ τῆς $ΓΗ$, ἡ EB πρὸς $BΓ$ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ZH πρὸς $ΓΗ$. γερονέτω οὖν ὡς ἡ EB πρὸς $BΓ$, ἡ $HΘ$ πρὸς $HΓ$, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ $ΘΓ$. ἐπεὶ οὖν αἱ ἐπὶ ABE EHZ γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν (ἐπεὶ καὶ περιφέρεια ἡ AE περιφέρειά τῇ EZ), καὶ αἱ λοιπαὶ ἴσαι εἰσὶν ἀλλήλαις αἱ ἐπὶ $EBΓ$ $ZHΓ$. καὶ περὶ ²⁵ ἴσας γωνίας αἱ πλευραὶ ἀνάλογόν εἰσιν· ἰσογώνιον ἄρα τὸ $EBΓ$ τρίγωνον τῷ $HΘΓ$ τριγώνῳ· ἴσαι ἄρα εἰσὶν αἱ ἐπὶ $ΑΓΕ$ $HΓΘ$ γωνίαι· μείζων ἄρα ἡ ἐπὶ $ΑΓΕ$ τῆς ἐπὶ $ΕΓΖ$.

- 77 μ'. Ἐστω λοιπὸν ἡ αὐτὴ καταγραφὴ τῇ πρότερον.

1. 2. πρὸς τὸ ξ τῇ πρὸς τὸ ϵ Wa paulo post idem mox πρὸς τῷ. mox πρὸς τῷ 2. τρίγωνόν ἐστι τὸ Wa. τριγώνου τοῦ HZA ἡ ἐκτὸς etc. conl. Hu 13. λθ' A' in marg. BS) Ἐστω ante κύκλος add. Wa 17. $ΓΒ$ $ΓΗΕ$ A, αἱ γὰρ αἱ $ΓΕ$ B, recte distinx. S 24. περιφέρεια τῆς EZA , περιμετρίας τῆς $εζ$ B eod. Co, περιμετρίας τῆς $ηζ$

itaque anguli $\eta\epsilon\zeta$ $\eta\zeta\epsilon$ aequales sunt. Et quoniam trianguli $\eta\zeta\delta$ angulus exterior $\alpha\eta\zeta$ maior est interiore et opposito $\eta\zeta\epsilon$, id est $\eta\epsilon\zeta$, sed angulus $\eta\epsilon\zeta$, ut exterior trianguli $\eta\epsilon\delta$, maior est quam $\delta\eta\epsilon$, ergo etiam angulus $\alpha\eta\zeta$ maior est quam $\epsilon\eta\delta$. Quorum uterque ad centrum est; maior igitur circumferentia $\alpha\zeta$ quam $\gamma\epsilon$, q. e. d.

XXXIX. Sit circulus $\alpha\beta$, cuius centrum δ , et extra cir-^{Prop. 41}
culum punctum γ , et ducatur recta $\gamma\lambda\delta\alpha$, et $\gamma\zeta$ circum-
tangens, et $\delta\alpha$ per δ centrum diametro $\alpha\lambda$ perpendicularis,
et circumferentia $\alpha\zeta$ bifariam secetur in ϵ , et iungantur $\gamma\beta\alpha$
 $\gamma\eta\epsilon$; dico angulum $\alpha\gamma\epsilon$ angulo $\epsilon\gamma\zeta$ maiorem esse.



Iungantur $\epsilon\beta$ $\zeta\eta$.

Quoniam est

$$\epsilon\beta > \zeta\eta \text{ et}$$

$$\beta\gamma < \gamma\eta, \text{ est igitur}$$

$$\epsilon\beta : \beta\gamma > \zeta\eta : \eta\gamma.$$

Iam fiat, producta $\eta\zeta$.

$$\vartheta\eta : \eta\gamma = \epsilon\beta : \beta\gamma,$$

et iungatur $\vartheta\gamma$. Iam

quia propter aequales circumferentias $\alpha\epsilon$ $\epsilon\zeta$

(*elem. 5. 21*) est

$$\angle \alpha\beta\epsilon = \angle \epsilon\eta\zeta,$$

etiam eorum supple-
menta aequalia sunt,

id est

$\angle \epsilon\beta\gamma = \angle \zeta\eta\gamma$. Et sunt circa aequales angulos latera pro-
portionalia; ergo propter *elem. 6. 6* est

$$\Delta \epsilon\beta\gamma \sim \Delta \vartheta\eta\gamma; \text{ ergo}$$

$$\angle \alpha\gamma\epsilon = \angle \eta\gamma\vartheta; \text{ itaque}$$

$$\angle \alpha\gamma\epsilon > \angle \epsilon\gamma\zeta.$$

XI. Sit denique eadem figura ac supra (*p. 561*), eae-^{Prop. 39}

demque hypotheses; dico angulum $\alpha\delta\lambda$ angulo $\zeta\delta\theta$ maiorem esse.

Bisariam secetur circumferentia $\zeta\theta$ in puncto μ , et iungatur $\mu\delta$. Iam ex eo quod modo (propos. 41) demonstratum est apparet angulum $\zeta\delta\mu$ angulo $\mu\delta\theta$ maiorem esse. Producantur rectae $\zeta\epsilon\beta$ $\delta\lambda$ ad puncta ν ξ , et ponatur $\zeta\nu = \alpha\delta$, et iungantur rectae $\nu\eta\mu$ $\nu\delta$ $\zeta\mu$. Et quia circulus est $\alpha\beta\gamma$, eiusque diameter $\alpha\gamma$ producta ad δ , et a δ ad concavam circumferentiam ducta est recta $\delta\lambda\xi$, est igitur (propos. 40)

circumf. $\alpha\xi >$ circumf. $\gamma\lambda$. Sed est

circumf. $\gamma\lambda =$ circumf. $\zeta\mu$ (utraque enim $= \frac{1}{2} \zeta\theta$; ergo etiam

circumf. $\alpha\xi >$ circumf. $\zeta\mu$). Iam ponatur

circumf. $\alpha\theta =$ circumf. $\zeta\mu$, et iungantur rectae $\alpha\theta$ $\omega\delta$.

Iam quia est

circumf. $\alpha\theta\gamma =$ circumf. $\zeta\gamma\beta$ (utraque enim semicirculi est, et ex constructione

circumf. $\alpha\theta =$ circumf. $\zeta\mu$, restat igitur

circumf. $\alpha\gamma =$ circumf. $\mu\beta$. Et in circumf. $\alpha\gamma$ insistit angulus $\alpha\alpha\gamma$ sive $\delta\alpha\theta$, in circumf. autem $\mu\beta$ angulus $\mu\zeta\beta$ sive $\nu\zeta\mu$; ergo (elem. 3. 27)

$\angle \delta\alpha\theta = \angle \nu\zeta\mu$ (quorum uterque propter elem. 3. 34 minor recto est. Et quia est

$\alpha\delta = \zeta\nu$ (ex constructione), et

$\alpha\theta = \zeta\mu$ (elem. 3. 29), et


$\angle \delta\alpha\theta = \angle \nu\zeta\mu$, est igitur propter elem. 1. 4**)

* Hoc scriptor eo consilio demonstravit, ut apparet punctum θ inter α ξ cadere necesse esse. Unde sequitur angulum $\alpha\delta\xi$ maiorem esse quam $\alpha\delta\theta$, id quod sub finem demonstrationis positum est.

**] Graeca $\delta\theta\alpha$ $\delta\eta$ ad 140 $\delta\theta\alpha$ $\tau\alpha\iota\varsigma$ $N\Xi\Lambda$ $\tau\alpha\iota\varsigma$ $\epsilon\lambda\alpha\beta$, et quae paulo post sequuntur $\kappa\alpha\iota$ $\alpha\delta$ $\gamma\omega\gamma\iota\alpha\iota$ $\tau\alpha\iota\varsigma$ $\epsilon\lambda\alpha\beta$, vel, ut accuratius cap. 79 legimus, $\kappa\alpha\iota$ $\alpha\delta$ $\lambda\omega\gamma\iota\alpha\iota$ $\gamma\omega\gamma\iota\alpha\iota$ $\tau\alpha\iota\varsigma$ $\lambda\omega\gamma\iota\alpha\iota\varsigma$ $\gamma\omega\gamma\iota\alpha\iota\varsigma$ $\tau\alpha\iota\varsigma$ $\epsilon\lambda\alpha\beta$ quibusdam forsitan abundare videantur: at his verbis nihil nisi Euclidem elem. 4. 4 citare voluit scriptor.

4. $\kappa\alpha\iota$ $\tau\alpha$ $\alpha\upsilon\tau\alpha$ $\delta\epsilon\delta\omicron\mu\epsilon\tau\alpha$ suspecta sunt; nam proprie scribenda erant $\kappa\alpha\iota$ $\epsilon\pi\alpha\pi\lambda\epsilon\sigma\iota\mu$ $\tau\alpha$ $\alpha\upsilon\tau\alpha$ 6. $\tau\alpha$ $N\Xi$ A. distinct. BS 7. $\alpha\delta$ $N\Lambda$, $\alpha\delta$ $N\Lambda\Lambda$ coni. Hu 10. η $\Lambda\Xi$ $\pi\omicron\mu\eta\mu\epsilon\tau\alpha\varsigma$ add. A² in marg. BS 11. η add. BS $\alpha\delta$ $\Lambda\theta$ OJ ABS Saviliani, corr. Co 17. $\lambda\omega\gamma\eta$ ante $\tau\eta$ MB add. Wa auctore Co

ἡ μὲν AA τῇ ZN , ἡ δὲ AO τῇ ZM , δύο δὲ αἱ AAO ὁμοίαι
ταῖς NZM ἴσαι εἰσὶν. καὶ γωνία ἡ ἐπὶ AAO γωνία τῇ
ὕπὸ NZM ἴση ἐστίν· βάσεις ἄρα ἡ OA βάσει τῇ NM ἴση
ἐστίν. καὶ αἱ γωνίαι ἴσαι εἰσὶν· ἴση ἄρα ἐστίν ἡ ἐπὶ AAO
78 γωνία τῇ ὑπὸ ZNM γωνίᾳ. πάλιν ἔπει ἡμικυκλίον ἐστίν⁵
ἡ ZAB , μείζων ἄρα ἡμικυκλίον ἐστίν ἡ $ZABH$. καὶ βέ-
βαιον ἐπ' αὐτῆς ἡ ὑπὸ ZMH γωνία· ἡ ἐπὶ ZMH γωνία
ἄρα μείζων ἐστίν ὁρθῆς. καὶ ἵπoteίνει αὐτὴν εὐθεΐα ἡ
 ZP , τὴν δὲ ἐπὶ PZM ὀξείαν ἡ PM · ἡ ZP ἄρα μείζων
ἐστίν τῆς PM . ἐκβεβλήσθω οὖν ἡ PW ἐπὶ τὸ Σ , καὶ κεί-
σθω τῇ ZP ἴση ἡ PS . καὶ ἔπει ὅλη ἡ AG ὅλη τῇ ZB
ἴση ἐστίν, ὥν ἡ AE ἴση ἐστίν τῇ ZE , λοιπὴ ἄρα ἡ E



λοιπὴ τῇ EN ἴση· καὶ γωνία ἄρα ἡ ἐπὶ EIN γωνία
τῇ ὑπὸ ENA ἴση ἐστίν· μείζων ἄρα ἡ ἐπὶ EIN τῆς ἐπὶ
 ANP · καὶ πλεονεξία ἄρα ἡ NP πλεονεξία τῆς PA μείζων ἐστίν.¹³
79 ἐκβεβλήσθω ἡ PA ἐπὶ τὸ Y , καὶ κείσθω τῇ PN ἴση ἡ PY ,
καὶ ἐπεξέχθω ἡ YS . ἔπει οὖν ἴση ἐστίν ἡ μὲν ZP τῇ
 PS , ἡ δὲ PN τῇ PY , δύο αἱ ZPN ὁμοίαι ταῖς SPY ἴσαι
εἰσὶν. καὶ γωνία ἡ ἐπὶ ZPN γωνία τῇ ὑπὸ SPY ἴση ἐστίν
κατὰ κορυφὴν γὰρ· βάσεις ἄρα ἡ NZ βάσει τῇ SY ἐστίν²⁰

$\Delta \delta \alpha \sigma \cong \Delta \nu \zeta \mu$; itaque

$\angle \alpha \delta \sigma = \angle \zeta \nu \mu$. Rursus quia circumferentia $\zeta \alpha \beta$ semicirculi est, maior igitur semicirculo est circumf. $\zeta \alpha \beta \eta$; angulus igitur $\zeta \mu \eta$, qui in hac insistit, maior est recto (*elem. 3, 31*). Et hunc subleudit recta $\zeta \rho$, angulum autem $\rho \zeta \mu$ recta $\rho \mu$; ergo est (*elem. 1, 19*)

$\zeta \rho > \rho \mu$. Iam producat $\rho \mu$ ad σ , et ponatur

$\rho \sigma = \zeta \rho$. Et quia est recta $\alpha \gamma \delta = \zeta \beta \nu$ et $\alpha \epsilon = \zeta \epsilon$, restat igitur

$\epsilon \delta = \epsilon \nu$; ergo etiam

$\angle \epsilon \delta \nu = \angle \epsilon \nu \delta$; itaque

$\angle \epsilon \delta \nu > \angle \rho \nu \delta$, multoque magis

$\angle \rho \delta \nu > \angle \rho \nu \delta$; itaque

$\nu \rho > \rho \delta$. Producat $\rho \delta$ ad ϵ , et ponatur $\rho \epsilon = \rho \nu$, et iungatur $\epsilon \sigma$. Iam quia est

$\zeta \rho = \rho \sigma$ et

$\nu \rho = \rho \epsilon$, et

$\angle \zeta \rho \nu = \angle \sigma \rho \epsilon$ (sunt enim ad verticem), est igitur propter *elem. 1, 4*

$\Delta \zeta \rho \nu \cong \Delta \sigma \rho \epsilon$; itaque

$\angle \rho \zeta \nu = \angle \rho \sigma \epsilon$. Sed est

$\angle \rho \mu \delta > \angle \rho \sigma \nu$, quia angulus $\rho \mu \delta$ extra triangulum est¹⁾; ergo

1) Hoc loco error scriptorisprehenditur, qui pro quadrilatero $\mu \sigma \epsilon \delta$ substituit triangulum $\mu \sigma \delta$, cuius exterior angulus est $\rho \mu \delta$. Neque tamen ea socordia Pappo imputanda esse videtur, sed interpreti cuidam, qui Pappi scripturam, quam antiquitus depravatam in suo codice invenerit, minus feliciter conatus sit restituere.

4. αὐ γωνία αὐ λοιπὰ γωνία ταῖς λοιπαῖς γωνίαις Wa auctore Co 6. ἡ ζαβ περιφέρεια Wa 7. αγωνία ante ἄρα A, sed α del. prima m. 9. ἡ PAM ZP 4 ἄρα AB, sed A ante ἄρα del. in A nescio quae manus, reliqua corr. S 12. τῇ Hu auctore Co pro τ 15. καὶ S. x A, x' B 17. ἐκτείνωμεν ἡ ἄν Wa 19. γωνία ante τῇ ἐνὸς AB, corr. S


ἴση. καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι ταῖς λοιπαῖς γωνίαις ἴσαι εἰσίν· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ PZN τῇ ὑπὸ PZY · ἀλλὰ ἡ ὑπὸ PMZ μείζων ἐστὶν τῆς ὑπὸ PZY (ἐκτὸς γάρ ἐστιν τοῦ τριγώνου)· καὶ ἡ ὑπὸ PMZ ἄρα μείζων ἐστὶν τῆς ὑπὸ PZN . ἔστιν δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ZPN ἴση τῇ ὑπὸ MPZ · λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ZNP μείζων ἐστὶν τῆς ὑπὸ PJM . ἀλλ' ἡ ὑπὸ ZNP ἴση ἐδείχθη τῇ ὑπὸ AJO · καὶ ἡ ὑπὸ AJO ἄρα μείζων ἐστὶν τῆς ὑπὸ PJM · πολλὴν ἄρα ἡ ὑπὸ AJZ μείζων ἐστὶν τῆς ὑπὸ PJM . ἀλλὰ τῆς μὲν AJZ διπλασίον ἐστὶν ἡ ὑπὸ KAJ , τῆς δὲ ὑπὸ PJM ἐλάττω ἢ διπλασίον ἐδείχθη ἡ 10 ὑπὸ ZAG · ἡ ἄρα ὑπὸ KAJ μείζων ἐστὶν τῆς ὑπὸ ZAG .

Εἰς τὰ ὑπερὰ ἑκτελεύτου.

- 80 μα'. Ἐὰν ἡ ἀπὸ τοῦ ὁμωμάτων προσπίπτουσα πρὸς τὸ κέντρον τοῦ κύκλου μήτε πρὸς ὁρθὰς ἢ τῷ ἐπιπέδῳ μήτε ἴση τῇ ἐκ τοῦ κέντρον, μείζων δὲ ἢ ἐλάσσων, ἀνισοὶ αἱ 15 διάμετροι τοῦ κύκλου γινοῦνται.

Προγράφεται δὲ τοῦ θεωρήματος τάδε.

Ἐστω δύο τρίγωνα ὁρθογώνια τὰ $ABΓ$ $ΔΕΖ$ ὁρθὰς ἔχοντα τὰς πρὸς τοῖς A $Δ$ γωνίας, καὶ ἡ $ΒΓ$ πρὸς τὴν $ΓΔ$ μείζονα λόγον ἔχτω ἥπερ ἡ $ΕΖ$ πρὸς τὴν $ΖΔ$ · ὅτι 20 μείζων ἐστὶν ἡ ὑπὸ $ΒΓΔ$ γωνία τῆς ὑπὸ $ΕΖΔ$.



Ἐπεὶ γὰρ ἡ $ΒΓ$ πρὸς τὴν $ΓΔ$ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ $ΕΖ$ πρὸς τὴν $ΖΔ$, καὶ δυνάμει καὶ διελόντι καὶ μήκει ἡ ἄρα $ΒΔ$ πρὸς τὴν $ΑΓ$ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ $ΕΔ$ πρὸς τὴν $ΙΖ$. πεποισθῶ ὡς ἡ $ΕΔ$ πρὸς τὴν $ΙΖ$, οὕτως ἡ $ΗΔ$ 25 πρὸς $ΑΓ$ · ὁῖον ἄρα ὅτι ἐλάσσων ἐστὶν ἡ $ΗΔ$ τῆς $ΑΒ$.

4. ἡ ὑπὸ MPZ ἄρα AB cod. Co, corr. S Co 40. ἐλάσσων Wa
12. εἰσοπτικὰ ἐκτελεύτου add. A^3 in marg. S, om. B Co 43. MA
 A^1 in marg. BS 49. τοῖς $ΔΔ$ A, distinct. BS 24. ἡ add. BS
26. ἄρα Hu pro γὰρ

$L \rho\mu\delta > L \rho\zeta\nu$. Sed est

$L \mu\rho\delta = L \zeta\rho\nu$; ergo per subtractionem (*est enim supplementum* $\rho\delta\mu$ minus supplemento $\rho\nu\zeta$

$L \zeta\nu\rho > L \rho\delta\mu$. Sed demonstratus est $L \zeta\nu\rho$ sive

$L \zeta\nu\mu = L \alpha\delta\theta$; ergo

$L \alpha\delta\theta > L \rho\delta\mu$; multo igitur

$L \alpha\delta\xi > L \rho\delta\mu$. Sed est

$L \alpha\delta\xi = \frac{1}{2} L \kappa\delta\lambda$ (quia ex hypothesis circumf. $\gamma\lambda = \frac{1}{2}$
circumf. $\kappa\lambda$; et demonstratus est
(propos. 41)

$L \rho\delta\mu > L \mu\delta\theta$, itaque etiam

$> \frac{1}{2} L \zeta\delta\theta$; ergo est

$L \kappa\delta\lambda > L \zeta\delta\theta$.

IN EUCLIDIS OPTICA.

XII. Si radius ab oculo in centrum circuli tendens neque perpendicularis sit ad planum circuli neque aequalis semidiametro eius, sed maior vel minor, diametri circuli inaequales apparebunt¹⁾.

Ad id theorema *demonstrandum* praemittuntur haec.

Sint duo triangula orthogonia $\alpha\beta\gamma$ $\delta\epsilon\zeta$ angulos ad α δ Prop. rectos habentia, et $\beta\gamma$ ad $\gamma\alpha$ maiorem proportionem habeat⁴² quam $\epsilon\zeta$ ad $\zeta\delta$; dico angulum $\alpha\gamma\beta$ angulo $\delta\zeta\epsilon$ maiorem esse.

Quoniam enim est

$\beta\gamma : \gamma\alpha > \epsilon\zeta : \zeta\delta$, et

$\beta\gamma^2 : \gamma\alpha^2 > \epsilon\zeta^2 : \zeta\delta^2$, et dirimendo

$\beta\alpha^2 : \gamma\alpha^2 > \epsilon\delta^2 : \zeta\delta^2$, est igitur


$\alpha\beta : \alpha\gamma > \delta\epsilon : \delta\zeta$. Iam fiat

$\alpha\eta : \alpha\gamma = \delta\epsilon : \delta\zeta$; manifesto igitur est

1) Haec est Euclidis opticorum propositio 37, quam scholiastae aliqui Gregorius editor (p. 625) tribuendam esse suspicatur. Graecus autem ille contextus paucis a Pappo discrepat hunc in modum: 'Εάν η από τοῦ ὀφθαλμοῦ πρὸς τὸ κέντρον προσπίπτουσα τοῦ κύκλου μήτε πρὸς ἀρθρὸς ἢ τῇ τοῦ κύκλου ἐπιπλάῃ, μήτε ἴση ἢ τῇ ἐκ τοῦ κέντρον, μήτε ἴσας γωνίας περιέχουσα μετὰ τῶν ἐκ τοῦ κέντρον, μέζων δὲ ἢ ἐλάσσων τῆς ἐκ τοῦ κέντρον, ἄνιστοι αὐτὰς εἰσὶν αἰσθηταί.'.

ἐπεξεύχθω ἡ $ΗΓ$ · καὶ ἔστιν ὡς ἡ $ΗΑ$ πρὸς τὴν $ΑΓ$, οὕτως ἡ $ΒΑ$ πρὸς τὴν $ΑΖ$ · ὁμοίον ἄρα ἔστιν τὸ $ΑΗΓ$ τρίγωνον τῷ $ΔΕΖ$ τριγώνῳ· ἴση ἄρα ἔστιν ἡ ὑπὸ $ΑΓΗ$ γωνία τῇ ὑπὸ $ΔΖΕ$ · μείζων ἄρα ἔστιν ἡ ὑπὸ $ΑΓΒ$ τῆς ὑπὸ $ΔΖΕ$ γωνίας.

- 81 μβ. Ἀπὸ μετεώρου σημείου τοῦ $Α$ ἐπὶ τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον κάθετος ἤχθω ἡ $ΑΒ$, καὶ συμβαλλέτω αὐτῷ κατὰ τὸ $Β$ σημεῖον, ἔστω δ' ἐν τῷ ἐπιπέδῳ εὐθεία τις ἡ $ΓΔ$, καὶ ἀπὸ τοῦ $Β$ σημείου ἐπὶ τὴν $ΓΔ$ κάθετος ἤχθω ἡ $ΒΔ$, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ $ΑΔ$ · λέγω ὅτι καὶ ἡ $ΑΔ$ κάθετος ἔστιν ἐπὶ τὴν $ΓΔ$.



Εἰλήρθω ἐπὶ τῆς $ΓΔ$ τυχὸν σημεῖον τὸ $Γ$ καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ $ΑΓ$, $ΓΒ$. ἐπεὶ οὖν ἡ $ΑΒ$ κάθετος ἐπὶ τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον, ὀρθή ἐστιν ἡ ὑπὸ $ΑΒΓ$ γωνία· τὸ ἄρα ἀπὸ $ΑΓ$ ἴσον ἔστιν τοῖς ἀπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$. τῷ δὲ ἀπὸ $ΒΓ$ ἴσα τὰ ἀπὸ τῶν $ΒΔ$, $ΔΓ$ · τὸ ἄρα ἀπὸ $ΑΓ$ ἴσον ἔστιν τοῖς ἀπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΔ$, $ΔΓ$. τοῖς δὲ ἀπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΔ$ ἴσον ἔστιν τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΔ$ · τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς $ΑΓ$ ἴσον ἔστιν τῷ ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΓ$ · ὀρθή ἄρα ἔστιν ἡ ὑπὸ $ΑΔΓ$ γωνία· κάθετος ἄρα ἔστιν ἡ $ΑΔ$ ἐπὶ τὴν $ΓΔ$, ὅπερ· ~

- 82 μγ. Ἀπὸ σημείου μετεώρου τοῦ $Α$ ἐπὶ τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον εὐθεία διήχθω ἡ $ΑΒ$ μὴ οὕσα κάθετος ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον, καὶ κάθετος ἀπὸ τοῦ $Α$ ἐπὶ τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον ἤχθω, καὶ συμβαλλέτω αὐτῷ κατὰ τὸ $Γ$, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ $ΓΒ$ · λέγω ὅτι ἡ ὑπὸ $ΑΒΓ$ γωνία ἐλαχίστη ἐστὶν πασῶν τῶν περιεχομένων ὑπὸ τε τῆς $ΑΒ$ καὶ ἐκάστης τῶν ἀπὸ τοῦ $Β$ σημείου διαγομένων εὐθειῶν ἐν τῷ ὑποκειμένῳ

1. 2. καὶ ἔστιν — τὴν $ΑΖ$ del. Co 6. $ΑΒ$ $Α^1$ in marg. (BS)
μεταίωρου $Α^1$, corr. $Α^3$ (BS) 22. τὸ ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΓ$ $ΑΒ$,
corr. S 25. $ΜΓ$ $Α^1$ in marg. (BS) 31. σημείων $ΑΒ$, item S, sed
ou superscriptum

$\alpha\gamma < \alpha\beta$. Iungatur $\gamma\delta$; ergo est

$$\Delta \alpha\gamma\delta \sim \Delta \delta\epsilon\zeta, \text{ et}$$

$$\angle \alpha\gamma\delta = \angle \delta\zeta\epsilon; \text{ itaque}$$

$$\angle \alpha\gamma\beta > \angle \delta\zeta\epsilon.$$

*Similiter lemma conversum demonstratur: si sint triangu-
gula orthogonia, ut supra, et angulus $\alpha\gamma\beta$ angulo $\delta\zeta\epsilon$ maior
sit, esse $\beta\gamma : \gamma\alpha > \epsilon\zeta : \zeta\delta$).*

XLII. A sublimi puncto α ducatur perpendicularis $\alpha\beta$ Prop.
ad planum subiectum, cui in puncto β occurrat, atque in ⁴⁸
eodem plano sit recta quaedam $\gamma\delta$, et a puncto β ad $\gamma\delta$ du-
catur perpendicularis $\beta\delta$, iungaturque $\alpha\delta$; dico rectam $\alpha\delta$
ipsi $\gamma\delta$ perpendicularem esse¹⁾.

Sumatur in recta $\gamma\delta$ quodlibet punctum γ et iungantur
 $\alpha\gamma$ $\gamma\beta$. Iam quia $\alpha\beta$ perpendicularis est ad subiectum pla-
num, angulus $\alpha\beta\gamma$ rectus est; itaque

$$\alpha\gamma^2 = \alpha\beta^2 + \beta\gamma^2. \text{ Sed ex hypothesis est}$$

$$\beta\gamma^2 = \beta\delta^2 + \delta\gamma^2; \text{ ergo}$$

$$\alpha\gamma^2 = \alpha\beta^2 + \beta\delta^2 + \delta\gamma^2. \text{ Sed est etiam propter elem.}$$

11 defin. 3

$$\alpha\gamma^2 + \beta\delta^2 = \alpha\delta^2; \text{ ergo}$$

$$\alpha\gamma^2 = \alpha\delta^2 + \delta\gamma^2;$$

itaque angulus $\alpha\delta\gamma$ rectus est et $\alpha\delta$ perpendicularis ipsi $\gamma\delta$,
q. e. d.

XLIII. A sublimi puncto α ad planum subiectum ducatur Prop.
recta $\alpha\beta$ non perpendicularis plano, aliaque ab α per- ⁴⁴ 49;
pendicularis ad subiectum planum ducatur, cui in γ occurrat,
et iungatur $\gamma\beta$; dico


angulum $\alpha\beta\gamma$ minimum esse omnium qui continentur
ipsa $\alpha\beta$ et qualibet earum rectarum quae a puncto β in plano
subiecto ducuntur: atque etiam

*1) Hoc lemma conversum infra adhibetur propos. 44 med. De-
monstrationem peculiarem addit Commandinus.

1) Hoc theorema adhibetur infra libro VIII propos. 8 cap. 15 extr.,
ubi $\epsilon\eta\mu\epsilon\alpha \sigma\gamma\alpha\iota\tau\epsilon\chi\acute{o}\nu$ immo $\delta\pi\epsilon\tau\epsilon\chi\acute{o}\nu$ vocatur, et propos. 15 cap. 34 extr.

*2) Conf. Baltzer, *Elemente der Mathematik*, II. 3 § 2, 10.

ἐπιπέδῳ, ἔτι δὲ ὅτι αἰεὶ ἡ ἔγγιον αὐτῆς τῆς ἀπώτερον ἐλάσσων ἐστίν, καὶ ὅτι δύο μόνον ἴσαι αὐτῇ ἐφ' ἑκάτερα συνίστανται.



Λιγέχω γάρ τις ἐν τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ τυχοῦσα ἡ ΒΔ, καὶ ἀπὸ τοῦ Γ ἐπ' αὐτὴν κάθετος ἡ ΓΔ, καὶ ἐπεξέχθω ἡ ΑΔ· κάθετος ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΔ ἐπὶ τὴν ΒΔ διὰ τὸ προοδευγμένον. καὶ ἐπεὶ ὀρθὴ ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΓΔ γωνία, μείζων ἐστὶν ἡ ΑΔ τῆς ΑΓ· ἡ ἄρα ΒΑ πρὸς τὴν ΑΓ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΑΔ. καὶ εἰσὶν ὀρθαὶ αἱ ὑπὸ ΒΓΑ

ΒΔΑ· μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΒΑΓ γωνία τῆς ὑπὸ ΒΑΔ διὰ τὸ πρὸ ἐνὸς δεδευγμένον, ὥστε λοιπὴ ἡ ὑπὸ ΑΒΓ ἐλάσσων ἐστὶν τῆς ὑπὸ ΑΒΔ. ὁμοίως δεῖξομεν ὅτι καὶ πασῶν ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΒΓ γωνία· ἐλαχίστη ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΒΓ γωνία.

53 Λέγω ὅτι καὶ αἰεὶ ἡ ἔγγιον αὐτῆς τῆς ἀπώτερόν ἐστιν ἐλάσσων.

20

Λιγέχω γάρ τις ἡ ΒΕ ἐν τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ, καὶ ἀπὸ τοῦ Γ ἐπ' αὐτὴν κάθετος ἡ ΓΕ, καὶ ἐπεξέχθω ἡ ΑΕ· καὶ ἡ ΑΕ ἄρα κάθετός ἐστιν ἐπὶ τὴν ΒΕ. καὶ ἐπεὶ ὀρθὴ ἡ ὑπὸ ΒΑΓ ὀρθὴ τῇ ὑπὸ ΓΕΒ ἴση, ἀλλὰ καὶ ἡ ὑπὸ ΒΓΔ γωνία τῆς ὑπὸ ΒΓΕ μείζων, ἡ ΕΓ ἄρα πρὸς ΓΒ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΑΓ πρὸς ΓΒ· πολλὴ ἄρα μείζων ἐστὶν ἡ ΕΓ τῆς ΓΔ. καὶ ἐστὶν ἡ ΓΑ πρὸς ὀρθῶς ἐκατέρωτ' τῶν ΓΔ ΓΕ· μείζων ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ΕΑ τῆς ΑΔ· ἡ ἄρα ΒΑ πρὸς τὴν ΑΔ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ πρὸς τὴν ΑΕ. καὶ εἰσὶν ὀρθαὶ αἱ πρὸς τοῖς ΑΕ σημείοις γωνίαι· μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΒΑΔ γωνία τῆς ὑπὸ ΒΑΕ· ἡ ἄρα ὑπὸ ΑΒΔ γωνία ἐλάσσων ἐστὶν τῆς ὑπὸ ΑΒΕ γωνίας.

1. ἔτι τε ΑΒ', corr. S ἔγγιον Α² ex ἐγγιον 2. μόνον S
16. ὅτι Β, om. AS 19. ἐγγιον Α² ex ἐγγιον 26. 27. πολλῇ ἄρα
μείζων μείζων ἄρα conit. Hu 27. ἡ ante ΕΓ add. BS 28. καὶ ἡ

eum angulum qui ipsi $\alpha\beta\gamma$ propior est semper remotiore minorem esse; denique

binos tantum aequales angulos ad utrasque ipsius $\alpha\beta\gamma$ partes constitui.

Ducatur enim in plano subiecto quaelibet $\beta\delta$, eique perpendicularis a puncto γ recta $\gamma\delta$, et iungatur ad ; ergo propter superius lemma ad ipsi $\beta\delta$ perpendicularis est. Et quia angulus $\alpha\gamma\delta$ rectus est, maior est $\delta\alpha$ quam $\alpha\gamma$; itaque $\beta\alpha : \alpha\gamma > \beta\alpha : ad$. Et recti sunt anguli $\beta\gamma\alpha$ $\beta\delta\alpha$; ergo propter primum lemma (*propos. 42*) angulus $\beta\alpha\gamma$ angulo $\beta\alpha\delta$ maior est; itaque subtrahendo $\alpha\beta\gamma$ minor est quam $\alpha\beta\delta$. Similiter demonstrabimus angulum $\alpha\beta\gamma$ minorem esse omnibus reliquis qui recta $\alpha\beta$ et qualibet a puncto β in plano ducta continentur; ergo angulus $\alpha\beta\gamma$ minimus est.

Dico etiam eum angulum qui ipsi $\alpha\beta\gamma$ propior est semper remotiore minorem esse.

Ducatur enim in plano subiecto quaelibet recta $\beta\epsilon$ angulum $\alpha\beta\gamma$ maiorem quam $\delta\beta\gamma$ efficiens, eique perpendicularis a puncto γ ducatur $\gamma\epsilon$, et iungatur ae ; ergo etiam ae ipsi $\beta\epsilon$ perpendicularis est (*propos. 45*). Et quia angulus $\beta\delta\gamma$ ut rectus angulo recto $\beta\epsilon\gamma$ aequalis, et angulus $\beta\gamma\delta$ ipso $\beta\gamma\epsilon$ maior est¹⁾, propter *propos. 42* conversam est igitur

$\beta\gamma : \gamma\delta > \beta\gamma : \gamma\epsilon$, id est (*infra VII propos. 7 extr.*)

$\epsilon\gamma : \gamma\delta > \delta\gamma : \gamma\beta$; ergo (*elem. 5. 10*)

$\epsilon\gamma > \delta\gamma$. Et recti sunt anguli $\alpha\gamma\epsilon$ $\alpha\gamma\delta$; ergo quia

$$\epsilon\gamma^2 = ae^2 - \alpha\gamma^2, \text{ et}$$

$$\delta\gamma^2 = ad^2 - \alpha\gamma^2, \text{ est igitur}$$

$ae > ad$; itaque (*elem. 5. 8*)

$\alpha\beta : ad > \alpha\beta : ae$. Et recti sunt anguli $ad\beta$ $ae\beta$; ergo propter *propos. 42* est

$\angle \beta ad > \angle \beta ae$; itaque

$\angle \alpha\beta\delta < \angle \alpha\beta\epsilon$.

¹⁾ Scilicet ex constructione est $\angle \gamma\beta\delta < \angle \gamma\beta\epsilon$; et recti sunt anguli $\delta\gamma\epsilon$; ergo $\angle \beta\gamma\delta > \angle \beta\gamma\epsilon$.

νίας. ὁμοίως δείξομεν ὅτι καὶ αἰεὶ ἡ ἔγγιον τῆς ἐπὶ *ΑΒΓ* γωνίας τῆς ἀπώτερον ἐλάσσων ἐστίν.

84 Ἀέγω δ' ὅτι ἴσαι δύο μόνον ἐρ' ἐκάτερα αὐτῆς συνίστα-
θήσονται.

Συνεστάτω πρὸς τῇ *ΓΒ* εὐθείᾳ καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ ση-
μεῖον τῷ *Β* ἐν τῷ ἐποκειμένῳ ἐπιπέδῳ τῇ ἐπὶ *ΑΒΓ* γω-
νίᾳ ἴση ἡ ἐπὶ *ΓΒΖ*, καὶ ἀπὸ τοῦ *Γ* ἐπὶ τὴν *ΒΖ* κάθετος
ἦχθω ἡ *ΓΖ*, καὶ ἐπεξέχθω ἡ *ΑΖ*. ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ἐπὶ
ΓΒΔ γωνία τῇ ἐπὶ *ΓΒΖ*, ἔστιν δὲ καὶ ὁρθή ἡ ἐπὶ *ΓΑΒ*
ὁρθῇ τῇ ἐπὶ *ΓΖΒ* ἴση, καὶ ἔστιν καὶ κοινὴ τῶν τριγώνων
ἡ *ΓΒ* πλευρά, ἴση ἄρα ἡ μὲν *ΒΔ* τῇ *ΒΖ*, ἡ δὲ *ΓΔ* τῇ *ΓΖ*.
καὶ ἔστιν ἡ *ΑΓ* κάθετος ἐπὶ ἐκάτεραν τῶν *ΑΓ ΓΖ*. ἴσαι
ἄρα καὶ ἡ *ΑΔ* τῇ *ΑΖ*. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ *ΑΒ* τῇ *ΒΖ*,
κοινὴ δὲ ἡ *ΒΑ*, καὶ ἔστιν βάσις ἡ *ΑΔ* βάσει τῇ *ΑΖ* ἴση,
γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ *ΑΒΔ* γωνία τῇ ἐπὶ *ΑΒΖ* ἐστὶν ἴση. 15
ὁμοίως δὲ δείξομεν ὅτι τῇ ὑπὸ *ΑΒΔ* ἐτέρα οὐ συνίστα-
ται ἴση.


Ἡ μὲν ἐπὶ *ΑΒΓ* ἄρα γωνία ἐλαχίστη ἐστίν, αἰεὶ δὲ
ἡ ἔγγιον αὐτῆς τῆς ἀπώτερον ἐλάσσων, ἴσαι δὲ δύο μόνον
ἐρ' ἐκάτερα αὐτῆς συνίστανται. 20

85 μδ'. Ἐστω δύο τρίγωνα τὰ *ΑΒΓ ΔΕΖ* ἴσας ἔχοντα
τὰς *ΒΓ ΕΖ*, καὶ τετμήσθωσαν διχα αἱ *ΒΓ ΕΖ* τοῖς *Η Θ*,
καὶ ἐπεξέχθωσαν αἱ *ΑΗ ΑΘ*, καὶ ἔστωσαν ἴσαι, καὶ ἡ
μὲν *ΑΗ* κάθετος ἔστω ἐπὶ τὴν *ΒΓ*, ἡ δὲ *ΑΘ* μὴ ἔστω
κάθετος ἐπὶ τὴν *ΕΖ*, καὶ ἔστω μείζων ἡ *ΑΗ* τῆς *ΗΒ*. ὅτι 25
ἡ ἐπὶ *ΒΑΓ* γωνία μείζων ἐστὶν τῆς ἐπὶ *ΕΔΖ*.

Περιγεράσθω περὶ τὸ *ΑΒΓ* τρίγωνον κύκλος ὁ *ΑΒΓ*,
καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ *ΑΗ* ἐπὶ τὸ *Α*. ἐπεὶ μείζων ἐστὶν ἡ
ΑΗ τῆς *ΗΒ*, καὶ ἔστιν διάμετρος ἡ *ΑΑ*, τὸ ἄρα κέντρον

1. η ἔγγιον (sine spir. et acc., A, corr. B τὸ ἔγγιον Paris. 2368,
τὸ ἔγγιον S 8. ἦχθω *ΗΓΖ* A¹, θ add. A², ἡ γὰρ distinct. BS 10. ἐπὶ
ΓΒΖ ἴση ABS, corr. Co Sea 15. *ΑΒΓ* γωνία A, corr. BS 18. αὐτὴ
AB, corr. S 19. ἔγγιον (sine spir. et acc., A, corr. BS 21. *ΑΔ*
A¹ in marg. BS 22. τοῖς *ΗΘ* A, distinct. BS 24. ἔστω (ante ἐπὶ)
add. A² super vs. BS 25. 25. *ΒΓ* — ἐπὶ τὴν om. S 25. *ΕΖ*
S; Sea

Similiter demonstrabimus, quicumque angulus propior est ipsi $\alpha\beta\gamma$, eum semper remotiore minorem esse.



Denique dico binos tantum aequales angulos ad utrasque ipsius $\alpha\beta\gamma$ partes constitui.

In plano subiecto constituatur ad rectam $\gamma\beta$ verticemque β angulus $\gamma\beta\zeta$ aequalis angulo $\gamma\beta\delta$, et a γ ad $\beta\zeta$ ducatur perpendicularis $\gamma\zeta$, et iungatur $\alpha\zeta$. Quoniam est

$\angle \gamma\beta\delta = \angle \gamma\beta\zeta$, et, utpote rectus recto,

$\angle \gamma\delta\beta = \angle \gamma\zeta\beta$, et $\gamma\beta$ latus utriusque triangulo commune est, ergo est (*elem. 1, 26*)

$\beta\delta = \beta\zeta$, et

$\gamma\delta = \gamma\zeta$. Et $\alpha\gamma$ ad utramque rectarum $\gamma\delta$ $\gamma\zeta$ perpendicularis est (*elem. 11 defin. 3*); ergo est

$\alpha\delta = \alpha\zeta$. Iam quia demonstrata est $\beta\delta = \beta\zeta$, et $\alpha\delta = \alpha\zeta$, et latus $\beta\alpha$ commune est, est igitur (*elem. 1, 8*)

$\angle \alpha\beta\delta = \angle \alpha\beta\zeta$.


Similiter demonstrabimus alium angulum ipsi $\alpha\beta\delta$ aequalem constitui non posse.

Ergo tria quae proposita erant demonstrata sunt. angulum $\alpha\beta\gamma$ minimum, propiorem autem semper remotiore minorem esse, denique binos tantum aequales angulos ad utrasque ipsius $\alpha\beta\gamma$ partes constitui.

XLIV. Sint duo triangula $\alpha\beta\gamma$ $\delta\epsilon\zeta$ aequalibus lateribus Prop. 45
 $\beta\gamma$ $\epsilon\zeta$, quae bifariam secantur in punctis η θ , et iungantur $\alpha\eta$ $\delta\theta$, quae etiam inter se aequales sint, et sit $\alpha\eta$ quidem ipsi $\beta\gamma$ perpendicularis, $\delta\theta$ autem ipsi $\epsilon\zeta$ non perpendicularis. sitque $\alpha\eta$ maior quam $\eta\beta$; dico angulum $\beta\alpha\gamma$ angulo $\epsilon\delta\zeta$ maiorem esse.

Describatur circa triangulum $\alpha\beta\gamma$ circulus $\alpha\beta\gamma$, et producat $\alpha\eta$ ad λ punctum circumferentiae. Quoniam $\alpha\eta$ maior quam $\eta\beta$, et $\alpha\lambda$ diametrus est, centrum igitur circuli est

τοῦ κύκλου ἐστὶ μεταξὺ τῶν AH (τοῦτο γὰρ ἐξῆς)· με-
γίστη ἄρα ἐστὶν ἡ AH , καὶ αἰεὶ ἡ ἔγγιον αὐτῆς μείζων



τῆς ἀπώτερον. συνεστάτω τῇ ὑπὸ $\Lambda\Theta Z$ γωνίᾳ ἴση ἡ ὑπὸ $\Gamma H M$ · μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ AH , τουτέστιν ἡ $\Lambda\Theta$, τῆς $H M$.
κείσθω τῇ $\Lambda\Theta$ ἴση ἡ $H K$, καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ $K B$ $K \Gamma$ · 5
ἡ ἄρα ὑπὸ $E J Z$ γωνία ἴση ἐστὶ τῇ ὑπὸ $B K \Gamma$. μείζων δὲ
τῆς ὑπὸ $B K \Gamma$ ἡ ὑπὸ $B \Lambda \Gamma$ · καὶ τῆς ὑπὸ $E J Z$ ἄρα μείζων
ἐστὶν ἡ ὑπὸ $B \Lambda \Gamma$.

86 Ὑποκειμένων τῶν αὐτῶν ἔστω ἐλάσσων ἡ $H A$ τῆς $H B$.
λέγω ὅτι ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ὑπὸ $B \Lambda \Gamma$ γωνία τῆς ὑπὸ $E J Z$. 10

Συνεστάτω οὖν τῇ ὑπὸ $\Lambda\Theta Z$ γωνίᾳ ἴση ἡ ὑπὸ $\Gamma H M$.
καὶ ἐπεὶ ἐλάσσων ἐστὶν ἡ AH τῆς $H B$, καὶ ἔστιν διάμε-
τρος ἡ ΛA , τὸ ἄρα κέντρον τοῦ κύκλου ἐστὶν μεταξὺ τῶν
 AH · ἐλαχίστη ἄρα ἐστὶν ἡ AH · μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ $H M$
τῆς $H A$, τουτέστιν τῆς $\Lambda\Theta$. κείσθω αὐτῇ ἴση ἡ $H N$, καὶ 15
ἐπεξεύχθωσαν αἱ $N B$ $N \Gamma$ · ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ $E J Z$ γω-
νία τῇ ὑπὸ $B N \Gamma$. ἀλλὰ ἡ ὑπὸ $B N \Gamma$ τῆς ὑπὸ $B \Lambda \Gamma$ μεί-
ζων ἐστὶν· μείζων ἄρα ἡ ὑπὸ $E J Z$ γωνία τῆς ὑπὸ $B \Lambda \Gamma$,
ὅπερ· ~

57 μέν. Κύκλος ὁ $A B \Gamma$, οὗ διάμετρος ἡ $A B$, καὶ ἐπ' 20

1. τῶν $\overline{AH}$ AB , distinx. S 2. αἰεὶ ἡ ἐγγιον Λ , corr. BS
11. γωνίαις ἡ ὑπὸ Λ , γωνία ἡ ὑπὸ B , corr. S 13. 14. τῶν $\overline{AH}$ A ,
distinx. BS 20. $\overline{ME}$ A in marg. (BS)

inter puncta $\alpha \eta$ (hoc enim deinceps *propos. 47* demonstrabitur). Ergo $\alpha\eta$ maxima est omnium quae ab η ad circumferentiam ducuntur et, quae ipsi $\alpha\eta$ propior, ea semper maior est remotiore (*elem. 3. 7.*). Constituatur angulus $\gamma\eta\mu$ ipsi $\zeta\vartheta$ aequalis; ergo $\alpha\eta$, id est $\delta\vartheta$ (utpote ex hypothesi $= \alpha\eta$), maior est quam $\eta\mu$. Ponatur $\eta\kappa = \vartheta\delta$, et iungantur $\kappa\delta$ $\kappa\gamma$; ergo est


$\angle \beta\kappa\gamma = \angle \epsilon\delta\zeta$. Sed est (si iungantur $\beta\mu$ $\mu\gamma$, propter *elem. 3, 21*)

$\angle \beta\alpha\gamma = \angle \beta\mu\gamma$, id est (*elem. 1, 21*)

$> \angle \beta\kappa\gamma$; ergo

$\angle \beta\alpha\gamma > \angle \epsilon\delta\zeta$.

Iisdem ceteroquin suppositis sit $\alpha\eta$ minor quam $\eta\beta$; dico *Prop. 46*
angulum $\beta\alpha\gamma$ angulo $\epsilon\delta\zeta$ minorem esse.



Constituatur igitur angulus $\mu\eta\gamma$ angulo $\delta\vartheta\zeta$ aequalis. Et quia $\alpha\eta$ minor quam $\eta\beta$, et $\alpha\lambda$ diametrus est, centrum igitur circuli est inter puncta $\lambda \eta$ (*propos. 47 extr.*). Ergo minima est $\alpha\eta$ etc. (*elem. 3. 7.*); itaque $\eta\mu$ maior est quam $\eta\alpha$, id est quam $\vartheta\delta$. Ponatur $\eta\kappa = \vartheta\delta$, et iungantur $\beta\kappa$ $\kappa\gamma$; ergo est

$\angle \beta\kappa\gamma = \angle \epsilon\delta\zeta$. Sed est (similiter ac *propos. 45*)


$\angle \beta\eta\gamma > \angle \beta\mu\gamma$, id est

$> \angle \beta\alpha\gamma$; itaque

$\angle \beta\alpha\gamma < \angle \epsilon\delta\zeta$, q. e. d.

XIV. Si circulus $\alpha\beta\gamma$, cuius diametrus $\alpha\beta$, in eaque *Prop. 47*

αὐτῆς τοχὸν σημεῖον τὸ A , καὶ διήχθω ὡς ἔτιχεν ἡ $ΓΔ$, καὶ ἔστω μείζων ἡ $ΑΔ$ τῆς $ΔΓ$. ὅτι καὶ τῆς $ΑΒ$ μείζων ἐστίν.



Ἐπεξεύχθωσαν αἱ $ΑΓ ΓΒ$. ἐπεὶ μείζων ἐστίν ἡ ὑπὸ $ΑΓΔ$ γωνία τῆς ὑπὸ $ΓΑΔ$, λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ $ΔΓΒ$ ἐλάσσων ἐστίν τῆς ὑπὸ $ΔΒΓ$. μείζων ἄρα ἐστίν ἡ $ΓΔ$ τῆς $ΔΒ$. ἔστιν δὲ καὶ ἡ $ΑΔ$ μείζων τῆς $ΔΓ$. πολλῶν ἄρα μείζων ἐστίν ἡ $ΑΔ$ τῆς $ΔΒ$. 10

Ὅμοιως δεῖξομεν (ὅτι), καὶ ἐλάσσων ἢ ἡ $ΑΔ$ τῆς $ΔΓ$, ὅτι καὶ τῆς $ΔΒ$ ἐλάσσων ἐστίν.

- 88 μζ'. Κύκλος ὁ $ΑΒΓ$, οὗ διάμετρος ἡ $ΑΒ$, καὶ ἐν' αὐτῆς εἰλήθθω σημεῖον τὸ $Δ$, καὶ διήχθωσαν αἱ $ΔΓ ΔΕ$, καὶ ἔστω μείζων ἡ $ΓΔ$ τῆς $ΔΕ$. ὅτι μείζων ἐστίν ἡ $ΑΔ$ τῆς $ΔΒ$. 15

Ἐπεξεύχθω ἡ $ΓΕ$, καὶ κάθετος ἡ $ΔΖ$. μείζων ἄρα ἐστίν ἡ $ΓΖ$ τῆς $ΖΕ$. τεμνέσθω δίχα ἡ $ΓΕ$ τῷ $Η$, καὶ διὰ τοῦ $Η$ παραλλήλος τῇ $ΔΖ$ ἡ $ΗΘ$. πρὸς ὀρθὰς ἄρα ἐστίν ἡ $ΘΗ$ τῇ $ΓΕ$. ἀλλὰ καὶ δίχα αὐτὴν τέμνει· ἐπὶ τῆς $ΗΘ$ ἄρα ἐστίν τὸ κέντρον. ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῆς $ΑΒ$ · τὸ ἄρα $Θ$ κέντρον ἐστίν τοῦ κύκλου· μείζων ἄρα ἐστίν ἡ $ΑΔ$ τῆς $ΔΒ$. 20

- 89 μζ'. Ἐστω πάλιν δύο τρίγωνα τὰ $ΑΒΓ ΔΕΖ$ ἴσας ἔχοντα τὰς $ΒΓ ΕΖ$, καὶ δίχα τεμνέσθωσαν αἱ $ΒΓ ΕΖ$ τοῖς $Η Θ$, καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ $ΑΗ ΔΘ$, καὶ ἔστωσαν ἴσαι, καὶ μηδετέρα τῶν $ΑΗ ΔΘ$ ἔστω κάθετος ἐπὶ τὴν βάσιν, ἔστω δὲ μείζων ἡ ὑπὸ $ΑΗΓ$ γωνία τῆς ὑπὸ $ΔΘΖ$. λέγω ὅτι, εἴ μὲν ἢ μείζων ἡ $ΑΗ$ τῆς $ΗΓ$, μείζων ἐστίν ἡ ὑπὸ $ΒΑΓ$ γωνία τῆς ὑπὸ $ΕΔΖ$, εἰ δὲ ἐλάσσων ἡ $ΗΑ$ τῆς $ΗΓ$, 30 ἐλάσσων καὶ ἡ ὑπὸ $ΒΑΓ$ γωνία τῆς ὑπὸ $ΕΔΖ$.

2. τῆς $ΔΓ$ τῆς $ΔΓ$ $Α$, τῆς $αγ$ $δ$, corr. B Sca 11. ὅτι del. Hu

18. $Μζ$ $Α'$ in marg. BS; ὁ $ΑΒΓ$ Hu auctore Co pro ὁ $ΑΒ$

24. $Μζ$ $Α'$ in marg. BS; πάλιν om. Co 25. 26. τοῖς $ΗΘ$ $Α$, distinx. BS

quodlibet punctum δ , et ducatur utcumque $\gamma\delta$, sitque $\alpha\delta$ maior quam $\delta\gamma$; dico $\alpha\delta$ etiam maiorem esse quam $\delta\beta$.

Iungantur $\alpha\gamma$ $\gamma\beta$. Quoniam est

$$\angle \alpha\gamma\delta + \angle \delta\gamma\beta = \angle \gamma\alpha\delta + \angle \gamma\beta\delta, \text{ et}$$

$$\angle \alpha\gamma\delta > \angle \gamma\alpha\delta \text{ elem. 1. 18; restat igitur}$$

$$\angle \delta\gamma\beta < \angle \gamma\beta\delta; \text{ itaque elem. 1. 19}$$


$$\delta\gamma > \delta\beta. \text{ Sed est}$$

$$\alpha\delta > \delta\gamma; \text{ multo igitur}$$

$$\alpha\delta > \delta\beta.$$

Similiter demonstrabimus, si $\alpha\delta$ minor sit quam $\delta\gamma$, eandem minorem esse quam $\delta\beta$.

XLVI. Sit circulus $\alpha\beta\gamma$, cuius diameter $\alpha\beta$, in eaque ^{Prop. 48} sumatur quodlibet punctum δ , et ad circumferentiam ducantur $\delta\gamma$ $\delta\epsilon$, sitque $\delta\gamma$ maior quam $\delta\epsilon$; dico $\alpha\delta$ maiorem esse quam $\delta\beta$.



Iungatur $\gamma\epsilon$, eique perpendicularis ducatur $\delta\zeta$; ergo $\gamma\zeta$ maior est quam $\zeta\epsilon$. Bifariam secetur $\gamma\epsilon$ in puncto r_1 , et per r_1 ipsi $\delta\zeta$ parallela ducatur $r_1\theta$; ergo $r_1\theta$ ipsi $\gamma\epsilon$ perpendicularis est. Sed $r_1\theta$ etiam bifariam secat $\gamma\epsilon$: ergo centrum circuli est in $r_1\theta$ (elem. 3. 1 coroll.). Sed idem etiam in $\alpha\beta$: ergo θ circuli centrum est; itaque $\alpha\delta$ maior est quam $\delta\beta$.

XLVII. Sint rursus duo triangula $\alpha\beta\gamma$ $\delta\epsilon\zeta$ aequalibus ^{Prop. 49} lateribus $\beta\gamma$ $\epsilon\zeta$, quae bifariam secantur in punctis r_1 θ , et iungantur αr_1 $\delta\theta$, quae inter se aequales sint, et neutra earum sit perpendicularis ad basim, angulus autem $\alpha r_1\gamma$ angulo $\delta\theta\zeta$ maior sit; dico,



$$\text{si sit } \alpha r_1 > r_1\gamma, \text{ esse } \angle \beta\alpha\gamma > \angle \epsilon\delta\zeta, \text{ at,}$$

$$\text{si sit } \alpha r_1 < r_1\gamma, \text{ esse } \angle \beta\alpha\gamma < \angle \epsilon\delta\zeta.$$

* Hoc ex propos. 42 similiter demonstratur ac supra p. 573.

** Nam quia $\gamma\zeta > \zeta\epsilon$, punctum η est inter γ ζ ; itaque θ inter δ ζ etc.

"Ηχθω ἀπὸ τοῦ H ἢ BI πρὸς ὀρθὰς ἡ HK · διάμετρος ἄρα ἐστὶν τοῦ κύκλου· ἔστω πρότερον μείζων ἢ HA



τῆς $HΓ$ · διὰ ἄρα τὸ προδειχθὲν μείζων ἐστὶν ἡ HK τῆς HA [μεγίστη ἄρα ἐστὶν ἡ KH , καὶ αἰεὶ ἡ ἔγγιον αὐτῆς τῆς ἀπώτερον μείζων]. συνεστιάτω τῇ ὑπὸ IOZ γωνίᾳ ἴση ἢ ὑπὸ $ΓHM$ · μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ HA , τουτέστιν ἡ IO , τῆς HM . κείσθω αὐτῇ ἴση ἡ HN , καὶ ἐπεζείχθωσαν αἱ NB NI · ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ BNI γωνία τῇ ὑπὸ EIZ · μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ BAG γωνία τῆς ὑπὸ EIZ .

Ὅμοιως δεῖξομεν ὅτι, ἐὰν ἡ ἐλάσσων ἢ AH τῆς $HΓ$, 10 ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ὑπὸ BAG γωνία τῆς ὑπὸ EIZ , ὅπερ· ~

90 μί'. Ἐστω κύκλος ὁ $ABΓ$, οὗ κέντρον τὸ E , καὶ ἀπὸ τοῦ E πρὸς ὀρθὰς ἔστω τῷ τοῦ κύκλου ἐπιπέδῳ ἡ EZ · λέγω ὅτι, ἐὰν ἐπὶ τῆς EZ τὸ ὕμμα τεθῇ, ἴσαι αἱ διάμετροι φαίνονται τοῦ κύκλου.

Τοῦτο δὲ δῆλον· ἀπασαι γὰρ αἱ ἀπὸ τοῦ Z πρὸς τὴν τοῦ κύκλου περιφέρειαν προσπίπτουσιν εὐθεῖαι ἴσαι εἰσὶν ἀλλήλαις καὶ ἴσας γωνίας περιέχουσιν.


91 Μὴ ἔστω δὲ ἡ EZ πρὸς ὀρθὰς τῷ τοῦ κύκλου ἐπιπέδῳ, ἴση δὲ ἔστω τῇ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου· λέγω ὅτι 20 τοῦ ὕμματος ὄντος πρὸς τῷ Z σημείῳ καὶ οὕτως αἱ διάμετροι ἴσαι ὁρῶνται.

"Ηχθωσαν γὰρ δύο διάμετροι αἱ $ΑΓ ΒΔ$, καὶ ἐπεζείχθωσαν αἱ $ZΑ ΖΒ ΖΓ ΖΔ$. ἐπεὶ αἱ τρεῖς αἱ $ΕΑ ΕΓ ΕΖ$ ἴσαι εἰσὶν, ὁρθὴ ἄρα ἡ ὑπὸ $ΑΖΓ$ γωνία, διὰ τὰ αὐτὰ 25 δὴ καὶ ἡ ὑπὸ $ΒΖΔ$ ὁρθὴ ἐστὶν· ἴσαι ἄρα φανήσονται αἱ $ΑΓ ΒΔ$ διάμετροι. ὁμοίως δὲ δεῖξομεν ὅτι καὶ πᾶσαι.

Ducatur ab η ipsi $\beta\gamma$ perpendicularis $\eta\alpha$; ergo in $\eta\alpha$ circuli centrum est (*elem.* 3, 1 coroll.). Sit primum $\alpha\eta > \eta\gamma$; ergo propter id quod supra (*in propos.* 45) demonstravimus est $\alpha\eta > \alpha\gamma$. Constituatur $\angle \mu\eta\gamma = \angle \delta\theta\zeta$; ergo $\eta\alpha$, id est $\theta\delta$, $> \eta\mu$. Ponatur $\eta\nu = \theta\delta$, et iungantur $\nu\beta$ $\nu\gamma$; ergo est $\angle \beta\nu\gamma = \angle \epsilon\delta\zeta$; itaque (*similiter ac propos.* 45) $\angle \beta\alpha\gamma > \angle \epsilon\delta\zeta$.


Similiter demonstrabimus, si sit $\alpha\eta < \eta\gamma$, esse $\angle \beta\alpha\gamma < \angle \epsilon\delta\zeta$, q. e. d.

XLVIII. Sit circulus $\alpha\beta\gamma$, cuius centrum ϵ , et ab ϵ circuli plano perpendicularis sit $\epsilon\zeta$; dico, si oculus in recta $\epsilon\zeta$ positus sit, circuli diametros aequales apparere. 50



Hoc vero manifestum; nam omnes rectae, quae a puncto ζ ad circuli circumferentiam pertinent, inter se aequales sunt angulosque aequales comprehendunt.

At recta $\zeta\epsilon$ circuli plano non perpendicularis sit, eademque circuli semidiametro aequalis; dico, oculo in puncto ζ posito, sic etiam diametros aequales apparere.



Ducantur enim duae diametri $\alpha\gamma$ $\beta\delta$, et iungantur $\zeta\alpha$ $\zeta\beta$ $\zeta\gamma$ $\zeta\delta$. Quoniam tres $\alpha\epsilon$ $\epsilon\gamma$ $\epsilon\zeta$ aequales sunt, rectus igitur est angulus $\alpha\zeta\gamma$ (*elem.* 3, 31). Eadem ratione etiam angulus $\beta\zeta\delta$ rectus est; diametri igitur $\alpha\gamma$ $\beta\delta$ aequales apparebunt. Similiter demonstrabimus etiam omnes reliquas.

4. 5. $\mu\epsilon\gamma\delta\alpha\eta$ — $\mu\epsilon\zeta\alpha\eta$ interpolatori tribuit Hu ($\mu\epsilon\gamma\delta\alpha\eta$ $\gamma\alpha\delta$ $\delta\alpha\eta$ etc. conl. Co). 4. $\alpha\delta\beta$ η $\epsilon\gamma\zeta\alpha\eta$ A, corr. BS. 6. $\tau\alpha\upsilon\tau\alpha\iota\alpha$ η JO AB, corr. S. 8. $\tau\eta$ $\delta\alpha\delta$ E IZ A¹ ex $\tau\eta$ $\tau\eta\alpha\delta$ B Z. 12. III A¹ in marg. (BS). 13. $\tau\eta$ S, om. AB. 18. $\alpha\lambda\lambda\eta\lambda\alpha\iota\varsigma$ A, corr. BS. 24. E I A² BS; pro nescio qua primae m. scriptura.

92 Ἀλλ' ὅταν οὖν ὅτι ἐὰν ἡ κύκλος καὶ ἀπὸ τοῦ κέντρου αὐ-
τοῦ πρὸς ὁρθὰς ἀχθῇ τῷ τοῦ κύκλου ἐπιπέδῳ, ὅπου ἂν
ἐπὶ τῆς ἀχθείσης τὸ ὅμμα τεθῇ, ἴσαι ὀφθῇσονται αἱ τοῦ
κύκλου διάμετροι, ἐὰν δὲ ἡ ἀπὸ τοῦ κέντρου ἀνισταμένη,
μὴ ἢ πρὸς ὁρθὰς τῷ τοῦ κύκλου ἐπιπέδῳ, ἴση δὲ τῇ ἐκ 5
τοῦ κέντρου ὑπάρῃ, καὶ οὕτως ἀπὸ τοῦ πέρατος αὐτῆς
ἴσαι αἱ διάμετροι τοῦ κύκλου ὀφθῇσονται· δηλον δὲ ὅτι
ἐντεῦθεν], ἐὰν ἢ ἐν σφαίρα μέγιστος κύκλος, ἐπὶ δὲ τῆς
ἐπιφανείας τῆς σφαίρας ὅπουδήποτε τὸ ὅμμα μετατεθῇ
κατὰ τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας, αἱ διάμετροι ἴσαι ὀφθῇ- 10
σονται.

93 μθ'. Ἐὰν ἡ κύκλος, ἀπὸ δὲ τοῦ κέντρου ἀνασταθῇ τις
εὐθεῖα μῆτε πρὸς ὁρθὰς οὐσα τῷ τοῦ κύκλου ἐπιπέδῳ μῆτε
ἴση τῇ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου, ἐπὶ δὲ τοῦ πέρατος τῆς
ἀνασταθείσης τὸ ὅμμα τεθῇ, ἄνισοι αἱ τοῦ κύκλου διά- 15
μετροι ὀφθῇσονται.

Ἐστω κύκλος ὁ $ABΓ$, οὗ κέντρον τὸ A , καὶ ἀπὸ τοῦ
 A ἀναστῶ τις εὐθεῖα ἡ AE μῆτε πρὸς ὁρθὰς οὐσα τῷ
τοῦ κύκλου ἐπιπέδῳ μῆτε ἴση τῇ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ κύ-
κλου, καὶ ἔστω τὸ ὅμμα πρὸς τῷ E , ἔστω δὲ πρότερον ἡ 20
 AE μείζων τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου τοῦ AB , καὶ
ἦχθω ἀπὸ τοῦ E σημείου ἐπὶ τὸ τοῦ κύκλου ἐπίπεδον κά-
θετος ἡ EZ , καὶ ἐπιτευχθεῖσα ἡ $ZHΔ$ διήχθω ἐπὶ τὸ $Γ$,
καὶ ἦχθω ἀπὸ τοῦ A τῇ $HΓ$ πρὸς ὁρθὰς ἡ AB . λέγω ὅτι
μεγίστη μὲν ὀφθῇσεται ἡ AB , ἐλαχίστη δὲ ἡ $HΓ$, αἰεὶ δὲ 25
ἡ ἔγγιον τῆς $HΓ$ τῆς ἀπώτερον ἐλάσσων ὀφθῇσεται, εἴη
δὲ μόνον ἴσαι ἔφ' ἑκάτερα τῆς $HΓ$ θεωρηθῇσονται.


Ἀλλ' ὅταν δὲ ὅτι ἡ EA κάθετός ἐστιν ἐπὶ τὴν AB · ἀπὸ

4. *ἐὰν ἢ* — 8. *ἐντεῦθεν* tribuit Hu interpolatori, qui et supervaca-
nea addidit et alia quaedam suae manus vestigia reliquit nam vs. 2.
post αὐτοῦ omisit εὐθεῖα, et vs. 4. ἀνισταμένη minus recte scripsisse
videtur pro ἀρεσταμένη, et vs. 8. *ἐντεῦθεν* alieno loco interposuit, ubi
ἐντεῦθεν ὅτι voluit Co. 13. $\overline{M\Theta}$ A¹ in marg. BS) ἀπὸ A²BS,
αὐτὸ A¹ 23. ἡ $ZHΔ$ Co idque confirmat figurae in codicibus de-

scriptae ratio, ἡ $HZΔ$ ABS quod si retinere velis, figuram ita deli-
neare oporteat, ut punctum ζ inter η δ cadat, quo facto variae lineae
rectae, quae ducendae sunt, vix inter se distinguantur; 26. *ἐγγιον*

Itaque manifestum est, si sit in sphaera maximus circulus, et in quolibet puncto superficiei sphaerae oculus ita positus sit, ut circuli circumferentiam intueatur¹⁾, diametros eius aequales apparere.

II. Si sit circulus, et a centro eius recta quaedam erigatur, quae neque circuli plano perpendicularis neque semidiametro circuli aequalis sit, et in termino eius rectae oculus positus sit, circuli diametri inaequales apparebunt. Prop. 51



Sit circulus $\alpha\beta\gamma$, cuius centrum δ , et a δ erigatur recta $\delta\epsilon$, quae neque circuli plano perpendicularis neque semidiametro circuli aequalis sit, atque oculus versetur in puncto ϵ , sit autem primum recta $\delta\epsilon$ maior semidiametro circuli $\alpha\beta\gamma$. et a puncto ϵ ad circuli planum ducatur perpendicularis $\epsilon\zeta$, et inneta $\zeta\gamma\delta$ producat ad γ , et per δ ipsi $\gamma\gamma$ perpendicularis ducatur $\alpha\beta$; dico

maximam apparere diametrum $\alpha\beta$. minimam $\gamma\gamma$, et, quaecunque diametrus ipsi $\gamma\gamma$ propior sit, eam minorem semper apparere remotiore, denique

binas tantum aequales diametros ad utrasque ipsius $\gamma\gamma$ partes conspici.

Primum igitur rectam $\epsilon\delta$ ipsi $\alpha\beta$ perpendicularem esse

1) Haec est vis Graecae praepositionis $\piαρα$; excipitur igitur is casus, ut oculus in ipsa circuli circumferentia positus sit.

* Conf. Eucl. opt. propos. 38.

Item manifestum est binas tantum aequales diametros ad utrasque ipsius $\eta\gamma$ partes conspici, quoniam hinc tantum aequales angulos ad utrasque ipsius $\epsilon\delta\zeta$ partes constitui *supra ostendimus propos. 44*).

Similiter demonstrabimus, si sit $\epsilon\delta$ minor quam $\delta\alpha$, maximam apparere diametrum $\eta\gamma$, minimam autem $\alpha\beta$ *, et, quaecunque diametrus ipsi $\alpha\beta$ propior sit, eam minorem semper apparere remotiore, denique binas tantum aequales diametros ad utrasque ipsius $\eta\gamma$ (vel $\alpha\beta$) partes conspici.

L. Quoniam igitur effecimus circulum ellipsis speciem oculo praebere et ipsius centrum adspectu ellipsis centrum esse, non mediocrem difficultatem habet hoc theorema; possumus enim demonstrare aliud in circulo punctum tamquam centrum eius quae intuenti conspicietur lineae apparere. Praemitemus autem hoc parvulum lemma.

Sit recta $\beta x : x\delta = \beta\vartheta : \vartheta\delta$, et $\angle \beta\zeta\vartheta = \angle \vartheta\zeta\delta$, et iun- Prop. 32
gatur $x\zeta$; dico angulum $\vartheta\zeta x$ rectum esse¹⁾.

Ducatur per ϑ ipsi ζx parallela $\gamma\vartheta\eta$, et producat $\zeta\delta$ ad η . Iam quia est

$$\beta x : x\delta = \beta\vartheta : \vartheta\delta, \text{ et vicissim}$$

$$\beta x : \beta\vartheta = x\delta : \vartheta\delta, \text{ atque etiam propter similitudinem triangulorum } \beta\zeta x \text{ } \beta\gamma\vartheta$$

$$\beta x : \beta\vartheta = \zeta x : \gamma\vartheta, \text{ est igitur}$$

$$\zeta x : \gamma\vartheta = x\delta : \vartheta\delta. \text{ Sed propter similitudinem triangulorum } \zeta\delta x \text{ } \eta\delta\vartheta \text{ est}$$

$$x\delta : \vartheta\delta = x\zeta : \vartheta\eta; \text{ ergo}$$

*) Conf. Eucl. optic. propos. 39.

1) Huic propositioni manifestum est respondere duas conversas, quas addit Commandinus:

I. Si sit $\beta x : x\delta = \beta\vartheta : \vartheta\delta$, et angulus $\vartheta\zeta x$ rectus, iunganturque $\beta\zeta$ $\zeta\delta$, esse angulum $\beta\zeta\vartheta$ angulo $\vartheta\zeta\delta$ aequalem, quod lemma infra propos. 33 et 34 adhibetur;

II. Si sit trianguli $\vartheta\zeta x$ angulus ζ rectus, et $\angle \beta\zeta\vartheta = \angle \vartheta\zeta\delta$, esse $\beta x : x\delta = \beta\vartheta : \vartheta\delta$. Atque haec propositio convenit cum illo lemmate quod a Pappo VII cap. 224 citatur. Conf. append. ad illum locum.

πρὸς ΘΗ (ἰσογώνια γὰρ τὰ ΖΑΚ ΔΗΘ τρίγωνα)· ἡ ΖΚ ἄρα πρὸς ἑκατέραν τῶν ΓΘ ΘΗ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον· ἴση ἄρα ἡ ΓΘ τῇ ΘΗ. καὶ ἔστιν ὡς ἡ ΓΘ πρὸς ΘΗ, οὕτως ἡ ΓΖ πρὸς ΖΗ· ἴση ἄρα καὶ ἡ ΓΖ εὐθεία τῇ ΖΗ. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΓΘ τῇ ΘΗ, κοινὴ δὲ ἡ ΖΘ, καὶ βά-
σις ἡ ΗΖ βάσει τῇ ΓΖ ἴση, γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ ΓΘΖ τῇ ὑπὸ ΖΘΗ ἐστὶν ἴση· ὁρθὴ ἄρα ἐστὶν ἑκατέρα αἰτῶν· ὁρθὴ ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ ΘΖΚ διὰ τὸ τὰς ΓΗ ΖΚ παραλλήλους εἶναι.

100 νά'. Τοῦτου προγραφέντος ἔστω ὁ μὲν κύκλος ὁ ΑΒΓΔ 10
περὶ κέντρον τὸ Ε, ὅψις δὲ μὴ ἐν τῇ ἐπιπέδῳ αὐτοῦ ἢ
πρὸς τῇ Ζ σημείῳ, καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ Ζ κάθετος ἀγομένη
ἐπὶ τὸ διὰ τοῦ κύκλου ἐπίπεδον ἡ ΖΗ μὴ πιπτεύω ἐπὶ
τὸ Ε κέντρον, καὶ ἐπιτευχθεῖσα μὲν ἡ ΗΒ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ
τὰ Β Κ, ἀπὸ δὲ τοῦ Ζ σημείου ἐπὶ τὰ Β Δ ἐπετευχθώ- 15
σαν αἱ ΖΔ ΖΒ, καὶ τεμησθῶ δίχα ἡ ἐπὸ ΒΖΔ τῇ ΖΘ,
καὶ ἦχθω τῇ ΒΔ πρὸς ὁρθὰς ἡ ΑΘΓ, καὶ ἐφαπτόμεναι
τοῦ κύκλου αἱ ΑΚ ΚΓ· λέγω ὅτι τῇ πρὸς τῷ Ζ ὄψει ὁ
ΑΒΓΔ κύκλος ἔλλειψις φανήσεται κέντρον μὲν ἔχουσα τὸ
Θ σημεῖον (οὐχ, ὥσπερ οἴονται τινες, τὸ Ε), ἄξονας δὲ 20
τοὺς ΓΑ ΒΔ συζυγεῖς, καὶ αἱ μὲν ἐπὶ τὴν ΒΔ καταγόμε-
ναι τεταγμένως τῇ ΑΓ ἔσονται τε καὶ φανοῦνται παράλ-
ληλοι, αἱ δ' ἐπὶ τὴν ΑΓ καταγόμεναι διαχθήσονται μὲν
ἀπὸ τοῦ Κ, φανοῦνται δὲ τῇ ΒΔ παράλληλοι, καὶ ταῦτα
φανεῖται περὶ τὴν ὀρωμένην ἔλλειψιν, ἃ καὶ τῇ τοῦ κέντρον 25
τομῇ συμβέβηκεν.

Ἐπετευχθῶσαν γὰρ αἱ ΑΖ ΖΓ· ἴσι, ἄρα ἡ ὑπὸ ΑΖΘ
γωνία τῇ ἐπὸ ΘΖΓ· ἐστὶν δὲ καὶ ἡ ἐπὸ ΘΖΒ τῇ ὑπὸ
ΘΖΔ ἴσι· φαίνεται ἄρα ἴσι, ἡ μὲν ΑΘ τῇ ΟΓ, ἡ δὲ ΒΘ

1. γὰρ τὰ $\overline{JK}$ A¹, Z add. A² (BS)

6. ἴση add. A¹ super vs.

BS, 10. $\overline{NA}$ A¹ in marg. BS, 11. ὁ $\overline{AB}$ ΓΔ A, coniung. BS, item

vs. 19 12. διὰ om. Co 13. τὰ ΒΚ — τὰ ΒΔ A, distinx.

BS 17. ἡ ΑΘΓ, ἡ ΑΘ A¹B³, ἡ αγ B³, corr. A² (qui Γ superscr.)

Co 24. ταῦτα Hu uelore Co pro ταῦτα

$\zeta x : \gamma \vartheta = \zeta x : \vartheta \eta$; itaque *elem. 5, 9*

$\gamma \vartheta = \vartheta \eta$. Et, quia anguli $\gamma \zeta \vartheta$ $\vartheta \zeta \eta$ aequales sunt, propter *elem. 6, 3* est

$\gamma \vartheta : \vartheta \eta = \gamma \zeta : \zeta \eta$; itaque

$\gamma \zeta = \zeta \eta$. Et quia $\gamma \vartheta = \vartheta \eta$, et $\gamma \zeta = \zeta \eta$, et communis $\zeta \vartheta$ *, est igitur

$L \gamma \vartheta \zeta = L \zeta \vartheta \eta$: itaque uterque rectus:

ergo propter parallelas $\vartheta \eta$ ζx etiam angulus $\vartheta \zeta x$ rectus est (*elem. 1, 29*).


LI. Hoc praemonstrato sit circulus $\alpha \beta \gamma \delta$ circa centrum *Prop.*
 ϵ , oculus autem in puncto ζ non sit in circuli plano, et $\zeta \eta$ 38
 perpendicularis a ζ ad circuli planum ducta non cadat in
 centrum ϵ , et iuncta $\eta \delta \epsilon$ producat ad βx , et a puncto ζ
 ad $\beta \delta$ iungantur $\zeta \beta$ $\zeta \delta$, et angulus $\beta \zeta \delta$ bifariam secetur
 recta $\zeta \vartheta$, et ducatur ipsi $\beta \delta$ perpendicularis recta $\alpha \vartheta \gamma$, ac
 circulum tangentes $x \alpha$ $x \gamma$; dico oculo in ζ posito circulum
 $\alpha \beta \gamma \delta$ visum iri ellipsim centrum habentem punctum ϑ non,
 ut nonnulli opinantur, punctum ϵ ¹⁾; axes autem coniugatos
 fore $\alpha \gamma$ $\beta \delta$; atque ordinatas, quae ad $\beta \delta$ deducuntur, ipsi
 $\alpha \gamma$ parallelas et futuras et apparituras esse, ordinatas autem,
 quae ad $\alpha \gamma$ applicantur, a puncto quidem x deductum iri,
 sed ipsi $\beta \delta$ parallelas apparituras esse; denique eadem in
 conspectu ellipsis visum iri quae in coni sectione contin-
 gunt¹⁾.

Iungantur enim $\alpha \zeta$ $\zeta \gamma$; aequales igitur sunt anguli $\alpha \zeta \vartheta$
 $\vartheta \zeta \gamma$. Sed etiam anguli $\beta \zeta \vartheta$ $\vartheta \zeta \delta$ aequales sunt *ex hypothesi*;

*. His verbis Pappus Euclidis *elem. primi* propositionem 8 citat
 conf. supra p. 563 adnot. **.

1) Multa et in hac propositione et in ea demonstratione quae sequi-
 tur uberius explicanda commentariisque illustranda esse videntur. Et
 pauca quidem attulit Commandinus, quaedam etiam nos breviter signi-
 ficavimus; alia autem, quae quasi in transcurso absolvi non possunt,
 futuro alicui interpreti relinquimus pertractanda. Figuram repetivimus
 ex codicum auctoritate, nisi quod omnem eius positionem correximus,
 quae apud Commandinum talis exstat qualem codices exhibent.

101 τῇ $\Theta\Lambda$. λέγω δὴ οὕτω καὶ, ἥτις ἂν διαχθῇ ὡς ἡ $\Lambda\Theta\text{Μ}$, φανείται διχοτομουμένη κατὰ τὸ Θ . ἐπεξερχόμεθα γὰρ αἱ τε $\Lambda\text{Κ}$ ΚΜ ΜΞ καὶ αἱ ΜΖ ΖΞ ΖΝ ΖΑ καὶ ἐνι ΖΚ . ἐπεὶ οὖν διὰ τὰς ἐφαπτομένας ἐστὶν ὡς ἡ ΒΚ πρὸς



ΚΑ , ἡ ΒΘ πρὸς $\Theta\Lambda$, καὶ ἐστὶν ἡ ἐπὶ ΒΖΘ ἴση τῇ $\text{ἐπὶ } \Theta\text{ΖΑ}$, ὁρθή ἐστὶν ἡ ἐπὶ $\Theta\text{ΖΚ}$ γωνία τοῦτο γὰρ προ-
 δέδεται). καὶ ἐπεὶ τὸ διὰ τῶν Β Ζ Κ ἐπιπέδον ὁρθὸν
 ἐστὶν πρὸς τὸ διὰ τῶν Α Ζ Γ ἐπιπέδον (καὶ γὰρ ἡ ΑΓ
 ὁρθή ἐστὶν τῷ διὰ τῶν Β Ζ Κ ἐπιπέδῳ, καὶ τῇ κοινῇ τομῇ
 τῇ ΟΖ ὁρθή ἦται ἐν ἐνὶ τῶν ἐπιπέδων ἡ ΖΚ), ἡ ἄρα ΖΚ
 τῷ διὰ τῶν Α Ζ Γ ἐπιπέδῳ ὁρθή ἐστὶν· ὁρθή ἄρα ἡ
 ἐπὶ ΝΖΚ γωνία. καὶ ἐστὶν ὡς ἡ ΑΚ πρὸς ΚΞ , ἡ ΑΝ
 πρὸς ΝΞ · ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ἐπὶ ΑΖΝ γωνία τῇ ἐπὶ ΝΖΞ .
 ἴση ἄρα φαίνεται ἡ ΑΝ τῇ ΝΞ . καὶ ἐστὶν ὡς ἡ ΑΖ
 πρὸς ΖΞ , ἡ ΑΝ πρὸς ΝΞ , ἀλλ' ἡ μὲν ΖΞ τῇ ΖΜ ἴση
 ἐστὶν (ἐπιζευχθεῖσα γὰρ ἡ ΜΞ γίνεται παράλληλος τῇ ΑΓ ,
 ὡς δὲ ἡ ΑΝ πρὸς ΝΞ , ἡ ΑΘ πρὸς $\Theta\text{Μ}$ · ἴση ἄρα ἡ ἐπὶ
 ΑΖΘ γωνία τῇ ἐπὶ $\Theta\text{ΖΜ}$ · ἴση ἄρα φαίνεται ἡ $\Theta\text{Α}$ τῇ
 $\Theta\text{Μ}$. ὁμοίως δὲ καὶ, ἥτις ἂν ἄλλῃ διὰ τοῦ Θ διαχθῇ,
 φανήσεται διχοτομουμένη κατὰ τὸ Θ · κέντρον ἄρα φαί-
 νεται τῆς ἑλλείψεως τὸ Θ , καὶ συζυγεῖς ἄξονες οἱ ΑΓ ΒΔ ,

ergo $\alpha\theta$ ipsi $\theta\gamma$, et $\beta\theta$ ipsi $\theta\delta$ aequales apparent (Eucl. *optic. positi*. 7) ... iam dico,

quaecunque recta, velut $\lambda\theta\mu$, per circulum ducatur, eam dimidiatam in puncto θ apparituram esse.

longantur enim rectae $\lambda\nu\xi\kappa$ et $\mu\pi\xi$, item $\mu\xi$ $\xi\zeta$ $\xi\theta$ $\theta\lambda$, denique $\xi\kappa$. Iam quia propter tangentes $\kappa\alpha$ $\kappa\gamma$ (infra VII *propos.* 154, est $\beta\kappa : \kappa\delta = \beta\theta : \theta\delta$, et anguli $\beta\xi\theta$ $\theta\xi\delta$ aequales sunt, angulus igitur $\theta\xi\kappa$ rectus est (hoc enim supra *propos.* 52 demonstravimus). Iam quia planum per β ξ κ transiens perpendicularare est ad planum quod per α ξ γ transit (propter *elem.* 11 *defn.* 4; etenim recta $\alpha\gamma$ perpendicularis est ad planum per β ξ κ transiens, et rectae $\theta\xi$, id est communi utriusque plani sectioni, perpendicularis in uno plano ducta est $\xi\kappa$, recta igitur $\xi\kappa$ ipsi $\alpha\xi\gamma$ plano perpendicularis est²); itaque angulus $\nu\xi\kappa$ rectus (*elem.* 11 *defn.* 3). Atque est $\lambda\kappa : \kappa\xi = \lambda\nu : \nu\xi$ ³; ergo anguli $\lambda\xi\nu$ $\nu\xi\xi$ aequales sunt (propter *propos.* 52 *conversam*); itaque rectae $\lambda\nu$ $\nu\xi$ aequales apparent. Atque est *elem.* 6, 3,

$\lambda\xi : \xi\xi = \lambda\nu : \nu\xi$, et, quia $\xi\mu$ ipsi $\gamma\alpha$ parallela est,

$\xi\xi = \xi\mu$; itaque

$\lambda\xi : \xi\mu = \lambda\nu : \nu\xi$. Sed est, propter parallelas,

$\lambda\nu : \nu\xi = \lambda\theta : \theta\mu$; ergo

$\lambda\xi : \xi\mu = \lambda\theta : \theta\mu$; itaque (*elem.* 6, 3)

$\angle \lambda\xi\theta = \angle \lambda\xi\mu$.


Ergo rectae $\lambda\theta$ $\theta\mu$ aequales apparent. Similiter etiam, quaecunque alia recta per θ ducetur, dimidiata in ipso θ apparebit. Itaque

centrum ellipsis videbitur θ , et axes coniugati $\alpha\gamma$ $\beta\delta$, et rectae ipsi $\alpha\gamma$ parallelae bifariam secabuntur recta $\beta\delta$, rectae autem a κ ductae apparebunt bifariam secatae recta $\alpha\gamma$,

2. * Vide append. ad hanc propositionem.

3. post *et* *AZ* additum in A ξ *def.* prima m. 7. τὸν BZK
ABS ac similiter vs. 8. 9. 11, distinx. Hu 12. ἡ AN Co Sea pro
ἡ IM 13. ἡ AN ἡ NJ A'S, ἡ ηλ B cod. Co, corr. Co 10. γὰρ-
εται, quare Hu 21. *et* *AB FJ* ABS, *et* *βδ γα* Sea, corr. Co

καὶ αἱ μὲν τῇ $ΑΓ$ παράλληλοι διχοτομῶσθαι ὑπὸ τῆς $ΒΙ$, αἱ δὲ ἀπὸ τοῦ $Κ$ διαγόμεναι δίχα τεμνόμεναι φα-
 102 νοῦνται ὑπὸ τῆς $ΑΓ$, ὥσπερ ἡ $ΑΞ$ ἀπεδείχθη. λέγω δὲ
 ὅτι φαίνονται τῇ $ΒΙ$ παράλληλοι αἱ ἀπὸ τοῦ $Κ$ διαγόμε-
 ναι. διήχθω γὰρ λόγον χάριν ἡ $ΑΚ$, καὶ κάθετος ἡ $ΑΟ$, 5



καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ P , καὶ ἐπεξεχθῶσαν αἱ $ΘΖ$ $ΖΠ$
 $ΖΡ$. ἐπεὶ οὖν ὅστιν ὡς ἡ $ΑΚ$ πρὸς $ΚΞ$, τοιούστιν ὡς ἡ
 $ΡΑ$ πρὸς τὴν $ΞΜ$, οὕτως ἡ $ΑΖ$ πρὸς τὴν $ΞΖ$, καὶ ἔστιν
 ἴση ἡ μὲν $ΑΖ$ τῇ $ΖΡ$, ἡ δὲ $ΞΖ$ τῇ $ΖΜ$, ἴσαι ἄρα ἡ ὑπὸ
 $ΑΖΡ$ τῇ ὑπὸ $ΞΖΜ$ · καὶ ἡ ὑπὸ $ΑΖΟ$ ἄρα ἴση ἔστιν τῇ
 ὑπὸ $ΞΖΠ$ · ἡ ἄρα $ΟΑ$ ἴση φαίνεται τῇ $ΗΞ$, ὥστε παράλ-
 13 ληλοι φανοῦνται αἱ $ΑΞ$ $ΒΙ$ [ἐπειδὴ αἱ μεταξὺ αὐτῶν κά-
 θετοι ἴσαι φαίνονται].

103 η'. Τούτου δεδειγμένον παραδοξότερόν τι πρόβλημα
 δυνατόν ἀποδείξαι προτείνοντας οὕτως.

Θέσει ὅντος κύκλου καὶ ἐν τῇ ἐπιπέδῳ αὐτοῦ σημεῖον 20
 δοθέντος ἐντὸς τῆς περιφερείας τόπον εἶρεῖν τῇ ὕψει, ἀφ'
 οὗ τὸν κύκλον ἑλλεινῇν διήται κέντρον ἔχουσαν τὸ δοθέν
 ἐντὸς τῆς περιφερείας σημεῖον.

Ἔστω γὰρ ὁ μὲν δοθείς κύκλος ὁ $ΑΒΓΔ$ περὶ κέν-
 25 τρον τὸ $Ε$, τὸ δὲ δοθέν ἐντὸς αὐτοῦ σημεῖον τὸ $Ζ$, καὶ

sicut in recta $\lambda\xi$ demonstratum est. Iam dico

rectas, quae a κ per circulum ducuntur, ipsi $\beta\delta$ parallelas apparere.

Ducatur enim exempli gratia $\lambda\kappa$, et ab λ ad $\beta\kappa$ perpendicularis $\lambda\sigma$, quae producat ad ϱ , et iungantur $\vartheta\zeta$ $\pi\zeta\varrho$. Iam quia est (supra p. 591)

$$\lambda\kappa : \kappa\xi = \lambda\nu : \nu\xi, \text{ et elem. 6, 5,}$$

$$\lambda\nu : \nu\xi = \lambda\zeta : \zeta\xi, \text{ et}$$

$$\lambda\kappa : \kappa\xi = \lambda\varrho : \xi\mu^{**}, \text{ et}$$

$$\lambda\zeta = \zeta\varrho, \text{ et } \zeta\xi = \zeta\mu, \text{ est igitur in triangulis aequicruribus } \lambda\varrho\zeta \text{ } \xi\mu\zeta$$

$$\lambda\varrho : \xi\mu = \zeta\varrho : \zeta\mu; \text{ ergo similia sunt triangula elem. 6, 5): itaque}$$

$$\angle \lambda\zeta\varrho = \angle \xi\zeta\mu. \text{ Ergo etiam dimidii aequales sunt, id est } \angle \lambda\zeta\sigma = \angle \xi\zeta\tau.$$

Ergo rectae $\sigma\lambda$ $\pi\xi$ aequales apparent; itaque rectae $\lambda\xi$ $\beta\delta$ tamquam parallelae conspiciuntur ex puncto ζ quoniam perpendiculares inter eas ductae aequales apparent.

LII. Hoc demonstrato admirabilius etiam problema ostendere possumus, quod sic proponimus.


Circulo positione dato et in eius plano puncto dato, intra circumferentiam locus oculo inveniatur, unde is circulum videat tamquam ellipsim, cuius centrum sit datum punctum intra circumferentiam. Prop. 54

Sit datus quidem circulus $\alpha\beta\gamma\delta$ circa centrum ε , punctum autem intus datum ζ , et locum invenire oporteat, unde

** Haec ad proportionem demonstrandam caveamus, ne puncta ϱ μ π in eadem recta esse facile supponamus. Nam, si iungatur qu , recta quidem est qux , sed id neque ex ipsa constructione efficitur neque a scriptore demonstratur. Ergo suppleamus proportionem $\lambda\kappa : \kappa\xi = \lambda\sigma : \sigma\zeta$ etc.

4. $\tau\eta\mu$ C.J. ABS. corr. Co Sea 16. 17. $\varepsilon\pi\alpha\theta\eta$ - $\eta\alpha\theta\eta\sigma\tau\alpha\alpha$
 interpolatori tribuit He 18. $\bar{A}B A^1$ in marg. BS 19. $\pi\varrho\sigma\tau\epsilon\theta\iota\omega$ -
 $\tau\alpha\varsigma$ S 24. δ $\bar{A}B$ $\bar{F}J$ A, coniunx. BS

δέον ἔστω τόπον εἶρεῖν, ἀπ' οὗ ὁ κύκλος ἑλλειψις ὁρθή-
σεται κέντρον ἔχουσα τὸ Z σημείον· ἐπιζευχθεῖσα ἐπὶ τὸ



κέντρον ἢ ZE ἐκβεβλήσθω ἐφ'
ἐκάτερα, καὶ ὁρθῇ αὐτῇ ἀπὸ
τοῦ Z ἤχθω ἡ $ΑΓ$, καὶ ἀπὸ
τῶν $A Γ$ ἐν τῷ ἐπιπέδῳ τοῦ
κύκλου ἐφαπτόμεναι ἤχθωσαν
αἱ $ΑΘ ΘΓ$, καὶ ἐπὶ τῆς $ZΘ$
ἡμικύκλιον γεγράφθω ὁρθὸν
πρὸς τὸ τοῦ $ΑΒΓΔ$ κύκλου
ἐπίπεδον τὸ $ZΗΘ$. λέγω δὲ
ὅτι, ὁποῖον ἂν ληφθῇ σημείον
ἐφ' ὅλῃς τῆς $ZΗΘ$ περιφε-
ρείας, πρὸς αὐτῷ τεθεῖσα ἢ
ὅψις ἑλλειψιν ὀψεται τὸν κύ-
κλον κέντρον ἔχουσαν τὸ Z .

Εἰλήφθω γάρ τὸ H ση-
μεῖον καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ HB
 $HZ HJ HΘ$. ἐπεὶ οὖν διὰ
τὰς ἐφαπτομένας ἔστιν ὡς ἡ 20

$BΘ$ πρὸς $ΘΔ$, ἢ BZ πρὸς $ZΔ$, καὶ ὁρθῇ ἔστιν ἡ ἐπὶ
 $ZΗΘ$ γωνία, ἴση ἔσται ἡ ἐπὶ BHZ γωνία τῇ ἐπὶ ZHJ .
ἴση ἄρα φαίνεται ἡ BZ τῇ $ZΔ$. φανερόν δὲ ὅτι καὶ ἡ
 AZ τῇ $ZΓ$ ἴση φαίνεται. καὶ τοῖς προγεγραμμένοις ὁμοίως
δεικθίσεται τῆς φαινομένης ἑλλείψεως κέντρον τὸ Z ση-
μεῖον καὶ συζυγεῖς ἄξονες οἱ $ΑΓ BJ$.

Εἰς τὰ φαινόμενα ἑκκλείδου.

- 104 γ/. Ἐπὶ τοῦ β' θεωρήματος τῶν ἑκκλείδου φαινομέ-
νων παρῆται καὶ διὰ τῆς ἀποδείξεως, ἐὰν ὁ πόλος τοῦ
ὁρίζοντος μεταξὺ τῶν τροπικῶν ἢ ἢ ἐπὶ τινος αὐτῶν, πο-
σάκις ὁ ἥριμαχὸς πρὸς ὁρθὰς ἔσται πρὸς τὸν ὁρίζοντα ἐν
μῇ περιφορᾷ. διὸ ἀποδείξομεν ἡμεῖς ὅτι, ἐὰν μὲν ὁ πό-

6. τῶν $ΑΓ$ A, distinx. BS 3. αὐτὸ $ΑΘ$ $ΘΓ$ AB, corr. S 21. πρὸς
 $ΘJ$, $Θ$ corr. A² pro alia nescio qua littera 22. ἡ ἐπὶ BHZ HZ

circulus ellipsis videatur, cuius centrum sit ζ . Iungatur $\zeta\epsilon$, quae in utranque partem producat, etque perpendicularis a ζ ducatur $\alpha\gamma$, et ab $\alpha\gamma$ in circuli plano tangentes ducantur $\alpha\vartheta\gamma\vartheta$, et in recta $\zeta\vartheta$ describatur semicirculus $\zeta\iota\vartheta$ ad circuli $\alpha\beta\gamma\delta$ planum perpendicularis; iam dico, si quodvis punctum in tota $\zeta\iota\vartheta$ circumferentia ¹⁾ sumatur in eoque oculus constituatur, circulum visum iri ellipsim, cuius centrum est ζ .

Sumatur enim punctum ι , et iungantur $\eta\beta\iota\zeta\iota\delta\iota\vartheta$. Iam quia propter tangentes $\alpha\vartheta\gamma\vartheta$ est $\beta\vartheta : \vartheta\delta = \beta\zeta : \zeta\delta$ (VII propos. 154), et angulus $\zeta\iota\vartheta$ rectus est, aequales igitur erunt anguli $\beta\zeta\iota\zeta\iota\delta$ (propter propos. 52 conversam); ergo rectae $\beta\zeta\zeta\delta$ aequales apparent. Atque item, iunctis $\alpha\iota\iota\gamma$, manifestum est rectas $\alpha\zeta\zeta\gamma$ aequales apparere. Et similiter atque in superioribus demonstrabitur eius quae apparet ellipsis centrum esse ζ axesque coniugatos $\alpha\gamma\beta\delta$.

IN EUCLIDIS PHAENOMENA.

LIII. In secundo theoremate Euclidis phaenomenon interpretes demonstrare omiserunt, si horizontis polus vel inter tropicos vel in alterutro ipsorum sit, quotiens zodiacus in una mundi conversione rectus sit ad horizontem²⁾. Quapropter nos iam demonstrabimus,

1) Nimirum ipsis punctis $\zeta\vartheta$ exceptis, quae sunt in circuli $\alpha\beta\gamma\delta$ plano.

2) Comparantibus Euclidis phaenomena, quae nostra aetate exstant ex libris manuscriptis edita, non satis liquet, quid maxime omissum esse Pappus conqueratur. Sin vero quis in codicum scriptura, quae supra p. 474, 11 occurrit, illud $\delta\iota\varsigma$ retineri velit, quasi Pappus scripserit "quotiens his rectus sit etc.", ne sic quidem ea quam statim notavimus difficultas levare videtur. Conf. etiam p. 604 adnot. 4.

corr. A² [A¹ iterum incerta] 23. $\iota\eta\varsigma \overline{ZZ}$ ABS, corr. *See* $\delta\eta$ A¹
ex $\delta\epsilon$ 23. 24. $\alpha\alpha\iota \eta \overline{ZZ}$ ABS, corr. *Co See* 26. $\alpha\iota \overline{AB} \overline{F\Gamma}$ ABS,
corr. *Co See* 27. titulum add. S 28. $\overline{VF}$ A¹ in marg. BS
 $\overline{B} A$, $\delta\epsilon\upsilon\tau\epsilon\rho\epsilon\upsilon$ BS 31. $\zeta\omega\delta\iota\alpha\chi\acute{o}\varsigma$ A, $\zeta\omega\delta\iota\alpha\chi\acute{o}\varsigma$ BS. item posthac p.
596. 598

λος τοῦ ὀρίζοντος ἐπὶ τινος τῶν τροπικῶν ἢ, ἅπαξ ὁ ζῳδιακὸς ἐστὶν ὀρθὸς πρὸς τὸν ὀρίζοντα ἐν μιᾷ περιφορᾷ, ἔαν δὲ μεταξὺ τῶν τροπικῶν, δίς.


- 105 Ἔστω γὰρ ὀρίζων μὲν ὁ $ΑΒΘ$, θερινὸς δὲ τροπικὸς ὁ $ΓΗ$, χειμερινὸς δὲ ὁ $ΒΘ$, μεσημβρινὸς δὲ ὁ $ΑΔΕ$, ζῳδια-
κὸς δὲ ὁ $ΒΖΗ$, ὁ δὲ τοῦ $ΑΒΘ$ ὀρίζοντος πόλος ἐστω ἐπὶ
τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ τὸ $Ι$. λέγω ὅτι ἐν μιᾷ περιφορᾷ ὁ
 $ΒΖΗ$ ἅπαξ ἔσται ὀρθὸς πρὸς τὸν $ΑΒΘ$ ὀρίζοντα.

Ἐπεὶ γὰρ ἐν μιᾷ περιφορᾷ τὸ $Η$ τὴν $ΗΓ$ περιφέρειαν
διέρχεται καὶ τὴν συνεχῇ αὐτῆς τὴν ἐπὶ γῆν καὶ ἐπὶ τὸ 10
 $Η$ παραγίνεται, ἐν δὲ τῇ εἰρημένῃ διεξόδῳ τὸ $Η$ ἅπαξ ἐπὶ
τὸν $Ι$ πόλον παραγίνεται καὶ ὁ ζῳδιακὸς θέσιν λαμβάνει
τὴν ἐπὶ τοῦ $ΚΑΑ$, καὶ ἔσται ἅπαξ ὀρθὸς πρὸς τὸν ὀρί-
ζοντα· διὰ γὰρ τῶν πόλων ἐστὶν αὐτοῦ.

- 106 Ὀμοίως δὲ καί, ἔαν ὁ πόλος τοῦ ὀρίζοντος ἐπὶ τοῦ 15
χειμερινοῦ κύκλου ἢ, ὥς ὁ $Ε$, ἅπαξ ἔσται ὁ ζῳδιακὸς ὀρ-
θὸς πρὸς τὸν ὀρίζοντα. [φανερὸν γὰρ ὅτι οἱ δύο πόλοι
τοῦ ὀρίζοντος οὐκ εἰσὶν ἐν τῇ τροπικῇ, ἦτοι τῇ θερινῇ
ἢ τῇ χειμερινῇ· οὐ γὰρ τὴν διάμετρον τῆς σφαίρας δέχε-
ται ἑλάσσων τις κύκλος τοῦ μεγίστου· ὥστε ἑκάτερος τῶν 20
τροπικῶν μὴ ὦν διὰ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας τοὺς β' πό-
λους τοῦ ὀρίζοντος οὐ δέχεται· ὥστε τὸ $Η$ ὑπόγειον γινώ-
μενον οὐκ ἔξει διὰ τοῦ ἐτέρου πόλου τοῦ ὀρίζοντος, ἀλλ'
ἑκάτερος τῶν τροπικῶν ἓνα δέχεται πόλον. ἐπεὶ γὰρ τὸ
 $Η$ τῇ $Β$ ἐστὶν κατὰ διάμετρον καὶ θέσιν ἔχει τὸ $Η$ κατὰ 25
τὸ $Ι$ τὸν πόλον, καὶ τὸ $Β$ ἄρα ἐπὶ γῆν πόλον ἔξει ἐν τῇ
χειμερινῇ κατὰ τὴν διάμετρον τοῦ $Ι$ τὸν ἕτερον πόλον τοῦ
ὀρίζοντος· ὅτι κατὰ διάμετρον ἐστὶν τὸ $Η$ τοῦ $Β$ · ὥστε
οὐδὲ ἐν τῇ ἐτέρῃ τῶν τροπικῶν εἰσὶν οἱ δύο πόλοι τοῦ
ὀρίζοντος, ἀλλ' ἑκάτερος ἐν ἑκατέρῃ τῶν τροπικῶν.] 30

3. ὁ $ΒΘ$ Co pro ὁ $ΒΕ$ 9. $γοραῖ$ et superscr. $περι Α'$ 13. τοῦ
 $ΚΑΑ$ Co pro τοῦ $ΚΑΘ$ 14. διὰ — αὐτοῦ, conf. adnot. ad Lat.
17. $φανερὸν$ — 30. $τροπικῶν$ haec ad Pappi opus interpres quidam
recentior addidisse videtur 22. $γερόμετροι$ conij. Hu 25. 26. $κατὰ$
 $τὸν Ι$ πόλον et 27. $κατὰ διάμετρον$ alius quivis scriptor prudentior
quam hic interpolator scripsisset

si polus horizontis in alterutro tropicorum sit, zodiacum semel in una conversione rectum esse ad horizontem, sin autem inter tropicos, his.




Sit enim horizon $\alpha\beta\theta$, et ^{Prop. 55} aestivus tropicus $\gamma\eta$, hiemalis $\beta\theta$, et meridianus $\alpha\delta\epsilon$, zodiacus $\beta\zeta\eta$, polus autem horizontis sit in aestivo tropico punctum δ ; dico in una conversione circulum $\beta\zeta\eta$ semel rectum esse ad horizontem $\alpha\beta\theta$.

Quoniam enim punctum η in una mundi conversione et circumferentiam $\eta\eta$ et eam sub terra quae ipsi continua est percurrit et *rursus* ad η pervenit, in hoc autem cursu punctum η semel ad polum δ pervenit zodiacusque positionem $\kappa\delta\lambda$ sumit, hic igitur semel ad horizontem rectus erit; nam *semel tantum* per polos eius transit ¹⁾.

Similiter etiam, si polus horizontis, velut ϵ , in hiemali tropico sit, zodiacus semel rectus erit ad horizontem. [Nam manifestum est duos horizontis polos non esse in uno tropico, aut aestivo aut hiemali. Neque enim sphaerae diametrum circulus ullus minor maximo in se recipit; quapropter uterque tropicorum, quippe qui non transeat per centrum sphaerae, duos horizontis polos non recipit; itaque punctum η , cum sub terram venerit, non per alterum horizontis polum ibit, sed uterque tropicorum unum tantummodo polum recipit. Nam quia punctum η ipsi β per diametrum oppositum est positionemque ad polum δ sumit, ergo etiam punctum β , cum sub terram venerit, in hiemali tropico locum habebit ad polum qui ipsi δ per diametrum oppositus est, scilicet η ipsi β ad diametrum est *oppositum*]; itaque in neutro tropicorum duo horizontis poli sunt, sed unus in utroque.]

¹⁾ Sive ab ipso Pappo sive ab interprete aliquo Graeca διὰ γὰρ τῶν πόλων ἵσταν αὐτοῦ scripta sunt, his citatur Theodosii sphaeric. I propositio 45.

- 107 γδ'. Ἐστω δὴ ὁ πόλος μεταξὺ τῶν τροπικῶν, ὡς ὁ Θ· λέγω ὅτι ὁ ζῳδιακὸς δις γίνεται ὁρθὸς πρὸς τὸν ὀριζήντα ἐν μιᾷ περιφορᾷ.



- Προσαναγεγράφθω γὰρ ὁ ζῳδιακὸς κύκλος, καὶ ἔστω ὁ ΒΜΗ, ἔστω δὲ καθ' οὗ φέρεται παραλλήλῳ κύκλῳ τὸ Θ σημεῖον ὁ ΜΛΟ. τοῦ δὲ Ἀ ἐπὶ τὸν Θ πόλον παραγενομένου ὁ ΗΜΒ ζῳδιακὸς θέσιν λαβὼν τὴν ἐπὶ τοῦ ΝΘΞ ὁρθὸς γίνεται τὸ πρῶτον πρὸς τὸν ὀριζήντα. πάλιν τοῦ Μ τὴν ΜΟΘ περιφέρειαν διελθόντος κατὰ τὴν συστροφὴν καὶ ἐπὶ τὸν Θ πόλον παραγενομένου ὁ ζῳδιακὸς¹⁰ θέσιν λαβὼν τὴν ἐπὶ τοῦ ΚΘΠ ὁρθὸς τὸ δεύτερον ἔσται πρὸς τὸν ὀριζήντα. [μόνα γὰρ τὰ Μ Α σημεῖα τῶν ἐπὶ τοῦ ζῳδιακοῦ κύκλου καὶ τοῦ παραλλήλου (τὰ Μ Α κατὰ τοῦ ΜΟΑ κύκλου φέρεται), καὶ δις μόνον ποιήσει τὸν ζῳδιακὸν κύκλον ὁρθὸν πρὸς τὸν ὀριζήντα διὰ τοῦ Θ ἐλθόντα¹⁵ πόλου ἐν μιᾷ περιφορᾷ κόσμου· ἐκάτερον γὰρ τῶν Μ Α ἐν μιᾷ στροφῇ ὅλον τὸν κύκλον τὸν ΜΟΑ διέρχεται· ὥστε καὶ πάντα τὰ ἐπὶ τῆς περιφερείας σημεῖα τοῦ κύκλου διέρχεται ἐν μιᾷ στροφῇ τὰ Μ Α· ὥστε καὶ τὸ Θ σημεῖον διέρχεται ἐν μιᾷ στροφῇ ἐκάτερον τῶν Μ Α.]²⁰
- 108 νε'. Ἐπὶ δὲ τοῦ ιβ' θεωρήματος ἴψιν ὁ Εὐκλείδης τοῦ μετὰ τὸν καρλίνον ἡμικυκλίου αἱ ἴσαι περιφέρεται ἐν

LIV. Iam sit *horizontis* polus, velut ϑ , inter tropicos; *Prop.*
 dico zodiacum in una *mundi* conversione bis rectum fieri ad ⁵⁶
 horizontem.

Describatur enim circulus zodiacus $\beta\mu\eta$ ^{*}, sitque $\mu\lambda\theta$
 parallelus circulus in quo punctum ϑ fertur. Iam cum punctum λ ad ϑ polum pervenit, zodiacus $\beta\mu\eta$, sumptâ positione $\pi\vartheta\xi$, primum sit rectus ad horizontem *Theod. sphaer. 1, 15*.
 Rursus cum punctum μ in *mundi* conversione circumferentiam $\mu\theta$ percurrerit et ad polum ϑ pervenerit, zodiacus, sumptâ positione $\pi\vartheta\pi$, iterum rectus erit ad horizontem. [Nam in ea zodiaci positione quam primum descripsimus puncta zodiaci μ λ sola sunt communia cum circulo parallelo, eaque his tantummodo in una mundi conversione per polum ϑ trans-euntia zodiacum rectum ad horizontem efficient: nam utrumque punctorum μ λ in una conversione totum circulum $\mu\theta\lambda$ percurrit; itaque omnia puncta quae sunt in circuli circumferentia in una conversione per μ λ transeunt; quapropter etiam punctum ϑ in una conversione per utrumque punctorum μ λ transit.]

LV. In theoremate XII Euclides "semicirculi" inquit "qui post cancerum est aequales circumferentiae occidunt inaequa-

¹⁾ Figuram talem fere exhibemus qualem ex corruptis codicum lineis restituere conatus est Commandinus. At vero alia ratio emendatio-
 restat ut quaeratur, cuius difficultas non tam in lineis recte du-
 cendis, quam in litteris geometricis convenienter ad contextum scrip-
 toris distribuendis posita est. Conf. adnot. 4 ad propos. 58.

1. NA A^1 in marg. (BS) 6. δ MAO δ $MA\theta$ ABS cod. Co.
 δ MOA Co $\delta\eta$ Hu auctore Co pro $\delta\epsilon$ 9. $\delta\epsilon\lambda\acute{o}\nu\tau\omicron\varsigma$ A^1 , corr. A^2
 9. 10. $\tau\eta\eta\sigma\tau\omicron\gamma\eta\eta$ conl. Hu 11. $\epsilon\pi\iota$ τοῦ $K\theta\eta F$ voluit Co $\delta\epsilon\iota\tau\epsilon\gamma\omicron\nu$ S, B^1 A, β B 12. $\mu\acute{o}\nu\alpha$ — 20. $\tau\omega\eta$ MA haec eidem inter-
 preti, qui paulo supra nonnulla addidit, tribuenda esse videntur
 12. $\tau\acute{\alpha}$ MA f , $\tau\acute{\alpha}$ AO A, distinx. BS, $\tau\acute{\alpha}$ AM Co 13. 14. $\tau\acute{\alpha}$ MA
 — $\eta\acute{\epsilon}\rho\epsilon\tau\alpha\iota$ del. Hu 15. $\tau\acute{\alpha}$ MA et 16. $\tau\omega\eta$ MA A, distinx. BS
 16. $\pi\acute{o}\lambda\omicron\nu$ Hu auctore Co pro $\pi\acute{o}\lambda\omicron\nu$ 19. $\tau\acute{\alpha}$ MA et 20. $\tau\omega\eta$ MA
 A, distinx. B $\tau\acute{\alpha}$ λ μ et $\tau\omega\eta$ λ μ S; 21. NE A^1 in marg. (BS) 1B
 A, $\eta\theta\epsilon\omicron\nu$ B, $\delta\omega\delta\epsilon\kappa\acute{\alpha}\tau\omicron\nu$ S

ἀνίστοις χρόνοις δύνουσι, καὶ ἐν μεγίστοις αἱ πρὸς ταῖς συναφαῖς τῶν τροπικῶν, ἐν ἐλαχίστοις δὲ αἱ πρὸς τῇ ἰσημερινῷ, ἐν ἴσοις δὲ χρόνοις αἱ ἴσον ἀπέχουσαι τοῦ ἰσημερινοῦ". ζητεῖται δὲ διὰ τί περὶ μὲν τῆς καταδύσεως τούτων τῶν περιφερειῶν λέγει, περὶ δὲ τῆς ἀνατολῆς οὐκ εἴτι. ἡ ἀπαναβέβηκε γὰρ ἢ ζήτησις [καὶ ἀντεράπη] εἰς τοὺς ἀνατολικοὺς διορισμοὺς, ἔστιν δὲ ὅλη, ἢ πραγματεία τοιαύτη· εὐρεῖν οἴκησιν ἐν ἣ λόγον χάριν ὁ καρκίνος τῷ λέοντι ἐν 109 ἴσοις χρόνοις ἀνατέλλει [πρὸς τὸ ἄνω]. "Ἰππαρχος δὲ ἐν τῇ περὶ τῆς τῶν ἰσθμίων ἀναφορᾶς συναποδείκνυσιν 10 δι' ἀριθμῶν ὅτι οὐχ ὥσπερ δύνουσι αἱ ἴσαι περιφέρειαι τοῦ μετὰ τὸν καρκίνον ἡμικυκλίον ἔχουσαι τινα πρὸς ἀλλήλας χρόνον σύγκρισιν, οἷτως καὶ αὐταὶ ἀνατέλλουσιν. εἶναι γὰρ τινες οἰκῆσεις, ἐν αἷς τῶν ἴσων περιφερειῶν τοῦ μετὰ τὸν καρκίνον ἡμικυκλίον αἰεὶ αἱ ἔγγιον τοῦ ἰσημερι- 15 νοῦ ἐν πλείονι χρόνῳ ἀνατέλλουσιν τῶν πρὸς ταῖς συναφαῖς τῶν τροπικῶν. διὰ τοῦτο οὖν καὶ αὐτὸς ἐπὶ τῶν ἴσων ἀπεχουσῶν ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ εἴρηκεν ἐν ἴσοις χρόνοις καὶ τὰς ἀνατολὰς γίνεσθαι. τοῦτο δὲ συμφανὲς ἐκ τῶν ἐν τοῖς φαινομένοις δεικνυμένων. ὁμοίως δὲ καὶ "τοῦ μετὰ 20 τὸν αἰγάκερῳ" φησιν "ἡμικυκλίον αἱ ἴσαι περιφέρειαι ἐν ἀνίστοις χρόνοις ἀνατέλλουσιν, καὶ ἐν πλείστοις μὲν αἱ πρὸς ταῖς συναφαῖς, ἐν ἐλάττοσι δὲ αἱ ἐξῆς τοιούτων, ἐν ἐλαχίστοις δὲ αἱ πρὸς τῇ ἰσημερινῷ, ἐν ἴσοις δὲ αἱ ἴσον ἀ- 110 ἔχουσαι τοῦ ἰσημερινοῦ". περὶ δὲ δέσεως αὐτῶν οὐδὲν λέγει· ἡ γὰρ λόγος τῆς ἀποδείξεως ἐμπίπτει εἰς τοὺς ἀνατολικοὺς διορισμοὺς, καὶ ἔστιν ἥδη, πραγματεία περὶ τού-

1. μεγίστοις, πλείστοις μὲν Euclides a Gregorio editus 2. post τροπικῶν add. ἐν ἐλάττοσι δὲ αἱ ἐξῆς τούτων Eucl. 3. χρόνοις om. Eucl. 4. post ἰσημερινοῦ add. κύκλον καὶ δύνουσι καὶ ἀνατέλλουσιν Eucl. 6. καὶ ἀντεράπη cf 9. πρὸς τὸ ἄνω interpolatori tribuit Hu 10. ζωιδίων A, ζωδίων BS 12. αὐταὶ BS, αὐτὰ A, αἱ αὐτὰ conl. Hu 13. αἱ ἢ ἐγγιον (sine spir. et acc.) A, αἱ ἢ ἐγγιον BS, αἱ corr. Hu 17. ἴσων B, ἴσων A²S 23. post συναφαῖς add. τῶν τροπικῶν Eucl. phenom. 13 ἐλάττοσι S 25. post ἰσημερινοῦ add. κύκλον καὶ ἀνατέλλουσιν καὶ δύνουσι Eucl.

libus temporibus, ac maximis quidem temporibus eae quae prope contactus sunt tropicorum, minimis autem eae quae prope aequinoctialem sunt, aequalibus denique eae quae ab aequinoctiali aequaliter distant". Ambigitur autem, cur de occasu quidem earum circumferentiarum dicat, sed de ortu non item¹. Etenim illa quaestio *aliorum cura etiam* ad orientales determinaciones provecta hunc in modum tractatur:


inveniatur exempli gratia habitatio, in qua cancer aequali tempore ac leo oriatur.

Hipparchus quidem in libro de XII signorum ascensione per numeros ostendit semicirculi qui post cancerum est aequales circumferentias, quae inter se temporis comparisonem quandam habent, non perinde oriri atque occidere. Nam habitationes quasdam esse, in quibus semicirculi qui post cancerum est eae aequales circumferentiae, quae aequinoctiali propiores sunt, maiore tempore orientur quam illae quae sunt ad contactus tropicorum. Quapropter ipse quoque de iis circum-

1) Comparantibus phaenomena, quae sub Euclidis titulo a Gregorio edita sunt, cum iis quae Pappus et hoc loco et paulo post (cap. 409 sq.) scribit gravior sine dubio incidit haesitatio. Nam secundum Gregorii editionem in clausula duodecimi theorematidis pariter de ortu ac de occasu circumferentiarum aequaliter ab aequinoctiali distantium, et similiter in clausula teritiidecimi theorematidis de utroque agitur; at Pappus ab Euclide in duodecimo de ortu, in teritiidecimo de occasu commemoratum esse negat. Ergo ambigitur, utrum Pappus eadem, quae nos apud Gregorium, in suo olim codice legerit nec tamen plene citaverit, an vero aliam Euclidis phaenomenon formam in manibus habuerit. Ac mihi quidem clausulae illae, quas e Gregorii editione in adnotatione ad Graeca p. 600, 4 et 25 adscripsi, ab eo Euclidis codice quo Pappus usus est afuisse videntur. At contra si statueris Pappum ea ipsa quidem legisse, sed in citando omisisse, tamen iudicium de toto hoc Pappi loco non inmutatur. Nam quod apud Gregorium legimus semicirculi eius qui post cancerum, itemque illius qui post capricornum est aequales circumferentias aequaliter ab aequinoctiali distantes aequalibus temporibus et occidere et oriri, id nihil facit ad eam quaestionem quam hoc loco Pappus proponit. Num semicirculi qui est post cancerum aequalis circumferentia quae proxima contactui tropici est, ut maximo tempore occidit, ita etiam maximo oriatur, itemque semicirculi post capricornum etc., ut maximo tempore oritur, ita etiam occidat. Incredibiliter etiam omnis huius quaestionis difficultas augetur illo loco qui paulo post cap. 418 legitur. Quem equidem multis de causis spurium esse iudico aliasque genuina illic periisse opinor; at forsitan alii existant qui illa quoque ab ipso Pappo scripta, sed a librariis passim corrupta esse existiment. Ne multa, absolvi quaestio non potest nisi peculiari eaque longiore disputatione instituta.

τον γεγραμμένη Μενελάω τῷ Ἀλεξανδρεῖ, περὶ ἧς ὕστερον ἐπισκεψόμεθα. εἰς μὲντοι διὰ τῶν πόλων τῶν παραλλήλων ἢ ὁ ὀρίζων, οὕτως δειχθήσεται.

- 111 Ἐστω ὀρίζων διὰ τῶν πόλων τῶν παραλλήλων ὁ $ΑΒΓΑΖΘ$, καὶ τοῦ ζῳδιακοῦ τὸ μετὰ τὸν καρπὸν ἡμικύκλιον τὸ $ΒΞΗ$, καὶ μέγιστος τῶν παραλλήλων ὁ $ΘΞΕ$, καὶ διηγήσθω τὸ $ΒΝΞ$ τεταρτημόριον εἰς ἴσα κατὰ τὰ $ΜΝ$, καὶ διὰ τοῦ $Α$ καὶ ἑκατέρου τῶν $ΜΝ$ μέγιστοι κύκλοι γεγράφθωσαν· ἴξουσιν δὲ καὶ διὰ τοῦ ἑτέρου πόλου.



- ἔστωσαν οἱ $ΑΜΖ$ $ΑΝΖ$, καὶ διὰ τῶν $ΜΝ$ παράλληλοι ¹⁰ κύκλοι γεγράφθωσαν οἱ $ΑΝΚ$ $ΓΜΑ$. καὶ ἐπεὶ ἕκαστον τῶν $ΑΜΖ$ $ΑΝΖ$ ἡμικυκλίων ἐφαρμόζει τῷ $ΑΙΖ$ δευτικῷ ἡμικυκλίῳ ἅμα γὰρ δύνει ἡ $ΜΒ$ καὶ ἡ $ΓΜ$ περιφέρεια, ἐν ᾗ δὲ χρόνῳ ἡ $ΜΓ$ δύνει, ἐν τούτῳ τὸ $Μ$ σημεῖον ἔσται διεληλυθὸς τὴν $ΜΓ$ περιφέρειαν, ἐν ᾗ ἄρα χρόνῳ τὸ $Μ$ ¹⁵ διέρχεται τὴν $ΜΓ$ περιφέρειαν, ἐν τούτῳ δύνει ἡ $ΜΒ$ περιφέρεια. πάλιν δὲ τοῦ $ΑΜΖ$ λαβόντος τὴν τοῦ ὀρίζοντος θέσιν τὰ $ΜΠ$ ἅμα ἐστὶν ἐπὶ τοῦ ὀρίζοντος, καὶ τοῦ $Ν$ σημείου γενομένου ἐπὶ τοῦ ὀρίζοντος δεδύκασιν αἱ $ΠΝ$

ferentis quae aequaliter ab aequinoctiali distant docuit aequalibus temporibus earum etiam ortus fieri, idque manifestum est ex iis quae in phaenomenis demonstrantur. Similiter etiam "semicirculi" inquit *Euclides theoremate XIII* "qui post capricornum est aequales circumferentiae oriuntur inaequalibus temporibus, ac maximis quidem temporibus eae quae prope contactus sunt tropicorum. minoribus autem eae quae deinceps sequuntur, minimis eae quae prope aequinoctialem sunt, aequalibus denique eae quae ab aequinoctiali aequaliter distant". At de occasu earum nihil disserit. Nam demonstrationis ratio in orientales determinationes cecidit, quo de argumento iam a Menelao Alexandrino commentarius scriptus est, de quo posthaec videbimus². Si tamen horizon per polos parallelorum transeat, hac demonstratione utemur.

Sit per polos parallelorum horizon $\alpha\beta\gamma\delta\zeta\theta$, et zodiaci semicirculus, qui est post canerum, $\beta\xi\eta$, et maximus parallelorum $\vartheta\xi\epsilon$, et quadrans $\beta\nu\xi$ in aequales partes dividatur in punctis μ ν , et per α et utrumque punctorum μ ν describantur maximi circuli $\alpha\mu\zeta$ $\alpha\nu\zeta$; hi igitur etiam per alterum polum transiunt. Iam per μ ν paralleli describantur circuli $\gamma\mu\lambda$ $\delta\nu\lambda$. Et quia uterque semicirculorum $\alpha\mu\zeta$ $\alpha\nu\zeta$ cum semicirculo occidentali $\alpha\delta\zeta$ congruit (nam circumferentiae $\beta\mu$ $\gamma\mu$ simul occidunt, et quo tempore ipsa $\gamma\mu$ occidit, eodem punctum μ circumferentiam $\gamma\mu$ percurrit, ac similiter idem de circumf. $\alpha\nu\zeta$ demonstratur), quo igitur tempore punctum μ circumferentiam $\mu\gamma$ percurrit, eodem circumferentia $\mu\beta$ occidit. Rursus, cum semicirculus $\alpha\mu\zeta$ positionem horizontis sumpsit, puncta μ π simul sunt in horizonte, et cum punctum ν ad horizontem pervenit, circum-

2) Nihil quod ad hoc argumentum pertineat sequitur in iis Pappi collectionis reliquiis quae ad nostram aetatem pervenerunt.


1. ἀλλ' ἐξ ἀνδρῶν et εἰ super vs. A¹ 3. ὁ om. BS οὕτω A BS
 5. ζωδιακοῦ A, ζωδιακοῦ BS 6. ὁ OET ABS, corr. Co 7. τὰ
 τὰρ τῇ μόνον A, coniunx. BS 7. 8. τὰ MN A, distinx. BS 8. τῶν
 MN AB, τῶν ἢ μ S 10. τῶν MN A, distinx. BS 11. ἐκείνων
 coni. Hu 12. τὰ MIF A, distinx. BS

ΝΜ περιφέρειαι· ὅμα ἄρα δύνει ἡ ΝΠ περιφέρεια καὶ ἡ ΝΜ, ἐν ᾗ δὲ ἡ ΠΝ δύνει, τὸ Ν ἔσται τὴν ΝΠ διεληλυθός· ἐν ᾗ ἄρα χρόνῳ τὸ Ν τὴν ΝΠ περιφέρειαν διέρχεται, ἐν τούτῳ ἡ ΝΜ περιφέρεια δύνει. ὁμοίως δὲ καὶ ἐν ᾗ τὸ Ξ τὴν ΞΣ περιφέρειαν διέρχεται, ἐν τούτῳ ἡ ΝΞ⁵ περιφέρεια δύνει. ἔπει δὲ διὰ τῶν πόλων τῶν παραλλήλων γεγραμμένοι εἰσὶν μέγιστοι κύκλοι, ὁμοίως ἀπολήψονται τῶν παραλλήλων κύκλων περιφερείας τὰς μεταξὺ αὐτῶν· ὁμοία ἄρα ἔστιν ἡ μὲν ΜΓ τῇ ΔΠ καὶ ΡΕ περιφερεία, ἡ δὲ ΝΠ τῇ ΣΡ. ἔπει δὲ ἴσαι εἰσὶν αἱ ΒΜ ΜΝ¹⁰ ΝΞ, καὶ διὰ τῶν πόλων μέγιστοι κύκλοι γεγραμμένοι εἰσὶν, μελῶν ἄρα ἡ μὲν ΕΡ τῆς ΣΡ, ἡ δὲ ΡΣ τῆς ΣΞ· ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ τὸ Ρ τὴν ΡΕ περιφέρειαν διέρχεται ἥπερ τὸ Σ τὴν ΣΡ, καὶ τὸ Σ τὴν ΣΡ ἢ τὸ Ξ τὴν ΞΣ. ἀλλ' ἐν ᾗ μὲν τὸ Ρ τὴν ΡΕ περιφέρειαν διέρχεται, ἐν τούτῳ καὶ¹⁵ τὸ Μ τὴν ΜΓ, ἐν ᾗ δὲ τὸ Σ τὴν ΣΡ, ἐν τούτῳ καὶ τὸ Ν τὴν ΝΠ· ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ τὸ Μ τὴν ΜΓ περιφέρειαν διέξισιν ἥπερ τὸ Ν τὴν ΝΠ, τὸ δὲ Ν τὴν ΝΠ ἥπερ τὸ Ξ τὴν ΞΣ. ἀλλ' ἐν ᾗ μὲν τὸ Μ τὴν ΜΓ διέξισιν, ἐν τούτῳ ἡ ΜΒ περιφέρεια δύνει, ἐν ᾗ δὲ τὸ Ν τὴν [ἴσην²⁰ τῇ] ΝΠ περιφερεία διέξισιν, ἐν τούτῳ ἡ ΜΝ δύνει, ἐν ᾗ δὲ τὸ Ξ τὴν ΞΣ διέξισιν, ἐν τούτῳ ἡ ΝΞ περιφέρεια δύνει· ἐν πλείονι μὲν ἄρα χρόνῳ ἡ ΜΒ δύνει, ἐν ἐλάσσονι δὲ ἡ ΜΝ, ἐν ἐλαχίστῳ δὲ ἡ ΝΞ.

- 113 [Ὅμοίως δὲ καὶ τὰ ἐπὶ τοῦ ΞΗ τεταρτημορίου δειχθή-²⁵ σεται. ὅτι δὲ καὶ ἐν πλείονι ἀνατέλλει ἡ μὲν ΜΒ τῆς ΜΝ, ἡ δὲ ΜΝ τῆς ΝΞ, οὕτως δειχθήσεται. τετμήσθω καὶ τὸ ΞΗ τεταρτημόριον ὁμοίως τῇ ΞΒ κατὰ τὰ Ο Ω σημεῖα, καὶ διὰ τοῦ Α πόλον καὶ τῶν Ο Ω σημείων μέ-


8. αὐτῶν A²BS 10. ἡ δὲ ΝΠ A²BS, ἡ δὲ ΠΠ A¹ αἱ ΠΠ ΜΠ A, corr. BS 12. τῆς ΣΞ Co pro τῆς ΕΞ 20. 21. ἴσην τῇ om. Co 25. Ὅμοίως — p. 808. 3. ἡ ΝΞ interpolatori tribuit Hu 26. τετάρτη μορίου A, coniunx. BS 27. οὕτω A²BS 28. τετάρτη μορίον A, coniunx. BS τὰ (Οω) et 29. τῶν ΟΩ A, distinx. BS

ferentiae $\nu\pi$ $\nu\mu$ occiderunt: ergo ipsae $\nu\pi$ $\nu\mu$ simul occidunt. Sed quo tempore circumferentia $\nu\pi$ occidit, punctum ν ipsam $\nu\pi$ percurrit; ergo quo tempore punctum ν circumferentiam $\nu\pi$ percurrit, eodem ipsa $\nu\mu$ occidit. Similiter etiam, quo tempore punctum ξ circumferentiam $\xi\sigma$ percurrit, eodem ipsa $\xi\nu$ occidit. Sed quia per polos parallelorum maximi circuli descripti sunt, hi similes eorum parallelorum circumferentias, quae inter ipsos interiiciuntur, abscindunt (*Theodos. sphaer. 2, 10*): ergo est circumf. $\mu\gamma \sim \pi\delta \sim \rho\epsilon$, et $\nu\pi \sim \sigma\rho$. Sed quia ex hypothesi $\beta\mu$ $\nu\mu$ $\nu\xi$ aequales, et per polos maximi circuli descripti sunt, circumferentia igitur $\epsilon\rho$ maior est quam $\rho\sigma$, et $\rho\sigma$ maior quam $\sigma\xi$ (*supra propos. 21. Theodos. 3. 6*):



ergo punctum ρ maiore tempore circumferentiam $\rho\epsilon$ percurrit quam σ ipsam $\sigma\rho$, et rursus σ maiore tempore ipsam $\sigma\rho$ quam ξ ipsam $\xi\sigma$. Sed quo tempore ρ circumferentiam $\rho\epsilon$, eodem μ ipsam $\mu\gamma$ percurrit, et quo σ circumferentiam $\sigma\rho$, eodem ν ipsam $\nu\pi$; ergo μ maiore tempore circumferentiam $\mu\gamma$ percurrit quam ν ipsam $\nu\pi$, et ν maiore ipsam $\nu\pi$ quam ξ ipsam $\xi\sigma$. Sed quo tempore μ circumferentiam $\mu\gamma$ percurrit, eodem ipsa $\mu\beta$ occidit, et quo tempore ν circumferentiam $\nu\pi$ percurrit, eodem $\nu\mu$ occidit, denique quo ξ ipsam $\xi\sigma$, eodem $\xi\nu$ occidit; maiore igitur tempore circumferentia $\mu\beta$, minore $\nu\mu$, minimo $\nu\xi$ occidit.

γίσται κύκλοι γεγραφθῶσαν οἱ ZO ·1 $Z\Omega A$. ὁμοίως δὲ
 δειχθήσεται μεῖζων ἢ ὁμοία ἢ μὲν ΘY τῆς YT , ἢ δὲ YT
 τῆς $T\Xi$, καὶ τῶν παραλλήλων ἄρα τῷ μεγίστῳ αἱ περι-
 φέρειαι· μεῖζων ἄρα ἐστὶν ἢ ὁμοία ἢ μὲν $\Lambda\Omega$ τῆς ΦO , ἢ
 δὲ ΦO τῆς ΞT . ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ τὸ Ω τὴν ΩX δι-
 ἐξεισιν ἢ περ τὸ O τὴν $O\Phi$, καὶ τὸ O τὴν $O\Phi$ ἢ περ τὸ Ξ
 τὴν ΞT . ἀλλ' ἐν ᾧ μὲν τὸ Ω τὴν ΩX , ἐν τούτῳ ἢ ΩH
 περιφέρεια ἀνατέλλει, ἐν ᾧ δὲ τὸ Φ τὴν ἴσην τῇ ΦO , ἢ
 $O\Omega$ ἀνατέλλει, ἐν ᾧ δὲ τὸ Ξ τὴν ἴσην τῇ $T\Xi$ διέξεισιν,



ἐν τούτῳ ἢ ΞO περιφέρεια ἀνατέλλει· ἐν πλείονι ἄρα 10
 χρόνῳ ἢ μὲν $H\Omega$ περιφέρεια ἀνατέλλει τῆς ΩO περιφε-
 ρείας, ἢ δὲ ΩO τῆς $O\Xi$ ἀνατέλλει. ἀλλ' ἐν ἴσῳ χρόνῳ
 ἐκάστη τῶν $H\Omega$ ΩO $O\Xi$ ἐκάστη, τῶν $B\Gamma$ $M\Lambda$ $N\Xi$ ἀνα-

3. ἄρα om. Co. γὰρ fortasse voluit interpolator 4. τῆς ΦO Co
 pro τῆς $\Phi\Theta$ 5. τῆς (ante ΞT : Hu pro τῇ τὸ Ω) scribi oportebat
 τὸ X 6. τὸ O oportebat τὸ Φ utroque loco 7. τὸ Ω oportebat
 τὸ X 8. τὸ Φ τὸ O Co ἴσην τῇ om. Co. item proximo vs. 9. τὸ Ξ
 oportebat τὸ T 12. ἀνατέλλει ipse Pappus hoc loco non repetivisset
 13. $O\Xi$ ante ἐκάστη Co pro $O\Lambda\Xi$

Similiter demonstrabimus aequalium circumferentiarum semicirculi qui post capricornum est eam quae hiemali contactui tropici est propior maiore tempore oriri quam illam quae remotior est¹.

[Similiter ea quae in quadrante $\xi\eta$ contingunt demonstrabuntur. Sed oriri etiam $\mu\beta$ maiore tempore quam $\nu\mu$, et $\nu\mu$ maiore quam $\xi\nu$, sic demonstrabitur. Similiter ac $\beta\xi$ etiam quadrans $\xi\eta$ in aequales partes secetur in punctis o ω , et per polum α ac puncta o ω describantur maximi circuli $\alpha\omega\xi$ $\alpha\omega\zeta$. Iam similiter ac supra circumferentia $\theta\nu$ demonstrabitur maior esse eā quae ipsi $\nu\tau$ similis est²), et $\nu\tau$ maior eā quae ipsi $\tau\xi$ similis³); ergo $\chi\omega$ maior est eā quae ipsi ϕo similis, et ϕo maior eā quae ipsi $\tau\xi$ similis est; itaque maiore tempore punctum ω circumferentiam $\omega\chi$ percurrit⁴) quam o ipsam $o\phi$, et o maiore ipsam $o\phi$ quam ξ ipsam $\xi\tau$. Sed quo tempore ω circumferentiam $\omega\chi$ percurrit, eodem ipsa $\omega\eta$ oritur, et quo ϕ eam quae ipsi ϕo aequalis est percurrit⁵), eodem ωo oritur, et quo ξ eam quae ipsi $\tau\xi$ aequalis est percurrit, eodem ξo oritur; ergo maiore tempore circumferentia $\tau\omega$ quam ωo , et maiore ipsa ωo quam $o\xi$ oritur. Sed aequalibus temporibus oriuntur $\tau\omega$ ac $\mu\beta$, ωo

1, Ex scriptoris verbis quae cap. 44 sequuntur colligitur hoc loco in Graeco contextu aut talia fere qualia supra inseruimus aut plenam demonstrationem similem illi quae statim antecedit casu infelici perisse. Quam lacunam, ut equidem existimo, postea explere conatus est interpolator quidam, qui insulse admodum ea composuit, quae supra uncis notauimus.

2) Sic ad verbum convertimus ea Graeca quorum structura redit ad schema $\pi\epsilon\rho\iota\gamma\epsilon\iota\alpha \pi\epsilon\rho\iota\gamma\epsilon\iota\alpha\varsigma \mu\epsilon\lambda\omega\varsigma \eta \delta\upsilon\omicron\iota\alpha$, velut Autolycus libro de sphaera quae movetur propos. 9 $\eta \Gamma\text{Z} \pi\epsilon\rho\iota\gamma\epsilon\iota\alpha \tau\eta\varsigma \text{E}\text{H} \pi\epsilon\rho\iota\gamma\epsilon\iota\alpha\varsigma \mu\epsilon\lambda\omega\varsigma \epsilon\sigma\tau\iota\nu \eta \delta\upsilon\omicron\iota\alpha$, et λοιπὴ $\eta \text{Z}\theta\iota\Gamma \lambda\omicron\iota\pi\eta\varsigma \tau\eta\varsigma \text{K}\Gamma$ $\epsilon\lambda\acute{\alpha}\sigma\sigma\alpha\iota \epsilon\sigma\tau\iota\nu \iota \delta\upsilon\omicron\iota\alpha$, aliaque similiter scripsit conf. indicem sub $\delta\upsilon\omicron\iota\omicron\varsigma$ et $\delta\upsilon\omicron\iota\omicron\tau\eta\varsigma$. Verum interpolator quid in hac demonstratione eo dicendi genere efficere voluerit, non satis liquet.


3. Sequuntur in Graecis pauca verba, quorum sententia est "et parallelorum igitur maximo circumferentiae", quae corrupta esse apparet. Fortasse interpolator dicere voluit "nam hae circumferentiae in maximo parallelorum abscissae sunt secundum propos. 21 huius libri".

4) Oportebat, nisi fallor, scribi "punctum χ circumferentiam $\chi\omega$ ", et similiter in proximis. Redit tamen idem dicendi genus infra cap. 423 sq.

5) Quidni brevius et aptius " η ipsam ϕo percurrit", id quod etiam Commandinus praetulit?

τέλλει (ἡ μὲν $H\Omega$ τῇ BM , ἡ δὲ ΩO τῇ MN , ἡ δὲ ΞO τῇ $N\Xi$ · τοῦτο γὰρ καὶ ἐν τῷ στοιχείῳ δέδεικται)· ἀνατέλλει ἄρα ἐν πλείοντι χρόνῳ ἡ MB , ἐν ἐλαχίστῳ δὲ ἡ $N\Xi$.

- 114 $\nu\zeta'$. Δέδεικται μὲν ὅτι τοῦ μετὰ τὸν καρκίνου ἡμικυκλίου τῶν ἴσων περιφερειῶν ἡ ἔγγιον τῆς θερινῆς συναφῆς τοῦ τροπικοῦ τῆς ἀπώτερον ἐν πλείονι χρόνῳ δύνει, τοῦ δὲ μετὰ τὸν αἰγώνκερω ἡμικυκλίου τῶν ἴσων περιφερειῶν ἐν πλείονι χρόνῳ ἀνατέλλει ἡ ἔγγιον τῆς χειμερινῆς συναφῆς τοῦ τροπικοῦ τῆς ἀπώτερον. εἰ δὲ τις ἐπιζητοίη εἰ καὶ τὸ ἀνάπαλιν γίνεται ὥστε ἐν πλείονι χρόνῳ ἀνατέλλειν τὰς ἐν τῷ μετὰ τὸν καρκίνου ἡμικυκλίῳ ἴσας περιφερείας αἰεὶ τὰς ἔγγιον τῆς ἀπώτερον τῆς θερινῆς συναφῆς τοῦ τροπικοῦ, τοῦτο δὴ, ῥητέον, οὐκ ἐν πάσῃ οἰκίσει συμβαίνει [τοῦτο] δυνατόν ἐστιν· δειχθήσεται γὰρ ἐπὶ τινων ὀριζόντων παρθένος μὲν λέοντος ὀρθότερα ἀναφερομένη, ἀνάπαλιν δὲ ὁ λέων παρθένου ἐν πλείονι χρόνῳ ἀνατέλλων, καὶ λέων μὲν καρκίνου ὀρθότερος ἀναφερόμενος καὶ ἐν πλείονι χρόνῳ ἀνατέλλων.



- 115 Ὅτι μὲν οὖν ἐν παντὶ κλίματι, ὅπου ἀναιολαὶ καὶ δύνσεις εἰσὶν τοῖς $\iota\beta'$ ζῳδίοις, ὀρθότερα ἀναφέρεται λέων-20 τος παρθένος, δειχθήσεται οὕτως.
Ἔστω ὀριζών ὁ $AB\Gamma$, θερινὸς δὲ ὁ ΛH , καὶ ἐπὶ μὲν

ac $\mu\nu$, $\xi\theta$ ac $\nu\xi$, sicut in elemento demonstratum est⁶⁾; maximo igitur tempore $\mu\beta$, minimo $\nu\xi$ oritur.]

LVI. *Itaque demonstratum est primum: aequalium circumferentiarum semicirculi qui post cancerum est eam quae aestivo contactui tropici est propior maiore tempore occidere quam illam quae remotior, tum: aequalium circumferentiarum semicirculi qui post capricornum est eam quae hiemali contactui tropici est propior maiore tempore oriri quam illam quae remotior est. Iam si quis insuper quaerat, fiatne etiam contraria ratione, ut aequalium circumferentiarum semicirculi qui post cancerum est eae semper quae aestivo contactui tropici propiores sunt maiore tempore oriantur quam remotiores, hoc quidem dicamus non in omni habitatione posse contingere. Nam demonstrabimus in quibusdam horizontibus virginem rectiorem ascendere quam leonem, et contra leonem maiore tempore oriri quam virginem, et leonem rectiorem ascendere ac maiore tempore oriri quam cancerum. Sed*

in omni climate, ubi duodecim signis ortus et occasus Prop. 58
est, virginem rectiorem ascendere quam leonem
*sic demonstrabitur*¹⁾.

Sit horizon $\alpha\beta\gamma$, et aestivus tropicus $\delta\eta$, qui in primo

6) Recte Commandinus adnotat verbis *ἐν τῷ στοιχείῳ* Euclidis phaenomena designari. Quod mirum videtur; sed nos interpolatori quidem libenter id concedimus. Qui si eam phaenomenon formam, quae nunc exstat, in manibus habuit, theorema XII, at certe invito Pappo, citare potuit; si non, obscurum admodum est, quod ad theorema provocaverit.


1) Figuram ad similitudinem earum quae in codicibus exstant, quamvis diu dubitassetus, describi necesse fuit, quoniam alia forma nulla cum verbis scriptoris congruere visu est.

3. *πλείσται* AB, *πλείονι* S cod. Co post *πλείσται* addi oportebat *μὲν* post *ἢ AB* add. *ἐν ἐλάσσονι δὲ ἢ MN* Co 4. *Nξ* A¹ in marg. BS) 5. *ἐγγιῶν* et 8. 12. *εγγιῶν* A, corr. BS 14. *τοῦτο* del. Hu 15. *ὀρθότεραν* A, sed *ν* deletum 16. *παρθέριον* Hu auctore Co pro *παρθέριον* 17. *ὀρθότερον* ABS, corr. Hu 20. *ζωδιῶν* A, *ζωδῶν* BS 22. *ὁ ΑΒΑ* ABS, corr. Co nisi forte *ΑΒΓΚ* Pappus scripsit

τῆς α' πτώσεως ἐφαπτεύθω τοῦ ὀρίζοντος, ἐπὶ δὲ τῆς β' πτώσεως τεμνέτω τὸν ὀρίζοντα, πόλος δὲ αὐτοῦ ἔστω Ὁ, καὶ διὰ τοῦ Ὁ καὶ τῶν τοῦ ὀρίζοντος πόλων μέγιστος κύκλος γεγράφθω ὁ ΗΘΕ· ἔσται ἄρα μεσημβρινὸς καὶ ὀρθὸς πρὸς τὸν ὀρίζοντα [διὰ γὰρ τῶν πόλων αὐτοῦ ἔστιν 5 γεγραμμένος]. γεγράφθω δὲ καὶ διὰ τοῦ Α ζωδιακὸς κύκλος ὁ ΒΑΓ, καὶ ἔστω ὁ ΒΓ ἰσημερινὸς κύκλος [ὡς καὶ ἔστιν]. ἐπεὶ οὖν οἱ ΑΗ ΒΑΓ ἐφάπτονται ἀλλήλων, διὰ δὲ τῆς ἀφῆς τοῦ Α καὶ τῶν πόλων τοῦ ἐνὸς τοῦ ΑΗ [τοῦ Ὁ] γέγραπται μέγιστος κύκλος ὁ μεσημβρινὸς ὁ ΗΘΑΕ, 10 καὶ διὰ τῶν τοῦ ἑτέρου πόλων τοῦ ΒΑΓ ἔξει καὶ ὀρθὸς ἔσται πρὸς αὐτόν, ὥστε καὶ ὁ ζωδιακὸς ὀρθὸς ἔσται πρὸς τὸν μεσημβρινόν· καὶ διὰ τῶν πόλων ἄρα. ἔστιν δὲ καὶ ὁ ὀρίζων καὶ ὁ ἰσημερινὸς διὰ τῶν πόλων τοῦ μεσημβρινοῦ, ὥστε καὶ ἡ κοινὴ τομὴ τῶν τριῶν κύκλων, ὀρίζοντος, 15 ζωδιακοῦ, ἰσημερινοῦ, τὰ Β Γ σημεῖά ἐστιν κατὰ διὰμειρον 116 ὄντα, ὥστε ἰσημερινὸς ἔστιν ὁ ΒΓ κύκλος. διηρησθῶ ἡ ΑΓ εἰς γ' ἴσα κατὰ τὰ Ζ Μ, διὰ δὲ τῶν Ζ Μ κύκλοι παράλληλοι γεγράφθωσαν οἱ ΑΖΚ ΑΜΟ· ἔστιν ἄρα καρκίνου μὲν δωδεκατημόριον τὸ ΑΖ, λέοντος δὲ τὸ ΖΜ, παρ- 20 θένου δὲ τὸ ΜΓ. ὅταν μὲν δὴ ἡ ΜΓ ἀνατέλλῃ, ὁ ζωδιακὸς ἔξει θέσιν τινά· ἐχέτω τὴν ΗΝΞ. ὅταν δὲ ἡ ΖΜ ἀνατέλλῃ, ὁ ζωδιακὸς θέσιν ἔξει τινά· ἐχέτω τὴν ΡΚΟ. διὰ δὲ τὸ ἐν τῇ β' τῶν σφαιρικῶν Θεοδοσίου κα' θεώ-

1. πτώσεως add. Hu auctore Co 2. τὸ S, om. AB 3. 6. διὰ γὰρ — γεγραμμένος addidit interpolator, Theodosii sphaer. 4 propos. 13 huc pertinere significans 6. ζωδιακὸς A, ζωδιακὸς BS, item post-hac cap. 115—119 7. 8. ὡς καὶ ἔστιν interpolatori tribuit Hu 8. ΒΑΓ Co pro ΒΓ 9. ἀφῆς AB, corr. S (eadem scripturae varietas reddit p. 610, 2; sed ἀγὰς etiam AB exhibent p. 341, 23) 9. 10. τοῦ Ὁ si ipse Pappus scripsisset. non antea posuisset pluralem τῶν πόλων 10. ὁ ΗΘ ΑΓΕ A, coniunx. BS 13. ἔστιν — 17. κύκλος interpolatori tribuit Hu 16. τὰ ΒΓ A, distinx. BS 18. γ' B A B', δέο S cod. Co. τρεῖς Co τὰ ΖΜ — τῶν ΖΜ A, distinx. BS 20. δωδεκάτημόριον A, coniunx. BS, item p. 612, 5 24. B A, δευτέρω BS K A AB, εἰκοστῶν πρώτων S, κα' voluit Co


casu horizontem tangat, in secundo autem horizontem secet, et polus eius ϑ , et per ϑ ac polos horizontis maximus circulus $\eta\vartheta\epsilon$ describatur; hic igitur et meridianus erit et ad horizontem perpendicularis *Theodos. sphaer. 1, 15*. Describatur etiam per δ zodiacus $\beta\delta\gamma$, sitque $\beta\gamma$ circulus aequinoctialis. Iam quia circuli $\delta\eta$ $\beta\delta\gamma$ se invicem tangunt, et



per contactum δ ac polos unius, scilicet $\delta\eta$, maximus circulus meridianus $\eta\vartheta\epsilon$ descriptus est, hic etiam per polos alterius, videlicet $\beta\delta\gamma$, transibit *sphaer. 2, 5*; ad eumque perpendicularis erit *ibid. 1, 15*; quare etiam zodiacus ad meridianum perpendicularis erit; itaque etiam per polos eius transibit. [Sed etiam horizon atque aequinoctialis per polos meridiani transeunt; ergo in communi sectione trium circulorum, horizontis, zodiaci, aequinoctialis, sunt puncta β γ , eaque secundum diametrum opposita; quapropter $\beta\gamma$ re vera, sicut ab initio supposuimus, aequinoctialis circulus est.] Dividatur quadrans $\delta\gamma$ in tres partes aequales in punctis ζ μ , per quos circuli paralleli $\alpha\zeta\chi$ $\lambda\mu\sigma$ describantur; cancri igitur signum obtinebit circumferentiam $\delta\zeta$, leonis $\zeta\mu$, virginis $\mu\gamma$. Iam si circumferentia $\mu\gamma$ oriatur, zodiacus positionem quandam habebit: habeat eam quae in figura significatur circumferentia $\pi\chi$; et si $\zeta\mu$ oriatur, zodiacus aliam quandam positionem habebit: habeat ipsam $\rho\chi$. Ergo propter Theodosii sphaericorum libri II theorema 21^o zodiacus, cum positionem

* In ea Theodosii sphaericorum forma, quae ad nostram aetatem pervenit, est theorema vicesimum secundum, ac similiter illud duodecesimum, quod Pappus paulo post citat. in nostris editionibus est decimum tertium.

ρισμα ὀρθότητός ἐστιν, τουτέστιν μετεωρούτατος [ὁ $B\Lambda\Gamma$]
 πρὸς τὸν ὀρίζοντα, ὁ ζῳδιακὸς θέσιν ἔχων τὴν $B\Lambda\Gamma$, αἰεὶ
 δ' ὁ ἔγγιον τῆς Δ συναφῆς τῆς θερινῆς τῆς ἀπώτερον
 ἴσσον κέκληται· ὀρθότερος ἄρα ἐστὶν ὁ $\Pi\Lambda\Xi$ τοῦ PKO .



καὶ ἐπεὶ τὸ μὲν $N\Xi$ δωδεκατημόριον ἀνατέλλει, ὃ ἐστὶν τῆς 5
 παρθένου, τοῦ ζῳδιακοῦ θέσιν ἔχοντος τὴν $\Pi\Lambda\Xi$, τὸ δὲ
 KO ἀνατέλλει, ὅπερ ἐστὶν τοῦ λέοντος, τοῦ ζῳδιακοῦ θέ-
 σιν ἔχοντος τὴν PKO , ὀρθότερα ἄρα ἢ παρθένος ἀναίρε-
 ται λέοντος ἐπὶ τούτων τῶν οἰκίσεων, ἐφ' ὧν πάντα τὰ
 117 μέρη τοῦ ζῳδιακοῦ ἀνατέλλει τε καὶ δύνει. καὶ φανερόν 10
 ὅτι αἱ θέσεις τοῦ ζῳδιακοῦ κύκλου ὀρθῶς ἔχουσιν τῷ $\iota\beta'$
 τοῦ β' . ὅμοιαι γάρ εἰσιν αἱ περιφέρειαι αἱ $\Lambda\Pi$ $\Sigma\Sigma$ MN
 $\Gamma\Xi$, καὶ ἴσαι αἱ $\Pi\Sigma$ PK ΣN KO , ὥστε στρεφομένης τῆς
 σφαίρας ἀρμόζειν ἐν ἴσῳ χρόνῳ [τῷ αὐτῷ] τὰ σημεῖα ἐπὶ
 τὰ σημεῖα, καθ' ὃ καὶ ἐν τῷ περὶ κινουμένης σφαίρας 15
 δεικνύνται, καὶ τὰς μεταξὺ περιφερείας ἴσας ἐπὶ τὰς ἴσας
 [καὶ μεταξὺ περιφέρειαι ὁ τοῦ ζῳδιακοῦ κύκλου]. δεῖ δὲ
 τὴν ἴσην τῇ $\Pi\Gamma$ ἀνατέλλουσαν μεταξὺ πάλιν εἶναι τῶν αὐ-
 τῶν παραλλήλων, διότι ἢ τῆς $\Pi\Gamma$ ἀναφορὰ ἢ αὐτῇ λαμ-
 βάνεται τῇ $N\Xi$. οὐ προσοδεύεται δὲ τὸ θεώρημα τοῦτο οὐκ- 20

$\beta\delta\gamma$ habebit, rectissimus erit, id est maxime sublimis ad horizonalem, et in ea semper positione, quae propior est aestivo contactui δ , minus erit inclinatus²⁾ quam in ea quae a contactu δ remotior est; itaque circulus $\pi\nu\xi$ rectior est quam $\rho\chi\theta$. Et quia signum $\nu\xi$, quod est virginis. oritur zodiaco positionem $\pi\nu\xi$ habente, et $\chi\theta$, quod leonis est, oritur zodiaco positionem $\rho\chi\theta$ habente, rectior igitur virgo leone ascendit in iis habitationibus, in quibus omnes zodiaci partes oriuntur atque occidunt. Et positiones zodiaci, quemadmodum descriplae sunt, recte se habere manifestum est ex *sphaericorum libri II theoremate 12^o*. Nam circumferentiae $\delta\eta$ $\zeta\sigma$ $\mu\nu$ $\gamma\xi$ similes, et $\pi\sigma$ $\rho\chi$ $\sigma\nu$ $\chi\theta$ aequales sunt; itaque in conversione sphaerae aequali tempore puncta π σ ν ξ cum punctis δ ζ μ γ congruunt, sicut etiam *Autolycus* in libro de sphaera quae movetur demonstrat³⁾, et aequales circumferentiae inter parallelos interiectae cum aequalibus. Circumferentiam autem $\mu\gamma$, cum oritur, rursus inter eosdem parallelos esse propterea necesse est, quia ascensio circumferentiae $\mu\gamma$ eadem sumitur atque ipsius $\nu\xi$; neque vero theorema procedit in maiore ele-

2) Id est "planum zodiaci cum horizontis plano maiorem angulum efficiet". Eodem igitur sensu *ἡσσον κεκλιται* Pappus scripsit, quo Theodosius l. c. eum circulum, qui minorem angulum cum plano alterius efficit, *μᾶλλον κεκλιμένον* vocat. In definitionibus Euclides elem. 11 def. 7 et Theodosius sphaer. 1 def. 6 nihil nisi quid sit *ὁμοίως κεκλισθαι* exponunt.


^{2*)} In nostris Theodosii editionibus est theorema tertium decimum. Conf. supra adnot. *.

3) Propos. 2: 'Ἐὰν σφαῖρα στρέφηται ὁμοιῶς περὶ τὸν ἐαυτῆς ἄξονα, πάντα τὰ ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας σημεῖα ἐν τῇ ἴσῳ χρόνῳ τὰς ὁμοίας περιμετρείας διεξέρχεται τῶν παραλλήλων κίχλων καθ' ὧν γέρεται, et idem media in demonstratione: λέγω οὖν ὅτι ἐν ἴσῳ χρόνῳ τὸ Γ σημεῖον ἐπὶ τὸ Ε᾽ παραγίγνεται καὶ τὸ Α' ἐπὶ τὸ Ζ εἰς.

2. ὁ BS, om. A 3. ἐγγειον A, corr. BS 5. ἐπεὶ add. Hu 8. ἡ S, om. AB 11. 12. τῷ Ἰβ' τοῦ β' A, τῷ Ἰβ' τοῦ β' B'S, τῷ γ' τοῦ β' voluit C'o 14. τῷ αὐτῷ om. C'o 16. 17. ἴσας ἐπὶ — περιμετρεῖται add. A³ in marg. (BS) 17. καὶ μεταξὺ — κίχλων tribuit Hu interpolatori, qui haec scribere voluerit: τοῦ ᾠδιστοῦ τὰς μεταξὺ τῶν παραλλήλων ὁ ἡ con. C'o

εἰ ἐν μείζονι ἐξάρματι, ὅταν ὁ ὀρίζων μείζονων ἐράπτηται ἢ ὡς ὁ ζῳδιακὸς ἐφάπτεται.

- 118 νζ'. Ἐστω δὲ νῦν τοὺς ὀρίζοντας εἶρεῖν τῶν οἰκήσεων, ἐν οἷς τὰ ὀρθότερα ἀναφερόμενα τοῦ ζῳδιακοῦ δωδεκατημόρια ἐν ἐλάσσονι χρόνῳ ἀνενεχθήσεται τῶν πλαγιωτέρων ἀναφερομένων.



Ἐκκεῖσθω μέγιστος κύκλος ὁ $AB\Gamma A$ ὀρίζων διὰ τῶν πόλων τῶν παραλλήλων, καὶ ἔστωσαν πόλοι τὰ $A \Gamma$, καὶ δι' αὐτῶν μέγιστος ὁ $A\Theta\Gamma$, τουτέστιν μεσημβρινός, καὶ 15 ἔστω θερινὸν μὲν ἡμικύκλιον τὸ $E\eta$, χειμερινὸν δὲ τὸ KZ , ζῳδιακοῦ θέσις ὅτε μὲν ἡ $E\Theta Z$, ὅτε δὲ 20 ἡ $H\Theta K$, ἀνατολικῶν ὄντων μερῶν τῶν

πρὸς τοῖς $H A Z$, καὶ διηγήσθω τὸ $E\Theta$ τεταρτημόριον εἰς τὰ ζῳδία κατὰ τὰ $A M$ · λέγω ὅτι ὀρθότερα ἢ $M\Theta$ τῆς AM ἀναφέρεται. 25

Ἐπεὶ γὰρ ὁ ὀρίζων ἐστὶν διὰ τῶν πόλων τῆς σφαίρας, τουτέστιν τοῦ ἡσημερινοῦ, ὀρθός ἐστιν πρὸς τὸν αὐτόν, ὥστε καὶ ὁ ἡσημερινὸς ὀρθός ἐστιν πρὸς τὸν ὀρίζοντι· καὶ διὰ τῶν πόλων ἄρα τοῦ ὀρίζοντος ἐστὶν ὁ ἡσημερινός. ἔστιν δὲ καὶ ὁ μεσημβρινός διὰ τῶν πόλων τοῦ ὀρίζοντος, ὥστε 30 ἡ κοινὴ τομὴ τοῦ ἡσημερινοῦ καὶ τοῦ μεσημβρινοῦ εἰσιν οἱ πόλοι τοῦ ὀρίζοντος. καὶ ἔστιν ὁ μὲν ἡσημερινὸς φερόμενος αἰεὶ διὰ τῶν πόλων τοῦ ὀρίζοντος, ὁ δὲ ζῳδιακὸς κατὰ δύο σημεῖα μόνον [χριοῦ ἀρχῇ καὶ ζυγοῦ] διὰ τῶν κοινῶν τομῶν τοῦ ἡσημερινοῦ καὶ μεσημβρινοῦ, ὥστε καὶ ἡ ἀπὸ 35 τοῦ ὀρίζοντος ἐπὶ τὸν πόλον περιφέρεια τεταρτημορίου

vatione, cum horizon maiores circulos tangit quam quos zodiacus tangit.

LVII. Nunc autem horizontes earum habitationum inveniantur, in quibus zodiaci signa, quae rectiora ascendunt, minore tempore oriantur quam quae obliquiora ascendunt. Prop. 39

Exponatur maximus circulus $\alpha\beta\gamma\delta$, qui sit horizon per polos parallelorum *transiens*, et sint poli $\alpha\gamma$, per quos maximus circulus, id est meridianus, $\alpha\delta\gamma$ describatur, sitque ex semicirculus aestivi tropici, $\alpha\zeta$ hiemalis, et zodiaci positio sit interdum $\varepsilon\theta\zeta$, interdum $\eta\theta\kappa$, ac partes orientales sint ad puncta $\eta\delta\zeta$, et dividatur quadrans $\varepsilon\theta$ in tres aequales partes, i. e. tria zodiaci signa, in punctis $\lambda\mu$; dico circumferentiam $\mu\theta$ rectiorem ascendere quam $\lambda\mu$ ^{*)}.

Nam quia horizon per polos sphaerae, id est per polos circuli aequinoctialis, transit, perpendicularis igitur est ad eundem [itaque aequinoctialis ad horizontem perpendicularis est]; ergo aequinoctialis etiam per polos horizontis transit. Verum etiam meridianus per polos horizontis transit; itaque communis sectio circulorum aequinoctialis et meridiani est ea recta quae per polos horizontis ducitur [et aequinoctialis quidem semper per polos horizontis fertur, zodiacus autem in duobus tantum punctis per communem sectionem aequinoctialis et meridiani transit]; ergo ab horizonte ad polum est circum-


^{*)} Haec extrema, ut in Graecis significavimus, nostra coniectura addidimus. Omnino hinc incipit latissima genuinae scripturae corruptela, cum et interpolata nonnulla et alia aliis rationibus depravata sint. Quae nos, partim Commandino auctore, utcumque in Latinum sermonem convertimus, Graeca autem, quae probabili coniectura sanari non possent, intacta relinquere quam temere immutare maluimus.

8. NZ A¹ in marg. (BS) 8. 9. δ AB¹ ABS, corr. Co 12. τὰ
 AF A, distinx. BS 21. η HQ ABS, corr. Co 23. τοὺς II. IZ
 A, distinx. BS τετάρτη μῦθος A, coniunx. BS 24. τὰ ζῳδια A,
 τὰ ζῳδια BS, τὰς ἰσὰ coni. Hu κατὰ add. Co τὰ AM A.
 distinx. BS 24. 25. λέγω — ἀναγίγεται add. Hu 28. ὥστε —
 ὁρίζοντι propter ταυτολογίαν suspecta videntur 34. χροῦ — ζυγοῦ
 interpolatori tribuit Hu (ἃ ἔστιν χροῦ etc. voluit Co) διὰ Co pro ὁ
 36. τετάρτη μυσθίου A, coniunx. BS, item p. 616, 3 init.

[μοιρῶν C']. καὶ ἔστιν ἐπὶ τοῦ ὀριζήοντος τὰ Ε Η Κ Ζ ὄντα τῶν ἀφῶν σημεῖα τῶν τροπικῶν ἐπὶ τὸν μεσημβρινὸν τεταρτημορίου, ὥστε τὸ τεταρτημόριον τὸ ἀπὸ τῶν Ε Η Κ Ζ ἐπὶ τὸ τοῦ ἰσημερινοῦ κύκλου καὶ τοῦ μεσημβρινοῦ
 119 καὶ τοῦ πόλου τοῦ ὀριζήοντος κοινὸν σημεῖον τὸ Θ. καὶ ὁ
 διὰ τῶν Α Μ Θ παράλληλοι κύκλοι γεγράφθωσαν οἱ ΑΝ ΜΞ ΒΘΔ· ἔσται δὴ ὁ ΒΘΔ ἰσημερινός, ὡς προεῖρηται. γεγράφθωσαν διὰ τοῦ Α πόλου καὶ ἐκάστου τῶν Α Μ Ξ Ν μέγιστοι κύκλοι οἱ ΑΟ ΑΠ ΑΡ ΑΣ. καὶ ἐπειδὴ τῷ α' τοῦ β' τῶν σφαιρικῶν ἴσαι εἰσὶν αἱ ΕΑ ΗΝ καὶ ΑΜ 10 ΝΞ, καὶ αἱ ΜΘ ΞΘ, διήρηται δὲ ἴσαι, εἰς τὰ ζώδια εἰσὶν διαιρεθεῖσαι καὶ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν, καὶ ἔστιν τὸ Ε χαρκῖνον ○ ἡγούμενον τοῦ ἡμικυκλίου, καὶ τὸ Η χαρκῖνον ○ ἐπόμενον τῇ ἡμικυκλίῳ, ὥστε τὰ μὲν Α Μ Θ σημεῖα ἔπεται τῷ Ε, τὰ δὲ Ν Ξ Θ ἡγεῖται τοῦ Η, ὥστε 15 εἶναι τὰ ὁμόζωνα ζώδια καὶ εἶναι τὸ Θ σημεῖον κριοῦ ○ κατὰ τὸ Η καὶ ζυγοῦ ○ κατὰ τὸ Ε. μεζῶν ἄρα ἔστιν ἡ μὲν ΒΟ τῆς ΟΗ, ἡ δὲ ΟΠ τῆς ΠΘ, ὁμοίως δὲ καὶ ἡ μὲν ΑΣ τῆς ΣΡ, ἡ δὲ ΣΡ τῆς ΡΘ· ἔσται ἄρα ἡ ΟΘΣ τῆς ΠΘΡ μεζῶν ἢ διπλῇ, τουτέστιν τῇ ὁμοιότητι ἢ ΑΝ τῆς 20 ΜΞ. ἔστω δὴ τῆς ΜΞ διπλῇ τῇ ὁμοιότητι ἢ ΑΦ, διὰ δὲ τῶν Φ Θ μέγιστος κύκλος γεγράφθω ὁ ΞΦΘΓ. ἔσται

1. $\overline{MC}$ A(B), μοιρῶν ἐννεμήκοντα S, interpolatori tribuit Hu τὰ ΕΗ ΚΖ AB Paris. 2368, distinx. S 2. ὄντα σημεῖα τῶν τροπικῶν, ἀφ' ὧν ἐπὶ τὸν etc. conl. Co ἀφῶν S, ἀφῶν A, ἀφ' ὧν B 3. ὥστε τὸ ὥστ' ἔστιν conl. Hu auctore Co τετάρτη μόριον A, coniunx. BS τὸ (ante ἀπὸ) Α² pro τὸν 3. 4. τῶν ΕΗ ΚΖ ABS, distinx. Hu 6. τῶν ΑΜΘ A, distinx. B (τῶν Α Θ μ S) 6. 7. οἱ ΑΜ ΝΞ ABS, corr. Co 7. δὴ ὁ ΒΘΔ ABS, corr. Idem 8. 9. τῶν ΑΜ ΝΞ AB, distinx. S, corr. Hu 9. 10. καὶ ἐπεὶ διὰ τὸ δωδεκάτην Hu 10. ἸΒ τοῦ Β Α, Ἰβ τοῦ β' B, δωδεκάτῳ τοῦ δευτέρου S, γ' τοῦ β' voluit Co 11. 12. διήρηται δὲ εἰς ἴσα ἢ ΕΘ, καὶ ἡ ΗΘ ἄρα εἰς τὰ ζώδια ἔστιν διαιρεθεῖσα, καὶ ἔστιν τὸ Ε etc. conl. Hu 11. ζώδια εἰσὶν A, ζώδια εἰσι BS 13. 14. Θ — Θ ABS, ἀρχόμενον coll. cap. 127, vel ἀρκτικὸν coll. cap. 121 conl. Hu, item paulo post vs. 17 14. τοῦ ἡμικυκλίου ABS, corr. Hu auctore Co 14. 15. τὰ μὲν ΑΜΘ — τὰ δὲ ΝΞΘ A, distinx. BS 16. εἶναι τὰ εἶναι τινα vel εἶναι ε' conl. Hu ζώδια

ferentia quadrantis. Et sunt in horizonte tropicorum puncta $\varepsilon \eta \kappa \zeta$ [a quibus ad meridianum est quadrantis circumferentia]; ergo quadrans est a punctis $\varepsilon \eta \kappa \zeta$ ad ϑ commune punctum aequinoctialis circuli et meridiani, quod idem



horizontis polus est. Iam per $\lambda \mu \vartheta$ describantur circuli paralleli $\lambda \nu \mu \xi \beta \vartheta \delta$: ergo $\beta \vartheta \delta$ aequinoctialis erit, ut supra diximus. Porro per polum α ac singula puncta $\lambda \mu \xi \nu$ describantur maximī circuli $\alpha \sigma \alpha \pi \alpha \varrho \alpha \sigma$. Et quia propter theorema (12^{*)}) libri II sphaericorum est $\varepsilon \lambda = \eta \nu$, et $\lambda \mu = \nu \xi$, et $\mu \vartheta = \xi \vartheta$, atque

ex constructione quadrans $\varepsilon \vartheta$ in punctis $\lambda \mu$ in aequales partes divisus est, quadrans etiam $\eta \vartheta$ in tres aequales partes, i. e. tria signa divisus est [et est ε principium cancri praecedens semicirculum, et η principium cancri semicirculum sequens, quapropter puncta $\lambda \mu \vartheta$ ipsum ε sequuntur, et $\vartheta \xi \nu$ ipsum η praecedunt; itaque bina signa sunt in eadem zona, et punctum ϑ arietis principium est versus η , idemque librae principium versus ε]. Ergo est $\beta \sigma > \alpha \pi > \pi \vartheta$, ac similiter $\delta \sigma > \sigma \varrho > \varrho \vartheta$ supra propos. 21. Theodos. sphaer. 5. 6; itaque $\sigma \vartheta \sigma > 2 \pi \vartheta \varrho$, id est similitudine $\lambda \nu > 2 \mu \xi$. Sit similitudine $\lambda \varrho = 2 \mu \xi$, et per $\eta \vartheta$ describatur maximus circulus $\varepsilon \eta \vartheta \zeta$; hic igitur ad horizon-

^{*)} In nostris Theodosii editionibus est theorema tertium decimum. Conf. supra p. 614 adnot. *.

(sine acc.) A, $\zeta \omega \delta \iota \alpha$ BS 17. $\zeta \nu \gamma \omega \delta$ AS, $\sigma \nu \zeta \gamma \omega \nu$ B cod. Co 19. η
 $\delta \varepsilon$ CP $\tau \eta \zeta$ CH A^s, corr. B 22. $\tau \omega \rho$ CH A, distinx. BS

δὴ οὗτος ὁρθὸς τῷ $ΑΒΓΔ$ ὀρίζοντι (τὸ γὰρ $Θ$ ἐστὶν πό-
λος τοῦ ὀρίζοντος).

- 120 Λέγω οὖν ἔτι, ἐὰν ὀρίζοντα ὑποστησώμεθα ἦτοι τὸν
 $ΣΦΘς$ ἢ τὸν $ΗΘΚ$ (ὃς ἐφάπτεται τοῦ $ΕΗ$ θερينوῦ τρο-
πικοῦ ἐν τῇ μεταξὺ τῶν $Σ Η$ πιπτοίῃ οἰκῇσιν), δειχθί-
σεται παρθένης λέοντος ὁρθότερα ἀναφερομένη, ἐν πλείονι
δὲ χρόνῳ παρθένου λέων ἀνατέλλων.

Ἐπεὶ περ (ἐν πλείονι χρόνῳ) ὑπεστησάμεν ὀρίζοντα
τοιοῦτον μὴ μειζόνων ἐφαπτόμενον ἥπερ εἰσὶν οἱ τροπικοὶ
κύκλοι, φανερόν οὖν ὅτι διὰ τὸ προαποδεδειγμένον παρ- 10

- 121 θένος λέοντος ὁρθότερα ἀνεσθῆται. ὑποκείσθω πρό-
τερον ὁ $ΗΘΚ$ ὀρίζων, καὶ ἔστω αὐτοῦ ἀνατολικώτερον
ἡμικύκλιον τὸ $ΗΘΚ$, τοῦ μεσημβρινοῦ ὅντος τοῦ $ΑΒΓΔ$
ἑρσοῦ τοῖς παραλλήλοις καὶ τῷ $ΗΘΚ$. ἀρκτικὸς ἄρα τοῦ
 $ΗΘΚ$ ὀρίζοντος ὁ $ΕΗ$ θερινὸς τροπικὸς. καὶ ἔσται καρ- 15
κίνου μὲν δωδεκατημόριον τὸ $ΕΑ$, λέοντος δὲ τὸ $ΑΜ$,
παρθένου δὲ τὸ $ΜΘ$. ὁρθότερα ἄρα ἢ $ΜΘ$ τῆς $ΑΜ$ ἀνα-
φέρεται.

- 122 Λέγω ὅτι ἐν πλείονι χρόνῳ ἀνατέλλει ἢ $ΑΜ$ τῆς
 $ΜΘ$. 20

Ἐπεὶ γὰρ δέδεικται μείζων ἢ διπλῇ τῇ ὁμοιότητι ἢ
 $ΑΝ$ τῆς $ΜΞ$, καὶ ἐν ᾧ μὲν χρόνῳ τὸ $Α$ τὴν $ΑΝ$ διεξελί-
λυθεν, ἀνατέλλει ἢ $ΑΘ$ (τοῦ γὰρ $Α$ ἀρξαμένου ἀπὸ τοῦ
 $Ν$ ἀνατολῆς ὀρίζοντος διαπορεύεσθαι τὴν $ΝΑ$, ἢ $ΑΘ$ ἀν-
εσθῆται· ἐστὶν γὰρ τὸ $Θ$ ἐν τῇ ἀνατολῇ τοῦ ὀρίζοντος), 25
ἐν ᾧ δὲ χρόνῳ τὸ $Μ$ τὴν $ΞΜ$ διαπορεύεται, ἀνατέλλει ἢ

4. οὗτος B, ουτος A, οὕτως S τῷ $\overline{ΑΒ ΓΔ}$ A, coniunx. BS

5. τῶν $\overline{ΣΗ}$ A, distinx. BS 6. ὁρθότερα Hu auctore Co pro ὁρθο-
τάτη 7. λέων] ὁ λέων Co, om. ABS 8. ἐπεὶ περ Hu

auctore Co ἐν πλείονι χρόνῳ del. Co 9. ἐφαπτόμενον ei o
superscr. A¹ 40. οὖν ἄρα Hu 42. ἀνατολικὸν coni. Hu 46. δω-


δεκάτη μόριον A, coniunx. BS 47. παρθένου — τῆς $\overline{ΑΜ}$ bis scripta
in AB, sed in A altera scriptura deleta 49. post λέγω add. δὴ S

24. ἀνατολῆς ὀρίζοντος] distinctius τῆς ἀνατολῆς τοῦ ὀρίζοντος scriptor
cap. 428 posuit

tem $\alpha\beta\gamma\delta$ perpendicularis erit (quoniam ϑ polus horizon-
tis est).

Iam dico, si horizontem supponamus vel circulum $\xi\vartheta\zeta$
vel $\eta\vartheta\chi$ (qui quidem aestivum tropicum $\varepsilon\eta$ tangit in ea ha-
bitatione quae inter ξ et η cadit), demonstrari virginem rectio-
rem ascendere quam leonem, et maiore tempore leonem oriri
quam virginem.

Quoniam talem horizontem non maiores circulos tangere
supposui, quam sunt tropici, propter illa igitur quae supra



(*propos. 58*) demon-
stravimus manife-
stum est virginem
rectiorem ascendere
quam leonem. Sup-
ponatur primum cir-
culus $\eta\vartheta\chi$ horizon,
cuius orientalis semi-
circulus sit $\eta\vartheta\chi$, et
meridianus $\alpha\beta\gamma\delta$ per-
pendicularis ad pa-
rallellos et ad circu-
lum $\eta\vartheta\chi$; ergo aesti-
vus tropicus $\varepsilon\eta$ prin-
cipium est horizon-
tis
 $\eta\vartheta\chi$, et cancri sig-
num obtinebit circumferentiam $\varepsilon\lambda$, leonis $\lambda\mu$, virginis $\mu\vartheta$;
ergo $\mu\vartheta$ rectior quam $\lambda\mu$ ascendit.

Iam dico maiore tempore circumferentiam $\lambda\mu$ quam $\mu\vartheta$
oriri.

Quoniam enim $\lambda\nu$ similitudine maior quam dupla $\mu\xi$
demonstrata est, et quo tempore punctum λ circumferentiam
 $\nu\lambda$ percurrit, eodem circumferentia $\vartheta\lambda$ oritur nam cum λ ab
horizontis orientalis puncto ν incipiet circumferentiam $\nu\lambda$ per-
currere, ipsa $\vartheta\lambda$ oriatur; est enim ϑ in horizonte orientali),
et quo tempore μ circumferentiam $\xi\mu$ percurrit, ipsa $\vartheta\mu$ ori-

tur (quod similiter ac praecedens demonstratur), manifestum igitur est tempus quo $\lambda\theta$ oritur maius esse duplo tempore quo $\mu\theta$ oritur; itaque maiore tempore $\lambda\mu$ quam $\mu\theta$ oritur nam quia demonstravimus


tempus ortus $\lambda\theta > 2$ temp. ort. $\mu\theta$, est igitur
temp. ort. $\mu\theta < \frac{1}{2}$ temp. ort. $\lambda\theta$; itaque subtrahendo
temp. ort. $\lambda\theta -$ temp. ort. $\mu\theta > \frac{1}{2}$ temp. ort. $\lambda\theta$, id est
temp. ort. $\lambda\mu > \frac{1}{2}$ temp. ort. $\lambda\theta$, eoque magis
 $>$ temp. ort. $\mu\theta$.

Rursus sit alius circulus $\varepsilon\varphi\theta\zeta$ horizon, et meridianus $\alpha\beta\gamma\delta$ perpendicularis ad parallelos et ad horizontem $\varepsilon\varphi\theta\zeta$ quia θ polus meridiani est; itaque circuli inter se perpendiculares; dico in hoc etiam casu circumferentiam $\lambda\mu$ maiore tempore quam $\mu\theta$ oriri.

Nam quia abscissa est circumferentia $\lambda\varphi$ similitudine dupla ipsius $\mu\xi$ (supra p. 617 extr.), manifestum est circumferentiam $\lambda\varphi$ similitudine maiorem esse quam duplam $\mu\psi$ (apparet enim punctum ψ inter μ ξ cadere; nam circumferentia $\theta\varphi\zeta$ manifesto non per ipsa μ ξ transibit, quoniam sic $\theta\mu$ $\theta\xi$ diametri maximorum circulorum fierent. cum circumferentiae $\theta\mu$ $\theta\xi$ minores sint totis semicirculis $\varepsilon\mu\theta\zeta$ $\eta\xi\theta\zeta$, id quod fieri non potest; sed neque extra μ ξ punctum ψ cadit: nam circulus per θ ψ descriptus ex hypothesis etiam per φ transibit; itaque, si ψ extra μ ξ caderet, circulus $\varphi\psi$ maximos circulos $\varepsilon\lambda\zeta$ $\eta\xi\kappa$ in alio puncto ac θ secaret, et communis sectio inde ab ε minor esset semicirculo. id quod fieri non potest; ergo inter μ ξ punctum ψ cadit. Sed quo tempore punctum λ ab horizontis orientalis puncto φ incipiens per circumferentiam $\varphi\lambda$ fertur, eodem circumferentia $\theta\lambda$ ori-

9. $\eta\mu\iota\sigma\upsilon$ BS. L' A 16. $\xi\lambda\alpha\sigma\sigma\omicron\rho\varsigma$ Hu auctore Co pro $\xi\lambda\alpha\sigma\sigma\omicron\rho\varsigma$
17. $\eta\mu\iota\sigma\upsilon$ S, L' AB 19. δ add. Hu 26. 27. $\tau\omega\upsilon$ MΞ A. distinx.
BS. item posthac 27. η $\theta\varphi\zeta$ ABS, corr. Hu auctore Co 28. $\delta\iota\alpha$ -
 $\mu\epsilon\tau\rho\varsigma$ AB³, corr. BS 29. $\xi\lambda\alpha\sigma\sigma\omicron\rho\varsigma$ Co pro $\xi\lambda\alpha\sigma\sigma\omicron\rho\varsigma$ $\gamma\acute{\alpha}\rho$ del.
Hu EMI $\theta\zeta$ ABS, coniunx. Co HΞΘA A, $\eta\zeta$ $\theta\kappa$ B, $\eta\zeta$ $\theta\kappa$ S
31. δ add. Hu $\tau\omega\upsilon$ $\theta\varphi$ $\tau\omega\upsilon$ $\theta\varphi$ A, distinx. BS, corr. Hu 33. $\tau\omicron$ -
 $\mu\eta$ Co pro $\tau\omicron$ $\xi\lambda\alpha\sigma\sigma\omicron\rho\varsigma$ ABS, $\tau\omicron$ $\xi\lambda\alpha\sigma\sigma\omicron\rho\varsigma$ $\tau\omega\upsilon$ Co, corr. Hu 35. $\alpha\lambda\lambda'$
 $\xi\pi\epsilon\iota$ $\epsilon\upsilon$ coni. Hu $\kappa\iota\tau\epsilon\iota\tau\alpha\iota$ et η super ei A'

τέλλει, ἐν ᾧ δὲ τὸ M τὴν $M\psi$ περιφέρειαν κινεῖται ἀρξά-



μενον ἀπὸ τοῦ ψ τῆς ἀνατολῆς τοῦ ὁρίζοντος, ἡ $M\Theta$ ἀνατέλλει· φανερόν ὅτι ἐν πλείονι χρόνῳ ἀνατέλλει ἡ AM τῆς $M\Theta$, ὡς προεδείχθη.

Τῷ δὲ αὐτῷ ἐν τῷ τρόπῳ ἐφωδύσαμεν ὅτι ἐν πλείονι χρόνῳ ἀνατέλλει ἡ EA τῆς AM , καὶ ὀρθότερα ἡ AM περιφέρεια, ἥτις ἐστὶν τοῦ λέοντος,

ἀναφερομένη· ἥπερ ἡ EA , ἥτις ἐστὶν τοῦ καρκίνου.

- 124 Λέδειται οὖν τὰ προτεθέντα, κατὰ δὲ Πτολεμαῖον ἐν ὀρθῇ σφαίρᾳ καὶ πρώτῳ κλίματι καὶ δευτέρῳ συμφώνως ὁ καρκίνος ἐν πλείονι χρόνῳ ἀναφέρεται τοῦ λέοντος, μετὰ δὲ μοίρας ις' κζ' ἐξάρματος πόλου τοῦ δευτέρου κλίματος ἕως τοῦ γ' κλίματος ἐν πλείονι ὁ λέων ἀνατέλλει τοῦ καρκίνου, ὥστε ἀσύμφωνον εἶναι. περὶ δὲ τοῦ ὀρθότερου [εἶναι] τὸ τοῦ λέοντος ἥπερ τὸ τοῦ καρκίνου ἀναφέρεσθαι δειχθήσεται πάλιν τῷ κα' τοῦ δευτέρου τῶν σφαιρικῶν [τῷ προτέρῳ λήμματι].

- 125 νη'. Ἐστω διὰ τῶν πόλων τῆς σφαίρας κύκλος ὁ $AB\Gamma\Delta$, πόλοι δὲ τῆς σφαίρας οἱ A B , ἕτερος δὲ μέγιστος κύκλος ὁ $\Gamma\Delta$ λοξὸς μὲν πρὸς τοὺς παραλλήλους ὀρθὸς δὲ πρὸς τὸν $AB\Gamma\Delta$, καὶ διηρῆσθω τὸ ΓX τεταρτημόριον εἰς τρία ἴσα κατὰ τὰ Σ T , καὶ διὰ τῶν Σ T X γεγραφθῶσαν κύκλοι παράλληλοι, καὶ ἔστωσαν κοινὰ τομαὶ αὐτῶν τε καὶ τοῦ $AB\Gamma\Delta$ αἱ $\Delta\Gamma$ ΔK καὶ $H\Theta$ EZ γίνονται δι' καὶ

tur, et quo tempore punctum μ ab horizontis orientalis puncto ψ incipiens per circumferentiam $\psi\mu$ fertur, eodem ipsa $\theta\mu$ oritur; ergo ex iis quae supra (p. 619. 621) demonstravimus manifestum est circumferentiam $\lambda\mu$ maiore tempore quam $\mu\theta$ oriri.

Eadem ratione usi sumus, ut demonstraremus maiore tempore circumferentiam $\epsilon\lambda$ quam $\lambda\mu$ oriri, et circumferentiam $\lambda\mu$, quae est leonis, rectiorem ascendere quam $\epsilon\lambda$, quae est cancri.


Sic igitur ea quae proposita sunt demonstravimus; sed secundum Ptolemaeum convenienter nostrae quidem rationi in recta sphaera et primo ac secundo climate cancer maiore tempore quam leo oritur; at post $46^{\circ} 27'$ elevationis poli secundi climatis usque ad tertium clinia leo maiore tempore oritur quam cancer, quod cum nostra demonstratione discrepat. Sed leonis signum rectius ascendere quam cancri rursus Theodosii sphaericorum libri II theoremate 21 demonstrabitur (supra p. 611).

LVIII. Sit per polos sphaerae circulus $\alpha\gamma\beta\delta$, et sint ^{Prop. 60*)} sphaerae poli $\alpha\beta$, sitque alius maximus circulus $\gamma\delta$ obliquus ad parallelos et perpendicularis ad ipsum $\alpha\gamma\beta\delta$, et quadrans $\gamma\chi$ in tres aequales partes dividatur in punctis $\sigma\tau$, et per $\sigma\tau\chi$ describantur circuli paralleli, sintque circulorum $\gamma\chi\delta$ $\kappa\alpha\lambda$, $\iota\tau\theta$ $\epsilon\chi\zeta$ et circuli $\alpha\gamma\beta\delta$ communes sectiones $\gamma\delta$ $\kappa\lambda$ $\iota\theta$ $\epsilon\zeta$ (quae quidem etiam diametri fiunt), et sit $\gamma\nu$ parallela

*) "Hoc theorema videtur quodammodo supervacaneum; quod enim in eo demonstratur, satis superque demonstratum iam fuit" Co. Accedit quod in ipsa Graecorum verborum compositione multa reperiuntur, e quibus scriptor posterioris quam Pappi aetatis cognoscatur.

tore Co 22. $\mu\omicron\tau\alpha\varsigma$ S, $\overline{M}$ AB $\overline{I\zeta}$ $\overline{K\zeta}$ AS, $\iota\zeta$ $\kappa\zeta'$ B 23. $\xi\alpha\omega$
 $\sigma\tau\omicron\upsilon$ ζ' A, om. B¹. $\xi\omega\varsigma$ $\tau\omicron\upsilon$ ζ' B³, $\xi\alpha\omega$ $\tau\omicron\upsilon$ ζ S, usque ad tertium Co
 24. $\epsilon\iota\tau\alpha\iota$ om. Co 27. $\tau\eta$ $\pi\rho\omicron\tau\epsilon\rho\eta$ $\lambda\acute{\eta}\mu\mu\alpha\tau\iota$ interpolatori tribuit Hu
 $\xi\omega\sigma\pi\epsilon\rho$ $\kappa\alpha\iota$ $\tau\eta$ $\pi\rho.$ λ . voluit Co; 28. NH A¹ in marg. (BS
 28. 29. $\acute{o}$ $\overline{AFBA}$ coni. Hu (item posthac) 29. $\acute{o}$ $\overline{AB}$ A, distinx. BS
 31. $\tau\omicron\upsilon$ $\overline{AB}$ $\overline{FI}$ — $\tau\epsilon\tau\acute{\alpha}\rho\tau\eta$ $\mu\acute{o}\rho\tau\omicron\upsilon$ A, coniunx. BS $\tau\omicron$ $\overline{FX}$ Hu
 pro $\tau\omicron$ $\overline{FI}$ 32. $\tau\omicron$ $\overline{CT}$ $\kappa\alpha\iota$ $\delta\iota\acute{\alpha}$ $\tau\omicron\upsilon$ $\overline{CTX}$ A, distinx. BS 34. $\tau\omicron\upsilon$
 $\overline{AB}$ $\overline{FI}$ A, coniunx BS $\delta\eta$ Hu pro $\delta\epsilon$

διάμετροι, ἔστω δὲ παράλληλος τῇ $ΚΑ$ ἡ $ΓΝ$ ὁ ἄρα περὶ τὴν $ΓΝ$ παράλληλος κύκλος ὁρθός ἐστιν πρὸς τὸν $ΑΒΓΑ$ * * ἡ $ΓΝ$ · ἐφάπεται γὰρ κατὰ τὸ $Γ$, καὶ ἐπεξέχθω ἡ $ΜΝ$ · φημί δὲ ὅτι τῆς κατὰ τὴν $ΠΡ$ εὐθείαν περιφέρειας ἐν τῷ $ΗΘ$ κύκλῳ ἡ κατὰ τὴν $ΞΟ$ εὐθείαν περιφέρεια ἥτις ἔχει βάσιν τὴν ἴσην τῇ $ΞΟ$, μείζων ἐστὶν ἢ διπλασίων τῇ ὁμοιότητι.



Νενοήσθωσαν γὰρ αἱ κοιναὶ τομαὶ πάντων τῶν κύκλων· ἔσονται δὲ αἱ $ΣΞ$ $ΠΤ$ $ΧΜ$ κάθετοι ἐπὶ τὴν $ΓΑ$ καὶ ἐπὶ τὰς $ΚΑ$ καὶ $ΗΘ$ καὶ $ΕΖ$. γεγράφθωσαν δὲ διὰ τῶν $Σ$ $Τ$ $Χ$ καὶ τοῦ $Α$ μεγίστων κύκλων περιφέρειαι αἱ $ΑΥ$ $ΑΦ$ $ΑΧ$ · ὁῦλον δὲ ὅτι δίχα τεμεῖ τὰ ἀπειλημμένα ἡμικύκλια τῶν παραλλήλων κύκλων ἡ $ΑΧ$. ἔχθωσαν δὲ καὶ ἀπὸ τῶν $Ο$ $Ρ$ πρὸς ὁρθὰς ταῖς $ΚΑ$ $ΗΘ$ ἐν τοῖς τῶν ἡμικυκλίων ἐπιπέδοις ἢ τε $ΟΨ$ καὶ ἢ $ΡΑ$ · ἔσονται δὲ αἱ αὗται ἴσαι ταῖς $ΔΞ$ $ΠΤ$, ὥστε ἔσονται αἱ κατὰ τὰς $ΟΞ$ $ΠΡ$ εὐθείας περιφέρειαι αἱ $ΣΨ$ καὶ $ΤΑ$. ὅτι οὖν ἡ $ΣΨ$

1. ἡ $ΓΗ$ $ΑΒ$, sed in $ΑΗ$ vix differt a $Ν$, unde ἡ γρ $Σ$ 2. παρ-

ipsi $\kappa\lambda$ (ergo circulus parallelus circa $\gamma\nu$ descriptus ad ipsum $\alpha\gamma\beta\delta$ perpendicularis est, et communis sectio est $\gamma\nu$; nam in punctis γ ν circulorum circumferentiae se invicem tangunt, et iungatur $\mu\nu$; iam dico circumferentiam, quae est secundum rectam $\xi\theta$ id est, quae basim ipsi $\xi\theta$ aequalem habet, similitudine maiorem esse quam duplam circumferentiam, quae in circulo $\eta\vartheta$ est secundum rectam $\pi\rho$ **).

Intellegantur enim communes sectiones omnium circulorum: rectae igitur $\sigma\xi$ $\tau\pi$ $\chi\mu$ perpendiculares erunt ad rectas $\gamma\delta$ $\kappa\lambda$ $\eta\vartheta$ $\epsilon\zeta$ (elem. II propos. 19, defin. 4.). Iam per puncta σ τ χ et α describantur maximorum circulorum circumferentiae $\alpha\psi$ $\alpha\phi$ $\alpha\chi$; apparet igitur circumferentiam $\alpha\chi$ bifariam secare circulorum parallelorum semicirculos eos qui maximo circulo $\alpha\gamma\beta\delta$ abscinduntur (Theodos. sphaer. 2, 9). Ducantur ab o q in semicirculorum $\kappa\lambda$ $\eta\vartheta$ planis rectae $o\psi$ q,α perpendiculares ad rectas $\kappa\lambda$ $\eta\vartheta$: hae igitur ipsis $\xi\sigma$ $\pi\tau$ aequales erunt¹; ergo circumferentiae $\sigma\psi$ τ,α erunt secundum rectas $\xi\theta$ $\pi\rho$ ***). Iam dico circumferentiam $\sigma\psi$ similitudine maiorem esse quam duplam τ,α ; ergo etiam dimidiam $\sigma\psi$,


** Tacite igitur scriptor haec supponit: sphaerae ac circuli $\alpha\gamma\beta\delta$ centrum esse μ , et ξ π q o esse puncta sectionis rectarum $\gamma\mu$ $\mu\nu$ $\kappa\lambda$ $\eta\vartheta$ in plano circuli $\alpha\gamma\beta\delta$.

1) Scilicet in circulo $\kappa\sigma\psi\lambda$ diametri portio $\xi\theta$ recta $\alpha\mu$ bifariam secatur atque ipsum sectionis punctum circuli centrum est; ergo perpendiculares $\xi\sigma$ $o\psi$ aequaliter a centro distant, itaque propter elem. 8, 14 aequales sunt.

*** Id est, rectae, quae circumferentias $\sigma\psi$ τ,α subtendunt, aequales erunt rectis $\xi\theta$ $\pi\rho$.

$\alpha\lambda\lambda\eta\lambda\omicron\varsigma$ $\chi\acute{\upsilon}\kappa\lambda\omicron\varsigma$ Hu. $\hat{O} \hat{=} A$, $\hat{\Theta} \hat{=} B$, $\chi\acute{\epsilon}\kappa\lambda\omicron\varsigma$ $\pi\alpha\rho\acute{\alpha}\lambda\lambda\eta\lambda\omicron\varsigma$ S, $\theta\epsilon\tau\iota\kappa\omicron\varsigma$ $\pi\alpha\rho\acute{\alpha}\lambda\lambda\eta\lambda\omicron\varsigma$ coni. Co $\tau\acute{o}\nu$ $\overline{AB}$ $\overline{I,I}$ A, distinx. BS 3. . . . η $\overline{FN}$ — $\tau\acute{o}$ $\overline{F}$) continget enim in C. omisso η $\overline{FN}$ Co. $\kappa\alpha\iota$ $\kappa\omicron\iota\tau\eta$ $\tau\omicron\mu\eta$ η $\overline{FN}$ $\epsilon\gamma\acute{\alpha}\phi\omicron\upsilon\tau\alpha\iota$ (scil. $\alpha\iota$ $\pi\epsilon\tau\iota\gamma\acute{\epsilon}\rho\epsilon\tau\alpha\iota$ $\gamma\acute{\alpha}\rho$ $\kappa\alpha\tau\acute{\alpha}$ $\tau\acute{\alpha}$ $\overline{F,N}$ Hu 41. $\tau\acute{o}\nu$ $\overline{CTX}$ A, distinx. BS 11, 12. $\alpha\iota$ $\overline{AF}$ $\overline{AX}$ $\overline{AY}$ ABS, transposuit Co 13. $\tau\acute{o}\nu$ $\overline{OP}$ A, distinx. BS $\tau\alpha\iota\varsigma$ $\overline{KA}$ $\overline{I,N}$ $\overline{G}$ A. $\tau\acute{o}$ coniunx. BS, H4 corr. Hu 13. ϵ $\tau\epsilon$ $\overline{OT}$ ABS, corr. Co $\delta\eta$ Hu pro $\delta\epsilon$ quae erunt aequales Co 17. $\Sigma\psi$ Co utroque loco pro $\overline{CH}$ $\kappa\alpha\iota$ $\overline{T,I}$ $\kappa\alpha\iota$ $\overline{T,2}$ coni. Hu, ac similiter posthac

περιφέρεια τῆς TA περιφερείας μείζων ἐστὶν ἢ διπλῇ ὁμοιότητι [τῆς TA · ὅτι ἄρα καὶ ἡμίσεια ἡ $\Sigma\Xi$ περιφέρεια τῆς TC περιφερείας μείζων ἐστὶν ὁμοιότητι ἢ διπλασίων. καὶ ἐστὶν ἡ μὲν $\Sigma\Xi$ τῇ YX ὁμοία, ἡ δὲ TC τῇ ΦX [ἡ δὲ YX τῆς TC μείζων]· ὁμοιότητι ἄρα ἡ YX περιφέρεια τῆς ΦX μείζων ἐστὶν [ὁμοιότητι] ἢ διπλασίων.



ἐστὶν δέ, ἐπεὶ περ ἴση ἐστὶν ἡ ΣT τῇ TX περιφέρειᾳ, καὶ διὰ τοῦ πόλου καὶ τῶν $T X$ σημείων μέγιστοι κύκλοι γεγραμμένοι εἰσὶν· τοῦτο γὰρ ἐν τοῖς σφαιρικοῖς ἀποδεδείχται.
126 νῦν. Καὶ τὸ παραλειφθὲν δὲ εἰς τὸ ιβ' καὶ ιγ'.

Τῶν ἐν τῷ μετὰ τὸν καρχίνον ἡμικυκλίῳ περιφερειῶν ἡ τεχοῦσα περιφέρεια ἐν πλείονι χρόνῳ ἀνατέλλει ἢ δύνει, τῶν δὲ ἐν τῷ λοιπῷ ἡμικυκλίῳ, ὃ ἐστὶν μετὰ τὸν αἰγώκερω, ἡ τεχοῦσα ἐν πλείονι χρόνῳ δύνει ἢ ἀνατέλλει.

Ἐστω γὰρ ἐν σφαίρᾳ ὁρίζων ὁ $AB\Gamma$, ζῳδιακοῦ δὲ τὸ 15 μετὰ τὸν καρχίνον ἡμικύκλιον ἐν τῷ φανερῷ ἡμισφαίριῳ $A\Lambda Z$ τὸ A ἄρα καρχίνον· ἰσχυόμενον τοῦ ἡμικυκλίου ἐπὶ τῇ δύνει, καὶ ἔστω θερινοῦ τροπικοῦ τὸ ἐπὶ γῆν τμήμα τὸ $A\Lambda\Gamma$, καὶ ἀφ' ἡμέρας τις τοῦ ζῳδιακοῦ περι-

id est circumferentiam $\sigma\zeta$, similitudine maiorem quam $\tau\alpha$, id est quam duplam $\tau\zeta$. Atque est

$$\sigma\zeta \sim \nu\chi, \text{ et}$$

$$\tau\zeta \sim \phi\chi; \text{ dico igitur similitudine esse}$$

$$\nu\chi > 2\phi\chi.$$

Est vero; quoniam ex hypothesis circumferentiae $\sigma\tau$ $\tau\chi$ aequales, et per polum et puncta $\tau\chi$ maximi circuli descripti sunt; hoc enim in Theodosii sphaericis 3, 6 demonstratum est².

LIX. Iam sequitur illud quod praetermissum esse diximus ad theorematum XII et XIII demonstranda (supra p. 601. 603).

Circumferentiarum, quae sunt in semicirculo post can-^{Prop. 61}
crum, quaelibet maiore tempore oritur quam occidit, earum autem, quae sunt in altero semicirculo, id est post capricornum, quaelibet maiore tempore occidit quam oritur.

Sit enim in sphaera horizon $\alpha\beta\gamma$, et in aperto hemisphaerio zodiaci semicirculus, qui post cancrum est, $\alpha\delta\zeta$ (ergo α cancri principium est praecedens semicirculum in occasu, et sit aestivi tropici portio super terram $\alpha\eta\gamma$, et abscindatur quaedam zodiaci circumferentia $\delta\epsilon$); dico circumferentiam $\delta\epsilon$ maiore tempore oriri quam occidere¹.

² Conf. supra propos. 21. Ceterum recte Commandinus adnotat a scriptore huius loci analyticam demonstrandi formam adhibitam esse.

⁴ Hoc loco scriptor tacite supponit punctum δ inter α et positum esse, quemadmodum ex figura perspicitur.

¹ Figuram delineavimus similem ei quae antiquitus tradita est. Conferatur tamen illa quoque forma quam Commandinus finxit.

1. η $\delta\pi\lambda\eta$ super vs. add. A¹ 2. $\tau\eta\varsigma$ $T\Delta$ del. Hu auctore Co
 $T\Delta$ $\delta\tau\epsilon$ $\alpha\rho\alpha$ A² in rasura η $\epsilon\sigma$ Hu pro η $\epsilon\tau$ 3. $\tau\eta\varsigma$ $\tau\chi$ Hu
auctore Co pro $\tau\eta\varsigma$ $\alpha\zeta$ 5. η $\delta\epsilon$ — $\mu\epsilon\lambda\omega\tau\epsilon\tau$ del. Co 6. $\delta\omega\sigma\iota\sigma\tau\eta\tau\iota$
del. Hu auctore Co 8. $\tau\omega\upsilon\tau$ $\tau\chi$ A, distinx. BS 10. $\tau\delta$ add.
B;S) $\pi\alpha\rho\alpha\iota\eta\gamma$ $\delta\iota\upsilon$ S $\iota\beta$ $\kappa\alpha\iota$ $\iota\gamma$ A, $\delta\omega\delta\epsilon\chi\alpha\tau\omega\upsilon$ $\kappa\alpha\iota$ $\tau\epsilon\pi\iota\chi\alpha\upsilon\delta\epsilon$
 $\chi\alpha\tau\omega\upsilon$ BS 15. $\zeta\omega\delta\iota\alpha\kappa\omega\upsilon$ A, $\zeta\omega\delta\iota\alpha\kappa\omega\upsilon$ BS, item vs. 19 et p. 628, 17
17. $\bar{O}$ ABS, $\alpha\rho\chi\eta$ coll. cap. 129 med., vel $\alpha\rho\chi\tau\iota\chi\omega\upsilon$ coll. cap. 124 conl.
Hu, "videtur nota illa O significare principium signi, quemadmodum et
in omnibus tabulis apud Latinos" Co $\eta\gamma\omega\upsilon\mu\epsilon\tau\omega\upsilon$ ABS, corr. Co
19. $\tau\delta$ $A\eta\Gamma$ Hu pro $\tau\delta$ $A\eta$

φέρεια ἢ EA · λέγω ὅτι ἡ AE ἐν πλείονι χρόνῳ ἀνατέλλει ἢ δίνει.

127 Γεγραφήθωσαν γὰρ διὰ τῶν AE παράλληλοι κύκλοι οἱ BA · $NOEK$ · γίνεται ἄρα μείζων ἢ ὁμοία ἢ μὲν AA τῆς SE , ἢ δὲ EN τῆς AB · προανατέλλει ἄρα τὸ A ἢ γού-
μενον τοῦ E ἐπομένου, ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ A , τοῦ E ἀρ-
ξαμένου ἀπὸ τοῦ S , ὥστε μείζων ἐστὶν ἢ ὁμοία ἢ AA τῆς ES , ὅτι καὶ ὁ χρόνος ἐστὶν μείζων [προανατέλλει, καὶ ὅτι
τὸ A τοῦ E προδίνει κατὰ τὸ B ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ A
καὶ τὸ E δίνει κατὰ τὸ N ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ E · ἐλάσσων 10
γὰρ ἐστὶν ὁ χρόνος τοῦ A ἢ τοῦ E]· ὥστε ἐλάσσων ἐστὶν
ἢ ὁμοία ἢ BA τῆς EN . γεγραφήθωσαν δὲ διὰ τῶν B A
μέγιστοι κύκλοι ἐφαπτόμενοι τοῦ AHI · οἱ OBM K · IAH ·
ἢ ἄρα AE περιφέρεια ἀνατελεῖ μὲν θέσιν ἔχουσα τὴν K · A ,
ὅταν τὸ K τὴν $K\Sigma$ περιφέρειαν διέλθῃ, δόσεται δὲ θέσιν 15
ἔχουσα τὴν $B\Theta$, ὅταν τὸ Θ τὴν ΘN περιφέρειαν διέλθῃ
[καὶ γὰρ αἱ θέσεις εἰσὶν τοῦ αὐτοῦ κύκλου τοῦ $\zeta\phi\delta\iota\alpha\kappa\omicron\upsilon$
αἱ AE $MB\Theta$ H · IK , μεταξὺ ὁμοίας περιφερείας ἔχουσαι
τάς τε AH AA EK καὶ τὰς MA BA ΘE · ὥστε μείζων
ἐστὶν ἢ ὁμοία ἢ μὲν AA τῆς ES , ἢ δὲ EN τῆς BA , ὡς 20
καὶ ἐδείχθη]. ἔτι τε ἴσαι εἰσὶν αἱ HK AE $M\Theta$ [κατέρα
γὰρ τῶν $M\Theta$ HK ἴσαι ἐστὶν τῇ AE , ὥστε καὶ ἐφαρμόζει
καὶ ἅμα τὰ K A H ἐπὶ τὰ E A A ἵξει. ὁμοίως καὶ τὰ
 E A A ἐπὶ τὰ Θ B Γ ἵξει ἴσαι γὰρ εἰσὶν καὶ αἱ K A

2. τῶν AE A , *distinx.* BS 3. ἢ οἱ BA AE EK ABS , *corr.* Co

4. 5. γίνεται — τῆς AB *interpolatori tribuit Hu* 6. 7. τὸ δὲ E ἀρξά-
μενον ABS , *corr.* Hu 8. προανατέλλει — 11. τοῦ E *interpolatori*

tribuit Hu 10. post ἀπὸ τοῦ E *add. παρερὸν Hu* 12. τῶν BA A ,
distinx. BS 13. τοῦ AHI Hu pro τοῦ AI οἱ $\Theta\beta\mu$ B , οἱ ΘB A

$A\Sigma$ 14. ἀνατέλλει ABS , *corr.* Hu 17. καὶ γὰρ — 24. ἵξει *forsitan*
ab eodem interpolatore, qui absurda illa ἴσαι γὰρ etc. scripsit, ad-

dita sint 18. HAK Co pro HK A 23. καὶ ante ἅμα, Hu pro
 $\xi\iota$ τὰ K AI AB , *distinx.* S τὰ E AA A , *distinx.* BS, item proximo

vs. 24. τὰ ΘB Γ A , *distinx.* BS ἅμα ante ἵξει *add.* B ἴσαι
γὰρ — p. 630, 1. περιφερείας *interpolatori tribuit Hu*

λ ad δ , η ad α pervenient ⁴⁾. Similiter etiam ϵ ad ϑ , δ ad β , α ad μ simul pervenient. Dico circumferentiam $\alpha\chi$ maiorem esse quam $\nu\vartheta$.

Quoniam enim $\delta\lambda$ ipsi $\epsilon\chi$, et $\beta\delta$ ipsi $\vartheta\epsilon$ similis est, erit igitur tota $\beta\lambda$ toti $\vartheta\chi$ similis. Sed $\beta\lambda$ similitudine maior est quam $\nu\sigma^{**}$; ergo etiam $\vartheta\chi$ similitudine maior est quam $\nu\sigma$. Et sunt eiusdem circuli portiones; ergo $\vartheta\chi$ maior est quam $\nu\sigma$. Communis auferatur $\vartheta\sigma$; restat igitur $\alpha\chi$ maior quam $\nu\vartheta$ [id est, tempus quo $\delta\epsilon$ oritur maius est tempore quo eadem occidit]. Et quia propter theorema XI Euclidis phaenomenon ex aequalibus et secundum diametrum oppositis zodiaci circumferentiis quo tempore una oritur altera occidit, et quo tempore una occidit altera oritur, circumferentia igitur ipsi $\delta\epsilon$ aequalis ac secundum diametrum opposita sumitur in altero semicirculo qui a capricorno principium habet, eaque maiore tempore occidere quam oriri demonstrabitur.

LX. Iisdem suppositis sit in altero theorematis casu semicirculi qui est post capricornum portio supra terram $\alpha\epsilon\zeta$, et abscindatur quaelibet circumferentia $\delta\epsilon$; dico circumferentiam $\delta\epsilon$ maiore tempore occidere quam oriri.

4) Accuratus sic fere scribendum erat: "ac propter Theodosii sphaer. 2, 13 est $\eta\lambda = \alpha\delta = \mu\beta$, et $\lambda\chi = \delta\epsilon = \beta\vartheta$; itaque $\eta\lambda\alpha\delta\epsilon$ $\mu\beta\vartheta$ inter se congruent" etc.

**): Theodosii sphaer. 2, 20 citat Commandinus; at nobis aut figurae delineatio aut Graeca verba corrupta esse videntur.


5. 6. $\tau\eta$ $\overline{CN}$ AB, $\tau\eta$ $\overline{r\sigma}$ S, corr. Hu auctore Co 7. $\mu\epsilon\lambda\lambda\omega\nu$ S, M AB¹, η B³ 9. 10. δ ἀνατολικός — $\chi\rho\acute{o}\nu\alpha\nu$ interpolatori tribuit Hu rectius eadem ponebantur post $\tau\eta\varsigma$ ΘN ; 10. $\delta\iota\alpha$ τὸ Hu pro τοῦ $\overline{A} A$, $\iota\alpha'$ B, $\iota\alpha\delta\epsilon\kappa\alpha\tau\omicron\nu$ S 11. $\epsilon\nu$ $\tilde{\phi}$ $\chi\rho\acute{o}\nu\omega$ del. Hu, τοῦ τῶν $\zeta\omega\delta\iota\alpha\iota\nu$ $\chi\upsilon\kappa\lambda\omicron\nu$ secundum Euclidem coni. Co 11. 12. $\alpha\delta$ — $\alpha\delta\alpha\iota$; τῶν $\epsilon\sigma\tau\omega\nu$ $\tau\epsilon$ καὶ ἀπεναντίον περιγεγραμῶν Eucl. 13. καὶ $\epsilon\nu$ $\tilde{\phi}$ $\chi\rho\acute{o}\nu\omega$; $\epsilon\nu$ $\tilde{\phi}$ $\delta\iota$ Eucl. 12. 13. $\epsilon\tau\epsilon\rho\alpha$ ἀνατέλλει — $\delta\upsilon\rho\epsilon\iota$ (ante η $\epsilon\tau\epsilon\rho\alpha$) add. A² in marg. (BS) 13. $\tau\eta$ Hu auctore Co pro $\tau\eta\varsigma$ 15. O ABS, om. Co, ἀρχαίμενω vol ἀρχαίω coll. cap. 127 et 121 coni. Hu 16. 17. δ γὰρ — $\delta\upsilon\sigma\tau\omega\varsigma$ interpolatori tribuit Hu 17. η BS, om. A 18. $\xi^{\prime\prime\prime}$ addl. B S; 20. $\gamma\eta\nu$ B Paris. 2368, $\tau\eta\nu$ A¹, $\gamma\eta\nu$ A²S

Κατεσκευάσθω γὰρ τὰ αὐτά. ἐπεὶ οὖν τὸ *A* ἀρχὴ
 ἐστὶν καρκίνου ἐπόμενον τῷ ἡμικυκλίῳ, καὶ τὸ *Z* ἡγοί-
 μενον αἰγόκερω ἀρχή, ἐστὶν ἄρα τὸ *Z* δυτικὸν καὶ τὸ *A*
 ἀνατολικόν· ἡ *AE* ἄρα ἀνατέλλει μὲν θέσιν ἔχουσα τὴν
BΘ, ὅταν τὸ *Θ* τὴν *NΘ* διέλθῃ ὥστε καὶ ἀνατέλλει τὸ *A*⁵
 ἐπόμενον τῇ *AE* περιφερείᾳ, ὡς τρόπον πρὸς τῇ ἀνατολῇ
 κατὰ τὸ *B*, καὶ τοῦ *E* ἡγουμένου ὄντος ἐπὲρ γῆν κατὰ τὸ
Θ, ὅταν τὴν *EN* περιφέρειαν διέλθῃ ἀπὸ τῆς ἀνατολῆς
 τοῦ *N*], δίνει δὲ θέσιν ἔχουσα τὴν *KA*, ὅταν τὸ *K* τὴν
KΣ διέλθῃ ὥστε καὶ ἔδυνεν τὸ *E* ἡγούμενον τῆς *AE* πε-¹⁰
 ριφερείας προδυνούσης τῆς *KΣ* περιφερείας τοῦ *A* ἐπο-
 μένου ὄντος κατὰ τῆς θέσεως τοῦ *A*. καὶ ἐδείχθη πρό-
 τερον ἢ *ΣΚ* τῆς *NΘ* μείζων, ὥστε ὁ χρόνος ὁ δυτικὸς ἐστὶν
 μείζων ἢ ὁ ἀνατολικὸς τῆς *EA* περιφερείας, ὁ τῆς *ΣΚ*
 τῆς *ΘΝ*.

130 Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἱκανὰ τοῦ συντάγματος Εὐκλείδου
 τῶν φαινομένων μόνον ἔνεκον, ὅτι δὲ τὰ περὶ τὰς ἀνατο-
 λὰς καὶ θέσεις τῶν τοῦ ζωδιακοῦ δωδεκατημορίων ἀτελῇ
 καθέστηκεν, οἴμαι καὶ αὐτόν σε μὴ ἀγνοεῖν. ἔλαστα δὲ
 τούτων ἀπαρалаίπτως ἔνεστί σοι καὶ ῥηδίως ἐντυγχάνοντι²⁰
 τοῖς ἐπὶ τοῦ Πτολεμαίου πεπρωγματευμένοις περὶ τούτων
 συντάγμασιν ἐπιγινώσκειν.

2. ἐπόμενον, eraso ε, A, corr. BS τοῦ ἡμικυκλίου ABS, corr.
 Hu auctore Co 3. ὥστε — 9. τοῦ *N* interpolatori tribuit Hu
 5. 6. τοῦ *A* ἐπόμενον conl. Co 8. ὅταν add. Hu auctore Co
 9. ἔχουσα Hu pro ἔχον 10. ὥστε — 12. τοῦ *A* interpolatori tribuit
 Hu 10. τὸ *E* ἡγούμενον] ἡγουμένης ABS, τοῦ *E* ἡγουμένου conl. Co.
 corr. Hu 12. ὄντος πρὸς τῇ δύσει κατὰ τὸ *A* conl. Co 18. ζω-
 διακοῦ A, ζωδιακοῦ BS δωδεκάτη μορίων A, conlunx. B [δωδεκατη-
 μορίου S] 20. καὶ add. Hu auctore Co 22. post ἐπιγινώσκου
 add. παππου αλεξανδρῆ συναγωγῆς πᾶσι εχει δε των εντ μικρῶι αστρο-
 νομομετω θεωρηματ απόρων λυσεις A³ τέλος τοῦ 20^{ου} τῆς συναγωγῆς
 παππου τοῦ ἀλεξανδρῆως B, τέλος τοῦ ἔκτου τῶν συναγωγῶν Πάππου S

Construantur enim eadem. Iam quia α principium cancri est semicirculum sequens, et ξ semicirculum praecedens, principium capricorni, occidentale igitur est ξ et orientale α .



Ergo circumferentia $\delta\epsilon$ oritur positionem $\beta\theta$ habens, cum punctum θ ipsam $\nu\theta$ percurrit, occidit autem positionem $\lambda\kappa$ habens, cum punctum κ ipsam $\sigma\kappa$ percurrit. Et supra demonstravimus $\sigma\kappa$ maiorem quam $\nu\theta$; itaque maiore tempore $\sigma\kappa$ occidit quam $\nu\theta$ oritur, id est. tempus occasus circumferentiae $\delta\epsilon$ maius est tempore ortus.

Sed haec satis sint. quantum de solo Euclidis phaenomenon libro agitur; at vero ea quae ad ortus et occasus zodiaci signorum pertinent imperfecta illum reliquisse te ipsum non ignorare arbitror. Quorum quidque, si Ptolemaei libros de his rebus conscriptos adieris, plene ac facile tibi cognoscere licebit.

ΠΑΠΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ Ζ.

Περιέχει δὲ λήμματα τοῦ ἀναλυομένου.

1 Ὁ καλούμενος ἀναλύμενος, Ἐρμόδωρε τέχνην, κατὰ σέλληψιν ἰδία εἰς ἔστιν ἔλ, παρεσκευασμένη μετὰ τὴν τῶν κοινῶν στοιχείων ποιήσιν τοῖς βουλομένοις ἀναλυμβάταιν· ἐν γραμμαῖς δὲναμιν εἴρειτιζήν τῶν προτεινομένων αὐτοῖς προβλημάτων, καὶ εἰς τοῦτο μόνον χρησίμη καθιστώσα. γέγραπται δὲ ἐπὶ τριῶν ἀνδρῶν, Εὐκλείδου τε τοῦ στοιχειωτοῦ καὶ Ἀπολλωνίου τοῦ Περγαίου καὶ Ἀρισταίου τοῦ Περσευτέρου, κατὰ ἀνάλυσιν καὶ σύνθεσιν ἔχουσα τὴν ἑρ-¹⁰ δον. ἀνάλυσιν τοίνυν ἐστὶν ὁδὸς ἀπὸ τοῦ ζητουμένου εἰς ὁμολογουμένου διὰ τῶν ἑξῆς ἀκολουθῶν ἐπὶ τι ὁμολογούμενον συνθέσει· ἐν μὲν γὰρ τῇ ἀναλύσει τὸ ζητούμενον ὡς γερονὸς ἐποθέμενοι τὸ ἐξ οὗ τοῦτο συμβαίνει σκοποῦμεθα καὶ πάλιν ἐκείνου τὸ προηγούμενον, ὥς ἂν οὕτως ἀναπο-¹⁵ δίζοντες καταντίσωμεν εἰς τι τῶν ἡδὴ γνωριζομένων ἢ τάξις ἀρχῆς ἐχόντων· καὶ τὴν τοιαύτην ἔφοδον ἀνάλυσιν καλοῦμεν, οἷον ἀνάπαλιν λέσιν· ἐν δὲ τῇ συνθέσει ἐξ ὑποστροφῆς τὸ ἐν τῇ ἀναλύσει καταληφθὲν ὕστατον ἵποστι-²⁰ σάμενοι γερονὸς ἡδὴ, καὶ ἐπόμενα τὰ ἐκεῖ ἐνταῦθα προηγούμενα κατὰ φύσιν γάξαντες καὶ ἀλλήλοις ἐπισυνθέντες, εἰς τέλος ἀφικνούμεθα τῆς τοῦ ζητουμένου κατασκευῆς· καὶ τοῦτο καλοῦμεν σύνθεσιν.

2 Λιτὸν δ' ἐστὶν ἀναλύσεως γένος, τὸ μὲν ζητητικὸν τάληθοῖς, ὃ καλεῖται θεωρητικόν, τὸ δὲ ποριστικὸν τοῦ²⁵ προταθέντος λέγειν, ὃ καλεῖται προβληματικόν. ἐπὶ μὲν

1— p. 640, 2. σημείου ed. David. Gregorius in praef. ad Euclidis quae supersunt omnia, Oxoniae 1703; de Edmundi Halley editione vide nostram praef. vol. I p. xix 4. 2. παππου αλεξανδρι

συναγωγῆς ἢ περιέχει δε λήμματα τοῦ ἀναλυομένου Α³ ΠΑΠΠΟΥ αλεξανδρείας συναγωγῶν μαθηματικῶν τὸ ἔβδομον. περιέχει δὲ λήμματα τοῦ ἀναλυομένου SV et, ut videtur, B 2. τοῦ ἀναλυομένου τόπον Gregorius et Ha 11. ἑστὶν ἔφοδος V 13. ἐν ante συνθέσει add. S Gregor. Ha γὰρ om. Gregor. et Ha 14. οὗ τοῦ | τοῦτο

Pappi Alexandrini collectionis liber VII.

Continet lemmata loci de resolutione.

Locus qui ἀναλόμενος dicitur, Hermodore fili, ut paucis comprehendam, est propria quaedam materia in eorum usum parata qui, absolutis communibus elementis, in linearum constructione facultatem problematum quae proponuntur solvendorum¹; sibi comparare volunt. estque ad hoc solum ea disciplina utilis. Quae quidem tractata a tribus viris. Euclide elementorum scriptore, Apollonio Pergaeo, Aristaeo maiore, procedit per resolutionem et compositionem. Resolutio igitur est ea via ac ratio, qua a quaesito tanquam concessio per ea quae deinceps consequuntur perducimur ad id quod compositione conceditur². Nam in resolutione, id quod quaeritur tanquam factum supponentes, illud unde hoc contingit et rursus, quid illi antecesserit. consideramus, donec ita regredientes in aliquid, quod iam cognitum sit vel in numero principiorum habeatur, incidimus, atque eiusmodi rationem, quoniam veluti retro sit solutio, ἀνάλυσιν vocamus. In compositione autem vicissim illud, quod in resolutione ultimum effecimus. utpote iam factum praemittentes. eaque quae illic praecedunt secundum rei naturam sequentia collocantes et alterum alteri copulantes postremo constructionem quaesiti absolvimus, idque σύνθεσιν appellamus.

Duo autem sunt resolutionis genera, quorum alterum, quoniam in vero inquirendo versatur, θεωρητικόν sive *speculativum* dicitur, alterum inveniendi proposito inservit ac προβληματικόν vocatur. In speculativo igitur genere primum

1) Conf. Vincent. p. 46 commentarii in praef. vol. I p. xxi citati.

2) Conf. schol. in Euclid. elem. 13, 4 (vol. II p. 303 ed. Augusti). Nesselmann, *Geschichte der Algebra* I p. 59 sq., Herm. Hankel, *Geschichte der Mathematik*. Lipsiae 1874, p. 427 sqq.

A. corr. BS 43. τῇ ante συνθέσει om. Ge 20. ἐπόμενα τὰ Hu
pro τὰ ἐπόμενα ἐπταῦθα del. Hu 24. τὸ μὲν γὰρ Gregorius
26. προτιθέντος Gregorius et Ha invitis ABS λέγειν del. Hu

οὖν τοῦ θεωρητικοῦ γένους τὸ ζητούμενον ὡς ὃν ὑποθέμε-
 νοι καὶ ὡς ἀληθές, εἴτα διὰ τῶν ἐξῆς ἀκολούθων ὡς ἀλη-
 θῶν καὶ ὡς ἔστιν καθ' ὑπόθεσιν προελθόντες ἐπὶ τι ὁμο-
 λογούμενον, εἰ μὲν ἀληθές ἢ ἐκεῖνο τὸ ὁμολογούμενον,
 ἀληθές ἐσται καὶ τὸ ζητούμενον, καὶ ἡ ἀπόδειξις ἀντί-
 στροφος τῇ ἀναλύσει, εἰ μὲν δὲ ψεύδει ὁμολογουμένῳ ἐντί-
 χωμεν, ψεῦδος ἐσται καὶ τὸ ζητούμενον. ἐπὶ δὲ τοῦ προ-
 βληματικοῦ γένους τὸ προταθὲν ὡς γνωστὸν ὑποθέμενοι,
 εἴτα διὰ τῶν ἐξῆς ἀκολούθων ὡς ἀληθῶν προελθόντες ἐπὶ
 τι ὁμολογούμενον, εἰ μὲν τὸ ὁμολογούμενον δυνατόν ἢ καὶ 10
 ποριστόν, ἢ καλοῦσιν οἱ ἀπὸ τῶν μαθημάτων δοθέν, δε-
 νυτὸν ἐσται καὶ τὸ προταθὲν, καὶ πάλιν ἡ ἀπόδειξις ἀντί-
 στροφος τῇ ἀναλύσει, εἰ μὲν δὲ ἀδυνάτῳ ὁμολογουμένῳ ἐντί-
 χωμεν, ἀδύνατον ἐσται καὶ τὸ πρόβλημα.

Διορισμὸς δὲ ἐστὶν προδιαστολὴ τοῦ πότε καὶ πῶς 15
 καὶ ποσαυχῶς δυνατόν ἐσται καὶ τὸ πρόβλημα.

Τοσαῦτα μὲν οὖν περὶ ἀναλύσεως καὶ συνθέσεως.

- 3 Τῶν δὲ προειρημένων τοῦ ἀναλυομένου βιβλίων ἡ τάξις
 ἐστὶν τοιαύτη· Εὐκλείδου δεδομένων βιβλίον α', Ἀπολλω-
 νίου λόγον ἀποτομῆς β', χωρίου ἀποτομῆς β', διωρισμένης 20
 τομῆς δύο, ἐπαφῶν δύο, Εὐκλείδου πορισμάτων τρία,
 Ἀπολλωνίου νεύσεων δύο, τοῦ αὐτοῦ τόπων ἐπιπέδων δύο,
 κωνικῶν ἡ', Ἀρισταίου τόπων στερεῶν πέντε, Εὐκλείδου
 τύπων τῶν πρὸς ἐπιφανείᾳ δύο, Ἑρατοσθένους περὶ με-
 σοτήτων δύο. γίνεται βιβλία λγ', ὧν τὰς περιοχὰς μέχρι 25
 τῶν Ἀπολλωνίου κωνικῶν ἐξεθέμεν σοι πρὸς ἐπίσκεψιν,
 καὶ τὸ πλῆθος τῶν τόπων καὶ τῶν διορισμῶν καὶ τῶν
 πτώσεων καθ' ἕκαστον βιβλίον, ἀλλὰ καὶ τὰ λήμματα τὰ
 ζητούμενα, καὶ οὐδεμίαν ἐν τῇ πραγματείᾳ τῶν βιβλίων
 καταλέλοιπα ζῆτησιν, ὡς ἐνόμιζον.

3. 3. ἀληθῶν καὶ B'S, ἀληθῶς καὶ A 8. καὶ ὡς ὄντων καθ'
 ἐπ. Hu 5. προτεθέν Gregorius et Ha. Item vs. 12 9. ἀληθῶς
 AB, corr. S 15. 16. Διορισμός — πρόβλημα interpolatori tribuit
 Hu 16. καὶ inepte repetitum ex vs. 14 del. Gregorius et Ha
 20. 21. ἀποτομῆς B δύο· ἐπαφῶν δύο AB, ἀποτομῆς δύο, ἐπαφῶν
 δύο S, corr. Ha 24. τόπων πρὸς ἐπιφανείαν ABS, corr. Hu coll. IV

id quod quaeritur re vera ita se habere statuimus. tum per ea quae deinceps consequuntur, tanquam vera sint et per hypothesim firmata, ad aliquid concessum progredimur. quod quidem si verum sit, verum etiam erit id quod quaerimus. et demonstratio vice versa resolutioni respondebit: contra si in aliquid quod falsum esse constat inciderimus, falsum etiam erit id quod quaerimus. In problematico autem genere, cum id quod propositum est tanquam cognitum subiecimus, iam per ea quae deinceps consequuntur, tanquam vera sint, ad aliquid concessum progredimur: quod concessum si fieri et suppeditari possit quod mathematici datum appellant, fieri etiam propositum poterit et rursus demonstratio vice versa resolutioni respondebit: contra si in aliquid quod falsum esse constat inciderimus, itidem problema fieri non poterit.

[Determinatio est praevia quaedam distinctio, quando et qua ratione et quot modis problema fieri possit.]

Haec quidem de resolutione et compositione dicta sunt.

Illorum librorum, quibus de loco ἀναλυόμενῳ sive resolutio agitur, ordo hic est. Euclidis datorum liber unus, Apollonii de proportionis sectione libri duo, de spatii sectione duo, de sectione determinata duo, de tactionibus duo, Euclidis porismatum libri tres, Apollonii inclinationum libri duo. eiusdem locorum planorum duo, conicorum octo, Aristaei locorum solidorum libri quinque, Euclidis locorum qui sunt ad superficiem libri duo¹, Eratosthenis de medietatibus libri duo. Omnino igitur sunt libri triginta tres, quorum argumenta usque ad Apollonii conica tibi inspicienda proposui, et numerum locorum, determinationum, casuum, qui sunt in unoquoque libro, nec minus lemmata quae requiruntur, attuli. neque ullam quaestionem in eorum librorum tractatione a me omissam esse existimo.

4) Conf. supra IV propos. 28.

4 Περιέχει δὲ τὸ πρῶτον βιβλίον, ἥπερ ἐστὶν τῶν δεδομένων, ἅπαντα θεωρήματα ἐναντίοντα· ὧν πρῶτα μὲν καθόλου ἐπὶ μεγεθῶν [διαγράμματα] κ', τὸ δὲ δ' καὶ κ' ἐν εὐθείαις ἐστὶν ἀνάλογον ἄνευ θέσεως. τὰ δὲ ἐξῆς τοῖς ιδ' ἐν εὐθείαις ἐστὶν θέσει δεδομέναις. τὰ δὲ τοῖς ιξῆς ι' ἐπὶ τριγώνων ἐστὶν τῇ εἵδει δεδομένων ἄνευ θέσεως. τὰ δὲ ἐξῆς τοῖς ις' ἐπὶ τετράγωνων ἐστὶν εὐθυγράμμων χωρίων εἵδει δεδομένων ἄνευ θέσεως. τὰ δὲ ἐξῆς τοῖς ις' ἐν παραλληλογράμμοις ἐστὶ καὶ παραβολαῖς εἵδει δεδομένων χωρίων. τῶν δὲ ἔχοντων ε' τὸ μὲν πρῶτον γραφόμενόν ἐστιν, τὰ δὲ δ' ἐπὶ τριγώνων χωρίων, ὅτι αἱ διαφοραὶ τῶν δυνάμεων τῶν πλεονῶν πρὸς ταῦτα τὰ τρίγωνα χωρία λόγον ἔχουσιν δεδομένον. τὰ δὲ ἐξῆς ζ' ἕως τοῦ ο' καὶ γ' ἐν δυοῖ παραλληλογράμμοις, ὅτι διὰ τὰς ἐν ταῖς γωνίαις ὑποθέσεις ἐν δεδομένοις ἐστὶν λόγοις πρὸς ἄλληλα· ἓνα δὲ τούτων ἐπιλόγους ἔχει ὁμοίους ἐν δυοῖ τριγώνοις. ἐν δὲ τοῖς ἑφεξῆς ς' διαγράμμασιν ἕως τοῦ ο' καὶ θ' δύο μὲν ἐστὶν ἐπὶ τριγώνων, δ' δὲ ἐπὶ πλειόνων εὐθειῶν ἀνάλογον οὖσων. τὰ δὲ ἐξῆς γ' ἐπὶ δύο εὐθειῶν ἀνάλογον οὖσων, τὰ δ' ἐστὶν] δοθέν τι περιεχουσῶν χωρίον. τὰ δὲ ἐπὶ πᾶσιν ι' ἕως τοῦ C' ἐν κέλαις δαίνονται

1. in marg. δεδομένα α add. A³; verum Pappus ipse et hic et infra, ubicunque librorum appellationes contextui inseruit (ut hoc loco τὸ πρῶτον βιβλίον, ὅπερ ἐστὶν τῶν δεδομένων. titulis superscribendis abstinuit; posuit autem eiusmodi titulos inde a cap. 21 huius edit.

2. πρῶτον ABS Gregor., corr. V Hu 3. εἰσι, quot sunt theoremata. tot etiam figuræ, tamen διαγράμματα alienum est ab hoc loco, quia θεωρήματα statim præcessit I καὶ τὸ α ABS, xδ V², corr. Hu

3. 6. τὰ δὲ ἐξῆς τοῖς ις' V 6. ι' add. Gregor. et Ha τριγώνου AB, corr. S 9. ἐστὶ Hu pro ἔτι 11. γραφόμενόν ἐστιν "est in lineis" Co; conf. Euclid. dat. prop. 62: ἐὰν δύο εὐθελται πρὸς ἀλλήλας

λόγον ἔχωσι δεδομένον καὶ ἀπαρχαῇ ἀπὸ μὲν μιᾶς δεδομένην τοῖ εἵδει εἶδος cel., quæ cum fugerent Halleium, γραφόμενον asterisco notavit et sic vertit: "e quinque autem sequentibus primum iam descriptum est" τὰ δὲ δ' in datorum recensione, quam nostri codices præbent, sunt quinque, nempe prop. 62—67 conf. infra. 13. 14. ἕως τοῦ ο' καὶ γ' in nostris datorum editionibus usque ad prop. 74 (conf. ad vs. 41)

17. 18. ἐν δὲ τοῖς ἑφεξῆς ς' — δ' in nostris datorum editionibus sunt

DATORUM LIBER.

..... *Primus liber, qui est datorum, omnino theoremata nonaginta*¹⁾ *continet. Quorum priora viginti tria omnino sunt de magnitudinibus; quartum autem et vicesimum est in rectis lineis proportionalibus sine positione. Sequuntur quattuordecim in rectis lineis positione datis. Proxima decem de triangulis sunt specie datis sine positione; proxima septem de quibuscumque spatiis rectilineis specie datis sine positione; proxima sex in parallelogrammis sunt et applicationibus spatiorum specie datorum. Eorum autem quinque quae deinceps sequuntur primum quidem est in lineis, quattuor autem de triangulorum areis demonstrant differentias laterum secum multiplicatorum ad ipsas triangulorum areas proportionem habere datam. Proxima septem usque ad septuagesimum tertium in binis parallelogrammis demonstrant haec parallelogramma iuxta angulorum hypotheses proportionem datam inter se habere; quaedam autem ex his epilogos similes habent in binis triangulis. Proximorum sex diagrammatum usque ad septuagesimum nonum duo sunt de triangulis, quattuor de pluribus rectis lineis proportionalibus; proxima tria de binis rectis lineis datum spatium comprehendentibus. Denique postrema octo usque ad nonagesimum in circulis vel*

1) In ea datorum recensione, quae ad nostram aetatem pervenit, sunt theoremata nonaginta quinque. Quae praeterea differant inter hanc recensionem et illam quam Pappus exponit, vide in adnotationibus ad Graeca verba.

sex diagrammata sive prop. 73—83; ergo Pappi $\epsilon\omega\varsigma\ \tau\omicron\upsilon\ \sigma'\ \kappa\alpha\iota\ \theta'$ est nunc prop. 83, ac Pappi $\delta\upsilon\omicron\ \epsilon\pi\iota\ \tau\epsilon\iota\gamma\omega\acute{\nu}\omega\tau\omega\tau$ nunc prop. 73 et 76; reliqua non conveniunt; nam sequuntur in nostris editionibus prop. 77 de duabus figuris specie datis, prop. 78 de datae figurae ad rectangulum ratione data, prop. 79 et 80 de triangulis, denique prop. 81—83 de pluribus rectis proportionalibus; hae igitur tres propositiones respondent quattuor illis quas Pappus significat: $\theta'\ \delta\epsilon\ \epsilon\pi\iota\ \pi\lambda\epsilon\iota\omicron\tau\epsilon\omega\iota\ \epsilon\acute{\iota}\theta\epsilon\iota\omega\iota\ \alpha\acute{\nu}\alpha\lambda\omicron\gamma\omega\iota\ \sigma\acute{\iota}\omega\iota\omega$ 49. $\tau\alpha\ \delta\epsilon\ \epsilon\acute{\xi}\eta\varsigma\ \gamma'$ in nostris editionibus quattuor, nempe prop. 84—87 20. $\alpha\acute{\nu}\alpha\lambda\omicron\gamma\omega\iota\omega$ — $\epsilon\sigma\tau\iota\iota\iota\iota$ del. Hu $\delta\omicron\theta\acute{\epsilon}\tau\iota\ \tau\iota\ \text{Hu}$, $\delta\omicron\theta\acute{\epsilon}\tau\iota\ \text{A(B)}$, $\delta\omicron\theta\acute{\epsilon}\tau\iota\ \text{S}$ $\chi\omega\iota\tau\omega\iota\omega\ \text{A BS}$, corr. Gregor. et Hu 21. $\tau\omicron\upsilon$ add. Hu C' in nostris editionibus est prop. 93

τοῖς μὲν μεγέθει μένον δεδομένοις, τοῖς δὲ καὶ θέσει.
ἀγομένων εὐθειῶν ἐστὶν διὰ δεδομένου σημείου τὰ γενό-
μενα δεδομένα.

- 5 Τῆς δ' ἀποτομῆς τοῦ λόγου βιβλίων ὄντων β' πρότα-
σις ἐστὶν μία ὑποδιηρημένη· διὸ καὶ μίαν πρότασιν οὕτως⁵
γράφω· διὰ τοῦ δοθέντος σημείου εὐθείαν γραμμὴν ἀγα-
γεῖν τέμνουσαν ἀπὸ τῶν τῇ θέσει δοθεισῶν δύο εὐθειῶν
πρὸς τοῖς ἐπ' αὐτῶν δοθείσι σημείοις λόγον ἔχούσας τὸν
αὐτὸν τῷ δοθέντι. τὰς δὲ γραφὰς διαφόρους γενέσθαι καὶ
πληθος λαβεῖν συμβέβηκεν. ὑποδιαίρεσως γενομένης, ἔνεκα¹⁰
τῆς τε πρὸς ἀλλήλας θέσεως τῶν δεδομένων εὐθειῶν καὶ
τῶν διαφόρων πτώσεων τοῦ δεδομένου σημείου καὶ διὰ τὰς
ἀναλύσεις καὶ συνθέσεις αὐτῶν τε καὶ τῶν διορισμῶν.
6 ἔχει γὰρ τὸ μὲν πρῶτον βιβλίον τῶν λόγων ἀποτομῆς τό-
πους ζ', πτώσεις κδ', διορισμοὺς δὲ ε', ὧν τρεῖς μὲν εἰσιν¹⁵
μέγιστοι, δύο δὲ ἐλάχιστοι· καὶ ἐστὶ μέγιστος μὲν κατὰ
τὴν τρίτην πτώσιν τοῦ ε' τόπου, ἐλάχιστος δὲ κατὰ τὴν δευ-
τέραν τοῦ ε' τόπου καὶ κατὰ τὴν αὐτὴν τοῦ ζ' τόπου, μέ-
γιστοι δὲ οἱ κατὰ τὰς τετάρτας τοῦ ε' καὶ τοῦ ζ' τόπου.
τὸ δὲ δεύτερον βιβλίον λόγων ἀποτομῆς ἔχει τόπους ιδ',²⁰
πτώσεις δὲ ξγ', διορισμοὺς δὲ τοὺς ἐκ τοῦ πρώτου· ἀπά-
γεται γὰρ ὅλον εἰς τὸ πρῶτον.

Λήμματα δὲ ἔχει τὰ λόγων ἀποτομῆς γ', αὐτὰ δὲ τὰ
δύο βιβλία τῶν λόγων ἀποτομῆς θεωρημάτων ἐστὶν ρα',
κατὰ δὲ Περιττέα πλειόνων ᾧ τοσούτων.

- 7 Τῆς δ' ἀποτομῆς τοῦ χωρίου βιβλία μὲν ἐστὶν δύο,
πρόβλημα δὲ καὶ τούτοις ἓν, ὑποδιαίρουμενον δις· καὶ
τούτων μία πρότασις ἐστὶν τὰ μὲν ἄλλα ὁμοίως ἔχουσα τῇ
προτέρᾳ, μόνῃ δὲ τούτῳ διαφέρουσα τῇ δεῖν τὰς ἀπο-
τεμνομένας δύο εὐθείας ἐν ἐκείνῃ μὲν λόγον ἔχούσας δο-³⁰

2. 3. ἀγομένων — δεδομένα del. Ha interpolator eas propositiones respexit quae in nostris editionibus sunt 92. 93. 95. 2. ἀγομένων A.B., διαγομένων S, ὅτι διαγομένων Ha ἔστιν om. Gregor. et Ha σημείου desinit Gregor. 3. οἷτοι A*B*S Ha 44. διδομένων ABV. corr. S 42. διδομένου ABS. corr. Ha 43. καὶ add. Ha τῇ:

magnitudine tantum, vel etiam positione datis demonstrantur.
[* rectis lineis per datum punctum ductis ea quae fiunt e segmentis data sunt.]

DE PROPORTIONIS SECTIONE LIBRI DUO.

Duorum librorum de sectione proportionis una est propositio subdivisa; quare hanc unam propositionem sic describo: "per datum punctum rectam lineam ducere a duabus rectis positione datis segmenta abscindentem, quae *per-tinentia* usque ad puncta in iisdem rectis data, eandem proportionem ac quae data est habeant". Verum multas variasque figuras. facta subdivisione, haec propositio habet propter rectarum datarum inter se positionem et diversos dati puncti casus, denique propter analyses synthesesque et horum casuum et determinationum. Etenim liber primus de proportionis sectione locos habet septem, casus viginti quatuor, determinationes quinque, quarum tres sunt maximae, duae minimae: estque maxima ad tertium casum quinti loci, minima ad secundum sexti loci et ad secundum septimi loci. tum maximae ad quartos casus sexti et septimi loci. Secundus autem liber de proportionis sectione habet locos quatuordecim, casus sexaginta tres, determinationes easdem ac primus liber; nam ad hunc totus refertur.

Lemmata libri de proportionis sectione habent viginti: iidem duo libri de proportionis sectione continent theoremata CLXXXI, vel etiam plura secundum Periclem.

DE SPATII SECTIONE LIBRI DUO.

De spatii sectione libri quidem sunt duo, problema vero in his quoque unum. quod duas subdivisiones habet. Et una quidem horum librorum propositio superiori in ceteris similis est; sed hoc solum differt, quod in illa duas rectas abscissas effici necesse est, quae datam proportionem habe-

$\alpha\beta\gamma\delta$ idem pro $\tau\eta\varsigma \alpha\delta\tau\eta\varsigma$ 20. $\alpha\delta$ idem pro $\alpha\delta$ 24. $\xi\alpha\tau\eta\iota$ A^v. $\xi\alpha\tau\eta$
B^s Ha Ge 26. $\chi\omega\rho\iota$ $\alpha\tau\omicron\tau\omicron\mu$ α in marg. add. A³

θέντα ποιεῖν, ἐν δὲ ταύτῃ χωρίον περιεχοῦσας δοθέν. ἡ-
 θύσεται γὰρ οὕτως· διὰ τοῦ δοθέντος σημείου εὐθείαν
 γραμμὴν ἀγαγεῖν τέμνουσαν ἀπὸ τῶν δοθεισῶν θέσει δύο
 εὐθειῶν πρὸς τοῖς ἐπ' αὐτῶν δοθεῖσι σημείοις χωρίον πε-
 ριεχοῦσας ἴσον τῷ δοθέντι. καὶ αὕτη δὲ διὰ τὰς αὐτὰς 5
 αἰτίας τὸ πλήθος ἔσχικε τῶν γραφομένων. ἔχει δὲ τὸ μὲν
 α' βιβλίον χωρίον ἀποτομῆς τόπους ζ', πτώσεις κδ', διο-
 ρισμοὺς ζ', ὧν δ' μὲν μέγιστοι, τρεῖς δὲ ἐλάχιστοι· καὶ
 ἔστι μέγιστος μὲν κατὰ τὴν δευτέραν πτώσιν τοῦ πρώτου
 τόπου, καὶ ὁ κατὰ τὴν πρώτην πτώσιν τοῦ β' τόπου, καὶ 10
 ὁ κατὰ τὴν β' τοῦ δ', καὶ ὁ κατὰ τὴν τρίτην τοῦ ε' τόπου,
 ἐλάχιστος δὲ ὁ κατὰ τὴν τρίτην πτώσιν τοῦ τρίτου τόπου,
 καὶ ὁ κατὰ τὴν δ' τοῦ δ' τόπου, καὶ ὁ κατὰ τὴν πρώτην
 τοῦ ἔκτου τόπου. τὸ δὲ δεῦτερον βιβλίον τῶν χωρίων ἀπο-
 τομῆς ἔχει τόπους ιγ', πτώσεις δὲ ξ', διορισμοὺς δὲ τοῖς 15
 ἐκ τοῦ πρώτου· ἀπάγεται γὰρ εἰς αὐτό.

Θεωρήματα δὲ ἔχει τὸ μὲν πρῶτον βιβλίον μγ', τὸ δὲ
 δεῦτερον ος'.

9 Ἐξῆς δὲ τοῖτοις ἀναδέδοται τῆς διωρισμένης τομῆς
 βιβλία β', ἐν ὁμοίως τοῖς πρότερον μίαν πρότασιν πάρ-
 εστιν λέγειν, διεξιγμένην δὲ ταύτην· τὴν δοθεῖσαν ἔπει-
 ρον εὐθεῖαν ἐνὶ σημείῳ τεμεῖν, ὥστε τῶν ἀπολαμβανομέ-
 νων εὐθειῶν πρὸς τοῖς ἐπ' αὐτῆς δοθεῖσι σημείοις ἴτοι
 τὸ ἀπὸ μιᾶς τετραγώνου ἢ τὸ ἐπὶ δύο ἀπολαμβανομένων
 περιεχόμενον ῥηθρογώνιον δοθέντα λόγον ἔχειν ἴτοι πρὸς 25
 τὸ ἀπὸ μιᾶς τετραγώνου ἢ πρὸς τὸ ἐπὶ μιᾶς ἀπολαμβανο-
 μένης καὶ τῆς ἑξῶ δοθείσης ἢ πρὸς τὸ ἐπὶ δύο ἀπολαμ-

4. ἐπ' Ha pro ἀπ' 7. α A, πρῶτον BS 8. Γ A, τέσσαρες;
 BS 10. β' Ha, Δ AB, τετάρτου S 15. ξ Ha, Ζ A BS 16. αὐ-
 τόν AB Ha, corr. S 19. cap. 9 et 10 ante Hallejam ediderunt Wile-
 brordus Snellius in libro qui inscribitur Apollonius Batavus. Lugodini
 1608 δὲ add. Snellius ἀναδέδοται ABS, corr. Hu 26. τετρά-
 γωνον ἢ πρὸς τὸ ἐπὶ μιᾶς auctore Simsono add. Hu; his nondum re-
 ceptis prius ἐπὶ in ἐπὶ mutaverat Snellius (conf. adnot. ad Latina).

ant, in hac autem, quae datum rectangulum comprehendant. Sic enim dicetur: "per datum punctum rectam lineam ducere a duabus rectis positione datis segmenta abscindentem, quae *pertinentia* usque ad puncta in iisdem rectis data rectangulum aequale dato comprehendant". Haec etiam propositio iisdem de causis magnum figurarum numerum accepit. Primus liber de spatii sectione habet locos septem, casus viginti quattuor, determinationes septem, quarum quattuor maximae, tres minimae sunt. Maximae sunt ad secundum casum primi loci, ad primum casum secundi loci, ad secundum quarti, ad tertium sexti loci; minimae ad tertium casum tertii loci, ad quartum quarti loci, ad primum sexti loci. Secundus autem liber de spatii sectione habet locos tredecim, casus sexaginta, determinationes easdem ac primus liber, ad quem refertur.

Theoremata primus liber habet XXXXVIII, secundus LXXVI.

SECTIONIS DETERMINATAE LIBRI DUO.

Deinceps editi sunt libri duo de sectione determinata, quorum perinde ac superiorum una propositio, sed ea hiperlita, enuntiari potest hoc modo: "datam rectam infinitam in uno puncto secare, ut, abscissis rectis inter hoc punctum et puncta in eadem recta data, vel quadratum ex una *abscissa* vel rectangulum, quod duabus abscissis continetur, datam proportionem vel ad quadratum ex una *abscissa*¹ vel ad rectangulum, quod una abscissa et alia extrinsecus data, vel ad id, quod duabus abscissis continetur, habeat, sive ad

¹ "Vel ad quadratum ex reliqua intercepta" Simsonus Opera quaedam reliqua, Glasgae 1776 p. IX, ad quae adnotavit haec: "Hunc casum textui Graeco addidimus, nam sine eo essent tantum quinque problemata in libro primo; si autem dicatur problema secundum posse in duo parti prout punctum inveniendum requiritur esse inter vel extra duo puncta data, ut in sequentibus huius libri I fit, essent hoc modum quindecim epitagmata in libro primo, Pappus autem numerat sexdecim. Et praeterea non verisimile est Apollonium problema hoc primum omisisse". Hanc Simsoni coniecturam egregie codicis scriptura, quae mutilata quidem est, sed *ἀπὸ* etiam nunc exhibet, confirmari apparet ex adnotatione ad Graeca.

βανομένων περιεχόμενον ὁρθογώνιον, ἐφ' ὁπότερ' ἂν χρη-
τῶν δοθέντων σημείων. καὶ ταύτης ἅτε δις διεξυγμένης
καὶ περισκελεῖς διορισμοὺς ἔχουσης διὰ πλείονων ἢ δεῖξαι
γέγονεν ἐξ ἀνάγκης. [δείκνυσι δὲ ταύτην Ἀπολλώνιος μὲν
πάλιν ἐπὶ ψιλῶν τῶν εὐθειῶν τριβαχύτερον πειρώμενος,
καθάπερ καὶ ἐπὶ τοῦ δευτέρου βιβλίου τῶν πρώτων στοι-
χείων Εὐκλείδου, καὶ ταύτην πάλιν εἰσαγωγικώτερον ἐπανα-
10 γράφων δέξας τε καὶ εὐρυῶς διὰ τῶν ἡμικυκλίων.] ἔχει
δὲ τὸ μὲν πρῶτον βιβλίον προβλήματα ζ', ἐπιτάγματα ις',
διορισμοὺς ε', ὧν μέγιστος μὲν δ', ἐλάχιστον δὲ ἓνα· καὶ 11
εἰσὶν μέγιστοι μὲν ὅ τε κατὰ τὸ δεύτερον ἐπίταγμα τοῦ
δευτέρου προβλήματος καὶ ὁ κατὰ τὸ γ' τοῦ δ' προβλήμα-
τος καὶ ὁ κατὰ τὸ τρίτον τοῦ ε' καὶ ὁ κατὰ τὸ τρίτον τοῦ
ἔκτου, ἐλάχιστος δὲ ὁ κατὰ τὸ τρίτον ἐπίταγμα τοῦ τρίτου
προβλήματος. τὸ δὲ δεῦτερον διωρισμένης τομῆς ἔχει προ- 12
βλήματα τρία, ἐπιτάγματα θ', διορισμοὺς γ'· ὧν εἰσὶν ἐλά-
χιστοι μὲν ὅ τε κατὰ τὸ τρίτον τοῦ πρώτου καὶ ὁ κατὰ
τὸ τρίτον τοῦ δευτέρου, μέγιστος δὲ ὁ κατὰ τὸ τρίτον τοῦ
τρίτου προβλήματος.

Λήμματα δὲ ἔχει τὸ μὲν πρῶτον βιβλίον κζ', τὸ δὲ 20
δεύτερον κδ'. θεωρημάτων δὲ ἔστιν τὰ δέο βιβλία διω-
ρισμένης τομῆς πγ'.

- 11 Ἐξῆς δὲ τοῖτοις τῶν ἐπαφῶν ἔστιν βιβλία δύο. προ-
τάσεις δὲ ἐν αὐτοῖς δοκοῦσιν εἶναι πλείονες. ἀλλὰ καὶ
τοίων μίαν τίθειμεν οὕτως ἔχουσαν· ἐξῆς σημείων καὶ εἰ- 25
θειῶν καὶ κύκλων τριῶν ὁποῖωνοῦν θέσαι δοθέντων κύκλον
ἀγαγεῖν δι' ἑκάστην τῶν δοθέντων σημείων εἰ δοθείη
ῥηραπτόμενον ἑκάστης τῶν δοθειῶν γραμμῶν. ταύτης διὰ
πλήθους τῶν ἐν ταῖς ἐποθέσει δεδομένων ὁμοίων ἢ ἀνο-
μοίων κατὰ μέρος διαφόρους προτάσεις ἀναγκαῖον γίνεσθαι 30

4. ὁπότερ' ἂν Hu. ὁπότερα ABS Snellius, ὁποτέρῃ Ha 4. 2. χρη-
τῶν Snellius pro χρηστῶν 3. περισκελεῖς sine acc.; A, corr. BS
4. δείκνυσι — 8. ἡμικυκλίων interpolatori tribuit Hu 4. 5. μὲν πᾶ-
λιν om. Hā 7. ταῦτα Snellius 8. δέξας τε Ha. δέξαντος AS, δέξα-
ς B Snellius 8—19. conf. infra cap. 119 40. δὲ ante ε' add. Bc S Snel-
lius 44. μέγιστον AB, corr. S 12—15. καὶ ὁ κατὰ τὸ τρίτον ἐπι-

puncta quae ab hac sive quae ab altera parte data sunt necesse est *spectare*". Huius quoque propositionis, quippe quae hipertita sit ac perobscuras determinaciones habeat, demonstrationem pluribus verbis fieri necesse fuit. [Hanc rursus Apollonius demonstrat trita ratione per solas rectas rem experiens, sicut etiam in secundo libro primorum Euclidis elementorum fit, ac rursus ad institutionem magis accomodate eandem tractavit accuratius figuras describens et demonstrationibus usus idque ingeniose per semicirculos.] Primus liber habet problemata sex, epitagmata sive *punctorum dispositiones* sedecim, determinaciones quinque, quarum quattuor sunt maximae, minima una. Suntque maximae ad secundum epitagma secundi problematis, ad tertium quarti problematis, ad tertium quinti, ad tertium sexti; minima autem ad tertium epitagma tertii problematis. Secundus liber de sectione determinata habet problemata tria, epitagmata novem, determinaciones tres, quarum minimae sunt ad tertium epitagma primi problematis et ad tertium secundi; maxima autem ad tertium tertii problematis.

Lemmata habet primus liber XXVII, secundus XXIV. Insunt in duobus libris de sectione determinata theoremata LXXXIII.

TACTIONUM LIBRI DUO.

Deinceps sequuntur tactionum duo libri, in quibus cum plures propositiones inesse videantur, nos tamen hic etiam unam ponimus huiusmodi: "punetis, rectis lineis, circulis ternis quibuscunque deinceps positione datis circulum ducere per singula data puncta siquidem puncta data sint, qui singulas datas lineas contingat". Ex hac autem, quoniam in hypothesibus permulta vel similia vel dissimilia data sunt, singillatim diversas propositiones decem fieri necesse est.

ταγμα τοῦ τρίτου προβλήματος, omissis reliquis. Snellius 13. 14. τοῦ ἔκτου ἐλάχιστος δὲ ὁ κατὰ τὸ γ' add. Ha 25. ἔξῃ; abundare videtur, ἐκ coni. C'a 26. 27 κίχλων ἀγαγεῖν A. corr. BS 28. ἐγα-
πόμενος ABS, corr. Ha

δέκα· ἐκ τῶν τριῶν γὰρ ἀνομοίων γενῶν τριάδες διάφοροι
 ἔσονται· γίνονται ἑ· ἦτοι γὰρ τὰ δοθεμένα τρία σημεῖα
 ἢ τρεῖς εὐθεῖαι ἢ δύο σημεῖα καὶ εὐθεῖα ἢ δύο εὐθεῖαι
 καὶ σημεῖον ἢ δύο σημεῖα καὶ κύκλος ἢ δύο κύκλοι καὶ
 σημεῖον ἢ δύο εὐθεῖαι καὶ κύκλος ἢ δύο κύκλοι καὶ εὐθεῖα
 ἢ σημεῖον καὶ εὐθεῖα καὶ κύκλος ἢ τρεῖς κύκλοι. τοῦτων
 δύο μὲν τὰ πρῶτα δέδεικται ἐν τῇ δ' βιβλίῳ τῶν πρώτων
 στοιχείων· ὃ παρῆμεν γράφειν· τὸ μὲν γὰρ τριῶν δοθέν-
 των σημείων μὴ ἔτ' εὐθείας ὄντων τὸ αὐτὸ ἔστιν τῷ περὶ
 τὸ δοθὲν τρίγωνον κύκλον περιγράψαι, τὸ δὲ γ' δοθεισῶν
 εὐθειῶν μὴ παραλλήλων οὐσῶν ἀλλὰ τῶν τριῶν συμπι-
 πτονσῶν τὸ αὐτὸ ἔστιν τῷ εἰς τὸ δοθὲν τρίγωνον κύκλον
 ἐγγράψαι· τὸ γὰρ δύο παραλλήλων οὐσῶν καὶ μιᾶς ἐμπι-
 πτούσης ὡς μέρος ὃν τῆς τοῦ β' ὑποδιαίρεσεως προγράφε-
 ται ἐν τοῦτοις πάντων. καὶ τὰ ἑξῆς ε' ἐν τῇ πρώτῃ βι-
 βλίῳ, τὰ δὲ λειπόμενα δύο, τὸ δύο δοθεισῶν εὐθειῶν καὶ
 κύκλου, ἢ τριῶν δοθέντων κύκλων, μόνον ἐν τῇ δευτέρῃ βι-
 βλίῳ διὰ τὰς πρὸς ἀλλήλους θέσεις τῶν κύκλων τε καὶ
 εὐθειῶν πλείονας οἷσας καὶ πλείονων διορισμῶν δεομένης.

12 Ταῖς προειρημέναις ἐπαιραῖς ὁμογενὲς πλήθος ἔστιν²⁰
 προβλημάτων παραλειπόμενον ἐπὶ τῶν ἀναδιδόντων, καὶ
 προσανέδωκα ἐν τοῖς πρότερον τῶν εἰρημένων δύο βιβλίων·
 εὐσυνοπτόν τε γὰρ καὶ εἰσαγωγικὸν μᾶλλον ἢ ἐντελὲς δὲ
 καὶ συμπληρωτικὸν τοῦ γένους τῶν ἐπαφῶν. πάλιν μὲν

1. δέκα Ha pro δε καὶ τριάδες Ha. τριὰς A, τρία δὲ BS triadis
 differentiae Co; 2. τὰ del. Hu. δίδόμενα ABV, corr. cod. Paris.
 2368 S; 3. εὐθεῖαι post τρεῖς B* Ha, εὐθείας AS εὐθεῖα καὶ δύο
 εὐθεῖαι A, corr. Co; 5. ἢ δύο εὐθεῖαι καὶ κύκλος post ἢ σημεῖον καὶ
 εὐθεῖα καὶ κύκλος transponunt Co et Ha; 7. δ' -J A, τετάρτῃ BS
 8. ὃ παρῆμεν γράφειν Hu. ὁπτομένην γράφων A S, ὃ περὶ μὲν γρα-
 φων B, ὅπερ ἦν μὲν γράφων Ha ὃ παρὲν γράφων conl. Ge; 9. εὐ-
 θέας recte AS, εὐθεῖαν B* Ha; 11. ἀλλὰ τῶν τριῶν συμπιπτονσῶν
 abundare videntur; 14. μέρος ὅντος τοῦ ε' ὑποδιαίρεσεως ABS, corr.
 Ha, nisi quod τοῦ omisit, quod restituit Ge; 15. ἐν τοῦτοις πάντων
 καὶ τῶν ἑξῆς conl. Ca, ἐν τοῦτοις πάντα καὶ τὰ ἑξῆς Ha; 18, 19. διὸ
 — δεομένης, conf. Haumann p. 64 sq.; 20. Ταῖς — p. 648, 13. πᾶ-
 σιν; haec forsitan alius scriptor mathematicorum peritus Pappi collec-

Nam ex tribus dissimilibus generibus triades diversae inordinatae existunt numero decem. Etenim data sunt

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| I. aut tria puncta | VI. aut duo circuli et punctum |
| II. aut tres rectae | VII. aut duae rectae et circulus |
| III. aut duo puncta et recta | VIII. aut duo circuli et recta |
| IV. aut duae rectae et punctum | IX. aut punctum et recta et circulus |
| V. aut duo puncta et circulus | X. aut tres circuli. |

Horum duo prima demonstrata sunt in quarto primorum elementorum libro *propos. 3 et 4*; id quod describere supersedimus. Nam "tribus datis punctis", quae non sunt in recta linea, idem est ac circa datum triangulum circulum circumscribere; illud autem "tribus datis rectis lineis", quae non parallelae sunt sed tres in unum concurrunt, idem est atque in datum triangulum circulum inscribere; ac praeterea hoc "si duae parallelae sunt et una cum his concurrat" tamquam pars subdivisionis secundi *problematis* in his omniut. primum ponitur. Deinceps in primo libro sex *problemata* scilicet casus III. IV, V. VI. VIII. IX superioris *tabulae* sequuntur; restant autem duo; nam et hoc "duabus datis rectis et circulo" *vide supra casum VII* et illud "tribus datis circulis" (*vide supra X*, tantum in secundo libro *tractata sunt*, quia plures sunt et circulorum et rectarum inter se positiones caeque pluribus determinationibus indigent.

His tactionibus similia sunt permulta *problemata* ab editoribus omissa, quae equidem in introductione duorum quos dixi librorum superaddidi; haec enim *institutio* et facilis intellectu erat et aptius in *reliquam disciplinam* introducebat eademque omne tactionum genus plane absolvebat. Rursus

tioni addiderit 20. *ὁμογενής* ABS, corr. Ha 21. *ὅπῃ* Hu pro *ἀπὸ*
 21. 22. καὶ προσανέδωκαν τισι πρότερον A, καὶ προσανέδωκαν τισι
 πρότερον τε BS, προσανέδωκαν δὲ τινες πρότερον Ha, καὶ προσανέδω-
 καν ἂν τις τῷ πρότερον Friedleinus *Literarisches Centralblatt* 1871
 p. 714, corr. Hu 23. τε om. Ha μᾶλλον ἂν ἦν Friedleinus l. c.
ἐντελής τε Ha

περιλάβωμεν ἅπαντα προτάσει, ἥτις τῆς προειρημένης λεί-
πουσα μὲν ἐποθέσει περιτείνουσα δὲ ἐπιτάγματι οὕτως
ἔχει· ἐκ σημείων καὶ εὐθειῶν καὶ κύκλων ὁποιωνοῦν δύο
δοθέντων κύκλον γράψαι τῷ μεγέθει δοθέντα διὰ τοῦ δο-
θέντος σημείου ἢ τῶν δοθέντων παραγινόμενον [εἰ δοθεῖ, 5
ἐραπτόμενον δὲ ἐκάστης τῶν δεδομένων γραμμῶν. αὕτη
περιέχει προβλημάτων ἥδη τὸ πλῆθος ἔξ· ἐκ τριῶν γὰρ
διαφόρων τινῶν δυνάδες ἄτακτοι διάφοροι γίνονται τὶ πλῆ-
θος 5· ἔτι γὰρ δύο δοθέντων σημείων ἢ δύο δοθεισῶν
εὐθειῶν ἢ δύο δοθέντων κύκλων ἢ σημείου καὶ εὐθείας ἢ¹⁰
σημείου καὶ κύκλου ἢ εὐθείας καὶ κύκλου τὸν δεδομένον
τῷ μεγέθει κύκλον ἀγαγεῖν δεῖ, ὥς εἴρηται, ταῦτα δὲ
ἀναλῦσαι καὶ συνθεῖναι καὶ διορίσασθαι κατὰ πτώσιν.

ἔχει δὲ τὸ πρῶτον τῶν ἐπαφῶν προβλήματα 3, τὸ δὲ
δεύτερον προβλήματα 8.

Ἀήμματα δὲ ἔχει τὰ δύο βιβλία κα', αὐτὰ δὲ θεωρη-
μάτων ἔστιν 5.

13 Μετὰ δὲ τὰς ἐπαφὰς ἐν τρισὶ βιβλίοις πορίσματα ἔστιν
Εὐκλείδου [πολλοῖς] ἄθροισμα φιλοτεχνότατον εἰς τὴν ἀνά-
λυσιν τῶν ἐμβριθεστέρων προβλημάτων, [καὶ] τῶν γενῶν²⁰
ἀπερίληπτον τῆς φύσεως παρεχομένης πλῆθος. [οὐδὲν

4. περιλαβὼν ABS, corr. Hu 5. ἐκ alienum est ab integri ser-
monis Graeci usu, ἔξης conlicit idque ad οὕτως ἔχει refert Haumannus
p. 48 5. ἡ τῶν δοθέντων A·BS, corr. Co εἰ Ha pro ἡ 7. ἔξ Ha.
καὶ Co pro ἡξει 8. διαφορῶν τινῶν AS et, ut videtur, B. accentum
corr. Ha δυνάδες idem pro δυνάδος διαφοραὶ AS et, ut videtur,
B, διάφοραι Ha, corr. Ca 9. 10. σημείων ἢ δύο δοθεισῶν εὐθειῶν
ἢ δύο δοθέντων om. A¹, in marg. add. A²·BS 10. 11. καὶ εὐθείας
ἢ σημείου B¹ Ha, καὶ εὐθεία ἢ σημεία A·S, 11. τὸν δεδομένον B·
Ha, τὸ δεδομένον AS 12. δεῖ Ha pro δύο ταῦτα δὲ καὶ ταῦτα
Ha 13. διορίσασθαι Ha 16. 17. numeros κα' et 5 in dubitationem
vocat C^a, tuetur Haumann p. 62 sq. θεωρήματα Ha 18 sqq. de
porismatis quae cap. 13—17 leguntur, ea duorum certe scriptorum ma-
nus, non unius Pappi, produnt, id quod nos uncis appositis significa-
vimus, quamquam in singulis verbis ac sententiis aut servandis aut ex-
pellendis multas dubitandi causas relinqui nos non fugit 20. καὶ τῶν
γενομένων 'et des conséquences des hypothèses Breton p. 211, τῶν γενῶν,
deleto καὶ, Hu conf. Vincent p. 23. 31

omnia una propositione comprehendamus, cuius hypothesis magis quam superioris contracta est, sed superaddita condicio ad constructionem hoc modo¹⁾: "punctis, rectis lineis, circulis quibuscunque binis datis circum magnitudine datum ducere, qui per datum punctum vel data puncta (siquidem puncta data sint) transeat ac singulas datas lineas contingat". Haec igitur propositio problemata numero sex continet; nam ex tribus quibusdam diversis *duádec sive paria* inordinata diversa fiunt numero sex, siquidem, aut duobus datis punctis aut duobus datis rectis aut duobus datis circulis aut *dati* puncto et recta aut puncto et circulo aut recta et circulo, circum magnitudine datum ducere oportet, sicut dictum est. Haec autem et resolvenda sunt et componenda et determinanda (*sive faciendae sunt analyses, syntheses, determinationes*) in singulis quibusque casibus.

Primus tactionum liber problemata septem, alter quatuor habet.

Lemmata insunt in duobus libris XXI, theoremata LX.

PORISMATUM LIBRI TRES²⁾.

Post tactiones tribus libris porismata Euclidis continentur, collectio artis studiique plenissima ad solvenda difficiliora problemata, quorum porismatum ea est natura, ut eorum genera infinita sint multitudine. [Nihil iis quae ab Euclide

1) Conf. W. Berkhan, *das Problem des Pappus von den Berührungen*, Halae 1857; C. Hellwig, *das Problem des Apollonius*, Halae 1856.

2) Praeter auctores, qui in praefatione nostrae editionis vol. I citati sunt (Breton: p. xv sq., Chasles: p. xvii, Simson: p. xx, Vincent: p. xxi), de Euclidis porismatis egerunt Aug. Richter, *Porismen nach Simson bearbeitet*, Elbing 1837; Ch. Housel, *les porismes d'Euclide in Journal de mathématiques pures et appliquées par J. Liouville, deuxième série, tome I, a. 1856 p. 193—209*; M. Cantor, *über die Porismen des Euklid und deren Divinatoren*, in *Schönmilch. Zeitschr. für Mathematik und Physik*, 1857 p. 47 sqq., et 1864, *Literaturzeitung*, p. 3 sqq.; Th. Leidenfrost, *die Porismen des Euklid*, Programm der Realschule zu Weimar, 1863; Fr. Buchbinder, *Euklids Porismen und Data*, Programm der Kgl. Landesschule Pforta, 1866.

προστεθείκασιν τοῖς ὑπὸ Εὐκλείδου γραφεῖσιν πρώτον, χωρὶς εἰ μὴ τινες τῶν πρὸ ἡμῶν ἀπειροχάλοι δευτέρας γραφὰς ὀλίγοις αὐτῶν παρατεθείκασιν, ἐκάστου μὲν πλήθος ὠρισμένον ἔχοντος ἀποδείξεων, ὡς ἐδείξαμεν, τοῦ δ' Εὐκλείδου μίαν ἐκάστοτε θέντος τὴν μάλιστα ὑπεμφαίνουσαν. 5 ταῦτα δὲ λεπτήν καὶ φυσικὴν ἔχει θεωρίαν καὶ ἀναγκαίαν καὶ καθολικωτέραν καὶ τοῖς δυναμένοις ὁρᾶν καὶ πορίζειν ἐπιτερεπῇ.] ἅπαντα δὲ αὐτῶν τὰ εἶδη οὔτε θεωρημάτων ἐστὶν οὔτε προβλημάτων ἀλλὰ μέσον πως τούτων ἐχούσης ἰδέας [ὥστε τὰς προτάσεις αὐτῶν δύνασθαι σχηματίζεσθαι 10 ἢ ὡς θεωρημάτων ἢ ὡς προβλημάτων], παρ' ὃ καὶ συμβέβηκε τῶν πολλῶν γεωμετρῶν τοὺς μὲν ὑπολαμβάνειν αὐτὰ εἶναι τῷ γένει θεωρημάτων τοὺς δὲ προβλήματα, ἀπο- 14 βλέποντας εἰς τὸ σχῆμα μόνον τῆς προτάσεως. τὴν δὲ διαφορὰν τῶν τριῶν τούτων ὅτι βέλτιον ᾔδεσαν οἱ ἀρχαῖοι, 15 δῆλον ἐκ τῶν ὕρων· ἔφασαν γὰρ θεωρημα μὲν εἶναι τὸ προτεινόμενον εἰς ἀπόδειξιν αὐτοῦ τοῦ προτεινομένου, πρόβλημα δὲ τὸ προβαλλόμενον εἰς κατασκευὴν αὐτοῦ τοῦ προτεινομένου, πόρισμα δὲ τὸ προτεινόμενον εἰς πορισμὸν αὐτοῦ τοῦ προτεινομένου. [μετεγράφη δὲ οὗτος ὁ τοῦ πυ- 20 ρίσματος ὅρος ἐπὶ τῶν νεωτέρων μὴ δυναμένων ἅπαντα πορίζειν, ἀλλὰ συγχρωμένων τοῖς στοιχείοις τούτοις καὶ δεικνύντων αὐτὸ μόνον τοῦθ' ὅτι ἔστι τὸ ζητούμενον, μὴ πορίζοντων δὲ τοῦτο καὶ ἐλεγχόμενων ὑπὸ τοῦ ὅρου καὶ

4. τοῦ Ha pro τὴν 5. ἐκάστοτε Hu pro ἐκάστου ὑπεμφαίνουσαν Ha pro ἀπεμφαίνουσαν 9. μέσον Hu pro μέσην 10. ἰδέας A(B), ἰδέαν S 11. ἢ ὡς ante θεωρημάτων τῶς AHS, ὡς V², corr. Scd et Hu παρὰ AS, distinctit V (item B²) 14. εἰς τὸ σχῆμα vel εἰς τὸ σχηματικόν Hu pro τῷ σχήματι 14. 15. τὴν δὲ διαφορὰς AB, corr. SV, τὰς δὲ διαφορὰς Ha 15. ᾔδεσαν A²(BS), ᾔδεισαν Ha 17. προτεινόμενον A¹, corr. A³(BS) 19. προτεινόμενον] fortasse παραγιγόμενον 23. ὅτι ἐστὶ Hu (que la chose cherchée existe Chasles p. 16, ὅτι ἐστὶ A²BS, ὅ τι ἐστὶ voluit Ha, cum videret quid sit quod quaeritur 24—p. 632, 4. τοῦτο· καὶ ἐλεγχόμενοι ὑπὸ τοῦ ὅρου καὶ τῶν διδασκομένων ἔγραψαν ἀπὸ τοῦ cet. Ha, et quoiqu'ils fussent condamnés tant par la définition que par les propositions mêmes, ces géomètres donnèrent — cette définition Chasles p. 16

primo scripta sunt addiderunt, nisi quod ante nostram aetatem *mathematici* quidam inepti ad pauca illius *problemata* alius suis quasi secundarias descriptiones¹⁾ adiunxerunt, cum unumquodque *problema* definitum numerum demonstrationum habeat, ut ostendimus, Euclides autem ubique unam eamque evidentissimam posuerit. Verum haec subtilem et naturalem doctrinam eamque necessariam et generatorem et iis qui *singula* perspicere et suppeditare possunt²⁾ admodum iucundam habent.] Omnia autem horum genera speciem neque theorematum neque problematum, sed eam quae medium inter haec locum obtineat, repraesentant [ut propositiones eorum vel theoremata vel problemata perhiberi possint], quamobrem etiam factum est, ut plurimi geometrae ea inter theoremata referenda esse existiment, alii inter problemata, cum *utrique* ad formam tantum propositionis respiciant. Sed inter haec tria quid intersit, melius cognovisse veteres apparet e definitionibus. Etenim theorema esse dixerunt id quod ad demonstrationem ipsius propositi protenditur, problema autem id quod ad constructionem ipsius propositi constituitur, denique porisma id quod ad investigationem ipsius propositi adhibetur³⁾. [Haec porismatis definitio a recentioribus immutata est, qui, cum omnia suppeditare non possent⁴⁾, his elementis utentes tantum "esse id quod quaeritur" demonstrarunt⁵⁾, minime autem idem investigaverunt; sed eos errare et ipsa definitio et omnis mathematica disci-

1) Vincent. p. 23: "quelques doubles redactions", et conf. eundem p. 31.

2) Chasles p. 43: "à ceux qui savent voir et trouver". Vincent p. 23: "à ceux qui savent voir et déduire des conséquences".

3) Chasles l. c.: "le porisme est une proposition où l'on demande de trouver ce qui est proposé", Vincent l. c.: "le porisme est une chose proposée en vue du parti à tirer de ce qui est proposé".

4) Vincent l. c.: "ne pouvant pas tout pénétrer pour aller au delà".

5) Vincent p. 32: "ὁ ἔστι τὸ ζητοῦμενον me parait être une formule terminale et conclusive de la solution des problèmes, analogue à ὅτι ἐστι τοῦτο, de même que ὅτι ἐστι δεῖξαι est la formule conclusive des théorèmes. Ainsi les géomètres qui manquaient de sagacité, arrivés à la conclusion ὁ ἔστι τὸ ζητοῦμενον, s'arrêtaient là sans chercher plus loin; mais les habiles, τοῦτο ποιεῖντες, examinaient s'il n'y avait pas quelque chose à remarquer et à déduire".

τῶν διδασκομένων. ἔγραψαν δὲ ἀπὸ συμβεβηκότος οὕτως·
 πόρισμά ἐστιν τὸ λείπον ὑποθέσει τοικιῶν θεωρήματος.
 τούτου δὲ τοῦ γένους τῶν πορίσμάτων εἰδὸς ἐστὶν οἱ τό-
 ποι, καὶ πλεονάζουσιν ἐν τῇ ἀναλυομένῃ· κεχωρισμένον
 δὲ τῶν πορίσμάτων ἤθροισται καὶ ἐπιγράφεται καὶ παρα-
 δίδεται διὰ τὸ πολύχυτον εἶναι μᾶλλον τῶν ἄλλων εἰδῶν.
 τῶν γοῦν τόπων ἐστὶν ἃ μὲν ἐπιπέδων, ἃ δὲ στερεῶν, ἃ
 15 δὲ γραμμικῶν, καὶ ἔτι τῶν πρὸς μεσότητος.] συμβέβηκε
 δὲ καὶ τοῦτο τοῖς πορίσμασιν, τὰς προτάσεις ἔχειν ἐπι-
 τετμημένας διὰ τὴν σχολιότητα πολλῶν συνήθως συνυπα-
 10 κονομένων, ὥστε πολλοὺς τῶν γεωμετρῶν ἐπὶ μὲν μέρους
 ἐκδέχεσθαι, τὰ δὲ ἀναγκαιότερα ἀγνοεῖν τῶν σημαινομέ-
 νων. [περιλαβεῖν δὲ πολλὰ μᾶλλον προτάσει ἥκιστα δυνατόν
 ἐν τούτοις, διὰ τὸ καὶ αὐτὸν Εὐκλείδην οὐ πολλὰ ἐξ ἐκά-
 15 στου εἰδους τεθεικέναι· ἀλλὰ δείγματος ἕνεκα ἐκ τῆς πο-
 λυπληθείας ἕνα ὀλίγα πρὸς ἀρχὴν (δεδομένον) τοῦ πρώτου
 βιβλίου τέθεικεν ἡμοιεῖν, πάντ' ἐκείνου τοῦ δαψιλεστέρου
 16 εἰδους τῶν τόπων, ὡς ἰ τὸ πλῆθος.] διὸ καὶ περιλαβεῖν
 ταύτας μᾶλλον προτάσει ἐνδεχόμενον εὐρόντες οὕτως ἐγράψα-
 20 μεν· ἐὰν ὑπτιῶν ἢ παρυπτιῶν τρία τὰ ἐπὶ μιᾷ σημεῖα [ἢ
 παραλλήλου ἕτερα τὰ δύο] δεδομένα ἦ, τὰ δὲ λοιπὰ πλὴν

4. κεχωρισμένῳ Ha 'αὶ κεχωρισμένον' intelligitur τὸ εἶδος) 7. ἐστιν
 δέκα ἃ μὲν ABS, δέκα del. Ha 8. ἔτι B^s Ha, ἐπὶ AS 10. διὰ τὴν
 ἱμμο εἰς τινὰ Hu 14. μὲν add. Hu 12. ἐκδέχεσθαι Ha pro ἐκ-
 δέχεται ἀναγκαιότερα expectatur; at conf. infra cap. 27 med.
 13. ἡδιστα A(BS), corr. Sca et Ha (codicum scripturam tuetur Vincen-
 tius p. 20) 15. δείγματα Ge ex add. Hu πολυπληθείας (sine
 acc., A, corr. BS 16. ἕνα Breton p. 289, ἐν ἢ A BS, ἐν ἢ E, Littré
 apud Bretonum p. 214 ὀλίγα προσαρξέιν δεδομένα conf. Vincent
 p. 20 post δεδομένον lacuna in A, δεδομένων Ge, del. Hu 17. πάντ'
 Hu, πάν AB Ha, παρ' S Breton p. 212 19. ἐν ante μιᾷ add. Ha
 20. σημεῖα pro σημείον Ha 21. ad παραλλήλου item atque ante ad
 ὑπτιῶν et παρυπτιῶν cogitatione adde σχήματος; verum quia haec om-
 nis hypothesis ἢ παραλλήλου ἕτερα τὰ δύο aliena est a generali pro-
 positionis sensu, hic quoque interpolatoris manus deprehenditur (cete-
 rum conf. adnot. ad Latinum) ἕτερα Ha, qui transpositis verbis totum
 locum sic dedit: ἐὰν ὑπτιῶν ἢ παρυπτιῶν ἢ παραλλήλου ἕτερα τρία τὰ

plina evincit¹⁾. Qui accidens quiddam spectantes definierunt: "porisma est id quod deficiente hypothesis differt a theoremate locali"²⁾. Huius porismatum generis species quaedam sunt loci *geometrici*, qui abunde occurrunt in loco qui *ἀναλυόμενος* vocatur. Sed hoc argumentum, quia diffusius est ceteris generibus, separatim a porismatis collectum est et proprio titulo traditur. Locorum igitur alii sunt plani, alii solidi, alii lineares; alii denique ad medias proportionales spectant.] Verum hoc etiam in porismatis contingit, ut propositiones in compendium contractas habeant, cum propter contortiores formas multa tacite supplenda omitti soleant; unde multi geometricae ex parte tantum ea percipiunt, praecepta autem maxime necessaria ignorant. [Minime in his porismatis fieri potest, ut plura una propositione contineantur, siquidem ipse etiam Euclides non multa e singulis generibus posuit; sed exempli gratia e tanto numero pauca quaedam eaque inter se cognata initio primi libri posuit, quae omnia ex illo uberiore locorum genere repelita decem sunt numero]. Quocirca nos, cum haec una propositione comprehendere posse cognoverimus, sic scripsimus³⁾: "si in systemate quattuor rectarum, quarum binae se secant, tria puncta in una recta [vel duo, si duae parallelae sint] data sint. reliqua autem

1) Vincent. p. 33: "*convaincus par la définition précitée, et par ce qui est enseigné*". Aliter Chasles, cuius interpretationem ad Graeca p. 650, 24 adscripsimus.

2) Chasles p. 16: "*ce qui constitue le porisme est ce qui manque à l'hypothèse d'un theoreme local; en d'autres termes, le porisme est inférieur, par l'hypothèse, au theoreme local; c'est à dire que quand quelques parties d'une proposition locale n'ont pas dans l'énoncé la détermination qui leur est propre, cette proposition cesse d'être regardée comme un theoreme et devient un porisme*". Latius de difficillima hac quaestione agit Vincentius p. 32—34.

3) Conf. Vincent p. 24, 36—38.

- ἐπὶ δὲ ἀπὸ τῆς θέσεως δεδομένης εὐθείας, καὶ τοῦθ' ἄνεται
 θέσει δεδομένης εὐθείας. τοῦτ' ἐπὶ τῶν αὐτῶν μὲν εὐθειῶν
 εἴρηται μόνων, ὧν οὐ πλείονες ἢ δύο διὰ τοῦ αὐτοῦ ση-
 μείων εἶσιν, ἀγνοεῖται δὲ ἐπὶ παντὸς τοῦ προτεινομένου
 πλήθους ἀληθὲς ὑπάρχον οὕτως λεγόμενον· ἐὰν ὁποσαοῦν
 εὐθεῖαι τέμνωσιν ἀλλήλας, μὴ πλείονες ἢ δύο διὰ τοῦ αὐ-
 τοῦ σημείου, πάντα δὲ ἐπὶ μιᾷ αὐτῶν δεδομένα ἢ, καὶ
 τῶν ἐπὶ ἑτέρας ἕκαστον ἀπὸ τῆς θέσεως δεδομένης εὐθείας,
 ἢ καθολικώτερον οὕτως· ἐὰν ὁποσαοῦν εὐθεῖαι τέμνωσιν
 ἀλλήλας, μὴ πλείονες ἢ δύο διὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου, πάντα
 δὲ τὰ ἐπὶ μιᾷ αὐτῶν σημεία δεδομένα ἢ, τῶν δὲ λοιπῶν
 τὸ πλῆθος ἐχόντων τρίγωνον ἀριθμὸν ἢ πλευρὰ τοῦτο
 ἕκαστον ἔχῃ σημεῖον ἀπτόμενον εὐθείας θέσει δεδομένης,
 τῶν τριῶν μὴ πρὸς γωνίαις ὑπαρχόντων τριγώνων χωρίον,
 ἕκαστον λοιπὸν σημεῖον ἄνεται θέσει δεδομένης εὐθείας.
 17 τὸν δὲ στοιχειωτὴν οὐκ εἰκὸς ἀγνοῆσαι τοῦτο, τὴν δ' ἀρχὴν
 μόνην τάξαι· καὶ ἐπὶ πάντων δὲ τῶν πορισμάτων φαίνεται
 ἀρχὰς καὶ σπέρματα μόνα [πληθῶν πολλῶν καὶ μεγάλων]
 καταβεβλημένος, ὧν τὰ γένη οὐ κατὰ τὰς τῶν ὑποθέσεων
 διαφορὰς διαστέλλειν δεῖ, ἀλλὰ κατὰ τὰς τῶν συμβεβηκό-
 των καὶ ζητούμενων. [αἱ μὲν ὑποθέσεις ἅπασαι διαφέρου-
 σιν ἀλλήλων εἰδικώταται οὖσαι, τῶν δὲ συμβαινόντων καὶ
 ζητούμενων ἕκαστον ἐν καὶ τὸ αὐτὸ ὅν πολλαῖς ὑποθέσεσι
 διαφόροις συμβέβηκε διακριθῆναι.]
 18 Ποιτέον οὖν ἐν μὲν τῇ πρώτῃ βιβλίῳ ταῦτα τὰ γένη
 τῶν ἐν ταῖς προτάσεσι ζητούμενων ἐν ἀρχῇ μὲν τοῦ διὰ-
 γράμματος τοῦτο·

2. τοῦτ' ἴστω A, BS, corr. Ha 3. μόνοι Breton p. 212 5. οὔτοι
 A² B² S 11. σημεία BS, σημείων A 12. τὸ πλῆθος abundare videtur
 (conf. ad vs. 18) 13. ἔχῃ Hu pro ἔχει 14. ὧν τριῶν μὴ πρὸς γωνίαις
 ὑπάρχον ABS. corr. Hu 15. πληθῶν πολλῶν καὶ μεγάλων interpola-
 tori tribuit Hu (pro πληθῶν sanum erat εἰδῶν vel γενῶν) 19. κατα-
 βεβλημένος ABS, καταβεβλημένος Ha, corr. Hu ὧν τὰ γένη Hu, ὧν
 ἐν A, BS, ὧν ἕκαστον Ha 21. διαφεροῦσιν A, διαφοροῦσιν BS. corr.
 Ha 23. ἕκαστον ἐν B² Ha, ἐκάστην ἐν A, S² 24. διακριθῆναι Hu.
 τῶν ταῦτα γένη A, BS, om. Ha, qui sic vertit: nullis diversisque hypo-
 thesibus contingit; ac conferantur Simson p. 349 et Chasles p. 18
 26. 27. ἢ ἀρχῇ --- τοῦτο interpolatori tribuit Hu. ἐν ἀρχῇ μὲν τοῦτο

praeter unum singulas rectas positione datas tangant¹, etiam hoc unum rectam positione datam tanget". Hoc de quattuor tantum rectis dictum est, quarum non amplius binæ per idem punctum transeunt: ignorant autem plerique idem quovis reclarum numero proposito verum esse, si sic enuntietur: "si quocunque rectae inter se secant, non plures quam binæ per idem punctum, omnia autem in una harum reclarum puncta data sint et eorum quæ in alia recta sunt unum quodque rectam positione datam tangat", vel generalius sic: "si quocunque rectae inter se secant, non plures quam binæ per idem punctum, omniaque in unâ harum reclarum puncta data sint, reliqua autem numerum triangularem² efficiant, cuius latus quot puncta habet, tot puncta singulas rectas positione datas tangant, modo ne terna ad angulos spatii trianguli sint (i. e. dummodo terna in recta linea sint), quodque reliquum punctum tanget rectam positione datam". Scriptorem autem elementorum ea non ignoravisse, sed initia tantum posuisse veri simile est, qui quidem omnino in porismatum doctrina principia modo et semina [multarum magnarumque rerum] iecisse videtur; genera autem eorum non secundum hypothesium, sed accidentium et quaesitorum differentias distinguenda sunt. Hypotheses quidem omnes, quippe quæ specialissimæ sint, differunt inter sese; quidquid autem accidens ac quaesitum est, quamvis unum idemque sit, in multas hypotheses diversas distingui solet³.

In primo igitur libro hæc genera eorum quæ in propositionibus quaeruntur statuenda sunt [initio septimæ sectionis hoc diagramma est]:

1: Schema ἑπτιον et παρῑπτιον quid sit, et quale schema παράλληλων interpolator significaverit, explicat Simsonus de porismatibus p. 348 vide nostræ edit. indicem. Idem Græca τὸ δὲ λοιπὸν ἄπληται θέσει δεδομένης sic interpretatur: "unum tangat unam, aliud tangat aliam rectam positione datam, et sic deinceps".

2: De numeris triangularibus latius disserit Nicomachus introduct. arithm. II. 8.

3: Conf. Vincent p. 38 sq.

(scil. τοῦ βιβλίου ζῆτι τὸ διάγραμμα conf. Vincent p. 39 et conf. Breton p. 287 sq. 26. τὸ ζ' cod. Paris. 2368, τὸ ἑρδουον SV

ἐὰν ἀπὸ δύο δεδομένων σημείων πρὸς θέσει δεδομένην εὐθεΐαν κλασθῶσιν, ἀποτεμνῇ δὲ μία ἀπὸ θέσει δεδομένης εὐθείας πρὸς τῷ ἐπ' αὐτῆς δεδομένῳ σημείῳ, ἀποτεμεῖ καὶ ἡ ἑτέρα ἀπὸ ἑτέρας λόγον ἔχουσαν δοθέντα·

ἐν δὲ τοῖς ἑξῆς·

5

ὅτι τότε τὸ σημεῖον ἄπτεται θέσει δεδομένης εὐθείας·

ὅτι λόγος τῆσδε πρὸς τήνδε δοθείς·

ὅτι λόγος τῆσδε πρὸς ἀποτομήν·

ὅτι ἦδε θέσει δεδομένη ἐστίν·

ὅτι ἦδε ἐπὶ δοθέν νεύει·

10

ὅτι λόγος τῆσδε πρὸς τινὰ ἀπὸ τοῦδε ἕως δοθέντος·

ὅτι λόγος τῆσδε πρὸς τινὰ ἀπὸ τοῦδε κατηγμένην·

ὅτι λόγος τοῦδε τοῦ χωρίου πρὸς τὸ ἐπὶ δοθείσης καὶ τῆσδε·

ὅτι τοῦδε τοῦ χωρίου ὃ μὲν τι δοθέν ἐστίν, ὃ δὲ λόγον ἔχει πρὸς ἀποτομήν·

ὅτι τότε τὸ χωρίον ἢ τότε μετὰ τινος χωρίου δοθέντος ἐστίν, ἐκεῖνο δὲ λόγον ἔχει πρὸς ἀποτομήν·

ὅτι ἦδε μεθ' ἧς πρὸς ἣν ἦδε λόγον ἔχει δοθέντα, λόγον ἔχει πρὸς τινὰ ἀπὸ τοῦδε ἕως δοθέντος·

20

ὅτι τὸ ἐπὶ δοθέντος καὶ τῆσδε ἴσον ἐστὶν τῷ ἐπὶ δοθέντος καὶ τῆς ἀπὸ τοῦδε ἕως δοθέντος·

2. εὐθεΐαι Hu pro εὐθείαν ἀποτεμνῇ δὲ μίαν A, BS, corr. Ha auctore Co 3. δεδομένων σημείων A(B), corr. S 4. ἔχουσαν B^a Ha, ἔχουσα AS 11. ὅτι λόγος τῆς δε πρὸς τινὰ ἀπὸ τοῦδε ὡς δοθέντος repetunt A(B), nisi quod hic τοῦ δὴ ὡς, S, del. V ἕως Ha pro ὡς 12. κατηγμένης ABS, corr. Ha 13. ὃ μὲν — ὃ δὲ V, ὃ μὲν — ὃ δὲ S, ὃ μὲν — ὃ δὲ AB 15. 16. λόγον ἔχει πρὸς τὸ ἐπὶ ἀποτομῆς καὶ δοθείσης voluisse videtur Chasles (vide adnot. 3 ad Latina. 19. ἦδε ante μεθ' ἧς del. Hu 20. ἕως Ha pro ὡς 21. ἐπὶ τοῦ δοθέντος Ha post καὶ τῆσδε repetunt καὶ τὸ ἐπὶ δοθέντος καὶ τῆσδε A(BS), del. Co 21. 22. ὑποδοθέντι A(BS), corr. Ha 22. τῆς add. Ha

I. Si a duobus punctis datis rectae ducantur et rectam positione datam secant, una autem a recta positione data inde a puncto dato segmentum abscindat, etiam altera ab altero segmentum, quod datam proportionem habeat, abscindet.

Tum in iis quae sequuntur:

II. Hoc punctum tangere rectam positione datam.

III. Proportionem huius rectae ad hanc datam esse.

IV. Proportionem huius rectae ad segmentum datam esse¹⁾.

V. Hanc rectam positione datam esse.

VI. Hanc rectam ad datum punctum vergere²⁾.

VII. Proportionem huius rectae ad segmentum, quod ab hoc puncto ad alterum datum pertinet, datam esse.

VIII. Proportionem huius rectae ad alteram, quae ab hoc puncto ducta est, datam esse.

IX. Proportionem huius rectanguli ad rectangulum, quod ex data recta et hac construitur, datam esse.

X. Huius rectanguli partem quandam (ipsam quoque rectangulum) datam esse, alteram partem ad segmentum proportionem datam habere³⁾.

XI. Hoc rectangulum vel hoc cum quodam spatio dato datum esse, illud autem proportionem datam habere ad segmentum⁴⁾.

XII. Hanc rectam, quae coniuncta cum altera ad eandem alteram habet proportionem datam, etiam ad quandam rectam, quae ab hoc puncto ad datum punctum pertinet, habere proportionem datam⁵⁾.

¹⁾ Conf. Vincent p. 40.

²⁾ "Que telle droite passe par un point donné" Vincent p. 26, Chasles p. 18. Conf. etiam Chasles p. 441, Simson. p. 418 sqq.

³⁾ Vix recte Ha et Simsonus vertunt: "Quod huius rectanguli unum latus datum est, alterum vero rationem habet ad rectam abscissam". Probabilius Bretonus p. 217: "que tel rectangle équivaut à un rectangle constant, plus un autre rectangle qui varie proportionnellement à une certaine abscisse". et Vincentius p. 26: "que tel espace est décomposable en deux parties dont l'une est donnée et dont l'autre est à la première dans un rapport d'apotome". Rursus aliter Chasles p. 19: "que tel rectangle équivaut à un rectangle donné plus le rectangle formé sur telle abscisse et sur une droite donnée".

⁴⁾ Obscura haec atque, ut plerisque interpretibus videtur, mutilata. Vincentius p. 26 locum sic convertit: "que tel espace pris seul ou avec un certain espace est décomposable en deux parties dont l'une est donnée et dont l'autre est à un espace donné dans un rapport d'apotome". Ceterum conf. mox genus XVI.

⁵⁾ Sic verba difficillima interpretanda esse duxi, cum vulgo haec potius Graeca conversa reperiantur: ὅτι συναμφοτέρως ἴσθαι καὶ ἡ πρὸς

ὅτι λόγος τῆσδε καὶ τῆσδε πρὸς τινα ἀπὸ τοῦδε ἕως
δοθέντος·

ὅτι ἦδε ἀποτέμνει ἀπὸ θάσει δεδομένων δοθὲν περι-
εχοίσας.

- 19 Ἐν δὲ τῇ δευτέρῃ βιβλίῳ ὑποθέσεις μὲν ἔτεροι, τῶν δὲ
ῥητουμένων τὰ μὲν πλείονα τὰ αὐτὰ τοῖς ἐν τῇ πρώτῃ
βιβλίῳ, περισσὰ δὲ ταῦτα·

ὅτι τούδε τὸ χωρίον ἢ τούδε μετὰ δοθέντος λόγον ἔχει
πρὸς ἀποτομήν·

ὅτι λόγος τοῦ ὑπὸ τῶνδε πρὸς ἀποτομήν·

10

ὅτι λόγος τοῦ ὑπὸ συναμφοτέρων τῶνδε καὶ συναμ-
φοτέρων τῶνδε πρὸς ἀποτομήν·

ὅτι τὸ ὑπὸ τῆσδε καὶ συναμφοτέρου τῆσδε τε καὶ τῆς
πρὸς ἣν ἦδε λόγον ἔχει δοθέντα καὶ τὸ ὑπὸ τῆσδε καὶ
τῆς πρὸς ἣν ἦδε λόγον ἔχει δοθέντα λόγον ἔχει πρὸς ἀπο-
τομήν·

ὅτι λόγος συναμφοτέρου πρὸς τινα ἀπὸ τοῦδε ἕως δο-
θέντος·

ὅτι δοθὲν τὸ ὑπὸ τῶνδε.

- 20 Ἐν δὲ τῇ τρίτῃ βιβλίῳ αἱ μὲν πλείονες ὑποθέσεις²⁰
ἐπὶ ἡμικυκλίων εἰσίν, ὀλίγαι δὲ ἐπὶ κύκλου καὶ τμημάτων·
τῶν δὲ ῥητουμένων τὰ μὲν πολλὰ παραπληρώως τοῖς ἑμ-
προσθεν, περισσὰ δὲ ταῦτα·

1. ἕως Ha pro ὥς 8. ἢ τόδε μετὰ δοθέντος Hu pro ἥτοι (conf.
proximam adnot.) 9. post ἀποτομήν add. μετὰ δοθέντος λόγον

ἔχει πρὸς ἀποτομήν A² in marg. BS, quae recepit Ha addito ἢ ante
μετὰ 10. ὅτι λόγος τοῦ ὑπὸ τῶνδε B² Ha, ὅτι λόγον cet. AS

11. συναμφοτέρου τῶνδε καὶ συναμφοτέρου ABS², συναμφοτέρου τῶνδε
καὶ συναμφοτέρου SIV Ha. corr. Hu 17. ὅτι λόγος B² Ha, ὅτι
λόγου AS συναμφοτέρου τῆσδε voluit Ha "utriusque simul sumptae"
interpretans ἀπὸ add. Ha 18. ἀποτομήν add. Hu

XIII. Triangulum, cuius vertex est datum punctum et basis haec recta, aequale esse triangulo, cuius vertex datum punctum et basis est abscissa inde ab hoc puncto ad datum punctum¹⁾.

XIV. Proportionem summae huius rectae et huius ad portionem quandam, quae ab hoc puncto ad datum punctum pertinet, datam esse.

XV. Hanc rectam a duabus rectis positione datis segmento abscindere, quae latera dati rectanguli sint²⁾.

In secundo libro aliae quidem sunt hypotheses; quaesita autem pleraque eadem atque in primo libro. Accedunt tamen haec:

XVI. Hoc rectangulum vel hoc cum altero dato ad segmentum proportionem datam habere.

XVII. Rectanguli, cuius latera sunt haec recta et haec, proportionem ad segmentum datam esse.

XVIII. Rectanguli, cuius alterum latus est summa harum rectarum, alterum summa harum, proportionem ad segmentum datam esse.

XIX. Rectangulum, cuius alterum latus haec recta est, alterum summa huius et alterius ad quam haec proportionem datam habet, coniunctum cum eo rectangulo, cuius latera sunt haec recta et altera ad quam haec proportionem datam habet, proportionem datam habere ad segmentum.

XX. Summae horum duorum rectangulorum³⁾ ad segmentum quoddam, quod ab hoc puncto ad datum punctum pertinet, proportionem datam esse.

XXI. Rectangulum, cuius latera haec rectae sunt, datum esse.

In tertio libro plurimae hypotheses de semicirculis sunt, paucae tantum de circulis et segmentis. Iterum quaesita plurima similia sunt prioribus: accedunt tamen haec:

ἢν ἦδε cet.; nam sic Ha: "Quod recta una cum alia, ad quam est in ratione data" cet., ac similiter reliqui, velut Vincent l. c.: "que telle droite plus une autre droite avec laquelle telle autre droite est dans un rapport donné, est elle même dans un certain rapport avec un certain segment compris entre tel point et un point donné".

† Sic secundum Bretonum, Vincentium, Chaslesium; Halleius interpretando pro *δοδεκάς* his intellexit *δοδεκάς*.

2) Conf. Simson. p. 431 sq., Chasles p. 174 sq.

3) Halleium summam duarum rectarum statuisse ad Graeca adnotatum est, qua ab opinione non discesserunt Simsonus p. 351 et Vincentius p. 27: ad ἀναμνηστικὰς τὰς τοῦ τοῦ ὀρθογώνου suppleverunt itaque rectangulorum summam intellexerunt Breton p. 217 et Chasles p. 20.

ὅτι λόγος τοῦ ὑπὸ τῶνδε πρὸς τὸ ἐπὶ τῶνδε·

ὅτι λόγος τοῦ ἀπὸ τῆσδε πρὸς ἀποτομήν·

ὅτι τὸ ὑπὸ τῶνδε τῇ ἐπὶ δοθείσῃς καὶ τῇ ἀπὸ τοῦδε
ἕως δοθέντος·

ὅτι τὸ ἀπὸ τῆσδε τῇ ἐπὶ δοθείσῃς καὶ ἀπολαμβάνο-
μένης ὑπὸ καθέτου ἕως δοθέντος·

ὅτι συναμφοτέρως ἦδε καὶ πρὸς ἣν ἦδε λόγον ἔχει δο-
θέντα λόγον ἔχει πρὸς ἀποτομήν·

ὅτι ἔστιν τι δοθὲν σημεῖον ἀφ' οὗ αἱ ἐπιζευγνύμεναι
ἐπὶ τούτῳ δοθὲν περιέξονται τῇ εἶδει τρίγωνον· 10

ὅτι ἔστιν τι δοθὲν σημεῖον ἀφ' οὗ αἱ ἐπιζευγνύμεναι
ἐπὶ τόνδε ἴσας ἀπολαμβάνουσι περιφερείας·

ὅτι ἦδε ἔχει ἐν παραθέσει ἐστὶν ἡ μετὰ τινος εὐθείας
ἐπὶ δοθὲν γενούσης δοθεῖσαν περιέχει γωνίαν.

Ἔχει δὲ τὰ τρία βιβλία τῶν πορισμάτων λήμματα λή', 15
αὐτὰ δὲ θεωρημάτων ἐστὶν ροά'.

Τόπων ἐπιπέδων δύο.

- 21 Τῶν τόπων καθόλου οἱ μὲν εἰσιν ἑφεκτικοί, ὡς καὶ
Ἀπολλώνιος πρὸ τῶν ἰδίων στοιχείων λέγει σημείου μὲν

3. ὅτι λόγος τοῦ ἀπὸ τῆσδε ABS, corr. Ha πρόστο ἀποτομήν
A:BS, corr. Ha 3. τῆς add. Ha 5. ὑπὸ δοθείσῃς Hu pro ἐπὶ
δοθέντος ex Halleli ac reliquorum interpretum sententia 7. post
συναμφοτέρως add. ἦδε Hu ac similiter vertit Ha; longe aliter Bre-
tonus aliique, quorum interpretationi haec Graeca respondent: ὅτι τὸ
ὑπὸ συναμφοτέρων τῶνδε καὶ τῆς πρὸς ἣν ἦδε cet. conf. adnot. 2 (sine
acc.) A BS, ἐπὶ τούτῳ Ha, ἐπὶ τόνδε Simson. l. c. 11. ὅτι ἐστὶν
δοθὲν A, ὅτι ἐστὶ δοθὲν BS, τι add. Ha 12. ἐπὶ τούτῳ ABS Ha,
corr. Hu ex ratione Simsoni p. 468 13. ἦδε ἦτοι ἐν Ha, ἡδεντοι
AB, ἡδ' ἐν τῇ SV Paris. 2368 ἐστὶν Hu pro ἐσται 14. τὸ ante
δοθὲν add. Ha 18. ὡς Hu, * * οὕς A, οὕς BS vulgo 19. ἰδίων
om. Ha

XXII. Rectanguli, quod est sub his *rectis*, ad rectangulum, quod est sub his, proportionem datam esse.

XXIII. Quadrati, quod ab hac *recta* est, proportionem ad segmentum datum esse.

XXIV. Rectangulum, quod est sub his *rectis*, aequale esse rectangulo, cuius latera sunt data *rectu* et abscissa ab hoc puncto ad datum punctum.

XXV. Quadratum, quod ab hac *recta* est, aequale esse rectangulo, cuius latera sunt data *recta*¹⁾ et abscissa a catheto ad datum punctum.

XXVI. Summam huius *rectae* et alterius, ad quam haec proportionem datam habet²⁾, ad segmentum proportionem datam habere.

XXVII. Esse aliquod datum punctum, a quo ductae ad hos *circulos*³⁾ *rectae* datum specie triangulum continebunt.

XXVIII. Esse aliquod datum punctum, a quo ductae ad hunc *circulum*⁴⁾ *rectae* aequales arcus abscindunt.

XXIX. Hanc *rectam* aut parallelam esse aut cum *recta* quadam, quae ad datum punctum vergit, datum angulum continere⁵⁾.

Tres porismatum libri habent lemmata XXXVIII; theoremata in iis insunt CLXXI.

LOCORUM PLANORUM LIBRI DUO.

Loci in universum partim *ἐπεξεργασμένοι* sive *fixi*, ut iam Apollonius in exordio suorum elementorum puncti locum punc-

1) Rectangulum eiusque alterum latus datam rectam, i. e. τὸ ὑπὸ δοθέντος, omnes secundum Halleium interpretes intellexerunt. Quod codex habet τὸ ὑπὸ δοθέντος, id significaret: aequale esse triangulo, cuius vertex datum punctum et basis est abscissa a catheto cet.

2) Sic ex mea coniectura interpretatus sum, eademque Halleii fuit sententia, qui sic dedit: "Quod *rectae* . . . una cum illa ad quam . . . datam habet rationem, simul sumptae" cet., quod quidem non idem est ac supra XII, etiamsi secundum vulgarem interpretationem illud accipiamus. Contra Breton p. 248, Vincent p. 27, Chasles p. 24 liberius tractata codicis scriptura (vide adnot. ad Graeco) rectangulum intulerunt; nam Chasles hoc similiter ante hunc Breton et Vincent sic convertit: "Que le rectangle qui a pour côtés la somme de deux droites et une droite en rapport donne avec telle autre droite" cet.

3) Sic ex ratione Simsoni p. 453 sqq.; contra Halleius "ad puncta quaevis"; τὰδε igitur intellexit, quamvis τὰδε in Graeco contextu scriberet. Vincent p. 27. 44 sq. (quem sequitur Chasles) sic interpretatur: "qu'il existe un point donné tel que les droites menées de ce point à deux points donnés comprennent un angle donné d'espèce".

4) Vide Simsonum p. 463 sqq.; contra Vincent p. 27: "qu'il existe un point donné tel que les droites menées de ce point à deux points donnés interceptent des arcs égaux".

5) Conf. Simsonum p. 471 sqq., Vincent p. 42.

τόπον σημείον, γραμμῆς δὲ τόπον γραμμῆν, ἐπιφανείας δὲ ἐπιφάνειαν, στερεοῦ δὲ στερεόν, οἱ δὲ διεξοδικοί, ὡς σημείου μὲν γραμμῆν, γραμμῆς δ' ἐπιφάνειαν, ἐπιφανείας δὲ στερεόν, οἱ δὲ ἀναστροφικοί, ὡς σημείου μὲν ἐπιφάνειαν, 22 γραμμῆς δὲ στερεόν. τῶν δὲ ἐν τῇ ἀναλυσμένῃ οἱ μὲν τῶν θέσει δεδομένων ἐρεχτικοί εἰσιν, οἱ δὲ ἐπιπέδου λεγόμενοι καὶ οἱ στερεοί. γραμμικοὶ διεξοδικοί εἰσιν σημείων, οἱ δὲ πρὸς ἐπιφανείαις ἀναστροφικοὶ μὲν εἰσιν σημείων, διεξοδικοί δὲ γραμμῶν· οἱ μὲντοι γραμμικοὶ ἀπὸ τῶν πρὸς ἐπιφανείαις δείκνυνται. λέγονται δὲ ἐπιπέδου μὲν 10 τόποι οὗτοί τε περὶ ὧν ἐπάγομεν καὶ καθόλου ὅσοι εἰσὶν εὐθεῖαι τε καὶ γραμμαὶ ἢ κύκλοι· στερεοὶ δὲ ὅσοι εἰσὶν κῶνων τομαὶ παραβολαὶ ἢ ἑλλείψεις ἢ ὑπερβολαὶ· γραμμικοὶ δὲ τόποι λέγονται ὅσοι γραμμαὶ εἰσιν οὔτε εὐθεῖαι οὔτε κύκλοι οὔτε τινὲς τῶν εἰρημένων κωνικῶν τομῶν. οἱ 15 δὲ ἐπὶ Ἑρατοσθένους ἐπιγραφέντες τόποι πρὸς μεσότητος ἐκ τῶν προειρημένων εἰσὶν τῇ γένει, ἀλλὰ δὲ τῆς ιδιότητος τῶν ἵπουθέσεων· ἐκείνοις.

23 Οἱ μὲν οὖν ἀρχαῖοι εἰς τὴν τῶν ἐπιπέδων [τούτων] τόπων τάξιν ἀποβλέποντες ἐστοιχειώσαν· ἕως ἀμελήσαντες οἱ 20 μετ' αὐτοὺς προσέθηκαν ἑτέροισ, ὡς οὐκ ἀπείρων τὸ πληθος ὄντων, εἰ θέλοι τις προσγράφειν τὰ τῆς τάξεως ἐκείνης ἐχόμενα. θήσω οὖν τὰ μὲν προσκείμενα ὕστερα, τὰ δ' ἐκ τῆς τάξεως πρότερα, μιᾷ περιλαβὼν προτάσει ταύτη·

ἐὰν δύο εὐθεῖαι ἀθρώσιν ἤτοι ἀπὸ ἐνὸς δεδομένου 25 σημείου ἢ ἀπὸ δύο, καὶ ἤτοι ἐπ' εὐθείας ἢ παράλληλοι ἢ δεδομένην περιέχουσαι γωνίαν, καὶ ἤτοι λόγον

1. γραμμῆν Ha pro γραμμῆ 2. ἐπιφάνειαν idem pro ἐπιφάνεια
3. δ' add. Hu 5. τῶν δὲ — 48. ἐκείνοις interpolatori tribuit Hu
6. ταῖς θέσει AS, τῷ θέσει B, corr. Ha οἱ δὲ διεξοδικοί οἱ ἐπιπέδοι cet. voluisse videtur interpolator 7. στερεοὶ καὶ γραμμικοὶ Ha
8. ἐπιφανείας BS vulgo 9. 10. ἀπὸ τῶν om. V 10. ἐπιφάνειαν Ha
11. καὶ ante καθόλου et 12. τε καὶ om. Ha 14. ὅσοι B^o Ha
15. τινὲς Hu pro τις 18. lacunam ante ἐκείνοις statuit Ha, latine vertit "diversa sunt ab illis", unde ἀνόμοιοι ἐκείνοις conji. Hu 19. εἰς τὴν add. Hu τούτων τόπων ABS, τόπων τούτων Hu, τούτων e

tum, lineae locum lineam, superficiei superficiem, solidi solidum esse dicit, partim *διεξοδικοί* sive progredientes, ut puncti locum lineam, lineae superficiem, superficiei solidum *idem* appellat, partim denique *ἀναστροφικοί* sive circumvertentes, ut puncti superficiem, lineae autem solidum. [Eorum qui in analytica demonstratione inveniuntur alii sunt fixi in rectis positione datis, alii ii qui plani et solidi vocantur. Lineares sunt progredientes ex punctis; ii autem, qui ad superficies spectant, circumvertentes sunt ex signis vel progredientes ex lineis. Lineares tamen ex iis qui ad superficies spectant demonstrantur. Plani autem loci et ii appellantur, de quibus agimus, et omnino quocunque sunt rectae et lineae vel circuli; solidi autem, quocunque sunt conorum sectiones, parabolae vel ellipses vel hyperbolae. Lineares denique loci appellantur, quocunque lineae neque rectae sunt neque circulares neque conicae quas modo diximus sectiones. Loci vero, quos Eratosthenes "ad medietates" inscripsit, genere quidem referendi sunt ad superiores, sed propter peculiarem hypothesium naturam illis sunt dissimiles.]

Veteres quidem locorum planorum ordinem in conficiendis elementis respexerunt. Quo neglecto posteriores alios locos addiderunt, quasi non infiniti numero essent, si quis omnia quae ex ordine illo pendent conscribere vellet. Iam vero ea quae adiecta sunt ponam posteriora, reliqua ex ordine priora, eaque hac una propositione comprehendam:

I. Si duae rectae ducantur vel ab uno dato puncto vel a duobus eaeque vel unam rectam efficiant vel parallelae sint¹; vel datum angulum contineant, ac vel datam inter se

4) Brevius Bretonus p. 299: "dans la même direction", scilicet ab uno puncto ἐν τῷ αὐτῷ, a duobus παραλλήλοις.

ditlographia ortum esse existimat Ha 22. τὰ Ha pro οὐ 23. προ-
ξείμενα ABS Ha, ea quae adiecta sunt Simsonus p. xv, corr. Ge
24. δ' ἐκ τῆς ASV, δὲ ἐκ τῆς B, δὲ τῆς Ha 25. ἐχθῶσαι om. Ha
27. γωρίαι AB, corr. S

ἔχουσαι πρὸς ἀλλήλας ἢ χωρίον περιέχουσαι δεδομένον, ἀπτήται δὲ τὸ τῆς μιᾶς πέρας ἐπιπέδον τόπον θέσει δεδομένου, ἄψεται καὶ τὸ τῆς ἐτέρας πέρας ἐπιπέδον τόπου θέσει δεδομένου ὅτε μὲν τοῦ ὁμογενοῦς, ὅτε δὲ τοῦ ἐτέρου, καὶ ὅτε μὲν ὁμοίως κείμενον πρὸς τὴν εὐθείαν, ὅτε δὲ ἐναντίως. ταῦτα δὲ γίνεται παρὰ τὰς διαφορὰς τῶν ὑποκειμένων.

- 24 Τὰ δὲ προσκαίμενα ἐν ἀρχῇ μὲν ἐπὶ Χαρμάνδρου γ' συμφωνεῖ ταῦτα·

ἐὰν εὐθείας τῷ μεγέθει δεδομένης τὸ ἐν πέρας ἢ δεδομένου, τὸ ἕτερον ἄψεται θέσει δεδομένης περιφερείας κοίλης·

ἐὰν ἀπὸ δύο δεδομένων σημείων κλασθῶσιν εὐθεῖαι δεδομένην περιέχουσαι γωνίαν, τὸ κοινὸν αὐτῶν σημεῖον ἄψεται θέσει δεδομένης περιφερείας κοίλης·

ἐὰν τριγώνου χωρίου μεγέθει δεδομένου ἢ βάσις θέσει καὶ μεγέθει δεδομένη ἢ, ἡ κορυφή αὐτοῦ ἄψεται θέσει δεδομένης εὐθείας·

- 25 Ἔτερα δὲ τοιαῦτα·

ἐὰν εὐθείας τῷ μεγέθει δεδομένης καὶ παρὰ τινι θέσει δεδομένην εὐθείαν ἡγμένης τὸ ἐν πέρας ἀπτήται θέσει δεδομένης εὐθείας, ἄψεται καὶ τὸ ἕτερον εὐθείας θέσει δεδομένης·

ἐὰν ἀπὸ τινος σημείου ἐπὶ θέσει δεδομένης δύο εὐθείας παραλλήλους ἢ συμπίπτουσας καταχθῶσιν ἐν δεδομέναις γωνίαις ἥτοι λόγον ἔχουσαι πρὸς ἀλλήλας δεδομένον ἢ ἂν ἡ μία μεθ' ἧς πρὸς ἣν ἡ ἑτέρα λόγον ἔχει δοθέντα δεδομένη ἐστίν, ἄψεται τὸ σημεῖον θέσει δεδομένης εὐθείας·

8. μὲν om. Ha 9. συμφωνεῖ S ταῦτα] fortasse ταύτη
14. γωνίαι et σημείων AB, corr. S 22. θέσει om. Ha 25. post
καταχθῶσιν add. ἥτοι ἐπ' εὐθείας ἢ Hu auctore Simsono (vide La-
lina) 23. 26. δεδομένη γωνία [sine acc.] A, δεδομένη γωνία BS,
corr. Ha 26. ἔχουσιν A, ἔχουσι BS, corr. Ha

proportionem habeant vel datum rectangulum comprehendant, ~~unius autem harum rectarum terminus tangat locum planum~~ positione datum: etiam alterius ~~rectae~~ terminus tanget locum planum positione datum: modo eiusdem generis, modo diversum, et modo similiter positum respectu rectae, modo contrarium¹⁾. Haec autem fiunt secundum differentias eorum quae subiiciuntur (*i. e. hypothesis*).

Cum his conveniunt tria a Charandro initio adiecta:

II. Si rectae magnitudine datae unus terminus datus sit, alter tanget *circuli* circumferentiam concavam positione datam.

III. Si a duobus datis punctis inflectantur rectae datum continentis angulum, commune earum punctum tanget *circuli* circumferentiam concavam positione datam.

IV. Si trianguli spatii magnitudine dati basis positione et magnitudine data sit, vertex eius tanget rectam positione datam.

Sequuntur alia id genus:

V. Si rectae magnitudine datae, quae parallela cuidam rectae positione datae ducta est, unus terminus tangat rectam positione datam, etiam alter tanget rectam positione datam.

VI. Si a quodam puncto ad duas rectas positione datas *vel* parallelas vel inter se occurrentes ducantur *vel in eadem recta vel*²⁾ in datis angulis, eaeque vel datam proportionem inter se habeant vel quarum una simul cum ea, ad quam altera habet proportionem datam, data est³⁾: punctum tanget rectam positione datam⁴⁾.

1) Haec ne Graeci quidem mathematicorum studiosi intellegere potuerunt nisi cognitis ipsis Apollonii propositionibus: nobis recentioribus conferendus est Apollonii locorum planorum liber primus a Simsono restitutus p. 3—33 (Ca p. 36—73).

2) Haec addit Simsonus p. 35 (Ca p. 74).

3) "Vel quarum una maior vel minor est altera data quam in ratione" explicandi gratia addit Simsonus p. 44 et 45 (Ca p. 81 et 87).

4) Totam hanc propositionem distinguit alique illustrat Simsonus p. 35—48 (Ca p. 74—94). Eandem Bretonus p. 300 sic vertit: "Si d'un point on mène à deux droites données des obliques sous des angles donnés, et que ces obliques soient entre elles dans un rapport constant, ou bien qu'en ajoutant à l'une d'elles une longueur en raison constante avec la seconde, on obtienne une somme constante, le lieu de ce point sera une ligne droite donnée de position".

καὶ ἐὰν ὥσιν ὁποσαιοῦν εὐθεῖαι θέσει δεδομέναι, καὶ ἐπ' αὐτάς ἀπὸ τινος σημείου καταχθῶσιν εὐθεῖαι ἐν δεδομέναις γωνίαις, ἥ δὲ τὸ ἐπὶ δοθείσῃ καὶ κατηγμένης μετὰ τοῦ ἐπὶ δοθείσης καὶ ἑτέρας κατηγμένης ἴσον τῷ ἐπὶ δοθείσῃ καὶ ἄλλῃς κατηγμένης καὶ τῶν λοιπῶν ὁμοίως, τὸ σημεῖον ἄψεται θέσει δεδομένης εὐθείας.

ἐὰν ἀπὸ τινος σημείου ἐπὶ θέσει δεδομένης παραλλήλους καταχθῶσιν εὐθεῖαι ἐν δεδομέναις γωνίαις ἥτοι ἀποτέμνουσαι πρὸς ταῖς ἐπ' αὐτῶν δοθείσι σημείοις εὐθείας λόγον ἔχούσας ἢ χωρίον περιέχουσαι δεδομένον ἢ ὥστε τὰ ἐπ' αὐτῶν τῶν κατηγμένων δεδομένα εἶδῃ, ἢ τὴν ἑπεροχήν τῶν εἰδῶν ἴσῃ εἶναι δεδομένην χωρίον, τὸ σημεῖον ἄψεται θέσει δεδομένης εὐθείας.

26 Τὸ δὲ δεύτερον βιβλίον περιέχει τάδε·

ἐὰν ἀπὸ δύο δεδομένων σημείων εὐθεῖαι κλασθῶσιν, καὶ ἥ τὰ ἀπ' αὐτῶν δοθέντι χωρίῳ διαφέροντα, τὸ σημεῖον ἄψεται θέσει δεδομένης εὐθείας.

ἐὰν δὲ ὥσιν ἐν λόγῳ δοθέντι, ἥτοι εὐθείας ἢ περιφερείας.

ἐὰν ἡ θέσει δεδομένη εὐθεῖα καὶ ἐπ' αὐτῇ δοθὲν σημεῖον καὶ ἀπὸ τούτου διαχθείσῃ τις πεπερασμένη, ἀπὸ δὲ τοῦ πέρατος ἀχθῇ πρὸς ὁρθὰς ἐπὶ τὴν θέσει δεδομένην, καὶ ἡ τὸ ἀπὸ τῆς διαχθείσης ἴσον τῷ ἐπὶ δοθείσῃ καὶ ἴς ἀπολαμβάνει ἥτοι πρὸς τῷ δοθέντι σημείῳ ἢ πρὸς ἑτέρῳ δοθέντι σημείῳ ἐπὶ τῇ θέσει δεδομένης, τὸ πέρας τῆσδε ἄψεται θέσει δεδομένης περιφερείας.

5. ἄλλῃς; ἑτέρας Ha 8. ἥτοι, quod in ABS vs. 10 ante λόγον legitur, huc transposuit Simsonus p. xii 9. σημείοις Ha pro σημείων 10. post ἔχούσας add. δοθέντα Ha ἢ χωρίον — 12. χωρίῳ uncis seclust Ha περιέχουσαι Simsonus pro περιεχούσας 14. ἐπ' Ha pro ἀπ' 12. ἴσῃ Ha pro ἴσον 13. πρὸς ὁρθὰς Ha pro καὶ θέσει Ha pro θέσιν δεδομένην add. Ha 24. ἥτοι Ha, η καὶ ABS Paris. 2368, ἡ V 25. post σημείῳ repetunt η πρὸς ἑτέρῳ δοθέντι A BS., del. Ha 23. 26. τὸ πέρας — δεδομένης om. A', in marg. add. A² BS 26. τῆσδε; τῆς διαχθείσης Hu

VII. Si quocunque rectae positione datae sint ad easque a quodam puncto ducantur rectae in datis angulis, sitque summa duorum rectangulorum, quorum alterum datà rectà et unà ductà, alterum datà et alterà ductà continetur, aequalis rectangulo, quod datà et alià tertià ductà continetur, et sic in ceteris: punctum tanget rectam positione datam.

VIII. Si a quodam puncto ad parallelas positione datas ducantur rectae in datis angulis eaeque vel ad puncta in ipsis data abscindant rectas datam proportionem habentes vel spatium *rectangulum*¹, datum comprehendant vel eiusmodi sint, ut summa vel differentia figurarum datarum, quae super ipsas ductas constructae sunt, aequalis sit spatio dato: punctum tanget rectam positione datam².

Secundo libro haec continentur:

I. Si a duobus punctis datis rectae inflectantur et quadrata, quae ab his fiunt, dato spatio differant, punctum *concursus harum rectorum* tanget rectam positione datam³.

II. Si vero hae rectae sint in proportionem data, punctum *concursus tanget* vel rectam vel *circuli* circumferentiam *positione datam*⁴.

III. Si recta positione data et in ea punctum datum sit, unde ducta sit quaedam *recta* terminata, ab huius autem termino ducatur perpendicularis ad *rectam* positione datam, et sit quadratum, quod a *primo* ductà fit, aequale rectangulo, quod datà rectà et abscissà vel inter *perpendicularem* et datum punctum vel inter *eundem* et aliud datum punctum in recta positione data continetur: terminus illius *primo* ductae tanget *circuli* circumferentiam positione datam⁵.

1 Graecum *ῥαπλον* omnino *spatium* vel *ebene Figur* interpretantur Simsonus p. xvi (Ca p. 28; et Gerhardtus p. 25; sed ipsum *rectangulum* spatium intellegunt Simsonus p. 98 (Ca p. 182) et Bretonus p. 300.

2 Totam *propositionem* distinguit et illustrat Simsonus p. 93—113 (Ca p. 475—507; neque omittenda est Bretoni p. 304 adnotatio.

3 Vide Simsonum p. 418 sq. (Ca p. 209 sq.) et Bretonum p. 301.

4 V. Simson. p. 420—424 (Ca p. 214—222, Breton l. c., Charles p. 269—272.

5 V. Simson. p. 425—434 (Ca p. 223—233.

ἐὰν ἀπὸ δύο δοθέντων σημείων εὐθεῖαι κλασθῶσιν, καὶ ἡ τὸ ἀπὸ τῆς μιᾶς τοῦ ἀπὸ τῆς ἑτέρας δοθέντι μείζων ἢ ἐν λόγῳ, τὸ σημεῖον ἄψεται θέσει δεδομένης περιφερείας·

ἐὰν ἀπὸ ὁσωνοῦν δεδομένων σημείων κλασθῶσιν εὐθεῖαι πρὸς ἐνὶ σημείῳ, καὶ ἡ τὰ ἀπὸ πασῶν εἶδη ἴσα δοθέντι χωρίῳ, τὸ σημεῖον ἄψεται θέσει δεδομένης περιφερείας·

ἐὰν ἀπὸ δύο δοθέντων σημείων κλασθῶσιν εὐθεῖαι, ἀπὸ δὲ τοῦ σημείου παρὰ θέσει ἀχθεῖσα εὐθεῖα ἀπολαμβάνη ἀπὸ θέσει δεδομένης εὐθείας πρὸς δοθέντι σημείῳ, καὶ ἡ τὰ ἀπὸ τῶν κεκλασμένων εἶδη ἴσα τῷ ἐπὶ δοθείσῃ¹⁰ καὶ τῆς ἀπολαμβανομένης, τὸ πρὸς τῇ κλάσει σημεῖον ἄψεται θέσει δεδομένης περιφερείας·

ἐὰν ἐν κύκλῳ θέσει δεδομένῳ δοθῇ τι σημεῖον ἢ καὶ δι' αὐτοῦ ἀχθῇ τις εὐθεῖα καὶ ἐπ' αὐτῆς ληφθῇ τι σημεῖον ἐκτός, καὶ ἡ τὸ ἀπὸ τῆς ἀχρι τοῦ δοθέντος ἐντός¹⁵ σημείου ἴσον τῷ ἐπὶ τῆς ὅλης καὶ τῆς ἐκτός ἀπολαμβανομένης ᾗτοι μόνον ἢ τοῦτό τε καὶ τὸ ἐπὶ τῶν ἐντός δύο τμημάτων, τὸ ἐκτός σημεῖον ἄψεται θέσει δεδομένης εὐθείας·

καὶ ἐὰν τοῦτο μὲν τὸ σημεῖον ἄπτηται θέσει δεδομένῳ²⁰ τῆς εὐθείας, ὃ δὲ κύκλος μὴ ὑπόκειται, τὰ ἑφ' ἑκάτερα τοῦ δεδομένου σημεία ἄψεται θέσει δεδομένης περιφερείας τῆς αὐτῆς.

3. δοθέντι Ha pro δοθέν μείζων ἢ ἐν A'B, corr. S 3. ἴσα Ha pro ἴσον 8. παρὰ τὴν θέσει ἀχθεῖσα "duratur recta positione datae normalis" Ha, qui pro normalis voluit parallela [sic recte Simsonus p. xvii] ἀπολαμβάνη Hu pro ἀπολαμβανομένη 10. ἴσα Ha pro ἴσον 11. σημείῳ A'B, corr. S 13. ἐντός κύκλου θέσει δεδομένου Ha δοθέντι AS et, ut videtur, B, distinctit Ha σημείῳ ἢ A'BS', corr. prima manus in S 16. ἐπὶ Ha pro ἐπὶ 17. 18. ᾗτοι — τμημάτων] horum verborum cum iustus locus sit vs. 16 post σημείον, non abest interpolationis suspicio 17. ᾗτοι Hu. γ τῷ A'BS', ἡ τὸ Simsonus p. xiii μόνον ἢ τοῦτό τε καὶ τῷ A'BS', corr. Simsonus p. xiii et 194 sq. 20. καὶ ἴαν — 23. τῆς αὐτῆς fortasse ab interpolatore addita sunt 20. τὸ om. Ha 21. ὑπόκειται] conf. supra p. 316, 6 cum adnot. 19' ἑκατέρω Hu 23. σημεία Ha pro σημείον

IV. Si a duobus datis punctis rectae inflectantur sitque quadratum, quod ab una sit, comparatum cum quadrato, quod ab altera sit, dato spatio maius quam in proportionē: punctum concursus harum rectarum tanget circuli circumferentiam positione datam¹.

V. Si a quocunque datis punctis inflectantur rectae ad unum punctum sintque species *i. e. figurarum specie datae*, quae ab omnibus describuntur, aequales dato spatio: punctum tanget circuli circumferentiam positione datam².

VI. Si a duobus datis punctis inflectantur rectae, a puncto autem concursus recta ducatur parallela rectae positione datae, eaque ab alia recta positione data auferat segmentum, cuius alter terminus datum punctum est, sitque summa figurarum specie datarum, quae ab inflexis fiunt, aequalis rectangulo, quod datā et abscissā continetur: punctum concursus rectarum inflexarum tanget circuli circumferentiam positione datam³.

VII. Si intra circulum positione datum punctum aliquod datum sit et per id ducatur recta quaedam in eaque sumatur punctum aliquod extra circulum, ac sit quadratum, quod ex recta ab hoc puncto ad punctum intra datum pertinente fit, aequale rectangulo, quod totā hac rectā et parte extra circulum abscissā continetur, vel solum scil. quadratum vel summa ipsius et rectanguli, quod segmentis duobus interioribus continetur: externum punctum tanget rectam positione datam⁴.

VIII. Si hoc punctum tangat rectam positione datam, circulus autem non suppositus sit, puncta ad utramque partem a dato puncto tangent eandem circuli circumferentiam positione datam⁵.

1. V. Simson. p. 436—444. Ca p. 236—243. et Breton. p. 302. Graeca verba *μείζων ἢ τὸ λόγος*, nota ex Euclidis datis, Bretonus apte sic interpretatur: "le premier carré doit être plus grand d'un espace donné que le carré qui est au second carré dans la raison donnée". Conf. praef. vol. I p. xxiv.

2. V. Simson. p. 459—477. Ca p. 263—287.

3. V. Simson. p. 482—493. Ca p. 310—321. Bretonus p. 302 locum difficillimum sic interpretatur: "Le lieu du point tel, que la somme des aires des polygones respectivement semblables à deux polygones données, construits sur les droites menées de ce point à deux points fixes, soit égale au rectangle construit sur une droite donnée et sur la distance du pied de la perpendiculaire abaissée du même point sur une droite fixe à un point donné sur cette droite, est une circonférence de cercle donnée de position".

4. V. Simson. p. 494—504. Ca p. 322—331. Breton. p. 302.

5. Liberius haec tractat Simsonus p. 504 sqq. Ca p. 331 sqq. Etiam Bretoni p. 302 sq. interpretatio difficultatem horum verborum declarat.

ἔχει δὲ τὰ τύπων ἐπιπέδων δύο βεβλῖα θεωρήματα
ἔτι διαγράμματα οὐκ, λέμματα δὲ ἡ'.

Νεύσεων δύο.

- 27 Νεύειν λέγεται γραμμὴ ἐπὶ σημείον, ἐὰν ἐπεκταλλο-
μένη, ἐπ' αὐτὸ παραγίνηται. καθόλου δὲ τὸ αὐτὸ ἐστίν, ὅ-
ταν τε ἐπὶ δοθέν νεύειν σημείον λέγεται, ἐὰν τε ἐστὶν τι
ἐπ' αὐτῆς δοθέν, ἐὰν τε διὰ δοθέντος ἐστὶν σημείον. ἐπέ-
γραψαν δὲ ταῦτα νεύσεις ἀπὸ ἐνὸς τῶν εἰρημένων, προ-
βλήματος δὲ ὅτος καθολικοῦ τοῦτον

δύο δοθεισῶν γραμμῶν θέσει, θεῖναι μεταξὺ τοῦτων¹⁰
εὐθείαν τῇ μεγέθει δεδομένην νεύουσιν ἐπὶ δοθέν σημείον,

ἐπὶ ταύτης τῶν ἐπὶ μέρους διάφορα τὰ ὑποκείμενα
ἐχόντων ἃ μὲν [ἔν] ἐπίπεδα, ἃ δὲ στερεά, ἃ δὲ γραμμικά,
τῶν ἐπιπέδων ἀποκλιγρώσαντες τὰ πρὸς πολλὰ χρησιμώ-
τερα ἔδειξαν τὰ προβλήματα ταῦτα.¹⁵

θέσει δεδομένων ἑμικυκλίου τε καὶ εὐθείας πρὸς ὁρ-
θας τῇ βάσει, ἢ δύο ἑμικυκλίων ἐπ' εὐθείας ἐχόντων τὰς
βάσεις, θεῖναι δοθεῖσαν τῇ μεγέθει εὐθεῖαν μεταξὺ τῶν
δύο γραμμῶν, νεύουσιν ἐπὶ γωνίαν ἑμικυκλίου.

καὶ ῥόμβον δοθέντος καὶ ἐπεκβεβλημένης μιᾶς πλευ-²⁰
ρᾶς, ἀρμόσαι ἐπὶ τὴν ἐκτὸς γωνίαν δεδομένην τῇ μεγέθει
εὐθείαν νεύουσιν ἐπὶ τὴν ἀντιρρὸς γωνίαν.

καὶ θέσει δοθέντος κύκλου, ἀρμόσαι εὐθεῖαν μεγέ-
θει δεδομένην νεύουσιν ἐπὶ δοθέν.

- 28 τοῦτων δὲ ἐν μὲν τῇ πρώτῃ τεύχει δέδεικται τὸ ἐπὶ²⁵
τοῦ ἐνὸς ἑμικυκλίου καὶ εὐθείας, ἔχον πτώσεις δ', καὶ τὸ
ἐπὶ τοῦ κύκλου ἔχον πτώσεις δύο, καὶ τὸ ἐπὶ τοῦ ῥόμβου
πτώσεις ἔχον β'. ἐν δὲ τῇ δευτέρῃ τεύχει τὸ ἐπὶ τῶν δύο

1. γραμμὴν S Go ἐπεκταλλομένη· A 3. παραγίνεται B^s Ha,
παραγίνεται AS 3. καθόλου — 8. εἰρημένων interpolatori tribuit Hu
7. σημείον ABS, corr. V 12. ἐπὶ τοῦτον conit. Horsley 13. ἡ-
del. Hu 14. τῶν δ' ἐπιπέδων Ha χρησιμωτέρων ABV, corr. se-
cunda manus in Paris. 2368 S 15. ἔδειξαν τὰ Hu. ἔδειξαντε A, ἔδειξαν
τε BS, ἔδειξαν Ha 20. ἐπεκβεβλημένης AB, ἐπεμβεβλημένης S, corr. Ha
μοῖης ante μιᾶς add. Ha 25. τεύχει βεβλῖν B pr. m. 26. εὐ-

Libri duo locorum planorum continent theoremata sive diagrammata CXXXVII, lemmata VIII.

INCLINATIONUM LIBRI DUO.

Inclinare sive *vergere* dicitur linea ad punctum, si producta ad id perveniat. Omnino idem est, sive ad datum punctum *linea* inclinare dicitur, sive in ea *punctum* quoddam datum est, sive per datum punctum transit; verum has *promiscue* inclinationes ab uno eorum quae dicta sunt appellarunt.] Iam cum problema generale hoc esset:

I. duabus lineis positione datis, inter eas ponere rectam magnitudine datam, quae ad datum punctum inclinet,

cumque illa quae in ea *recta* particularia sunt diversas hypotheses haberent partim planas, partim solidas, partim etiam lineares, e planis elegerunt ea quae ad multas res utilia essent, haecque problemata demonstraverunt.

II. Si semicirculus et recta ad basim perpendicularis, vel duo semicirculi in *eodem* recta bases habentes dati sint, ponere rectam magnitudine datam inter illas duas lineas, quae ad angulum semicirculi inclinet.

III. Rhombo dato unoque latere producto, sub externo angulo rectam magnitudine datam inserere, quae ad angulum oppositum inclinet¹).

IV. Circulo positione dato, inserere rectam magnitudine datam, quae ad datum *punctum* inclinet.

Quorum *problematum distributio haec est*: in primo libro problema de uno semicirculo et recta, quod quattuor² casus habet, tum de circulo, quod duo casus habet, denique de rhombo, quod duo casus habet, demonstrata sunt; in se-

1 "Sed et problema de recta, magnitudine data, angulo interiori per oppositum angulum subilicienda, ab Apollonio resolutum esse ex Papp. lib. 7 prop. 73 liquido constat". Horsley praef. p. 2.

2 Quinque casus demonstrat Horsley p. 3—5. quare in Graecia $\pi\epsilon\iota\tau\epsilon$ legendum esse censet.

ἡμιτεκλίων, τῆς ἐπιθέσεως πτώσεως ἐχούσης ι'· ἐν δὲ ταί-
ταις ὑποδιαιρέσεσι πλείονες διοριστίζαι ἔνεκα τοῦ δεδομέ-
νου μεγέθους τῆς εὐθείας.

- 29 Τὰ μὲν οὖν ἐν τῇ ἀναλυομένῃ τέτῳ ἐπίπεδα ταῦτ'
ἔστιν ἃ καὶ πρότερον δέκνυνται, χωρὶς τῶν Ἑρατοσθένους³
μεσοτήτων· ὅσατα γὰρ ἐκεῖνα. τοῖς δὲ ἐπιπέδοις ἐφεξῆς
τὴν τῶν στερεῶν ἢ τάξεις ἀπαιτεῖ θεωρίαν· στερεὰ δὲ κα-
λοῦναι προβλήματα οὐχ ὅσα ἐν στερεοῖς σχήμασι προτείνε-
ται, ἀλλ' ὅσα διὰ τῶν ἐπιπέδων μὴ δυνάμενα δειχθῆναι
διὰ τῶν τριῶν κωνικῶν γραμμῶν δέκνυνται, ὥστε ἀναγκαῖον¹¹
πρότερον περὶ τούτων γράφειν. Ἦν μὲν οὖν ἀναδεδομένα
κωνικῶν στοιχείων πρότερον Ἀρισταίου τοῦ πρεσβύτερου
εἴ τεύχη, ὡς ἂν ἦδη, δυνατοῖς οὖσι ταῦτα παραλαμ-
βάνουσιν ἐπιτομώτερον γεγραμμένα.

Ἐχει δὲ τὰ τῶν νεύσεων βιβλία δύο θεωρήματα μὲν¹⁵
ἦτοι διαγράμματα ραί, λήμματα δὲ λή'.

Κωνικῶν ἡ'.

- 30 Τὰ Εὐκλείδου βιβλία δ' κωνικῶν Ἀπολλώνιος ἀνα-
πληρώσας καὶ προσθεῖς ἑτέρα δ' παρέδωκεν ἡ' κωνικῶν
τεύχη. Ἀρισταῖος δέ, ὅς γε γέγραφε τὰ μέχρι τοῦ νῦν ἀνα-²⁰
διδόμενα στερεῶν τέτῳ τεύχη εἴ συνεχῇ τοῖς κωνικοῖς,
ἐκάλει [καὶ οἱ πρὸ Ἀπολλωνίου] τῶν τριῶν κωνικῶν γραμ-
μῶν τὴν μὲν ὀξυγωνίον, τὴν δὲ ὀρθογωνίον, τὴν δὲ ἀμβλυ-
γωνίον κώνου τομήν. ἐπεὶ δ' ἐν ἑκάστῃ τῶν τριῶν τού-
των κώνων διαφόρως τεμνομένων αἱ γ' γίνονται γραμμαί,²⁵
διαπορήσας, ὡς φαίνεται. Ἀπολλώνιος τί δέποτε ἀποκλη-

3. Τὰ μὲν — 11. γεγραμμένα interpolatori tribuit Hu 4. ἐπί-
πεδα Ha pro ἐπιπέδοις τοῦτ' Hu 5. δέκνυνται Ha 6. ὅσατε
S 7. τάξεις 'sine acc. A, corr. BS 11. ἀναδεδομένα Hu pro ἀνα-
διδόμενον 13. ὡς ἂν τοῖς ἦδη δυνατοῖς οὖσι ταῦτα παραλαμβάνει
Ha, ὡς ἂν ἦδη δυνατοῖς οὖσι τὰ τοιαῦτα παραλαμβάνειν Hu 15. δύο
βιβλία Hu μὲν om. Ha 18. ἀναπλήσας AB, corr. Paris. 236^v
SV 20. ἀρισταίας 'sine acc. A, corr. S γέγραφε Hu. γράφει
ABS, ἔγραψε Ge τὰ Ha, καὶ BS, om. A 22. καὶ οἱ πρὸ Ἀπολ-
λωνίου del. Hu 24. ἐπειδὴ ἐν Ha 25. κώνων idem pro κωνικῶν

cundo libro problema de duobus semicirculis, cuius hypothesis decem casus¹, habet; suntque in his complures subdivisiones determinativae propter datam rectae magnitudinem.

[Haec igitur plana in loco de resolutione reperiuntur, quae etiam priora demonstrata sunt praeter Eratosthenis methodates, quae ultimum locum obtinent. Sed post plana deinceps solidorum contemplationem ordo requirit. Iam solida problemata non tam ea vocantur, quae in solidis figuris proponuntur. sed quae, cum per plana demonstrari non possint. per tres conicas lineas demonstrantur, quapropter de his prius scribere necesse est. Ac conicorum elementorum prius Aristaei maioris quinque libri editi erant, in eorum usum qui eiusmodi *problemata* iam percipere valerent, compendiosius conscripti.]

Duo inclinationum libri theoremata sive diagrammata CXXV, lemmata XXXVIII habent.

CONICORUM LIBRI OCTO.

Euclidis quattuor conicorum libros Apollonius ita complevit, ut quattuor aliis additis *omnino* octo conicorum volumina *studiosis mathematicorum* traderet. *Ante hunc* Aristaeus, qui solidorum locorum volumina quinque, adhuc usque prostantia, tamquam supplementum conicorum doctrinae scripsit. [perinde atque ii qui ante Apollonium fuerant] trium conicarum linearum primam coni acutanguli, secundam rectanguli, tertiam obtusanguli sectionem appellaverat. Sed quoniam in quovis horum conorum genere, prout secantur, tres illae lineae existunt, Apollonium haesitavisse apparet, qua tandem distinc-

1 "Semicirculorum nempe status quintuplex: circulis contingentibus intus, contingentibus extrinsecus, nullibi occurrentibus altero incluso, nullibi occurrentibus incluso neutro, secantibus. In statu autem unoquoque gemina erit semicirculorum positio: ad partes baseos aut easdem aut contrarias. En tibi decem, ni fallor, hypotheseos casus, quos Pappus innuit". Horsley praef. p. 3.

* * γράμματα A 26. ἀποκλινόμενοι discrete enotatum est ex A. ἀποκλινόμενοι BSV Paris. 2368, ἀποκλινόμενοι Ha

ρώσαντες οἱ πρὸ αὐτοῦ ἦν μὲν ἐκάλουν ὀξυγωνίου κώνου
 τομῇν δυναμένην καὶ ὀρθογωνίου καὶ ἀμβλυγωνίου εἶναι.
 ἦν δὲ ὀρθογωνίου εἶναι δυναμένην ὀξυγωνίον τε καὶ ἀμβλυ-
 γωνίον, ἦν δὲ ἀμβλυγωνίου δυναμένην εἶναι ὀξυγωνίου τε
 καὶ ὀρθογωνίου, μεταθεῖς τὰ ὀνόματα καλεῖ τὴν μὲν ὀξυ-
 γωνίου καλουμένην ἔλλειψιν, τὴν δὲ ὀρθογωνίου παραβο-
 λήν, τὴν δὲ ἀμβλυγωνίου ὑπερβολήν, ἐκάστην ἀπὸ τινος
 ἰδίου συμπεριχότος. χωρίον γάρ τι παρὰ τινι γραμμῇν
 παραβαλλόμενον ἐν μὲν τῇ ὀξυγωνίου κώνου τομῇ ἐλλείπον
 γίνεται τετραγώνῳ, ἐν δὲ τῇ ἀμβλυγωνίου ὑπερβάλλον τετρα-
 γώνῳ, ἐν δὲ τῇ ὀρθογωνίου οὔτε ἐλλείπον οὐδ' ὑπερβάλ-
 31 λον. τοῦτο δ' ἔπαθεν μὴ προσενοήσας ὅτι κατὰ τινι
 ἰδίαν πτώσει τοῦ τέμνοντος ἐπιπέδου τὸν κώνον καὶ γεν-
 νῶντος τρεῖς γραμμὰς ἐν ἐκάστῃ τῶν κώνων ἄλλη καὶ ἄλλη
 τῶν γραμμῶν γίνεται, ἦν ὠνόμασεν ἀπὸ τῆς ιδιότητος τοῦ 15
 κώνου. εἰάν γάρ τὸ τέμνον ἐπίπεδον ἀχθῇ παράλληλον μιᾷ
 τοῦ κώνου πλευρᾷ, γίνεται μία μὴν τῶν τριῶν γραμμῶν,
 αἰεὶ ἡ αὐτή, ἦν ὠνόμασεν ὁ Ἀρισταίος ἐκείνου τοῦ τμη-
 θέντος κώνου τομῇν.
 32 Ὁ δ' οὖν Ἀπολλώνιος οἷα περιέχει τὰ ὑπ' αὐτοῦ γε-
 φέντα κωνικῶν ἡ βιβλία λέγει κεφαλαιώδη θεῖς προδήλω-
 πιν ἐν τῷ προοιμίῳ τοῦ πρώτου ταύτην· ὅτι περιέχει δὲ τὸ μὲν
 πρῶτον τὰς γενέσεις τῶν τριῶν τομῶν καὶ τῶν ἀντικειμένων
 καὶ τὰ ἐν αὐταῖς ἀρχικὰ συμπτώματα ἐπὶ πλεῖον καὶ καθό-
 λου μᾶλλον ἐζητασμένα παρὰ τὰ ἐπὶ τῶν ἄλλων γεγραμ-
 25 μένα. τὸ δὲ δεύτερον τὰ περὶ τὰς διαμέτρους καὶ τοὺς
 ἄξονας τῶν τομῶν καὶ τῶν ἀντικειμένων συμβαίοντα καὶ

4. εἶναι δυναμένην B ὀξυγωνίοντε A, corr. BS 7. ἀπὸ SV.
 δ' ἀπὸ A, δὲ ἀπὸ B¹ Ha. γ' ἀπὸ Hu 10. ἐν δὲ τῇ ἀμβλ. — τετρα-
 γώνῳ om. B¹ Ha 12. τοῦτο δ' ἔπαθεν scil. ὁ Ἀρισταίος — 19. το-
 μῇν interpolatori tribuit Hu 12. δεπαθὲν A, distinxerunt et acc. corr.
 BS προσροήσας ABS, προροήσας Ha, corr. Hu 13. ἰδίαν Hu pro
 utar 13. 14. verba καὶ γεννῶντος τρεῖς γραμμὰς aller interpolator
 interpolato iam loco inseruisse videtur 14. ἄλλη καὶ ἄλλη ABS,
 corr. Ha 15. ὠνόμασεν Hu pro ὠνόμασι 17. μια μὴν (sine
 acc.: A, corr. BS 18. ἐκείνος Ha 20. Ὁ γοῦν Hu 22. περι-

tione usi priores *mathematici* aliam acutanguli conici sectionem vocavissent, quae et rectanguli et obtusanguli esse posset, aliam rectanguli, quae et acutanguli et obtusanguli posset esse, aliam denique obtusanguli, quae posset esse et acutanguli et rectanguli. Quapropter mutatis nominibus eam *sectionem* quae acutanguli dicebatur, ellipsim, quaeque rectanguli, parabolam, denique quae obtusanguli, hyperbolam, singulas a peculiari quodam accidente nuncupavit. Etenim rectangulum ad rectam quandam applicatum in sectione acutanguli conici deficit *ἐλλείπει*, quadrato, in sectione obtusanguli excedit *ὑπερβάλλει*, quadrato, denique in sectione rectanguli conici applicatum *πααραβαλλόμενον* neque deficit neque excedit¹. [Sed hoc accidit *Aristaeo*, quoniam non animadvertit per peculiarem quendam casum planities conum secantis²; in quovis cono singulas lineas existere, quas e proprietate conici appellavit. Nam si planities secans uni conici lateri parallela ducitur, una tantum illarum trium linearum semperque eadem existit, quam *Aristaeus* illius secti conici sectionem appellavit.]

Iam vero Apollonius, quae octo conicorum libris ab ipso conscriptis contineantur, dicit in exordio primi libri hanc praeviam explicationem summam proponens: "Continet primus liber generationes trium conici sectionum et earum quae oppositae dicuntur, tum principalia illarum accidentia, uberius et magis in universum quam ab aliis, qui de eo argumento scripserunt, elaborata. Secundus liber complectitur ea quae ad diametros et axes sectionum [et oppositarum] pertinent,

¹ Vide Apollonii conic. 1 prop. 11—13, et conf. H. Balsam, *des Apollonius sieben Bücher über Kegelschnitte*. Berolini 1864, p. 18—23; Herm. Hankel, *Geschichte der Mathematik*. p. 98 sq. 150.

² Sequuntur in codice verba καὶ γερῶντος τρεῖς γραμμάς "et tres lineas effrangentis", de quibus v. adnot. ad Græca.

ἔχει δὲ τὸ cet.; vide Apollonium ab Halleio editum p. 8 23. τῶν ἀντικειμένων Ha ex Apollonio pro τὰς ἀντικειμένης 24. καὶ ex Apollonio add. Ha 25. ἐξηρασμένα Apollonius 27. καὶ τῶν ἀντικειμένων non leguntur apud Apoll.

τὰς ἀσυμπύτους, καὶ ἄλλα γενικὴν καὶ ἀναγκαίαν χρεῖαν
παρεχόμενα πρὸς τοὺς διορισμούς· τίνας δὲ διαμέτρους
ἢ τίνας ἄξοντας καλῶ εἰδήσεις ἐκ τοῦτον τοῦ βιβλίου. τὸ
δὲ τρίτον πολλὰ καὶ παντοία χρήσιμα [τὰ πρὸς τε τὰς
συνθέσεις τῶν στερεῶν τόπων καὶ τοὺς διορισμούς, ὧν τὰ
πλείονα καὶ καλὰ καὶ ξένα κατανοήσαντες εἴρομεν μὴ συν-
τιθέμενοι ἐπὶ Εὐκλείδου τὸν ἐπὶ τρεῖς καὶ ὁ γραμμὰς
τόπον, ἀλλὰ μόριόν τι αὐτοῦ καὶ τοῦτο οὐκ εὐτυχῶς· οὐ
γὰρ δυνατόν ἄνευ τῶν προειρημένων τελειωθῆναι τὴν σύν-
θεσιν. τὸ δὲ δ', ποσάχως αἱ τῶν κῶνων τομαὶ ἀλλήλαις
τε καὶ τῇ τοῦ κύκλου περιφερείᾳ συμπίπτουσιν, καὶ ἐκ
περισσοῦ, ὧν οὐδέτερον ἐπὶ τῶν πρὸ ἡμῶν γέγραπται.
κῶνον τομῇ κύκλου περιφερείᾳ [κατὰ πόσα σημεῖα συμ-
βάλλει καὶ ἀντικείμεναι ἀντικείμεναις κατὰ πόσα σημεῖα
συμβάλλουσιν τὰ δὲ λοιπὰ δ' περιουσιαστικώτερα· ἔστι
γὰρ τὸ μὲν περὶ ἐλαχίστων καὶ μεγίστων ἐπὶ πλείον, τὸ
δὲ περὶ ἴσων καὶ ὁμοίων τομῶν, τὸ δὲ διοριστικῶν θεω-
ρημάτων, τὸ δὲ κωνικῶν προβλημάτων διωρισμένων".

- 33 Ἀπολλώνιος μὲν ταῦτα. ὃν δὲ φησιν ἐν τῷ τρίτῳ τό-
πον ἐπὶ γ' καὶ ὁ γραμμὰς μὴ τετελειωθῆναι ἐπὶ Εὐκλεί-
δου, οὐδ' ἂν αὐτὸς ῥηθῇ οὐδ' ἄλλος οὐδείς [ἀλλ' οὐδὲ
μικρόν τι προσθεῖναι τοῖς ἐπὶ Εὐκλείδου γραφεῖσιν διὰ
γε μόνων τῶν προδεδειγμένων ἤδη κωνικῶν ἄχρι τῶν κατ'
Εὐκλείδην, ὡς καὶ αὐτὸς μαρτυρεῖ λέγων ἀδύνατον εἶναι
34 τελειωθῆναι χωρὶς ὧν αὐτὸς προγράφειν ἤναγκάσθαι. (ὃ δὲ
Εὐκλείδης ἀποδεχόμενος τὸν Ἀριστῆον ἄξιον ὄντα εἶναι
ἢ δὲ παραδεδιώκει κωνικοῖς, καὶ μὴ φθάσας ἢ μὴ θελίσας
ἐπικαταβάλλεσθαι τοῦτων τὴν αὐτὴν πραγματείαν, ἐπει-

4. ἄλλας· ἐνικὴν A BS., ex Apoll., corr. Ha

4. πολλὰ καὶ παρὰ-
δοξα θεωρήματα χρήσιμα πρὸς τε cet. Apoll. τὰ expunctum in V
del. Hu

5. 6. ὧν τὰ πλείστα καλὰ καὶ ξένα. α καὶ κατανοήσαντες
συνείδομεν Apoll.

6. καὶ ante καλὰ cum Apollonio om. V Ha

8. τι· τὸ τευχὸν Apoll. 9. τῶν προσενηρημένων ἡμῖν Apoll. 11. συμ-
βάλλουσιν Apoll. ἄλλα ante ἐκ περισσοῦ ex Apoll., add. Ha

12. πρὸς
AB, corr. S 13. 14. κῶνον τομῇ ἢ κύκλου περιφέρεια καὶ ἐπὶ ἀντι-
κεῖνται cet. Apoll. 13. περιουσια (sine acc. A, corr. BS κατὰ

item doctrinam de rectis asymptotis aliaque quae et generalem et necessarium usum ad determinationes praebent: quos autem appellem diametros et quos axes, ex hoc libro cognosces. Tertius liber multa et varia theorematum continet utilia ad solidorum locorum compositiones et determinationes, quorum cum plurima et egregia et insolita esse cognovissemus, ab Euclide locum ad tres et quattuor lineas non compositum esse invenimus, nisi quod particulam quandam, ac ne hanc quidem feliciter, attigit. Neque enim fieri poterat, ut sine iis quae diximus theorematum compositio absolveretur. Quartus liber demonstrat, quot modis conorum sectiones et inter sese et circuli circumferentiae occurrant, atque insuper, quorum neutrum a superioribus explicatum est, in quot punctis coni sectio circuli circumferentiae et oppositae sectiones oppositis occurrant. Reliqui autem quattuor libri ad abundantio-rem scientiam pertinent. Etenim quintus de minimis et maximis uberius agit, sextus de aequalibus similibusque coni sectionibus, septimus de theorematum, quae determinandi vim habent, octavus de conicis problematibus determinativis".

Haec igitur Apollonius. Sed quod in tertio libro locum ad tres et quattuor lineas ab Euclide confectum esse negat, neque ipse neque alius quisquam per ea tantum conica theorematum, quae usque ad Euclidis aetatem demonstrata erant, illum locum solvere potuisset, ut ipse testatur negans sine iis, quae ipse antea demonstrare coactus fuerit, illa absolvi posse. Euclides cum probaret Aristaeum iam propter ea quae ediderat conica auctoritatem quandam assecutum, neque aut illum praevenire aut eiusdem disciplinae fundamenta statim post

πόσα σημεία συμβάλλει del. Hu 13. περι ους αστιχώτερον Α Β, corr. S 16. μεγίστων τῶν ΑΒΣ, τῶν del. Hu 17. τομῶν κώνων τὸ δὲ περι διοριστικῶν Apoll. 18. προβλημάτων κωνικῶν Apoll. 20. τε-
λειωθῆναι Hu 21. οὐτ' ἂν — οὐτ' Ha 21. 22. ἀλλ' οὐδὲ — γρά-
φεισιν del. Hu 23. ὁ δὲ Εὐκλείδης — p. 678, 15. τοιοῦτος ἐστιν
scholiastae cuidam historiae quidem veterum mathematicorum non im-
perito, sed qui dicendi genere languido et inconcinno usus sit, tribuit
Hu 26. ἀριστέα ABS, corr. Ha 27. παραδεδωκε Β* Ha. παραδε-
δωκε Γε 28. τότε Hu

- κρίστατος ὢν καὶ πρὸς ἅπαντας εἰμενὶς τοῖς καὶ κατὰ πο-
 σὶν συναίξειν δυναμένους τὰ μαθήματα, ὡς δεῖ, καὶ μη-
 δαμῶς προσκροστικὸς ὑπάρχων, καὶ ἀκριβὲς μὲν οὐκ ἀλα-
 ζονικὸς δὲ καθάπερ οὗτος, ὅσον δυνατόν ἦν δεῖξαι τοῖ
 τόπον διὰ τῶν ἐκείνου κωνικῶν ἔγραψεν, οὐκ εἰπὼν τέλος
 ἔχειν τὸ δεικνύμενον· τότε γὰρ ἦν ἀναγκαῖον ἐξελέγχειν,
 τὴν δ' οὐδαμῶς, ἐπεὶ τοὶ καὶ αὐτὸς ἐν τῇς κωνικαῖς ἀτελεῖ
 35 τὰ πλεῖστα καταλιπὼν οὐκ εὐθύνεται. προσθεῖναι δὲ τῇ
 τότῃ τὰ λειπόμενα δεδένηται προφαντασισθεῖς τοῖς ὑπὸ
 Εὐκλείδου γεγραμμένοις ἔσθι περὶ τοῦ τόπου καὶ συσχελά-
 10 σας τοῖς ὑπὸ Εὐκλείδου μαθηταῖς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ πλεῖστοι
 χρόνον, ὅθεν ἔσχε καὶ τὴν τοιαύτην ἔξιν οὐκ ἀμαθῆ. οὗτος
 δὲ ὁ ἐπὶ γ' καὶ δ' γραμμὰς τύπος, ἐφ' ᾧ μέγα φρονεῖ
 προσθεῖς χάριν ὀφείλειν εἰδέναι τῇ πρώτῃ γράψαντι, τοι-
 36 οὔτως ἐστίν. ἔαν γάρ, θέσει δεδομένων τριῶν εὐθειῶν, 15
 ἀπὸ τινος τοῦ αὐτοῦ σημείου καταχθῶσιν ἐπὶ τὰς τρεῖς
 ἐν δεδομέναις γωνίαις εἰθεῖαι, καὶ λόγος ἢ δοθεῖς τοῦ ἐπὶ
 δύο κατηγμένων περιεχομένου ὀρθογωνίου πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς
 λοιπῆς τετραγώνου, τὸ σημεῖον ἄψεται θέσει δεδομένου
 στερεοῦ τόπου, τοῦτέστιν μιᾶς τῶν τριῶν κωνικῶν γραμ-
 20 μῶν. καὶ ἔαν ἐπὶ δ' εὐθείας θέσει δεδομένης καταχθῶσιν
 εἰθεῖαι ἐν δεδομέναις γωνίαις, καὶ λόγος ἢ δοθεῖς τοῦ ἐπὶ
 δύο κατηγμένων πρὸς τὸ ἐπὶ τῶν λοιπῶν δύο κατηγμένων.
 ὁμοίως τὸ σημεῖον ἄψεται θέσει δεδομένης κώνου τομῆς.
 37 ἔαν μὲν γὰρ ἐπὶ δύο μόνας, ἐπίπεδος ἡ τῆς δέδεικται· 25
 ἔαν δὲ ἐπὶ πλείονας τεσσάρων, ἄψεται τὸ σημεῖον τόπῳ
 οὐκέτι γνωρίμῳ, ἀλλὰ γραμμῶν μόνον λεγομένων [ποδα-
 πῶν δὲ ἢ τινὰ ἔχουσιν ἴδια οὐκέτι], ὢν μίαν οὐδέ τινα

7. ἐπίτοι A, corr. BS

10. συσχελάσας Hu pro σχολάσας

11. ὑπ' Εὐκλείδῃ Hu

12. τοιαύτην Hu pro τοσαύτην

οὐκ αἰ-
 παθη A BS, εἰκαιοπαθῆ Hu Fleckeiseni annal. 1873 p. 224, corr. Fried-
 leinijus Literarisches Centralblatt 1874 p. 742

15. ὀφείλει Hu pro

ὀφείλων

16. τοῦ αὐτοῦ del. Hu

17. ἄψεται Hu pro ἄπεται

22. λόγοις A: sed i. erasum est

24. ἄπτεσθαι ABS, ἄπεται V, corr.

Ha

25. ἔαν μὲν γάρ — δέδεικται et 27. 28. ποδαπῶν — οὐκέτι

interpolatori tribuit Hu

27. 28. ποδαπῶν δὲ ἢ τινὰ ἔχουσιν ἴδια

illum iacere vellet, quippe qui modestissimus esset et benignus erga omnes qui vel mediocriter mathematicam disciplinam promovere possent, ut necesse est, ac neutiquam importunus, sed accuratus quidem, nec tamen gloriosus sicut ille, quantum de eo quem diximus loco per illius conica demonstrari poterat, conscripsit ita ut demonstrationem nondum ad finem perductam esse concederet. Nam sic eum reprehendi necesse fuisset, nunc vero minime, siquidem ipse quoque *Apollonius*, quod in conicis plurima imperfecta reliquit, non in-cusatur. Attamen *Apollonius* huic loco ea quae desiderabantur potuit adiungere, cum et antea ad eas res animo concipiendas instructus esset iis libris, quos iam de eodem loco Euclides scripserat, et Euclidis discipulorum consuetudine diutissime Alexandriae uteretur, unde etiam animi habitum illum non indocilem habuit. Sed hic ad tres et quattuor lineas locus, quo magnopere gloriatur *simul* addens ei qui primus conscripserit gratiam habendam esse, sic se habet. Si enim, tribus rectis positione datis, a quodam puncto ad has tres in datis angulis rectae ducantur, et proportio rectanguli sub duabus ductis contenti ad quadratum ex reliqua data sit, punctum continget locum solidum positione datum, id est unam e tribus lineis conicis. Et si ad quattuor rectas positione datas rectae ducantur in datis angulis, et proportio rectanguli sub duabus ductis contenti ad rectangulum sub duabus reliquis ductis contentum data sit, similiter punctum continget coni sectionem positione datam. [Nam si ad duas tantum rectas positione datas rectae ducantur in datis angulis, planum locum esse demonstratum est *supra cap. 25. [I.]*] Sin vero ad plures quam quattuor rectas positione datas rectae ducantur in datis angulis, punctum continget locos, qui *ru- gari* ratione iam cognosci non possunt, sed lineae tantum

margini olim interpolator adscripsisse, οὐκ ἐστὶν autem casu ex priore οὐ-
 ζῆτι repetitum esse videtur 28. οὐδὲ τίνα Hu pro οὐδὲ τὴν πρώτην
 καὶ scilicet τὴν πρώτην corruptum est ex τὴν ᾧ, quod pro τίνα libra-
 rius aliquis legit

συμφανιστάτην εἶναι δοκοῦσαν συντεθεῖκασιν ἀναδειξάντες
 37 χορηγίην αὐτῶν. αὐτὰ δὲ προτάσεις αὐτῶν εἶναι· ἂν ἐκ
 τινος σημείου ἐπὶ θέσει δεδομένης εὐθείας πέντε κατα-
 χθῶσιν εὐθεῖαι ἐν δεδομέναις γωνίαις, καὶ λόγος ἢ δεδο-
 μένος τοῦ ἐπὶ τριῶν κατηγμένων περιεχομένου στερεοῦ
 παραλληλεπίπεδον ὀρθογωνίου πρὸς τὸ ἐπὶ τῶν λοιπῶν
 δύο κατηγμένων καὶ δοθείσης τινὸς περιεχόμενον παραλ-
 λελεπίπεδον ὀρθογωνιον, ἄψεται τὸ σημεῖον θέσει δεδο-
 μένης γραμμῆς. ἂν γὰρ ἐπὶ ζ', καὶ λόγος ἢ δοθείς τοῦ
 ἐπὶ τῶν τριῶν περιεχομένου προειρημένου στερεοῦ πρὸς 10
 τὸ ἐπὶ τῶν λοιπῶν τριῶν, πάλιν τὸ σημεῖον ἄψεται θέσει
 δεδομένης. ἂν δὲ ἐπὶ πλείονας τῶν ζ', οὐκέτι μὲν ἔχουσι
 λέγειν, ἂν λόγος ἢ δοθείς τοῦ ἐπὶ τῶν δ' περιεχομένου
 τινὸς πρὸς τὸ ἐπὶ τῶν λοιπῶν, ἐπεὶ οὐκ ἔστι τι περιεχό-
 39 μενον ἐπὶ πλείονων ἢ τριῶν διαστάσεων. συγκεχωρήκασιν 15
 δὲ ἑαυτοῖς οἱ βραχὺ πρὸ ἡμῶν ἐρηγνέειν τὰ τοιαῦτα, μηδὲ
 ἐν μηδανίῳ διάληπτον σημαίνοντες, τὸ ἐπὶ τῶνδε περι-
 εχόμενον λέγοντες ἐπὶ τὸ ἀπὸ τῆςδε τετραγώνου ἢ ἐπὶ τὸ
 ἐπὶ τῶνδε. παρὴν δὲ διὰ τῶν συνημμένων λόγων ταῦτα
 καὶ λέγειν καὶ δεικνύναι καθόλου καὶ ἐπὶ τῶν προειρημέ- 20
 40 των προτάσεων καὶ ἐπὶ τοῦτων τὴν τῶνδε τοῦτον· ἂν
 ἀπὸ τινος σημείου ἐπὶ θέσει δεδομένης εὐθείας καταχθῶ-
 σιν εὐθεῖαι ἐν δεδομέναις γωνίαις, καὶ δεδομένος ἢ λόγος
 ὁ συνημμένος εἴς οὗ ἔχει μία κατηγμένη πρὸς μίαν καὶ
 ἑτέρα πρὸς ἑτέραν, καὶ ἄλλι, πρὸς ἄλλην, καὶ ἢ λοιπὴ 25
 πρὸς δοθεῖσαν, ἂν ὡσιν ζ', ἂν δὲ ι', καὶ ἢ λοιπὴ πρὸς
 λοιπὴν, τὸ σημεῖον ἄψεται θέσει δεδομένης γραμμῆς· καὶ
 ὁμοίως ἦσαι ἂν ὡσιν περισσῶς ἢ ἄρτιαι τὸ πλῆθος. τοί-
 των, ὡς ἔρην, ἐπομένων τῷ ἐπὶ τέσσαρας τόπῳ οὐδὲ ἐν
 41 συντεθεῖκασιν ὥστε τὴν γραμμὴν εἰδέναι. [ταῦθ' οἱ βλέ- 30

9. ἂν δὲ Paris. 2368 SV 10. προειρημένου Hu pro καὶ εἰρημέ-
 101 13. ἂν add. Hu 16. δ' ἐν ἑαυτοῖς Hu 17. et 19. ἐπὶ
 τῶν δ' Ha 22. εὐθείας om. Hu 23. post καὶ repetunt δεδομένας
 γωνίας καὶ AB ὁ ante λόγος add. B^o Ha 24. μία κατηγμένην A.
 corr. BS post μίαν add. κατηγμένην Ha 28. αἵται A, corr.
 Paris. 2368 SV ἄρτιαι Ha et ex silentio B) 30. τεθεῖκασιν A, sed su-
 per vs. οὐ add. pr. m., unde οὐν τεθεῖκασιν BS, corr. Hu ταῦθ' Ha

vocantur [quales vero sint quasque proprietates habeant, non item *liqueat*]. Quarum unam quandam, quae nequaquam inter maxime conspicuas esse videtur, composuerunt (*sive synthetice constituerunt*) eiusque utilitatem demonstraverunt. His autem propositionibus ea quae diximus constant: Si a quodam puncto ad rectas quinque positione datas ducantur rectae in datis angulis, sitque data proportio parallelepipedo solidi rectanguli sub tribus ductis contenti ad parallelepipedum rectangulum sub duabus reliquis et data quadam contentum, punctum continget lineam positione datam. Et si ad sex rectas ducantur, sitque data proportio solidi quod diximus sub tribus contenti ad id quod reliquis tribus continetur, iterum punctum continget lineam positione datam. Sin vero ad plures quam sex ducantur, non amplius dicere licet "si proportio data sit solidi cuiusdam sub quattuor rectis contenti ad id quod sub reliquis tribus continetur", quoniam nihil est quod sub pluribus quam tribus dimensionibus contineatur. Verum ii qui paulo ante nos fuerunt sibi ipsi concesserunt, ut eiusmodi res interpretarentur neque tamen quidquam perspicue proferrent, cum rectangulum sub his rectis contentum cum quadrato ab hac vel cum rectangulo sub his contento multiplicarent. At vero per compositas proportionales haec et enuntiare et generaliter demonstrare licebat non solum in superioribus propositionibus, sed etiam in his de quibus nunc agimus hunc in modum: Si a quodam puncto ad rectas positione datas ducantur rectae in datis angulis, ac data sit proportio composita ex ea, quam una ducta habet ad unam, eaque, quam altera ad alteram, tum ea, quae alia ad aliam, denique ea, quam reliqua ad datam, si sint septem, sin vero octo, reliqua ad reliquam: punctum continget lineam positione datam. Ac perinde quocumque vel pares numero vel impares rectae ducuntur. Etsi haec, ut dixi, locum ad quattuor rectas sequuntur, nihil admodum ita composuerunt (*sive synthetice demonstrarunt*), ut illa linea cognosci posset. [Haec

[Invitis ABS: ταῦτ' οἱ — p. 682, 20. *συνθετικῶς* interpolatori tribuit Hu; exciderunt autem eodem loco pauciora plurave genuina Pappi verba Pappus II.

ποντες ἥμιστα διτταίρονται, καθάπερ οἱ πάλοι καὶ τῶν τὰ
 κρείττονα γραψάντων ἕκαστοι· ἐγὼ δὲ καὶ πρὸς ἀρχαῖς ἐτι-
 τῶν μαθημάτων καὶ τῆς ἐπὶ φύσεως προκειμένης ζητημά-
 των ὕλης κινουμένους ὁρῶν ἅπαντας, αἰδοῦμενος ἐγὼ καὶ
 δεῖξας γε πολλῶν κρείσσονα καὶ πολλὴν προφερόμενα ὠφέ-
 λειαν. . . ἵνα δὲ μὴ κεναῖς χερσὶ τοῦτο φθεγγόμενος ἰδὲ
 42 χωρισθῶ τοῦ λόγου, ταῦτα δώσω τοῖς ἀναγνοῦσιν· ὁ μὲν
 τῶν τελείων ἀμφοιστικῶν λόγος συνήπται ἐκ τε τῶν ἀμφοι-
 σμάτων καὶ τῶν ἐπὶ τοῖς ἄξονας ὁμοίως κατηγμένων ἐν-
 θειῶν ἀπὸ τῶν ἐν αὐτοῖς κεντροβαρικῶν σημείων, ὁ δὲ 10
 τῶν ἀτελῶν ἐκ τε τῶν ἀμφοισμάτων καὶ τῶν περιφερειῶν,
 ὅσας ἐποίησεν τὰ ἐν τοῖτοις κεντροβαρικὰ σημεῖα, ὁ δὲ
 τούτων τῶν περιφερειῶν λόγος συνήπται δῆλον ὥς ἐκ τε τῶν
 κατηγμένων καὶ ὧν περιέχουσιν αἱ τούτων ἄκραι, εἰ καὶ
 εἴεν πρὸς τοῖς ἄξουσιν ἀμφοιστικῶν, γωνιῶν. περιέχουσι 15
 δὲ αὐταὶ αἱ προτάσεις, σχεδὸν οὕσαι μία, πλεῖστα ὕσι
 καὶ παντοῖα θεωρήματα γραμμῶν τε καὶ ἐπιφανειῶν καὶ
 στερεῶν, πάνθ' ὅμα καὶ μιᾷ δείξει καὶ τὰ μῆτιρ δεδειγ-
 μένα καὶ τὰ ἤδη ὥς καὶ τὰ ἐν τῇ δωδεκάτῃ τῶνδε τῶν
 στοιχείων.] 20

Ἔχει δὲ τὰ ἡ' βιβλία τῶν Ἀπολλωνίου κωνικῶν θεω-
 ρήματα ἥτοι διαγράμματα νη', λήμματα δὲ [ἥτοι λαμβά-
 νόμενά ἐστιν εἰς αὐτὰ ο'.

1. ἥμιστα περιῶνται Hu 2. ἕκαστον AS, ἕκαστα B, ἕκαστος Ha,
 corr. Hu 3. καὶ τῆς — ζητημάτων om. A¹, in
 marg. add. A², BS; 4. πολλῶν Ha pro πολλῶν 5. ἀναγινώσκουσιν
 Græccus scriptor voluisse videtur, ἀγνοοῦσιν edidit Ha 6. ἀμφοι-
 (sine acc.) στίχων A BS, corr. Ha 7. ὅσας Ha pro ὅσα ἐν αὐ-
 τοῖς Ha 8. τῶν om. Ha 9. λόγος συνήπται add. Hu 10. εἰς τε τῶν
 A (BS), corr. Ha 11. 46. περιέχουσαι δὲ ταυτη A BS, corr. Ha
 12. μὴ προδεδειγμένα Ha 13. ἤδη ὥς Ha, ἡδέως A (ἡδέως BS)
 δεκάτῃ V 14. τῶνδε BS, των δε A, del. Hu 15. ἡ' Ha, ε' A, πέντε
 BS 16. ἀπολλωνίω A, corr. BS 17. 23. ἥτοι λαμβ. — αὐτὰ inter-
 polatori tribuit Hu (propter similitudinem earum quae p. 670, 2 et 672, 16
 Pappus ipse scripsit, cuius a dicendi genere alienum est etiam εἰς αὐτὰ
 pro ἐν αὐτοῖς: nam agitur de lemmatis, quae insunt in libris, non quae
 ad libros adsumpta sunt)

qui perspiciunt minime *ad eiusmodi conatum* inducuntur, perinde ac veteres et quicumque *praeterea* emendatius scripserunt. Sed equidem cum *fere* cunctos in ipsis initiis et rerum mathematicarum et quaestionum physicarum¹⁾ versari viderem, cumque eius rei me pueret et ipse demonstravissim multo meliora quaequo magnam utilitatem afferrent . . . sed ne inanibus quasi manibus hoc protulerim, antequam ab hac disputatione discedo, haec offero legentibus. *Figurae perfecta rotatione genitae proportionem habent compositam et ex rotantibus et ex rectis similiter ad axes ductis a gravitatis centris quae in rotantibus sunt. Figurae imperfecta rotatione genitae proportionem habent compositam et ex rotantibus et ex arcubus quos centra in his gravitatis descripserunt. Sed horum arcuum proportionem apparet compositam esse et ex ductis ad axes et ex angulis quos harum extremitates continent. si ad axes figurarum rotatione genitarum sint²⁾. Verum hae propositiones, quae paene ad unam redigi possunt, mirum quanta quamque varia theorematum et linearum et superficierum et solidorum continent ita, ut una eademque demonstratione *probentur* omnia et quae nondum et quae iam demonstrata sunt, velut ea quae in duodecimo libro horum elementorum reperiuntur.]*

Libri octo Apollonii conicorum continent theorematum sive diagrammata CCCCLXXXVII; lemmata LXX.

1. Proprie: *materiae quaestionum a natura propositae*.

2. Locum vergentis iam Graecitatis aetate conscriptum eaque de causa impeditissimum sic interpretatur Halleius: "Figurae perfecto gyro genitae rationem habent compositam ex ratione gyrantium et ex illa rectarum similiter ad axes ductarum ab ipsarum gyrantium gravitatis centris. Ratio vero incompleto gyro genitarum fit ex ratione gyrantium et arcuum quos descripsere earundem centra gravitatis. Manifestum autem est horum arcuum rationem componi ex ratione ductarum ad axes et ex illa angularum quos continent ductarum extremitates, si ad axes genitarum aestimantur". Quae praeterea recentiores mathematici in eo genere invenerint, v. apud Baltzer, *Elemente der Mathematik* II p. 265 edit. IV.

- 43 α'. Τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν εἰς τὸν δοθέντα λόγον τεμεῖν.
 Ἐστω ἡ μὲν δοθεῖσα εὐθεῖα ἡ AB , ὁ δὲ δοθεὶς λόγος ὁ Γ πρὸς A , καὶ δεόν ἔστω τεμεῖν τὴν AB εἰς τὸν τῆς Γ πρὸς τὴν A λόγον. ἔκλινα πρὸς τὴν AB εὐθεῖαν ἐν γωνίᾳ τυχούσῃ εὐθεῖαν τὴν AE , καὶ τῇ μὲν Γ ἴσην ἀρεῖλον τὴν AZ , τῇ δὲ A τὴν ZH , καὶ ἐπιτεύξας τὴν BH ταύτῃ παράλληλον ἤγαγον τὴν $Z\Theta$. ἔπει οὖν ἔστιν ὡς ἡ $A\Theta$ πρὸς ΘB , οὕτως ἡ AZ πρὸς ZH , ἴση δὲ ἔστιν ἡ μὲν AZ τῇ Γ , ἡ δὲ ZH τῇ A , ἔστιν ἄρα ὡς ἡ $A\Theta$ πρὸς ΘB , οὕτως ἡ Γ πρὸς τὴν A . διήρηται ἄρα κατὰ τὸ Θ σημεῖον, ¹⁰ ὅπερ: ~
- 44 β'. Τριῶν δοθεῖσων εὐθειῶν τῶν AB $B\Gamma$ A , εἰρεῖν ὡς τὴν AB πρὸς τὴν $B\Gamma$, οὕτως ἄλλην τινὰ πρὸς τὴν A .
 Πάλιν ἔκλινά τινα εὐθεῖαν τὴν GE ἐν τυχούσῃ γωνίᾳ, καὶ τῇ A ἴσην ἀτεθέμην τὴν GZ . ἐπέτευξα τὴν BZ καὶ ¹⁵ ταύτῃ παράλληλον ἤγαγον τὴν HA . γίνεται οὖν πάλιν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν $B\Gamma$, οὕτως ἡ HZ πρὸς τὴν GZ , τουτέστιν πρὸς τὴν A . εὐρηται ἄρα ἡ ZH .
 Ὅμοίως καὶ ἡ τρίτη δοθῇ, τὴν τετάρτην εὐρήσομεν.
- 45 γ'. Ἐχέτω τὸ AB πρὸς τὸ $B\Gamma$ μείζονα λόγον ἥπερ ²⁰ τὸ AE πρὸς τὸ EZ : ὅτι καὶ κατὰ σύνθεσιν τὸ AG πρὸς τὸ GB μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ AZ πρὸς τὸ ZE .
 Πεποιήσθω γὰρ ὡς τὸ AB πρὸς τὸ $B\Gamma$, οὕτως ἄλλο τι τὸ H πρὸς τὸ EZ : καὶ τὸ H ἄρα πρὸς τὸ EZ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ AE πρὸς τὸ EZ : μείζον ἄρα ἔστιν τὸ ²⁵ H τοῦ AE . κείσθω ἀντὶ ὅσον τὸ ΘE . ἔπει οὖν ἔστιν ὡς τὸ AB πρὸς τὸ $B\Gamma$, οὕτως τὸ ΘE πρὸς τὸ EZ ,

1. α' add. BS 3. ὁ Γ] $\overline{O\Gamma A}$ (sed O m. sec. in rasura), ὁ τῆς Γ Ha 4. ἐκλινά (sine spir. et acc.) A , corr. BS 5. αὐ ABV , αὐ Paris. 2368 S, AH Ha ἴση A , corr. BS 12. B A^1 in marg. (BS) 14. ἐκλινά (sine spir. et acc.) A . ἔκλινα BS ΓE Hu , $\Gamma\Theta$ AS , γο B , ΓH Ha 15. 16. καὶ ταύτῃ Ha . ἡ καὶ αὐτῇ (sine spir. et acc.) A , ἡ καὶ αὐτῇ S , καὶ αὐτῇ B 16. τὴν AH Ha 17. πρὸς τὴν GB ABS , corr. Ha 20. γ' add. BV , β' add. S τὸ AB scil. μέγεθος, et similiter posthac; conf. p. 688. 10 22. πρὸς τὸ ZI A , corr. BS 27. τὸ ante EZ add. S

συνθένει ἄρα ἐστὶν ὡς τὸ ΑΓ πρὸς τὸ ΒΓ, οὕτως τὸ ΖΘ πρὸς τὸ ΖΕ. τὸ δὲ ΘΖ πρὸς τὸ ΖΕ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ΔΖ πρὸς τὸ ΖΕ· καὶ τὸ ΑΓ ἄρα πρὸς τὸ ΓΒ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ΔΖ πρὸς τὸ ΖΕ.

- 16 δ'. Πάλιν δὴ τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΒΓ ἐλάσσονα λόγον ἔχεται ἥπερ τὸ ΑΕ πρὸς τὸ ΕΖ· ὅτι καὶ τὸ ΑΓ πρὸς τὸ ΓΒ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ΔΖ πρὸς τὸ ΕΖ.

Πάλιν γὰρ ἐπεὶ τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΒΓ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ΑΕ πρὸς τὸ ΕΖ, ἐὰν ποιῶ ὡς τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΒΓ, οὕτως ἄλλο τι πρὸς τὸ ΕΖ, ἔσται ἐλάσσον τοῦ ΔΕ. ἔστω τὸ ΕΘ· γίνεται ἄρα καὶ ὡς τὸ ΑΓ πρὸς τὸ ΓΒ, οὕτως τὸ ΘΖ πρὸς τὸ ΖΕ. τὸ δὲ ΘΖ πρὸς τὸ ΖΕ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ΔΖ πρὸς τὸ ΖΕ· τὸ ΑΓ ἄρα πρὸς τὸ ΓΒ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ΔΖ πρὸς τὸ ΖΕ.

- 17 ε'. Ἐχέτω δὴ πάλιν τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΒΓ μείζονα λόγον ἥπερ τὸ ΔΕ πρὸς τὸ ΕΖ· ὅτι καὶ ἐναλλάξ τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΔΕ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ΒΓ πρὸς τὸ ΕΖ.

Πειριχθῶ γὰρ ὡς τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΒΓ, οὕτως ἄλλο τι πρὸς τὸ ΕΖ· φανερόν δὴ ὅτι μείζον ἔσται τοῦ ΔΕ. ἔστω τὸ ΗΕ· ἐναλλάξ ἄρα ἐστὶν ὡς τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΕΗ, οὕτως τὸ ΒΓ πρὸς τὸ ΕΖ. ἀλλὰ τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΔΕ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΕΗ, τουτέστιν ἥπερ τὸ ΒΓ πρὸς ΕΖ· καὶ τὸ ΑΒ ἄρα πρὸς τὸ ΔΕ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ΒΓ πρὸς τὸ ΕΖ.

Τὰ δ' αὐτά, καὶ ἐλάσσονα λόγον ἔχει, ὅτι καὶ ἐναλλάξ, ἔσται γὰρ καὶ ὡς τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΒΓ, οὕτως ἄλλο τι πρὸς τὸ ΕΖ· ὅτι ἐλάσσον τοῦ ΔΕ. τὰ λοιπὰ τὰ αὐτά.

- 18 ζ'. Τὸ ΑΓ πρὸς τὸ ΓΒ μείζονα λόγον ἔχεται ἥπερ τὸ ΔΖ πρὸς τὸ ΖΕ· ὅτι ἀναστρέψαντι τὸ ΓΑ πρὸς τὸ ΑΒ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ΖΑ πρὸς τὸ ΔΕ.

Πειριχθῶ γὰρ ὡς τὸ ΑΓ πρὸς τὸ ΓΒ, οὕτως τὸ

1. 2. συνθένει — πρὸς τὸ ΖΕ ante τὸ δὲ om. Ha 2. 3. μείζονα — ἥπερ τὸ ΔΖ πρὸς τὸ ΖΕ add. BS 3. δ' add. BS 15. Ε Α' in marg. BS 20. πρὸς τὸ ΗΓ Ha. Item vs. 22 25. ἔχει Α, sed ἔχει corr. pr. man. 27. ὅτι πρὸς ἐλάσσονα τοῦ ΔΕ ABS, corr. Co φανερόν δὴ

$\vartheta\epsilon : \epsilon\zeta$, componendo igitur est $\alpha\gamma : \gamma\beta = \vartheta\zeta : \zeta\epsilon$. Sed est $\vartheta\zeta > \delta\zeta$ quia $\vartheta\epsilon > \delta\epsilon$; itaque *elem.* 5, 8) $\vartheta\zeta : \zeta\epsilon > \delta\zeta : \zeta\epsilon$; ergo etiam $\alpha\gamma : \gamma\beta > \delta\zeta : \zeta\epsilon$.

IV. Sit contra $\alpha\beta : \beta\gamma < \delta\epsilon : \epsilon\zeta$; dico item componendo *Prop.* 4
esse $\alpha\gamma : \gamma\beta < \delta\zeta : \zeta\epsilon$.

Rursus enim, quoniam $\alpha\beta : \beta\gamma < \delta\epsilon : \epsilon\zeta$, si faciam, ut $\alpha\beta$ ad $\beta\gamma$, ita aliud quiddam ad $\epsilon\zeta$, hoc erit minus quam $\delta\epsilon$,^{*}. Sit $\epsilon\vartheta$; ergo est etiam $\alpha\gamma : \gamma\beta = \vartheta\zeta : \zeta\epsilon$. Sed est

$\vartheta\zeta : \zeta\epsilon < \delta\zeta : \zeta\epsilon$; ergo $\alpha\gamma : \gamma\beta < \delta\zeta : \zeta\epsilon$.

V. Sit rursus $\alpha\beta : \beta\gamma > \delta\epsilon : \epsilon\zeta$; dico etiam vicissim *Prop.* 5
esse $\alpha\beta : \delta\epsilon > \beta\gamma : \epsilon\zeta$.

Fiat enim, ut $\alpha\beta : \beta\gamma$, ita aliud quiddam ad $\epsilon\zeta$; apparet igitur id maius esse quam $\delta\epsilon$ (*supra propos. 5*). Sit $\epsilon\epsilon$; ergo vicissim est

$\alpha\beta : \epsilon\epsilon = \beta\gamma : \epsilon\zeta$. Sed est *elem.* 5, 8) $\alpha\beta : \delta\epsilon > \alpha\beta : \epsilon\epsilon$, id est $> \beta\gamma : \epsilon\zeta$; ergo etiam $\alpha\beta : \delta\epsilon > \beta\gamma : \epsilon\zeta$.

Item, si $\alpha\beta : \beta\gamma < \delta\epsilon : \epsilon\zeta$, dico vicissim esse $\alpha\beta : \delta\epsilon < \beta\gamma : \epsilon\zeta$ ^{**}. Erit enim, ut $\alpha\beta : \beta\gamma$, ita aliud quiddam ad $\epsilon\zeta$. Apparet id minus esse quam $\delta\epsilon$. Reliqua similiter ac *supra*.

VI. Sit $\alpha\gamma : \gamma\beta > \delta\zeta : \zeta\epsilon$; dico convertendo esse $\gamma\alpha : \text{Prop. 6}$
 $\alpha\beta < \zeta\delta : \delta\epsilon$.

Fiat enim, ut $\alpha\gamma : \gamma\beta$, ita $\delta\zeta$ ad aliud quiddam; erit

^{*)} Hoc similiter atque in tertia propositione demonstrari voluit scriptor. Idem valet de similibus locis qui in proximis lemmatis sequuntur.

^{**) Conf. supra III propos. 3.}

ΔZ πρὸς ἄλλο τι· ἔσται δὲ πρὸς ἑλασσον τοῦ ZE . ἔστω πρὸς τὸ ZH · ἀναστρέψαντι ἄρα ἐστὶν ὡς τὸ ΓA πρὸς τὸ AB , οὕτως τὸ ZJ πρὸς τὸ AH . τὸ δὲ ZA πρὸς τὸ AH ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ZA πρὸς τὸ AE · καὶ τὸ ΓA ἄρα πρὸς τὸ AB ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ZJ πρὸς τὸ AE . 5

Ὅμοιως δὲ καὶ τὸ AG πρὸς τὸ GB ἐλάσσονα λόγον ἐχέτω ἥπερ τὸ AZ πρὸς τὸ ZE · ἀναστρέψαντι ἄρα τὸ ΓA πρὸς τὸ AB μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ AZ πρὸς τὸ AE . ἔσται γὰρ ὡς τὸ AG πρὸς τὸ GB , οὕτως τὸ AZ πρὸς μείζον τι μέγεθος τοῦ ZE . καὶ τὰ λοιπὰ φανερά. 10

- 49 γ'. Ἐχέτω δὲ πάλιν τὸ AB πρὸς τὸ $BΓ$ μείζονα λόγον ἥπερ τὸ AE πρὸς τὸ EZ · ὅτι ἀνάπαλιν τὸ $ΓB$ πρὸς τὸ BA ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ZE πρὸς τὸ EA .

Πεποιήσθω γὰρ ὡς τὸ AB πρὸς τὸ $BΓ$, οὕτως τὸ AE πρὸς τι· ἔσται δὲ πρὸς ἑλασσον τοῦ EZ . ἔστω πρὸς τὸ 15 EH · ἀνάπαλιν ἄρα ἐστὶν ὡς τὸ $ΓB$ πρὸς τὸ BA , οὕτως τὸ HE πρὸς τὸ EA . τὸ δὲ HE πρὸς τὸ EJ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ZE πρὸς τὸ EA · καὶ τὸ $ΓB$ ἄρα πρὸς τὸ BA ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ZE πρὸς τὸ EA .


Ὅμοιως δὲ καὶ τὸ AB πρὸς τὸ $BΓ$ ἐλάσσονα λόγον 20 ἔχη ἥπερ τὸ AE πρὸς τὸ EZ , ἀνάπαλιν τὸ $ΓB$ πρὸς τὸ BA μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ZE πρὸς τὸ EA . ἔσται γὰρ ὡς τὸ AB πρὸς τὸ $ΓB$, οὕτως τὸ AE πρὸς μείζον τι τοῦ EZ · τὰ δὲ λοιπὰ φανερά.

Καὶ φανερὸν ἐκ τούτων ὅτι, ἐὰν τὸ AB πρὸς τὸ $BΓ$ 25 μείζονα λόγον ἔχη ἥπερ τὸ AE πρὸς τὸ EZ , καὶ τὸ ZE πρὸς τὸ EA μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ $ΓB$ πρὸς τὸ BA · ἐὰν δὲ τὸ AB πρὸς τὸ $BΓ$ ἐλάσσονα λόγον ἔχη ἥπερ τὸ AE πρὸς τὸ EZ , καὶ τὸ ZE πρὸς τὸ EA ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ $ΓB$ πρὸς τὸ BA . 30

- 50 δ'. Ἐχέτω τὸ AB πρὸς τὸ AE μείζονα λόγον ἥπερ τὸ $BΓ$ πρὸς τὸ EZ · ὅτι καὶ τὸ AB πρὸς τὸ AE μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ AG πρὸς τὸ AZ .

Πεποιήσθω γὰρ ὡς τὸ AB πρὸς τὸ AE , οὕτως τὸ

igitur ad minus quam $\zeta\epsilon$. Sit ad $\zeta\eta$; convertendo igitur est




$\gamma\alpha : \alpha\beta = \zeta\delta : \delta\eta$. Sed est
 $\zeta\delta : \delta\eta < \zeta\delta : \delta\epsilon$; ergo etiam
 $\gamma\alpha : \alpha\beta < \zeta\delta : \delta\epsilon$.

Similiter etiam sit $\alpha\gamma :$

$\gamma\beta < \delta\zeta : \zeta\epsilon$; ergo conver-

tendo est $\gamma\alpha : \alpha\beta > \zeta\delta : \delta\epsilon$. Erit enim, ut $\alpha\gamma : \gamma\beta$, ita $\delta\zeta$ ad maiorem quandam magnitudinem quam $\zeta\epsilon$. Ac reliqua manifesta sunt.

VII. Rursus sit $\alpha\beta : \beta\gamma > \delta\epsilon : \epsilon\zeta$; dico e contrario esse Prop. 7
 $\gamma\beta : \beta\alpha < \zeta\epsilon : \epsilon\delta$.



Fiat enim, ut $\alpha\beta : \beta\gamma$, ita
 $\delta\epsilon$ ad aliquid; erit igitur ad
 minus quam $\epsilon\zeta$. Sit ad $\epsilon\eta$; e
 contrario igitur est $\gamma\beta : \beta\alpha =$
 $\eta\epsilon : \epsilon\delta$. Sed est $\eta\epsilon : \epsilon\delta <$

$\zeta\epsilon : \epsilon\delta$; ergo etiam $\gamma\beta : \beta\alpha < \zeta\epsilon : \epsilon\delta$.

Similiter etiam, si sit $\alpha\beta : \beta\gamma < \delta\epsilon : \epsilon\zeta$, e contrario est
 $\gamma\beta : \beta\alpha > \zeta\epsilon : \epsilon\delta$. Erit enim, ut $\alpha\beta : \beta\gamma$, ita $\delta\epsilon$ ad minus
 aliquid quam $\epsilon\zeta$; reliqua autem manifesta sunt.

Atque hoc etiam ex his apparet, si sit $\alpha\beta : \beta\gamma > \delta\epsilon : \epsilon\zeta$,
 esse etiam $\zeta\epsilon : \epsilon\delta > \gamma\beta : \beta\alpha$; sin vero sit $\alpha\beta : \beta\gamma < \delta\epsilon : \epsilon\zeta$,
 esse etiam $\zeta\epsilon : \epsilon\delta < \gamma\beta : \beta\alpha$.

VIII. Sit $\alpha\beta : \delta\epsilon > \beta\gamma : \epsilon\zeta$; dico esse etiam $\alpha\beta : \delta\epsilon >$ Prop. 8
 $\beta\gamma + \beta\gamma : \delta\epsilon + \epsilon\zeta$, id est $> \alpha\gamma : \delta\zeta$.

Fiat enim, ut $\alpha\beta : \delta\epsilon$, ita $\beta\gamma$ ad aliquid; erit igitur ad

$\kappa\alpha\iota \tau\acute{o} A\Gamma \acute{\alpha}\rho\alpha$ 7. $\acute{\alpha}\rho\alpha$ add. Ha 11. ζ add. BS 13. $\pi\rho\acute{o}\varsigma E\zeta$
 AB, $\tau\acute{o}$ add. S 15. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\omega\iota H\upsilon$ pro $\acute{\omega}\sigma\tau\epsilon$ ($\acute{\omega}\varsigma$ eni. Co) 17. III post
 $\omicron\upsilon\tau\omega\varsigma$; $\tau\acute{o}$ Ha pro $E\Gamma I$ $\pi\rho\acute{o}\varsigma \tau\acute{o} \acute{\epsilon}\delta$ $\acute{\epsilon}\lambda\lambda\acute{\alpha}\sigma\sigma\iota\alpha$ S Ha, $\tau\acute{o}$ om. AB
 18, 19. $\kappa\alpha\iota \tau\acute{o} I\beta \acute{\alpha}\rho\alpha$ — $\pi\rho\acute{o}\varsigma \tau\acute{o} E\zeta$ add. Co Sea 20. $\pi\rho\acute{o}\varsigma \tau\acute{o}$
 $B\Gamma$ add. Co Sea 22. $\pi\rho\acute{o}\varsigma \tau\acute{o} \acute{\epsilon}\delta$ S, $\tau\acute{o}$ om. AB 23. $\omicron\upsilon\tau\omega\varsigma$
 $\omicron\upsilon\tau\omega\varsigma$ (sine spir. et acc. A, $\omicron\upsilon\tau\omega$ BS 25. $\acute{\epsilon}\kappa \tau\acute{o}\upsilon\tau\omega\tau$ Ha 26. $\acute{\epsilon}\chi\eta$
 A, corr. BS 31. η add. BS

ΒΓ πρὸς τι· ἔσται δὲ πρὸς ἑλάσσον τοῦ ΕΖ. ἔστω πρὸς τὸ ΗΕ· καὶ ὅλη ἄρα ἡ ΑΓ πρὸς ὅλην τὴν ΙΗ, ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΙΕ· ἡ δὲ ΑΓ πρὸς τὴν ΔΗ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ πρὸς τὴν ΔΖ· καὶ ἡ ΑΒ ἄρα πρὸς τὴν ΔΕ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΔΖ. 5

Καὶ φανερόν ἐστι ὅλη ἡ ΑΓ πρὸς ὅλην τὴν ΔΖ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΔΕ.

Κὰν ἐλάσσων τοῦ μέρους, μείζων ὅλης.

- 51 Β'. Ἐχέτω δὲ πάλιν ὅλη ἡ ΑΓ πρὸς ὅλην τὴν ΔΖ μείζονα λόγον ἥπερ ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΔΕ· ὅτι καὶ λοιπὴ 10 ἡ ΒΓ πρὸς λοιπὴν τὴν ΕΖ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΔΖ.

Πεποιήσθω γὰρ ὡς ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΔΖ, οὕτως ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΙΗ· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΒΓ πρὸς λοιπὴν τὴν ΗΖ ἔστιν ὡς ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΔΖ. ἡ δὲ ΒΓ πρὸς τὴν ΕΖ 15 μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ πρὸς τὴν ΖΗ· καὶ ἡ ΒΓ ἄρα πρὸς τὴν ΕΖ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΔΖ.


Ἐὰν δὲ ὅλη πρὸς τὴν ὅλην ἐλάσσονα, ἡ λοιπὴ ἐλάσσονα.

- 52 Γ'. Ἐστω μείζων μὲν τὸ ΑΒ τοῦ Γ, ἴσον δὲ τὸ Α τῷ Ε· ὅτι τὸ ΑΒ πρὸς τὸ Γ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ Α 20 πρὸς τὸ Ε.

Κείσθω γὰρ τῷ Γ ἴσον τὸ ΒΖ· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ΒΖ πρὸς τὸ Γ, οὕτως τὸ Α πρὸς τὸ Ε. ἀλλὰ τὸ ΑΒ πρὸς τὸ Γ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ΒΖ πρὸς τὸ Γ· καὶ τὸ ΑΒ ἄρα πρὸς τὸ Γ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ Α πρὸς τὸ Ε. 25

2. post πρὸς ὅλην τὴν ΙΗ add. ἔστιν Α³BS 4. ἥπερ πρὸς τὴν ΙΗ ABS, corr. Sca (idem voluit Co), καὶ ἡ α ΑΒ ἄρα Α, sed α deletum 8. ἐλάσσων τοῦ μέρους, μείζων ὅλης Co. ἐλάσσων τὸ μέρος μείζων ὅλης Α BS;., ἐλάσσονα τὰ μέρη, μείζονα ὅλαι, h. e. ἐὰν δύο εἰσὶν τὰ μέρη πρὸς ἀλλήλα ἐλάσσονα λόγον ἔχῃ ἥπερ τῶν αὐτῶν τὰ ἕτερα μέρη, ὅλαι αὐ εὐθεῖαι πρὸς ἀλλήλας μείζονα λόγον ἔξουσιν ἥπερ τὰ προειρημένα μέρη, Hu. (conf. etiam cap. 31 extr.) 9. θ' add. BS 13. Πεποιήσθω — τὴν ΔΖ add. Co, ἔστω et cetera perinde add. Sca 15. 16. ΕΖ μείζονα — πρὸς τὴν ante ΖΗ add. Co Sca 18. ὅλη πρὸς τὴν ὅλην ἐλάσσων ABS, ὅλης πρὸς τὴν ὅλην ἐλάσσων Co, corr. Hu ἡ λοιπὴ ἐλάσσονα Hu, ἡ λοιπὴ μείζων Α BS;., ἡ λοιπὴ ἐλάσσων debuit τῆς λοιπῆς ἐλάσσων; Co 19. ι' add. BS

minus quam $\epsilon\zeta$. Sit ad $\epsilon\eta$; ergo etiam est tota ad totam¹⁾



$\alpha\gamma : \delta\eta = \alpha\beta : \delta\epsilon$. Sed est


$\alpha\gamma : \delta\eta > \alpha\gamma : \delta\zeta$; ergo etiam

$\alpha\beta : \delta\epsilon > \alpha\gamma : \delta\zeta$.

Et apparet esse totam ad totam $\alpha\gamma : \delta\zeta < \alpha\beta : \delta\epsilon$.


Et si partium duarum rectarum proportio minor sit quam alterarum partium, maior erit proportio totarum rectarum quam illarum priorum partium vel: si sit $\alpha\beta : \delta\epsilon < \beta\gamma : \epsilon\zeta$, erit $\alpha\beta + \beta\gamma : \delta\epsilon + \epsilon\zeta$, id est $\alpha\gamma : \delta\zeta > \alpha\beta : \delta\epsilon$.

IX. Rursus sint rectae $\alpha\gamma$ $\delta\zeta$ earumque partes $\alpha\beta$ $\delta\epsilon$, Prop. 9
et sit $\alpha\gamma : \delta\zeta > \alpha\beta : \delta\epsilon$; dico subtrahendo esse $\beta\gamma : \epsilon\zeta > \alpha\gamma : \delta\zeta$.



Fiat enim, ut $\alpha\gamma$ ad $\delta\zeta$, ita $\alpha\beta$ ad $\delta\eta$; ergo etiam subtrahendo $\beta\gamma : \epsilon\zeta = \alpha\gamma : \delta\zeta$. Sed est $\beta\gamma : \epsilon\zeta > \beta\gamma : \eta\zeta$; ergo etiam $\beta\gamma : \epsilon\zeta > \alpha\gamma : \delta\zeta$.

Sin vero tota ad totam minorem proportionem habeat quam pars ad partem, etiam reliqua ad reliquam minorem proportionem habebit quam tota ad totam vel: si sit $\alpha\gamma : \delta\zeta < \alpha\beta : \delta\epsilon$, erit etiam $\beta\gamma : \epsilon\zeta < \alpha\gamma : \delta\zeta$.



X. Sit $\alpha\beta > \gamma$, et δ Prop. 10
 $= \epsilon$; dico esse $\alpha\beta : \gamma > \delta : \epsilon$.

Ponatur enim $\beta\zeta = \gamma$; est igitur $\beta\zeta : \gamma = \delta : \epsilon$. Sed est $\alpha\beta : \gamma > \beta\zeta : \gamma$; ergo etiam $\alpha\beta : \gamma > \delta : \epsilon$.

1) Sic ad Graeci sermonis similitudinem brevitatis causa scripsimus et hoc loco et paucis aliis qui sequuntur, ubi Pappus elementorum quinti propositionem 12 adhibuit, ex qua in proportionibus, ut unum antecedentium ad unum sequentium, ita est summa antecedentium ad summam consequentium.

Καὶ φανερόν ὅτι, ἂν ἐλάσσον τὸ AB τοῦ Γ , τὸ AB πρὸς τὸ Γ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ τὸ A πρὸς τὸ E , διὰ τὸ ἀνάπαλιν.

- 53 ια'. Ἀλλὰ ἔστω μείζον μὲν τὸ AB τοῦ Γ , ἐλάσσον δὲ τὸ AE τοῦ Z . ὅτι τὸ AB πρὸς τὸ Γ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ τὸ AE πρὸς τὸ Z .

Φανερόν μὲν οὖν καὶ ἄνευ ἀποδείξεως· εἰ γὰρ ὄντος ἴσον τοῦ AE τῷ Z τὸ AB πρὸς τὸ Γ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ τὸ AE πρὸς τὸ Z , ἐλάσσονος ὄντος πολλῇ μείζονα λόγον ἔξει. διὰ ἀποδείξεως δὲ οὕτως· ἐπεὶ γὰρ μείζον¹⁰ ἔστιν τὸ AB τοῦ Γ , ἂν ποιῶ ὡς τὸ AB πρὸς τὸ Γ , οὕτως ἄλλο τι πρὸς τὸ Z , ἔσται μείζον τοῦ Z , ὥστε καὶ τοῦ AE . ἔστω οὖν [αὐτῷ ἴσον] τὸ HE . τὸ HE ἄρα πρὸς τὸ Z μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ τὸ AE πρὸς τὸ Z . ἀλλ' ὡς τὸ HE πρὸς τὸ Z , οὕτως τὸ AB πρὸς τὸ Γ . καὶ τὸ AB ¹⁵ ἄρα πρὸς τὸ Γ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ τὸ AE πρὸς τὸ Z .

Καὶ φανερόν ὅτι, ὅπου τὸ ἐλάσσον, αἰεὶ ἐλάσσονα.

Καὶ ὅτι μείζον γίνεται τὸ ὑπὸ τῶν $AB Z$ τοῦ ἐπὶ τῶν ΓAE . ἴσον γὰρ αὐτῷ ἔστιν τὸ ὑπὸ τῶν ΓEH , ὃ ἔστιν μείζον τοῦ ἐπὶ τῶν ΓAE .

- 54 ιβ'. Εὐθεία ἡ AB καὶ τετμήσθω κατὰ τὸ Γ . ὅτι πάντα μὲν τὰ μεταξὺ τῶν $A \Gamma$ σημείων εἰς ἐλάσσονας λόγους διαιρεῖ τὴν AB τοῦ τῆς AG πρὸς τὴν GB , πάντα δὲ τὰ μεταξὺ τῶν ΓB εἰς μείζονας.


Εἰλήφθω γὰρ σημεία ἐφ' ἐκάτερα τοῦ Γ τὰ $A E$.²⁰ ἐπεὶ οὖν ἐλάσσων μὲν ἡ AA τῆς AG , μείζων δὲ ἡ AB τῆς BG , ἡ AA πρὸς τὴν AG ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ AB πρὸς τὴν BG . ἐναλλάξ ἄρα ἡ AA πρὸς τὴν AB ἐλάσ-

4. ια' B¹, idem paulo supra ante Καὶ φανερόν add. SV 5. τὸ AE τοῦ Z Co, τὸ Γ τοῦ E ABV, τὸ δ τοῦ ν S 6. ἢ περ τὸ AE πρὸς τὸ Z Co pro ἢ περ τὸ Γ πρὸς τὸ E 7. ἄνευ Co pro διὰ 12. πρὸς τὸ Z Ha auctore Co pro πρὸς τὸ ZE 13. αὐτῷ ἴσον del. Hu 17. αἰεὶ ἐλάσσονα A B¹, καὶ ἐλάσσονα Hu 18. 19. τῶν ABZ τοῦ ὑπὸ τῶν ΓAE — τὸ ὑπὸ τῶν ΓEH A, distinx. V B¹, τῶν $\alpha \beta \gamma$ ac reliqua similiter S; 20. μείζον τοῦ ἐπὶ τῶν B¹ Sea idem voluit Co, μείζον τὸ ὑπὸ ASV τῶν ΓAE A, distinx. V (B¹, τῶν $\gamma \delta \epsilon$ S)

Et manifestum est, si sit $\alpha\beta < \gamma$, esse $\alpha\beta : \gamma < \delta : \varepsilon$, propter inversam rationem.

XI. Sed sit $\alpha\beta > \gamma$, et $\delta\varepsilon < \zeta$; dico esse $\alpha\beta : \gamma > \delta\varepsilon : \zeta$. Prop. 11

Manifestum est vel sine de-



monstratione: nam si propter superius lemma aequaliter positus $\delta\varepsilon$ et ζ , est $\alpha\beta : \gamma > \delta\varepsilon : \zeta$, erit, facto $\delta\varepsilon$ minore quam ζ , multo $\alpha\beta : \gamma > \delta\varepsilon : \zeta$. Demonstratio autem sic se habet: quoniam est $\alpha\beta > \gamma$, si fecerim, ut

$\alpha\beta$ ad γ , ita aliud quiddam ad ζ , hoc erit maius quam ζ ; ergo etiam maius quam $\delta\varepsilon$. Sit igitur $\eta\varepsilon$; ergo $\eta\varepsilon : \zeta > \delta\varepsilon : \zeta$. Sed erat $\eta\varepsilon : \zeta = \alpha\beta : \gamma$; ergo etiam $\alpha\beta : \gamma > \delta\varepsilon : \zeta$.

Et apparet, ubi est primum minus quam secundum, et tertium maius quam quartum, proportionem semper minorem esse (vel: si sit $\alpha\beta < \gamma$, et $\delta\varepsilon > \zeta$, esse $\alpha\beta : \gamma < \delta\varepsilon : \zeta$).

Apparet etiam, suppositis iisdem atque initio huius propositionis, esse $\alpha\beta : \zeta > \gamma : \delta\varepsilon$; est enim $\alpha\beta \cdot \zeta = \gamma \cdot \varepsilon$, et $\gamma \cdot \eta > \gamma \cdot \delta\varepsilon$ (infra propos. 16).

XII. Sit recta $\alpha\beta$, eaque secetur in γ ; dico omnia inter α et γ puncta rectam $\alpha\beta$ in minores proportionem dirimere quam $\alpha\gamma : \gamma\beta$, omnia autem inter γ et β in maiores. Prop. 12

Sumantur enim



ad utramque puncti γ partem puncta δ et ε . Quoniam est

$\delta\alpha < \alpha\gamma$, et $\delta\beta > \beta\gamma$, erit (propter superius lemma) $\delta\alpha : \alpha\gamma < \delta\beta : \beta\gamma$. Vicissim igitur (propter huius libri propos. 5)

21. $\beta\delta$ add. BS $\varepsilon\sigma\omega$ ante η AB add. Ha $\kappa\alpha\iota$ $\delta\epsilon\chi\alpha$ $\tau\epsilon\tau\eta\mu\epsilon\theta\omega$

V² 22. $\tau\omega\gamma$ AF $\sigma\eta\mu\epsilon\lambda\omega\gamma$ A, corr. BS 24. $\tau\omega\gamma$ FB A, distinx.

BS $\epsilon\lambda\varsigma$ $\mu\epsilon\lambda\iota\sigma\tau\alpha\varsigma$ B² $\sigma\epsilon\alpha$ (idem voluit Co), $\epsilon\lambda\varsigma$ $\mu\epsilon\lambda\iota\sigma\tau\alpha$ ASV 25. $\epsilon\eta'$

$\epsilon\kappa\alpha\tau\epsilon\tau\epsilon\gamma$ Ha $\tau\alpha$ FE A, distinx. BS 27. $\delta\epsilon$ ante AA $\pi\acute{o}\varsigma$ $\tau\eta\eta$ AF

add. ASV, del. Sa .om. B² . η AA $\acute{\alpha}\rho\alpha$ $\pi\acute{o}\varsigma$ $\tau\eta\eta$ AF conl. Co

28. $\kappa\alpha\iota$ ante $\epsilon\iota\sigma\lambda\lambda\acute{\alpha}\zeta$ add. Ha . $\acute{\alpha}\rho\alpha$ post idem add. Co

συνα λόγον ἔχει ἢ·περ ἡ $ΑΓ$ πρὸς τὴν $ΓΒ$. ὁμοίως δὲ δεῖξομεν ὅτι καὶ ἐπὶ πάντων τῶν μεταξὺ τῶν $Α Γ$ σημείων.

Πάλιν ἐπεὶ μείζων μὲν ἔστιν ἡ $ΕΑ$ τῆς $ΑΓ$, ἐλάσσων δὲ ἡ $ΕΒ$ τῆς $ΒΓ$, ἡ $ΕΑ$ ἄρα πρὸς τὴν $ΑΓ$ μείζονα λόγον ἔχει ἢ·περ ἡ $ΕΒ$ πρὸς τὴν $ΒΓ$. ἐναλλάξ ἄρα ἡ $ΑΕ$ πρὸς τὴν $ΕΒ$ μείζονα λόγον ἔχει ἢ·περ ἡ $ΑΓ$ πρὸς τὴν $ΓΒ$. ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν μεταξὺ τῶν $Γ Β$ λαμβανομένων σημείων.

55 γ'. Ἐὰν εὐθεῖα ἢ $ΑΒ$ καὶ τετραγῶν διέχα κατὰ τὸ $Γ$,¹⁴ πάντων τῶν λαμβανομένων σημείων μέγιστον ἀποτεμένει τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΓΒ$ τὸ $Γ$ σημεῖον.

Ἐὰν γὰρ τετραγῶν σημεῖον τὸ $Α$, γίνεται τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΒΒ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $ΓΑ$ ἴσον τῷ ἀπὸ $ΑΓ$, τοντέστιν τῷ ὑπὸ τῶν $ΑΓΒ$. ὥστε μείζον ἔστιν τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΓΒ$ τοῦ¹⁵ ὑπὸ τῶν $ΑΒΒ$. τὰ δὲ αὐτὰ καὶ ἐπὶ τὰ ἕτερα.

56 Λέγω δ' ὅτι καὶ αἰεὶ τὸ ἔγγιον τοῦ $Γ$ τοῦ ἀπώτερον μείζον χωρίον ποιεῖ.

Εἰληφθῶ γὰρ καὶ ἕτερον σημεῖον τὸ $Ε$ μεταξὺ τῶν $Α Β$. δεικτέον ὅτι μείζον ἔστιν τὸ ἐπὸ τῶν $ΑΒΒ$ τοῦ ἐπὸ²⁰ τῶν $ΑΕΒ$. ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΒΒ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $ΑΓ$ ἴσον ἔστιν τῷ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$, ἔστιν δὲ καὶ τὸ ἐπὸ τῶν $ΑΕΒ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς $ΓΕ$ ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$ τετραγώνῳ, καὶ τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΒΒ$ ἄρα μετὰ τοῦ ἀπὸ $ΑΓ$ ἴσον ἔστιν τῷ ὑπὸ τῶν $ΑΕΒ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς $ΓΕ$. ὢν τὸ ἀπὸ $ΑΓ$ ²⁵ ἐλασσόν ἔστιν τοῦ ἀπὸ $ΓΕ$. λοιπὸν ἄρα τὸ ἐπὸ τῶν $ΑΒΒ$ μείζον ἔστιν τοῦ ἐπὸ τῶν $ΑΕΒ$.

57 δ'. Εἰ γὰρ εἴη τὸ $Α$ μετὰ τοῦ $Β$ ἴσον τῷ $Γ$ μετὰ τοῦ $ΔΕ$, καὶ ἐλασσον τὸ $Β$ τοῦ $ΔΕ$, μείζον ἂν γένοιτο τὸ $Α$ τοῦ $Γ$.


30

2. τῶν $ΑΓ$ A , distinct. BS 7. ἔστιν A , corr. BS 8. μεταξὺ
καὶ τῶν $ΑΒΒ$, καὶ del. Hu τῶν $ΓΒ$ A , distinct. BS 10. γ' add.
BS 13. 16. τοῦ ὑπὸ τῶν $ΑΒΒ$ add. Hu 17. ἀπώτερον Hu
18. μείζονα AB , corr. S 19. 20. τῶν $ΑΓ$ A , distinct. BS, τῶν $ΑΓ$
sit autem τὸ δ' propius τῷ $γ$ quam τὸ ε' V² 20. ὑπὸ τῶν $ΑΒΒ$ τοῦ

est $\alpha\delta : \delta\beta < \alpha\gamma : \gamma\beta$. Similiter demonstrabimus idem de omnibus inter α et γ punctis.

Rursus quoniam est $\epsilon\alpha > \alpha\gamma$, et $\epsilon\beta < \beta\gamma$, erit $\epsilon\alpha : \alpha\gamma > \epsilon\beta : \beta\gamma$; vicissim igitur est $\alpha\epsilon : \epsilon\beta > \alpha\gamma : \gamma\beta$. Similiter idem de omnibus punctis demonstratur. quae inter γ et β sumuntur.

XIII. Si sit recta $\alpha\beta$, eaque bifariam secetur in γ , omnium punctorum quae in eadem recta praeterea sumuntur punctum γ efficit maximum $\alpha\gamma \cdot \gamma\beta$. Prop. 13




Si enim sumatur punctum δ , lit (propter elem. 2. 5)

$$\alpha\delta \cdot \delta\beta + \delta\gamma^2 = \alpha\gamma^2 \\ = \alpha\gamma \cdot \gamma\beta;$$

ergo est $\alpha\gamma \cdot \gamma\beta > \alpha\delta \cdot \delta\beta$. Eadem etiam de omnibus aliis punctis demonstrantur.

Sed dico etiam, quodcunque punctum propius est γ , id semper maius rectangulum officere quam remotius punctum. Prop. 14



Sumatur enim etiam aliud punctum ϵ inter α et δ . Demon-

strandum est esse $\alpha\delta \cdot \delta\beta > \alpha\epsilon \cdot \epsilon\beta$. Quoniam est, ut supra.

$$\alpha\delta \cdot \delta\beta + \delta\gamma^2 = \alpha\gamma^2, \text{ atque etiam}$$

$$\alpha\epsilon \cdot \epsilon\beta + \epsilon\gamma^2 = \alpha\gamma^2, \text{ est igitur}$$

$$\alpha\delta \cdot \delta\beta + \delta\gamma^2 = \alpha\epsilon \cdot \epsilon\beta + \epsilon\gamma^2.$$

In quibus est $\delta\gamma^2 < \epsilon\gamma^2$; restat igitur $\alpha\delta \cdot \delta\beta > \alpha\epsilon \cdot \epsilon\beta$.

XIV. Si enim sit $\alpha + \beta = \gamma + \delta\epsilon$, et $\beta < \delta\epsilon$, erit $\alpha > \gamma$. Prop. 15

his scripta sunt in A 22. 28. *ἔστιν δὲ καὶ — τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΓ om.*
 A¹, add. A² in marg. BS 22. *τὸ add.* V² 23. *post ὅρ τὸ ἀπὸ*
ΑΓ repetunt ἵσος ἐστὶ τῇ — ὅρ τὸ ἀπὸ et tum pro ΑΓ ponunt δζ
 SV, item *ὅρ τὸ ἀπὸ δζ* e suo codice offert Co 27. *ἔστι ABS*
 28 — p. 696, 4. haec propositio a scholiasta quodam non ultra prima
 mathematicorum elementa progressu adiecta esse videtur 28. *id add.*
 BS 29. 30. *μεῖζον ἢ γένοτο τὸ ΑΕ τοῦ Β· ὅτι μεῖζον τὸ Α τοῦ Γ*
 coni. Co

Κείσθω γὰρ τῷ B ἴσον τὸ AZ . τὸ A ἄρα μετὰ τοῦ AZ ἴσον ἐστὶν τῷ AE μετὰ τοῦ I . κοινὸν ἀφελήσθω τὸ AZ . λοιπὸν ἄρα τὸ A ἴσον ἐστὶν τοῖς $I ZE$, ὥστε μείζον ἐστὶν τὸ A τοῦ I .

- 58 ιε'. Ἡ A πρὸς τὴν B μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἢ I πρὸς τὴν A . ὅτι μείζον ἐστὶν τὸ ὑπὸ τῶν $A A$ τοῦ ὑπὸ τῶν $B I$.

Πεποιήσθω γὰρ ὡς ἡ A πρὸς τὴν B , οὕτως ἢ I πρὸς τὴν E . καὶ ἢ I ἄρα πρὸς τὴν E μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ πρὸς τὴν A , ὥστε ἐλάσσων ἐστὶν ἢ E τῆς A . καὶ κοινὸν ὕψος ἢ A . ἐλάσσων ἄρα ἐστὶν τὸ ὑπὸ τῶν $E A$ τοῦ ὑπὸ τῶν $A A$. ἀλλὰ τὸ ὑπὸ τῶν $A E$ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν $B I$. ἐλάσσων ἄρα ἐστὶν τὸ ὑπὸ τῶν $B I$ τοῦ ὑπὸ τῶν $A A$, ὥστε μείζον ἐστὶν τὸ ὑπὸ τῶν $A A$ τοῦ ὑπὸ τῶν $B I$.

Ὁμοίως καὶ ἐὰν ἐλάσσων γίνηται, ἐλάσσων καὶ τὸ χω-
ρίον τοῦ χωρίου.

- 59 Ἀλλὰ δὴ ἔστω πάλιν μείζον τὸ ὑπὸ τῶν $A A$ τοῦ ὑπὸ τῶν $B I$. ὅτι ἢ A πρὸς τὴν B μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἢ I πρὸς τὴν A .

Κείσθω γὰρ τῷ ὑπὸ τῶν $A A$ ἴσον τὸ ὑπὸ τῶν $B E$. γίνεται ἄρα μείζον μὲν τὸ ὑπὸ τῶν $B E$ τοῦ ὑπὸ τῶν $B I$, ὥστε καὶ ἢ E τῆς I μείζων. ὡς δὲ ἢ A πρὸς τὴν B , οὕτως ἢ E πρὸς τὴν A . ἢ δὲ E πρὸς τὴν A μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἢ I πρὸς τὴν A . καὶ ἢ A ἄρα πρὸς τὴν B .

Ὁμοίως καὶ ἀναστρέψαντι.

- 60 ιζ'. Ἐπο εὐθεῖαι αἱ AB BF , καὶ τῶν AB BF μέση ἀνάλογον ἔστω ἢ BA , καὶ τῇ AA ἴση κείσθω ἢ AE . ὅτι ἢ FE ὑπεροχή ἐστὶν ἢ ὑπερέχει συναμφοτέρως ἢ ABF τῆς δυναμένης τὸ τετράκις ὑπὸ τῶν ABF .

3. τοῖς $I\bar{Z}\bar{E}$ A , distinx. BV (τοῖς $\gamma\bar{\zeta}\bar{\epsilon}$ S) 5. ιε' add. BS 6. 7. $\bar{A}\bar{I}$ — $\bar{B}\bar{I}$, et similiter toto hoc et proximo capite $\bar{E}\bar{A}$ — $\bar{A}\bar{I}$ cet. A , distinx. BS 15. ἐλάσσων. ἐλάσσων ABS , ἐλάσσων ὁ λόγος Ha γίνηται Ha 22. ὥστε καὶ ἢ $\bar{B}$ ABS , corr. Co Sca 22—23. ὡς δὲ ἢ $\bar{A}$ πρὸς τὴν $\bar{A}$ οὕτως ἢ $\bar{B}$ πρὸς τὴν $\bar{E}$. ἢ δὲ $\bar{B}$ πρὸς τὴν $\bar{E}$ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ πρὸς τὴν $\bar{I}$. καὶ ἢ $\bar{A}$ ἄρα (ἢ δ' ἄρα B , καὶ ἢ δ' ἄρα SV ;

Ponatur enim $\delta\zeta = \beta$; ergo $\alpha + \delta\zeta = \delta\epsilon + \gamma$. Sub-

trahatur commune

$\delta\zeta$; restat igitur
 $\alpha = \gamma + \zeta\epsilon$, ita
 ut sit $\alpha > \gamma$.

XV. Sit $\alpha : \beta > \gamma : \delta$; dico esse $\alpha \cdot \delta > \beta \cdot \gamma$.

Prop.
16

Fiat enim $\gamma : \epsilon = \alpha : \beta$; ergo

etiam $\gamma : \epsilon > \gamma : \delta$. itaque (elem.

3. 10. $\epsilon < \delta$. Et communis sit

altitudo α (sive: multiplicetur ϵ

et δ cum α : erit igitur $\alpha \cdot \epsilon < \alpha \cdot \delta$.

Sed est $\alpha \cdot \epsilon = \beta \cdot \gamma$; ergo $\beta \cdot \gamma <$

$\alpha \cdot \delta$, itaque $\alpha \cdot \delta > \beta \cdot \gamma$.

Similiter etiam, si minor pro-
 portio fiat, minus erit spatium

spatio (vel. si sit $\alpha : \beta < \gamma : \delta$, erit $\alpha \cdot \delta < \beta \cdot \gamma$).

Sed rursus sit $\alpha \cdot \delta > \beta \cdot \gamma$;

dico esse $\alpha : \beta > \gamma : \delta$.

Ponatur enim $\beta \cdot \epsilon = \alpha \cdot \delta$;

ergo fit $\beta \cdot \epsilon > \beta \cdot \gamma$, itaque etiam

$\epsilon > \gamma$. Sed est $\alpha : \beta = \epsilon : \delta$.


atque $\epsilon : \delta > \gamma : \delta$; ergo etiam

$\alpha : \beta > \gamma : \delta$.

Similiter etiam vice versa,
 si minus sit spatium spatii, pro-
 portio minor erit.

XVI. Sint duae rectae $\alpha\beta$ $\beta\gamma$, earumque media proportio- Prop.
 nalis sit $\beta\delta$, et ponatur $\delta\epsilon = \alpha\delta$; dico $\gamma\epsilon$ differentiam esse, 17
 qua summa rectarum $\alpha\beta + \beta\gamma$ eam rectam superat, cuius
 quadratum aequale est quattuor rectangulis $\alpha\beta \cdot \beta\gamma$ vel bre-
 vius: dico esse $\gamma\epsilon = \alpha\beta + \beta\gamma - 2\alpha\beta \cdot \beta\gamma$.

Ἐπεὶ γὰρ συναμφοτέρος ἢ $ABΓ$ συναμφοτέρον τῆς ABE ὑπερέχει τῇ $ΓΕ$, ἢ $ΓΕ$ ἄρα ἐστὶν ἢ ὑπεροχὴ ἢ ὑπερέχει συναμφοτέρος ἢ $ABΓ$ συναμφοτέρον τῆς ABE · συναμφοτέρος δὲ ἢ ABE δύο



εἰσὶν αἱ $ΒΔ$, δύο δὲ αἱ $ΒΔ$ δύναται τὸ τετράκις ἐπὶ τῶν $ABΓ$ · ἢ $ΓΕ$ ἄρα ἐστὶν ἢ ὑπεροχὴ ἢ ὑπερέχει συναμφοτέρος ἢ $ABΓ$ τῆς δυναμένης τὸ τετράκις ἐπὶ τῶν $ABΓ$.

- 61 ιζ'. Ἐστω δὴ πάλιν ἢ τῶν $AB BΓ$ μέση ἢ $ΒΔ$, καὶ 19
 κείσθω τῇ $ΑΔ$ ἴση ἢ $ΔΕ$ · ὅτι ἢ $ΓΕ$ σύγκειται ἐκ τε συναμφοτέρου τῆς $AB BΓ$ καὶ τῆς δυναμένης τὸ τετράκις ἐπὶ τῶν $AB BΓ$.

Ἐπεὶ γὰρ ἢ $ΓΕ$ ἐστὶν ἢ συγκειμένη ἐκ τῶν $ΓΔ ΔΕ$, ἴση δὲ ἐστὶν ἢ $ΑΔ$ τῇ $ΔΕ$, ἢ $ΓΕ$ ἄρα ἐστὶν ἢ συγκειμένη 15
 ἐκ τῶν $ΑΔ ΔΓ$, τοιούστιν ἐκ συναμφοτέρου τῆς $AB BΓ$ καὶ δύο τῶν $ΒΔ$, δύο δὲ αἱ $ΒΔ$ δύναται τὸ τετράκις ἐπὶ τῶν $ABΓ$ · ἢ $ΓΕ$ ἄρα ἐστὶν ἢ συγκειμένη ἐκ τε συναμφοτέρου τῆς $AB BΓ$ καὶ τῆς δυναμένης τὸ τετράκις ἐπὶ τῶν $ABΓ$. 20

- 62 ιη'. Πάλιν τῶν $AB BΓ$ μέση ἀνάλογον ἢ $ΒΔ$, καὶ τῇ $ΓΔ$ ἴση κείσθω ἢ $ΔΕ$ · ὅτι ἢ $ΔΕ$ ὑπεροχὴ ἐστὶν ἢ ὑπερέχει συναμφοτέρος ἢ $ABΓ$ τῆς δυναμένης τὸ τετράκις ἐπὶ $ABΓ$.

Ἐπεὶ γὰρ συναμφοτέρος ἢ $ABΓ$ συναμφοτέρον τῆς 25
 $EBΓ$ ὑπερέχει τῇ $ΔΕ$, συναμφοτέρος δὲ ἢ $EBΓ$ δύο εἰσὶν αἱ $ΒΔ$, τοιούστιν ἢ δυναμένη τὸ τετράκις ἐπὶ τῶν $ABΓ$, ἢ $ΔΕ$ ἄρα ἐστὶν ἢ ὑπεροχὴ ἢ ὑπερέχει συναμφοτέρος ἢ $ABΓ$ τῆς δυναμένης τὸ τετράκις ἐπὶ τῶν $ABΓ$.

- 63 ιθ'. Πάλιν τῶν $AB BΓ$ μέση ἀνάλογον ἔστω ἢ $ΒΔ$, 30
 καὶ τῇ $ΓΔ$ ἴση κείσθω ἢ $ΔΕ$ · ὅτι ἢ $ΔΕ$ ἐστὶν ἢ συγκει-

Quoniam summa reclarum $\alpha\beta + \beta\gamma$ superat summam $\alpha\beta + \beta\epsilon$ recta $\gamma\epsilon$, est igitur $\gamma\epsilon = \alpha\beta + \beta\gamma - (\alpha\beta + \beta\epsilon)$.¹⁷
Sed est $\alpha\beta + \beta\epsilon = \alpha\delta + \delta\beta + \beta\epsilon$, sive (quoniam est $\delta\epsilon = \alpha\delta$) $= \beta\delta + \beta\epsilon + \epsilon\delta = 2\beta\delta$. Sed quia ex hypothesi est $\alpha\beta : \beta\delta = \beta\delta : \beta\gamma$, sive $\alpha\beta \cdot \beta\gamma = \beta\delta^2$, fit igitur¹⁾ $(2\beta\delta)^2 = 4\alpha\beta \cdot \beta\gamma$; ergo $\gamma\epsilon = \alpha\beta + \beta\gamma - 2\sqrt{\alpha\beta \cdot \beta\gamma}$.

XVII. Iam rursus sit $\beta\delta$ media proportionalis reclarum $\alpha\beta$ $\beta\gamma$, et ponatur $\delta\epsilon = \alpha\delta$; dico $\gamma\epsilon$ compositam esse ex $\alpha\beta$ $\beta\gamma$ et ea recta, cuius quadratum aequale est quattuor rectangulis $\alpha\beta \cdot \beta\gamma$ (vel: esse $\gamma\epsilon = \alpha\beta + \beta\gamma + 2\sqrt{\alpha\beta \cdot \beta\gamma}$).¹⁸

Quoniam est $\gamma\epsilon = \gamma\delta + \delta\epsilon$, et $\delta\epsilon = \alpha\delta$, est igitur $\gamma\epsilon = \alpha\delta + \delta\gamma$, id est $= \alpha\beta + \beta\gamma + 2\beta\delta$. Sed est, ut in superiore lemme, $2\beta\delta^2 = 4\alpha\beta \cdot \beta\gamma$; ergo $\gamma\epsilon = \alpha\beta + \beta\gamma + 2\sqrt{\alpha\beta \cdot \beta\gamma}$.

XVIII. Rursus sit $\beta\delta$ media proportionalis reclarum $\alpha\beta$ $\beta\gamma$, et ponatur $\delta\epsilon = \gamma\delta$; dico $\alpha\epsilon$ differentiam esse, qua summa reclarum $\alpha\beta + \beta\gamma$ eam rectam superat, cuius quadratum aequale est quattuor rectangulis $\alpha\beta \cdot \beta\gamma$ (vel: dico esse $\alpha\epsilon = \alpha\beta + \beta\gamma - 2\sqrt{\alpha\beta \cdot \beta\gamma}$).¹⁹

Quoniam est $\alpha\epsilon = \alpha\beta + \beta\gamma - (\epsilon\beta + \beta\gamma)$
 $= \alpha\epsilon$, et $\epsilon\beta + \beta\gamma = \epsilon\delta + \delta\gamma + 2\gamma\beta$
 $= 2\delta\gamma + 2\gamma\beta = 2\delta\beta$, id est (propos. 17) $= 2\sqrt{\alpha\beta \cdot \beta\gamma}$,
est igitur $\alpha\epsilon = \alpha\beta + \beta\gamma - 2\sqrt{\alpha\beta \cdot \beta\gamma}$.

XIX. Rursus sit $\beta\delta$ media proportionalis reclarum $\alpha\beta$ $\beta\gamma$, et ponatur $\delta\epsilon = \gamma\delta$; dico $\alpha\epsilon$ compositam esse ex summa $\alpha\beta +$ ²⁰

*) Brevius nostrae aetatis mathematici dixerint: quoniam est $\gamma\epsilon = \gamma\beta - \epsilon\beta$, communi addita recta $\alpha\beta$ fit $\gamma\epsilon = \alpha\beta + \gamma\beta - \alpha\beta + \epsilon\beta$.

† Quia $\beta\delta$ est media proportionalis $\alpha\beta$ $\beta\gamma$. $\tau\omicron$ $\alpha\beta\delta$ $\tau\eta\varsigma$ $\beta\delta$ est aequale $\tau\omega$ $\epsilon\alpha\delta$ $\tau\omega$ $\alpha\beta\gamma$. ergo $\tau\omicron$ $\alpha\beta\delta$ $\tau\eta\varsigma$ $\delta\tau\alpha\lambda\iota\sigma\tau\alpha\varsigma$ $\beta\delta$ est aequale ei quod fit quater ex $\alpha\beta\gamma$ $\sqrt{2}$, et similiter Co.

***) Addita sunt media secundum Co.

μένη ἐκ τε συναμφοτέρου τῆς ABI' καὶ τῆς δυναμένης τὸ τετράκις ἐπὶ τῶν ABF .

Ἐπεὶ γὰρ ἡ AE σύγκειται ἐκ τῶν AD DE , ἴσῃ δὲ ἔστιν ἡ AE τῇ AI' , ἡ AE ἄρα σύγκειται ἐκ τῶν AD AI' , τοιούστιν συναμφοτέρου τῆς ABF καὶ δύο τῶν BI . δύο δὲ αἱ BI δύνανται τὸ τετράκις ἐπὶ τῶν ABF · ἡ AE ἄρα ἔστιν ἡ συγκειμένη ἐκ τε συναμφοτέρου τῆς ABI' καὶ τῆς δυναμένης τὸ τετράκις ἐπὶ τῶν ABF .

Ταῦτα λαμβάνεται εἰς τὴν τοῦ λόγου ἀποτομὴν· ταῦτα καὶ εἰς τὴν τοῦ χωρίου ἀποτομὴν λαμβάνεται, διαφερόντως μόνον.]

Πρόβλημα εἰς τὸ δεύτερον λόγον ἀποτομῆς, χρήσιμον εἰς τὴν τοῦ ἐγ' τόλου ἀνακεφαλαίωσιν.

- 64 Δύο δοθεῖσων εὐθειῶν τῶν AB BI' , λαβεῖν ἐπιτελάοντα τὴν AD δοθέν τὸ A ποιοῦν τὸν τῆς BA πρὸς AA λόγον τὸν αὐτὸν τῷ τῆς GA πρὸς τὴν ἐπεροχὴν ἣ ἐπερέχει συναμφοτέρου τῆς ABI' τῆς δυναμένης τὸ τετράκις ἐπὶ τῶν ABF . ἄλλως οὐχ οἷόν τε σιτηῖναι, εἰ μὴ συναμφοτέρου μὲν ἡ AB AI' ἴσῃ ἢ τῇ EA ἐπεροχῇ, ὅλι, δὲ ἡ AA ὅλι τῇ AB , καὶ ἔτι τὰς EA AI' IB πρὸς ἀλλήλα λόγον ἔχειν ὅν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν, καὶ τὴν IB τῆς AE διπλασίαν εἶναι.]

Ἐστω γεγονός, καὶ ἡ ἐπεροχὴ ἔστω ἡ AE ἐν γὰρ τοῖς ἐπάνω εὑρομεν αὐτὴν· ἔστιν οὖν ὡς ἡ BA πρὸς τὴν AA , οὕτως ἡ GA πρὸς τὴν AE · καὶ ἐναλλάξ καὶ διελόντι καὶ χωρίον χωρίῳ τὸ ἄρα ἐπὶ τῶν BI' EA ἴσον τῷ ἐπὶ τῶν GA AE . δοθέν δὲ τὸ ἐπὶ τῶν BI' EA · δοθέν ἄρα καὶ τὸ ἐπὶ τῶν GA AE . καὶ παρὰ δοθεῖσιν τὴν IE μαράσσεται ἐπερβάλλον τετραγώνῳ· δοθέν ἄρα ἔστιν τὸ A .

7. τῆς ABF Hu pro τῶν ABF 9. Ταῦτα — 11. μόνον interpolatori tribuit Hu 12 — p. 704, 6' haec a posteriore scriptore addita esse suspicatur Ge 14. ἐπιτελάοντα (sine acc.) A'B', ἐπιτελάοντα S 18. ἄλλως — 22. εἶναι del. Hu 18. οὐχοιαντία A.B. corr. S 23. καὶ ante χωρίον add. Ha 29. τετράγωνον ABS. corr. Ha ἐστὶ καὶ τὸ A Hu

$\beta\gamma$ et ea recta, cuius quadratum aequale est quattuor rectangulis $\alpha\beta \cdot \beta\gamma$ (vel: esse $\alpha\epsilon = \alpha\beta + \beta\gamma + 2\sqrt{\alpha\beta \cdot \beta\gamma}$).

$$\alpha \quad \gamma \quad \beta \quad \delta \quad \epsilon$$

Quoniam est $\alpha\epsilon = \alpha\delta + \delta\epsilon$, et $\delta\epsilon = \delta\gamma$, est igitur $\alpha\epsilon = \alpha\delta + \delta\gamma = \alpha\beta + \beta\gamma + 2\beta\delta$. Sed est, ut supra lemm. XVI, $2\beta\delta)^2 = 4\alpha\beta \cdot \beta\gamma$; ergo $\alpha\epsilon = \alpha\beta + \beta\gamma + 2\sqrt{\alpha\beta \cdot \beta\gamma}$.

Haec lemmata ad sectionem proportionis sumuntur; praeterea ad sectionem spatii, diversum tamen in modum, sumuntur haec.

Problema ad secundum librum de sectione proportionis, utile ad summariam repetitionem loci decimi tertii.

Duabus datis rectis $\alpha\beta \beta\gamma$ et producta $\beta\alpha$ ad δ , sumere ^{Prop. 21} datum punctum δ faciens proportionem $\beta\delta : \delta\alpha$ eandem quam $\gamma\delta$ habet ad differentiam, qua summa rectarum $\alpha\beta + \beta\gamma$ superat eam rectam, cuius quadratum aequale est quattuor rectangulis $\alpha\beta \cdot \beta\gamma$ (vel: faciens proportionem $\beta\delta : \delta\alpha = \gamma\delta : \alpha\beta + \beta\gamma - 2\sqrt{\alpha\beta \cdot \beta\gamma}$).

Factum iam sit, ac differentia sit $\alpha\epsilon$ (quam supra lemm.

$$\delta \quad \epsilon \quad \alpha \quad \gamma \quad \beta$$

XVIII invenimus: est igitur $\beta\delta : \delta\alpha = \gamma\delta : \alpha\epsilon$, et vicissim

$\beta\delta : \gamma\delta = \delta\alpha : \alpha\epsilon$, et dirimendo $\beta\gamma : \gamma\delta = \delta\epsilon : \epsilon\alpha$, itaque aequale rectangulum rectangulo $\beta\gamma \cdot \epsilon\alpha = \gamma\delta \cdot \delta\epsilon$. Datum autem est $\beta\gamma \cdot \epsilon\alpha$; ergo etiam $\gamma\delta \cdot \delta\epsilon$ datum, quod ad datam $\gamma\epsilon$ applicatur excedens quadrato²: datum igitur est punctum δ .

1) Sequuntur in codice haec aliena a proposito: "Aliter constitui non potest, nisi si sit summa $\delta\beta + \alpha\gamma$ aequalis differentiae $\epsilon\alpha$, et tota $\delta\alpha$ toti $\alpha\beta$, praeterea oportet rectas $\epsilon\alpha$ $\alpha\gamma$ $\gamma\beta$ inter se proportionem habere eandem quam quadratus numerus ad quadratum numerum habet, et $\gamma\beta$ esse duplam $\delta\epsilon$ ".

2) Scilicet, quia est $\gamma\delta = \gamma\epsilon + \epsilon\delta$, rectangulum $\gamma\delta \cdot \delta\epsilon$ superat rectangulum $\gamma\epsilon \cdot \delta\epsilon$ quadrato ex $\delta\epsilon$; data igitur est recta δ datumque punctum δ propter Euclidis dat. propos. 39. 27. Excedens, quod dicitur, quadratum significat formulam quadratae aequationis. Quoniam enim punctum δ ita inveniatur necesse est, ut sit $\beta\gamma \cdot \epsilon\alpha = \gamma\delta \cdot \delta\epsilon = (\gamma\epsilon + \epsilon\delta) \cdot \delta\epsilon$, si pro $\delta\epsilon$ notam x ponemus, erit $x^2 + \gamma\epsilon \cdot x = \beta\gamma \cdot \epsilon\alpha$. Conf. Herm. Hankel, *Geschichte der Mathematik* p. 98 sq.

Συντεθήσεται δὲ οὕτως· ἔστω ἡ ὑπεροχή ἡ EA , καὶ τῷ ὑπὸ τῶν $BΓ$ EA ἴσον πάλιν τῇ $ΓE$ παραβεβλήσθω ὑπερβάλλον τετραγώνῳ τὸ ὑπὸ $ΓΔE$ · λέγω ὅτι τὸ ζητούμενον σημεῖόν ἐστιν τὸ A . εἴπει γὰρ ἴσον τὸ ὑπὸ τῶν $BΓ$ EA τῷ ὑπὸ τῶν $ΓΔE$, ἀνάλογον καὶ συνθέντι καὶ ἐναλλάξ· ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ $BΓ$ πρὸς τὴν AA , οὕτως ἡ $ΓΔ$ πρὸς EA , ἣτις ἐστὶν ἡ ὑπεροχή. τὰ δ' αὐτά, κἂν ζητῶμεν λαβεῖν σημεῖον ποιῶν ὡς τὴν $BΓ$ πρὸς τὴν AA , οὕτως τὴν $ΓΔ$ πρὸς τὴν συγκαμμένην ἐκ τε συναμφοτέρου τῆς $ABΓ$ καὶ τῆς δυναμένης τὸ τετράκις ὑπὸ τῶν $ABΓ$, ὅπερ· ~ 10

- 65 [Τὸ πρῶτον λόγον ἀποτομῆς ἔχει τόπους ζ', πτώσεις κδ', διορισμοὺς δὲ ε', ὧν τρεῖς μὲν μέγιστοι, δύο δὲ ἐλάχιστοι· καὶ ἐστὶν μέγιστος μὲν κατὰ τὴν τρίτην πτώσιν τοῦ ε' τόπου, ἐλάχιστος δὲ κατὰ τὴν β' τοῦ ἔκτου τόπου καὶ κατὰ τὴν αὐτὴν τοῦ ζ', μέγιστοι δὲ οἱ κατὰ τὰς τετάρ- 15 τας τοῦ ἔκτου καὶ τοῦ ἑβδόμου. τὸ δεύτερον λόγου ἀποτομῆς ἔχει τόπους ιδ', πτώσεις δὲ εζ', διορισμοὺς δὲ τοὺς ἐκ 66 τοῦ πρώτου· ἀπάγεται γὰρ ὅλον εἰς τὸ πρῶτον. τὸ πρῶτον χωρίου ἀποτομῆς ἔχει τόπους ζ', πτώσεις κδ', διορισμοὺς ε', ὧν δ' μὲν μέγιστοι, τρεῖς δὲ ἐλάχιστοι· καὶ ἐστὶν μέ- 20 γιστος μὲν ὁ κατὰ τὴν δευτέραν τοῦ πρώτου τόπου καὶ ὁ κατὰ τὴν πρώτην τοῦ β' τόπου καὶ ὁ κατὰ τὴν β' τοῦ δ' τόπου καὶ ὁ κατὰ τὴν τρίτην τοῦ ἔκτου, ἐλάχιστοι δὲ ὁ κατὰ τὴν τρίτην τοῦ τρίτου τόπου καὶ ὁ κατὰ τὴν δ' τοῦ δ' καὶ ὁ κατὰ τὴν πρώτην τοῦ ε'. τὸ δεύτερον χωρίου ἀποτομῆς 25 ἔχει τόπους ιγ', πτώσεις ε', διορισμοὺς δὲ τοὺς ἐκ τοῦ πρώτου· ἀπάγεται γὰρ εἰς αὐτό.]

- 67 [Ἐπιστήσειεν ἂν τις διὰ τί ποτε μὲν τὸ λόγου ἀποτομῆς δεύτερον ἔχει τόπους ιδ', τὸ δὲ τοῦ χωρίου ιγ'. ἔχει δὲ διὰ τὸδε, ὅτι ὁ ζ' ἐν τῷ τοῦ χωρίου ἀποτομῆς τόπος 30 παραλείπεται ὡς φανερός· ἐὰν γὰρ αἱ παραλλήλοι ἀμφο-

2. πάλιν τῇ $ΓE$ B^a Ha. πάλιν τὴν $\overline{ΓE}$ AS, παρὰ τὴν $\overline{γE}$ V
10. ὅπερ BS, δ A 11. cap. 65 sq. repetita sunt e cap. 6 et 8 45. τὴν αὐτὴν Ha pro τῆς αὐτῆς 17. ἔχει τόπους — 19. ἀποτομῆς ex cap. 6 et 8 add. Ha 22. τοῦ δευτέρου τόπου καὶ ὁ κατὰ τὴν δευτέραν add. Ha 22. 23. post τοῦ δ' τόπου repetunt καὶ ὁ κατὰ τὴν πρώτην τοῦ

Componetur autem hoc modo: Sit differentia $\epsilon\alpha$, et rursus rectangulo $\beta\gamma \cdot \epsilon\alpha$ aequale rectangulum $\gamma\delta \cdot \delta\epsilon$ applicetur ad rectam $\gamma\epsilon$ excedens quadrato; dico punctum quod quaeritur esse δ . Quoniam est $\beta\gamma \cdot \epsilon\alpha = \gamma\delta \cdot \delta\epsilon$, per proportionem igitur est $\beta\gamma : \gamma\delta = \delta\epsilon : \epsilon\alpha$, et componendo $\beta\delta : \delta\gamma = \delta\alpha : \alpha\epsilon$, et vicissim $\beta\delta : \delta\alpha = \gamma\delta : \epsilon\alpha$, quae quidem (*scil.* $\epsilon\alpha$) est differentia. Idem etiam contingit, si punctum sumere velimus, quod faciat, ut $\beta\delta : \delta\alpha$, ita $\gamma\delta$ ad eam rectam, quae ex summa $\alpha\beta + \beta\gamma$ eaque recta componitur, cuius quadratum aequale sit quattuor rectangulis $\alpha\beta \cdot \beta\gamma$ (*vel*: quod faciat $\beta\delta : \delta\alpha = \gamma\delta : \alpha\beta + \beta\gamma + 2\sqrt{\alpha\beta \cdot \beta\gamma}$), q. e. d.

[Primus liber de proportionis sectione locos habet septem, casus viginti quattuor, determinationes quinque, quarum tres sunt maximae, duae minimae. Estque maxima ad tertium casum quinti loci, minima ad secundum sexti et ad secundum septimi; tum maximae ad quartos casus sexti et septimi loci. Secundus liber de proportionis sectione habet locos quattuordecim, casus sexaginta tres, determinationes easdem ac primus liber; nam ad hunc totus refertur. Primus liber de spatii sectione habet locos septem, casus viginti quattuor, determinationes septem, quarum quattuor maximae, tres minimae sunt. Maximae sunt ad secundum casum primi loci, ad primum secundi loci, ad secundum quarti loci, ad tertium sexti; minimae ad tertium casum tertii loci, ad quartum quarti, ad primum sexti. Secundus liber de spatii sectione habet locos tredecim, casus sexaginta, determinationes easdem ac primus liber, ad quem refertur.]

[Sed quaerat quispiam, qua tandem de causa secundus de proportionis sectione liber locos quattuordecim, secundus autem de spatii sectione tredecim tantum habeat. Verum id inde evenit, quod in secundo libro de spatii sectione septimus locus tanquam manifestus omittitur; nam si duae paral-

τεραι ἐπὶ τὰ πέρατα πίπτωσιν, οἷα ἂν διαχθῇ, δοθέν
ἀποτέμνει χωρίον· ἴσον γὰρ γίνεται τῷ ἐπὶ τῶν μεταξὺ
τῶν περάτων καὶ τῆς ἀμφοτέρων τῶν ἐξ ἀρχῆς τῇ θέσει
δοθεισῶν εὐθειῶν συμβολῆς. ἐν δὲ τῇ λόγον ἀποτομῆς
οὐδέτι ὁμοίως· διὰ τοῦτο οὖν προέχει τόπον ἵνα εἰς τὸ
ἔβδομον τοῦ δευτέρου, καὶ τὰ λοιπὰ ὄντα τὰ ὄντα.]

Διωρισμένης τομῆς πρώτον.

*Λήμμα χρήσιμον εἰς τὸ πρῶτον ἐπιτάγμα τοῦ πέμπτου
προβλήματος.*

68 α'. Ἐστω εὐθεῖα ἡ AB καὶ ἐπ' αὐτῆς τρία σημεῖα¹⁰
τὰ Γ Δ E , καὶ ἔστω τὸ ἐπὶ τῶν $ΑΔΓ$ ἴσον τῷ ἐπὶ τῶν
 $BΔE$ · ὅτι γίνεται ὡς ἡ $BΔ$ πρὸς $ΔE$, οὕτως τὸ ἐπὶ τῶν
 $ΑΒΓ$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΕΓ$.

Ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΔΓ$ ἴσον ἐστὶν τῷ ἐπὶ $BΔE$,
ἀνάλογον ἄρα ὡς ἡ $ΑΔ$ πρὸς τὴν $ΔB$, οὕτως ἡ $EΔ$ πρὸς¹⁵
τὴν $ΔΓ$ · καὶ ὅλη ἄρα ἡ $ΑE$ πρὸς ὅλην τὴν $BΓ$ ἐστὶν ὡς
ἡ $EΔ$ πρὸς $ΔΓ$ · καὶ ἀνάπαλιν. πάλιν ἐπεὶ τὸ ὑπὸ τῶν
 $ΑΔΓ$ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν $BΔE$, ἀνάλογον ἄρα ἐστὶν
ὡς ἡ $ΑΔ$ πρὸς τὴν $ΔE$, οὕτως ἡ $BΔ$ πρὸς $ΔΓ$, καὶ ὅλη
ἄρα ἡ $ΑB$ πρὸς ὅλην τὴν $ΓE$ ἐστὶν ὡς ἡ $BΔ$ πρὸς $ΔΓ$.²⁰
ἦν δὲ καὶ ὡς ἡ $BΓ$ πρὸς τὴν $EΔ$, οὕτως ἡ $ΓΔ$ πρὸς τὴν
 $ΔE$, ὥστε καὶ ὁ συνημμένος λόγος ἔκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ $ΑB$
πρὸς $ΓE$ καὶ ἐξ οὗ ὄν ἔχει ἡ $BΓ$ πρὸς $ΑE$ ὁ αὐτός ἐστιν
τῷ ἔκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ $BΔ$ πρὸς $ΔΓ$ καὶ ἡ $ΓΔ$ πρὸς τὴν
 $EΔ$. ἀλλ' ὁ μὲν συνημμένος ἔκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ $ΑB$ πρὸς²⁵
 $ΓE$ καὶ ἐξ οὗ ὄν ἔχει ἡ $BΓ$ πρὸς $ΑE$ ὁ τοῦ ὑπὸ τῶν
 $ΑΒΓ$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΕΓ$ ἐστίν, ὁ δὲ συνημμένος ἔκ
τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ $BΔ$ πρὸς $ΔΓ$ καὶ ἐξ οὗ ἡ $ΓΔ$ πρὸς $ΔE$
ὁ τῆς $BΔ$ πρὸς $ΔE$ ἐστίν· καὶ ὡς ἄρα ἡ $BΔ$ πρὸς $ΔE$,
οὕτως τὸ ἐπὶ τῶν $ΑΒΓ$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΕΓ$, ὅπερ· ~³⁰

Ἄλλως τὸ αὐτό.

69 β'. Ἐπεὶ τὸ ἐπὶ $ΑΔΓ$ ἴσον ἐστὶν τῷ ἐπὶ τῶν $BΔE$,
ἀνάλογον καὶ ὅλη πρὸς ὅλην ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ $ΑE$ πρὸς $BΓ$.
οὕτως ἡ $ΑΔ$ πρὸς $ΔB$. συνθέντι ἐστὶν ὡς συναμρότερος

lelae in terminos *datos* cadant, quaecunque recta ducta fuerit, abscindet datum rectangulum; id enim aequale est illi rectangulo, quod continetur rectis quae sunt inter terminos et concursum duarum rectarum ab initio positione datarum. Sed in *secundo libro* de proportionis sectione aliter res se habet, eaque de causa *hic liber* uno loco, scilicet septimo, abundat; reliqua autem conveniunt.]

LEMMA IN SECTIONIS DETERMINATAE LIBRUM PRIMUM.

Lemma utile ad primum epitagma quinti problematis.

I. Sit recta $\alpha\beta$ in eaque tria puncta $\gamma \delta \epsilon$, et sit $\alpha\delta \cdot \delta\gamma$ ^{Prop. 22}
 $= \beta\delta \cdot \delta\epsilon$; dico esse $\beta\delta : \delta\epsilon = \alpha\beta : \beta\gamma : \alpha\epsilon : \epsilon\gamma$.

Quoniam enim est $\alpha\delta \cdot \delta\gamma$
 $\alpha\delta : \delta\beta = \epsilon\delta : \delta\gamma$, et tota ad
 totam $\alpha\epsilon : \beta\gamma = \epsilon\delta : \delta\gamma$, et e contrario $\beta\gamma : \alpha\epsilon = \delta\gamma : \epsilon\delta$.
 Rursus quoniam est $\alpha\delta \cdot \delta\gamma = \beta\delta \cdot \delta\epsilon$, per proportionem igitur est $\alpha\delta : \delta\epsilon = \beta\delta : \delta\gamma$, et tota ad totam $\alpha\beta : \gamma\epsilon = \beta\delta : \delta\gamma$.
 Sed erat $\beta\gamma : \alpha\epsilon = \delta\gamma : \epsilon\delta$, ita ut sit per formulam compositae proportionis $\frac{\alpha\beta}{\gamma\epsilon} \cdot \frac{\beta\gamma}{\alpha\epsilon} = \frac{\beta\delta}{\delta\gamma} \cdot \frac{\delta\gamma}{\epsilon\delta}$, sive
 $\alpha\beta \cdot \beta\gamma : \alpha\epsilon \cdot \epsilon\gamma = \beta\delta : \delta\epsilon$, q. e. d.

Similiter demonstratur esse $\alpha\delta : \delta\gamma = \beta\alpha \cdot \alpha\epsilon : \beta\gamma \cdot \gamma\epsilon$.

Aliter idem.

II. Quoniam est $\alpha\delta \cdot \delta\gamma = \beta\delta \cdot \delta\epsilon$, per proportionem igitur

est $\epsilon\delta : \delta\gamma = \alpha\delta : \delta\beta$, et tota
 ad totam $\alpha\epsilon : \beta\gamma = \alpha\delta : \delta\beta$.

1. οὐκ ἔστι Hu auctore Co pro οὐκ ἔστι 3. καὶ om. Ge 5. οὐκ-
 ἐστὶ non adhuc — contingit Co, οὐκ ἔστι coni. Ge 5. 6. voluisse
 videtur scriptor τόπω ἐστὶ, τούτέστιν ἐξῆς . . . τὰ λοιπὰ ἐστὶ τὰ
 αὐτὰ 5. εἰς τὸν Ge 6. ἐξῆς Hu pro δεῖτερον 10. ᾱ A¹ in
 marg. S, om. B¹ 11. τὰ ΓΔΕ A, distinx. BS 19. 20. καὶ ὅλη —
 πρὸς ΔΓ om. Paris. 2368 SV cod. Co, καὶ ὅλη ἥρα ἐστὶν ὥς ἡ ᾱ πρὸς
 τὴν δε οὕτως ἡ βδ πρὸς δγ B, καὶ ἡ αβ πρὸς γε V² 20. ἥρα ἡ
 ΔΒ A, corr. Co ἐστὶν ὥς ἡ ΒΔ A, corr. Co 21. καὶ ὥς ἡ ΒΓ
 ABV² Co, καὶ ὥς ἡ βδ S 24. ἐκ τε B¹. ἐκ AB¹S 28. πρὸς ΔΓ καὶ
 A¹V², πρὸς ΔΕΓ καὶ A³BS 30. πρὸς τὸ ἐπὶ τῶν ΑΔΓ AS, corr. BV²
 32. Β A¹ in marg. BS

ἡ AE GB πρὸς GB , οὕτως ἡ AB πρὸς BA . τὸ ἄρα ἐπὶ συναμφοτέρου τῆς AE GB καὶ τῆς BA ἴσον ἐστὶν τῷ ἐπὶ τῶν ABG . πάλιν ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ AA πρὸς τὴν AB , οὕτως ἡ EA πρὸς τὴν AG , καὶ ὅλη ἄρα ἡ AE πρὸς ὅλην τὴν GB ἐστὶν ὡς ἡ EA πρὸς AG . ἀνάπαλιν καὶ συνθέντι 5 τὸ ἄρα ἐπὶ συναμφοτέρου τῆς AE GB καὶ τῆς EA ἴσον ἐστὶν τῷ ἐπὶ τῶν $AEΓ$. ἐδείχθη δὲ καὶ τὸ ἐπὶ συναμφοτέρου τῆς AE GB καὶ τῆς BA ἴσον τῷ ἐπὶ τῶν $ABΓ$. ἐναλλάξ ἄρα γίνεται ὡς τὸ ἐπὶ συναμφοτέρου τῆς AE GB καὶ τῆς BA πρὸς τὸ ἐπὶ συναμφοτέρου τῆς AE GB καὶ 10 τῆς AE , τοιούστιν ὡς ἡ BA πρὸς τὴν AE , οὕτως τὸ ἐπὶ τῶν $ABΓ$ πρὸς τὸ ἐπὶ τῶν $AEΓ$.

Ἄλλως εἰς τὸ πρῶτον ἐπίταγμα τοῦ πέμπτου προβλήματος, πρότερον προδευρηθέντων τῶν ἐξῆς δύο.

- 70 γ'. Ἐστω ἴση ἡ AB τῇ GA , καὶ ἐπὶ τῆς GA τυχὸν τὸ 15 E . ὅτι τὸ ἐπὶ τῶν AGA ἴσον ἐστὶν τῷ τε ἐπὶ τῶν AEA καὶ τῷ ἐπὶ τῶν BEG .

Τετμήσθω ἡ $BΓ$ δίχα κατὰ τὸ Z σημεῖον. τὸ ἄρα ἐπὶ τῶν AGA μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς GZ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ZA . διὰ ταῦτα δὴ καὶ τὸ ἐπὶ τῶν AEA μετὰ τοῦ 20 ἀπὸ τῆς ZE τετραγώνου ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ZA . καὶ τὸ ἐπὶ τῶν AGA ἄρα μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς GZ ἴσον ἐστὶν τῷ ἐπὶ τῶν AEA καὶ τῷ ἀπὸ τῆς EZ τετραγώνῳ, τοιούστιν τῷ τε ἐπὶ τῶν BEG καὶ τῷ ἀπὸ τῆς GZ τετραγώνῳ. καὶ κοινὸν ἀφηρήσθω τὸ ἀπὸ τῆς GZ τετραγώνον. λοιπὸν 25 ἄρα τὸ ἐπὶ τῶν AGA ἴσον ἐστὶν τῷ ἐπὶ τῶν AEA καὶ τῷ ἐπὶ τῶν BEG .

- 71 δ'. Τῶν αὐτῶν ἐποκειμένων ἔστω τὸ E σημεῖον ἐκτὸς τῆς AA . ὅτι πάλιν τὸ ἐπὶ τῶν BEG ἴσον τῷ ἐπὶ τῶν AEA καὶ τῷ ἐπὶ τῶν BAG . 30


Τετμήσθω πάλιν ἡ $BΓ$ δίχα κατὰ τὸ Z . τὸ μὲν ἄρα ἐπὶ τῶν BEG μετὰ τοῦ ἀπὸ GZ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ZE , ὥστε τὸ ἐπὶ BEG μετὰ τοῦ ἀπὸ GZ ἴσον ἐστὶν τῷ ἐπὶ AEA μετὰ τοῦ ἀπὸ AZ , τοιούστιν τοῦ ἐπὶ BAG καὶ τοῦ

Componendo est $\alpha\epsilon + \gamma\beta : \gamma\beta = \alpha\beta : \beta\delta$; ergo $(\alpha\epsilon + \gamma\beta) \cdot \beta\delta = \alpha\beta \cdot \beta\gamma$. Rursus quoniam est $\alpha\delta : \delta\beta = \epsilon\delta : \delta\gamma$, est igitur tota ad totam $\alpha\epsilon : \gamma\beta = \epsilon\delta : \delta\gamma$. Ergo e contrario $\gamma\beta : \alpha\epsilon = \delta\gamma : \epsilon\delta$, et componendo $\alpha\epsilon + \gamma\beta : \alpha\epsilon = \epsilon\gamma : \epsilon\delta$; itaque $(\alpha\epsilon + \gamma\beta) \cdot \epsilon\delta = \alpha\epsilon \cdot \epsilon\gamma$. Demonstravimus autem $(\alpha\epsilon + \gamma\beta) \cdot \beta\delta = \alpha\beta \cdot \beta\gamma$; ergo vicissim facta proportionem $(\alpha\epsilon + \gamma\beta) \cdot \beta\delta : (\alpha\epsilon + \gamma\beta) \cdot \delta\epsilon = \alpha\beta \cdot \beta\gamma : \alpha\epsilon \cdot \epsilon\gamma$, id est $\beta\delta : \delta\epsilon = \alpha\beta \cdot \beta\gamma : \alpha\epsilon \cdot \epsilon\gamma$.

Aliter in primum epitagma quinti problematis, duobus lemmatis demonstrandi causa praemissis.

III. Sit recta $\alpha\beta = \gamma\delta$, et in $\gamma\delta$ quodvis punctum ϵ ; dico ^{Prop. 23} esse $\alpha\gamma \cdot \gamma\delta = \alpha\epsilon \cdot \epsilon\delta + \beta\epsilon \cdot \epsilon\gamma$.

Secetur recta $\beta\gamma$ bifariam in puncto ζ ; ergo est ^{propter elem. 2, 5} $\alpha\gamma \cdot \gamma\delta + \gamma\zeta^2 = \gamma\delta^2$. Eadem ratione est etiam




$$\begin{aligned}\alpha\epsilon \cdot \epsilon\delta + \zeta\epsilon^2 &= \zeta\delta^2; \text{ ergo} \\ \alpha\gamma \cdot \gamma\delta + \gamma\zeta^2 &= \alpha\epsilon \cdot \epsilon\delta + \zeta\epsilon^2, \text{ id est} \\ &= \alpha\epsilon \cdot \epsilon\delta + \beta\epsilon \cdot \epsilon\gamma + \gamma\zeta^2.\end{aligned}$$

Subtrahatur commune $\gamma\zeta^2$; restat igitur $\alpha\gamma \cdot \gamma\delta = \alpha\epsilon \cdot \epsilon\delta + \beta\epsilon \cdot \epsilon\gamma$.

IV. Iisdem suppositis sit punctum ϵ extra $\alpha\delta$; dico rur- ^{Prop. 24} sus esse $\beta\epsilon \cdot \epsilon\gamma = \alpha\epsilon \cdot \epsilon\delta + \beta\delta \cdot \delta\gamma$.

Rursus $\beta\gamma$ bifariam ^{secetur in ζ ; ergo est (propter elem. 2, 6)}



$$\begin{aligned}\beta\epsilon \cdot \epsilon\gamma + \gamma\zeta^2 &= \zeta\epsilon^2, \text{ itaque (quia etiam } \alpha\zeta = \gamma\delta) \\ \beta\epsilon \cdot \epsilon\gamma + \gamma\zeta^2 &= \alpha\epsilon \cdot \epsilon\delta + \delta\zeta^2, \text{ id est} \\ &= \alpha\epsilon \cdot \epsilon\delta + \beta\delta \cdot \delta\gamma + \gamma\zeta^2.\end{aligned}$$

* Elem. 2, 6 citat Co: "quia quadratum $\alpha\pi\omicron$ $\tau\eta\varsigma$ $\epsilon\zeta$ est aequale ei quod sit ex $\beta\epsilon\gamma$ et quadrato $\tau\eta\varsigma$ $\gamma\zeta$ " adnotat V².

$\epsilon\pi\omicron$ $\sigma\upsilon\gamma\gamma\alpha\mu\upsilon\sigma\tau\epsilon\sigma\theta\epsilon\upsilon$ $\tau\eta\varsigma$ $\overline{AE}$ $\overline{FB}$ AB, om. Paris. 2868 SV cod. Co. corr. V² Co 45. γ' add. BS 20. $\delta\iota\alpha$ $\tau\alpha\upsilon\tau\alpha$ AB, $\delta\iota\alpha$ $\tau\alpha$ $\alpha\upsilon\tau\alpha$ S 21. $\alpha\pi\omicron$ $\tau\eta\varsigma$ Z ABS, corr. V $\tau\epsilon\tau\alpha\gamma\omega\upsilon\sigma\tau\epsilon\sigma$ A'B', corr. S 26. 27. $\kappa\alpha\iota$ $\tau\omicron$ $\epsilon\pi\omicron$ A, corr. BS 28. δ A' in marg. (BS) 29. 30. $\iota\sigma\alpha\upsilon$ $\tau\omega\iota$ $\epsilon\pi\omicron$ $\tau\omega\iota$ $\overline{AJE}$ A(BS), corr. V² Co 33. 34. $\tau\omega\iota$ $\epsilon\pi\omicron$ $\overline{AJE}$ A'BS, corr. V² Co 34. $\tau\omicron\upsilon\tau\epsilon\sigma\tau\epsilon\tau$ $\tau\omega\iota$ $\epsilon\pi\omicron$ $\overline{BFJ}$ A'BS, corr. V² Co

ἀπὸ ΓΖ. κοινὸν ἀφηρέσθω τὸ ἀπὸ ΓΖ· λοιπὸν ἄρα τὸ
 ὑπὸ ΒΕΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΑΕΔ καὶ τῷ ἐπὶ ΒΔΓ.
 72 ε'. Τούτων προτε θεωρημένων δεῖξαι ὅτι, ἐὰν τὸ ὑπὸ
 ΑΒΓ ἴσον τῷ ὑπὸ ΔΒΕ, γίνεται ὡς ἡ ΔΒ πρὸς ΒΕ, οὕ-
 τως τὸ ἐπὶ ΑΔΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΕΓ. 5

Κείσθω γὰρ τῇ ΓΕ ἴση ἡ ΖΑ. ἐπεὶ οὖν τὸ ἐπὶ
 ΑΒΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΔΒΕ, κοινὸν προσκείσθω τὸ ἐπὶ
 ΖΒΕ· ὅλον ἄρα τὸ ἐπὶ ΑΖ ΒΕ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ἐπὶ τῶν
 ΖΒΕ καὶ τῷ ἐπὶ τῶν ΑΒΓ. ἀλλὰ ταῦτα διὰ τὸ προγε-
 γραμμένον ἴσα ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΖΓΕ, τοιτέστιν τῷ ἐπὶ 10
 τῶν ΑΕΓ· καὶ τὸ ἐπὶ τῶν ΖΔ ΒΕ ἄρα ἴσον ἐστὶν τῷ
 ἐπὶ τῶν ΑΕΓ. ἔξωθεν τὸ ἐπὶ τῶν ΖΔΕ· ὡς ἄρα τὸ ἐπὶ
 τῶν ΖΔΕ πρὸς τὸ ἐπὶ τῶν ΖΔ ΒΕ, τοιτέστιν ὡς ἡ ΕΔ
 πρὸς ΕΒ, οὕτως τὸ ἐπὶ τῶν ΖΔΕ πρὸς τὸ ἐπὶ τῶν ΑΕΓ.
 συνθέντι ἐστὶν ὡς ἡ ΔΒ πρὸς ΒΕ, οὕτως τὸ ἐπὶ τῶν ΖΔΕ 15
 μετὰ τοῦ ὑπὸ τῶν ΑΕΓ πρὸς τὸ ἐπὶ τῶν ΑΕΓ. ἀλλὰ τὸ
 ἐπὶ τῶν ΖΔΕ μετὰ τοῦ ἐπὶ τῶν ΑΕΓ διὰ τὸ προγεγραμ-
 μένον ἴσον ἐστὶν τῷ ἐπὶ τῶν ΑΔΓ· ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ ΔΒ
 πρὸς τὴν ΒΕ, οὕτως τὸ ἐπὶ τῶν ΑΔΓ πρὸς τὸ ἐπὶ ΑΕΓ.

73 ε'. Ἐὰν ἡ τρίγωνον τὸ ΑΒΓ καὶ δύο διαθῶσιν ὡς 20
 ΑΔ ΑΕ, ὥστε τὰς ἐπὶ ΒΔΓ ΔΑΕ γωνίας δεσὶν ὁρθαῖς
 ἴσας εἶναι, γίνεται ὡς τὸ ἐπὶ τῶν ΒΓΔ πρὸς τὸ ἐπὶ τῶν
 ΒΕΔ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΓΑ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΕ.

Ἐὰν γὰρ περιγράψωμεν κύκλον τῇ ΑΒΔ τρίγωνῳ, καὶ
 ἐκβληθῶσιν αἱ ΕΑ ΓΑ ἐπὶ τὰ Ζ Η, μεταβαίνει τὸ μὲν 25
 ὑπὸ τῶν ΒΓΔ εἰς τὸ ἐπὶ τῶν ΗΓΑ, τὸ δὲ ἐπὶ τῶν ΒΕΔ
 εἰς τὸ ἐπὶ τῶν ΖΕΑ, καὶ δεῖξαι ἐναλλάξ ζῆτῆσαι, εἰ ὡς
 τὸ ἐπὶ τῶν ΗΓΑ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΓΔ, οὕτως τὸ ἐπὶ
 ΖΕΑ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΕΑ. τοῦτο δὲ ταῦτόν ἐστιν τῷ

2. τὸ ἐπὶ τῶν ΔΔΕ ΑΒS., corr. V² Co 3. ε' Α' in marg. (BS)

4. post ἴσον add. ἡ V² ἡ ΔΒ πρὸς ΒΓ ABS, corr. Co 8. ἄρα τὸ
 ἐπὶ ΔΖΒ ABS, corr. V² Co 12. ἔξωθεν τὸ ἐπὶ τῶν Δ ΖΔΕ Α, sed
 prius Δ deletit prima m. 14. ΑΕΓ; ΔΕΓ ABS, corr. V² Co


15. [ἐστὶν] ἄρα cont. Co ὡς ἡ ΔΒ AS, corr. BV² Co οὕτως ΑΒS

15. 16. ΖΔΕ — ὑπὸ τῶν add. V² Co 18. ἴσον ἐστὶν τῶν Α, corr. BS

19. ὑπὸ ante ΑΕΓ add. Hu 20. ε' add. BS ὡς αἱ Β 23. ἐπὶ

Subtrahatur commune $\gamma\epsilon^2$; restat igitur $\beta\epsilon \cdot \epsilon\gamma = \alpha\epsilon \cdot \epsilon\delta + \beta\delta \cdot \delta\gamma$.

V. His praemissis demonstrandum est, si sit $\alpha\beta \cdot \beta\gamma = \text{Prop. 25}$
 $\delta\beta \cdot \beta\epsilon$, esse $\alpha\delta \cdot \delta\gamma : \alpha\epsilon \cdot \epsilon\gamma = \delta\beta : \beta\epsilon$.

Ponatur enim $\zeta\alpha$

 $\delta = \gamma\epsilon$. Quoniam igitur est $\alpha\beta \cdot \beta\gamma =$

$\delta\beta \cdot \beta\epsilon$, addatur commune $\zeta\beta \cdot \beta\epsilon$; ergo summa rectangulorum $\zeta\beta \cdot \beta\epsilon + \delta\beta \cdot \beta\epsilon$, id est $\zeta\delta \cdot \beta\epsilon = \zeta\beta \cdot \beta\epsilon + \alpha\beta \cdot \beta\gamma$. Sed est propter superius lemma III (propos. 25)

$$\zeta\beta \cdot \beta\epsilon + \alpha\beta \cdot \beta\gamma = \zeta\gamma \cdot \gamma\epsilon, \text{ id est } = \alpha\epsilon \cdot \epsilon\gamma; \text{ ergo}$$

$$\zeta\delta \cdot \beta\epsilon = \alpha\epsilon \cdot \epsilon\gamma.$$

Iam extrinsecus adsumpto rectangulo $\zeta\delta \cdot \delta\epsilon$ fiat proportio ad utrumque: est igitur

$$\zeta\delta \cdot \delta\epsilon : \alpha\epsilon \cdot \epsilon\gamma = \zeta\delta \cdot \delta\epsilon : \zeta\delta \cdot \beta\epsilon$$

$$= \delta\epsilon : \beta\epsilon. \text{ Componendo est}$$

$\zeta\delta \cdot \delta\epsilon + \alpha\epsilon \cdot \epsilon\gamma : \alpha\epsilon \cdot \epsilon\gamma = \delta\beta : \beta\epsilon$. Sed est propter superius lemma IV (propos. 24)

$$\zeta\delta \cdot \delta\epsilon + \alpha\epsilon \cdot \epsilon\gamma = \alpha\delta \cdot \delta\gamma; \text{ ergo}$$

$$\alpha\delta \cdot \delta\gamma : \alpha\epsilon \cdot \epsilon\gamma = \delta\beta : \beta\epsilon.$$

VI. Si sit triangulum $\alpha\beta\gamma$, duaeque $\alpha\delta$ $\alpha\epsilon$, ita ducantur, Prop. 26
 ut anguli $\beta\alpha\gamma + \delta\alpha\epsilon$ duobus rectis aequales sint, fit $\beta\gamma \cdot \gamma\delta : \beta\epsilon \cdot \epsilon\delta = \gamma\alpha^2 : \alpha\epsilon^2$.



Si enim circa triangulum $\alpha\beta\delta$ circum describamus, rectaeque $\epsilon\alpha$ $\gamma\alpha$ ad circumferentiae puncta ζ η producantur, pro $\beta\gamma \cdot \gamma\delta$ substituitur $\eta\gamma \cdot \gamma\alpha$, pro $\beta\epsilon \cdot \epsilon\delta$ autem $\zeta\epsilon \cdot \epsilon\alpha$, et vicissim quaerendum erit, sitne $\eta\gamma \cdot \gamma\alpha : \gamma\alpha^2 = \zeta\epsilon \cdot \epsilon\alpha : \epsilon\alpha^2$, idque

ἔχτείν, εἰ ἔστιν ὡς ἡ $HΓ$ πρὸς τὴν $ΓΑ$, οὕτως ἡ $ΖΕ$ πρὸς τὴν $ΕΑ$. εἰ ἄρα ἔστιν, ἡ $ΗΖ$ παράλληλος ἐστὶν τῇ $ΒΓ$. ἔστιν δέ· ἐπεὶ γὰρ αἱ ἐπὶ $ΒΑΓ$ $ΔΑΕ$ γωνίαι δυοῖν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶν, ἴση ἐστὶν ἡ ἐπὶ $ΔΑΕ$ γωνία τῇ ἐπὶ $ΒΑΗ$ γωνίᾳ. ἀλλὰ ἡ μὲν ἐπὶ $ΔΑΕ$ ἴση ἐστὶν τῇ ἐπὶ $ΖΒΔ$ ἐκ τῶς τετραπλεύρου, ἡ δὲ ἐπὶ $ΒΑΗ$ γωνία ἴση ἐστὶν τῇ ἐπὶ $ΒΖΗ$ καὶ ἡ ἐπὶ $ΖΒΔ$ ἄρα γωνία ἴση ἐστὶν τῇ ἐπὶ $ΒΖΗ$ γωνίᾳ. καὶ εἰσὶν ἐναλλάξ· παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ $ΗΖ$ τῇ $ΒΓ$. τοῦτο δὲ ἐξηγοῦμεν. εἰ ἄρα: ~

Ἄλλως τὸ αὐτό.

10

74 ζ'. Ἐστῶσαν ἐν τριγώνῳ τῷ $ΑΒΓ$ αἱ ἐπὶ $ΒΑΓ$ $ΔΑΕ$ γωνίαι δυοῖν ὀρθαῖς ἴσαι· ὅτι γίνεται ὡς τὸ ἐπὶ $ΒΓΔ$ πρὸς τὸ ἐπὶ $ΒΕΔ$, οὕτως τὸ ἀπὸ $ΓΑ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΑΕ$.


Ἦχθω διὰ τοῦ $Ε$ τῇ $ΑΓ$ παράλληλος ἡ $ΕΖ$ · ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ἐπὶ $ΔΑΕ$ γωνία τῇ ἐπὶ $ΑΖΕ$ γωνίᾳ· ἴσον ἄρα ἐστὶν τὸ ἐπὶ τῶν $ΖΕΗ$ τῷ ἀπὸ $ΑΕ$. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς μὲν ἡ $ΑΓ$ πρὸς τὴν $ΖΕ$, οὕτως ἡ $ΓΒ$ πρὸς $ΒΕ$, ὡς δὲ ἡ $ΓΑ$ πρὸς $ΗΕ$, οὕτως ἡ $ΓΔ$ πρὸς $ΔΕ$, ὁ ἄρα συνημμένος ἐκ τε τοῦ τῆς $ΓΑ$ πρὸς $ΖΕ$ καὶ ἐκ τοῦ τῆς $ΓΑ$ πρὸς $ΗΕ$ ὁ αὐτός ἐστὶν τῷ συνημμένῳ ἐκ τε τοῦ τῆς $ΓΒ$ πρὸς $ΒΕ$ καὶ τοῦ τῆς $ΓΔ$ πρὸς $ΔΕ$. ἀλλ' ὁ μὲν συνημμένος ἐκ τε τοῦ τῆς $ΓΑ$ πρὸς $ΖΕ$ καὶ τοῦ τῆς $ΓΑ$ πρὸς $ΗΕ$ ὁ τοῦ ἀπὸ $ΓΑ$ ἐστὶν πρὸς τὸ ἐπὶ $ΖΕ$ $ΗΕ$, τοιούτος πρὸς τὸ ἀπὸ $ΑΕ$, ὁ δὲ συνημμένος ἐκ τε τοῦ τῆς $ΓΒ$ πρὸς $ΒΕ$ καὶ τοῦ τῆς $ΓΔ$ πρὸς $ΔΕ$ ὁ αὐτός ἐστὶν τῷ τοῦ ἐπὶ $ΒΙ$

2. εἰ ἄρα ἐστὶν ἡ $ΗΖ$ cet. ABS, accentum et interpunctionem corr. Hu (longe aliter Co: εἰ ἄρα ἐστὶν ἡ $ΗΖ$ παράλληλος τῇ $ΒΓ$, γίνεται ὡς ἡ $ΗΓ$ πρὸς τὴν $ΓΑ$ οὕτως ἡ $ΖΕ$ πρὸς τὴν $ΕΑ$. ἔστι δὲ cet.) 5. 6. ἐκ τῶς τετραπλεύρου ABS, ἐν τῶς τοῦ ἐν τῷ κύκλῳ τετραπλεύρου B² add V² 8. παράλληλος om. AB cod. Co. add. Paris. 2368 SV 9. ἐξηγοῦμεν S, ἐξηγέτο μὲν A(B, 11. ζ' add. BS Ἐστῶ ABS, corr. Paris. 2368² V² 12. 13. γίνεται ὡς τὸ ἐπὶ $ΓΒΕ$ πρὸς τὸ ἐπὶ $ΓΔΕ$ conl. Co, itemque cum codice sub sinem demonstrationis, quae falsa esse apparat 13. οὕτως add. Gr 18. συνημμένος A, corr. BS 19. καὶ ἐκ τοῦ τῆς $ΓΑ$ A²S, καὶ ἐκ τοῦ τῆς $ΓΒ$ B cod. Co

idem est ac si quaeras, sitne $\eta\gamma : \gamma\alpha = \zeta\epsilon : \epsilon\alpha$. Si igitur ita esse statuitur, dirimendo fit $\gamma\alpha : \alpha\gamma = \zeta\alpha : \alpha\epsilon$; ergo triangulum $\gamma\alpha\zeta$ simile triangulo $\gamma\alpha\epsilon$, et $\gamma\zeta$ parallela rectae $\epsilon\gamma$, id est rectae $\beta\gamma$. Sic est autem. Quoniam enim anguli $\beta\alpha\gamma + \delta\alpha\epsilon$ duobus rectis aequales sunt, est $\angle \delta\alpha\epsilon = \angle \beta\alpha\gamma$. Sed est $\angle \delta\alpha\epsilon = \angle \zeta\beta\delta$, quia ipse $\delta\alpha\epsilon$ est extra quadrilaterum $\beta\zeta\alpha\delta$ circulo inscriptum¹⁾, et $\angle \beta\alpha\gamma = \angle \beta\zeta\gamma$, quia sunt in eodem segmento²⁾; ergo etiam $\angle \zeta\beta\delta = \angle \beta\zeta\gamma$. Et sunt hi anguli alterni; ergo est $\gamma\zeta \parallel \beta\gamma$. Hoc autem quaerebatur. Si igitur cet.

Aliter idem.

VII. Sint in triangulo $\alpha\beta\gamma$ anguli $\beta\alpha\gamma + \delta\alpha\epsilon$ duobus Prop. rectis aequales; dico esse $\beta\gamma \cdot \gamma\delta : \beta\epsilon \cdot \epsilon\delta = \gamma\alpha^2 : \alpha\epsilon^2$. 27



Ducatur per ϵ $\epsilon\zeta \parallel \alpha\gamma$; ergo $\angle \delta\alpha\epsilon = \angle \alpha\zeta\epsilon$; illaque triangulum $\alpha\gamma\epsilon$ simile triangulo $\zeta\alpha\epsilon$, et $\alpha\epsilon : \epsilon\gamma = \zeta\epsilon : \alpha\epsilon$; ergo $\zeta\epsilon \cdot \epsilon\gamma = \alpha\epsilon^2$. Quoniam igitur propter parallelus $\alpha\gamma \zeta\epsilon$ est

$\alpha\gamma : \zeta\epsilon = \gamma\beta : \beta\epsilon$, et $\gamma\alpha : \gamma\epsilon = \gamma\delta : \delta\epsilon$, per formulam igitur compositae proportionis est $\frac{\alpha\gamma}{\zeta\epsilon} \cdot \frac{\gamma\alpha}{\gamma\epsilon} = \frac{\gamma\beta}{\beta\epsilon} \cdot \frac{\gamma\delta}{\delta\epsilon}$. Sed est

$$\frac{\gamma\alpha}{\zeta\epsilon} \cdot \frac{\alpha\gamma}{\gamma\epsilon} = \gamma\alpha^2 : \zeta\epsilon \cdot \epsilon\gamma, \text{ id est } = \gamma\alpha^2 : \alpha\epsilon^2, \text{ et}$$

1) Nimirum angulus $\zeta\alpha\delta$ et cum angulo $\delta\alpha\epsilon$ propter rectam $\zeta\epsilon$ et cum $\zeta\beta\delta$ propter elem. 3, 22 duos rectos efficit Co. Similiter V2, qui tamen in demonstrando miris ambagibus ulitur, quas hic repetere non attinet.

2) Haec addit V2; elem. 3, 24 citat Co.


3) Quoniam angulus $\beta\alpha\gamma$ et cum angulo $\delta\alpha\epsilon$ (ex hypothesi et cum $\alpha\zeta\epsilon$ propter parallelas $\alpha\gamma \zeta\epsilon$) duos rectos efficit Co.

4) Addita haec secundum Co; similitudinem triangulorum demonstrat etiam V2: "quia angulus $\zeta\alpha\epsilon$ est communis duorum triangulorum $\zeta\alpha\epsilon$ $\eta\alpha\epsilon$ et anguli $\eta\alpha\epsilon$ $\alpha\zeta\eta$ aequales, triangula sunt similia".

25 — 712, 2. τοὺς ὑπὸ ΒΓ·ΒΓ πρὸς τοὺς ὑπὸ ΓΔ·ΓΔ ἵσται ἀπὸ ὧς τὸ ὑπὸ τῶν ΓΒΕ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒΔ. B Γ·Γ·Ε ΑΒΣ, corr. Sic V2 nisi quod V2 in priore parte brevis: τοὺς ὑπὸ βγ·δ πρὸς τοὺς ὑπὸ βε·δ

$\Gamma\Delta$ πρὸς τὸ ἐπὶ $ΒΕ$ $\Delta Ε$. ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ἐπὶ τῶν $ΒΓ\Delta$ πρὸς τὸ ἐπὶ $ΒΕ\Delta$, οὕτως τὸ ἀπὸ $\Gamma\Delta$ πρὸς τὸ ἀπὸ $\Delta Ε$.

75 γ'. Ἐστω πάλιν ἑκατέρα τῶν ἐπὶ τῶν $ΒΑΕ$ $\Gamma\Delta\Delta$ γωνία ὀρθή· ὅτι γίνεται ὡς τὸ ἐπὶ τῶν $ΒΓΕ$ πρὸς τὸ ἐπὶ τῶν $ΒΔΕ$, οὕτως τὸ ἀπὸ $\Gamma\Delta$ πρὸς τὸ ἀπὸ $\Delta\Delta$.



Ἦχθω διὰ τοῦ Δ τῇ $ΑΓ$ παράλληλος ἢ $ΖΗ$, καὶ καὶ ὁ συμπλήρωσις τῇ $ΑΕ$, ἔστω τὸ $Η$ σημεῖον· ὀρθή, ἄρα ἔστιν ἢ ἐπὶ $ΑΔΖ$. ὀρθή δὲ καὶ ἢ ἐπὶ $ΖΑΗ$. τὸ ἄρα ἐπὶ $ΖΑΗ$ ἴσον ἔστιν τῷ ἀπὸ $\Delta\Delta$ τετραγώνῳ· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ $\Delta\Delta$

$\Gamma\Delta$ πρὸς τὸ ἀπὸ $\Delta\Delta$, οὕτως τὸ ἀπὸ $\Gamma\Delta$ πρὸς τὸ ἐπὶ $ΖΑΗ$. ἀλλὰ ὁ τοῦ ἀπὸ $ΑΓ$ πρὸς τὸ ἐπὶ $ΖΑΗ$ συνήλπει λόγος ἔκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἢ $\Gamma\Delta$ πρὸς $\Delta Η$, τοιτέστιν ἢ $\GammaΕ$ πρὸς $Ε\Delta$, καὶ τοῦ ὄν ἔχει ἢ $\Gamma\Delta$ πρὸς $Ζ\Delta$, τοιτέστιν ἢ $\GammaΒ$ πρὸς $Β\Delta$, ὁ δὲ συνημμέρος λόγος ἔκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἢ $\GammaΕ$ πρὸς $Ε\Delta$ καὶ ἔκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἢ $\GammaΒ$ πρὸς $Β\Delta$ ὁ αὐτός· ἔστιν τῷ ἐπὶ $ΒΓΕ$ πρὸς τὸ ἐπὶ $ΒΔΕ$. ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ἐπὶ $ΒΓΕ$ πρὸς τὸ ἐπὶ $ΒΔΕ$, οὕτως τὸ ἀπὸ $\Gamma\Delta$ τετραγώνου πρὸς τὸ ἀπὸ $\Delta\Delta$ τετραγώνου.

76 δ'. Τοῦτον ὄντος ἄλλως τὸ προγεγραμμένον λήμμα· ὅτι γίνεται ὡς ἢ $Β\Delta$ πρὸς τὴν $\Delta Ε$, οὕτως τὸ ἐπὶ τῶν $ΑΒΓ$ πρὸς τὸ ἐπὶ τῶν $ΑΕΓ$.

Ληθθω ἀπὸ τοῦ Δ τεχούσα τις εὐθεῖα ἢ $\Delta Ζ$, καὶ τῷ ἐπὶ τῶν $\Delta\Delta Γ$ ἴσον ἐποκείσθω τὸ ἀπὸ τῆς $\Delta Ζ$, καὶ ἐπεξέχθωσαν αἱ $\Delta Ζ$ $\Gamma Ζ$ $Ε Ζ$ $Β Ζ$. ἐπεὶ οὖν τὸ ἐπὶ τῶν $\Delta\Delta Γ$ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς $\Delta Ζ$, γωνία ἄρα ἢ ἐπὶ τῶν

$$\frac{\gamma\beta}{\beta\alpha} \cdot \frac{\gamma\delta}{\delta\epsilon} = \beta\gamma \cdot \gamma\delta : \beta\epsilon \cdot \epsilon\delta; \text{ ergo}$$

$$\beta\gamma \cdot \gamma\delta : \beta\epsilon \cdot \epsilon\delta = \gamma\alpha^2 : \alpha\epsilon^2.$$


VIII. Sint rursus anguli $\beta\alpha\epsilon$ et $\gamma\alpha\delta$ recti; dico esse ^{Prop. 28}
 $\beta\gamma \cdot \gamma\epsilon : \beta\delta \cdot \delta\epsilon = \gamma\alpha^2 : \alpha\delta^2.$

Ducatur per δ $\zeta\eta \parallel \alpha\gamma$, sitque η punctum concursus cum producta $\alpha\epsilon$; ergo rectus est angulus $\alpha\delta\zeta$. Sed etiam angulus $\zeta\alpha\eta$ (id est $\beta\alpha\epsilon$ rectus est; ergo $\zeta\delta \cdot \delta\eta = \alpha\delta^2$); est igitur per proportionem $\gamma\alpha^2 : \zeta\delta \cdot \delta\eta = \gamma\alpha^2 : \alpha\delta^2$. Sed est

$$\begin{aligned} \gamma\alpha^2 : \zeta\delta \cdot \delta\eta &= \frac{\gamma\alpha}{\delta\eta} \cdot \frac{\gamma\alpha}{\zeta\delta} \\ &= \frac{\gamma\epsilon}{\epsilon\delta} \cdot \frac{\gamma\beta}{\beta\delta} \\ &= \beta\gamma \cdot \gamma\epsilon : \beta\delta \cdot \delta\epsilon; \text{ ergo est} \end{aligned}$$

$$\beta\gamma \cdot \gamma\epsilon : \beta\delta \cdot \delta\epsilon = \gamma\alpha^2 : \alpha\delta^2.$$

IX. Hoc cum ita sit, *primum* lemma, quod supra scrip- ^{Prop. 29}
tum est, esse $\beta\delta : \delta\epsilon = \alpha\beta \cdot \beta\gamma : \alpha\epsilon \cdot \epsilon\gamma$, aliter demonstrari
potest.



Ducatur a puncto ζ quaevis recta $\zeta\delta$, sitque $\alpha\delta \cdot \delta\gamma = \delta\zeta^2$, atque, ut in primo lemmate, $\beta\delta \cdot \delta\epsilon = \alpha\delta \cdot \delta\gamma$, et iungantur $\alpha\zeta$ $\gamma\zeta$ $\epsilon\zeta$ $\beta\zeta$. Quoniam

igitur est $\alpha\delta \cdot \delta\gamma = \delta\zeta^2$, per proportionem est $\alpha\delta : \delta\zeta = \delta\zeta : \delta\gamma$:

*) Quia perpendicularis est $\alpha\delta$ in triangulo orthogonio $\zeta\alpha\eta$. (Elem. 6, 8 et 47 citat Co.)

**) Est enim $\gamma\alpha : \delta\eta = \gamma\epsilon : \epsilon\delta$ propter similitudinem triangulorum $\alpha\gamma\epsilon$ et $\delta\eta\alpha$; tum $\gamma\alpha : \zeta\delta = \gamma\beta : \beta\delta$, quia "propter parallelas $\zeta\delta$ $\alpha\gamma$ tri- angula $\alpha\gamma\delta$ $\zeta\beta\delta$ sunt similia", ut adnotat V2.

2. οὐτως τὸ ἀπὸ $\overline{F\Gamma}$ A, corr. BS 4. η' add. V ἐπὶ τῶν $\overline{B\Gamma\Gamma}$ AB, corr. S 5. 6. πρὸς τὸ ἐπὶ τῶν $\overline{AB\Gamma}$ ABS, corr. Sea V2 Co 21. οὕτω add. Ge 22. ἀλλὰ ὁ — ἐπὶ τοῦ $\overline{Z\Gamma\Gamma}$ his scripta sunt in A, sed altera expuncta 30. β' add. V 35. αὖ $\overline{\alpha\zeta}$ V2 pro αὖ $\overline{\Gamma\Gamma}$ corr. etiam Co in Lat. vers.,

ΓΖ. Ἰση ἐστὶν τῇ $\angle A$ γωνίᾳ. πάλιν ἐπεὶ τὸ ἐπὶ τῶν $B\Delta E$ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς $\angle Z$, γωνίᾳ ἅρα ἡ ἐπὶ τῶν $\angle ZE$ γωνίᾳ τῇ B ἴση ἐστὶν. ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπὶ ΓΖ. $\angle$ γωνία ἴση ἐστὶν τῇ $\angle A$. ὅλη ἅρα ἡ ἐπὶ τῶν $\angle ZE$ ἴση ἐστὶν ταῖς $\angle A$ B γωνίαις. ἀλλὰ αἱ $\angle A$ B μετὰ τῆς ἐπὶ $\angle AZB$ γωνίας διοσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶν· καὶ αἱ ἐπὶ $\angle AZB$ $\angle ZE$ ἅρα γωνίαι διοσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶν. γίνεται διὸ διὰ τὸ προγεγραμμένον λήμμα ὥς τὸ ἀπὸ BZ πρὸς τὸ ἀπὸ ZE , οὕτως τὸ ἐπὶ $\angle AB\Gamma$ πρὸς τὸ ἐπὶ $\angle A\Gamma E$. ἀλλ' ὥς τὸ ἀπὸ BZ πρὸς τὸ ἀπὸ ZE , οὕτως ἐστὶν ἡ $B\Delta$ πρὸς ΔE ἴσον γάρ¹⁰ ἐστὶν τὸ ἐπὶ $B\Delta E$ τῷ ἀπὸ $\angle Z$ · καὶ ὥς ἅρα ἡ $B\Delta$ πρὸς ΔE , οὕτως ἐστὶν τὸ ἐπὶ τῶν $\angle AB\Gamma$ πρὸς τὸ ἐπὶ τῶν $\angle A\Gamma E$.

Λήμμα χρήσιμον εἰς τὸ β' ἐπίταγμα τοῦ αὐτοῦ προβλήματος.

- 77 ε'. Πάλιν ὁντος ἴσου τοῦ ἐπὶ τῶν $\angle A\Delta E$ τῷ ἐπὶ $B\Delta\Gamma$, δεῖξαι ὅτι γίνεται ὥς ἡ $B\Delta$ πρὸς τὴν $\Delta\Gamma$, οὕτως τὸ ἐπὶ τῶν $\angle ABE$ πρὸς τὸ ἐπὶ τῶν $\angle E\Gamma A$.

Ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὥς ἡ $B\Delta$ πρὸς τὴν ΔE , οὕτως ἡ ΔA πρὸς $\Delta\Gamma$, καὶ ὅλη ἅρα ἡ BA πρὸς ὅλην τὴν GE ἐστὶν ὥς ἡ BA πρὸς τὴν ΔE . πάλιν ἐπεὶ ἐστὶν ὥς ἡ BA πρὸς τὴν ΔA , οὕτως ἡ $E\Delta$ πρὸς τὴν $\Delta\Gamma$, λοιπὴ ἅρα ἡ BE πρὸς²⁰ λοιπὴν τὴν $\Delta\Gamma$ ἐστὶν ὥς ἡ $E\Delta$ πρὸς τὴν $\Delta\Gamma$. ἔν δὲ καὶ ὥς ἡ $B\Delta$ πρὸς τὴν ΔE , οὕτως ἡ AB πρὸς τὴν GE · καὶ ὁ συγχείμενος ἅρα λόγος ἔκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ $B\Delta$ πρὸς τὴν ΔE καὶ ἔξ οὗ ὄν ἔχει ἡ $E\Delta$ πρὸς τὴν $\Delta\Gamma$, ὅς ἐστιν ὁ τῆς BA πρὸς τὴν $\Delta\Gamma$, ὁ αὐτός ἐστιν τῷ συνημμένῳ ἔκ τε τοῦ²⁵ τῆς AB πρὸς τὴν GE καὶ τοῦ τῆς EB πρὸς τὴν $\Delta\Gamma$, ὅς ἐστιν ὁ αὐτός τῷ τοῦ ἐπὶ τῶν $\angle ABE$ πρὸς τὸ ἐπὶ τῶν $\angle E\Gamma A$ · ἐστὶν ἅρα ὥς ἡ $B\Delta$ πρὸς τὴν $\Delta\Gamma$, οὕτως τὸ ἐπὶ τῶν $\angle ABE$ πρὸς τὸ ἐπὶ τῶν $\angle E\Gamma A$, ὅπερ· ~

4. 5. ταῖς $\overline{AB}$ — αὐτὰ $\overline{AB}$ A, distinx. BS 7. αὐτὰ A BS 8. οὕτως ἴσους BS: τὸ ἐπὶ $\angle AB\Gamma$ — 10. πρὸς τὸ ἀπὸ ZE bis scripta in ABS, corr. V² Co 10. γάρ V² et Simsonus p. 9 pro ἅρα cuius emendationis ignarus Co verba ἴσον — ἀπὸ $\angle Z$ deletit) 11. ε' add. V 28. ἅρα add. Co πρὸς τὴν $\overline{AE}$ AB, corr. S Co 29. $E\Gamma A$, ὅπερ: ~ $E\Gamma A$: ~ A, ἔγα. ὅπερ ἔδει: ~ BS

ergo communi angulo $\alpha\delta\zeta$ triangula $\alpha\delta\zeta$ et $\zeta\delta\gamma$ sunt similia¹,
 est igitur $\angle \gamma\zeta\delta = \angle \zeta\alpha\delta$. Rursus quoniam est $\beta\delta \cdot \delta\epsilon = \delta\zeta^2$,
 itaque triangula $\beta\delta\zeta$ et $\zeta\delta\epsilon$ similia sunt, est igitur $\angle \epsilon\zeta\delta =$
 $\angle \zeta\beta\delta$. Sed demonstravimus etiam $\angle \gamma\zeta\delta = \angle \zeta\alpha\delta$; ergo
 sunt $\angle \gamma\zeta\delta + \epsilon\zeta\delta$, id est $\angle \gamma\zeta\epsilon = \angle \zeta\alpha\delta + \zeta\beta\delta$. Sed an-
 guli $\zeta\alpha\delta + \zeta\beta\delta + \alpha\zeta\beta$ duobus rectis aequales sunt; ergo
 item anguli $\alpha\zeta\beta + \gamma\zeta\epsilon$ duobus rectis aequales. Iam propter
 superius lemma sextum fit $\beta\zeta^2 : \zeta\epsilon^2 = \alpha\beta \cdot \beta\gamma : \alpha\epsilon \cdot \epsilon\gamma$. Sed
 quoniam ex hypothesi est $\beta\delta \cdot \delta\epsilon = \delta\zeta^2$ et proportionem factu
 $\beta\delta : \delta\zeta = \delta\zeta : \delta\epsilon$, fit igitur (propter elem. 6. 20 coroll. 2)
 $\beta\delta : \delta\epsilon = \beta\delta^2 : \delta\zeta^2$. Sed quoniam propter similitudinem tri-
 angulorum $\beta\delta\zeta$ et $\zeta\delta\epsilon$ est $\beta\delta : \delta\zeta = \beta\zeta : \zeta\epsilon$ itemque quadrata
 $\beta\delta^2 : \delta\zeta^2 = \beta\zeta^2 : \zeta\epsilon^2$, est igitur² $\beta\zeta^2 : \zeta\epsilon^2 = \beta\delta : \delta\epsilon$. Sed
 erat etiam $\beta\zeta^2 : \zeta\epsilon^2 = \alpha\beta \cdot \beta\gamma : \alpha\epsilon \cdot \epsilon\gamma$; ergo est
 $\beta\delta : \delta\epsilon = \alpha\beta \cdot \beta\gamma : \alpha\epsilon \cdot \epsilon\gamma$.

Lemma utile ad secundum epitagma eiusdem problematis.

X. Rursus, si sit $\alpha\delta \cdot \delta\epsilon = \beta\delta \cdot \delta\gamma$, demonstretur fieri ^{Prop. 30}
 $\beta\delta : \delta\gamma = \alpha\beta \cdot \beta\epsilon : \epsilon\gamma \cdot \gamma\alpha$.

Quoniam enim est

$\alpha \quad \gamma \quad \delta \quad \epsilon \quad \beta$ ex hypothesi $\beta\delta : \delta\epsilon =$
 $\alpha\delta : \delta\gamma$, ergo etiam tota

ad totam $\alpha\beta : \gamma\epsilon = \beta\delta : \delta\epsilon$. Rursus quoniam vicissim est
 $\beta\delta : \alpha\delta = \delta\epsilon : \delta\gamma$, subtrahendo igitur est $\beta\epsilon : \alpha\gamma = \epsilon\delta : \delta\gamma$.
 Sed erat $\beta\delta : \delta\epsilon = \alpha\beta : \gamma\epsilon$; ergo per formulam compositae
 proportionis est

$$\frac{\beta\delta}{\delta\epsilon} \cdot \frac{\epsilon\delta}{\delta\gamma} = \frac{\alpha\beta}{\gamma\epsilon} \cdot \frac{\beta\epsilon}{\alpha\gamma}, \text{ sive}$$

$$\beta\delta : \delta\gamma = \alpha\beta \cdot \beta\epsilon : \epsilon\gamma \cdot \gamma\alpha, \text{ q. e. d.}$$

1. Similiter demonstrationem complet Co: elem. sexti propos. 16
 et 6 citat Simsonus p. 8; brevius eadem significat V².

2. Addita est huius demonstrationis prior pars secundum V² cum
 quo consentit Simsonus p. 8; altera secundum Co. Adnotat omnino
 V² haec: "quia ex hypothesi id quod fit ex $\beta\delta\epsilon$ est aequale $\tau\alpha\delta \alpha\tau\delta$
 $\delta\zeta$, est ut $\beta\delta$ ad $\delta\epsilon$, ita quadratum $\tau\eta\zeta \beta\delta$ ad quadratum $\tau\eta\zeta \delta\epsilon$, sed
 $\tau\alpha\delta \alpha\tau\delta \beta\delta$ ad quadratum $\tau\eta\zeta \delta\zeta$ est sicut $\tau\alpha\delta \alpha\tau\delta \beta\zeta$ ad $\tau\alpha\delta \alpha\tau\delta \zeta\epsilon$,
 quia, ut $\delta\beta$ ad $\beta\zeta$, ita $\delta\zeta$ ad $\zeta\epsilon$, et $\tau\alpha\delta \alpha\tau\delta$; ergo cet."

Ἄλλως τὸ αὐτό.

- 78 ια'. Ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ AA πρὸς τὴν AB , οὕτως ἡ $ΓA$ πρὸς τὴν AE , λοιπὴ ἄρα ἡ AG πρὸς λοιπὴν τὴν EB ἐστὶν ὡς ἡ AA πρὸς τὴν AB . καὶ συνθέντι ἐστὶν ὡς συναμφοτέρως ἡ AG EB πρὸς τὴν EB , οὕτως ἡ AB πρὸς τὴν BA . τὸ ἄρα ὑπὸ συναμφοτέρων τῆς AG EB καὶ τῆς BA ἴσον ἐστὶν τῷ ἐπὶ τῶν ABE . πάλιν ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ BA πρὸς τὴν AA , οὕτως ἡ EA πρὸς τὴν AG , λοιπὴ ἄρα ἡ BE πρὸς λοιπὴν τὴν $ΓA$ ἐστὶν [ὡς εἰς τῶν λόγων] ὡς ἡ $EΓ$ πρὸς τὴν AG . καὶ συνθέντι ἐστὶν ὡς συναμφοτέρως ἡ EB AG πρὸς τὴν AG , οὕτως ἡ $EΓ$ πρὸς τὴν $ΓA$. τὸ ἄρα ἐπὶ συναμφοτέρων τῆς EB AG καὶ τῆς $ΓA$ ἴσον ἐστὶν τῷ ἐπὶ τῶν $EΓA$. ἐδείχθη δὲ καὶ τὸ ἐπὶ συναμφοτέρων τῆς AG EB καὶ τῆς BA ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν ABE . καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ συναμφοτέρων τῆς AG EB καὶ τῆς BA πρὸς τὸ ἐπὶ συναμφοτέρων τῆς AG EB καὶ τῆς $ΓA$, τοιούτως ὡς ἡ BA πρὸς τὴν AG , οὕτως τὸ ἐπὶ τῶν ABE πρὸς τὸ ἐπὶ τῶν $EΓA$, ὥπερ· ~

Ἄλλως τὸ αὐτὸ θεωρηθέντος τοῦδε.

- 79 ιβ'. Οὕτως ἴσως τῆς AB τῇ $ΓA$, ἐὰν ληθῇ τι σημείον ²⁰ τὸ E , δεῖξαι ὅτι ἴσον ἐστὶν τὸ ἐπὶ τῶν $AEΔ$ τῷ ἐπὶ τῶν $AGΔ$ καὶ τῷ ὑπὸ $BEΓ$.

Τετμήσθω ἡ BG δίχα κατὰ τὸ Z σημείον· τὸ μὲν ἄρα ἐπὶ $AEΔ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ EZ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ AZ , τὸ δ' ἐπὶ $AGΔ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $ΓZ$ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ AZ . ²⁵ ὥστε καὶ τὸ ἐπὶ $AEΔ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ EZ τετραγώνου ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν $AGΔ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $ΓZ$, τοιούτως τοῦ ὑπὸ $BEΓ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ EZ . κοινὸν ἀφελήσθω τὸ ἀπὸ EZ τετραγώνου· λοιπὸν ἄρα τὸ ἐπὶ $AEΔ$ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ $AGΔ$ καὶ τῷ ὑπὸ $BEΓ$. 30

- 80 ιγ'. Τοῦτου προτεθεωρημένου ἔστω τὸ ἐπὶ τῶν $ABΓ$ ἴσον τῷ ἐπὶ τῶν ABE . ὅτι ἐστὶν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν BE , οὕτως τὸ ἐπὶ τῶν $ABΓ$ πρὸς τὸ ἐπὶ τῶν ABE .

Κείσθω τῇ $ΓA$ ἴση ἡ AZ . διὰ δὲ τὸ προγεγραμμέ-

Aliter idem.

XI. Quoniam est $\alpha\delta : \delta\beta = \gamma\delta : \delta\epsilon$, subtrahendo igitur est $\alpha\gamma : \epsilon\beta = \alpha\delta : \delta\beta$. Et componendo est $\alpha\gamma + \epsilon\beta : \epsilon\beta$

$$= \alpha\beta : \beta\delta; \text{ ergo}$$

$$\alpha\gamma + \epsilon\beta : \beta\delta = \alpha\beta : \beta\epsilon.$$

Rursus quoniam *inversa*

ratione est $\beta\delta : \delta\alpha = \epsilon\delta : \delta\gamma$, subtrahendo igitur est $\beta\epsilon : \gamma\alpha = \epsilon\delta : \delta\gamma$. Et componendo est $\beta\epsilon + \gamma\alpha : \gamma\alpha = \epsilon\gamma : \gamma\delta$; ergo

$$\beta\epsilon + \gamma\alpha : \gamma\delta = \epsilon\gamma : \gamma\alpha. \text{ Sed demonstratum est etiam}$$

$$(\alpha\gamma + \epsilon\beta) : \beta\delta = \alpha\beta : \beta\epsilon; \text{ ergo } \textit{proportione facta}$$


$$\alpha\gamma + \epsilon\beta : \beta\delta : (\alpha\gamma + \epsilon\beta) : \gamma\delta = \alpha\beta : \beta\epsilon : \epsilon\gamma : \gamma\alpha, \text{ id est}$$

$$\beta\delta : \delta\gamma = \alpha\beta : \beta\epsilon : \epsilon\gamma : \gamma\alpha, \text{ q. e. d.}$$

Aliter idem, his demonstrandi causa praemissis.

XII. Si sit $\alpha\beta = \gamma\delta$, et sumatur punctum aliquod ϵ , de- Prop. 31
monstretur esse $\alpha\epsilon \cdot \epsilon\delta = \alpha\gamma \cdot \gamma\delta + \beta\epsilon \cdot \epsilon\gamma$.

Bifariam sece-

 tur $\beta\gamma$ in puncto ζ ;
ergo est (elem. 2, 5)

$$\alpha\epsilon \cdot \epsilon\delta + \epsilon\zeta^2 = \delta\zeta^2, \text{ et } \alpha\gamma \cdot \gamma\delta + \gamma\zeta^2 = \delta\zeta^2, \text{ ita ut sit etiam}$$

$$\alpha\epsilon \cdot \epsilon\delta + \epsilon\zeta^2 = \alpha\gamma \cdot \gamma\delta + \gamma\zeta^2, \text{ id est (quoniam } \beta\zeta = \zeta\gamma)$$


$$= \alpha\gamma \cdot \gamma\delta + \beta\epsilon \cdot \epsilon\gamma + \epsilon\zeta^2. \text{ Subtrahatur}$$

commune $\epsilon\zeta^2$; restat igitur

$$\alpha\epsilon \cdot \epsilon\delta = \alpha\gamma \cdot \gamma\delta + \beta\epsilon \cdot \epsilon\gamma.$$

XIII. Hoc demonstrato sit $\alpha\beta \cdot \beta\gamma = \delta\beta \cdot \beta\epsilon$; dico esse Prop. 33
 $\delta\beta : \beta\epsilon = \alpha\delta \cdot \delta\gamma : \alpha\epsilon \cdot \epsilon\gamma$.

Ponatur $\zeta\alpha =$


 $\gamma\delta$; per superius
igitur lemma fit

2. $\alpha\epsilon'$ add. BS 3. $\pi\rho\omicron\varsigma \lambda\omicron\iota\pi\eta\rho \tau\eta\varsigma$ A, corr. BS 5. η AFEB
et 6. $\tau\eta\varsigma$ AFEB A, distinx. BS 9. $\acute{\omega}\varsigma \epsilon\iota\varsigma \tau\hat{\omega}\nu \lambda\omicron\gamma\omega\nu$ A, $\acute{\omega}\varsigma \epsilon\iota\varsigma \tau. \lambda.$
BS, del. Co 14. 15. $\iota\sigma\omicron\upsilon\rho \tau\hat{\omega} - \kappa\alpha\iota \tau\eta\varsigma$ BJ add. Co eadem add.
V², nisi quod $\kappa\alpha\iota$ ante $\acute{\omega}\varsigma$ $\acute{\alpha}\rho\alpha$ omittit 19. $\epsilon\beta'$ ante $\pi\rho\omicron\delta\tau\omega\rho\eta\theta\epsilon\iota\tau\omicron\varsigma$
add. BS τοῦδε BS, τοῦ JE A 20. $\acute{\epsilon}\alpha\nu$ A²BS, $\acute{\epsilon}\nu$ A¹ 21. $\acute{\epsilon}\lambda\alpha\iota$
A²BS το (post $\iota\sigma\tau\iota\nu$ BS, $\tau\hat{\omega}\nu$ A 26. $\acute{\epsilon}\zeta$ TE $\tau\rho\alpha\gamma\acute{\omega}\nu\tau\omicron\nu$ A, corr.
BS 31. $\epsilon\gamma'$ add. BS 32. $\iota\sigma\omicron\upsilon\rho \tau\hat{\omega}\nu \acute{\epsilon}\nu\tau\hat{o} \tau\hat{\omega}\nu$ JB AB, corr. S
33. $\tau\hat{\omega}\nu$ AAF $\pi\rho\omicron\varsigma \tau\hat{o} \acute{\epsilon}\nu\tau\hat{o} \tau\hat{\omega}\nu$ add. V² Co

νον γίνεται τὸ ἐπὶ τῶν $ZB\Delta$ ἴσον τῷ τε ἐπὶ $Z\Gamma\Delta$ καὶ τῷ ἐπὶ $AB\Gamma$. ἔπει δὲ τὸ ἐπὶ τῶν $AB\Gamma$ ἴσον ἐστὶν τῷ ἐπὶ τῶν ΔBE , ὁπότῃ αὐτὸ ἀπο τοῦ ἐπὶ τῶν $ZB\Delta$ λοιπὸν ἄρα τὸ ἐπὶ τῶν $Z\Gamma\Delta$, ὅ ἐστιν τὸ ἐπὶ $\Delta\Gamma\Delta$, ἴσον ἐστὶν τῷ ἐπὶ τῶν $\Delta B ZE$. πάλιν ἔπει τὸ ἐπὶ τῶν $AB\Gamma$ ἴσον ἐστὶν τῷ ἐπὶ τῶν ΔBE , ἀνάλογον καὶ διελόντι ὡς ἡ AE πρὸς τὴν EB , οὕτως ἡ $\Gamma\Delta$ πρὸς GB ἐστὶν, τοιούστιν ἡ $Z\Delta$ πρὸς τὴν $B\Gamma$ · καὶ ὅλη, ἄρα ἡ ZE πρὸς ὅλην τὴν $E\Gamma$ ἐστὶν ὡς ἡ AE πρὸς τὴν EB . τὸ ἄρα ἐπὶ τῶν ZEB ἴσον ἐστὶν τῷ ἐπὶ τῶν $\Gamma E\Delta$. ἐδείχθη δὲ καὶ τὸ ἐπὶ τῶν $ZE B\Delta$ ἴσον τῷ ἐπὶ τῶν $\Delta\Gamma\Gamma$. ἐναλλάξ ἄρα ἐστὶν ὡς τὸ ἐπὶ τῶν $ZE B\Delta$ πρὸς τὸ ἐπὶ τῶν ZEB , τοιούστιν ὡς ἡ ΔB πρὸς BE , οὕτως τὸ ἐπὶ τῶν $\Delta\Gamma\Gamma$ πρὸς τὸ ἐπὶ τῶν $\Delta E\Gamma$.

- 81 εἴ. Προθεωρηθέντος καὶ τοῦδε ἄλλως τὸ αὐτὸ δειχθή-
σεται. Ἐστω τρίγωνον τὸ $AB\Gamma$ καὶ διήχθωσαν ἐντὸς αἱ
 $\Delta\Delta AE$ ποιοῦσαι ἑκατέραν τῶν ἐπὶ $BAE \Gamma\Delta\Delta$ γωνίαν
ὁρθήν· ὅτι γίνεται ὡς τὸ ἐπὶ τῶν $B\Gamma E$ πρὸς τὸ ἐπὶ τῶν
 BAE , οὕτως τὸ ἀπὸ $\Gamma\Delta$ τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ $\Delta\Delta$
τετράγωνον.

20



Περιγεράσθω περὶ τὸ ABE τρίγωνον κύκλος ὁ $ABZH$, καὶ ἐπετεύχθω ἡ ZH . ἔπει οὖν ὁρθή ἐστὶν ἑκατέρα τῶν ἐπὶ $BAE \Gamma\Delta\Delta$ γωνία, διάμετρος ἐστὶν ἑκατέρα τῶν $BE ZH$ τοῦ κύκλου, ὥστε κέντρον ἐστὶν τὸ Θ . ἔπει οὖν ἴση

$\zeta\beta \cdot \beta\delta = \zeta\gamma \cdot \gamma\delta + \alpha\beta \cdot \beta\gamma$. Sed quoniam est $\alpha\beta \cdot \beta\gamma = \delta\beta \cdot \beta\epsilon$, utrumque subtrahatur ex $\zeta\beta \cdot \beta\delta$ id est aequatio $\epsilon\beta \cdot \beta\delta = \alpha\beta \cdot \beta\gamma$ ex altera $\zeta\beta \cdot \beta\delta = \zeta\gamma \cdot \gamma\delta + \alpha\beta \cdot \beta\gamma$; restat igitur

$$\zeta\epsilon \cdot \beta\delta = \zeta\gamma \cdot \gamma\delta, \text{ id est} \\ = \alpha\delta \cdot \delta\gamma.$$

Rursus quoniam est $\alpha\beta \cdot \beta\gamma = \delta\beta \cdot \beta\epsilon$, per proportionem est

$$\alpha\beta : \epsilon\beta = \delta\beta : \beta\gamma, \text{ et dirimendo}$$

$$\alpha\epsilon : \epsilon\beta = \delta\gamma : \beta\gamma, \text{ id est}$$

$$= \zeta\alpha : \beta\gamma; \text{ ergo etiam tota ad totam (elem. 5, 12)}$$

$$\zeta\epsilon : \epsilon\gamma = \alpha\epsilon : \epsilon\beta; \text{ itaque}$$

$$\zeta\epsilon \cdot \epsilon\beta = \gamma\epsilon \cdot \epsilon\alpha. \text{ Sed demonstratum est}$$

$$\zeta\epsilon \cdot \beta\delta = \alpha\delta \cdot \delta\gamma; \text{ ergo proportionem factam} \\ \text{vicissim est}$$

$$\zeta\epsilon \cdot \beta\delta : \zeta\epsilon \cdot \epsilon\beta = \alpha\delta \cdot \delta\gamma : \alpha\epsilon \cdot \epsilon\gamma, \text{ id est}$$

$$\delta\beta : \beta\epsilon = \alpha\delta \cdot \delta\gamma : \alpha\epsilon \cdot \epsilon\gamma.$$

XIV. Hoc quoque perspecto superius lemma octavarum aliter demonstrabitur. Sit triangulum $\alpha\beta\gamma$, et intra ducantur rectae $\alpha\delta$ $\alpha\epsilon$, quae singulos angulos $\beta\alpha\epsilon$ $\gamma\alpha\delta$ rectos efficiant; dico fieri $\beta\gamma \cdot \gamma\epsilon : \beta\delta \cdot \delta\epsilon = \gamma\alpha^2 : \alpha\delta^2$. Prop. 33

Describatur circa $\alpha\beta\epsilon$ triangulum circulus $\alpha\beta\zeta\gamma$, et iungatur $\zeta\gamma$. Quoniam igitur singuli anguli $\beta\alpha\epsilon$ $\gamma\alpha\delta$ recti sunt, diametri circuli sunt $\beta\epsilon$ $\zeta\gamma$, ita ut centrum sit ϑ . Iam quia est $\zeta\vartheta = \vartheta\gamma$, fit igitur. ducta $\gamma\kappa \parallel \alpha\zeta$. $\angle \delta\zeta\vartheta = \angle \kappa\gamma\vartheta$, ideoque $\delta\zeta = \kappa\gamma$. ac porro $\alpha\gamma : \gamma\eta = \alpha\delta : \gamma\kappa$, et, quoniam $\gamma\kappa = \delta\zeta^*$, est igitur

* Latius haec, quae omisit Graecus scriptor, demonstrat Co.

2. 3. $\epsilon\sigma\tau\iota\tau\epsilon \tau\omega\iota \tau\omicron \epsilon\pi\omicron \Lambda$, $\tau\omicron$ del. BS 3. $\delta\pi\omicron\tau\epsilon\tau\epsilon \text{ B, } \delta\pi\omicron\tau\epsilon\tau\epsilon\alpha$
 A²S, $\epsilon\lambda\pi\iota\tau\epsilon\tau\omicron\varsigma \text{ Hu}$ $\tau\omicron\delta \epsilon\pi\omicron \tau\omega\iota\omega \text{ ZHJ}$ intellexit scriptor et ipsum
 rectangulum ZHJ et huic aequalem summam rectangulorum $Z\Gamma J$ et
 $AB\Gamma$ 10. 11. $\tau\omicron \epsilon\pi\omicron \tau\omega\iota\omega \text{ ZEBJ}$ Λ , corr. BS 12. $\overline{ZEBJ}$ $\pi\omicron\delta\varsigma$
 Λ , distinx. BS 13. $\sigma\epsilon\tau\omega\varsigma \tau\omicron \epsilon\pi\omicron \tau\omega\iota\omega \text{ AAI}$ Λ , corr. BS 15. id
 add. BS $\text{H}\rho\omicron\delta\epsilon\tau\omega\iota\theta\epsilon\tau\omicron\varsigma \text{ A}^2$ ex $\text{H}\rho\omicron\delta\epsilon\tau\omega\iota\theta\epsilon\tau\omicron\varsigma$ $\alpha\epsilon\tau\omicron$; $\pi\omicron\gamma\omicron\gamma\epsilon$
 $\gamma\epsilon\mu\epsilon\tau\omicron\varsigma$ coni. Hu 16. $\epsilon\sigma\tau\iota\tau\epsilon$, $\epsilon\sigma\tau\iota\tau\epsilon \text{ A}$, corr. BS 21. $\text{H}\epsilon\gamma$
 $\gamma\epsilon\gamma\alpha\gamma\theta\omega \text{ A}$, corr. BS 23. $\epsilon\kappa\alpha\tau\epsilon\tau\epsilon \text{ A}^3$ in rasura

ἐστὶν ἡ $ZΘ$ τῇ $ΘΗ$, ἔστιν ἄρα ὡς ἡ $ΑΓ$ πρὸς τὴν $ΓΗ$, οὕτως ἡ $ΑΑ$ πρὸς τὴν $ΑΖ$, καὶ ἀνάπαλιν. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ $ΓΗ$ πρὸς τὴν $ΓΑ$, οὕτως ἐστὶν τὸ ἐπὶ τῶν $ΑΓΗ$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $ΓΑ$, τουτέστιν τὸ ὑπὸ $ΒΓΕ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΓΑ$. ὡς δὲ ἡ $ΖΑ$ πρὸς τὴν $ΑΑ$, οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ τῶν $ΖΑΑ$ 5 πρὸς τὸ ἀπὸ $ΑΑ$, τουτέστιν τὸ ὑπὸ $ΒΑΕ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΑΑ$. ἐναλλάξ ἄρα γίνεται ὡς τὸ ἐπὶ $ΒΓΕ$ πρὸς τὸ ἐπὶ $ΒΑΕ$, οὕτως τὸ ἀπὸ $ΓΑ$ τετραγώνον πρὸς τὸ ἀπὸ $ΑΑ$ τετραγώνον, ὅπερ: ~

- 82 ιε'. Τοῦτου ὄντος ἄλλως τὸ προγεγραμμένον· ὅτι γί-10 νεται ὡς ἡ $ΒΑ$ πρὸς τὴν $ΑΓ$, οὕτως τὸ ἐπὶ $ΑΒΕ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΑΓΕ$.

Ἀνέχθω ἀπὸ τοῦ $Α$ τῇ $ΑΒ$ ὀρθὴ ἡ $ΑΖ$, καὶ διποτερεῖ τῶν ἐπὶ $ΑΒΕ$ $ΒΑΓ$ ἴσον κείσθω τὸ ἀπὸ $ΑΖ$ τετραγώνον, καὶ ἐπεξέχθωσαν αἱ $ΑΖ$ $ΖΓ$ $ΖΕ$ $ΖΒ$. ὀρθὴ ἄρα ἐστὶν 15 ἑκατέρω τῶν ἐπὶ τῶν $ΑΖΕ$ $ΓΖΒ$ γωνία· διὰ δὲ τὸ προγεγραμμένον γίνεται ὡς τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΒΕ$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΓΕ$, οὕτως τὸ ἀπὸ $ΒΖ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΖΓ$. ὡς δὲ τὸ ἀπὸ $ΒΖ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΖΓ$, οὕτως ἐστὶν ἡ $ΒΑ$ πρὸς τὴν $ΑΓ$. καὶ ὡς ἄρα ἡ $ΒΑ$ πρὸς τὴν $ΑΓ$, οὕτως ἐστὶν τὸ ἐπὶ 20 τῶν $ΑΒΕ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΑΓΕ$.

Εἰς τὸ πρῶτον ἐπίταγμα τοῦ ε' προβλήματος.

- 83 ιε'. Εὐθεία ἡ $ΑΒ$, καὶ ἐπ' αὐτῆς τρία σημεῖα τὰ $Γ$ $Δ$ $Ε$, καὶ ἔστω τὸ ἐπὶ τῶν $ΑΒΕ$ ἴσον τῷ ἐπὶ τῶν $ΓΒΑ$. ὅτι γίνεται ὡς ἡ $ΑΒ$ πρὸς τὴν $ΒΕ$, οὕτως τὸ ὑπὸ $ΑΑΓ$ 25 πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $ΓΕΔ$.

Ἐπεὶ γὰρ τὸ ἐπὶ τῶν $ΑΒΕ$ ἴσον ἐστὶν τῷ ἐπὶ τῶν $ΓΒΑ$, ἀνάλογον καὶ λοιπὸν πρὸς λοιπὸν καὶ ἀναστρέψαντι

4. ὑπὸ τῆς $\beta\gamma\epsilon$ BS 5. 6. τὸ ὑπὸ τῶν $\overline{ΖΑΑ}$ πρὸς τὸ ἀπὸ $\overline{ΑΑ}$ τουτέστιν bis scripta sunt in A/B. 7. τὸ ὑπὸ $\overline{ΗΓΕ}$ πρὸς bis scripta sunt in A 9. ὅπερ; ο A, om. BS 10. ιε' add. BS 11. $\overline{ΑΒΕ}$ Co pro $\overline{ΑΒΓ}$ 13. καὶ ἑκατέρω Hu 15. ad $\overline{ΖΓ}$ inter lineas add. $\overline{ΖΑ}$ A⁴, quod recepit B 18. post $\overline{ΑΓΕ}$ add. τουτέστιν πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $\overline{ΕΓΑ}$ A B) 23. ιε' add. BS 23. 24. τὰ $\overline{ΓΓΕ}$ A, distinctx. BS

$\alpha\gamma : \gamma\eta = \alpha\delta : \delta\zeta$ et, e contrario

$\gamma\eta : \gamma\alpha = \zeta\delta : \delta\alpha$; itaque


$\alpha\gamma \cdot \gamma\eta : \gamma\alpha^2 = \zeta\delta \cdot \delta\alpha : \delta\alpha^2$, id est *elem. 3, 36 et 35*;

$\beta\gamma \cdot \gamma\epsilon : \gamma\alpha^2 = \beta\delta \cdot \delta\epsilon : \delta\alpha^2$, et vicissim

$\beta\gamma \cdot \gamma\epsilon : \beta\delta \cdot \delta\epsilon = \gamma\alpha^2 : \alpha\delta^2$, q. e. d.

XV. Hoc cum ita sit, aliter superius lemma decimum, Prop. 34 esse $\beta\delta : \delta\gamma = \alpha\beta \cdot \beta\epsilon : \alpha\gamma \cdot \gamma\epsilon$, demonstrabitur.

Erigatur in puncto δ rectae $\alpha\beta$ perpendicularis $\delta\zeta$, sitque $\delta\zeta^2 = \alpha\delta \cdot \delta\epsilon$



$= \beta\delta \cdot \delta\gamma$, et ducantur $\alpha\zeta$, $\gamma\zeta$, $\zeta\epsilon$, $\zeta\beta$.

Ergo ex hypothesi *propter elem. 10, 33 lemma* singuli anguli $\alpha\zeta\epsilon$, $\gamma\zeta\beta$ recti sunt. Iam

propter superius lemma fit $\alpha\beta \cdot \beta\epsilon : \alpha\gamma \cdot \gamma\epsilon = \beta\zeta^2 : \zeta\gamma^2$. Sed est *propter elem. 1. c.* $\beta\zeta^2 = \beta\gamma \cdot \gamma\delta$, et $\zeta\gamma^2 = \beta\gamma \cdot \gamma\delta$; ergo $\beta\zeta^2 : \zeta\gamma^2 = \beta\delta : \delta\gamma$, itaque etiam $\beta\delta : \delta\gamma = \alpha\beta \cdot \beta\epsilon : \alpha\gamma \cdot \gamma\epsilon$.

In primum epitagma sexti problematis.

XVI. Sit recta $\alpha\beta$, inque ea tria puncta γ , δ , ϵ , et sit Prop. 35 $\alpha\beta \cdot \beta\epsilon = \gamma\beta \cdot \beta\delta$; dico fieri $\alpha\beta : \beta\epsilon = \delta\alpha : \alpha\gamma : \gamma\epsilon : \epsilon\delta$.

Quoniam enim est $\alpha\beta \cdot \beta\epsilon$

$= \gamma\beta \cdot \beta\delta$, per proportionem igitur est

$\alpha\beta : \beta\delta = \gamma\beta : \beta\epsilon$, et subtrahendo

$\alpha\gamma : \delta\epsilon = \alpha\beta : \beta\delta$, tum convertendo

$\alpha\gamma : \alpha\gamma - \delta\epsilon = \alpha\beta : \alpha\delta$, denique e contrario¹⁾

¹⁾ Elementorum lemma, quod bis citavimus supra, cum fugeret interpretem Vossianum, Commandinum, Simsonum p. 13 sq., hi ex similitudine triangulorum variis rationibus partimque per ambages eadem, quae brevius supra scripta sunt, demonstraverunt.

²⁾ Sic contractam Pappi demonstrationem explet V² multo aptius quam C², qui in ambages illabitur.

ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ τῶν $ΑΓ$ $ΕΔ$ ὑπεροχὴ πρὸς τὴν $ΑΓ$, οὕτως ἡ $ΑΔ$ πρὸς τὴν $ΑΒ$ · τὸ ἄρα ἐπὶ τῆς τῶν $ΑΓ$ $ΕΔ$ ὑπεροχῆς καὶ τῆς $ΑΒ$ ἴσον ἐστὶν τῷ ἐπὶ τῶν $ΑΑΓ$. πάλιν ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ $ΑΒ$ πρὸς τὴν $ΒΔ$, οὕτως ἡ $ΓΒ$ πρὸς τὴν $ΒΕ$, λοιπὴ ἄρα ἡ $ΑΓ$ πρὸς λοιπὴν τὴν $ΓΕ$ ἐστὶν ὡς ἡ $ΓΒ$ πρὸς τὴν $ΒΕ$. διελόντι ἐστὶν ὡς ἡ τῶν $ΑΓ$ $ΕΔ$ ὑπεροχὴ πρὸς τὴν $ΓΕ$, οὕτως ἡ $ΓΕ$ πρὸς τὴν $ΕΒ$ · τὸ ἄρα ἐπὶ τῆς τῶν $ΑΓ$ $ΑΕ$ ὑπεροχῆς καὶ τῆς $ΕΒ$ ἴσον ἐστὶν τῷ ἐπὶ τῶν $ΓΕΔ$. ἐδείχθη δὲ καὶ τὸ ἐπὶ τῆς τῶν $ΑΓ$ $ΕΔ$ ὑπεροχῆς καὶ τῆς $ΑΒ$ ἴσον τῷ ἐπὶ τῶν $ΑΑΓ$ · ἐναλλάξ 10 ἄρα ἐστὶν ὡς τὸ ἐπὶ τῆς τῶν $ΑΓ$ $ΓΕ$ ὑπεροχῆς καὶ τῆς $ΑΒ$ πρὸς τὸ ἐπὶ τῆς τῶν $ΑΓ$ $ΓΕ$ ὑπεροχῆς καὶ τῆς $ΒΕ$, ιουτέστιν ὡς ἡ $ΑΒ$ πρὸς τὴν $ΒΕ$, οὕτως τὸ ἐπὶ $ΑΑΓ$ πρὸς τὸ ἐπὶ $ΓΕΔ$.

Ἄλλως τὸ αὐτὸ διὰ τοῦ συνημμένου.

15

- 84 ιζ'. Ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ $ΑΒ$ πρὸς τὴν $ΒΓ$, οὕτως ἡ $ΔΒ$ πρὸς τὴν $ΒΕ$, λοιπὴ ἄρα ἡ $ΑΔ$ πρὸς λοιπὴν τὴν $ΓΕ$ ἐστὶν ὡς ἡ $ΑΒ$ πρὸς τὴν $ΒΓ$. πάλιν ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ $ΑΒ$ πρὸς τὴν $ΒΔ$, οὕτως ἡ $ΓΒ$ πρὸς τὴν $ΒΕ$, λοιπὴ ἄρα ἡ $ΑΓ$ πρὸς λοιπὴν τὴν $ΓΕ$ ἐστὶν ὡς ἡ $ΓΒ$ πρὸς τὴν $ΒΕ$ · ὥστε ὁ 20 συνημμένος ἔκ τε τοῦ τῆς $ΑΒ$ πρὸς $ΒΓ$ καὶ τοῦ τῆς $ΓΒ$ πρὸς $ΒΕ$, ὅς ἐστιν ὁ τῆς $ΑΒ$ πρὸς $ΒΕ$, ὁ αὐτός ἐστιν τῷ συνημμένῳ ἔκ τε τοῦ τῆς $ΑΔ$ πρὸς $ΓΕ$ καὶ τοῦ τῆς $ΑΓ$ πρὸς $ΑΕ$, ὅς ἐστιν ὁ αὐτός τῷ τοῦ ἐπὶ $ΑΑΓ$ πρὸς τὸ ἐπὶ $ΓΕΔ$.

25

Ἄλλως.

- 85 ιη'. Γεγραφθῶ ἐπὶ τῆς $ΑΕ$ ἡμικύκλιον τὸ $ΑΖΕ$, καὶ ἔχθῶ ἐφαπτομένη ἡ $ΒΖ$, καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ $ΑΖ$ $ΓΖ$ $ΑΖ$ $ΕΖ$. ἐπεὶ οὖν ἐφάπτεται μὲν ἡ $ΒΖ$, τέμνει δὲ ἡ $ΒΑ$, τὸ ἐπὶ τῶν $ΑΒΕ$ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ $ΒΖ$. ἀλλὰ τὸ ἐπὶ $ΑΒΕ$ 30

1. 2. ἡ τῶν $ΑΓ$ $ΕΒ$ ὑπεροχὴ — ἡ $ΒΑ$ πρὸς τὴν $ΑΔ$ ABS, corr. V² Co 2. τῆς add. Hu (idem ante ἐπὶ Ge; τῶν $ΑΓΕΒ$ A BS), corr. V² Co 4. ἡ $ΑΒ$ πρὸς τὴν $ΒΔ$; ἡ $ΑΕ$ πρὸς τὴν $ΕΔ$ ABS, ἡ $ΑΕ$ πρὸς τὴν $ΕΔ$ Co, corr. V² 9. τὸ ἐπὶ add. V² τῶν $ΑΓΕΔ$

$\alpha\gamma - \delta\epsilon : \alpha\gamma = \alpha\delta : \alpha\beta$. Ergo est

$(\alpha\gamma - \delta\epsilon) \cdot \alpha\beta = \delta\alpha \cdot \alpha\gamma$. Rursus quoniam est

$\alpha\beta : \beta\delta = \gamma\beta : \beta\epsilon$, subtrahendo igitur est

$\alpha\gamma : \delta\epsilon = \gamma\beta : \beta\epsilon$. Dirimendo est $\alpha\gamma - \delta\epsilon : \delta\epsilon =$

$\gamma\epsilon : \epsilon\beta$; ergo

$(\alpha\gamma - \delta\epsilon) \cdot \epsilon\beta = \gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta$. Sed demonstratum est


$(\alpha\gamma - \delta\epsilon) \cdot \alpha\beta = \delta\alpha \cdot \alpha\gamma$; vicissim igitur est

$(\alpha\gamma - \delta\epsilon) \cdot \alpha\beta : (\alpha\gamma - \delta\epsilon) \cdot \beta\epsilon = \delta\alpha \cdot \alpha\gamma : \gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta$, id est

$\alpha\beta : \beta\epsilon = \delta\alpha \cdot \alpha\gamma : \gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta$.

Aliter idem per formulam compositae proportionis.

XVII. Quoniam est $\alpha\beta : \beta\gamma = \delta\beta : \beta\epsilon$, subtrahendo igitur est $\alpha\delta : \gamma\epsilon = \alpha\beta : \beta\gamma$. Rur-



sus quoniam est $\alpha\beta : \beta\delta = \gamma\beta : \beta\epsilon$, subtrahendo igitur est $\alpha\gamma : \delta\epsilon =$


$\gamma\beta : \beta\epsilon$; ita ut sit per formulam compositae proportionis

$\frac{\alpha\beta}{\beta\gamma} \cdot \frac{\gamma\beta}{\beta\epsilon} = \frac{\alpha\delta}{\gamma\epsilon} \cdot \frac{\alpha\gamma}{\delta\epsilon}$, id est

$\alpha\beta : \beta\epsilon = \delta\alpha \cdot \alpha\gamma : \gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta$.

Aliter.

XVIII. Describatur in $\alpha\epsilon$ semicirculus $\alpha\zeta\epsilon$, et ducatur



tangens $\beta\zeta$, et iungantur $\alpha\zeta$ $\gamma\zeta$ $\delta\zeta$ $\epsilon\zeta$. Quoniam igitur circulum tangit $\beta\zeta$, secat autem $\beta\alpha$, est $\alpha\beta \cdot \beta\epsilon = \beta\zeta^2$. Sed

A, distinx. BS 10. ἐπεροχῆς add. Ge 13. το ἐπὶ τοῦ περιμέτρου
 A(S, τὸ αὐτὸ περιμέτρου B, corr. V² Co 16. αζ' add. BS 22. δς;
 δ A, δ B, corr. S 24. δς; δ A¹, ad quod ε add. A¹ 27. η' add.
 BS 28. ΓΖ add. V² Co 29. ἐγάνηται A, corr. BS δε ἐ B.J
 ABS, δε ἢ βδα V², corr. Co

τῇ ὑπὸ $ΓΒΔ$ ἴσον ἐπόμεται· καὶ τὸ ὑπὸ $ΓΒΔ$ ἄρα ἴσον
 ἐστὶν τῇ ἀπὸ $ΒΖ$ τετραγώνῳ· ὥστε ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν
 $ΒΖΔ$ γωνία τῇ ὑπὸ $ΒΓΖ$ γωνίᾳ. ὣν ἡ ὑπὸ $ΒΖΕ$ γωνία
 ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ $ΖΑΓ$ γωνίᾳ· λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ $ΑΖΕ$ γω-
 νία λοιπῇ τῇ ὑπὸ $ΑΖΓ$ γωνίᾳ ἴση ἐστὶν· ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ
 τῶν $ΑΑΓ$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $ΓΕΔ$, οὕτως ἐστὶν τὸ ἀπὸ $ΑΖ$
 πρὸς τὸ ἀπὸ $ΖΕ$. ὡς δὲ τὸ ἀπὸ $ΑΖ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΖΕ$,
 οὕτως ἐστὶν ἡ $ΑΒ$ πρὸς τὴν $ΒΕ$ · ὡς ἄρα ἡ $ΑΒ$ πρὸς τὴν
 $ΒΕ$, οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ $ΑΑΓ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΓΕΔ$.

Λήμμα εἰς τὸ τρίτον ἐπίταγμα τοῦ ἔκτου προβλήματος. 19

86 θ'. Ὅντος πάλιν ἴσον τοῦ ὑπὸ τῶν $ΑΒΕ$ τῇ ὑπὸ τῶν
 $ΓΒΔ$ δεῖξαι ὅτι γίνεται ὡς ἡ $ΓΒ$ πρὸς $ΒΔ$, οὕτως τὸ ὑπὸ
 τῶν $ΑΓΕ$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΔΕ$.

Ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὡς ἡ $ΑΒ$ πρὸς τὴν $ΒΔ$, οὕτως ἡ $ΓΒ$
 πρὸς τὴν $ΒΕ$, λοιπὴ ἄρα ἡ $ΑΓ$ πρὸς λοιπὴν τὴν $ΔΕ$ ἐστὶν 15
 ὡς ἡ $ΓΒ$ πρὸς τὴν $ΒΕ$. διὰ τὰ αὐτὰ καὶ λοιπὴ ἡ $ΑΔ$
 πρὸς λοιπὴν τὴν $ΓΕ$ ἐστὶν ὡς ἡ $ΑΒ$ πρὸς τὴν $ΒΕ$. καὶ
 ἀνάπαλιν· ὥστε ὁ συνημμένος λόγος ἐκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ $ΓΒ$
 πρὸς τὴν $ΒΕ$ καὶ ἐξ οὗ ὄν ἔχει ἡ $ΕΒ$ πρὸς τὴν $ΒΔ$, ὅς
 ἐστὶν ὁ αὐτὸς τῇ τῆς $ΓΒ$ πρὸς τὴν $ΒΔ$, ὁ αὐτὸς ἐστὶν τῇ 20
 συνημμένῳ ἐκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ $ΑΓ$ πρὸς τὴν $ΔΕ$ καὶ ἡ $ΓΕ$
 πρὸς τὴν $ΑΔ$, ὅς ἐστιν τοῦ ὑπὸ τῶν $ΑΓΕ$ πρὸς τὸ ὑπὸ
 $ΑΔΕ$ · ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ $ΓΒ$ πρὸς τὴν $ΒΔ$, οὕτως τὸ ὑπὸ
 τῶν $ΑΓΕ$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΔΕ$.

Ἄλλως τὸ αὐτό.

25

87 κ'. Ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ $ΑΒ$ πρὸς τὴν $ΒΔ$, οὕτως ἡ $ΓΒ$
 πρὸς τὴν $ΒΕ$, λοιπὴ ἡ $ΑΓ$ πρὸς λοιπὴν τὴν $ΔΕ$ ἐστὶν ὡς
 ἡ $ΓΒ$ πρὸς τὴν $ΒΕ$. ἀναστρέψαντί ἐστιν ὡς ἡ $ΑΓ$ πρὸς
 τὴν τῶν $ΑΓ$ $ΔΕ$ ὑπεροχὴν, οὕτως [ἐστὶν] ἡ $ΓΒ$ πρὸς τὴν

1. $ΓΒΔ$ ἄρα $Δ$ ex $ΓΒΔ$ ἄρα 5. τῇ ὑπὸ $ΑΖΓ$ $Δ$ BS, corr. ve-
 tusula m. in A (V^2 Scd). 10. τρίτον et ἔκτον Hu auctore Simsonio p. 49
 pro πρώτον et πρώτου 11. θ' add. BS 15. post ἐστὶν add. ὥστε·
 τῶν λοιπῶν A, ὡς εἰς τ. λ. BS 18, 19. ἡ $ΓΒ$ πρὸς τὴν $ΒΕ$ καὶ ἐξ

suppositum est $\alpha\beta \cdot \beta\epsilon = \gamma\beta \cdot \beta\delta$; itaque est $\gamma\beta \cdot \beta\delta = \beta\zeta^2$, ac per proportionem $\gamma\beta : \beta\zeta = \beta\zeta : \beta\delta^*$; ergo propter similitudinem triangulorum (elem. 6, 6) $L \beta\zeta\delta = L \beta\gamma\zeta$. Et quoniam est $\alpha\beta \cdot \beta\epsilon = \beta\zeta^2$, rursus propter similitudinem triangulorum est

$L \beta\zeta\epsilon = L \zeta\alpha\gamma$; subtrahendo igitur

$L \beta\zeta\delta - \beta\zeta\epsilon = L \beta\gamma\zeta$ (sive $\zeta\alpha\gamma + \alpha\zeta\gamma - \zeta\alpha\gamma$, id est

$L \delta\zeta\epsilon = L \alpha\zeta\gamma$).

Ergo propter libri VI propos. 12 est $\delta\alpha \cdot \alpha\gamma : \gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta = \alpha\zeta^2 : \zeta\epsilon^2$. Sed propter similitudinem triangulorum $\alpha\zeta\beta$ et $\zeta\epsilon\beta$ est $\alpha\beta : \beta\zeta = \alpha\zeta : \zeta\epsilon$, sive $\alpha\beta^2 : \beta\zeta^2 = \alpha\zeta^2 : \zeta\epsilon^2$, ac rursus propter eandem similitudinem $\alpha\beta : \beta\zeta = \beta\zeta : \beta\epsilon$, ideoque $\alpha\beta^2 : \beta\zeta^2 = \alpha\beta : \beta\epsilon$, ergo[†] est $\alpha\zeta^2 : \zeta\epsilon^2 = \alpha\beta : \beta\epsilon$, itaque $\alpha\beta : \beta\epsilon = \delta\alpha \cdot \alpha\gamma : \gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta$.

Lemma in tertium epitagma sexti problematis.

XIX. Si rursus sit $\alpha\beta \cdot \beta\epsilon = \gamma\beta \cdot \beta\delta$, demonstretur fieri Prop. 36
 $\gamma\beta : \beta\delta = \alpha\gamma \cdot \gamma\epsilon : \alpha\delta \cdot \delta\epsilon$.

Quoniam enim est $\alpha\beta : \beta\delta$

$\frac{\alpha}{\gamma} \cdot \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\beta}{\epsilon}$, subtrahendo igitur
 est $\alpha\gamma : \delta\epsilon = \gamma\beta : \beta\epsilon$. Eadem

ratione, quoniam est $\alpha\beta : \beta\gamma = \beta\delta : \beta\epsilon$, subtrahendo est $\alpha\delta : \gamma\epsilon = \beta\delta : \beta\epsilon$, et e contrario $\gamma\epsilon : \alpha\delta = \epsilon\beta : \beta\delta$, ita ut sit per formulam compositae proportionis

$$\frac{\gamma\beta}{\beta\epsilon} \cdot \frac{\epsilon\beta}{\beta\delta} = \frac{\alpha\gamma}{\delta\epsilon} \cdot \frac{\gamma\epsilon}{\alpha\delta}, \text{ id est}$$

$$\gamma\beta : \beta\delta = \alpha\gamma \cdot \gamma\epsilon : \alpha\delta \cdot \delta\epsilon.$$

Aliter idem.

XX. Quoniam est $\alpha\beta : \beta\delta = \gamma\beta : \beta\epsilon$, subtrahendo igitur est $\alpha\gamma : \delta\epsilon = \gamma\beta : \beta\epsilon$. Convertendo est $\alpha\gamma : \alpha\gamma - \delta\epsilon = \gamma\beta : \gamma\epsilon$;

*; Haec praeter Co explicat etiam V2.

† Addita haec secundum Co; brevius eadem V2 et Simsonus p. 16.

ΓΕ· τὸ ἄρα ἐπὶ τῶν ΑΓΕ ἴσον ἐστὶν τῷ ἐπὶ τῆς τῶν ΑΓ ΑΒ ὑπεροχῆς καὶ τῆς ΒΓ· πάλιν ἐπεὶ λοιπὴ ἡ ΑΓ πρὸς λοιπὴν τὴν ΙΕ γίνεται ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΙ, διελόντι ὡς ἡ τῶν ΑΓ ΔΕ ὑπεροχὴ πρὸς τὴν ΙΕ, οὕτως ἡ ΔΑ πρὸς τὴν ΙΒ· τὸ ἄρα ἐπὶ τῶν ΑΔΕ ἴσον ἐστὶν τῷ ἐπὶ τῆς τῶν ΑΓ ΔΕ ὑπεροχῆς καὶ τῆς ΙΒ· ὡς ἄρα τὸ ἐπὶ τῆς τῶν ΑΓ ΔΕ ὑπεροχῆς καὶ τῆς ΒΓ πρὸς τὸ ὑπὲρ τῆς τῶν ΑΓ ΔΕ ὑπεροχῆς καὶ τῆς ΙΒ, τοιτέστιν ὡς ἡ ΓΒ πρὸς τὴν ΒΙ, οὕτως τὸ ἐπὶ ΑΓΕ πρὸς τὸ ἐπὶ ΑΔΕ, ὕπερ: ~

10

Ἄλλως τὸ αὐτό.

88 κα'. Γεγράφθω ἐπὶ τῆς ΓΔ ἡμιζύγιον τὸ ΓΖΔ, ἔγκατομένη ἡχθῶ ἡ ΒΖ, καὶ ἐπεξέχθωσαν αἱ ΑΖ ΓΖ ΔΖ ΕΖ. ἐπεὶ οὖν τὸ ἐπὶ ΑΒΕ ἴσον ἐστὶν τῷ ἐπὶ ΓΒΔ, ἀλλὰ τὸ ἐπὶ ΓΒΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ἔγκατομένης τῆς ΒΖ,¹³ καὶ τὸ ἐπὶ τῶν ΑΒΕ ἄρα ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ΒΖ· γωνία ἄρα ἡ ἐπὶ ΒΖΕ γωνία τῇ Α ἴση ἐστίν. ἀλλὰ καὶ ὅλη ἡ ἐπὶ ΒΖΔ τῇ ἐπὶ ΖΓΒ ἴση ἐστίν· λοιπὴ ἄρα ἡ ἐπὶ ΕΖΔ γωνία λοιπῇ τῇ ἐπὶ τῶν ΑΖΓ ἴση ἐστίν· ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ΓΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΔ, οὕτως ἐστὶν τὸ ἐπὶ ΑΓΕ²⁰ πρὸς τὸ ἐπὶ ΑΔΕ. ὡς δὲ τὸ ἀπὸ ΓΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΔ, οὕτως ἐστὶν ἡ ΓΒ πρὸς τὴν ΒΙ· ὡς ἄρα ἡ ΓΒ πρὸς τὴν ΒΔ, οὕτως ἐστὶν τὸ ἐπὶ ΑΓΕ πρὸς τὸ ἐπὶ ΑΔΕ.

89 κβ'. Εὐθεία ἡ ΑΒ, καὶ ἐπ' αὐτῆς δύο σημεῖα τὰ Γ Δ, ἔστω δὲ ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΑΔ²⁵ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΓ· ὅτι τὸ ἐπὶ τῶν ΑΒΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ΒΔ.

Κείσθω τῇ ΓΔ ἴση ἡ ΑΒ· διελόντι ἄρα γίνεται ὡς

2. ΑΓΔΕ A, distinx. BS, item vs. 6 7. 8. τῆς τῶν ΑΒΓΔΕ ὑπεροχῆς καὶ τῆς ΙΒ τοιτέστιν ABS, corr. V² Co 9. οὕτως A·BS
10. ὕπερ V, ο A, ὕπερ ἔδει Paris. 2368 S, om. B 12. κα' add. BS
13. ἡ ΒΖ V² Co pro ἡ ΓΖ καὶ inter lineas add. A¹ ΓΖ et ΕΖ/
add. Co 15. ἐπὶ A·BS, item vs. 20 21. κβ' add. BS 24. 25. τὰ
ΓΔ A, distinx. BS 25. ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΔ ABS, ἡ αβ πρὸς τὴν β;
V², corr. Co

ergo est $\alpha\gamma \cdot \gamma\epsilon = \alpha\gamma - \delta\epsilon \cdot \gamma\beta$. Rursus quoniam subtrahendo fit $\alpha\gamma : \delta\epsilon = \alpha\beta : \beta\delta$, dirimendo est

$$\begin{array}{rcl} \alpha & \gamma & \delta \quad \epsilon \quad \beta \\ & & \beta \quad \alpha\gamma - \delta\epsilon : \delta\epsilon = \alpha\delta : \delta\beta; \text{ itaque} \\ & & \alpha\delta \cdot \delta\epsilon = \alpha\gamma - \delta\epsilon \cdot \delta\beta. \text{ Ergo} \\ & & (\alpha\gamma - \delta\epsilon) \cdot \gamma\beta : (\alpha\gamma - \delta\epsilon \cdot \delta\beta) = \alpha\gamma \cdot \gamma\epsilon : \alpha\delta \cdot \delta\epsilon, \text{ id est} \\ & & \gamma\beta : \beta\delta = \alpha\gamma \cdot \gamma\epsilon : \alpha\delta \cdot \delta\epsilon, \text{ q. e. d.} \end{array}$$

Aliter idem.

XXI. Describatur in recta $\gamma\delta$ semicirculus $\gamma\zeta\delta$; ducatur tangens $\beta\zeta$, iunganturque $\alpha\zeta$ $\gamma\zeta$ $\delta\zeta$ $\epsilon\zeta$. Iam quia ex *hypothese* est $\alpha\beta \cdot \beta\epsilon = \gamma\beta \cdot \beta\delta$, atque etiam secat enim $\beta\gamma$ et tangit $\beta\zeta$ $\gamma\beta \cdot \beta\delta = \beta\zeta^2$, ergo $\alpha\beta \cdot \beta\epsilon = \beta\zeta^2$, et per proportionem $\alpha\beta : \beta\zeta = \beta\zeta : \beta\epsilon$. Ergo propter similitudinem triangulorum



$\alpha\beta\zeta \sim \beta\zeta\epsilon$ est $\angle \beta\zeta\epsilon = \angle \beta\alpha\zeta$. Sed quoniam etiam est $\gamma\beta \cdot \beta\delta = \beta\zeta^2$, eadem ratione propter similitudinem triangulorum $\gamma\beta\delta \sim \beta\zeta\delta$ est $\angle \beta\zeta\delta = \angle \zeta\gamma\beta$, sive $\angle \beta\zeta\epsilon + \epsilon\zeta\delta = \angle \beta\alpha\zeta + \alpha\zeta\gamma$; subtrahendo igitur est $\angle \epsilon\zeta\delta = \angle \alpha\zeta\gamma$. Ergo propter libri VI propos. 12 extr.¹ est $\gamma\zeta^2 : \zeta\delta^2 = \alpha\gamma \cdot \gamma\epsilon : \alpha\delta \cdot \delta\epsilon$. Sed propter similitudinem triangulorum $\gamma\beta\zeta$ et $\zeta\beta\delta$ est

$$\begin{aligned} \gamma\zeta : \zeta\delta &= \gamma\beta : \beta\zeta = \beta\zeta : \beta\delta, \text{ itaque} \\ \gamma\zeta^2 : \zeta\delta^2 &= \gamma\beta^2 : \beta\zeta^2, \text{ sive, quia } \gamma\beta \cdot \beta\zeta \cdot \beta\delta \text{ proportionales} \\ &\text{sunt,} \\ &= \gamma\beta : \beta\delta. \end{aligned}$$

Ergo est $\gamma\beta : \beta\delta = \alpha\gamma \cdot \gamma\epsilon : \alpha\delta \cdot \delta\epsilon$.

XXII. Sit recta $\alpha\beta$, inque ea duo puncta γ δ : sit autem Prop. 37
 $\alpha\gamma : \beta\gamma = \alpha\delta^2 : \delta\gamma^2$: dico esse $\alpha\beta \cdot \beta\gamma = \beta\delta^2$.

Ponatur $\epsilon\delta = \delta\gamma$: dirimendo igitur est

1) Hunc alterum propositionis supra citatae casum indicavit Simonius p. 20 coll. p. 16: reliquorum quae in hoc lemmate demonstrando addidimus auctor est Co

ἡ $ΑΓ$ πρὸς τὴν $ΓΒ$, οὕτως τὸ ὑπὸ $ΓΑΕ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΓΑ$, τοιτέστιν πρὸς τὸ ἐπὸ $ΕΑΓ$. ὥς δὲ ἡ $ΑΓ$ πρὸς τὴν $ΓΒ$, οὕτως ἐστὶν κοινοῦ ὕψους παραληθθείσης τῆς $ΑΕ$ τὸ ἐπὸ τῶν $ΓΑΕ$ πρὸς τὸ ἐπὸ τῶν $ΑΕ ΓΒ$. ἐστὶν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ τῶν $ΓΑΕ$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΕ ΓΒ$, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν $ΓΑΕ$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $ΕΑΓ$. ἴσον ἄρα ἐστὶν τὸ ἐπὸ τῶν $ΑΕ ΓΒ$ τῷ ἐπὸ τῶν $ΕΑΓ$. ἀνάλογον καὶ συνθέντι ἐστὶν ὡς ἡ $ΑΑ$ πρὸς τὴν $ΑΕ$, τοιτέστιν πρὸς τὴν $ΑΓ$, οὕτως ἡ $ΑΒ$ πρὸς τὴν $ΒΓ$. καὶ ὅλη ἄρα ἡ $ΑΒ$ πρὸς ὅλην τὴν $ΒΑ$ ἐστὶν ὡς ἡ $ΑΒ$ πρὸς τὴν $ΒΓ$. τὸ ἄρα ἐπὸ τῶν $ΑΒΓ$ 10 ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς $ΒΑ$, ὅπερ: ~

- 90 κγ'. Ἐστω δὲ πάλιν ὡς ἡ $ΑΒ$ πρὸς τὴν $ΒΓ$, οὕτως τὸ ἀπὸ $ΑΑ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΑΓ$. ὅτι γίνεται ἴσον τὸ ἐπὸ $ΑΒΓ$ τῷ ἀπὸ $ΒΑ$ τετραγώνῳ.

Κείσθω τῇ $ΓΑ$ ἴση ἡ $ΔΕ$. κατὰ διαίρεσιν ἄρα γίνε- 15 ται ὡς ἡ $ΑΓ$ πρὸς τὴν $ΓΒ$, τοιτέστιν ὡς τὸ ὑπὸ τῶν $ΕΑΓ$ πρὸς τὸ ἐπὸ τῶν $ΕΑ ΒΓ$, οὕτως τὸ ἐπὸ τῶν $ΕΑΓ$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $ΓΔΕ$. ἴσον ἄρα ἐστὶν τὸ ἐπὸ τῶν $ΑΕ ΒΓ$ τῷ ἐπὸ τῶν $ΓΔΕ$. ἀνάλογον καὶ διελόντι ἐστὶν ὡς ἡ $ΑΑ$ πρὸς τὴν $ΔΕ$, τοιτέστιν πρὸς τὴν $ΑΓ$, οὕτως ἡ $ΑΒ$ πρὸς 20 τὴν $ΓΒ$. καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ $ΑΒ$ πρὸς λοιπὴν τὴν $ΑΒ$ ἐστὶν ὡς ἡ $ΑΒ$ πρὸς τὴν $ΓΒ$. τὸ ἄρα ἐπὸ $ΑΒΓ$ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ $ΒΑ$ τετραγώνῳ.

- 91 κδ'. Εὐθεία ἡ $ΑΒ$, καὶ ἐπ' αὐτῆς τρία σημεῖα τὰ $Γ$, $Δ$, $Ε$, ἔστω δὲ ὡς τὸ ἐπὸ $ΒΑΕ$ πρὸς τὸ ἐπὸ $ΒΔΕ$, οὕτως 25 τὸ ἀπὸ $ΑΓ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΓΔ$. ὅτι γίνεται καὶ ὡς τὸ ἐπὸ $ΑΒΔ$ πρὸς τὸ ἐπὸ $ΑΕΔ$, οὕτως τὸ ἀπὸ $ΒΓ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΓΕ$.

Εἰλήφθω γὰρ ἰσότητος σημεῖον τὸ $Ζ$, ὥστε ἴσον εἶναι τὸ ἐπὸ τῶν $ΑΖΔ$ τῷ ἐπὸ $ΒΖΕ$. ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ $ΑΖ$ 30


4. οὕτω A²BS ἐπὸ $ΓΑΕ$ V² Co pro ἐπὸ $ΓΔ$ 3. ἐστὶ A²BS
κοιτὸν ὕψος ABS, corr. V² Co 4. τῶν $ΑΕΓΒ$ A, distinx. BS
5. 6. $ΑΕ ΓΒ$ — τῶν (ante $ΕΑΓ$ add. V² (minus recte post $ΕΑΓ$ add. Co)
οὕτω τὸ ἐπὸ τῶν $ΓΑΕ$ πρὸς τὸ ἐπὸ τῆς $ΑΕΓΒ$ 9. ἄρα add. Hu
11. ἀπὸ add. V² Co, τῆς add. V² 12. xγ' add. BS 17. τῶν $ΓΑΒΓ$
ABS, distinx. Co 20. ἡ $ΑΒ$ V² Co pro ἡ $ΑΓ$ 20. 21. πρὸς τὴν $ΒΓ$ Co

$$\begin{aligned} \alpha\gamma : \gamma\beta &= \alpha\delta^2 - \delta\gamma^2 : \delta\gamma^2, \text{ sive propter elem. 2, 6} \\ &= \gamma\alpha \cdot \alpha\epsilon : \delta\gamma^2, \text{ id est quia } \delta\gamma = \epsilon\delta \\ &= \gamma\alpha \cdot \alpha\epsilon : \epsilon\delta \cdot \delta\gamma. \end{aligned}$$

Sed adsumpta com-
muni altitudine $\alpha\epsilon$
(sive multiplicata

proportione cum $\alpha\epsilon$, est $\alpha\gamma : \gamma\beta = \gamma\alpha \cdot \alpha\epsilon : \alpha\epsilon \cdot \gamma\beta$, itaque
 $\gamma\alpha \cdot \alpha\epsilon : \alpha\epsilon \cdot \gamma\beta = \gamma\alpha \cdot \alpha\epsilon : \epsilon\delta \cdot \delta\gamma$; ergo $\alpha\epsilon \cdot \gamma\beta = \epsilon\delta \cdot \delta\gamma$. Per
proportionem est $\alpha\epsilon : \epsilon\delta = \delta\gamma : \gamma\beta$, et componendo $\alpha\delta : \delta\epsilon$
 $= \delta\beta : \beta\gamma$, itaque (quia $\delta\epsilon = \delta\gamma$) tota $\alpha\delta + \delta\beta$ ad totam
 $\delta\gamma + \gamma\beta$, id est $\alpha\beta : \beta\delta = \delta\beta : \beta\gamma$; ergo est $\alpha\beta \cdot \beta\gamma = \beta\delta^2$,
q. e. d.

XXIII. Iam sit rursus $\alpha\beta : \beta\gamma = \alpha\delta^2 : \delta\gamma^2$; sed sit $\alpha\beta < \alpha\delta$; Prop.
dico esse $\alpha\beta \cdot \beta\gamma = \beta\delta^2$. ³⁸



Ponatur $\delta\epsilon = \gamma\delta$; di-
rimendo igitur sit

$$\alpha\gamma : \gamma\beta = \alpha\delta^2 - \delta\gamma^2 : \delta\gamma^2, \text{ id est, ut supra demonstra-}$$

rimus.


$$\epsilon\alpha \cdot \alpha\gamma : \epsilon\alpha \cdot \beta\gamma = \epsilon\alpha \cdot \alpha\gamma : \gamma\delta \cdot \delta\epsilon; \text{ ergo}$$

$$\epsilon\alpha \cdot \beta\gamma = \gamma\delta \cdot \delta\epsilon.$$

Per proportionem est $\alpha\epsilon : \epsilon\delta = \delta\gamma : \gamma\beta$, et dirimendo $\alpha\delta : \delta\epsilon$
 $= \delta\beta : \gamma\beta$, itaque (quia $\delta\epsilon = \delta\gamma$ subtrahendo $\alpha\beta : \beta\delta =$
 $\delta\beta : \gamma\beta$; ergo est $\alpha\beta \cdot \beta\gamma = \beta\delta^2$.

XXIV. Sit recta $\alpha\beta$, inque ea tria puncta $\gamma \delta \epsilon$; sit Prop.
autem $\beta\alpha \cdot \alpha\epsilon : \beta\delta \cdot \delta\epsilon = \alpha\gamma^2 : \gamma\delta^2$; dico fieri $\alpha\beta \cdot \beta\delta : \alpha\epsilon \cdot \epsilon\delta$ ³⁹
 $= \beta\gamma^2 : \gamma\epsilon^2$.

Sumatur enim



aequalitatis punc-
tum ζ ita, ut sit

$\alpha\zeta \cdot \zeta\delta = \beta\zeta \cdot \zeta\epsilon$). Ergo propter superius lemma I extr. in
sectionem determinatam est $\alpha\zeta : \zeta\delta = \beta\alpha \cdot \alpha\epsilon : \beta\delta \cdot \delta\epsilon$. Sed et

* Secetur $\alpha\epsilon$ in puncto ζ ita, ut sit $\alpha\beta : \delta\epsilon = \alpha\zeta : \zeta\epsilon$; ergo sub-
trahendo est $\beta\zeta : \zeta\delta = \alpha\zeta : \zeta\epsilon$, itaque $\alpha\zeta \cdot \zeta\delta = \beta\zeta \cdot \zeta\epsilon$ (Co.).

21. $\alpha\beta$ et γ AB V2 Co pro $\alpha\beta$ et γ FB

22. $\omega\epsilon$ et γ AB Co. $\omega\epsilon$ et γ BA V2

pro $\omega\epsilon$ et γ AT

24. $\alpha\delta$ add. BS

24. 23. ite F.J.E. A. distinct. BS

Pappus II.

πρὸς τὴν AZ , οὕτως τὸ ἐπὶ BAE πρὸς τὸ ἐπὶ BAE
 (ἔκθεμα γὰρ ἐν θεωρισμένῃ): ὥς δὲ τὸ ἐπὶ BAE πρὸς τὸ
 ἐπὶ BAE , οὕτως ἐστὶν τὸ ἀπὸ AI πρὸς τὸ ἀπὸ IA · καὶ
 ὥς ἄρα ἡ AZ πρὸς τὴν ZI , οὕτως τὸ ἀπὸ AI πρὸς τὸ
 ἀπὸ IA · τὸ ἄρα ἐπὶ AZI , τοιτέστιν τὸ ἐπὶ BZE , ἴσον
 ἐστὶν τῷ ἀπὸ ZI · ἐστὶν ἄρα ὥς ἡ BZ πρὸς τὴν ZE , οὕ-
 τως τὸ ἀπὸ BI πρὸς τὸ ἀπὸ IE . ὥς δὲ ἐστὶν ἡ BZ πρὸς
 τὴν ZE , οὕτως ἐστὶν τὸ ἐπὶ ABA πρὸς τὸ ἐπὶ AEA ·
 καὶ ὥς ἄρα τὸ ἐπὶ ABA πρὸς τὸ ἐπὶ AEA , οὕτως ἐστὶν
 τὸ ἀπὸ BI πρὸς τὸ ἀπὸ IE .

19

Ἄλλως τὸ αὐτό.


- 92 κα'. Γεγράφθω ἐπὶ τῶν $AE AB$ εὐθειῶν ἡμικύκλια
 τὰ $AZE AZB$, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ $AZ ZI ZA ZE ZB$.
 ἔπει οὖν αἱ ἐπὶ $AZB AZE$ γωνίαι δυοῖν ὁρθαῖς ἴσαι εἰ-
 σὶν, ἐστὶν ἄρα ὥς τὸ ἐπὶ BAE πρὸς τὸ ἐπὶ BAE , οὕτως
 τὸ ἀπὸ AZ πρὸς τὸ ἀπὸ ZI . ὥς δὲ τὸ ἐπὶ BAE πρὸς
 τὸ ἐπὶ BAE , οὕτως ἢ τὸ ἀπὸ AI πρὸς τὸ ἀπὸ AI · ὥς
 ἄρα τὸ ἀπὸ AI πρὸς τὸ ἀπὸ IA , οὕτως τὸ ἀπὸ AZ
 πρὸς τὸ ἀπὸ ZI , ὥστε καὶ ὥς ἡ AI πρὸς τὴν IA , οὕ-
 τως ἡ AZ πρὸς τὴν ZI . διότι ἄρα τέμνεται ἡ ἐπὶ AZI 20
 γωνία τῇ ZI εὐθείᾳ. ἀλλὰ καὶ ἐκβληθείσης τῆς BZ ἐπὶ
 τὸ H , ἴση ἐστὶν ἡ ἐπὶ AZE γωνία τῇ ἐπὶ HZA γωνίᾳ·
 ὅλη ἄρα ἡ ἐπὶ τῶν EZI ὅλη τῇ ἐπὶ τῶν GZH γωνίᾳ ἴση
 ἐστίν· ἐστὶν ἄρα ὥς ἡ BI πρὸς τὴν IE , οὕτως ἡ BZ πρὸς
 τὴν ZE , καὶ ὥς τὸ ἀπὸ πρὸς τὸ ἀπὸ. ἀλλ' ὥς τὸ ἀπὸ 25

1. ἐπὶ BAE $A'S$, ἐπὶ τῶν BAE B 2. 3. πρὸς τὸ ἐπὶ BAE V Ca ,
 πρὸς τὸ ἐπὶ BAE ABS , om. Paris. 2268 3. ἐστὶ $A'S$ 41. haec
 demonstratio ab alio scriptore addita esse videtur 42. κα' add. V
 43. τὰ $AZ EI ZB$ AB , corr. S 21. 22. ἐπὶ τὸ N AB , corr. S
 24. ἐστὶν ἄρα add. BS (conf. p. 708, 18. 712, 1. 27. 714, 29. 724, 22.
 730, 6. 732, 17) 25. καὶ ὥς τὸ ἀπὸ πρὸς τὸ ἀπὸ scriptor huius loci
 brevius posuit pro καὶ ὥς τὸ ἀπὸ BI πρὸς τὸ ἀπὸ IE , οὕτως τὸ ἀπὸ
 BZ πρὸς τὸ ἀπὸ ZE . ut recte adnotant V^2 et Ca ; neque tamen, id
 quod Ca vult, scriptura codicis pro corrupta habenda est

hypothesi est $\beta\alpha \cdot \alpha\epsilon : \beta\delta \cdot \delta\epsilon = \alpha\gamma^2 : \gamma\delta^2$; ergo etiam $\alpha\zeta : \zeta\delta = \alpha\gamma^2 : \gamma\delta^2$, itaque propter lemma XXII est $\alpha\zeta \cdot \zeta\delta$, id est $\beta\zeta \cdot \zeta\epsilon = \zeta\gamma^2$. Ergo propter lemma XXIII conversum¹⁾ est $\beta\zeta : \zeta\epsilon = \beta\gamma^2 : \gamma\epsilon^2$. Sed propter lemma I est $\beta\zeta : \zeta\epsilon = \alpha\beta \cdot \beta\delta : \alpha\epsilon \cdot \epsilon\delta$; ergo etiam $\alpha\beta \cdot \beta\delta : \alpha\epsilon \cdot \epsilon\delta = \beta\gamma^2 : \gamma\epsilon^2$.

Aliter idem.

XXV. Describantur in rectis $\alpha\epsilon$ $\delta\beta$ semicirculi $\alpha\zeta\epsilon$ $\delta\zeta\beta$,



iunganturque $\alpha\zeta$ $\zeta\gamma$ $\zeta\delta$ $\zeta\epsilon$ $\zeta\beta$. Quoniam igitur anguli $\alpha\zeta\beta + \delta\zeta\epsilon$ id est $\alpha\zeta\epsilon + \delta\zeta\beta$ duobus rectis aequales sunt, propter lemma VI est $\beta\alpha \cdot \alpha\epsilon : \beta\delta \cdot \delta\epsilon$

$$= \alpha\zeta^2 : \zeta\delta^2, \text{ sive ex hypothesi} \\ = \alpha\gamma^2 : \gamma\delta^2.$$

Ergo $\alpha\gamma^2 : \gamma\delta^2 = \alpha\zeta^2 : \zeta\delta^2$, itaque etiam $\alpha\gamma : \gamma\delta = \alpha\zeta : \zeta\delta$. Ergo propter elem. 6. 3 angulus $\alpha\zeta\delta$ recta $\zeta\gamma$ bifariam secutus est. Sed producta $\beta\zeta$ ad η etiam anguli $\delta\zeta\epsilon$ et $\eta\zeta\alpha$, quia commune complementum $\alpha\zeta\delta$ habent, inter se aequales sunt: itaque etiam angulorum summae aequales, id est $\epsilon\zeta\gamma = \gamma\zeta\eta$. Est igitur $\beta\gamma : \gamma\epsilon = \beta\zeta : \zeta\epsilon$ ²⁾, itemque quadrata. Sed prop-

1) Hoc lemma citat Co; ipsam demonstrationem addit Simsonus p. 26 sq. ac similiter V²; sic fere: quoniam est $\beta\zeta \cdot \zeta\epsilon = \zeta\gamma^2$, per proportionem est $\beta\zeta : \zeta\gamma = \zeta\gamma : \zeta\epsilon$, sive tota ad totam $\beta\gamma : \gamma\epsilon = \beta\zeta : \zeta\gamma$. Est autem elem. 6, 20 coroll. 2: $\beta\zeta : \zeta\epsilon = \beta\zeta^2 : \zeta\gamma^2$, et, quia $\beta\zeta^2 : \zeta\gamma^2 = \beta\gamma^2 : \gamma\epsilon^2$, est igitur $\beta\zeta : \zeta\epsilon = \beta\gamma^2 : \gamma\epsilon^2$.

2) Quia trianguli $\beta\zeta\epsilon$ angulus exterior $\epsilon\zeta\eta$ recta $\gamma\zeta$ bifariam divisus est. Theorema constituit et demonstrat Simsonus, the elements of Euclid lib. 6 prop. A 'p. 436 edit. 24, Londini 1834': If the outward angle of a triangle made by producing one of its sides, be divided into two equal angles by a straight line which also cuts the base produced, the segments between the dividing line and the extremities of the base, have the same ratio which the other sides of the triangle have to another vel.

BZ πρὸς τὸ ἀπὸ ZE , οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ ABA πρὸς τὸ ὑπὸ $AB\Lambda$ · καὶ ὥς ἄρα τὸ ὑπὸ ABA πρὸς τὸ ὑπὸ $AB\Lambda$, οὕτως τὸ ἀπὸ $B\Gamma$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓE , ὅπερ: ~

- 93 καί. Ἐστω πάλιν ὡς τὸ ὑπὸ AGB πρὸς τὸ ὑπὸ AEB , οὕτως τὸ ἀπὸ ΓA πρὸς τὸ ἀπὸ AE · ὅτι γίνεται ὡς τὸ 5 ὑπὸ EAG πρὸς τὸ ὑπὸ ΓBE , οὕτως τὸ ἀπὸ AA πρὸς τὸ ἀπὸ AB .

Εὐλήφθω πάλιν ἰσότητος σημεῖον τὸ Z , ὥστε ἴσον εἶναι τὸ ὑπὸ τῶν AZB τῷ ὑπὸ τῶν ΓZE . ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΓZ πρὸς τὴν ZE , οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν AGB πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν AEB . 10 ὡς δὲ τὸ ὑπὸ τῶν AGB πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν AEB , οὕτως τὸ ἀπὸ ΓA πρὸς τὸ ἀπὸ AE · καὶ ὥς ἄρα ἡ ΓZ πρὸς τὴν ZE , οὕτως ἐστὶν τὸ ἀπὸ ΓA πρὸς τὸ ἀπὸ AE . ἴσον ἄρα ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΓZE , τοιούτοις τὸ ὑπὸ AZB , τῷ ἀπὸ ZA · ἔστιν ἄρα ὡς ἡ AZ πρὸς τὴν ZB , οὕτως τὸ 15 ἀπὸ AA πρὸς τὸ ἀπὸ AB . ὡς δὲ ἡ AZ πρὸς τὴν ZB , οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ τῶν EAG πρὸς τὸ ὑπὸ ΓBE · ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ EAG πρὸς τὸ ὑπὸ ΓBE , οὕτως τὸ ἀπὸ AA πρὸς τὸ ἀπὸ AB , ὅπερ: ~

Ἄλλως τὸ αὐτό.


20

- 94 καί. Γεγραφθῶ περὶ τὰς AE ΓB ἡμικύκλια τὰ AZE ΓZB , καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ AZ ΓZ AZ EZ BZ . ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ $AZ\Gamma$ γωνία τῇ ὑπὸ EZB γωνίᾳ· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ AGB πρὸς τὸ ὑπὸ AEB , οὕτως τὸ ἀπὸ ΓZ πρὸς τὸ ἀπὸ ZE . 25 ὡς δὲ τὸ ὑπὸ AGB πρὸς τὸ ὑπὸ AEB , οὕτως ἦν τὸ ἀπὸ ΓA πρὸς τὸ ἀπὸ AE · καὶ ὥς ἄρα τὸ ἀπὸ ΓA πρὸς τὸ ἀπὸ AE , οὕτως τὸ ἀπὸ ΓZ πρὸς τὸ ἀπὸ ZE , ὥστε καὶ ὡς ἡ ΓA πρὸς τὴν AE , οὕτως ἡ ΓZ πρὸς τὴν ZE · ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΓZA γωνία τῇ ὑπὸ AZE

8. ὅπερ BS, ὁ A 4. καί add. BS 8. 9. ἴσον εἶναι add. Hu
12. καὶ ὡς ἄρα — 44. AE om. S Co 47. ὑπὸ ΓBE Co pro ὑπὸ ΓB
19. ὅπερ BS, ὁ A 20. hoc lemma idem scriptor, qui XXV, addidisse videtur 21. καί add. BS AZE corr. A¹ ex $A\Gamma Z$ (tamen ατξ migravit in B) 23. ὑπὸ AEB Hu auctore Co pro ὑπὸ AB
28. 29. ὥστε καὶ — τὴν ZE om. S Co

ter lemma VI est $\beta\zeta^2 : \zeta\epsilon^2 = \alpha\beta \cdot \beta\delta : \alpha\epsilon \cdot \epsilon\delta$; ergo etiam $\alpha\beta \cdot \beta\delta : \alpha\epsilon \cdot \epsilon\delta = \beta\gamma^2 : \gamma\epsilon^2$, q. e. d.


XXVI. Sit rursus $\alpha\gamma \cdot \gamma\beta : \alpha\epsilon \cdot \epsilon\beta = \gamma\delta^2 : \delta\epsilon^2$; dico fieri Prop. 40
 $\epsilon\alpha \cdot \alpha\gamma : \gamma\beta \cdot \beta\epsilon = \alpha\delta^2 : \delta\beta^2$.



Sumatur rursus aequalitatis punctum ζ ita, ut sit $\alpha\zeta \cdot \zeta\beta = \gamma\zeta \cdot \zeta\epsilon$ (**). Ergo propter lemma XIX est $\gamma\zeta : \zeta\epsilon = \alpha\gamma \cdot \gamma\beta : \alpha\epsilon \cdot \epsilon\beta$. Sed ex hypothesi est $\alpha\gamma \cdot \gamma\beta : \alpha\epsilon \cdot \epsilon\beta = \gamma\delta^2 : \delta\epsilon^2$, itaque $\gamma\zeta : \zeta\epsilon = \gamma\delta^2 : \delta\epsilon^2$. Ergo propter lemma XXII est $\gamma\zeta \cdot \zeta\epsilon = \zeta\delta^2$, sive ex constructione $\alpha\zeta \cdot \zeta\beta = \zeta\delta^2$; itaque propter idem lemma conversum¹⁾ est $\alpha\zeta : \zeta\beta = \alpha\delta^2 : \delta\beta^2$. Sed quia in recta $\alpha\zeta$ tria sunt puncta estque $\alpha\zeta \cdot \zeta\beta = \gamma\zeta \cdot \zeta\epsilon$, propter lemma XVI est $\alpha\zeta : \zeta\beta = \epsilon\alpha \cdot \alpha\gamma : \gamma\beta \cdot \beta\epsilon$; est igitur $\alpha\epsilon \cdot \alpha\gamma : \gamma\beta \cdot \beta\epsilon = \alpha\delta^2 : \delta\beta^2$, q. e. d.

Aliter idem.

XXVII. Describantur in rectis $\alpha\epsilon \gamma\beta$ semicirculi $\alpha\zeta\epsilon \gamma\zeta\beta$, iunganturque $\alpha\zeta \gamma\zeta \delta\zeta \epsilon\zeta \beta\zeta$. Est igitur, quia $\angle \gamma\zeta\epsilon$ commune com-



plementum est. $\angle \alpha\zeta\gamma = \angle \epsilon\zeta\beta$. Ergo propter libri VI propos. 12 extr. est $\alpha\gamma \cdot \gamma\beta : \alpha\epsilon \cdot \epsilon\beta = \gamma\zeta^2 : \zeta\epsilon^2$. Sed ex hypothesi erat $\alpha\gamma \cdot \gamma\beta : \alpha\epsilon \cdot \epsilon\beta = \gamma\delta^2 : \delta\epsilon^2$; est igitur $\gamma\delta^2 : \delta\epsilon^2 =$

$\gamma\zeta^2 : \zeta\epsilon^2$, itaque etiam $\gamma\delta : \delta\epsilon = \gamma\zeta : \zeta\epsilon$. Ergo propter elem. 6. 5 est $\angle \gamma\zeta\delta = \angle \delta\zeta\epsilon$. Sed, ut supra demonstravimus, est

(**) Aequalitatis punctum ζ in producta $\alpha\beta$ ita sumitur, ut sit $\gamma\zeta : \zeta\beta = \alpha\gamma : \epsilon\beta$; erit igitur tota ad totam $\alpha\zeta : \zeta\epsilon = \gamma\zeta : \zeta\beta$, ideoque $\alpha\zeta \cdot \zeta\beta = \gamma\zeta \cdot \zeta\epsilon$. Conf. Simson. p. 29 sq. 478 sq.

1) Vide append.

γωνία. ἔστιν δὲ καὶ ἡ ἐπὶ $AZΓ$ γωνία τῇ ἐπὶ BZE γωνίᾳ· ὅλη ἄρα ἡ ἐπὶ AZA γωνία ὅλη τῇ ἐπὶ BZA γωνίᾳ ἴση ἔστιν· ὥς ἄρα τὸ ἀπὸ AZ πρὸς τὸ ἀπὸ ZB , οὕτως τὸ ἀπὸ AA πρὸς τὸ ἀπὸ AB . ὥς δὲ τὸ ἀπὸ AZ πρὸς τὸ ἀπὸ ZB , οὕτως ἔστιν τὸ ἐπὶ EAF πρὸς τὸ ἐπὶ GBE · ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ἐπὶ EAF πρὸς τὸ ἐπὶ GBE , οὕτως τὸ ἀπὸ AA πρὸς τὸ ἀπὸ AB , ὅπερ· ~

Λήμματα χρήσιμα εἰς τὸ δεύτερον διωρισμένης τομῆς.

- 95 α'. Ἐστω εὐθεῖα ἡ AB , καὶ τρία σημεῖα τὰ Γ A E , ὥστε τὸ ἐπὶ τῶν $AAΓ$ ἴσον εἶναι τῷ ἐπὶ τῶν BAE , καὶ ¹⁰ συναμφοτέρῃ τῇ AE GB ἴσι, κείσθω ἡ Z · ὅτι γίνεται τὸ μὲν ἐπὶ τῶν Z AA ἴσον τῷ ἐπὶ τῶν BAE , τὸ δὲ ἐπὶ τῶν Z GA ἴσον τῷ ἐπὶ τῶν BGE , τὸ δὲ ἐπὶ τῶν Z BA ἴσον τῷ ἐπὶ τῶν $ABΓ$, τὸ δὲ ἐπὶ τῶν Z AE τῷ ἐπὶ τῶν $AEΓ$. 15

Ἐπεὶ γὰρ τὸ ἐπὶ τῶν $AAΓ$ ἴσον τῷ ἐπὶ τῶν BAE , ἀνάλογον καὶ ἀνάπαλιν καὶ ὅλη πρὸς ὅλην καὶ συνθέντι ὥς συναμφοτέρως ἡ $BΓ$ AE , τουτέστιν ἡ Z , πρὸς τὴν AE , οὕτως ἡ BA πρὸς τὴν AA · τὸ ἄρα ἐπὶ τῶν Z AA ἴσον ἔστιν τῷ ἐπὶ τῶν BAE . πάλιν ἐπεὶ ὅλη ἡ AE πρὸς ὅλην ²⁰ τὴν GB ἔστιν ὥς ἡ EA πρὸς τὴν AG , συνθέντι ἔστιν ὥς συναμφοτέρως ἡ AE GB πρὸς τὴν GB , τουτέστιν ὥς ἡ Z πρὸς τὴν GB , οὕτως ἡ GE πρὸς τὴν GA · τὸ ἄρα ἐπὶ τῶν Z GA ἴσον τῷ ἐπὶ τῶν BGE . τὰ αὐτὰ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν· γίνεται ἄρα τέσσαρα. 25

- 96 β'. Ἐστω νῦν πάλιν τὸ ἐπὶ τῶν $AAΓ$ ἴσον τῷ ἐπὶ τῶν BAE , καὶ συναμφοτέρῃ τῇ AE GB ἴσι, κείσθω ἡ Z · ὅτι πάλιν γίνεται τέσσαρα, τὸ μὲν ἐπὶ τῶν Z AA ἴσον τῷ ἐπὶ τῶν BAE , τὸ δὲ ἐπὶ τῶν Z GA ἴσον τῷ ἐπὶ τῶν


2. ἐπὶ AZA V² pro ἐπὶ GA idem in Latina versione significavit Coj 3. ἀπὸ AZ V² pro ἀπὸ AZ idem in Lat. vers. Coj 5. ἐπὶ EAF Ge auctore Co pro ἐπὶ $AEΓ$ 6. ἔστιν ἄρα — ἐπὶ GBE add. Ge auctore Co idē formula ἔστιν ἄρα ὡς conf. adnot. ad p. 730, 24

9. α' add. BS τὰ GA ABS, distinx. V 12. τῶν ZAA ABV², τῶν GA S, distinx. Hu 13. τῶν ZGA ABS τῶν BGE V² Co pro τῶν

$\angle \alpha \zeta \gamma = \angle \epsilon \zeta \delta$. itaque etiam angulorum summæ æquales sunt, id est $\alpha \zeta \delta = \beta \zeta \epsilon$. Ergo propter elem. I. c. est $\alpha \zeta : \zeta \delta = \alpha \delta : \delta \beta$, sive $\alpha \zeta^2 : \zeta \delta^2 = \alpha \delta^2 : \delta \beta^2$. Sed propter libri VI propos. 12 est $\alpha \zeta^2 : \beta \zeta^2 = \epsilon \alpha \cdot \alpha \gamma : \gamma \beta \cdot \beta \epsilon$; ergo $\epsilon \alpha \cdot \alpha \gamma : \gamma \beta \cdot \beta \epsilon = \alpha \delta^2 : \delta \beta^2$, q. e. d.

LEMmata UTILIA AD SECUNDUM LIBRUM DETERMINATAE SECTIONIS.

I. Sit recta $\alpha \beta$, et in ea tria puncta $\gamma \delta \epsilon$ ita sumantur, ut sit $\alpha \delta \cdot \delta \gamma = \beta \delta \cdot \delta \epsilon$, ac ponatur recta $\zeta = \alpha \epsilon + \gamma \beta$: dico fieri $\zeta \cdot \alpha \delta = \beta \alpha \cdot \alpha \epsilon$, et $\zeta \cdot \gamma \delta = \beta \gamma \cdot \gamma \epsilon$, et $\zeta \cdot \beta \delta = \alpha \beta \cdot \beta \gamma$, et $\zeta \cdot \delta \epsilon = \alpha \epsilon \cdot \epsilon \gamma$. Prop. 41



Quoniam enim est

$\alpha \delta \cdot \delta \gamma = \beta \delta \cdot \delta \epsilon$, per proportionem est

$$\delta \gamma : \epsilon \delta = \delta \beta : \alpha \delta^* ,$$

et tota ad totam

$\gamma \beta : \alpha \epsilon = \delta \beta : \alpha \delta$, et componendo $\gamma \beta + \alpha \epsilon : \alpha \epsilon = \alpha \beta : \alpha \delta$, id est $\zeta : \alpha \epsilon = \alpha \beta : \alpha \delta$: ergo est $\zeta \cdot \alpha \delta = \beta \alpha \cdot \alpha \epsilon$. Rursus quia per proportionem est $\alpha \delta : \delta \beta = \epsilon \delta : \delta \gamma$, et tota ad totam $\alpha \epsilon : \gamma \beta = \epsilon \delta : \delta \gamma$, componendo est $\alpha \epsilon + \gamma \beta : \gamma \beta = \gamma \epsilon : \gamma \delta$, id est $\zeta : \gamma \beta = \gamma \epsilon : \gamma \delta$: ergo $\zeta \cdot \gamma \delta = \beta \gamma \cdot \gamma \epsilon$. Eadem etiam in reliquis demonstrantur: fiunt igitur quattuor quæ dicta sunt.

II. Sit nunc rursus $\alpha \delta \cdot \delta \gamma = \beta \delta \cdot \delta \epsilon$, et ponatur recta $\zeta = \alpha \epsilon + \gamma \beta$: dico rursus fieri quattuor, scilicet $\zeta \cdot \alpha \delta =$ Prop. 42

* Sic secundum Simsonum p. 33; contra interpolator qui $\chi \alpha \iota \acute{\alpha} \rho \alpha \tau \alpha \iota$ addidit, per ambages voluit "per proportionem $\epsilon \delta : \delta \gamma = \alpha \delta : \delta \beta$, et e contrario $\delta \gamma : \epsilon \delta = \delta \beta : \alpha \delta$ ".

$\overline{ABF}$ 13. 44. τὸ δὲ ἐπὶ τῶν $\overline{ZBJ}$ — τῶν $\overline{ABF}$ om. BS cod. Co
13. τῶν $\overline{ZBJ}$ A 44. τῶν $\overline{ZJF}$ ABS 46. τὸ ἐπὶ τῶν $\overline{ad\gamma}$ B, τῶν
ἐπὶ τῶν $\overline{AJF}$ A, τῶν ἐπὶ τῶν $\overline{ag\delta}$ S cod. Co τῶν ἐπὶ τῶν $\overline{\beta\delta\epsilon}$ BS,
τὸ etc. AV 17. καὶ ἀνάπαλιν del. Simsonus p. 33, ἀγαθὸν com. Hu
18. ἡ $\overline{BFAE}$ A, distinx. BS 49. τῶν $\overline{ZAJ}$ ABS, distinx. Hu 20. τῶν
 $\overline{BAE}$ V2 Co pro τῶν $\overline{BJE}$ 21. τῶν $\overline{AF}$ V2 Co pro τῶν $\overline{AF}$ 22. πρὸς
τῶν om. A¹, add. in marg. A³ 24. τῶν $\overline{ZFI}$ ABS 26. β' add. BS
τῶν $\overline{AJF}$ Co pro τῶν $\overline{AFI}$ 27. ἀναμφοτέρα A, corr. BS 28. τῶν
 $\overline{ZAJ}$ et similiter posthac usque ad cap. 410 ABS, distinx. Hu (partim
etiam A vel V2 29. $\overline{BAE}$ — ἐπὶ τῶν add. Co

ΒΓΕ, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν Ζ ΒΔ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν ΑΒΓ, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν Ζ ΔΕ τῷ ὑπὸ τῶν ΑΕΓ.


Ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΒΔΕ, ἀνάλογον καὶ ἀνάπαλιν καὶ λοιπὴ πρὸς λοιπὴν καὶ συνθέντι ἔστιν ἄρα ὡς συναμρότερος ἢ ΑΕ ΓΒ πρὸς τὴν 5 ΑΕ, οὕτως ἢ ΒΑ πρὸς τὴν ΑΔ. συναμρότερος δὲ ἢ ΑΕ ΓΒ ἴση ἐστὶν τῇ Ζ· ἔστιν ἄρα ὡς ἢ Ζ πρὸς τὴν ΑΕ, οὕτως ἢ ΒΑ πρὸς τὴν ΑΔ· τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν Ζ ΑΔ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν ΒΔΕ. πάλιν ἐπεὶ ἔστιν ὡς ἢ ΑΔ πρὸς τὴν ΑΒ, οὕτως ἢ ΕΔ πρὸς τὴν ΔΓ, λοιπὴ ἄρα ἢ ΑΕ πρὸς 10 λοιπὴν τὴν ΓΒ ἐστὶν ὡς ἢ ΕΔ πρὸς τὴν ΔΓ. συνθέντι ὡς συναμρότερος ἢ ΑΕ ΓΒ, τοῦτέστιν ὡς ἢ Ζ, πρὸς τὴν ΓΒ, οὕτως ἢ ΕΓ πρὸς τὴν ΓΔ· τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν Ζ ΓΔ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν ΒΓΕ. τὰ δ' αὐτὰ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν δέο δειξομεν· γίνεται ἄρα τέσσαρα.

97 γ'. Ἐστω δὲ ἐκτὸς τῆς ὁλῆς τὸ σημεῖον, καὶ ἔστω τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔΓ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν ΒΔΕ· ὅτι πάλιν, ἐὰν τῇ τῶν ΑΕ ΓΒ ὑπεροχῇ ἴση τεθῇ ἢ Ζ, γίνεται τέσσαρα, τὸ μὲν ὑπὸ τῶν Ζ ΑΔ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν ΒΔΕ, τὸ δὲ ὑπὸ Ζ ΓΔ τῷ ὑπὸ ΒΓΕ, τὸ δὲ ὑπὸ Ζ ΒΔ τῷ ὑπὸ ΑΒΓ, τὸ 20 δὲ ὑπὸ Ζ ΔΕ τῷ ὑπὸ ΑΕΓ.

Ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔΓ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν ΒΔΕ, ἀνάλογον καὶ λοιπὴ πρὸς λοιπὴν καὶ ἀναστρέψαντι ἔστιν ἄρα ὡς ἢ ΑΕ πρὸς τὴν τῶν ΑΕ ΓΒ ὑπεροχὴν, οὕτως ἢ ΑΔ πρὸς τὴν ΑΒ. ἢ δὲ τῶν ΑΕ ΓΒ ὑπεροχὴ ἐστὶν ἢ 25 Ζ· τὸ ἄρα ὑπὸ Ζ ΑΔ ἴσον τῷ ὑπὸ ΒΔΕ. πάλιν ἐπεὶ λοιπὴ ἢ ΑΕ πρὸς λοιπὴν τὴν ΒΓ ἐστὶν ὡς ἢ ΕΔ πρὸς τὴν ΔΓ, διελόντι ἐστὶν ὡς ἢ τῶν ΑΕ ΒΓ ὑπεροχὴ πρὸς τὴν ΒΓ, οὕτως ἢ ΕΓ πρὸς τὴν ΓΔ· τὸ ἄρα ὑπὸ τῆς τῶν ΑΕ ΒΓ ὑπεροχῆς, τοῦτέστιν τῆς Ζ καὶ τῆς ΓΔ, ἴσον τῷ ὑπὸ 30

1. τῶν ΖΗJ Α' ex τῶν ... 4. καὶ ἀνάπαλιν hoc loco minus abundat quam p. 734, 17; tamen del. Simsonus p. 35 4. 5. λοιπὰ πρὸς λοιπὰ καὶ συνθέσεις ABS, corr. Hu auctore Co 12. ἢ αὖ βγ, τοῦτέστιν S 14. τῶν ΒΓΕ Co pro τῶν ΒΕΓ 16. γ' add. BS τὸ σημεῖον, scil. J vide Latina!, τὰ σημεία, scil. E Γ J extra totam (?) AB, coni. Co. τὰ σημεία, scil. Γ J extra totam AE + EB, coni. Ge 17. τῶν ΑΔΓ


$\beta\alpha \cdot \alpha\epsilon$, et $\zeta \cdot \gamma\delta = \beta\gamma \cdot \gamma\epsilon$, et $\zeta \cdot \beta\delta = \alpha\beta \cdot \beta\gamma$, et $\zeta \cdot \delta\epsilon = \alpha\epsilon \cdot \epsilon\gamma$.



Quoniam enim est $\alpha\delta \cdot \delta\gamma = \beta\delta \cdot \delta\epsilon$, per proportionem est $\alpha\delta : \beta\delta = \delta\epsilon : \delta\gamma$, et e contrario $\beta\delta : \alpha\delta = \delta\gamma : \delta\epsilon$, et subtrahendo $\gamma\beta : \alpha\epsilon = \beta\delta : \alpha\delta$, et componendo $\alpha\epsilon + \gamma\beta : \alpha\epsilon$

$= \beta\alpha : \alpha\delta$. Sed est $\alpha\epsilon + \gamma\beta = \zeta$; ergo $\zeta : \alpha\epsilon = \beta\alpha : \alpha\delta$; itaque $\zeta \cdot \alpha\delta = \beta\alpha \cdot \alpha\epsilon$. Rursus quia per proportionem est $\alpha\delta : \delta\beta = \epsilon\delta : \delta\gamma$, subtrahendo igitur est $\alpha\epsilon : \gamma\beta = \epsilon\delta : \delta\gamma$. Componendo est $\alpha\epsilon + \gamma\beta : \gamma\beta = \epsilon\gamma : \gamma\delta$, id est $\zeta : \gamma\beta = \epsilon\gamma : \gamma\delta$; ergo $\zeta \cdot \gamma\delta = \beta\gamma \cdot \gamma\epsilon$. Eadem etiam in reliquis duobus demonstrabimus; fiunt igitur quattuor quae dicta sunt.

III. Sed sint puncta ϵ et β inter α et γ , et extra totam $\alpha\epsilon + \epsilon\beta + \beta\gamma$ sit punctum δ , ac rursus sit $\alpha\delta \cdot \delta\gamma = \beta\delta \cdot \delta\epsilon$; dico rursus, si ponatur recta $\zeta = \alpha\epsilon - \beta\gamma$, fieri quattuor, scilicet $\zeta \cdot \alpha\delta = \beta\alpha \cdot \alpha\epsilon$, et $\zeta \cdot \gamma\delta = \beta\gamma \cdot \gamma\epsilon$, et $\zeta \cdot \beta\delta = \alpha\beta \cdot \beta\gamma$, et $\zeta \cdot \delta\epsilon = \alpha\epsilon \cdot \epsilon\gamma$. Prop. 43



Quoniam enim $\alpha\delta \cdot \delta\gamma = \beta\delta \cdot \delta\epsilon$, per proportionem igitur est $\alpha\delta : \beta\delta = \epsilon\delta : \delta\gamma$, et subtrahendo $\alpha\epsilon : \beta\gamma = \epsilon\delta : \delta\gamma$, et convertendo $\alpha\epsilon : \alpha\epsilon - \beta\gamma = \alpha\delta : \alpha\beta$. Sed differentia $\alpha\epsilon - \beta\gamma$

est ζ ; ergo $\zeta \cdot \alpha\delta = \beta\alpha \cdot \alpha\epsilon$. Rursus quia propter superiora est subtrahendo $\alpha\epsilon : \beta\gamma = \epsilon\delta : \delta\gamma$, dirimendo est $\alpha\epsilon - \beta\gamma : \beta\gamma = \epsilon\gamma : \gamma\delta$; ergo $(\alpha\epsilon - \beta\gamma) \cdot \gamma\delta = \beta\gamma \cdot \gamma\epsilon$, id est $\zeta \cdot \gamma\delta =$

Co pro τῶν $\overline{AEF}$ τῶν add. idem $\overline{HJE}$ A¹ ex B¹. 43. τῶν $\overline{AEFB}$ AB, corr. S 20. $\overline{ZFL}$ τῇ ἐπὶ add. Co idem praeterea τῶν ante $\overline{ZFL}$ 23. λοιπὰ πρὸς λοιπὰ ABS, corr. Hu auctore Co 25. τῶν $\overline{AEFB}$ A, distinct. BS 26, 27. πάλιν ἐπὶ λοιπὴν A'B', corr. S 28. τῶν $\overline{AEF}$ A'B'S, corr. in Lat. versione Co 29, 30. τῶν $\overline{AEFB}$ A, distinct. BS 30. τοιούτοι A'BS

τῶν $BΓΕ$. τὰ δὲ αὐτὰ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν δύο δείξομεν·
γίνεται ἄρα τέσσαρα.

- 98 δ'. Τούτου δ' ἂν δειχθέντος ῥαδίως εὐρεθῇ, τὰ εἰς
τὸ πρῶτον διωρισμένῃς· τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων ὅτι γίνε-
ται ὡς ἡ $ΒΔ$ πρὸς τὴν $ΔΕ$, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΒΓ$ πρὸς
τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΕΓ$.

Ἐπεὶ γὰρ δέδεικται τὸ μὲν ὑπὸ τῶν $Ζ ΒΔ$ ἴσον τῷ
ὑπὸ τῶν $ΑΒΓ$, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν $Ζ ΔΕ$ τῷ ὑπὸ $ΑΕΓ$, ἔστιν
ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ $Ζ ΒΔ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $Ζ ΔΕ$, τουτέστιν ὡς
ἡ $ΒΔ$ πρὸς τὴν $ΔΕ$, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΒΓ$ πρὸς τὸ ὑπὸ
τῶν $ΑΕΓ$.

Εἰς τὸ πρῶτον ἐπιταγμα τοῦ πρώτου προβλήματος.


- 99 ε'. Ἐστω πάλιν ἴσον τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΔΓ$ τῷ ὑπὸ τῶν
 $ΒΔΕ$, καὶ τεχὸν σημείον ἔστω τὸ $Ζ$ · ὅτι, ἐὰν συναμφο-
τέρῳ τῇ $ΑΕ$ $ΓΒ$ ἴσῃ τεθῇ ἡ $Η$, τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΖΓ$ τοῦ
ὑπὸ τῶν $ΒΖΕ$ ὑπερέχει τῷ ὑπὸ τῶν $Η ΑΖ$.

Ἐπεὶ γὰρ προδεδείκται τὸ ὑπὸ τῶν $Η ΔΕ$ ἴσον τῷ ὑπὸ
τῶν $ΑΕΓ$, κοινὸν ἀμφοτέρω τὸ ὑπὸ τῶν $Η ΖΕ$ · λοιπὸν
ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν $Η ΑΖ$ ἢ ὑπεροχὴ ἔστιν ἢ ὑπερέχει τὸ ὑπὸ
τῶν $ΑΕΓ$ τοῦ ὑπὸ τῶν $Η ΕΖ$. ὃ δὲ ὑπερέχει τὸ ὑπὸ τῶν
 $ΑΕΓ$ τοῦ ὑπὸ τῶν $Η ΕΖ$, κοινὸν ἀφαιρεθέντος τοῦ ὑπὸ
τῶν $ΑΕΖ$, τουτέστιν ὑπερέχει τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΕ ΓΖ$ τοῦ ὑπὸ
τῶν $ΒΓ ΖΕ$ · ὃ δὲ ὑπερέχει τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΕ ΓΖ$ τοῦ ὑπὸ
τῶν $ΓΒ ΖΕ$, κοινὸν ἀφαιρεθέντος τοῦ ὑπὸ τῶν $ΓΖΕ$,
τούτῳ ὑπερέχει τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΖΓ$ τοῦ ὑπὸ τῶν $ΒΖΕ$ · τὸ
ἄρα ὑπὸ τῶν $ΑΖΓ$ τοῦ ὑπὸ τῶν $ΒΖΕ$ ὑπερέχει τῷ ὑπὸ
τῶν $Η ΑΖ$, ὅπερ· ~

3. δ' add. BS 4. ὅτι Co pro οὕτως 13. hoc et quae sequuntur
lemmata alio ordine ab ipso olim Pappo disposita esse videntur ε' add.
BS Α.ΙΓ τῷ ὑπὸ τῶν add. Co 14. ἔστω om. S συναμφοτέρω.
AB, corr. S 15. τῇ ΑΕΓΗ A, distinx. BS 20. ὃ Ge auctore Co
pro ὡς 23. τοῦ ὑπὸ τῶν ΑΕΓΖ A(BS), corr. Co τοῦ τὸ S
24. τῶν ΓΖΕ Co pro τῶν ΒΖΕ 26. τῶν ΑΖΓ Co pro τῶν ΑΖΕ
τῷ add. S

$\beta\gamma \cdot \gamma\epsilon$. Eadem etiam in reliquis duobus demonstrabimus:
sunt igitur quattuor quae dicta sunt.


IV. Hoc autem demonstrato facile inveniantur *lemmata* ^{Prop 44}
I X XIX (propos. 22, 50, 36) ad primum librum sectionis
determinatae: "iisdem suppositis dico fieri $\beta\delta : \delta\epsilon = \alpha\beta \cdot \beta\gamma :$
 $\alpha\epsilon \cdot \epsilon\gamma$ ".



Quoniam enim tri-
bus quae antecedunt
lemmatis demonstra-
tum est $\zeta \cdot \beta\delta = \alpha\beta \cdot$
 $\beta\gamma$, et $\zeta \cdot \delta\epsilon = \alpha\epsilon \cdot \epsilon\gamma$,
est igitur $\zeta \cdot \beta\delta : \zeta \cdot \delta\epsilon$,
id est $\beta\delta : \delta\epsilon$
 $= \alpha\beta \cdot \beta\gamma : \alpha\epsilon \cdot \epsilon\gamma$.

In primum eptagma primi problematis.

V. Sit rursus $\alpha\delta \cdot \delta\gamma = \beta\delta \cdot \delta\epsilon$, et quodvis punctum ζ ^{Prop 43}
inter δ et ϵ : dico, si ponatur $\eta = \alpha\epsilon + \gamma\beta$, esse $\alpha\zeta \cdot \zeta\gamma$
 $- \beta\zeta \cdot \zeta\epsilon = \eta \cdot \delta\zeta$.



Quoniam enim supra (propos. 41) demonstratum est
 $\eta \cdot \delta\epsilon = \alpha\epsilon \cdot \epsilon\gamma$, subtrahatur commune $\eta \cdot \zeta\epsilon$: restat igitur
 $\eta \cdot \delta\zeta = \alpha\epsilon \cdot \epsilon\gamma - \eta \cdot \zeta\epsilon$. Sed, communi subtrahito $\alpha\epsilon \cdot \epsilon\zeta$
ex differentia $\alpha\epsilon \cdot \epsilon\gamma - \eta \cdot \zeta\epsilon$, est
 $\alpha\epsilon \cdot \epsilon\gamma - \eta \cdot \zeta\epsilon = \alpha\epsilon \cdot \gamma\zeta - \gamma\beta \cdot \zeta\epsilon$, et, communi sub-
trahito $\gamma\zeta \cdot \zeta\epsilon$ ex diff. $\alpha\epsilon \cdot \gamma\zeta - \gamma\beta \cdot \zeta\epsilon$,
 $\alpha\epsilon \cdot \gamma\zeta - \gamma\beta \cdot \zeta\epsilon = \alpha\zeta \cdot \zeta\gamma - \beta\zeta \cdot \zeta\epsilon$: ergo est
 $\alpha\zeta \cdot \zeta\gamma - \beta\zeta \cdot \zeta\epsilon = \eta \cdot \delta\zeta$, q. e. d.

* In comparandis propositionibus 30 et 36 quas citat Simsonus
p. 38, notae figurarum ex ordine mutandae sunt.

** Addit Simsonus p. 39.

Ἄλλο εἰς τὸ τρίτον τοῦ δευτέρου.

100 ζ'. Ἐστω τὸ σημεῖον μεταξὺ τῶν $E B$ τὸ Z · ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν $AZΓ$ μετὰ τοῦ ὑπὸ EZB ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν $H AZ$.

Ἐπεὶ γὰρ προαποδέδεικται τὸ ὑπὸ τῶν $H AE$ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν $ABΓ$, κοινὸν προσκείσθω τὸ ὑπὸ HEZ · ὅλον ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν $H AZ$ ἴσον τῷ τε ὑπὸ τῶν $ABΓ$ καὶ τῷ ὑπὸ τῶν AEZ καὶ τῷ ὑπὸ τῶν $BΓEZ$. ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὸ $ABΓ$ μετὰ τοῦ ὑπὸ AEZ ὅλον ἐστὶν τὸ ὑπὸ $AE ΓZ$ · γέγονεν οὖν τὸ ὑπὸ $H AZ$ ἴσον τῷ τε ὑπὸ $AE ΓZ$ καὶ τῷ ὑπὸ $ΓB EZ$. ἀλλὰ πάλιν τὸ ὑπὸ $ΓB EZ$ ἴσον τῷ τε ὑπὸ $ΓZE$ καὶ τῷ ὑπὸ EZB , τὸ δὲ ὑπὸ $AE ΓZ$ μετὰ τοῦ ὑπὸ $ΓZE$ ὅλον [ἄρα] ἐστὶν τὸ ὑπὸ AZI , εἵχομεν δὲ καὶ τὸ ὑπὸ EZB · τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν $H AZ$ ἴσον τῷ τε ὑπὸ $AZΓ$ καὶ τῷ ὑπὸ EZB .

Εἰς τὸ πρῶτον ἐπίταγμα τοῦ τρίτου προβλήματος.

101 ζ'. Ἐστω πάλιν τὸ σημεῖον ἐκτὸς τῆς AB τὸ Z · δεῖξαι ὅτι τὸ ὑπὸ $AZΓ$ τοῦ ὑπὸ EZB ὑπερέχει τῷ ὑπὸ $H AZ$.

Ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ τῶν $H AB$ ἴσον τῷ ὑπὸ $ABΓ$, κοινὸν προσκείσθω τὸ ὑπὸ τῶν $H BZ$ · ὅλον ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν $H AZ$ ἴσον τῷ τε ὑπὸ τῶν $ABΓ$ καὶ τῷ ὑπὸ $H BZ$, τοιτέστιν τῷ τε ὑπὸ $AE BZ$ καὶ τῷ ὑπὸ $ΓBZ$. τὸ δὲ ὑπὸ $ABΓ$ μετὰ τοῦ ὑπὸ $ΓBZ$ ὅλον [ἄρα] ἐστὶν τὸ ὑπὸ $AZ ΓB$ · τὸ ἄρα ὑπὸ $H AZ$ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ $AZ ΓB$ καὶ τῷ ὑπὸ $AE BZ$. τὸ δὲ ὑπὸ $AZ ΓB$ μετὰ τοῦ

1. δευτέρου Hu auctore Simsono p. 40 pro τρίτον 2. ζ' add.

BS Ἐστω μετὰ τὸ σημεῖον ABS, corr. Ge auctore Co τὸ Z del.

Hu 3. τῶν $AZΓ$ Co pro τῶν AZ 4. $H AZ$ Co pro $H BZ$

9. τὸ ὑπὸ $H AZ$ AB Co, τὸ ὑπὸ $H BZ$ S cod. Co 11. post μετὰ τοῦ

repetunt ὑπὸ $AE ΓZ$ μετὰ τοῦ ABV, ἀπὸ αὐτοῦ γὰρ μετὰ τοῦ S 12. ἄρα

del. Hu 13. ἴσον om. Ge ὑπὸ $AZΓ$ Co in Lat. versione pro ὑπὸ

AIZ 16. ζ' add. BS ἐκτὸς Co pro ἐπὶ (conf. cap. 104) τὸ Z


del. Hu 19. τῷ ὑπὸ τῶν $αβγ$ B' (τῷ τε et cetera perinde S.

21. H ante BZ τοιτέστιν; inter lin. add. A' 22. ὑπὸ $ΓBZ$ Co pro

ὑπὸ BZ 23. ἄρα del. Hu

Aliud in tertium epitagma secundi problematis.

VI. Sit punctum ζ inter ε et β ; dico esse $\alpha\zeta \cdot \zeta\gamma + \varepsilon\zeta \cdot \zeta\beta$ Prop. 16
 $= \eta \cdot \delta\zeta$.



Quoniam enim supra (lemm. I) demonstratum est $\eta \cdot \delta\varepsilon = \alpha\varepsilon \cdot \varepsilon\gamma$, commune addatur $\eta \cdot \varepsilon\zeta$; ergo

$\eta \cdot \delta\zeta = \alpha\varepsilon \cdot \varepsilon\gamma + \eta \cdot \varepsilon\zeta$, sive, quia ex hypothesi (lemm. V)

est $\eta = \alpha\varepsilon + \gamma\beta$,

$= \alpha\varepsilon \cdot \varepsilon\gamma + \alpha\varepsilon \cdot \varepsilon\zeta + \gamma\beta \cdot \varepsilon\zeta$, sive compositis $\alpha\varepsilon \cdot \varepsilon\gamma$
 $+ \alpha\varepsilon \cdot \varepsilon\zeta$,


$= \alpha\varepsilon \cdot \gamma\zeta + \gamma\beta \cdot \varepsilon\zeta$, sive, quia est $\gamma\beta \cdot \varepsilon\zeta = \gamma\zeta \cdot \zeta\varepsilon$
 $+ \varepsilon\zeta \cdot \zeta\beta$,

$= \alpha\varepsilon \cdot \gamma\zeta + \gamma\zeta \cdot \zeta\varepsilon + \varepsilon\zeta \cdot \zeta\beta$, sive compositis $\alpha\varepsilon \cdot \gamma\zeta$
 $+ \gamma\zeta \cdot \zeta\varepsilon$,

$= \alpha\zeta \cdot \zeta\gamma + \varepsilon\zeta \cdot \zeta\beta$.

In primum epitagma tertii problematis.

VII. Sit rursus extra $\alpha\beta$ punctum ζ ; demonstretur esse Prop. 47
 $\alpha\zeta \cdot \zeta\gamma - \varepsilon\zeta \cdot \zeta\beta = \eta \cdot \delta\zeta$.



Quoniam enim

propter lemma I est

$\eta \cdot \delta\beta = \alpha\beta \cdot \beta\gamma$,

commune addatur

$\eta \cdot \beta\zeta$; ergo

$\eta \cdot \delta\zeta = \alpha\beta \cdot \beta\gamma + \eta \cdot \beta\zeta$, id est, quia ex hypothesi
 (lemm. V) est $\eta = \alpha\varepsilon + \gamma\beta$,

$= \alpha\beta \cdot \beta\gamma + \alpha\varepsilon \cdot \beta\zeta + \gamma\beta \cdot \beta\zeta$, sive compositis $\alpha\beta \cdot \beta\gamma$
 $+ \gamma\beta \cdot \beta\zeta$,

$= \alpha\zeta \cdot \gamma\beta + \alpha\varepsilon \cdot \beta\zeta$. Sed quoniam est

$\alpha\zeta \cdot \zeta\gamma = \alpha\zeta \cdot \gamma\beta + \alpha\zeta \cdot \zeta\beta$

$= \alpha\zeta \cdot \gamma\beta + \alpha\varepsilon \cdot \beta\zeta + \varepsilon\zeta \cdot \zeta\beta$, est igitur

ὑπὸ AE BZ ὑπεροχή ἐστίν ἢ ὑπερέχει τὸ ὑπὸ τῶν $AZΓ$ τοῦ ὑπὸ τῶν EZB · καὶ τὸ ὑπὸ τῶν $H AZ$ ἄρα ἢ ὑπεροχή ἢ ὑπερέχει τὸ ὑπὸ τῶν $AZΓ$ τοῦ ὑπὸ τῶν EZB .

Εἰς τὸ δεύτερον ἐπίταγμα τοῦ πρώτου προβλήματος.

- 102 γ'. Ἐστω τὸ ὑπὸ τῶν $AΔΓ$ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν $EΔB$, σημείον ἔστω τὸ Z μεταξὺ τῶν A $Γ$, καὶ συναμφοτέρω τῇ AE $ΓB$ ἴση κείσθω ἡ H . ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν EZB τοῦ ὑπὸ $AZΓ$ ὑπερέχει τῷ ὑπὸ τῶν $H AZ$.

Ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ τῶν $H AΓ$ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν $BΓE$, κοινὸν ἀφηρέσθω τὸ ὑπὸ τῶν $H ZΓ$. λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ $H AZ$ ὑπεροχή ἐστίν ἢ ὑπερέχει τὸ ὑπὸ τῶν $EΓB$ τοῦ ὑπὸ τῶν $H ΓZ$. ὃ δὲ ὑπερέχει τὸ ὑπὸ τῶν $EΓB$ τοῦ ὑπὸ τῶν $H ZΓ$, κοινοῦ ἀφαιρεθέντος τοῦ ὑπὸ $BΓZ$, τούτῳ ὑπερέχει τὸ ὑπὸ τῶν EZ $ΓB$ τοῦ ὑπὸ AE $ZΓ$. ὃ δὲ ὑπερέχει τὸ ὑπὸ EZ $ΓB$ τοῦ ὑπὸ AE $ZΓ$, κοινοῦ προστεθέντος τοῦ ὑπὸ $EZΓ$, τούτῳ ὑπερέχει τὸ ὑπὸ EZB τοῦ ὑπὸ $AZΓ$. καὶ τὸ ὑπὸ EZB ἄρα τοῦ ὑπὸ $AZΓ$ ὑπερέχει τῷ ὑπὸ $H AZ$.

Εἰς τὸ δεύτερον ἐπίταγμα τοῦ δευτέρου προβλήματος.

- 103 β'. Ἀλλὰ ἔστω τὸ σημείον μεταξὺ τῶν $ΓB$ τὸ Z . οὕτως γίνεται τὸ ὑπὸ τῶν $AZΓ$ μετὰ τοῦ ὑπὸ BZE ἴσον τῷ ὑπὸ $H AZ$.

Ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ τῶν $H AΓ$ ἴσον ἐστίν τῷ ὑπὸ τῶν $BΓE$, κοινὸν προσκείσθω τὸ ὑπὸ $H ΓZ$. ὅλον ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν $H AZ$ ἴσον ἐστίν τῷ τε ὑπὸ $BΓE$ καὶ τῷ ὑπὸ $H ΓZ$, ὃ ἐστίν τῷ τε ὑπὸ AE $ΓZ$ καὶ τῷ ὑπὸ $BΓZ$. ἀλλὰ τὸ ὑπὸ $EΓB$ μετὰ τοῦ ὑπὸ $BΓZ$ ὅλον ἐστίν τὸ ὑπὸ EZ $ΓB$.


1. 2. τῶν $AZΓ$ τοῦ ὑπὸ τῶν EZB Co pro τῶν $AZΓ$ τοῦ ὑπὸ τῶν EBZ 2. τῶν $H AZ$ Co pro τῶν HBZ 4. πρώτου Hn auctore Simsono p. 42 pro αὐτῶν 'quod ex A¹⁰⁰ corruptum esse videtur' 5. η' add. BS 6. τῶν $ΓΓ$ AB, distinct. S συναμφοτέρως AB, corr. S 7. τῶν EZH A³ ex τῶν E 14. AE $ZΓ$ Co pro AB $ZΓ$ 15. προστεθέντος Co pro ἀφαιρεθέντος 16. τὸ ὑπὸ EZB Co pro

$$\alpha\zeta \cdot \gamma\beta + \alpha\epsilon \cdot \beta\zeta = \alpha\zeta \cdot \zeta\gamma - \epsilon\zeta \cdot \zeta\beta; \text{ ergo}$$

$$\eta \cdot \delta\zeta = \alpha\zeta \cdot \zeta\gamma - \epsilon\zeta \cdot \zeta\beta.$$

In secundum epitagma primi problematis.

VIII. Sit $\alpha\delta \cdot \delta\gamma = \epsilon\delta \cdot \delta\beta$, punctum ζ inter δ et γ , ac Prop.
ponatur $\eta = \alpha\epsilon + \gamma\beta$; dico esse $\epsilon\zeta \cdot \zeta\beta - \alpha\zeta \cdot \zeta\gamma = \eta \cdot \delta\zeta$. ⁴⁸



Quoniam enim prop-
ter lemma II est $\eta \cdot \delta\gamma =$
 $\beta\gamma \cdot \gamma\epsilon$, commune sub-
trahatur $\eta \cdot \zeta\gamma$; restat
igitur

$\eta \cdot \delta\zeta = \epsilon\gamma \cdot \gamma\beta - \eta \cdot \zeta\gamma$. Sed ex hac differentia commune
subtrahatur $\beta\gamma \cdot \gamma\zeta$; est igitur

$$\begin{aligned} \epsilon\gamma \cdot \gamma\beta - \eta \cdot \zeta\gamma &= \epsilon\gamma \cdot \gamma\beta - \beta\gamma \cdot \gamma\zeta - \eta \cdot \zeta\gamma - \beta\gamma \cdot \gamma\zeta \\ &= \epsilon\zeta \cdot \gamma\beta - \alpha\epsilon \cdot \zeta\gamma. \end{aligned}$$


Sed ad differentiam $\epsilon\zeta \cdot \gamma\beta - \alpha\epsilon \cdot \gamma\zeta$ commune addatur $\epsilon\zeta \cdot \zeta\gamma$;
est igitur

$$\begin{aligned} \epsilon\zeta \cdot \gamma\beta - \alpha\epsilon \cdot \zeta\gamma &= \epsilon\zeta \cdot \gamma\beta + \epsilon\zeta \cdot \zeta\gamma - (\alpha\epsilon \cdot \zeta\gamma + \epsilon\zeta \cdot \zeta\gamma) \\ &= \epsilon\zeta \cdot \zeta\beta - \alpha\zeta \cdot \zeta\gamma. \end{aligned}$$

Ergo etiam est $\epsilon\zeta \cdot \zeta\beta - \alpha\zeta \cdot \zeta\gamma = \eta \cdot \delta\zeta$.

In secundum epitagma secundi problematis.

IX. Sed sit punctum ζ inter γ et β ; dico fieri $\alpha\zeta \cdot \zeta\gamma$ Prop.
 $+ \beta\zeta \cdot \zeta\epsilon = \eta \cdot \delta\zeta$. ⁴⁹



Quoniam enim est,
ut supra, $\eta \cdot \delta\gamma = \beta\gamma \cdot$
 $\gamma\epsilon$, commune addatur
 $\eta \cdot \gamma\zeta$; est igitur

$$\begin{aligned} \eta \cdot \delta\zeta &= \beta\gamma \cdot \gamma\epsilon + \eta \cdot \gamma\zeta, \text{ sive, quia ex hypothesi (lemm.} \\ &\text{VIII est } \eta = \alpha\epsilon + \gamma\beta, \\ &= \beta\gamma \cdot \gamma\epsilon + \alpha\epsilon \cdot \gamma\zeta + \gamma\beta \cdot \gamma\zeta, \text{ sive compositis } \beta\gamma \cdot \gamma\epsilon \\ &\quad + \gamma\beta \cdot \gamma\zeta \end{aligned}$$

τὸ ἐπὶ EZI 47. ἄρα τὸ ἐπὶ ABS, corr. V 20. θ' add. BS
τῶν FH A, distinx. BS τὸ Z del. Hu 21. τοῦ ἐπὶ HZE Co pro
τοῦ ἐπὶ AZE 26. AEIZ A, distinx. BS, item p. 743, 4

γέγονεν οὖν τὸ ἐπὶ ΕΖ ΓΒ μετὰ τοῦ ἐπὶ ΑΕ ΓΖ ἴσον τῷ ἐπὶ Η ΑΖ. ἀλλὰ τὸ μὲν ἐπὶ ΕΖ ΓΒ ἴσον τῷ τε ἐπὶ ΕΖΓ καὶ τῷ ἐπὶ ΒΖΕ, τὸ δὲ ἐπὶ ΕΓΖ μετὰ τοῦ ἐπὶ ΑΕ ΓΖ ὅλον ἐστὶν τὸ ἐπὶ ΑΖΓ· τὸ ἄρα ἐπὶ ΑΖΓ μετὰ τοῦ ἐπὶ ΒΖΕ ἴσον ἐστὶν τῷ ἐπὶ Η ΑΖ. 5

Εἰς τὸ δεύτερον ἐπίταγμα τοῦ τρίτου προβλήματος.

- 104 ι'. Ἐστω δὴ τὸ σημεῖον ἐκτὸς τῆς ΑΒ τὸ Ζ· ὅτι τὸ ἐπὶ τῶν ΑΖΓ τοῦ ἐπὶ τῶν ΕΖΒ ὑπερέχει τῷ ἐπὶ τῶν Η ΑΖ.

Ἐπεὶ γὰρ τὸ ἐπὶ τῶν Η ΑΒ ἴσον ἐστὶν τῷ ἐπὶ τῶν ΑΒΓ, κοινὸν προσκείσθω τὸ ἐπὶ τῶν Η ΒΖ· ὅλον ἄρα τὸ ἐπὶ τῶν Η ΑΖ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ἐπὶ τῶν ΑΒΓ καὶ τῷ ἐπὶ Η ΒΖ, ὃ ἐστὶν τῷ τε ἐπὶ ΑΕ ΖΒ καὶ τῷ ἐπὶ ΓΒΖ. τὸ δὲ ἐπὶ ΑΒΓ μετὰ τοῦ ἐπὶ ΓΒΖ ὅλον ἐστὶν τὸ ἐπὶ ΑΖ ΓΒ· τὸ ἄρα ἐπὶ ΑΖ ΓΒ μετὰ τοῦ ἐπὶ ΑΕ ΖΒ ἴσον ἐστὶν τῷ ἐπὶ Η ΑΖ. ἀλλὰ τὸ ἐπὶ ΑΖ ΒΓ μετὰ τοῦ ἐπὶ ΑΕ ΖΒ ὑπεροχὴ ἐστίν, ἥ ὑπερέχει τὸ ἐπὶ ΑΖΓ τοῦ ἐπὶ ΕΖΒ· καὶ τὸ ἐπὶ ΑΖΓ ἄρα τοῦ ἐπὶ ΕΖΒ ὑπερέχει τῷ ἐπὶ Η ΑΖ, ὅπερ· ~

Εἰς τὸ τρίτον ἐπίταγμα τοῦ πρώτου προβλήματος. 20

- 105 ια'. Ἐστω τὸ ἐπὶ τῶν ΑΔ ΑΓ ἴσον τῷ ἐπὶ τῶν ΒΔ ΑΕ, καὶ τῇ τῶν ΑΕ ΒΓ ὑπεροχῇ ἴση κείσθω ἡ Η, καὶ εἰληφθῶ τι σημεῖον τὸ Ζ μεταξὺ τῶν Ε Β· ὅτι τὸ ἐπὶ ΑΖΓ τοῦ ἐπὶ ΕΖΒ ὑπερέχει τῷ ἐπὶ τῆς Η καὶ τῆς ΖΔ.


Ἐπεὶ γὰρ τὸ ἐπὶ τῶν Η ΒΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ἐπὶ ΑΒΓ, κοινὸν προσκείσθω τὸ ἐπὶ Η ΒΖ· ὅλον ἄρα τὸ ἐπὶ Η ΖΔ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ἐπὶ ΑΒΓ καὶ τῷ ἐπὶ Η ΒΖ, ὃ

4. τοῦ ἐπὶ ΑΕ ΓΖ Co pro τοῦ ἐπὶ ΑΒ ΓΖ 7. ι' add. BS
τὸ Ζ del. Hu 9. Η ΑΖ Co in Lat. versione pro ΗΖΑ 44. 12. Η
ΒΖ· ὅλον ἄρα τὸ ἐπὶ τῶν add. Co 48. ἐστὶν τὸ τε Α, corr. BS καὶ
τὸ ΑΒ, corr. S 44. ἐστὶ Α· BS 44. 45. ἐπὶ ΑΖ ΓΒ Co pro ἐπὶ ΑΗ
ΓΒ 46. ἐπὶ Η ΑΖ Co pro ἐπὶ ΗΑΖ τὸ ἐπὶ ΑΖ ΒΓ Ge auctore
Co pro τὸ ἐπὶ ΑΖ ΑΓ 47. ἡ add. BS 48. ἄρα add. Hu 49. ὅπερ
ο Α, ὅπερ εἶδει BS 51. ια' add. BS 52. καὶ τὴν — ὑπεροχὴ Α,

$$\begin{aligned}
 \eta \cdot \delta \zeta &= \epsilon \zeta \cdot \gamma \beta + \alpha \epsilon \cdot \gamma \zeta, \text{ sive, quia est } \epsilon \zeta \cdot \gamma \beta = \epsilon \zeta \cdot \zeta \gamma \\
 &\quad + \beta \zeta \cdot \zeta \epsilon, \\
 &= \epsilon \zeta \cdot \zeta \gamma + \beta \zeta \cdot \zeta \epsilon + \alpha \epsilon \cdot \gamma \zeta, \text{ sive compositis } \epsilon \zeta \cdot \zeta \gamma \\
 &\quad + \alpha \epsilon \cdot \gamma \zeta, \\
 &= \alpha \zeta \cdot \zeta \gamma + \beta \zeta \cdot \zeta \epsilon.
 \end{aligned}$$

In secundum epitagma tertii problematis.

X. iam sit punctum ζ extra $\alpha\beta$; dico esse $\alpha \zeta \cdot \zeta \gamma$ — Prop. 50
 $\epsilon \zeta \cdot \zeta \beta = \eta \cdot \delta \zeta$.




Quoniam enim propter lemma II est $\eta \cdot \delta \beta$
 $= \alpha \beta \cdot \beta \gamma$, commune addatur $\eta \cdot \beta \zeta$; est igitur

$$\begin{aligned}
 \eta \cdot \delta \zeta &= \alpha \beta \cdot \beta \gamma + \eta \cdot \beta \zeta, \text{ sive, quia ex hypothesi lemm. VIII) est } \eta = \alpha \epsilon + \gamma \beta, \text{ et} \\
 &\text{compositis } \alpha \beta \cdot \beta \gamma + \gamma \beta \cdot \beta \zeta, \\
 &= \alpha \zeta \cdot \beta \gamma + \alpha \epsilon \cdot \beta \zeta. \text{ Sed, ut supra lemm. VII) demonstravimus, est}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \alpha \zeta \cdot \beta \gamma + \alpha \epsilon \cdot \beta \zeta &= \alpha \zeta \cdot \zeta \gamma - \epsilon \zeta \cdot \zeta \beta; \text{ ergo etiam} \\
 \eta \cdot \delta \zeta &= \alpha \zeta \cdot \zeta \gamma - \epsilon \zeta \cdot \zeta \beta, \text{ q. e. d.}
 \end{aligned}$$

In tertium epitagma primi problematis.

XI. Sit $\alpha \delta \cdot \delta \gamma = \beta \delta \cdot \delta \epsilon$, et recta $\eta = \alpha \epsilon - \beta \gamma$, ac sumatur punctum aliquod ζ inter ϵ et β : dico esse $\alpha \zeta \cdot \zeta \gamma$ — Prop. 51
 $\epsilon \zeta \cdot \zeta \beta = \eta \cdot \zeta \delta$.



Quoniam enim propter lemma III est $\eta \cdot \beta \delta = \alpha \beta \cdot \beta \gamma$, commune addatur $\eta \cdot \beta \zeta$; est igitur
 $\eta \cdot \zeta \delta = \alpha \beta \cdot \beta \gamma + \eta \cdot \beta \zeta$, id est

ἔστιν τῷ ἐπὶ τῆς τῶν AE BF ὑπεροχῆς καὶ τῆς BZ . ἀλλὰ τὸ ἐπὶ ABF τὸ ἐπὶ AZ BF ἔστιν καὶ τὸ ἐπὶ ZB BF . γέγονεν οὖν τὸ ἐπὶ HZA ἴσον τῷ τε ἐπὶ τῶν AZ BF καὶ τῷ ἐπὶ GB BZ καὶ τῷ ἐπὶ τῆς τῶν AE $ΓB$ ὑπεροχῆς καὶ τῆς BZ . τὸ δὲ ἐπὶ $ΓB$ BZ μετὰ τοῦ ἐπὶ τῆς τῶν AE $ΓB$ ὑπεροχῆς καὶ τῆς BZ ὅλον ἔστιν τὸ ἐπὶ AE ZB . τὸ οὖν ἐπὶ HZA ἴσον ἔστιν τῷ τε ἐπὶ τῶν AZ $ΓB$ καὶ τῷ ἐπὶ AE ZB . ἀλλὰ τὸ ἐπὶ AZ BF μετὰ τοῦ ἐπὶ AE ZB ὑπεροχῆς ἔστιν ἢ ὑπερέχει τὸ ἐπὶ AZ $Γ$ τοῦ ἐπὶ EZB . τὸ ἄρα ἐπὶ AZ $Γ$ τοῦ ἐπὶ EZB ὑπερέχει τῷ ἐπὶ HZA , ὥστε: ~

10

Εἰς τὸ πρῶτον ἐπίταγμα τοῦ δευτέρου προβλήματος.

106 ιβ'. Τῶν αὐτῶν ἐποκειμένων ἔστω τὸ Z σημεῖον μεταξὺ τῶν B $Γ$. ὅτι τὸ ἐπὶ AZ $Γ$ μετὰ τοῦ ἐπὶ EZB ἴσον ἔστιν τῷ ἐπὶ τῆς H καὶ τῆς ZA .

Ἐπεὶ γὰρ τὸ ἐπὶ HZA ἴσον ἔστιν τῷ ἐπὶ $EΓB$, καὶ τὸν προσκείσθω τὸ ἐπὶ HZA . ὅλον ἄρα τὸ ἐπὶ HZA τῷ ἐπὶ $EΓB$ καὶ τῷ ἐπὶ HZA ἔστιν ἴσον. ἀλλὰ τὸ μὲν ἐπὶ HZA τὸ ἐπὶ τῆς τῶν AE BF ἔστιν ὑπεροχῆς καὶ τῆς $ZΓ$, τὸ δὲ ἐπὶ $EΓB$ τὸ ἐπὶ $BΓZ$ ἔστιν καὶ τὸ ἐπὶ EZ BF . γέγονεν οὖν τὸ ἐπὶ HZA ἴσον τῷ ἐπὶ EZ BF καὶ τῷ ἐπὶ $BΓZ$ καὶ τῷ ἐπὶ τῆς τῶν AE BF ὑπεροχῆς καὶ τῆς $ΓZ$. τὸ δὲ ἐπὶ τῆς τῶν AE BF ὑπεροχῆς καὶ τῆς $ΓZ$ μετὰ τοῦ ἐπὶ $BΓZ$ ὅλον ἔστιν τὸ ἐπὶ AE $ΓZ$. τὸ ἄρα ἐπὶ HZA ἴσον ἔστιν τῷ τε ἐπὶ AE $ΓZ$ καὶ τῷ ἐπὶ EZ $ΓB$. ἀλλὰ τὸ μὲν ἐπὶ EZ BF τὸ τε ἐπὶ EZ $ZΓ$ ἔστιν καὶ τὸ ἐπὶ EZ ZB , τὸ δὲ ἐπὶ EZ $Γ$ μετὰ τοῦ ἐπὶ AE $ZΓ$ ὅλον ἔστιν τὸ ἐπὶ AZ $Γ$. εἰχομεν δὲ καὶ τὸ ἐπὶ EZB . τὸ ἄρα ἐπὶ AZ $Γ$ μετὰ τοῦ ἐπὶ EZB ἴσον ἔστιν τῷ ἐπὶ HZA , ὥστε: ~

3. οὖν τὸ ἐπὶ HZ ZA ABS, corr. Hu auctore Co 5. τῶν
 1E $ΓB$ Co pro τῶν AE $ΓB$ 6. ἐπὶ 1E ZB Co pro ἐπὶ AEZ
 οὖν om. S cod. Co, unde ἄρα post HZA add. Co 7. $FEZB$ A.
 distinx. BS 8. τὸ ἐπὶ AZB A¹, ad quae nescio quae manus postea

$$\begin{aligned}\eta \cdot \zeta \delta &= \alpha \beta \cdot \beta \gamma + (\alpha \varepsilon - \beta \gamma) \cdot \beta \zeta, \text{ sive, quia est } \alpha \beta \cdot \beta \gamma \\ &= \alpha \zeta \cdot \beta \gamma + \zeta \beta \cdot \beta \gamma, \\ &= \alpha \zeta \cdot \beta \gamma + \beta \gamma \cdot \beta \zeta + (\alpha \varepsilon - \beta \gamma) \cdot \beta \zeta, \text{ id est} \\ &= \alpha \zeta \cdot \beta \gamma + \alpha \varepsilon \cdot \beta \zeta.\end{aligned}$$


Sed, ut supra sub finem lemmatis VII demonstravimus, est

$$\alpha \zeta \cdot \beta \gamma + \alpha \varepsilon \cdot \beta \zeta = \alpha \zeta \cdot \zeta \gamma - \varepsilon \zeta \cdot \zeta \beta; \text{ ergo etiam}$$

$$\eta \cdot \zeta \delta = \alpha \zeta \cdot \zeta \gamma - \varepsilon \zeta \cdot \zeta \beta, \text{ q. e. d.}$$

In primum epitagma secundi problematis.

XII. Iisdem suppositis sit punctum ζ inter β et γ ; dico Prop. 52
esse $\alpha \zeta \cdot \zeta \gamma + \varepsilon \zeta \cdot \zeta \beta = \eta \cdot \zeta \delta$.



Quoniam enim
propter lemma III
est $\eta \cdot \gamma \delta = \varepsilon \gamma \cdot \gamma \beta$,
commune addatur
 $\eta \cdot \zeta \gamma$: est igitur

$$\begin{aligned}\eta \cdot \zeta \delta &= \varepsilon \gamma \cdot \gamma \beta + \eta \cdot \zeta \gamma, \text{ sive, quia ex hypothesi est} \\ &\quad \eta \cdot \zeta \gamma = \alpha \varepsilon - \beta \gamma, \zeta \gamma, \text{ et} \\ &\quad \varepsilon \gamma \cdot \gamma \beta = \varepsilon \zeta \cdot \beta \gamma + \zeta \gamma \cdot \beta \gamma, \\ &= \varepsilon \zeta \cdot \beta \gamma + \zeta \gamma \cdot \beta \gamma + (\alpha \varepsilon - \beta \gamma) \cdot \zeta \gamma \\ &= \varepsilon \zeta \cdot \beta \gamma + \alpha \varepsilon \cdot \zeta \gamma \\ &= \varepsilon \zeta \cdot \zeta \gamma + \varepsilon \zeta \cdot \zeta \beta + \alpha \varepsilon \cdot \zeta \gamma, \text{ sive compositis } \varepsilon \zeta \cdot \zeta \gamma \\ &\quad + \alpha \varepsilon \cdot \zeta \gamma, \\ &= \alpha \zeta \cdot \zeta \gamma + \varepsilon \zeta \cdot \zeta \beta, \text{ q. e. d.}\end{aligned}$$

Γ addidit, distinxi. BS μετά τοῦ $\overline{AEZ}$ ABS, corr. Hu auctore Co
10. ὁπερ BS, ο A 12. $\overline{IB}$ A¹ in marg. (BS 13. τῶν $\overline{BI}$ A, distinxi.
BS 14. ἐστὶ A¹ BS τῆς H Hu pro τῶν H 16. τὸ ἐπὶ $\overline{HZ}$
λόγον ἔρα AB, τὸ ἐπὶ $\overline{\eta\zeta}$. ἀνάλογον ἔρα S, corr. Co 18. τῶν $\overline{IEBF}$
A, distinxi. BS 20. ἴσον τῶν ἐπὶ $\overline{IZB}$ A(BS, corr. Co 21. τῶν
 $\overline{AEBF}$ A, distinxi. BS 22. 23. τὸ δὲ ἐπὶ — τῆς $\overline{IZ}$ add. Co
23. ἐπὶ $\overline{AEFZ}$ A, distinxi. BS, item vs. 24 26. ἐστὶν καὶ τὸ ἐπὶ
 $\overline{BI}$ $\overline{IZ}$ A(BS), ἐστὶν καὶ τὸ ἐπὶ $\beta\gamma$ $\gamma\beta$ e suo codice assert Co, ἐστὶ καὶ
τὸ ἐπὶ $\overline{BI}$ $\overline{BZ}$ Ge. corr. Co ἐπὶ $\overline{EZF}$ Co pro ἐπὶ $\overline{BZF}$
26. 27. ἐπὶ $\overline{AEZI}$ A, distinxi. BS 27. τὸ ἐπὶ $\overline{AZI}$ A¹ S Co, τὸ
ἐπὶ $\overline{\alpha\gamma}$ B cod. Co

Εἰς τὸ τρίτον ἐπίταγμα τοῦ τρίτου προβλήματος.

- 107 ιγ'. Ἐστω πάλιν τὸ σημεῖον μεταξύ τῶν Γ Δ· ὅτι τὸ ἐπὶ ΑΖΓ τοῦ ἐπὶ ΕΖΒ ἐλλείπει τῷ ἐπὶ Η ΖΔ.

Ἐπεὶ γὰρ τὸ ἐπὶ Η ΓΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ἐπὶ ΕΓΒ, κοινὸν ἀφηρήσθω τὸ ἐπὶ Η ΓΖ· λοιπὸν ἄρα τὸ ἐπὶ Η ΖΔ εὐπεροχὴ ἐστίν, ἣ ὑπερέχει τὸ ἐπὶ ΕΓΒ τοῦ ἐπὶ Η ΓΖ, τοιούτεστιν τοῦ ἐπὶ τῆς τῶν ΑΕ ΓΒ εὐπεροχῆς καὶ τῆς ΓΖ. ὧ δὲ ὑπερέχει τὸ ἐπὶ ΕΓΒ τοῦ ἐπὶ τῆς τῶν ΑΕ ΓΒ εὐπεροχῆς καὶ τῆς ΓΖ, κοινοῦ προστεθέντος τοῦ ἐπὶ ΖΓΒ, τοῦτω ὑπερέχει τὸ ἐπὶ ΕΖ ΒΓ τοῦ ἐπὶ ΑΕ ΓΖ. ὧ δὲ ὑπερέχει τὸ ἐπὶ ΕΖ ΒΓ τοῦ ἐπὶ ΑΕ ΓΖ, κοινοῦ προστεθέντος τοῦ ἐπὶ ΕΖΓ, τοῦτω ὑπερέχει τὸ ἐπὶ ΕΖΒ τοῦ ἐπὶ ΑΖΓ· ὥστε τὸ ἐπὶ ΑΖΓ τοῦ ἐπὶ ΕΖΒ ἐλλείπει τῷ ἐπὶ τῆς Η καὶ τῆς ΖΔ.

Εἰς τὸ τρίτον ἐπίταγμα τοῦ τρίτου προβλήματος.


- 108 ιδ'. Ἀλλὰ ἔστω ἐκτὸς τὸ Ζ σημεῖον· ὅτι πάλιν τὸ ἐπὶ ΑΖΓ τοῦ ἐπὶ ΕΖΒ ὑπερέχει τῷ ἐπὶ Η ΖΔ.

Ἐπεὶ γὰρ τὸ ἐπὶ ΗΓΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ἐπὶ ΕΓΒ, ἀμφοτέρω ἀφηρήσθω ἀπὸ τοῦ ἐπὶ Η ΓΖ· λοιπὸν ἄρα τὸ ἐπὶ ΗΑΖ ἢ εὐπεροχὴ ἐστίν ἢ ὑπερέχει τὸ ἐπὶ Η ΓΖ τοῦ ἐπὶ ΕΓΒ. ὧ δὲ ὑπερέχει τὸ ἐπὶ Η ΓΖ τοῦ ἐπὶ ΕΓΒ, κοινοῦ προστεθέντος τοῦ ἐπὶ ΒΓΖ, τοῦτω ὑπερέχει τὸ ἐπὶ ΑΕ ΓΖ τοῦ ἐπὶ ΕΖ ΒΓ· ἢ γὰρ τῶν ΑΕ ΒΓ εὐπεροχὴ μετὰ τῆς ΒΓ ἢ ΑΕ ἐστίν. ὧ δὲ πάλιν ὑπερέχει τὸ ἐπὶ ΑΕ ΓΖ

2. ιγ' add. BS τῶν ΓΔ A, distinx. BS 7. ἐπὶ τῆς Co pro ἐπὶ καὶ τῶν ΑΕΓΒ A, distinx. BS 8. ὧς δὲ A, corr. BS post ὑπερέχει rasura duarum fere litterarum in A τὸ ἐπὶ ΕΓΒ Co pro τὸ ἐπὶ ΑΓΒ 10. τὸ ἐπὶ ΑΕΓΖ A, τὸ ἐπὶ αὐ γζ BS, τοῦ pro τὸ corr. V 10. 11. ὧ δὲ — ΑΕ ΓΖ add. Hu 16. ιδ' add. BS 17. τῷ ἐπὶ ΗΓΖ A³ ex τῷ ἐπὶ ΗΓ 19. λοιπὸν Co pro ὅλον 21. ὧ δὲ — ΕΓΒ add. Hu 22. 23. ἐπὶ ΑΕΓΖ τοῦ ἐπὶ ΕΖΗΓ A, distinx. BS 23. γὰρ Co pro ἄρα τῶν ΑΕΒΓ A, distinx. B, τῶν αὐ γζ S Ge 24. τὸ ἐπὶ ΑΕΓΖ A, distinx. BS

In tertium epitagma tertii problematis.

XIII. Sit rursus punctum ζ inter γ et δ ; dico esse $\epsilon\zeta \cdot \zeta\beta$ Prop. 33
 $-\alpha\zeta \cdot \zeta\gamma = \eta \cdot \zeta\delta$.



Quoniam propter
 lemma III est $\eta \cdot \gamma\delta$
 $= \epsilon\gamma \cdot \gamma\beta$, commune
 subtrahatur $\eta \cdot \gamma\zeta$;
 restat igitur

$$\eta \cdot \zeta\delta = \epsilon\gamma \cdot \gamma\beta - \eta \cdot \gamma\zeta, \text{ id est (ex hypoth. lemm. XI)} \\ = \epsilon\gamma \cdot \gamma\beta - (\alpha\epsilon - \beta\gamma) \cdot \gamma\zeta.$$

Sed ad hanc differentiam commune addatur $\zeta\gamma \cdot \gamma\beta$; est igitur


$$\epsilon\gamma \cdot \gamma\beta - (\alpha\epsilon - \beta\gamma) \cdot \gamma\zeta = \epsilon\gamma \cdot \gamma\beta + \zeta\gamma \cdot \gamma\beta - \\ [(\alpha\epsilon - \beta\gamma) \cdot \gamma\zeta + \beta\gamma \cdot \gamma\zeta] \\ = \epsilon\zeta \cdot \beta\gamma - \alpha\epsilon \cdot \gamma\zeta.$$

Sed ad differentiam $\epsilon\zeta \cdot \beta\gamma - \alpha\epsilon \cdot \gamma\zeta$ commune addatur $\epsilon\zeta \cdot \zeta\gamma$;
 est igitur

$$\epsilon\zeta \cdot \beta\gamma - \alpha\epsilon \cdot \gamma\zeta = \epsilon\zeta \cdot \beta\gamma + \epsilon\zeta \cdot \zeta\gamma - (\alpha\epsilon \cdot \gamma\zeta + \epsilon\zeta \cdot \zeta\gamma) \\ = \epsilon\zeta \cdot \zeta\beta - \alpha\zeta \cdot \zeta\gamma. \text{ Itaque etiam} \\ \eta \cdot \zeta\delta = \epsilon\zeta \cdot \zeta\beta - \alpha\zeta \cdot \zeta\gamma.$$

In tertium epitagma tertii problematis.

XIV. Sed sit extra $\alpha\delta$ punctum ζ ; dico vice versa esse Prop. 54
 $\alpha\zeta \cdot \zeta\gamma - \epsilon\zeta \cdot \zeta\beta = \eta \cdot \delta\zeta$.



Quoniam enim propter lemma III est $\eta \cdot \gamma\delta = \epsilon\gamma \cdot \gamma\beta$,
 utrumque subtrahatur ab $\eta \cdot \gamma\zeta$; restat igitur

$$\eta \cdot \delta\zeta = \eta \cdot \gamma\zeta - \epsilon\gamma \cdot \gamma\beta.$$

Sed ad hanc differentiam commune addatur $\beta\gamma \cdot \gamma\zeta$; est igitur

$$\eta \cdot \gamma\zeta - \epsilon\gamma \cdot \gamma\beta = \eta \cdot \gamma\zeta + \beta\gamma \cdot \gamma\zeta - (\epsilon\gamma \cdot \gamma\beta + \beta\gamma \cdot \gamma\zeta), \\ \text{sive, quia ex hypothesi (lemm. XI)} \\ \text{est } \eta = \alpha\epsilon - \beta\gamma, \\ = \alpha\epsilon \cdot \gamma\zeta - \epsilon\zeta \cdot \beta\gamma.$$

τοῦ ὑπὸ EZ $BΓ$, κοινῷ προστεθέντος τοῦ ἐπὶ $EZΓ$, αὐτὸν
ὑπερέχει τὸ ὑπὸ $AZΓ$ τοῦ ὑπὸ EZB . τὸ ἄρα ἐπὶ AZF
τοῦ ὑπὸ EZB ὑπερέχει τῷ ὑπὸ $H AZ$.


Εἰς τὸ τρίτον ἐπίταγμα τοῦ τρίτου προβλήματος.

- 109 ιε'. Πάλιν ἔστω τὸ Z σημεῖον μεταξὺ τῶν $A E$. ὅτι
τὸ ὑπὸ $AZΓ$ μετὰ τοῦ ὑπὸ EZB ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ $H ZA$.

Ἐπεὶ τὸ ὑπὸ $H BΔ$ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ $ABΓ$, κοινὸν
προσκεισθῶ τὸ ὑπὸ $H BZ$. ὅλον ἄρα τὸ ὑπὸ $H ZA$ ἴσον
ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ $ABΓ$ καὶ τῷ ὑπὸ $H ZB$. ἀλλὰ τὸ μὲν
ὑπὸ $ABΓ$ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ $AZ BΓ$ καὶ τῷ ὑπὸ $ZBΓ$,
τὸ δὲ ὑπὸ τῆς τῶν $AE BΓ$ ἐπεροχῆς καὶ τῆς ZB μετὰ
τοῦ ὑπὸ $ΓBZ$ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ $AE BZ$. τὸ ὑπὸ $AE BZ$
ἄρα ἐστὶν τὸ τε ὑπὸ BZE καὶ τὸ ὑπὸ AZB , ὃ μετὰ τοῦ
ὑπὸ $AZ BΓ$ ἐστὶν τὸ ὑπὸ $AZΓ$. τὸ οὖν ὑπὸ $AZΓ$ μετὰ
τοῦ ὑπὸ BZE ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ $H ZA$, ὅπερ: ~

Εἰς τὸ τρίτον ἐπίταγμα τοῦ τρίτου προβλήματος.

- 110 ις'. Ἐστω δὲ πάλιν ἐκτὸς τὸ Z σημεῖον. ὅτι τὸ ὑπὸ
 $AZΓ$ τοῦ ὑπὸ EZB ἐλλείπει τῷ ὑπὸ $H ZA$.



Ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ τῶν $H AΔ$ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ BAE ,
κοινὸν προσκεισθῶ τὸ ὑπὸ $H AZ$. ὅλον ἄρα τὸ ὑπὸ $H AZ$
ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ BAE καὶ τῷ ὑπὸ τῆς τῶν $AE ΓB$


1. τὸ ὑπὸ $ΓZ$ — $BΓ$ ABS , τοῦ corr. Ge 2. τὸ ὑπὸ $AZ ZΓ$ τοῦ
ὑπὸ EZ ABS , corr. Ill auctore Co 4. Εἰς τὸ πρῶτον ἐπίταγμα τοῦ
δευτέρου προβλ. conl. Simsonus p. 49. 163 ἐπίταγμα A^4 ex ἐπὶ
3. ιε' add. BS Πάλιν om. S τῶν $AE A$, distinx. BS 10. ὑπὸ
 $AZBΓ$ A, distinx. BS 11. τῶν $AE BΓ$ A, distinx. BS 12. τῷ ὑπὸ
 $AE BZ$ A, distinx. BS τὸ ὑπὸ $AE BZ$ add. Co 13. ὑπὸ BZE Co
pro ὑπὸ $BZΓ$ 13. 14. μετὰ τοῦ ὑπὸ AZB $A^4 B$, μετὰ τοῦ ὑπὸ $A. B$

Sed rursus ad differentiam $\alpha\epsilon \cdot \gamma\zeta - \epsilon\zeta \cdot \beta\gamma$ commune addatur $\epsilon\zeta \cdot \zeta\gamma$; est igitur.

$$\begin{aligned}\alpha\epsilon \cdot \gamma\zeta - \epsilon\zeta \cdot \beta\gamma &= \alpha\epsilon \cdot \gamma\zeta + \epsilon\zeta \cdot \zeta\gamma - \epsilon\zeta \cdot \beta\gamma + \epsilon\zeta \cdot \zeta\gamma \\ &= \alpha\zeta \cdot \zeta\gamma - \epsilon\zeta \cdot \zeta\beta. \quad \text{Ergo etiam} \\ \eta \cdot \delta\zeta &= \alpha\zeta \cdot \zeta\gamma - \epsilon\zeta \cdot \zeta\beta.\end{aligned}$$

In tertium epitagma tertii problematis, vel potius, ut videtur,
in primum secundi.

XV. Sit rursus punctum ζ inter α et ϵ ; dico esse $\alpha\zeta \cdot \zeta\gamma$ Prop. 53
+ $\epsilon\zeta \cdot \zeta\beta = \eta \cdot \zeta\delta$.



$$\begin{aligned}\eta \cdot \zeta\delta &= \alpha\beta \cdot \beta\gamma + \eta \cdot \beta\zeta, \quad \text{sive, quia est } \alpha\beta \cdot \beta\gamma = \alpha\zeta \cdot \beta\gamma \\ &\quad + \zeta\beta \cdot \beta\gamma, \quad \text{et ex hypothesi} \\ &\quad \text{lemm. XI } \eta = \alpha\epsilon - \beta\gamma, \\ &= \alpha\zeta \cdot \beta\gamma + \zeta\beta \cdot \beta\gamma + [\alpha\epsilon - \beta\gamma] \cdot \beta\zeta \\ &= \alpha\zeta \cdot \beta\gamma + \alpha\epsilon \cdot \beta\zeta, \quad \text{sive, quia est } \alpha\epsilon \cdot \beta\zeta = \alpha\zeta \cdot \zeta\beta \\ &\quad + \epsilon\zeta \cdot \zeta\beta, \quad \text{et compositis } \alpha\zeta \cdot \beta\gamma \\ &\quad + \alpha\zeta \cdot \zeta\beta, \\ &= \alpha\zeta \cdot \zeta\gamma + \epsilon\zeta \cdot \zeta\beta, \quad \text{q. e. d.}\end{aligned}$$

In tertium epitagma tertii problematis.

XVI. Iam sit rursus punctum ζ extra $\alpha\delta$; dico esse Prop. 56
 $\epsilon\zeta \cdot \zeta\beta - \alpha\zeta \cdot \zeta\gamma = \eta \cdot \zeta\delta$.

Quoniam enim propter lemma III est $\eta \cdot \alpha\delta = \beta\alpha \cdot \alpha\epsilon$, commune addatur $\eta \cdot \alpha\zeta$; est igitur

$$\begin{aligned}\eta \cdot \zeta\delta &= \beta\alpha \cdot \alpha\epsilon + \eta \cdot \alpha\zeta, \quad \text{sive, quia ex hypothesi lemm. XI} \\ &\quad \text{est } \eta = \alpha\epsilon - \beta\gamma, \\ &= \beta\alpha \cdot \alpha\epsilon + [\alpha\epsilon - \beta\gamma] \cdot \alpha\zeta, \quad \text{id est}\end{aligned}$$

mutavit vetusta m. in A et sic S. corr. Co 15. $\delta\alpha\epsilon\gamma$ BS, o A
17. $\epsilon\zeta$ add. BS 20. $\epsilon\pi\delta$ H AZ ante $\delta\lambda\alpha\epsilon$ Co pro $\epsilon\pi\delta$ H A I
21. $\epsilon\omega\iota$ $\overline{HEFB}$ A, distinx. BS

ὑπεροχῆς καὶ τῆς AZ . ἀλλὰ τὸ ὑπὸ BAE μετὰ τοῦ ὑπὸ τῆς
 τῶν AE GB ὑπεροχῆς καὶ τῆς AZ ὅλον ἐστὶν τὸ ὑπὸ ZB AE
 λείπον τῷ ὑπὸ ZA $BΓ$, ὥστε καὶ τὸ ὑπὸ H ZA ἢ ὑπερ-
 οχῇ ἐστίν, ἢ ὑπερέχει τὸ ὑπὸ BZ AE τοῦ ὑπὸ ZA $BΓ$.
 ἀλλὰ ὅτι τὸ ὑπὸ ZB AE τοῦ ὑπὸ ZA $BΓ$ ὑπερέχει, κοι-
 νοῦ προστεθέντος τοῦ ὑπὸ BZA , τοῦτ' ὑπερέχει καὶ τὸ
 ὑπὸ BZE τοῦ ὑπὸ $ΓZA$. τὸ οὖν ὑπὸ BZE τοῦ ὑπὸ $ΓZA$
 ὑπερέχει τῷ ὑπὸ H ZA , ὥστε τὸ ὑπὸ $ΓZA$ τοῦ ὑπὸ BZE
 ἐλλείπει τῷ ὑπὸ H ZA , ὅπερ: ~

Εἰς τὸ τρίτον ἐπίταγμα τοῦ πρώτου προβλήματος. 10

- 111 ιγ'. Ἐστω ἡ AB ἴση τῇ $ΓA$, καὶ τεχὸν σημεῖον τὸ E
 μεταξὺ τῶν B $Γ$ σημείων· ὅτι τὸ ὑπὸ AE EA τοῦ ὑπὸ
 BE EG ὑπερέχει τῷ ὑπὸ AG A .

Ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ AE EA ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ AE
 EG , τοιούτεσιν τῷ τε ὑπὸ BE EG καὶ τῷ ὑπὸ AB EG , 15
 καὶ ἔτι τῷ ὑπὸ AE $ΓA$, τὸ ἄρα ὑπὸ AE EA τοῦ ὑπὸ
 BE EG ὑπερέχει τῷ τε ὑπὸ EG AB , τοιούτεσιν τῷ ὑπὸ
 EG $ΓA$ ἴσαι γὰρ εἰσιν αἱ AB $ΓA$, καὶ τῷ ὑπὸ AE $ΓA$.
 ἀλλὰ τὸ τε ὑπὸ EG $ΓA$ καὶ τὸ ὑπὸ AE $ΓA$ γίνεται ὅλον τὸ
 ὑπὸ AG $ΓA$. τὸ ἄρα ὑπὸ AE EA τοῦ ὑπὸ BE EG ὑπερ- 20
 ἔχει τῷ ὑπὸ AG $ΓA$.

Εἰς τὸ πρῶτον ἐπίταγμα τοῦ δευτέρου προβλήματος.

- 112 ιδ'. Ἐστω ἡ AB ἴση τῇ $ΓA$, καὶ εἰλήφθω τι σημεῖον
 μεταξὺ τῶν $Γ$ A τὸ E . ὅτι τὸ ὑπὸ AE EA μετὰ τοῦ ὑπὸ
 BE EG ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ AG A . 25

1. 2. ἀλλὰ τὸ ὑπὸ — ὅλον ἐστὶν add. Hu pro his τοιούτεσιν volu-
 erat Simsonus p. 50; longe aliter, at vix rectius, Co: πάλιν κοινὸν προσ-
 κέσθω τὸ ὑπὸ ZA $BΓ$. ἀλλὰ τὸ μὲν ὑπὸ τῆς τῶν AE $BΓ$ ὑπεροχῆς
 καὶ τῆς AZ μετὰ τοῦ ὑπὸ ZA $BΓ$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ZAE , τὸ δὲ ὑπὸ
 BAE μετὰ τοῦ ὑπὸ ZAE ὅλον ἐστὶ τὸ ὑπὸ ZB AE . τὸ ἄρα ὑπὸ ZB
 AE ἴσον ἐστὶ τῷ τε ὑπὸ H AZ καὶ τῷ ὑπὸ ZA $BΓ$, ὥστε καὶ ccl.;
 conf. adnot. ad Latina. 3. λείπον τῷ Hu pro λοιπὸν τὸ 3. 4. ὥστε
 καὶ — τοῦ ὑπὸ ZA $BΓ$ his scripta sunt in ABS, corr. V 3. καὶ τὸ
 A ex καὶ τὰ 4. $BZAE$ τοῦ ὑπὸ $ZABΓ$ A. distinx. BS 5. ὅ

$$\begin{aligned} \eta \cdot \zeta\delta &= \beta\alpha \cdot \alpha\epsilon + \alpha\epsilon \cdot \alpha\zeta - \beta\gamma \cdot \alpha\zeta, \text{ sive compositis } \beta\alpha \cdot \alpha\epsilon \\ &\quad + \alpha\epsilon \cdot \alpha\zeta^*, \\ &= \zeta\beta \cdot \alpha\epsilon - \zeta\alpha \cdot \beta\gamma. \end{aligned}$$

Sed ad hanc differentiam addatur commune $\beta\zeta \cdot \zeta\alpha$; est igitur

$$\begin{aligned} \zeta\beta \cdot \alpha\epsilon - \zeta\alpha \cdot \beta\gamma &= \zeta\beta \cdot \alpha\epsilon + \beta\zeta \cdot \zeta\alpha - \zeta\alpha \cdot \beta\gamma + \beta\zeta \cdot \zeta\alpha, \\ &= \beta\zeta \cdot \zeta\epsilon - \gamma\zeta \cdot \zeta\alpha; \text{ ergo etiam} \\ \eta \cdot \zeta\delta &= \beta\zeta \cdot \zeta\epsilon - \gamma\zeta \cdot \zeta\alpha, \text{ q. e. d.} \end{aligned}$$

In tertium epitagma primi problematis.

XVII. Sit $\alpha\beta = \gamma\delta$, et quodvis punctum ϵ inter β et γ ; Prop.
dico esse $\alpha\epsilon \cdot \epsilon\delta - \beta\epsilon \cdot \epsilon\gamma$ 57

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & & & \\ & & & & & & \\ a & & \beta & & \epsilon & & \gamma & & \delta \end{array} = \alpha\gamma \cdot \gamma\delta.$$

Quoniam enim est

$$\begin{aligned} \alpha\epsilon \cdot \epsilon\delta &= \alpha\epsilon \cdot \epsilon\gamma + \alpha\epsilon \cdot \gamma\delta, \text{ id est} \\ &= \alpha\beta \cdot \epsilon\gamma + \beta\epsilon \cdot \epsilon\gamma + \alpha\epsilon \cdot \gamma\delta, \text{ est igitur} \\ \alpha\epsilon \cdot \epsilon\delta - \beta\epsilon \cdot \epsilon\gamma &= \alpha\beta \cdot \epsilon\gamma + \alpha\epsilon \cdot \gamma\delta, \text{ id est, quia } \alpha\beta = \gamma\delta, \\ &= \epsilon\gamma \cdot \gamma\delta + \alpha\epsilon \cdot \gamma\delta, \text{ sive} \\ &= \alpha\gamma \cdot \gamma\delta. \end{aligned}$$

In primum epitagma secundi problematis.

XVIII. Sit $\alpha\beta = \gamma\delta$ et sumatur punctum aliquod ϵ in- Prop.
ter γ et δ ; dico esse $\alpha\epsilon \cdot \epsilon\delta + \beta\epsilon \cdot \epsilon\gamma = \alpha\gamma \cdot \gamma\delta$. 58

*. Hoc ego addidi vestigiis antiquae scripturae accurate insistens; aliter Co ad aequationem $\eta \cdot \zeta\delta = \beta\alpha \cdot \alpha\epsilon + (\alpha\epsilon - \beta\gamma) \cdot \alpha\zeta$ addit commune $\zeta\alpha \cdot \beta\gamma$, ita ut sit


$$\begin{aligned} \eta \cdot \zeta\delta + \zeta\alpha \cdot \beta\gamma &= \beta\alpha \cdot \alpha\epsilon + \zeta\alpha \cdot \alpha\epsilon \\ &= \zeta\beta \cdot \alpha\epsilon; \text{ ergo} \\ \eta \cdot \zeta\delta &= \zeta\beta \cdot \alpha\epsilon - \zeta\alpha \cdot \beta\gamma. \end{aligned}$$

add. Co ZHAE τοῦ ἐπὶ ZAH A, distinx. BS 6. καὶ Co pro
ἀν καὶ 8. τὸ ἐπὶ IZA Co pro τὸ ἐπὶ IZ ἀπὸ 9. διὰ BS, ο Α
11. ἵζ' add. BS Ιση add. Co 16. ἐπὶ AE EI Co pro ἐπὶ AI
18. 19. ἐπὶ AE EI. ἀλλὰ Co pro ἐπὶ AI EI 19. τὸ τε -
AE EI add. Co 22. δευτέρου Hu auctore Simsono p. 53 pro πρώ-
του 23. η' add. BS Ιση add. Co 24. τῶν FI A, distinx. BS
25. ἐστὶ τῇ BS, ἐστὶ τῶν A ἐπὶ FI - p. 753, 1. ἐστὶ ἐστὶ τῇ
add. Co

Ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ τῶν AE, ED ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ τῶν AF, EA καὶ τῷ ὑπὸ FE, ED , κοινὸν προσκεῖσθαι τὸ ὑπὸ BE, EF . τὸ ἄρα ὑπὸ AED μετὰ τοῦ ὑπὸ BEF ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ AF, ED καὶ τῷ ὑπὸ FE, ED καὶ ἔτι τῷ ὑπὸ BE, EF . ἀλλὰ τὸ μὲν ὑπὸ FE, ED μετὰ τοῦ ὑπὸ BE, EF ὅλον ἐστὶν τὸ ὑπὸ BE, ED , τοιούτως τὸ ὑπὸ AF, ED ἴσαι γάρ εἰσιν καὶ ὅλαι αἱ AF, BE , τὸ δὲ ὑπὸ τῶν AF, ED μετὰ τοῦ ὑπὸ AF, ED ὅλον ἐστὶν τὸ ὑπὸ AF, ED . τὸ ἄρα ὑπὸ AED μετὰ τοῦ ὑπὸ BE, EF ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ AF, ED .

Λήμμα χρήσιμον εἰς τοὺς μοναχοὺς τοῦ τε πρώτου καὶ 10
δευτέρου καὶ τοῦ τρίτου ἐπιτάγματος.

- 113 α'. Ἡμικυκλίον ὅπως τοῦ AEB ἐπὶ διαμέτρῳ τῆς BA , καὶ ὁρθῶν τῶν GE, AZ , καὶ ἀχθείας εὐθείας τῆς EZH , καὶ ἐπ' αὐτῆς καθέτου τῆς BH , γίνεται τρίτα· τὸ μὲν ὑπὸ GB, BA ἴσον τῷ ὑπὸ BH , τὸ δὲ ὑπὸ AG, AB τῷ ὑπὸ ZH , τὸ δὲ ὑπὸ AA, GB τῷ ὑπὸ BH .



Ἐπεξεύχθησαν γὰρ αἱ HG, HZ, AZ, ZB . ἐπεὶ οὖν ὁρθὴ ἡ πρὸς τῇ Z , καὶ κάθετος ἡ ZH , ἴση ἐστὶν ἡ 20
ὑπὸ AZB γωνία τῇ ὑπὸ BAZ γωνίᾳ. ἀλλὰ ἡ μὲν ὑπὸ AZB ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ AHB , ἡ δὲ ὑπὸ BAZ , ἔαν ἐπιτευχθῇ ἡ EB , τῇ ὑπὸ BEZ , τοιούτως τῇ ὑπὸ BGH . καὶ 25
ἡ ὑπὸ AHB ἄρα ἴση τῇ BGH . ὥστε τὸ ὑπὸ GBA ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ BH . ἐστὶν δὲ καὶ ὅλον τὸ ὑπὸ ABA ἴσον τῷ ὑπὸ BZ . λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ AG, AB ἴσον ἐστὶν τῷ

2. κοινὸν Co pro καὶ κοινὸν 5. μὲν ὑπὸ FE, ED Co pro μὲν ὑπὸ FE, EB 10. 11. vide adnot. 3 ad Latina 12. 13' add. BS
ὅπως τοῦ τρίτου ἐπιταγ. τῆς BA, AB , corr. S 13. ὁρθῶν αὐτῇ
πρὸς ὁρθῶς conl. Hu; ut conf. infra p. 758, 6 τῶν GE, AZ, A , distinx.
BS 15. ἴσον add. Hu ὑπὸ AG, AB, A , distinx. BS 16. ὑπὸ AA, GB
 A , distinx. BS 18. $HG, HZ, AZ, EB, BH, BH, ZB$ ABS, corr. Hu

Quoniam enim est $\alpha\epsilon \cdot \epsilon\delta$

$$\alpha \quad \beta \quad \gamma \quad \epsilon \quad \delta = \alpha\gamma \cdot \epsilon\delta + \gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta, \text{ commune}$$

addatur $\beta\epsilon \cdot \epsilon\gamma$; est igitur

$$\alpha\epsilon \cdot \epsilon\delta + \beta\epsilon \cdot \epsilon\gamma = \alpha\gamma \cdot \epsilon\delta + \gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta + \beta\epsilon \cdot \epsilon\gamma, \text{ sive com-}$$

positis $\gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta + \beta\epsilon \cdot \epsilon\gamma$,

$$= \alpha\gamma \cdot \epsilon\delta + \beta\delta \cdot \gamma\epsilon, \text{ id est, quia } \beta\delta = \alpha\gamma,$$

$$= \alpha\gamma \cdot \epsilon\delta + \alpha\gamma \cdot \gamma\epsilon, \text{ sive}$$

$$= \alpha\gamma \cdot \gamma\delta.$$

In tertium epitagma tertii problematis¹.

(Vide infra propos. 63.)

Lemma utile ad rationem singularem tertii epitagmatis primi problematis².

• XIX. Si sit semicirculus $\alpha\epsilon\beta$ in diametro $\alpha\beta$, in eaque Prop
59perpendiculares rectae $\gamma\epsilon$ $\delta\zeta$, et ducatur recta $\epsilon\zeta\eta$, in eaque perpendicularis $\beta\eta$, tria fiunt. est enim $\gamma\beta \cdot \beta\delta = \beta\eta^2$, et $\alpha\gamma \cdot \delta\beta = \zeta\eta^2$, et $\alpha\delta \cdot \gamma\beta = \epsilon\eta^2$.

lungantur enim $\eta\gamma$ $\eta\delta$ $\alpha\zeta$ $\zeta\beta$. Quoniam igitur rectus est $\angle \alpha\zeta\beta$, et in $\alpha\beta$ perpendicularis $\delta\zeta$, propter elem. 6, 8 est $\angle \delta\zeta\beta = \angle \beta\alpha\zeta$. Sed primum, quoniam recti sunt anguli $\beta\delta\zeta$ et $\zeta\eta\beta$, ideoque in circulo sunt puncta δ ζ η β elem. 3, 22, in segmento igitur $\delta\beta$ ^{*)} est $\angle \delta\zeta\beta = \angle \delta\eta\beta$ elem. 3, 21; tum iuncta $\epsilon\beta$ in segmento $\zeta\beta$ ^{*)} est $\angle \beta\alpha\zeta = \angle \beta\epsilon\zeta$, et in segmento $\beta\eta$ $\angle \beta\epsilon\zeta = \angle \beta\gamma\eta$; ergo etiam est $\angle \delta\eta\beta = \angle \beta\gamma\eta$. Ergo, communi angulo $\gamma\beta\eta$ triangula $\gamma\beta\eta$ et $\eta\beta\delta$ sunt similia³⁾, ideoque $\gamma\beta : \beta\eta = \eta\beta : \beta\delta$, sive $\gamma\beta \cdot \beta\delta = \beta\eta^2$. Sed est etiam $\alpha\beta \cdot \beta\delta = \beta\zeta^2$, unde si subtrahatur $\gamma\beta \cdot \beta\delta = \beta\eta^2$, restat

1) Hanc propositionem hic interserit Simsonus p. 58 sq.

2) Sic dedi secundum Simsonum p. 54; Graeca perturbata sunt ac fortasse hunc in modum restituenda: *Λήμματα χρήσιμα εἰς τοὺς μοναχοὺς τῶν τρίτων ἐπιταγμάτων τοῦ τε πρώτου καὶ δευτέρου καὶ τρίτου προβλήματος*, ita ut hic titulus spectet ad propos. 59—62 et 64. Quo concesso, ne quid desit, etiam proprium huius lemmatis titulum addere licet: *Εἰς τὸν μοναχὸν τοῦ τρίτου ἐπιτάγματος τοῦ πρώτου προβλήματος*.

* Addita haec secundum Co.


**) Quia sunt in eodem segmento circuli $\zeta\beta$ V2.

3) Idem significat V2.

ἀπὸ ΖΗ. πάλιν ἐπεὶ τὸ ἐπὶ $\Delta B \Gamma$ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΒΕ τετραγώνῳ, ὡς τὸ ἐπὶ $\Gamma B \Delta$ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΒΗ, λοιπὸν ἄρα τὸ ἐπὶ $\Delta \Gamma B$ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΕΗ τετραγώνῳ· γίνεται ἄρα τρία.

Εἰς τὸν μοναχὸν τοῦ τρίτου ἐπιτάγματος τοῦ δευτέρου 5
προβλήματος.

- 114 κ'. Τρίγωνον τὸ $\Delta B \Gamma$, καὶ διήχθωσαν αἱ $\Delta \Delta B Z \Gamma E$, ἔστω δὲ ἡ μὲν $\Delta \Delta$ ἐπὶ τῆς $B \Gamma$ κάθετος, ἐν κύκλῳ δὲ τὰ $\Delta Z E H$ σημεία· ὅτι ὁρθαί εἰσιν αἱ πρὸς τοῖς $Z E$ γωνίαι.



Ἐκβεβλήσθω ἡ $\Delta \Delta$, καὶ 10
τῇ $H \Delta$ ἴση κείσθω ἡ $\Delta \Theta$, καὶ
ἐπεξέχθωσαν αἱ $B \Theta \Theta \Gamma$. ἴση
ἄρα ἐστὶν ἡ Θ γωνία τῇ ἐπὶ
 $B H \Gamma$, τουτέστιν τῇ ἐπὶ $Z H E$.
ἀλλ' ἦν ἡ ἐπὶ $Z H E$ μετὰ τῆς 15
 Δ δυοῖν ὁρθαῖς ἴση· καὶ ἡ ἐπὶ
 $B \Theta \Gamma$ ἄρα μετὰ τῆς Δ δυοῖν
ὁρθαῖς ἴση ἐστὶν· ἐν κύκλῳ
ἄρα ἐστὶν τὰ $\Delta B \Theta \Gamma$ ση-
μεῖα· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ἐπὶ 20
 $B \Delta H$ γωνία τῇ ἐπὶ $B \Gamma \Theta$,

τουτέστιν τῇ ἐπὶ $H \Gamma \Delta$. εἰσὶν δὲ καὶ αἱ πρὸς τῷ H κατὰ
κορυφὴν ἴσαι ἀλλήλαις· λοιπὴ ἄρα ἡ Δ ἴση τῇ πρὸς τῷ E .
ὁρθὴ δὲ ἐστὶν ἡ Δ · ὁρθὴ ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ πρὸς τῷ E ση-
μεῖω. διὰ ταῦτα δὴ καὶ ἡ πρὸς τῷ Z γωνία ὁρθὴ ἐστὶν· 25
ὁρθαί ἄρα εἰσὶν αἱ πρὸς τοῖς $Z E$ σημείοις, ὅπερ· ~

Ὁ μοναχὸς πρώτου προβλήματος τοῦ τρίτου ἐπιτάγματος.

- 115 κα'. Τριῶν δοθεισῶν εὐθειῶν τῶν $AB B \Gamma \Gamma \Delta$, ἐὰν
γένηται ὡς τὸ ἐπὶ $AB \Delta$ πρὸς τὸ ἐπὶ $\Delta \Gamma \Delta$, οὕτως τὸ

5. ἐπιτάγματος τοῦ δευτέρου add. Hu auctore Simsono p. 35 7. κ'
add. BS at $\Delta \Delta B E \Gamma Z \Delta$, corr. V² 8. 9. τὰ $\Delta Z E H \Delta$, τὰ $\xi \epsilon \eta$ S.
corr. BV² nisi quod V² τὰ $\xi \alpha \epsilon \eta$ 9. σημείων Δ , corr. BS τοῖς $Z E$
 Δ , distinx. BS 12. ἐπεξέχθωσαν αἱ Hu pro ἐπεξέχθω ἡ
13. 14. τῇ ἐπὶ $B H H \Gamma \Delta$ AB, corr. S 15. ἀλλ' ἦν ἡ Hu pro ἀλλὰ μὴ
19. τὰ $\Delta B B \Gamma$ σημεία AB, τὰ $\alpha \beta \gamma$ σημεία S, corr. Co 23. λοιπὴ

$\alpha\gamma \cdot \beta\delta = \zeta\eta^2$. Rursus quoniam est $\alpha\beta \cdot \beta\gamma = \beta\epsilon^2$, si hinc subtrahatur $\gamma\beta \cdot \beta\delta = \beta\eta^2$, restat $\alpha\delta \cdot \gamma\beta = \epsilon\eta^2$. Fiant igitur tria quae diximus.

In rationem singularem tertii epitagmatis secundi problematis.

XX. Sit triangulum $\alpha\beta\gamma$, et ducantur $\alpha\delta \beta\zeta \gamma\epsilon$, sit autem $\alpha\delta$ perpendicularis in $\beta\gamma$, et in circulo sint puncta $\alpha \zeta \eta \epsilon$; dico angulos ad puncta ϵ et ζ rectos esse. Prop. 60

Produceatur $\alpha\delta$, et ponatur $\delta\vartheta = \eta\delta$, iunganturque $\beta\vartheta \vartheta\gamma$; ergo aequalia ac similia sunt triangula $\vartheta\delta\gamma$ et $\eta\delta\gamma$, itemque $\vartheta\delta\beta$ et $\eta\delta\beta$, ideoque $\angle \beta\vartheta\gamma = \angle \beta\eta\gamma = \angle \zeta\eta\epsilon$. Sed anguli $\zeta\eta\epsilon + \epsilon\alpha\zeta$ ex hypothesi duobus rectis aequales sunt: ergo etiam anguli $\beta\vartheta\gamma + \epsilon\alpha\zeta$ duobus rectis aequales, itaque puncta $\alpha \beta \vartheta \gamma$ in circulo sunt. Ergo in segmento $\beta\vartheta$ est $\angle \beta\alpha\eta = \angle \beta\gamma\vartheta$, et, propter similitudinem triangulorum $\vartheta\delta\gamma$ et $\eta\delta\gamma$, $\angle \beta\gamma\vartheta = \angle \eta\gamma\delta$. Sed etiam ad verticem η anguli $\epsilon\eta\alpha$ et $\delta\eta\gamma$ aequales sunt; ergo in triangulis $\alpha\epsilon\eta$ et $\gamma\delta\eta$ est etiam $\angle \alpha\epsilon\eta = \angle \gamma\delta\eta$. Rectus autem est $\angle \gamma\delta\eta$; rectus igitur etiam $\angle \alpha\epsilon\eta$. Eadem ratione etiam angulum $\alpha\zeta\eta$ rectum esse demonstratur; recti igitur sunt anguli ad puncta ϵ et ζ , q. e. d.

Ratio singularis tertii epitagmatis primi problematis¹⁾.

XXI. Tribus datis rectis $\alpha\beta \beta\gamma \gamma\delta$, si fiat $\alpha\beta \cdot \beta\delta : \alpha\gamma \cdot \gamma\delta$ Prop. 61

*** Quia ducta recta $\alpha\epsilon$ angulus $\alpha\epsilon\beta$ est rectus, cum sit in semicirculo^{V2}; eadem manus pallidiora atramento aliam demonstrationem addit, quae ad alterum leminatis casum, si sit $\gamma\epsilon = \delta\zeta$, pertinet.

4) V. Simsonum p. 56. 157 sq., qui propositionem sic constituit: "Ratio autem minima determinatur ita. Ostensum fuit . . . datis in recta linea quatuor punctis A B C D, si fiat ut rectangulum ABD ad ipsum ACD, ita quadratum ex BE ad quadratum ex EC. fore E punctum quod facit rationem rectanguli AED ad rectangulum BEC singularem et minimam. Nunc vero ostendendum est rationem hanc eandem esse ei quam habet quadratum ex AD ad quadratum excessus quo recta linea quae potest rectangulum AC BD excedit eam quae potest rectangulum AB CD".

V² Co pro λοιπόν πρὸς τῷ ϵ V² pro πρὸς τῷ Z, item vs. 24

24. σημείον A, corr. BS 25. ταῦτα δὲ AB, τὰ αὐτὰ, omisso δὲ, S καὶ ἡ BS, καὶ μὴ A πρὸς τῷ ζ V² pro πρὸς τῷ E 27. τοῦ αὐτοῦ πρώτου add. Ge. τοῦ τρίτου ἐπιτάγματος τοῦ πρώτου παραλλήματος conii. Hu πρώτου [sine acc. A(V)], corr. BS 28. κα' add. BS

ἀπὸ BE πρὸς τὸ ἀπὸ $EΓ$, ὃ μοναχὸς λόγος καὶ ἐλάχιστός ἐστιν ὁ τοῦ ὑπὸ AEI πρὸς τὸ ἐπὶ BEI . λέγω δὲ· διὰ τὸ αὐτὸς ἐστὶν τῷ τοῦ ἀπὸ τῆς AD πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ὑπεροχῆς ἢ ὑπερέχει ἢ δυναμένη τὸ ἐπὶ AI BA τῆς δυναμένης τὸ ἐπὶ AB $ΓA$.


Γεγραφθῶ περὶ τὴν AA κύκλος, καὶ ἤχθωσαν ὁρθαὶ αἱ BZ $ΓH$. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς τὸ ἐπὶ AB $ΓA$ πρὸς τὸ ἐπὶ AG $ΔA$, τουτέστιν ὡς τὸ ἀπὸ BZ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΓH$, οὕτως τὸ ἀπὸ BE πρὸς τὸ ἀπὸ $EΓ$, καὶ μήκει ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ BZ πρὸς τὴν $ΓH$, οὕτως ἡ BE πρὸς τὴν $EΓ$. εὐθὺς ἄρα ἐστὶν ἡ διὰ τῶν Z E H . ἔστω ἡ ZEH , καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ μὲν $HΓ$ ἐπὶ τὸ $Θ$, ἐπιτεταχθεῖσα δὲ ἡ $ZΘ$ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ K , καὶ ἐπ' αὐτὴν κάθετος ἤχθω ἡ AK . καὶ διὰ δὲ τὸ προγεγραμμένον λήμμα γίνεται τὸ μὲν ἐπὶ AI BA ἴσον τῷ ἀπὸ ZK , τὸ δὲ ὑπὸ AB $ΓA$ τῷ ἀπὸ $ΘK$. λοιπὴ ἄρα ἡ $ZΘ$ ἐστὶν ἡ ὑπεροχὴ ἢ ὑπερέχει ἢ δυναμένη τὸ ἐπὶ AI BA τῆς δυναμένης τὸ ἐπὶ AB $ΓA$. ἤχθω οὖν διὰ τοῦ κέντρον ἡ ZA , καὶ ἐπεξεύχθω ἡ $ΘA$. ἐπεὶ οὖν ὁρθὴ ἡ ἐπὶ ZOA ὁρθὴ τῇ ἐπὶ $EΓH$ ἐστὶν ἴση, ἐστὶν δὲ καὶ ἡ πρὸς τῷ A τῇ πρὸς τῷ H γωνία ἴση, ἰσογώνια ἄρα τὰ τρίγωνα· ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ AZ πρὸς τὴν $ΘZ$, τουτέστιν ὡς ἡ AA πρὸς τὴν $ZΘ$, οὕτως ἡ EH πρὸς τὴν $EΓ$. καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ AA πρὸς τὸ ἀπὸ $ZΘ$, οὕτως τὸ ἀπὸ EH πρὸς τὸ ἀπὸ $EΓ$, καὶ τὸ ἐπὶ HE EZ , τουτέστιν τὸ ἐπὶ AE EA , πρὸς τὸ ἐπὶ BE $EΓ$. καὶ ἐστὶν ὁ μὲν τοῦ ὑπὸ AE EA πρὸς τὸ ἐπὶ BE $EΓ$ μοναχὸς καὶ ἐλάχιστος [ὁ] λόγος, ἡ δὲ $ZΘ$ ἡ ὑπεροχὴ ἢ ὑπερέχει ἢ δυναμένη τὸ ἐπὶ τῶν AI BA τῆς δυναμένης τὸ ἐπὶ AB $ΓA$ τουτέστιν

1. post BE πρὸς repetit τὸ BE πρὸς A ὁ del. Hu 11. τῶν ZEH A , distinx. BS 12. post ἡ $ZΘ$ add. interpunctum $\times$ ABS 13. τὸ ante μὲν add. V² 14. 15. ἐπὶ AGH A , distinx. BS, item vs. 17 15. ἐπὶ ABG A , distinx. BS, item vs. 17 19. ZOA ὁρθὴ τῇ A , corr. BS 21. ἡ AZ V² Co pro ἡ AZ 22. πρὸς τὴν $ΘZ$ οὕτως S 23. $ZΘ$ add. Hu. $ΘZ$ Co, τῆς $ΘZ$ V² οὕτω τὸ ἀπὸ add. V² Co 25. 26. τοῦ ἐπὶ AE $EΓ$ A , corr. BS 26. καὶ add. Ge auctore Co 27. ὁ del. Hu 28. ἐπὶ ABG A , distinx. BS τουτέστιν — p. 760, 1 τῆς $ΘK$ del. Hu auctore Ge

τὸ ἀπὸ τῆς ZK τοῦ ἀπὸ τῆς ΘK], ὥστε ὁ μοναχὸς καὶ ἐλάσσων λόγος ὁ αὐτὸς ἐστὶν τῇ ἀπὸ τῆς AA πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ὑπεροχῆς ἢ ὑπερέχει ἢ δυναμένη τὸ ὑπὸ AI BI τῆς δυναμένης τὸ ὑπὸ AB $ΓΔ$, ὅπερ: ~

Ὁ μοναχὸς τοῦ τρίτου ἐπιτάγματος τοῦ δευτέρου
προβλήματος.

- 116 κβ'. Πάλιν τριῶν δοθεισῶν εὐθειῶν τῶν AB BI $ΓΔ$, εἰς γένηται ὡς τὸ ὑπὸ AA B πρὸς τὸ ὑπὸ AI B , οὕτως τὸ ἀπὸ AE πρὸς τὸ ἀπὸ EF , μοναχὸς καὶ ἐλάσσων λόγος ἐστὶν ὁ τοῦ ὑπὸ AE B πρὸς τὸ ὑπὸ FE $Δ$. λέγω δὲ ὅτι ὁ αὐ-
τὸς ἐστὶν τῇ ἀπὸ τῆς συγχειμένης ἐκ τε τῆς δυναμένης τὸ
ὑπὸ τῶν AI BI καὶ τῆς δυναμένης τὸ ὑπὸ τῶν AA BI
πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς AI .



ἤχθω ἀπὸ τοῦ
 E τῇ AA ὁρθῇ ἢ ¹⁵
 EZ καὶ ἐκβεβλή-
σθω, καὶ τῇ ἐπὶ
 AA B ἴσον τὸ ἀπὸ
 $ZΔ$, καὶ τῇ $ZΔ$
εὐθείᾳ παράλληλος ²⁰
ἤχθω ἡ $HΓ$. ἐπεὶ
οὖν ἐστὶν ὡς τὸ ἐπὶ
 AA B πρὸς τὸ ἐπὶ
 AI B , οὕτως τὸ
ἀπὸ AE πρὸς τὸ ²⁵
ἀπὸ EF , τοιούστιν
τὸ ἀπὸ AZ πρὸς τὸ
ἀπὸ $ΓH$, καὶ ἐστὶν
ἴσον τὸ ἐπὶ τῶν
 AA B τῇ ἀπὸ $ZΔ$, ³⁰
καὶ τὸ ἐπὶ AI B

ἄρα ἴσον τῇ ἀπὸ $ΓH$. ἐκείνῃ χθωσαν αἱ AZ ZB AH HB .
ἐπεὶ οὖν τὸ ὑπὸ AA B ἴσον ἐστὶν τῇ ἀπὸ AZ , ἴση ἐστὶν ἡ ἐπὶ
 BZA γωνία τῇ ἐπὶ ZAB γωνίᾳ. ἐστὶν δὲ καὶ ἡ ἐπὶ BHI
ἴση τῇ ἐπὶ BAH . ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπὶ BZA ἴση ἐστὶν τῇ ³⁵

tive potentiam in superioribus substituimus, efficitur singularis ac minima ratio

$$ae \cdot ed : \beta e \cdot \epsilon \gamma = ad^2 : (\sqrt{a\gamma \cdot \beta \delta} - \sqrt{a\beta \cdot \gamma \delta})^2, \text{ q. e. d.}$$

Ratio singularis tertii epitagmatis secundi problematist¹.

XXII. Rursus tribus datis rectis $\alpha\beta$ $\beta\gamma$ $\gamma\delta$, si fiat Prop. 62
 $ad \cdot \delta\beta : \alpha\gamma \cdot \gamma\beta = \delta\epsilon^2 : \epsilon\gamma^2$, singularis ac minima ratio est

$ae \cdot \epsilon\beta : \gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta$: iam dico in eadem proportionem esse

$$(\sqrt{a\gamma \cdot \beta \delta} + \sqrt{ad \cdot \beta \gamma})^2 : \delta\gamma^2.$$

Ducatur a puncto ϵ ad ad perpendicularis $\epsilon\zeta$ et producat^{ur} ita, ut sit $ad \cdot \delta\beta = \zeta\delta^2$, et rectae $\zeta\delta$ parallela ducatur $\eta\gamma$. Quoniam igitur ex hypothesis est $ad \cdot \delta\beta : \alpha\gamma \cdot \gamma\beta = \delta\epsilon^2 : \epsilon\gamma^2$, et in similibus triangulis $\zeta\epsilon\delta$ et $\eta\epsilon\gamma$ est $\delta\epsilon : \epsilon\gamma = \delta\zeta : \gamma\eta$, itaque $ad \cdot \delta\beta : \alpha\gamma \cdot \gamma\beta = \delta\zeta^2 : \gamma\eta^2$, et quia ex constructione est $ad \cdot \delta\beta = \delta\zeta^2$, ergo etiam est $\alpha\gamma \cdot \gamma\beta = \gamma\eta^2$. Iungantur $\alpha\zeta$ $\zeta\beta$ $\alpha\eta$ $\eta\beta$, et producta $\eta\gamma$ secet rectam $\beta\zeta$ in θ *). Quoniam igitur est $ad \cdot \delta\beta = \delta\zeta^2$, sive $ad : \delta\zeta = \delta\zeta : \delta\beta$, est $\angle \beta\zeta\delta = \angle \zeta\alpha\beta$. Sed, quia est $\alpha\gamma \cdot \gamma\beta = \gamma\eta^2$, sive $\alpha\gamma : \gamma\eta = \gamma\eta : \gamma\beta$, est etiam $\angle \beta\eta\gamma = \angle \beta\alpha\gamma$. Sed, quia parallelae sunt $\delta\zeta$ $\eta\gamma$, est etiam $\angle \beta\zeta\delta = \angle \beta\theta\eta$. Producantur $\eta\beta$ $\zeta\beta$ secet-

1) Simsonus p. 169 propositionem sic constituit: "Ratio autem minima ita determinatur. Ostensum fuit, Dat^{is} in recta linea quatuor punctis A B C D, si fiat ut rectangulum ADB ad rectangulum ACB, ita quadratum ex DE ad quadratum ex EC, fore E punctum quod facit minimam rationem rectanguli AEB ad rectangulum CED. Ostendendum nunc est hanc eandem esse ei quam habet quadratum rectae lineae quae constat ex ea quae potest rectangulum AC BD et ex ea quae potest rectangulum AD BC ad quadratum ex DC".

*) Addita haec secundum Simsonum p. 170.

3. ἐνὰ $\alpha\gamma$ $\beta\delta$ BV2, ἐνὸς $\alpha\beta$ $\gamma\delta$ V1 Paris. 2368 cod.

Co 4. τῆς διαιρεμένης τὸ ἐνὸς $\alpha\beta$ $\gamma\delta$ add. B 5περ V, ὁ A, 5περ

ἔδει B* S 5. 6. τριῶν προβλήματος τοῦ δευτέρου ἐπιτάγματος ABS,

corr. Hu auctore Simsono p. 56 7. κβ' add. BS 8. A. IB A2B;


ex A2, αβ S πρὸς τὸ ἐνὸς AEF ABS, corr. Co 10. ἐστὶν ὁ

τοῦ — δὴ ὅτι add. Hu 23. 24. πρὸς τὸ ἐνὸς AFB Co pro πρὸς τὸ

ἐνὸς ABE 32. post ἐπιτάγματος add. αβ AB, γὰρ S, del. Hu

35. ἀλλὰ καὶ ἡ ἐνὸς A2I ABS, corr. Co

ὑπὸ ΒΘΗ· αἱ ἄρα ὑπὸ ΒΘΗ ΒΗΘ γωνίαι, τουτέστιν
ἐὰν ἐκβληθῇ ἡ ΒΚ, ἡ ὑπὸ ΚΒΖ γωνία ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ
ΛΑΚ γωνίᾳ· ὥστε ἐν κύκλῳ ἐστὶν τὰ Α Λ Β Κ σημεία·



διὰ ἄρα τὸ προ-
γεγραμμένον γίνον-5
ται δεῖσθαι αἱ πρὸς
τοῖς Κ Α σημείοις
γωνίαι. ἤχθω δι'
κάθετος ἐπὶ τὴν
ΖΑ ἡ ΒΜ, καὶ ἐπε-10
ξείχθω ἡ ΑΝ καὶ
ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ
Ξ· κάθετος ἄρα
ἐστὶν ἐπὶ τῆς ΖΑ
καὶ παράλληλος τῇ 13
ΗΛ. πάλιν δὲ ἐπι-
ξενχθεῖσα ἡ ΗΓ
ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ
Ο· κάθετος ἄρα
ἐστὶν ἐπὶ τῆς ΒΝ 20
(καὶ γὰρ ἡ ΖΑ ἐπὶ

τῆς ΜΒ). ἐπεὶ οὖν τὸ ὑπὸ ΑΓΒ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ΓΗ,
γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ ΒΗΓ γωνία τῇ ΗΑΓ ἴση ἐστὶν. ἀλλὰ ἡ μὲν
ὑπὸ ΒΗΓ ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΓΝΒ ἐν κύκλῳ, ἡ δὲ ὑπὸ ΗΑΒ
ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΒΑΝ ἐν παραλλήλῳ· καὶ ἡ ὑπὸ ΒΝΓ 25

2. ἐστὶ Α²BS

3. τὰ ΑΛ ΒΚ et 7. τοῖς ΚΑ Α, distinctx. BS

13. κάθετος ἄρα — 18. 19. ἐπὶ τὸ Ο om. Α¹, in marg. add. Α² 44. ἐπὶ
τὴν Λ S 46—19. ἐπιξενχθεῖσα ἡ ΗΓ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Ο hoc
loco Pappus vel quisquis ex Apollonio haec excerptit (neque vero ar-
bitror Apollonium ipsum) oblitus est iam in superiori demonstratione
rectam ΗΓ productam esse ad Θ; conf. Latina 19. 20. κάθετος ἄρα
ἐστὶν ἐπὶ τῆς ΒΗ AB, corr. S 21. καὶ γὰρ ἡ ΖΑ Co pro καὶ γὰρ ἡ
ΗΘ 21. 22. ἐπὶ τῆς ΜΒ Hu auctore Co pro ἐπὶ τῆς ΝΒ 24. τῇ
ὑπὸ ΓΝΒ Co in Lat. versione pro τῇ ὑπὸ ΓΗΒ ἡ δὲ ὑπὸ ΗΑΓ
ABS, corr. V

que $\eta\beta$ rectam $\alpha\zeta$ in κ , et $\zeta\beta$ rectam $\alpha\eta$ in λ ; ergo est
 $\angle\beta\theta\eta + \beta\eta\theta = \angle\kappa\beta\zeta$. Erat autem.

$$\angle\beta\theta\eta = \angle\beta\zeta\delta = \angle\zeta\alpha\beta, \text{ et}$$


$$\angle\beta\eta\theta \text{ sive } \beta\eta\gamma = \angle\beta\alpha\eta; \text{ ergo compositis angulis } \zeta\alpha\beta$$

$$\angle\kappa\beta\zeta = \angle\kappa\alpha\lambda. \quad + \beta\alpha\eta \text{ est}$$

Sed anguli $\kappa\beta\lambda + \kappa\beta\zeta$ duos rectos efficiunt; ergo etiam anguli $\kappa\beta\lambda + \kappa\alpha\lambda$ duobus rectis aequales, itaque in circulo sunt puncta $\alpha \lambda \beta \kappa$. Ergo propter superius lemma XX anguli ad κ et λ recti sunt. Iam ducatur ad $\zeta\delta$ perpendicularis $\beta\mu$ secetque rectam $\alpha\zeta$ in ν , et iungatur $\delta\nu$ producatque ad ξ punctum sectionis cum $\beta\zeta$. Ergo $\delta\xi$ perpendicularis est ad $\zeta\lambda$ *) eademque parallela rectae $\eta\lambda$. Secet $\eta\theta$ rectam $\beta\nu$ in puncto σ ; ergo $\eta\sigma$ perpendicularis est ad $\beta\nu$ est enim $\zeta\delta$ ad $\beta\mu$ perpendicularis, et ex constructione $\eta\theta \parallel \zeta\delta$. Iam quia est $\alpha\gamma \cdot \gamma\beta = \gamma\eta^2$, est igitur, ut supra demonstravimus, $\angle\beta\eta\gamma = \angle\eta\alpha\gamma$. Sed producta $\nu\gamma$ ad π punctum concursus cum $\beta\eta$, quia in triangulo $\beta\nu\eta$ est $\beta\eta$ perpendicularis ad $\nu\eta$, et $\eta\sigma$ ad $\beta\nu$, perpendicularis igitur est $\nu\pi$ ad $\beta\eta$ vide adnot. *). Ergo propter similitudinem triangulorum $\beta\sigma\eta$ et $\beta\pi\nu$ [vide ibid.] puncta $\sigma \pi \eta \nu$ sunt in circulo, et in segmento $\pi\sigma$ est $\angle\pi\sigma\eta = \angle\pi\sigma\nu$, sive $\angle\beta\eta\gamma = \angle\gamma\nu\beta$. Porro est $\angle\eta\alpha\beta = \angle\beta\delta\nu$ in parallelis $\eta\alpha \delta\xi$. Ergo, si comprehendamus priora
 $\angle\beta\eta\gamma = \angle\eta\alpha\gamma$, et $\angle\beta\eta\gamma = \angle\gamma\nu\beta$, et
 $\angle\eta\alpha\beta \text{ sive } \eta\alpha\gamma = \angle\beta\delta\nu$, inde efficitur esse
 $\angle\gamma\nu\beta = \angle\beta\delta\nu$.

*. Quia in triangulo oxygonio perpendiculares e verticibus ad latera ductae in unum punctum concurrunt, hinc sequitur rectam, quae per punctum concursus duarum perpendicularium transit, perpendicularem esse ad tertium trianguli latus. Hoc Apollonius compendiosa, quae supra legitur, scriptura significavisse videtur. Prolongam eamque falsam demonstrationem temptaverat Commandinus; breviorum et aptiorem apposuit Simsonus p. 174, quae, quoniam veterum mathematicorum rationi plane accommodata est, digna videtur quae hic, paucis tantum mutatis, repetatur: Quoniam anguli $\delta\mu\nu$ et $\delta\eta\nu$ recti sunt, puncta $\delta \epsilon \nu \mu$ sunt in circuli circumferentia. Sed quia triangulis orthogoniis $\delta\beta\mu$ et $\delta\zeta\epsilon$ communis est angulus $\beta\delta\zeta$, reliquus igitur $\delta\beta\mu$ reliquo $\delta\zeta\epsilon$ aequalis est, sive $\angle\epsilon\beta\mu = \angle\epsilon\zeta\mu$; ergo puncta $\beta \epsilon \mu \zeta$ in circuli circumferentia sunt. Ergo, iuncta $\epsilon\mu$, in segmento $\mu\nu$ erit $\angle\mu\delta\nu = \angle\mu\epsilon\nu$ sive $\mu\zeta$; et, in segmento $\mu\zeta$, $\angle\mu\epsilon\zeta = \angle\mu\beta\zeta$. Ergo in triangulis $\delta\zeta\epsilon$ et $\delta\beta\mu$ anguli $\delta\zeta\epsilon$ et $\delta\beta\mu$ aequales sunt, et iisdem communis est angulus $\beta\delta\zeta$; itaque reliqui anguli $\zeta\delta\epsilon$ et $\zeta\alpha\beta$ aequales sunt. Sed erat $\beta\mu$ perpendicularis ad $\zeta\delta$; ergo etiam $\delta\xi$ perpendicularis est ad $\zeta\lambda$.

ἄρα ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ $ΒΑΝ$ · τὸ ἄρα ὑπὸ $ΑΒΓ$ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ $ΒΝ$ τετραγώνῳ. ἐπεὶ δὲ ἐν τριγώνῳ τῷ $ΒΑΖ$ καθέτος ἔχεται ἡ $ΑΝΞ$, καὶ κεκλασμένοι πρὸς αὐτῇ εἰσιν αἱ $ΖΝ ΝΒ$, ἡ ἄρα τῶν ἀπὸ $ΖΑ ΑΒ$ ὑπεροχῇ ἴση τῇ τῶν ἀπὸ $ΖΝ ΝΒ$ ὑπεροχῇ. ἀλλὰ ἡ τῶν ἀπὸ $ΖΑ ΑΒ$ ὑπεροχῇ



ἐστὶν τὸ ἐπὶ $ΑΒΑ$ · καὶ ἡ τῶν ἀπὸ τῶν $ΖΝ ΝΒ$ ἄρα ὑπεροχῇ ἐστὶν τὸ ἐπὶ $ΑΒΑ$. ἐστὶν δὲ καὶ τὸ ἐπὶ $ΑΒΓ$ ἴσον τῷ ἀπὸ $ΒΝ$ · ἡ $ΝΖ$ ἄρα ἐστὶν ἡ δυναμένη τὸ ἐπὶ τῶν $ΑΓ ΒΑ$. πάλιν ἐπεὶ ἡ τῶν ἀπὸ τῶν $ΗΝ ΝΒ$ ὑπεροχῇ ἴση ἐστὶν τῇ τῶν ἀπὸ τῶν $ΗΓ ΓΒ$ ὑπεροχῇ, ἀλλὰ ἡ τῶν ἀπὸ τῶν $ΗΓ ΓΒ$ ὑπεροχῇ ἐστὶν τὸ ἐπὶ $ΑΒ ΒΓ$,

καὶ ἡ τῶν ἀπὸ τῶν $ΗΝ ΝΒ$ ἄρα ὑπεροχῇ ἐστὶν τὸ ἐπὶ τῶν $ΑΒ ΒΓ$. ἐστὶν δὲ καὶ τὸ ὑπὸ $ΑΒΓ$ ἴσον τῷ ἀπὸ $ΒΝ$ · ἡ $ΝΗ$ ἄρα ἐστὶν ἡ δυναμένη ὅλον τὸ ἐπὶ $ΑΑ ΒΓ$. ἀλλὰ καὶ ἡ $ΖΝ$ ἐστὶν ἡ δυναμένη τὸ ἐπὶ τῶν $ΑΓ ΒΑ$ · ὅλη ἄρα ἡ $ΖΗ$ ἴση ἐστὶν τῇ τε δυναμένῃ τὸ ὑπὸ $ΑΔ ΒΓ$ καὶ τῇ δυνα-

1. ἄρα ὑπὸ $ΑΒΓ$ Co pro ἄρα ὑπὸ $ΒΑΓ$ 2. ἐπεὶ BS , ἐπὶ $γ$ sine acc. A 3. ἀπὸ $ΖΝ ΝΒ$ Co in Lat. versione pro ἀπὸ $ΖΜ ΝΒ$
7. καὶ ἡ τῶν ἀπὸ — 10. $ΑΒΑ$ in marg. add. A² 7. 8. ἀπὸ τῶν $ΖΝ ΝΒ$ B, ἀπὸ τῶν $ΖΗ ΗΒ$ AS 9. ἐστὶ $A^2 BS$ 13. 14. δυναμένη τοῦ ὑπὸ $ΑΒ$, corr. S 16. 17. ἀπὸ τῶν $ΗΝ ΝΒ$ Hu auctore Simsoni p. 171 sq., ἀπὸ τῶν $ΗΗ ΗΒ$ A, ἀπὸ τῶν $τῇ ηζ$ BS 19. ἀπὸ τῶν $ηγ γζ$ S, ἀπὸ τῶν $ΝΓ ΓΒ$ A(B) 21. 22. ἀπὸ τῶν $ΗΓ ΓΒ$ Hu auctore Simsoni p. 172, ἀπὸ τῶν $ΗΓ$ ἡ A, ἀπὸ τῶν $ηγ$ BS, ἀπὸ τῶν $ηγ$ Paris.

Ergo triangula $\beta\gamma\gamma$ et $\beta\delta\nu$, communi angulo $\nu\beta\delta$, sunt similia, ideoque $\delta\beta : \beta\nu = \beta\nu : \beta\gamma$, sive $\delta\beta \cdot \beta\gamma = \beta\nu^2$. Sed quoniam in triangulo $\beta\delta\zeta$ perpendicularis ducta est $\delta\nu\zeta$, et ad hanc inflexae sunt rectae $\zeta\nu\beta$, est igitur $\zeta\delta^2 - \delta\beta^2 = \zeta\nu^2 - \nu\beta^2$.*

Sed quia ex constructione est

$$\alpha\delta \cdot \delta\beta = \zeta\delta^2, \text{ et propter elem. 2, 3 idem } \alpha\delta \cdot \delta\beta$$

$$= \alpha\beta \cdot \beta\delta + \delta\beta^2, \text{ est igitur}$$

$$\zeta\delta^2 - \delta\beta^2 = \alpha\beta \cdot \beta\delta; \text{ ergo etiam}$$

$$\zeta\nu^2 - \nu\beta^2 = \alpha\beta \cdot \beta\delta. \text{ Sed demonstravimus esse } \nu\beta^2 =$$

$$\delta\beta \cdot \beta\gamma; \text{ ergo}$$

$$\zeta\nu^2 = \alpha\beta \cdot \beta\delta + \delta\beta \cdot \beta\gamma$$

$$= \alpha\gamma \cdot \beta\delta, \text{ sive}$$

$$\zeta\nu = \sqrt{\alpha\gamma \cdot \beta\delta}.$$

Rursus eadem, qua supra, ratione est $\nu\beta^2 - \nu\gamma^2 = \eta\gamma^2 - \gamma\beta^2$. Sed quia, ut supra demonstravimus, est

$$\alpha\gamma \cdot \gamma\beta = \eta\gamma^2, \text{ et propter elem. 2, 3 idem } \alpha\gamma \cdot \gamma\beta$$

$$= \alpha\beta \cdot \beta\gamma + \beta\gamma^2, \text{ est igitur}$$

$$\eta\gamma^2 - \beta\gamma^2 = \alpha\beta \cdot \beta\gamma; \text{ ergo etiam}$$

$$\eta\nu^2 - \nu\beta^2 = \alpha\beta \cdot \beta\gamma. \text{ Sed demonstravimus esse } \nu\beta^2 =$$

$$\delta\beta \cdot \beta\gamma; \text{ ergo}$$

$$\eta\nu^2 = \alpha\beta \cdot \beta\gamma + \delta\beta \cdot \beta\gamma$$

$$= \alpha\delta \cdot \beta\gamma, \text{ sive}$$

$$\eta\nu = \sqrt{\alpha\delta \cdot \beta\gamma}. \text{ Sed est, ut modo demonstravimus, } \zeta\nu =$$

$$\sqrt{\alpha\gamma \cdot \beta\delta}; \text{ ergo } \zeta\nu + \nu\eta, \text{ id est}$$

$$\zeta\eta = \sqrt{\alpha\gamma \cdot \beta\delta} + \sqrt{\alpha\delta \cdot \beta\gamma}.$$

*: Rursus lemma aliquod breviter significat Apollonius, quod sic fere restituit Co: Est $\zeta\delta^2 = \zeta\epsilon^2 + \epsilon\delta^2$, et $\delta\beta^2 = \beta\epsilon^2 + \epsilon\delta^2$; ergo $\zeta\delta^2 - \delta\beta^2 = \zeta\epsilon^2 - \beta\epsilon^2$. Item demonstratur esse $\zeta\nu^2 - \nu\beta^2 = \zeta\epsilon^2 - \beta\epsilon^2$. Ergo $\zeta\delta^2 - \delta\beta^2 = \zeta\nu^2 - \nu\beta^2$.

3368 23. τὸ ἐπὶ AB BF τὸ ἐπὶ EFB Ge auctore Co. quamquam verum iam dudum Simsonus demonstraverat 24. ἀπὸ τῶν HN NB Hu auctore Simsono pro ἀπὸ τῶν NH HB 25. τὸ ἐπὶ ABF ἴσον τῷ ἀπὸ BN Hu auctore Simsono pro τὸ ἐπὶ ABF ἴσον ταῖς ἀπὸ BH 26. τὸ ἐπὶ A I BF Co in lat. versione pro τὸ ἐπὶ A I BF 27. 28. ὁλῆ ἀρα — τὸ ἐπὶ A I BF add. Hu 28 — p. 766, 1. καὶ τῇ — AF B I om. Co et post hunc reliqui

μένη τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΓ ΒΔ$. ἐπειδὴ ὁρθὴ ἐστὶν ἡ ὑπὸ ZKH γωνία, καὶ ἀθέτος ἡ $ΑΕ$, τὸ ἄρα ἐπὶ $ΑΕΒ$ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ZEH . ἐστὶν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ $ΑΕΒ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΓΕΔ$, οὕτως τὸ ὑπὸ ZEH πρὸς τὸ ὑπὸ $ΓΕΔ$. ὡς δὲ τὸ ὑπὸ ZEH πρὸς τὸ ὑπὸ $ΓΕΔ$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ZH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $ΓΔ$. καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ $ΑΕΒ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΓΕΔ$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ZH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $ΓΔ$. καὶ ἐστὶν ὁ μὲν τοῦ ὑπὸ $ΑΕΒ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΓΕΔ$ λόγος [ὁ] μοναχὸς καὶ ἐλάσσων, ἡ δὲ ZH ἡ συγκειμένη ἐκ τε τῆς δυναμένης τὸ ὑπὸ $ΑΓ ΒΔ$ καὶ τῆς δυναμένης τὸ ὑπὸ $ΑΔ ΒΓ$. ὁ ἄρα ¹⁰ μοναχὸς καὶ ἐλάσσων λόγος ὁ αὐτὸς ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς συγκειμένης ἐκ τε τῆς δυναμένης τὸ ὑπὸ $ΑΓ ΒΔ$ καὶ τῆς δυναμένης τὸ ὑπὸ $ΑΔ ΒΓ$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $ΓΔ$.

Εἰς τὸ τρίτον ἐπίταγμα τοῦ τρίτου προβλήματος.

- 117 κ'. Ἐστω ἴση ἡ μὲν $ΑΒ$ τῇ $ΓΔ$, μείζων δὲ ἐπὸ $ΒΕΓ$ ¹⁵ τοῦ ὑπὸ $ΑΒΔ$. ὅτι τὸ ἐπὸ $ΒΕΓ$ τοῦ ἐπὸ $ΑΕΔ$ ἐπερέχει τῷ ἐπὸ $ΒΔΓ$.

Ἐπεὶ γὰρ τὸ ἐπὸ $ΒΕΓ$ ἴσον τῷ τε ἐπὸ $ΒΓΕ$ καὶ τῷ ἀπὸ $ΕΓ$, τουτέστιν καὶ τῷ ἐπὸ $ΓΕΔ$ μετὰ τοῦ ἐπὸ $ΕΓΔ$, ἀλλὰ τὸ ὑπὸ $ΒΓΕ$ μετὰ τοῦ ἐπὸ $ΕΓΔ$ ὅλον ἐστὶν τὸ ἐπὸ $ΒΔ ΓΕ$, τουτέστιν τὸ ἐπὸ $ΑΓ ΓΕ$, τὸ ἄρα ἐπὸ $ΒΕΓ$ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ἐπὸ $ΑΓΕ$ καὶ τῷ ὑπὸ $ΓΕΔ$. ἀλλὰ τὸ μὲν ἐπὸ $ΑΓΕ$ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ἐπὸ $ΑΓ ΕΔ$ καὶ τῷ ἐπὸ $ΑΓ ΓΔ$, τὸ δὲ ἐπὸ $ΑΓ ΕΔ$ μετὰ τοῦ ἐπὸ $ΓΕΔ$ ὅλον ἐστὶν τὸ ἐπὸ $ΑΕΔ$. γέγονεν οὖν τὸ ὑπὸ $ΒΕΓ$ ἴσον τῷ τε ἐπὸ $ΑΕΔ$ ²⁵ καὶ τῷ ἐπὸ $ΑΓΔ$, ὃ ἐστὶν τὸ ἐπὸ $ΒΔ ΑΓ$, ὥστε τὸ ἐπὸ $ΒΕΓ$ τοῦ ἐπὸ $ΑΕΔ$ ἐπερέχει τῷ ἐπὸ $ΒΔΓ$, ὥστε: ~

1. ἐπὸ τῶν $ΑΓ ΒΔ$ Hu pro ἐπὸ τῶν $ΑΒΓΔ$ 2. ἄρα ἐπὸ $ΑΕΒ$
Co in Lat. versione pro ἄρα ἐπὸ $ΚΕΒ$ 3. 6. ZH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς
add. Co 8. ὁ μὲν ἐπὸ $ΑΓ$ τοῦ ante ὑπὸ add. $ΑΔ$ 9. ὁ del. Hu
9. ἡ δὲ ZH Hu pro ἡ δὲ $ΕZH$ ἡ δὲ ZEH conl. Co: inimo debebat ἡ
δὲ ZNH 10. τὸ ἐπὸ $ΑΓ ΒΔ$ Co pro τὸ ἐπὸ $ΑΒΓΔ$ καὶ τῆς —
 $ΑΔ ΒΓ$ add. Co ἄρα Hu, ἄρα ἐστὶν $Α ΒΣ$ 12. τὸ ὑπὸ $ΑΓ ΒΔ$
 $ΑΒ$ Co, τὸ ἐπὸ $αγ εδ$ S 13. τὸ ὑπὸ $ΑΔ ΒΓ$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $ΓΔ$
Co pro τὸ ἐπὸ $ΑΒ ΓΔ$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $ΚΔ$ 15. κ' add. BS

Porro, quoniam rectus est angulus $\zeta\eta\gamma$, et ae perpendicularis ad $\zeta\eta$, propter similitudinem triangulorum $\alpha\zeta\epsilon$ et $\eta\beta\epsilon$ (utrumque enim simile triangulo $\alpha\beta\alpha$, est $ae : \epsilon\zeta = \eta\epsilon : \epsilon\beta$, sive $ae \cdot \epsilon\beta = \zeta\epsilon \cdot \epsilon\eta$; ergo [facta proportione ad $\gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta$] est $ae \cdot \epsilon\beta : \gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta = \zeta\epsilon \cdot \epsilon\eta : \gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta$. Sed, quia parallelae sunt $\zeta\delta$ et $\gamma\gamma$, est $\zeta\epsilon : \epsilon\delta = \eta\epsilon : \epsilon\gamma$, et tota ad totam $\zeta\eta : \gamma\delta = \zeta\epsilon : \epsilon\delta$; tum, quia rectangula $\zeta\epsilon \cdot \epsilon\eta$ et $\delta\epsilon \cdot \epsilon\gamma$ latera habent proportionalia, est [propter elem. 6. 20 coroll. 1] $\zeta\epsilon \cdot \epsilon\eta : \delta\epsilon \cdot \epsilon\gamma = \zeta\epsilon^2 : \epsilon\delta^2 = \zeta\eta^2 : \gamma\delta^2$. Ergo est etiam $ae \cdot \epsilon\beta : \gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta = \zeta\eta^2 : \gamma\delta^2$, et est ratio $ae \cdot \epsilon\beta : \gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta$ singularis ac minima. Est autem, ut supra demonstravimus,

$$\zeta\eta = \sqrt{\alpha\gamma \cdot \beta\delta + \alpha\delta \cdot \beta\gamma};$$

ergo singularis ac minima ratio eadem est ac

$$\sqrt{\alpha\gamma \cdot \beta\delta + \alpha\delta \cdot \beta\gamma}^2 : \gamma\delta^2.$$

In tertium epitagma tertii problematis¹.

XXIII. Sit $\alpha\beta = \gamma\delta$, et $\beta\epsilon \cdot \epsilon\gamma > \alpha\beta \cdot \beta\delta$, hoc est. sit Prop. punctum ϵ in $\alpha\delta$ producta²; dico esse $\beta\epsilon \cdot \epsilon\gamma - \alpha\epsilon \cdot \epsilon\delta =$ ⁶³
 $\beta\delta \cdot \delta\gamma$.

Quoniam propter

$$\begin{array}{ccccccccc} \alpha & & \beta & & \gamma & & \delta & & \epsilon \\ \hline & & & & & & & & \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{elem. 2, 3: est } \beta\epsilon \cdot \epsilon\gamma \\ = \beta\gamma \cdot \gamma\epsilon + \epsilon\gamma^2 = \beta\gamma \cdot \end{array}$$

$\gamma\epsilon + \gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta + \epsilon\gamma \cdot \gamma\delta$, estque $\beta\gamma \cdot \gamma\epsilon + \epsilon\gamma \cdot \gamma\delta = \beta\delta \cdot \gamma\epsilon = \alpha\gamma \cdot \gamma\epsilon$, ergo $\beta\epsilon \cdot \epsilon\gamma = \alpha\gamma \cdot \gamma\epsilon + \gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta$. Sed est $\alpha\gamma \cdot \gamma\epsilon = \alpha\gamma \cdot \epsilon\delta + \alpha\gamma \cdot \gamma\delta$, et $\alpha\gamma \cdot \epsilon\delta + \gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta = \alpha\epsilon \cdot \epsilon\delta$. Factum igitur est $\beta\epsilon \cdot \epsilon\gamma = \alpha\epsilon \cdot \epsilon\delta + \alpha\gamma \cdot \gamma\delta = \alpha\epsilon \cdot \epsilon\delta + \beta\delta \cdot \delta\gamma$; itaque est $\beta\epsilon \cdot \epsilon\gamma - \alpha\epsilon \cdot \epsilon\delta = \beta\delta \cdot \delta\gamma$, q. e. d.

1) Hanc propositionem inter lemma XVIII et XIX collocat Simsonus p. 58 sq.; idem hanc aliam esse demonstrationem superioris propos. 24 adnotat.

2) Addit Simsonus p. 58.

16. τοῦ ἐπὶ ἂβδ S, τοῖ ἐπὶ ΑΕ. ΑΒ 17. τῷ ἐπὶ βγδ S 18. γὰρ
τὸ BS, γὰρ τοῦ Α 24. Β.ΓΓΕ Α, distinx. BS 22. τε ἐπὶ ΑΓΓ
Co pro τε ἐπὶ ΓΑΕ 22. 23. μὲν ἐπὶ ΑΓΓ Co pro μὲν ἐπὶ ΒΓΓ
23. 24. καὶ τῷ ἐπὶ ΑΓΓ. Co pro καὶ τοῖ ἐπὶ ΑΓΓΕ 26. 27. τὸ
ἐπὶ Β.Γ. ΑΓ, ὥστε τὸ ἐπὶ ΒΕΓ Co pro τὸ ἐπὶ Β.Α. ΑΓ ὥστε τὸ ἐπὶ ΒΕ

Singularis ratio tertii epitagmatis tertii problematis¹⁾.

XXIV. Tribus datis rectis $\alpha\beta$, $\beta\gamma$, $\gamma\delta$, et addita quadam^{Prop. 64} $\delta\epsilon$, si fiat $\alpha\beta \cdot \beta\delta : \alpha\gamma \cdot \gamma\delta = \beta\epsilon^2 : \epsilon\gamma^2$, singularis ac maxima ratio est $\alpha\epsilon \cdot \epsilon\delta : \beta\epsilon \cdot \epsilon\gamma$; iam dico in eadem proportionem esse $\alpha\delta^2 : \sqrt{\alpha\gamma \cdot \beta\delta} + \sqrt{\alpha\beta \cdot \gamma\delta}$.

Describatur in $\alpha\delta$ semicirculus $\alpha\zeta\eta\delta$, et ad $\alpha\delta$ perpendiculares ducantur $\beta\zeta$, $\gamma\eta$. Quoniam igitur ex hypothesis factum est $\alpha\beta \cdot \beta\delta : \alpha\gamma \cdot \gamma\delta = \beta\epsilon^2 : \epsilon\gamma^2$, atque est, ut in semicirculo, $\alpha\beta \cdot \beta\delta = \beta\zeta^2$, et $\alpha\gamma \cdot \gamma\delta = \gamma\eta^2$, est igitur $\beta\zeta^2 : \gamma\eta^2 = \beta\epsilon^2 : \epsilon\gamma^2$, itemque ipsae rectae $\beta\zeta : \gamma\eta = \beta\epsilon : \epsilon\gamma$. Suntque parallelae $\beta\zeta$, $\gamma\eta$; ergo recta est linea quae per ζ , ϵ transit²⁾. Sit $\zeta\epsilon$ eaque producat, et ad eam perpendiculares ducantur $\alpha\theta$, $\delta\chi$. Iam quia singularis ac maxima ratio est $\alpha\epsilon \cdot \epsilon\delta : \beta\epsilon \cdot \epsilon\gamma$, estque ex constructione³⁾ $\alpha\epsilon \cdot \epsilon\delta = \zeta\epsilon \cdot \epsilon\chi$, singularis igitur ac maxima ratio est $\zeta\epsilon \cdot \epsilon\chi : \beta\epsilon \cdot \epsilon\gamma$. Sed quia, ut inter parallelas $\beta\zeta$ et $\gamma\eta$, haec rectangula habent latera proportionalia, est igitur (elem. 6. 20 coroll. 1)

$$\zeta\epsilon \cdot \epsilon\chi : \beta\epsilon \cdot \epsilon\gamma = \eta\epsilon^2 : \epsilon\gamma^2, \text{ id est, quia anguli } \theta \text{ et } \gamma \text{ recti,} \\ \text{itaque in circulo sunt puncta } \theta \text{ et } \gamma \text{ et,} \\ \text{estque } \theta\epsilon \cdot \epsilon\chi = \alpha\epsilon \cdot \epsilon\gamma, \text{ siue } \eta\epsilon : \epsilon\gamma = \\ \alpha\epsilon : \epsilon\theta,$$

1) Simsonus p. 188 propositionem sic constituit: "Ratio autem maxima determinatur ita. Ostensum fuit, Datis in recta linea quatuor punctis A B C D, si fiat, addita quadam DE, ut rectangulum ABD ad rectangulum ACD, ita quadratum ex BE ad quadratum ex CE, fore E punctum quod facit maximam rationem rectanguli AED ad rectangulum BEC. Ostendendum nunc est rationem hanc eandem esse ei quam habet quadratum ex AD ad quadratum rectae lineae quae componitur ex ea quae potest rectangulum AC BD et ex ea quae potest contentum AB CD".

2) Vide supra IV propos. 13 p. 211. 213.

3) Scilicet puncta α , ζ , η , δ sunt in circuli circumferentia et productae $\alpha\delta$, $\zeta\eta$ concurrunt in ϵ extra circumulum.

A, distinx. BS 9. 10. $\eta\mu\iota\kappa\upsilon\mu\epsilon\iota\alpha \tau\acute{o} \overline{AZ} \text{ II. I} \text{ καὶ τῆς } \overline{AJ} \text{ ὁρθῆς AB,}$
corr. S 11. BE add. Co, lacuna trium fere litterarum in A'BS;

16. $\delta\iota\alpha \tau\acute{o}\nu \overline{ZII} \text{ A'B, } \delta\iota\alpha \tau\acute{o}\nu \overline{\eta \zeta} \text{ S, corr. Co in Lat. versione}$

18. post $\lambda\acute{o}\gamma\omicron\varsigma$ add. $\delta\acute{o} \alpha\upsilon\tau\acute{o}\varsigma \text{ A'BS, del. A}^2$ 19. $\tau\acute{o} \epsilon\pi\acute{o} \overline{ZEH} \text{ A}^2\text{S, } \tau\acute{o}$

$\epsilon\pi\acute{o} \overline{ZEN} \text{ A'BS}$ 20. $\epsilon\sigma\tau\iota \epsilon\sigma\tau\iota \tau\acute{o} \epsilon\pi\acute{o} \overline{AEJ}$ add. Co 21. 22. $\acute{\omega}\varsigma$

$\delta\epsilon - \epsilon\pi\acute{o} \overline{BEF}$ add. Co 23. $\pi\acute{\rho}\omicron\varsigma \tau\acute{o} \acute{\alpha}\nu\theta\acute{\iota} \overline{EF}$ Co pro $\pi\acute{\rho}\omicron\varsigma \tau\acute{o} \acute{\alpha}\nu\theta\acute{\iota} \overline{IF}$

πρὸς τὸ ἀπὸ $E\Theta$ (ἐν κύκλῳ γὰρ τὰ $\Theta A \Gamma H$ σημεῖα, ἐπειδὴ περ ὁρθαὶ εἰσὶν αἱ πρὸς τοῖς $\Theta \Gamma$ σημείοις γωνίαι· ὡς δὲ τὸ ἀπὸ EA πρὸς τὸ ἀπὸ $E\Theta$, οὕτως ἐστὶν τὸ ἀπὸ AA πρὸς τὸ ἀπὸ ΘK ἐν παραλλήλῳ· ὁ ἄρα μοναχὸς καὶ μέγιστος λόγος ἐστὶν ὁ τοῦ ἀπὸ AA πρὸς τὸ ἀπὸ ΘK . ἡ δὲ ΘK ἐστὶν ἡ δυναμένη τε τὸ ἐπὶ τῶν $AG BA$ καὶ ἡ τὸ ἐπὶ $AB \Gamma A$, ὥστε ὁ μοναχὸς καὶ μέγιστος λόγος ὁ αὐτὸς ἐστὶν τῷ τοῦ ἀπὸ AA πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς συγκεκλιμένης ἐκ τε τῆς δυναμένης τὸ ἐπὶ τῶν $AG BA$ καὶ τῆς δυναμένης τὸ ἐπὶ τῶν $AB \Gamma A$.

10

- 119 Τὸ πρῶτον διωρισμένης τομῆς ἔχει προβλήματα ξ' , ἐπιτάγματα $\iota\xi'$, διορισμοὺς δὲ ϵ' , ὧν μέγιστοι μὲν δ' , ἐλάχιστος δὲ α' . καὶ εἰσὶν μέγιστοι μὲν ὅ τε κατὰ τὸ β' ἐπιτάγμα τοῦ β' προβλήματος καὶ ὁ κατὰ τὸ τρίτον τοῦ τετάρτου προβλήματος καὶ ὁ κατὰ τὸ τρίτον τοῦ πέμπτου καὶ ὁ κατὰ τὸ τρίτον τοῦ ἕκτου, ἐλάχιστος δὲ ὁ κατὰ τὸ τρίτον ἐπιτάγμα τοῦ τρίτου προβλήματος. τὸ δὲ δευτέρον διωρισμένης ἔχει προβλήματα τρία, ἐπιτάγματα θ' , διορισμοὺς γ' , ὧν ἐλάχιστοι μὲν δύο, μέγιστος δὲ α' . καὶ εἰσὶν ἐλάχιστοι μὲν ὅ τε κατὰ τὸ τρίτον τοῦ πρώτου καὶ ὁ κατὰ τὸ τρίτον τοῦ δευτέρου, μέγιστος δὲ ὁ κατὰ τὸ γ' τοῦ γ' προβλήματος.

Νεύσεων πρῶτον.

Λήμμα χρήσιμον εἰς τὸ πρῶτον πρόβλημα.

- 120 α' . Ἐστω μεῖζων ἡ AB τῆς ΓA , καὶ ἴσον τὸ ἐπὶ AEB τῷ ἐπὶ ΓZA . ὅτι μεῖζων ἐστὶν ἡ AE τῆς ΓZ . Καὶ τετμήσθω ἑκατέρα τῶν $AB \Gamma A$ διέξα καθ' ἑκάτερα τῶν $H \Theta$ σημείων· φανερόν δὲ ὅτι μεῖζων ἐστὶν ἡ HB τῆς ΘA . ἐπεὶ οὖν ἴσον μὲν ἐστὶν τὸ ἐπὶ AEB τῷ ἐπὶ ΓZA , μεῖζον δὲ τὸ ἀπὸ HB τοῦ ἀπὸ ΘA , μεῖζον

1. πρὸς τὸ ἀπὸ $E\Theta$ Co pro πρὸς τὸ ἀπὸ $E\Gamma$ τὰ $\Theta A \Gamma H$ A, distinx. BS 2. τοῖς $\Theta \Gamma$ A, distinx. BS 3. ἀπὸ add. Hu 6. τὸ Hu pro τὸ τε καὶ ἡ Hu pro καὶ 7. τὸ ἐπὶ $AB \Gamma A$ Co pro τὸ ἐπὶ $AB \Gamma$ 9. ἐπὶ τῶν $AG BA$ Co in Lat. versione, ἐπὶ τῶν

$$= \alpha \varepsilon^2 : \varepsilon \vartheta^2, \text{ sive, quia inter parallelas } \alpha \vartheta \\ \delta x \text{ est } \alpha \varepsilon : \varepsilon \vartheta = \alpha \delta : \varepsilon \delta, \\ = \alpha \delta^2 : \vartheta x^2.$$

Ergo singularis ac minima ratio est $\alpha \delta^2 : \vartheta x^2$. Sed est

$$\vartheta x = \vartheta \eta + \tau x, \text{ sive, quia propter superius lemma XIX} \\ \text{est } \vartheta \eta^2 = \alpha \gamma \cdot \beta \delta \text{ atque } \tau x^2 = \alpha \beta \cdot \gamma \delta, \\ = \sqrt{\alpha \gamma \cdot \beta \delta} + \sqrt{\alpha \beta \cdot \gamma \delta};$$

itaque singularis ac maxima ratio est

$$\alpha \delta^2 : (\sqrt{\alpha \gamma \cdot \beta \delta} + \sqrt{\alpha \beta \cdot \gamma \delta})^2.$$

Primus liber sectionis determinatae habet problemata sex, epitagmata sedecim, determinationes quinque, quarum maximae sunt quattuor, minima una. Suntque maximae ad secundum epitagma secundi problematis, ad tertium quarti problematis, ad tertium quinti, ad tertium sexti; minima autem ad tertium epitagma tertii problematis. Secundus liber sectionis determinatae habet problemata tria, epitagmata novem, determinationes tres, quarum minimae sunt duae, maxima una. Suntque minimae ad tertium epitagma primi problematis et ad tertium secundi, maxima autem ad tertium tertii problematis.

LEMMATA IN INCLINATIONUM LIBRUM PRIMUM.

Lemma utile ad primum problema.

1. Sit $\alpha \beta > \gamma \delta$, et $\alpha \varepsilon \cdot \varepsilon \beta = \gamma \zeta \cdot \zeta \delta$: dico esse $\alpha \varepsilon > \gamma \zeta$. Prop. 63

Bifariam secetur $\alpha \beta$ in

ε η β ε
 γ ϑ δ ζ

puncto η , et $\gamma \delta$ in ϑ : apparet igitur esse $\eta \beta > \vartheta \delta$.
Iam quia ex hypothesis est $\alpha \varepsilon \cdot \varepsilon \beta = \gamma \zeta \cdot \zeta \delta$, et $\eta \beta > \vartheta \delta$, est igitur

$\overline{ABTA}$ A, $\overline{\eta\beta}$ $\overline{\alpha\beta}$ $\overline{\gamma\delta}$ BS 10. $\overline{\eta\beta}$ $\overline{ABTA}$ A, distinx. BS
11—22. conf. supra cap. 10 12. 13. $\overline{\eta\beta}$ $\overline{\alpha\beta}$ $\overline{\gamma\delta}$ A. $\overline{\eta\beta}$ $\overline{\alpha\beta}$ $\overline{\gamma\delta}$ $\overline{\delta\eta}$
14. BS 16. $\overline{\eta\beta}$ $\overline{\alpha\beta}$ $\overline{\gamma\delta}$ $\overline{\delta\eta}$ $\overline{\alpha\beta}$, corr. Ge auctore C'o 18. $\overline{\eta\beta}$ $\overline{\alpha\beta}$ $\overline{\gamma\delta}$
ex $\overline{\eta\beta}$ 21. $\overline{\eta\beta}$ $\overline{\alpha\beta}$ $\overline{\gamma\delta}$ $\overline{\delta\eta}$ $\overline{\alpha\beta}$ pro $\overline{\eta\beta}$ 25. $\overline{\eta\beta}$ $\overline{\alpha\beta}$ in marg. (BS) $\overline{\eta\beta}$ $\overline{\alpha\beta}$
S, $\overline{\eta\beta}$ $\overline{AB}$ 28. $\overline{\eta\beta}$ $\overline{\alpha\beta}$ $\overline{\gamma\delta}$ $\overline{\delta\eta}$ $\overline{\alpha\beta}$ in A : super σ additum vide-
tur, $\overline{\eta\beta}$ $\overline{\alpha\beta}$ $\overline{\gamma\delta}$ $\overline{\delta\eta}$ $\overline{\alpha\beta}$ S, corr. Hu $\overline{\eta\beta}$ $\overline{\alpha\beta}$ $\overline{\gamma\delta}$ $\overline{\delta\eta}$ $\overline{\alpha\beta}$ A

ἄρα καὶ τὸ ἐπὶ $\Lambda\epsilon\beta$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $H\beta$, τοῦ ἐπὶ $\Gamma\zeta\Delta$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $\Theta\Delta$. ἀλλὰ τὸ μὲν ἐπὶ $\Lambda\epsilon\beta$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $H\beta$ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ $H\epsilon$, τὸ δὲ ἐπὶ $\Gamma\zeta\Delta$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $\Theta\Delta$ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ $Z\Theta$. μεῖζον ἄρα ἐστὶν καὶ τὸ ἀπὸ $H\epsilon$ τοῦ ἀπὸ $\Theta\zeta$, ὥστε μεῖζον ἐστὶν ἢ $H\epsilon$ τῆς $\Theta\zeta$.¹ ἔστιν δὲ καὶ ἡ $\Lambda\eta$ τῆς $\Gamma\theta$ μεῖζον. ὅλη ἄρα ἡ $\Lambda\epsilon$ ὅλης τῆς $\Gamma\zeta$ ἐστὶν μεῖζον.

Ὅμοίως δὲ καὶ, ἐὰν ἐλάσσων ἢ ἡ $\Lambda\beta$ τῆς $\Gamma\Delta$, καὶ ἴσον τὸ ἐπὶ $\Lambda\epsilon\beta$ τῷ ἐπὶ $\Gamma\zeta\Delta$, ἐλάσσων ἔσται ὅλη ἡ $\Lambda\epsilon$ ὅλης τῆς $\Gamma\zeta$.

10

- 121 β'. Ἐστω μεῖζον ἢ $\Lambda\beta$ τῆς $\Gamma\Delta$, καὶ τετμήσθω διχα ἡ $\Gamma\Delta$ κατὰ τὸ ϵ . φανερόν μὲν οὖν ὅτι δυνατόν ἐστιν τῷ ἐπὶ τῶν $\Gamma\epsilon$ $\epsilon\Delta$ ἴσον παρὰ τὴν $\Lambda\beta$ παραβαλεῖν. τὸ μὲν γὰρ ἐπὶ $\Gamma\epsilon\Delta$ ἴσον τῷ ἀπὸ $\Gamma\epsilon$, τὸ δὲ ἀπὸ $\Gamma\epsilon$ ἐλασσόν ἐστὶν τοῦ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς $\Lambda\beta$. παραβεβλήσθω, καὶ¹⁵ ἔστω τὸ ἐπὶ τῶν $\Lambda\zeta\beta$, καὶ ἔστω μεῖζον ἢ $\Lambda\zeta$ τῆς $\beta\beta$. πάλιν δὲ φανερόν ὅτι μεῖζον ἐστὶν ἢ $\Lambda\zeta$ τῆς $\Gamma\epsilon$, ἐλάσσων δὲ ἢ $\beta\zeta$ τῆς $\epsilon\Delta$.

Ἡ μὲν γὰρ $\Lambda\zeta$ τῆς μεῖζονος μεῖζον ἐστὶν ἢ ἡμισεία, ἢ δὲ $\Gamma\epsilon$ τῆς ἐλάσσονός ἐστιν ἡμισεία ὥς δὲ ἡ $\Lambda\zeta$ πρὸς τὴν $\Gamma\epsilon$, οὕτως ἢ $\epsilon\Delta$ πρὸς τὴν $\beta\beta$. μεῖζον ἄρα ἐστὶν ἢ $\Lambda\zeta$ τῆς $\Gamma\epsilon$, ὅπερ· ~

- 122 γ'. Ἐστω δὲ πάλιν ἴσον τὸ ἐπὶ $\Lambda\zeta\beta$ τῷ ἐπὶ $\Gamma\epsilon\Delta$, καὶ ἐλάσσων ἢ $\Lambda\beta$ τῆς $\Gamma\Delta$, καὶ ἔτι ἐλάσσων μὲν ἢ $\Lambda\epsilon$ τῆς $\epsilon\Gamma$, ἢ δὲ $\beta\zeta$ τῆς $\zeta\Delta$. ὅτι καὶ ἡ $\Lambda\zeta$ τῆς $\Gamma\epsilon$ ἐλάσσων ἐστίν.

Τετμήσθωσαν δὲ διχα αἱ $\Gamma\Delta$ $\Lambda\beta$ κατὰ τὰ η θ σημεία· ἐλάσσων ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ $\Lambda\theta$ τῆς $\Gamma\eta$, ὥστε καὶ τὸ ἀπὸ $\Lambda\theta$ τοῦ ἀπὸ $\Gamma\eta$ ἐστὶν ἐλασσόν. ἀλλὰ τὸ μὲν ἀπὸ $\Lambda\theta$

1. 2. $H\beta$, τοῦ ἐπὶ $\Gamma\zeta\Delta$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $\alpha\delta\delta$. Co 3. τὸ δὲ ἐπὶ $\zeta\Delta$ μετὰ $\Lambda\beta$, corr. Co in Lat. versione 4. ἐστὶ (ante τῷ ἀπὸ

$\Lambda\beta$ 5. ὥστε μεῖζον Λ , corr. BS 9. 10. τῆς ὅλης Λ , transpos. BS 11. β' add. BS 17. 18. ἐλασσον δὲ Λ , corr. BS 19. τῆς μεῖζονος ἐστὶν ἡμισεία Λ (BS), corr. Co 20. ἐστὶν ἡμισείας Λ cod. Co, corr. BS Co 20. 21. ὥς δὲ — τὴν $\beta\beta$ ut aliena a simplicitate manifestae

$\alpha\epsilon \cdot \epsilon\beta + \eta\delta^2 > \gamma\zeta \cdot \zeta\delta + \vartheta\delta^2$. Sed est *propter elem. 2. 6*

$\alpha\epsilon \cdot \epsilon\beta + \eta\delta^2 = \eta\epsilon^2$, et

$\gamma\zeta \cdot \zeta\delta + \vartheta\delta^2 = \vartheta\zeta^2$; ergo etiam

$\eta\epsilon^2 > \vartheta\zeta^2$,


ita ut sit $\eta\epsilon > \vartheta\zeta$. Sed est etiam $\alpha\eta > \gamma\vartheta$; ergo etiam tota $\alpha\epsilon$ maior est tota $\gamma\zeta$.

Similiter etiam, si sit $\alpha\beta < \gamma\delta$, et $\alpha\epsilon \cdot \epsilon\beta = \gamma\zeta \cdot \zeta\delta$. tota $\alpha\epsilon$ minor erit tota $\gamma\zeta$.

II. Sit $\alpha\beta > \gamma\delta$, et bifariam secetur $\gamma\delta$ in ϵ ; apparet *Prop. 66* igitur fieri posse, ut rectangulo $\gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta$ nequale *rectangulum* ad rectam $\alpha\beta$ applicetur¹. Est enim $\gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta = \gamma\epsilon^2$, et $\gamma\epsilon^2 < \left(\frac{\alpha\beta}{2}\right)^2$. Applicatum sit rectangulum $\alpha\zeta \cdot \zeta\beta$, sitque $\alpha\zeta > \zeta\beta$.


Rursus igitur apparet esse $\alpha\zeta > \gamma\epsilon$, et $\zeta\beta < \epsilon\delta$.

Est enim $\alpha\zeta$ maior dimidia parte maioris, et $\gamma\epsilon$ est dimidia pars minoris: ergo $\alpha\zeta > \gamma\epsilon$, q. e. d.



III. Sit rursus $\alpha\zeta \cdot \zeta\beta = \gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta$, et $\alpha\beta < \gamma\delta$, ac prae- *Prop. 67* terea $\delta\epsilon < \epsilon\gamma$, et $\beta\zeta < \zeta\alpha$: dico esse etiam $\alpha\zeta < \gamma\epsilon$.

Bifariam secetur $\gamma\delta$ in puncto η , et $\alpha\beta$ in puncto ϑ ; ergo est $\alpha\vartheta < \gamma\eta$, itaque etiam $\alpha\vartheta^2 < \gamma\eta^2$. Sed *propter elem. 2. 5* est $\alpha\vartheta^2$



¹ Id est, rectangulum construatur, cuius laterum uni angulo adjacentium summa sit = $\alpha\beta$. Conf. etiam p. 775 adnot. 1.

argumentationis del. Hu 21. 22. $\mu\epsilon\lambda\omega\nu$ — $\tau\eta\varsigma$ $\Gamma\Gamma$ nucleore Co add. Hu 22. $\delta\pi\epsilon\rho$ δ A, $\delta\pi\epsilon\rho$ $\epsilon\delta\epsilon\iota$ BS 23. γ^2 add. BS 24. η ante η AB additum in AB del. S $\epsilon\tau\epsilon$ Co pro $\delta\epsilon\iota$ 25. η $\delta\epsilon$ BZ Co pro $\epsilon\alpha\tau\epsilon$ $\delta\epsilon$ η BZ $\epsilon\lambda\alpha\sigma\sigma\omega\nu$ (sine spir. et acc.) A, corr. BS 26 post $\epsilon\alpha\tau\epsilon$ add. η $\delta\epsilon$ ZB $\tau\eta\varsigma$ $\Gamma\Gamma$ $\mu\epsilon\lambda\omega\nu$ Co 27. $\tau\alpha$ $H\epsilon\sigma$ A, distinct. BS 28. $\epsilon\lambda\alpha\sigma\sigma\omega\nu$ $\acute{\alpha}\rho\alpha$ A, corr. BS $\acute{\omega}\alpha\tau\epsilon$ Hu pro $\epsilon\alpha\tau\epsilon$ 29. $\acute{\alpha}\rho\theta\acute{o}$ $\Lambda\epsilon$ Co pro $\acute{\alpha}\rho\theta\acute{o}$ ΛZ $\acute{\alpha}\rho\alpha$

ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ τῶν ΑΖΒ καὶ τῷ ἀπὸ ΖΘ, τὸ δὲ ἀπὸ ΓΗ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ ΓΕΔ καὶ τῷ ἀπὸ ΗΕ· καὶ τὸ ὑπὸ ΑΖΒ ἄρα μετὰ τοῦ ἀπὸ ΖΘ ἔλασσόν ἐστιν τοῦ ὑπὸ ΓΕΔ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΗΕ. ὣν τὸ ὑπὸ ΑΖΒ ἴσον ὑπόκειται τῷ ὑπὸ ΓΕΔ· λοιπὸν ἄρα τὸ ἀπὸ ΘΖ ἔλασσόν ἐστιν τοῦ ἀπὸ ΗΕ· ἐλάσσων ἄρα ἐστὶν ἢ ΘΖ τῆς ΗΕ. ἦν δὲ καὶ ἢ ΑΘ τῆς ΓΗ ἐλάσσων· ὅλη ἄρα ἢ ΑΖ ὅλης τῆς ΓΕ ἐστὶν ἐλάσσων. ἢ δὲ λοιπὴ τῆς λοιπῆς μεῖζων.

123 δ'. Ἐστω δὲ πάλιν μεῖζων ἢ ΑΒ τῆς ΓΔ, καὶ τετμήσθω ἢ ΓΑ κατὰ τὸ Ε, ὥστε τὴν ΑΕ τῆς ΕΓ μὴ εἶναι ἐλάσσονα· φανερὸν μὲν οὖν ὅτι δυνατόν ἐστιν τῷ ὑπὸ τῶν ΓΕΔ ἴσον παρὰ τὴν ΑΒ παραβαλεῖν ἑλλειπὸν τετραγώνω.

Ἐπεὶ γὰρ μὴ ἐστὶν ἐλάσσων ἢ ΑΕ τῆς ΕΓ, ἦτοι ἴση ἐστὶν αὐτῇ ἢ μεῖζων. καὶ εἰ μὲν ἴση, ἴσον τὸ ὑπὸ ΓΕΔ τῷ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς ΓΑ, ὥστε ἔλασσον τοῦ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς ΑΒ, εἰ δὲ μεῖζων, πολλῶ ἔλασσόν ἐστιν τὸ ὑπὸ ΓΕΔ τοῦ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς ΑΒ καὶ γὰρ τοῦ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς ΓΑ ἐστὶν ἔλασσον). δυνατόν ἄρα ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΓΕΔ ἴσον παρὰ τὴν ΑΒ παραβαλεῖν ἑλλειπὸν τετραγώνω.



Παραβεβλήσθω, καὶ ἔστω τὸ ὑπὸ τῶν ΑΖΒ, καὶ τὸ μεῖζον τμήμα ἔστω ἢ ΑΖ· ὅτι δὴ ἐλάσσων ἐστὶν ἢ ΖΒ τῆς ΓΕ.

Ἐπεὶ γὰρ ἢ ΑΕ τῆς ΕΓ οὐκ ἐστὶν ἐλάσσων, ἦτοι ἄρα ἴση ἐστὶν ἢ μεῖζων. ἔστω πρότερον ἴση ἢ ΑΕ τῇ ΕΓ.

1. 2. τῶν αἰσ καὶ τῷ ἀπὸ ζδ τὸ δὲ ἀπὸ γη ἴσον ἐστὶ τῷ τε ὑπὸ add. B, ΑΖΒ καὶ τῷ ἀπὸ ΘΖ et reliqua perinde add. Co 4. μετὰ τοῦ ἀπὸ ΗΘ ABS, corr. Co in Lat. versione ἴσον add. Hu auctore Co 6. ἐλάσσονος ἄρα AB, corr. S 9. δ' add. BS 10. 11. εἶναι ἔλασσον A, corr. BS 11. δυνατόν add. Co 12. τετραγώνω Co pro τετράγωνον 13. μὴ] οὐκ Ge ἐλασσον 'sine spir. et acc.' A.B., corr. S 14. ἴση add. Co ἴσον τοῦ A, corr. BS, ἴσον ἐστὶ τὸ Ge 15. 16. τῆς ΓΑ — ἡμισείας om. S cod. Co 15. ἐλασσον] ἐλάσσονος AB, ἐλασσόν ἐστι Co 16. εἰ δὲ Co pro ἢ δὲ ἐλασσόν Co pro ἐλάσσονός 17. καὶ γὰρ B correctus, καὶ Γ ABS 18. δυνατόν Co pro δι 19. ὑπὸ τῶν ΓΕΔ A, corr. BS ἴσον Co pro ἴση παρὰ

$= \alpha\zeta \cdot \zeta\beta + \zeta\theta^2$, et $\gamma\eta^2 = \gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta + \eta\epsilon^2$; ergo etiam $\alpha\zeta \cdot \zeta\beta + \zeta\theta^2 < \gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta + \eta\epsilon^2$. In quibus secundum hypothesin est $\alpha\zeta \cdot \zeta\beta = \gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta$; ergo reliquum $\zeta\theta^2$ minus est reliquo $\eta\epsilon^2$, itemque $\zeta\theta < \eta\epsilon$. Sed erat etiam $\alpha\theta < \gamma\eta$; ergo tota $\alpha\zeta$ minor est tota $\gamma\epsilon$. Item reliqua $\zeta\beta$ maior reliqua $\epsilon\delta$.

IV. Iam sit rursus $\alpha\beta > \gamma\delta$, ac $\gamma\delta$ in puncto ϵ ita se-
 cetur, ut $\delta\epsilon$ non minor sit quam $\epsilon\gamma$; apparet igitur fieri posse,
 ut rectangulo $\gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta$ aequale *aliquod rectangulum* deficiens
 quadrato ad rectam $\alpha\beta$ applicetur. Prop. 68



Quoniam enim $\delta\epsilon$ non minor est quam $\epsilon\gamma$, aut aequalis est ipsi $\epsilon\gamma$ aut eadem maior. Ac primum, si aequalis est, rectangulum $\gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta$ aequale est quadrato a dimidia $\gamma\delta$, ideoque minus quam quadratum a dimidia $\alpha\beta$; sin vero

$\delta\epsilon$ maior est quam $\epsilon\gamma$, multo minus est rectangulum $\gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta$ quam quadratum a dimidia $\alpha\beta$ quippe etiam *propter elem. 6. 27* minus est quam quadratum a dimidia $\gamma\delta$). Potest igitur rectangulo $\gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta$ aequale *rectangulum* deficiens quadrato ad rectam $\alpha\beta$ applicari¹.

Applicatum sit rectangulum $\alpha\zeta \cdot \zeta\beta$. sitque $\alpha\zeta$ maius segmentum: dico esse $\zeta\beta < \gamma\epsilon$.

Quoniam enim $\delta\epsilon$ non minor est quam $\epsilon\gamma$, aut aequalis igitur est ipsi $\epsilon\gamma$ aut eadem maior. Sit primum $\delta\epsilon = \epsilon\gamma$.

4) Hoc sequitur ex elem. 6, 28; quamquam, si omnia explanare vellem, longa disputatione opus esset. Ne multa, dato rectangulo $\gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta$ aequale construendum est eiusmodi, ut summa laterum uni angulo adiacentium aequalis sit datae rectae $\alpha\beta$. Si igitur minus latus x appellamus, est $\gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta = \alpha\beta \cdot x - x^2$. Hinc rationem geometricam, quam Graecorum disciplina requirit, non difficile est constituere.

$\tau\eta\varsigma \overline{AB}$ ABS. mendum notavit V², corr. C^o 20. $\tau\epsilon\tau\alpha\gamma\omega\rho\epsilon$ C^o pro $\tau\epsilon\tau\alpha\gamma\omega\rho\omega\rho$ 22. $\delta\eta$ C^o pro $\delta\epsilon$ 22. $\tau\eta\varsigma \overline{FE}$ his scripta in A
 24. $\epsilon\lambda\alpha\sigma\sigma\omega\rho$ sine acc. A. corr. BS

ἐπεὶ οὖν μείζων ἐστὶν ἢ AB τῆς $ΓΔ$, καὶ ἔστι τῆς μὲν AB μείζων ἢ ἡμίσεια ἢ AZ , τῆς δὲ $ΓΔ$ ἡμίσεια ἢ $ΔΕ$, μείζων ἄρα ἐστὶν ἢ AZ τῆς $ΔΕ$. καὶ ἐστὶν ὡς ἢ AZ πρὸς τὴν $ΓΕ$, οὕτως ἢ $ΔΕ$ πρὸς τὴν ZB . μείζων ἄρα καὶ ἢ $ΓΕ$ τῆς ZB , ὥστε ἐλάσσων ἐστὶν ἢ ZB τῆς $ΓΕ$. 5

- 124 Ἐστω δὲ μείζων ἢ $ΔΕ$ τῆς $ΕΙ'$, καὶ τετμήσθω δίχα ἢ $ΓΔ$ κατὰ τὸ H σημεῖον, ἢ δὲ AB δίχα κατὰ τὸ $Θ$ σημείον. ἐπεὶ οὖν μείζων ἐστὶν ἢ AB τῆς $ΓΔ$, καὶ ἔστι τῆς μὲν AB ἡμίσεια ἢ $ΘΒ$, τῆς δὲ $ΓΔ$ ἡμίσεια ἢ $ΓΗ$, μείζων ἄρα ἢ $ΘΒ$ τῆς $ΓΗ$, ὥστε καὶ τὸ ἀπὸ $ΘΒ$ τοῦ ἀπὸ $ΓΗ$ 10 μείζον ἐστὶν. ἀλλὰ τὸ μὲν ἀπὸ $ΘΒ$ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ἐπὶ AZB καὶ τῷ ἀπὸ $ZΘ$, τὸ δὲ ἀπὸ $ΓΗ$ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ τῶν $ΓΕΔ$ καὶ τῷ ἀπὸ τῆς $ΕΗ$. μείζων ἄρα ἐστὶν τὸ ὑπὸ AZB μετὰ τοῦ ἀπὸ $ZΘ$ τοῦ ὑπὸ $ΓΕΔ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $ΕΗ$. ὦν τὸ ὑπὸ AZB ἴσον ἐστὶν τῷ ἐπὶ τῶν $ΓΕΔ$. λοι- 15 πὸν ἄρα τὸ ἀπὸ $ΘΖ$ μείζον ἐστὶν τοῦ ἀπὸ $ΕΗ$, ὥστε μείζων ἐστὶν ἢ $ΘΖ$ τῆς $ΕΗ$. ἐστὶν δὲ καὶ ἢ $ΑΘ$ τῆς $ΔΗ$ μείζων. ὅλη ἄρα ἢ AZ ὅλης τῆς $ΔΕ$ μείζων ἐστὶν. καὶ ἐστὶν ὡς ἢ AZ πρὸς τὴν $ΓΕ$, οὕτως ἢ $ΔΕ$ πρὸς τὴν ZB . μείζων ἄρα καὶ ἢ $ΓΕ$ τῆς ZB , ὥστε ἐλάσσων ἐστὶν ἢ ZB 20 τῆς $ΓΕ$, ὅπερ: ~

Εἰς τὸ ζ' πρόβλημα.

- 125 ε'. Ἐστω ἐλάσσων μὲν ἢ AB τῆς $ΓΔ$, ἴσον δὲ τὸ ἐπὶ τῶν $ΔΕΒ$ τῷ ἐπὶ $ΓΖΔ$. ὅτι ἐλάσσων ἐστὶν ἢ $ΔΕ$ τῆς $ΓΖ$. Τετμήσθωσαν δίχα αἱ AB $ΓΔ$ κατὰ τὰ $Θ$ H σημεία. 25 ἐλάσσων ἄρα ἐστὶν ἢ $ΘΒ$ τῆς $HΔ$. ἐπεὶ οὖν τὸ μὲν ἐπὶ $ΓΖΔ$ ἴσον ἐστὶν τῷ ἐπὶ $ΔΕΒ$, τὸ δὲ ἀπὸ $ΘΒ$ ἐλάσσον ἐστὶν τοῦ ἀπὸ $HΔ$, τὸ ἄρα ἐπὶ $ΔΕΒ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $ΘΒ$,

2. ἢ ante ἡμισ.) S, om. AB 4. πρὸς τὴν $ΔΕ$ οὕτως ἢ $ΓΕ$ ABS, corr. Hu καὶ om. BS 5. ἔστιν ἢ $ΖΘ$ ABS, corr. Co in lat. versione 9. ἡμίσεια — ἡμίσεια Co pro ἄρα — ἄρα 11. $ZΘ$ τὸ δὲ ἀπὸ bis scripta in ABS, mendum nolavit V², corr. Co 13. ἐπὶ add. Ge ἄρα A ex δαμ 14. τοῦ ἐπὶ $ΓΕΔ$ Co, τὸ ἐπὶ $ΔΕΔ$ AB, τῷ ἐπὶ αὐτὸ S 19. τὴν $ΔΕ$ οὕτως ἢ $ΔΗ$ ABS, τὴν $ΔΕ$ οὕτως ἢ $ΓΕ$ Co.

Quoniam igitur est $\alpha\beta > \gamma\delta$, et $\alpha\zeta > \frac{1}{2}\alpha\beta$, ergo est $\alpha\zeta > \delta\epsilon$,
 et, quia factum est $\alpha\zeta \cdot \zeta\beta$
 $= \gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta$, est $\alpha\zeta : \gamma\epsilon =$
 $\delta\epsilon : \zeta\beta$; ergo propter elem.
 5. 14 est etiam $\gamma\epsilon > \zeta\beta$,
 itaque $\zeta\beta < \gamma\epsilon$.

Sit autem $\delta\epsilon > \epsilon\gamma$, et bifariam secetur $\gamma\delta$ in puncto ι ,
 et $\alpha\beta$ in puncto ϑ . Quo-
 niam igitur est $\alpha\beta > \gamma\delta$,
 et $\vartheta\beta = \frac{1}{2}\alpha\beta$, et $\gamma\iota =$
 $\frac{1}{2}\gamma\delta$, ergo est $\vartheta\beta > \gamma\iota$,
 itaque etiam $\vartheta\beta^2 > \gamma\iota^2$.
 Sed est propter elem. 2. 5

$$\vartheta\beta^2 = \alpha\zeta \cdot \zeta\beta + \vartheta\zeta^2, \text{ et}$$

$$\gamma\iota^2 = \gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta + \epsilon\gamma^2; \text{ ergo}$$

$$\alpha\zeta \cdot \zeta\beta + \vartheta\zeta^2 > \gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta + \epsilon\gamma^2; \text{ in quibus secundum con-}$$

structionem est $\alpha\zeta \cdot \zeta\beta = \gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta$,
 quibus subtractis restat


$$\vartheta\zeta^2 > \epsilon\gamma^2; \text{ ergo } \vartheta\zeta > \epsilon\gamma.$$

Verum est etiam $\alpha\vartheta > \delta\iota$; ergo $\alpha\vartheta + \vartheta\zeta > \delta\iota + \iota\epsilon$, id est
 $\alpha\zeta > \delta\epsilon$. Sed est secundum constructionem $\alpha\zeta : \gamma\epsilon = \delta\epsilon : \zeta\beta$;
 ergo propter elem. 5. 14 est $\gamma\epsilon > \zeta\beta$, itaque $\zeta\beta < \gamma\epsilon$,
 q. e. d.

In sextum problema.

V. Sit $\alpha\beta < \gamma\delta$, et $\alpha\epsilon \cdot \epsilon\beta = \gamma\zeta \cdot \zeta\delta$; dico esse $\alpha\epsilon < \gamma\zeta$. Prop. 69

Bifariam secetur $\alpha\beta$
 in puncto ϑ , et $\gamma\delta$ in
 puncto ι ; ergo est $\vartheta\beta$
 $< \iota\delta$. Quoniam igitur
 est $\alpha\epsilon \cdot \epsilon\beta = \gamma\zeta \cdot \zeta\delta$, et
 $\vartheta\beta^2 < \iota\delta^2$, ergo est



corr. Hu 20. 21. $\alpha\delta$ et η FI. — $\eta\epsilon$ FI. Co pro $\alpha\delta$ et η AI. — $\eta\delta$ AI.
 23. ι add. BS 24. $\iota\delta$ et $\delta\iota$ AB, corr. S 25. $\alpha\delta$ AFI $\alpha\delta$ et
 $\iota\delta$ AI A, distinct. BS 26. $\delta\delta$ A, corr. BS

ὅ ἐστιν τὸ ἀπὸ ΘΒ, ἑλάσσων ἐστὶν τοῦ ἐπὶ ΓΖΑ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΗΑ, τοιούτων τοῦ ἀπὸ ΗΖ· ὥστε ἑλάσσων ἐστὶν ἢ ΕΘ τῆς ΗΖ. ἔστιν δὲ καὶ ἡ ΑΘ τῆς ΓΗ ἐλάσσων· ὅλη ἄρα ἡ ΑΕ ὅλης τῆς ΓΖ ἐστὶν ἐλάσσων.


Ὅμοιως καὶ μείζων ἢ, ἢ ὅλης τῆς ὅλης.

5

Παραθεωρούμενον ἐν τῷ ἡ' προβλήματι.

126 Ἡ. Ῥόμβον ὅτιος τοῦ ΑΑ, οὗ διάμετρος ἡ ΒΓΕ, ἐὰν τῶν ΒΕ ΕΙ μέση ἀνάλογον λιφθῇ ἡ ΕΖ, καὶ κέντρον μὲν τῷ Ε διαστήματι δὲ τῷ ΕΖ πύκλος γραφῇ ὁ ΖΗΘ, καὶ ἐκβληθῇ ἡ ΑΓΗ, ἔσται εὐθεῖα ἡ διὰ τῶν Η Κ Β.

10



Ἐπεξεύχθωσαν γὰρ αἱ ΑΕ ΕΚ ΒΚ ΚΗ ΗΕ. ἐπειδὴ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ ἐπὶ ΑΓΖ γωνία τῇ ἐπὶ ΖΓΚ γωνίᾳ καὶ ἐφ' ἑκάτερα τῆς τοῦ πύκλου διαμέτρου εἰσὶν, αἱ ΑΓ ΓΚ ἴσαι εἰσὶν (λήμμα γάρ· ἀλλὰ καὶ ἡ ΑΕ τῇ ΕΚ ἴση

ἐστίν· γωνία ἄρα ἡ ἐπὶ ΓΑΕ γωνία τῇ ἐπὶ ΓΚΕ ἴση ἐστίν. ἀλλὰ ἡ ἐπὶ ΓΑΕ ἴση ἐστὶν τῇ ἐπὶ ΓΗΕ· καὶ ἡ ἐπὶ ΓΗΕ ἄρα ἴση ἐστὶν τῇ ἐπὶ ΓΚΕ. ἔστιν δὲ καὶ ἡ ἐπὶ ΓΚΕ τῇ ἐπὶ ΓΒΚ· καὶ ἡ ἐπὶ ΓΒΚ ἄρα ἴση ἐστὶν τῇ ἐπὶ ΓΗΕ.

4. τοῦ ἐπὶ ΑΖΑ μετὰ ABS, corr. Co in Lat. versione 5 ἡ, ε.
Ge, ἡ ΑΣ, ἡ Β 7. ε' add. BS 8. ἡ ΕΖ Co pro ἡ ΕΖ 10. τῶν
ΗΚΒ Α, distinx. BS 44. ἐπεξεύχθω Α, corr. BS 43. ΗΕ add.
Hu, EH hoc loco add. Horsley p. 20, idem ante ΒΚ, deletis ΑΕ ΕΑ,
add. Co 49. διάμετρος ΑΒ, corr. S 21. 22. λήμμα γάρ olim
glossa ad marginem fuisse videtur 23. τῇ ΕΑ Α' ex τῆς ΕΚ 24. ἐπὶ
ΓΚ ἴση ΑΒ, corr. S 25. ΓΗΗ καὶ ἡ ἐπὶ ΓΗΗ ΑΒ, corr. S
26. 27. post τῇ ἐπὶ ΓΒΚ add. ἴση V 27. ΓΒΑ ante καὶ ἡ Α' ex Γ-

$\alpha\epsilon \cdot \epsilon\beta + \beta\gamma^2 < \gamma\epsilon^2 + \epsilon\delta^2$, id est propter elem. 2. 6
 $\beta\epsilon^2 < \gamma\epsilon^2$, itaque $\beta\epsilon < \gamma\epsilon$.

Verum est etiam $\alpha\beta < \gamma\delta$: ergo $\alpha\beta + \beta\epsilon < \gamma\delta + \gamma\epsilon$, id est
 $\alpha\epsilon < \gamma\epsilon$.

Similiter etiam, si sit $\alpha\beta > \gamma\delta$, demonstrabitur esse totam
 $\alpha\epsilon$ maiorem tota $\gamma\epsilon$.

Theorema suppletum in octavo problemate.

VI. Si sit rhombus $\alpha\delta$, eiusque diametrus ultra angulum Prop. 70
 γ producta $\beta\gamma\epsilon^1$, et si rectarum $\beta\epsilon$ $\epsilon\gamma$ media proportionalis
sumatur $\epsilon\zeta$, et centro ϵ radioque $\epsilon\zeta$ circulus describatur $\zeta\delta\theta$,
et producat $\lambda\gamma\eta$, recta linea erit quae per puncta η ζ β
transibit.

Iungantur enim $\lambda\epsilon$ ex $\beta\gamma$ $\gamma\epsilon$ $\gamma\delta$. Quoniam igitur, ut in
rhombis, anguli $\lambda\gamma\epsilon$ $\zeta\gamma\delta$ aequales iidemque ad utramque partem
circuli diametri sunt, rectae $\lambda\gamma$ $\gamma\zeta$, utpole iuncta hos aequales
angulos ad circumferentiam circuli ductae, inter se aequales
sunt². Sed est etiam $\lambda\epsilon = \epsilon\zeta$: ergo est $\angle \gamma\lambda\epsilon = \angle \gamma\zeta\epsilon$.
Sed est etiam $\angle \gamma\lambda\epsilon = \angle \gamma\eta\epsilon$; ergo etiam $\angle \gamma\eta\epsilon = \angle \gamma\zeta\epsilon$.
Sed, quia ex hypothesi est $\epsilon\beta : \epsilon\zeta = \epsilon\zeta : \epsilon\gamma$, et $\epsilon\zeta = \epsilon\zeta$, in
similibus igitur triangulis $\beta\epsilon\zeta$ et $\zeta\epsilon\gamma$, est etiam $\angle \zeta\beta\epsilon$ (sive
 $\gamma\beta\zeta$) $= \angle \gamma\zeta\epsilon$; ergo etiam $\angle \gamma\beta\epsilon = \angle \gamma\eta\epsilon$. Sed est etiam

1. Scriptura codicis $\alpha\delta$ $\delta\alpha\mu\epsilon\tau\epsilon\sigma$ η $\beta\gamma\delta$: rhombum quendam $\alpha\delta\gamma$
designare videtur. At vero ex demonstratione, quae sequitur, sponte
apparet rhombi angulum esse γ , non ϵ ; ideoque ipsam rhombi diame-
trum significari $\beta\gamma$, in eaque producta esse punctum ϵ , tam prior ista
opinio, quam falsam esse dixi, etiam per figuram in codicibus tradita
est, quae rhombum $\alpha\delta\beta$ et ipsum ϵ circuli centrum exhibet. Contra
Horsleius p. 19 veram rationem invenit, quae quidem ex ipsis etiam
Graecis verbis, modo brevitatis interdum sane obscurae veterum ma-
thematicorum recodemur, eo quo supra posui modo elici potest.


2. Verbis in codice additis $\lambda\eta\mu\alpha$ $\gamma\alpha\gamma$ libentius caremus. Nam
etsi tale quoddam lemma olim existisse minime negaverim, tamen
scriptor brevitatis studiosus id perinde, ac plurima alia silentio omi-
sisse videtur. Demonstrationem autem lemmatis supra significavi, quam
qua ratione veteres peregerint, ambiguum est. Nostrates quidem per
quantum congruentiae theorema tria $\lambda\gamma$ et $\pi\gamma$ aequalia ac similia
esse statim intellegant; at in Graecis initium theorematum factum esse
puto a ducta $\lambda\alpha\zeta$, unde, adhibita elem. 3 propositione 3, apagogica ra-
tione comprobatum esse censeam tria $\lambda\mu$ $\gamma\alpha$ $\pi\alpha$ orthogonia esse etc.

3. Addita haec secundum V², similiter Horsley p. 20.

ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπὶ $HI'E$ τῇ ἐπὶ $BΓK$ ἴση ἐστίν· λοιπὴ ἄρα ἡ ἐπὶ $ΓΕΗ$ λοιπὴ τῇ ἐπὶ $ΓΚΒ$ ἴση ἐστίν· ἀλλὰ ἡ ἐπὶ $Γ'ΕΗ$ μετὰ τῆς ἐπὶ $ΓΚΗ$ δυοῖν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν· καὶ ἡ ἐπὶ $ΓΚΒ$ ἄρα μετὰ τῆς ἐπὶ $ΓΚΗ$ γωνίας δυοῖν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν· ὥστε εὐθεία ἐστίν ἡ διὰ τῶν B K H σιμείων.

Λήμμα χρήσιμον εἰς τὸ ἐπὶ τετραγώνων ποιοίντων τὰ αὐτὰ τῷ ῥόμβῳ.]

- 127 ζ'. Ἐστω τετραγώνον τὸ $ΑΖ$, καὶ ἔχθω ἡ BHE , καὶ αὐτῇ ὀρθὴ, ἔχθω ἡ EZ . ὅτι τὰ ἀπὸ τῶν $Γ$ $Δ$ HE τετραγώνων ἴσα ἐστίν τῷ ἀπὸ τῆς $ΔΖ$ τετραγώνῳ.



Ἐχθω διὰ τοῦ E τῇ $Γ$ $Δ$ παράλληλος ἡ $ΕΘ$. ὀρθὴ ἄρα ἐστίν ἡ ἐπὶ $ΙΕΘ$ γωνία. ἐστίν δὲ καὶ ἡ ἐπὶ $ΖΕΗ$ γωνία ὀρθή· ἴση ἄρα ἐστίν καὶ ἡ ἐπὶ $ΓΕΗ$ γωνία, τοιούτη ἐστίν ἡ ἐπὶ $ΔΒΗ$ γωνία, τῇ ἐπὶ $ΖΕΘ$ γωνία. ἐστίν δὲ

καὶ ἡ ἐπὶ $ΖΘΕ$ γωνία ὀρθὴ τῇ ἐπὶ $ΒΔΗ$ ἴση, καὶ ἐστίν ἴση ἡ $ΕΘ$ τῇ $ΒΔ$. ἴση ἄρα ἐστίν καὶ ἡ EZ τῇ HB . ἐπεὶ δὲ τὸ ἀπὸ τῆς BZ ἴσον τοῖς ἀπὸ τῶν BE EZ τετραγώνοις, ὧν τὸ ἐπὶ $ΖΒΔ$ ἴσον ἐστίν τῷ ἐπὶ $ΕΒΗ$ ἐν κύλῳ γάρ ἐστιν τὰ $Δ$ $Ζ$ E H σιμεία, λοιπὸν ἄρα τὸ ἐπὶ $ΒΖΔ$ ἴσον ἐστίν τῷ τε ἐπὶ $ΒΕΗ$ καὶ τῷ ἀπὸ EZ τετραγώνῳ, εὐτετέστιν καὶ τῷ ἀπὸ BH τετραγώνῳ. ἀλλὰ τὸ ἐπὶ $ΒΕΗ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ BH τετραγώνου τὸ ἐπὶ $ΕΒΗ$ ἐστίν μετὰ τοῦ ἀπὸ $ΕΗ$ τὸ ἄρα ἐπὶ $ΒΖΔ$ ἴσον ἐστίν τῷ τε ἐπὶ

4. γωνίας Ge pro γωνία 5. τῶν BKH A, distinx. BS 7. 8. ἐπὶ τετραγώνων [super vs. πρόβλημα add. man. rec.] ποιοῦν τα αὐτὰ τῷ ῥόμβῳ A'B', δ' πρόβλημα ποιοῦν τὰ αὐτὰ τῷ ῥόμβῳ S, corr. Hu 9. ζ' add. BS 10 ὀρθῇ [sine acc. A, corr. BS 21. τὰ $ΔΖΕΗ$ A cod. Co, distinx. B, corr. S Co 26-28 ἀλλὰ τῷ τε τετραγώνῳ ἴσον ἐστὶ τὸ ἐπὶ $ΕΒΗ$ μετὰ τοῦ cet. Ge non perspecta Graecorum verborum structura 27. ἐστίν ἄρα μετὰ A. sed ἄρα expunctum

$\angle \gamma \rho \epsilon = \angle \beta \gamma \kappa$ uterque enim angulo $\lambda \gamma \beta$ aequalis est ⁴; ergo in triangulis $\kappa \beta \gamma$ et $\epsilon \eta \gamma$ est etiam $\angle \gamma \kappa \beta = \angle \gamma \epsilon \eta$. Sed, quia erat $\angle \gamma \rho \epsilon = \angle \gamma \kappa \epsilon$, propter elem. 3. 21 igitur in circulo sunt puncta $\kappa \gamma \epsilon \eta$, itaque ⁵ anguli $\gamma \epsilon \eta + \gamma \kappa \eta$ duobus rectis aequales sunt. Sed erat $\angle \gamma \epsilon \eta = \angle \gamma \kappa \beta$; ergo etiam anguli $\gamma \kappa \beta + \gamma \kappa \eta$ duobus rectis aequales sunt, itaque recta est linea quae per puncta $\beta \kappa \eta$ transit.

[Lemma utile ad problema de quadratis quorum summa rhombo aequalis est ¹.]

VII. Sit quadratum $\alpha \delta$, et ducatur $\beta \eta \epsilon$, eique perpendi- Prop. 71
cularis $\epsilon \zeta$: dico esse $\gamma \delta^2 + \eta \epsilon^2 = \delta \zeta^2$.

Ducatur per ϵ rectae $\gamma \delta$ parallela $\epsilon \theta$; rectus igitur est angulus $\gamma \epsilon \theta$. Sed est etiam angulus $\zeta \epsilon \eta$ rectus; ergo angulus $\gamma \epsilon \eta$, id est angulus $\delta \beta \eta$, angulo $\zeta \epsilon \theta$ aequalis est. Sed est etiam $\zeta \theta \epsilon$ recto $\beta \delta \eta$ aequalis, estque $\epsilon \theta$ rectae $\beta \delta$ aequalis; ergo in triangulis $\zeta \epsilon \theta$ $\eta \beta \delta$ etiam rectae $\epsilon \zeta$ $\beta \eta$ aequales sunt. Sed quoniam est

$$\beta \zeta^2 = \beta \epsilon^2 + \epsilon \zeta^2, \text{ sive}$$

$$\beta \zeta \cdot \beta \delta + \beta \zeta \cdot \zeta \delta = \beta \epsilon \cdot \beta \eta + \beta \epsilon \cdot \epsilon \eta + \epsilon \zeta^2,$$

et quia, rectis angulis $\eta \epsilon \zeta$ et $\eta \delta \zeta$, in circulo sunt puncta $\delta \zeta \epsilon \eta$, itaque ² $\beta \zeta \cdot \beta \delta = \beta \epsilon \cdot \beta \eta$; his igitur subtractis restat

$$\beta \zeta \cdot \zeta \delta = \beta \epsilon \cdot \epsilon \eta + \epsilon \zeta^2.$$

$$= \beta \epsilon \cdot \epsilon \eta + \beta \eta^2.$$

Sed est propter elem. 2, 3 $\beta \epsilon \cdot \epsilon \eta = \beta \eta \cdot \eta \epsilon + \eta \epsilon^2$, ideoque

4) "Quia anguli $\overline{\eta \gamma \epsilon}$ $\overline{\lambda \gamma \zeta}$ sunt $\pi \alpha \rho \alpha \ \kappa \alpha \rho \alpha \ \eta \nu$ et anguli $\overline{\lambda \gamma \zeta}$ $\overline{\zeta \gamma \kappa}$ aequales" V² ac similiter Co et Horsley.

5) Sic demonstratio quam brevissime suppleta est. Multo prolixius Horsley p. 20 sq.: "Producta enim $\kappa \gamma$ circulo iterum in ν occurrat, et iungatur $\epsilon \nu$. Propter angulos $\nu \gamma \theta$ $\eta \gamma \theta$ aequales, aequales erunt $\gamma \nu$ $\gamma \eta$. Sed $\epsilon \nu = \epsilon \eta$, et $\epsilon \gamma$ triangulis utrisque $\epsilon \gamma \nu$ $\epsilon \gamma \eta$ latus commune. Angulus igitur $\nu \epsilon \gamma = \eta \epsilon \gamma$, ac proinde $\partial \epsilon \nu = \partial \epsilon \eta$, et arcus $\nu \theta$ arcui $\eta \theta$ aequalis. Angulus igitur $\gamma \kappa \eta$ seu $\nu \kappa \eta$ angulo $\partial \epsilon \eta$ aequalis. Duo igitur $\gamma \epsilon \eta$ $\gamma \kappa \eta$ duobus $\gamma \epsilon \eta$ $\eta \epsilon \theta$ ac proinde duobus rectis aequales sunt".

1) Vide append.

2) Quomodo hoc ex elem. 3, 36 veteres derivaverint, breviter significavimus supra p. 494 adnot. **.

$$\beta\epsilon \cdot \epsilon\eta + \beta\eta^2 = \beta\eta \cdot \eta\epsilon + \beta\eta^2 + \eta\epsilon^2, \text{ sive (elem. l. v.)} \\ = \epsilon\beta \cdot \beta\eta + \eta\epsilon^2; \text{ ergo est}$$

$$\beta\zeta \cdot \zeta\delta = \epsilon\beta \cdot \beta\eta + \eta\epsilon^2, \text{ id est, ut supra demonstravimus,} \\ = \zeta\beta \cdot \beta\delta + \eta\epsilon^2. \text{ Commune subtrahatur } \beta\delta \cdot \delta\zeta; \\ \text{restat igitur}$$

$$\delta\zeta^2 = \beta\delta^2 + \eta\epsilon^2, \text{ id est} \\ = \gamma\delta^2 + \eta\epsilon^2.$$

Problema, ut Heraclitus.

VIII. Si sit quadratum $\alpha\delta$, efficere, ut data $\epsilon\zeta$, cuius ^{Prop. 72} terminus ϵ sit in producta $\alpha\gamma$, alter autem terminus in recta $\gamma\delta$, inclinet ad punctum β .

Factum iam sit, et a puncto ϵ rectae $\beta\epsilon$ perpendicularis ducatur $\epsilon\eta$. Quoniam igitur propter superius lemma est $\gamma\delta^2 + \zeta\epsilon^2 = \delta\eta^2$, et data sunt $\gamma\delta^2$ $\zeta\epsilon^2$ (utraque enim rectarum $\gamma\delta$ $\zeta\epsilon$ magnitudine data est, datum est igitur etiam $\delta\eta^2$. Data est igitur $\delta\eta$ magnitudine; ergo etiam tota $\beta\eta$ magnitudine data est. Sed eadem etiam positione; ergo semicirculus super $\beta\eta$ positione datus est, qui, quoniam angulus $\beta\epsilon\eta$ rectus est, per punctum ϵ transit. Ergo punctum ϵ positione circumferentiam tangit. Sed etiam rectam $\alpha\epsilon$ positione tangit; ergo datum est (dat. 25). Sed etiam β datum est; positione igitur data est $\beta\epsilon$.

Componetur autem problema hoc modo. Sit quadratum $\alpha\delta$, et data recta ϑ , et $\gamma\delta^2 + \vartheta^2 = \delta\eta^2$. Est igitur $\eta\delta > \delta\gamma$, itaque etiam $\eta\delta \cdot \delta\eta > \delta\gamma^2$. Ergo semicirculus super $\beta\eta$ descriptus punctum γ superabit. Describatur, sitque $\beta\chi\epsilon\eta$, et produca-

2. τὸ ὑπὸ $\overline{HZZ}$ ABS, τὸ ὑπὸ $\overline{\zeta\beta}$ V², corr. Co 3. τῶν B. IIIE
— τῶν FJHE A, distinx. BS 6. ἡ add. BS θέσει om. Co
τοῦ AJ ποιεῖν] τοῦ AJ εἶναι ABS, τοῦ AJ ἐπαλλεῖν AF ἐπὶ τὸ E
καὶ ποιεῖν Co 8. ὀρθογώνιος] ὀρθογώνιον εὐθεία γὰρ ABS, ὀρθο-
γώνιος εὐθεία, omisso γὰρ, Co, ὀρθῇ, omisissis εὐθεία γὰρ, Co 9. ἴσα
add. Co 11. δοθεῖσα γὰρ ἑκάτερα τῶν FJ ZE τῇ μεγέθει Hu, nisi
forte haec parenthesis delenda est 15. περιφέρεια A cod. Co. corr.
BS Co 16. 17. εὐθεία τῆς AE δοθεῖσα ἄρα — δοθεῖσα θέσει ABS,
corr. Co 20. τῶν FJΘ ABS et sic posthac, distinx. Co

καὶ ἔστω τὸ $BKEH$, καὶ ἐκτελλήσθω ἡ AI ἐπὶ τὸ E , καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ BE , EH . τὰ ἄρα ἀπὸ τῶν $ΓΑ$ EZ τετράγωνα ἴσα ἐστὶν τῷ ἀπὸ $HΑ$ τετραγώνῳ. τῷ δὲ ἀπὸ $ΑΗ$ ἴσα ἐπέθῃ τὰ ἀπὸ τῶν $ΓΑ$ $Θ$ τετράγωνα. ἴσα ἄρα ἐστὶν τὰ ἀπὸ τῶν $ΓΑ$ $Θ$ τετράγωνα τοῖς ἀπὸ τῶν $ΓΑ$ EZ , ὥστε ἴσον ἐστὶν τὸ ἀπὸ $Θ$ τῷ ἀπὸ EZ τετραγώνῳ. ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ $Θ$ τῇ EZ . καὶ ἐστὶν δοθείσα ἡ EZ . ἡ EZ ἄρα ποιεῖ τὸ πρόβλημα.

Λέγω δὲ ὅτι καὶ μόνη. διήχθω γάρ τις καὶ ἑτέρα ἡ $BΑ$. εἰ δὴ καὶ ἡ $BΑ$ ποιεῖ τὸ πρόβλημα, ἔσται ἴση ἡ $ΝΑ$ τῇ EZ . μείζων δὲ ἡ ZB τῆς NB . ὅλη ἄρα ἡ $BΑ$ ἐλάσσων ἐστὶ τῆς BE , ὑπερ ἄτοπον. ἐστὶν γὰρ μείζων οὐκ ἄρα ἡ $BΑ$ ποιεῖ τὸ πρόβλημα. ἡ BE ἄρα μόνη.

Ἵνα δὲ καὶ ἐπιγνώμεν, ποτέρα αὐτῶν μείζων, δείξομεν οὕτως. ἐπεὶ μείζων ἐστὶν ἡ μὲν AB τῆς BE , ἡ δὲ BZ τῆς BN , λοιπὴ ἄρα ἡ NA τῆς ZE μείζων ἐστίν. καὶ φανερόν οὖν αἰεὶ ἡ ἔγγιστα τοῦ $Γ$ σημείου τῆς ἀπώτερον ἐλάσσων.

Ἔκκμα χρήσιμον εἰς τὸν τοῦ Θ' προβλήματος διορισμόν, ὡς ἐν τοῖς ἀρχαίοις.

20

130 Θ' . Ἐστω ἴση ἡ BA τῇ AI , καὶ τετμήσθω ἡ BF δίχα κατὰ τὸ A σημεῖον. ὅτι ἐλαχίστη ἐστὶν ἡ BF πασῶν τῶν διὰ τοῦ A σημείου διαγομένων εὐθειῶν.

Διήχθω γάρ τις καὶ ἑτέρα ἡ EZ , καὶ ἐκτελλήσθω ἡ AB ἐπὶ τὸ Z . ὅτι μείζων ἐστὶν ἡ EZ τῆς $ΓB$. ἐπεὶ μείζων ἐστὶν ἡ ἐπὶ $ABΓ$ γωνία, τρυπέσιν ἡ $Γ$, τῆς ὑπὸ BZE , δυνατόν ἐστὶν τῇ ἐπὶ BZE ἴσην ἀπὸ τῆς $Γ$ ἀφελεῖν.

2. ἐπεξεύχθω A , corr. BS 2. 3. τετράγωνον ἴσον ἄρα ἐστὶν A (B cod. Co), corr. S Co 3. post $HΑ$ τετραγώνῳ add. διὰ τὸ ζ' cod. Paris. 2368 m. rec. S 7. ἡ EZB ἄρα A , corr. BS 40. 41. ἡ $HΑ$ AB cod. Co , corr. S Co 12. ἔσται τῆς Hu pro ἐστὶν τῆς 14. post αὐτῶν add. τῶν $\pi\lambda$ $\zeta\epsilon$ cod. Paris. 2368 m. rec. S 16. τῆς ZH μείζων AB , τῆς $\pi\lambda$ μείζων in suo codice legit Co , corr. S Co ἐστὶ A^oBS 19. προβλήματος Hu auctore Horsleio p. 7 pro θεωρήματος 24. Θ' add. BS 23. διαγομένων S , αιταγομένων A B 25. 26. τῆς ἐπὶ $BEZE$ A , τῆς $\beta\zeta\epsilon$, omisso ἐπὶ. B^oS

tur $\alpha\gamma$ ad ϵ , et iungantur $\beta\epsilon$ et $\epsilon\eta$. Est igitur propter superioris lemma $\gamma\delta^2 + \zeta\epsilon^2 = \delta\eta^2$. At suppositum est $\delta\eta^2 = \gamma\delta^2 + \vartheta^2$; ergo est $\vartheta^2 = \zeta\epsilon^2$, itaque $\vartheta = \zeta\epsilon$. Estque data ϑ ; itaque data etiam $\zeta\epsilon$; ergo $\zeta\epsilon$ problema efficit.

Iam dico solam $\zeta\epsilon$ problema efficere. Ducatur enim alia quaedam $\beta\lambda$ infra punctum ϵ . Si igitur etiam $\beta\lambda$ problema efficit, erit $\nu\lambda = \zeta\epsilon$. Sed est $\beta\nu < \beta\zeta^*$; ergo tota $\beta\lambda$ minor erit quam $\beta\epsilon$, quod absurdum est; est enim maior¹. Ergo $\beta\lambda$ non efficit problema; itaque sola $\beta\epsilon$.

Verum ut etiam cognoscamus, utra harum rectarum maior sit, sic demonstrabimus. Quoniam maior est $\lambda\beta$ quam $\beta\epsilon$, et $\beta\zeta$ quam $\beta\nu$, reliqua igitur $\nu\lambda$ maior est quam $\zeta\epsilon^{**}$. Et apparet, quo quaeque recta propius accedit punctum γ , eo hanc ipsam minorem esse quam remotiorem².

Lemma utile ad noni problematis determinationem, ut apud veteres reperitur.

IX. Sit $\beta\alpha = \alpha\gamma$, et $\beta\gamma$ bifariam secetur in puncto δ ; Prop. dico $\beta\gamma$ minimam esse omnium rectarum quae per punctum δ ducuntur³. 73

Ducatur enim etiam alia quaedam $\epsilon\zeta$, et producat $\alpha\zeta$ ad punctum ζ : dico esse $\epsilon\zeta > \gamma\beta$. Quoniam angulus $\alpha\beta\gamma$, id est $\alpha\gamma\beta$, maior est quam angulus $\beta\zeta\epsilon$, ab angulo $\alpha\gamma\beta$ potest angulus aequalis angulo $\beta\zeta\epsilon$ auferri. Sit $\angle \delta\gamma\epsilon = \angle \beta\zeta\epsilon$:

* "Quia angulus $\beta\gamma\zeta$ est obtusus eo quod angulus δ est rectus" V2; respicit igitur triangulum $\beta\gamma\zeta$ et Eucl. elem. 1, 19.


1, "Quia angulus α est rectus, angulus $\beta\epsilon\lambda$ est obtusus. ergo $\beta\lambda$ maior quam $\beta\epsilon$ " V2. Ad incredibiles ambages aberrat Co.

** Scilicet si esset $\lambda\beta = \beta\epsilon$, foret $\nu\lambda > \zeta\epsilon$; ergo, quoniam est $\lambda\beta > \beta\epsilon$, multo est $\nu\lambda > \zeta\epsilon$.

2) Ex hac determinatione derivatur etiam is casus, quem scriptor supra omisit, scilicet si in eadem figura recta $\beta\lambda$ ducatur infra puncta γ et ϵ .

3) "In omni triangulo isoscele reclarum omnium, quae per punctum baseos medium ductae lateribus interceptantur, basis minima est" Horsley p. 12.

ἔστω αὐτῇ ἴση ἡ ἐπὶ $\triangle ΓΗ$ γωνία· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ $ΖΔ$ πρὸς τὴν $ΑΒ$, οὕτως ἡ $ΓΔ$ πρὸς τὴν $ΔΗ$ · μείζων δὲ ἡ $ΖΔ$ τῆς $ΑΒ$ · μείζων ἄρα καὶ ἡ $ΓΔ$ τῆς $ΔΗ$. ἐπεὶ οὖν μείζων ἔστιν ἡ $ΖΔ$ τῆς $ΑΒ$, τοῦτο



ἔστιν τῆς $ΑΓ$, ἀλλὰ ἡ $ΑΓ$ τῆς $ΔΗ$ μείζων ἔστιν, μεγίστη ἄρα ἔστιν ἡ $ΖΔ$, ἐλαχίστη δὲ ἡ $ΔΗ$. ἐπεὶ οὖν τέσσαρες εὐθεῖαι ἀνάλογόν εἰσιν αἱ $ΖΔ$ $ΑΒ$ $ΑΓ$ $ΔΗ$, καὶ ἔστιν μεγίστη μὲν ἡ $ΖΔ$, ἐλαχίστη δὲ ἡ $ΔΗ$, μείζων ἄρα ἔστιν ἡ $ΖΗ$ τῆς $ΒΓ$, ὥστε ἡ $ΒΓ$, ἐλάσσων οὖσα τῆς $ΖΗ$, πολλῶν ἐλάσσων ἔστιν τῆς $ΕΖ$. ὁμοίως δεῖξομεν ὅτι καὶ πασῶν τῶν διὰ τοῦ $Α$ διαγομένων εὐθειῶν ἐλάσσων ἔστιν ἡ $ΒΓ$.

Ἡ $ΒΓ$ ἄρα ἐλάσσων ἔστιν πασῶν τῶν διὰ τοῦ $Α$ διαγομένων εὐθειῶν· λέγω δὴ ὅτι καὶ ἡ ἔγγιστα αὐτῆς τῆς ἀπώτερον ἐλάσσων ἔστιν. διήχθω γάρ τις καὶ ἑτέρα ἡ $ΘΚ$, καὶ τῇ $Κ$ γωνία ἴση συνεστήτω ἡ ὑπὸ $ΑΕΑ$ (δυνατὸν γάρ). πάλιν δὲ μείζων ἡ μὲν $ΚΑ$ τῆς $ΖΑ$, ἡ δὲ $ΕΑ$ τῆς $ΑΑ$, ὥστε ἡ $ΚΑ$ μείζων ἔστιν τῆς $ΕΖ$ · πολλῶν ἄρα μείζων ἡ $ΘΚ$ τῆς $ΕΖ$, ὥστε ἐλάσσων ἔστιν ἡ $ΕΖ$ τῆς $ΘΚ$. ἐλάσσων μὲν ἄρα ἔστιν ἡ $ΒΓ$ πασῶν τῶν διὰ τοῦ $Α$ διαγομένων εὐθειῶν, ἡ δὲ ἔγγιστα αὐτῆς τῆς ἀπώτερον ἐλάσσων.


- 131 Ἦ. Τοῦτου ὄντος, φανερὸς ὁ διορισμὸς. ἔαν γὰρ ἐκθώμεθα τὸν ῥόμβον τὸν $ΑΒΓΔ$, καὶ ἐπιτεύξας τὴν $ΑΔ$ ἀγάγω αὐτῇ ὁρθὴν τὴν $ΕΖ$ συμπίπτουσιν ταῖς $ΑΓ$ $ΑΒ$ κατὰ τὰ $Ε$ $Ζ$, δεῖ με διοριζέσθαι πότερον μεγίστη ἔστιν τῶν ἐλάσσων πασῶν τῶν διὰ τοῦ $Α$ διαγομένων εὐθειῶν. καὶ ἐπεὶ διαγωνίως ἔστιν ἡ $ΑΔ$, καὶ τῇ $ΑΔ$ ὁρθῇ ἡ $ΕΖ$.

est igitur $\zeta\delta : \delta\gamma = \gamma\delta : \delta\eta$. Est autem $\zeta\delta > \delta\gamma$; ergo $\gamma\delta > \delta\eta$. Quoniam igitur est $\zeta\delta > \delta\gamma$; id est $> \delta\gamma$, et $\delta\gamma > \delta\eta$, maxima igitur est $\zeta\delta$, et minima $\delta\eta$. Quoniam igitur quattuor rectae in proportionem sunt ita, ut sit $\zeta\delta : \delta\gamma = \delta\gamma : \delta\eta$, estque maxima $\zeta\delta$ et minima $\delta\eta$, propter elem. 5, 25 est $\zeta\delta + \delta\eta > \beta\delta + \delta\gamma$, sive $\zeta\eta > \beta\gamma$; itaque $\beta\gamma$, quippe quae minor sit quam $\zeta\eta$, multo minor erit quam $\zeta\epsilon$. Similiter demonstrabimus omnium rectarum, quaecunque per punctum δ ducuntur, minimam esse $\beta\gamma$.

Minima igitur $\beta\gamma$ est omnium rectarum, quaecunque per punctum δ ducuntur. Iam dico etiam propiorem quamque minorem esse remotiore. Ducatur enim etiam alia quaedam $\alpha\theta$, et construatur $\angle \delta\epsilon\lambda = \angle \delta\alpha\zeta$ (quod fieri potest). Iam rursus est $\alpha\delta > \zeta\delta$, et $\epsilon\delta > \delta\lambda$, et sunt in proportionem $\alpha\delta : \zeta\delta = \epsilon\delta : \delta\lambda$; itaque, ut supra, $\alpha\delta + \delta\lambda > \zeta\delta + \delta\epsilon$, sive $\alpha\lambda > \zeta\epsilon$. Multo igitur maior est $\alpha\theta$ quam $\zeta\epsilon$, itaque $\zeta\epsilon$ minor quam $\alpha\theta$. Ergo $\beta\gamma$ minima est omnium rectarum, quaecunque per punctum δ ducuntur, et propior quaeque minor remotiore.

X. Quod cum ita sit, manifesta est determinatio.

Prop.
74



Si enim ponam rhombum $\alpha\beta\delta\gamma$, et iungam $\alpha\delta$, eique perpendicularem ducam $\epsilon\zeta$, quae productus $\alpha\gamma$ $\alpha\beta$ in punctis ϵ ζ secet. determinandum mihi est, sitne $\epsilon\zeta$ maxima an minima omnium rectarum, quae per punctum δ ducuntur. Et quoniam diagonalis est $\alpha\delta$, eique perpendicularis $\epsilon\zeta$, factum mihi

A_1B_1 , corr. S 11. $\epsilon\sigma\tau\iota$ A^oBS 12. $\mu\epsilon\lambda\omega\sigma\alpha\iota$ A , corr. BS 44. $\sigma\iota'\sigma\alpha$ Co .
 $\epsilon\sigma\tau\iota\upsilon$ A $\epsilon\sigma\tau\iota$ BS 44. 15. $\epsilon\lambda\alpha\sigma\sigma\omega\iota\upsilon$ $\epsilon\sigma\tau\iota$ $\tau\eta\varsigma$ $\zeta\eta'$ $\pi\omicron\lambda\lambda\eta\lambda\omicron$ $\acute{\alpha}\rho\alpha$ $\epsilon\lambda\alpha\sigma\sigma\omega\iota$
 S 17. $\delta\iota\acute{\alpha}$ Ge auctore Co pro $\acute{\alpha}\pi\delta$ 20. 21. Π BF — $\epsilon\delta\epsilon\iota\omega\iota\upsilon$ om.
 Co 24. 25. $\tau\eta\varsigma$ $\Gamma\Gamma$ $\acute{\omega}\sigma\tau\epsilon$ AB , corr. S 28. ϵ $\delta\epsilon$ S . $\alpha\iota$ $\delta\epsilon$ AB , $\alpha\epsilon\iota$ δ'
 η conl. Hu 29. ι' add. BS $\epsilon\kappa\theta\acute{\omega}\mu\alpha\iota$ Hu 30. $\tau\omicron\iota$ $\cdot$ $\cdot$ AB $\cdot$ IT Hu
 32. $\kappa\alpha\tau\acute{\alpha}$ $\tau\acute{\alpha}$ EZ AV . $\kappa\alpha\tau\acute{\alpha}$ $\tau\acute{\alpha}$ $\epsilon\zeta$ B , distinx. Paris. 2368 S $\mu\epsilon\gamma\iota\sigma\tau\eta$,
 ABS, corr. V

γέγονέ μοι ἰσοσκελὲς τρίγωνον τὸ $ΕΑΖ$ ἴσιν ἔχον τὴν $ΕΑ$ τῇ $ΙΖ$. διὰ δὲ τὸ προσγεγραμμένον ἡμίμα γίνεται ἡ $ΕΖ$ ἐλάσσων πασῶν τῶν διὰ τοῦ $Α$ διαγομένων ἐξαιτῶν, καὶ αἰεὶ ἡ ἔγγιον αὐτῆς τῆς ἀπώτερον ἐλάσσων.

Νεύσεων δεύτερον.

5

- 132 α'. Ἡμικύκλιον τὸ ἐπὶ τῆς $ΑΒ$, διέχθω τυχοῦσα ἡ $ΑΕ$, καὶ ἐπ' αὐτὴν κάθεται αἱ $ΑΑ$ $ΒΕ$. ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ $ΙΖ$ τῇ $ΗΕ$.

Εἰλήφθω τὸ τοῦ ἡμικυκλίου κέντρον τὸ $Θ$, καὶ ἐπὶ τὴν $ΑΕ$ κάθετος ἤχθω ἡ $ΘΚ$. παράλληλος ἄρα ἐστὶν ταῖς $ΑΑ$ $ΒΕ$, καὶ ἴση ἐστὶν ἡ $ΖΚ$ τῇ $ΚΗ$. ἐπεὶ δὲ τρεῖς εἰσιν παράλληλοι αἱ $ΑΑ$ $ΘΚ$ $ΒΕ$, καὶ ἐστὶν ἴση ἡ $ΑΘ$ τῇ $ΘΒ$, ἴση ἄρα καὶ ἡ $ΑΚ$ τῇ $ΚΕ$. ὦν ἡ $ΖΚ$ τῇ $ΚΗ$ ἐστὶν ἴση. λοιπὴ ἄρα ἡ $ΙΖ$ λοιπῇ τῇ $ΗΕ$ ἐστὶν ἴση.

Καὶ φανερόν ὅτι καὶ ἡ $ΑΗ$ τῇ $ΕΖ$ ἴση ἐστὶν.

15

- 133 β'. Ἐστω πάλιν ἡμικύκλιον τὸ ἐπὶ τῆς $ΑΒ$, καὶ ἐφαπτομένη ἤχθω ἡ $ΓΔ$ καὶ ἐκβεβλήσθω, καὶ κάθεται ἐπ' αὐτὴν αἱ $ΑΕ$ $ΒΖ$. ὅτι πάλιν ἴση ἡ $ΕΔ$ τῇ $ΙΖ$.

Ἐστω τὸ κέντρον τὸ $Η$, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ $ΑΗ$. παράλληλος ἄρα ἐστὶν ταῖς $ΑΕ$ $ΒΖ$ γίνονται γὰρ ὁρθαὶ αἱ 20 πρὸς τῷ $Δ$ γωνίαι. ἐπεὶ οὖν τρεῖς παράλληλοι αἱ $ΑΕ$ $ΗΔ$ $ΒΖ$, καὶ ἴση ἐστὶν ἡ $ΑΗ$ τῇ $ΗΒ$, ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ $ΕΔ$ τῇ $ΙΖ$, ὅπερ: ~

Εἰς τὸ ε' πρόβλημα.


- 134 γ'. Ἐστω δύο ἡμικύκλια ἐπὶ τῆς $ΑΓ$ τὰ $ΑΒΓ$ $ΔΕΖ$, 25 καὶ ἔστω ἴση ἡ $ΑΑ$ τῇ $ΙΖ$, καὶ ἀπὸ τοῦ $Γ$ διέχθω ἡ $ΒΓ$. ὅτι ἴση ἐστὶν καὶ ἡ $ΒΕ$ τῇ $ΗΓ$.

2. προσγεγραμμένον A, corr. BS 4. αἰετ γγγιον A, corr. BS
αὐτῆς om. Paris. 2368 5. δεύτερον AB, πρώτοι S cod. Co 6. ἡ
Α' in marg. (BS) 6. 7. ad τυχοῦσα add. ἐφαπτομένη V² ac tum post
ad ΑΑ BE "sintque ~ η aequaliter distantia a contactu x". quae aliena
sunt a proposito 7. post ΑΑ HE add. η R, η x cod. Co ὅτι
add. sic 9. τὸ τοῦ Θ ABS, τὸ κέντρον τὸ Θ Co. τὸ τοῦ κύκλου κέν-
τρον τὸ Θ V², corr. Hu καὶ add. Ge suctore Co 12. ad ΑΑΘ
ΚΒΕ A, distinx. BS 14. λοιπῇ τῇ ΗΘ A(B), corr. S 16. β' add. BS

est isosceles triangulum $\epsilon\alpha\zeta$ aequalibus lateribus $\epsilon\alpha$ $\alpha\zeta$. Propter superius igitur lemma est $\epsilon\zeta$ minima omnium rectorum, quae per punctum δ ducuntur, et semper propior est minor remotiore.

LEMATA IN INCLINATIONUM LIBRUM SECUNDUM.

I. Sit semicirculus super $\alpha\beta$, et ducatur quaelibet recta $\delta\epsilon$ ita, ut semicirculum secet in punctis ζ et η . in eaque perpendicularares $\delta\alpha$ $\epsilon\beta$; dico esse $\delta\zeta = \eta\epsilon$. Prop. 75




Sumatur semicirculi centrum ϑ , et rectae $\delta\epsilon$ perpendicularis ducatur $z\vartheta$: haec igitur parallela est rectis $\alpha\delta$ $\beta\epsilon$, et est propter elem. 3. $\delta\zeta x = x\eta$. Sed quia tres parallelae sunt $\alpha\delta$ ϑx $\beta\epsilon$, est

igitur $\alpha\vartheta : \vartheta\beta = \delta x : x\epsilon$, et quoniam est $\alpha\vartheta = \vartheta\beta$, est igitur $\delta x = x\epsilon$. Et erat $\zeta x = x\eta$: restat igitur $\delta\zeta = \eta\epsilon$.

Et apparet esse etiam $\delta\eta = \zeta\epsilon$.

II. Sit rursus semicirculus super $\alpha\beta$, et tangens ducatur $\gamma\delta$ producatque ad punctum ϵ , sintque huic rectae perpendicularares $\epsilon\alpha$ $\zeta\beta$: dico rursus esse $\epsilon\delta = \delta\zeta$. Prop. 76



Sit semicirculi centrum η , et iungatur $\delta\eta$, quae, quoniam anguli ad δ recti sunt, parallela est rectis $\epsilon\alpha$ $\zeta\beta$. Iam quia tres sunt parallelae $\alpha\epsilon$ $\eta\delta$ $\beta\zeta$, est

que $\alpha\eta = \eta\beta$, est igitur etiam $\epsilon\delta = \delta\zeta$, q. e. d.

In quantum problema.

III. Sint super $\alpha\gamma$ duo semicirculi $\alpha\beta\gamma$ $\delta\epsilon\zeta$, sitque $\alpha\delta = \zeta\gamma$, et a puncto γ ducatur recta $\gamma\eta\epsilon\beta$: dico esse $\beta\epsilon = \eta\gamma$. Prop. 77


Ἐπεὶ γὰρ ἴσθι, ἔστιν ἡ AA τῇ GZ , περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον ἔστιν τὰ ἡμικύκλια· εἰλήφθω γὰρ τὸ κέντρον τῶν ἡμικυκλίων τὸ Θ , καὶ ἀπὸ τοῦ Θ ἐπὶ τὴν EH κάθετος ἔχθω ἡ ΘK . ἴσθι ἄρα ἔστιν ἡ EK τῇ KH . ἐπεξέχθω οὖν ἡ AB , καὶ εἰς παράλληλοι εἰσιν αἱ AB ΘK , καὶ ἔστιν ἴσθι ἡ AG τῇ ΘI , ἴσθι ἄρα ἔστιν καὶ ἡ BK τῇ KI . ὦν ἡ EK τῇ KH ἴσθι ἔστιν· λοιπὴ ἄρα ἡ BE λοιπῇ τῇ HI ἔστιν ἴσθι, ὅπερ: ~

Φανερόν δὲ ὅτι καὶ ἡ BH τῇ EI ἔστιν ἴσθι.

- 135 δ'. Ἐστω δὲ πάλιν τὰ ABF IEZ ἡμικύκλια, καὶ ἀπὸ τοῦ Γ ἔχθω εφαπτομένη τοῦ IEZ ἡ ΓE καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ B · ὅτι ἴσθι ἔστιν ἡ BE τῇ EI , ἴσθις οὖσης τῆς AA τῇ ZI .

Φανερόν ὅτι περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον εἰσιν τὰ ἡμικύκλια· εἰλήφθω πάλιν τὸ κέντρον τῶν ἡμικυκλίων τὸ H , καὶ ἐπεξέχθωσαν αἱ HE AB . ὁρθὴ ἄρα ἔστιν ἡ πρὸς τῷ E γωνία. ἀλλὰ καὶ ἡ πρὸς τῷ B · παράλληλος ἄρα ἔστιν ἡ AB τῇ EH . καὶ ἴσθι ἔστιν ἡ AH τῇ GH . ἴσθι ἄρα ἔστιν καὶ ἡ BE τῇ EI , ὅπερ: ~

Εἰς τὸ ἔξδομον.


- 136 ε'. Ἐστω πάλιν τὰ ABF IEZ ἡμικύκλια, καὶ ἔστω ἴσθι ἡ AI τῇ ZI , καὶ 20

 προσαναγεγράφθω ὁ 21
 μείζων κύκλος, καὶ διὰ 22
 τοῦ Z ἔχθω τις ἡ BH .
 ὅτι ἴσθι ἔστιν ἡ BE
 τῇ ZH . 23

Ἐστω τὸ κέντρον 24
 τὸ Θ , καὶ ἀπὸ τοῦ Θ
 ἐπὶ τὴν BH κάθετος
 ἔχθω ἡ ΘK . ἴσθι ἄρα
 ἔστιν ἡ BK τῇ KH . 25
 ἐπεξέχθω δὲ ἡ $E I$.

3. τὴν EH τῶν EH A , τῶν EH B , τῆς EH S , τὴν EH Ge S . Φα-
 νερὸν — ἴσθι in ABS ante ὅτι in inserta transposuit Hu 9. δ' et 19. ε' add.
 BS 21. προσαναγεγράφθω Hu. προσαναγεγραμμένος ABS. προσανα-
 γεγραμμένος ἔστιν Friedlein *Literarisches Centralblatt* n. 1871 p. 741.
 προσαναγεγραμμένος Ge 23. τοῦ ZI AB. τοῦ ds S cod. Co. corr. V2 L.

Quoniam enim est $\alpha\delta = \gamma\zeta$, semicirculi circa idem centrum sunt: haur sumatur centrum ϑ , et


a puncto ϑ rectae $\varepsilon\zeta$ perpendicularis ducatur $\alpha\vartheta$: est igitur propter elem. 3. 3 $\alpha\zeta = \alpha\gamma$. Iam quia parallelae sunt $\alpha\beta$ $\vartheta\zeta$,



estque $\alpha\vartheta = \vartheta\gamma$, est igitur $\beta\zeta = \gamma\zeta$. Et erat $\alpha\zeta = \alpha\gamma$: restat igitur $\beta\epsilon = \gamma\zeta$, q. e. d.

Et apparet esse etiam $\beta\epsilon = \varepsilon\gamma$.

IV. Sint rursus semicirculi $\alpha\beta\gamma$ $\delta\epsilon\zeta$, et a puncto γ ducatur $\gamma\epsilon$ tangens semicirculum $\delta\epsilon\zeta$ producatque ad β punctum sectionis cum altero semicirculo: dico esse $\beta\epsilon = \varepsilon\gamma$, manente superiore hypothesis, qua statuimus esse $\alpha\delta = \gamma\zeta$. Prop. 78



Apparet semicirculos circa idem centrum esse. Rursus sumatur semicirculorum centrum η , et iungantur $\eta\epsilon$ $\alpha\eta$. Recti igitur sunt anguli ad ϵ et β , itaque parallelae sunt $\alpha\beta$ $\eta\epsilon$. Et est

$\alpha\eta = \eta\gamma$: ergo est etiam $\beta\epsilon = \varepsilon\gamma$, q. e. d.

In septimum problema.

V. Sint rursus semicirculi $\alpha\beta\gamma$ $\delta\epsilon\zeta$, sitque $\alpha\delta = \gamma\zeta$, et compleatur maior circulus, et in eo circulo per ζ ducatur recta quaedam $\beta\epsilon$ secans semicirculum $\delta\epsilon\zeta$ in puncto ϵ : dico esse $\beta\epsilon = \gamma\zeta$. Prop. 79

Sit centrum ϑ , et a puncto ϑ rectae $\beta\epsilon$ perpendicularis ducatur $\vartheta\zeta$: est igitur propter elem. 3. 3 $\beta\zeta = \alpha\zeta$. Iam


* Hic ad ambages aberravit scriptor; est enim in ipso semicirculo $\alpha\beta\gamma$, parallelis non adhibitis, $\beta\zeta = \alpha\zeta$. Quam demonstrandi rationem recte sequitur Horsley p. 27.

ἐπεὶ οὖν παράλληλοί εἰσιν αἱ $ΔΕ ΘΚ$, καὶ ἔστιν ἴση ἡ $ΔΘ$ τῇ $ΘΖ$, ἴση ἄρα ἔστιν καὶ ἡ $ΕΚ$ τῇ $ΚΖ$. ἔστιν δὲ καὶ ὅλη ἡ $ΒΚ$ ὅλη τῇ $ΚΗ$ ἴση· λοιπὴ ἄρα ἡ $ΒΕ$ λοιπὴ τῇ $ΖΗ$ ἴση ἐστίν, ὅπερ· ~

Φανερόν ὅτι καὶ ἡ $ΒΖ$ τῇ $ΕΗ$ ἴση ἐστίν.

Εἰς τὸ 9'.

- 137 ζ'. Ἐστω δύο ἡμικύκλια τὰ $ΑΒΓ ΔΕΖ$, καὶ τῇ $ΑΔ$ ἴση κείσθω ἡ $ΖΗ$, καὶ διαχθείσῃς τῆς $ΒΓ$ ἀπὸ τοῦ $Η$ ἐπ' αὐτὴν κάθετος ἦχθω ἡ $ΗΘ$ · ὅτι ἴση ἐστίν ἡ $ΒΕ$ τῇ $ΚΘ$.



Εὐλόγηθω τὸ κέντρον τοῦ $ΔΕΖ$ ἡμι-
κυκλίου τὸ $Δ$, καὶ
ἀπὸ τοῦ $Δ$ ἐπὶ τὴν
 $ΚΕ$ κάθετος ἦχθω ἡ
 $ΔΜ$ · ἴση ἄρα ἔστιν ἡ
 $ΕΜ$ τῇ $ΜΚ$. ἔπει
δὲ ἴση ἐστίν ἡ μὲν
 $ΑΔ$ τῇ $ΖΗ$, ἡ δὲ $ΑΔ$

τῇ $ΑΖ$, ὅλη ἄρα ἡ $ΑΔ$ ὅλη τῇ $ΑΗ$ ἴση ἐστίν. καὶ εἰσὶν
τρεῖς παράλληλοι αἱ $ΑΒ ΜΔ ΘΗ$ · ἴση ἄρα καὶ ἡ $ΒΜ$ τῇ
 $ΗΘ$. ὦν ἡ $ΕΜ$ τῇ $ΜΚ$ ἴση ἐστίν· λοιπὴ ἄρα ἡ $ΒΕ$ λοιπὴ
τῇ $ΚΘ$ ἴση ἐστίν.

Φανερόν δὲ ὅτι καὶ ἡ $ΒΚ$ τῇ $ΕΘ$ ἴση ἐστίν.

- 138 ζ'. Τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων ἐφαπτεύσθω ἡ $ΒΓ$ τοῦ
 $ΔΕΖ$ ἡμικυκλίου· ὅτι πάλιν ἡ $ΒΕ$ τῇ $ΕΘ$ ἴση ἐστίν.

Πάλιν εὐλόγηθω τὸ κέντρον τοῦ $ΔΕΖ$ ἡμικυκλίου τὸ
 $Δ$, καὶ ἐπεξείχθω ἡ $ΔΕ$ · κάθετος ἄρα ἔστιν ἐπὶ τὴν $ΒΓ$
καὶ γέγονασιν τρεῖς παράλληλοι αἱ $ΑΒ ΕΔ ΗΘ$, καὶ ἔστιν
ἴση ἡ $ΑΔ$ τῇ $ΑΗ$ · ἴση ἄρα καὶ ἡ $ΒΕ$ τῇ $ΕΘ$, ὅπερ· ~

Εἰς τὸ 1'.

- 139 η'. Ἐστω δύο ἡμικύκλια τὰ $ΑΒΓ ΔΕΖ$, καὶ ἔστω

2. ἴση ἄρα τοῦ προ ὅλη γὰρ ἴση προ ὅλη corr. etiam A2. 5. post
ἡ $ΒΖ$ add. τῇ $ΕΖ$ ἐστίν A B, del. S post ἴση ἑατέν repetunt ἕως
ABS 7. = A' in marg. BS 8. κείσθω ἡ $ΖΕ$ AB, corr. S

gatur $\alpha\delta$. Quoniam igitur $\delta\epsilon$ $\theta\alpha$ parallelæ sunt, et $\delta\theta = \theta\zeta$, est igitur etiam $\epsilon\alpha = \alpha\zeta$. Sed erat etiam $\beta\alpha = \alpha\eta$, restat igitur $\beta\epsilon = \zeta\eta$, q. e. d.

Apparet esse etiam $\beta\zeta = \epsilon\eta$.


In nonum problema.

VI. Sint duo semicirculi $\alpha\beta\gamma$ $\delta\epsilon\zeta$, et ponatur $\zeta\eta = \alpha\delta$; Prop. ⁸⁰
ducatur $\beta\gamma$ secans semicirculum $\delta\epsilon\zeta$ in punctis ϵ et α , et ipsi $\beta\gamma$ perpendicularis ducatur $\theta\eta$; dico esse $\beta\epsilon = \alpha\theta$.

Sumatur semicirculi $\delta\epsilon\zeta$ centrum λ , et a puncto λ rectæ $\alpha\alpha$ perpendicularis ducatur $\lambda\mu$; est igitur, ut supra, $\epsilon\mu = \mu\alpha$. Sed quoniam est $\alpha\delta = \zeta\eta$, et $\delta\lambda = \lambda\zeta$, tota igitur $\alpha\lambda$ toti $\lambda\eta$ æqualis est. Suntque tres parallelæ $\alpha\beta$ $\lambda\mu$ $\eta\theta$; ergo etiam $\beta\mu = \mu\theta$. Et erat $\epsilon\mu = \mu\alpha$; restat igitur $\beta\epsilon = \alpha\theta$.

Apparet esse etiam $\beta\alpha = \epsilon\theta$.

VII. Iisdem suppositis tangat $\beta\gamma$ semicirculum $\delta\epsilon\zeta$ in puncto ϵ ; dico rursus esse $\beta\epsilon = \epsilon\theta$. ⁸¹



Rursus sumatur semicirculi $\delta\epsilon\zeta$ centrum λ , et iungatur $\lambda\epsilon$; hæc igitur perpendicularis est rectæ $\beta\gamma$. Et factæ sunt tres parallelæ $\alpha\beta$ $\lambda\epsilon$ $\eta\theta$, estque $\alpha\lambda = \lambda\eta$; ergo etiam $\beta\epsilon = \epsilon\theta$, q. e. d.

In octavum (vel fortasse decimum) problema.

VIII. Sint duo semicirculi $\alpha\beta\gamma$ $\delta\epsilon\zeta$, sitque $\alpha\delta < \gamma\zeta$, et Prop. ⁸²

*) Eadem ratione ac supra propos. 77 ad ambages descendit scriptor, quod ad h. l. recte notat Co.

13. 13. η $\overline{AH}$ AB, corr. S 49. $\eta\eta$ $\overline{AH}$ Co pro $\eta\eta$ $\overline{AH}$ 24. $\eta\eta$ $\overline{MA}$
13. $\eta\eta$ $\overline{AB}$, corr. S 24. ζ' add. BS $\eta\eta$ $\overline{AH}$ Co pro $\eta\eta$ $\overline{AH}$ 24. $\eta\eta$ $\overline{MA}$
23. $\alpha\delta$ $\overline{AB}$ $\overline{EK}$ $\overline{HA}$ AB, corr. S 29. $\alpha\delta$ $\overline{AH}$ AB, corr. S $\delta\eta$ $\overline{AB}$,
6 A 30. $\delta\eta$ $\overline{AB}$ A, $\delta\eta$ $\overline{AB}$ Co pro $\delta\eta$ $\overline{AB}$, $\delta\eta$ $\overline{AB}$ Co pro $\delta\eta$ $\overline{AB}$,
Pappus 11. 31. η' add. V


ἐλάσσωσιν ἡ $ΑΑ$ τῆς $ΓΖ$, καὶ τῇ $ΑΑ$ ἴση κείσθω ἡ $ΓΗ$, καὶ προσαναπληρώσθω ὁ $ΒΑΚΓ$ κύκλος, καὶ διγῆθω τυχοῦσα ἡ $ΒΚ$, καὶ ἀπὸ τοῦ $Η$ ἐπ' αὐτὴν κάθετος ἡ $ΗΘ$. ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ $ΒΕ$ τῇ $ΘΚ$.

Εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ $ΑΒΓ$ κύκλου τὸ $Α$, καὶ ἀπὸ τοῦ $Α$ ἐπὶ τὴν $ΕΖ$ κάθετος ἵχθω ἡ $ΑΜ$. ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ $ΒΜ$ τῇ $ΜΚ$. ἐπεὶ δὲ ἴση ἐστὶν ἡ μὲν $ΑΑ$ τῇ $ΑΓ$, ἡ δὲ $ΑΑ$ τῇ $ΗΓ$, λοιπὴ ἄρα ἡ $ΑΑ$ λοιπῇ τῇ $ΑΗ$ ἐστὶν ἴση. καὶ εἰσὶ τρεῖς παράλληλοι αἱ $ΑΕ ΑΜ ΗΘ$. ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ $ΕΜ$ τῇ $ΜΘ$. ἐστὶν δὲ καὶ ὅλη ἡ $ΒΜ$ ὅλη τῇ $ΗΚ$ ἴση, λοιπὴ ἄρα ἡ $ΒΕ$ λοιπῇ τῇ $ΘΚ$ ἐστὶν ἴση.

Φανερόν δὲ ὅτι καὶ ἡ $ΘΒ$ τῇ $ΕΚ$ ἴση ἐστὶν.

Εἰς τὸ ιζ'.


- 140 8'. Τῶν αὐτῶν ἐποκειμένων ἔστω μείζων ἡ $ΑΑ$ τῆς $ΖΓ$, καὶ αὐτῇ ἴση κείσθω ἡ $ΖΗ$, καὶ διαγραφείης τῆς $ΒΓΘ$ ἐπ' αὐτὴν κάθετος ἵχθω ἡ $ΗΘ$. ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ $ΒΕ$ τῇ $ΚΘ$.



Εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ $ΑΕΖ$ ἡμικυκλίου τὸ $Α$, καὶ ἀπ' αὐτοῦ ἐπὶ τὴν $ΕΚ$ κάθετος ἡ $ΑΜ$. ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ $ΕΜ$ τῇ $ΜΚ$. ἐπεὶ δὲ ἴση ἐστὶν ἡ μὲν $ΑΑ$ τῇ $ΖΗ$, ἡ δὲ $ΑΑ$ τῇ $ΑΖ$, ὅλη ἄρα ἡ $ΑΑ$ ὅλη τῇ $ΑΗ$ ἐστὶν ἴση. καὶ εἰσὶν πάλιν τρεῖς παράλληλοι αἱ $ΒΑ ΜΑ ΗΘ$. ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ $ΒΜ$ τῇ $ΜΘ$. ὥν ἡ $ΕΜ$ τῇ $ΜΚ$ ἐστὶν ἴση. λοιπὴ ἄρα ἡ $ΒΕ$ λοιπῇ τῇ $ΚΘ$ ἐστὶν ἴση, ὡς ἐπεὶ: ~

Φανερόν δὲ ὅτι καὶ ἡ $ΒΚ$ τῇ $ΕΘ$ ἐστὶν ἴση.

ponatur $\gamma\eta = \alpha\delta$, et compleatur circulus $\beta\alpha\chi\gamma$, ducaturque quaelibet $\beta\alpha$ per punctum ξ , eique perpendicularis a puncto γ , recta $\gamma\theta$; dico esse $\beta\epsilon = \theta\alpha$.



Sumatur circuli $\alpha\beta\gamma$ centrum λ , ab eoque rectae $\epsilon\xi$ perpendicularis ducatur $\lambda\mu$; est igitur, ut supra, $\beta\mu = \mu\alpha$. Sed quoniam est $\alpha\lambda = \lambda\gamma$, et $\alpha\delta = \gamma\eta$, restat igitur $\delta\lambda = \lambda\eta$. Suntque tres parallelae $\delta\epsilon$, $\lambda\mu$, $\theta\eta$; ergo est etiam $\epsilon\mu = \mu\theta$ *). Sed erat etiam $\beta\mu = \mu\alpha$; restat igitur $\beta\epsilon = \theta\alpha$.

Apparet esse etiam $\beta\theta = \epsilon\alpha$.

In decimum septimum problema.

IX. Iisdem suppositis sit $\alpha\delta > \xi\gamma$, ponaturque $\xi\eta = \alpha\delta$, Prop. 83 et ducatur recta $\beta\gamma\theta$, semicirculum $\delta\epsilon\xi$ secans in punctis ϵ et z , eique perpendicularis $\gamma\theta$; dico esse $\beta\epsilon = \alpha\theta$.

Sumatur semicirculi $\delta\epsilon\xi$ centrum λ , ab eoque rectae ϵz perpendicularis ducatur $\lambda\mu$; est igitur, ut supra, $\epsilon\mu = \mu\alpha$. Sed quoniam est $\alpha\delta = \xi\eta$, et $\delta\lambda = \lambda\xi$, est etiam $\alpha\lambda = \lambda\eta$. Suntque tres parallelae $\beta\alpha$, $\mu\lambda$, $\gamma\theta$; est igitur etiam $\beta\mu = \mu\theta$ **. Sed erat $\epsilon\mu = \mu\alpha$; restat igitur $\beta\epsilon = \alpha\theta$, q. e. d.


Apparet esse etiam $\beta\alpha = \epsilon\theta$.

* Est enim $\delta\lambda : \epsilon\mu = \lambda\xi : \mu\alpha$, et $\lambda\xi : \mu\alpha = \xi\eta : \eta\theta = \lambda\xi : \xi\eta + \xi\eta : \mu\alpha + \xi\eta$, est igitur $\delta\lambda : \epsilon\mu = \lambda\xi : \mu\theta$, et quoniam est $\delta\lambda = \lambda\eta$, est etiam $\epsilon\mu = \mu\theta$.

** Demonstratio eadem est atque in superiore adnotatione.

Hu 4. $\alpha\delta$ ante η BE additum in AB del. S 8. $\alpha\theta\alpha$ η AA AB, corr. S 9. $\delta\alpha\delta$ A'BS, $\delta\alpha\delta$ Hu 12. $\alpha\delta$ η EB AB, corr. S 14. δ add. BS 16. $\delta\alpha$ A'S, $\xi\eta$ B cod. Co 17. $\alpha\delta$ EEZ A', corr. A² 24. $\phi\alpha\eta\epsilon\theta\alpha$ — $\epsilon\alpha\eta$ in ABS ante $\delta\alpha\eta$ inserta transposuit Hu

- 141 ε'. Τῶν ἀετῶν ἐποκειμένων ἐφαπτέσθω ἡ ΒΓ τοῦ ΔΕΖ ἡμικυκλίου· ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΒΕ τῇ ΕΘ.



Εἰλήφθω πάλιν τὸ κέντρον τοῦ ΔΕΖ ἡμικυκλίου τὸ Α, καὶ ἐπεξέχθω ἡ ΑΕ· κάθετος ἄρα ἐστὶν ἐπὶ τὴν ΒΘ· ὥστε τρεῖς εἰσὶν παράλληλοι αἱ ΑΒ ΑΕ ΗΘ, καὶ ἐστὶν ἴση ἡ ΑΑ τῇ ΑΗ· ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ΒΕ τῇ ΕΘ.

Πρόβλημα χρήσιμον εἰς τὴν σύνθεσιν τοῦ εζ'.


- 142 ια'. Θέσει ἡμικυκλίον ὕψος τοῦ ΑΒΓ, καὶ δοθέντος τοῦ Α, γράψαι διὰ τοῦ Α ἡμικύκλιον ὡς τὸ ΔΕΖ, ἵνα, ἐὰν ἐφαπτομένη ἀχθῇ ἡ ΒΓ, ἴση γένηται ἡ ΑΑ τῇ ΒΕ. ¹⁰

Γεγονέτω· ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ ΑΑ πρὸς τὴν ΕΓ, οὕτως ἡ ΕΒ πρὸς τὴν ΕΓ· καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ΕΒ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΓ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΑΑ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΓ. ἀλλ' ὡς τὸ ἀπὸ ΒΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΓ, οὕτως ἐστὶν, ἐὰν κέντρον τοῦ ΔΕΖ ἡμικυκλίου ληφθῇ τὸ Η, καὶ ἐπιτευχθῇ ἡ ΗΕ, τὸ ἀπὸ ¹⁵ ΑΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΓ. ἀλλὰ τὸ ἀπὸ ΕΓ ἡ τῶν ἀπὸ ΕΗ ΗΓ ἐστὶν ὑπεροχή· ἐστὶν ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ ΑΑ πρὸς τὴν τῶν ἀπὸ ΑΗ ΗΓ ὑπεροχὴν, οὕτως τὸ ἀπὸ ΑΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΓ. κείσθω τῇ ΑΑ ἴση ἡ ΑΘ, καὶ τεμίσθω ἡ ΑΓ δίχα κατὰ τὸ Κ σημεῖον. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς τὸ ἀπὸ ΑΗ ²⁰ πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΓ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΑΑ πρὸς τὴν τῶν ἀπὸ ΑΗ ΗΓ ὑπεροχὴν, λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ ΑΗΘ πρὸς λοιπὸν

1. ε' add. BS 6. τῇ ΑΘ ἴση Α(Β), corr. S 8. ια' add. V
10. ἀχθῇ ἡ ἢ ΒΓ Α, corr. BS ἡ ΑΑ τῇ ΒΕ, neque, ut expectabamus, τῇ ΑΑ ἢ ΒΕ scriptor similiter posuit ac p. 800, 9. 806, 26
13. ἐπιτευχθαι ΗΕ Α, ἐπιτευχθῇ ἡ ΗΕ Β (nescio qua manu) S, corr. Ge

τὸ ἀπὸ $H\Lambda$, τοιτέσιν ἢ ΘH πρὸς $H\Lambda$, ἔστιν [ὡς εἰς τῶν λόγων ὡς τὸ ἀπὸ $\Lambda\Lambda$ πρὸς τὴν τῶν ἀπὸ ΛH $\Pi\Gamma$ ἵπεροσχήν, τοιτέσιν πρὸς τὸ δις ἐπὶ $\Lambda\Gamma$ HK . κείσθω οὖν τῷ ἀπὸ $\Lambda\Lambda$ τετραγώνῳ ἴσον τὸ δις ἐπὶ $\Lambda\Gamma$ Λ , δοθέν δὲ τὸ ἀπὸ $\Lambda\Lambda$ · δοθέν ἄρα καὶ τὸ δις ἐπὶ $\Lambda\Gamma$ Λ , ὥστε καὶ τὸ $\alpha\beta\alpha\zeta$. καὶ ἔστιν δοθεῖσα ἢ $\Gamma\Lambda$ · δοθεῖσα ἄρα ἔστιν καὶ ἢ Λ . ἐπεὶ δὲ ἔστιν ὡς ἢ $H\Theta$ πρὸς τὴν $H\Lambda$, οὕτως τὸ ἀπὸ $\Lambda\Lambda$, τοιτέσιν τὸ δις ἐπὶ Λ $\Lambda\Gamma$, πρὸς τὸ δις ἐπὶ $\Lambda\Gamma$ HK , τοιτέσιν ἢ Λ πρὸς HK , τὸ ἄρα ἐπὶ ΘHK ἴσον τῷ ἐπὶ $\Lambda H\Lambda$. καὶ εἰσὶν αἱ τρεῖς αἱ $\Theta\Lambda$ ΔK Λ δοθεῖσαι· ἀπῆχται ἄρα εἰς διωρισμένης α' · δεδομένων τριῶν εὐθειῶν τῶν $\Theta\Lambda$ ΔK Λ τεμεῖν τὴν ΔK κατὰ τὸ H , καὶ ποιεῖν λόγον τοῦ ἐπὶ ΘHK πρὸς τὸ ἐπὶ $\Lambda H\Lambda$ ἴσον πρὸς ἴσον. τοῦτο δὲ φανερόν, καὶ ἔστιν ἀδιόριστον. δοθέν ἄρα τὸ H , καὶ κέντρον τοῦ ΛEZ ἡμικυκλίου· θέσει ἄρα τὸ ἡμικύκλιον. καὶ ἀπὸ δοθέντος τοῦ Γ ἔχεται ἐφαπτομένη ἢ $B\Gamma$ · θέσει ἄρα ἢ $B\Gamma$ [τὸ δ' αὐτὸ ἀρμόσει τοῦ σημείου κάτω], ὅπερ· ~

143 β'. Συντεθήσεται δὴ τὸ πρόβλημα οὕτως· ἔστω τὸ



μὲν ἡμικύκλιον τὸ $AB\Gamma$, τὸ δὲ δοθέν τὸ Δ · καὶ θέον ἔστω 20 ποιεῖν τὸ πρόβλημα. κείσθω τῷ ἀπὸ $\Lambda\Lambda$ τετραγώνῳ ἴσον

1. ἢ ΘN πρὸς AB , corr. S 4. 2. ὡς εἰς τῶν λόγων del. Hu
3. post τοιτέσιν add. τὸ δις ἐπὶ $\Lambda\Gamma$ Λ Co ἐπὶ $\Lambda\Gamma$ HK Co, ἐπὶ $\Lambda\Gamma H$ AB, ἐπὶ $\delta\gamma\lambda$ S 3. 4. κείσθω — ἐπὶ $\Lambda\Gamma$ Λ om. S cod. Co
4. ἐπὶ $\Lambda\Gamma$ Λ ἐπὶ $\delta\gamma\lambda$ Bj, distinx. Ge 5. ἐπὶ $\Lambda\Gamma$ Λ ABS, distinx. Co 6. ἄρα ἐστὶ ΛBS 8. ἐπὶ $\Lambda\Gamma$ Λ , distinx. BS 9. τοιτέσιν

$$\vartheta\eta : \eta\delta = \alpha\delta^2 : \eta\gamma^2 - \delta\eta^2, \text{ id est} \\ = \alpha\delta^2 : 2\delta\gamma \cdot \eta x^*).$$

Iam ponatur $2\delta\gamma \cdot \lambda = \alpha\delta^2$, datum autem est $\alpha\delta^2$; ergo etiam $2\delta\gamma \cdot \lambda$ datum, ideoque etiam $\delta\gamma \cdot \lambda$. Et est data $\delta\gamma$; ergo etiam recta λ data est. Sed quoniam est

$$\vartheta\eta : \eta\delta = \alpha\delta^2 : 2\delta\gamma \cdot \eta x, \text{ id est} \\ = 2\lambda \cdot \delta\gamma : 2\delta\gamma \cdot \eta x, \text{ id est} \\ = \lambda : \eta x, \text{ ergo est}$$

$$\vartheta\eta \cdot \eta x = \lambda \cdot \eta\delta.$$

Suntque tres rectae $\vartheta\delta$ δx λ datae; reductum igitur est *problema* ad determinatae sectionis libri primi *probl. III epitagma II*¹⁾: "Datis tribus rectis $\vartheta\delta$ δx λ secetur δx in puncto η ita, ut fiat $\vartheta\eta \cdot \eta x : \lambda \cdot \eta\delta$ in proportionem aequalis ad aequale (*id est* $\vartheta\eta \cdot \eta x = \lambda \cdot \eta\delta$). Hoc autem manifestum; et est *problema* indeterminatum. Datum igitur est punctum η , idque centrum est semicirculi $\delta\epsilon\zeta$; ergo etiam semicirculus positione *datus* est. Et a dato puncto γ tangens $\beta\gamma$ ducta est: positione igitur $\beta\gamma$ *data* est²⁾, q. e. d.

XII. Componetur autem *problema* sic. Sit semicirculus $\alpha\beta\gamma$, et in diametro $\alpha\gamma$ datum punctum δ , et oporteat efficere *problema*. Ponatur $2\delta\gamma \cdot \lambda = \alpha\delta^2$, et $\alpha\delta = \alpha\delta$, et $\delta\gamma$ bifa-

*) Etenim quia $\delta\zeta$ bifariam secatur in puncto η , et $\zeta\gamma$ additur in eadem recta, propter elem. 2, 6 est $\eta\gamma^2 - \delta\eta^2 = \delta\gamma \cdot \gamma\zeta$. Sed est $\zeta\gamma = \delta\gamma - \delta\zeta$, et $\eta x = \frac{1}{2}\delta\gamma - \frac{1}{2}\delta\zeta$, itaque $\zeta\gamma = 2\eta x$; ergo $\delta\gamma \cdot \gamma\zeta = 2\delta\gamma \cdot \eta x$ (Co).

1) Restituit hoc Apollonii *problema* Simsonus, opera quaedam reliqua, p. 73—75: "Datis in recta linea tribus punctis B A C invenire quantum D inter puncta B A, quod faciet rectangulum a segmento BA et data recta E ad rectangulum BDC in ratione data".

2) Verba dubia τὸ δ' αὐτὸ cet., quae in Graeco codice addita sunt, Co vertit: "Idem autem congruet, si punctum infra sumatur". At punctum δ infra rectam $\alpha\gamma$ locum non habere facile apparet. Restat igitur ut interpolator semicirculum $\delta\epsilon\zeta$ infra esse significaverit. At ne hoc quidem statui posse docet Horsley p. 73.

II.1 AB, corr. S 10. ὅτι II.1 ABS, distinx. Co, item vs. 13 6J JK.1 A, distinx. BS, item vs. 12 11. ἄρα add. Ge διωρισμένης α' Hu, διωρισμένης ABS, διωρισμένην Co 14. ἐδιόρισται Hu auctore Co pro ἐδιόριστος 16. ἐγὰρ τε AB, corr. S 18. καὶ S, καὶ sine acc. AB, καὶ τοι ληφθέντος cont. Hu auctore Co, sed tota parenthesis delenda esse videtur: vide adnot. 2 ad Latina 19. ἢ add. BS 20. τὸ J καὶ δέον add. BS

τὸ δις ἐπὶ $ΑΓ$ $Α$, καὶ τῇ μὲν $ΑΑ$ ἴση κείσθω ἢ $ΑΘ$, ἢ δὲ $ΙΓ$ διχα τετμήσθω καὶ τὸ $Κ$ σημείον, καὶ τριῶν δοθεῖσων ἐθειῶν τῶν $ΘΑ$ $ΙΚ$ $Α$, τετμήσθω ἢ $ΙΚ$ κατὰ τὸ $Η$ καὶ ποιείτω λόγον τοῦ ἐπὶ $ΑΗ$ $Α$ πρὸς τὸ ἐπὶ $ΘΗΚ$ ἴσον πρὸς ἴσον, καὶ περὶ κέντρον τὸ $Η$ ἡμικύκλιον $γ$ γεγράφθω τὸ $ΑΕΖ$. λέγω ὅτι τὸ $ΑΕΖ$ ποιεῖ τὸ πρόβλημα.

Ἦχθω γὰρ ἐφαπτομένη τοῦ ἡμικύκλιον ἢ $ΒΓ$. ὅτι ἴσι, ἔστιν ἢ $ΑΑ$ τῇ $ΒΕ$. ἐπεὶ γὰρ τὸ ἐπὶ $ΘΗΚ$ ἴσον ἔστιν τῷ ἐπὶ $ΑΗ$ $Α$, ἀνάλογόν ἐστιν ὡς ἢ $ΘΗ$ πρὸς τὴν $ΗΑ$, οὕτως ἢ $Α$ πρὸς τὴν $ΗΚ$. ἀλλ' ὡς μὲν ἢ $ΘΗ$ πρὸς τὴν $ΗΑ$, οὕτως ἔστιν τὸ ἐπὶ $ΘΗΑ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΗΑ$, τουτέστιν ἢ τῶν ἀπὸ $ΗΑ$ $ΑΑ$ ὑπεροχῇ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΗΑ$, ὡς δὲ ἢ $Α$ πρὸς τὴν $ΗΚ$, οὕτως ἔστιν τὸ δις ἐπὶ $ΑΓ$ $Α$ πρὸς τὸ δις ἐπὶ $ΑΓ$ $ΗΚ$, τουτέστιν τὸ ἀπὸ $ΑΑ$ πρὸς τὴν τῶν ἀπὸ $ΑΗ$ $ΗΓ$ ὑπεροχὴν. καὶ ὡς ἄρα ἢ τῶν ἀπὸ $ΗΑ$ $ΑΑ$ ὑπεροχῇ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΗΑ$, οὕτως ἔστιν τὸ ἀπὸ $ΑΑ$ πρὸς τὴν τῶν ἀπὸ $ΑΗ$ $ΗΓ$ ὑπεροχὴν. ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ $ΑΗ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΗΓ$, οὕτως τὸ ἀπὸ $ΑΑ$ πρὸς τὴν τῶν ἀπὸ $ΑΗ$ $ΗΓ$ ὑπεροχὴν, τουτέστιν πρὸς τὴν τῶν ἀπὸ $ΓΗ$ $ΗΕ$ ὑπεροχὴν, τουτέστιν πρὸς τὸ ἀπὸ $ΕΓ$. καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ $ΑΗ$ τετραγώνον πρὸς τὸ ἀπὸ $ΗΓ$, οὕτως τὸ ἀπὸ $ΑΑ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΓΕ$. ὡς δὲ τὸ ἀπὸ $ΑΗ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΗΓ$, οὕτως ἔστιν τὸ ἀπὸ $ΒΕ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΕΓ$. ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ $ΒΕ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΕΓ$, οὕτως τὸ ἀπὸ $ΑΑ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΕΓ$. ἴσον ἄρα ἔστιν τὸ ἀπὸ $ΑΑ$ τῷ ἀπὸ $ΒΕ$, ὥστε ἴση ἔστιν ἢ $ΑΑ$ τῇ $ΒΕ$. καὶ φανερόν ὅτι μείζων ἔστιν ἢ $ΒΕ$ τῆς $ΕΓ$. ἔχομεν γὰρ ὡς τὴν $ΘΗ$ πρὸς τὴν $ΗΑ$, οὕτως τὸ ἀπὸ $ΑΑ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΕΓ$. μείζων δὲ ἢ $ΘΗ$ τῆς $ΗΑ$. μείζων ἄρα τὸ ἀπὸ $ΑΑ$ τοῦ ἀπὸ $ΕΓ$, ὥστε

1. ἐπὶ $ΓΑ$ et similiter posthac ABS, distinct. Co 3. τετμήσθω ἢ $ΑΗ$ AB, corr. S 4. 5. πρὸς τοῦ $ΘΗΚ$ AB, corr. S 9. ἢ $ΙΓ$. $Α$ ex ἢ $ΙΓ$ 11. ἢ $Α$ πρὸς] ἔστιν AB, ἔστιν ἢ $λ$ πρὸς S 14. δὲ ἢ $ΗΑ$ AB cod. Co, corr. S Co δις ἐπὶ $ΑΑΓ$ AB, δις ἐπὶ $λδ$. Paris. 2368 S, distinct. V 45. ἐπὶ $ΓΗΚ$ A. distinct. BS 18. τῶν ἀπὸ $ΓΗΑ$ ABS, corr. Co in Lat. versione 29. post ἀπὸ $ΕΓ$

riam secetur in puncto x , et datis tribus rectis $\vartheta\delta$ δx λ , secetur δx in puncto η ita, ut fiat $\lambda \cdot \eta\delta = \vartheta\eta \cdot \eta x$, et circa centrum η semicirculus describatur $\delta\epsilon\zeta$; dico semicirculum $\delta\epsilon\zeta$ efficere problema.

Ducatur enim $\beta\gamma$ tangens semicirculum in puncto ϵ ; dico esse $\beta\epsilon = \alpha\delta$. Quoniam enim est $\vartheta\eta \cdot \eta x = \lambda \cdot \eta\delta$, per proportionem est

$$\vartheta\eta : \eta\delta = \lambda : \eta x.$$

Sed est multiplicando

$$\begin{aligned}\vartheta\eta : \eta\delta &= \vartheta\eta \cdot \eta\delta : \eta\delta^2, \text{ id est propter elem. 2. 6} \\ &= \alpha\eta^2 - \alpha\delta^2 : \eta\delta^2.\end{aligned}$$

Sed est multiplicando

$$\begin{aligned}\lambda : \eta x &= 2\delta\gamma \cdot \lambda : 2\delta\gamma \cdot \eta x, \text{ id est} \\ &= \alpha\delta^2 : \delta\gamma \cdot \gamma\zeta^*, \text{ sive propter elem. 2. 6} \\ &= \alpha\delta^2 : \eta\gamma^2 - \delta\eta^2; \text{ ergo etiam} \\ \alpha\eta^2 - \alpha\delta^2 : \eta\delta^2 &= \alpha\delta^2 : \eta\gamma^2 - \delta\eta^2; \text{ est igitur propter} \\ &\text{elem. 5. 12}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\alpha\delta^2 : \eta\gamma^2 - \delta\eta^2 &= \alpha\eta^2 : \eta\gamma^2. \text{ Sed est} \\ \eta\gamma^2 - \delta\eta^2 &= \gamma\eta^2 - \eta\epsilon^2, \text{ id est} \\ &= \epsilon\gamma^2; \text{ ergo etiam}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\alpha\eta^2 : \eta\gamma^2 &= \alpha\delta^2 : \epsilon\gamma^2. \text{ Sed est} \\ \alpha\eta^2 : \eta\gamma^2 &= \beta\epsilon^2 : \epsilon\gamma^2^{**}); \text{ ergo} \\ \beta\epsilon^2 : \epsilon\gamma^2 &= \alpha\delta^2 : \epsilon\gamma^2; \text{ itaque} \\ \beta\epsilon^2 &= \alpha\delta^2, \text{ et } \beta\epsilon = \alpha\delta.\end{aligned}$$

Et apparet esse $\beta\epsilon > \epsilon\gamma$. Habemus enim $\vartheta\eta : \eta\delta = \alpha\delta^2 : \epsilon\gamma^2^{***})$; sed est $\vartheta\eta > \eta\delta$; ergo etiam $\alpha\delta^2 > \epsilon\gamma^2$, itaque $\alpha\delta$ sive

*. Vide supra p. 799 extr., et ibidem adnot. *.


** Vide supra adnot. † ad p. 797.

*** Est enim, ut ex superioribus apparet,

$$\begin{aligned}\vartheta\eta : \eta\delta &= \alpha\eta^2 - \alpha\delta^2 : \eta\delta^2 \\ &= \alpha\delta^2 : \eta\gamma^2 - \delta\eta^2 \\ &= \alpha\delta^2 : \epsilon\gamma^2.\end{aligned}$$

μειζων ἐστίν ἢ $ΑΔ$ τῆς $ΕΓ$. πολλῶ ἄρα τῆς $ΖΓ$ μειζων ἐστίν· τὸ $ΔΕΖ$ ἄρα ἡμικύκλιον ποιεῖ τὸ πρόβλημα.

Λέγω δὲ ὅτι καὶ μόνον. γεγράφω γάρ τι καὶ ἕτερον $ΔΜΝ$, καὶ ἦχθω ἐφαπτομένη ἢ $ΓΜΞ$. εἰ δὴ καὶ τὸ $ΔΜΝ$



ποιεῖ τὸ πρόβλημα, ἔσται ἴσιν ἢ $ΑΔ$ τῇ $ΜΞ$. καὶ εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ $ΔΜΝ$ ἡμικυκλίου τὸ $Ο$, καὶ ἐπεξεύχθω ἢ $ΟΜ$. ἔσται ἀκολούθως τῇ ἀναλίσει τὸ ἐπὶ τῶν $ΘΟΚ$ ἴσον τῇ ἐπὶ τῶν $ΑΔΟ$, ὥπερ ἐστὶν ἄτοπον (ἐν γὰρ τῇ διωρισμένῃ δέδεικται μειζων)· οὐκ ἄρα τὸ $ΔΜΝ$ ἡμικύκλιον ποιεῖ τὸ πρόβλημα. ὁμοίως δὲ δείξομεν ὅτι οὐδὲ ἄλλο τι τοῦ $ΔΕΖ$ · τὸ $ΔΕΖ$ ἄρα μόνον ποιεῖ τὸ πρόβλημα.

- 144 Ἵνα δὲ καὶ ἐπιγνώμεν πότερον αὐτῶν μειζων ἀποτέμνει, δείξομεν οὕτως. ἐπεὶ ἐν τῇ διωρισμένῃ δέδεικται ἔλασσον τὸ ἐπὶ τῶν $ΑΔΟ$ τοῦ ἐπὶ τῶν $ΘΟΚ$, ἀνάλογον ἢ $Α$ πρὸς $ΟΚ$ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ ἢ $ΘΟ$ πρὸς $ΟΑ$. 15 ἀλλ' ὥς μὲν ἢ $Α$ πρὸς $ΚΟ$, οὕτως ἐστὶν τὸ ἀπὸ $ΑΔ$ πρὸς τὴν τῶν ἀπὸ $ΔΟ ΟΓ$ ὑπεροχὴν (δέδεικται γάρ), ὥς δὲ ἢ $ΘΟ$ πρὸς $ΟΑ$, οὕτως ἐστὶν ἢ τῶν ἀπὸ $ΟΑ ΑΔ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΟΑ$ · καὶ τὸ ἀπὸ $ΑΔ$ ἄρα πρὸς τὴν τῶν ἀπὸ $ΔΟ ΟΓ$ ὑπεροχὴν ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ ἢ τῶν ἀπὸ $ΟΑ ΑΔ$ 20

4. ἐφαπτομένη $ΗΓΜΞ$ A, corr. BS 8. τοῦ ἐπὶ τῶν $ΑΔΟ$ ABS, corr. Co 9. μειζων AB, corr. S ἄρα τὸ $ΔΜΝ$ ABS, corr. V 11. τὸ $ΔΕΖ$ ante ἀρε! Hu pro τὸ $ΔΕΖ$ ἄρα Co, ἰσὺν A, ἐστὶ BS ποιεῖ AB, ποιοῦν S 14. τῶν $ΑΔΟ$ ABS, distin. Ge ἀνάλογος

$\beta\epsilon > \epsilon\gamma$. Multo igitur maior est $\alpha\delta$ quam γ^* , itaque semicirculus $\delta\epsilon\gamma$ problema efficit.

Dico etiam semicirculum $\delta\epsilon\gamma$ solum efficere problema. Describatur enim alius semicirculus $\delta\mu\nu$. Si igitur etiam semicirculus $\delta\mu\nu$ problema efficit, erit $\alpha\delta = \mu\xi$. Et sumatur semicirculi $\delta\mu\nu$ centrum σ , et iungatur $\sigma\mu$. Erit secundum analysin $\theta\sigma \cdot \sigma\alpha = \lambda \cdot \delta\sigma$, id quod absurdum est (nam in determinata sectione est demonstratum $\theta\sigma \cdot \sigma\alpha > \lambda \cdot \delta\sigma^*$); ergo semicirculus $\delta\mu\nu$ non efficit problema. Similiter demonstrabimus neque alium ullum semicirculum praeter $\delta\epsilon\gamma$ id efficere; ergo semicirculus $\delta\epsilon\gamma$ solus problema efficit.

Sed ut etiam cognoscamus, uter semicirculus maius tangentis segmentum abscindat, sic demonstrabimus. Quoniam in determinata sectione est demonstratum esse $\lambda \cdot \delta\sigma < \theta\sigma \cdot \sigma\alpha$, per proportionem propter huius libri propos. XVI est

$$\lambda : \sigma\alpha < \theta\sigma : \sigma\delta.$$

Sed, ut supra p. 799 in rectis $\theta\eta$ $\delta\eta$ $\eta\alpha$ demonstratum est, fit multiplicando

$$\begin{aligned} \lambda : \sigma\alpha &= 2\delta\gamma \cdot \lambda : 2\delta\gamma \cdot \sigma\alpha \\ &= \alpha\delta^2 : \delta\gamma \cdot \gamma\nu, \text{ sive propter elem. 2. 6} \\ &= \alpha\delta^2 : \sigma\gamma^2 - \delta\sigma^2, \text{ et rursus multiplicando} \\ \theta\sigma : \sigma\delta &= \theta\sigma \cdot \sigma\delta : \sigma\delta^2, \text{ sive propter elem. 2. 6} \\ &= \alpha\sigma^2 - \alpha\delta^2 : \sigma\delta^2; \text{ ergo est} \end{aligned}$$

*; Demonstrat hoc Co ducta a $\delta\gamma$ perpendiculari ad ϵ .

**; Hic Pappum idem Apollonii problema, quod supra p. 799, adn. 1 citavimus, respexisse oportet. Iam vero, etsi in demonstratione a Simsono restituta id ipsum quod Pappus significat non comparat, tamen idem recta ratione addi posse facile intellegitur. Sed ut iis Graecis reliquis, quae nunc exstant, innitatur, auctore Commandino breviter rem sic demonstramus: Est secundum Papp. VII propos. 14 $\theta\sigma \cdot \sigma\alpha > \theta\eta \cdot \eta\alpha$, tum ex hypothesis $\theta\eta \cdot \eta\alpha = \lambda \cdot \delta\eta$, denique $\lambda \cdot \delta\eta > \lambda \cdot \delta\sigma$ (quia $\delta\eta > \delta\sigma$); ergo $\theta\sigma \cdot \sigma\alpha > \lambda \cdot \delta\sigma$.

ABS, corr. Hu 16. η λ $\alpha\rho\delta\varsigma$ $\lambda\sigma$ Co pro η $\lambda\sigma$ $\alpha\rho\delta\varsigma$ λ 17. $\alpha\rho\delta$ $\lambda\sigma$ $\sigma\alpha$ Co pro $\alpha\rho\delta$ $\lambda\sigma$ $\sigma\alpha$ 18. 19. $\alpha\rho\delta$ $\sigma\alpha$ $\alpha\rho\delta$ $\sigma\alpha$ $\alpha\rho\delta$ $\sigma\alpha$ ABS, corr. Co 19. $\eta\eta$ $\tau\omega\nu$ $\alpha\rho\delta$ $\sigma\alpha$ $\eta\eta$ $\tau\omega\nu$ $\alpha\rho\delta$ $\sigma\alpha$ $\delta\gamma$ B Paris. 2368 V, $\tau\omega\nu$ $\alpha\rho\delta$ $\sigma\alpha$ $\delta\gamma$ S

$$\alpha\delta^2 : \alpha\gamma^2 - \delta\alpha^2 < \alpha\alpha^2 - \alpha\delta^2 : \alpha\delta^2, \text{ et summa facta}^1) \\ < \alpha\alpha^2 : \alpha\gamma^2;$$

ergo, quia est $\alpha\gamma^2 - \delta\alpha^2 = \alpha\gamma^2 - \alpha\mu^2 = \mu\gamma^2$, et propter similitudinem triangulorum $\alpha\xi\gamma$ $\alpha\mu\gamma$ $\alpha\alpha^2 : \alpha\gamma^2 = \xi\mu^2 : \mu\gamma^2$. his igitur substitutis est

$$\alpha\delta^2 : \mu\gamma^2 < \xi\mu^2 : \mu\gamma^2; \text{ ergo} \\ \alpha\delta < \xi\mu, \text{ siue } \xi\mu > \alpha\delta.$$

Similiter demonstrabimus omnia tangentium segmenta, quae circumferentiae $\alpha\beta\gamma$ inter α β occurrunt, maiora esse quam $\alpha\delta$, omnia autem, quae inter β γ , minora. Etenim si rursus describamus semicirculum $\delta\iota\alpha$ maiorem quam $\delta\epsilon\zeta$, et tangentem $\sigma\iota\gamma$ ducamus, eademque quae supra construamus, centrum τ semicirculi $\delta\iota\alpha$ erit ultra ι centrum semicirculi $\delta\epsilon\zeta$. Sed, ut in determinata sectione est demonstratum², erit $\theta\iota \cdot \iota\gamma > \theta\tau \cdot \tau\alpha$, et eadem ratione rursus erit $\alpha\delta > \sigma\tau$; itaque omnino semicirculi, qui tangentes propiores ad punctum α habent, segmenta maiora quam $\alpha\delta$ faciunt, qui autem remotiores, minora.

Possunt igitur per δ semicirculi ita describi, ut recta, quae quemque eorum tangit, producta ad maioris semicirculi circumferentiam vel segmentum inter contactum et maiorem semicirculum aequale faciat rectae $\alpha\delta$, vel rursus segmenta maiora, vel minora.

1) Graeca πάντα πρὸς πάντα secundum Euclid. elem. 5, 42 significant summam τῶν ἡγουμένων, id est $\alpha\delta^2 + \alpha\alpha^2 - \alpha\delta^2 = \alpha\alpha^2$, ad summam τῶν ἐπομένων, id est $\alpha\gamma^2 - \delta\alpha^2 + \alpha\delta^2 = \alpha\gamma^2$. Facile autem ex Euclidis propositione, quam modo citavimus, effici potuit, si sit $a : b \geq c : d$, esse $a : b \geq a + c : b + d$, quod in rectis quidem lineis supra demonstravit Pappus libri VII propos. 8.

2) Vide adnot. ** ad p. 803.

πρὸς πάντα ὥστε cel. scripta esse oportuit. 5. τὸ ἀπὸ $\overline{A\theta}$ πρὸς τὸ ἀπὸ $\overline{\theta\Gamma}$ $A'B$, τὸ ἀπὸ $\overline{A\theta}$ πρὸς τὸ ἀπὸ $\overline{\theta\Gamma}$ A per rasuram S 6. μείζον A , corr. BS 8. 9. τῶν $\overline{AB}$ A , distinx. BS 10. τῶν $\overline{BF}$ ἐλάσσονες $A:BS$, corr. Co 13. τὸ ὑπὸ $\overline{JHP}$ ἡμικύκλιον ABS , corr. Co in Lat. versione 14. 15 τὸ ὑπὸ $\overline{LAT}$ τοῦ ὑπὸ $\overline{OTK}$ ABS , corr. Co 15. καὶ add. Hu 17. μείζον A , μέγιστα BS, corr. Hu τῆς $\overline{AJ}$ Co pro τῇ $\overline{AJ}$ 20. περιμέτρου et 21. περιμέτρου add. Hu auctore Co 20. 21. τῇ μετὰ — ἡμικύκλιον S , om. A^1 . τῆς μετὰ — ἡμικύκλιον A^3 in marg. B 22. ἐλάσσον AB , corr. S

ZB , καὶ ἐπὶ τῆς AZ ἑμικύκλιον γράψω τὸ AEZ , ἐφάπτεται ἢ BZ τοῦ ἑμικυκλίου, καὶ ἔσται ἴση τῇ AA . τοῦτο δὲ γίνεται, ὁπόταν ἢ AA ἐλάσσων ἢ ἢ ἰσότης τῆς AI .


Ἐξηγούμενον δὴ τοῦτον, ἔαν διὰ τοῦ A ἕτερα ἑμικύκλια γράψω, ὡς τὰ $AHΘ$ AKA , καὶ ἐφαπτόμεναι ἀχθῶσιν αἱ $ΘM$ AN , ἔσται ἢ μὲν $ΘM$ μείζων τῆς AI , ἢ δὲ AN ἐλάσσων. ἵππει γὰρ ἢ AA τῆς AI ἐλάσσων ἔστιν, ἢ $ΘM$ ἄρα ἔσται μεταξὺ τῶν A I . ἐπὶ μὲν οὖν τὸ Z οὐ πεσεῖται, ἐπεὶ συμβήσεται ἴσην γίνεσθαι τὴν AA τῇ ZI , ὅπερ ἄτοπον, μεταξὺ δὲ τῶν I Z πολλὴ μᾶλλον οὐκ ἔστιν, ¹⁰ ἐπεὶ πάλιν συμβαίνει ἐλάσσονα εἶναι τὴν AA τῆς ZI , ὅπερ ἄτοπον ἔστιν γὰρ καὶ μείζων, ὡς ἐν τῇ $\epsilon\zeta$ ἀρχῆς ἐπὶ κεῖται προβλήματι· ἔσται ἄρα μεταξὺ τῶν Z A τὸ Θ . μείζων δὲ τὸ ἐπὶ $AΘI$, τοντέστιν τὸ ἀπὸ $MΘ$, τοῦ ἐπὶ AZI , τοντέστιν τοῦ ἀπὸ ZB · μείζων ἄρα καὶ τοῦ ἀπὸ ¹⁵ AA , ὥστε μείζων ἢ $ΘM$ τῆς AA . ἢ δὲ AN μεταξὺ τῶν I Z . ἐπειδὴ ἐλάσσων ἔστιν τὸ ἐπὶ AAI τοῦ ἀπὸ AI (ἐπεὶ καὶ τὸ ἐπὶ AZI), ἐλάσσων ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ AN τοῦ ἀπὸ AA , ὥστε ἐλάσσων ἔστιν ἢ AN τῆς AA . ὁμοίως καὶ πᾶσαι αἱ ἐπὶ ταύτῃ ὡς πρὸς τὸ I ἔγμεναι εὐθεῖαι.] ²⁰ καὶ καθόλου προσιόντων μὲν τῶν ἑμικυκλίων τῇ I σημείῳ ἢ ἐφαπτομένη ἐλάσσων ἔστιν τῆς AA , ἀποχωροῦντων δὲ αἱ μείζων· δυνατὸν ἄρα ἔστιν ἐπὶ τῆς AI , μένοντος τοῦ A , ἑμικύκλια γράψαι, ἵνα ὅτε μὲν αἱ ἐφαπτόμεναι αὐτῶν ἴσαι ὦσιν τῇ AA , ὅτε δὲ μείζονες, ὅτε δὲ ἐλάσσονες. ²⁵

4. ἐγράφεται Hu 3. ἢ ἢ S, ἢ A, ἢ B, ἢ ἢ ἢ Ge, ἢ ἢ πρὶν ἢ Hu

7. ἐπεὶ γὰρ — 20. εὐθεῖαι] haec iam Commandino suspecta fuerunt eademque ab Horsleio p. 85 ut "luce clariora" ommissa; sine dubio sunt et interpolata et praeterea scripturae villis corrupta: nos in Graeco contextu codicis notas servavimus, in Latina autem versione probabiles emendationes posuimus 7. ἢ $ΘA$ τῆς AI coni. Hu 8. μεταξὺ τῶν AI A, distinx. BS ἐπεὶ μὲν AB, corr. S 9. ἐπὶ συμβήσεται A'B), corr. S τὴν AA τῇ ZI] τὴν $ΘI$ τῇ ZI Co. τὴν $ΘA$ τῇ IZ Hu 10. τῶν IZ A, distinx. BS, item vs. 16. 17 11. συμβαίνειν ἂν Hu 11. 12. εἶναι τῆς $ΘA$ τῇ IZ , ὅπερ Hu 13. προβλήματι Hu τῶν ZI A, distinx. BS 14. τὰ ἀπὸ $MΘ$ ABS, corr.

mus, et super $\delta\zeta$ semicirculum $\delta\epsilon\zeta$ describerimus, recta $\zeta\beta$ et hunc semicirculum tanget et rectae $\alpha\delta$ aequalis erit. Hoc autem fit, si $\alpha\delta$ minor sit quam dimidia $\alpha\gamma$.

Hoc igitur invento, si per δ alios semicirculos, velut $\delta\eta\theta$ minore quam $\delta\zeta$ diametro, et $\delta\kappa\lambda$ maiore quam $\delta\zeta$ diametro, describamus, et tangentes $\vartheta\mu$ $\lambda\nu$ ducantur, erit $\vartheta\mu > \alpha\delta > \lambda\nu$.



[Quoniam enim est $\delta\vartheta < \delta\gamma$, recta $\vartheta\mu$ igitur inter puncta δ et γ cadet. Iam in punctum ζ non cadet; sic enim esset $\vartheta\delta = \delta\zeta$, quod absurdum est. At inter puncta ζ et γ multo

minus cadere potest, sic enim esset $\delta\zeta < \delta\vartheta$, quod absurdum est (est enim $\delta\zeta > \delta\vartheta$, ut initio suppositum est). Erit igitur punctum ϑ inter δ et ζ . Est autem propter huius libri lemma XIV $\alpha\vartheta \cdot \vartheta\gamma > \alpha\zeta \cdot \zeta\gamma$, id est $\vartheta\mu^2 > \zeta\beta^2$. Et est $\zeta\beta^2 = \alpha\delta^2$; ergo etiam $\vartheta\mu > \alpha\delta$. Sed recta $\lambda\nu$ est inter puncta ζ et γ . Quoniam igitur est $\alpha\lambda \cdot \lambda\gamma < \alpha\zeta \cdot \zeta\gamma$, estque $\alpha\lambda \cdot \lambda\gamma = \lambda\nu^2$, et $\alpha\zeta \cdot \zeta\gamma = \zeta\beta^2 = \alpha\delta^2$, ergo est $\lambda\nu^2 < \alpha\delta^2$, itaque $\lambda\nu < \alpha\delta$. Similiter etiam omnes tangentes, quae praeterea versus punctum γ ducuntur, minores sunt quam $\alpha\delta$.] Et omnino, prout semicirculi puncto γ appropinquant, tangens minor fit quam $\alpha\delta$, et prout recedunt, semper maior. Possunt igitur in diametro $\alpha\gamma$, manente puncto δ , semicirculi ita describi, ut modo tangentes aequales sint rectae $\alpha\delta$, modo eadem maiores, modo minores.

Ge auctore Co

16. ΔN add. Co

18. $\Pi\acute{\alpha}\sigma\sigma\omega\upsilon\alpha\iota$ A, corr. BS

19. $\eta \Delta N$ Co pro $\eta \Delta N$

20. $\epsilon\pi\iota \tau\alpha\upsilon\tau\eta$ vel $\epsilon\pi\iota\tau\alpha$ Hu pro $\epsilon\pi\iota \tau\alpha$

πρὸς τῷ γ BS

ἡγμέναι Hu pro μέρη

22. $\eta \epsilon\mu\alpha\pi\tau\omicron\upsilon\epsilon\tau\eta$ Hu pro

οὐ $\epsilon\gamma\acute{\alpha}\pi\epsilon\iota\tau\alpha\iota$


23. 24. $\epsilon\pi\iota \mu\acute{\epsilon}\nu \tau\eta\varsigma \Delta\Gamma$ διὰ τοῦ J ABS, corr. Hu

24. $\eta\mu\iota\kappa\epsilon\chi\lambda\iota\omicron\upsilon$ AS, $\eta\mu\iota\kappa\epsilon\chi\lambda\iota\omicron\upsilon$ B, corr. Ge

ad A¹ ex d

Εἰς τὸ κα'.

- 147 ιβ'. Ἐστω ἡμικύκλια τὰ $ΑΒΓ$ $ΑΕΖ$, τῇ $ΓΑ$ ἴση κείσθω ἡ $ΑΗ$, καὶ διαχθείσως τῆς $ΖΒ$ ἐκ' αὐτὴν κάθετος ἦχθω ἡ $ΗΘ$. ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ $ΘΒ$ τῇ $ΚΕ$.



Εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ $ΑΒΓ$ ἡμικυκλίου τὸ $Α$, καὶ ἀπὸ τοῦ $Α$ ἐπὶ τὴν $ΒΖ$ κάθετος ἦχθω ἡ $ΑΜ$. ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ $ΒΜ$ τῇ $ΜΚ$. ἔπει δὲ ἴση ἐστὶν ἡ μὲν $ΗΑ$ τῇ $ΓΑ$, ἡ δὲ $ΑΑ$ τῇ $ΑΓ$, ὅλη ἄρα ἡ $ΗΑ$ ὅλη τῇ $ΑΓ$ ἴση ἐστίν. καὶ εἰσὶν τρεῖς παράλληλοι αἱ $ΗΘ$ $ΑΜ$ $ΑΕ$. ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ $ΘΜ$ τῇ $ΜΕ$. ὦν ἡ $ΒΜ$ τῇ $ΜΚ$ ἐστὶν ἴση. λοιπὴ ἄρα ἡ $ΘΒ$ τῇ $ΚΕ$ ἴση ἐστίν, ὅπερ: ~

Φανερόν δὲ ὅτι καὶ ἡ $ΘΚ$ τῇ $ΒΕ$ ἴση ἐστίν.

- 148 ιγ'. Τῶν αὐτῶν ὄντων ἐραπτέσθω ἡ $ΒΖ$ κατὰ τὸ $Β$. ὅτι πάλιν ἴση ἐστὶν ἡ $ΘΒ$ τῇ $ΒΕ$.

Εἰλήφθω γάρ πάλιν τὸ κέντρον τοῦ $ΑΒΓ$ ἡμικυκλίου τὸ $Κ$, καὶ ἀπὸ τοῦ $Κ$ ἐπὶ τὸ $Β$ ἐπεξεύχθω ἡ $ΚΒ$. κάθετος ἄρα ἐστὶν ἐπὶ τὴν $ΒΖ$. ἔπει οὖν ἐν τρισὶν παραλλήλοις ταῖς $ΗΘ$ $ΒΚ$ $ΑΕ$ ἴση ἐστὶν ἡ $ΗΚ$ τῇ $ΚΑ$, ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ $ΘΒ$ τῇ $ΒΕ$, ὅπερ: ~

Εἰς τὸ κγ'.

20


- 149 ιδ'. Ἐστω τὰ ἡμικύκλια τὰ $ΑΒΓ$ $ΑΕΖ$, καὶ τῇ $ΓΑ$ ἴση κείσθω ἡ $ΑΗ$, καὶ διαχθείσως τῆς $ΕΘ$ ἐκ' αὐτὴν κάθετος ἦχθω ἡ $ΗΘ$. ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ $ΘΒ$ τῇ $ΚΑ$.

2. ιε' add. V τὰ $ΑΒΓ$ $ΕΖ$ A, distinct. BS 6. ἐπὶ τὴν $ΒΖ$
 Α' Co, ἐπὶ τῶν $ΒΖ$ BS 11. λοιπὴ Ge auctore Co pro λοιπὸν
 12. Φανερόν — ἐστίν in ABS ante ὅπερ inserta transposuit Hu

est inter α et δ . Sit λ , rursusque rectae $\beta\epsilon$ perpendicularis ducatur $\lambda\mu$; est igitur, ut supra, $\beta\mu = \mu\kappa$. Sed quoniam est $\alpha\eta = \delta\gamma$, et $\alpha\lambda = \lambda\gamma$, per subtractionem igitur restat $\eta\lambda = \lambda\delta$. Suntque tres parallelae $\eta\theta$ $\lambda\mu$ $\delta\epsilon$; est igitur etiam $\theta\mu = \mu\epsilon$. Sed erat $\beta\mu = \mu\kappa$; ergo per subtractionem restat $\beta\theta = \epsilon\kappa$, q. e. d.

In problema vicesimum sextum.

XX. Sit $\alpha\delta < \delta\gamma$, et $\eta\gamma = \alpha\delta$, et $\eta\theta$ perpendicularis rectae $\beta\epsilon$; dico esse $\beta\epsilon = \theta\kappa$. 93



Quoniam enim est $\alpha\delta < \delta\gamma$, centrum semicirculi $\alpha\beta\gamma$ est inter δ et η . Sit λ , ab eoque rectae $\beta\epsilon$ perpendicularis ducatur $\lambda\mu$; est igitur, ut supra, $\beta\mu = \mu\kappa$. Sed quoniam est $\alpha\delta = \eta\gamma$, et $\alpha\lambda = \lambda\gamma$, per subtractionem igitur restat $\delta\lambda = \lambda\eta$. Suntque tres parallelae $\delta\epsilon$ $\lambda\mu$ $\eta\theta$; est igitur $\epsilon\mu = \mu\theta$. Sed erat $\beta\mu = \mu\kappa$; ergo per subtractionem restat $\beta\epsilon = \theta\kappa$, q. e. d.

In problema undetricesimum (vide propos. 92).

XXI. Si sint duo semicirculi $\alpha\beta\gamma$ $\delta\epsilon\zeta$, et $\alpha\delta > \delta\gamma$, ac

corr. S 43. $\epsilon\alpha\eta$ (sic) ABS $\tau\omega\eta$ III A. distinx. BS 46. $\tau\eta\eta$ III AB cod. Co, corr. S Co 46. 47. η $\delta\epsilon$ — $\tau\alpha\eta$ $\epsilon\alpha\tau\eta$ add. Co 47. $\epsilon\tau\sigma\alpha\tau$ add. Hu 48. $\delta\lambda\eta$ η EM AB cod. Co, corr. S Co 51 — p. 818, 7. "In Græcis codicibus sequuntur duo lemmata, quæ cum nihil aliud continent, nisi quod in duobus præcedentibus demonstratur, supervacanea visa sunt, quare nos ea consulto omisimus" Co 22. $\kappa\alpha'$ add. BS 23. $\tau\eta\epsilon$ AA $\tau\eta\eta$ FF ABS Ge, corr. V $\epsilon\alpha\tau$ $\tau\eta$ $\delta\gamma$ BS, om. A¹, $\epsilon\alpha\tau$ $\tau\eta$ FF super verum add. A³


ponatur $\alpha\gamma = \delta\gamma$, et, ducta recta $\zeta\kappa\epsilon\beta$, huic perpendicularis ducatur $\eta\vartheta$, dico esse $\beta\vartheta = \epsilon\kappa$.

Sumatur semicirculi $\alpha\beta\gamma$ centrum λ , ab eoque rectae $\beta\zeta$ perpendicularis ducatur $\lambda\mu$: est igitur, ut supra. $\beta\mu = \mu\kappa$. Sed quoniam est $\alpha\lambda = \lambda\gamma$, et $\alpha\gamma = \delta\gamma$, per subtractionem igitur restat $\eta\lambda = \lambda\delta$. Suntque tres parallelae $\eta\vartheta$ $\lambda\mu$ $\delta\epsilon$; est igitur $\vartheta\mu = \mu\epsilon$. Sed erat $\beta\mu = \mu\kappa$; ergo per subtractionem restat $\beta\vartheta = \epsilon\kappa$, q. e. d.

Apparet esse etiam $\beta\epsilon = \vartheta\kappa$.

In problema tricesimum primum vide propos. 93.

XXII. Sint semicirculi $\alpha\beta\gamma$ $\delta\epsilon\zeta$, et sit rursus $\alpha\delta < \delta\gamma$, ducaturque recta $\zeta\kappa\epsilon\beta$, et ponatur $\eta\gamma = \alpha\delta$, rectaeque $\beta\zeta$ perpendicularis ducatur $\eta\vartheta$; dico esse $\beta\epsilon = \vartheta\kappa$.



Apparet enim rectam $\eta\vartheta$ neque in punctum κ neque inter κ et ζ cadere. Iam supponamus rectam $\eta\vartheta$ cadere in punctum κ . Si semicirculi $\alpha\beta\gamma$ centrum λ sumatur, ab eoque rectae $\beta\zeta$ perpendicularis ducatur $\lambda\mu$, erit, ut supra. $\beta\mu = \mu\kappa$. Sed quia tres sunt parallelae $\delta\epsilon$ $\lambda\mu$ $\eta\vartheta$, et $\delta\lambda = \lambda\gamma$, esset etiam (quia $\eta\vartheta$ in κ cadere supposuimus) $\epsilon\mu = \mu\kappa$; ergo etiam esset $\beta\mu$ aequalis rectae $\epsilon\mu$, scilicet maiori minori, quod fieri non potest. Ergo recta $\eta\vartheta$ non cadit in punctum κ . Multo autem magis manifestum est rectam $\eta\vartheta$ non inter

13. $\delta\tau\epsilon$ η EB $\tau\eta$ $K\Theta$ $I\sigma\eta$ $\epsilon\sigma\tau\epsilon\upsilon$ add. Ge. corr. Hu 16. η $\overline{H\Theta}$ add. Horsley 17. $\tau\omega\tau$ $\overline{ZK}$ A, distinx. BS 20. $\gamma\alpha\rho$ η $\overline{AA}$ AB, corr. S 23. $\delta\rho\alpha$ S, $\epsilon\sigma\tau\epsilon\upsilon$ AB

δὲ μᾶλλον ὅτι οὐδὲ μεταξὺ τῶν ZK τῶν ἐκτὸς ἄρα. ἐπεὶ δὲ ἴση ἐστὶν ἡ μὲν AA τῇ AI , ἡ δὲ AA τῇ HI , λοιπὴ ἄρα ἡ AI λοιπῇ τῇ HI ἴση ἐστίν. καὶ εἰσὶν τρεῖς παράλληλοι αἱ AE AM $HΘ$. ἴση ἄρα καὶ ἡ EM τῇ $MΘ$. ὧν ἡ BM τῇ MK ἐστὶν ἴση· λοιπὴ ἄρα ἡ EB λοιπῇ τῇ $KΘ$ ἐστὶν ἴση, ὅπερ: ~

Φανερόν δὲ καὶ ὡς ἡ EK τῇ $BΘ$ ἐστὶν ἴση.

Εἰς τὸ λδ'.

- 155 κγ'. Ἐστω τὰ $ABΓ$ AEZ ἡμικύκλια, μείζων ἔστω ἡ AI τῆς $IΖ$, καὶ τῇ AA ἴση κείσθω ἡ ZH , καὶ προσανα-
πεπληρώσθω ὁ $ΔΕΖΚ$ κύκλος, διήχθω ἡ $BIΘ$, καὶ ἀπὸ
τοῦ H ἐπὶ τὴν $BΘ$ κάθετος ἦχθω [φανερὸν ὅτι ἐκτὸς πίπτει
τοῦ κύκλου· παράλληλος γὰρ γίνεται τῇ AB , ἡ δὲ AB
ὑποπίπτει, καὶ ἡ $HΘ$ ἄρα ὑποπίπτει. ἔστω] ἡ $HΘ$. δι-
ἴση ἐστὶν ἡ BE τῇ $ΘΚ$. 15

Ἐπεὶ μείζων ἐστὶν ἡ AI τῆς $IΖ$, τὸ τοῦ AEZ ἡμι-
κύκλιον κέντρον μεταξὺ ἐστὶν τῶν A I . ἔστω τὸ A , καὶ
κάθετος ἡ AM . ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ μὲν AA τῇ ZH , ἡ
δὲ AA τῇ AZ , ὅλη ἄρα ἡ AAI ὅλη τῇ AH ἐστὶν ἴση.
καὶ εἰσὶν τρεῖς παράλληλοι αἱ AB AM $HΘ$. ἴση ἄρα ἐστὶν 20
καὶ ἡ BM τῇ $MΘ$. ὧν ἡ EM τῇ MK ἐστὶν ἴση· λοιπὴ
ἄρα ἡ BE λοιπῇ τῇ $KΘ$ ἐστὶν ἴση, ὅπερ: ~

Φανερόν ὡς καὶ ἡ BK τῇ $EΘ$ ἐστὶν ἴση.

- 156 κδ'. Ἐστω πάλιν τὰ ἡμικύκλια τὰ $ABΓ$ AEZ , καὶ
μείζων ἡ AI τῆς $IΖ$, καὶ τῇ AA ἴση κείσθω ἡ ZH , καὶ 25
προσαναπενπληρώσθω ὁ $AEZK$ κύκλος, καὶ διήχθω ἡ EBK ,


1. τῶν ZK A, distinx. BS 2. ZK πίπτει· ἐκτὸς conl. Hu 3. ἐπεὶ
δὲ ἴση add. Ge 7. vide ad p. 816, 10 8. κγ' add. BS 9.
 $ABΓ$ AEZ A, distinx. BS 10. $AEZK$ add. Co 11. ἐπὶ τὴν $BΘ$
Hu pro ἐπὶ τὴν BI 12. φανερόν — 13. ἔστω del. Hu 14. ὑποπίπτει
ἐκτὸς πίπτει utroque loco conl. Co 15. ἔστω ἡ $HΘ$ del. Co 16. 17. τοῦ
 AEZ κύκλου conl. Co 17. κέντρον AV cod. Co, om. B^s 18. τῶν AI
A, distinx. B, τῶν γ δ S cod. Co 19. ἴσαι A, corr. BS 20. ὅπερ
BS, ὅ A 21. vide ad p. 816, 10 22. κδ' add. BS 23. τὰ $ABΓE$ $IΖ$
A. corr. BS

puncta α et ζ cadere: ergo extra rectam $\alpha\zeta$ cadit. Sed quoniam est $\alpha\lambda = \lambda\gamma$, et $\alpha\delta = \eta\gamma$, per subtractionem igitur restat $\delta\lambda = \lambda\eta$. Suntque tres parallelæ $\delta\epsilon$ $\lambda\mu$ $\eta\vartheta$; est igitur $\epsilon\mu = \mu\vartheta$. Sed erat $\beta\mu = \mu\alpha$; ergo per subtractionem restat $\beta\epsilon = \vartheta\alpha$, q. e. d.

Apparet esse etiam $\beta\vartheta = \epsilon\alpha$.

In problema tricesimum quartum.

XXIII. Sint semicirculi $\alpha\beta\gamma$ $\delta\epsilon\zeta$; sit $\delta\gamma > \gamma\zeta$, et pro-^{Prop. 94}
ducatur $\alpha\zeta$, ac ponatur $\zeta\eta = \alpha\delta$, et compleatur circulus $\delta\epsilon\zeta\eta$; ducatur recta $\beta\epsilon\gamma\eta\vartheta$, eique perpendicularis ab γ ducatur $\eta\vartheta$ [quam extra circulum cadere apparet; nam parallela est rectæ $\alpha\beta$, quæ quidem extra cadit; ergo etiam $\eta\vartheta$ extra cadit]; dico esse $\beta\epsilon = \alpha\vartheta$.



Quoniam est $\delta\gamma > \gamma\zeta$, semicirculi $\delta\epsilon\zeta$ centrum est inter puncta δ et γ . Sit λ , et rectæ $\beta\vartheta$ perpendicularis $\lambda\mu$. Iam quia est $\alpha\delta = \zeta\eta$, et $\delta\lambda = \lambda\zeta$, tota igitur $\alpha\lambda$ toti $\lambda\eta$ æqualis est. Sunt-

que tres parallelæ $\alpha\beta$ $\lambda\mu$ $\vartheta\eta$; est igitur $\beta\mu = \mu\vartheta$. Sed est propter elem. 5, 5 $\epsilon\mu = \mu\alpha$; ergo per subtractionem restat $\beta\epsilon = \alpha\vartheta$, q. e. d.


Apparet esse etiam $\beta\alpha = \epsilon\vartheta$.

XXIV. Sint rursus semicirculi $\alpha\beta\gamma$ $\delta\epsilon\zeta$, sitque $\delta\gamma > \gamma\zeta$.^{Prop. 95}
et ponatur $\zeta\eta = \alpha\delta$, et compleatur circulus $\delta\epsilon\zeta\eta$, et ducatur recta $\epsilon\beta\gamma\eta$ et huic perpendicularis a puncto γ ducatur $\eta\vartheta$

⁹⁴) Conf. supra p. 795 adnot. ⁹⁵.

⁹⁵*) Apparet ipsa notarum collocatione significari proprium huius problematis casum. Punctum enim β , quod est in semicirculi $\alpha\beta\gamma$ circumferentia, inter ϵ et γ esse oportet.

καὶ ἀπὸ τοῦ H ἐπ' αὐτὴν κάθετος ἵχθω ἡ $HΘ$ [φανερὸν δὲ ὅτι ἐντός πίπτει τοῦ κύκλου, ἐπεὶ καὶ ἡ παράλληλος αὐτῇ ἡ AB ἐντός· δεῖξαι ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ EB τῇ $ΘΚ$].



Ἔστω τὸ κέν-
τρον τὸ A , καὶ δ
πάλιν κάθετος ἡ
 AM . ἴση ἄρα
ἐστὶν ἡ EM τῇ
 MK . ἐπεὶ δὲ ἐν
τρισὶ παράλλη-
λοις ταῖς AB
 AM $HΘ$ ἴση ἐ-
στὶν ἡ AA τῇ
 AH , ἴση ἄρα ἐ-
στὶν καὶ ἡ BM 15

τῇ $MΘ$. ἔστιν δὲ καὶ ὅλη ἡ EM ὅλη τῇ MK ἴση· λοιπὴ
ἄρα ἡ EB λοιπὴ τῇ $KΘ$ ἐστὶν ἴση, ὥστε: ~

- 157 Τὸ πρῶτον τῶν νεύσεων ἔχει προβλήματα θ', διορισ-
μοὺς τρεῖς· καὶ εἰσὶν οἱ τρεῖς ἐλάσσονες ὃ τε κατὰ τὸ
πέμπτον καὶ ὁ κατὰ τὸ ζ' πρόβλημα καὶ ὁ κατὰ τὸ θ'. 20
τὸ δεύτερον νεύσεων ἔχει προβλήματα με', διορισμοὺς τρεῖς,
τὸν τε κατὰ τὸ ιζ' πρόβλημα καὶ τὸν κατὰ τὸ ιθ' καὶ τὸν
κατὰ τὸ κγ'· καὶ εἰσὶν οἱ τρεῖς ἐλάσσονες.

Ἐπαφῶν πρῶτον.

Εἰς τὸ ε' πρόβλημα.

25

- 158 α'. Ἄντι παράλληλοι αἱ AB $ΓΔ$, καὶ κύκλος ἐφαπτέ-
σθω ὁ EZ κατὰ τὰ E Z σημεία, καὶ ἐπεξείχθω ἡ EZ .
ὅτι διάμετρος ἐστὶν τοῦ EZ κύκλου.

Εἰλήφθω σημεία ἐπὶ τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας τὰ
 H $Θ$, καὶ ἐπεξείχθωσαν αἱ EH HZ $EΘ$ $ΘZ$. ἐπεὶ οὖν 30
ἐφάπτεται μὲν ἡ AE τέμνει δὲ ἡ EZ , ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ
ὑπὸ AEZ γωνία τῇ ἐν τῷ ἐναλλάξ τμήματι γωνίᾳ τῇ ὑπὸ
 EOZ . διὰ ταῦτα καὶ ἡ ὑπὸ AZE ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ EHZ

{quam intra circulum cadere apparet, quia etiam $\alpha\beta$, quae rectae $\eta\theta$ parallela est, intra cadit}: demonstretur esse $\epsilon\beta = \theta\kappa$.

Esto circuli $\delta\epsilon\zeta$ centrum λ , et rursus rectae ex perpendicularis $\lambda\mu$; est igitur, ut supra, $\epsilon\mu = \mu\kappa$. Sed quoniam inter tres parallelas $\alpha\beta$ $\lambda\mu$ $\eta\theta$ est $\alpha\lambda = \lambda\eta$, est igitur $\beta\mu = \mu\theta$. Sed erat etiam $\epsilon\mu = \mu\kappa$; ergo per subtractionem restat $\epsilon\beta = \theta\kappa$, q. e. d.


Primus inclinationum liber habet problemata novem¹, determinationes tres; suntque hae omnes minimae, ad quintum problema, ad septimum, ad nonum. Secundus inclinationum liber habet problemata quadraginta quinque, determinationes tres, easque ad problema XVII, ad XIX, ad XXIII: suntque hae tres minimae.

LEMATA IN TACTIONUM LIBRUM PRIMUM.

In problema quintum.

I. Sint duae parallelae $\alpha\beta$ $\gamma\delta$, quas circulus $\epsilon\zeta$ tangat Prop. in punctis ϵ et ζ , et iungatur $\epsilon\zeta$; dico rectam $\epsilon\zeta$ circuli $\epsilon\zeta$ ⁹⁶

diametrum esse.



Sumantur in circuli circumferentia puncta η θ , et iungantur $\epsilon\eta$ $\eta\zeta$ $\epsilon\theta$ $\theta\zeta$. Iam quia circulum tangit $\alpha\epsilon$ et secat $\epsilon\zeta$, propter elem. 3, 32 angulus $\alpha\epsilon\zeta$ aequalis est angulo $\epsilon\theta\zeta$ qui est in alterno segmento. Eadem de causa est etiam angulus $\delta\zeta\epsilon$ aequalis alterno $\epsilon\eta\zeta$.

Est autem inter parallelas $\alpha\beta$ et $\gamma\delta$ $\angle \alpha\epsilon\zeta$

4) Conf. supra p. 674 cum adnot. 2.

quae cap. 155 reperiuntur, tamen aliena esse ab hoc loco censet Hu
 44. 12. ταῖς $ABAM$ $U\theta$ A, distinx. BS 48. διαρριζόμενος A, corr.
 BS 49. ὁ τε Hu pro ὅτις ὁ 25. titulum $El\zeta$ τὸ ε' πρόβλημα in
 suspicionem vocat Haumannus p. 63 sq. 26. α' add. BS αὐτὰ $AB\Gamma$ A, distinx. BS 27. κατὰ τὰ $E\zeta$ et 29. 30. τὰ $U\theta$ A, distinx. BS
 32. τῶν E ἐναλλὰξ ABS, corr. V Co 33. ταῦτα Hu pro ταῦτα τῇ
 ὑπὸ $A\zeta E$ AB cod. Co, corr. S Co

$= \angle \varepsilon \zeta \delta$; ergo est etiam $\angle \varepsilon \theta \zeta = \angle \varepsilon \eta \zeta$. Et horum angulorum summa duos rectos efficit (*elem. 3, 22*); ergo uterque rectus est; itaque utrumque segmentorum $\varepsilon \theta \zeta$ et $\varepsilon \eta \zeta$ semicirculus est. Ergo $\varepsilon \zeta$ diametrus est circuli $\varepsilon \zeta$, q. e. d.

II. Sit circulus $\alpha \beta \delta$, et tangant eum $\beta \gamma$ $\alpha \gamma$, et angulus γ rectus Prop. 97
 ita $\gamma \delta$ bifariam secetur; dico in recta $\gamma \delta$ esse centrum circuli $\alpha \beta \delta$.

Iungantur $\delta \alpha$ $\alpha \varepsilon$ $\delta \beta$ $\beta \varepsilon$. Iam quia circulum tangit $\alpha \gamma$ et secat $\gamma \delta$, est $\alpha \gamma^2 = \delta \gamma \cdot \gamma \varepsilon$ (*elem. 3, 36*); per proportionem igitur est $\delta \gamma : \alpha \gamma = \alpha \gamma : \gamma \varepsilon$, et communi angulo $\alpha \gamma \delta$ similia sunt triangula $\alpha \gamma \delta$ $\varepsilon \gamma \alpha$; ergo est $\angle \delta \alpha \gamma = \angle \alpha \varepsilon \gamma$. Eadem de causa est $\angle \delta \beta \gamma = \angle \beta \varepsilon \gamma$. Sed quia tangentes $\gamma \alpha$ $\gamma \beta$ aequales sunt¹⁾, et ex hypothesi est $\angle \alpha \gamma \delta = \angle \beta \gamma \delta$, communi igitur latere $\gamma \varepsilon$ in triangulis $\alpha \varepsilon \gamma$ et $\beta \varepsilon \gamma$ est etiam $\angle \alpha \varepsilon \gamma$ (id est $\delta \alpha \gamma$) $= \angle \beta \varepsilon \gamma$ (id est $\delta \beta \gamma$), et $\angle \varepsilon \alpha \gamma = \angle \varepsilon \beta \gamma$; itaque subtrahendo est etiam $\angle \delta \alpha \varepsilon = \angle \delta \beta \varepsilon$; ergo, quia quadrilaterum $\delta \alpha \varepsilon \beta$ circulo est inscriptum, uterque horum angulorum rectus est; est igitur $\delta \varepsilon$ diametrus circuli $\alpha \beta \delta$; itaque in recta $\gamma \delta$ centrum est circuli $\alpha \beta \delta$.

In problema duodecesimum.

III. Sint duo circuli $\alpha \beta$ $\beta \gamma$ se tangentes extra²⁾ in Prop. 98
 puncto β , et ducatur recta $\alpha \beta \gamma$, sitque in ea circuli $\alpha \beta$ centrum; dico etiam circuli $\beta \gamma$ centrum esse in recta $\alpha \beta \gamma$.



Ducatur enim recta $\delta \beta \varepsilon$ utrumque circulum tangens. Rectus igitur est angulus $\alpha \beta \delta$ (*elem. 3, 18*); ergo etiam eius supplementum angulus $\delta \beta \gamma$ rectus est. Et tangit $\delta \varepsilon$ circulum

¹⁾ Quae huic propositioni respondet conversa, eam a scriptore propositionis 134 adhibitam esse demonstravimus in append. ad VI propos. 53 sub finem.


²⁾ Nimirum propter *elem. 3, 36* est et $\gamma \alpha^2$ et $\gamma \beta^2 = \delta \gamma \cdot \gamma \varepsilon$. Conf. supra p. 491 adnot. *.

³⁾ Addidit Ca p. 86; idem "intra" in propos. 100.

κλον· τὸ ἄρα κέντρον τοῦ ΒΓ κύκλου ἐστὶν ἐπὶ τῆς ΑΒΓ
ὁμοίως ὡς καὶ τοῦ ΑΒ.

Ἄλλως.

- 161 δ'. Ἐστωσαν πάλιν αἱ ΑΒ ΒΓ κύκλων διάμετροι· ὅτι
οἱ ΑΒ ΒΓ κύκλοι ἐφάπτονται ἀλλήλων.



Ἦχθω πάλιν ἐφα-
πτομένη [ἡ] τοῦ ΑΒ κύ-
κλου ἡ ΑΕ· ὁρθὴ ἄρα ἐστὶν
ἡ ὑπὸ ΑΒΑ γωνία, καὶ
ἐφεξῆς ἡ ὑπὸ ΑΒΓ γωνία 10
ὁρθὴ ἐστὶν. καὶ ἐστὶν τοῦ
ΒΓ κύκλου κέντρον ἐπὶ
τῆς ΒΓ· ἡ ΑΕ ἄρα ἐφά-

πτεται τοῦ ΒΓ κύκλου· ἀλλὰ καὶ τοῦ ΑΒ κατ' αὐτὸ τὸ Β·
καὶ ὁ ΑΒ ἄρα τοῦ ΒΓ κύκλου ἐφάπτεται κατὰ τὸ Β σημεῖον 15
[ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς].

- 162 ε'. Ἄνὸ κύκλοι ἐφαπτόμενοι ἀλλήλων οἱ ΑΒ ΒΓ κατὰ τὸ
Β σημεῖον, καὶ διήχθω ἡ ΑΓΒ, ἔστω δὲ ἐπ' αὐτῆς τὸ κέντρον
τοῦ ΑΒ κύκλου· ὅτι καὶ τοῦ ΒΓ τὸ κέντρον ἐστὶν ἐπὶ τῆς ΒΓ.

Ἦχθω ἐφαπτομένη τῶν κύκλων ἡ ΑΕ. ἐπεὶ οὖν ἐφα- 20
πτομένη ἡ ΑΕ τοῦ ΑΒ κύκλου, καὶ διὰ τοῦ κέντρου ἡ ΑΒ,
ὁρθὴ ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΒΑ γωνία. καὶ ἔκται ἀπὸ τῆς ἀφῆς
ἡ ΒΓ· ἐπὶ τῆς ΒΓ ἄρα τὸ κέντρον ἐστὶν τοῦ ΒΓ κύκλου.

Φανερόν δὲ καὶ οὕτως· εἰ γὰρ διαχθεῖν ἡ ΒΖΗ, καὶ
ἐπιζευχθεῖσαν αἱ ΓΖ ΑΗ, γένοιτο ἂν ἴση ἡ ὑπὸ ΕΒΓ 25
γωνία ἑκατέρᾳ τῶν ὑπὸ τῶν ΒΖΓ ΑΗΒ γωνία. καὶ ἐστὶν

1. ἐπὶ τῆς ΒΓ ABS, corr. Hu 2. ὡς add. Hu 4. δ' add. BS
διάμετροι om. B cod. Co 7. ἡ del. Hu 8. ἄρα add. Hu 11—13. καὶ
ἐστὶν ἐν ἑκατέρᾳ κέντρον ἡ ΒΓ ΑΒ], καὶ ἐστὶν ἐν ἑκατέρᾳ κέντρον τῶν
α β γ Σ, καὶ ἐστὶν ἑκάτερον κέντρον τῶν ΑΒ ΒΓ κύκλων ἐπὶ τῆς ΑΒΓ Ca.
καὶ ἐστὶν ἐν ἑκατέρᾳ κέντρον τῶν ΑΒ ΒΓ Haumannus, corr. Hu 17. ε'
add. BS 21. καὶ add. S 22. ΑΒΑ γωνία Hu pro ΑΒΓ γωνία
23. ἡ ΒΓ Co. τῆς ΒΕ ΑΒ, τῆς β Σ, τῆς Η ἡ ΗΓ Ca ἐπὶ τὴν ΒΓ τὸ
κέντρον ἄρα ABS, corr. Co 24. 25. διαχθῇ — ἐπιζευχθώσαν ΑΒΣ,
corr. Hu 25. ἡ ὑπὸ ΕΒΓ Ca pro ἡ ὑπὸ ΑΒΖ 26. ὑπὸ τῶν ΕΖΓ Α
ΗΒ γωνίαι A B cod. Co, corr. S

$\beta\gamma$; ergo circuli $\beta\gamma$ centrum est in recta $\alpha\beta\gamma$ perinde ac circuli $\alpha\beta$.

Aliter.

IV. Sint rursus circulorum $\alpha\beta$ $\beta\gamma$ diametri $\alpha\beta$ $\beta\gamma$ in eadem recta, sitque punctum β inter α et γ ; dico circulos $\alpha\beta$ $\beta\gamma$ se tangere in puncto β . Prop. 99

Ducatur rursus $\delta\epsilon$ tangens circulum $\alpha\beta$ in puncto β ; rectus igitur est angulus $\alpha\beta\delta$, itemque eius supplementum angulus $\delta\beta\gamma$ rectus est. Et est circuli $\beta\gamma$ centrum in recta $\beta\gamma$; ergo $\delta\epsilon$ circulum $\beta\gamma$ tangit in puncto β ; sed etiam circulum $\alpha\beta$ in eodem puncto β ; ergo etiam circulus $\alpha\beta$ circulum $\beta\gamma$ tangit in puncto β .

V. Sint duo circuli $\alpha\beta$ $\beta\gamma$ in puncto β se tangentes in- Prop. 100


tra, et ducatur recta $\alpha\gamma\beta$, sitque in ea circuli $\alpha\beta$ centrum; dico etiam circuli $\beta\gamma$ centrum esse in recta $\alpha\gamma\beta$.

Ducatur $\delta\epsilon$ utrumque circulum tangens. Iam quia $\delta\epsilon$ circulum $\alpha\beta$ tangit, et $\alpha\beta$ per centrum transit, rectus est angulus $\delta\beta\alpha$. Et ducta est a puncto tactionis recta $\beta\gamma$, rectusque est angulus $\delta\beta\gamma$; ergo in recta $\beta\gamma$ est centrum circuli $\beta\gamma$.

Manifestum est etiam sic. Si ducatur recta $\beta\zeta\eta$, iunganturque $\gamma\zeta$ $\alpha\eta$, fiet propter elem. 3. 32 $\angle \epsilon\beta\gamma = \angle \gamma\zeta\beta = \angle \alpha\eta\beta$. Et, quia ex hypothesi circuli $\alpha\beta$ centrum est in recta $\alpha\beta$, rectus est angulus $\alpha\eta\beta$; ergo etiam $\gamma\zeta\beta$ rectus est; itaque in recta $\epsilon\beta\gamma$ est centrum circuli $\beta\gamma$. Et similiter, si centrum circuli $\beta\gamma$ in recta

* "Sint $\alpha\beta$ $\beta\gamma$ circulorum diametri in eadem recta e diversis partibus puncti β , quod commune habent, sitae, ostendendum est circulos $\alpha\beta$ $\beta\gamma$ in puncto β extra se contingere." Ca p. 37.

- ὁρθῇ ἢ ἐπὶ $\angle AHB$ γωνία· ὁρθῇ ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ἐπὶ BZI γωνία, ὥστε ἐπὶ τῆς $BΓ$ τὸ κέντρον ἐστὶν τοῦ $BΓ$. καὶ ὁμοίως, καὶ τοῦ $BΓ$ δοθῇ ἐπὶ τῆς AB , δεῖξομεν ὅτι καὶ τοῦ AB .
 163 Ἦ. Ἀλλὰ δὲ πάλιν ἔστωσαν διάμετροι αἱ AB $BΓ$. ὅτι οἱ κύκλοι ἐφάπτονται ἀλλήλων. 5



Ἦχθω τοῦ AB κύκλου ἐφαπτομένη εὐθεΐα ἡ ABE . ὁρθῇ ἄρα ἐστὶν ἡ ἐπὶ ABE γωνία. καὶ ἐστὶν διάμετρος ἡ $BΓ$. ἡ AE ἄρα ἐφαπτομένη τοῦ $BΓ$ κύκλου κατὰ τὸ B 10 σημεῖον. [εἰ γὰρ ἐκβληθεῖν ἡ $ΓΖ$ ἐπὶ τὸ A , γένοιτο ἂν τὸ ὑπὸ $ΓAZ$ ἴσον τῷ ἀπὸ AB , διὰ τὸ ὁρθὴν γίνεσθαι τὴν πρὸς τῷ Z γωνίαν, οὔσης τῆς πρὸς τῷ B ὁρθῆς.] ἀλλὰ 15
 γὰρ καὶ τοῦ AB κύκλου ἐφάπτεται κατὰ τὸ B . καὶ ὁ AB ἄρα κύκλος τοῦ $BΓ$ κύκλου ἐφάπτεται κατὰ τὸ B [ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς].

Εἰς τὸ ις'.

- 164 Ἦ. Ἐστωσαν δύο κύκλοι ἐφαπτόμενοι ἀλλήλων οἱ $ABΓ$ 20 AEB κατὰ τὸ B σημεῖον, καὶ διὰ τοῦ B διεχθῶσαν αἱ $ΓΒA$ ABE , καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ $ΑΓ$ AE . ὅτι παράλληλοι αἱ $ΑΓ$ AE .

Ἦχθω γὰρ τῶν κύκλων ἐφαπτομένη εὐθεΐα ἡ ZH κατὰ τὸ B σημεῖον. ἐπεὶ οὖν ἐφάπτεται μὲν ἡ BZ τέμνει δὲ 25 ἡ BA , ἴση ἐστὶν ἡ ἐπὶ ABZ γωνία τῇ ἐπὶ $ΑΓB$. διὰ ταῦτα δὲ καὶ ἡ ἐπὶ HBE γωνία ἴση ἐστὶν τῇ ἐπὶ BIE γωνίᾳ. ἀλλὰ ἡ ἐπὶ ABZ γωνία ἴση ἐστὶν τῇ ἐπὶ EBH γωνίᾳ· καὶ ἡ ἐπὶ $ΑΓB$ ἄρα γωνία ἴση ἐστὶν τῇ ἐπὶ EAB γωνίᾳ. καὶ εἰσὶν ἐναλλάξ· παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ $ΑΓ$ 30 τῇ AE , ὅπερ· ~

4. ε' add. BS 41. εἰ γὰρ — 15. ὁρθῆς del. Co (conf. etiam adnot. * ad Latina) 13. τῷ ἀπὸ AB ABS, corr. Ca 20. ε' add. BS 20. 21. οἱ AB $ΓA$ EB A, corr. BS 24. εὐθεΐα ἡ ZBH , omissis κατὰ τὸ B σημεῖον, Hu 27. ταῦτα Hu pro ταῦτα τῇ ἐπὶ εὐθ S Co


$\alpha\beta$ datum sit; in eadem recta circuli $\alpha\beta$ centrum esse demonstrabimus.

VI. Sed rursus sint diametri $\alpha\beta$ $\beta\gamma$; dico circulos se tangere¹⁾. Prop. 101

Ducatur recta $\delta\beta\epsilon$ circulum $\alpha\beta$ tangens; rectus igitur est angulus $\alpha\beta\epsilon$. Et est $\beta\gamma$ diametrus circuli $\beta\gamma$; ergo $\delta\epsilon$ hunc circulum tangit in puncto β . Sed eandem circulum $\alpha\beta$ in puncto β tangit; ergo etiam circulus $\alpha\beta$ circulum $\beta\gamma$ tangit in puncto β .

In problema decimum sextum.

VII. Sint duo circuli $\alpha\beta\gamma$ $\delta\beta\epsilon$ se tangentes extra in puncto β , et per β ducantur rectae $\gamma\beta\delta$ $\alpha\beta\epsilon$, iunganturque $\alpha\gamma$ $\delta\epsilon$; dico rectas $\alpha\gamma$ $\delta\epsilon$ parallelas esse²⁾. Prop. 102



Ducatur enim recta $\xi\eta$ utrumque circulum in puncto β tangens. Iam quia tangit $\beta\xi$ secatque $\beta\alpha$, propter elem. 3. 32 est $\angle \alpha\beta\xi = \angle \alpha\gamma\beta$. Eadem de causa est etiam $\angle \eta\beta\epsilon = \angle \beta\delta\epsilon$. Sed ad verticem β est $\angle \alpha\beta\xi = \angle \epsilon\beta\eta$; ergo est etiam $\angle \alpha\gamma\beta = \angle \beta\delta\epsilon$: suntque hi anguli alterni; ergo recta $\alpha\gamma$ parallela est ipsi $\delta\epsilon$, q. e. d.

1) Hoc loco scriptor non solum eas, quas solet, hypotheseos partes, sed etiam alias omisit, quae ex propos. 100 efficiuntur: rectae $\alpha\beta$ partem esse $\beta\delta$, et circulos in puncto β se tangere intra. Conf. Ca p. 38.


2) Ex verbis $\epsilon\iota\ \gamma\alpha\rho\ \epsilon\kappa\beta\lambda\eta\theta\epsilon\iota\eta$ cet., quae a Græco contextu sectusimus, hanc demonstrationem concinnavit Ca p. 38: "Patet vera etiam ita: Si producantur recta aliqua $\gamma\delta$, donec rectae $\delta\beta$, quae circulum $\alpha\beta$ in β contingit, in δ occurrat, fiet, quia angulus ξ rectus est acque ac angulus β , rectangulum $\gamma\delta\cdot\delta\beta$ aequale quadrato ex $\delta\beta$. Recta igitur $\delta\epsilon$ contingit circulum $\beta\gamma$; eadem autem in eodem puncto β contingit etiam circulum $\alpha\beta$. Circulus $\alpha\beta$ igitur circulum $\beta\gamma$ in puncto β intra contingit".

2) Conf. supra IV propos. 8 adnot. 2.

165 η'. Κύκλος δ' $ABΓ$, καὶ ἐπεξέχθωσαν αἱ AB BF FA , καὶ διὰ τοῦ A διήχθω τις εὐθεΐα ἢ AE , ὥστε ἴσην εἶναι τὴν B γωνίαν τῇ ἐπὶ EAF γωνίᾳ· ὅτι ἐφαπτεται ἡ AE τοῦ $ABΓ$ κύκλου κατὰ τὸ A σημεῖον.

Εἰ μὲν οὖν ἡ AF διὰ τοῦ κέντρου ἐστίν, φανερόν ἐστί· 5 γίνεται γὰρ ὀρθή ἡ ἐπὶ EAF γωνία διὰ τὸ καὶ τὴν B γωνίαν εἶναι ὀρθήν· τοῦτο δὲ προδεδείκται. εἰ δὲ μή, ἔστω τὸ κέντρον τὸ Z , καὶ ἐπεξέχθω ἢ AZ καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ H , καὶ ἐπεξέχθω ἡ BH . ὀρθὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ἐπὶ ABH γωνία. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἢ μὲν ἐπὶ EAF 10 γωνία τῇ ἐπὶ $ABΓ$, ἢ δὲ ἐπὶ HAF γωνία ἐν τῷ αὐτῷ τμήματι τῇ ἐπὶ HBF , ὅλη ἄρα ἢ ἐπὶ EAH γωνία τῇ ἐπὶ ABH γωνίᾳ ἴση ἐστίν. ὀρθὴ δὲ ἢ ἐπὶ ABH · ὀρθὴ ἄρα καὶ ἢ ἐπὶ EAH . καὶ ἐστὶν ἐκ τοῦ κέντρου ἢ ZA ἐφαπτομένη, ἄρα ἢ AE τοῦ $ABΓ$ κύκλου· τοῦτο γὰρ προ- 15 γέγραπται.

166 θ'. Τούτου ὅτιος ἀνάστροφον τοῦ προῦ αὐτοῦ. παρα-
λήλουν αἵσας AF τῇ AE , δείξαι ὅτι ἐφαπτόμενοι οἱ $ABΓ$ EGB ἀλλή-
λων κατὰ τὸ B σημεῖον. 20




Ἦχθω πάλιν τοῦ $ABΓ$ κύ-
κλου ἐφαπτομένη εὐθεΐα ἢ ZH .
ἴση ἄρα ἐστὶν ἢ ἐπὶ ABZ γωνία
τῇ $Γ$. ἀλλὰ ἢ ἐπὶ ABZ γωνία
ἴση ἐστὶν τῇ ἐπὶ EBH , ἢ δὲ $Γ$ 25
τῇ $Δ$ ἐναλλάξ ἴση ἐστίν, ὥστε καὶ
ἢ ἐπὶ HBE γωνία τῇ $Δ$. διὰ δὲ
τὸ προγεγραμμένον ἐφαπτεται ἢ
 ZH τοῦ EGB κύκλου. ἀλλὰ καὶ
τοῦ $ABΓ$ κατὰ τὸ B · καὶ ὁ $ABΓ$ 30

1. η' add. BS ἐπεξέχθωσαν αἱ Ca pro ἐπεξέχθω ἢ ΓΑ om.
AB cod. Co, add. S AF add. Co. 2. διὰ Hu pro ἀπὸ διήχθη A.
corr. BS ἢ AE Hu pro ἢ AE 3. τὴν B AB Co, τὴν γ cod. Co.
τὴν αβγ S 4. τοῦ AB κύκλου ABS, corr. Co 14. ἢ ZA Hu pro ἢ
AZ 15. ἐφαπτεται conl. Co at conf. statim vs. 19 17. θ' add.
BS ἀναστροφόν B, ἀναστροφόν A, ἀντιστροφόν S 24. ἢ ἐπὶ BS.

ἄρα κύκλος τοῦ $B\Delta E$ κύκλου ἐφάπτεται κατὰ τὸ B σημείον.

Πρόβλημα εἰς τὸ αὐτό.

- 167 Ἦ. Θέσει δοθέντος κύκλου τοῦ $AB\Gamma$, καὶ δύο δοθέντων τῶν $\angle E$, ἀπὸ τῶν $\angle B$ ἂν κλασθῇ ἡ ABE καὶ ἐκβληθῇ, ποιεῖν παράλληλον τὴν AF τῇ AE .



Γεγονέντω· καὶ ἦχθω ἐφαπτομένη ἡ ZA .
 ἔπει οὖν παράλληλος ἡ AF τῇ AE , ἴση ἐστὶν¹⁶
 ἡ Γ γωνία τῇ ὑπὸ ΓAE
 γωνίᾳ. ἀλλὰ ἡ Γ ἴση
 ἐστὶν τῇ ἐπὶ ZAE
 (ἐφάπτεται γὰρ καὶ
 τέμνει)· καὶ ἡ ἐπὶ ZAE ¹⁵
 ἄρα γωνία ἴση ἐστὶν τῇ

ὑπὸ ΓAE . ἐν κύκλῳ ἄρα ἐστὶν τὰ $A B A Z$ σημεῖα· ἴσον
 ἄρα ἐστὶν τὸ ὑπὸ AEB τῷ ἐπὶ $ZE A$. δοθέν δὲ τὸ ἐπὶ
 AEB ἴσον γάρ ἐστιν τῷ ἀπὸ τῆς ἐφαπτομένης· δοθέν
 ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν AEZ . καὶ δοθεῖσα ἡ AE · δοθεῖσα²⁰
 ἄρα καὶ ἡ EZ . ἀλλὰ καὶ τῇ θέσει. καὶ ἐστὶν δοθέν τὸ E .
 δοθέν ἄρα καὶ τὸ Z . ἀπὸ δὲ δεδομένον σημεῖον τοῦ Z
 θέσει δεδομένον κύκλου τοῦ $AB\Gamma$ ἐφαπτομένην εὐθεῖαν ἦχ-
 ται ἡ ZA · δέδοται ἄρα καὶ ἡ ZA τῇ θέσει καὶ τῷ με-
 γέθει. καὶ ἐστὶν δοθέν τὸ Z · δοθέν ἄρα καὶ τὸ A . ἀλλὰ²⁵
 καὶ τὸ E δοθέν· θέσει ἄρα ἐστὶν ἡ AE . θέσει δὲ καὶ ὁ
 κύκλος· δοθέν ἄρα τὸ B σημεῖον. ἐστὶν δὲ καὶ ἐκάτερον
 τῶν $A E$ δοθέν· δοθεῖσα ἄρα ἐστὶν ἐκάτερα τῶν $AB BE$
 τῇ θέσει.

- 168 Συντεθήσεται δὲ τὸ πρόβλημα οὕτως. ἔστω ὁ μὲν³⁰
 κύκλος ὁ $AB\Gamma$, τὰ δὲ δοθέντα δύο σημεῖα τὰ $A E$. καί-

4. ε' add. BS δύο ABV cod. Co, om. Paris. 2368 S 5. τῶν
 AE utroque loco A, distinx. BS κλασθῇ Co pro δοθῇ 8. ἡ $Z A$
 Co, ZH (omisso ἡ) A, ἡ $\zeta\eta$ BS 17. τὰ $ABZ A$, distinx. BS
 21. ἄρα καὶ ἡ EZ ABS, corr. Co 22. δὴ add. Co 23. 24. τὸ

constructione circulum $\alpha\beta\gamma$ tangit in puncto β ; ergo etiam circulus $\alpha\beta\gamma$ circulum $\delta\beta\epsilon$ in puncto β tangit.

Problema in idem (Apollonii probl. XVI.).

X. Circulo $\alpha\beta\gamma$ positione dato, datisque duobus punctis δ & ϵ , ex his rectae $\delta\beta$ $\epsilon\beta$ ita inflectantur, ut eadem productae efficiant rectam $\alpha\gamma$ parallelam ipsi $\delta\epsilon$ *). Prop. 103

Factum iam sit, et ducatur $\zeta\alpha$ tangens circulum in puncto α . Iam quia parallelae sunt $\alpha\gamma$ $\delta\epsilon$, est $\angle\alpha\gamma\delta = \angle\gamma\delta\epsilon$. Sed, quia circulum tangit $\zeta\alpha$ secatque $\alpha\beta$, propter elem. 3. 32 est $\angle\alpha\gamma\delta = \angle\zeta\alpha\epsilon$; ergo est etiam $\angle\zeta\alpha\epsilon = \angle\gamma\delta\epsilon$, sive $\angle\zeta\alpha\beta = \angle\beta\delta\epsilon$. Sed anguli $\beta\delta\epsilon + \beta\delta\zeta$, id est $\zeta\alpha\beta + \beta\delta\zeta$ duobus rectis aequales sunt; itaque puncta α β δ ζ sunt in circuli circumferentia; est igitur $\alpha\epsilon \cdot \epsilon\beta = \zeta\epsilon \cdot \epsilon\delta$. Sed datum est $\alpha\epsilon \cdot \epsilon\beta$ (hoc enim propter elem. 3. 36 est aequale quadrato ab ea recta, quae ex ϵ ducta circulum $\alpha\beta\gamma$ tangit)¹⁾; ergo etiam $\zeta\epsilon \cdot \epsilon\delta$ datum est. Et data est $\delta\epsilon$; data igitur etiam $\epsilon\zeta$ (dat. 57). Sed etiam positione. Et est datum ϵ ; ergo etiam ζ datum est (dat. 27). Iam a dato puncto ζ ducta est recta $\zeta\alpha$ circulum $\alpha\beta\gamma$ positione datum tangens in puncto α ; ergo $\zeta\alpha$ positione data est ac magnitudine (dat. 91). Et est datum ζ ; ergo etiam α datum est. Sed etiam ϵ datum est; ergo recta $\alpha\epsilon$ positione data est (dat. 26). Sed etiam circulus $\alpha\beta\gamma$ positione datus est; ergo etiam punctum β datum (dat. 25). Sed etiam puncta δ & ϵ data sunt; ergo etiam rectae $\delta\beta$ $\beta\epsilon$ positione datae sunt.

Componetur problema sic. Sit circulus $\alpha\beta\gamma$, et sint data puncta δ & ϵ . Ponatur quadrato ab ea recta, quae ex ϵ ducta

*) Id est: punctum β in circuli circumferentia ita sumatur, ut, si rectae $\delta\beta$ $\epsilon\beta$ ad γ et α , altera puncta sectionis circumferentiae, producantur, recta $\alpha\gamma$ sit parallela datae $\delta\epsilon$.

1) Conf. infra adnotat. ** ad propos. 107.


$\overline{AB\Gamma}$ ἐγάνηται πρὸς ἐνθεῖαν ἤται ἢ $\overline{ZAN}$ ABS, corr. Cu 28. τὰρ $\overline{AE}$ et 31. τὰ $\overline{JE}$ A, distinx. BS 31. xad ante xεισθαι add. Ge at conf. supra p. 798. 21

circulum $\alpha\beta\gamma$ tangit, aequale rectangulum, quod recta $\delta\epsilon$ et alia quadam $\xi\zeta$ continetur, et a ζ ducatur recta $\xi\alpha$ circulum $\alpha\beta\gamma$ tangens in puncto α , et iungatur recta $\alpha\beta\epsilon$, itemque iuncta $\delta\beta$ producat ad γ , et iungatur $\alpha\gamma$; dico hanc parallelam esse rectae $\delta\epsilon$.

Quoniam enim ex hypothesis rectangulum $\xi\epsilon \cdot \epsilon\delta$ aequale est quadrato ab ea recta, quae ex ϵ ducta circulum $\alpha\beta\gamma$ tangit, at vero etiam rectangulum $\alpha\epsilon \cdot \epsilon\beta$ aequale est quadrato ab eadem tangente (elem. 3. 36), est igitur $\alpha\epsilon \cdot \epsilon\beta = \xi\epsilon \cdot \epsilon\delta$; ergo in circuli circumferentia sunt puncta $\alpha \beta \delta \zeta$, itaque $\angle \xi\alpha\epsilon = \angle \beta\delta\epsilon$ quia hi anguli commune supplementum $\beta\delta\zeta$ habent. Sed etiam angulus $\xi\alpha\epsilon$ sive $\xi\alpha\beta$ aequalis est angulo $\alpha\gamma\beta$ in alterno segmento elem. 3. 32; ergo est etiam $\angle \alpha\gamma\beta = \angle \beta\delta\epsilon$. Suntque hi anguli alterni; ergo recta $\alpha\gamma$ ipsi $\delta\epsilon$ parallela est.

In problema decimum septimum.

XI. Sint duo circuli $\alpha\beta\gamma$ $\alpha\delta\epsilon$ in puncto α se tangentes intra. et ducantur ex α rectae $\alpha\delta\beta$ $\alpha\epsilon\gamma$, et iungantur $\delta\epsilon$ $\beta\gamma$; ^{Prop. 106} dico parallelas esse $\delta\epsilon$ $\beta\gamma$.



Ducatur a puncto α recta $\xi\eta$ utrumque circulum tangens; ergo propter elem. 3. 32 est $\angle \xi\alpha\beta = \angle \alpha\gamma\beta = \angle \alpha\epsilon\delta$; est igitur $\delta\epsilon$ parallela rectae $\beta\gamma$.

Sed sit $\delta\epsilon$ parallela rectae $\beta\gamma$; dico circulos $\alpha\beta\gamma$ $\alpha\delta\epsilon$ in puncto α se tangere intra.

*) Propositionem complet Ca p. 78: "ductis nempe per punctum α , duobus circulis $\alpha\beta\gamma$ $\alpha\delta\epsilon$ commune, rectis quibuscunque $\alpha\delta\beta$ $\alpha\epsilon\gamma$, quae ex eadem puncti α parte uni circulo in punctis $\beta \gamma$, alteri vero in punctis $\delta \epsilon$ occurrant, iunctisque rectis $\beta\gamma$ $\delta\epsilon$ ".

Lat. versione 21. $\angle \xi\alpha\beta = \angle \alpha\gamma\beta = \angle \alpha\epsilon\delta$ 22. $\alpha\alpha'$ add. BS
 A. I. E. Co pro $\overline{HE}$ 23. ad $\overline{HEBF}$ A, distinx. BS 30. $\overline{AH}$ —
 $\overline{BF}$ add. Ca

Ducatur enim $\zeta\eta$ circulum $\alpha\beta\gamma$ tangens in puncto α ; ergo est $\angle \zeta\alpha\beta$ sive $\zeta\alpha\delta = \angle \alpha\gamma\beta$. Sed ex hypothesi est $\angle \alpha\gamma\beta = \angle \alpha\epsilon\delta$; ergo etiam $\angle \zeta\alpha\delta = \angle \alpha\epsilon\delta$, itaque recta $\zeta\eta$ circulum $\alpha\delta\epsilon$ tangit in puncto α (id enim supra lemm. VIII demonstratum est); ergo circuli $\alpha\beta\gamma$ $\alpha\delta\epsilon$ in puncto α se tangunt intra.

Problema in idem.

XII. Positione dato circulo $\alpha\beta\gamma$, datisque duobus punctis Prop. $\delta \epsilon$, inflectantur ex his punctis rectae $\delta\beta\alpha$ $\epsilon\gamma\alpha$ ita, ut fiat ¹⁰⁷ recta $\beta\gamma$ parallela ipsi $\delta\epsilon^*$.

Factum iam sit, et a puncto β ducatur tangens $\beta\zeta$. Iam quia tangit $\beta\zeta$ secaturque $\beta\gamma$, propter elem. 3, 32 est

$$\angle \zeta\beta\gamma = \angle \beta\alpha\gamma, \text{ id est propter parallelas } \beta\gamma \delta\epsilon$$

$$\angle \delta\zeta\beta = \angle \beta\alpha\gamma \text{ sive } \beta\alpha\epsilon.$$

Ergo anguli $\beta\alpha\epsilon + \beta\zeta\epsilon$ duobus rectis aequales sunt, itaque puncta $\alpha \beta \zeta \epsilon$ sunt in circuli circumferentia; est igitur $\alpha\delta \cdot \delta\beta = \epsilon\delta \cdot \delta\zeta$. Sed datum est $\alpha\delta \cdot \delta\beta$ (hoc enim propter elem. 3, 36 est aequale quadrato a tangente $\delta\eta^{**}$); ergo etiam $\epsilon\delta \cdot \delta\zeta$ datum est. Et est data $\delta\epsilon$; data igitur etiam $\delta\zeta$ (dat. 57). Sed etiam positione. Et est datum δ ; ergo etiam ζ datum est (dat. 27). Iam a dato puncto ζ ducta est $\zeta\beta$ circulum positione datum tangens in puncto β ; ergo $\zeta\beta$ positione data est (dat. 94). Sed etiam circulus $\alpha\beta\gamma$ positione

*) Id est: punctum α in circuli circumferentia ita sumatur, ut rectae $\delta\alpha$ $\epsilon\alpha$, quae, antequam in α concurrant, circumferentiam in punctis β et γ secuerint, efficiant rectam $\beta\gamma$ parallelam datae $\delta\epsilon$. Conf. adnot. 4 ad p. 884.

**) Perspicuitatis causa rectam $\delta\eta$, quae e puncto δ ducta circulum $\alpha\beta\gamma$ tangit, et in figura addidi et in Latina versione suis notis appellavi, cum Graeco scriptori, qui Apollonii libros manibus teneret, huius problemate XVII innotenti breviter $\tau\eta\ \alpha\pi\omicron\ \tau\eta\varsigma\ \epsilon\gamma\alpha\pi\omicron\mu\epsilon\tau\eta\varsigma$ scribere liceret. Ac profecto idem nobis beneficium contingit Apollonii de tactionibus libros ab Haumanno restitutos p. 93 sq. comparantibus nisi forte sunt qui spreta insigni auctoritate suae socordiae indulgere malint. Datum est autem quadratum a $\delta\eta$ propter dat. 94; atque ex synthesi, quae statim sequitur, apparet, cur Graecus scriptor ad hanc datorum propositionem, non ad 92, provocaverit.

$\pi\omicron\mu\epsilon\tau\eta\varsigma$, $\tau\omicron\upsilon\tau\epsilon\sigma\tau\omicron\upsilon\ \delta\omicron\delta\epsilon\iota\tau\epsilon$ conl. Hu. $\epsilon\gamma\alpha\pi\omicron\mu\epsilon\tau\eta\varsigma$ $\alpha\pi\omicron\ \tau\omicron\upsilon\delta\ \Gamma$ Ca. BZ $\delta\omicron\delta\epsilon\iota\tau\eta\varsigma$ Ge; conf. p. 836. 3, 6 26. $\tau\eta$ et $\delta\epsilon$ del. Hu 28. $\alpha\gamma\alpha$ $\iota\sigma\tau\iota$ A²BS

*datum*¹⁾; ergo etiam β datum est. Sed etiam δ datum est; ergo recta $\beta\delta$ positione data est (dat. 26). Sed etiam circulus $\alpha\beta\gamma$ positione *datum est*; ergo etiam punctum α datum (dat. 25). Sed etiam punctum ε datum est; ergo rectae $\delta\alpha$ $\alpha\varepsilon$ positione datae sunt.

Componetur problema sic. Sit circulus $\alpha\beta\gamma$, et sint data puncta δ ε , et quadrato a tangente $\delta\eta$ aequale ponatur rectangulum $\varepsilon\delta \cdot \delta\zeta$, et a ζ ducatur recta $\zeta\beta$ circulum $\alpha\beta\gamma$ tangens in puncto β , et iungatur $\delta\beta$ producaturque ad α , iunganturque $\alpha\varepsilon$ (circumferentiam secans in γ et $\beta\gamma$; dico rectam $\beta\gamma$ parallelam esse ipsi $\delta\varepsilon$.

Quoniam enim rectangulum $\varepsilon\delta \cdot \delta\zeta$ aequale est quadrato a tangente $\delta\eta$ (ex hypothesi), id est rectangulo $\alpha\delta \cdot \delta\beta$ (elem. 3. 36). in circuli igitur circumferentia sunt puncta α β ζ ε . Est igitur $\angle \delta\alpha\varepsilon = \angle \beta\zeta\delta$ quia hi anguli commune supplementum $\beta\zeta\varepsilon$ habent. Sed quia circulum $\alpha\beta\gamma$ tangit $\zeta\beta$ secatque $\beta\gamma$, propter elem. 3. 32 est $\angle \zeta\beta\gamma = \angle \beta\alpha\gamma$ sive $\delta\alpha\varepsilon$; ergo etiam $\angle \zeta\beta\gamma = \angle \beta\zeta\delta$. Suntque hi anguli alterni; ergo recta $\beta\gamma$ ipsi $\delta\varepsilon$ parallela est.

Problema in Apollonii problema duodevicesimum.

XIII. Circulo $\alpha\beta\gamma$ positione dato, datisque intra hunc ^{Prop. 108} duobus punctis δ ε , ab his rectae $\delta\alpha$ $\varepsilon\alpha$ ita inflectantur, ut eadem in alteram partem productae efficiant rectam $\beta\gamma$ parallelam ipsi $\delta\varepsilon$.

1) Pro Graecis ἡλλὰ καὶ ὁ ΑΗΓ κύκλος θέσται, perinde ac supra in propos. 105 et infra 109 expectamus καὶ ἔστιν δοθὲν τὸ Ζ. Sed eadem ratione scriptor in proximo problemate (propos. 108) ad circulum $\alpha\beta\gamma$ recurrit; respicit igitur demonstrationem, quae in datorum propositione 91 exstat (p. 470, 1 ed. Peyrard). Quamquam non dubium est, quin rectius secundum dat. 91. 27, positione et magnitudine data recta $\zeta\beta$ datoque puncto ζ , datum esse punctum β conclusurus fuerit. Camererus et hic et passim alibi nescio quas discrepantias in datis citandis admisit.

2) Id est: punctum α in circuli circumferentia ita sumatur, ut, si rectae $\alpha\delta$ $\alpha\varepsilon$ ad β et γ , altera puncta sectionis circumferentiae, producantur, recta $\beta\gamma$ parallela sit datae $\delta\varepsilon$. Praeterea conf. Haumann. p. 94 sq.

1) AE Co pro ΑΗΓ 26, τὴν ΑΗ ἀναγκάσιον τῇ ΒΓ ABS, τὴν ΒΓ ἀναγκάσιον τῇ ΑΕ Co, corr. Hu


Γεγονέτω· καὶ ἦχθω ἀπὸ τοῦ B τοῦ $ABΓ$ κύκλου ἐφαπτομένη εὐθεία γραμμὴ ἡ BZ · ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ἐπὶ ZBA γωνία τῇ $Γ$, τουτέστιν τῇ E · ἐν κύκλῳ ἄρα ἐστὶν τὰ $BZ A E$ σημεῖα· τὸ ἄρα ἐπὶ BAA ἴσον ἐστὶν τῷ ἐπὶ ZAE . δοθέν δὲ τὸ ἐπὶ BAA ἀπὸ γὰρ δοθέντος τοῦ A εἰς θέσει δεδομένον κύκλον διήχται ἡ AAB · δοθέν ἄρα καὶ τὸ ἐπὶ ZAE . καὶ ἔστι δοθεῖσα ἡ AE · δοθεῖσα ἄρα καὶ ἡ ZA . καὶ ἔστιν δοθέν τὸ A · δοθέν ἄρα καὶ τὸ Z . ἀπὸ οὖν δεδομένου σημείου τοῦ Z θέσει δεδομένου κύκλου ἐφαπτομένη ἦχται ἡ ZB · θέσει ἄρα ἐστὶν ἡ ZB .¹⁰ θέσει δὲ καὶ ὁ κύκλος· δοθέν ἄρα ἐστὶν καὶ τὸ B σημεῖον. ἀλλὰ καὶ τὸ A δοθέν· θέσει ἄρα ἐστὶν ἡ BA . θέσει δὲ καὶ ὁ κύκλος· δοθέν ἄρα ἐστὶν τὸ A σημεῖον. ἔστιν δὲ καὶ ἑκάτερον τῶν $A E$ δοθέν· δοθεῖσα ἄρα ἐστὶν ἑκατέρα τῶν $AA AE$ τῇ θέσει.¹⁵

- 173 Συντεθήσεται δὴ τὸ πρόβλημα οὕτως. ἔστω ὁ μὲν τῇ θέσει δεδομένος κύκλος ὁ $ABΓ$, τὰ δὲ δοθέντα δύο σημεῖα τὰ $A E$, καὶ διήχθω τυχοῦσα ἡ AAB , καὶ τῷ ἐπὶ AAB ἴσον κείσθω τὸ ἐπὶ EAZ , καὶ ἀπὸ τοῦ Z τοῦ $ABΓ$ κύκλου ἐφαπτομένη ἦχθω ἡ BZ , καὶ ἐπεξεύχθω ἡ $ΓEA$. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ ἐπὶ ZBA γωνία τῇ πρὸς τῷ E (ἐν κύκλῳ γὰρ ἐστὶν τὰ $A Z B E$ σημεῖα), ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπὶ ZBA ἴση ἐστὶν τῇ $Γ$ (ἐφάπτεται γὰρ καὶ τέμνει), καὶ ἡ $Γ$ ἄρα γωνία ἴση ἐστὶν τῇ E · παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ $BΓ$ τῇ AE , διπερ: ~²⁵

2. 3. ἡ ἐπὶ ZBA Hu pro ἡ ἐπὶ $ZB.A$ 4. τὰ $BZ AE A$, distinx. BS 6. τοῦ A εἰς θέσει δεδομένην γωνίαν διήχται ABS, corr. Ca 7. ἔστι A^*BS 8. 9. δοθέν ἄρα — δεδομένου add. Co 10. post κύκλου add. ἄρα S cod. Co 12. ἐστὶν ἡ BA ABS, corr. Co in Lat. versione 14. ἑκατέρα τῶν AE δοθέντων δοθέν ἄρα A^*BS , corr. Co 18. τὰ $AE A$, distinx. BS 19. καὶ ἀπὸ τοῦ Z Hu pro τουτέστιν (nonnulla deesse suspicnhatu Co 21. ἡ ἐπὶ ZBA Hu pro ἡ ἐπὶ $ZB.A$; item vs. 22 πρὸς τῷ E AB cod. Co, ἐπὶ δια S 22. τὰ $AB EZ A$, distinx. BS, corr. Hu 24. post ἄρα add. ἴση S 25. διπερ V, o A, ὁπερ Edei B^S

Πρόβλημα εἰς τὸ ιθ'.

- 171 ιθ'. Θέσει ἄντος τοῦ $\triangle AB\Gamma$ κέκλον, καὶ δύο δοθέντων ἰῶν $\angle E$, κλᾶν ἀπ' αὐτῶν τὴν $\angle A\epsilon$, ὥστε παράλληλον εἶναι τὴν $B\Gamma$ τῇ $\angle E$.



Γεγονέντω· καὶ ἤχθω ἐφαπτομένη ἢ BZ . γίνεται οὖν πάλιν ἐν κέκλῳ τὰ $\angle Z B E$ σημεία, καὶ ἴσον τὸ ἐπὶ $\angle A\angle B$ τῷ ἐπὶ $\angle E\angle Z$. δοθέν δὲ τὸ ἐπὶ $\angle A\angle B$ · δοθέν ἄρα καὶ τὸ ἐπὶ $\angle E\angle Z$. καὶ ἔστιν ὁμοθεῖσα ἢ $\angle E$ · ὁμοθεῖσα ἄρα καὶ ἢ $\angle Z$. ἀλλὰ καὶ τῇ θέσει. καὶ ἔστιν δοθέν τὸ $\angle$ · δοθέν ἄρα καὶ

τὸ Z , ὥστε θέσει ἢ BZ . ἀλλὰ καὶ ὁ κέκλος· δοθέν ἄρα καὶ ἐπὶ τὸ B . ἀλλὰ καὶ τὰ $\angle E$ · ὁμοθεῖσα ἄρα ἔστιν ἑκατέρω τῶν $\angle A \angle B$. ὁμοίως γὰρ τοῖς πρότερον δείξομεν, καὶ ὁμοίως ἢ σίνθεσις ἐπὶ πρὸ αὐτοῦ.

Εἰς τὸ κδ'.

- 175 ιε'. Ἀπτεσθώσαν δύο κέκλοι ἀλλήλων οἱ $\angle B B\Gamma$ κατὰ τὸ B σημεῖον, καὶ εἰλήφθω τὰ κέντρα αὐτῶν τὰ $\angle E$, καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ $\angle \angle B \Gamma E E B$, ἔστω δὲ παράλληλος ἢ $\angle \angle$ τῇ ΓE · ὅτι εὐθείαι εἰσιν αἱ διὰ τῶν $\angle B E$, $\angle B \Gamma$.

Ἦχθω γὰρ τῶν $\angle B B\Gamma$ κέκλων ἐφαπτομένη εὐθεῖα ἢ ZH . ἐπεὶ οὖν ἐφαπτεται μὲν ἢ ZH , ἐκ δὲ τοῦ κέντρου καὶ ἢ $\angle B$, ὁρθή· ἄρα ἔστιν ἢ ἐπὶ τῶν $\angle B Z$ γωνία. διὰ ταῦτα καὶ ἢ ἐπὶ $\angle B E$ γωνία ἔστιν ὁρθή· εὐθεῖα ἄρα ἔστιν

2. ιθ' add. BS θέσει δοθέντος Ca auferre Co καὶ add. Ca
3. τῶν $\angle E$ ABS, distinx. Ca κλᾶν Ca, $\angle \angle$ ut A·BS, ἀπ' αὐτῶν vel ἀπὸ τῶν $\angle E$ Hu, δοθέντων A·BS, ἀπὸ τῶν δοθέντων Ca 7. τὰ $\angle Z B E$ A, distinx. BS 16. ἐπὶ A·BS τὰ $\angle \angle$ A, distinx. BS
20. ιε' add. BS 21. τὰ $\angle E$ A, distinx. BS 22. ἐξ αὐτῆς ἔστω S, $\angle B \angle$ AB 23. τῶν $\angle B \angle A \angle B \angle$ AB, τῶν $\angle \angle$ $\angle \angle$ S, distinx. Hu
24. ἤχθωσαν AB, corr. S 24. 25. εὐθεῖα --- μὲν om. S cod. Co ἢ εὐθεῖα ἢ $\angle \angle$ AB, corr. Ca (nisi quod omisit εὐθεῖα. 26. ἐπὶ τῶν ἢ AB, corr. S 27. ταῦτα Hu pro ταῦτα


Problema in Apollonii problema undevicesimum.

XIV. Circulo $\alpha\beta\gamma$ positione dato, datisque intra hunc ^{Prop. 409} duobus punctis δ ϵ , ab his rectae $\delta\alpha$ $\epsilon\alpha$ ita inflectantur, ut eadem in alteram partem productae efficiant rectam $\beta\gamma$ parallelam ipsi $\delta\epsilon$.*

Factum iam sit, et ducatur (ut supra) tangens $\beta\zeta$. Rursus igitur puncta α ζ β ϵ in circuli circumferentia sunt, estque $\alpha\delta \cdot \delta\beta = \epsilon\delta \cdot \delta\zeta$. Sed datum est $\alpha\delta \cdot \delta\beta$; ergo etiam $\epsilon\delta \cdot \delta\zeta$ datum. Et est data $\delta\epsilon$; ergo etiam $\delta\zeta$ data est magnitudine. Sed eadem etiam positione data est. Et est datum punctum δ ; ergo etiam ζ datum est; itaque recta $\beta\zeta$ positione data est. Sed etiam circulus; ergo etiam punctum β datum est. Sed etiam puncta δ ϵ ; ergo rectae $\delta\alpha$ $\epsilon\alpha$ positione datae sunt. Haec enim similiter ac superiora *propos. 108* demonstrabimus, itemque compositio similis est priori¹.

In problema vicesimum quartum.

XV. Duo circuli $\alpha\beta$ $\beta\gamma$ in puncto β se tangant *extra*. ^{Prop. 410} et sumantur eorum centra δ ϵ



et sumantur eorum centra δ ϵ iunganturque $\alpha\delta$ $\delta\beta$ $\beta\epsilon$ $\epsilon\gamma$, sint autem parallelae $\alpha\delta$ $\epsilon\gamma$; dico rectas lineas esse et eam quae per δ β ϵ et quae per α β γ transit.

Ducatur enim recta $\zeta\eta$ circulos $\alpha\beta$ $\beta\gamma$ tangens in puncto β . Iam quia tangit $\zeta\eta$, et e centro est $\delta\beta$, angulus igitur $\delta\beta\zeta$ rectus est. Eadem de causa etiam angulus $\zeta\beta\epsilon$ rectus est: recta igitur est linea quae per puncta δ β ϵ transit. Sed quo-


* Conf. supra *propos. 408* et Haumann. p. 95 sq.

† Post hoc lemma XIV Haumannus p. 68 inserendum esse putat lemma XXI cum titulo *ελε το π' παρόλημα*, tum lemma XXIII cum titulo *ελε το αὐτό*.

ἡ διὰ τῶν $A B E$. ἐπεὶ δὲ ἴση ἐστὶν ἡ μὲν AA τῇ AB , ἡ δὲ EF τῇ EB , ἐστὶν ὡς ἡ AA πρὸς τὴν AB , οὕτως ἡ EF πρὸς τὴν EB . καὶ περὶ ἴσας γωνίας τὰς $A E$ αἱ πλευραὶ ἀνάλογόν εἰσιν· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ἐπὶ τῶν ABA γωνία τῇ ἐπὶ GBE . καὶ ἐστὶν εὐθεῖα ἡ ABE . εὐθεῖα ἄρα ἐστὶν 5 καὶ ἡ διὰ τῶν $A B \Gamma$, ὅπερ: ~

Εἰς τὸ κέ'.

- 176 ιζ'. Ἰσος οὖσις τῆς μὲν AB τῇ $B\Gamma$, τῆς δὲ AA τῇ AE , καὶ παραλλήλων οὖσης τῆς AE τῇ $B\Gamma$, δεῖξαι ὅτι εὐθεῖα ἐστὶν ἡ διὰ τῶν $A E \Gamma$ σημείων. 10



Ἐπεξεύχθωσαν αἱ AE EF , καὶ τῇ AE παραλλήλος ἤχθω ἡ BZ , καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ EA ἐπὶ τὸ Z . ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ AZ τῇ AB . ἐστὶν 15 δὲ καὶ ἡ AA τῇ AE ἴση· ὅλη ἄρα ἡ AB ὅλη τῇ ZE ἐστὶν ἴση. ἀλλὰ ἡ AB τῇ $B\Gamma$ ἴση ἐστίν· καὶ ἡ BI

ἄρα τῇ ZE ἐστὶν ἴση. ἀλλὰ καὶ παραλλήλος· καὶ ἡ GE 20 ἄρα τῇ BZ . ἀλλὰ καὶ ἡ AE τῇ BZ παραλλήλος ἐστίν· εὐθεῖα ἄρα ἐστὶν ἡ AEI · τοῦτο γὰρ φανερόν.

Ἐπαφῶν δεύτερον.

Εἰς τὸ λα'.

- 177 ιζ'. Ἐὰν ἡ κύκλος ὁ $AB\Gamma$, καὶ δύο προβληθῶσιν αἱ 25 BA $A\Gamma$ ἴσαι οὖσαι, ἡ δὲ BA ἐφάπτεται, ὅτι καὶ ἡ $A\Gamma$ ἐφάπτεται.

Τοῦτο δὲ φανερόν· ἂν γὰρ διαχθῇ ἡ AA , τὸ ὑπὸ AAE ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ AB . ἀλλὰ τὸ ἀπὸ AB τῷ ἀπὸ $A\Gamma$

1. ἡ διὰ — ἴση ἐστὶν bis scripta in S (cum quo consentit A*) τῶν ABE ABS , distinx. Hu 2. γωνίας bis scriptum in A τὰς AE A , distinx. BS 6. τῶν $AB\Gamma$ A , distinx. BS 8. ις' add. V 9. τῆς ZE τῇ BI AB , corr. S 10. τῶν $AB\Gamma$ A , distinx. BS 17. ὅλη om. AB, add. S 20. 21. καὶ παραλλήλος — ἡ AE τῇ BZ om. S, unde magis etiam hunc locum inconcinnis coniecturis pertur-

niam est $\alpha\delta = \delta\beta$, et $\gamma\epsilon = \epsilon\beta$, est igitur $\alpha\delta : \delta\beta = \gamma\epsilon : \epsilon\beta$. Iam propter parallelas $\alpha\delta$ et $\gamma\epsilon$ aequales sunt anguli $\alpha\delta\beta$ $\beta\epsilon\gamma$, quibus cum proportionales rectae adiaceant, in similibus triangulis $\alpha\delta\beta$ $\gamma\epsilon\beta$ anguli $\delta\beta\alpha$ $\epsilon\beta\gamma$ aequales sunt. Et est recta $\delta\beta\epsilon$; ergo etiam recta est quae per α β γ transit¹⁾, q. e. d.

In problema vicesimum quintum.


XVI. Si sit $\alpha\beta = \beta\gamma$, et $\alpha\delta = \delta\epsilon$, et $\delta\epsilon \parallel \beta\gamma$, demon-
stretur rectam esse quae per puncta α ϵ γ transit. Prop. 411

Iungantur $\alpha\epsilon$ $\epsilon\gamma$, et rectae $\alpha\epsilon$ parallela ducatur $\zeta\beta$, et producat $\delta\delta$ ad ζ : est igitur $\delta\zeta = \delta\beta$ (quia $\delta\alpha : \delta\epsilon = \delta\beta : \delta\zeta$, et $\delta\alpha = \delta\epsilon$). Sed ex hypothesi est $\alpha\delta = \delta\epsilon$; ergo tota $\alpha\beta$ toti $\zeta\epsilon$ aequalis est. Sed ex hypothesi est $\alpha\beta = \beta\gamma$; ergo etiam $\beta\gamma = \zeta\epsilon$. Verum ex constructione est $\beta\gamma \parallel \zeta\epsilon$; ergo etiam $\gamma\epsilon \parallel \beta\zeta$ (elem. 1, 33). Sed est etiam $\alpha\epsilon \parallel \beta\zeta$; ergo rectam esse $\alpha\epsilon\gamma$ apparet²⁾.

LEMMATA IN TACTIONUM LIBRUM SECUNDUM.

In problema tricesimum primum.

XVII. Si sit circulus $\alpha\beta\gamma$, et e puncto δ ducantur duae
rectae $\delta\beta$ $\delta\gamma$ inter se aequales, et $\delta\beta$ circumulum tangat, dico
etiam $\delta\gamma$ circumulum tangere. Prop. 412




Hoc vero perspicuum est; etenim si recta $\delta\epsilon\alpha$, circumferentiam in ϵ et α secans, ducatur, est $\alpha\delta \cdot \delta\epsilon = \delta\beta^2$ (elem. 5. 56). Sed, quia ex hypothesi est $\delta\beta =$

1) Hoc loco scriptor aut elem. libri I propositionem 45 conversam tacite significavit, aut sic argumentatus est: est $\angle \delta\beta\alpha = \angle \epsilon\beta\gamma$, ideoque anguli $\gamma\beta\epsilon$ + $\delta\beta\alpha$ uni recto, sive $\gamma\beta\delta$ + $\delta\beta\alpha$ duobus rectis aequales sunt; ergo propter elem. 1, 14 recta est $\gamma\beta\alpha$.

2) Elem. 1, 29 et 14 citat Ca p. 97; complet demonstrationem Co sic fere: anguli $\beta\gamma\epsilon$ + $\delta\epsilon\gamma$ duos rectos efficiunt, estque $\angle \beta\gamma\epsilon = \angle \beta\zeta\gamma$; sed ob triangulorum similitudinem etiam $\angle \beta\zeta\gamma = \angle \alpha\epsilon\delta$; ergo anguli $\alpha\epsilon\delta$ + $\delta\epsilon\gamma$ duos rectos efficiunt etc.

ἴσον ἐστίν· καὶ τὸ ἐπὶ τῶν $ΑΒΕ$ ἄρα ἴσον ἐστὶν τῇ ἀπὸ $ΑΓ$ · ἐφάπτεται ἄρα ἡ $ΑΓ$ τοῦ $ΑΒΓ$ κύκλου.

- 178 $α'$. Δύο κύκλοι οἱ $ΑΒ ΒΓ$, καὶ διὰ τοῦ $Β$ διήχθω τὴς ἡ $ΑΒΓ$, καὶ δύο παράλληλοι αἱ $ΑΔ ΕΓ$ νεύουσαι ἐπὶ τὰ κέντρα τῶν κύκλων· ὅτι οἱ $ΑΒ ΒΓ$ κύκλοι ἐφάπτονται ἑ ἀλλήλων κατὰ τὸ $Β$ σημεῖον.



Εἰλήφθω τὰ κέντρα τῶν κύκλων τὰ $Α Ε$, καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ $ΑΒ ΒΕ$ · εὐθεῖα ἄρα ἐστὶν ἡ διὰ τῶν $Α Β Ε$ · παράλληλος γάρ ἐστιν ἡ $ΑΔ$ τῇ $ΕΓ$. καὶ ἔστιν ὡς ἡ $ΑΔ$ πρὸς $ΑΒ$, οὕτως ἡ $ΕΓ$ πρὸς $ΕΒ$, καὶ γίνεται δύο τρίγωνα μίαν γωνίαν μὴ γωνία ἴσην ἔχοντα τὴν $Α$ τῇ $Γ$, περὶ δὲ ἄλλας γωνίας τὰς $Δ Ε$ τὰς πλεονάζουσας ἀνάλογον· ἰσογώνια ἄρα ἐστὶν τὰ τρίγωνα· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ἐπὶ $ΑΒΑ$ γωνία τῇ ἐπὶ $ΓΒΕ$. καὶ ἔστιν εὐθεῖα ἡ $ΑΒΓ$ · εὐθεῖα ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ $ΒΕ$. ἐπεὶ δὲ εὐθεῖά ἐστιν ἡ διὰ τῶν κέντρων καὶ τῆς ἀφῆς,

ἐφάπτονται ἄρα οἱ $ΑΒ ΒΓ$ κύκλοι ἀλλήλων κατὰ τὸ $Β$ σημείον.

Εἰς τὸ $α'$.

- 179 $ω'$. Ἐστω ἡ μὲν $ΑΒ$ τῇ $ΓΔ$ παράλληλος, ἴση δὲ ἡ $ΑΓ$ τῇ $ΒΔ$, οὗσης ἀμβλείας μὲν τῆς ἐπὶ τῶν $ΑΓΔ$, ὀξείας δὲ τῆς ἐπὶ $ΒΑΓ$ · ὅτι παραλληλόγραμμον ἐστὶν τὸ $ΑΔ$.

Ἐπεὶ γὰρ ἀμβλεία μὲν ἐστὶν ἡ ἐπὶ $ΑΓΔ$, ὀξεία δὲ ἡ ἐπὶ $ΒΑΓ$, αἱ ἀπὸ τῶν $Α Β$ ἐπὶ τὴν $ΓΔ$ καθετοὶ ἀγόμεναι ἡ μὲν ἀπὸ τοῦ $Α$ ἐκτὸς τοῦ $Γ$, ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ $Β$ ἐντὸς τοῦ $Δ$ πίπτουσιν·

3. $α'$ add. BS 8. τὰ $ΑΒ$ A, distinct. BS 9. 10. τῶν $ΑΒΕ$ ABS, distinct. Ca p. 98 10. γὰρ Co pro ἄρα 11. 12. ἡ $ΑΔ$ πρὸς $ΑΒ$ ABS, corr. Co 13. τὰς $ΑΓ$ A, distinct. BS 25. 19' add. BS
 ἡ ante $ΑΓ$ om. AB, add. S 29. τῶν $ΑΒ$ A, distinct. BS 30. πίπτουσιν Hu auclore Co pro πίπτουσιν


$\delta\gamma$, est igitur $\delta\gamma^2 = \delta\beta^2 = \alpha\delta \cdot \delta\epsilon$. Ergo $\delta\gamma$ circulum $\alpha\beta\gamma$ tangit (elem. 5, 37).

XVIII. Sint duo circuli $\alpha\beta\gamma$, et per punctum β quae-
libet recta $\alpha\beta\gamma$ a circumferentiâ circuli $\alpha\beta$ ad circumferentiâ
alterius ducatur, et ducantur parallelæ $\alpha\delta$ $\epsilon\gamma$ ad centra cir-
culorum vergentes¹; dico circulos $\alpha\beta$ $\beta\gamma$ in puncto β se
tangere. Prop. 113

Sumantur circulorum centra δ ϵ , et iungantur $\delta\beta$ $\beta\epsilon$;
recta igitur est quae per δ β ϵ transit. Etenim ex hypothesi
 $\alpha\delta$ $\epsilon\gamma$ parallelæ sunt, estque $\alpha\delta : \delta\beta = \gamma\epsilon : \epsilon\beta$, et fiunt duo
triangula angulos $\delta\alpha\beta$ et $\epsilon\gamma\beta$ aequales habentia, quorum circa
alteros angulos $\alpha\delta\beta$ et $\gamma\epsilon\beta$ latera proportionalia sunt; aequi-
angula igitur sunt triangula; ergo angulus $\alpha\beta\delta$ angulo $\gamma\beta\epsilon$
aequalis est. Et est recta $\alpha\beta\gamma$; ergo etiam $\delta\beta\epsilon$ recta est².
Sed quoniam recta est quae per centra et punctum concursus
transit, circuli igitur $\alpha\beta$ $\beta\gamma$ in puncto β se tangunt.

In problema quinquagesimum secundum.

XIX³⁾. Sint parallelæ $\alpha\beta$ $\gamma\delta$, et aequales $\alpha\gamma$ $\beta\delta$, sitque Prop.
angulus $\alpha\gamma\delta$ obtusus et $\beta\delta\gamma$ acutus; dico parallelogrammum 114
esse $\alpha\beta\delta\gamma$.



Quoniam enim angulus $\alpha\gamma\delta$ obtusus et $\beta\delta\gamma$ acutus est, perpendicularis ab α ad $\gamma\delta$ ducta extra punctum γ , itemque perpendicularis ex β intra


1) Ipsa hypothesis, nec minus quae sequitur demonstratio nonnulla habet, quibus iure offendas. Nam unum punctum β utrique circulo commune esse tacite supponitur, quod nisi esset, aut non parallelæ essent $\alpha\delta$ $\epsilon\gamma$, aut alterutrum punctorum δ ϵ non esset centrum; at si unum punctum β circulis commune esse sumitur, eosdem se tangere demonstratur in elem. 3, 12. Ergo hoc lemma integrum servatum esse negaverim.

2) Conf. supra p. 843 adnot. 1.

3) Lemmata XIX XX XXII ab interpolatore addita esse suspicatur Haumannus p. 69.

καὶ ἔστωσαν αἱ AE BZ · παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ AE τῇ BZ · ἐστὶν δὲ καὶ ἡ AB τῇ $ΓΔ$ παράλληλος· καὶ εἰσὶν ὁρθαὶ αἱ πρὸς τοῖς E Z σημείοις γωνίαι· ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ $ZΔ$ τῇ $ΕΓ$, ὥστε καὶ ὕλη ἡ EZ τῇ $ΓΔ$ ἐστὶν ἴση· καὶ ἡ AB ἄρα τῇ $ΓΔ$ ἐστὶν ἴση.

180 κ'. Λέο ἴσοι κύκλοι οἱ AB $ΓΔ$, καὶ διὰ τῶν κέντρων ἡ $ΑΔ$, καὶ τῇ $ΓΔ$ παράλληλος ἡ EZ · λέγω ὅτι ἐκβληθεῖσα τέμνει καὶ τὸν AB κύκλον.



Εἰλήφθω τὰ κέντρα τῶν κύκλων τὰ H Θ , καὶ ἀπὸ τῶν H Θ σημείων τῇ $ΑΔ$ ὁρθαὶ ἤχθωσαν αἱ HK ΘA , καὶ ἐπέξωθω ἡ $K\Lambda$ · ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ HK τῇ ΘA , ἀλλὰ καὶ παρ-

άλληλος· καὶ ἡ $K\Lambda$ ἄρα τῇ $H\Theta$ ἴση ἐστὶν καὶ παράλληλος, ὥστε ὁρθαὶ εἰσὶν αἱ πρὸς τοῖς K A γωνίαι, καὶ εἰσὶν ἐκ τῶν κέντρων αἱ HK ΘA · ἡ $K\Lambda$ ἄρα ἐγράφεται τῶν κύκλων· φανερὸν οὖν ὅτι ἡ τοῦ $ΓΔ$ ἐφαπτομένη καὶ τοῦ AB ἐγράφεται· ἡ ἄρα τὸν $ΓΔ$ τέμνουσα ἡ EZ καὶ τὸν AB τέμνει ἐκβληθεῖσα (ἐπεὶ καὶ μεταξὺ τῶν B A ἔσται, ὥς ἡ EZ τῶν $Γ$ K ἐστὶν μεταξὺ).

181 κα'. Ἐστω ἴση ἡ μὲν $ΑΔ$ τῇ $ΑΕ$, μείζων δὲ ἡ $BΔ$ τῇς $ΓΕ$, καὶ ἐπέξωθω ἡ $ΑΕ$ · ὅτι ἐκβληθεῖσα ἡ $ΑΕ$ συμπίπτει τῇ $ΒΓ$.


Κείσθω τῇ $ΓΕ$ ἴση ἡ $ΑΖ$, καὶ ἐπέξωθω ἡ $ΓΖ$ · παράλ-

3. αἱ om. AB, add. S τοῖς EZ A, distinx. BS 4. καὶ ἡ $ZΔ$ A'S Co, καὶ ἡ $βδ$ B cod. Co τῇ $ΑΓ$ ὥστε AB cod. Co, corr. S Co ὅλη ante τῇ $ΓΔ$ ἐστὶν add. V 6. κ' add. BS οἱ AB $ΒΓ$ AB, οἱ $αβ$ $δγ$ S, corr. Hu 40—12. τὰ $ΗΘ$ — τῶν $ΗΘ$ A, distinx. BS 44. HK ΘA add. Co 44. 45. καὶ ἐπέξωθω ἡ $K\Lambda$ add. Co 45. 16. ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ add. Co 18. ἄρα add. Co 19. τοῖς $K\Lambda$ A, distinx. BS 21. ἡ τοῦ $ΓΕ$ AB cod. Co, ἡ τοῦ $δγ$ S, corr. Co ἐφαπτομένη B'S, ἐγράφεται A cod. Co 24. 25. καὶ τοῦ AB ἐγράφεται bis scripta sunt in A, unde ἐγράφεται καὶ τοῦ $αβ$ ἐγράφεται B,

punctum δ cadit; sintque eae perpendiculares $\alpha\epsilon$ $\beta\zeta$. Est igitur $\alpha\epsilon \parallel \beta\zeta$; sed ex hypothesis etiam $\alpha\beta \parallel \gamma\delta$; ergo parallelogrammum est $\alpha\beta\zeta\epsilon$, ideoque $\alpha\epsilon = \beta\zeta$; sed ex hypothesis etiam $\alpha\gamma = \beta\delta$, et anguli $\epsilon\zeta$ recti sunt; ergo est $\epsilon\gamma = \zeta\delta$ *, itaque etiam $\epsilon\gamma + \gamma\zeta = \gamma\zeta + \zeta\delta$, id est $\epsilon\zeta = \gamma\delta$. Ergo etiam $\alpha\beta$, quae in parallelogrammo $\alpha\beta\zeta\epsilon$ rectae $\epsilon\zeta$ aequalis est, rectae $\gamma\delta$ est aequalis, itaque parallelogrammum est $\alpha\beta\delta\gamma$ (elem. 1, 33).

XX. Sint duo aequales circuli $\alpha\beta$ $\gamma\delta$, et per centra ducatur recta $\alpha\delta$ circumferentiam secans in punctis α β γ δ , et ducatur in circulo $\gamma\delta$ parallela diametro $\gamma\delta$ recta $\epsilon\zeta$; dico hanc productam circum $\alpha\beta$ secare. Prop. 115

Sumantur circulorum centra η θ , et ab his ducantur $\eta\kappa$ $\theta\lambda$ perpendiculares rectae $\alpha\delta$, et iungatur $\kappa\lambda$. Sunt igitur aequales $\eta\kappa$ $\theta\lambda$; sed eadem etiam parallelae; itaque anguli $\kappa\lambda$ recti sunt. Et ex centris ductae sunt $\eta\kappa$ $\theta\lambda$; ergo $\kappa\lambda$ utrumque circum tangit. Iam apparet rectam hac ratione ductam, si circum $\gamma\delta$ tangit, eandem etiam circum $\alpha\beta$ tangere; ergo recta $\epsilon\zeta$ circum $\gamma\delta$ secans, si producat, etiam circum $\alpha\beta$ secat (etenim inter puncta β λ perinde erit atque $\epsilon\zeta$ inter puncta γ κ est).



etiam circum $\alpha\beta$ secat (etenim inter puncta β λ perinde erit atque $\epsilon\zeta$ inter puncta γ κ est).

XXI. Sit $\delta\alpha = \alpha\epsilon$, et $\beta\delta > \gamma\epsilon$, et iungatur $\delta\epsilon$; dico rectam $\delta\epsilon$ productam occurrere rectae $\beta\gamma$ productae. Prop. 116

Ponatur $\delta\zeta = \epsilon\gamma$, et iungatur $\gamma\zeta$; haec igitur rectae $\delta\epsilon$ parallela est, eademque


* Non quantum, quod nunc dicunt, congruentiae theorema, sed elem. 4 propos. 47 scriptor adhibuisse videtur, ex quo efficitur esse $\epsilon\gamma^2 = \zeta\delta^2$ etc.

ἡγάνηται καὶ τοῦ $\alpha\beta$ S 23. 24. ἐπεὶ καὶ — ἐστὶν μεταξὺ interpolata esse videntur (deletur ab Haumanno p. 53); 23. ἐπεὶ ἡ pro δὲ 23. 24. τῶν B, A — τῶν Γ, K A, distinx. BS 24. post μεταξὺ add. ἡ BZ μετὰ τῶν ABS, del. Co 25. lemma κα' post superius lemma id' reponendum esse putat Haumann. p. 68 κα' add. BS

ληλος ἄρα ἐστὶν τῇ AE , καὶ συμπέπτει τῇ BI · καὶ ἡ AE
ἄρα συμπέπτει τῇ BF .

Πρόβλημα εἰς τὸ αὐτό.

- 182 $\kappa\beta$. Θέσει ὄντος κύκλου τοῦ $AB\Gamma$, καὶ τριῶν δοθέν-
των σημείων τῶν $A B Z$ ἐπ' εὐθείας, κλᾶν τὴν AAE καὶ ὁ-
ποιεῖν ἐπ' εὐθείας τὴν BI τῇ $I'Z$.



Γεγονέντω· καὶ διὰ τοῦ B
τῇ AZ παράλληλος ἦχθω ἡ
 BH , καὶ ἐπεξέχθω ἡ HI'
καὶ ἐκτελλήσθω ἐπὶ τὸ Θ · ἴσθι, 10
ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ BHI' γωνία,
τοντέστιν ἡ A , τῇ ἐπὶ $I\Theta Z$
γωνίᾳ· τὸ ἄρα ὑπὸ $AB\Gamma$ ἴσον
ἐστὶν τῷ ὑπὸ $AE\Theta$. δοθέν
δὲ τὸ ὑπὸ $AB\Gamma$ (ἴσον γὰρ τῷ 15
ἀπὸ τῆς ἀπὸ τοῦ E ἐφαπτο-
μένης· δοθέν ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ
τῶν $AE\Theta$, καὶ ἐστὶν δοθεῖσαι

ἡ AE · δοθεῖσα ἄρα καὶ ἡ $E\Theta$. ἀλλὰ καὶ τῇ θέσει· καὶ
ἐστὶν δοθέν τὸ E · δοθέν ἄρα καὶ τὸ Θ . ἐστὶν δὲ καὶ 20
τὸ Z δοθέν· γέγονεν δὴ μοι ἀπὸ δύο δοθέντων τῶν ΘZ
κλᾶν τὴν $BI'Z$ καὶ ποιεῖν παράλληλον τὴν BH τῇ ΘEZ ·
τοῦτο δὲ προγράφεται. δοθέν ἄρα τὸ Γ . ἀλλὰ καὶ τὸ E
δοθέν· θέσει ἄρα ἡ ΓE . ἀλλὰ καὶ ὁ κύκλος δοθείς· δο-
θέν ἄρα τὸ A . ἐστὶν δὲ καὶ τὸ I δοθέν· θέσει ἄρα καὶ 25
ἡ AA , ὅπερ· ~

- 183 Συντεθήσεται δὴ τὸ πρόβλημα οὕτως. ἔστω ὁ μὲν
κύκλος ὁ $AB\Gamma$, τὰ δὲ δοθέντα ἐπ' εὐθείας τρία σημεία

4. $\kappa\beta$ add. BS δοθέντος Ca [at conf. supra p. 834, 8. 840, 2.
καὶ add. Co 5. τῶν $I'EZ A$, distinct. BS κλᾶν Ca (κλᾶσαι Co,
pro κλᾶν δοθεῖσαν 9. 10. ἐπιτελλήσθω ἡ HI' ἐκτελλήσθω Hu
10. καὶ add. Co 12. 13. post $I\Theta Z$ γωνία add. Co ἐν κύκλῳ ἄρα ἐστὶ
τὰ $AB\Gamma$ (sic) σημεία 19. ἄρα καὶ ἡ $Z\Theta$ ABS, corr. Co in Lat.
versione 22. κλᾶν Ca (κλᾶσαι Co) pro AA ἂν τὴν $\Theta I'Z$ add.
Co τῇ ΘKZ ABS, τῇ ΘZ Ca, corr. Co 28. ὁ $AB\Gamma A$ AB, corr. S

cum recta $\beta\gamma$ concurrat; ergo etiam $\delta\epsilon$ producta rectae $\beta\gamma$ productae occurrat¹⁾.

Problema in Idem Apollonii problema²⁾.

XXII. Circulo $\alpha\beta\gamma$ positione dato, tribusque in eadem Prop. 117
recta datis punctis δ & ζ , a punctis δ & rectae $\delta\alpha$ & α , circumferentiam in punctis β & γ secantes, ita inflectantur, ut recta sit quae per β & γ transit.

Factum iam sit, et per β rectae $\delta\zeta$ parallela ducatur $\beta\eta$, et iuncta $\eta\gamma$ producat ad ϑ punctum sectionis rectae $\delta\zeta$; angulus igitur $\beta\eta\gamma$, sive (quia in eodem segmento est) $\beta\alpha\gamma$, aequalis est angulo $\gamma\vartheta\zeta$. Sed anguli $\gamma\vartheta\zeta + \gamma\vartheta\delta$ duobus rectis aequales sunt; ergo item anguli $\beta\alpha\gamma$ (sive $\delta\alpha\gamma$) + $\gamma\vartheta\delta$; in circuli igitur circumferentia sunt puncta α & γ & ϑ , itaque est $\alpha\epsilon \cdot \epsilon\gamma = \delta\epsilon \cdot \epsilon\vartheta$. Datum autem est $\alpha\epsilon \cdot \epsilon\gamma$ (aequale enim est quadrato ab ea recta, quae ex ϵ ducta circumulum $\alpha\beta\gamma$ tangit³⁾); ergo etiam $\delta\epsilon \cdot \epsilon\vartheta$ datum est. Et est data $\delta\epsilon$; ergo etiam $\epsilon\vartheta$ magnitudine data (dat. 57). Sed eadem etiam positione; et est datum ϵ ; ergo etiam ϑ datum (dat. 27). Sed etiam ζ datum est; problema igitur eo reductum est, ut a duobus datis punctis ϑ & ζ inflectantur rectae $\vartheta\gamma$ & $\zeta\gamma$, fiatque $\beta\eta$ parallela rectae $\vartheta\epsilon$; hoc autem supra (lemm. X) demonstratum est. Datum igitur est γ . Sed etiam ϵ datum; ergo etiam $\gamma\epsilon$ positione data est (dat. 26). Sed etiam circulus positione datus; ergo etiam α datum (dat. 25). Sed etiam δ datum, ergo etiam $\delta\alpha$ positione data est, q. e. d.

Componetur problema sic. Sit circulus $\alpha\beta\gamma$, et data in eadem recta tria puncta δ & ζ , et quadrato ab ea recta, quae

1) Procll commentarium in elem. 1, 29 (p. 372 ed. Friedlein. citat Co, ipsorum elementorum libri I propos. 17 et 29 et axioma 11 Ca.

2) Hoc lemma ab interpolatore additum esse suspicatur Haumanus p. 69.

3) Quadratum ab ea quae supra dicitur tangente datum est propter Euclid. dat. 91; ceterum quae causa sit, cur scriptor illius potius quadrati mentione omissa non ad dat. 92 provocaverit, significavimus p. 835 adnot. ** extr.

ex ε ducta circum $\alpha\beta\gamma$ tangit, aequale ponatur rectangulum $\delta\varepsilon \cdot \varepsilon\theta$, et datis duobus punctis θ ξ , ab his ad circuli circumferentiam rectae $\theta\gamma$ $\xi\gamma$ ita inflectantur, ut $\beta\eta$ parallela sit rectae $\theta\xi$ (lemm. X), et iungatur $\varepsilon\gamma$ producatique ad α alterum punctum sectionis circumferentiae; dico rectam esse quae per puncta α β δ transit.

Quoniam enim et rectangulum $\alpha\varepsilon \cdot \varepsilon\gamma$ et (ex constructione) rectangulum $\delta\varepsilon \cdot \varepsilon\theta$ aequale est quadrato ab ea recta, quae ex ε ducta circum $\alpha\beta\gamma$ tangit, est igitur $\alpha\varepsilon \cdot \varepsilon\gamma = \delta\varepsilon \cdot \varepsilon\theta$; ergo in circuli circumferentia sunt puncta δ θ γ α . Et quia propter parallelas $\beta\eta$ $\theta\xi$ angulus $\beta\eta\gamma$ angulo $\gamma\theta\xi$, atque, ut in eodem circuli segmento, angulus $\beta\eta\gamma$ angulo $\beta\alpha\gamma$ aequalis est, angulus igitur $\beta\alpha\gamma$ est aequalis angulo $\gamma\theta\xi$; itaque anguli $\beta\alpha\gamma + \gamma\theta\delta$ duos rectos efficiunt quoniam propter rectum $\delta\theta\xi$ item anguli $\gamma\theta\xi + \gamma\theta\delta$. Et, quia puncta α γ θ δ in circuli circumferentia sunt, item anguli $\delta\alpha\gamma + \gamma\theta\delta$ duos rectos efficiunt; ergo angulus $\beta\alpha\gamma$ angulo $\delta\alpha\gamma$ aequalis est. itaque $\alpha\beta$ in eadem recta est ac $\beta\delta$ *, q. e. d.

Casus problematis non mutantur; etenim ad casus septimidecimi reducuntur.

XXIII. Sint duo circuli $\alpha\beta$ $\gamma\delta$, et producat $\alpha\delta$, fiat Prop. 118
que, ut $\varepsilon\eta$ ad $\eta\xi$, ita radius circuli $\alpha\beta$ ad radium circuli $\gamma\delta$; dico, si recta quaelibet ab η ducta circum $\gamma\delta$ secet, eandem productam circum $\alpha\beta$ secare¹⁾.

*) Rectius, puto, scriptor $\alpha\beta$ et $\alpha\delta$ in eadem recta esse dixisset. Apparet autem demonstrationem apagogicam cogitatione supplendam esse. Nam si $\alpha\beta$ non congrueret cum $\alpha\delta$, angulus $\beta\alpha\gamma$ aut maior aut minor esset quam $\delta\alpha\gamma$ etc.

1) Multa in hoc lemmate vitiosa esse eiusque propositionem sic re-stituendam esse censet Ca p. 110: "Dati sint duo circuli $\alpha\beta$ $\gamma\delta$ non ex eodem centro descripti, sintque centra eorum ε ζ iungaturque recta $\varepsilon\zeta$; dico sumi posse in ipsa recta $\varepsilon\zeta$, et, si circuli sint inaequales, maior nempe circulus $\alpha\beta$, minor vero circulus $\gamma\delta$, sumi posse praeterea in recta $\varepsilon\zeta$ ultra ζ producta punctum η tale, ut sit $\varepsilon\eta$ ad $\eta\zeta$ in eadem ratione ac radius circuli $\alpha\beta$ ad radium circuli $\gamma\delta$, ductaque ex puncto η recta quacunque, quae secet alterutrum circulorum, v. g. circum $\gamma\delta$, dico eandem productam secare etiam alterum circum $\alpha\beta$ ".

una cum $\alpha\alpha'$ post superius lemma $\alpha\delta$ reponendum esse putat Haumann. p. 68 $\alpha\gamma'$ add. BS $\varepsilon\alpha\omega$ A, corr. BS 12. $\eta\phi\delta$ $\tau\eta\eta$ HJ ABS, corr. Co

Εὐλήφθω γὰρ τὰ κέντρα τῶν κύκλων τὰ $E Z$ σημεία, καὶ ἀπὸ τοῦ H τοῦ ΓA κύκλου ἐφαπτομένη ἦχθω ἡ $H\Theta$, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ $Z\Theta$, καὶ τῇ $Z\Theta$ παράλληλος ἦχθω ἡ $E\kappa$. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ἡ EH πρὸς τὴν HZ , οὕτως ἡ $E\kappa$ πρὸς τὴν $Z\Theta$, εὐθεία ἄρα ἐστὶν ἡ διὰ τῶν $H \Theta K$, καὶ ἐστὶν ὁρθὴ ἡ Θ γωνία· ὁρθὴ ἄρα καὶ ἡ K γωνία, ὥστε, εἰ τοῦ ΓA ἐφάπτεται ἡ ἀπὸ τοῦ H , ἐκκληθεῖσα καὶ τοῦ AB ἐράψεται. ἀλλὰ αἱ τέμνουσαι τὸν ΓA μεταξὺ τῶν $A \Theta$ εἰσὶν· ἐκβαλλόμεναι ἄρα μεταξὺ τῶν $K B$ ἔσονται. καὶ ἐστὶν ἐφαπτομένη ἡ $H\kappa$ · τέμνει ἄρα ἡ μεταξὺ τῶν $B K$, ¹⁰ $A \Theta$. ἀλλὰ ἡ αὐτὴ καὶ τὸν ΓA τέμνει· ἡ ἄρα τὸν ΓA τέμνουσα καὶ τὸν AB τέμνει ἀγομένη ἀπὸ τοῦ H σημείου.

Τὸ πρῶτον τῶν ἐπαφῶν ἔχει προβλήματα ἑπτὰ, τὸ δεῦτερον προβλήματα δ'.

Ἐπιπέδων τόπων α' β'.

15

Εἰς τὸν τοῦ δευτέρου πρῶτον τόπον.

185 α'. Τρίγωνον τὸ $AB\Gamma$, καὶ διήχθω [τεχοῦσα] ἡ AA , καὶ ἔστω ὡς ἡ BA πρὸς τὴν $A\Gamma$ οὕτως τὸ ἀπὸ BA πρὸς τὸ ἀπὸ $A\Gamma$ · ὅτι γίνεται ἴσον τὸ ὑπὸ τῶν $BA\Gamma$ τῷ ἀπὸ AA .

20

Ἦχθω διὰ τοῦ Γ τῇ AB παράλληλος ἡ ΓE · ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ BA πρὸς τὴν $A\Gamma$, οὕτως ἡ AB πρὸς τὴν ΓE , καὶ τὸ ἀπὸ AB πρὸς τὸ ἐπὶ $AB \Gamma E$. ὡς δὲ ἡ BA πρὸς τὴν $A\Gamma$, οὕτως ἦν τὸ ἀπὸ BA πρὸς τὸ ἀπὸ $A\Gamma$ · ἴσον ἄρα ἐστὶν τὸ ἐπὶ $BA \Gamma E$ τῷ ἀπὸ ΓA · ἀνάλογον ἄρα αἱ ²⁵

1. τὰ EZ A, distinct. BS 2. ἦχθω ἡ HZ A¹, 6* super Z corr. A² 3. καὶ τῇ $Z\Theta$ add. Hu 5. 6. τῶν $H\Theta K$ καὶ ἐστὶν ὁρθὴ $H\Theta$ A, distinct. BS 8. ἀλλὰ αἱ Hu pro ἀλλὰ καὶ 8. 9. τῶν AA — τῶν $KB A$, distinct. BS 10. 11. τῶν $BK Z\Theta$ A, distinct. BS, corr. Co 14. καὶ τὸν ΓA Hu pro καὶ τὸν AB 13. 14. conf. supra p. 648, 14. 15. ἐπιπέδ. τοῦ $\alpha \beta$ A, α' om. BS 17. α' add. BS τεχοῦσα anectore Simson (Apollon. loc. plan. p. 120) del. Hu 25. ἄρα αἱ Hu pro ἄρα καὶ

περι ἴσας γωνίας τὰς ἐναλλὰξ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ $\Gamma\Delta\Delta$ τῇ B , ὥστε ἴσον ἐστὶν τὸ ὑπὸ $B\Delta\Gamma$ τῷ ἀπὸ $\Delta\Delta$.

Τὸ δὲ ἀναστρεφόμενον φανερόν.

Εἰς τὸν δεύτερον τόπον.

- 186 β'. Τρίγωνον τὸ $\Delta B\Gamma$, καὶ κάθετος ἡ $\Delta\Delta$. ὅτι μὲν ἡ τῶν ἀπὸ $B\Delta\ \Delta\Gamma$ ὑπεροχὴ ἴση ἐστὶ τῇ τῶν ἀπὸ $B\Delta\ \Delta\Gamma$ ὑπεροχῇ· ἐὰν δὲ ἡ $B\Gamma$ διχα τμηθῇ κατὰ τὸ E , ἡ τῶν ἀπὸ $B\Delta\ \Delta\Gamma$ ὑπεροχὴ ἐστὶν τὸ δις ὑπὸ $B\Gamma\ E\Delta$.
- Ὅτι μὲν οὖν ἡ τῶν ἀπὸ $B\Delta\ \Delta\Gamma$ ὑπεροχὴ ἴση ἐστὶν τῇ τῶν ἀπὸ $\Delta B\ \Delta\Gamma$ ὑπεροχῇ, φανερόν· ἐστὶν γὰρ τὸ μὲν ¹⁰ ἀπὸ ΔB ἴσον τοῖς ἀπὸ τῶν $B\Delta\ \Delta\Delta$, τὸ δὲ ἀπὸ $\Delta\Gamma$ τοῖς ἀπὸ τῶν $\Delta\Delta\ \Delta\Gamma$. ὅ ἄρα ὑπερέχει τὸ ἀπὸ ΔB τοῦ ἀπὸ $\Delta\Gamma$, τοῦτω ὑπερέχει τὰ ἀπὸ $\Delta\Delta\ \Delta B$ τῶν ἀπὸ $\Delta\Delta\ \Delta\Gamma$. ἀφρηήσθω τὸ ἀπὸ $\Delta\Delta$, λοιπὸν ἄρα ὅ ὑπερέχει τὸ ἀπὸ $B\Delta$ τοῦ ἀπὸ $\Delta\Gamma$, τοῦτω ὑπερέχει τὸ ἀπὸ ΔB τοῦ ἀπὸ $\Delta\Gamma$. ¹⁵ ὅτι καὶ ἡ τῶν ἀπὸ $B\Delta\ \Delta\Gamma$ ὑπεροχὴ ἐστὶν τὸ δις ὑπὸ τῶν $B\Gamma\ E\Delta$, οὕτως· ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ $B\Gamma$ τῇ $E\Gamma$, ἡ $B\Delta$ ἄρα ἴση ἐστὶν συναμφοτέρῳ τῇ $E\Delta$ · καὶ τὸ ἀπὸ $B\Delta$ ἄρα ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς $E\Delta$. ἀλλὰ τὸ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς $E\Delta$ τοῦ ἀπὸ $\Gamma\Delta$ ὑπερέχει τῷ τετρακτῖς ²⁰ ὑπὸ $E\Delta$, τουτέστιν τῷ δις ὑπὸ τῶν $B\Gamma\ E\Delta$ · ἡ ἄρα τῶν ἀπὸ $B\Delta\ \Delta\Gamma$ ὑπεροχὴ ἐστὶν τὸ δις ὑπὸ τῶν $B\Gamma\ E\Delta$.


1. ἴσην γωνίαν AB , corr. S 2. ὑπὸ $B\Delta\Gamma$ ABS , corr. V² Co
3. ἀναστρεφόμενον $B\Gamma$, ἀναγραφόμενον $AB\Gamma S$ 5. β' add. BS 6. ἡ
add. BS βα αγ $B\Gamma$ Co, $B\Delta\ \Delta\Gamma$ $AB\Gamma S$ ἐστὶ $\Delta\Gamma BS$ 7. ὑπεροχῇ S,
ὑπεροχῆς (sine acc.) $\Delta(B)$ κατὰ add. Co 8. $\Delta\Gamma$ ὑπεροχῇ add. Co,
qui praelerea conl. ἡ τῶν ἀπὸ $B\Delta\ \Delta\Gamma$ ὑπεροχῇ, idque comprobet Sim-
sonus p. 117 (Ca p. 208) ἔστιν τὸ δις Hu 9. $B\Delta\Delta\Gamma\Delta$, distinx.
BS 11. ἀπὸ τῶν ΔB ABS , ἀπὸ τοῦ ΔB minus recte conl. Co idque
recepit Ca, τῶν altera coniectura del. Co ἀπὸ τῶν $B\Delta$ τὸ ΔB , ad
add. SV (et Paris. 2368 correctus ex αγ) 12. ὅ S, ὡς AB 14. καὶ
ἀφρηήσθω S 15. τοῦ ἀπὸ ΔB ABS , sed in V $\delta\beta$ punctis notatum,
 $\Delta\Gamma$ corr. Ca auctore Co post τοῦ ἀπὸ $\Delta\Gamma$ add. ABS τῶν δὲ ἀπὸ $B\Delta\ \Delta\Gamma$
τὸ δις ὑπὸ $B\Gamma\ E\Delta$, ὥστε καὶ τῶν ἀπὸ $\Delta B\ \Delta\Gamma$, del. Hu
16. ὅτι δὲ καὶ Hu (conf. vs. 9) 18. συναμφοτέρῳ S, συναμφοτέρως
 AB τὸ ἀπὸ $B\Delta$ recte AB , τὸ ἀπὸ $E\Delta$ S 21. τῷ δις BS, τὸ δις A

triangula $\beta\alpha\gamma$ $\alpha\gamma\epsilon$, et angulus $\gamma\alpha\delta$ sive $\gamma\alpha\delta$ angulo $\alpha\beta\gamma$ aequalis est; itaque, communi angulo δ , etiam triangula $\alpha\beta\delta$ $\gamma\alpha\delta$ similia sunt, ita ut sit $\beta\delta : \delta\alpha = \alpha\delta : \delta\gamma$, ideoque $\beta\delta \cdot \delta\gamma = \alpha\delta^2$.*.

Inversio autem manifesta est.

In secundum locum.

II. Sit triangulum $\alpha\beta\gamma$, et perpendicularis ad basim ducta ad ; dico esse $\beta\alpha^2 - \alpha\gamma^2 = \beta\delta^2 - \delta\gamma^2$ **, et, si $\beta\gamma$ bifuriam secetur in ϵ , $\beta\delta^2 - \delta\gamma^2 = 2\beta\gamma \cdot \epsilon\delta$. Prop. 120



Primum apparet esse $\beta\alpha^2 - \alpha\gamma^2 = \beta\delta^2 - \delta\gamma^2$. Est enim $\alpha\beta^2 = \beta\delta^2 + \alpha\delta^2$, et $\alpha\gamma^2 = \alpha\delta^2 + \delta\gamma^2$; ergo est $\alpha\beta^2 - \alpha\gamma^2 = \alpha\delta^2 + \beta\delta^2 - (\alpha\delta^2 + \delta\gamma^2)$. Et subtrahatur $\alpha\delta^2$; restat igitur $\beta\delta^2 - \delta\gamma^2 = \alpha\beta^2 - \alpha\gamma^2$.

Tum si $\beta\gamma$ bifuriam secetur in ϵ , esse $\beta\delta^2 - \delta\gamma^2 = 2\beta\gamma \cdot \epsilon\delta$ sic demonstratur. Quoniam est $\beta\epsilon = \epsilon\gamma$, est igitur

$\beta\delta = \gamma\epsilon + \epsilon\delta$, itaque

$\beta\delta^2 = (\gamma\epsilon + \epsilon\delta)^2$, id est

$= \gamma\epsilon^2 + \epsilon\delta^2 + 2\gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta$, sive, quia est $\gamma\epsilon = \gamma\delta + \delta\epsilon$,

$= \gamma\delta^2 + 2\delta\epsilon^2 + 2\gamma\delta \cdot \delta\epsilon + 2\gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta$.

Sed propter elem. 2. 3 est $\delta\epsilon^2 + \gamma\delta \cdot \delta\epsilon = \gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta$; est igitur

$(\gamma\epsilon + \epsilon\delta)^2 = \gamma\delta^2 + 4\gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta$, sive

$(\gamma\epsilon + \epsilon\delta)^2 - \gamma\delta^2 = 4\gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta$.

Sed erat $(\gamma\epsilon + \epsilon\delta)^2 = \beta\delta^2$, et $\gamma\epsilon = \frac{1}{2}\beta\gamma$; est igitur

$\beta\delta^2 - \gamma\delta^2 = 2\beta\gamma \cdot \epsilon\delta$ ***).


*) Quae Graecus scriptor omisit, ea secundum Simsonum p. 120 (Ca p. 211) supra suppleta sunt. Similiter V³ ad Graeca $\alpha\delta \pi\epsilon\delta\iota \tau\alpha\upsilon\varsigma \gamma\omega\nu\tau\alpha\varsigma \tau\alpha\varsigma \epsilon\kappa\alpha\lambda\lambda\acute{\alpha}\xi$ adnotat: " $\alpha\delta \pi\beta \alpha\gamma \gamma\epsilon$ ". quia angulus ad δ est communis triangulorum $\beta\alpha\delta$ $\gamma\alpha\delta$ et angulus $\gamma\alpha\delta$ aequalis angulo β . ergo reliquus $\beta\alpha\delta$ aequalis reliquo $\alpha\gamma\delta$. est ergo sicut $\beta\delta$ ad $\delta\alpha$ sic $\delta\alpha$ ad $\delta\gamma$. ergo $\tau\omicron \delta \alpha\delta \beta\delta\gamma$ aequale $\tau\omicron\eta \alpha\pi\omicron \delta\alpha$ ".

**) Hinc facile efficitur illud lemma, quod supra p. 765 adnot. ** (ubi haec ipsa Pappi propositio citanda erat) auctore Commandino supplevimus.

***) Quae in Graeco contextu desunt addita secundum C^o.

Εἰς τὸν αὐτόν, ἔαν μὴ ὁ λόγος ἴσου πρὸς ἴσον.

- 187 γ'. Τρίγωνον τὸ $ABΓ$, καὶ τὸ ἀπὸ BA τοῦ ἀπὸ $ΑΓ$ δοθέντι μείζον ἔστω ἢ ἐν λόγῳ, δοθέντι μὲν τῷ E , ἐν λόγῳ δὲ τῇ τῆς BA πρὸς τὴν $ΑΓ$. ὅτι μείζον ἔστιν τὸ ἐπὶ $ABΓ$ τοῦ E χωρίου.



Ληρησθῶ γὰρ τὸ δοθὲν χωρίον τὸ ἐπὶ ABH . λοιποῦ ἄρα τοῦ ἐπὶ BAH πρὸς τὸ ἀπὸ $ΑΓ$ λόγος ἔστιν δοθείς¹⁰ ὁ αὐτὸς τῷ τῆς BA πρὸς τὴν $ΑΓ$. κείσθω τῷ ἐπὶ BAH ἴσον τὸ ἐπὶ $ZΑΓ$. λοιποῦ ἄρα τοῦ ἐπὶ $ZΑΓ$ πρὸς τὸ¹⁵ ἀπὸ $ΑΓ$, τουτέστιν τῆς ZA πρὸς τὴν $ΑΓ$, ὁ αὐτὸς τῷ τῆς BA πρὸς τὴν $ΑΓ$. παράλληλος ἄρα ἔστιν ἡ AA τῇ ZB . ἴση ἄρα ἔστιν ἡ Z γωνία τῇ ἐπὶ $ΓAA$ γωνίᾳ. ἀλλὰ ἡ Z ἴση ἔστιν²⁰ τῇ ἐπὶ $ΑΗΓ$ γωνίᾳ· καὶ ἡ ἐπὶ $ΑΗΓ$ ἄρα γωνία ἴση ἔστιν τῇ ἐπὶ $ΓAA$ γωνίᾳ. μείζων ἔστιν ἡ ἐπὶ $AAΘ$ τῆς ἐπὶ $ΓAA$. καὶ τῆς ἐπὶ $ΓHA$ ἄρα μείζων ἔστιν ἡ ἐπὶ $AAΘ$ γωνία· ὥστε μείζον ἔστιν τὸ ἐπὶ $ABΓ$ τοῦ ἐπὶ ABH , τουτέστιν τοῦ E [τοῦ δοθέντος] χωρίου.

Εἰς τὸν τρίτον τόπον.

- 188 δ'. Ἐὰν ἡ τρίγωνον τὸ $ABΓ$, καὶ διαχθῇ τις ἡ AA δίχα τέμνουσα τὴν $BΓ$, ὅτι τὰ ἀπὸ τῶν BA $ΑΓ$ τετράγωνα διπλάσια ἔστιν τῶν ἀπὸ τῶν AA $ΑΓ$ τετραγώνων.
Ἦχθω κάθετος ἡ AE . τὰ δὲ ἀπὸ τῶν BE $ΕΓ$ τετρά-³⁰

2. γ' add. BS 3. δοθέντι Ge anclore Co pro δοθέντος δο-
θέντι idem pro δοθέν ἐν add. Hu 4. $ABΓ$ Co pro $BΑΓ$
6. 7. γὰρ τῷ δοθέντι χωρίῳ ἴσον τὸ ἐπὶ cel. Hu 8. λοιποῦ Co pro
λοιπὸν 12. πρὸς τὴν $ΑΓ$ Co pro πρὸς τὴν $ΑΓ$ 14. λοιποῦ Co

In eundem locum, si non sit proportio aequalis magnitudinis ad aequalem.

III. Sit triangulum $\alpha\beta\gamma$, et sit quadratum ex $\beta\alpha$ com-
paratum cum quadrato ex $\alpha\gamma$ dato spatio maius quam in pro-
portione, nempe dato spatio ϵ , in proportione autem rectae
 $\beta\delta$ ad $\delta\gamma$; dico rectangulum $\delta\beta \cdot \beta\gamma$ maius esse quam spa-
tium ϵ (vel brevius sic: sit triangulum $\alpha\beta\gamma$, datum spatium
 ϵ , data proportio $\beta\delta : \delta\gamma$, sitque $\beta\alpha^2 - \epsilon : \alpha\gamma^2 = \beta\delta : \delta\gamma$;
erit $\delta\beta \cdot \beta\gamma > \epsilon$). Prop. 121

Subtrahatur enim dato spatio ϵ aequale rectangulum
 $\alpha\beta \cdot \beta\eta$; est igitur

$$\beta\alpha (\beta\alpha - \beta\eta) : \alpha\gamma^2 = \beta\delta : \delta\gamma, \text{ sive}$$

$$\beta\alpha \cdot \alpha\eta : \alpha\gamma^2 = \beta\delta : \delta\gamma, \text{ quae est data proportio.}$$

Ponatur $\zeta\alpha \cdot \alpha\gamma = \beta\alpha \cdot \alpha\eta$; est igitur $\zeta\alpha \cdot \alpha\gamma : \alpha\gamma^2$, id est
 $\zeta\alpha : \alpha\gamma = \beta\delta : \delta\gamma$. Ergo parallelae sunt $\alpha\delta$ $\beta\zeta^*$, itaque
 $\angle \beta\zeta\alpha = \angle \gamma\alpha\delta$. Sed quia ex constructione est $\zeta\alpha \cdot \alpha\gamma =$
 $\beta\alpha \cdot \alpha\eta$, id est $\zeta\alpha : \alpha\beta = \eta\alpha : \alpha\gamma$, propter elem. 6, 6 est
 $\angle \beta\zeta\alpha = \angle \alpha\eta\gamma$; ergo $\angle \alpha\eta\gamma = \angle \gamma\alpha\delta$. Estque $\angle \alpha\delta\theta >$
 $\angle \gamma\alpha\delta$; ergo etiam $\angle \alpha\delta\theta > \angle \alpha\eta\gamma$, ita ut sit $\delta\beta \cdot \beta\gamma >$
 $\alpha\beta \cdot \beta\eta^{**}$, hoc est maius dato spatio ϵ .

In tertium locum.

IV. Si sit triangulum $\alpha\beta\gamma$, et $\alpha\delta$ ducatur basim $\beta\gamma$ bifa-
riam secans, dico esse $\beta\alpha^2 + \alpha\gamma^2 = 2(\alpha\delta^2 + \delta\gamma^2)$. Prop. 122


Ducatur ad basim perpendicularis $\alpha\epsilon$. Sunt autem prop-

* Quia est $\zeta\alpha - \alpha\gamma : \alpha\gamma = \beta\delta - \delta\gamma : \delta\gamma$, id est $\zeta\gamma : \alpha\gamma = \beta\gamma : \delta\gamma$,
sive $\zeta\gamma : \gamma\beta = \alpha\gamma : \gamma\delta$, unde secundum elem. 6, 6 et 1, 27 efficitur
rectas $\beta\zeta$ ad parallelas esse (Co).

** Facto angulo $\alpha\eta\gamma$ aequali angulo $\alpha\delta\theta$ Commandinus demonstrat,
quia anguli $\alpha\eta\gamma + \alpha\delta\gamma$ aequales duobus rectis sint, puncta $\alpha \eta \gamma \delta$ esse
in circuli circumferentia, itaque (id quod sequitur ex elem. 3, 36) esse
 $\alpha\beta \cdot \beta\eta = \delta\beta \cdot \beta\gamma$, tum, quia sit $\beta\gamma > \beta\eta$, esse $\delta\beta \cdot \beta\gamma > \delta\beta \cdot \beta\eta$, ergo
etiam $\delta\beta \cdot \beta\gamma > \alpha\beta \cdot \beta\eta$.

pro λοιπόν 20. ἡ $\overline{HZ}$ γὰρ ἐστὶν AB, corr. S 22. δ' ἐστὶν Hu
23. τῆς ἐπὶ $\overline{FH}$ AB, corr. S 24. τοῦ ἐπὶ $\overline{AB}$ H A, coniunx. BS
25. τοῦ δοθέντος interpretamentum esse videtur 27. δ' add. BS
Ἐὰν γ' om. S 30. BE EF Co pro AE EI

γωνία διπλάσια ἐστὶν τῶν ἀπὸ τῶν $BA EA$ τετραγώνων·



ἐστὶν δὲ καὶ τὸ δις ἀπὸ AE μετὰ τοῦ δις ἀπὸ AE διπλάσιον τοῦ ἀπὸ AA , τὰ δὲ ἀπὸ τῶν $BE EG$ μετὰ τοῦ δις ἀπὸ AE ἴσα ἐστὶν τοῖς ἀπὸ τῶν $BA AG$. τὰ ἄρα ἀπὸ $BA AG$ διπλάσια ἐστὶν τῶν ἀπὸ

$BA AA$ τετραγώνων, τούτέστιν τῶν ἀπὸ $GA AA$ τετραγώνων.

- 159 ε'. Λόγον ὄντος τοῦ τῆς AB πρὸς τὴν BG , καὶ χωρίου τοῦ ἐπὶ τῶν $GA AA$, ἐὰν τῶν $JB BG$ μέση ἀνάλογον ληφθῇ ἡ BE , δεῖξαι ὅτι τὸ ἀπὸ AE τοῦ ἀπὸ EG μεῖζόν ἐστιν τῷ ἐπὶ $GA AA$ ἢ ἐν λόγῳ τῷ τῆς AB πρὸς τὴν BG .

Παροίησθω γὰρ ὡς ¹⁵
 $\alpha \quad \delta \quad \epsilon \quad \gamma \quad \zeta \quad \beta$ ἡ AB πρὸς τὴν BG ,
 οὕτως ἄλλη τις ἡ ZE πρὸς τὴν EG . διελόντι ἄρα ἐστὶν καὶ
 ὡς ἡ AG πρὸς τὴν GB , οὕτως ἡ ZI πρὸς τὴν GE . καὶ
 ὅλη ἄρα ἡ AZ πρὸς ὅλην τὴν BE ἐστὶν ὡς ἡ AG πρὸς
 τὴν BG . ἐναλλάξ ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ ZA πρὸς τὴν AG , οὕ-²⁰
 τως ἡ EB πρὸς τὴν BG . ὡς δὲ ἡ EB πρὸς τὴν BG , οὕ-
 τως ἐστὶν ἡ AE πρὸς τὴν EG ἐκ τοῦ εἶναι μέσην ἀνάλογον·
 καὶ ὡς ἄρα ἡ ZA πρὸς τὴν AG , οὕτως ἡ EA πρὸς τὴν
 GE . χωρίον χωρίῳ· τὸ ἄρα ἐπὶ τῶν $AZ EG$ ἴσον ἐστὶν
 τῷ ἐπὶ $AI AE$. τὸ δὲ ἐπὶ $AZ GE$ τοῦ ἐπὶ AEG ἔπερ-²⁵
 ἔχει τῷ ἐπὶ ZEG . ὃ δὲ ὑπερέχει τὸ ὑπὸ $AZ EI$ τοῦ ὑπὸ
 AEF , τούτῳ ὑπερέχει καὶ τὸ ὑπὸ $AI EF$ τοῦ ὑπὸ AEI . τὸ
 ἄρα ὑπὸ $AG AE$ τοῦ ὑπὸ AEF μεῖζόν ἐστιν τῷ ἐπὶ ZEG .

2. δις ἐπὶ AE ABS, corr. Ge auctore Co 9. $BA AA AA AA$ ABS, $AA JB$ Co, $BA AA Ca$ $GA AA Co$, $EIEA ABS$, $GA AA Ca$ 10. ε' add. BS 10. 11. χωρίον τὸ A, corr. BS 17. διελόντι ἄρα ἐστὶν καὶ Hu. ἀνάλογον ἄρα ἐστὶν κατὰ διαίρεσιν $A'BS$; conf. p. 860, 12 [scilicet, postquam διελόντι in ἀνάλογον corruptum est, scholiasta quidam additis verbis κατὰ διαίρεσιν veram sententiam conatus est restituere] 24. χωρίῳ ἄρα τὸ conl. Hu 25. post τὸ δὲ add τετράκις ABS, del. Co 26. ἐπὶ $AZ EI$ — 28. ἄρα add. Co; contra

ter elem. 2. 9 $\beta\epsilon^2 + \epsilon\gamma^2 = 2\beta\delta^2 + 2\epsilon\delta^2$; atque in triangulo orthogonio $\alpha\epsilon\delta$ sunt

$$2\alpha\epsilon^2 + 2\epsilon\delta^2 = 2\alpha\delta^2, \text{ et in triangulo orthogonio } \beta\epsilon\alpha$$

$$\beta\epsilon^2 + \alpha\epsilon^2 = \beta\alpha^2, \text{ itemque in triangulo } \alpha\epsilon\gamma$$

$$\alpha\epsilon^2 + \epsilon\gamma^2 = \alpha\gamma^2, \text{ itaque summa facta}$$

$$\beta\epsilon^2 + \epsilon\gamma^2 + 2\alpha\epsilon^2 = \beta\alpha^2 + \alpha\gamma^2; \text{ ergo, si pro } \beta\epsilon^2 + \epsilon\gamma^2 \\ \text{id quod supra positum} \\ \text{est substituimus,}$$

$$\beta\alpha^2 + \alpha\gamma^2 = 2\beta\delta^2 + 2\epsilon\delta^2 + 2\alpha\epsilon^2, \text{ sive rursus ex} \\ \text{superioribus} \\ = 2\beta\delta^2 + 2\alpha\delta^2, \text{ sive, quia est } \beta\delta = \delta\gamma, \\ = 2(\alpha\delta^2 + \delta\gamma^2):$$

V. Si sit data proportio $\alpha\beta : \beta\gamma$, et rectangulum $\gamma\alpha \cdot \alpha\delta$, Prop. 123*,
et rectarum $\delta\beta$ $\beta\gamma$ media proportionalis sumatur $\beta\epsilon$, demon-
stretur quadratum ex $\alpha\epsilon$, comparatum cum quadrato ex $\epsilon\gamma$,
rectangulo $\gamma\alpha \cdot \alpha\delta$ maius esse quam in proportionem $\alpha\beta : \beta\gamma$
(vel brevius sic: esse $\alpha\epsilon^2 - \gamma\alpha \cdot \alpha\delta : \epsilon\gamma^2 = \alpha\beta : \beta\gamma$).

Fiat enim

$$\zeta\epsilon : \epsilon\gamma = \alpha\beta : \beta\gamma; \text{ dirimendo igitur est}$$

$$\alpha\gamma : \gamma\beta = \zeta\gamma : \gamma\epsilon; \text{ suntque totae (elem. 5. 12)}$$

$$\alpha\zeta : \beta\epsilon = \alpha\gamma : \gamma\beta; \text{ vicissim igitur}$$

$$\zeta\alpha : \alpha\gamma = \epsilon\beta : \beta\gamma.$$

Sed quia ex hypothesis est $\delta\beta : \beta\epsilon = \beta\epsilon : \beta\gamma$, ut est dirimendo

$\delta\epsilon : \epsilon\beta = \epsilon\gamma : \gamma\beta$, et vicissim $\delta\epsilon : \epsilon\gamma = \epsilon\beta : \beta\gamma$, est igitur

$$\zeta\alpha : \alpha\gamma = \delta\epsilon : \epsilon\gamma; \text{ itaque per multiplicationem}$$

$$\alpha\zeta \cdot \epsilon\gamma = \alpha\gamma \cdot \delta\epsilon. \text{ Sed, quia } \alpha\zeta = \alpha\epsilon + \epsilon\zeta, \text{ ideoque}$$

$$\alpha\zeta \cdot \epsilon\gamma - \alpha\epsilon \cdot \epsilon\gamma = \epsilon\zeta \cdot \epsilon\gamma, \text{ item est}$$

$$\alpha\gamma \cdot \delta\epsilon - \alpha\epsilon \cdot \epsilon\gamma = \epsilon\zeta \cdot \epsilon\gamma. \text{ Sed est } \epsilon\zeta$$


* Propositiones 123 et 124 duo casus eius propositionis sunt quam Simsonus p. 136—136 (Ca p. 236—248) pertractat.

1. Explicanda haec auctore Simsono p. 145 (Ca p. 245) sic fere: est $\alpha\epsilon = \alpha\delta + \delta\epsilon$; ergo $\alpha\gamma \cdot \alpha\epsilon = \alpha\gamma \cdot \alpha\delta + \alpha\gamma \cdot \delta\epsilon$; sed est propter elem. 2, 3 $\alpha\gamma \cdot \alpha\epsilon = \alpha\epsilon^2 + \alpha\epsilon \cdot \epsilon\gamma$; ergo $\alpha\epsilon^2 + \alpha\epsilon \cdot \epsilon\gamma = \alpha\gamma \cdot \alpha\delta + \alpha\gamma \cdot \delta\epsilon$, sive $\alpha\gamma \cdot \delta\epsilon - \alpha\epsilon \cdot \epsilon\gamma = \alpha\epsilon^2 - \gamma\alpha \cdot \alpha\delta$.

Ca neque haec recepit et postea vs. 28. $\mu\epsilon\tau\acute{\iota}\sigma\tau\epsilon\iota\varsigma \lambda\alpha\tau\iota\nu$ — p. 860, l. $\tau\alpha\iota$ $\epsilon\pi\acute{o}\delta\ A\epsilon\Gamma$ delevit 28. $A\Gamma\Gamma\epsilon A$, distinx. BS; item p. 860, l.

ᾧ δὲ ὑπερέχει τὸ ὑπὸ $ΑΓ ΔΕ$ τοῦ ὑπὸ $ΑΒΓ$, τούτῳ ὑπερέχει καὶ τὸ ἀπὸ $ΑΕ$ τοῦ ὑπὸ $ΓΑΔ$ · τὸ ἄρα ἀπὸ $ΑΕ$ τετραγώνου τοῦ ὑπὸ $ΓΑΔ$ μείζον ἐστὶν τῷ ὑπὸ $ΖΕΓ$. τὸ δὲ ὑπὸ $ΖΕΓ$ λόγον ἔχει πρὸς τὸ ἀπὸ $ΕΓ$ τὸν αὐτὸν τῷ τῆς $ΑΒ$ πρὸς τὴν $ΒΓ$, ὥστε τὸ ἀπὸ $ΑΕ$ τοῦ ἀπὸ $ΕΓ$ μείζον ἐστὶν· τῷ ὑπὸ $ΓΑΔ$ ἢ ἐν λόγῳ τῷ τῆς $ΑΒ$ πρὸς τὴν $ΒΓ$.

- 190 ζ'. Λόγος τῆς $ΑΒ$ πρὸς τὴν $ΒΓ$, χωρίον τὸ ὑπὸ $ΓΑΔ$. εἰν τῶν $ΑΒ ΒΓ$ μέση ἀνάλογον ληφθῇ ἡ $ΒΕ$, ὅτι τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΕ$ τοῦ ἀπὸ τῆς $ΕΓ$ μείζον ἐστὶν τῷ ὑπὸ $ΓΑΔ$ ἢ ἐν λόγῳ τῷ τῆς $ΑΒ$ πρὸς τὴν $ΒΓ$. 10



Πεποιήσθω γὰρ ὡς ἡ $ΑΒ$ πρὸς τὴν $ΒΓ$, οὕτως ἄλλαις ἡ $ΕΖ$ πρὸς τὴν $ΓΕ$. διαιδόντι ἄρα καὶ λοιπὴ πρὸς λοιπὴν ἐστὶν ὡς ἡ $ΖΑ$ πρὸς τὴν $ΒΕ$, οὕτως ἡ $ΑΓ$ πρὸς τὴν $ΒΓ$. ἐναλλάξ ἐστὶν ὡς ἡ $ΖΑ$ πρὸς τὴν $ΑΓ$, οὕτως ἡ $ΕΒ$ πρὸς τὴν $ΒΓ$. ὡς δὲ ἡ $ΕΒ$ πρὸς τὴν $ΒΓ$, οὕτως ἡ $ΑΕ$ 15 πρὸς τὴν $ΕΓ$. καὶ ὡς ἄρα ἡ $ΖΑ$ πρὸς τὴν $ΑΓ$, οὕτως ἡ $ΑΕ$ πρὸς τὴν $ΓΕ$. χωρίον χωρίῳ· τὸ ἄρα ἐπὶ τῶν $ΖΑ ΓΕ$ ἴσον ἐστὶν τῷ ἐπὶ $ΕΑ ΑΓ$. κοινὸν προσαιείσθω τὸ ἐπὶ $ΑΕΓ$ μετὰ τοῦ ὑπὸ $ΓΑΔ$ · ὅλον ἄρα τὸ ἀπὸ $ΑΕ$ ἴσον ἐστὶν ὅλῳ τῷ τε ὑπὸ $ΖΕΓ$ καὶ ἔτι τῷ ὑπὸ $ΓΑΔ$ · ὥστε τὸ ἀπὸ 20 $ΑΕ$ τοῦ ἀπὸ $ΕΓ$ μείζον τῷ ὑπὸ $ΓΑΔ$ ἢ ἐν λόγῳ τῷ τῆς $ΑΒ$ πρὸς τὴν $ΒΓ$. τὸ γὰρ ὑπὸ $ΖΕΓ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΕΓ$ τοῦτον ἔχει τὸν λόγον.

2. τοῦ ὑπὸ $ΓΑΔ$ Co pro τοῦ ὑπὸ $ΑΕΓ$ 3. τῷ ὑπὸ $ΖΕΓ$ Co pro τῷ ὑπὸ $ΖΕ$ 3. 4. τὸ δὲ ὑπὸ $ΖΕΓ$ add. Co 4. ἔχον S πρὸς add. Co 7. ζ' add. BS 8. τῶν $ΑΒ ΒΓ$ Co, τῶν $ΑΑΑΒ ΑΒ$, 9. τῷ ὑπὸ $ΓΑΔ$ Co pro τῷ ὑπὸ $ΒΑΑ$ 12. ἡ $ΕΖ$ πρὸς τὴν $ΓΕ$ ἢ ἡ $ΕΓ$ πρὸς τὴν $ΓΒ$ ABS, ἡ $ΖΕ$ πρὸς τὴν $ΕΓ$ Co 13. ὡς ἡ $ΖΑ$ πρὸς τὴν $ΒΕ$ Co pro ὡς ἡ $ΖΓ$ πρὸς τὴν $ΓΕ$ 15. οὕτως ἡ δὲ $ΒΑ$, οὕτως ἡ $ΕΑΕ$ A, οὕτως ἡ εἰς $Β$ S 16. 17. οὕτως ἡ $ΑΕ$ Co, οὕτως ἡ $ΑΓ$ ABS, οὕτως ἡ $ΕΑ$ Ca 17. χωρίῳ ἄρα τὸ con. Hu 18. τῷ ὑπὸ $ΕΑ ΑΓ$ Co, τῷ ὑπὸ $ΕΑΓ$ ABS, τῷ ὑπὸ $ΑΓ ΓΕ$ Ca 18. 19. τὸ ὑπὸ $ΑΕΓ$

$$\alpha\gamma \cdot \varepsilon\delta - \alpha\varepsilon \cdot \varepsilon\gamma = \alpha\varepsilon^2 - \gamma\alpha \cdot \alpha\delta; \text{ ergo}$$

$$\alpha\varepsilon^2 - \gamma\alpha \cdot \alpha\delta = \zeta\varepsilon \cdot \varepsilon\gamma. \text{ Sed ex constructione erat}$$

$$\zeta\varepsilon : \varepsilon\gamma = \alpha\beta : \beta\gamma, \text{ id est}$$

$$\zeta\varepsilon \cdot \varepsilon\gamma : \varepsilon\gamma^2 = \alpha\beta : \beta\gamma, \text{ itaque}$$

$$\alpha\varepsilon^2 - \gamma\alpha \cdot \alpha\delta : \varepsilon\gamma^2 = \alpha\beta : \beta\gamma.$$

VI. Sit data proportio $\alpha\beta : \beta\gamma$, et rectangulum $\gamma\alpha \cdot \alpha\delta$. Si Prop. 121
 reclarum $\delta\beta$ $\beta\gamma$ media proportionalis sumatur $\beta\varepsilon$, dico qua-
 dratum ex $\alpha\varepsilon$, comparatum cum quadrato ex $\varepsilon\gamma$, rectangulo
 $\gamma\alpha \cdot \alpha\delta$ maius esse quam in proportionem $\alpha\beta : \beta\gamma$ (vel brevius
 sic: esse $\alpha\varepsilon^2 - \gamma\alpha \cdot \alpha\delta : \varepsilon\gamma^2 = \alpha\beta : \beta\gamma$).

Fiat enim

$$\zeta\varepsilon : \varepsilon\gamma = \alpha\beta : \beta\gamma; \text{ dirimendo igitur est}$$

$$\zeta\gamma : \gamma\varepsilon = \alpha\gamma : \beta\gamma, \text{ et subtrahendo } \zeta\gamma - \alpha\gamma : \gamma\varepsilon - \beta\gamma,$$

id est

$$\zeta\alpha : \beta\varepsilon = \alpha\gamma : \beta\gamma. \text{ Vicissim est}$$

$$\zeta\alpha : \alpha\gamma = \beta\varepsilon : \beta\gamma. \text{ Sed est ex hypothesi}$$

$$\beta\varepsilon : \beta\gamma = \delta\beta : \beta\varepsilon, \text{ ideoque}$$

$$= \beta\varepsilon + \delta\beta : \beta\gamma + \beta\varepsilon, \text{ id est}$$

$$= \delta\varepsilon : \varepsilon\gamma; \text{ itaque}$$

$$\zeta\alpha : \alpha\gamma = \delta\varepsilon : \varepsilon\gamma; \text{ ergo per multiplicationem}$$

$$\zeta\alpha \cdot \gamma\varepsilon = \varepsilon\delta \cdot \alpha\gamma. \text{ Communia addantur } \alpha\varepsilon \cdot \varepsilon\gamma + \gamma\alpha \cdot \alpha\delta,$$

et pro $\varepsilon\delta \cdot \alpha\gamma$ substituitur summa

$\delta\gamma \cdot \alpha\gamma + \gamma\varepsilon \cdot \alpha\gamma$; ergo sunt

$$\zeta\alpha \cdot \gamma\varepsilon + \alpha\varepsilon \cdot \varepsilon\gamma + \gamma\alpha \cdot \alpha\delta = \delta\gamma \cdot \alpha\gamma + \gamma\varepsilon \cdot \alpha\gamma + \alpha\varepsilon \cdot \varepsilon\gamma$$

+ $\gamma\alpha \cdot \alpha\delta$.

Sed est $\zeta\alpha \cdot \gamma\varepsilon + \alpha\varepsilon \cdot \varepsilon\gamma = \zeta\varepsilon \cdot \varepsilon\gamma$, et in altera parte $\delta\gamma \cdot \alpha\gamma$
 + $\gamma\alpha \cdot \alpha\delta = \alpha\gamma^2$, et hoc $\alpha\gamma^2 + \gamma\varepsilon \cdot \alpha\gamma = \alpha\gamma \cdot \alpha\varepsilon$. et hoc $\alpha\gamma \cdot \alpha\varepsilon$
 + $\alpha\varepsilon \cdot \varepsilon\gamma = \alpha\varepsilon^2$. Ergo

$$\zeta\varepsilon \cdot \varepsilon\gamma + \gamma\alpha \cdot \alpha\delta = \alpha\varepsilon^2, \text{ sive}$$

$$\alpha\varepsilon^2 - \gamma\alpha \cdot \alpha\delta = \zeta\varepsilon \cdot \varepsilon\gamma, \text{ ita ut sit in proportionem}$$

$$\alpha\varepsilon^2 - \gamma\alpha \cdot \alpha\delta : \varepsilon\gamma^2 = \zeta\varepsilon \cdot \varepsilon\gamma : \varepsilon\gamma^2$$

$$= \zeta\varepsilon : \varepsilon\gamma$$

$$= \alpha\beta : \beta\gamma.$$

- 191 ζ'. Εὐθεία ἡ AB , καὶ δύο σημεῖα τὰ Γ Δ . ὅτι, ἐὰν τὸ ἀπὸ $ΑΔ$ καὶ τὸ λόγον ἔχον πρὸς τὸ ἀπὸ AB τὸν αὐτὸν τῷ τῆς $ΑΓ$ πρὸς τὴν GB συντεθῇ, γίνεται τὸ τε ἀπὸ $ΑΓ$ καὶ τὸ λόγον ἔχον πρὸς τὸ ἀπὸ GB τὸν αὐτὸν τῷ τῆς $ΑΓ$ πρὸς τὴν GB καὶ ἔτι τὸ λόγον ἔχον πρὸς τὸ ἀπὸ $ΓΔ$ τὸν αὐτὸν τῷ τῆς AB πρὸς τὴν BG .



$ΖΔ$ πρὸς τὴν AB · καὶ συνθέντι ἄρα καὶ τὰ λοιπὰ ἡ $ΑΖ$ ¹⁰
 πρὸς λοιπὴν τὴν $ΓΔ$, τουτέστιν τὸ ἐπὶ $ΑΖ$ $ΓΔ$ πρὸς
 τὸ ἀπὸ $ΓΔ$, ἐστὶν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν $ΒΓ$ · ὥστε τὸ
 μὲν λόγον ἔχον πρὸς τὸ ἀπὸ $ΑΒ$ τὸν αὐτὸν τῷ τῆς $ΑΓ$
 πρὸς τὴν GB ἐστὶν τὸ ἐπὶ $ΖΑΒ$, τὸ δὲ λόγον ἔχον πρὸς
 τὸ ἀπὸ GB τὸν αὐτὸν τῷ τῆς $ΑΓ$ πρὸς τὴν GB ἐστὶν τὸ ἐπὶ ¹⁵
 $ΑΓΒ$, τὸ δὲ λόγον ἔχον πρὸς τὸ ἀπὸ $ΓΔ$ τὸν αὐτὸν τῷ
 τῆς (αὐτῆς) AB πρὸς τὴν $ΒΓ$ ἐστὶν τὸ ἐπὶ $ΑΖ$ $ΑΓ$. ὅτι
 οὖν τὸ ἀπὸ $ΑΔ$ μετὰ τοῦ ἐπὶ $ΒΑΖ$ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ἐπὶ
 $ΒΑΓ$ καὶ τῷ ἐπὶ $ΑΖ$ $ΓΔ$. καὶ κοινὸν ἀφηρέσθω τὸ ἐπὶ
 $ΑΑΓ$ · ὅτι λοιπὸν τὸ ἐπὶ $ΑΑΓ$ μετὰ τοῦ ἐπὶ $ΖΑΒ$ ἴσον ²⁰
 ἐστὶν τῷ τε ἐπὶ $ΑΓ$ $ΑΒ$ καὶ τῷ ἐπὶ $ΑΖ$ $ΓΔ$. κοινὸν
 ἀφηρέσθω τὸ ἐπὶ $ΑΖ$ $ΓΔ$ · ὅτι ἄρα τὸ ἐπὶ $ΖΑΓ$ μετὰ
 τοῦ ἐπὶ $ΖΑΒ$, τουτέστιν ὅλον τὸ ἐπὶ $ΖΔ$ $ΓΒ$, ἴσον ἐστὶν

4. ζ' add. BS τὰ $ΓΔ$ A, distinx. BS ἐὰν add. Co 3. πρὸς
 τὴν GB Co, πρὸς τὴν $ΓΔ$ ABS, πρὸς τὴν BG Ca συντεθῇ Hu pro
 συντεθήσεται 5. τὸν λόγον A, corr. BS 7. 8. Τῷ γὰρ — λόγῳ
 Ca, τῷ γὰρ — λόγον ἔχον A, τὸ γὰρ — λόγον ἔχον BS, τῷ γὰρ λόγον
 ἔχοντι Co 10. συνθέντι Co pro συντεθήσεται καὶ τὰ λοιπὰ καὶ
 λοιπὴ Hu 13. τὸν αὐτὸν τῷ τῆς $ΑΓ$ πρὸς τὴν GB add. Co
 17. αὐτῆς del. Hu auctore Co τὸ ἐπὶ $ΑΖ$ $ΓΔ$ A, distinx. BS
 18. τοῦ ἐπὶ $ΒΑΖ$ τοῦ ἐπὶ $ΑΓΖ$ ABS, τοῦ ἐπὶ $ΖΑΒ$ Co 19. καὶ
 ante κοινὸν om. S 19. 20. τὸ ἐπὶ $ΑΑΓ$ τοῦ ἐπὶ $ΑΑΓ$ A, τοῦ ἐπὶ
 γὰρ B, τὸ ἐπὶ γὰρ S 21. ἐπὶ $ΑΓ$ $ΑΒ$ et 22. ἐπὶ $ΑΖ$ $ΓΔ$ A, distinx.
 BS (at vs. 21 ἐπὶ $ΑΖ$ $ΓΔ$ ex silentio quidem A 22. 23. ὅτι ἄρα
 τὸ ἐπὶ $ΖΑΓ$ μετὰ τοῦ ἐπὶ $ΖΑΒ$ ABS, corr. Co 23. τουτέστιν Hu
 pro γίνεται

VII. Sit recta $\alpha\beta$, inque ea duo puncta γ δ ; dico, si ^{Prop. 425.} quadratum ex $\alpha\delta$ et id spatium, quod ad quadratum ex $\delta\beta$ proportionem $\alpha\gamma : \gamma\beta$ habet, componantur, effici quadratum ex $\alpha\gamma$ et spatium, quod ad quadratum ex $\gamma\beta$ proportionem $\alpha\gamma : \gamma\beta$ habeat, atque insuper spatium, quod ad quadratum ex $\gamma\delta$ proportionem $\alpha\beta : \beta\gamma$ habeat (vel brevius sic: dico esse $\alpha\delta^2 + \frac{\delta\beta^2 \cdot \alpha\gamma}{\beta\gamma} = \alpha\gamma^2 + \alpha\gamma \cdot \gamma\beta + \frac{\gamma\delta^2 \cdot \alpha\beta}{\beta\gamma}$, vel, si $\zeta\delta : \delta\beta = \alpha\gamma : \gamma\beta$ ponatur, esse $\alpha\delta^2 + \beta\delta \cdot \delta\zeta = \alpha\gamma^2 + \alpha\gamma \cdot \gamma\beta + \alpha\zeta \cdot \gamma\delta = \beta\alpha \cdot \alpha\gamma + \alpha\zeta \cdot \gamma\delta$).

Fiat enim

$\zeta\delta : \delta\beta = \alpha\gamma : \gamma\beta$; ergo componendo est

$\zeta\beta : \beta\delta = \alpha\beta : \beta\gamma$, et subtrahendo $\alpha\beta - \zeta\beta : \beta\gamma - \beta\delta$,
id est

$\alpha\zeta : \gamma\delta = \alpha\beta : \beta\gamma$, id est

$\alpha\zeta \cdot \gamma\delta : \gamma\delta^2 = \alpha\beta : \beta\gamma$,

ita ut rectangulum $\zeta\delta \cdot \delta\beta$ ad quadratum ex $\delta\beta$, itemque rectangulum $\alpha\gamma \cdot \gamma\beta$ ad quadratum ex $\gamma\beta$ habeant proportionem $\alpha\gamma : \gamma\beta$, et rectangulum $\alpha\zeta \cdot \gamma\delta$ ad quadratum ex $\gamma\delta$ proportionem $\alpha\beta : \beta\gamma$. Iam dico esse

$\alpha\delta^2 + \beta\delta \cdot \delta\zeta = \alpha\gamma^2 + \alpha\gamma \cdot \gamma\beta + \alpha\zeta \cdot \gamma\delta$, sive, quia
propter elem. 2, 5 est

$\alpha\gamma^2 + \alpha\gamma \cdot \gamma\beta = \beta\alpha \cdot \alpha\gamma$,

$= \beta\alpha \cdot \alpha\gamma + \alpha\zeta \cdot \gamma\delta$. Subtrahatur com-

mune $\delta\alpha \cdot \alpha\gamma$, scilicet

$\alpha\delta^2 - \delta\alpha \cdot \alpha\gamma = \alpha\delta \cdot \delta\gamma$

elem. 2, 2, et $\beta\alpha \cdot \alpha\gamma$

$- \delta\alpha \cdot \alpha\gamma = \alpha\gamma \cdot \delta\beta$;

apparet restare

$\alpha\delta \cdot \delta\gamma + \zeta\delta \cdot \delta\beta = \alpha\gamma \cdot \delta\beta + \alpha\zeta \cdot \gamma\delta$. Sed subtrahatur

commune $\alpha\zeta \cdot \gamma\delta$; ap-

paret igitur esse

$\zeta\delta \cdot \delta\gamma + \zeta\delta \cdot \delta\beta = \alpha\gamma \cdot \delta\beta$, id est compositis $\delta\gamma + \delta\beta$

* V. Simson. p. 154 sq. (Ca p. 255—257), qui ceteros quoque eiusdem propositionis casus demonstrat.

τῇ ὑπὸ $ΑΓ$ $ΑΒ$. ἔστιν δέ· ἀνάλογον γὰρ αἱ $ΑΓ$ $ΓΒ$, $ΖΔ$ $ΑΒ$ εἰαὶν εὐθεῖαι.

- 192 ἡ. Θέσει καὶ μεγέθει εὐθεῖα ἡ $ΑΒ$, καὶ τυχὸν τὸ $Γ$. ὅτι ἔστιν δοθέν ἐπὶ τῆς $ΑΒ$, ὥστε τὸ ἀπὸ $ΑΓ$ καὶ τὸ λόγον ἔχον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $ΓΒ$ δοθέντα ἴσον ἔστιν δοθέντι καὶ τῇ λόγον ἔχοντι πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς μεταξὺ τοῦ τε δοθέντος καὶ τοῦ $Γ$ δοθέντα.

Πεποιήσθω γὰρ ὡς ὁ δοθεὶς λόγος, οὕτως ἡ $ΑΔ$ πρὸς τὴν $ΑΒ$. λόγος ἄρα καὶ τῆς $ΑΔ$ πρὸς τὴν $ΑΒ$ δοθεὶς· ὥστε δοθέν ἔστιν τὸ $Δ$ σημεῖον. ἐπεὶ δὲ εὐθεῖα ἔστιν ἡ $ΑΒ$, καὶ δύο σημεῖα τὰ $Δ$ $Γ$, τὸ ἄρα ἀπὸ $ΑΓ$ καὶ τὸ λόγον ἔχον πρὸς τὸ ἀπὸ $ΓΒ$ τὸν αὐτὸν τῇ τῆς $ΑΔ$ πρὸς τὴν $ΑΒ$ ἴσον ἔστιν τῇ τε ἀπὸ $ΑΔ$ καὶ τῇ λόγον ἔχοντι πρὸς τὸ ἀπὸ $ΑΒ$ τὸν αὐτὸν τῇ τῆς $ΑΔ$ πρὸς τὴν $ΑΒ$ καὶ ἔτι τῇ λόγον ἔχοντι πρὸς τὸ ἀπὸ $ΑΓ$ τὸν αὐτὸν τῇ τῆς $ΑΒ$ πρὸς τὴν $ΒΔ$. καὶ τὸ λόγον ἔχον πρὸς τὸ ἀπὸ $ΑΒ$ τὸν αὐτὸν τῇ τῆς $ΑΔ$ πρὸς τὴν $ΒΔ$ τὸ ὑπὸ $ΑΔΒ$. τὸ ἄρα ἀπὸ $ΑΓ$ καὶ τὸ λόγον ἔχον πρὸς τὸ ἀπὸ $ΓΒ$ τὸν αὐτὸν τῇ τῆς $ΑΔ$ πρὸς τὴν $ΑΒ$, τουτέστιν δοθέντα, ἴσον ἔστιν τῇ τε ὑπὸ $ΒΑΔ$, τουτέστιν δοθέντι, καὶ τῇ λόγον ἔχοντι πρὸς τὸ ἀπὸ $ΑΓ$ τὸν αὐτὸν τῇ τῆς $ΑΒ$ πρὸς τὴν $ΒΔ$, τουτέστιν δοθέντα.

Ὅμοίως καί, ἐὰν [τὸ δοθέν] τὸ $Γ$ ἐκτὸς ἢ τῆς $ΑΒ$ εὐθείας, τῇ αὐτῇ ἀκολουθίᾳ δεῖξομεν.

4. 2. αὖτε $ΑΓ$ $ΓΒ$ καὶ $ΖΔ$ $ΑΒ$ conl. Hu 2. $ΑΒ$ Co pro $ΑΒ$
 3. ἡ add. BS καὶ μεγέθει add. Ca auctore Simsoni p. 153
 3. 4. καὶ τυχὸν τὸ $Γ$ δοθέν ἐπὶ τῆς $ΑΒ$. ὅτι τὸ ἀπὸ $ΑΓ$ cet. conl. Co
 3. δοθέντα — δοθέντι Co pro δοθέν — δοθέν 6. τῷ λόγῳ $Α(Β)$, corr. S τοῦ τε Hu, τοῦτο Α, τοῦ BS 7. καὶ τοῦ ὑπὸ $ΓΔ$ δοθέντος ABS, καὶ τοῦ ἀπὸ γδ δοθέντος Paris. 1368, καὶ τοῦ $Γ$ δοθέντος Ca, δοθέντα corr. Hu 11. τὰ $ΓΓ$ Α, distinx. BS 14. πρὸς τὸ ἀπὸ $ΑΒ$ Co pro πρὸς τὸ ἀπὸ $ΑΒ$ 13. ἔτι Co pro ἐν τῷ λόγῳ Α, corr. BS πρὸς τὸ ἀπὸ $ΑΓ$ Co, πρὸς τὸ ἀπὸ $ΑΒ$ ABS, πρὸς τὸ ἀπὸ $ΓΔ$ Ca 16. 17. καὶ τὸ λόγον — τὸ ὑπὸ $ΑΔΒ$ del. Co 16. καὶ τὸ λόγον ἔχον Ge, καὶ τῷ λόγον ἔχοντι ABS, τὸ δὲ λόγον ἔχον Ca πρὸς τὸ ἀπὸ

$\zeta\delta \cdot \gamma\beta = \alpha\gamma \cdot \delta\beta$. Est vero sic, quoniam ex constructione sunt

$$\alpha\gamma : \gamma\beta = \zeta\delta : \delta\beta.$$

VIII. Si recta $\alpha\beta$ positione et magnitudine data in ea-
que punctum quodvis γ ; dico in $\alpha\beta$ punctum datum esse ita, Prop. 126
ut summa quadrati ex $\alpha\gamma$ et spatii, quod ad quadratum ex
 $\gamma\beta$ datam proportionem habet, aequalis sit summae dati spa-
tii et eius spatii, quod ad quadratum ex segmento inter da-
tum punctum et γ alium datam proportionem habet (vel sic:
si datae proportioni aequalis fiat $\alpha\delta : \delta\beta$, ideoque datum sit et
punctum δ et rectangulum $\beta\alpha \cdot \alpha\delta$, denique si fiat spatium
 $\varepsilon : \gamma\beta^2 = \alpha\delta : \delta\beta$, et spatium $\zeta : \delta\gamma^2 = \alpha\beta : \beta\delta$, esse $\alpha\gamma^2 +$
 $\varepsilon = \beta\alpha \cdot \alpha\delta + \zeta$).

Fiat enim datae propor-
tioni aequalis $\alpha\delta : \delta\beta$; ita-
que etiam proportio $\alpha\delta : \delta\beta$

data est, datumque et punctum δ et rectangulum $\beta\alpha \cdot \alpha\delta$
(dat. 7). Porro secundum superius lemma fiat rectangulum
 $\varepsilon : \gamma\beta^2 = \alpha\delta : \delta\beta$, et rectangulum $\zeta : \delta\gamma^2 = \alpha\beta : \beta\delta$, et rec-
tangulum $\eta : \delta\beta^2 = \alpha\delta : \delta\beta$. Sed quoniam recta est $\alpha\beta$, in
eaeque duo puncta δ γ , erit propter superius lemma

$$\alpha\gamma^2 + \varepsilon = \alpha\delta^2 + \eta + \zeta.$$

Estque $\eta = \alpha\delta \cdot \delta\beta$, itaque, ut in superiore lemmate, $\alpha\delta^2 + \eta$
 $= \beta\alpha \cdot \alpha\delta$; ergo $\alpha\gamma^2 + \varepsilon = \beta\alpha \cdot \alpha\delta + \zeta$.



Similiter etiam, si punctum γ sit extra rectam $\alpha\beta$ (nempe
in producta $\alpha\beta$ ultra β , eodem tenore theorema demonstra-
bimus.

JB Ca pro πρὸς τὸ ἀπὸ $\overline{AF}$ 17. τῇ τῆς AD Ca, τὸν τῆς $\overline{AB}$ A,
τῇ τῆς $\alpha\beta$ BS 19. δοθέντα add. Ca auctore Simsono p. 455 (δοθέντα
Co), ἴσων ἐστὶν add. Co 20. τῷ λόγῳ A, corr. BS 21. τὸ ἀπὸ
 $\overline{AF}$ Co, τὸ ἀπὸ $\overline{AF}$ ABS, τὸ ἀπὸ $\overline{F\beta}$ Ca 22. δοθέντα Ca auctore
Simsono p. 455, δοθέν ABS, δοθέν Co 23. αὐτὸ τὸ δοθέν delendum
αὐτὸ τυχόν legendum esse videtur

Πορισμάτων α' β' γ'.

Τοῦ πρώτου εἰς τὸ πρῶτον πόρισμα.

- 193 α'. Ἐστω καταγραφὴ ἡ $ΑΒΓΔΕΖΗ$, καὶ ἔστω ὡς ἡ $ΑΖ$ πρὸς τὴν $ΖΗ$, οὕτως ἡ $ΑΔ$ πρὸς τὴν $ΔΓ$, καὶ ἐπε-
ξείχθω ἡ $ΘΚ$ · ὅτι παράλληλός ἐστιν ἡ $ΘΚ$ τῇ $ΑΓ$. 5



Ἦχθω διὰ τοῦ Z τῇ $ΒΔ$
παράλληλος ἡ $ΖΑ$. ἐπεὶ οὖν
ἐστὶν ὡς ἡ $ΑΖ$ πρὸς τὴν $ΖΗ$,
οὕτως ἡ $ΑΔ$ πρὸς τὴν $ΔΓ$, ἀνά-
παλιν καὶ συνθέντι καὶ ἐναλ-
λάξ ἐστὶν ὡς ἡ $ΑΔ$ πρὸς τὴν
 $ΑΖ$, τοιούτως ἐν παραλλήλοις
ὡς ἡ $ΒΔ$ πρὸς τὴν $ΑΔ$, οὕ-
τως ἡ $ΓΔ$ πρὸς τὴν $ΑΗ$ · παρ-
άλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ $ΑΗ$ τῇ
 $ΒΓ$ · ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ $ΕΒ$ πρὸς
τὴν $ΒΔ$, οὕτως ἐν παραλλήλοις

ἡ $ΕΚ$ πρὸς τὴν $ΚΖ$, καὶ ἡ $ΕΘ$ πρὸς τὴν $ΘΗ$ · καὶ ὡς ἄρα ἡ
 $ΕΚ$ πρὸς τὴν $ΚΖ$, οὕτως ἐστὶν ἡ $ΕΘ$ πρὸς τὴν $ΘΗ$ · παρ-
άλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ $ΘΚ$ τῇ $ΑΓ$. 20


- 194 Διὰ δὲ τοῦ συνημμένου οὕτως. ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ $ΑΖ$

1. $A' B' G' AB$, τρία S 3. a in A vs. 2 ante Τοῦ πρώτου ser-
vatum est, a' ante Ἐστω in BS ἡ post ὡς add. BS 15. ἄρα
ἐστὶν ἡ $ΑΗ$ AB . corr. A' super vs. S 18. καὶ ἡ $ΕΘ$ πρὸς τὴν $ΘΗ$
add. Co

LEMMATA IN PORISMATUM LIBROS I II III.

In libri primi primum porisma.

I. Sit figura $\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\zeta\eta$, sitque $\alpha\zeta : \zeta\eta = \alpha\delta : \delta\gamma$, et du- Prop. 427
catur $\vartheta\kappa$: dico parallelas esse rectas $\alpha\gamma$ $\vartheta\kappa$.



Ducatur per ζ rectae $\beta\delta$ parallela $\zeta\lambda$. Quoniam igitur est $\alpha\zeta : \zeta\eta = \alpha\delta : \delta\gamma$, e contrario est $\zeta\eta : \alpha\zeta = \delta\gamma : \alpha\delta$, et componendo $\alpha\eta : \alpha\zeta = \alpha\gamma : \alpha\delta$, et vicissim $\alpha\eta : \alpha\gamma = \alpha\zeta : \alpha\delta$, denique e contrario

$$\alpha\gamma : \alpha\eta = \alpha\delta : \alpha\zeta, \text{ id est propter parallelas } \beta\delta \text{ } \lambda\zeta \\ = \alpha\beta : \alpha\lambda.$$

Ergo parallelae sunt $\beta\gamma$ $\lambda\eta$; est igitur propter parallelas $\beta\kappa$ $\lambda\zeta$
 $\epsilon\beta : \beta\lambda = \epsilon\kappa : \kappa\zeta$, et propter parallelas $\beta\vartheta$ $\lambda\eta$
 $= \epsilon\vartheta : \vartheta\eta$;

ergo, quia $\epsilon\kappa : \kappa\zeta = \epsilon\vartheta : \vartheta\eta$, parallelae sunt $\kappa\vartheta$ $\alpha\gamma$.

Per formulam compositae proportionis sic. Quoniam est

PROPOS. 127: Simson p. 398 sq., Breton p. 219 sq., Chasles p. 74. 87. 108 sqq., Vincent p. 33 sqq. Propositionem et hanc et proximam accuratius enuntiat Simsonus; quas cum omnes repetere alienum sit ab hac editione, exempli gratia hanc unam afferamus: "Si in recta linea fuerint puncta α ζ δ η γ , ita ut $\alpha\zeta$ sit ad $\zeta\eta$, ut $\alpha\delta$ ad $\delta\gamma$, et ad rectam lineam $\alpha\beta$ inflectantur $\zeta\epsilon$ $\eta\epsilon$, et ad eandem inflectantur $\delta\beta$ $\gamma\beta$, et inflexae a punctis ζ δ sibi mutuo occurrant in κ , inflexae vero a punctis η γ occurrant in ϑ , et $\vartheta\kappa$ iungatur, erit $\kappa\vartheta$ parallela ipsi $\alpha\gamma$ ". Figurae quinque, ut hic descriptae sunt, exstant in codicibus.


$\alpha\zeta : \zeta\eta = \alpha\delta : \delta\gamma$, e contrario est $\zeta\eta : \alpha\zeta = \delta\gamma : \alpha\delta$, et componendo $\alpha\eta : \alpha\zeta = \alpha\gamma : \alpha\delta$, et vicissim $\alpha\eta : \alpha\gamma = \alpha\zeta : \alpha\delta$, et e contrariis $\alpha\gamma : \alpha\eta = \alpha\delta : \alpha\zeta$, et convertendo $\alpha\gamma : \gamma\eta = \alpha\delta : \delta\zeta$. Sed est¹⁾

$$\frac{\alpha\delta}{\delta\zeta} = \frac{\alpha\beta}{\beta\lambda} = \frac{\alpha\beta}{\beta\epsilon} \cdot \frac{\beta\epsilon}{\beta\lambda} = \frac{\alpha\beta}{\beta\epsilon} \cdot \frac{\epsilon\theta}{\theta\eta} = \frac{\alpha\beta}{\beta\epsilon} \cdot \frac{\epsilon\kappa}{\kappa\gamma};$$

et dividendo tollatur communis proportio $\alpha\beta : \beta\epsilon$; relinquitur igitur ex : $\kappa\zeta = \epsilon\theta : \theta\eta$; sunt igitur parallelæ $\kappa\theta$ et $\alpha\gamma$.

In secundum porisma.

II. Figura $\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\zeta\eta\theta$, sintque parallelæ $\alpha\zeta$ et $\delta\beta$, ac sit $\alpha\epsilon : \epsilon\zeta = \gamma\eta : \eta\zeta$; dico rectam esse quæ per θ et ζ transit. ^{Prop. 128}



Ducatur per η rectæ $\delta\epsilon$ parallelæ $\eta\lambda$, et iuncta $\theta\kappa$ producatæ ad λ . Quoniam igitur est $\alpha\epsilon : \epsilon\zeta = \gamma\eta : \eta\zeta$, vicissim est

$$\alpha\epsilon : \gamma\eta = \epsilon\zeta : \eta\zeta.$$

Sed propter parallelas $\theta\delta$ et $\eta\lambda$ est

$$\eta\lambda : \delta\theta = \eta\kappa : \kappa\delta, \text{ et propter parallelas } \delta\beta \text{ et } \gamma\eta$$

$$\eta\kappa : \kappa\delta = \gamma\eta : \beta\delta; \text{ ergo etiam}$$

$$\eta\lambda : \delta\theta = \gamma\eta : \beta\delta, \text{ et vicissim}$$

$$\eta\lambda : \gamma\eta = \delta\theta : \beta\delta, \text{ sive propter parallelas } \delta\beta \text{ et } \alpha\epsilon \\ = \theta\epsilon : \alpha\epsilon. \text{ Ergo e contrario est}$$

$$\alpha\epsilon : \epsilon\theta = \gamma\eta : \eta\lambda, \text{ et vicissim}$$

$$\alpha\epsilon : \gamma\eta = \epsilon\theta : \eta\lambda.$$


Ergo etiam (quoniam erat $\alpha\epsilon : \gamma\eta = \epsilon\zeta : \eta\zeta$) est $\epsilon\zeta : \eta\zeta = \epsilon\theta : \eta\lambda$.

¹⁾ Media argumentationis membra hoc loco ommissa facile supplentur ex priore demonstratione (p. 867).

PROPOS. 128: vide append.

παράλληλος ἡ $ΕΘ$ τῇ $ΗΑ$. εὐθεία ἄρα ἐστὶν ἡ διὰ τῶν
 $Θ Α Ζ$, τοῦτέστιν ἡ διὰ τῶν $Θ Κ Ζ$, ὅπερ: ~

- 196 γ'. Εἰς τρεῖς εὐθείας τὰς $ΑΒ ΓΑ ΔΑ$ διήχθωσαν δύο
 εὐθεῖαι αἱ $ΘΕ ΘΑ$. ὅτι ἐστὶν ὡς τὸ ὑπὸ $ΘΒ ΗΖ$ πρὸς
 τὸ ὑπὸ $ΘΗ ΖΕ$, οὕτως τὸ ὑπὸ $ΘΒ ΑΓ$ πρὸς τὸ ὑπὸ
 $ΘΑ ΒΓ$.



Ἦχθω διὰ μὲν τοῦ $Θ$
 τῇ $ΖΓΑ$ παράλληλος ἡ
 $ΚΑ$, καὶ αἱ $ΔΑ ΑΒ$ συμ-
 πιπτεύωσαν αὐτῇ κατὰ τὰ¹⁰
 $Κ Α$ σημεία, διὰ δὲ τοῦ
 $Α$ τῇ $ΔΑ$ παράλληλος ἡ
 $ΑΜ$ καὶ συμπιπτεύω τῇ
 $ΕΘ$ ἐπὶ τὸ $Μ$. ἐπεὶ οὖν
 ἐστὶν ὡς μὲν ἡ $ΕΖ$ πρὸς¹⁵
 τὴν $ΖΑ$, οὕτως ἡ $ΕΘ$ πρὸς
 τὴν $ΘΑ$, ὡς δὲ ἡ $ΑΖ$

πρὸς τὴν $ΖΗ$, οὕτως ἡ $ΘΑ$ πρὸς τὴν $ΘΜ$ (καὶ γὰρ ἡ $ΘΚ$
 πρὸς τὴν $ΘΗ$ ἐν παραλλήλῳ, δι' ἴσον ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ $ΕΖ$
 πρὸς τὴν $ΖΗ$, οὕτως ἡ $ΕΘ$ πρὸς τὴν $ΘΜ$. τὸ ἄρα ὑπὸ²⁰
 τῶν $ΘΕ ΗΖ$ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν $ΕΖ ΘΜ$. ἄλλο δέ
 τι τεχὸν τὸ ὑπὸ τῶν $ΕΖ ΘΗ$. ἐστὶν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ τῶν
 $ΕΘ ΗΖ$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $ΕΖ ΗΘ$, οὕτως τὸ ὑπὸ $ΕΖ ΘΜ$
 πρὸς τὸ ὑπὸ $ΕΖ ΗΘ$, τοῦτέστιν ἡ $ΘΜ$ πρὸς $ΘΗ$, τοῦ-
 τέστιν ἡ $ΑΘ$ πρὸς τὴν $ΘΚ$. κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡς ἡ $ΚΘ$ ²⁵
 πρὸς τὴν $ΘΑ$, οὕτως τὸ ὑπὸ $ΘΑ ΒΓ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΘΒ ΓΑ$.
 ἀνάπαλιν ἄρα γίνεται ὡς ἡ $ΑΘ$ πρὸς τὴν $ΘΚ$, οὕτως τὸ

2. $Θ Α Ζ$, τοῦτέστιν ἡ διὰ τῶν $Θ Κ Ζ$ Hu. $Θ Α Ζ Α Β$. 3. $Ζ$ add. BS
 S (conf. etiam cap. 198 extr.) ὅπερ BS, ο Α 3. γ' add. BS
 10. 11. τὰ $ΚΑ Α$, distinx. BS 12. τῇ $ΔΑ Α^2$ ex τῇ $ΑΔ$
 12. 13. ἡ $ΑΜ$ καὶ fortasse διαχθεῖσα ἡ $ΑΜ$ 18. 19. καὶ γὰρ --
 ἐν παραλλήλῳ corrupta putant Co et Ge, at vide Simson. p. 380 sq.
 22. τεχὸν; forsitan legendum sit ἔχουσι; at eadem ratione redit τεχὸν
 infra cap. 204. 205 26. ὑπὸ $ΘΑΒΓ Α$, distinx. BS 27. ἀνάπαλιν
 Co pro ἀνάλογον

Et sunt parallelæ $\epsilon\theta$ $\lambda\lambda$; recta igitur est quæ per puncta θ λ ζ , id est θ λ ζ transit, q. e. d.

III. In tres rectas lineas $\alpha\beta$ $\gamma\alpha$ $\delta\alpha$ ducantur duæ rectæ $\theta\epsilon$ $\theta\delta$; dico esse $\theta\epsilon \cdot \eta\zeta : \theta\eta \cdot \zeta\epsilon = \theta\beta \cdot \delta\gamma : \theta\delta \cdot \beta\gamma$. Prop. 129

Ducatur¹⁾ per θ rectæ $\zeta\gamma\alpha$ parallela $\lambda\lambda$, et huic rectæ $\delta\alpha$ producta occurrat in λ , itemque recta $\alpha\beta$ in λ , et per λ rectæ $\delta\alpha$ parallela ducatur $\lambda\mu$, cui $\epsilon\theta$ producta occurrat in μ . Quoniam igitur propter parallelas $\alpha\zeta$ $\lambda\theta$ est

$\epsilon\zeta : \zeta\alpha = \epsilon\theta : \theta\lambda$, et propter parallelas $\alpha\zeta$ $\lambda\theta$ et $\lambda\mu$ $\lambda\zeta$ est $\alpha\zeta : \zeta\eta = \lambda\theta : \theta\eta = \lambda\theta : \theta\mu$, itaque

$\alpha\zeta : \zeta\eta = \theta\lambda : \theta\mu$, ex aequali igitur est


$\epsilon\zeta : \zeta\eta = \epsilon\theta : \theta\mu$;

ergo $\zeta\eta \cdot \epsilon\theta = \epsilon\zeta \cdot \theta\mu$. Sed fiat proportio ad aliud rectangulum $\epsilon\zeta \cdot \theta\eta$; est igitur

$\zeta\eta \cdot \epsilon\theta : \epsilon\zeta \cdot \theta\eta = \epsilon\zeta \cdot \theta\mu : \epsilon\zeta \cdot \theta\eta$, id est
 $= \theta\mu : \theta\eta$, id est
 $= \lambda\theta : \theta\lambda$.

Eadem ratione²⁾ fit etiam $\lambda\theta : \theta\lambda = \theta\delta \cdot \beta\gamma : \theta\beta \cdot \gamma\delta$: e contrario igitur fit

* Vide supra IV cap. 21.



Etenim, ut omittamus illum trium circulorum contactum, de quo est libri IV propositio 13, in eadem propositione conversa, id est cap. 21, demonstratio deducitur ad huiusmodi lemma: Si duæ parallelæ, velut $\alpha\lambda$ $\gamma\delta$, rectam $\alpha\epsilon$ in punctis α γ secent, sitque $\alpha\lambda : \gamma\delta = \alpha\epsilon : \epsilon\gamma$, dico puncta

α δ ϵ in eadem rectâ esse. Quod illic primum ratione apagogica, tum (p. 212. 213) auxilio parallelogrammi ostenditur. Idem lemma adhibitum esse in VII libri propos. 64 et 118 supra p. 769 adnot. * et 853 adnot. 2 commemoravimus; præterea conf. infra propos. 130 sq.

PROPOS. 129: Simson p. 380 sqq., Breton p. 221 sq., Charles p. 75 sq. 82. 87 sq. 101 sq. cel., idem *Aperçu historique* p. 33 sqq. edit. Paris. secundæ (p. 34 sqq. versionis German., Baltzer *Elemente* II p. 365 sqq. edit. IV.

1) Rursus, ut supra ad propos. 127, plures figuras exhibent codices, e quibus una tantummodo scilicet secunda in cod. et apud Commandinum, quinta apud Gerhardum litterarum ordinem $\zeta\gamma\alpha$ in contextu traditum servat. Hanc igitur descripsimus; reliquarum quinque speciem satis accuratam præbet Commandinus. Sunt hi diversi eiusdem propositionis casus, at neutiquam omnes qui fingi possunt: velut septimam figuram a nobis addi necesse fuit in append. ad propos. 139. octavam in append. ad propos. 143.

2) Demonstrat hæc singillatim Simsonus p. 381 productâ $\theta\theta$ ad λ punctum concursus cum $\lambda\mu$.

ὑπὸ $\Theta B \Gamma A$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\Theta A B \Gamma$. ὡς δὲ ἡ $A \Theta$ πρὸς τὴν ΘK , οὕτως ἐδείχθη τὸ ὑπὸ $E \Theta H Z$ πρὸς τὸ ὑπὸ $E Z H \Theta$. καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ $E \Theta H Z$ πρὸς τὸ ὑπὸ $E Z H \Theta$, οὕτως τὸ ὑπὸ $\Theta B \Gamma A$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\Theta A B \Gamma$.

- 197 Διὰ δὲ τοῦ συνημμένου οὕτως. ἐπεὶ τοῦ ὑπὸ $\Theta E H Z$ ⁵ πρὸς τὸ ὑπὸ $\Theta H Z E$ συνηπται λόγος ἕκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ ΘE πρὸς τὴν $E Z$ καὶ τοῦ ὄν ἔχει ἡ $Z H$ πρὸς τὴν $H \Theta$, καὶ ἔστιν ὡς μὲν ἡ ΘE πρὸς τὴν $E Z$, οὕτως ἡ ΘA πρὸς τὴν $Z A$, ὡς δὲ ἡ $Z H$ πρὸς τὴν $H \Theta$, οὕτως ἡ $Z A$ πρὸς τὴν ΘK , τὸ ἄρα ὑπὸ $\Theta E H Z$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\Theta H Z E$ συνηπται¹⁰ ἕκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ ΘA πρὸς τὴν $Z A$ καὶ τοῦ ὄν ἔχει ἡ $Z A$ πρὸς τὴν ΘK . ὁ δὲ συνημμένος ἕκ τε τοῦ τῆς ΘA πρὸς τὴν $Z A$ καὶ τοῦ τῆς $Z A$ πρὸς τὴν ΘK ὁ αὐτός ἐστιν τῷ τῆς ΘA πρὸς τὴν ΘK . ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ $\Theta E H Z$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\Theta H Z E$, οὕτως ἡ ΘA πρὸς τὴν ΘK . διὰ¹⁵ ταῦτά καὶ ὡς τὸ ὑπὸ $\Theta A B \Gamma$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\Theta B \Gamma A$, οὕτως ἐστὶν ἡ ΘK πρὸς τὴν ΘA . καὶ ἀνάπαλιν ἐστὶν ὡς τὸ ὑπὸ $\Theta B \Gamma A$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\Theta A B \Gamma$, οὕτως ἡ ΘA πρὸς τὴν ΘK . ἦν δὲ καὶ ὡς τὸ ὑπὸ τῶν $\Theta E Z H$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\Theta H Z E$, οὕτως ἡ ΘA πρὸς τὴν ΘK . καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν²⁰ $\Theta E Z H$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\Theta H Z E$, οὕτως τὸ ὑπὸ $\Theta B \Gamma A$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\Theta A B \Gamma$.

- 198 δ'. Καταγραφὴ ἡ $AB \Gamma A E Z H \Theta K A$, ἔστω δὲ ὡς τὸ ὑπὸ $A Z B \Gamma$ πρὸς τὸ ὑπὸ $A B \Gamma Z$, οὕτως τὸ ὑπὸ $A Z A E$ πρὸς τὸ ὑπὸ $A A E Z$. ὅτι εὐθεῖά ἐστὶν ἡ διὰ τῶν $\Theta H Z$ ²⁵ σημείων.

Ἐπεὶ ἐστὶν ὡς τὸ ὑπὸ $A Z B \Gamma$ πρὸς τὸ ὑπὸ $A B \Gamma Z$, οὕτως τὸ ὑπὸ $A Z A E$ πρὸς τὸ ὑπὸ $A A E Z$, ἐναλλάξ ἐστὶν

2. 3. πρὸς τὸ ὑπὸ $E Z H \Theta A$, *distinx.* BS. Item posthuc in eodem lemmate quaternas litteras coniunctas habet A 3. ὑπὸ ante $E Z H \Theta$ add. S 7. πρὸς τὴν $E Z$ καὶ τοῦ ὄν ἔχει ἡ $Z H$ bis scripta in ABS, corr. Co 16. ταῦτά Hu pro ταῦτα 18. 19. οὕτως ἡ $A \Theta$ πρὸς τὴν ΘK τὴν δὲ καὶ A(B), corr. S 20. οὕτως ἡ ΘA πρὸς τὴν ΘK add. Ge 20. 21. καὶ ὡς — ὑπὸ τῶν $\Theta H Z E$ add. Co (in quibus τῶν ante $\Theta H Z E$ del. Ge) 22. δ' add. BS $AB \Gamma A E Z \Theta H K A$ A BS, corr. Co 24. ὑπὸ $A Z B \Gamma$ A, *distinx.* BS ὑπὸ $AB \Gamma Z$ A, *distinx.*

$\vartheta\beta \cdot \gamma\delta : \vartheta\delta \cdot \beta\gamma = \lambda\vartheta : \vartheta\alpha$; ergo secundum ea quae
modo demonstrata sunt

$$\zeta\eta \cdot \varepsilon\vartheta : \varepsilon\zeta \cdot \vartheta\eta = \vartheta\beta \cdot \gamma\delta : \vartheta\delta \cdot \beta\gamma.$$

Per formulam compositae
proportionis sic. Quoniam
est

$$\frac{\vartheta\varepsilon \cdot \eta\zeta}{\vartheta\eta \cdot \zeta\varepsilon} = \frac{\vartheta\varepsilon}{\zeta\varepsilon} \cdot \frac{\eta\zeta}{\eta\vartheta};$$

estque (propter parallelas
 $\vartheta\lambda$ $\alpha\zeta$) $\vartheta\varepsilon : \zeta\varepsilon = \vartheta\lambda : \zeta\alpha$,
et (propter parallelas $\alpha\zeta$
 $\alpha\vartheta$) $\eta\zeta : \eta\vartheta = \zeta\alpha : \vartheta\alpha$, est
igitur

$$\frac{\vartheta\varepsilon \cdot \eta\zeta}{\vartheta\eta \cdot \zeta\varepsilon} = \frac{\vartheta\lambda}{\zeta\alpha} \cdot \frac{\zeta\alpha}{\vartheta\alpha} = \frac{\vartheta\lambda}{\vartheta\alpha}.$$

Eadem ratione est etiam

$$\frac{\vartheta\delta \cdot \beta\gamma}{\vartheta\beta \cdot \gamma\delta} = \frac{\vartheta\alpha}{\vartheta\lambda}, \text{ et e contrario } \frac{\vartheta\beta \cdot \gamma\delta}{\vartheta\delta \cdot \beta\gamma} = \frac{\vartheta\lambda}{\vartheta\alpha};$$

ergo secundum ea quae modo demonstrata sunt

$$\frac{\vartheta\varepsilon \cdot \eta\zeta}{\vartheta\eta \cdot \zeta\varepsilon} = \frac{\vartheta\beta \cdot \gamma\delta}{\vartheta\delta \cdot \beta\gamma}.$$

IV. Figura $\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\zeta\eta\vartheta\kappa\lambda$, sit autem $\alpha\zeta : \beta\gamma : \alpha\beta : \gamma\zeta = \text{Prop. 430}$
 $\alpha\zeta : \delta\varepsilon : \alpha\delta : \varepsilon\zeta$; dico rectam esse quae per ϑ η ζ transit.

Quoniam est $\alpha\zeta : \beta\gamma : \alpha\beta : \gamma\zeta = \alpha\zeta : \delta\varepsilon : \alpha\delta : \varepsilon\zeta$, vicissim
igitur est

PROPOS. 130: Simson p. 382 sq., Breton p. 222 sq., Chasles p. 74 sq.
88. 102. 108 sqq., idem *Aperçu historique* p. 36. 376 sqq. (p. 33. 323 sqq.
versionis German.).

* Quattuor punctorum dispositiones, scilicet $\alpha\epsilon\delta\gamma\beta\zeta$, $\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\zeta$, $\alpha\epsilon\gamma\delta\beta\zeta$,
 $\alpha\beta\delta\gamma\epsilon\zeta$, et octo figuras exhibent codices, quas vide apud Commandinum;
quintam dispositionem $\alpha\epsilon\beta\zeta\gamma\delta$ addit Chasles; nos cum Bretono repeti-
vimus eam tantum figuram, quae secunda est in codicibus; quae quidem
una praeter punctorum seriem $\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\zeta$ etiam in altera recta ordinem
 $\vartheta\eta\zeta$ exhibet.

B, ἐπὶ $\alpha\beta$ $\zeta\eta$ S οὐτὼ A⁶BS 25. ἐπὶ $\alpha\beta$ $\zeta\eta$ A, distinx. BS, item
vs. 28 τὸν $\theta\eta\zeta$ A, distinx. BS

$$\frac{\alpha\zeta \cdot \beta\gamma}{\alpha\zeta \cdot \delta\epsilon} = \frac{\beta\gamma}{\delta\epsilon} = \frac{\alpha\beta \cdot \gamma\zeta}{\alpha\delta \cdot \epsilon\zeta} = \frac{\alpha\beta}{\alpha\delta} \cdot \frac{\gamma\zeta}{\epsilon\zeta}.$$

Sed si per κ rectae $\alpha\zeta$ parallela ducatur $\kappa\mu$, quae rectam $\beta\lambda$ secet in ν , est

$$\frac{\beta\gamma}{\delta\epsilon} = \frac{\beta\gamma}{\kappa\nu} \cdot \frac{\kappa\nu}{\kappa\mu} \cdot \frac{\kappa\mu}{\delta\epsilon}; \text{ est igitur}$$

$$\frac{\alpha\beta}{\alpha\delta} \cdot \frac{\gamma\zeta}{\epsilon\zeta} = \frac{\beta\gamma}{\kappa\nu} \cdot \frac{\kappa\nu}{\kappa\mu} \cdot \frac{\kappa\mu}{\delta\epsilon}. \quad \text{Dividendo tollatur ab altera parte}$$

proportio $\alpha\beta : \alpha\delta$, ab altera quae huic aequalis est $\kappa\nu : \kappa\mu$; relinquitur igitur

$$\frac{\gamma\zeta}{\epsilon\zeta} = \frac{\beta\gamma}{\kappa\nu} \cdot \frac{\kappa\mu}{\delta\epsilon} = \frac{\gamma\delta}{\delta\kappa} \cdot \frac{\kappa\eta}{\eta\epsilon};$$

recta igitur est quae per δ η ζ transit.

Etenim si per ϵ rectae $\delta\gamma$ parallelam ducam $\epsilon\xi$, et iuncta $\delta\eta$ producatur ad ξ , est

$$\frac{\kappa\eta}{\eta\epsilon} = \frac{\delta\kappa}{\epsilon\xi}, \text{ et } \frac{\gamma\delta}{\delta\kappa} \cdot \frac{\delta\kappa}{\epsilon\xi} = \frac{\gamma\delta}{\epsilon\xi}, \text{ itaque } \frac{\gamma\zeta}{\epsilon\zeta} = \frac{\gamma\delta}{\epsilon\xi}.$$

Et quia $\gamma\delta$ $\epsilon\xi$ parallelae sunt, recta igitur est quae per δ ξ ζ transit (hoc enim manifestum est¹); itaque etiam quae per δ η ζ transit recta est.

V. Si sit figura $\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\zeta\eta\theta$, et reliqua similiter ac supra ^{Prop. 431} (propos. 127) supponantur, sit $\alpha\delta : \delta\gamma = \alpha\beta : \beta\gamma$. Iam vero supponatur esse $\alpha\delta : \delta\gamma = \alpha\beta : \beta\gamma$; dico rectam esse quae per α η θ transit.


Ducatur per η rectae $\alpha\delta$ parallela $\kappa\lambda$, quae rectam $\epsilon\gamma$

1) Conf. supra p. 871 adnot. *.

PROPOS. 131: Breton p. 223 sq., Chasles p. 74 sq. 88. 103. 108 sqq., idem *Aperçu historique* p. 86 edit. Parisinae secundae (p. 88 versionis German.), Baltzer *Elemente II* p. 370.

ABS, corr. Co $\kappa\alpha\iota\omicron\varsigma$ V et super vs. S, κ^o ABS 44. $\tau\phi$ $\tau\eta\zeta$ $\overline{\eta\kappa}$
S cod. Co (recte $\overline{NK}$ AB), item vs. 46. $\tau\eta\nu$ $\kappa\eta$ S $\kappa\alpha\iota\omicron\varsigma$ Ge 47. $\tau\omicron\delta$
add. Hu 48. $\delta\iota\alpha$ $\tau\omicron\nu$ $\Theta\eta\kappa$ A, BS, corr. Co 19. $\kappa\eta$ BΓ $\pi\alpha\rho\alpha\lambda\lambda\eta$ -
λον ABS, corr. Co in Lat. versione $\tau\eta\nu$ E $\overline{\delta}$ Co pro $\tau\eta\nu$ E $\overline{\zeta}$
20. $\epsilon\pi\iota\zeta\epsilon\chi\theta\epsilon\iota\sigma\alpha$ η Hu auctore Co pro $\epsilon\pi\iota\zeta\epsilon\chi\theta\epsilon\iota\sigma\eta\varsigma$ $\tau\eta\varsigma$ 23. $\mu\epsilon\tau\alpha$ -
 $\beta\alpha\lambda\lambda\epsilon\tau\alpha\iota$ Hu auctore Co pro $\mu\epsilon\tau\alpha\beta\alpha\lambda\lambda\omicron\mu\epsilon\tau\omicron\varsigma$ $\epsilon\iota\varsigma$ $\tau\omicron$ $\tau\eta\varsigma$ AB, corr. S
25. $\pi\rho\omicron\varsigma$ $\tau\eta\nu$ E $\overline{\delta}$ Co pro $\pi\rho\omicron\varsigma$ $\tau\eta\nu$ $\Theta\zeta$ 26. $\tau\omicron\nu$ $\Theta\zeta\zeta$ A, distinx.
BS 27. $\tau\omicron\nu$ $\Theta\eta\zeta$ A, distinx. BS 28. ϵ' add. BS 31. $\tau\omicron\nu$
 $\overline{A\eta\theta}$ A, distinx. BS

οὕτως ὡς ἡ $ΑΔ$ πρὸς τὴν $ΑΓ$, οὕτως ἡ $ΑΒ$ πρὸς τὴν $ΒΓ$, ἀλλ' ὡς μὲν ἡ $ΑΔ$ πρὸς τὴν $ΑΓ$, οὕτως ἡ $ΚΑ$ πρὸς τὴν $ΑΗ$, ὡς δὲ ἡ $ΑΒ$ πρὸς τὴν $ΒΓ$, οὕτως ἡ $ΚΗ$ πρὸς τὴν $ΗΜ$, καὶ ὡς ἄρα ἡ $ΚΑ$ πρὸς τὴν $ΑΗ$, οὕτως ἡ $ΚΗ$ πρὸς τὴν $ΗΜ$, καὶ λοιπὴ ἡ $ΗΑ$ πρὸς λοιπὴν τὴν $ΑΜ$ ἐστὶν ὡς ἡ $ΚΑ$ πρὸς τὴν $ΑΗ$, τουτέστιν ὡς ἡ $ΑΔ$ πρὸς τὴν $ΑΓ$. ἐναλλάξ ἐστὶν ὡς ἡ $ΑΔ$ πρὸς τὴν $ΗΑ$, οὕ-




τως ἡ $ΓΔ$ πρὸς τὴν $ΑΜ$, τουτέστιν ἡ $ΑΘ$ πρὸς $ΘΑ$. καὶ ἔστι παραλλήλος ἡ $ΗΑ$ τῇ $ΑΔ$. εὐθεία ἄρα ἐστὶν ἡ διὰ τῶν $Α Η Θ$ σημείων· τοῦτο γὰρ φανερόν. 15

200 ὥ. Πάλιν ἐὰν ἡ καταγραφὴ, καὶ παραλλήλος ἡ $ΑΖ$ τῇ $ΒΓ$, γίνεται ἴση ἡ $ΑΒ$ τῇ $ΒΓ$. ἔστω οὖν ἴση· ὅτι παραλλήλος.

Ἔστιν δέ· ἐὰν γὰρ ἐπὶ τῆς $ΕΒ$ θῶ τῇ $ΗΒ$ ἴσην τὴν $ΒΘ$, καὶ ἐπιζεύξω τὰς $ΑΘ ΘΓ$, γίνεται παραλληλόγραμμον 20 τὸ $ΑΘΓΗ$, καὶ διὰ τοῦτο ἐστὶν ὡς ἡ $ΑΔ$ πρὸς τὴν $ΑΕ$, οὕτως ἡ $ΓΖ$ πρὸς τὴν $ΖΕ$ (κατέρων γὰρ τῶν εἰρημένων ὁ αὐτός ἐστιν τῷ τῆς $ΘΗ$ πρὸς τὴν $ΗΕ$ λόγος), ὥστε παραλλήλως ἐστὶν ἡ $ΑΖ$ τῇ $ΑΓ$.

201 ὥ. Ἔστω καταγραφὴ, καὶ τῶν $ΑΒ ΒΓ$ μέσθι ἀνάλογον 25


ἔστω ἡ $ΒΑ$ · ὅτι παραλλήλως ἐστὶν ἡ $ΖΗ$ τῇ $ΑΓ$.



Ἐκβεβλήσθω ἡ $ΕΒ$, καὶ διὰ τοῦ $Α$ τῇ $ΑΖ$ εὐθείᾳ παραλλήλος ἤχθω ἡ $ΑΚ$, καὶ 30 ἐπεζεύχθω ἡ $ΓΚ$. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ἡ $ΓΒ$ πρὸς τὴν $ΒΑ$, οὕτως ἡ $ΑΒ$ πρὸς τὴν $ΒΔ$, ὡς δὲ ἡ $ΑΒ$ πρὸς τὴν $ΒΔ$, οὕτως ἡ $ΚΒ$ πρὸς τὴν $ΒΘ$, καὶ 35 ὡς ἄρα ἡ $ΓΒ$ πρὸς τὴν $ΒΑ$,

οὕτως ἡ $ΚΒ$ πρὸς τὴν $ΒΘ$ · παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ $ΑΘ$ τῇ $ΚΓ$. ἔστιν οὖν πάλιν ὡς ἡ $ΑΖ$ πρὸς τὴν $ΖΕ$, οὕτως ἡ $ΓΗ$ πρὸς τὴν $ΗΕ$ · ἐκατέρων γὰρ τῶν εἰρημένων λόγος ὁ αὐτός ἐστιν τῷ τῆς $ΚΘ$ πρὸς τὴν $ΘΕ$, ὥστε παράλληλός ἐστιν ἡ $ΖΗ$ τῇ $ΑΓ$. 5

- 202 γ'. Ἐστω βωμίσκος ὁ $ΑΒΓΑΕΖΗ$, καὶ ἔστω παράλληλος ἡ μὲν $ΑΕ$ τῇ $ΒΓ$, ἡ δὲ $ΕΗ$ τῇ $ΒΖ$ · ὅτι καὶ ἡ $ΑΖ$ τῇ $ΓΗ$ παράλληλός ἐστιν.



Ἐπεξεύχθωσαν αἱ $ΒΕ$ $ΑΓ$ $ΖΗ$ · ἴσον ἄρα ἐστὶν ¹⁰ τὸ $ΔΒΕ$ τρίγωνον τῷ $ΔΓΕ$ τριγώνῳ· κοινὸν προσκείσθω τὸ $ΔΑΕ$ τριγώνον· ὅλον ἄρα τὸ $ΑΒΕ$ τρίγωνον ὅλῳ τῷ $ΓΑΔ$ τριγώνῳ ¹⁵ ἴσον ἐστὶν· πάλιν ἐπεὶ παράλληλός ἐστιν ἡ $ΒΖ$ τῇ $ΕΗ$, ἴσον ἐστὶν τὸ $ΒΖΕ$ τρίγωνον τῷ $ΒΖΗ$ τρι-

γώνῳ· κοινὸν ἀφηρεῖσθαι τὸ $ΑΒΖ$ τρίγωνον· λοιπὸν ἄρα τὸ ²⁰ $ΑΒΕ$ τρίγωνον λοιπῷ τῷ $ΑΗΖ$ τριγώνῳ ἴσον ἐστὶν· ἀλλὰ τὸ $ΑΒΕ$ τρίγωνον τῷ $ΑΓΔ$ τριγώνῳ ἐστὶν ἴσον· καὶ τὸ $ΑΓΔ$ ἄρα τρίγωνον τῷ $ΑΖΗ$ τριγώνῳ ἴσον ἐστὶν· κοινὸν προσκείσθαι τὸ $ΑΓΗ$ τρίγωνον· ὅλον ἄρα τὸ $ΓΑΗ$ τρίγωνον ὅλῳ τῷ $ΓΖΗ$ τριγώνῳ ἴσον ἐστὶν· καὶ ἔστιν ἐπὶ τῆς αὐ- ²⁵ τῆς βάσεως τῆς $ΓΗ$ · παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ $ΓΗ$ τῇ $ΑΖ$.

- 203 δ'. Ἐστω τρίγωνον τὸ $ΑΒΓ$, καὶ ἐν αὐτῷ διήχθωσαν αἱ $ΑΔ$ $ΑΕ$, καὶ τῇ $ΒΓ$ παράλληλος ἦχθω ἡ $ΖΗ$, καὶ κεκλάσθω ἡ $ΖΘΗ$, ἔστω δὲ ὡς ἡ $ΒΘ$ πρὸς τὴν $ΘΓ$, οὕτως ἡ $ΑΘ$ πρὸς τὴν $ΘΕ$ · ἦτι παράλληλός ἐστιν ἡ $ΚΑ$ τῇ $ΒΓ$. ³⁰

Ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὡς ἡ $ΒΘ$ πρὸς τὴν $ΘΓ$, οὕτως ἡ $ΑΘ$ πρὸς τὴν $ΘΕ$, λοιπὴ ἄρα ἡ $ΒΔ$ πρὸς λοιπὴν τὴν $ΓΕ$ ἐστὶν ὡς ἡ $ΑΘ$ πρὸς τὴν $ΘΕ$ · ὡς δὲ ἡ $ΒΔ$ πρὸς τὴν $ΕΓ$, οὕτως

1. ἡ $ΑΘ$ Co pro ἡ $ΑΘ$

2. πρὸς τὴν $ΖΕ$ Co pro πρὸς τὴν $ΖΓ$

3. ἐκατέρων $Ημ$, ἐκατέρω $ΑΒΣ$

4. πρὸς τὴν $ΘΕ$ Co pro πρὸς τὴν

$= \kappa\beta : \beta\theta$; ergo parallelae sunt $\alpha\theta$ xy (propter similitudinem triangulorum $\alpha\beta\theta$ $\gamma\beta\kappa$). Iam rursus est $\alpha\zeta : \zeta\epsilon = \gamma\eta : \eta\epsilon$ (utraque enim proportio est $= \kappa\theta : \theta\epsilon$), itaque parallelae sunt $\zeta\eta$ $\alpha\gamma$.

VIII. Sit figura arae inaequalibus lateribus exstructae ^{Prop. 124} similis, quae *ῥωμύλοχος* vocatur¹⁾, in eaque $\delta\epsilon$ parallela rectae $\beta\gamma$, et $\epsilon\eta$ rectae $\beta\zeta$; dico etiam $\delta\zeta$ rectae $\gamma\eta$ parallelam esse.

Iungantur $\beta\delta$ $\delta\gamma$ $\zeta\eta$; ergo triangulum $\delta\epsilon\beta$ aequale est triangulo $\delta\epsilon\gamma$. Commune addatur $\delta\epsilon\alpha$ triangulum; totum igitur $\alpha\beta\epsilon$ triangulum toti $\alpha\gamma\delta$ triangulo aequale est. Rursus quia $\beta\zeta$ $\epsilon\eta$ parallelae sunt, aequalia sunt triangula $\beta\zeta\epsilon$ $\beta\zeta\eta$. Commune subtrahatur $\beta\zeta\alpha$ triangulum; reliquum igitur $\alpha\beta\epsilon$ triangulum reliquo $\alpha\eta\zeta$ aequale est. Sed erat triangulum $\alpha\beta\epsilon$ aequale triangulo $\alpha\gamma\delta$; ergo etiam triangulum $\alpha\gamma\delta$ triangulo $\alpha\eta\zeta$ aequale est. Commune addatur $\alpha\gamma\eta$ triangulum; ergo totum $\gamma\delta\eta$ toti $\gamma\zeta\eta$ aequale est. Et sunt haec triangula in eadem basi $\gamma\eta$; ergo $\delta\zeta$ rectae $\gamma\eta$ parallela est.

IX. Sit triangulum $\alpha\beta\gamma$, in eoque ducantur rectae $\alpha\delta$ $\alpha\epsilon$, ^{Prop. 135} et rectae $\beta\gamma$ parallela ducatur $\zeta\eta$, et a rectae $\delta\epsilon$ puncto θ ducantur $\theta\zeta$ $\theta\eta$, sitque $\beta\theta : \theta\gamma = \delta\theta : \theta\epsilon$; dico parallelam esse $\kappa\lambda$ rectae $\beta\gamma$.

Quoniam est $\beta\theta : \theta\gamma = \delta\theta : \theta\epsilon$, per subtractionem proportionis igitur est $\beta\delta : \epsilon\gamma = \delta\theta : \theta\epsilon$. Sed propter paralle-


PROPOS. 134: Breton p. 224 sq., Chasles p. 78. 89. 119 sq., idem *Aperçu historique* p. 26 (p. 34 versionis German.).

1) Distinctius, ut videtur, scriptor dicere potuit "sint duo triangula, inaequali altitudine, $\beta\zeta\gamma$ $\beta\eta\gamma$, sitque $\eta\epsilon \parallel \zeta\delta$, et $\epsilon\delta \parallel \gamma\beta$ " etc.; sed brevitalis causa, figuram plene constructam intuens, *ῥωμύλοχος* (vid. ind.) praetulit. Propria quae sit lemmatis ratio, docet Chasles ad porisma XVIII.

PROPOS. 135: Breton p. 225, Chasles p. 78. 89 sq. 108 sqq. 120 sq.

BΘ 5. $\tau\eta$ AF Bretonus pro $\tau\eta\epsilon$ $A.1$ 6. η' add. BS δ ABS. η Ge 17. 18. $\tau\eta$ BZ η EH conl. Hu 20. $\acute{\alpha}\mu\alpha\iota\eta\sigma\theta\omega$ A, corr. BS 22. 23. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$ $\acute{\iota}\sigma\omega\nu$ — $\tau\omega\iota$ AZH $\tau\epsilon\mu\gamma\acute{\alpha}\nu\omega\iota$ om. A¹, add. A² in marg. (BS) 26. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$ $\tau\eta$ FI η AZ conl. Hu 27. θ' add. BS 29. η $Z\Theta H$ Co pro η ZH 32. $\lambda\omicron\iota\pi\acute{o}\nu$ $\acute{\alpha}\rho\alpha$ A, corr. BS

ἐστὶν ἡ ZM πρὸς NH · καὶ ὥς ἄρα ἡ ZM πρὸς NH , οὕτως
 ἐστὶν ἡ $\Delta\Theta$ πρὸς τὴν ΘE . ἐναλλάξ ἐστὶν ὥς ἡ ZM πρὸς
 τὴν $\Delta\Theta$, οὕτως ἡ NH πρὸς τὴν
 ΘE . ἀλλ' ὥς μὲν ἡ ZM πρὸς
 τὴν $\Delta\Theta$, οὕτως ἐστὶν ἐν παραλ-
 λήλῳ ἡ ZK πρὸς τὴν $K\Theta$, ὥς
 δὲ ἡ NH πρὸς τὴν ΘE , οὕτως
 ἐστὶν ἡ HA πρὸς τὴν $\Delta\Theta$, καὶ
 ὥς ἄρα ἡ ZK πρὸς τὴν $K\Theta$, οὕ-
 τως ἐστὶν ἡ HA πρὸς τὴν $\Delta\Theta$ · 10
 παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ KA
 τῇ HZ , ὥστε καὶ τῇ $ΓB$.



- 204 ε'. Εἰς δύο εὐθείας τὰς BAE AAH ἀπὸ τοῦ Θ ση-
 μείνουν δύο διήχθωσαν εὐθεῖαι αἱ $\Delta\Theta$ ΘE , ἔστω δὲ ὥς τὸ
 ἐπὶ τῶν $\Delta\Theta$ $BΓ$ πρὸς τὸ ἐπὶ $\Delta Γ B\Theta$, οὕτως τὸ ἐπὶ ΘH 15
 ZE πρὸς τὸ ἐπὶ ΘE ZH · ὅτι εὐθεία ἐστὶν ἡ διὰ τῶν
 $\Gamma A Z$.

Ἦχθω διὰ τοῦ Θ τῇ ΓA παράλληλος ἡ KA καὶ συμ-
 μετρίτω ταῖς AB AA κατὰ τὰ $K A$ σημεία, καὶ διὰ τοῦ
 A τῇ AA παράλληλος ἤχθω ἡ AM , καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ 20
 $E\Theta$ ἐπὶ τὸ M , διὰ δὲ τοῦ K τῇ AB παράλληλος ἤχθω ἡ
 KN , καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ $\Delta\Theta$ ἐπὶ τὸ N . ἐπεὶ οὖν διὰ τὰς
 παραλλήλους γίνεται ὥς ἡ $\Delta\Theta$ πρὸς τὴν ΘN , οὕτως ἡ $\Delta Γ$
 πρὸς τὴν ΓB , τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν $\Delta\Theta$ ΓB ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ
 τῶν $\Delta Γ$ ΘN . ἄλλο δὲ τι τεχὸν τὸ ὑπὸ $\Delta Γ B\Theta$ · ἐστὶν 25
 ἄρα ὥς τὸ ἐπὶ $\Delta\Theta$ $BΓ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\Delta Γ B\Theta$, οὕτως τὸ
 ἐπὶ ΓA ΘN πρὸς τὸ ὑπὸ $\Delta Γ B\Theta$, τουτέστιν ἡ ΘN πρὸς


1. καὶ ὥς — πρὸς NH add. Co 8—10. καὶ ὥς ἄρα — πρὸς
 τὴν $\Delta\Theta$ quater scripta sunt in A, bis in S, semel in V (Item B)

13. ε' add. BS 15. διήχθω A, corr. BS 16. 17. τὸ ἐπὶ $\Theta E ZH$
 — τῶν $\Gamma A Z$ A, distinct. BS 19. τὰ $K A$ A, distinct. BS 22. ἐκβε-
 βλήσθω Hu pro ἐκβλήθη 23. 23. τὰς παραλλήλας (sine acc. A, τὰ
 παραλλήλα B, corr. S 24. 23. τοῖς ὑπὸ τῶν $\Gamma\Theta H A$ BS), corr. Co
 in Lat. versions 25. τεχὸν] conf. supra ad p. 870, 22 27. ἐπὶ
 $\Gamma A \Theta N$ A, distinct. BS; Item posthac in eodem lommate ac perinde in

ΘΒ. ἀλλ' ὥς μὲν τὸ ἐπὶ $\Theta\Delta$ $B\Gamma$ πρὸς τὸ ἐπὶ $\Delta\Gamma$ $B\Theta$, ὑπόκειται τὸ ἐπὶ $\Theta\eta$ ZE πρὸς τὸ ἐπὶ $\Theta\epsilon$ $Z\eta$, ὥς δὲ ἡ $\Theta\eta$ πρὸς $\Theta\beta$, οὕτως ἡ $K\Theta$ πρὸς $\Theta\Delta$, τοιτέστιν ἐν παραλλήλῃ ἡ $H\Theta$ πρὸς τὴν $\Theta\mathcal{M}$, τοιτέστιν τὸ ἐπὶ $\Theta\eta$ ZE πρὸς τὸ ἐπὶ $\Theta\mathcal{M}$ ZE . καὶ ὥς ἄρα τὸ ἐπὶ $\Theta\eta$ ZE πρὸς τὸ ἐπὶ $\Theta\epsilon$ $Z\eta$, οὕτως ἐστὶν τὸ ἐπὶ $\Theta\eta$ ZE πρὸς τὸ ἐπὶ $\Theta\mathcal{M}$ ZE . ἴσον ἄρα ἐστὶν τὸ ἐπὶ $\Theta\epsilon$ $Z\eta$ τῷ ἐπὶ $\Theta\mathcal{M}$ ZE . καὶ ὥς ἄρα ἡ $\Theta\mathcal{M}$ πρὸς τὴν $\Theta\epsilon$, οὕτως ἡ HZ πρὸς τὴν ZE . συνθέντι καὶ ἐναλλάξ ἐστὶν ὥς ἡ ME πρὸς τὴν EH , οὕτως ἡ $\Theta\epsilon$ πρὸς τὴν EZ . ἀλλ' ὥς ἡ ME πρὸς τὴν EH , οὕτως ἐστὶν ἡ AE πρὸς τὴν EA . καὶ ὥς ἄρα ἡ AE πρὸς τὴν EA , οὕτως ἡ $\Theta\epsilon$ πρὸς τὴν EZ . παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ AZ τῇ KA . ἀλλὰ καὶ ἡ ΓA . εὐθεῖα ἄρα ἐστὶν ἡ ΓAZ , ὅπερ: ~

Τὰ δὲ πτωπικὰ αὐτοῦ ὁμοίως τοῖς προγεγραμμένοις, ¹⁵ ὧν ἐστὶν ἀναστρόφιον.

- 205 **ια'.** Τρίγωνον τὸ $AB\Gamma$, καὶ τῇ $B\Gamma$ παράλληλος ἡ AA , καὶ διαχθεῖσα ἡ AE τῇ $B\Gamma$ συμμιπτεύω κατὰ τὸ E σημείον· ὅτι ἐστὶν ὥς τὸ ἐπὶ AE $Z\eta$ πρὸς τὸ ἐπὶ EZ HA , οὕτως ἡ ΓB πρὸς τὴν BE . 20



Ἦχθω διὰ τοῦ Γ τῇ AE παράλληλος ἡ $\Gamma\Theta$, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ AB ἐπὶ τὸ Θ . ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὥς ἡ ΓA πρὸς τὴν $A\eta$, οὕτως ἡ $\Gamma\Theta$ πρὸς τὴν $Z\eta$, ὥς δὲ ἡ ΓA πρὸς τὴν $A\eta$, οὕτως ἐστὶν ἡ $E\mathcal{A}$ πρὸς τὴν $A\eta$, καὶ ὥς ἄρα ἡ $E\mathcal{A}$ πρὸς τὴν $A\eta$, οὕτως ἐστὶν ἡ $\Theta\Gamma$ πρὸς τὴν $Z\eta$. τὸ ἄρα ἐπὶ $\mathcal{A}\eta$ $Z\eta$ ἴσον ἐστὶν τῷ ἐπὶ $E\mathcal{A}$ $Z\eta$. ἄλλο δὲ τι τυχόν τὸ ἐπὶ EZ HA · ἐστὶν ἄρα ὥς τὸ ἐπὶ AE $Z\eta$ πρὸς

Sed ex hypothesi est $\delta\theta \cdot \beta\gamma : \delta\gamma \cdot \beta\theta = \theta\eta \cdot \zeta\epsilon : \theta\epsilon \cdot \zeta\eta$, est-
que propter parallelas $\nu\kappa \lambda\beta$

$\theta\nu : \beta\theta = \kappa\theta : \theta\lambda$, id est propter parallelas $\tau\chi \lambda\mu$

$= \eta\theta : \theta\mu$, id est

$= \theta\eta \cdot \zeta\epsilon : \theta\mu \cdot \zeta\epsilon$; ergo etiam

$\theta\eta \cdot \zeta\epsilon : \theta\epsilon \cdot \zeta\eta = \theta\eta \cdot \zeta\epsilon : \theta\mu \cdot \zeta\epsilon$; itaque

$\theta\epsilon \cdot \zeta\eta = \theta\mu \cdot \zeta\epsilon$; ergo etiam

$\theta\mu : \theta\epsilon = \eta\zeta : \zeta\epsilon$. Componendo est

$\mu\epsilon : \theta\epsilon = \epsilon\eta : \epsilon\zeta$, et vicissim

$\mu\epsilon : \epsilon\eta = \theta\epsilon : \epsilon\zeta$. Sed propter parallelas $\lambda\mu$
 $\alpha\eta$ est

$\mu\epsilon : \epsilon\eta = \lambda\epsilon : \epsilon\alpha$; ergo etiam

$\lambda\epsilon : \epsilon\alpha = \theta\epsilon : \epsilon\zeta$;

ergo parallelæ sunt $\alpha\zeta$ et $\lambda\theta$ sive $\lambda\kappa$. Sed ex constructione
etiam $\gamma\alpha \lambda\chi$ parallelæ sunt; ergo recta est quæ per γ α ζ
transit, q. e. d.


Casus huius lemmatis, quod est reciprocum ad lemma III,
similiter se habent ac supra (propos. 129 adnot. 1).

XI. Sit triangulum $\alpha\beta\gamma$, et rectæ $\beta\gamma$ parallela $\alpha\delta$, et Prop.
ducatur $\delta\epsilon$, quæ rectas $\alpha\gamma$ $\alpha\beta$ secet in η ζ ac cum $\beta\gamma$ pro-
ductâ concurrat in puncto ϵ ; dico esse $\epsilon\delta \cdot \zeta\eta : \epsilon\zeta \cdot \eta\delta =$
 $\gamma\beta : \beta\epsilon$. 137

Ducatur per γ rectæ $\delta\epsilon$ parallela $\gamma\theta$, et $\alpha\beta$ producat
ad θ . Iam quia propter parallelas $\gamma\theta$ $\eta\zeta$ est $\gamma\alpha : \alpha\eta =$
 $\gamma\theta : \zeta\eta$, et propter parallelas $\epsilon\gamma$ $\alpha\delta$ est $\gamma\alpha : \alpha\eta = \epsilon\delta : \delta\eta$,
est igitur etiam $\epsilon\delta : \delta\eta = \gamma\theta : \zeta\eta$, itaque $\gamma\theta \cdot \delta\eta = \epsilon\delta \cdot \zeta\eta$.
Sed fiat proportio ad aliud rectangulum $\epsilon\zeta \cdot \eta\delta$; est igitur

PROPOS. 137: Simson p. 411 sq., Breton p. 227, Chasles p. 75 sq.
82, 90, 114 sq. cet., idem *Aperçu historique* p. 34 (p. 34 sq. versionis
German.).

13. ἀλλὰ καὶ ἡ $\overline{\Gamma\Gamma}$ ABS, corr. Co in Lat. versione 13. 14. ἡ $\overline{\Gamma\Lambda\Omega}$
O A, corr. V (ἡ $\overline{\gamma\alpha\zeta}$. ὁπερ εἶδει B'S) 17. τα', sed id ante Τα δὲ
πρωτικὰ, add. BS 19. πρὸς τὸ ἐπὶ εἰς ἡλ S cod. Co (recte $\overline{EZ \overline{H\Gamma}}$
AB), item p. 384, 5



τὸ ὑπὸ $\Delta\text{H}\text{E}\text{Z}$, οὕτως τὸ ὑπὸ $\Gamma\Theta$
 ΔH πρὸς τὸ ὑπὸ $\Delta\text{H}\text{E}\text{Z}$, τουτέστιν
 ἢ $\Gamma\Theta$ πρὸς EZ , τουτέστιν ἢ ΓB
 πρὸς BE . ἔστιν οὖν ὡς τὸ ὑπὸ ΔE
 ZH πρὸς τὸ ὑπὸ $\text{E}\text{Z}\text{H}\Delta$, οὕτως ἢ
 ΓB πρὸς BE . τὰ δ' αὐτὰ καὶ ἐπὶ
 τὰ ἕτερα μέρη ἀχθῇ ἢ $\Delta\Delta$ παρά-
 λλος, καὶ ἀπὸ τοῦ Δ ἐκτὸς τοῦ Γ
 ἀχθῇ ἢ ΔE .

206 ιβ'. Αποδεδειγμένων νῦν τούτων ἔσται δεῖξαι ὅτι, ἐὰν 10
 παράλληλοι ὡσιν αἱ $\text{AB}\text{Γ}\Delta$, καὶ εἰς αὐτὰς ἐμπίπτωσιν
 εὐθεῖαι τινες αἱ $\Delta\Delta\text{AZ}\text{B}\Gamma\text{B}\text{Z}$, καὶ ἐπιξαναθῶσιν αἱ $\text{E}\Delta$
 $\text{E}\Gamma$, [ὅτι] γίνεται εὐθεῖα ἢ διὰ τῶν HMK .


Ἐπεὶ γὰρ τρίγωνον τὸ ΔAZ , καὶ τῇ ΔZ παράλληλος
 ἢ ΔE , καὶ διῆκται ἢ $\text{E}\Gamma$ συμπέπουσα τῇ ΔZ κατὰ τὸ Γ , 15
 διὰ τὸ προγεγραμμένον γίνεται ὡς ἢ ΔZ πρὸς τὴν $\text{Z}\Gamma$,
 οὕτως τὸ ὑπὸ $\Gamma\text{E}\text{H}\Theta$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\Gamma\text{H}\text{ΘE}$. πάλιν ἐπεὶ
 τρίγωνόν ἐστιν τὸ ΓBZ , καὶ τῇ $\Gamma\Delta$ παράλληλος ἵκται ἢ BE ,
 καὶ διῆκται ἢ ΔE συμπέπουσα τῇ $\Gamma\Delta$ κατὰ τὸ Δ , γί-
 νεται ὡς ἢ ΓZ πρὸς τὴν $\text{Z}\Delta$, οὕτως τὸ ὑπὸ $\Delta\text{E}\text{A}\text{K}$ πρὸς 20
 τὸ ὑπὸ $\Delta\text{K}\text{A}\text{E}$. ἀνάπαλιν ἄρα γίνεται ὡς ἢ ΔZ πρὸς τὴν
 $\text{Z}\Gamma$, οὕτως τὸ ὑπὸ $\Delta\text{K}\text{A}\text{E}$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\Delta\text{E}\text{A}\text{K}$. ἦν δὲ
 καὶ ὡς ἢ ΔZ πρὸς τὴν $\text{Z}\Gamma$, οὕτως τὸ ὑπὸ $\Gamma\text{E}\text{H}\Theta$ πρὸς
 τὸ ὑπὸ $\Gamma\text{H}\text{ΘE}$. καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ $\Gamma\text{E}\text{H}\Theta$ πρὸς τὸ ὑπὸ
 $\Gamma\text{H}\text{ΘE}$, οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ $\Delta\text{K}\text{A}\text{E}$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\Delta\text{E}\text{K}\Delta$ 25
 [ἀνήκται εἰς τὸ πρὸ ἐνός]. ἐπεὶ οὖν εἰς δύο εὐθείας τὰς
 $\Gamma\text{M}\Delta\text{A}\text{M}\Theta$ δύο εὐθεῖαι διηγμέναι εἰσὶν αἱ $\text{E}\Gamma\text{E}\Delta$, καὶ
 ἔστιν ὡς τὸ ὑπὸ $\Gamma\text{E}\text{H}\Theta$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\Gamma\text{H}\text{ΘE}$, οὕτως τὸ
 ὑπὸ $\Delta\text{K}\text{E}\Delta$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\Delta\text{E}\text{A}\text{K}$, εὐθεῖα ἄρα ἐστὶν ἢ
 διὰ τῶν HMK . τοῦτο γὰρ προσδέδεται. 30

8. 9. ἐκτὸς ὡς ἐπὶ τὸ Γ διὰ τὴν εὐθεῖαν ABS , ἐκτὸς τοῦ Γ ὡς ἐπὶ
 τὸ E ἀχθῇ ἢ $\Delta\text{E}\text{Co}$, in quibus ὡς ἐπὶ τὸ E del. Hu 10. ιβ' add.
 BS νῦν del. B¹, οὖν conl. Hu 18. ὅτι del. Hu (superius ὅτι
 ante ἐὰν del. Go) τῶν $\text{H}\text{M}\text{K}\text{A}$, distinx. BS 18. τῇ ΓZ παρ-
 ἄλληλος conl. Hu 26. ἀνήκται εἰς τὸ πρὸ ἐνός del. Hu (lemma de-
 cimum significavit interpolator) 26. 27. τὰς $\text{FM}\Delta\text{ABS}$, corr. Co in

$$\begin{aligned} \epsilon\delta \cdot \zeta\eta : \epsilon\zeta \cdot \eta\delta &= \gamma\vartheta \cdot \delta\eta : \epsilon\zeta \cdot \eta\delta, \text{ id est} \\ &= \gamma\vartheta : \epsilon\zeta, \text{ id est propter parallelas } \gamma\vartheta \zeta\epsilon \\ &= \gamma\beta : \beta\epsilon. \end{aligned}$$

Eadem ratione, si ad contrariam partem ducatur $\alpha\delta$ parallela rectae $\beta\gamma$, et a δ extra γ ducatur $\delta\epsilon$, eique parallela $\beta\vartheta$, demonstratur esse $\epsilon\delta \cdot \zeta\eta : \epsilon\zeta \cdot \eta\delta = \beta\gamma : \gamma\epsilon$.

XII. Iam his demonstratis ostendendum erit, si parallelae Prop. 138
sint $\alpha\beta \gamma\delta$, et in eas incident quaedam rectae $\alpha\delta \alpha\zeta \beta\gamma \beta\zeta$, quarum $\alpha\delta \beta\gamma$ concurrant in μ^* , et a quovis rectae $\alpha\beta$ puncto inter α et β sumpto ducantur $\epsilon\gamma \epsilon\delta$, quarum $\epsilon\gamma$ cum $\alpha\zeta$ concurrat in η et $\epsilon\delta$ cum $\beta\zeta$ in χ , rectam esse quae per $\eta \mu \chi$ transit.



Quoniam enim triangulum est $\delta\alpha\zeta$, et rectae $\delta\zeta$ parallela $\alpha\epsilon$, et ducta est $\epsilon\gamma$ cum $\delta\zeta$ producta concurrens in γ , propter superius lemma XI fit $\delta\zeta : \zeta\gamma = \gamma\epsilon \cdot \eta\vartheta : \gamma\eta \cdot \vartheta\epsilon$. Rursus quia est triangulum $\gamma\beta\zeta$, et rectae $\gamma\zeta$ parallela $\epsilon\beta$, et ducta est $\epsilon\delta$ cum recta $\gamma\zeta$ producta concurrens in δ , fit $\gamma\zeta : \zeta\delta = \delta\epsilon \cdot \chi\lambda : \delta\chi \cdot \lambda\epsilon$. E contrario igitur est

$$\begin{aligned} \delta\zeta : \zeta\gamma &= \delta\chi \cdot \lambda\epsilon : \delta\epsilon \cdot \chi\lambda. \text{ Sed erat etiam} \\ \delta\zeta : \zeta\gamma &= \gamma\epsilon \cdot \eta\vartheta : \gamma\eta \cdot \vartheta\epsilon; \text{ ergo etiam} \\ \gamma\epsilon \cdot \eta\vartheta : \gamma\eta \cdot \vartheta\epsilon &= \delta\chi \cdot \lambda\epsilon : \delta\epsilon \cdot \chi\lambda. \end{aligned}$$


Iam quia in duas rectas $\gamma\mu\lambda$ $\delta\mu\vartheta$ duae rectae $\epsilon\gamma$ $\epsilon\delta$ ductae sunt, estque $\gamma\epsilon \cdot \eta\vartheta : \gamma\eta \cdot \vartheta\epsilon = \delta\chi \cdot \lambda\epsilon : \delta\epsilon \cdot \chi\lambda$, recta igitur est quae per $\eta \mu \chi$ transit; hoc enim supra lemma X demonstratum est.

PROPOS. 138: Simson p. 443 sq., Breton p. 228, Chasles p. 77. 90. 124 sq. 130, idem *Aperçu historique* p. 36 (p. 34 versionis German.), Baltzer *Elemente* II p. 380.

*) Haec addita secundum Simsonum, reliqua a nobis; praeterea totam propositionem alia eaque explicatiore ratione enuntiat Simsonus.

Lat. versione 28. $\pi\rho\acute{o}\varsigma \tau\acute{o} \epsilon\nu\theta\acute{o} \overline{FE} \overline{GE}$ ABS, corr. Co in Lat. versione 28. 29. $\sigma\epsilon\tau\omega\varsigma \tau\acute{o} \epsilon\nu\theta\acute{o} \overline{IK} \overline{IL}$ A, sed corr. pr. manus 30. $\tau\acute{o}\nu \overline{HMK}$ A, distinx. BS

- 207 ιγ'. Ἀλλὰ δὴ μὴ ἔστωσαν αἱ AB ΓA παράλληλοι, ἀλλὰ συμπεπτεῖν κατὰ τὸ N · ὅτι πάλιν εὐθεῖα ἔστιν ἡ διὰ τῶν H M K .



Ἐπεὶ εἰς τρεῖς εὐθείας τὰς AN AZ AA ⁵ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ Γ δύο διηγμέναι εἰσὶν αἱ ΓE ΓA , γίνε-ται ὡς τὸ ὑπὸ ΓE $H\Theta$ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓH ΘE ,¹⁰ οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν ΓN $Z A$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $N A$ ΓZ . πάλιν ἐπεὶ

ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ A εἰς τρεῖς εὐθείας τὰς BN $B\Gamma$ BZ δύο εἰσὶν διηγμέναι αἱ AE AN , ἔστιν ὡς τὸ ὑπὸ¹⁵ $N\Gamma$ $Z A$ πρὸς τὸ ὑπὸ $N A$ $Z \Gamma$, οὕτως τὸ ὑπὸ AK EA πρὸς τὸ ὑπὸ AE KA . ἀλλ' ὡς τὸ ὑπὸ $N\Gamma$ $Z A$ πρὸς τὸ ὑπὸ $N A$ ΓZ , οὕτως ἐδείχθη τὸ ὑπὸ ΓE $H\Theta$ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓH ΘE . καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ ΓE ΘH πρὸς τὸ ὑπὸ ΓH ΘE , οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ AK EA πρὸς τὸ ὑπὸ AE KA (ἀπὸ τῆς²⁰ ται εἰς ὃ καὶ ἐπὶ τῶν παραλλήλων). διὰ δὴ τὸ προγε-γραμμένον εὐθεῖα ἔστιν ἡ διὰ τῶν H M K .

- 208 ιδ'. Ἐστω παράλληλος ἡ AB τῇ ΓA , καὶ διήχθωσαν αἱ AE ΓB , καὶ σημείον ἐπὶ τῆς BH τὸ Z , ὥστε εἶναι ὡς τὴν AE πρὸς τὴν BI , οὕτως τὸ ὑπὸ ΓB HZ πρὸς τὸ ὑπὸ²⁵ ZB ΓH . ὅτι εὐθεῖα ἔστιν ἡ διὰ τῶν A Z A .

Ἦχθω διὰ μὲν τοῦ A τῇ $B\Gamma$ παράλληλος ἡ $A\Theta$, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ AE ἐπὶ τὸ Θ , διὰ δὲ τοῦ Θ τῇ ΓA παράλληλος ἡ ΘK , καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ BI ἐπὶ τὸ K . ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ἡ AE πρὸς τὴν EF , οὕτως τὸ ὑπὸ ΓB ZH πρὸς³⁰ τὸ ὑπὸ ZB ΓH , ὡς δὲ ἡ AE πρὸς τὴν BI , οὕτως ἐστὶν ἡ AE πρὸς τὴν ΓH καὶ τὸ ὑπὸ $A\Theta$ BZ πρὸς τὸ ὑπὸ

1. ιγ' add. BS 2. κατὰ τὸ $\overline{H}$ ABS , corr. Co 3. τῶν $\overline{HMA}$
A, distinx. BS, item vs. 22 7. 8. τοῦ K — αἱ $\overline{FE}$ $\overline{NA}$ ABS , corr.
Co 9. 10. ὑπὸ $\overline{FHE\Theta}$ πρὸς τὸ ὑπὸ $\overline{FHE}$ Λ , distinx. BS, item vs.

τῶν ΓΗ ΒΖ, ἴσον ἄρα ἐστὶν τὸ ὑπὸ τῶν ΒΓ ΖΗ τῷ ὑπὸ
 ΑΘ ΒΖ· ἀνάλογον ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ ΓΒ πρὸς τὴν ΒΖ, οὕ-
 τως ἡ ΑΘ πρὸς τὴν ΗΖ, τουτέστιν ὡς ἡ ΓΚ πρὸς τὴν ΗΖ·
 καὶ ὅλη ἄρα ἡ ΚΒ πρὸς ὅλην τὴν ΒΗ ἐστὶν ὡς ἡ ΚΓ
 πρὸς ΖΗ, τουτέστιν ὡς ἡ ΑΘ πρὸς ΖΗ. ἀλλ' ὡς ἡ ΚΒ⁵
 πρὸς ΒΗ ἐν παραλλήλω, οὕτως ἐστὶν ἡ ΘΑ πρὸς ΑΗ καὶ
 ἡ ΑΘ πρὸς ΖΗ. καὶ εἰσὶν παράλληλοι αἱ ΑΘ ΖΗ· εὐ-
 θεῖα ἄρα ἐστὶν ἡ διὰ τῶν Α Ζ Α σημείων.

209 vs. Τούτου προτεθεωρημένου ἔστω παράλληλος ἡ ΑΒ
 τῇ ΓΔ, καὶ εἰς αὐτὰς ἐμπεπτέωσαν εὐθεῖαι αἱ ΑΖ ΖΒ¹⁰
 ΓΕ ΕΔ, καὶ ἐπεξεύθωσαν αἱ ΒΓ ΗΚ· ὅτι εὐθεῖα ἐστὶν
 ἡ διὰ τῶν Α Μ Α.

Ἐπεξεύθω ἡ ΑΜ καὶ ἐκβεβλήθω ἐπὶ τὸ Θ. ἐπεὶ
 οὖν τριγώνου τοῦ ΒΓΖ [ἐκτός] ἀπὸ τῆς κορυφῆς τοῦ Β
 σημείου τῇ ΓΔ παράλληλος ἦται ἡ ΒΕ, καὶ διῆται ἡ ΑΕ,¹⁵
 γίνεται ὡς ἡ ΓΖ πρὸς ΖΔ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΑΕ ΚΑ πρὸς
 τὸ ἐπὶ ΕΑ ΚΑ. ὡς δὲ τὸ ὑπὸ ΑΕ ΚΑ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΚ
 ΑΕ, οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΓΗ ΘΕ πρὸς τὸ ἐπὶ ΓΕ ΗΘ
 (εἰς τρεῖς γὰρ εὐθείας τὰς ΓΑ ΑΘ ΗΚ δύο εἰσὶν διγ-
 μέναι ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ Ε αἱ ΕΓ ΕΔ)· καὶ ὡς²⁰
 ἄρα ἡ ΑΖ πρὸς ΖΓ, οὕτως ἐστὶν τὸ ἐπὶ ΓΕ ΗΘ πρὸς τὸ
 ἐπὶ ΓΗ ΘΕ. καὶ ἔστιν εὐθεῖα ἡ διὰ τῶν Θ Μ Α· διὰ

3. πρὸς τὴν ΗΖ add. Hu coll. vs. 3 (brevius scribi poterat οὕτως
 ἡ ΑΘ, τουτέστιν ἡ ΓΚ, πρὸς τὴν ΗΖ) 4. καὶ ὅλη Α, corr. BS
 7. εὐθεῖαι (sine acc.) Α(Β), corr. S 8. τῶν ΑΖΑ Α³ ex τῶν ΑΖ.,
 distinx. BS 9. αἱ add. BS 11. ἐπεξεύθω Α, corr. BS 12. διὰ
 τῶν ΗΜΚ Α(ΒS), corr. Co 13. ἡ λμ S cod. Co (recte ἡ ΑΜ ΑΒ
 καὶ add. Co ἐπὶ τὸ Κ ΑΒS, corr. Co 14. ἐκτός del. Hu auctore
 Simsono 15. διῆται ἡ ΑΒ ΑΒ, διῆται ἡ βδ S, ducitur ED Co. corr.
 Hu 16. πρὸς Ζ.Α Co (in Lat. versione) pro πρὸς ΖΓ 17. 18. πρὸς
 τὸ ὑπὸ ΑΚΑΒ Α(ΒS), πρὸς τὸ ὑπὸ ΕΑ ΚΑ Co, corr. Hu 19. γὰρ
 add. Hu auctore Co τὰς ΓΑΑΘΗΚ Α, distinx. BS 22. καὶ
 ἔστιν cet.] immo εὐθεῖα ἄρα ἐστὶν ἡ διὰ τῶν Α Θ Α διὰ τὸ προγε-
 γραμμένον. καὶ ἔστιν εὐθεῖα ἡ διὰ τῶν Θ Μ Α· εὐθεῖα ἄρα καὶ ἡ διὰ
 τῶν Α Μ Α (vel ὥστε καὶ ἡ διὰ — ἐστὶν εὐθεῖα) διὰ τῶν ΗΜΑ
 Α(ΒS), corr. Hu (διὰ τῶν Α Μ Θ Co)

τὸ προγεγραμμένον ἄρα καὶ ἡ διὰ τῶν $A M A$ ἐστὶν εὐ-
θεΐα.


- 210 ιζ'. Εἰς δύο εὐθείας τὰς $AB AΓ$ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ση-
μείου τοῦ A δύο διήχθωσαν αἱ $AB AE$, καὶ ἐπ' αὐτῶν
εἰλήφθω σημεῖα τὰ $H \Theta$, ἔστω δὲ ὡς τὸ ὑπὸ $BH ZA$ ⁵
πρὸς τὸ ὑπὸ $AE HZ$, οὕτως τὸ ὑπὸ $B\Theta GA$ πρὸς τὸ ὑπὸ
 $BA ΓΘ$. ὅτι εὐθεΐά ἐστιν ἡ διὰ τῶν $A H \Theta$.

Ἦχθω διὰ τοῦ H τῇ BA παράλληλος ἡ KA . ἐπεὶ
οὖν ἐστὶν ὡς τὸ ὑπὸ $BH ZA$ πρὸς τὸ ὑπὸ $AE ZH$, οὕτως
τὸ ὑπὸ $B\Theta GA$ πρὸς τὸ ὑπὸ $BA ΓΘ$, ἀλλὰ ὁ τοῦ ὑπὸ BH ¹⁰
 ZA πρὸς τὸ ὑπὸ $AE HZ$ συνήπται λόγος ἕκ τε τοῦ ὄν
ἔχει ἡ HE πρὸς EA , τουτέστιν ἡ KH πρὸς BA , καὶ ἔξ
οὗ ὄν ἔχει ἡ AZ πρὸς ZH , τουτέστιν ἡ GA πρὸς τὴν HA ,
ὁ δὲ τοῦ ὑπὸ $B\Theta GA$ πρὸς τὸ ὑπὸ $BA ΓΘ$ συνήπται λό-
γος ἕκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ ΘB πρὸς BA καὶ ἔξ οὗ ὄν ἔχει¹⁵
ἡ AG πρὸς GO , καὶ ὁ ἕκ τε τοῦ τῆς KH ἄρα πρὸς BA καὶ τοῦ
τῆς AG πρὸς HA ὁ αὐτός ἐστιν τῷ συνημμένῳ ἕκ τε τοῦ τῆς
 $B\Theta$ πρὸς BA καὶ τοῦ τῆς AG πρὸς GO . ὁ δὲ τῆς KH
πρὸς BA συνήπται ἕκ τε τοῦ τῆς KH πρὸς $B\Theta$ καὶ τοῦ
τῆς $B\Theta$ πρὸς BA . ὁ ἄρα συνημμένος ἕκ τε τοῦ τῆς KH ²⁰
πρὸς $B\Theta$ καὶ τοῦ τῆς $B\Theta$ πρὸς BA καὶ ἔτι τοῦ τῆς AG
πρὸς HA ὁ αὐτός ἐστιν τῷ συνημμένῳ ἕκ τε τοῦ τῆς $B\Theta$
πρὸς BA καὶ τοῦ τῆς AG πρὸς GO . κοινὸς ἐκκεκρούσθω
ὁ τῆς $B\Theta$ πρὸς BA λόγος· λοιπὸς ἄρα ὁ συνημμένος ἕκ
τε τοῦ τῆς KH πρὸς $B\Theta$ καὶ τοῦ τῆς AG πρὸς HA ὁ²⁵
αὐτός ἐστιν τῷ τῆς AG πρὸς τὴν GO , τουτέστιν τῷ συνημ-
μένῳ ἕκ τε τοῦ τῆς AG πρὸς τὴν HA καὶ τοῦ τῆς HA
πρὸς τὴν ΘG . καὶ πάλιν κοινὸς ἐκκεκρούσθω ὁ τῆς AG
πρὸς τὴν HA λόγος· λοιπὸς ἄρα ὁ τῆς KH πρὸς τὴν $B\Theta$
λόγος ὁ αὐτός ἐστιν τῷ τῆς HA πρὸς τὴν ΘG . καὶ ἐναλ-³⁰
λάξ ἐστὶν ὡς ἡ KH πρὸς τὴν HA , οὕτως ἡ $B\Theta$ πρὸς τὴν

4. τῶν $AM A$ A, distinx. BS 3. ις' add. BS 4. διήχθη A,
corr. BS 5. τὰ $H\Theta$ A, distinx. BS δὲ Hu pro δὴ 7. τῶν $AH\Theta$
A, distinx. BS 10. ὁ add. BS, τοῦ Ge 16. ἡ AG πρὸς GE ABS,
corr. Co in lat. versione ἕκ τε τοῦ add. Hu (nec tamen per-
sanatus locus esse videtur, nisi καὶ ὁ συνημμένος ἄρα ἕκ τε τοῦ τῆς

Et ex constructione recta est quae per $\vartheta \mu \delta$ transit; ergo etiam recta est quae per $\alpha \mu \delta$ transit.

XVI. In duas rectas $\alpha\beta \alpha\gamma$ ab eodem puncto δ ducantur duae rectae $\delta\beta \delta\epsilon$, et in his sumantur duo puncta $\vartheta \eta$, sit autem $\epsilon\eta \cdot \zeta\delta : \delta\epsilon \cdot \eta\zeta = \beta\vartheta \cdot \gamma\delta : \beta\delta \cdot \gamma\vartheta$; dico rectam esse quae per $\alpha \eta \vartheta$ transit. Prop. 142



Ducatur ¹⁾ per η rectae $\beta\delta$ parallela $\chi\lambda$. Iam quia est $\epsilon\eta \cdot \zeta\delta : \delta\epsilon \cdot \eta\zeta = \beta\vartheta \cdot \gamma\delta : \beta\delta \cdot \gamma\vartheta$, ac per formulam compositae proportionis

$$\frac{\epsilon\eta \cdot \zeta\delta}{\delta\epsilon \cdot \eta\zeta} = \frac{\eta\epsilon}{\epsilon\delta} \cdot \frac{\delta\zeta}{\zeta\eta} = \frac{\alpha\eta}{\beta\delta} \cdot \frac{\gamma\delta}{\eta\lambda},$$

itemque

$$\frac{\beta\vartheta \cdot \gamma\delta}{\beta\delta \cdot \gamma\vartheta} = \frac{\beta\vartheta}{\beta\delta} \cdot \frac{\delta\gamma}{\gamma\vartheta}, \text{ ergo etiam est}$$

$$\frac{\alpha\eta}{\beta\delta} \cdot \frac{\gamma\delta}{\eta\lambda} = \frac{\beta\vartheta}{\beta\delta} \cdot \frac{\delta\gamma}{\gamma\vartheta}. \text{ Sed est}$$

$$\frac{\alpha\eta}{\beta\delta} = \frac{\alpha\eta}{\beta\vartheta} \cdot \frac{\beta\vartheta}{\beta\delta}; \text{ ergo } \frac{\alpha\eta}{\beta\vartheta} \cdot \frac{\beta\vartheta}{\beta\delta} \cdot \frac{\gamma\delta}{\eta\lambda} = \frac{\beta\vartheta}{\beta\delta} \cdot \frac{\delta\gamma}{\gamma\vartheta}.$$

Dividendo tollatur communis proportio $\beta\vartheta : \beta\delta$; relinquitur igitur

$$\frac{\alpha\eta}{\beta\vartheta} \cdot \frac{\gamma\delta}{\eta\lambda} = \frac{\delta\gamma}{\gamma\vartheta} = \frac{\delta\gamma}{\eta\lambda} \cdot \frac{\eta\lambda}{\gamma\vartheta}.$$

Et rursus tollatur communis proportio $\delta\gamma : \eta\lambda$; relinquitur igitur $\alpha\eta : \beta\vartheta = \eta\lambda : \gamma\vartheta$. Et vicissim est $\alpha\eta : \eta\lambda = \beta\vartheta : \gamma\vartheta$.


PROPOS. 442 (id est propos. 436 aliter demonstrata): Simson p. 409 —441, Breton p. 230 sq., Chasles p. 76. 92. 442 sq. 450 cet., Baltzer Elemente II p. 378.

1) Rursus ex plurimis, quae fingi possunt figuris, unam tantum adscripsimus; duas exhibet codex, scilicet hanc ipsam et alteram cum punctorum in basi dispositione $\beta \delta \gamma \vartheta$, quae cum ad lemma XVII valeat, repetita est a nobis in appendice ad propos. 442; tertiam addit Commandinus cum dispositione $\beta \vartheta \delta \gamma$; quarta supra est in lemm. X, quod litteris convenienter mutatis dat seriem $\vartheta \beta \gamma \delta$. Conf. etiam infra propos. 444 cum append.

KH πρὸς *BA* cet. scripseris; 48. πρὸς *BA* καὶ τοῦ *της* *AF* *ABS*, corr. *Co* 23. καὶ πρὸς *BS* super vs., *x*^o *ABS*, item vs. 23 24. ὁ *της* *AB* *AB*, corr. *S*

ΘΓ, καὶ εἰσὶν αἱ ΚΛ ΒΓ παράλληλοι· εὐθεία ἄρα ἐστὶν ἡ διὰ τῶν Α Η Θ σημείων.

- 211 ιζ. Ἀλλὰ δὴ μὴ ἔστω παράλληλος ἡ ΑΒ τῇ ΓΔ, ἀλλὰ συμπίπτειτω κατὰ τὸ Ν.



Ἐπεὶ οὖν ἀπὸ τοῦ⁵ αὐτοῦ σημείου τοῦ Α εἰς τρεῖς εὐθείας τὰς ΒΝ ΒΓ ΒΖ δύο εὐ-
θεῖαι διηγμέναι εἰσὶν αἱ ΔΕ ΔΝ, ἔστιν ὡς¹⁰ τὸ ἐπὶ ΝΑ ΓΖ πρὸς τὸ ἐπὶ ΝΓ ΑΖ, οὕ-
τως τὸ ἐπὶ ΔΕ ΚΑ πρὸς τὸ ἐπὶ ΕΑ ΚΑ.
ὡς δὲ τὸ ἐπὶ ΕΑ¹⁵

ΚΑ πρὸς τὸ ἐπὶ ΕΑ ΚΑ, οὕτως ἐστὶν τὸ ἐπὶ ΕΘ ΓΗ πρὸς τὸ ἐπὶ ΕΓ ΘΗ (πάντα γὰρ εἰς τρεῖς τὰς ΓΑ ΔΘ ΗΚ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ Ε δύο ἡγμέναι εἰσὶν αἱ ΕΓ ΕΑ· καὶ ὡς ἄρα τὸ ἐπὶ ΕΘ ΓΗ πρὸς τὸ ἐπὶ ΕΓ ΘΗ, οὕτως τὸ ἐπὶ ΝΑ ΓΖ πρὸς τὸ ἐπὶ ΝΓ ΖΑ· διὰ δὲ²⁰ τὸ προγεγραμμένον εὐθεῖα ἐστὶν ἡ διὰ τῶν Α Θ Α· καὶ ἡ διὰ τῶν Α Μ Α ἄρα εὐθεῖα ἐστὶν.

- 212 ιη. Τρίγωνον τὸ ΑΒΓ, καὶ τῇ ΒΓ παράλληλος ἤχθω ἡ ΑΔ, καὶ διήχθωσαν αἱ ΔΕ ΖΗ, ἔστω δὲ ὡς τὸ ἀπὸ ΕΒ πρὸς τὸ ἐπὶ ΕΓΒ, οὕτως ἡ ΒΗ πρὸς τὴν ΗΓ· ὅτι, ἐὰν²⁵ ἐπιτευχθῇ ἡ ΒΑ, γίνεται εὐθεῖα ἡ διὰ τῶν Θ Κ Γ.

Ἐπεὶ ἐστὶν ὡς τὸ ἀπὸ τῆς ΕΒ πρὸς τὸ ἐπὶ ΕΓΒ, οὕ-
τως ἡ ΒΗ πρὸς ΗΓ, κοινὸς [ἄρα] προσκείσθω ὁ τῆς ΓΕ πρὸς ΕΒ λόγος ὁ αὐτὸς ὢν τῷ τοῦ ἐπὶ ΕΓΒ πρὸς τὸ ἐπὶ

2. τῶν ΑΗΘ Α, distinx. BS

3. ιζ' BS, ΙΗ Α' in marg.

7. 8. τὰς βη B^s cod. Co (recte τὰς ΒΝ Α')

16. 17. τὸ ἐπὶ εβ γν

S cod. Co (recte τὸ ἐπὶ ΕΘ ΓΗ ΑΒ)

47. πρὸς τὸ ἐπὶ ΕΓ ΘΝ ABS,

corr. Co, item vs. 49. 20

49. ἄρα τὸ ἐπὶ εβ γν S cod. Co (recte ΑΒ,

ut supra)

20. τὸ ἐπὶ ΝΑ ΓΖ πρὸς bis scripta in Α ΑΖ (ante διὰ)

Co δὴ add. G^s

21. 22. τῶν ΑΘ Α — τῶν ΑΜ Α Α, distinx. BS

23. ιη' add. BS

24. ὡς τὰ ἀπὸ ΑΒ, corr. S

26. τῶν ΘΚ Α Α, distinx.

BS, item p. 894, 12

28. κοινὸν ΑΒ', corr. B^s S

ἄρα del. Hu

suntque parallelae $\alpha\lambda$ $\beta\gamma$; recta igitur est quae per puncta α η ϑ transit¹⁾.

XVII. At ne sint parallelae $\alpha\beta$ $\gamma\delta$, sed convergant in puncto ν (ceteris ut in lemmate XV manentibus). Prop. 143

Iam quia ab eodem puncto δ in tres rectas $\delta\nu$ $\beta\gamma$ $\beta\zeta$ duae rectae $\delta\epsilon$ $\delta\nu$ ductae sunt, propter lemma III est


$\nu\delta \cdot \gamma\zeta = \nu\gamma \cdot \delta\zeta = \delta\epsilon \cdot \alpha\lambda : \epsilon\lambda \cdot \kappa\delta^*)$. Sed rursus, quia in tres rectas $\gamma\lambda$ $\delta\vartheta$ $\eta\kappa$ (id est $\mu\lambda$ $\mu\delta$ $\mu\kappa$) ab eodem puncto ϵ duae $\epsilon\gamma$ $\epsilon\delta$ ductae sunt, est

$\epsilon\delta \cdot \alpha\lambda : \epsilon\lambda \cdot \kappa\delta = \epsilon\vartheta \cdot \gamma\eta : \epsilon\gamma \cdot \vartheta\eta^{**})$; ergo etiam

$\epsilon\vartheta \cdot \gamma\eta : \epsilon\gamma \cdot \vartheta\eta = \nu\delta \cdot \gamma\zeta : \nu\gamma \cdot \delta\zeta$.

Iam propter superius lemma recta est quae per α ϑ δ transit^{***)}; ergo etiam recta est quae per α μ δ transit.

XVIII. Sit triangulum $\alpha\beta\gamma$, et rectae $\beta\gamma$ parallela ducatur $\alpha\delta$, et ducatur utcumque $\delta\epsilon$, quae rectis $\alpha\beta$ $\alpha\gamma$ occurrat in ϑ ζ ; sit autem in $\beta\gamma$ punctum η , quod faciat $\epsilon\beta^2 : \epsilon\gamma \cdot \gamma\beta = \beta\eta : \eta\gamma$, et iungatur $\zeta\eta$, cui occurrat iuncta $\beta\delta$ in $\kappa^{***})$; dico rectam esse quae per ϑ κ γ transit.



Quoniam est $\epsilon\beta^2 : \epsilon\gamma \cdot \gamma\beta = \beta\eta : \eta\gamma$, utraque proportio multiplicetur per $\frac{\gamma\epsilon}{\epsilon\beta}$, vel potius, quod ad idem redit, per $\frac{\epsilon\gamma \cdot \gamma\beta}{\epsilon\beta \cdot \beta\gamma}$; est igitur

1) Demonstrationem sic fere explet Simson p. 411: Quoniam est $\alpha\eta : \eta\lambda = \beta\vartheta : \vartheta\gamma$, componendo erit $\alpha\lambda : \lambda\eta = \beta\gamma : \gamma\vartheta$. Sed est $\alpha\lambda : \lambda\epsilon = \alpha\gamma : \gamma\beta$; igitur ex aequo $\alpha\lambda : \lambda\eta = \alpha\gamma : \gamma\vartheta$. Et parallelae sunt $\lambda\eta$ $\gamma\vartheta$; ergo (propter lemma p. 371 adnot. *) in recta linea sunt α η ϑ puncta.

PROPOS. 143: Simson p. 417 sq., Breton p. 231 sq., Chasles p. 77. 92. 141, idem *Aperçu historique* p. 36 (p. 34 versionis German.).

*) Vide casum secundum in append. ad propos. 139.

***) Vide append.

PROPOS. 144: Simson p. 426 sq., Breton p. 232 sq., Chasles p. 79. 92 sq. 143 sq.

****) Sic auctore Simsono enuntiationem distinctiorem reddidimus.

$ΕΒΓ$ · δι' ἴσων ἄρα ὁ τοῦ ἀπὸ $ΕΒ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΕΒΓ$ λόγος, τουτέστιν ὁ τῆς $ΕΒ$ πρὸς τὴν $ΒΓ$, ὁ αὐτός ἐστιν τῷ συνημμένῳ ἕκ τε τοῦ τῆς $ΒΗ$ πρὸς $ΗΓ$ καὶ τοῦ τοῦ ὑπὸ $ΕΓΒ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΕΒΓ$, ὅς ἐστιν ὁ αὐτός τῷ τῆς $ΕΓ$ πρὸς $ΕΒ$ · ὥστε ὁ τοῦ ἀπὸ $ΕΒ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΕΒΓ$ συνήπται ἕκ τε τοῦ ὃν ἔχει ἡ $ΒΗ$ πρὸς $ΗΓ$ καὶ τοῦ ὃν ἔχει ἡ $ΕΓ$ πρὸς $ΕΒ$, ὅς ἐστιν ὁ αὐτός τῷ τοῦ ὑπὸ $ΕΓ$ $ΒΗ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΕΒ$ $ΓΗ$. ὥς δὲ ἡ $ΕΒ$ πρὸς τὴν $ΒΓ$, οὕτως ἐστὶν διὰ τὸ προγεγραμμένον λήμμα τὸ ὑπὸ $ΑΖ$ $ΘΕ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΑΕ$ $ΖΘ$ · καὶ ὥς ἄρα τὸ ὑπὸ $ΓΕ$ $ΒΗ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΓΗ$ $ΕΒ$,¹⁰ οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ $ΑΖ$ $ΘΕ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΑΕ$ $ΖΘ$ · εὐθεία ἄρα ἐστὶν ἡ διὰ τῶν $Θ$ $Κ$ $Γ$ · τοῦτο γὰρ ἐν τοῖς πτωτικοῖς τῶν ἀναστροφῶν.

- 213 $Β'$. Εἰς τρεῖς εὐθείας τὰς $ΑΒ$ $ΑΓ$ $ΑΔ$ ἀπὸ τινος σημείου τοῦ $Ε$ δύο διήχθωσαν αἱ $ΕΖ$ $ΕΒ$, ἔστω δὲ ὡς ἡ $ΕΖ$ πρὸς τὴν $ΖΗ$, οὕτως ἡ $ΘΕ$ πρὸς τὴν $ΘΗ$ · ὅτι γίνεταί καὶ ὡς ἡ $ΒΕ$ πρὸς τὴν $ΒΓ$, οὕτως ἡ $ΕΔ$ πρὸς τὴν $ΔΓ$.


Ἦχθω διὰ τοῦ $Η$ τῇ $ΒΕ$ παράλληλος ἡ $ΑΚ$. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ἡ $ΕΖ$ πρὸς τὴν $ΖΗ$, οὕτως ἡ $ΕΘ$ πρὸς τὴν $ΘΗ$, ἀλλ' ὡς μὲν ἡ $ΕΖ$ πρὸς τὴν $ΖΗ$, οὕτως ἡ $ΕΒ$ πρὸς τὴν $ΗΚ$, ὥς δὲ ἡ $ΕΘ$ πρὸς τὴν $ΘΗ$, οὕτως [ἐστὶν] ἡ $ΔΕ$ πρὸς τὴν $ΗΔ$, καὶ ὡς ἄρα ἡ $ΒΕ$ πρὸς τὴν $ΗΚ$, οὕτως ἐστὶν ἡ $ΔΕ$ πρὸς τὴν $ΗΔ$. ἐναλλάξ ἐστὶν ὡς ἡ $ΕΒ$ πρὸς τὴν $ΕΔ$, οὕτως ἡ $ΚΗ$ πρὸς τὴν $ΗΔ$. ὥς δὲ ἡ $ΚΗ$ πρὸς τὴν $ΗΔ$, οὕτως ἐστὶν ἡ $ΒΓ$ πρὸς τὴν $ΓΔ$ · καὶ ὡς ἄρα ἡ $ΒΕ$ πρὸς τὴν $ΕΔ$, οὕτως ἡ $ΒΓ$ πρὸς τὴν $ΓΔ$. ἐναλλάξ ἐστὶν ὡς ἡ $ΕΒ$ πρὸς τὴν $ΒΓ$, οὕτως ἡ $ΕΔ$ πρὸς τὴν $ΔΓ$.

Τὰ δὲ πτωτικά ὁμοίως.

- 214 $κ'$. Ἐστω δύο τρίγωνα τὰ $ΑΒΓ$ $ΔΕΖ$ ἴσας ἔχοντα τὰς $ΑΔ$ γωνίας· ὅτι ἐστὶν ὡς τὸ ὑπὸ $ΒΑΓ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΕΔΖ$,³⁰ οὕτως τὸ $ΑΒΓ$ τρίγωνον πρὸς τὸ $ΔΕΖ$ τρίγωνον.

1. δι' ἴσων — 5. συνήπται) vide append. 3. καὶ τῷ τοῦ $ΑΒΣ$, τῷ del. Ge. corr. Hu 5. τοῦ ἀπὸ Hu pro ἀπὸ τοῦ συνήπται Α, corr. BS 9. 10. τὸ ὑπὸ $ΔΕ$ $ΖΘ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΔΕ$ $ΘΕ$ ABS, corr. Simsonus p. 427, item vs. 41 10. ἄρα τὸ ὑπὸ $ΓΕ$ $ΒΗ$ Α, distinx. BS πρὸς τὸ ὑπὸ $ΓΗ$ $ΘΒ$ ABS, corr. Co in Lat. verslone 44. 19'

Ἦχθωσαν κάθετοι αἱ BH EO . ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ μὲν A γωνία τῇ A , ἡ δὲ H τῇ Θ , ἔστιν ἄρα ὡς ἡ AB



πρὸς τὴν BH , οὕτως ἡ AE πρὸς τὴν EO . ἀλλ' ὡς μὲν ἡ AB πρὸς τὴν BH , οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ $BA\Gamma$ πρὸς τὸ ὑπὸ $BH\Lambda\Gamma$, ὡς δὲ ἡ AE πρὸς τὴν EO , οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ $EA\Z$ πρὸς τὸ ὑπὸ $EO\Lambda Z$. ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ $BA\Gamma$ πρὸς τὸ ὑπὸ $BH\Lambda\Gamma$, οὕτως τὸ ὑπὸ $EA\Z$ πρὸς τὸ ὑπὸ $EO\Lambda Z$. καὶ ἐναλλάξ. ἀλλ' ὡς τὸ ὑπὸ $BH\Lambda\Gamma$ πρὸς τὸ ὑπὸ $EO\Lambda Z$, οὕτως ἐστὶν τὸ $AB\Gamma$ τρίγωνον πρὸς τὸ AEZ τρίγωνον (ἐκατέρα γὰρ τῶν BH EO κάθετός ἐστιν ἑκατέρου τῶν εἰρημένων τριγώνων, καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ $BA\Gamma$ πρὸς τὸ ὑπὸ $EA\Z$, οὕτως ἐστὶν τὸ $AB\Gamma$ τρίγωνον πρὸς τὸ AEZ τρίγωνον.

- 215 κα'. Ἐστωσαν δὴ αἱ AA δυοὶν ὁρθαῖς ἴσαι· ὅτι πάλιν γίνεται ὡς τὸ ὑπὸ $BA\Gamma$ πρὸς τὸ ὑπὸ $EA\Z$, οὕτως τὸ $AB\Gamma$ τρίγωνον πρὸς τὸ AEZ τρίγωνον.

Ἐκβεβλήσθω ἡ BA , καὶ κείσθω τῇ BA ἴση ἡ AH , καὶ ἐπεξεύχθω ἡ GH . ἐπεὶ οὖν αἱ AA γωνίαι δυοὶν ὁρθαῖς ἴσαι εἰσὶν, ἀλλὰ καὶ αἱ ὑπὸ $BA\Gamma$ GAH γωνίαι δυοὶν ὁρθαῖς, ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ GAH γωνία τῇ A . ἔστιν οὖν ὡς τὸ ὑπὸ $HA\Gamma$ πρὸς τὸ ὑπὸ $EA\Z$, οὕτως τὸ AHG τρίγωνον πρὸς τὸ AEZ τρίγωνον. ἴση δὲ ἐστὶν ἡ μὲν HA τῇ AB , τὸ δὲ $HA\Gamma$ τρίγωνον τῷ $AB\Gamma$ τριγώνῳ· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ $BA\Gamma$ πρὸς τὸ ὑπὸ $EA\Z$, οὕτως τὸ $AB\Gamma$ τρίγωνον πρὸς τὸ AEZ τρίγωνον.

- 216 χβ'. Εὐθεία ἡ AB , καὶ ἐπ' αὐτῆς δύο σημεῖα τὰ Γ A , ἔστω δὲ τὸ δις ὑπὸ $AB\Gamma A$ ἴσον τῷ ἀπὸ ΓB · ὅτι καὶ τὸ ἀπὸ AA ἴσον ἐστὶν τοῖς ἀπὸ τῶν $A\Gamma$ AB τετραγώνοις.

Ducantur perpendiculares $\beta\eta$ $\epsilon\vartheta$. Iam quia est $\angle \alpha = \angle \delta$, et $\angle \eta = \angle \vartheta$, est igitur $\alpha\beta : \beta\eta = \delta\epsilon : \epsilon\vartheta$. Sed est


$$\frac{\alpha\beta}{\beta\eta} = \frac{\alpha\beta \cdot \alpha\gamma}{\beta\eta \cdot \alpha\gamma}, \text{ et } \frac{\delta\epsilon}{\epsilon\vartheta} = \frac{\delta\epsilon \cdot \delta\zeta}{\epsilon\vartheta \cdot \delta\zeta}; \text{ est igitur}$$

$$\frac{\alpha\beta \cdot \alpha\gamma}{\beta\eta \cdot \alpha\gamma} = \frac{\delta\epsilon \cdot \delta\zeta}{\epsilon\vartheta \cdot \delta\zeta}, \text{ et vicissim } \frac{\alpha\beta \cdot \alpha\gamma}{\delta\epsilon \cdot \delta\zeta} = \frac{\beta\eta \cdot \alpha\gamma}{\epsilon\vartheta \cdot \delta\zeta}.$$

Sed quia in triangulis $\alpha\beta\gamma$ $\delta\epsilon\zeta$ perpendiculares sunt $\beta\eta$ $\epsilon\vartheta$, et bases $\alpha\gamma$ $\delta\zeta$, est

$$\frac{\beta\eta \cdot \alpha\gamma}{\epsilon\vartheta \cdot \delta\zeta} = \frac{\Delta \alpha\beta\gamma}{\Delta \delta\epsilon\zeta}; \text{ ergo etiam } \frac{\beta\alpha \cdot \alpha\gamma}{\epsilon\delta \cdot \delta\zeta} = \frac{\Delta \alpha\beta\gamma}{\Delta \delta\epsilon\zeta}.$$

XXI. Iam sint anguli $\alpha + \delta$ duobus rectis aequales; Prop. 147
dico rursus esse $\beta\alpha \cdot \alpha\gamma : \epsilon\delta \cdot \delta\zeta = \Delta \alpha\beta\gamma : \Delta \delta\epsilon\zeta$.



Producatur $\beta\alpha$, fiatque $\alpha\eta = \beta\alpha$, et iungatur $\gamma\eta$. Iam quia anguli $\alpha + \delta$ duobus rectis aequales sunt, itemque anguli $\beta\alpha\gamma + \gamma\alpha\eta$, est igitur $\angle \gamma\alpha\eta = \angle \delta$. Ergo propter superius lemma est $\eta\alpha \cdot \alpha\gamma : \epsilon\delta \cdot \delta\zeta = \Delta \alpha\eta\gamma : \Delta \delta\epsilon\zeta$. Sed est $\eta\alpha = \alpha\beta$, et $\Delta \eta\alpha\gamma = \Delta \alpha\beta\gamma$ (elem. 6, 1); ergo est $\beta\alpha \cdot \alpha\gamma : \epsilon\delta \cdot \delta\zeta = \Delta \alpha\beta\gamma : \Delta \delta\epsilon\zeta$.

XXII. Sit recta $\alpha\beta$, in eaque duo puncta γ δ , sitque Prop. 148
 $2\alpha\beta \cdot \gamma\delta = \gamma\delta^2$; dico esse etiam $\alpha\delta^2 = \alpha\gamma^2 + \delta\beta^2$.

PROPOS. 147: Simson p. 516 sq., Breton p. 284 sq., Chasles p. 77. 98 sq. 295.

PROPOS. 148: Simson p. 482 sq., Breton p. 295, Chasles p. 79. 94. 322.

1. *al* $\overline{BH} \overline{H\Theta}$ $\overline{ABS}$, corr. V 3. $\tau\eta\nu \overline{BE} \overline{o\upsilon\tau\omega\varsigma}$ $\overline{ABS}$, corr. Co
7. 3. $\text{ὡπὸ } \overline{E\Theta} \overline{I\Z}$ καὶ Λ , distinx. BS 10. $\text{ἐκαστέρου } \Lambda$, corr. BS
14. $\alpha\epsilon'$ add. BS *al* $\overline{A\Gamma} \overline{I} \Lambda$, distinx. BS, item vs. 18 17. ἐκβεβλη-
 $\sigma\theta\omega$ Hu pro ἐκβληθῆ $\text{Iση } \eta \overline{AB} \overline{AB}$, corr. S 49. *al* $\text{ὡπὸ } \overline{H\Gamma} \overline{A\Gamma}$
 $\overline{H\Gamma} \overline{H\Gamma}$ γωνία Λ , ἡ — γωνία B , corr. S 20. post ὁρθαῖς add. Iσαι Hu
 $\gamma\omega\nu\tau\alpha\iota \tau\eta\varsigma \overline{I} \Lambda$, corr. BS 23. $\tau\omega\iota \overline{A\Theta\Gamma} \overline{\tau\epsilon\tau\rho\alpha\iota\omega\varsigma}$ $\overline{ABS}$, corr. Co
26. $\alpha\beta'$ add. BS 26. 27. $\tau\alpha \overline{F\Gamma}$ et 28. $\tau\omega\nu \overline{A\Gamma} \overline{I\Gamma} \Lambda$, distinx. BS

Ἐπεὶ γὰρ τὸ δις ὑπὸ AB $ΓΔ$ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ $ΓΒ$, κοινὸν ἀφαιρεθῶ τὸ δις ὑπὸ $ΒΔΓ$. λοιπὸν ἄρα τὸ δις ὑπὸ $ΑΔΓ$ ἴσον ἐστὶν τοῖς ἀπὸ τῶν $ΓΔ$ $ΑΒ$ τετραγώνοις. κοινὸν ἀφαιρεθῶ τὸ ἀπὸ $ΓΔ$ τετραγώνον· λοιπὸν ἄρα τὸ δις ὑπὸ $ΑΓΔ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $ΓΔ$ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ $ΑΒ$ τετραγώνῳ. κοινὸν προσκείσθω τὸ ἀπὸ $ΑΓ$ τετραγώνον· ὅλον ἄρα τὸ ἀπὸ $ΑΔ$ τετραγώνον ἴσον ἐστὶν τοῖς ἀπὸ τῶν $ΑΓ$ $ΑΒ$ τετραγώνοις.

- 217 κγ'. Ἐστω τὸ ὑπὸ $ΑΒΓ$ ἴσον τῷ ἀπὸ $ΒΔ$ τετραγώνῳ· ὅτι γίνεται τρία, τὸ μὲν ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς $ΑΔΓ$ καὶ τῆς $ΒΔ$ ἴσον τῷ ὑπὸ $ΑΔ$ $ΔΓ$, τὸ δὲ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς $ΑΔΓ$ καὶ τῆς $ΒΓ$ ἴσον τῷ ἀπὸ $ΔΓ$ τετραγώνῳ, τὸ δὲ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς $ΑΔΓ$ καὶ τῆς $ΒΔ$ ἴσον τῷ ἀπὸ $ΑΔ$ τετραγώνῳ.

Ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ $ΑΒΓ$ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ $ΒΔ$, ἀνά-¹⁵λογον καὶ ὅλη πρὸς ὅλην καὶ ἀνάπαλιν καὶ συνθέντι ἐστὶν ἄρα ὡς συναμφοτέρος ἢ $ΓΔ$ $ΔΔ$ πρὸς τὴν $ΔΔ$, οὕτως ἢ $ΓΔ$ πρὸς τὴν $ΑΒ$ · τὸ ἄρα ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς $ΑΔ$ $ΔΓ$ καὶ τῆς $ΒΔ$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν $ΑΔΓ$. πάλιν ἐπεὶ ὅλη ἢ $ΑΔ$ πρὸς ὅλην τὴν $ΔΓ$ ἐστὶν ὡς ἢ $ΔΒ$ πρὸς τὴν $ΒΓ$,²⁰ συνθέντι ἐστὶν ὡς συναμφοτέρος ἢ $ΑΔΓ$ πρὸς τὴν $ΔΓ$, οὕτως ἢ $ΔΓ$ πρὸς τὴν $ΓΒ$ · τὸ ἄρα ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς $ΑΔΓ$ καὶ τῆς $ΓΒ$ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ $ΔΓ$. πάλιν ἐπεὶ ὅλη ἢ $ΑΔ$ πρὸς ὅλην τὴν $ΔΓ$ ἐστὶν ὡς ἢ $ΑΒ$ πρὸς τὴν $ΒΔ$, ἀνάπαλιν καὶ συνθέντι ἐστὶν ὡς συναμφοτέρος ἢ $ΓΔΔ$ πρὸς²⁵ τὴν $ΔΔ$, οὕτως ἢ $ΔΔ$ πρὸς τὴν $ΑΒ$, τὸ ἄρα ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς $ΑΔΓ$ καὶ τῆς $ΑΒ$ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ $ΑΔ$ τετραγώνῳ.

1. ὑπὸ $ΑΒΓΔ$ A, distinx. BS ἐστὶ A^oBS τοῖς ἀπὸ $ΓΒ$ A, corr. BS 7. ὅλον — τετραγώνον bis scripta in A 9. κγ' add. BS 10. τρία BS, $\overline{\Gamma}$ A συναμφοτέρου τῆς $\overline{ΑΔ}$ $\overline{ΒΓ}$ ABS, συναμφ. τῆς $\overline{ΑΔ}$ $\overline{ΔΓ}$ Co, corr. Hu 11. τῷ ὑπὸ $\overline{ΑΔ}$ $\overline{ΔΓ}$ A, corr. BS 11. 12. συναμφοτέρου τῆς $\overline{ΑΔΓ}$ AB, συναμφ. τῆς $\overline{αδ}$ $\overline{εγ}$ S, συναμφ. τῆς $\overline{ΑΔ}$ $\overline{ΔΓ}$ Co 12. καὶ τῆς $\overline{ΒΓ}$ AB, καὶ τῆς $\overline{βδ}$ S cod. Co 13. τῆς $\overline{ΑΔΓ}$ ABS, τῆς $\overline{ΑΔ}$ $\overline{ΔΓ}$ Co 15. ἀνάλογον Co pro ἀνάπαλιν 19. ἐστὶ τῷ S, ἐστὶ τὸ AB 20. ὅλη ἢ $\overline{ΑΔ}$ A, corr. BS ὡς $\overline{δβ}$ S 21. ἢ

$\alpha \quad \gamma \quad \delta \quad \beta$ Quoniam enim est
 $2\alpha\beta \cdot \gamma\delta = \gamma\beta^2$, commune subtrahatur $2\beta\delta \cdot \delta\gamma$; restat
 igitur
 $2\alpha\delta \cdot \delta\gamma = \gamma\delta^2 + 2\beta\delta \cdot \delta\gamma + \delta\beta^2 - 2\beta\delta \cdot \delta\gamma$
 $= \gamma\delta^2 + \delta\beta^2$. Commune subtrahatur $\gamma\delta^2$; re-
 stat igitur, quia est
 $2\alpha\delta \cdot \delta\gamma = 2(\alpha\gamma + \gamma\delta) \delta\gamma$
 $= 2\alpha\gamma \cdot \gamma\delta + 2\gamma\delta^2$,
 $2\alpha\gamma \cdot \gamma\delta + \gamma\delta^2 = \delta\beta^2$. Commune addatur $\alpha\gamma^2$; est
 igitur
 $\alpha\gamma^2 + 2\alpha\gamma \cdot \gamma\delta + \gamma\delta^2 = \alpha\gamma^2 + \delta\beta^2$, id est
 $\alpha\delta^2 = \alpha\gamma^2 + \delta\beta^2$.

XXIII. Sit $\alpha\beta \cdot \beta\gamma = \beta\delta^2$; dico haec tria fieri, primum Prop.
 $(\alpha\delta + \delta\gamma) \beta\delta = \alpha\delta \cdot \delta\gamma$, tum $(\alpha\delta + \delta\gamma) \beta\gamma = \delta\gamma^2$, denique ¹⁴⁹
 $(\alpha\delta + \delta\gamma) \beta\alpha = \alpha\delta^2$.

Quoniam enim est

$\alpha \quad \gamma \quad \beta \quad \delta$ $\alpha\beta \cdot \beta\gamma = \beta\delta^2$, per propor-
 tionem fit

$\alpha\beta : \beta\delta = \beta\delta : \beta\gamma$, et tota ad totam (elem. 5. 12)
 $\alpha\delta : \delta\gamma = \beta\delta : \beta\gamma$, et e contrario
 $\gamma\delta : \delta\alpha = \gamma\beta : \beta\delta$, et componendo
 $\alpha\delta + \delta\gamma : \delta\alpha = \gamma\delta : \delta\beta$, itaque $(\alpha\delta + \delta\gamma) \beta\delta = \alpha\delta \cdot \delta\gamma$.

Rursus, quia, ut statim demonstravimus, est

$\alpha\delta : \delta\gamma = \delta\beta : \beta\gamma$, componendo fit
 $\alpha\delta + \delta\gamma : \delta\gamma = \delta\gamma : \gamma\beta$, itaque $(\alpha\delta + \delta\gamma) \beta\gamma = \delta\gamma^2$.

Rursus, quia ex hypothesis est

$\alpha\beta : \beta\delta = \beta\delta : \beta\gamma$, et tota ad totam
 $\alpha\delta : \delta\gamma = \alpha\beta : \beta\delta$, e contrario fit
 $\gamma\delta : \delta\alpha = \delta\beta : \beta\alpha$, et componendo
 $\gamma\delta + \delta\alpha : \delta\alpha = \delta\alpha : \alpha\beta$, itaque $(\alpha\delta + \delta\gamma) \beta\alpha = \alpha\delta^2$.

PROPOS. 149: Simson p. 433 sq., Breton p. 235 sq., Chasles p. 79 sq.
 94. 240. 243. 289.

1. 1. 1Γ et 22. 23. τῆς ΑΑ 1Γ Co 25. ἡ Γ.Α Hu, ἡ Γ.Α ΑΑ Α(B),
 ἡ γδ δα S Co 26. ἀρα ἐνὶ Ge auctore Co pro ἀρα ἀπὸ 27. τῆς
 ΑΑ 1Γ Co

- 218 κδ'. Εὐθεία ἡ AB , καὶ δύο σημεῖα τὰ ΓA , καὶ ἔστω τὸ ἀπὸ ΓA τετραγώνον ἴσον τῷ δις ὑπὸ $AF AB$ · οὕτως καὶ τὸ ἀπὸ AB τετραγώνον ἴσον ἐστὶν τοῖς ἀπὸ τῶν AA GB τετραγώνοις.

Ἐπεὶ γὰρ τὸ ἀπὸ ΓA ἴσον ἐστὶν τῷ δις ὑπὸ $AF AB$,⁵ τὸ ἄρα δις ὑπὸ $AF B$ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ἀπὸ τῆς ΓA καὶ τῷ δις ὑπὸ τῶν AA . κοινὸν προσκείσθω τὸ ἀπὸ AF · τὸ ἄρα δις ὑπὸ $AF B$ μετὰ τοῦ ἀπὸ AF ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ AA . κοινὸν προσκείσθω τὸ ἀπὸ BF · ὅλον ἄρα τὸ ἀπὸ AB τετραγώνον ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν AA GB τετρα-¹⁰ γώνοις.


- 219 κε'. Ἐστω τὸ ὑπὸ τῶν $AB \Gamma$ ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς BA · οὕτως γίνεται τρίτα, τὸ μὲν ὑπὸ τῆς τῶν AA AF ὑπεροχῆς καὶ τῆς BA ἴσον τῷ ὑπὸ $AA \Gamma$, τὸ δὲ ὑπὸ τῆς τῶν AA AF ὑπεροχῆς καὶ τῆς $B \Gamma$ ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς AF τετραγώνῳ,¹⁵ τὸ δὲ ὑπὸ τῆς τῶν AA AF ὑπεροχῆς καὶ τῆς BA ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς AA τετραγώνῳ.

Ἐπεὶ γὰρ ἐστὶν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν BA , οὕτως ἡ BA πρὸς τὴν $B \Gamma$, λοιπὴ πρὸς λοιπὴν καὶ διελόντι ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ τῶν AA AF ὑπεροχὴ πρὸς τὴν AF , οὕτως ἡ AA ²⁰ πρὸς τὴν AB · τὸ ἄρα ὑπὸ τῆς τῶν AA AF ὑπεροχῆς καὶ τῆς AB ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν AA AF . πάλιν ἐπεὶ λοιπὴ ἡ AA πρὸς λοιπὴν τὴν AF ἐστὶν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν $B \Gamma$, διελόντι ἐστὶν ὡς ἡ τῶν AA AF ὑπεροχὴ πρὸς τὴν AF , οὕτως ἡ AF πρὸς τὴν GB · τὸ ἄρα ὑπὸ τῆς τῶν AA AF ²⁵ ὑπεροχῆς καὶ τῆς $B \Gamma$ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς AF τετραγώνῳ. πάλιν ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ AA πρὸς τὴν AF , οὕτως

1. κδ' add. BS τὰ ΓA A, distinct. BS 2. δις ὑπὸ $AF B$ διότι ABS, corr. Co 3. ἀπὸ τῶν $AA \Gamma B$ A, distinct. BS 5. τῷ δις ὑπὸ $AF AB$ A(BS), corr. Co 6. τὸ ἄρα δις ὑπὸ $AF B$ add. Co 10. ἐστὶ A²BS 12. κε' add. BS 13. τρίτα BS, ΓA 14—16. τὸ δὲ ὑπὸ τῆς τῶν $AA \Gamma$ ὑπεροχῆς καὶ τῆς BA ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς AF τετραγώνῳ τὸ δὲ ὑπὸ τῆς τῶν $AA \Gamma$ ABS, corr. Co 18. 19. ἡ BA πρὸς τὴν $B \Gamma$ ABS, corr. Co 19. λοιπὴ πρὸς A, corr. BS ἄρα Hu pro οὖν 22. τῷ τῶν A, corr. BS ἐπεὶ λοιπὴ (sine acc.) A, corr. BS 23. τὴν (ante AF) add. BS 24. ἡ τῶν $AA \Gamma$ ABS, corr. Co

XXIV. Sit recta $\alpha\beta$ et in ea duo puncta γ δ , sitque $\gamma\delta^2 = 2\alpha\gamma \cdot \delta\beta$; dico esse $\alpha\beta^2 = \alpha\delta^2 + \gamma\beta^2$. Prop. 450

Quoniam enim est



$$\gamma\delta^2 = 2\alpha\gamma \cdot \delta\beta, \text{ fit igitur} \\ \text{(communi addito)} \\ 2\alpha\gamma \cdot \gamma\delta$$


$$2\alpha\gamma \cdot \gamma\delta + \gamma\delta^2 = 2\alpha\gamma \cdot \gamma\beta. \text{ Commune addatur } \alpha\gamma^2; \text{ est} \\ \text{igitur}$$

$$\alpha\gamma^2 + 2\alpha\gamma \cdot \gamma\delta + \gamma\delta^2 = 2\alpha\gamma \cdot \gamma\beta + \alpha\gamma^2, \text{ id est}$$

$$\alpha\delta^2 = 2\alpha\gamma \cdot \gamma\beta + \alpha\gamma^2. \text{ Commune addatur } \gamma\beta^2; \text{ est igitur}$$

$$\alpha\delta^2 + \gamma\beta^2 = \alpha\gamma^2 + 2\alpha\gamma \cdot \gamma\beta + \gamma\beta^2 \\ = \alpha\beta^2.$$

XXV. Sit $\alpha\beta \cdot \beta\gamma = \beta\delta^2$; dico haec tria fieri, primum Prop. 451
 $(\alpha\delta - \delta\gamma) \beta\delta = \alpha\delta \cdot \delta\gamma$, tum $(\alpha\delta - \delta\gamma) \beta\gamma = \delta\gamma^2$, denique
 $(\alpha\delta - \delta\gamma) \beta\alpha = \alpha\delta^2$; vel, si sit $\alpha\delta < \delta\gamma$, primum fieri
 $(\delta\gamma - \alpha\delta) \beta\delta = \alpha\delta \cdot \delta\gamma$ cet. ¹⁾



Quoniam enim propor-
 tione facta est

$$\alpha\beta : \beta\delta = \beta\delta : \beta\gamma, \text{ per} \\ \text{subtractionem} \\ \text{proportionis fit}$$

$$\alpha\delta : \delta\gamma = \alpha\beta : \beta\delta, \text{ et dirimendo}$$

$$\left\{ \begin{matrix} \alpha\delta - \delta\gamma \\ \delta\gamma - \alpha\delta \end{matrix} \right\} : \delta\gamma = \alpha\delta : \beta\delta; \text{ ergo } \left\{ \begin{matrix} \alpha\delta - \delta\gamma \\ \delta\gamma - \alpha\delta \end{matrix} \right\} \beta\delta = \alpha\delta \cdot \delta\gamma.$$

Rursus quia per subtractionem proportionis (vide supra) est

$$\alpha\delta : \delta\gamma = \beta\delta : \beta\gamma, \text{ dirimendo fit}$$

$$\left\{ \begin{matrix} \alpha\delta - \delta\gamma \\ \delta\gamma - \alpha\delta \end{matrix} \right\} : \delta\gamma = \delta\gamma : \beta\gamma; \text{ ergo } \left\{ \begin{matrix} \alpha\delta - \delta\gamma \\ \delta\gamma - \alpha\delta \end{matrix} \right\} \beta\gamma = \delta\gamma^2.$$

Rursus quia, ut supra demonstravimus, est

$$\alpha\delta : \delta\gamma = \alpha\beta : \beta\delta, \text{ fit e contrario}$$

PROPOS. 450: Simson p. 434, Breton p. 226, Chasles p. 79. 94. 323 sq.

PROPOS. 451: Simson p. 435 sq., Breton p. 226 sq., Chasles p. 79 sq. 94. 240 sq. 289.

1) Hunc casum eique convenientem figuram recte addidit Simsonus; nam Graeca $\eta \tau\omega\varsigma \alpha\delta \delta\gamma \delta\eta\epsilon\rho\alpha\chi\eta$ utrumque et $\alpha\delta - \delta\gamma$ et $\delta\gamma - \alpha\delta$ significant.

ἡ AB πρὸς τὴν BA , ἀνάπαλιν καὶ διελόντι ἐστὶν ὡς ἡ τῶν AA $ΔΓ$ ὑπεροχὴ πρὸς τὴν AA , οὕτως ἡ AA πρὸς τὴν AB . τὸ ἄρα ὑπὸ τῆς τῶν AA $ΔΓ$ ὑπεροχῆς καὶ τῆς AB ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς AA τετραγώνῳ.

- 220 κ'. Ἐστω ὡς ἡ AB πρὸς τὴν $BΓ$, οὕτως τὸ ἀπὸ AA πρὸς τὸ ἀπὸ $ΔΓ$. ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν $ABΓ$ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς BA τετραγώνῳ.

Κείσθω τῇ $ΓΔ$ ἴση ἡ $ΔΕ$. τὸ ἄρα ὑπὸ $EAΓ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $ΓΔ$, τουτέστιν τοῦ ὑπὸ $ΓΔΕ$, ἴσον τῷ ἀπὸ AA . ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν $BΓ$, οὕτως τὸ ἀπὸ AA πρὸς τὸ ἀπὸ $ΔΓ$, διελόντι ἐστὶν ὡς ἡ $ΔΓ$ πρὸς τὴν $ΓB$, τουτέστιν ὡς τὸ ὑπὸ $EAΓ$ πρὸς τὸ ὑπὸ EA $BΓ$, οὕτως τὸ ὑπὸ $EAΓ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΓΔΕ$. ἴσον ἄρα ἐστὶν τὸ ὑπὸ AE $BΓ$ τῷ ὑπὸ $ΓΔΕ$. ἀνάλογον καὶ διελόντι ἐστὶν ὡς ἡ AA πρὸς τὴν $ΔΕ$, τουτέστιν πρὸς τὴν $ΔΓ$, οὕτως ἡ AB πρὸς τὴν $BΓ$. καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ AB πρὸς λοιπὴν τὴν BA ἐστὶν ὡς ἡ BA πρὸς τὴν $BΓ$. τὸ ἄρα ὑπὸ $ABΓ$ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς BA τετραγώνῳ.

- 221 κ''. Ἐστω δὲ πάλιν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν $BΓ$, οὕτως τὸ ἀπὸ AA τετραγώνον πρὸς τὸ ἀπὸ $ΔΓ$ τετραγώνον. ὅτι τὸ ὑπὸ $ABΓ$ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς BA τετραγώνῳ.

Κείσθω γὰρ ὁμοίως τῇ $ΓΔ$ ἴση ἡ $ΔΕ$. τὸ ἄρα ὑπὸ $ΓΔΕ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $ΓΔ$, τουτέστιν τοῦ ὑπὸ $EAΓ$, ἴσον τῷ ἀπὸ AA . καὶ γίνεται κατὰ διαιρέσιν ὡς ἡ $ΔΓ$ πρὸς τὴν $ΓB$, τουτέστιν ὡς τὸ ὑπὸ $EAΓ$ πρὸς τὸ ὑπὸ EA $ΓB$, οὕτως τὸ ὑπὸ $ΓΔΕ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $EAΓ$. ἴσον ἄρα ἐστὶν τὸ ὑπὸ AE $ΓB$ τῷ ὑπὸ $EAΓ$. ἀνάλογον καὶ συνθέντι ἐστὶν ὡς ἡ AA πρὸς τὴν $ΔΕ$, τουτέστιν πρὸς τὴν $ΔΓ$, οὕτως ἡ AB πρὸς τὴν $BΓ$. καὶ ὅλη ἄρα ἡ AB πρὸς ὅλην τὴν BA ἐστὶν ὡς ἡ BA πρὸς τὴν $BΓ$. τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν $ABΓ$ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς BA τετραγώνῳ.

2. τῶν $AAΔΓ$ A, distinx. BS 5. κς' add. BS 9. τοῦ ὑπὸ $ΓΔΕ$ Co pro τὸ ὑπὸ $ΓΔΕ$ 12. ὑπὸ EA $BΓ$ ὑπὸ EA $ΘΕ$ A, ὑπὸ EA $ΘΓ$ B, corr. S 13. 14. ὑπὸ $ABΓ$ A, distinx. BS 14. ἀνάλογον Co pro ἀνάπαλιν, item vs. 27 17. πρὸς τὴν $BΓ$ Co pro πρὸς τὴν $ΓΓ$. 18. ἀπὸ τῆς BA AB, corr. S 19. κς' add. BS 21. ἴση

$\delta\gamma : \alpha\delta = \beta\delta : \alpha\beta$, et dirimendo

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha\delta - \delta\gamma \\ \delta\gamma - \alpha\delta \end{array} \right\} : \alpha\delta = \alpha\delta : \alpha\beta; \text{ ergo } \left\{ \begin{array}{l} \alpha\delta - \delta\gamma \\ \delta\gamma - \alpha\delta \end{array} \right\} \beta\alpha = \alpha\delta^2.$$

XXVI. Sit $\alpha\beta : \beta\gamma = \alpha\delta^2 : \delta\gamma^2$; dico esse $\alpha\beta \cdot \beta\gamma = \beta\delta^2$. Prop. 452

Ponatur $\delta\epsilon = \gamma\delta$;

$\alpha \quad \gamma \quad \beta \quad \delta \quad \epsilon$ est igitur propter elem. 2, 6

$\alpha\epsilon \cdot \alpha\gamma + \gamma\delta^2 = \alpha\delta^2$. Quoniam igitur est $\alpha\beta : \beta\gamma = \alpha\delta^2 : \delta\gamma^2$, dirimendo fit

$\alpha\beta - \beta\gamma : \beta\gamma = \alpha\delta^2 - \delta\gamma^2 : \delta\gamma^2$, sive

$\alpha\gamma : \beta\gamma = \alpha\epsilon \cdot \alpha\gamma : \delta\gamma^2$, id est

$\alpha\epsilon \cdot \alpha\gamma : \alpha\epsilon \cdot \beta\gamma = \alpha\epsilon \cdot \alpha\gamma : \delta\gamma^2$; est igitur

$\alpha\epsilon \cdot \beta\gamma = \delta\gamma^2$, id est $= \gamma\delta \cdot \delta\epsilon$. Per proportionem est

$\alpha\epsilon : \epsilon\delta = \gamma\delta : \beta\gamma$, et dirimendo

$\alpha\delta : \delta\epsilon = \beta\delta : \beta\gamma$, id est

$\alpha\delta : \delta\gamma = \beta\delta : \beta\gamma$; ergo per subtractionem proportionis

$\alpha\beta : \beta\delta = \beta\delta : \beta\gamma$, itaque $\alpha\beta \cdot \beta\gamma = \beta\delta^2$.

XXVII. Sit rursus $\alpha\beta : \beta\gamma = \alpha\delta^2 : \delta\gamma^2$; dico esse $\alpha\beta \cdot \beta\gamma = \beta\delta^2$. Prop. 453

Similiter enim ponatur

$\alpha \quad \epsilon \quad \delta \quad \gamma \quad \beta$ $\delta\epsilon = \gamma\delta$; est igitur propter elem. 2, 6

$\alpha\gamma \cdot \alpha\epsilon + \gamma\delta^2 = \alpha\delta^2$. Et, quia est $\alpha\beta : \beta\gamma = \alpha\delta^2 : \delta\gamma^2$, dirimendo fit

$\alpha\gamma : \beta\gamma = \alpha\gamma \cdot \alpha\epsilon : \delta\gamma^2$, id est

$\alpha\gamma \cdot \alpha\epsilon : \alpha\epsilon \cdot \beta\gamma = \alpha\gamma \cdot \alpha\epsilon : \delta\gamma^2$; est igitur

$\alpha\epsilon \cdot \beta\gamma = \delta\gamma^2$, id est $= \gamma\delta \cdot \delta\epsilon$. Per proportionem est

$\alpha\epsilon : \epsilon\delta = \gamma\delta : \beta\gamma$, et componendo

$\alpha\delta : \epsilon\delta = \beta\delta : \beta\gamma$, id est

$\alpha\delta : \delta\gamma = \beta\delta : \beta\gamma$; ergo tota ad totam (elem. 5. 12)


$\alpha\beta : \beta\delta = \beta\delta : \beta\gamma$, itaque $\alpha\beta \cdot \beta\gamma = \beta\delta^2$.

PROPOS. 452: Simson p. 547 sq., Breton p. 237 sq., Chasles p. 79 sq. 94. 305.

PROPOS. 453: Simson p. 548, Breton p. 238, Chasles p. 79 sq. 95. 268. 305.

A, corr. BS 22. $\eta\kappa\epsilon \Gamma A \lambda\alpha\eta$ AB!, corr. BcS 23. $\tau\omicron\upsilon$ (ante $\acute{\upsilon}\pi\acute{o}\ \epsilon\Gamma\Lambda$)
Hu pro $\tau\acute{o}$ $\acute{\upsilon}\pi\acute{o}\ \epsilon\Gamma\Lambda$] litteras $\Lambda\Gamma$ in rasura exhibet A post $\lambda\alpha\eta$
add. $\lambda\alpha\eta$ S 25. $\tau\acute{o}\ \acute{\upsilon}\pi\acute{o}\ \epsilon\Gamma\Lambda\Gamma$ — $\alpha\Gamma\omega\varsigma$ add. Co


- 222 κη'. Κύκλον τοῦ $AB\Gamma$ ἐφαπτέσθωσαν αἱ AD $ΔΓ$, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ $ΑΓ$, καὶ διήχθω τυχοῦσα ἡ AB . οὕτως ἡ BZ πρὸς τὴν AE , οὕτως ἡ BZ πρὸς τὴν ZE .



Ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ AD τῇ $ΔΓ$, τὸ ἄρα ὑπὸ $AZΓ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ ZA ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ $ΔA$. ἀλλὰ τὸ μὲν ὑπὸ $AZΓ$ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ BZE , τὸ δὲ ἀπὸ $ΔA$ ἴσον

τῷ ὑπὸ $BΔE$. τὸ ἄρα ὑπὸ BZE μετὰ τοῦ ἀπὸ AZ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ $BΔE$. ἔὰν δὲ ἡ τοῦτο, γίνεται ὡς ἡ $BΔ$ πρὸς τὴν AE , οὕτως ἡ BZ πρὸς τὴν ZE .

- 223 κθ'. Τμήματος δοθέντος τοῦ ἐπὶ τῆς AB , κλάσαι εὐθεϊαν τὴν $ΑΓΒ$ ἐν λόγῳ τῷ δοθέντι.



Γεγονέτω, καὶ διήχθω ἀπὸ τοῦ $Γ$ ἐφαπτομένη ἡ $ΓΔ$. ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ $ΑΓ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΒΓ$, οὕτως ἡ AD πρὸς AB . λόγος δὲ τοῦ ἀπὸ $ΑΓ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΓB$ δοθείς, ὥστε καὶ ὁ τῆς AD πρὸς τὴν $BΔ$ δοθείς. καὶ ἔστιν δοθέντα τὰ $A B$. δοθὲν ἄρα ἐστὶν τὸ $Δ$, ὥστε καὶ τὸ $Γ$ δοθέν.

1. κη' add. BS ἑγάρπτεται A, ἑγάρπονται BS, corr. Co 2. τυχοῦσα ἡ AB ABS, corr. Simson p. 518 13. 14. ἴσον τῷ ἐστὶν το A, ἐστὶ τὸ BS, ἐστὶ τῷ V, ἴσον ἐστὶ τῷ Sca 14. post τὸ ἄρα repetunt τὸ AB, del. S 17. κθ' add. BS 19. ἐφαπτομένη A, corr. BS 21. 22. τὸ ἀπὸ $ΓB$ — A.f πρὸς add. Co 22. δοθείς Sca pro δοθέν 22. 23. δοθέντα τὰ $A B$ Hu auctore Simsono p. 453 pro δύο 23. τὸ $Γ$ δοθέν Hu auctore Simsono pro τὸ H.f δοθέν

XXVIII. Circulum $\alpha\beta\gamma$ tangant $\alpha\delta$ $\delta\gamma$, et iungatur $\alpha\gamma$, Prop. 154
 ducanturque quaelibet $\delta\beta$, quae circumferentiam in ϵ et β ,
 rectum $\alpha\gamma$ in ζ secet: dico fieri $\beta\delta : \delta\epsilon = \beta\zeta : \zeta\epsilon$.

Quoniam enim est $\alpha\delta = \delta\gamma$, ducta perpendiculari $\delta\eta$ ad
 $\alpha\gamma$, est etiam $\alpha\eta = \eta\gamma$, itaque propter elem. 2, 5

$$\alpha\zeta \cdot \zeta\gamma + \zeta\eta^2 = \alpha\eta^2, \text{ et communi addito } \eta\delta^2$$

$$\alpha\zeta \cdot \zeta\gamma + \zeta\eta^2 + \eta\delta^2 = \alpha\eta^2 + \eta\delta^2, \text{ id est}^1.$$

$$\alpha\zeta \cdot \zeta\gamma + \zeta\delta^2 = \alpha\delta^2.$$

Sed est $\alpha\zeta \cdot \zeta\gamma = \beta\zeta \cdot \zeta\epsilon$ (elem. 3, 35), et $\alpha\delta^2 = \beta\delta \cdot \delta\epsilon$ (ibid. 36); ergo

$$\beta\zeta \cdot \zeta\epsilon + \zeta\delta^2 = \beta\delta \cdot \delta\epsilon.$$

Verum si hoc sit, sit etiam $\beta\delta : \delta\epsilon = \beta\zeta : \zeta\epsilon$: subtrahantur
 enim aequalia $\beta\zeta \cdot \zeta\epsilon + \zeta\delta^2 = \beta\delta \cdot \delta\epsilon$ ex $\beta\delta \cdot \delta\zeta$, id est e.r

$$\beta\zeta \cdot \zeta\epsilon + \beta\zeta \cdot \delta\epsilon + \zeta\delta^2 = \beta\delta \cdot \zeta\epsilon + \beta\delta \cdot \delta\epsilon^* ; \text{ restat}$$

$$\beta\zeta \cdot \delta\epsilon = \beta\delta \cdot \zeta\epsilon, \text{ ut est } \beta\delta : \delta\epsilon = \beta\zeta : \zeta\epsilon.$$

XXIX. Circuli segmento dato in recta $\alpha\beta$, inflectantur Prop. 155
 rectae $\alpha\gamma$ $\gamma\beta$ in data proportione.

Factum iam sit, et ducatur a γ tangens $\gamma\delta$: est igitur
 $\alpha\delta \cdot \delta\beta = \delta\gamma^2$ (elem. 3, 36), sive per proportionem

$$\alpha\delta : \delta\gamma = \delta\gamma : \delta\beta, \text{ itaque propter elem. 6, 20 coroll. 2}$$

$$\alpha\delta^2 : \delta\gamma^2 = \alpha\delta : \delta\beta. \text{ Sed quia propter aequales angu-}$$

los $\delta\alpha\gamma$ $\delta\gamma\beta$ (elem. 3, 32) simi-
 lia sunt triangula $\alpha\delta\gamma$ $\gamma\delta\beta$, est
 igitur $\alpha\delta : \delta\gamma = \alpha\gamma : \gamma\beta$, item-
 que quadrata

$$\alpha\delta^2 : \delta\gamma^2 = \alpha\gamma^2 : \gamma\beta^2; \text{ ergo est}$$

$$\alpha\gamma^2 : \gamma\beta^2 = \alpha\delta : \delta\beta.$$

Sed est data proportio $\alpha\gamma : \gamma\beta$, itemque $\alpha\gamma^2 : \gamma\beta^2$; data igitur
 etiam proportio $\alpha\delta : \delta\beta$. Et data sunt puncta α β : ergo etiam
 δ datum, itemque tangens $\delta\gamma$ (dat. 91); itaque etiam punctum γ .

PROPOS. 154: Simson p. 518 sq., Breton p. 328 sq., Chasles p. 80.
 95, 262, 273, 278, 317. Et conf. append. ad libri VI propos. 53.

1) Addita haec et proxima secundum Simsonum p. 519.

*) Scilicet, quia $\beta\delta = \beta\zeta + \zeta\delta$, et $\zeta\delta = \zeta\epsilon + \epsilon\delta$, sit $\beta\delta \cdot \delta\zeta = \beta\zeta \cdot \zeta\delta$
 + $\zeta\delta^2 = \beta\zeta \cdot \zeta\epsilon + \beta\zeta \cdot \delta\epsilon + \zeta\delta^2 = \beta\delta \cdot \zeta\epsilon + \beta\delta \cdot \delta\epsilon$.

PROPOS. 155: Simson p. 453 sq., Breton p. 329 sq., Chasles p. 81.
 95, 271, 294. Nonnulla in hoc problemate partim Commandino, par-
 tim Simsono auctoribus addita sunt.

Συντεθήσεται δὴ τὸ πρόβλημα οὕτως. ἔστω τὸ μὲν τμήμα τὸ $ABΓ$, ὃ δὲ λόγος ὁ τῆς E πρὸς τὴν Z , καὶ πεποιθῶσθω ὡς τὸ ἀπὸ E πρὸς τὸ ἀπὸ Z , οὕτως ἡ AA πρὸς τὴν AB , καὶ ἤχθω ἐραπτομένη ἡ $ΔΓ$, καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ $ΑΓ ΓΒ$. λέγω ὅτι αἱ $ΑΓ ΓΒ$ ποιοῦσι τὸ πρόβλημα.

Ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὡς τὸ ἀπὸ E πρὸς τὸ ἀπὸ Z , οὕτως ἡ AA πρὸς τὴν AB , ὡς δὲ ἡ AA πρὸς τὴν AB , οὕτως τὸ ἀπὸ $ΑΓ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΓΒ$ (διὰ τὸ ἐραπτεσθαι τὴν $ΓΔ$, καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ E πρὸς τὸ ἀπὸ Z , οὕτως τὸ ἀπὸ $ΑΓ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΓΒ$. ὥστα καὶ ὡς ἡ E πρὸς τὴν Z , οὕτως ἡ $ΑΓ$ πρὸς τὴν $ΓΒ$. ἡ $ΑΓΒ$ ἄρα ποιεῖ τὸ πρόβλημα.

224 λ'. Κύκλος οὗ διάμετρος ἡ AB , καὶ ἀπὸ τυχόντος ἐπ' αὐτὴν κάθετος ἡ $ΔΕ$, διήχθω ἡ AZ , ἐπεξεύχθω ἡ EZ καὶ ἐκβεβλήσθω, καὶ καθ' ὃ συμπέπτει τῇ διαμέτρῳ ἔστω 15 τὸ H . ὅτι ἐστὶν ὡς ἡ AH πρὸς τὴν HB , οὕτως ἡ $AΘ$ πρὸς τὴν $ΘΒ$.

Ἐπεξεύχθωσαν αἱ $AA AE AZ$. ἐπεὶ οὖν ἐπὶ διαμέτρου κάθετος ἡ $ΔΕ$, ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ AAB τῇ ὑπὸ BAE . ἀλλ' ἡ ὑπὸ $ΔAB$ τῇ ἐν τῷ αὐτῷ τμήματι ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ 20 $ΘΖΒ$, ἡ δὲ ὑπὸ BAE ἴση ἐστὶν τῇ ἐκτὸς τετραπλεύρου τῇ ὑπὸ BZH . καὶ τῇ ὑπὸ $ΘΖΒ$ ἄρα γωνία ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ BZH . καὶ ἐστὶν ὁρθὴ ἡ ὑπὸ AZB γωνία. διὰ δὴ τὸ λίμμα γίνεται ὡς ἡ AH πρὸς τὴν HB , οὕτως ἡ $AΘ$ πρὸς τὴν $ΘΒ$. 25


225 λα'. Ἡμικύκλιον τὸ ἐπὶ τῆς AB , καὶ ἀπὸ τῶν $A B$.

2. ὁ (post λόγος) om. A¹, add. A²BS τῆς E πρὸς AB Co Sca, τῆς S πρὸς S cod. Co 4. ἐπεξεύχθω A¹, corr. man. secunda vel nlla recentior 10. οὕτως τὸ A² (οὕτω τὸ BS, οὕτωσε A¹ ante rasuram, ut videtur, οὕτως ἐστὶν τὸ conl. Hu ἀπὸ (ante ΑΓ) om. A¹B, add. A² super vs. S 43 sqq. hinc usque ad cap. 222 aut omnia aut pleraque lemmata ab aliis mathematicis Pappi collectioni addita esse videntur (conf. adnot. ad propos. 162) 43. λ' add. BS 44. καὶ ante διήχθω et ante ἐπεξεύχθω add. Ge 49. 20. ἐπὸ BAE — AAB τῇ add. Co 20. ἴση A , corr. BS 22. 23. ἡ ὑπὸ BZH Sca, τῇ ὑπὸ BZH AB, τῇ ὑπὸ $βζη$ S 23. 24. δὴ τι λίμμα conl. Hu 25. $ΘΒ$ Hu pro $ΒΘ$ 26. λα' add. BS τῶν $AH A$, distinxz. BS

Componetur problema sic. Sit circuli segmentum $\alpha\beta\gamma$, et data proportio $\epsilon : \zeta$, fiatque $\alpha\delta : \delta\beta = \epsilon^2 : \zeta^2$, et ducatur tangens $\delta\gamma$, iunganturque $\alpha\gamma$ $\gamma\beta$; dico rectas $\alpha\gamma$ $\gamma\beta$ problema efficere.

Quoniam enim est $\epsilon^2 : \zeta^2 = \alpha\delta : \delta\beta$, et $\alpha\delta : \delta\beta = \alpha\gamma^2 : \gamma\beta^2$ (tangit enim $\gamma\delta$; ac vide singula supra); ergo etiam est $\epsilon^2 : \zeta^2 = \alpha\gamma^2 : \gamma\beta^2$, itaque $\epsilon : \zeta = \alpha\gamma : \gamma\beta$; ergo rectae $\alpha\gamma$ $\gamma\beta$ problema efficiunt.

XXX. Sit circulus eiusque diametrus $\alpha\beta$, et ad eam a Prop. 156 quovis circumferentiae puncto ducatur perpendicularis chorda $\delta\epsilon$; ducatur alia chorda $\delta\zeta$ diametrum secans in ϑ , et iungatur $\epsilon\zeta$ producatque ad η punctum concursus cum diametro; dico esse $\alpha\eta : \eta\beta = \alpha\vartheta : \vartheta\beta$.



lungantur $\delta\alpha$ $\alpha\zeta$. Iam quia in diametro perpendicularis est $\delta\epsilon$, propter elem. 3, 5. 1, 4 anguli $\delta\alpha\beta$ $\beta\alpha\epsilon$ aequales sunt. Sed est

$\angle \delta\alpha\beta = \angle \delta\zeta\beta$ sive $\vartheta\zeta\beta$ in eodem segmento, et

$\angle \beta\alpha\epsilon = \angle \beta\zeta\eta$ exteriori quadrilateri circulo inscripti $\beta\zeta\epsilon\alpha$; ergo etiam

$\angle \vartheta\zeta\beta = \angle \beta\zeta\eta$.

Et est rectus angulus $\alpha\zeta\beta$; itaque propter lemma¹⁾ fit $\alpha\eta : \eta\beta = \alpha\vartheta : \vartheta\beta$.

XXXI. Sit semicirculus in recta $\alpha\beta$, et a punctis α β Prop. 157

PROPOS. 156: Simson p. 461 sq., Breton p. 240, Chasles p. 81. 95 sq. 256. 266 sqq. 278.

1) Lemma hoc, quod scriptor significat, cum inter Pappi reliquias non exstet, restitutum est a Commandino et Simsono: vide append.

PROPOS. 157: Simson p. 519 sqq., Breton p. 240 sq., Chasles p. 81. 96. 279. 295. Littera γ et in figura omissa et in propositione supervacanea (vide adnot. ad p. 908, 1) indicat hanc demonstrationem partem fuisse alius latioris.

ipsi $\alpha\beta$ perpendiculares ducantur rectae $\beta\delta$ $\alpha\epsilon$, et ducatur quaelibet $\delta\epsilon$, et a puncto ζ ipsi $\delta\epsilon$ perpendicularis recta $\zeta\eta$ concurrat cum $\alpha\beta$ in η ; dico esse $\alpha\epsilon \cdot \beta\delta = \alpha\eta \cdot \eta\beta$.

Sit ita; ergo per proportionem est $\alpha\epsilon : \alpha\eta = \eta\beta : \beta\delta$. Et circa aequales angulos latera sunt proportionalia; ergo est, iunctis $\eta\epsilon$ $\eta\delta$, $\angle \alpha\eta\epsilon = \angle \beta\delta\eta$. Sed propter rectos angulos $\epsilon\alpha\eta$ $\delta\zeta\eta$ puncta ϵ α ζ η sunt in circulo (elem. 3, 31), ideoque, ut in eodem segmento, est $\angle \alpha\eta\epsilon = \angle \alpha\zeta\epsilon$; et rursus puncta δ ζ β η sunt in circulo, ideoque, ut in eodem segmento, $\angle \beta\delta\eta = \angle \beta\zeta\eta$. Est igitur $\angle \alpha\zeta\epsilon = \angle \beta\zeta\eta$. Est vero; nam uterque angulus cum angulo $\epsilon\zeta\beta$ rectum efficit.

XXXII. Sit triangulum $\alpha\beta\gamma$ latera $\alpha\beta$ $\alpha\gamma$ aequalia ha-
bens²⁾, et producat $\beta\alpha$ ad δ , et a δ ducatur $\delta\epsilon$ triangulum
 $\beta\delta\epsilon$ triangulo $\alpha\beta\gamma$ aequale faciens; dico, si unum ex aequa-
libus lateribus, quod est ad triangulum aequale, bifariam


Prop.
158

secetur a recta $\beta\zeta$, fieri
 $\zeta\beta + \beta\eta : \zeta\eta = \alpha\zeta^2 : \zeta\theta^2$.

Sit ita, et ducatur per β
rectae $\delta\epsilon$ parallela $\beta\chi$, et pro-
ducatur $\gamma\alpha$ ad κ ; ergo prop-
ter parallelas $\beta\chi$ $\eta\theta$ est

$$\alpha\zeta : \zeta\theta = \beta\zeta : \zeta\eta, \text{ itemque} \\ 2\alpha\zeta : \zeta\theta = 2\beta\zeta : \zeta\eta, \text{ et}$$

dirimendo



1) Compositionem a Graeco scriptore omissam addunt Commandinus et Simsonus, sic incipientem: "Quoniam uterque angulorum $\alpha\zeta\beta$ $\epsilon\zeta\eta$ rectus est, dempto communi angulo $\epsilon\zeta\beta$ erit angulus $\alpha\zeta\epsilon$ aequalis angulo $\beta\zeta\eta$ " cet. Praeterea alteram figuram cum punctorum serie α η β addit Simsonus.

PROPOS. 158: Simson p. 528 sq., Breton p. 241 sq., Chasles p. 79. 96. 307.

2) "Nihil est in demonstratione quod pendet ex aequalitate laterum $\alpha\beta$ $\alpha\gamma$; tenet enim in quocunque triangulo. Propositio igitur sine dubio est corrupta" Simson, cui adstipulatur Chasles p. 96. 307.

per 11, η $\zeta\theta\eta$ BS 30. $\sigma\tau\alpha\mu\gamma\sigma\tau\epsilon\tau\alpha$ B, item A, nisi quod de accentu non constat, corr. S

$x\zeta + x\vartheta : \zeta\vartheta = \beta\zeta + \beta\eta : \zeta\eta$. Sed ex hypothesi est

$\beta\zeta + \beta\eta : \zeta\eta = \alpha\zeta^2 : \zeta\vartheta^2$; ergo

$x\zeta + x\vartheta : \zeta\vartheta = \alpha\zeta^2 : \zeta\vartheta^2$, id est

$(x\zeta + x\vartheta) \zeta\vartheta : \zeta\vartheta^2 = \alpha\zeta^2 : \zeta\vartheta^2$; ergo est

$(x\zeta + x\vartheta) \zeta\vartheta = \alpha\zeta^2$. Sed fingatur recta dupla ipsius $x\vartheta$; est igitur propter elem. 2, 6

$(2x\vartheta + \vartheta^2) \vartheta\zeta + x\vartheta^2 = \zeta x^2$, id est

$(x\zeta + x\vartheta) \vartheta\zeta = \zeta x^2 - x\vartheta^2$; est igitur

$\zeta x^2 - x\vartheta^2 = \alpha\zeta^2$, itaque

$\zeta x^2 - \alpha\zeta^2 = x\vartheta^2$. Sed, quia ex constructione est $\alpha\zeta^2 = \zeta\gamma$, propter elem. 2, 6 est

$\zeta x^2 - \alpha\zeta^2 = \gamma\kappa \cdot \kappa\alpha$; ergo

$\gamma\kappa \cdot \kappa\alpha = x\vartheta^2$; est igitur

$\gamma\kappa : x\vartheta = x\vartheta : \kappa\alpha$, id est, quia propter $\beta\kappa$ et $\delta\vartheta$ parallelas $\gamma\kappa : x\vartheta = \gamma\beta : \beta\delta$, et propter $\beta\kappa$ et $\delta\delta$ parallelas $x\vartheta : \kappa\alpha = \delta\beta : \beta\alpha$,

$\gamma\beta : \beta\delta = \delta\beta : \beta\alpha$.

Sic autem haec proportio (quam effecimus ratione analytica statuente esse $\beta\zeta + \beta\eta : \zeta\eta = \alpha\zeta^2 : \zeta\vartheta^2$) re vera se habet; nam porro hinc sequitur parallelas esse ae et $\delta\gamma$; sunt vero parallelae, quia ex constructione triangulum $\delta\beta\epsilon$ triangulo $\alpha\beta\gamma$ aequale est, et communi dempto triangulo $\alpha\beta\epsilon$ reliquum $\alpha\epsilon\delta$ reliquo $\alpha\epsilon\gamma$ aequale est; suntque in eadem basi, et cet. 1).

XXXIII. Sit circulus circa diametrum $\alpha\beta$, et producat^{Prop. 159}ur $\alpha\beta$ ad punctum ζ , rectaeque $\alpha\zeta$ perpendicularis sit $\delta\epsilon$, sitque $\alpha\zeta \cdot \zeta\beta = \zeta\eta^2$; dico, utcumque sumatur punctum ϵ , si recta hinc ad η iuncta eademque producta circuli circumferentiam in punctis x et ϑ secet, fieri $\vartheta\epsilon \cdot \epsilon x = \epsilon\eta^2$.

Iungantur ae et $\lambda\beta$; rectus igitur est angulus λ . Sed etiam angulus ζ rectus est; ergo propter similitudinem triangulorum $\alpha\lambda\beta$ et $\alpha\zeta\epsilon$ est

$\alpha\lambda : \alpha\zeta = \alpha\beta : \alpha\epsilon$, sive

$\alpha\lambda \cdot \alpha\epsilon = \alpha\beta \cdot \alpha\zeta$. Sed quia est $\alpha\epsilon^2 = \alpha\zeta^2 + \zeta\epsilon$, fit etiam

1) Et analysim brevius adumbravit scriptor (conf. infra adnot. ad propos. 162; et omisit, ut in superiore lemmate, compositionem, quam postea addiderunt iidem qui supra citati sunt.

τὸ μὲν ὑπὸ $AB\Lambda$ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΘEK , τὸ δὲ ὑπὸ AZB ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ZH τετραγώνῳ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΘEK ἴσον ἐστὶν τοῖς ἀπὸ τῶν BZ ZH τετραγώνοις, τουτέστιν τῷ ἀπὸ EH τετραγώνῳ.

- 228 λδ'. Ἐστω ὡς ἡ AB πρὸς τὴν $B\Gamma$, οὕτως ἡ $A\Lambda$ πρὸς 5 τὴν $A\Gamma$, καὶ τεμηθῶ ἡ $A\Gamma$ δίχα κατὰ τὸ E σημεῖον· ὅτι γίνεται τρία, τὸ μὲν ὑπὸ $BE\Lambda$ ἴσον τῷ ἀπὸ $E\Gamma$ τετραγώνῳ, τὸ δὲ ὑπὸ $B\Lambda E$ τῷ ὑπὸ $A\Lambda\Gamma$, τὸ δὲ ὑπὸ $AB\Gamma$ τῷ ὑπὸ EBA .

Ἐπεὶ γὰρ ὡς ἡ AB πρὸς 10 τὴν $B\Gamma$, οὕτως ἡ $A\Lambda$ πρὸς τὴν $A\Gamma$, συνθέντι καὶ τὰ ἡμίση τῶν ἡγουμένων καὶ ἀναστρέψαντι ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ BE πρὸς τὴν $E\Gamma$, οὕτως ἡ $E\Gamma$ πρὸς τὴν $E\Lambda$ · τὸ ἄρα ὑπὸ $BE\Lambda$ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ $E\Gamma$. 15 κοινὸν ἀφηρήσθω τὸ ἀπὸ ΛE τετραγώνον· λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ $B\Lambda E$ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ $A\Lambda\Gamma$. πάλιν τὸ ὑπὸ $BE\Lambda$ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ $E\Gamma$ τετραγώνῳ. ἀμφοτέρω ἀφηρήσθω ἀπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς BE τετραγώνου· λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν $AB\Gamma$ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν EBA . 20

Ἀλλὰ ἔστω νῦν τὸ ὑπὸ τῶν $B\Lambda E$ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν $A\Lambda\Gamma$, καὶ τεμηθῶ δίχα ἡ ΓA κατὰ τὸ E · ὅτι ἐστὶν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν $B\Gamma$, οὕτως ἡ $A\Lambda$ πρὸς τὴν $A\Gamma$.

Ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ τῶν $B\Lambda E$ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν $A\Lambda\Gamma$, κοινὸν προσκείσθω τὸ ἀπὸ ΛE τετραγώνον· ἕλλον 25 ἄρα τὸ ὑπὸ $BE\Lambda$ ἴσον τῷ ἀπὸ ΓE τετραγώνῳ. ἀνάλογον καὶ ἀναστρέψαντι καὶ δις τὰ ἡγούμενα καὶ διελόντι ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν $B\Gamma$, οὕτως ἡ $A\Lambda$ πρὸς τὴν $A\Gamma$.

1. τὸ μὲν A rec. ex τὸ μετ' 3. ἀπὸ τῶν $\overline{EZH}$ ABS, corr. Co
5. λδ' add. BS 14. ὡς ἡ $\overline{AE}$ ABS, corr. Co οὕτως add. Ge
15. τὸ ἄρα ὑπὸ $\overline{AE\Lambda}$ ABS, corr. Co 16. τὸ ἀπὸ $\overline{AE}$ Co pro τὸ
ἀπὸ $\overline{GE}$ 17. 18. πάλιν τὸ ἀπὸ $\overline{AE\Lambda}$ — τῷ ἀπὸ $\overline{A\Gamma}$ ABS, corr.
Co 20. ὑπὸ τῶν $\overline{EBA}$ Co pro ὑπὸ τῶν $\overline{EB\Gamma}$ 32. ὡς om. AB,
add. S 27. καὶ ἀναστρέψαντι add. Co

$$\alpha\epsilon^2 - \alpha\lambda \cdot \alpha\epsilon = \alpha\zeta^2 - \alpha\beta \cdot \alpha\zeta + \zeta\epsilon^2, \text{ id est}$$

$$\alpha\epsilon \cdot \epsilon\lambda = \alpha\zeta \cdot \zeta\beta + \zeta\epsilon^2.$$

Sed est $\alpha\epsilon \cdot \epsilon\lambda = \vartheta\epsilon \cdot \epsilon\kappa$, et ex constructione $\alpha\zeta \cdot \zeta\beta = \zeta\eta^2$; est igitur

$$\begin{aligned} \vartheta\epsilon \cdot \epsilon\kappa &= \zeta\eta^2 + \zeta\epsilon^2, \text{ id est} \\ &= \epsilon\eta^2. \end{aligned}$$

XXXIV. Sit $\alpha\beta : \beta\gamma = \alpha\delta : \delta\gamma$, et bifariam secetur $\alpha\gamma$ ^{Prop. 16^o} in puncto ϵ ; dico tria fieri, primum $\beta\epsilon \cdot \epsilon\delta = \epsilon\gamma^2$, tum $\beta\delta \cdot \delta\epsilon = \alpha\delta \cdot \delta\gamma$, denique $\alpha\beta \cdot \beta\gamma = \epsilon\beta \cdot \beta\delta$.

Quoniam enim est $\alpha\beta : \beta\gamma = \alpha\delta : \delta\gamma$, componendo est
 $\alpha\gamma + 2\beta\gamma : \beta\gamma = \alpha\gamma : \delta\gamma$, et dimidiando antecedentes
magnitudines

$$\epsilon\gamma + \beta\gamma : \beta\gamma = \epsilon\gamma : \delta\gamma, \text{ et convertendo}$$

$$\beta\epsilon : \epsilon\gamma = \epsilon\gamma : \epsilon\delta; \text{ ergo est } \beta\epsilon \cdot \epsilon\delta = \epsilon\gamma^2.$$

Tum ex hac aequatione commune subtrahatur $\delta\epsilon^2$; est igitur
 $\beta\epsilon \cdot \epsilon\delta - \delta\epsilon^2 = \beta\delta \cdot \delta\epsilon$, et propter elem. 2, 5 $\epsilon\gamma^2 - \delta\epsilon^2 = \alpha\delta \cdot \delta\gamma$; ergo

$$\beta\delta \cdot \delta\epsilon = \alpha\delta \cdot \delta\gamma.$$

Rursus, quia est $\beta\epsilon \cdot \epsilon\delta = \epsilon\gamma^2$, utrumque subtrahatur ex $\beta\epsilon^2$; est igitur $\beta\epsilon^2 - \beta\epsilon \cdot \epsilon\delta = \epsilon\beta \cdot \beta\delta$, et propter elem. 2, 6 $\beta\epsilon^2 - \epsilon\gamma^2 = \alpha\beta \cdot \beta\gamma$; ergo

$$\alpha\beta \cdot \beta\gamma = \epsilon\beta \cdot \beta\delta.$$

Sed sit nunc $\beta\delta \cdot \delta\epsilon = \alpha\delta \cdot \delta\gamma$, et $\alpha\gamma$ in ϵ bifariam secetur; dico esse $\alpha\beta : \beta\gamma = \alpha\delta : \delta\gamma$.

Quoniam enim est $\beta\delta \cdot \delta\epsilon = \alpha\delta \cdot \delta\gamma$, commune addatur $\delta\epsilon^2$; est igitur $\beta\delta \cdot \delta\epsilon + \delta\epsilon^2 = \beta\epsilon \cdot \epsilon\delta$, et propter elem. 2, 5 $\alpha\delta \cdot \delta\gamma + \delta\epsilon^2 = \gamma\epsilon^2$; ergo

$$\beta\epsilon \cdot \epsilon\delta = \gamma\epsilon^2. \text{ Per proportionem igitur est}$$

$$\beta\epsilon : \epsilon\gamma = \gamma\epsilon : \epsilon\delta, \text{ et convertendo duplicandoque ante-}$$


cedentes

$$2\beta\epsilon : \beta\gamma = \alpha\gamma : \delta\gamma, \text{ et dirimendo (est scilicet } 2\beta\epsilon = \alpha\gamma + 2\beta\gamma)$$

$$\alpha\gamma + 2\beta\gamma - \beta\gamma : \beta\gamma = \alpha\gamma - \delta\gamma : \delta\gamma, \text{ id est}$$

$$\alpha\beta : \beta\gamma = \alpha\delta : \delta\gamma.$$


- 229 λε'. Τούτων ὄντων ἔστω κύκλος ὁ περὶ διάμετρον τὴν AB , καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ AB , ἔστω δὲ ἐπὶ τευχούσαν τὴν AE κάθετος, καὶ πεποιήσθω ὡς ἡ AZ πρὸς τὴν ZB , οὕτως ἡ AH πρὸς τὴν HB . ὅτι πάλιν, ὅλον ἐὰν ἐπὶ τῆς BA σημείον ληφθῇ ὡς τὸ E , καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ EH ἐκβληθῇ ἐπὶ τὸ Θ , γίνεται ὡς ἡ ΘE πρὸς τὴν EK , οὕτως ἡ ΘH πρὸς τὴν HK .



Εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ A , καὶ ἀπὸ τοῦ A ἐπὶ τὴν $E\Theta$ κάθετος ἤχθω 10 ἡ AM . ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ KM τῇ $M\Theta$. ἐπεὶ δὲ ὁρθὴ ἐστὶν ἑκατέρω τῶν MZ γωνιῶν, ἐν κύκλῳ ἐστὶν τὰ EZA 15 σημεία· τὸ ἄρα ὑπὸ ZHA

ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν EHM . ἀλλὰ τὸ ὑπὸ τῶν ZHA ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν AHB (διὰ τὸ εἶναι ὡς τὴν AZ πρὸς τὴν ZB , οὕτως τὴν AH πρὸς τὴν HB , καὶ τέτμηται ἡ AB δίχα κατὰ τὸ A). καὶ τὸ ὑπὸ τῶν EHM ἄρα ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν AHB , τουτέστιν ἐν κύκλῳ γὰρ τῷ ὑπὸ 20 τῶν ΘHK . καὶ τέτμηται δίχα ἡ ΘK κατὰ τὸ M . διὰ δὲ τὸ προγεγραμμένον γίνεται ὡς ἡ ΘE πρὸς τὴν EK , οὕτως ἡ ΘH πρὸς τὴν HK .

- 230 λζ'. Ἡμικύκλιον τὸ ἐπὶ τῆς AB , καὶ παράλληλος τῇ AB ἡ ΓA , καὶ κάθετοι ἤχθωσαν αἱ ΓE AH . ὅτι ἴση ἐστὶν 25 ἡ AE τῇ HB .



Εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ Z , καὶ ἐπεζευχθωσαν αἱ ΓZ ZA . ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΓZ τῇ ZA , ὥστε καὶ 30 τὸ ἀπὸ τῆς ΓZ ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς ZA τετραγώνῳ. ἀλλὰ τῷ

4. λε' add. BS 4. ἐπὶ τῆς EJ Hu auctore Co pro ἐπὶ τῆς ΓJ

5. ἐπιζευχθῇ ἡ EH ἐκβεβλήσθω ABS , corr. Hu auctore Co (ἐπιζευχθῇ ἡ EH καὶ ἐκβληθῇ Ge) 13. 14. τῶν MZ — τὰ EZ AM A, distinct. BS 15. 16. τὸ ἄρα ὑπὸ ZHA ἴση A, corr. BS 18. 19. καὶ τε-

XXXV. His ita se habentibus sit circulus circa diame-
trum $\alpha\beta$, et producat^{ur} $\alpha\beta$ ad ζ , sitque $\alpha\zeta$ perpendicularis
ad quamlibet rectam $\delta\epsilon$, et fiat $\alpha\eta$: $\eta\beta = \alpha\zeta$: $\zeta\beta$; dico, ut-
cumque in recta $\delta\epsilon$ punctum ϵ sumatur, si iuncta $\epsilon\eta$ circum-
ferentiam secet in x eademque producat^{ur} ad ϑ alterum punc-
tum sectionis circumferentiae, rursus¹⁾; fieri $\vartheta\epsilon$: $\epsilon x = \vartheta\eta$: ηx .

Prop.
161

Sumatur circuli centrum λ , ab eoque ad $\epsilon\vartheta$ perpendi-
cularis ducatur $\lambda\mu$; est igitur $\lambda\mu = \mu\vartheta$ (elem. 3, 3). Sed
quoniam uterque angulorum $\mu\zeta$ rectus est, in circulo sunt
puncta $\epsilon\zeta\mu\lambda$ *); est igitur $\zeta\eta\cdot\eta\lambda = \epsilon\eta\cdot\eta\mu$. Sed quia ϵx
hypothesi est $\alpha\zeta$: $\zeta\beta = \alpha\eta$: $\eta\beta$, et recta $\alpha\beta$ in puncto λ bi-
fariam secta est, propter superius lemma est $\zeta\eta\cdot\eta\lambda = \alpha\eta\cdot\eta\beta$;
ergo etiam

$$\epsilon\eta\cdot\eta\mu = \alpha\eta\cdot\eta\beta, \text{ id est, quia in circulo rectae } \alpha\beta \text{ } \vartheta x \\ \text{inter se secant,} \\ = \vartheta\eta\cdot\eta x.$$

Et secta est ϑx bifariam in puncto μ ; ergo propter id quod
supra (lemm. XXXIV extr.) demonstratum est sit $\vartheta\epsilon$: $\epsilon x =$
 $\vartheta\eta$: ηx .

XXXVI. Sit semicirculus in recta $\alpha\beta$, et ipsi $\alpha\beta$ paral-
lela $\gamma\delta$, et perpendiculares ducantur $\gamma\epsilon$ $\delta\eta$; dico esso $\alpha\epsilon = \eta\beta$.

Prop.
162

Sumatur circuli centrum ζ , et iungantur $\gamma\zeta$ $\zeta\delta$; est igi-
tur $\gamma\zeta = \zeta\delta$, itaque $\gamma\zeta^2 = \zeta\delta^2$. Sed est $\gamma\zeta^2 = \gamma\epsilon^2 + \epsilon\zeta^2$,

PROPOS. 161: Simson p. 307 sq., Breton p. 244 sq., Chasles p. 80.
97. 262. 273. 278.

1) Haec vox vix ad lemma XXXIII aut XXX referri posse, sed
aliam quandam propositionem nunc perditam spectare videtur.

*) "Nam, si iuncta $\epsilon\lambda$ circa ipsam circulus describatur, per μ ζ
puncta transibit" Co.

PROPOS. 162: Simson p. 323 sq. (qui haec addit "observare licet in-
signem differentiam inter demonstrationem huius et praecedentis pro-
positionis 158; praecedens enim nimis videtur esse brevis, et quaedam
in ea supplenda sunt, haec autem instar elementorum admodum est ex-
plicita; idem autem in multis aliis Pappi (conf. supra p. 323 adnot. "
observandum est"), Breton p. 243, Chasles p. 81. 98. 279. 296.

$\tau\eta\sigma\theta\alpha\iota \tau\eta\varsigma AB$ Hu 20. 21. $\tau\omicron\upsilon\tau\epsilon\sigma\tau\iota \tau\eta\iota \iota\pi\omicron\delta \tau\omicron\upsilon\tau\eta\theta\epsilon\iota\theta\kappa$ $\epsilon\tau\iota \chi\iota\lambda\iota\phi$
 $\gamma\alpha\rho$ coni. Ge auctore Co 21. $\delta\eta$ add. Ge 24. $\lambda\zeta'$ add. BS

μὲν ἀπὸ ΓΖ τετραγώνῳ ἴσα ἐστὶν τὰ ἀπὸ τῶν ΓΕ ΕΖ τετράγωνα, τῇ δὲ ἀπὸ ΑΖ τετραγώνῳ ἴσα ἐστὶν τὰ ἀπὸ τῶν ΔΗ ΗΖ τετράγωνα· καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΓΕ ΕΖ ἄρα τετράγωνα ἴσα ἐστὶν τοῖς ἀπὸ τῶν ΖΗ ΗΔ τετραγώνοις. ὡν τὸ ἀπὸ ΓΕ τετραγώνον ἴσον ἐστὶν τῇ ἀπὸ τῆς ΔΗ⁵ τετραγώνῳ· λοιπὸν ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ΕΖ τετράγωνον λοιπῇ τῇ ἀπὸ ΖΗ τετραγώνῳ ἐστὶν ἴσον· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΖ τῇ ΖΗ. ἔστιν δὲ καὶ ὅλη ἡ ΑΖ ὅλη τῇ ΖΒ ἴση· λοιπὴ ἄρα ἡ ΑΕ λοιπῇ τῇ ΗΒ ἐστὶν ἴση, ὅπερ: ~

- 231 λζ'. Ἡμικύκλιον τὸ ἐπὶ τῆς ΑΒ, καὶ ἀπὸ τυχόντος¹⁰ τοῦ Γ διήχθω ἡ ΓΔ, καὶ κάθετος ἡχθῶ ἡ ΑΕ· ὅτι τὸ ἀπὸ ΑΓ τοῦ ἀπὸ ΓΔ ὑπερέχει τῇ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΑΓ ΓΒ καὶ τῆς ΑΕ.



Ὅτι ἄρα τὸ ἀπὸ ΑΓ ἴσον ἐστὶν τῇ τε ἀπὸ¹⁵ ΑΓ, τουτέστιν τοῖς ἀπὸ ΑΕ ΕΓ, καὶ τῇ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΑΓ ΓΒ καὶ τῆς ΑΕ· ὅτι ἄρα κοινού ἀφαιρε-

θέντος τοῦ ὑπὸ ΓΑΕ λοιπὸν τὸ ὑπὸ ΑΓΕ ἴσον ἐστὶν τῇ τε ἀπὸ ΑΕ, τουτέστιν τῇ ὑπὸ ΑΕΒ, καὶ τῇ ἀπὸ ΓΕ καὶ τῇ ὑπὸ ΑΕ ΓΒ. κοινού ἀφαιρεθέντος τοῦ ἀπὸ ΓΕ ὅτι λοιπὸν τὸ ὑπὸ ΑΕΓ ἴσον ἐστὶν τῇ τε ὑπὸ ΑΕΒ καὶ τῇ ὑπὸ ΑΕ ΒΓ. ἔστιν δέ.

25

Εἰς τὸ πόρισμα τοῦ α' βιβλίου.

- 232 λη'. Θέσει ὄντος παραλληλογράμμου τοῦ ΑΔ, ἀπὸ δοθέντος τοῦ Ε διαγαγεῖν τὴν ΕΖ καὶ ποιεῖν ἴσον τὸ ΖΓΗ τρίγωνον τῇ ΑΔ παραλληλογράμμῳ.
Γεγονέτω. ἐπεὶ οὖν ἴσον ἐστὶν τὸ ΖΓΗ τρίγωνον τῇ³⁰

4. ἀπὸ τῶν ΖΗΗΓ Α, distinct. BS 9. ὅπερ BS, ο Α 40. λζ' add. BS ἐπὶ τῆς ΑΒΓ ΑΒ, ἐπὶ τῆς αδβ S, corr. C^o 11. ἡχθῶ ἡ ΑΒ ΑΒ, corr. S 12. τῇ ἀπὸ συναμφοτέρου et 14. ἄρα τὸ ὑπὸ ΑΓ retinuit G^o ex S recte, ut supra editum, AB: 18. 19. συναμφοτέρου

et $\zeta\delta^2 = \delta\eta^2 + \eta\zeta^2$; ergo $\gamma\epsilon^2 + \epsilon\zeta^2 = \delta\eta^2 + \eta\zeta^2$. Subtrahantur aequalia $\gamma\epsilon^2 = \delta\eta^2$; restat igitur $\epsilon\zeta^2 = \eta\zeta^2$; itaque $\epsilon\zeta = \eta\zeta$. Sed est etiam $\alpha\zeta = \eta\beta$; per subtractionem igitur est $\alpha\epsilon = \eta\beta$, q. e. d.

XXXVII. Sit semicirculus in recta $\alpha\beta$, et a quolibet *Prop.*
ductae diametri puncto γ ducatur per semicirculum $\gamma\delta$, et dia- ¹⁶³
metro perpendicularis ducatur $\delta\epsilon$: dico esse $\alpha\gamma^2 - \gamma\delta^2 =$
 $\alpha\gamma + \gamma\beta \cdot \alpha\epsilon$.

Sit ita; est igitur

$$\begin{aligned}\alpha\gamma^2 &= \gamma\delta^2 + (\alpha\gamma + \gamma\beta) \alpha\epsilon, \text{ id est} \\ &= \delta\epsilon^2 + \epsilon\gamma^2 + (\alpha\gamma + \gamma\beta) \alpha\epsilon, \text{ id est} \\ &= \alpha\epsilon \cdot \epsilon\beta + \epsilon\gamma^2 + (\alpha\gamma + \gamma\beta) \alpha\epsilon.\end{aligned}$$

Ergo communi subtracto $\alpha\gamma \cdot \alpha\epsilon$ restat

$$\alpha\gamma \cdot \gamma\epsilon = \alpha\epsilon \cdot \epsilon\beta + \epsilon\gamma^2 + \alpha\epsilon \cdot \beta\gamma.$$

Communi subtracto $\epsilon\gamma^2$ restat

$$\alpha\epsilon \cdot \epsilon\gamma = \alpha\epsilon \cdot \epsilon\beta + \alpha\epsilon \cdot \beta\gamma.$$

Est autem, quoniam ex constructione est $\epsilon\gamma = \epsilon\beta + \beta\gamma$.

In porisma primi libri.

XXXVIII. Parallelogrammo $\alpha\gamma\delta\beta$ positione dato, a dato *Prop.*
in producta $\beta\delta^*$ puncto ϵ ducatur recta $\epsilon\gamma$, ita, ut triangu- ¹⁶⁴
lum $\zeta\gamma\epsilon$ parallelogrammo $\alpha\gamma\delta\beta$ aequale fiat.

Factum iam sit. Quia igitur triangulum $\zeta\gamma\epsilon$ parallelo-

PROPOS. 163: Simson p. 526, Breton p. 246, Chasles p. 98. 243.

PROPOS. 164: Simson p. 527—530, Breton p. 246 sq., Chasles p. 79. 98. 284.

* Hoc secundum figuram, qualis in codicibus adumbrata est, addidimus; eademque, ut ceteros taceam, est Chaslesii sententia. Simsonus autem Halleium de sectione spatii (p. 144 sq., secutus problema demonstrat utcumque "dato puncto ϵ in angulo qui deinceps est angulo $\alpha\gamma\delta$ ".

$\eta\zeta$ $\overline{AFB}$ $\overline{ABS}$, corr. Co 20. $\overline{\alpha\gamma\delta\beta}$ $\overline{Hu}$ pro $\chi\alpha\iota$ 22. $\tau\epsilon$ $\overline{\alpha\beta}$ $\overline{Co}$
pro $\tau\epsilon$ $\overline{\alpha\beta}$ $\overline{AE}$ $\tau\omega\iota$ $\overline{\epsilon\beta}$ $\overline{AE\beta}$ $\chi\alpha\iota$ A, corr. BS 23. $\overline{\epsilon\beta}$ $\overline{AE\beta}$
et 25. $\overline{\epsilon\beta}$ $\overline{AE\beta}$ A, distinx. BS 26. $\epsilon\zeta$ ($\overline{A^2}$ pro $\epsilon\zeta$) $\tau\omega$ $\overline{\alpha\gamma\delta\beta}$
 $\overline{A}$ $\beta\epsilon\lambda\lambda\omicron\upsilon$ A, $\epsilon\zeta$ $\tau\omega$ $\overline{\alpha\gamma\delta\beta}$ $\tau\omega$ $\overline{\alpha\gamma\delta\beta}$ $\beta\epsilon\lambda\lambda\omicron\upsilon$ B, $\epsilon\zeta$ $\tau\omega$ $\overline{\alpha\gamma\delta\beta}$
cum nota corruptione et tum $\epsilon\zeta$ $\tau\omega$ $\overline{\alpha\gamma\delta\beta}$ $\tau\omega$ $\overline{\alpha\gamma\delta\beta}$ S 27. $\epsilon\zeta$
 ϵ BS, om. A

grammo $\alpha\gamma\delta\beta$ aequale, et idem parallelogrammum duplum est trianguli $\alpha\gamma\delta$, ergo etiam triangulum $\zeta\gamma\eta$ duplum est trianguli $\alpha\gamma\delta$. Sed, quia haec triangula sunt circa eundem angulum γ , propter superius lemma XX est $\Delta \zeta\gamma\eta : \Delta \alpha\gamma\delta = \zeta\gamma \cdot \gamma\eta : \alpha\gamma \cdot \gamma\delta$. Sed datum est $\alpha\gamma \cdot \gamma\delta$: ergo etiam $\zeta\gamma \cdot \gamma\eta$ datum. Et a dato puncto ε ad positione datas $\alpha\gamma \cdot \gamma\delta$ ducta est $\varepsilon\zeta$ abscindens rectas $\zeta\gamma \cdot \gamma\eta$, quae continent spatium aequale dato spatio, videlicet duplo ipsius $\alpha\gamma \cdot \gamma\delta$, estque problema deductum ad spatii sectionem¹⁾. Ergo positione data est $\varepsilon\zeta$.

Componetur problema sic. Sit parallelogrammum positione datum $\alpha\gamma\delta\beta$, et datum punctum ε . Ducatur ab ε ad positione datas $\zeta\gamma \cdot \gamma\delta$ recta $\varepsilon\zeta$ abscindens rectas $\zeta\gamma \cdot \gamma\eta$, quae continent spatium $\zeta\gamma \cdot \gamma\eta$ aequale dato spatio, videlicet duplo ipsius $\alpha\gamma \cdot \gamma\delta$; et eadem ratione atque in analysi demonstrabimus triangulum $\zeta\gamma\eta$ parallelogrammo $\alpha\gamma\delta\beta$ aequale esse; ergo recta $\varepsilon\zeta$ problema efficit, eademque, ut manifestum est, sola, quia illa quoque quae in spatii sectione constructur sola illud problema efficit²⁾.

LEMATA IN CONICORUM LIBRUM I.

I³⁾. Sit conus, cuius basis circulus $\alpha\beta$, et vertex punctum γ . Iam si isosceles conus est, omnes rectas quae a puncto γ ad circuli $\alpha\beta$ circumferentiam ducuntur inter se aequales esse apparet; sin vero obliquus est, inveniatur, quae sit maxima quaeque minima. Prop. 165

^{*)} Haec addit Simsonus p. 529 secundum ea quae statim in compositione sequuntur.

¹⁾ Est libri primi de sectione spatii ab Halleio restituti loci tertii casus primus (p. 145); sed commodius ad hoc Pappi problema conferretur Simsoni de porism. propositio LXXVIII (p. 527 sq.).


²⁾ Sic Graeca in brevissimum concla explicanda esse iudicavimus: demonstrantur autem ab eodem Simsono p. 528 sq.

^{3*)} Numeri lemmatum in hac quae sequitur Latina interpretatione secundum Halleium positi sunt.

Ducatur enim a puncto γ ad circuli $\alpha\beta$ planum perpendicularis $\gamma\delta$; quae primum intra $\alpha\beta$ circulum cadat, et sumatur circuli centrum ϵ , et iuncta $\delta\epsilon$ producat in utramque partem secetque circumferentiam in punctis α β , et iungantur $\alpha\gamma$ $\gamma\beta$; dico rectam $\beta\gamma$ maximam, $\alpha\gamma$ minimam esse omnium quae a puncto γ ad circuli $\alpha\beta$ circumferentiam ducuntur.

Ducatur enim alia quaevis $\gamma\zeta$, iungaturque $\delta\zeta$; est igitur $\beta\delta > \delta\zeta$ (*elem.* 3, 7). Et communis est $\gamma\delta$, angulique ad δ recti; ergo est $\beta\gamma > \gamma\zeta$. Eadem ratione est etiam $\gamma\zeta > \gamma\alpha$; itaque maxima omnium est $\beta\gamma$, minima $\alpha\gamma$.

Sed rursus perpendicularis a puncto γ ducta in ipsam $\alpha\beta$ circuli circumferentiam cadat, sitque $\gamma\alpha$, et rursus ad circuli centrum δ ducatur $\alpha\delta$, quae producta circumferentiam secet in β , et iungatur $\beta\gamma$; dico maximam esse $\beta\gamma$, minimam $\alpha\gamma$. Prop. 166



Iam primum apparet esse $\gamma\beta > \gamma\alpha$; ducatur autem ad circumferentiam alia quaevis $\gamma\epsilon$, et iungatur $\alpha\epsilon$. Quia $\alpha\beta$ diametrus est, maior est quam $\alpha\epsilon$ (*elem.* 3, 15). Et ipsis $\alpha\beta$ $\alpha\epsilon$ perpendicularis est $\alpha\gamma$; ergo $\gamma\beta > \gamma\epsilon$. Item $\gamma\beta$ maior est ceteris omnibus. Et eadem ratione demonstrabitur esse $\epsilon\gamma > \gamma\alpha$; ergo $\beta\gamma$ maxima, $\alpha\gamma$ minima est omnium rectarum quae a puncto γ ad circuli $\alpha\beta$ circumferentiam ducuntur.

Iisdem suppositis perpendicularis extra circulum cadat, sitque $\gamma\delta$, et ad circuli centrum ϵ ducta $\delta\epsilon$ producat in utramque partem secetque circumferentiam in punctis α β , et iungantur $\alpha\gamma$ $\beta\gamma$; iam Prop. 167

Ha 48. β' γ' BS, om. A

om. B Ha 28. $\alpha\epsilon\alpha$ add. Ha

Co 34. γ' δ' BS, om. A

49. τοῦ κέντρου AB Ha η ante ΓΔ

28. $\mu\gamma\iota\sigma\tau\eta\varsigma$ ABS, corr. Ha auctore

αὶ $ΑΓ ΒΓ$ · λέγω δὴ ὅτι μεγίστη μὲν ἐστὶν ἡ $ΒΓ$, ἐλαχίστη δὲ ἡ $ΑΓ$ · πασῶν τῶν ἀπὸ τοῦ $Γ$ πρὸς τὸν $ΑΒ$ κύκλον προσπιπτουσῶν εὐθειῶν.


Ὅτι μὲν οὖν μείζων ἐστὶν ἡ $ΒΓ$ τῆς $ΓΑ$ φανερόν, λέγω δὲ ὅτι καὶ πασῶν τῶν ἀπὸ τοῦ $Γ$ πρὸς τὴν τοῦ $ΑΒ$ κύκλου περιφέρειαν προσπιπτουσῶν. προσπιπτέτω γάρ τις καὶ ἑτέρα ἡ $ΓΖ$, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ $ΑΖ$. ἐπεὶ οὖν διὰ τοῦ κέντρου ἐστὶν ἡ $ΒΔ$, μείζων ἐστὶν ἡ $ΑΒ$ τῆς $ΑΖ$. καὶ ἔστιν αὐταῖς ὀρθὴ ἡ $ΑΓ$, ἐπεὶ καὶ τῷ ἐπιπέδῳ· μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ $ΒΓ$ τῆς $ΓΖ$. ὁμοίως καὶ πασῶν. μεγίστη μὲν ἄρα ἐστὶν ἡ $ΓΒ$, ὅτι δὲ καὶ ἡ $ΑΓ$ ἐλαχίστη. ἐπεὶ γὰρ ἐλάσσων ἐστὶν ἡ $ΑΔ$ τῆς $ΑΖ$, καὶ ἔστιν αὐταῖς ὀρθὴ ἡ $ΑΓ$, ἐλάσσων ἄρα ἐστὶν ἡ $ΑΓ$ τῆς $ΓΖ$. ὁμοίως καὶ πασῶν. ἐλαχίστη ἄρα ἐστὶν ἡ $ΑΓ$, μεγίστη δὲ ἡ $ΒΓ$ πασῶν τῶν ἀπὸ τοῦ $Γ$ πρὸς τὴν τοῦ $ΑΒ$ κύκλου περιφέρειαν προσπιπτουσῶν εὐθειῶν.

Εἰς τοὺς κωνικοὺς ὅρους.

- 236 “Ἐὰν ἀπὸ τινος σημείου πρὸς κύκλον περιφέρειαν” εἰκότως ὁ Ἀπολλώνιος προστίθῃσιν “ἐφ’ ἑκάτερα προσεβλήθῃ”, ἐπειδήπερ τοῦ τεχόντος κώνου γένεσιν δηλοῖ. 20 εἰ μὲν γὰρ ἰσοσκελὲς ὁ κώνος, περισσὸν ἦν προσεχβάλλειν διὰ τὸ τὴν φερομένην εὐθειᾶν αἰεὶ ποτε ψαύειν τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας, ἐπειδήπερ πάντοτε τὸ σημεῖον ἴσον ἀφίξειν ἔμελλεν τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας. ἐπεὶ δὲ δύναται καὶ σκαληνὸς εἶναι ὁ κώνος, ἔστιν δέ, ὡς προγέγραπται, ἐν κώνῳ σκαληνῷ μεγίστη τις καὶ ἐλαχίστη πλευρά, ἀναγκαίως προστίθῃσιν τὸ “προσεβλήθῃ”, ἵνα αἰεὶ προσ-

1. δὴ ὅτι AS, ὅτι B^oV, ὅτι δὴ Ha 2. τὸν $\overline{ABΓ}$ κύκλον ABS, corr. Ha auctore C^o 3. δὲ Hu pro δὴ 44. ἐλάσσων Ha pro ἐλαχίστη. item vs. 42 12. ἐστὶ καὶ αὐταῖς Ha 47 — p. 924, 3. hoc scholion non ab ipso Pappo scriptum esse videtur 48. numerum 1' praefigunt BS 49. ἐφ' ἑκάτερα προσεβλήθῃ Apollon. conic. 4. defin. 4, καὶ ἐφ' ἑκάτερα ἐβλήθῃ ABS 22. τὸ add. Hu αἰεὶ (sine spir. et acc.) A

dico maximam esse $\beta\gamma$, minimam $\alpha\gamma$ omnium rectarum quae a puncto γ ad circuli $\alpha\beta$ circumferentiam ducuntur.



Iam primum apparet esse $\beta\gamma > \gamma\alpha$; sed dico eandem $\beta\gamma$ maiorem esse omnibus quae a puncto γ ad circuli $\alpha\beta$ circumferentiam ducuntur. Ducatur enim alia quaevis $\gamma\zeta$, et iungatur $\delta\zeta$. Iam quia $\beta\delta$ per centrum transit (elem. 3, 8), est $\beta\delta > \delta\zeta$. Et his ipsis perpendicularis est $\delta\gamma$, quoniam etiam plano circuli perpendicularis est; ergo $\beta\gamma > \gamma\zeta$. Item $\beta\gamma$ maior est ceteris

omnibus. Maxima igitur est $\beta\gamma$; sed demonstretur etiam minimam esse $\alpha\gamma$. Quia enim $\alpha\delta$ minor est quam $\delta\zeta$ (elem. 3, 8), et his ipsis perpendicularis $\delta\gamma$, minor igitur est $\alpha\gamma$ quam $\gamma\zeta$. Item etiam ceteris omnibus. Ergo $\alpha\gamma$ minima, $\beta\gamma$ maxima est omnium rectarum quae a puncto γ ad circuli $\alpha\beta$ circumferentiam ducuntur.

In conicas definitiones.

In conicorum I libri defin. I ad verba "si ab aliquo puncto ad circuli circumferentiam" iure Apollonius addit "in utranque partem producat", quoniam cuiuslibet coni originem explicat. Nam si isosceles conus esset, supervacaneum esset rectam producere, quia haec ipsa, cum convertitur, circuli circumferentiam perpetuo tangeret, quippe cum punctum manens semper aequali intervallo a circuli circumferentia distaret. Sed quia etiam obliquus conus esse potest, in quo, ut supra demonstratum est, et maximum aliquod et minimum latus exstat, necessario illud "producat" adiecit, ut quae minima


(Ha), $\alpha\epsilon$ BS
 $\epsilon\alpha\beta\epsilon\lambda\eta\sigma\theta\omega$

24. $\delta\epsilon$ A² ex δ .
 uti sine spir. et acc. A : Hu BS.

27. $\eta\sigma\sigma\alpha\pi\beta\lambda\eta\theta\eta$ Ha pro $\eta\sigma\sigma$

est usque eo producta augeatur, quoad maximae aequalis fiat et propterea circuli circumferentiam semper contingat.

II. Sit linea $\alpha\beta\gamma$, et positione data $\alpha\gamma$, et omnes a linea $\alpha\beta\gamma$ ad rectam $\alpha\gamma$ perpendiculares ita ducantur, ut uniuscuiusque quadratum aequale sit rectangulo baseos segmentis, quae a singulis perpendicularibus efficiuntur, contento: dico lineam $\alpha\beta\gamma$ dimidiam circuli circumferentiam, eiusque diametrum $\alpha\gamma$ esse.




Ducantur enim a punctis δ β ϵ perpendiculares $\delta\zeta$ $\beta\eta$ $\epsilon\theta$: est igitur ex hypothesi $\delta\zeta^2 = \alpha\zeta \cdot \zeta\gamma$, et $\beta\eta^2 = \alpha\eta \cdot \eta\gamma$, et $\epsilon\theta^2 = \alpha\theta \cdot \theta\gamma$. Iam $\alpha\gamma$ bisariam secetur in puncto x , et iungantur $x\delta$ $x\beta$ $x\epsilon$. Iam quia propter elem. 2. δ est

$\alpha\zeta \cdot \zeta\gamma + \zeta x^2 = \alpha x^2$, et ex hypothesi $\alpha\zeta \cdot \zeta\gamma = \delta\zeta^2$, est igitur $\delta\zeta^2 + \zeta x^2 = \alpha x^2$, id est $\delta x^2 = \alpha x^2$; itaque $x\delta = \alpha x$. Similiter demonstrabimus et βx et ϵx aequalem esse rectae αx vel $x\gamma$; ergo linea $\alpha\beta\gamma$ est dimidia circumferentia circuli, cuius centrum x , id est circuli circa diametrum $\alpha\gamma$ descripti.

III. Tres parallelae $\alpha\beta$ $\gamma\delta$ $\zeta\epsilon$, in easque ducantur duae rectae $\alpha\eta\zeta\gamma$ $\beta\eta\delta\epsilon$: dico esse $\alpha\beta \cdot \zeta\epsilon : \gamma\delta^2 = \alpha\eta \cdot \eta\zeta : \eta\gamma^2$.

Quoniam enim est $\alpha\beta : \zeta\epsilon = \alpha\eta : \eta\zeta$, per multiplicationem est igitur



*) Praeter illam quae p. 924 descripta est in codice exstat haec altera, quam si sequimur supra reponendum est "rectae $\alpha\gamma\zeta\eta$ $\beta\delta\epsilon\eta$ ".

τῶν τμημάτων S

14. αλ K. I Ha

ante πρὸς διάμετρον) Ha pro τῆς

AH ZF BH E. I A, corr. BS

10. τῶν TBE A, distinx. BS

18. δὴ δὲ Hu

20. τοῦ (ante περὶ χεῖρας et

22. εἰ ζ BS, om. AV

23. αλ

13. δὴ δὲ Ha

τὸ ἀπὸ ΓΔ, οὕτως ἐστὶν τὸ ἀπὸ ΖΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΓ· δι' ἴσων ἄρα ἐστὶν ὡς τὸ ὑπὸ ΑΒ ΖΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΔ τετραγώνων, οὕτως τὸ ὑπὸ ΑΗΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΓ τετράγωνον.

- 239 ζ'. Ἐστω ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ, οὕτως ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΔΓ, καὶ τετμήσθω ἡ ΑΓ δίχα κατὰ τὸ Β σημεῖον· διὸ γίνεται τὸ μὲν ὑπὸ ΒΕΔ ἴσον τῷ ἀπὸ ΕΓ, τὸ δὲ ὑπὸ ΑΔΓ τῷ ὑπὸ ΒΔΕ, τὸ δὲ ὑπὸ ΑΒΓ τῷ ὑπὸ ΕΒΔ.

Ἐπεὶ γάρ ἐστιν

α ε δ γ β ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ, οὕτως ἡ ΑΔ

πρὸς τὴν ΔΓ, συνθέντι καὶ τὰ ἡμίση, τῶν ἡγουμένων καὶ ἀναστρέψαντί ἐστὶν ὡς ἡ ΒΕ πρὸς τὴν ΕΓ, οὕτως ἡ ΓΕ πρὸς τὴν ΕΔ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΒΕΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΓΕ τετραγώνῳ. κοινὸν ἀφαιρεσθῶ τὸ ἀπὸ ΕΔ τετραγώνον· λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ ΑΔΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΒΔΕ. ἐπεὶ δὲ τὸ ὑπὸ ΒΕΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΕΓ, ἐκάτερον ἀφαιρεσθῶ ἀπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς ΒΕ τετραγώνου· λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ ΑΒΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΕΒΔ. γίνεται ἄρα τὰ τρίτα.

- 240 ζ'. Τὸ Α πρὸς τὸ Β τὸν συνημμένον λόγον ἔχεται ἕκ τε τοῦ ὄν ἔχει τὸ Γ πρὸς τὸ Δ καὶ ἐξ οὗ ὄν ἔχει τὸ Ε πρὸς τὸ Ζ· ὅτι καὶ τὸ Γ πρὸς τὸ Δ τὸν συνημμένον λόγον ἔχει ἕκ τε τοῦ ὄν ἔχει τὸ Α πρὸς τὸ Β καὶ τὸ Ζ πρὸς τὸ Ε.

Τῷ γάρ τοῦ Ε πρὸς τὸ Ζ λόγῳ ὁ αὐτὸς πεποιησθῶ ὁ τοῦ Α πρὸς τὸ Η. ἐπεὶ οὖν ὁ τοῦ Α πρὸς τὸ Β συν-ῆπται ἕκ τε τοῦ τοῦ Γ πρὸς τὸ Δ καὶ τοῦ τοῦ Ε πρὸς τὸ Ζ, τουτέστιν τοῦ Α πρὸς τὸ Η, ἀλλὰ ὁ συνημμένος ἕκ τε τοῦ ὄν ἔχει τὸ Γ πρὸς τὸ Δ καὶ ἐξ οὗ ὄν ἔχει τὸ Α πρὸς τὸ Η ἐστὶν ὁ τοῦ Γ πρὸς τὸ Η, ὡς ἄρα τὸ Α πρὸς τὸ Β, οὕτως τὸ Γ πρὸς τὸ Η. ἐπεὶ δὲ τὸ Γ πρὸς τὸ Δ τὸν συνημμένον

5. ζ'] ἡ' BS, om. A 7. γίνεται B¹, γίνεται AB² S Ha 42. πρὸς τὴν γδ SV 43. ἀφαιρεσθῶ AS, corr. B V m. rec., item vs. 47 17. δὲ τὸ ὑπὸ ΗΔΓ ABS, corr. Ha auctore Co ἐκάτερον Hu pro ἀμφοτέρω 20. ζ'] θ' BS, om. A 21. ἐξ οὗ ὄν A²BS, ἐξουσιον (sine acc.) A¹ 25. ὁ τοῦ Ha pro τὸ λόγος ante συνῆπται add. Ha 26. τοῦ τοῦ Ha pro τοῦ τῆς τὸ αὐτο Α add. Hu τοῦ Ε

$$\alpha\beta \cdot \zeta\epsilon : \zeta\epsilon^2 = \alpha\eta \cdot \eta\zeta : \eta\zeta^2. \text{ Sed est etiam}$$

$$\zeta\epsilon^2 : \gamma\delta^2 = \eta\zeta^2 : \eta\gamma^2; \text{ ex aequali igitur}$$

$$\alpha\beta \cdot \zeta\epsilon : \gamma\delta^2 = \alpha\eta \cdot \eta\zeta : \eta\gamma^2.$$

IV. Sit $\alpha\beta : \beta\gamma = \alpha\delta : \delta\gamma$, et $\alpha\gamma$ bifariam secetur in *Prop.*
 puncto ϵ ; dico esse $\beta\epsilon \cdot \epsilon\delta = \epsilon\gamma^2$, et $\alpha\delta \cdot \delta\gamma = \beta\delta \cdot \delta\epsilon$, et ¹⁷⁰
 $\alpha\beta \cdot \beta\gamma = \epsilon\beta \cdot \beta\delta$.

Quoniam enim est

$$\alpha\beta : \beta\gamma = \alpha\delta : \delta\gamma, \text{ componendo fit}$$

$$\alpha\beta + \beta\gamma : \beta\gamma = \alpha\gamma : \gamma\delta, \text{ et, quoniam est } \alpha\beta + \beta\gamma \\ = \alpha\gamma + 2\beta\gamma, \text{ et ex hypothesi} \\ \epsilon\gamma = \frac{1}{2}\alpha\gamma, \text{ sumptis antece-} \\ \text{dentium dimidiis}$$

$$\epsilon\gamma + \gamma\beta : \beta\gamma = \epsilon\gamma : \gamma\delta, \text{ et convertendo}$$

$$\epsilon\beta : \epsilon\gamma = \epsilon\gamma : \epsilon\delta; \text{ ergo est}$$

$$\beta\epsilon \cdot \epsilon\delta = \epsilon\gamma^2. \text{ Est autem } \beta\epsilon \cdot \epsilon\delta = \beta\delta \cdot \delta\epsilon + \epsilon\delta^2 \text{ (elem.} \\ 2, 3, \text{ et } \epsilon\gamma^2 = \alpha\delta \cdot \delta\gamma + \epsilon\delta^2 \text{ (elem. 2, 5 ;} \\ \text{hinc igitur communi subtracto } \epsilon\delta^2 \text{ restat}$$

$$\beta\delta \cdot \delta\epsilon = \alpha\delta \cdot \delta\gamma.$$


Sed quia est $\beta\epsilon \cdot \epsilon\delta = \epsilon\gamma^2$, utrumque subtrahatur ex $\beta\epsilon^2$; est
 autem $\beta\epsilon^2 = \beta\epsilon \cdot \epsilon\delta + \epsilon\beta \cdot \beta\delta$ (elem. 2, 2) $= \alpha\beta \cdot \beta\gamma + \gamma\epsilon^2$
 (elem. 2, 6); restat igitur

$$\epsilon\beta \cdot \beta\delta = \alpha\beta \cdot \beta\gamma.$$

Fiunt igitur tria quae supra proposita sunt.

$$\text{V. Sit } \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \cdot \frac{\epsilon}{\zeta}; \text{ dico esse etiam } \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\zeta}{\epsilon}.$$

Prop.
171



Fiat enim $\frac{\delta}{\eta} = \frac{\epsilon}{\zeta}$. Iam quia (ex hypothesi) est

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \cdot \frac{\epsilon}{\zeta} = \frac{\gamma}{\delta} \cdot \frac{\delta}{\eta} = \frac{\gamma}{\eta}, \text{ est igitur } \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\eta}. \text{ Sed quia est}$$

$\pi\rho\acute{o}\varsigma \tau\acute{o} Z \text{ } \alpha\eta \text{ } \pi\rho\acute{o} \tau\eta\varsigma E \text{ } \pi\rho\acute{o}\varsigma Z$ 29. $\delta \text{ } \tau\acute{o} \upsilon \Gamma \text{ } \pi\rho\acute{o}\varsigma \tau\acute{o} H \text{ add. } \alpha\eta$
 $\acute{\omega}\varsigma \acute{\alpha}\rho\alpha \alpha\eta, \acute{\alpha}\rho\alpha AB, \acute{\alpha}\rho\alpha \acute{\omega}\varsigma S$

λόγον ἔχει ἔκ τε τοῦ Ἰν ἔχει τὸ Γ πρὸς τὸ Η καὶ ἐξ οὗ
ὅν ἔχει τὸ Η πρὸς τὸ Α, ἀλλ' ὁ μὲν τοῦ Γ πρὸς τὸ Η ὁ
αὐτὸς ἐδείχθη τῷ τοῦ Α πρὸς τὸ Β, ὁ δὲ τοῦ Η πρὸς τὸ
Α ἔκ τοῦ ἀνάπαλιν ὁ αὐτὸς ἐστὶν τῷ τοῦ Ζ πρὸς τὸ Ε,
καὶ τὸ Γ ἄρα πρὸς τὸ Α τὸν συνήμμενον λόγον ἔχει ἔκ τε⁵
τοῦ ὅν ἔχει τὸ Α πρὸς τὸ Β καὶ ἐξ οὗ Ἰν ἔχει τὸ Ζ πρὸς
τὸ Ε.

- 241 η'. Ἐστω δύο παραλληλόγραμμα τὰ ΑΓ ΔΖ ἰσογώνια,
ἴσων ἔχοντα τὴν Β γωνίαν τῇ Ε γωνίᾳ· ὅτι γίνεται ὡς τὸ
ὑπὸ ΑΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΕΖ, οὕτως τὸ ΑΓ παραλληλό-¹⁰
γραμμον πρὸς τὸ ΔΖ παραλληλόγραμμον.

Εἰ μὲν οὖν ὁρθαὶ εἰσὶν αἱ Β Ε γωνίαι, φανερόν· εἰ
δὲ μὴ, ἤχθωσαν κάθετοι αἱ ΑΗ ΔΘ. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν
ἡ μὲν Β γωνία τῇ Ε, ἡ δὲ Η ὁρθὴ τῇ Θ, ἰσογώνιον ἄρα
ἐστὶν τὸ ΑΒΗ τρίγωνον τῷ ΔΕΘ τριγώνῳ· ἐστὶν ἄρα ὡς¹⁵
ἡ ΒΑ πρὸς τὴν ΑΗ, οὕτως ἡ ΕΔ πρὸς τὴν ΔΘ. ἀλλ'
ὡς μὲν ἡ ΒΑ πρὸς τὴν ΑΗ, οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΑΒΓ
πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΗ ΒΓ, ὡς δὲ ἡ ΕΔ πρὸς τὴν ΔΘ, οὕτως
ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΔΕΖ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΘ ΕΖ· ἐστὶν ἄρα ἐν-
αλλάξ ὡς τὸ ὑπὸ ΑΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΕΖ, οὕτως τὸ ὑπὸ²⁰
ΑΗ ΒΓ, τουτέστιν τὸ ΑΓ παραλληλόγραμμον, πρὸς τὸ ὑπὸ
ΔΘ ΕΖ, τουτέστιν πρὸς τὸ ΔΖ παραλληλόγραμμον.

- 242 θ'. Ἐστω τρίγωνον τὸ ΑΒΓ, ἔστω δὲ παράλληλος ἡ
ΒΓ τῇ ΔΕ, καὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΓΑ ἴσων κείσθω τὸ ὑπὸ ΖΑΕ·
ὅτι, ἐὰν ἐπιτευχθῶσιν αἱ ΑΓ ΒΖ, γίνεται παράλληλος ἡ²⁵
ΒΖ τῇ ΑΓ.

Τοῦτο δὲ ἐστὶν φανερόν. ἐπεὶ γάρ ἐστὶν ὡς ἡ ΖΑ
πρὸς τὴν ΑΓ, οὕτως ἡ ΓΑ πρὸς τὴν ΑΕ, ὡς δὲ ἡ ΓΑ πρὸς
τὴν ΑΕ, οὕτως ἐστὶν ἐν παραλλήλῳ ἡ ΒΑ πρὸς ΑΔ, καὶ
ὡς ἄρα ἡ ΖΑ πρὸς ΑΓ, οὕτως ἡ ΒΑ πρὸς ΑΔ· παρ-³⁰
άλληλοι ἄρα εἰσὶν αἱ ΑΓ ΒΖ.

- 243 ι'. Ἐστω τρίγωνον μὲν τὸ ΑΒΓ τραπέζιον δὲ τὸ ΔΕΖΗ,


8. η' ι' B Paris. 3268 V, om. AS 12. ad HE A, distinct. BS
13. ad AH ΔΘ A, distinct. BS 15. 16. ὡς ἡ AB Ba 18. ὑπὸ AHBΓ
A, distinct. BS 19. ὑπὸ ΔΘΕΖ A, distinct. BS 23. θ' ια' BS, om.

$\frac{\gamma}{\delta} = \frac{\zeta}{\eta} \cdot \frac{\eta}{\delta}$, et demonstravimus esse $\frac{\gamma}{\eta} = \frac{\alpha}{\beta}$, et ex hypothesi

inversà efficitur $\frac{\eta}{\delta} = \frac{\zeta}{\epsilon}$, est igitur

$$\frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\zeta}{\epsilon}.$$


VI. Sint duo parallelogramma $\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\zeta$ aequiangula, et ^{Prop. 172} quidem sit $\angle\beta = \angle\epsilon$; dico parallelogramma eandem inter se proportionem habere ac rectangula $\alpha\beta \cdot \beta\gamma : \delta\epsilon \cdot \epsilon\zeta$.*).



Siquidem anguli $\beta\epsilon$ recti sunt, manifestum est; sin minus, ducantur perpendiculares $\alpha\eta\delta\theta$. Iam quia est $\angle\beta =$

$\angle\epsilon$, et $\angle\eta = \angle\theta$, est igitur $\Delta\alpha\beta\eta \sim \Delta\delta\epsilon\theta$, itaque $\beta\alpha : \alpha\eta = \epsilon\delta : \delta\theta$. Sed est $\beta\alpha : \alpha\eta = \beta\alpha \cdot \beta\gamma : \alpha\eta \cdot \beta\gamma$, et $\epsilon\delta : \delta\theta = \epsilon\delta \cdot \epsilon\zeta : \delta\theta \cdot \epsilon\zeta$; ergo vicissim $\alpha\beta \cdot \beta\gamma : \delta\epsilon \cdot \epsilon\zeta = \alpha\eta \cdot \beta\gamma$ (id est parallelogrammum $\alpha\beta\gamma$) : $\delta\theta \cdot \epsilon\zeta$ (id est parallelogrammum $\delta\epsilon\zeta$).

VII. Sit triangulum $\alpha\beta\gamma$, et $\delta\epsilon \parallel \beta\gamma$, et ponatur $\alpha\epsilon \cdot \alpha\zeta$ ^{Prop. 173} $= \gamma\alpha^2$; dico, si iungantur $\delta\gamma\beta\zeta$, has ipsas parallelas esse.



Hoc quidem manifestum est. Nam quia ex hypothesi est $\zeta\alpha : \alpha\gamma = \gamma\alpha : \alpha\epsilon$, et propter parallelas $\beta\gamma\delta\epsilon$ est $\gamma\alpha : \alpha\epsilon = \beta\alpha : \alpha\delta$, est igitur $\zeta\alpha : \alpha\gamma = \beta\alpha : \alpha\delta$; ergo parallelas sunt $\delta\gamma\beta\zeta$.

VIII. Sit triangulum $\alpha\beta\gamma$ et trapezium $\delta\epsilon\zeta\eta$, ita ut an- ^{Prop. 174}

*) Conf. adnot. ad VII propos. 163.

A 28. 24. $\tau\eta\ BF\ \eta\ AE$ coni. Hu 25. post $\pi\alpha\rho\acute{\alpha}\lambda\lambda\eta\lambda\omicron\varsigma$ add. $\epsilon\sigma\tau\iota\upsilon$
 AB, del. S Ha 28. $\omicron\upsilon\tau\omega\varsigma\ \eta\ \Gamma\Delta$ ABS, corr. Ha auctore Co
 28. 29. $\acute{\omega}\varsigma\ \delta\epsilon\ \eta\ \Gamma\Delta$ $\pi\rho\acute{o}\varsigma\ \tau\eta\nu\ AE$ add. Hu auctore Co 34. $al\ BZ$
 $\Delta\Gamma\ Ha$ 32. $\epsilon\beta\ BS$, om. A $\tau\rho\alpha\pi\acute{\epsilon}\zeta\epsilon\iota\omicron\nu\ A$, corr. BS

ὥστε ἴσην εἶναι τὴν ὑπὸ $ABΓ$ γωνίαν τῇ ὑπὸ $ΔΕΖ$ γωνίᾳ·
ὅτι γίνεται ὡς τὸ ὑπὸ $ABΓ$ πρὸς τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου
τῆς $ΔΗ ΕΖ$ καὶ τῆς $ΔΕ$, οὕτως τὸ $ABΓ$ πρὸς τὸ $ΔΕΖΗ$.

Ἦχθωσαν κάθετοι αἱ $ΑΘ ΔΚ$. ἐπεὶ δὲ ἴση ἐστὶν ἡ
μὲν ὑπὸ $ABΓ$ γωνία τῇ ὑπὸ $ΔΕΖ$ γωνίᾳ, ἡ δὲ $Θ$ ὀρθή 5
τῇ $Κ$ ὀρθῇ ἴση, ἔστιν ἄρα ὡς ἡ $ΒΑ$ πρὸς $ΑΘ$, οὕτως ἡ
 $ΕΔ$ πρὸς $ΔΚ$. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ $ΒΑ$ πρὸς $ΑΘ$, οὕτως ἐστὶν
τὸ ὑπὸ $ABΓ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $ΑΘ ΒΓ$, ὡς δὲ ἡ $ΕΔ$ πρὸς τὴν
 $ΔΚ$, οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς $ΔΗ ΕΖ$ καὶ
τῆς $ΔΕ$ πρὸς τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς $ΔΗ ΕΖ$ καὶ τῆς 10
 $ΔΚ$. καὶ ἔστιν τοῦ μὲν ὑπὸ $ΑΘ ΒΓ$ ἡμισὺ τὸ $ABΓ$ τρι-
γωνον, τοῦ δὲ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς $ΔΗ ΕΖ$ καὶ τῆς $ΔΚ$
ἡμισὺ τὸ $ΔΕΖΗ$ τραπέζιον· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ $ABΓ$
πρὸς τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς $ΔΗ ΕΖ$ καὶ τῆς $ΔΕ$, οὕτως
τὸ $ABΓ$ τριγώνον πρὸς τὸ $ΔΕΖΗ$ τραπέζιον. 15

244 Καὶ ἐὰν ἡ [δὲ] τριγώνον τὸ $ABΓ$ καὶ παραλληλό-
γραμμον τὸ $ΔΖ$, γίνεται ὡς τὸ $ABΓ$ τριγώνον πρὸς τὸ
 $ΔΕΖΗ$ παραλληλόγραμμον, οὕτως τὸ ὑπὸ $ABΓ$ πρὸς τὸ
δις ὑπὸ $ΔΕΖ$, κατὰ τὰ αὐτά. καὶ φανερὸν ἐκ τούτων εἶναι
τὸ μὲν ὑπὸ $ABΓ$, ἐὰν ἡ παραλληλόγραμμον τὸ $ΔΖ$ καὶ ἴσον 20
τῷ $ABΓ$ τριγώνῳ, ἴσον γίνεται τῷ δις ὑπὸ $ΔΕΖ$, ἐπὶ δὲ
τοῦ τραπέζίου ἴσον γίνεται τῷ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς $ΔΗ$
 $ΕΖ$ καὶ τῆς $ΔΕ$, ὅπερ: ~

245 ια'. Ἐστω τριγώνον τὸ $ABΓ$, καὶ ἐκβληθείσας τῆς $ΓΑ$
διήχθω τις τυχοῦσα ἡ $ΔΕ$, καὶ αὐτῇ μὲν παράλληλος ἦχθω 25
ἡ $ΔΗ$, τῇ δὲ $ΒΓ$ ἡ $ΑΖ$ · εἴτε γίνεται ὡς τὸ ἀπὸ $ΔΗ$ τε-
τράγωνον πρὸς τὸ ὑπὸ $ΒΗΓ$, οὕτως τὸ ὑπὸ $ΔΖΘ$ πρὸς τὸ
ἀπὸ $ΖΑ$ τετράγωνον.

Κείσθω τῷ μὲν ὑπὸ $ΒΗΓ$ ἴσον τὸ ὑπὸ $ΑΗΚ$, τῷ δὲ
ὑπὸ $ΔΖΘ$ ἴσον τὸ ὑπὸ $ΑΖΑ$, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ $ΒΚ ΘΑ$. 30

1. post γωνία add. Ha ἡ δὲ $ΔΗ$ τῇ $ΕΖ$ παράλληλος 4. αὶ
 $ΑΘ ΔΚ$ A, distinx. BS ἐπεὶ οὖν ἴση conl. Hu 5. $Θ$ ὀρθή] ὀρθή
ABS, ὀρθή $Θ$ Ha 8. ὡς δὲ ἡ $ΑΔ$ ABS, corr. Ha auctore Co
10. τῆς $ΔΗΕΖ$ A, distinx. BS 12. τὸ δὲ ὑπὸ Ha καὶ τῆς $ΔΚ$
ABS, corr. Ha auctore Co 14. καὶ ante τῆς $ΔΗ ΕΖ$ add. A

gulus $\alpha\beta\gamma$ aequalis sit angulo $\delta\epsilon\zeta$, et parallelae sint $\delta\eta$ $\epsilon\zeta$; dico ut rectangulum $\alpha\beta \cdot \beta\gamma$ ad rectangulum $(\delta\eta + \epsilon\zeta) \delta\epsilon$, ita esse triangulum $\alpha\beta\gamma$ ad trapezium $\delta\epsilon\zeta\eta$.



Ducantur perpendiculares $\alpha\vartheta$ $\delta\kappa$. Quoniam ex hypothesi est $\angle \alpha\beta\gamma = \angle \delta\epsilon\zeta$, et ex constructione $\angle \vartheta = \angle \kappa$, est igitur $\beta\alpha : \alpha\vartheta = \epsilon\delta : \delta\kappa$. Sed est $\beta\alpha : \alpha\vartheta = \beta\alpha \cdot \beta\gamma : \alpha\vartheta \cdot \beta\gamma$, et

$\epsilon\delta : \delta\kappa = (\delta\eta + \epsilon\zeta) \epsilon\delta : (\delta\eta + \epsilon\zeta) \delta\kappa$; ideoque vicissim $\alpha\beta \cdot \beta\gamma : (\delta\eta + \epsilon\zeta) \epsilon\delta = \alpha\vartheta \cdot \beta\gamma : (\delta\eta + \epsilon\zeta) \delta\kappa$. Et est rectanguli $\alpha\vartheta \cdot \beta\gamma$ dimidium triangulum $\alpha\beta\gamma$, et rectanguli $(\delta\eta + \epsilon\zeta) \delta\kappa$ dimidium trapezium $\delta\epsilon\zeta\eta$; est igitur ut rectangulum $\alpha\beta \cdot \beta\gamma$ ad rectangulum $(\delta\eta + \epsilon\zeta) \epsilon\delta$, ita triangulum $\alpha\beta\gamma$ ad trapezium $\delta\epsilon\zeta\eta$.

Quodsi sit triangulum $\alpha\beta\gamma$ et parallelogrammum $\delta\epsilon\zeta\eta$, fit ut $\alpha\beta\gamma$ triangulum ad $\delta\epsilon\zeta\eta$ parallelogrammum, ita rectangulum $\alpha\beta \cdot \beta\gamma$ ad duplum rectangulum $\delta\epsilon \cdot \epsilon\zeta$, eadem ratione. Et hinc apparet, si parallelogrammum sit $\delta\epsilon\zeta\eta$ idque triangulo $\alpha\beta\gamma$ aequale, esse $\alpha\beta \cdot \beta\gamma = 2 \delta\epsilon \cdot \epsilon\zeta$; si vero trapezium, esse $\alpha\beta \cdot \beta\gamma = (\delta\eta + \epsilon\zeta) \delta\epsilon$.

IX. Sit triangulum $\alpha\beta\gamma$, et producta $\gamma\alpha$ ad δ ducatur Prop. 173
quaelibet recta $\delta\vartheta\epsilon$, eique parallela $\alpha\eta$, et rectae $\beta\gamma$ parallela $\alpha\zeta$: dico esse $\alpha\eta^2 : \beta\eta \cdot \eta\gamma = \delta\zeta \cdot \zeta\vartheta : \zeta\alpha^2$.

Ponatur $\alpha\eta \cdot \eta\kappa = \beta\eta \cdot \eta\gamma$, et $\alpha\zeta \cdot \zeta\lambda = \delta\zeta \cdot \zeta\vartheta$, et iun-

16—23. haec ab interpolatore addita esse videntur 16. numerum
 $\gamma\gamma'$ praestigunt BS $\delta\epsilon$ del: Hu 18. $\tau\omicron$ $\epsilon\pi\omicron$ $\triangle AB\Gamma$ Hu auctore Co.
 $\tau\omicron$ $\epsilon\pi\omicron$ $\triangle AB\Gamma$ A(BS), $\tau\omicron$ $\epsilon\pi\omicron$ $\triangle AB\Gamma$ Ha, item vs. 20 19. $\epsilon\pi$ $\tau\omicron\epsilon\pi$
typothetae errorem apud Ha repetiuit Ge 20. 21. $\kappa\alpha\iota$ $\tau\omicron\alpha\omicron\nu$ $\tau\omicron\epsilon\pi$ $\triangle AB\Gamma$
 $\tau\omicron\epsilon\pi\omega\nu\epsilon\pi$ add. Ha 22. $\tau\omicron\epsilon\pi$ $\epsilon\pi\omicron$ Ha auctore Co, $\tau\omicron$ $\delta\iota\varsigma$ $\epsilon\pi\omicron$ AS, $\tau\omicron\epsilon\pi$
 $\delta\iota\varsigma$ $\epsilon\pi\omicron$ B 23. 23. $\tau\omicron\epsilon\pi$ $\triangle IHEZ$ A, distinx. BS 23. $\delta\epsilon\pi\epsilon\pi$ BS, o A
24. $\iota\alpha'$ $\iota\alpha'$ BS, om. A 25. $\tau\epsilon\chi\omicron\sigma\alpha$ η $\triangle IHE$ Ha auctore Co 26. $\delta\epsilon$
 $\beta\gamma$ BS, $\triangle IEB\Gamma$ A 27. $\tau\omicron$ $\epsilon\pi\omicron$ $\triangle IZ\theta$ Ha auctore Co pro $\tau\omicron$ $\epsilon\pi\omicron$ $\triangle Z\theta$
29. 30. $\triangle IHK$, $\tau\omicron\epsilon\pi$ $\delta\epsilon$ — $\tau\omicron\alpha\omicron\nu$ $\tau\omicron$ $\epsilon\pi\omicron$ add. Co 30. $\triangle Z\theta$ $\triangle AB\epsilon$, $\alpha\zeta$ δ
BS col. Co

ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ Γ γωνία τῇ ὑπὸ BKH , ἡ δὲ ὑπὸ AAA ἐν κύκλῳ ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ $Z\Theta A$ · καὶ ἡ ὑπὸ HKB ἄρα ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ $Z\Theta A$ γωνία. ἀλλὰ καὶ ἡ πρὸς τῷ H γωνία ἴση ἐστὶν τῇ πρὸς τῷ Z · ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ BH πρὸς τὴν HK , οὕτως ἡ AZ πρὸς τὴν $Z\Theta$. ἐπεὶ δὲ ἐστὶν 5 ὡς ἡ AH πρὸς τὴν HB , οὕτως ἡ ΘE πρὸς τὴν EB , ὡς δὲ ἡ ΘE πρὸς EB , οὕτως ἐστὶν ἐν παραλλήλῳ ἡ $Z\Theta$ πρὸς ZA , ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ AH πρὸς τὴν HB , οὕτως ἡ ΘZ πρὸς ZA . ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς μὲν ἡ AH πρὸς HB , οὕτως ἡ ΘZ πρὸς ZA , ὡς δὲ ἡ BH πρὸς HK , οὕτως ἄλλῃ τις ἡ AZ 10 πρὸς τὴν ἡγουμένην τὴν $Z\Theta$, δι' ἴσου ἄρα ἐν τετραγώνῳ ἀναλογία ὡς ἡ AH πρὸς τὴν HK , οὕτως ἡ AZ πρὸς τὴν ZA . ἀλλ' ὡς μὲν ἡ AH πρὸς HK , οὕτως ἐστὶν τὸ ἀπὸ AH πρὸς τὸ ὑπὸ AHK , τουτέστιν πρὸς τὸ ὑπὸ BHG , ὡς δὲ ἡ AZ πρὸς ZA , οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ AZA , τουτέστιν 15 τὸ ὑπὸ $AZ\Theta$, πρὸς τὸ ἀπὸ ZA · ἐστὶν ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ AH πρὸς τὸ ὑπὸ BHG , οὕτως τὸ ὑπὸ $AZ\Theta$ πρὸς τὸ ἀπὸ ZA .

246 Διὰ δὲ τοῦ συνιμμένου. ἐπεὶ ὁ μὲν τῆς AH πρὸς HB λόγος ἐστὶν ὁ τῆς ΘE πρὸς EB , τουτέστιν ὁ τῆς ΘZ πρὸς ZA , ὁ δὲ τῆς AH πρὸς τὴν HG λόγος ὁ αὐτὸς ἐστὶν τῷ 20 τῆς AE πρὸς EG , τουτέστιν τῷ τῆς AZ πρὸς ZA , ὁ ἄρα συνιμμένος ἔκ τε τοῦ ὃν ἔχει ἡ AH πρὸς HB καὶ τοῦ ὃν ἔχει ἡ AH πρὸς HG , ὅς ἐστιν ὁ τοῦ ἀπὸ AH πρὸς τὸ ὑπὸ BHG , ὁ αὐτὸς ἐστὶν τῷ συνιμμένῳ ἔκ τε τοῦ τῆς ΘZ πρὸς ZA καὶ τοῦ τῆς AZ πρὸς ZA , ὅς ἐστιν ὁ τοῦ ὑπὸ 25 $AZ\Theta$ πρὸς τὸ ἀπὸ ZA τετραγώνου.

Τοῦ β'.

- 247 α'. Δύο δοθεῖσιν τῶν AB $B\Gamma$, καὶ εὐθείας τῆς AE , εἰς τὰς AB $B\Gamma$ ἐναρμόσαι εὐθεῖαν ἴσην τῇ AE καὶ παρ-
ἀλλήλῳ αὐτῇ.

3. 4. πρὸς τῷ Γ γωνία ἴση ἐστὶν τῇ πρὸς τῷ K $A(BS)$, corr. Ha
6. ὡς ἡ $\overline{AH}$ A , corr. BS πρὸς τὴν $\beta\eta$ οὕτως S 7. ἐν παραλλήλῳ
ἡ ΘZ Hu 19. ὁ τῆς $\zeta\theta$ S 22. 23. ἡ AH πρὸς HB καὶ τοῦ ὃν
ἔχει om. A¹, add. A²BS 27. τοῦ $\overline{H}$ add. in A manus rec., τοῦ δευτέ-
ρου τῶν κωνικῶν S, om. A¹B 28. α' add. BS

Τοῦτο δὲ φανερόν. ἔαν γὰρ διὰ τοῦ E τῇ AB πα-
ράλληλον ἀγάγωμεν τὴν BF , διὰ δὲ τοῦ F τῇ AE παράλλη-
λος ἀχθῇ ἡ GA , ἔσται, διὰ τὸ παραλληλόγραμμον εἶναι
τὸ $ΑΓΕΔ$, ἡ $ΑΓ$ ἴση τῇ $ΔΕ$ καὶ παράλληλος, καὶ ἐνῆρ-
μονται εἰς τὰς δοθείσας εὐθείας τὰς AB BF . 5


- 248 β'. Ἐστω δύο τρίγωνα τὰ $ABΓ$ $ΔΕΖ$, καὶ ἔστω ὡς ἡ
 AB πρὸς τὴν BF , οὕτως ἡ $ΔΕ$ πρὸς EZ , καὶ παράλληλος
ἡ μὲν AB τῇ $ΔΕ$, ἡ δὲ BF τῇ EZ . ὅτι καὶ ἡ $ΑΓ$ τῇ $ΔΖ$
ἔστιν παράλληλος.

Ἐκβεβλήσθω ἡ BF καὶ συμπιπτετω ταῖς $ΔΕ$ $ΔΖ$ κατὰ 10
τὰ H $Θ$. ἐπεὶ οὖν ἔσιν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν BF , οὕτως
ἡ $ΔΕ$ πρὸς EZ , καὶ εἰσὶν ἴσαι αἱ B E γωνίαι, διὰ τὸ εἶναι
δύο παρὰ δύο, ἴση ἄρα ἔστιν καὶ ἡ $Γ$ τῇ Z , τουτέστιν τῇ
 $Θ$, διὰ τὸ παραλλήλους εἶναι τὰς EZ $HΘ$. παράλληλος
ἄρα ἔστιν ἡ $ΑΓ$ τῇ $ΔΘ$. 15

- 249 γ'. Εὐθεία ἡ AB , καὶ ἔστωσαν ἴσαι αἱ $ΑΓ$ $ΔB$, καὶ
μεταξὺ τῶν $ΓΔ$ εἰλήφθω τυχὸν σημεῖον τὸ E . ὅτι τὸ ἐπὶ
 $ΑΔB$ μετὰ τοῦ ἐπὶ $ΓΕΔ$ ἴσον ἔστιν τῷ ἐπὶ $ΑΕB$.

Τετμήσθω ἡ $ΓΔ$ δίχα [ὅπως ἂν ἔχη ὡς πρὸς τὸ E
σημεῖον] κατὰ τὴν Z . καὶ ἐπεὶ τὸ ἐπὶ $ΑΔB$ μετὰ τοῦ ἀπὸ 20
 $ZΔ$ ἴσον ἔστιν τῷ ἀπὸ ZB , ἀλλὰ τῷ μὲν ἀπὸ $ZΔ$ ἴσον
ἔστιν τὸ ἐπὶ $ΓΕΔ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ ZE , τῷ δὲ ἀπὸ ZB ἴσον
ἔστιν τὸ ἐπὶ $ΑΕB$ μετὰ τοῦ ἀπὸ ZE , τὸ ἄρα ἐπὶ $ΑΔB$
μετὰ τοῦ ἐπὶ $ΓΕΔ$ καὶ τοῦ ἀπὸ ZE ἴσον ἔστιν τῷ τε ἐπὶ
 $ΑΕB$ καὶ τῷ ἀπὸ ZE . κοινὸν ἀφηρέσθω τὸ ἀπὸ ZE . 25
λοιπὸν ἄρα τὸ ἐπὶ $ΑΔB$ μετὰ τοῦ ἐπὶ $ΓΕΔ$ ἴσον ἔστιν
τῷ ἐπὶ $ΑΕB$.

1. διὰ τοῦ E Ha auctore Co pro διὰ τοῦ Γ 4. τὸ $\overline{ΑΓ}$ $\overline{ΔΕ}$ A,
τὸ ἀγθε BS, corr. Ha auctore Co 6. β' add. BS 10. 11. κατὰ τὰ
 $HΘ$ A, distinx. S, κατὰ τὰ ο $\overline{B}$ B 12. αἱ $\overline{BF}$ ABS, distinx. Ha
13. καὶ om. BS 14. post EZ $HΘ$ add. ἴση ἄρα ἔστιν ἡ γωνία τῇ
 H ἐπεὶ καὶ τῇ B ABS, om. Co 15. τῇ $\overline{ΔΖ}$ Ge 16. γ' add. BS
Ἐστω εὐθεῖα Ha 17. τῶν $\overline{ΓΔ}$ A, distinx. BS 19. 20. ὅπως —



Hoc vero manifestum est. Nam si per ϵ rectae $\alpha\beta$ parallelam ducamus $\epsilon\gamma$, et per γ rectae $\delta\epsilon$ parallelam $\gamma\alpha$, facto parallelogrammo $\alpha\gamma\epsilon\delta$ erit $\alpha\gamma$ datae rectae $\delta\epsilon$ aequalis et parallela eademque trianguli $\alpha\beta\gamma$ latus.

II. Sint duo triangula $\alpha\beta\gamma$ $\delta\epsilon\zeta$, sitque $\alpha\beta : \beta\gamma = \delta\epsilon : \epsilon\zeta$, Prop. 177
et $\alpha\beta$ parallela rectae $\delta\epsilon$, et $\beta\gamma$ rectae $\epsilon\zeta$; dico etiam rectam $\alpha\gamma$ rectae $\delta\zeta$ parallelam esse.



Producatur $\beta\gamma$ secetque rectas $\delta\epsilon$ $\delta\zeta$ in punctis η ϑ . Iam quia ex *hypothesi* est $\alpha\beta : \beta\gamma = \delta\epsilon : \epsilon\zeta$, et propter binas parallelas anguli β ϵ aequales sunt, etiam angulus γ aequalis est angulo ζ , id est angulo ϑ (quia parallelae sunt $\epsilon\zeta$ $\eta\vartheta$); ergo $\alpha\gamma$ rectae $\delta\vartheta$ sive $\delta\zeta$ parallela est.

III. Sit recta $\alpha\beta$, et $\alpha\gamma = \delta\beta$, et inter γ δ sumatur Prop. 178
qualvis punctum ϵ ; dico esse $\alpha\delta \cdot \delta\beta + \gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta = \alpha\epsilon \cdot \epsilon\beta$.



Secetur $\gamma\delta$ bifariam in puncto ζ . Et quoniam propter elem. 2. 5 est

$$\alpha\delta \cdot \delta\beta + \zeta\delta^2 = \zeta\beta^2, \text{ itemque}$$

$$\zeta\delta^2 = \gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta + \zeta\epsilon^2, \text{ et}$$

$$\zeta\beta^2 = \alpha\epsilon \cdot \epsilon\beta + \zeta\epsilon^2, \text{ est igitur}$$


$$\alpha\delta \cdot \delta\beta + \gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta + \zeta\epsilon^2 = \alpha\epsilon \cdot \epsilon\beta + \zeta\epsilon^2. \text{ Commune auferatur } \zeta\epsilon^2; \text{ restat igitur}$$

$$\alpha\delta \cdot \delta\beta + \gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta = \alpha\epsilon \cdot \epsilon\beta.$$

- 250 δ'. Εὐθεῖα ἡ AB , καὶ ἕστωσαν ἴσαι αἱ AG AB , καὶ μεταξὺ τῶν $ΓΑ$ εἰλήφθω τυχὸν σημεῖον τὸ $Ε$. ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΕΒ$ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ τῶν $ΓΕΑ$ καὶ τῷ ὑπὸ $ΔΑΓ$. Τετμήσθω γὰρ ἡ $ΓΑ$ διέξα [ὅπως ἂν ἔχη ὡς πρὸς τὸ $Ε$ σημεῖον] κατὰ τὸ $Ζ$. καὶ ὅλη ἄρα ἡ AZ τῇ ZB ἴση ἐστίν· τὸ μὲν ἄρα ὑπὸ $ΑΕΒ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ EZ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ AZ , τὸ δὲ ὑπὸ $ΔΑΓ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $ΓΖ$ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ AZ , ὥστε τὸ ὑπὸ $ΑΕΒ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ EZ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ $ΔΑΓ$ καὶ τῷ ἀπὸ $ΓΖ$. ἀλλὰ τὸ ἀπὸ $ΓΖ$ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ $ΓΕΑ$ καὶ τῷ ἀπὸ EZ , καὶ κοινὸν¹⁰ ἀφηρεῖσθω τὸ ἀπὸ EZ τετράγωνον· λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ $ΑΕΒ$ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ $ΓΕΑ$ καὶ τῷ ὑπὸ $ΔΑΓ$.
- 251 ε'. Ἐστω δύο τρίγωνα τὰ $ABΓ$ $ΔΕΖ$, καὶ ἕστω ἴση ἡ μὲν $Γ$ τῇ Z , μείζων δὲ ἡ B τῆς E . ὅτι ἡ $BΓ$ πρὸς $ΓΑ$ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ EZ πρὸς $ΖΑ$.¹⁵ Συνεστάτω τῇ E γωνία ἴση ἡ ὑπὸ $ΓΒΗ$, ἔστιν δὲ καὶ ἡ $Γ$ τῇ Z ἴση· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ $BΓ$ πρὸς $ΓΗ$, οὕτως ἡ EZ πρὸς $ΖΑ$. ἀλλὰ ἡ $BΓ$ πρὸς τὴν $ΓΑ$ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ $BΓ$ πρὸς $ΓΗ$. καὶ ἡ $BΓ$ ἄρα πρὸς $ΓΑ$ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ EZ πρὸς $ΖΑ$.²⁰
- 252 ζ'. Ἐχέτω δὲ πάλιν ἡ $BΓ$ πρὸς $ΓΑ$ μείζονα λόγον ἢ περ ἡ EZ πρὸς $ΖΑ$, ἴση δὲ ἕστω ἡ $Γ$ γωνία τῇ Z . ὅτι πάλιν γίνεται ἐλάσσων ἡ B γωνία τῆς E γωνίας. Ἐπεὶ γὰρ ἡ $BΓ$ πρὸς $ΓΑ$ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ EZ πρὸς $ΖΑ$, ἐὰν ἄρα ποιῶ ὡς τὴν $BΓ$ πρὸς τὴν $ΓΑ$,²⁵ οὕτως τὴν EZ πρὸς τινά, ἔσται πρὸς ἐλάσσονα τῆς $ΖΑ$. ἕστω πρὸς τὴν $ΖΗ$, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ $ΕΗ$, καὶ περὶ ἴσας

1. δ' add. BS 2. Ἐστω εὐθεῖα Ha 3. τῶν $ΓΑ$ A, *distinx.* BS
 3. τῶν ante $ΑΕΒ$ et ante $ΓΕΑ$ om. Ha 4. 5. ὅπως — σημεῖον del. Hu 5. ἴση S. ἴσον AB 7. 8. τὸ δὲ ὑπὸ $ΔΑΓ$ — τῷ ἀπὸ AZ om. Co Ha 8. μετὰ τοῦ ἀπὸ EZ AB, corr. S 10. καὶ ante κοινόν om. Ha 12. τῷ τε ὑπὸ $ΔΕΓ$ Ha 13. ε' add. Ha 14. πρὸς $ΓΑ$ Hu auctore Co pro πρὸς $ΓΑ$
 14. πρὸς $ΓΑ$ Hu auctore Co pro πρὸς $ΓΑ$ 15. ὡς ἡ $BΓ$ Ha πρὸς τὴν $ΓΑ$ Ha auctore Co pro πρὸς τὴν $ΓΑ$ 25. οὕτως ἡ EZ πρὸς τινά ἄλλην Ha 27. ἐπιτεύχθῃ ABS, corr. Ha περὶ πρὸς Ha

IV. Sit recta $\alpha\beta$, et $\alpha\gamma = \delta\beta$, et inter γ δ sumatur ^{Prop. 479} quodvis punctum ϵ ; dico esse $\alpha\epsilon \cdot \epsilon\beta = \gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta + \delta\alpha \cdot \alpha\gamma$.*



Secetur enim $\gamma\delta$ bifariam in puncto ζ ; ergo est etiam $\alpha\zeta = \zeta\beta$, itaque propter elem. 2. ζ est



$$\alpha\epsilon \cdot \epsilon\beta + \epsilon\zeta^2 = \alpha\zeta^2, \text{ itemque propter elem. 2. 6}$$

$$\delta\alpha \cdot \alpha\gamma + \gamma\zeta^2 = \alpha\zeta^2, \text{ ita ut sit}$$

$$\alpha\epsilon \cdot \epsilon\beta + \epsilon\zeta^2 = \delta\alpha \cdot \alpha\gamma + \gamma\zeta^2. \text{ Sed quia est } \gamma\zeta^2 = \gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta + \epsilon\zeta^2, \text{ commune auferatur } \epsilon\zeta^2; \text{ restat igitur}$$


$$\alpha\epsilon \cdot \epsilon\beta = \gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta + \delta\alpha \cdot \alpha\gamma.$$

V. Sint duo triangula $\alpha\beta\gamma$ $\delta\epsilon\zeta$, sitque $\angle\gamma = \angle\zeta$, et ^{Prop. 480} $\angle\beta > \angle\epsilon$; dico esse $\beta\gamma : \gamma\alpha < \epsilon\zeta : \zeta\delta$.



Construatur $\angle\gamma\beta\eta_1$
 $= \angle\epsilon$, et est $\angle\gamma = \angle\zeta$; itaque $\beta\gamma : \gamma\eta_1 = \epsilon\zeta : \zeta\delta$. Sed, quia est $\gamma\alpha > \gamma\eta_1$, est $\beta\gamma : \gamma\alpha < \beta\gamma : \gamma\eta_1$; ergo etiam $\beta\gamma : \gamma\alpha < \epsilon\zeta : \zeta\delta$.

VI. Iam rursus sit $\beta\gamma : \gamma\alpha > \epsilon\zeta : \zeta\delta$, et $\angle\gamma = \angle\zeta$; ^{Prop. 481} dico angulum β minorem esse quam ϵ .



Quoniam enim est $\beta\gamma : \gamma\alpha > \epsilon\zeta : \zeta\delta$, si faciam $\epsilon\zeta : \alpha = \beta\gamma : \gamma\alpha$, erit $\alpha < \zeta\delta$. Sit $\zeta\eta_1$, et iungatur $\epsilon\eta_1$; et aequales sunt anguli quos

* Hoc lemma idem est ac superius tertium, paulo aliter enuntiatum. Quapropter eandem figuram repetivimus omitta auctoritate, qui ad hoc IV lemma punctum ϵ inter γ et ζ situm exhibent. Simillimam demonstrationem habet Eutocius ad Apollonii conic. p. 121 Ha.

γωνίας ἀνάλογόν εἰσιν αἱ πλευραί· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ Β γωνία τῇ ἐπὶ ΖΒΗ, ἐλάσσονι οὖσα τῆς Ε.

- 253 ζ. Ἔστω ὁμοία τρίγωνα τὰ ΑΒΓ ΔΕΖ, καὶ διήχθωσαν αἱ ΑΗ ΔΘ οὕτως, ὥστε εἶναι ὡς τὸ ἐπὶ ΒΓΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΑ, οὕτως τὸ ἐπὶ ΕΖΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΑ· ὅτι γίνεται ὁμοιον καὶ τὸ ΑΗΓ τριγώνων τῶ ΔΘΖ τριγώνων.

Ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὡς τὸ ἐπὶ ΒΓΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΑ, οὕτως τὸ ἐπὶ ΕΖΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΑ, ἀλλ' ὁ μὲν τοῦ ἐπὶ ΒΓΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΑ λόγος συνηῖται ἐκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ ΒΓ πρὸς ΓΑ καὶ τοῦ τῆς ΗΓ πρὸς ΓΑ, ὁ δὲ τοῦ ἐπὶ ΕΖΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΑ συνηῖται ἐκ τε τοῦ τῆς ΕΖ πρὸς ΖΑ καὶ τοῦ τῆς ΘΖ πρὸς ΖΑ, ὡν ὁ τῆς ΒΓ πρὸς ΓΑ λόγος ὁ αὐτός ἐστιν τῇ τῆς ΕΖ πρὸς ΖΑ, διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν τριγώνων λοιπὸς ἄρα ὁ τῆς ΗΓ πρὸς ΓΑ λόγος ὁ αὐτός ἐστιν τῇ τῆς ΘΖ πρὸς ΖΑ. καὶ περὶ ἴσας γωνίας· ὁμοιον ἄρα ἐστὶν τὸ ΑΓΗ τριγώνων τῶ ΔΖΘ τριγώνων.

- 254 η. Διὰ μὲν οὖν τοῦ συνημμένου λόγου, ὡς προέγραπται, ἔστω δὲ νῦν ἀποδείξαι μὴ προσχερσάμενον τῷ συνημμένῳ λόγῳ.

Κείσθω τῷ μὲν ἐπὶ ΒΓΗ ἴσον τὸ ἐπὶ ΑΓΚ· ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΓΚ, οὕτως ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΓΗ. τῷ δὲ ἐπὶ ΕΖΘ ἴσον κείσθω τὸ ἐπὶ ΑΖΑ· ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ ΕΖ πρὸς ΖΑ, οὕτως ἡ ΑΖ πρὸς ΖΘ. ὑπόκειται δὲ ὡς τὸ ἐπὶ ΒΓΗ, τουτέστιν τὸ ἐπὶ ΑΓΚ, πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΓ, τουτέστιν ὡς ἡ ΚΓ πρὸς ΓΑ, οὕτως τὸ ἐπὶ ΕΖΘ, τουτέστιν τὸ ἐπὶ ΑΖΑ, πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΖ, τουτέστιν ἡ ΑΖ πρὸς ΖΑ. ἀλλὰ καὶ ὡς ἡ ΒΓ πρὸς ΓΑ, οὕτως ἡ ΕΖ πρὸς ΖΑ διὰ τὴν ὁμοιότητα· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΒΓ πρὸς ΓΚ, οὕτως ἡ ΕΖ πρὸς ΖΑ. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΒΓ πρὸς ΓΚ, οὕτως ἐδείχθη ἡ ΑΓ πρὸς ΓΗ, ὡς δὲ ἡ ΕΖ πρὸς ΖΑ, οὕτως ἡ

1. citatur elem. 6 propositio 4; sed significatur eadem conversa

2. ἐλάσσονι οὖσα τῆς ΖΕΑ Ha, ἐλάσσονος οὔσης τῆς Ε ABS 3. ζ' add. BS 9. ἀπὸ add. Ha auctore Co 10. πρὸς ΓΑ A² ex πρὸς Γ 11. τοῦ τῆς ΘΖ Ha 12. λοιπὸς Ha pro λοιπὸν 13. τὸ ΑΗΓ τριγώνων τῶ ΔΘΖ τριγώνων Ha 14. η' add. BS 15. κείσθω τῷ ἐπὶ ΑΒ, corr. S 16. ὡς ἡ ΑΓ πρὸς ΓΚ ABS, corr. Ha 17. 18. η

latera proportionalia complectuntur; ergo est $\angle \beta = \angle \xi \epsilon \eta$, itaque $\angle \xi \epsilon \delta$.

VII. Sint similia triacula $\alpha \beta \gamma \delta \epsilon \zeta$, in quibus rectae $\alpha \gamma$ ^{Prop. 482} $\delta \theta$ ita ducantur, ut sit $\beta \gamma : \gamma \eta : \gamma \alpha^2 = \epsilon \zeta : \zeta \theta : \zeta \delta^2$; dico etiam triacula $\alpha \gamma \eta$ $\delta \theta \zeta$ similia esse.




Quoniam enim est $\beta \gamma : \gamma \eta : \gamma \alpha^2 = \epsilon \zeta : \zeta \theta : \zeta \delta^2$, et per formulam compositae proportionis

$$\frac{\beta \gamma}{\gamma \alpha} \cdot \frac{\eta \gamma}{\gamma \alpha} = \frac{\epsilon \zeta}{\zeta \delta} \cdot \frac{\theta \zeta}{\zeta \delta},$$

in quibus propter triangulorum similitudinem est $\beta \gamma : \gamma \alpha = \epsilon \zeta : \zeta \delta$, hac igitur proportione subtracta restat $\eta \gamma : \gamma \alpha = \theta \zeta : \zeta \delta$. Et sunt haec latera proportionalia circa aequales angulos: ergo triacula $\alpha \gamma \eta$ $\delta \theta \zeta$ similia sunt.

VIII. Per formulam igitur compositae proportionis sic, ut ^{Prop. 483} modo scriptum est: iam vero idem, non adhibita ea formula, demonstretur.



Ponatur $\alpha \gamma : \gamma \eta = \beta \gamma : \gamma \eta$, et $\delta \theta : \zeta \lambda = \epsilon \zeta : \zeta \theta$; est igitur $\beta \gamma : \gamma \eta = \alpha \gamma : \gamma \eta$, et $\epsilon \zeta : \zeta \theta = \delta \theta : \zeta \theta$. Sed ex hypothesis est

$$\beta \gamma : \gamma \eta : \gamma \alpha^2 = \epsilon \zeta : \zeta \theta : \delta \theta^2, \text{ id est}$$

$$\alpha \gamma : \gamma \eta : \gamma \alpha^2 = \delta \theta : \zeta \lambda : \delta \theta^2, \text{ id est}$$

$$\alpha \gamma : \gamma \alpha = \lambda \zeta : \zeta \delta. \text{ Sed propter similitudinem triangulorum est etiam}$$

$$\beta \gamma : \gamma \alpha = \epsilon \zeta : \zeta \delta; \text{ itaque est}$$

$$\beta \gamma : \gamma \alpha = \epsilon \zeta : \zeta \delta. \text{ Sed demonstravimus esse } \beta \gamma : \gamma \alpha = \alpha \gamma : \gamma \eta, \text{ et } \epsilon \zeta : \zeta \lambda = \delta \theta : \zeta \theta; \text{ ergo etiam}$$

ΔZ πρὸς $Z\Theta$ · καὶ ὥς ἄρα ἡ $\Delta\Gamma$ πρὸς $\Gamma\eta$, οὕτως ἡ ΔZ πρὸς $Z\Theta$. καὶ περὶ ἴσας γωνίας· ὅμοιον ἄρα ἐστὶν τὸ $\Delta\Gamma\eta$ τρίγωνον τῷ $\Delta Z\Theta$ τριγώνῳ.

Ὅμοίως καὶ τὸ $\Delta\eta\beta$ τῷ $\Delta\Theta E$, ὅτι καὶ τὸ $\Delta\beta\Gamma$ τῷ $\Delta E Z$.

5

- 255 ὅ'. Ἐστω ὅμοιον τὸ μὲν $\Delta\beta\Gamma$ τρίγωνον τῷ $\Delta E Z$ τριγώνῳ, τὸ δὲ $\Delta\eta\beta$ τῷ $\Delta\Theta E$ · ὅτι γίνεται ὥς τὸ ἐπὶ $\beta\Gamma\eta$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓA , οὕτως τὸ ἐπὶ $E Z\Theta$ πρὸς τὸ ἀπὸ $Z A$.

Ἐπεὶ γὰρ διὰ τὴν ὁμοιότητα ἴση ἐστὶν ὅλη μὲν ἡ A ὅλη τῇ A , ἡ δὲ ἐπὶ $\beta A\eta$ τῇ ἐπὶ $E A\Theta$, λοιπὴ ἄρα ἡ ἐπὶ 10 $\eta A\Gamma$ λοιπῇ τῇ ἐπὶ $\Theta A Z$ ἐστὶν ἴση. ἀλλὰ καὶ ἡ Γ τῇ Z · ἐστὶν ἄρα ὥς ἡ $\eta\Gamma$ πρὸς τὴν ΓA , οὕτως ἡ ΘZ πρὸς $Z A$. ἀλλὰ καὶ ὥς ἡ $\beta\Gamma$ πρὸς τὴν ΓA , οὕτως ἦν ἡ $E Z$ πρὸς $Z A$ · καὶ ὁ συνημμένος ἄρα τῷ συνημμένῳ ἐστὶν ὁ αὐτός· ἐστὶν ἄρα ὥς τὸ ἐπὶ $\beta\Gamma\eta$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓA , οὕτως τὸ ἐπὶ $E Z\Theta$ 15 πρὸς τὸ ἀπὸ $Z A$.

- 256 ι'. Ἄλλως μὴ διὰ τοῦ συνημμένου. καίσθω τῷ μὲν ἐπὶ $\beta\Gamma\eta$ ἴσον τὸ ἐπὶ $\Delta\Gamma K$, τῷ δὲ ἐπὶ $E Z\Theta$ ἴσον τὸ ἐπὶ $\Delta Z A$. ἔσται πάλιν ὥς μὲν ἡ $\beta\Gamma$ πρὸς ΓK , οὕτως ἡ $\Delta\Gamma$ πρὸς $\Gamma\eta$, ὥς δὲ ἡ $E Z$ πρὸς $Z A$, οὕτως ἡ ΔZ πρὸς $Z\Theta$. καὶ κατὰ 20 τὰ αὐτὰ τῷ ἐπάνω δεῖξομεν ὅτι ἐστὶν ὥς ἡ $\Delta\Gamma$ πρὸς $\Gamma\eta$, οὕτως ἡ ΔZ πρὸς $Z\Theta$ · καὶ ὥς ἄρα ἡ $\beta\Gamma$ πρὸς ΓK , οὕτως ἡ $E Z$ πρὸς $Z A$. ἀλλὰ καὶ ὥς ἡ $\beta\Gamma$ πρὸς ΓA , οὕτως ἡ $E Z$ πρὸς $Z A$ διὰ τὴν ὁμοιότητα· δι' ἴσον ἄρα ἐστὶν ὥς ἡ $K\Gamma$ πρὸς ΓA , τοιούτως ὥς τὸ ἐπὶ $K\Gamma A$, ὃ ἐστὶν τὸ 25 ἐπὶ $\beta\Gamma\eta$, πρὸς τὸ ἀπὸ $\Delta\Gamma$, οὕτως ἡ ΔZ πρὸς $Z A$, τοιούτως τὸ ἐπὶ $\Delta Z A$, ὃ ἐστὶν τὸ ἐπὶ $E Z\Theta$, πρὸς τὸ ἀπὸ $Z A$, ὅπερ· ~


4. 5. ὁμοίως — $\Delta E Z$ interpolatori tribuit Hu 4. ὅτι· ὥστε Ha
6. 8' add. BS 8. τὸ ἐπὶ ΔZ ABS, corr. Ha auctore Co (vide
vs. 16) 12. τὴν ante $Z A$ add. Ha 13. ἢν ἡ AS, καὶ B, ἢν om.
Co Ha πρὸς $Z A$ Ha auctore Co pro πρὸς $Z A$ 15. τὸ ἐπὶ
 $E Z\Theta$ ABS, corr. Ha auctore Co 17. ι'. add. BS 21. τοῖς ἐπάνω
coni. Hu (conf. p. 942, 8) 22. οὕτως ἡ $E Z$ ABS, corr. Ha auctore
Co 23. 24. οὕτως ἡ ΘZ ABS, corr. Ha auctore Co 25. πρὸς ΓA
Ha auctore Co pro πρὸς ΓA τὸ (post ὃ ἐστὶν) Ha pro τοῦ 26. οὕτως
ἡ ΔZ ABS. corr. Ha auctore Co 28. ὅπερ εἰδει δεῖξαι S

$$\alpha\gamma : \gamma\eta = \delta\zeta : \zeta\theta.$$

Et sunt haec latera proportionalia circa aequales angulos; ergo triangula $\alpha\gamma\eta$ $\delta\zeta\theta$ similia sunt.

Item triangula $\alpha\beta\gamma$ $\delta\epsilon\theta$ similia sunt, quia etiam triangula $\alpha\beta\gamma$ $\delta\epsilon\zeta$ similia sunt etc.

IX. Sit $\Delta \alpha\beta\gamma \sim \Delta \delta\epsilon\zeta$, et $\Delta \alpha\beta\eta \sim \Delta \delta\epsilon\theta$; dico esse Prop. 184
 $\beta\gamma \cdot \gamma\eta : \gamma\alpha^2 = \epsilon\zeta \cdot \zeta\theta : \zeta\delta^2$.



Quoniam enim propter similitudinem triangulorum est $\angle \beta\alpha\gamma = \angle \delta\epsilon\zeta$, et $\angle \beta\alpha\eta = \angle \delta\epsilon\theta$, per subtractionem igitur est $\angle \eta\alpha\gamma =$


$\angle \theta\delta\zeta$. Sed est etiam $\angle \gamma = \angle \zeta$; ergo

$\eta\gamma : \gamma\alpha = \theta\zeta : \zeta\delta$. Sed erat etiam

$\beta\gamma : \gamma\alpha = \epsilon\zeta : \zeta\delta$; ergo per formulam compositae proportionis est

$$\beta\gamma \cdot \gamma\eta : \gamma\alpha^2 = \epsilon\zeta \cdot \zeta\theta : \zeta\delta^2.$$

X. Aliter sine formula compositae proportionis. Ponatur Prop. 185



$$\alpha\gamma \cdot \gamma\alpha = \beta\gamma \cdot \gamma\eta,$$

$$\text{et } \delta\zeta \cdot \zeta\lambda = \epsilon\zeta \cdot \zeta\theta.$$

Rursus erit $\beta\gamma : \gamma\alpha$

$$= \alpha\gamma : \gamma\eta, \text{ et } \epsilon\zeta : \zeta\lambda$$

$$= \delta\zeta : \zeta\theta. \text{ Et eadem ratione ac supra demonstrabi-$$

mus esse $\alpha\gamma : \gamma\eta =$

$\delta\zeta : \zeta\theta$; ergo etiam $\beta\gamma : \gamma\alpha = \delta\zeta : \zeta\theta$, id est

$\beta\gamma : \gamma\alpha = \epsilon\zeta : \zeta\lambda$. Sed propter similitudinem triangulorum est etiam

$$\beta\gamma : \gamma\alpha = \epsilon\zeta : \zeta\delta; \text{ ex aequali igitur est}$$

$$\alpha\gamma : \gamma\alpha = \lambda\zeta : \zeta\delta, \text{ id est}$$

$$\alpha\gamma \cdot \gamma\alpha : \alpha\gamma^2 = \lambda\zeta \cdot \zeta\delta : \zeta\delta^2, \text{ id est (ex constructione)}$$

$$\beta\gamma \cdot \gamma\eta : \alpha\gamma^2 = \epsilon\zeta \cdot \zeta\theta : \zeta\delta^2, \text{ q. e. d.}$$

Ὅμοίως δὲ δεῖξομεν, καὶ ἐὰν ἦ ὡς τὸ ὑπὸ ΒΓΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΓ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΕΖΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΑ, καὶ ὅμοιον τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ ΔΕΖ τριγώνῳ, ὅτι καὶ τὸ ΑΒΗ τρίγωνον τῷ ΔΕΘ τριγώνῳ ὅμοιον.

- 257 ια'. Ἐστω δύο ὅμοια τρίγωνα τὰ ΑΒΓ ΔΕΖ, καὶ κά-
θεται ἤχθωσαν αἱ ΑΗ ΔΘ· ὅτι ἐστὶν ὡς τὸ ὑπὸ ΒΗΓ
πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΗ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΕΘΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘΑ.

Τοῦτο δὲ φανερόν, ὅτι ὅμοιον γίνεται τοῖς πρὸ αὐτοῦ.

- 258 ιβ'. Ἐστω ἴση ἡ μὲν Β γωνία τῇ Ε, ἐλάσσων δὲ ἡ Α
τῆς Δ· ὅτι ἡ ΓΒ πρὸς ΒΑ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ 10
ΖΕ πρὸς ΕΔ.

Ἐπεὶ γὰρ ἐλάσσων ἡ Α γωνία τῆς Δ, συνεστατώ αὐτῇ
ἴση ἡ ὑπὸ ΕΔΗ· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΓΒ πρὸς ΒΑ, οὕτως ἡ
ΕΗ πρὸς ΕΔ. ἀλλὰ καὶ ἡ ΕΗ πρὸς ΕΔ ἐλάσσονα λόγον
ἔχει ἢ περ ἡ ΖΕ πρὸς ΕΔ· καὶ ἡ ΓΒ ἄρα πρὸς τὴν ΒΑ 15
ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΖΕ πρὸς τὴν ΕΔ. καὶ πάντα
δὲ τὰ τοιαῦτα τῇ αὐτῇ ἀγωγῇ δεῖξομεν.


- 259 ιγ'. Ἐστω ὡς τὸ ὑπὸ ΒΗΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΗ, οὕτως
τὸ ὑπὸ ΕΘΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΘ, καὶ ἡ μὲν ΒΗ τῇ ΗΓ ἔστω
ἴση, ἡ δὲ ΓΗ πρὸς ΗΔ ἐλάσσονα λόγον ἐχέτω ἢ περ ἡ ΖΘ 20
πρὸς ΘΑ· ὅτι μείζων ἐστὶν ἡ ΖΘ τῆς ΘΕ.

Ἐπεὶ γὰρ τὸ ἀπὸ ΓΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΔ ἐλάσσονα λό-
γον ἔχει ἢ περ τὸ ἀπὸ ΖΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘΑ, ἀλλὰ τὸ ἀπὸ
ΓΗ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΒΗΓ, τὸ ἄρα ὑπὸ ΒΗΓ πρὸς τὸ
ἀπὸ ΑΗ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ τὸ ἀπὸ ΖΘ πρὸς τὸ 25
ἀπὸ ΘΑ. ἀλλ' ὡς τὸ ὑπὸ ΒΗΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΗ, οὕτως
ὑπόκειται τὸ ὑπὸ ΕΘΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘΑ, καὶ τὸ ὑπὸ ΕΘΖ
ἄρα πρὸς τὸ ἀπὸ ΘΑ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ τὸ ἀπὸ

1. καὶ om. Ha 3. ια' et 9. ιβ' add. BS 13. 14. οὕτως ἡ ΗΕ
et ἀλλὰ καὶ ἡ ΗΕ Ha 14. ἀλλ' ἐπεὶ ἡ ΕΗ conit. Hu 16. ἢ περ
ΖΕ Ha auctore Co. ἢ περ ἡ ΖΘ ABS 17. τὰ bis scriptum in A
18. ιγ' add. BS 28. ἀπὸ (post ἀλλὰ τὸ) add. Ha auctore Co 27. ὑπε-
κειτο (sine acc.) A(BS), corr. Ha τὸ ὑπὸ ΕΖΘ ABS, corr. Ha auc-
tore Co 27. 28. τὸ ὑπὸ ΕΖΘ ἄρα AB, ὡς τὸ ὑπὸ ΕΖ ἄρα S, corr.
Ha auctore Co

Similiter demonstrabimus, si sit $\beta\gamma \cdot \gamma\eta : \alpha\gamma^2 = \epsilon\zeta \cdot \zeta\vartheta : \zeta\delta^2$, et $\Delta \alpha\beta\gamma \sim \Delta \delta\epsilon\zeta$, esse etiam $\Delta \alpha\beta\eta \sim \Delta \delta\epsilon\vartheta$.


XI. Sint duo similia triangula $\alpha\beta\gamma$ $\delta\epsilon\zeta$, et ducantur perpendicularares $\alpha\eta$ $\delta\vartheta$; dico esse $\beta\eta \cdot \eta\gamma : \eta\alpha^2 = \epsilon\vartheta \cdot \vartheta\zeta : \vartheta\delta^2$. Prop. 186



Hanc vero demonstrationem apparet similem esse superiori quae est in lemmate IX. Et enim est $\beta\eta : \eta\alpha = \epsilon\vartheta : \vartheta\delta$, et $\gamma\eta : \eta\alpha = \zeta\vartheta : \vartheta\delta$, ideoque per formulam compo-

situe proportionis $\beta\eta \cdot \eta\gamma : \eta\alpha^2 = \epsilon\vartheta \cdot \vartheta\zeta : \vartheta\delta^2$.


XII. Sit $\angle \beta = \angle \epsilon$, et $\angle \alpha < \angle \delta$: dico esse $\gamma\beta : \beta\alpha$ Prop. 187
 $< \zeta\epsilon : \epsilon\delta$.



Quoniam enim est $\angle \alpha < \angle \delta$, construat $\angle \epsilon\delta\eta = \angle \alpha$: est igitur $\gamma\beta : \beta\alpha = \eta\epsilon : \epsilon\delta$. Sed quia propter elem. 5, 8 est $\eta\epsilon : \epsilon\delta < \zeta\epsilon : \epsilon\delta$, est igitur etiam $\gamma\beta : \beta\alpha < \zeta\epsilon : \epsilon\delta$. Et omnia quae

sunt eius generis eadem ratione demonstrabimus.

XIII. Sit $\beta\eta \cdot \eta\gamma : \alpha\eta^2 = \epsilon\vartheta \cdot \vartheta\zeta : \delta\vartheta^2$, et $\beta\eta = \eta\gamma$, et Prop. 188
 $\gamma\eta : \eta\alpha < \zeta\vartheta : \vartheta\delta$: dico esse $\zeta\vartheta > \vartheta\epsilon$.



Quoniam enim ex hypothesi sequitur esse $\gamma\eta^2 : \eta\alpha^2 < \zeta\vartheta^2 : \vartheta\delta^2$, estque $\gamma\eta^2 = \beta\eta \cdot \eta\gamma$, est igitur

$\beta\eta \cdot \eta\gamma : \alpha\eta^2 < \zeta\vartheta^2 : \vartheta\delta^2$. Sed ex hypothesi est $\beta\eta \cdot \eta\gamma : \alpha\eta^2 = \epsilon\vartheta \cdot \vartheta\zeta : \delta\vartheta^2$: ergo

$Z\Theta$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘA · μεῖζον ἄρα ἐστὶν τὸ ἀπὸ $Z\Theta$ τοῦ
ὑπὸ $E\Theta Z$ · ὥστε μεῖζον ἐστὶν ἢ $Z\Theta$ τῆς ΘE .

Τοῦ γ'.

260 α'. Καταγραφὴ ἡ $ABΓJEZH$, ἔστω δὲ ἴση ἡ BH τῇ
 HI · ὅτι παράλληλός ἐστιν ἡ EZ τῇ BI . 5

Ἦχθω διὰ τοῦ A τῇ BI παράλληλος ἡ ΘK , καὶ ἐκ-
βεβλήσθωσαν αἱ BZ $Γ E$ ἐπὶ τὰ K Θ σημεῖα. ἐπεὶ οὖν
ἴση ἐστὶν ἡ BH τῇ HI , ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ΘA τῇ AK ·
ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ BI πρὸς τὴν ΘA , τουτέστιν ὡς ἡ BE πρὸς
τὴν EA , οὕτως ἡ BI πρὸς τὴν KA , τουτέστιν ἡ IZ πρὸς 10
 ZA · παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ EZ τῇ BI .

261 β'. Ἐστω δύο τρίγωνα τὰ $ABΓ JEZ$, ἴσας ἔχοντα τὰς
 A J γωνίας, ἴσον δὲ ἔστω τὸ ὑπὸ $B A Γ$ τῷ ὑπὸ $E J Z$ ·
ὅτι καὶ τὰ τρίγωνον τῷ τριγώνῳ ἐστὶν ἴσον.

Ἦχθωσαν κάθετοι αἱ BH $E\Theta$ · ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ HB 15
πρὸς τὴν BA , οὕτως ἡ $E\Theta$ πρὸς τὴν EA · καὶ ὡς ἄρα τὸ
ὑπὸ $BH A Γ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $BA A Γ$, οὕτως τὸ ὑπὸ $E\Theta J Z$
πρὸς τὸ ὑπὸ $EA J Z$. ἴσον δὲ ἐστὶν τὸ ὑπὸ $B A Γ$ τῷ ὑπὸ
 $E J Z$ · ἴσον ἄρα ἐστὶν καὶ τὸ ὑπὸ $BH A Γ$ τῷ ὑπὸ $E\Theta J Z$.
ἀλλὰ τοῦ μὲν ὑπὸ $BH A Γ$ ἡμισὺ ἐστὶν τὸ $ABΓ$ τρίγωνον, 20
τοῦ δὲ ὑπὸ $E\Theta J Z$ ἡμισὺ ἐστὶν τὸ AEZ τρίγωνον· καὶ τὸ
 $ABΓ$ ἄρα τρίγωνον τῷ AEZ τριγώνῳ ἴσον ἐστίν.


Φανερόν δὴ ὅτι καὶ τὰ διελθὰ αὐτῶν παραλληλόγραμμα
ἴσα ἐστίν.

1. μεῖζον ἄρα A, corr. BS 4. 2. τοῦ ἀπὸ ΘH AS, τοῦ ἀπὸ $\Theta \nu$ B,
corr. Ha auctore Co 9. Τοῦ τρίτου τῶν κοινικῶν BS 6. α' add.
BS ἡ $AB \Gamma J E Z H A$, coniunx. BS ἔστω δὲ ἴση ἡ BH his
scripta in A 7. ἐπεὶ τὰ $K\Theta$ σημεῖα A, corr. BS 9. 10. πρὸς τὴν EA
Ha auctore Co pro πρὸς τὴν $Γ A$ 12. β' add. BS 12. 13. τὰ $ABΓ JEZ$
et τὰς AA A, distinx. BS 17. $BH A Γ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $BA A Γ$ οὕτως
τὸ ὑπὸ his scripta in A (similiter S et, ut videtur, B) τὸ ὑπὸ $B A Γ$
Ha 18. $EA Z$. ἴσον δὲ $H J Z$ [εδὲ BS] ἐναλλάξ ὡς τὸ ὑπὸ $BH A Γ$
πρὸς τὸ ὑπὸ $E\Theta J Z$ οὕτως τὸ ὑπὸ $B A Γ$ πρὸς τὸ ὑπὸ $E J Z$ ἴσον δὲ

$\epsilon\theta \cdot \theta\zeta : \theta\delta^2 < \zeta\theta^2 : \theta\delta^2$; itaque propter elem. 5, 8 est
 $\zeta\theta^2 > \epsilon\theta \cdot \theta\zeta$; itaque $\zeta\theta > \theta\epsilon$.

LEMATA IN CONICORUM LIBRUM III.

I. Sit figura $\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\zeta\eta$, id est trianguli $\alpha\beta\gamma$ basis $\beta\gamma$ bi- Prop. 189
 sariam secetur in η , et iungatur $\eta\alpha$, cuius per quodvis punc-
 tum δ ducantur $\beta\zeta$ $\gamma\epsilon$, et iungatur
 $\epsilon\zeta$; dico esse $\epsilon\zeta \parallel \beta\gamma$.




Ducatur per α rectae $\beta\gamma$ pa-
 rallela $\theta\alpha$, et producantur $\beta\zeta$ $\gamma\epsilon$
 ad puncta θ ϑ . Iam quia est $\beta\eta$
 $= \eta\gamma$, propter similitudinem trian-
 gulorum est etiam $\theta\alpha = \alpha\vartheta$: est
 igitur

$\beta\gamma : \theta\alpha = \beta\gamma : \alpha\alpha$, id est

$\beta\epsilon : \epsilon\alpha = \gamma\zeta : \zeta\alpha$; ergo est $\epsilon\zeta \parallel \beta\gamma$.

II. Sint duo triangula $\alpha\beta\gamma$ $\delta\epsilon\zeta$, angulos α δ aequales Prop. 190
 habentia, sitque $\beta\alpha \cdot \alpha\gamma = \epsilon\delta \cdot \delta\zeta$; dico triangulum triangulo
 aequale esse.




Ducantur perpendi-
 culares $\beta\eta$ $\epsilon\theta$; est igitur
 $\Delta \eta\beta\alpha \sim \Delta \theta\epsilon\delta$,
 ideoque $\eta\beta : \beta\alpha = \theta\epsilon :$
 $\epsilon\delta$; ergo etiam $\beta\eta \cdot \alpha\gamma :$
 $\beta\alpha \cdot \alpha\gamma = \theta\epsilon \cdot \delta\zeta : \epsilon\delta \cdot \delta\zeta$.

Sed ex hypothesi est
 $\beta\alpha \cdot \alpha\gamma = \epsilon\delta \cdot \delta\zeta$; ergo etiam $\beta\eta \cdot \alpha\gamma = \theta\epsilon \cdot \delta\zeta$. Sed est
 $\frac{1}{2}\beta\eta \cdot \alpha\gamma = \Delta \alpha\beta\gamma$, et $\frac{1}{2}\theta\epsilon \cdot \delta\zeta = \Delta \delta\epsilon\zeta$; ergo etiam $\Delta \alpha\beta\gamma$
 $= \Delta \delta\epsilon\zeta$.

Apparet etiam parallelogramma, utpote horum triangulo-
 rum dupla, aequalia esse.

- 262 γ'. Τρίγωνον τὸ $\triangle AB\Gamma$, καὶ παράλληλος ἡ ΔE τῇ $B\Gamma$.
ὅτι ἐστὶν ὡς τὸ ἀπὸ BA πρὸς τὸ ἀπὸ AA , οὕτως τὸ $\triangle AB\Gamma$
τρίγωνον πρὸς τὸ $\triangle A\Delta E$ τρίγωνον.
- Ἐπεὶ γὰρ ὁμοίον ἐστὶν τὸ $\triangle AB\Gamma$ τρίγωνον τῷ $\triangle A\Delta E$
τριγώνῳ, τὸ ἄρα $\triangle AB\Gamma$ τρίγωνον πρὸς τὸ $\triangle A\Delta E$ τρίγωνον⁵
διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ BA πρὸς AA . ἀλλὰ καὶ
τὸ ἀπὸ BA πρὸς τὸ ἀπὸ AA διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περ
ἡ BA πρὸς τὴν AA . ἐστὶν ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ BA πρὸς τὸ
ἀπὸ AA , οὕτως τὸ $\triangle AB\Gamma$ τρίγωνον πρὸς τὸ $\triangle A\Delta E$ τρίγωνον.
- 263 δ'. Ἰσαι αἱ AB ΓA , καὶ τυχὸν σημεῖον τὸ E . ὅτι τὸ¹⁰
ἐπὶ $\triangle EGB$ τοῦ ἐπὶ $\triangle AB$ ὑπερέχει τῷ ἐπὶ $\triangle EA$.
- Τετμήσθω ἡ $B\Gamma$ διχα τῷ Z . τὸ Z ἄρα διχοτομία ἐστὶν
καὶ τῆς AA . καὶ ἐπεὶ τὸ ἐπὶ $\triangle EGB$ μετὰ τοῦ ἀπὸ BZ
ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ EZ , ἀλλὰ καὶ τὸ ἐπὶ $\triangle EA$ μετὰ τοῦ
ἀπὸ AZ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ EZ , καὶ ἐστὶν τὸ ἀπὸ AZ ¹⁵
ἴσον τῷ ἐπὶ $\triangle AB$ μετὰ τοῦ ἀπὸ BZ , κοινὸν ἐκκακρούσθω
τὸ ἀπὸ BZ . λοιπὸν ἄρα τὸ ἐπὶ $\triangle EGB$ ἴσον ἐστὶν τῷ τε
ἐπὶ $\triangle AB$ καὶ τῷ ἐπὶ $\triangle EA$, ὥστε τὸ ἐπὶ $\triangle EGB$ τοῦ ἐπὶ
 $\triangle AB$ ὑπερέχει τῷ ἐπὶ $\triangle EA$, ὅπερ: ~
- 264 ε'. Ἐὰν δὲ τὸ σημεῖον ᾗ μεταξὺ τῶν A B σημείων,²⁰
τὸ ἐπὶ $\triangle EGB$ τοῦ ἐπὶ $\triangle AB$ ἔλασσον ἔσται τῷ αὐτῷ χωρίῳ,
οὐπὲρ ἐστὶν κατὰ τὰ αὐτὰ ἢ ἀποδείξεις.
- Ἐὰν δὲ τὸ σημεῖον ᾗ μεταξὺ τῶν B Γ , τὸ ἐπὶ $\triangle EGB$
τοῦ ἐπὶ $\triangle EA$ ἔλασσον ἔσται τῷ ἐπὶ $\triangle AB$, τῇ αὐτῇ ἀγωγῇ.
- 265 ς'. Ἰση ἡ AB τῇ $B\Gamma$, καὶ δύο σημεία τὰ Δ E . ὅτι²⁵
τὸ τετράκις ἀπὸ τῆς AB τετράγωνον ἴσον ἐστὶν τῷ δις ἐπὶ
 $\triangle A\Delta\Gamma$ μετὰ τοῦ δις ἐπὶ $\triangle A\Gamma E$ καὶ δις τῶν ἀπὸ BA BE
τετραγώνων.

1. γ' add. BS τῆς $B\Gamma$ AB , corr. S 1. τὸ ἀπὸ BA πρὸς τὸ
ἀπὸ AB A , τὸ ἀπὸ BA πρὸς τὸ ἀπὸ AB B , τὸ ἀπὸ AB πρὸς τὸ ἀπὸ AB
S 5. τρίγωνον (ante διπλ.) om. Ha 6. διπλάσιον B, item vs. 7
9. τὸ $\triangle AB\Gamma$ τρίγωνον Ha auctore Co pro τὸ ἀπὸ $AB\Gamma$ 10. δ' add.
BS 15. καὶ ἐστὶν] ἐστὶν ἄρα καὶ conl. Ha 16. ἴσον τῷ ἐπὶ $\triangle A\Gamma E$
ABS, corr. Ha auctore Co 17. 18. τὸ ἐπὶ $\triangle EGB$ — ὥστε bis scripta
in ABS 18. ὥστε καὶ τὸ Ha 18. 19. τοῦ ἐπὶ $\triangle B\Delta\Gamma$ ABS, corr. Ha



III. Sit triangulum $\alpha\beta\gamma$, et $\delta\epsilon \parallel \beta\gamma$: Prop. 191
 dico esse $\beta\alpha^2 : \alpha\delta^2 = \Delta \alpha\beta\gamma : \Delta \alpha\delta\epsilon$.

Quoniam enim similia sunt triangula;
 est igitur propter elem. 6, 19 $\Delta \alpha\beta\gamma :$
 $\Delta \alpha\delta\epsilon = \beta\alpha^2 : \alpha\delta^2$.

IV. Sit recta $\alpha\delta$, et $\alpha\beta = \gamma\delta$, et in $\delta\alpha$ producta quod- Prop. 192
 vis punctum ϵ ; dico esse $\gamma\epsilon \cdot \epsilon\beta - \gamma\alpha \cdot \alpha\beta = \delta\epsilon \cdot \epsilon\alpha$.

Bifariam secetur $\beta\gamma$
 in puncto ζ ; in eodem
 igitur puncto etiam $\alpha\delta$ bifariam secatur. Et quia propter elem.
 2, 6 est

$$\gamma\epsilon \cdot \epsilon\beta + \beta\zeta^2 = \epsilon\zeta^2, \text{ itemque}$$

$$\delta\epsilon \cdot \epsilon\alpha + \alpha\zeta^2 = \epsilon\zeta^2, \text{ et } \alpha\zeta^2 = \gamma\alpha \cdot \alpha\beta + \beta\zeta^2, \text{ itaque}$$

$$\gamma\epsilon \cdot \epsilon\beta + \beta\zeta^2 = \delta\epsilon \cdot \epsilon\alpha + \gamma\alpha \cdot \alpha\beta + \beta\zeta^2, \text{ commune au-}$$

feratur $\beta\zeta^2$; restat igitur

$$\gamma\epsilon \cdot \epsilon\beta = \delta\epsilon \cdot \epsilon\alpha + \gamma\alpha \cdot \alpha\beta, \text{ itaque}$$

$$\gamma\epsilon \cdot \epsilon\beta - \gamma\alpha \cdot \alpha\beta = \delta\epsilon \cdot \epsilon\alpha, \text{ q. e. d.}$$

Sin vero punctum ϵ sit Prop. 193
 inter $\alpha \beta$, erit $\gamma\alpha \cdot \alpha\beta -$

$$\gamma\epsilon \cdot \epsilon\beta = \delta\epsilon \cdot \epsilon\alpha, \text{ quod eadem ratione demonstratur.}$$

At si punctum ϵ inter Prop. 194
 $\beta \gamma$ sit, erit $\alpha\epsilon \cdot \epsilon\delta - \gamma\epsilon \cdot \epsilon\beta$
 $= \alpha\beta \cdot \beta\delta$, eadem ratione (conf. supra propos. 178).

V. Sit recta $\alpha\gamma$, et $\alpha\beta = \beta\gamma$, duoque in recta $\alpha\gamma$ puncta Prop. 195
 $\delta \epsilon$; dico esse $\frac{1}{2} \alpha\beta^2 = \frac{1}{2} (\alpha\delta \cdot \delta\gamma + \alpha\epsilon \cdot \epsilon\gamma + \beta\delta^2 + \beta\epsilon^2)$.

auctore Co 20. ϵ' add. BS τὸ $E \sigma\eta\mu\epsilon\iota\omicron\nu$ Ha auctore Co, item
 vs. 23 τῶν AB A, distinx. BS 24. τοῦ ἐπὶ ΓAB S^r Ha, τὸ ἐπὶ
 ΓAB AB, πρὸς τὸ ἐπὶ $\gamma\alpha\beta$ Paris. 2368 $\epsilon\lambda\acute{\alpha}\sigma\sigma\omega\nu$ A, corr. BS post
 χωρίῳ add. τῇ ἐπὶ $AE\delta$ Ha auctore Co 22. οὐκ $\epsilon\pi\epsilon\rho$ Ha pro $\delta\pi\epsilon\rho$
 23. τῶν BF A, distinx. BS τὸ ἐπὶ ΓFB Ha auctore Co pro τὸ ἐπὶ
 $\Gamma E\Gamma$ 25. ξ' add. BS τὰ JB A, distinx. BS 26. τετραγώνῳ Ha
 auctore Co pro δεκάγων 27. τοῦ δις ἐπὶ $\alpha\epsilon\gamma$ BS, in A pro oblitterato
 $AE\Gamma$ manus rec. scr. $KA\Gamma$ δις τῶν ἀπὸ $H\alpha$, δις ἀπὸ τῶν $AB\delta$,
 τοῦ δις ἀπὸ τῶν $H\alpha$

Τοῦτο δὲ φανερόν· τὸ μὲν γὰρ δις ἀπὸ AB , διὰ τῶν διχοτομιῶν, ἴσον ἐστὶν τῇ τε δις ὑπὸ AAE καὶ τῇ δις ἀπὸ AB , τὸ δὲ δις ἀπὸ AB ἴσον ἐστὶν τῇ τε δις ὑπὸ AEI καὶ τῇ δις ἀπὸ EB τετραγώνῳ.

- 266 ζ'. Ἰση ἡ AB τῇ GA , καὶ σημείον τὸ E · ὅτι τὰ ἀπὸ τῶν $AE EA$ τετράγωνα ἴσα τοῖς ἀπὸ τῶν $BE EI$ τετραγώνοις καὶ τῇ δις ὑπὸ τῶν AAE .

Τετμήσθω δὲ BA ἡ BI κατὰ τὸ Z . ἐπεὶ οὖν τὸ δις ἀπὸ τῆς $ΔZ$ ἴσον ἐστὶν τῇ τε δις ὑπὸ AGA καὶ δις ἀπὸ $I'Z$, κοινοῦ προστεθέντος τοῦ δις ἀπὸ EZ ἴσον ἐστὶν τὸ 10 τε δις ὑπὸ AGA καὶ τὰ δις ἀπὸ τῶν $I'Z ZE$ τοῖς δις ἀπὸ τῶν $AZ ZE$ τετραγώνοις. ἀλλὰ τοῖς μὲν δις ἀπὸ τῶν $AZ ZE$ ἴσα ἐστὶν τὰ ἀπὸ τῶν $AE EA$ τετράγωνα, τοῖς δὲ δις ἀπὸ τῶν $I'Z ZE$ ἴσα ἐστὶν τὰ ἀπὸ τῶν $BE EI$ τετράγωνα· τὰ ἄρα ἀπὸ τῶν $AE EA$ τετράγωνα ἴσα ἐστὶν τοῖς 15 τε ἀπὸ τῶν $BE EI$ τετραγώνοις καὶ τῇ δις ὑπὸ τῶν AAE .

- 267 η'. Ἐστω τὸ ὑπὸ BAG μετὰ τοῦ ἀπὸ GA ἴσον τῇ ἀπὸ AA · ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ GA τῇ AB .

Κοινὸν γὰρ ἀφηρήσθω τὸ ἀπὸ GA · λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ BAG ἴσον ἐστὶν τῇ τῶν ἀπὸ $AA ΔI$ ὑπεροχῇ, τουτέστιν τοῖς ὑπὸ 20 τῶν $ΔAG AGA$. ἐπεὶ δὲ τὸ ὑπὸ BAG ἴσον ἐστὶν τῇ ὑπὸ $ΔAG$ καὶ τῇ ὑπὸ $BA AG$, κοινὸν ἀφηρήσθω τὸ ὑπὸ $ΔAG$ · λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ $AG AB$ ἴσον ἐστὶν τῇ ὑπὸ AGA · ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ AG τῇ AB , ὅπερ· ~

- 268 θ'. Ἐστω τὸ ὑπὸ AGB μετὰ τοῦ ἀπὸ GA ἴσον τῇ 25 ἀπὸ AB τετραγώνῳ· ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ AG τῇ AB .

4. $\overline{AB}$ διὰ τῶν BS , $\overline{AB}$ δις ἀπὸ A m. rec. super velustiore scripturam deletam 8. $\overline{AB}$ τὸ δὲ B , $\overline{AB}$ τῶν (sine δὲ) A , $\overline{AB}$ τὸ δὲ S

4. τετραγώνῳ erasum in A

5. ζ' add. BS

8. $\delta\epsilon\lambda\gamma\alpha$ ἡ BI Ha

auctore Co , ἡ B A , ἡ $\beta\epsilon$ S

9. AZ add. Ha auctore Co

ante δις ἀπὸ $I'Z$ add. Ha

10. κοινοῦ Ha , ἀλλὰ κοινοῦ ABS , κοινοῦ ἄρα coni. Hu

11. τα δις ἀπὸ τῶν EZG AB , τὸ δις ὑπὸ τῶν EZ S , corr. Ha

12. τῶν $\delta\epsilon$ $\zeta\epsilon$ BS , $|||$ A δις add.

Ha auctore Co , item vs. 13

13. $\delta\epsilon$ BS , $\overline{IE}$ A

14. τῶν $\beta\epsilon$ $\epsilon\gamma$ τετράγωνα BS , $|||$ $|||$ τετραγώνῳ A

15. 16. ἀπὸ τῶν BS , $|||$ $|||$ A

17. η' add. BS

19. ἀφαιρέσθω ABS , corr. Ha τὸ ἀπὸ S , τοῦ

Κείσθω τῇ ΓΔ ἴση ἡ ΑΕ· τὸ ἄρα ἐπὶ ΓΒΕ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΑΕ, τουτέστιν τοῦ ἀπὸ ΓΑ, ἴσον τῷ ἀπὸ ΑΒ, τουτέστιν τῷ ἐπὶ ΑΓΒ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓΑ, ὥστε τὸ ἐπὶ ΓΒΕ ἴσον ἐστὶν τῷ ἐπὶ ΑΓΒ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΓ τῇ ΕΒ. ἀλλὰ καὶ ἡ ΓΑ τῇ ΑΕ· ὅλη ἄρα ἡ ΑΑ ὅλη τῇ ΑΒ ἴση ἐστίν.

- 269 ι'. Ἐστω πάλιν τὸ ἐπὶ ΒΑΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΑΒ ἴσον τῷ ἀπὸ ΑΑ· ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΓΑ τῇ ΑΒ.

Κείσθω τῇ ΑΒ ἴση ἡ ΑΕ. ἐπεὶ οὖν τὸ ἐπὶ ΒΑΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΑΒ, τουτέστιν τοῦ ἀπὸ ΕΑ, ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΑΑ τετραγώνῳ, κοινὸν ἀφγρήσθω τὸ ἐπὶ ΑΑΓ· λοιπὸν ἄρα τὸ ἐπὶ ΒΑ ΑΓ, τουτέστιν τὸ ἐπὶ ΕΑΓ, μετὰ τοῦ ἀπὸ ΕΑ, ὃ ἐστὶν τὸ ἐπὶ ΓΕΑ, ἴσον ἐστὶν τῷ ἐπὶ ΑΑΓ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΑ, τουτέστιν ἡ ΒΑ, τῇ ΑΓ.

- 270 ια'. Εὐθεῖα ἡ ΑΒ, ἑφ' ἧς γ' σημεία τὰ Γ Δ Ε οὕτως, ὥστε ἴσην μὲν εἶναι τὴν ΒΕ τῇ ΕΓ, τὸ δὲ ἐπὶ ΑΕΑ τῷ ἀπὸ ΕΓ· ὅτι γίνεται ὡς ἡ ΒΑ πρὸς ΑΓ, οὕτως ἡ ΒΓ πρὸς ΑΓ.

Ἐπεὶ γὰρ τὸ ἐπὶ
α ————— γ — δ — ε — ς ΑΕΑ ἴσον ἐστὶν τῷ
ἀπὸ ΕΓ, ἀνάλογον

καὶ ἀναστρέψαντι καὶ δις τὰ ἡγούμενα καὶ διελόντι ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ ΒΑ πρὸς τὴν ΑΓ, οὕτως ἡ ΒΓ πρὸς ΑΓ.

- 271 ιβ'. Ἐστω πάλιν τὸ ἐπὶ ΒΓΑ ἴσον τῷ ἀπὸ ΓΕ, ἴση δὲ ἡ ΑΓ τῇ ΓΕ· ὅτι τὸ ἐπὶ ΑΒΕ ἴσον ἐστὶν τῷ ἐπὶ ΓΒΑ. Ἐπεὶ γὰρ τὸ ἐπὶ ΒΓΑ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΓΕ, ἀνάλογόν ἐστιν ὡς ἡ ΒΓ πρὸς ΓΕ, τουτέστιν πρὸς τὴν ΓΑ, οὕτως ἡ ΓΕ, τουτέστιν ἡ ΑΓ, πρὸς τὴν ΓΑ· καὶ ὅλη πρὸς

2. τοῦ Ha auctore Co pro τὸ 3. ἐπὶ ΑΓΒ idem pro ἐπὶ ΕΑΓ
et vs. 4 pro ἐπὶ ΗΓΑ 5. τῇ ΑΕ idem pro τῇ ΓΕ 6. ι' add.
BS 9. post τοῦ ἀπὸ ΑΒ add. ἴσον ἐστὶν Α(BS), del. Co τοῦ
(ante ἀπὸ ΕΑ Ha auctore Co pro τὸ 10. ἀφγρήσθω ABS, corr.
Ha 11. ια' add. BS Γ Α, τρεῖς BS τὰ ΓΑΕ Α, distinx. BS
13. ἐπὶ ΑΕΑ Ha auctore Co pro ἀπὸ ΑΕ 23. ιβ' add. BS
24. ΑΒΕ ἴσον ἐστὶν τῷ ἐπὶ add. Ha auctore Co ΓΒΑ ΑΒ, ΓΒΑ
ΑΓ, 138 S

$\alpha \quad \gamma \quad \delta \quad \epsilon \quad \beta$
Ponatur $\delta\epsilon = \gamma\delta$; ergo
propter elem. 2. 6^o est

$$\gamma\beta \cdot \beta\epsilon + \delta\epsilon^2 = \delta\beta^2, \text{ id est ex constructione et hypothesisi}$$

$$\gamma\beta \cdot \beta\epsilon + \gamma\delta^2 = \alpha\gamma \cdot \gamma\beta + \gamma\delta^2, \text{ ita ut sit}$$

$$\gamma\beta \cdot \beta\epsilon = \alpha\gamma \cdot \gamma\beta, \text{ itaque } \alpha\gamma = \epsilon\beta.$$

Sed etiam $\gamma\delta = \delta\epsilon$; ergo tota $\alpha\delta$ toti $\delta\beta$ aequalis est.

IX. Sit rursus $\beta\alpha \cdot \alpha\gamma + \delta\beta^2 = \alpha\delta^2$; dico esse $\gamma\delta = \delta\beta$. Prop. 199

Ponatur $\epsilon\alpha = \delta\beta$.

$\epsilon \quad \alpha \quad \gamma \quad \delta \quad \beta$
Quoniam ex hypothesisi
et constructione est

$$\beta\alpha \cdot \alpha\gamma + \epsilon\alpha^2 = \alpha\delta^2, \text{ commune auferatur } \delta\alpha \cdot \alpha\gamma; \text{ re-}$$

stat igitur

$$\beta\delta \cdot \alpha\gamma + \epsilon\alpha^2 = \alpha\delta \cdot \delta\gamma, \text{ id est}$$

$$\epsilon\alpha \cdot \alpha\gamma + \epsilon\alpha^2 = \alpha\delta \cdot \delta\gamma, \text{ sive, quia } \epsilon\alpha \cdot \alpha\gamma + \epsilon\alpha^2 =$$

$\gamma\epsilon \cdot \epsilon\alpha,$

$$\gamma\epsilon \cdot \epsilon\alpha = \alpha\delta \cdot \delta\gamma, \text{ id est per proportionem } ^1)$$

$$\epsilon\gamma : \delta\gamma = \delta\alpha : \epsilon\alpha, \text{ et componendo}$$

$$\epsilon\delta : \delta\gamma = \epsilon\delta : \epsilon\alpha; \text{ ergo est } \gamma\delta = \epsilon\alpha, \text{ id est } = \delta\beta.$$

X. Sit recta $\alpha\beta$, in qua tria puncta $\gamma \delta \epsilon$, ita ut sit Prop. 200
 $\beta\epsilon = \epsilon\gamma$, et $\alpha\epsilon \cdot \epsilon\delta = \epsilon\gamma^2$, dico esse $\beta\alpha : \alpha\gamma = \beta\delta : \delta\gamma$.

Quoniam enim est

$$\alpha\epsilon \cdot \epsilon\delta = \epsilon\gamma^2, \text{ per proportionem est}$$

$$\alpha\epsilon : \epsilon\gamma = \epsilon\gamma : \epsilon\delta, \text{ et convertendo}$$

$$\alpha\epsilon : \alpha\gamma = \epsilon\gamma : \gamma\delta, \text{ et antecedentibus his sumptis (scilicet } 2\alpha\epsilon = \alpha\epsilon + \alpha\gamma + \gamma\epsilon = \alpha\beta + \alpha\gamma)$$

$$\alpha\beta + \alpha\gamma : \alpha\gamma = \gamma\beta : \gamma\delta, \text{ et dirimendo}$$

$$\beta\alpha : \alpha\gamma = \beta\delta : \delta\gamma.$$

XI. Sit rursus $\beta\gamma \cdot \gamma\delta = \gamma\epsilon^2$, et $\alpha\gamma = \gamma\epsilon$; dico esse Prop. 201
 $\alpha\beta \cdot \beta\epsilon = \gamma\beta \cdot \beta\delta$.

Quoniam enim est

$\alpha \quad \gamma \quad \delta \quad \epsilon \quad \beta$
 $\beta\gamma \cdot \gamma\delta = \gamma\epsilon^2$, per pro-
portionem est

$$\beta\gamma : \gamma\epsilon = \gamma\epsilon : \gamma\delta, \text{ id est}$$

$$\beta\gamma : \gamma\alpha = \alpha\gamma : \gamma\delta, \text{ et, propter elem. 2. 19 "si sit tota ad totam" cet., componendo}$$

† Haec et proxima addita sunt secundum Co.

ἄλλην καὶ ἀναστρέψαντι καὶ χωρίον χωρίῳ τὸ ἄρα ἐπὶ ABE ἴσον ἐστὶν τῷ ἐπὶ GBA .

Φανερόν δὲ ὅτι καὶ τὸ ἐπὶ ABE ἴσον ἐστὶ τῷ ἐπὶ BAG . ἐὰν γὰρ ἀφαιρεθῇ τὸ ἀπὸ GA κοινὸν ἀπὸ τῆς τοῦ ἀπὸ GE πρὸς τὸ ἐπὶ BGA ἰσότητος, γίνεται: ~

- 272 ιγ'. Εἰς δύο παραλλήλους τὰς $AB GA$ διὰ τε τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ E τρεῖς διήχθωσαν αἱ $AE A BEI' ZEN$. ὅτι ἐστὶν ὡς τὸ ἐπὶ AEB πρὸς τὸ ἐπὶ AZB , οὕτως τὸ ἐπὶ GEA πρὸς τὸ ἐπὶ $GH A$.

Διὰ τοῦ συνημμένου φανερόν· ὡς μὲν γὰρ ἡ AE πρὸς τὴν EA , οὕτως ἡ AZ πρὸς τὴν HA , ὡς δὲ ἡ BE πρὸς τὴν EG , οὕτως ἡ ZB πρὸς τὴν HI , καὶ σύγκειται ἐκ τούτων τὰ χωρία· γίνεται ἄρα: ~

Ἔστιν δὲ καὶ οὕτως μὴ προσχρησάμενον τῷ συνημμένῳ. ἐπεὶ γὰρ ἐστὶν ὡς ἡ AE πρὸς τὴν EB , οὕτως ἡ EA πρὸς τὴν EG , καὶ ὡς ἄρα τὸ ἐπὶ AEB πρὸς τὸ ἀπὸ EB , οὕτως τὸ ἐπὶ AEG πρὸς τὸ ἀπὸ EG . ἀλλὰ καὶ ὡς τὸ ἀπὸ BE πρὸς τὸ ἀπὸ BZ , οὕτως τὸ ἀπὸ EI' πρὸς τὸ ἀπὸ GH . δι' ἴσου ἄρα ἐστὶν ὡς τὸ ἐπὶ AEB πρὸς τὸ ἀπὸ ZB , οὕτως τὸ ἐπὶ GEA πρὸς τὸ ἀπὸ GH . ἀλλὰ καὶ ὡς τὸ ἀπὸ ZB πρὸς τὸ ἐπὶ BZA , οὕτως τὸ ἀπὸ GH πρὸς τὸ ἐπὶ $GH A$. δι' ἴσου ἄρα ἐστὶν ὡς τὸ ἐπὶ AEB πρὸς τὸ ἐπὶ AZB , οὕτως τὸ ἐπὶ GEA πρὸς τὸ ἐπὶ $GH A$.

Τοῦ ε'.

- 273 α'. Τρίγωνον τὸ ABG , καὶ κάθετος ἤχθω ἡ AA . λέγω 25 ὅτι, εἰ μὲν ἴσον ἐστὶν τὸ ἐπὶ BAG τῷ ἀπὸ AA τετραγώνῳ, γίνεται ὁρθὴ ἡ A γωνία, εἰ δὲ μεῖζον, ἀμβλεία, εἰ δὲ ἔλασσον, ὀξεία.

Ἔστω πρότερον ἴσον· ἀνάλογον ἄρα καὶ περὶ ἴσας γω-


1. ἐπὶ ABE Ha auctore Co pro ἐπὶ AEB 3. ἐστι extremo
versu A(BS) 4. ἀπὸ GA Ha auctore Co pro ἀπὸ AA 5. πρὸς
τὸ ἐπὶ $γβδ$ S γίνεται τὰ λοιπὰ ἴσα Ha auctore Co 6. ιγ' add.
BS 7. αἱ BS, ἡ A 13. γίνεται ἄρα Hu, μὲν ἡ ἄρα ABS, constat
igitur propositum Co. ἀνάλογον ἄρα ἐστὶ Ha 14. post οὕτως add.

$\beta\alpha : \alpha\gamma = \alpha\delta : \delta\gamma$, et per subtractionem proportionis
 $\beta\delta : \delta\epsilon = \beta\alpha : \alpha\gamma$, et convertendo
 $\beta\delta : \epsilon\beta = \beta\alpha : \beta\gamma$, itaque rectangulum rectangulo aequale, scilicet

$$\alpha\beta \cdot \beta\epsilon = \gamma\beta \cdot \beta\delta.$$

Apparet etiam esse $\alpha\delta \cdot \delta\epsilon = \beta\delta \cdot \delta\gamma$; nam si ab aequatione $\gamma\epsilon^2 = \beta\gamma \cdot \gamma\delta$ commune $\gamma\delta^2$ auferatur, restat propter elem. 2. 5 et 2. 3 $\alpha\delta \cdot \delta\epsilon = \beta\delta \cdot \delta\gamma$.

XII. In duas parallelas $\alpha\beta$ $\gamma\delta$ per idem punctum ϵ tres Prop. 202
 ducantur rectae $\alpha\epsilon\delta$ $\beta\epsilon\gamma$ $\zeta\epsilon\eta$; dico esse $\alpha\epsilon \cdot \epsilon\beta : \alpha\zeta \cdot \zeta\beta = \gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta : \gamma\eta \cdot \eta\delta$.



Per formulam compositae proportionis manifestum est. Est enim $\frac{\alpha\epsilon}{\epsilon\delta} = \frac{\alpha\zeta}{\eta\delta}$, et $\frac{\beta\epsilon}{\epsilon\gamma} = \frac{\zeta\beta}{\eta\gamma}$, unde componuntur rectangulorum proportionibus $\frac{\alpha\epsilon \cdot \epsilon\beta}{\alpha\zeta \cdot \zeta\beta} = \frac{\gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta}{\gamma\eta \cdot \eta\delta}$; fit igitur propositum.

Potest autem sic etiam demonstrari, non adhibita formula compositae proportionis. Quoniam enim $\alpha\epsilon : \epsilon\beta = \delta\epsilon : \epsilon\gamma$, est igitur $\alpha\epsilon \cdot \epsilon\beta : \epsilon\beta^2 = \delta\epsilon \cdot \epsilon\gamma : \epsilon\gamma^2$. Sed est etiam $\epsilon\beta^2 : \beta\zeta^2 = \epsilon\gamma^2 : \gamma\eta^2$; ex aequali igitur est $\alpha\epsilon \cdot \epsilon\beta : \beta\zeta^2 = \delta\epsilon \cdot \epsilon\gamma : \gamma\eta^2$. Sed est etiam $\beta\zeta^2 : \beta\zeta \cdot \zeta\alpha = \gamma\eta^2 : \gamma\eta \cdot \eta\delta$; ex aequali igitur est $\alpha\epsilon \cdot \epsilon\beta : \alpha\zeta \cdot \zeta\beta = \gamma\epsilon \cdot \epsilon\delta : \gamma\eta \cdot \eta\delta$.

LEMMATA IN CONICORUM LIBRUM V.


I. Sit triangulum $\alpha\beta\gamma$, et ducatur perpendicularis $\alpha\delta$: Prop. 203
 dico, si sit $\beta\delta \cdot \delta\gamma = \alpha\delta^2$, angulum α rectum esse, si autem
 sit $\beta\delta \cdot \delta\gamma > \alpha\delta^2$, obtusum, denique si $\beta\delta \cdot \delta\gamma < \alpha\delta^2$, acutum.

Sit primum $\beta\delta \cdot \delta\gamma = \alpha\delta^2$; ergo est $\beta\delta : \delta\alpha = \alpha\delta : \delta\gamma$,

ἀποδείξαι Ha auctore Co 15. οὕτως ἡ ΔΕ et 17. ὡς τὸ ἀπὸ ΕΒ Ha
 auctore Co 22. ὑπὸ ΓΗΑ idem pro ὑπὸ ΓΗΑ 24. Τοῦ πέμπτον
 τῶν χωνικῶν BS 25. α' add. BS 27. εἰ δὲ (post ἀμβλεία) BS,
 ἡδὲ Α 29. ἴσον Ha auctore Co pro ἴση

νίας· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ A γωνία τῇ πρὸς τῷ A , ὥστε ὁρθή
 ἐστὶν ἡ πρὸς τῷ A γωνία· ἀλλὰ ἐστὶν μείζων, καὶ αὐτῷ
 ἴσον κείσθω τὸ ἀπὸ AE , καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ BE EG .
 ἔσται ἄρα ὁρθή ἡ ὑπὸ BEF γωνία· καὶ αὐτῆς μείζων ἡ
 A γωνία· ἀμβλεία ἄρα ἐστὶν ἡ A γωνία· ἀλλὰ ἐστὶν πλά-
 λιν ἑλάσσων, καὶ αὐτῷ ἴσον κείσθω τὸ ἀπὸ AZ , καὶ ἐπε-
 ζεύχθωσαν αἱ BZ ZG . ἔσται δὲ ὁρθή ἡ ὑπὸ BZG γωνία.
 καὶ αὐτῆς ἐλάσσων ἡ πρὸς τῷ A γωνία· ὀξεῖα ἄρα ἐστὶν
 ἡ A γωνία.


- 271 γ. Θέσει οὖσων δύο εὐθειῶν τῶν AB $BΓ$, καὶ ση-
 μείου δοθέντος τοῦ A , γράψαι διὰ τοῦ A ὑπερβολὴν περὶ
 ἀσμπτώτους τὰς AB $BΓ$.



Γεγονέτω· κέντρον ἄρα αὐτῆς ἐστὶν τὸ B . ἐπεζεύχθω
 οὖν ἡ AB καὶ ἐκτελλήσθω, διάμετρος ἄρα ἐστίν. κείσθω
 τῇ AB ἴση ἡ BE . δοθεῖσα ἄρα ἐστίν, ὥστε δοθέν ἐστὶν¹⁵
 τὸ E καὶ πέρας τῆς διαμέτρου. ἤχθω ἀπὸ τοῦ A ἐπὶ τὴν

2. μείζων AB , corr. S 3. ἴση A , corr. BS αὐτὴν BE BS , αὐτὴν
 $BE \parallel A$ 6. ἐλάσσων AB , ἐλάσσων S , corr. in Paris. 2868 secunda
 manus 8. ἐλάσσων A , corr. BS πρὸς τὸ A AB , corr. S 10. β'
 add. BS post οὖσων add. πρὸς ὁρθάς Ha 'rectius forsitan post AB
 $BΓ$ addantur πρὸς ὁρθάς ἀλλήλους; et conf. adnot. ad Latina' 15. Jo-
 nen ante ἄρα; $A(BS)$, corr. Ha 'δοθέν ἄρα ἐστὶν τὸ B Co .

suntque haec latera proportionalia circa aequales angulos, ideoque similia sunt triangula $\beta\delta\alpha$ $\alpha\delta\gamma$; ergo etiam triangula $\alpha\beta\delta$



$\gamma\beta\alpha$ similia. et angulo $\beta\delta\alpha$ aequalis angulus $\beta\alpha\gamma$, itaque rectus est.

Sed sit $\beta\delta \cdot \delta\gamma > \alpha\delta^2$, et ponatur $\delta\epsilon^2 = \beta\delta \cdot \delta\gamma$, iunganturque $\beta\epsilon$ $\epsilon\gamma$; erit igitur propter praecedens angulus $\beta\epsilon\gamma$ rectus. Estque angulo $\beta\epsilon\gamma$ maior angulus $\beta\alpha\gamma$, itaque obtusus.

Sed rursus sit $\beta\delta \cdot \delta\gamma < \alpha\delta^2$, et ponatur $\delta\zeta^2 = \beta\delta \cdot \delta\gamma$, iunganturque $\beta\zeta$ $\zeta\gamma$; erit igitur angulus $\beta\zeta\gamma$ rectus. Estque angulo $\beta\zeta\gamma$ minor angulus $\beta\alpha\gamma$, itaque acutus.

II. Duabus rectis $\alpha\beta$ $\beta\gamma$ invicem perpendicularibus¹⁾ positione datis, datoque puncto δ , describatur per δ hyperbola circa²⁾ asymptotos $\alpha\beta$ $\beta\gamma$. Prop. 204

Factum iam sit: centrum igitur hyperbolae erit β . Iam iungatur $\delta\beta$ producatique; haec igitur diametrus est. Ponatur $\beta\epsilon = \delta\beta$; ergo data est $\beta\epsilon$, itaque datum punctum ϵ , id est diametri terminus. Ducatur a δ rectae $\beta\gamma$ perpendicular-

1) Verba *invicem perpendicularibus* Halleio auctore addita sunt, quoniam ea quae sequitur problematis resolutio hunc unum casum respicit. Sed tamen Apollonius conic. 4 propos. 53, postquam eundem casum demonstravit, alterum: *μη ἔστιν δὲ ἡ διδομένη γωνία ὀρθή* cet. statim subiungit, atque idem libro 2 propos. 4, neque aliter scriptor problematis quod supra IV propos. 33 legitur, generaliter duas rectas quemvis angulum continentibus datas esse supponunt. Ergo vix statui posse videtur integrum problematis contextum in hac Pappi collectione exstare, sed perisise alteram demonstrationis partem, quae de angulo non recto egerit, veri est simillimum.

2) Conf. supra IV propos. 34 adnot. 2.

ris $\delta\zeta$; datum igitur est punctum ζ^*). Et ponatur $\zeta\gamma = \beta\zeta$; ergo etiam γ datum est. Et iuncta $\gamma\delta$ producatur ad α ; positione igitur data est $\alpha\gamma$. Sed etiam $\alpha\beta$ positione data; datum igitur est α (dal. 25). Sed etiam γ datum est; ergo etiam magnitudine recta $\alpha\gamma$ data est. Et quia est $\beta\zeta = \zeta\gamma$ (et parallelae $\alpha\beta$ $\delta\zeta$), erit etiam $\alpha\delta = \delta\gamma$. Iam sit $\delta\eta$ rectum latus (sive parametrum) figurae quae est ad diametrum $\delta\epsilon^{**}$; est igitur

$$\begin{aligned}\alpha\delta^2 &= \delta\gamma^2 = \frac{1}{4} \epsilon\delta \cdot \delta\eta \text{ conic. 2. 3 : sed etiam} \\ &= \frac{1}{4} \alpha\gamma^2; \text{ est igitur} \\ \epsilon\delta \cdot \delta\eta &= \alpha\gamma^2.\end{aligned}$$

Et datum est $\alpha\gamma^2$; ergo etiam $\epsilon\delta \cdot \delta\eta$ datum. Et data est $\epsilon\delta$; ergo etiam $\eta\delta$ data, itaque etiam punctum η . Iam quia (ut est in conic. I propos. 53) duae rectae $\epsilon\delta$ $\delta\eta$ in eodem plano ad rectos invicem angulos constructae positione datae sunt, et per datum punctum δ sub angulo $\alpha\delta\beta$ fit hyperbola, cuius diametrum est $\epsilon\delta$ et vertex δ , reclarum autem sub dato angulo $\alpha\delta\beta$ ordinatim applicatarum quadrata aequalia sunt spatiis rectae $\delta\eta$ adjacentibus, quae quidem spatia latitudines habent eas quas ipsae abscindunt in producta diametro ad punctum δ , excedunt vero figuris similibus figurae $\epsilon\delta\eta$, positione igitur data est sectio conica.

* Nam propter Euclidis datorum propos. 28 positione data est $\delta\zeta$, et propter propos. 32 magnitudine data est $\beta\zeta$, ideoque punctum ζ .

** Et haec verba et ea quae paulo post leguntur illustrantur Apollonii conicarum theorematibus. Conf. p. 284 adnot. * ad IV propos. 33.

δ' add. Co, τὸ τέταρτον Ha 8. 9. ἀλλὰ καὶ — ὑπὸ $\epsilon\delta\eta$ om. A¹,
add. A²(BS) 11. ἔστι A¹BS 12. ὥστε Ha, καὶ ἔστι Co pro ἔστω
13. εὐθείας ἐκινέσθω ABS, corr. Co 14. τοῦ δ add. Co ὑπὸ τῆς
 $\alpha\alpha\beta$ γωνίας Ha pro τῆς ὑπὸ $\alpha\alpha\beta$ γωνίας 16. καταγράφεται delet et
vs. 17. δύνανται conī, Hu 17. τὴν $\delta\eta$ Ha auctore Co pro τὴν $\alpha\alpha$
18. α add. Ha auctore Co αὐταὶ (sine spir. et acc.) A, αὐταὶ BS,
ταυταὶ Ha, corr. Co 18. 19. τῇ διαμέτρῳ Hu pro τῆς διαμέτρῳ
19. ὑπὸ A¹ Co, ἀπὸ BS cod. Co

275 Συντεθήσεται δὲ τὸ πρόβλημα οὕτως· ἔστωσαν αἱ τῇ
 θέσει δύο εὐθεῖαι αἱ AB BI , τὸ δὲ δοθὲν τὸ $\mathcal{A}$, καὶ ἐπι-
 ζευχθεῖσα ἡ AB ἐκτελλήσθω ἐπὶ τὸ E , καὶ αὐτῇ ἴση κεί-
 σθω ἡ BE , καὶ ἡχθω κάθετος ἡ AZ , καὶ τῇ BZ ἴση κεί-
 σθω ἡ ZI , καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ $I\mathcal{A}$ ἐκτελλήσθω ἐπὶ τὸ A ,⁵
 καὶ τῇ AE προσανήχθω ἡ AH , καὶ τῷ ἀπὸ AI ἴσον κεί-
 σθω τὸ ὑπὸ $E\mathcal{A}H$, καὶ γεγράφθω, ὥς ἐν τῇ ἀναλύσει ἐλέ-
 γομεν, περὶ διάμετρον JE ὑπερβολῇ· λέγω ὅτι ποιεῖ τὸ
 πρόβλημα.

Ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ BZ τῇ ZI , ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ¹⁰
 ἡ $A\mathcal{A}$ τῇ AI · ἐκάτερον ἄρα τῶν ἀπὸ $A\mathcal{A}$ AI δ' ἐστὶν
 τοῦ ἀπὸ τῆς AI τετραγώνου, τουτέστιν τοῦ ὑπὸ $E\mathcal{A}H$,
 τουτέστιν τοῦ πρὸς τῇ EA διαμέτρῳ εἶδους. ἔαν δὲ ἡ
 τοῦτο, δέδωκεται ἐν τῷ δευτέρῳ, ὅτι ἀσύμπτωτοί εἰσιν αἱ
 AB BI τῆς ὑπερβολῆς.¹⁵

276 γ'. Θέσει εὐθεῖα ἡ AB , καὶ δοθὲν τὸ I . διήχθω ἡ
 BI , κείσθω δοθεῖσα ἡ BI , ὁρθῇ ἀνήχθω ἡ AE · ὅτι
 τὸ E ἄπτεται [θέσει κώνου τομῆς] ὑπερβολῆς ἐρχομένης
 διὰ τοῦ I .


Ἦχθω κάθετος ἡ IZ , καὶ τῇ BA ἴση κείσθω ἡ ZA ·²⁰
 δοθὲν ἄρα ἐστὶν τὸ A . ἀνήχθω ὁρθῇ ἡ AH · θέσει ἄρα
 ἐστὶν ἡ AH συμπίπτουσα τῇ BI ἐκβληθείσῃ κατὰ τὸ H ·
 καὶ θέσει δοθεῖσων τῶν BA AH καὶ σημείου δοθέντος
 τοῦ I ὑπερβολῇ περὶ ἀσύμπτωτους τὰς HA AB ἐλευσε-
 ται ἄρα καὶ διὰ τοῦ E , διὰ τὸ ἴσην εἶναι τὴν BI τῇ EH ²⁵

2. αἱ om. A, add BS ἐπιζευχθεῖσα Hu auctore (u et collato
 Apollonio con. 3, 4 pro ἐπεζεύχθω, item vs. 3 3. ἡ BA καὶ ἐκτε-
 λλήσθω Ha 7. καὶ post γεγράφθω repetunt ABS, del. Ha ἐλέ-
 γομεν Hu pro λέγομεν 11. ἐκάτερον Hu pro ἐκατέρα δ' Hu, δυ-
 νάμει $\overline{A,BS}$, δυνάμει τὸ τέταρτον Ha 12. τουτέστιν] καὶ ἔστι Ha
 τοῦ (ante ὑπὸ $E\mathcal{A}H$) Hu pro τῶν 13. διαμέτρῳ εἶδει ABS, corr.
 Co ἔαν δὲ ἡ] ἡ ὥς δυνάμει S 16. γ' add. BS καὶ δοθὲν τὸ I
 Ha pro δοθεῖσα τὸ I 17. καὶ ante κείσθω et δὲ ante ἀνήχθω add.
 Ha 18. θέσει κώνου τομῆς om. in Latina versione Ha 20. καὶ —
 ἡ ZA add. Co 21. τὸ A Co pro τὸ $\mathcal{A}$ 22. verba συμπίπτουσα
 — κατὰ τὸ H suo loco posita fuerint post ὁρθῇ ἡ AH ; sed ab ipso

Componetur problema, *similiter atque in conic. II propos. 4 demonstratur*, hoc modo: Sint duae rectae positione datae $\alpha\beta$ $\beta\gamma$, datumque punctum δ , et iuncta $\delta\beta$ producat ad ϵ , ita ut sit $\beta\epsilon = \delta\beta$, et ducatur perpendicularis $\delta\zeta$, ac rectae $\beta\zeta$ aequalis ponatur $\zeta\gamma$, et iuncta $\gamma\delta$ producat ad α , et rectae $\delta\epsilon$ aptetur $\delta\eta$ ita, ut sit $\epsilon\delta \cdot \delta\eta = \alpha\gamma^2$, et diametro $\delta\epsilon$ hyperbola, sicut in analysi diximus, describatur; dico hunc lineam problema efficere.

Quoniam est $\beta\zeta = \zeta\gamma$, est etiam $\alpha\delta = \delta\gamma$; ergo et $\alpha\delta^2$ et $\delta\gamma^2$ aequale est quartae parti quadrati ex $\alpha\gamma$, id est rectanguli sub $\epsilon\delta$ $\delta\eta$, id est ipsius figurae ad diametrum $\epsilon\delta$. Hoc autem si ita sit, demonstratum est in conicorum libri II *propos. 1 et 2* rectas $\alpha\beta$ $\beta\gamma$ asymptotos hyperbolae esse.

III. Sit recta $\alpha\beta$ positione data, et datum punctum γ . Prop. 205
Ducatur ad quodvis rectae $\alpha\beta$ punctum β recta $\gamma\beta$, et fiat $\beta\delta$ aequalis cuidam rectae magnitudine datae, et rectae $\beta\delta$ perpendicularis ducatur $\delta\epsilon$, quae productam $\beta\gamma$ secet in ϵ ; dico punctum ϵ tangere hyperbolam per punctum γ transeuntem.



Ducatur perpendicularis $\gamma\zeta$, rectaeque $\beta\delta$ aequalis ponatur $\zeta\alpha$; datum igitur est punctum $\alpha^*)$. Erigatur perpendicularis $\alpha\eta$, quae productam $\beta\epsilon$ secet in η ; ergo positione data est $\alpha\eta$ (*dat. 29*); itaque datis posi-

tionem rectis $\beta\alpha$ $\alpha\eta$ datoque puncto γ hyperbola per γ circa asymptotos $\eta\alpha$ $\alpha\beta$ descripta transibit etiam per punctum ϵ , quia est $\beta\gamma = \epsilon\eta$ (est enim $\beta\delta = \zeta\alpha$, ideoque $\beta\epsilon = \gamma\eta$, unde communis

*) Nam propter Euclid. *dat. 30* positione data est $\gamma\zeta$, et propter 25 datum punctum ζ , ideoque propter 27 datum est α .

(ἐπεὶ καὶ ὅλη ἡ ΒΕ τῇ ΗΓ'. καὶ ἔσται διὰ τὸ προγεγραμ-
μένον.

Συντεθήσεται δὲ οὕτως· ἔστω ἡ μὲν τῇ θέσει δεδο-
μένη εὐθεῖα ἡ ΑΒ, τὸ δὲ δοθὲν τὸ Γ', ἡ δὲ διηγμένη ἡ
ΒΓ', ἡ δὲ δοθεῖσα ἡ Θ, καὶ αὐτῇ ἴση ἔστω, καθέτου ἀχ-
θείσης τῆς ΓΖ, ἡ ΖΑ, καὶ ὀρθῇ ἀνήχθω ἡ ΑΗ καὶ συμ-
πιπτεύω τῇ ΒΓ κατὰ τὸ Η, καὶ περὶ ἀσυμπίπτουσας τὰς
ΗΑ ΑΒ διὰ δοθέντος τοῦ Γ' γεγράφθω ὑπερβολή· λέγω
ὅτι ποιεῖ τὸ πρόβλημα, τουτέστιν ὅτι, ἂν καθέτος ἀχθῇ
ἡ ΕΔ, ἴση γίνεται ἡ ΒΔ τῇ Θ. τοῦτο δὲ φανερόν διὰ τὰς
ἀσυμπίπτουσας· ἴση γὰρ ἡ ΕΗ τῇ ΓΒ, ὥστε καὶ ἡ ΑΔ τῇ
ΖΒ· καὶ ὅλη ἄρα ἡ ΑΖ, τουτέστιν ἡ Θ, ἴση ἐστὶν τῇ ΒΔ.

- 277 ζ'. Ἐστω ὥς ἡ ΒΑ πρὸς τὴν ΑΓ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΒΔ
πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΓ· ὅτι τῶν ΒΑ ΑΓ μέση ἀνάλογόν ἐστιν
ἡ ΑΔ.

15

Κείσθω τῇ ΓΔ ἴση ἡ ΔΕ· κατὰ διαιρέσειν ἄρα γίνε-
ται ὥς ἡ ΒΓ' πρὸς τὴν ΓΔ, τουτέστιν ὥς τὸ ὑπὸ ΓΒΕ
πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΓ' ΕΒ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΓΒΕ πρὸς τὸ ἀπὸ
ΕΔ· ἴσον ἄρα ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΑΓ' ΕΒ τῷ ἀπὸ ΔΕ, τουτ-
έστιν τῷ ὑπὸ ΓΔΕ. ἀνάλογον καὶ συνθέντι ἐστὶν ὥς ἡ ΒΔ
πρὸς τὴν ΔΕ, τουτέστιν πρὸς τὴν ΑΓ', οὕτως ἡ ΑΔ πρὸς
ΑΓ· ὅλη ἄρα πρὸς ὅλην ἐστὶν ὥς ἡ ΒΑ πρὸς τὴν ΑΔ,
οὕτως ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΑΓ, ὥστε τῶν ΒΑ ΑΓ μέση ἀνά-
λογόν ἐστὶν ἡ ΑΔ.

- 278 ζ'. Ἐστω τὸ ὑπὸ ΑΒΓ ἴσον τῷ δις ἀπὸ ΑΓ· ὅτι ἴση 25
ἐστὶν ἡ ΑΓ τῇ ΓΒ.

Κείσθω τῇ ΑΓ ἴση ἡ ΑΔ· ἔσται ἄρα τὸ ὑπὸ ΓΑΔ
ἴσον τῷ ἐπὶ ΑΒΓ. καὶ παρὰ τὴν αὐτὴν· ἴση ἄρα ἐστὶν
ἡ ΑΔ, τουτέστιν ἡ ΑΓ, τῇ ΓΒ.

1. ἡ add. Hu BE τῇ ΗΓ add. Ha auctore Co 3. δὲ S, δη Α(Β)
4. ἡ δὲ διηγμένη Ha, ἡ δὲ διάμετρος ABS, καὶ διήχθω Co 6. καὶ
(post ΑΗ) add. Hu 7. τῇ ΗΓ' τῇ ΒΗ ABS, τῇ ΒΓ ἐκβληθείση Ha
8. post δοθέντος repetit ἐντός ABS 9. οἶα (voluit oia) ante ἂν add.
Ha 11. γὰρ add. Ha 13. δ' add. Ha 17. τὴν ΓΑ Ha auctore
Co pro τὴν ΓΔ 18. ὑπὸ ΑΓ ΕΒ Ha auctore Co pro ὑπὸ ΑΓΕ

$\epsilon\gamma$ subtrahenda est). Et fiet demonstratio secundum superius lemma.

Componetur sic. Sit recta positione data $\alpha\beta$, et datum punctum γ , et recta a puncto γ ad quodvis rectae $\alpha\beta$ punctum ducta $\gamma\beta$, et data alia sit ϑ , eique aequalis, ducta $\gamma\zeta$ perpendiculari, sit $\zeta\alpha$, et perpendicularis ducatur $\alpha\eta$ secotque productam $\beta\gamma$ in η , et circa asymptotos $\eta\alpha$ $\alpha\beta$ per punctum datum γ describatur hyperbola; dico hanc efficere problema, id est, si ab altero sectionis puncto ϵ perpendicularis $\epsilon\delta$ ducatur, aequalem fieri rectam $\beta\delta$ datae ϑ . Hoc vero manifestum est propter asymptotos: est enim $\epsilon\gamma = \gamma\beta$, itaque $\alpha\delta = \zeta\beta$; ergo etiam tota $\alpha\zeta = \beta\delta$, id est $\vartheta = \beta\delta$.

IV. Sit $\beta\alpha : \alpha\gamma = \beta\delta^2 : \delta\gamma^2$; dico rectarum $\beta\alpha$ $\alpha\gamma$ mediam proportionalem esse $\alpha\delta$. Prop. 206

Ponatur $\delta\epsilon = \gamma\delta$;
ergo est per diremptionem

$$\beta\alpha - \alpha\gamma : \alpha\gamma = \beta\delta^2 - \delta\gamma^2 : \epsilon\delta^2, \text{ id est (elem 2, 6)}$$

$$\beta\gamma : \alpha\gamma = \gamma\beta \cdot \beta\epsilon : \epsilon\delta^2, \text{ id est}$$

$$\gamma\beta \cdot \beta\epsilon : \alpha\gamma \cdot \beta\epsilon = \gamma\beta \cdot \beta\epsilon : \epsilon\delta^2; \text{ est igitur}$$

$$\alpha\gamma \cdot \beta\epsilon = \epsilon\delta^2, \text{ id est}$$

$$= \epsilon\delta \cdot \delta\gamma. \text{ Per proportionem est}$$

$$\beta\epsilon : \epsilon\delta = \delta\gamma : \alpha\gamma, \text{ et componendo}$$

$$\beta\delta : \epsilon\delta = \alpha\delta : \alpha\gamma, \text{ id est}$$

$$\beta\delta : \delta\gamma = \alpha\delta : \alpha\gamma; \text{ ergo } \beta\delta + \alpha\delta : \delta\gamma + \alpha\gamma, \\ \text{id est}$$

$$\beta\alpha : \alpha\delta = \alpha\delta : \alpha\gamma; \text{ ergo rectarum } \beta\alpha \text{ } \alpha\gamma \text{ media} \\ \text{proportionalis est } \alpha\delta.$$

V. Sit $\alpha\beta \cdot \beta\gamma = 2\alpha\gamma^2$; dico esse $\alpha\gamma = \gamma\beta$. Prop. 207

Ponatur $\delta\alpha = \alpha\gamma$; erit igitur $\gamma\delta \cdot \delta\alpha$
 $\delta \quad \alpha \quad \gamma \quad \beta$ $= \alpha\beta \cdot \beta\gamma$, et, communi addito $\delta\alpha \cdot \beta\gamma$,
 fiet $(\gamma\delta + \beta\gamma) \delta\alpha = (\alpha\beta + \delta\alpha) \beta\gamma$; id
 est $\delta\beta \cdot \delta\alpha = \delta\beta \cdot \beta\gamma$; ergo $\delta\alpha = \beta\gamma$, id est $\alpha\gamma = \gamma\beta$.

20. ἄρα ante ἔστιν add. Ha

23. ἀνάλογος ABS, corr. Ha


24. πρὸς τὴν ΔΕ, τοῦτέστιν om. Ha

25. εἰ add. BS

279 ζ'. Περὶ τὰς αὐτὰς ἀσυμπιπτόνους τὰς AB $BΓ$ ὑπερβολὰς γεγραφθῶσαν αἱ AZ HE · λέγω ὅτι οὐ συμβάλλουσιν ἀλλήλαις.

Εἰ γὰρ δυνατόν, συμπιπτέτωσαν κατὰ τὸ A , καὶ ἀπὸ τοῦ A διήχθω εἰς τομὰς εὐθείαι ἡ $AAEΖΓ$ · ἔσται δὲ διὰ⁵ μὲν τῆς AZ τομῆς ἴση ἡ AA τῇ $ZΓ$, διὰ δὲ τῆς AE τομῆς ἴση ἡ AA τῇ $ΕΓ$, ὥστε ἡ $ΓΖ$ τῇ $ΓΕ$ ἴση ἐστίν, ὅπερ ἀδύνατον· οὐκ ἄρα συμβάλλουσιν αἱ τομαὶ ἀλλήλαις.

Λέγω δὲ ὅτι καὶ εἰς ἄπειρον ἀυξόμεναι ἔγγιον προσ-
αγοῦσιν ἑαυταῖς καὶ αἰεὶ εἰς ἔλαττον ἀφικνοῦνται διάστημα.¹⁰



Ἦχθω γάρ τις καὶ
ἑτέρα ἡ $ΘΚ$, καὶ ἔστω ἡ
διάμετρος . . . ἥς πέρας
ἔστω τὸ M ἔσται
ἄρα ὡς μὲν τὸ ὑπὸ MAN ¹⁵
πρὸς τὸ ἀπὸ AE , οὕτως
ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὀρ-
θίαν, ὡς δὲ τὸ ὑπὸ $HOΠ$
πρὸς τὸ ἀπὸ OP , οὕτως
ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὀρ-²⁰
θίαν· ὥστε ἐστὶν ὡς τὸ
ὑπὸ MAN πρὸς τὸ ἀπὸ
 AE , οὕτως τὸ ὑπὸ $HOΠ$
πρὸς τὸ ἀπὸ OP , καὶ
ἐναλλάξ· μείζων δὲ ἐστὶν²⁵
τὸ ὑπὸ MAN τοῦ ὑπὸ

$HOΠ$ · μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ EZ τῆς $ΘΣ$. καὶ ἔστιν διὰ τὰς
τομὰς ἴσον τὸ ὑπὸ $ZEΔ$ τῷ ὑπὸ $ΣΟΡ$ · ἐλάσσων ἄρα ἐστὶν
ἡ $ΕΔ$ τῆς $ΟΡ$, ὥστε αἰεὶ εἰς ἔλαττον ἀφικνοῦνται διάστημα.

1. ζ' add. BS 2. αἱ AE AZ ABS, corr. Hu 4. post' συμ-
πιπτέτωσαν add. ἀλλήλαις Ha 3. διήχθωσαν εἰς τομὰς εὐθείαι αἱ
 HA AZ $ΕΓ$ ABS, corr. Co 10. αἰεὶ add. Hu εἰς add. Ha auctore
Co 12. ἑτέρα ἡ $ΘNK$ Ha 13. hinc incipit demonstrationis cor-
ruptela, quae usque ad finem pertinet 13. 14. διάμετρος MN , ἥς
πέρας τὸ M . ἔστω καὶ τῆς $ΑΠΖ$ διάμετρος ἡ $ΠH$ · ἔσται cet. Ha
18. ὑπὸ $HOΠ$ Ha pro ὑπὸ $MOΠ$, item vs. 28 et 26. 27 20. τὴν ὀρ-

VI. Circa easdem asymptotos $\alpha\beta$ $\beta\gamma$ hyperbolae $\delta\zeta$ $\eta\epsilon$ *, Prop. 208
describantur; nego has concurrere.



Si enim fieri possit, concurrant in puncto δ , et a δ ducatur sectionis causà recta $\alpha\delta\epsilon\zeta\gamma$. Ergo propter sectionem $\delta\zeta$ erit $\alpha\delta = \zeta\gamma$, et propter $\delta\epsilon$ sectionem $\alpha\delta = \epsilon\gamma$, ita ut sit $\gamma\zeta = \gamma\epsilon$, quod esse non potest; ergo sectiones non concurrent.

Iam dico easdem in infinitum productas magis inter se appropinquare et ad minus intervallum procedere.

Ducatur enim alia quoque hyperbolarum sectio $\vartheta\theta\sigma\chi$, sitque hyperbolae $\xi\epsilon$ diameter $\nu\mu$ ***) terminusque μ , et hyperbolae $\delta\zeta$ diameter $\pi\tau$; erit igitur ut $\mu\lambda \cdot \lambda\nu$ ad $\lambda\xi^2$, ita diameter transversa ad latus rectum (sive parametrum), itemque ut $\eta\theta \cdot \theta\pi$ ad $\theta\varrho^2$, ita diameter transversa ad latus rectum, ita ut sit $\mu\lambda \cdot \lambda\nu : \lambda\xi^2 = \eta\theta \cdot \theta\pi : \theta\varrho^2$, et vicissim $\mu\lambda \cdot \lambda\nu : \eta\theta \cdot \theta\pi = \lambda\xi^2 : \theta\varrho^2$. Sed est $\mu\lambda \cdot \lambda\nu > \eta\theta \cdot \theta\pi$; ergo etiam $\lambda\xi > \theta\varrho$ ideoque $\xi\zeta > \vartheta\sigma$. Et propter sectiones est $\zeta\xi \cdot \xi\delta = \sigma\vartheta \cdot \vartheta\epsilon$ (utrumque enim quadrato ex $\pi\tau$ aequale); ergo est $\xi\delta < \vartheta\epsilon$; itaque sectiones hyperbolarum semper ad minora intervalla procedunt. [Sed etiam ad extremum ad-

*) Hic et errorem sive scriptoris sive librariorum correximus et in figura veram hyperbolam $\eta\epsilon$, quae a codicibus abest, addidimus.

**) Hinc usque corruptam et mancā scripturam, quantum fieri potuit, emendavit Ha; praeterea idem suo ingenio duas alias demonstrationes addidit.

$\vartheta\eta\nu$ AB, corr. S 21. $\acute{\omega}\varsigma$ om. AB, add. S 24. 25. καὶ ἐπὶ αὐτῇ Ha pro ἐπὶ αὐτῇ ἐστίν 25. μετὰ AB, corr. S 26. ἐπὶ M·N Ha auctore Co pro ἐπὶ M·N 27. τῆς ΘΖ Ha pro τῆς PΣ 28. τὸ ἐπὶ Z·ΔΕ τῶν ἐπὶ ΣΡΘ ABS, corr. Ha. qui praeterea addit ἐκαστον γὰρ τῶν ἀπὸ H·T ἴσων

[ἀλλὰ καὶ παράκειται· εἰ γὰρ ἑκατέρω αὐτῶν ταῖς ἀσμπύκτοις ἔγγιον προσάγει, δηλονότι καὶ ἑαυταῖς.]

280 ζ'. Ἐστω ὡς μὲν ἡ AB πρὸς τὴν $BΓ$, οὕτως ἡ $ΔE$ πρὸς τὴν EZ , ὡς δὲ ἡ BA πρὸς τὴν AH , οὕτως ἡ EA πρὸς τὴν $AΘ$. ὅτι γίνεται ὡς τὸ στερεὸν τὸ βάσιν μὲν ἔχον τὸ δ' ἀπὸ $ΑΓ$ τετραγώνον, ὕψος δὲ τὴν AB , πρὸς τὸ στερεὸν τὸ βάσιν μὲν ἔχον τὸ ἀπὸ AZ τετραγώνον, ὕψος δὲ τὴν $ΔE$, οὕτως ὁ ἀπὸ τῆς AH κύβος μετὰ τοῦ λόγον ἔχοντος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς HB κύβον ὅν τὸ ἀπὸ $ΑΓ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΓB$ πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς $AΘ$ κύβον μετὰ τοῦ λόγον ἔχοντος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς $ΘE$ κύβον ὅν τὸ ἀπὸ AZ πρὸς τὸ ἀπὸ ZE .


Ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὡς ἡ $ΓA$ πρὸς τὴν AB , οὕτως ἡ ZA πρὸς τὴν $ΔE$, καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ $ΓA$ πρὸς τὸ ἀπὸ AB , οὕτως τὸ ἀπὸ ZA πρὸς τὸ ἀπὸ $ΔE$. ἀλλ' ὡς μὲν τὸ ἀπὸ $ΓA$ πρὸς τὸ ἀπὸ AB (κοινὸν ὕψος ἡ AB), οὕτως τὸ στε-
 15 ρεὸν τὸ βάσιν μὲν ἔχον τὸ ἀπὸ $ΑΓ$ τετραγώνον, ὕψος δὲ τὴν AB , πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς AB κύβον, ὡς δὲ τὸ ἀπὸ ZA πρὸς τὸ ἀπὸ $ΔE$ (κοινὸν ὕψος ἡ $ΔE$), οὕτως τὸ στερεὸν τὸ βάσιν μὲν ἔχον τὸ ἀπὸ AZ τετραγώνον, ὕψος δὲ τὴν $ΔE$, πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς $ΔE$ κύβον· καὶ ταῦτα ἄρα ἀνάλογον καὶ 20 ἐναλλάξ ἐστιν. ἔστιν δὲ καὶ ὡς ὁ ἀπὸ τῆς AB κύβος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς $ΔE$ κύβον, οὕτως ὁ ἀπὸ τῆς AH κύβος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς $AΘ$ κύβον, καὶ ὁ ἀπὸ τῆς HB κύβος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς $ΘE$ κύβον. ἀλλ' ὡς ὁ ἀπὸ τῆς HB κύβος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς $ΘE$ κύβον, οὕτως τὸ λόγον ἔχον πρὸς 25 τὸν ἀπὸ τῆς HB κύβον ὅν τὸ ἀπὸ $ΑΓ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΓB$ πρὸς τὸ λόγον ἔχον πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς $ΘE$ κύβον ὅν τὸ ἀπὸ AZ πρὸς τὸ ἀπὸ ZE . καὶ ὡς ἄρα ἐν τῶν ἡγουμένων πρὸς ἐν τῶν ἐπομένων, οὕτως ἅπαντα πρὸς ἅπαντα· ἔστιν

1. 2. ἀλλὰ — ἑαυταῖς interpolatori tribuit Hu 4. παράκειται
 ABS, corr. Ha 3. ζ' add. BS 8. post ὁ add. τε ABS, del. Ha
 9. ὅν Ha auctore Co pro ὅτι 13. ἀπὸ AB Co, ἀπὸ $ΓE$ A, ἀπὸ $γB$
 BS cod. Co 14. τὸ ἀπὸ $ZΔΘ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $AΘ$ ABS, corr. Co
 15. κοινὸν Ha pro κύβου 19. ἀπὸ AZ] ἀπὸ AZ ABS, ἀπὸ ZA Ha
 auctore Co 21. ὁ ἀπὸ τῆς AB κύβος Ha, ὁ ἀπὸ τῆς AB καὶ AB ,

iacebunt; nam, si utraque magis appropinquabit asymptotis, manifesto etiam inter se appropinquabunt.]

VII. Sit $\alpha\beta : \beta\gamma = \delta\varepsilon : \zeta\eta$, et $\beta\alpha : \alpha\eta = \varepsilon\delta : \delta\vartheta$; dico, Prop. 209
ut solidum basim habens quadratum ex $\alpha\gamma$ altitudinemque $\alpha\beta$ ad solidum basim habens quadratum ex $\delta\zeta$ altitudinemque $\delta\varepsilon$, ita esse cubum ex $\alpha\eta$ una cum eo quod est ad cubum ex $\eta\beta$ in proportionem quadrati ex $\alpha\gamma$ ad quadratum ex $\gamma\beta$ ad cubum ex $\delta\vartheta$ una cum eo quod est ad cubum ex $\vartheta\varepsilon$ in proportionem quadrati ex $\delta\zeta$ ad quadratum ex $\zeta\eta$; vel brevius sic: dico esse

$$\frac{\alpha\gamma^3 \cdot \alpha\beta}{\delta\zeta^3 \cdot \delta\varepsilon} = \frac{\alpha\eta^3 + \eta\beta^3 \cdot \alpha\gamma^3 : \gamma\beta^3}{\delta\vartheta^3 + \vartheta\varepsilon^3 \cdot \delta\zeta^3 : \zeta\eta^3}.$$



Quoniam enim e contrario et componendo est $\gamma\alpha : \alpha\beta = \zeta\delta : \delta\varepsilon$; ergo etiam $\gamma\alpha^2 : \alpha\beta^2 = \zeta\delta^2 : \delta\varepsilon^2$. Multiplicetur prior pro-

portio per $\alpha\beta$, altera per $\delta\varepsilon$; est igitur

$$\alpha\gamma^2 \cdot \alpha\beta : \alpha\beta^3 = \delta\zeta^2 \cdot \delta\varepsilon : \delta\varepsilon^3, \text{ et vicissim}$$

$$\alpha\gamma^2 \cdot \alpha\beta : \delta\zeta^2 \cdot \delta\varepsilon = \alpha\beta^3 : \delta\varepsilon^3. \text{ Sed est ex hypothesis et vicissim}$$

$$\alpha\beta^3 : \delta\varepsilon^3 = \alpha\eta^3 : \delta\vartheta^3, \text{ itemque, quia ex portione } \alpha\beta : \delta\varepsilon = \alpha\eta : \delta\vartheta \text{ subtrahendo fit } \alpha\beta : \delta\varepsilon = \eta\beta : \vartheta\varepsilon,$$

$$= \eta\beta^3 : \vartheta\varepsilon^3, \text{ vel, quia ex hypothesis et componendo est } \alpha\gamma : \gamma\beta = \delta\zeta : \zeta\eta,$$

$$= \frac{\eta\beta^3 \cdot \alpha\gamma^2 : \gamma\beta^2}{\vartheta\varepsilon^3 \cdot \delta\zeta^2 : \zeta\eta^2}. \text{ Ergo, comprehensis superioribus aequationibus est}$$

τὸ ἀπὸ τῆς $\alpha\beta$ καὶ S 24. 25. ἀλλ' ὡς — $\chi\epsilon\beta\alpha\nu$ add. Co 25. τὸν λόγον A, corr. BS 26. ὅν add. Ha auctore Co 27. ὅν τὸ BS, ὅν τὰ A 29. οὕτως add. Ha

ἄρα ὡς τὸ στερεὸν τὸ βάσιν μὲν ἔχον τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$ τε-
τραγώνου, ὕψους δὲ τὴν $ΑΒ$, πρὸς τὸ στερεὸν τὸ βάσιν μὲν
ἔχον τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΖ$ τετραγώνου, ὕψους δὲ τὴν $ΑΕ$, οὕτως
ὁ ἀπὸ τῆς $ΑΗ$ κύβος μετὰ τοῦ λόγον ἔχοντος πρὸς τὸν
ἀπὸ τῆς $ΗΒ$ κύβον ὡς τὸ ἀπὸ $ΑΓ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΓΒ$ πρὸς
τὸν ἀπὸ τῆς $ΑΘ$ κύβον μετὰ τοῦ λόγον ἔχοντος πρὸς τὸν
ἀπὸ τῆς $ΘΕ$ κύβον ὡς τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΖ$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $ΖΕ$.

281 γ'. Ἐστω τὸ $Α$ μετὰ τοῦ $Β$ ἴσον τῷ $Γ$ μετὰ τοῦ $Δ$.
ὅτι ὃ ὑπερέχει τὸ $Α$ τοῦ $Γ$, τοῦτῳ ὑπερέχει καὶ τὸ $Α$ τοῦ $Β$.

Ἐστω γὰρ ὃ ὑπερέχει τὸ $Α$ τοῦ $Γ$ τὸ $Ε$. τὸ $Α$ ἄρα 10
ἴσον ἐστὶν τοῖς $Γ Ε$. κοινὸν προσκεῖσθω τὸ $Β$. τὰ $Α Β$
ἄρα ἴσα ἐστὶν τοῖς $Γ Ε Β$. ἀλλὰ τὰ $Α Β$ τοῖς $Γ Δ$ ἴσα
ὑπόκειται· καὶ τὰ $Γ Δ$ ἄρα τοῖς $Γ Ε Β$ ἴσα. κοινὸν ἀφη-
ρήσθω τὸ $Γ$. λοιπὸν ἄρα τὸ $Δ$ ἴσον τοῖς $Β Ε$, ὥστε τὸ $Δ$
τοῦ $Β$ ὑπερέχει τῷ $Ε$. ὃ ἄρα ὑπερέχει τὸ $Α$ τοῦ $Γ$, τοῦτῳ 15
ὑπερέχει καὶ τὸ $Α$ τοῦ $Β$.

Ὁμοίως δὴ δείξομεν [ὅτι], εἰάν, ὃ ὑπερέχει τὸ $Α$ τοῦ
 $Γ$, τοῦτῳ ὑπερέχῃ καὶ τὸ $Δ$ τοῦ $Β$, ὅτι τὰ $Α Β$ ἴσα ἐστὶν
τοῖς $Γ Δ$.

282 δ'. Ἐστω δύο μεγέθη τὰ $ΑΒ ΒΓ$. ὅτι [ὃ ὑπερέχει 20
τὸ $ΒΑ$ τοῦ $ΑΓ$ τοῦτῳ] ὑπερέχει [καὶ] τὸ λόγον ἔχον πρὸς
τὸ $ΑΒ$ τοῦ λόγον ἔχοντος πρὸς τὸ $ΑΓ$ τὸν αὐτὸν τῷ λόγον
ἔχοντι πρὸς τὸ $ΓΒ$ τὸν αὐτόν.

Ἐστω γὰρ τὸ μὲν πρὸς τὸ $ΑΒ$ λόγον τινὰ ἔχον τὸ $ΔΕ$,
τὸ δὲ πρὸς τὸ $ΑΓ$ τὸν αὐτὸν λόγον ἔχον τὸ $ΑΖ$. λοιπὸν 25
ἄρα τὸ $ΕΖ$ πρὸς τὸ $ΒΓ$ λόγον ἔχει τὸν αὐτόν. καὶ ἐστὶν
τὸ $ΕΖ$ ὑπεροχὴ ἢ ὑπερέχει τὸ $ΔΕ$ τοῦ $ΑΖ$, τοῦτέστιν τὸ
λόγον ἔχον πρὸς τὸ $ΑΒ$ τοῦ λόγον ἔχοντος πρὸς τὸ $ΑΓ$
τὸν αὐτόν.

1. τὸ βάσιν B^s, τὸ om. A Ha 3. ὧν add. Ha auctore Co
6. μετὰ τοῦ λόγον ἔχοντος Ha auctore Co pro καὶ τὸ λόγον ἔχον
8. ἡ add. BS 10. post τὸ Ε add. τοῦ Α AB, del. S 11. τοῖς
ΓΕ Α, distinx. BS 12. τοῖς ΓΕΒ Α, distinx. BS, item vs. 13
τοῖς ΓΔ Α, distinx. BS 13. ἀφαιρέσθω ABS, corr. Ha 14. τοῖς
ΒΓ Α¹, ut videtur, τοῖς ΒΕ Α², distinx. BS 15. ὥς ἄρα AB, corr.
S τοῦ Γ add. Ha auctore Co 17. ὅτι del. Hu 18. ὑπερέχῃ Hu

$$\frac{\alpha\gamma^2 \cdot \alpha\beta}{\delta\zeta^2 \cdot \delta\epsilon} = \frac{\alpha\gamma^3}{\delta\eta^3} = \frac{\eta\beta^3 \cdot \alpha\gamma^2 : \gamma\beta^2}{\eta\epsilon^3 \cdot \delta\zeta^2 : \zeta\epsilon^2}, \text{ ideoque factâ summâ duarum posteriorem proportionum}$$

$$= \frac{\alpha\gamma^3 + \eta\beta^3 \cdot \alpha\gamma^2 : \gamma\beta^2}{\delta\eta^3 + \eta\epsilon^3 \cdot \delta\zeta^2 : \zeta\epsilon^2}.$$

VIII. Sit $\alpha + \beta = \gamma + \delta$; dico esse $\alpha - \gamma = \delta - \beta$. Prop. 210

Sit enim $\epsilon = \alpha - \gamma$; ergo




$\alpha = \gamma + \epsilon$. Commune addatur β ; ergo $\alpha + \beta = \gamma + \epsilon + \beta$.

Sed ex hypothesi est $\alpha + \beta = \gamma + \delta$; ergo etiam $\gamma + \delta = \gamma + \epsilon + \beta$. Commune auferatur γ ; ergo $\delta = \epsilon + \beta$,

itaque $\epsilon = \delta - \beta$; ergo $\alpha - \gamma = \delta - \beta$.

Similiter demonstrabimus, si sit $\alpha - \gamma = \delta - \beta$, esse $\alpha + \beta = \gamma + \delta$.

IX. Sint duae magnitudines $\alpha\gamma$ $\gamma\beta$, earumque summa Prop. 211
 $\alpha\beta^*$; dico id quod ad $\alpha\beta$ proportionem aliquam habet maius esse quam illud quod ad $\alpha\gamma$ eandem proportionem habet eo quod ad $\gamma\beta$ eandem proportionem habet (vel brevius sic: dico, si ponantur $x : \alpha\beta = y : \alpha\gamma = z : \gamma\beta$, esse $x - y = z$).



Sit enim $\delta\epsilon$ id quod ad $\alpha\beta$ proportionem aliquam habet, et illud quod ad $\alpha\gamma$ eandem proportionem habet sit $\delta\zeta$; est igitur

$$\frac{\delta\epsilon}{\alpha\beta} = \frac{\delta\zeta}{\alpha\gamma} = \frac{\delta\epsilon - \delta\zeta}{\alpha\beta - \alpha\gamma}, \text{ id est } \frac{\zeta\epsilon}{\gamma\beta}.$$

*) Graeca $\mu\epsilon\gamma\epsilon\theta\eta$ τὰ αβ βγ id ipsum quod supra posuimus significant; sana igitur est scriptura quae in codicibus exstat.

pro ὑπερέχει 48. 19. τὰ $\overline{AB}$ — τοῖς $\Gamma\Delta$ A, distinx. BS 48. ἴσα S, ἴσων AB 20. δ' add. BS 20. 21. φ — τοῦτον et καὶ del. Hu, ἔαν ὑπερέχει (sic) τὸ $\overline{AB}$ τοῦ $\overline{AI}$, ὑπερέχει καὶ cel. Hu 22. 23. τὸ ἀπὸ $\overline{AB}$ et τὸ ἀπὸ $\overline{IB}$ ABS, corr. Co 22. πρὸς τὸν $\overline{AI}$ A, corr. BS 23. ἔχον τῶν $\overline{AZ}$ ABS, corr. Co 27. τὸ $\overline{EZH}$ ὑπεροχή ABS, H del. Co nisi forte articulum η voluit scriptor,

283 ι'. Τὸ A τοῦ Γ ἐλάσσονι ὑπερέχειτο ἥπερ τὸ A τοῦ B .
ὅτι τὰ $A B$ ἐλάσσονά ἐστιν τῶν ΓA .

Ἐστω γὰρ ὃ ὑπερέχει τὸ A τοῦ Γ τὸ E , τὰ $A B$ ἄρα ἴσα ἐστὶν τοῖς $\Gamma E B$. ἐπεὶ δὲ τὸ A τοῦ Γ ἐλάσσονι ὑπερέχει ἥπερ τὸ A τοῦ B , τὸ δὲ A τοῦ Γ ὑπερέχει τῷ B , τὸ E ἄρα ἐλάσσον ἐστὶν τῆς τῶν $A B$ ὑπεροχῆς, ὥστε τὰ $E B$ ἐλάσσονά ἐστιν τοῦ A . κοινὸν προσκείσθω τὸ Γ . τὰ $\Gamma E B$ ἄρα ἐλάσσονά ἐστιν τῶν ΓA . ἀλλὰ τὰ $\Gamma E B$ ἴσα ἐδείχθη τοῖς $A B$. τὰ $A B$ ἄρα ἐλάσσονά ἐστιν τῶν ΓA .

10

Ὅμοιως καὶ τὸ ἀναστρόφιον. καὶ τὰ ἐπὶ τῆς ἑλλείψεως ὁμοίως.

Τοῦ ζ'.

284 α'. Ἐστω δύο τρίγωνα ἀμβλυγώνια τὰ $AB\Gamma$ ΔEZ , ἀμβλείας ἔχοντα τὰς ΓZ γωνίας, καὶ ἴσας τὰς $A \Delta$ ὀξείας, 15 ὁρθᾶι ταῖς $B\Gamma$ EZ ἤχθωσαν αἱ ΓH $Z\Theta$, ἔστω δὲ ὡς τὸ ὑπὸ τῶν BAH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $A\Gamma$ τετραγώνον, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν $EA\Theta$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς AZ . ὅτι ὁμοίων ἐστὶν τὸ $AB\Gamma$ τρίγωνον τῷ ΔEZ τριγώνῳ.

Γεγραμμένω γὰρ ἐπὶ τῶν HB $E\Theta$ ἡμικύκλια· ἐλεύσεται 20 δὴ καὶ διὰ τῶν ΓZ [ἐρχέσθω, καὶ ἔστω τὰ $H\Gamma B$ $EZ\Theta$]. ἥτοι δὴ ἐφάπτονται αἱ $A\Gamma$ ΔZ τῶν ἡμικυκλίων ἢ οὐ. εἰ μὲν οὖν ἐφάπτονται, φανερόν ἐστι γίνεσθαι ὅμοια τὰ $AB\Gamma$ ΔEZ τρίγωνα. ἐὰν γὰρ λάβω τὰ κέντρα τὰ $M N$, καὶ ἐπιζεύξω τὰς $M\Gamma$ NZ , ἔσονται ὁρθᾶι αἱ ὑπὸ $M\Gamma A$ $NZ\Delta$ 25 γωνίαι· καὶ εἰσὶν αἱ $A \Delta$ γωνίαι ἴσαι· καὶ ἡ ἐπὶ $A M\Gamma$ ἄρα τῇ ἐπὶ $\Delta N Z$ γωνίᾳ. καὶ τὰ ἡμίση· καὶ ἡ B ἄρα

1. ι' add. BS 2. τὰ $\overline{AB}$ — τῶν $\overline{\Gamma A}$ et similiter posthac A, distinx. BS 4. ἐπεὶ δὲ τὸ A Ha auctore Co pro ἐπεὶ δὲ τὸ ἀπὸ 8 et 9. τῶν Hu auctore Co pro τοῖς 11. ἐπὶ om. Ha 12. Τοῦ ἔκτου τῶν κοινῶν BS 14. α' add. BS 15. τὰς $\overline{\Gamma Z}$ — τὰς $\overline{A\Delta}$ A, distinx. BS 16. ταῖς γὰρ εἰς S Ha 20. τῶν $H\Gamma B\Theta$ et 21. τῶν $\overline{\Gamma Z}$ A, distinx. BS 21. ἐρχέσθω — $EZ\Theta$ del. Hu τὰ $H\Gamma B$ $B\Gamma Z$

X. Sit $\alpha - \gamma < \delta - \beta$; dico esse $\alpha + \beta < \gamma + \delta$. Prop. 212

Sit enim $\varepsilon = \alpha - \gamma$;

ergo est

$$\alpha + \beta = \gamma + \varepsilon + \beta. \text{ Sed}$$

quia est

$$\alpha - \gamma < \delta - \beta, \text{ et}$$

$$\alpha - \gamma = \varepsilon, \text{ est igitur}$$

$$\varepsilon < \delta - \beta, \text{ itaque}$$

$$\varepsilon + \beta < \delta.$$

Commune addatur γ ; est igitur $\gamma + \varepsilon + \beta < \gamma + \delta$. Sed demonstrata sunt $\gamma + \varepsilon + \beta = \alpha + \beta$; ergo $\alpha + \beta < \gamma + \delta$.

Similiter etiam conversum demonstrabimus: si sit $\alpha + \beta < \gamma + \delta$, esse $\alpha - \gamma < \delta - \beta$. Et similis demonstratio erit, si sit $\alpha < \gamma$.

LEMATA IN CONICORUM LIBRUM VI.

I. Sint duo triangula amblygonia $\alpha\beta\gamma$ $\delta\varepsilon\zeta$, angulos ad γ ζ obtusos habentia et acutos ad α δ inter se aequales. et $\beta\gamma$ $\varepsilon\zeta$ perpendiculares ducantur $\gamma\eta$ $\zeta\theta$, sitque $\beta\alpha \cdot \alpha\eta$: $\alpha\gamma^2 = \varepsilon\delta \cdot \delta\theta$: $\delta\zeta^2$; dico esse $\Delta \alpha\beta\gamma \sim \Delta \delta\varepsilon\zeta$. Prop. 213




Describantur enim semicirculi in rectis $\eta\beta$ $\delta\theta$; hi igitur per γ ζ transibunt; ergo rectae $\alpha\gamma$ $\delta\zeta$ aut semicirculos tangunt aut non. Primum si tangunt, apparet triangula $\alpha\beta\gamma$ $\delta\varepsilon\zeta$ similia esse. Nam si centra μ ν sumpsero, et iunxero $\mu\gamma$ $\nu\zeta$, recti erunt anguli $\mu\gamma\alpha$ $\nu\zeta\delta$. Et ex hypothesi aequales sunt anguli α δ ; ergo etiam anguli $\alpha\mu\gamma$ $\delta\nu\zeta$ aequales. Atque etiam horum dimidia partes, id est anguli $\alpha\beta\gamma$ $\delta\varepsilon\zeta$ aequales

ABS. corr. Ha auctore C'o 22. η o ν A²BS, $\varepsilon\gamma\theta\alpha$ sine spir. et acc.)

A¹, η γ' o ν Ha 26. al. A¹ A, distinx. BS

Pappu. II.

γωνία τῇ B ἔστιν ἴση. ἀλλὰ καὶ ἡ A τῇ A . ὁμοία ἄρα ἔστιν τὰ τρίγωνα.



Ἀλλὰ δὴ μὴ ἐφαπτέσθωσαν, ἀλλὰ τεμνέτωσαν τὰ ἡμι-
κύκλια κατὰ τινα σημεῖα τὰ $K A$, καὶ ἤχθωσαν κάθετοι
αἱ $M E N O$. ἴση ἄρα ἔστιν ἡ μὲν $K E$ τῇ $E Γ$, ἡ δὲ $A O$ ⁵
τῇ $O Z$. ὁμοιον δὲ τὸ $A M E$ τῷ $A N O$ τριγώνω· ἔστιν ἄρα
ὡς ἡ $E A$ πρὸς $A M$, οὕτως ἡ $O A$ πρὸς $A N$. ἔπει δὲ ἔστιν
ὡς τὸ ὑπὸ $B A H$ πρὸς τὸ ἀπὸ $A Γ$, οὕτως τὸ ὑπὸ $E A Θ$
πρὸς τὸ ἀπὸ $A Z$, καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ $K A Γ$ πρὸς τὸ ἀπὸ
 $A Γ$, τοιούτεστιν ὡς ἡ $K A$ πρὸς $A Γ$, οὕτως τὸ ὑπὸ $A A Z$ ¹⁰
πρὸς τὸ ἀπὸ $A Z$, τοιούτεστιν ἡ $A A$ πρὸς $A Z$. ὥστε καὶ
ὡς ἡ $E A$ πρὸς $A Γ$, οὕτως ἡ $O A$ πρὸς $A Z$. ἀλλὰ καὶ ὡς
ἡ $E A$ πρὸς $A M$, οὕτως ἔστιν ἡ $O A$ πρὸς $A N$ [διὰ τὴν
ὁμοιότητα τῶν τριγώνων]. δι' ἴσον ἄρα ἔστιν ὡς ἡ $A A$
πρὸς $A M$, οὕτως ἡ $Z A$ πρὸς $A N$. καὶ παρὰ ἴσας γωνίας¹⁵
τὰς $A A$ ἀνάλογόν εἰσιν. ἴση ἄρα ἔστιν ἡ ὑπὸ τῶν $A M Γ$
τῇ ὑπὸ τῶν $A N Z$ γωνία. καὶ τὰ ἡμίση· καὶ ἡ B ἄρα γωνία
ἴση ἔστιν τῇ E . ἀλλὰ καὶ ἡ A τῇ A καθ' ὑπόθεσιν·
ὁμοιον ἄρα ἔστιν τὸ $A B Γ$ τριγώνον τῷ $A E Z$ τριγώνω.

285 Συμφανές δὲ τὸ ἀντίστροφον αὐτῷ· ὅντος ὁμοίου τοῦ²⁰
 $A B Γ$ τῷ $A E Z$, καὶ ὁρθῶν τῶν ὑπὸ $B Γ H E Z Θ$, δεῖξαι
ὅτι γίνεται ὡς τὸ ὑπὸ $B A H$ πρὸς τὸ ἀπὸ $A Γ$, οὕτως τὸ
ὑπὸ $E A Θ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $A Z$. ἔστιν γὰρ διὰ τὴν ὁμοιότητα
τῶν τριγώνων ὡς μὲν ἡ $B A$ πρὸς $A Γ$, οὕτως ἡ $E A$ πρὸς

sunt. Atque erant etiam anguli $\alpha \delta$ aequales; ergo triangula $\alpha\beta\gamma$ $\delta\epsilon\zeta$ similia sunt.

Sed iam rectae $\alpha\gamma$ $\delta\zeta$ non tangant semicirculos, sed eos secant in punctis κ λ , et ducantur perpendiculares $\mu\xi$ $\nu\omicron$; est igitur $\kappa\xi = \xi\gamma$, et $\lambda\omicron = \omicron\zeta$. Sunt autem ex hypothesis et constructione triangula $\alpha\mu\xi$ $\delta\nu\omicron$ similia; est igitur

$\xi\alpha : \alpha\mu = \omicron\delta : \delta\nu$. Sed quia ex hypothesis est

$\beta\alpha \cdot \alpha\eta : \alpha\gamma^2 = \epsilon\delta \cdot \delta\vartheta : \delta\zeta^2$, est etiam (elem. 3, 36)

$\gamma\alpha \cdot \alpha\kappa : \alpha\gamma^2 = \zeta\delta \cdot \delta\lambda : \delta\zeta^2$, id est

$\kappa\alpha : \alpha\gamma = \lambda\delta : \delta\zeta$, sive componendo

$\kappa\alpha + \alpha\gamma : \alpha\gamma = \lambda\delta + \delta\zeta : \delta\zeta$, id est $2(\alpha\kappa + \kappa\gamma) : \alpha\gamma$
 $= 2(\delta\lambda + \lambda\omicron) : \delta\zeta^*$,
 ita ut sit

$\xi\alpha : \alpha\gamma = \omicron\delta : \delta\zeta$. Sed est etiam, ut modo demonstravimus,

$\xi\alpha : \alpha\mu = \omicron\delta : \delta\nu$; ex aequali igitur est

$\gamma\alpha : \alpha\mu = \zeta\delta : \delta\nu$. Et sunt haec latera proportionalia circa aequales angulos $\alpha \delta$; est igitur

$\angle \alpha\mu\gamma = \angle \delta\nu\zeta$. Atque etiam dimidiaae partes, id est

$\angle \alpha\beta\gamma = \angle \delta\epsilon\zeta$. Sed est etiam $\angle \alpha = \angle \delta$ ex hypothesis; ergo est

$\Delta \alpha\beta\gamma \sim \Delta \delta\epsilon\zeta$.

Manifestum autem est lemma conversum: si sint triangula $\alpha\beta\gamma$ $\delta\epsilon\zeta$ similia, rectique anguli $\beta\gamma\eta$ $\epsilon\zeta\vartheta$, demonstretur esse $\beta\alpha \cdot \alpha\eta : \alpha\gamma^2 = \epsilon\delta \cdot \delta\vartheta : \delta\zeta^2$. Nam propter similitudinem triangulorum est $\beta\alpha : \alpha\gamma = \epsilon\delta : \delta\zeta$, et $\eta\alpha : \alpha\gamma =$

* Haec quae addidimus spectant ad priores figuras, in quibus puncta κ λ sunt inter α γ et δ ζ . In alteris figuris dicendum est: "id est $2(\alpha\gamma + \gamma\xi) : \alpha\gamma = 2(\delta\zeta + \zeta\omicron) : \delta\zeta$ ".

3. τεμνέτω ABS, corr. Ha auctore Co

5. τὰ $\overline{KA}$ A, distinx. BS

13. 14. διὰ — τριγώνων del. Hu

16. τὰς $\overline{AA}$ A, distinx. BS

17. $\overline{ANZ}$ γωνιών AB, corr. S

20. ὅρθος Hu pro τοῦ ὀρθος (τοῦ ABΓ


ὀρθος ὁμοίον τῇ $\overline{AEZ}$ Ha

23. ὑπὸ E. 14 Ha auctore Co pro ὑπὸ

$\overline{E.14}$.

ΔZ , ὡς δὲ ἡ HA πρὸς AI , οὕτως ἡ ΘA πρὸς ΔZ · καὶ ὁ συνημμένος.

- 286 β'. Ἐστω δύο ὅμοια τμήματα μείζονα ἡμικυκλίου τὰ ἐπὶ τῶν $AB \Gamma A$, καὶ ἤχθωσαν κάθετοι αἱ $EZH \Theta KA$, ἔστω δὲ ὡς ἡ EH πρὸς HZ , οὕτως ἡ ΘA πρὸς AK · δεικτέον ὅτι ὅμοια ἐστὶν ἡ BZ περιφέρεια τῇ AK περιφέρειᾳ.



Εἰλήφθω τὰ κέντρα τὰ $M N$, καὶ κάθετοι ἤχθωσαν αἱ $ME MO NH NP$, καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ $MB NA$. ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ OMB γωνία τῇ ὑπὸ $PN A$ γωνίᾳ (ἴσαι γάρ εἰσιν αἱ ἐν τοῖς τμήμασιν, ὥστε καὶ ἡμίσειαι). καὶ εἰσιν ὁρθαὶ αἱ OP . ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ὑπὸ MBO γωνία τῇ ὑπὸ NAP γωνίᾳ. ἤχθωσαν ταῖς $AB \Gamma A$ παράλληλοι αἱ $ZS KT$, καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ $MZ NK$. ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ὑπὸ $MΣ Z$ γωνία τῇ ὑπὸ NTK γωνίᾳ. ἐπεὶ δὲ ἐστὶν ὡς ἡ EH πρὸς HZ , οὕτως ἡ ΘA πρὸς AK , καὶ ὡς ἄρα ἡ ΞH πρὸς HZ , οὕτως ἐστὶν ἡ ΠA πρὸς AK , ὥστε καὶ ὡς ἡ $H\Xi$ πρὸς ΞZ , τουτέστιν ἡ MB πρὸς $MΣ$, τουτέστιν [ὡς] ἡ ZM πρὸς $MΣ$, οὕτως ἡ AN πρὸς NT , τουτέστιν ἡ KN πρὸς NT . καὶ εἰσὶν αἱ μὲν ὑπὸ $MΣ Z$ NTK ἴσαι, αἱ δὲ ὑπὸ MZS NKT ὀξεῖαι. ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΣMZ γωνία τῇ ὑπὸ TNK . ὅμοια ἄρα ἐστὶν ἡ BZ περιφέρεια τῇ AK περιφερείᾳ.

- 287 γ'. Ἐστω δύο τρίγωνα τὰ $AB \Gamma \Delta EZ$, ὁρθὰς ἔχοντα τὰς ΓZ γωνίας, καὶ διήχθωσαν αἱ $AH \Lambda \Theta$ ἐν ἴσαις γωνίαις ταῖς ὑπὸ BAH $E\Lambda \Theta$, ἔστω τε ὡς τὸ ὑπὸ τῶν $B \Gamma H$

$\vartheta\delta : \delta\zeta$, unde *fit* formula compositae proportionis $\beta\alpha \cdot \alpha\eta : \alpha\gamma^2$
 $= \varepsilon\delta \cdot \delta\vartheta : \delta\zeta^2$.

II. Sint duo similia *circulorum* segmenta maiora semi- Prop. 214
 circulo in rectis $\alpha\beta \gamma\delta$. et ducantur perpendiculares $\varepsilon\zeta\eta \vartheta\kappa\lambda$
 ita, ut sit $\varepsilon\eta : \eta\zeta = \vartheta\lambda : \lambda\kappa$; demonstretur circumferentiam $\beta\zeta$
 circumferentiae $\delta\kappa$ similem esse¹⁾.

Sumantur centra $\mu \nu$, et ducantur perpendiculares $\mu\zeta$
 $\mu\sigma \nu\pi \nu\varrho$, iunganturque $\mu\beta \nu\delta$; est igitur $\angle \alpha\mu\beta = \angle \varrho\nu\delta$
 (nam aequales sunt *centri* anguli in segmentis $\alpha\beta \gamma\delta$, ita-
 que etiam dimidii). Et sunt recti anguli $\sigma \varrho$; ergo etiam
 $\angle \mu\beta\sigma = \angle \nu\delta\varrho$. Ducantur rectis $\alpha\beta \gamma\delta$ parallelae $\zeta\sigma \kappa\tau$, et
 iungantur $\mu\zeta \nu\kappa$; ergo etiam est $\angle \mu\sigma\zeta = \angle \nu\kappa\chi$. Sed quia
 ex *hypothesi* est

$\varepsilon\eta : \eta\zeta = \vartheta\lambda : \lambda\kappa$, est igitur (ut in superiore *lemmate*)

$\xi\eta : \eta\zeta = \pi\lambda : \lambda\kappa$, itaque *convertendo*

$\eta\zeta : \xi\zeta = \lambda\pi : \pi\kappa$, id est *propter parallelas*

$\beta\mu : \mu\sigma = \delta\nu : \nu\tau$, id est *quia* $\zeta\mu = \beta\mu$, et $\kappa\nu = \delta\nu$;

$\zeta\mu : \mu\sigma = \kappa\nu : \nu\tau$. Estque, ut modo demonstravimus,

$\angle \mu\sigma\zeta = \angle \nu\kappa\chi$, et minores recto sunt anguli $\mu\zeta\sigma \nu\kappa\tau$;
 ergo *propter elem. 6, 7 similia sunt*
triangula, ideoque

$\angle \sigma\mu\zeta = \angle \tau\nu\kappa$; ergo circumferentia $\beta\zeta$ circumferentiae
 $\delta\kappa$ similis est.

III. Sint duo triangula $\alpha\beta\gamma \delta\epsilon\zeta$, rectos angulos $\gamma \zeta$ ha- Prop. 215
 bentia, et ducantur $\alpha\eta \delta\vartheta$ sub aequalibus angulis $\beta\alpha\eta \varepsilon\delta\vartheta$,

4. Figuras tales exhibemus, quales emendavit Halleius; in codicibus
 quattuor corruptae inveniuntur figurae, quarum speciem vide sis apud
 Commandinum.

1. $\omega\varsigma \delta\epsilon \eta \text{ } K A$ et $\omicron\upsilon\tau\omega\varsigma \eta \text{ } I J$ ABS, corr. Ha auctore Co 3. β'
 add. BS 10. $\overline{MONII}$ A, distinx. BS 11. $\tau\alpha\iota\varsigma \epsilon\nu \tau\omicron\iota\varsigma \tau\mu\eta\mu\alpha\sigma\iota\nu$
 $\kappa\alpha\tau\alpha \mu\epsilon\tau\alpha\nu \kappa\alpha\iota A(BS)$, corr. Hu 16. $\eta \text{ } \Theta A$ Ha auctore Co pro $\eta \text{ } E A$
 17—20. $\omega\varsigma\tau\epsilon \kappa\alpha\iota \eta \text{ } H E$ $\pi\rho\acute{o}\varsigma E Z$, $\tau\omicron\upsilon\tau\iota\sigma\tau\iota \eta \text{ } M B$ $\eta\tau\omicron\iota Z M$ $\pi\rho\acute{o}\varsigma M \Sigma$,
 $\omicron\upsilon\tau\omega\varsigma \eta \text{ } I I I$ $\pi\rho\acute{o}\varsigma H K$, $\tau\omicron\upsilon\tau\iota\sigma\tau\iota \eta \text{ } J N$ $\eta\tau\omicron\iota N K$ $\pi\rho\acute{o}\varsigma N T$ Ha
 19. $\omega\varsigma$ del. Hu 20. $\tau\omicron\upsilon\tau\iota\sigma\tau\iota \eta \text{ } K N$ $\pi\rho\acute{o}\varsigma N T$ add. Co 21. $\overline{M \Sigma Z}$
 $N T$ $\kappa\alpha\iota \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } A$, corr. A²S ($\mu\sigma\zeta \nu\tau \text{ } \text{ } \text{ } B$) 24. γ' add. BS $\tau\epsilon\tau\iota$ -
 $\gamma\omega\gamma\omega\varsigma S$, $\delta\rho\delta\theta\gamma\omega\gamma\omega\varsigma A B$ Ha $\tau\alpha \text{ } A B \text{ } \overline{I J} \text{ } E Z$ A, corr. BS 25. $\tau\alpha\varsigma$
 $\overline{I Z}$ A, distinx. BS

πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν $ΕΖΘ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΖΔ$. ὅτι ὁμοίων ἐστὶν τὸ $ΑΒΓ$ τρίγωνον τῷ $ΔΕΖ$ τριγώνῳ.




Γεγράφθω γάρ περὶ τὰ $ΑΒΗ ΔΕΘ$ τρίγωνα τμήματα κύκλων τὰ $ΒΗΑ ΕΘΔ$ [ὅμοια ἄρα ἐστίν]. ἤτοι δὴ ἐφαπτοῦνται αἱ $ΑΓ ΑΖ$ τῶν τμημάτων ἢ οὐ. ἐφαπτεύσθωσαν πρότερον. ἴσον ἄρα ἐστὶν τὸ μὲν ὑπὸ $ΒΓΗ$ τῷ ἀπὸ $ΑΓ$, τουτέστιν, ἐὰν πρὸς ὁρθὰς ἀγάγω τῇ $ΑΗ$ τὴν $ΑΚ$, τῷ ὑπὸ τῶν $ΗΓΚ$, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν $ΕΖΘ$ τῷ ἀπὸ $ΔΖ$, τουτέστιν, ἐὰν ὁρθὴν ἀγάγω τὴν $ΔΔ$ τῇ $ΔΘ$, τῷ ὑπὸ $ΘΖΔ$.¹⁰ ὥστε ἴση ἐστὶν ἡ μὲν $ΒΓ$ τῇ $ΓΚ$, ἡ δὲ $ΕΖ$ τῇ $ΖΔ$. καὶ ὁρθαὶ αἱ $ΑΓ ΑΖ$. διπλὴ ἄρα ἐστὶν ἡ μὲν ὑπὸ $ΒΑΚ$ γωνία τῆς ὑπὸ $ΒΑΓ$ γωνίας, ἡ δὲ ὑπὸ $ΕΔΔ$ γωνία τῆς ὑπὸ $ΕΔΖ$. καὶ εἰσὶν ἴσαι αἱ ὑπὸ $ΒΑΚ ΕΔΔ$ (ἴση γάρ ἐστιν ἡ μὲν ὑπὸ $ΒΑΗ$ τῇ ὑπὸ $ΕΔΘ$, ὁρθὴ δὲ ἡ ὑπὸ $ΗΑΚ$ ὁρθῇ¹⁵ τῇ ὑπὸ $ΘΔΔ$). καὶ αἱ ὑπὸ $ΒΑΓ ΕΔΖ$ ἄρα ἴσαι εἰσὶν. ἀλλὰ καὶ ὁρθαὶ αἱ $ΓΖ$. ὁμοιον ἄρα ἐστὶν τὸ $ΑΒΓ$ τρίγωνον τῷ $ΔΕΖ$ τριγώνῳ, ὅπερ· ~

Ἀλλὰ δὴ μὴ ἐφαπτεύσθωσαν αἱ $ΑΓ ΑΖ$, ἀλλὰ τεμνέτωσαν κατὰ τὰ $Μ Ν$ σημεία. ἐστὶν οὖν ὡς τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΓΜ$ ²⁰ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΑΓ$, τουτέστιν ὡς ἡ $ΜΓ$ πρὸς $ΓΑ$, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν $ΔΖΝ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΔΖ$, τουτέστιν ἡ $ΝΖ$ πρὸς $ΖΔ$.

3. τοῖ $ΑΒΓ$ τριγώνων A^1 , τοῖς $ΑΒΓ$ τριγώνωι A^2 BS, corr. et τῷ $ΔΕΖ$ τριγώνῳ add. Co 4. 5. $ΕΔΘ$ τριγώνων τμήματα κύκλων τὰ $ΒΑΗ ΒΔΘ$ A, in his τριγώνω corr. BS, $ΒΔΘ$ om. S cod. Co. Initio $ΔΕΘ$ et deinceps τὰ $ΒΗΑ$ corr. Ha. extremum $ΕΘΔ$ corr. Hu ($ΕΔΘ$ Co, $ΔΘΕ$ Ha) 5. ὅμοια ἄρα ἐστίν del. Hu δὴ add. Co 6. ἐφαπτεύσθω ABS, corr. Ha auctore Co 8. 9. $ΑΚ$ τὸ ὑπὸ ABS, τῷ corr. Co 10. τὴν $ΔΔ$ τῇ $ΔΘ$ τοῖ ὑπὸ $ΖΔ$ ABS, corr. Co 11. ἡ δὲ $ΕΖ$ Co

sitque $\beta\gamma \cdot \gamma\eta : \alpha\gamma^2 = \varepsilon\zeta \cdot \zeta\vartheta : \delta\zeta^2$; dico esse $\Delta \alpha\beta\gamma \sim \Delta \delta\varepsilon\zeta$.

Describantur enim circa triangula $\alpha\beta\gamma$, $\delta\varepsilon\vartheta$ circulorum segmenta $\beta\eta\alpha$ $\varepsilon\vartheta\delta$; iam rectae $\alpha\gamma$ $\delta\zeta$ aut segmenta tangunt aut non. Primum quidem tangant; est igitur propter elem. 3, 36 $\beta\gamma \cdot \gamma\eta = \alpha\gamma^2$, et $\varepsilon\zeta \cdot \zeta\vartheta = \delta\zeta^2$, id est, si rectae $\alpha\eta$ perpendicularem ducam $\alpha\kappa$ rectaeque $\delta\vartheta$ perpendicularem $\delta\lambda$, $\beta\gamma \cdot \gamma\eta = \eta\gamma \cdot \gamma\kappa$, et $\varepsilon\zeta \cdot \zeta\vartheta = \vartheta\zeta \cdot \zeta\lambda$, ita ut sit $\beta\gamma = \gamma\kappa$, et $\varepsilon\zeta = \zeta\lambda$. Et sunt perpendiculares $\alpha\gamma$ $\delta\zeta$; ergo est $\angle \beta\alpha\kappa = 2 \angle \beta\alpha\gamma$, et $\angle \varepsilon\delta\lambda = 2 \angle \varepsilon\delta\zeta$. Et est $\angle \beta\alpha\kappa = \angle \varepsilon\delta\lambda$ (nam ex hypothesis est $\angle \beta\alpha\eta = \angle \varepsilon\delta\vartheta$, et ex constructione recti sunt anguli $\eta\alpha\kappa$ $\vartheta\delta\lambda$); ergo est etiam $\angle \beta\alpha\gamma = \angle \varepsilon\delta\zeta$. Sed etiam recti anguli γ ζ aequales sunt; est igitur $\Delta \alpha\beta\gamma \sim \Delta \delta\varepsilon\zeta$, q. e. d.



At rectae $\alpha\gamma$ $\delta\zeta$ non tangant circulorum segmenta, sed secant in punctis μ ν . Est igitur (quia ex hypothesis $\beta\gamma \cdot \gamma\eta : \alpha\gamma^2 = \varepsilon\zeta \cdot \zeta\vartheta : \delta\zeta^2$, et $\beta\gamma \cdot \gamma\eta = \mu\gamma \cdot \gamma\alpha$, et $\varepsilon\zeta \cdot \zeta\vartheta = \nu\zeta \cdot \zeta\delta$) $\mu\gamma \cdot \gamma\alpha : \gamma\alpha^2 = \nu\zeta \cdot \zeta\delta : \zeta\delta^2$, id est $\mu\gamma : \gamma\alpha = \nu\zeta : \zeta\delta$. Et

pro η $\delta\epsilon$ HZ 12. $\delta\rho\vartheta\alpha\iota$ S, $\delta\rho\vartheta\eta$ AB, $\pi\rho\delta\varsigma$ $\delta\rho\vartheta\alpha\varsigma$ con. Hu ad
 AF AZ] ad FZ Ha 13. $\gamma\omega\rho\iota\alpha$ $\tau\eta\varsigma$ $\epsilon\pi\alpha\delta$ (scilicet ante EAZ) A²
 in rasura 14. $\iota\sigma\alpha\iota$ ad $\epsilon\pi\alpha\delta$ $\overline{ABK}$ AB, $\iota\sigma\alpha\iota$ ad $\epsilon\pi\alpha\delta$ $\alpha\beta\gamma$ S, corr. Ha
 auctore Co 16. $\chi\alpha\iota$ ad] ad $\alpha\beta\alpha$ Ha $\alpha\beta\alpha$ hoc loco add. Hu
 20. $\tau\acute{\alpha}$ M N Ha pro $\tau\acute{\alpha}$ K.1 20. 21. $\omicron\upsilon\tau$ — $\tau\omicron\upsilon\tau\epsilon\sigma\tau\epsilon\upsilon$ add. Ha
 auctore Co (nisi quod $\epsilon\pi\alpha\delta$ $\tau\acute{\omega}\nu$ $\overline{MFA}$ scripsit Ha, quod corr. Hu)
 21. 22. $\omega\varsigma$ η $\overline{KF}$ — $\tau\acute{\omega}\nu$ $\overline{AZA}$ — $\tau\omicron\upsilon\tau\epsilon\sigma\tau\epsilon\upsilon$ η $\overline{AZ}$ ABS, corr. Ha


καὶ ἔστιν ὁμοία μείζονα τμήματα τὰ $ΒΛΗ$ $ΕΛΘ$ · ὁμοία ἄρα ἔστιν ἡ $ΑΗ$ περιφέρεια τῇ $ΙΘ$ περιφέρειᾳ· ὥστε ἴση ἔστιν ἡ $Β$ γωνία τῇ $Ε$ · ὁμοιον ἄρα ἔστιν τὸ $ΑΒΓ$ τρίγωνον τῷ $ΔΕΖ$ τριγώνῳ.

Ἄλλως τὸ αὐτό.

5

288 δ'. Ἐστω δύο τρίγωνα ὁρθὰς ἔχοντα τὰς $ΓΖ$ γωνίας, καὶ διήχθωσαν αἱ $ΑΗ$ $ΙΘ$ ἐν ἴσαις γωνίαις ταῖς ἐπὶ $ΒΛΗ$ $ΕΛΘ$, ἔστω τε ὡς τὸ ἐπὶ $ΒΓΗ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΑΓ$, οὕτως τὸ ἐπὶ $ΕΖΘ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΔΖ$ · ὅτι ὁμοιον τὸ $ΑΒΓ$ τρίγωνον τῷ $ΔΕΖ$ τριγώνῳ.

10



Ἐχθωσαν ταῖς $ΑΗ$ $ΙΘ$ ὁρθαὶ αἱ $ΑΚ$ $ΔΑ$ · ἴσον ἄρα τὸ μὲν ἀπὸ $ΑΓ$ τῷ ἐπὶ $ΗΓΚ$, τὸ δὲ ἀπὸ $ΔΖ$ τῷ ἐπὶ $ΘΖΑ$ · ἔστιν οὖν ὡς τὸ ἐπὶ $ΒΓΗ$ πρὸς τὸ ἐπὶ $ΗΓΚ$, τοιούτως ὡς ἡ $ΒΓ$ πρὸς τὴν $ΓΚ$, οὕτως τὸ ἐπὶ $ΕΖΘ$ πρὸς τὸ ἐπὶ $ΘΖΑ$, τοιούτως ἡ $ΕΖ$ πρὸς $ΖΑ$. Ἐχθωσαν ταῖς $ΑΚ$ $ΔΑ$ παράλληλοι αἱ $ΓΜ$ $ΖΝ$ · καὶ ὡς ἄρα ἡ $ΒΜ$ πρὸς $ΜΑ$, οὕτως ἡ $ΕΝ$ πρὸς $ΝΑ$. καὶ εἰσὶν ὁρθαὶ μὲν αἱ πρὸς τοῖς $ΓΖ$ σημείοις, ἴσαι δὲ αἱ πρὸς τοῖς $ΜΝ$ γωνίαι ταῖς ἐπὶ $ΒΛΚ$ $ΕΔΑ$ · διὰ δὲ τὸ προγεγραμμένον ὁμοιὸν ἔστι τὸ $ΑΒΓ$ τρίγωνον τῷ $ΔΕΖ$ τριγώνῳ.

20

289 ε'. Ἐστω δύο τρίγωνα ὁρθὰς ἔχοντα τὰς πρὸς ταῖς $ΒΕ$ σημείοις γωνίας, καὶ διήχθωσαν αἱ $ΒΗ$ $ΕΘ$ ἐν ἴσαις γωνίαις ταῖς ἐπὶ $ΑΗΒ$ $ΙΘΕ$, ἔστω τε ὡς τὸ ἐπὶ τῶν $ΑΗΓ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΗΒ$, οὕτως τὸ ἐπὶ τῶν $ΔΘΖ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΘΕ$ · δεικτέον ὅτι ὁμοιὸν ἔστιν τὸ $ΑΒΓ$ τρίγωνον τῷ $ΔΕΖ$ τριγώνῳ.

1. ὁμοιον ABS, corr. Co τὰ add. Ha 3. τῇ Ε Ha pro τῇ Θ
6. δ' add. BS τὰς ΓΖ Α, distinx. BS 13. ὡς τὸ ἐπὶ $ΒΓΗ$ Α Co,

sunt ex constructione segmenta circulorum $\beta\eta\alpha\mu$ $\epsilon\theta\delta\gamma$ similia
 eaque maiora semicirculo; ergo propter superius lemma cir-
 cumferentia $\alpha\eta$ similis est circumferentiae $\delta\theta$, itaque an-
 gulus $\alpha\beta\gamma$ angulo $\delta\epsilon\zeta$ aequalis, quapropter $\Delta \alpha\beta\gamma \sim \Delta \delta\epsilon\zeta$.

Aliter idem.

Sint duo triacula $\alpha\beta\gamma$ $\delta\epsilon\zeta$, rectos angulos γ ζ habentia,
 et ducantur $\alpha\eta$ $\delta\theta$ sub aequalibus angulis $\beta\alpha\eta$ $\epsilon\delta\theta$, sitque
 $\beta\gamma \cdot \gamma\eta : \alpha\gamma^2 = \epsilon\zeta \cdot \zeta\theta : \delta\zeta^2$; dico esse $\Delta \alpha\beta\gamma \sim \Delta \delta\epsilon\zeta$.

Ducantur rectis $\alpha\eta$ $\delta\theta$ perpendiculares $\alpha\chi$ $\delta\lambda$; est igitur
 $\alpha\gamma^2 = \eta\gamma \cdot \gamma\chi$, et $\delta\zeta^2 = \theta\zeta \cdot \zeta\lambda$; ergo est secundum hypothesim
 $\beta\gamma \cdot \gamma\eta : \eta\gamma \cdot \gamma\chi = \epsilon\zeta \cdot \zeta\theta : \theta\zeta \cdot \zeta\lambda$, id est $\beta\gamma : \gamma\chi = \epsilon\zeta : \zeta\lambda$.
 Ducantur rectis $\alpha\chi$ $\delta\lambda$ parallelae $\gamma\mu$ $\zeta\nu$; ergo est etiam $\beta\mu : \mu\alpha$
 $= \epsilon\nu : \nu\delta$. Et sunt recti anguli $\beta\gamma\alpha$ $\epsilon\zeta\delta$, et anguli $\beta\mu\gamma$ $\epsilon\nu\zeta$
 aequales angulis $\beta\alpha\chi$ $\epsilon\delta\lambda$ (qui quidem inter se aequales sunt,
 quia ex hypothesi $\angle \beta\alpha\eta = \angle \epsilon\delta\theta$, et recti anguli $\eta\alpha\chi$ $\theta\delta\lambda$);
 ergo propter id quod demonstravimus est $\Delta \alpha\beta\gamma \sim \Delta \delta\epsilon\zeta$.

IV. Sint duo triacula $\alpha\beta\gamma$ $\delta\epsilon\zeta$, angulos β ϵ rectos ha-
 bentia, et ducantur $\beta\eta$ $\epsilon\theta$ sub aequalibus angulis $\alpha\eta\beta$ $\delta\theta\epsilon$,
 sitque $\alpha\eta \cdot \eta\gamma : \alpha\beta^2 = \delta\theta \cdot \theta\zeta : \delta\epsilon^2$; demonstretur esse $\Delta \alpha\beta\gamma$
 $\sim \Delta \delta\epsilon\zeta$. Prop. 216

* Haec extrema demonstrationis pars neque integra a librariis tra-
 dita esse videtur neque satis certam explicationem habet. Nam ver-
 bis $\delta\iota\alpha\ \tau\omicron\ \pi\omicron\gamma\gamma\gamma\gamma\alpha\mu\epsilon\nu\omicron\varsigma$ superius lemma II scriptor significare vi-
 detur; at vero illius alia est ratio. Brevem et simplicem demonstra-
 tionem in promptu est suggerere. Est enim

$$\beta\gamma : \gamma\chi = \epsilon\zeta : \zeta\lambda = \epsilon\nu : \nu\delta = \beta\mu : \mu\alpha, \text{ id est vicissim}$$


$$\beta\gamma : \beta\mu = \gamma\chi : \mu\alpha = \epsilon\zeta : \epsilon\nu = \zeta\lambda : \nu\delta, \text{ id est}$$

$$\beta\gamma : \beta\mu = \epsilon\zeta : \epsilon\nu.$$

Suntque anguli $\beta\mu\gamma$ $\epsilon\nu\zeta$ aequales (quoniam anguli $\beta\alpha\chi$ $\epsilon\delta\lambda$ aequales);
 ergo propter elem. 6, 7 anguli $\alpha\beta\gamma$ $\delta\epsilon\zeta$ aequales sunt. Et recti sunt
 anguli $\beta\gamma\alpha$ $\epsilon\zeta\delta$; ergo similia triacula $\alpha\beta\gamma$ $\delta\epsilon\zeta$.

$\alpha\iota\varsigma\ \tau\omicron\ \epsilon\nu\omicron\ \beta\gamma\chi$ B^s cod. Co 13. $\eta\ EZ$ Co pro $\eta\ \epsilon\theta\zeta$ 15. 16. $\tau\alpha\iota\varsigma$
 $\overline{AKJJA}$ A, distincta. BS 18. post $\iota\sigma\alpha\iota\ \delta\epsilon$ add. $\kappa\alpha\iota\ S$ $\gamma\omicron\upsilon\tau\alpha\iota\ \tau\alpha\iota\varsigma$
 Ha , $\kappa\alpha\iota\ \tau\omicron\upsilon\tau\ \alpha\iota\ ABS$, $\kappa\alpha\iota\ \gamma\alpha\rho\ \alpha\iota\ \text{vel}$ $\epsilon\tau\epsilon\iota\ \kappa\alpha\iota\ \alpha\iota\ Co$ 19. $\epsilon\tau\alpha\iota\ \epsilon\text{-}$
 extremo versu A 21. ϵ add. BS 20. 22. $\nu\omicron\iota\varsigma\ \overline{HE}$ A, distincta. BS
 23. $\epsilon\nu\omicron\ \overline{AH BJ \theta E}$ AB, corr. S


Περιγεγράφωσαν κύκλοι, καὶ εἰλήφθω αὐτῶν τὰ κέντρα τὰ K A · φανερόν δὲ ἔστι ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῶν H Θ σημείων εἶσιν. εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω τὸ μὲν K μεταξὺ τῶν Γ H σημείων, τὸ δὲ A μεταξὺ τῶν A Θ , καὶ ἐκβεβλήσθωσαν αἱ BH $E\Theta$ ἐπὶ τὰ M N σημεία, καὶ ἀπὸ τοῦ K ἐπὶ 5



τὴν MB κάθετος ἦχθω ἡ $K\Xi$ · περσέεται ἄρα μεταξὺ τῶν H B , ἀμβλεῖα τε γίνεται ἡ ὑπὸ AHB γωνία καὶ ἔστιν ἴση τῇ ὑπὸ $A\Theta E$ · ἀμβλεῖα ἄρα ἔστιν καὶ ἡ ὑπὸ $A\Theta E$ γωνία· ὁξεία ἄρα ἔστιν ἡ ὑπὸ $A\Theta N$, ὥστε ἡ ἀπὸ τοῦ A ἐπὶ τὴν EN κάθετος ἀγομένη πίπτει μεταξὺ τῶν Θ N . πιπτέτω 10 καὶ ἔστω ἡ AO · ἴση ἄρα ἔστιν ἡ NO τῇ OE , ὥστε μείζων ἔστιν ἡ NO τῆς ΘE · πολλῇ ἄρα ἡ $N\Theta$ τῆς ΘE ἔστιν μείζων, καὶ τὸ ὑπὸ $N\Theta E$, τουτέστιν τὸ ὑπὸ $A\Theta Z$, μείζον ἔστιν τοῦ ἀπὸ $E\Theta$ τετραγώνου. καὶ ἔστιν ὡς τὸ ὑπὸ $A\Theta Z$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘE , οὕτως τὸ ὑπὸ AHI πρὸς τὸ ἀπὸ HB , ὅπερ 15 ἔστιν ἄτοπον· ἔστιν γὰρ καὶ ἑλασσον, ἐπειδήπερ ἑλασσων ἔστιν ἡ MH τῆς HB καὶ τὸ ὑπὸ MHB τοῦ ἀπὸ HB · οὐκ ἄρα τοῦ K κέντρου ὄντος μεταξὺ τῶν H I , τὸ A ἔσται 290 μεταξὺ τῶν A Θ . ἔστω οὖν μεταξὺ τῶν Θ Z , καὶ κατὰ τὰ αὐτὰ ἦχθω ἡ AO κάθετος. ἐπεὶ οὖν ἔστιν ὡς τὸ ὑπὸ 20

4. περιγεγράφω κύκλος ABS , corr. Ha auctore Co 2. τὰ K A
et similiter posthac τῶν $H\Theta$, τῶν ΓH cel. A , distinx. BS 3. εἰσὶν
 Ha pro εἶναι 6. πιπτέτω Ha (conf. Latina) 6. 7. μεταξὺ τῆν
 HB $A(B)$, corr. S 11. ἡ AO ἴση ἄρα εἶσιν ἡ $N\Theta$ AB , ἡ ΘA et cel.
perinde S cod. Co , corr. Co τῇ OE ὥστε $A^2(BS)$ ex τῇ $+E$ + ὥστε

Circumscribantur circuli, et sumantur eorum centra α λ , quae apparet ad easdem partes punctorum η ϑ esse. Nam si fieri possit, sit α quidem inter puncta γ η , λ autem inter δ ϑ , et producantur $\beta\eta$ $\varepsilon\vartheta$ ad puncta circumferentiae μ ν , et a α rectae $\mu\beta$ perpendicularis ducatur $\alpha\xi$. Haec igitur inter η β cadat, unde fit obtusus angulus $\alpha\eta\beta^*$, idemque ex hypothesi aequalis angulo $\delta\vartheta\varepsilon$; ergo hic quoque obtusus est. Acutus igitur est angulus $\delta\vartheta\nu$, ita ut recta ex λ ad $\varepsilon\nu$ perpendicularis ducta inter puncta ϑ ν cadat. Fiat ita, sitque $\lambda\sigma$; est igitur $\nu\sigma = \sigma\varepsilon$, ideoque $\nu\sigma > \vartheta\varepsilon$, eoque magis $\nu\vartheta > \vartheta\varepsilon$, itemque $\nu\vartheta \cdot \vartheta\varepsilon$, id est (elem. 5, 55) $\delta\vartheta \cdot \vartheta\varepsilon^2 > \vartheta\varepsilon^2$. Et ex hypothesi est $\delta\vartheta \cdot \vartheta\zeta : \vartheta\varepsilon^2 = \alpha\eta \cdot \eta\eta' : \eta\beta^2$; ergo absurdum est esse $\delta\vartheta \cdot \vartheta\zeta$ maius quam $\vartheta\varepsilon^2$, quippe cum minus sit. Namque est $\mu\eta < \eta\beta$, itaque $\mu\eta \cdot \eta\beta$, id est $\alpha\eta \cdot \eta\beta < \eta\beta^2$; ergo etiam $\delta\vartheta \cdot \vartheta\zeta < \vartheta\varepsilon^2$. Si igitur centrum α inter puncta η γ sit, non inter puncta δ ϑ erit centrum λ .




Iam sit inter puncta ϑ ζ , et eadem ratione ducatur $\lambda\sigma$ perpendicularis. Quoniam ex hypothesi est

*) Graecum $\piισεῖται ἄρα$ "cadet igitur" vitiosum esse apparet; nam fieri etiam potest, ut punctum ξ in ipsum η , aut inter η μ cadat. Recte igitur Halleius $\piιστεῖται$ scripsisse, itaque Graeco scriptori unius tantum casus demonstrationem ex pluribus qui fingi possunt tribuisse videtur.

12. ἡ NO Co pro ἡ $\overline{NQ}$ πολλὰ — $\eta\zeta$ $\overline{OE}$ bis scripta sunt in A

13. τὸ ἐπὶ (ante $\overline{AQZ}$) Hu pro τοῦ $\overline{AQZ}$ Co pro $\overline{AEZ}$ 16. καὶ om. Ha 19. μεταξὺ τῶν $\overline{AE}$ A(BS), corr. Co

$\Delta\eta\Gamma$, τουτέστιν τὸ ἐπὶ $M\eta B$, πρὸς τὸ ἀπὸ $H B$, τουτέστιν ὡς ἡ $M\eta$ πρὸς $H B$, οὕτως τὸ ἐπὶ $\Delta\theta Z$, τουτέστιν τὸ ἐπὶ $\theta\eta E$ πρὸς τὸ ἀπὸ θE , τουτέστιν ἡ $\theta\eta$ πρὸς θE , καὶ τέτμηται αἱ $B M$ $N E$ διχα τοῖς ΞO , ἔστιν ἄρα ὡς ἡ $B \Xi$ πρὸς ΞH , οὕτως ἡ $E O$ πρὸς $O \theta$. ἀλλὰ καὶ ὡς ἡ $H \Xi$ πρὸς ΞK , οὕτως ἡ θO πρὸς τὴν $O A$ (ὁρθὰ μὲν γὰρ αἱ ΞO , ἴσαι δὲ αἱ πρὸς τοῖς $H \theta$ σημείοις γωνίαι). δι' ἴσου ἄρα ἔστιν ὡς ἡ $B \Xi$ πρὸς ΞK , οὕτως ἡ $E O$ πρὸς $O A$.



καὶ περὶ ἴσας γωνίας· ἴση ἄρα ἔστιν ἡ ἐπὶ τῶν $B K \Xi$ γωνία τῇ ἐπὶ τῶν $E A O$ γωνίᾳ, ἔστιν δὲ καὶ ἡ ἐπὶ $\Xi K H$ γωνία τῇ ἐπὶ $O A \theta$ ἴση· ὅλη ἄρα ἡ ἐπὶ $B K H$ ὅλη τῇ ἐπὶ $E A \theta$ ἔστιν ἴση. καὶ τὰ ἡμίση· καὶ ἡ ἐπὶ τῶν $A \Gamma B$ ἄρα γωνία ἴση ἔστιν τῇ ἐπὶ τῶν $A Z E$. καὶ εἰσὶν ὁρθὰ αἱ $B E$ γωνίαι· ὁμοιον ἄρα ἔστιν τὸ $A B \Gamma$ τρίγωνον τῷ $A E Z$ τριγώνῳ.

- 291 Φανερόν δὲ καὶ τὸ τούτῳ ἀναστρέφειν, ἐὰν ᾗ ὁμοιον τὸ μὲν $A B \Gamma$ τρίγωνον τῷ $A E Z$ τριγώνῳ, τὸ δὲ $H B \Gamma$ τῷ $\theta E Z$, διὸ γίνεται ὡς τὸ ἐπὶ $\Delta\eta\Gamma$ πρὸς τὸ ἀπὸ $H B$, οὕτως τὸ ἐπὶ $\Delta\theta Z$ πρὸς τὸ ἀπὸ θE [διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν τριγώνων].
- 292 Ἔ. Ἐστω δύο τρίγωνα τὰ $A B \Gamma$ $A E Z$, ἴσας ἔχοντα τὰς $A A$ γωνίας μὴ ὁρθὰς δέ, καὶ κάθετοι ἤχθωσαν αἱ $A H$ $A \theta$, ἔστω τε τὸ ἐπὶ τῶν $B H \Gamma$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $A H$, οὕτως τὸ ἐπὶ τῶν $E \theta Z$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $A \theta$, καὶ ἔστω τῶν $B \Gamma$ $E Z$ εὐθειῶν μείζονα τμήματα τῇ $B H$ $E \theta$. λέγω ὅτι ὁμοίόν ἐστιν τὸ μὲν $A B H$ τρίγωνον τῷ $A E \theta$, τὸ δὲ 25 λοιπὸν τῷ λοιπῷ.

$$\alpha\eta \cdot \eta\gamma : \eta\beta^2 = \delta\theta \cdot \theta\zeta : \theta\epsilon^2, \text{ id est}$$

$$\mu\eta \cdot \eta\beta : \eta\beta^2 = \nu\theta \cdot \theta\epsilon : \theta\epsilon^2, \text{ id est}$$

$$\mu\eta : \eta\beta = \nu\theta : \theta\epsilon,$$

et rectae $\beta\mu$ et bifariam secantur in punctis ξ o, est igitur

$\beta\xi : \xi\eta = \epsilon\theta : \theta\theta^*$. Sed propter similitudinem triangulorum $\eta\xi\alpha$ $\theta\alpha\lambda$ (recti enim sunt anguli ξ o et secundum hypothesim aequales anguli η θ) est etiam

$$\eta\xi : \xi\alpha = \theta\alpha : \alpha\lambda; \text{ ex aequali igitur est}$$

$\beta\xi : \xi\alpha = \epsilon\theta : \alpha\lambda$. Suntque haec latera proportionalia circa aequales angulos; ergo

$\angle \beta\xi\alpha = \angle \epsilon\theta\alpha$. Sed est etiam, ut modo demonstravimus

$\angle \xi\alpha\eta = \angle \alpha\lambda\theta$; ergo etiam summae, id est

$\angle \beta\alpha\eta = \angle \epsilon\lambda\theta$. Itemque dimidii anguli aequales sunt; ergo (elem. 3, 20)

$\angle \alpha\gamma\beta = \angle \delta\zeta\epsilon$. Et sunt recti anguli β ϵ ; ergo

$$\Delta \alpha\beta\gamma \sim \Delta \delta\epsilon\zeta.$$

Manifesta est etiam conversa propositio: si sit triangulum $\alpha\beta\gamma$ simile triangulo $\delta\epsilon\zeta$, et triangulum $\eta\beta\gamma$ simile triangulo $\theta\epsilon\zeta$, fieri $\alpha\eta \cdot \eta\gamma : \eta\beta^2 = \delta\theta \cdot \theta\zeta : \theta\epsilon^2$.

V. Sint duo triangula $\alpha\beta\gamma$ $\delta\epsilon\zeta$, angulos α δ aequales Prop. 217 neque tamen rectos habentia, et ducantur perpendiculares $\alpha\eta$ $\delta\theta$, sitque $\beta\eta \cdot \eta\gamma : \alpha\eta^2 = \epsilon\theta \cdot \theta\zeta : \delta\theta^2$, et sint rectorum $\beta\gamma$ $\epsilon\zeta$ maiora segmenta $\beta\eta$ $\epsilon\theta$; dico et triangulum $\alpha\beta\eta$ triangulo $\delta\epsilon\theta$, et reliquum reliquo simile esse.

*) Est enim componendo, tum sumptis antecedentium dimidiis, e contrario, dirimendo, denique rursus e contrario

$$\mu\beta : \eta\beta = \nu\epsilon : \theta\epsilon$$

$$\xi\eta : \beta\xi = \alpha\theta : \epsilon\theta$$

$$\beta\xi : \eta\beta = \epsilon\theta : \theta\epsilon$$

$$\beta\xi : \xi\eta = \epsilon\theta : \alpha\theta.$$


$$\eta\beta : \beta\xi = \theta\epsilon : \epsilon\theta$$

4. τέμνονται Ha 42. υπό EAΘ Ha auctore Co pro υπό EAO
 ἡμίσεια AB Hu, corr. S 16. τὸ τοῦτο ἀναστρέφεται] τοῦτοι ἀνα-
 στρέφονται τὸ ABS, τοῦτο ἀντιστρέφεται τὸ Ha, corr. Hu 19. διὰ —
 τριγώνων interpolatori tribuit Hu 20. ε', sed id paulo supra ante
 φανερόν, add. BS 21. τὰς AA A, distinx. BS ὁρθὰς δέ Co. ὁρθῇ
 τε A BS 22. ξίστω τε idem pro ὥσπερ

Περιγεγράφθωσαν κύκλοι, καὶ ἐκτεβλήσθωσαν αἱ $\Lambda\Theta$ ἐπὶ τὰ $ΚΑ$ σημεῖα, καὶ εἰλήφθω τὰ κέντρα τῶν κύκλων τὰ $ΜΝ$, καὶ ἀπὸ αὐτῶν ἐπὶ τὰς $ΑΚ ΒΓ ΔΑ ΕΖ$ κάθεται αἱ $ΜΞ ΜΟ ΝΗ ΝΡ$. ἔστιν δὴ κατὰ τὰ αὐτὰ τοῖς προγεγραμμένοις ὡς ἡ $ΚΗ$ πρὸς $ΗΑ$, οὕτως ἡ $\Lambda\Theta$ πρὸς $\ThetaΔ$, ὥστε καὶ ὡς ἡ $\LambdaΞ$ πρὸς $\XiΗ$, οὕτως ἡ $\Delta\Pi$ πρὸς $\Pi\Theta$. ἐπεξεύχθωσαν αἱ $\DeltaΜ ΔΝ$. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ $\LambdaΞ$ πρὸς $\XiΗ$, οὕτως ἡ $\DeltaΜ$ πρὸς $ΜΣ$, ὡς δὲ ἡ $\Delta\Pi$ πρὸς $\Pi\Theta$, οὕτως ἡ $\DeltaΝ$ πρὸς $ΝΤ$. καὶ ὡς ἄρα ἡ $\DeltaΜ$ πρὸς $ΜΣ$, οὕτως ἡ $\DeltaΝ$ πρὸς $ΝΤ$. ἐπεξεύχθωσαν δὴ αἱ $ΒΜ ΕΝ$. ἐπεὶ οὖν ὁμοίον ¹⁰ ἔστι τὸ $ΒΑΓ$ τμήμα τῷ $ΕΔΖ$ τμήματι, καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ $ΒΚΓ$ τμήμα λοιπῷ τῷ $ΕΔΖ$ τμήματι ὁμοίων ἔστιν· αἱ ἄρα ἐν αὐτοῖς γωνίαι ἴσαι εἰσίν, καὶ εἰσὶν αὐτῶν καὶ ἡμίσειαι ἴσαι· αἱ ὑπὸ τῶν $ΒΜΟ ΕΝΡ$ ἄρα γωνίαι ἴσαι εἰσίν [ἐπὶ τῆς πρώτης δυάδος τῶν πτώσεων, ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας ἐκ ¹⁵ παραχειμμένου δηλονότι ἔστιν ἴση ἡ ὑπὸ τῶν $ΒΜΟ$ γωνία τῇ ὑπὸ $ΕΝΡ$ · καὶ γὰρ αἱ ἐν τοῖς $ΒΑΓ ΕΔΖ$ τμήμασιν γωνίαι]. γίνεται οὖν ὡς ἡ $ΒΜ$ πρὸς $ΜΟ$, τοιούτως ὡς ἡ $\DeltaΜ$ πρὸς $ΜΟ$, οὕτως ἡ $ΕΝ$ πρὸς $ΝΡ$, τοιούτως ἡ $\DeltaΝ$ πρὸς $ΝΡ$. ἔστιν δὲ καὶ ὡς ἡ $\DeltaΜ$ πρὸς $ΜΣ$, οὕτως ἡ $\DeltaΝ$ ²⁰ πρὸς $ΝΤ$ · δι' ἴσου ἄρα ἔστιν ὡς ἡ $ΜΟ$ πρὸς $ΜΣ$, οὕτως ἡ $ΡΝ$ πρὸς $ΝΤ$. καὶ εἰσὶν ὀρθαὶ μὲν αἱ $ΟΡ$ γωνίαι, ὁξεῖα δὲ ἑκατέρω τῶν $\Sigma Τ$. ἴση ἄρα ἔστιν ἡ ὑπὸ τῶν $ΟΜΣ$ γωνία τῇ ὑπὸ τῶν $ΡΝΤ$ γωνίᾳ. ἀλλὰ καὶ ἡ ὑπὸ τῶν $ΒΜΟ$ τῇ ὑπὸ $ΕΝΡ$ ἔστιν ἴση· καὶ ἡ ὑπὸ τῶν $ΒΜΣ$ ἄρα τῇ ὑπὸ ²⁵ τῶν $ΕΝΤ$ ἔστιν ἴση, ὥστε καὶ ἡ Γ γωνία τῇ $Ζ$ ἔστιν ἴση· ὁμοία ἄρα ἔστιν πάντα πᾶσιν.

2. τὰ $ΚΑ$ et 3. τὰ $\overline{ΜΝ}$ A, *distinx.* BS 3. ἀπ' αὐτῶν BS
 4. ἤχθωσαν ante κάθεται add. Ha εἰσὶν δὲ ἡ $\Lambda(S)$, εἰσὶ δὲ B, ἔστι δὲ Ha 11. ἔστι $\Lambda^{\circ}BS$ 13. καὶ ἡμίσειαι Hu pro κατὰ μέλαν 14. ἐπὶ τῆς πρώτης — 18. γωνίαι interpolatoris tribuit Hu 16. ἔστιν ἴση Hu, ἔστιν ὡς ἴση ABS, ἴση ἔστιν Ha τῶν $ΒΜΟ$ Ha auctore Co pro τῶν $\overline{ΒΜΘ}$ 17. ἐν τοῖς ἐν ἴσοις Ha 18. πρὸς $ΜΟ$ Ha auctore Co pro πρὸς $ΜΘ$, item vs. 19 et 21 22. 23. αὐ $ΟΡ$ — τῶν $\Sigma Τ$ A, *distinx.* BS 24. τῶν $ΒΜΟ$ Co. τῶν $\overline{ΒΟΜ}$ AB, τῶν $\rho\sigma\mu$ S cod. Co 25. ὑπὸ $\overline{ΕΝΡ}$ Co pro ὑπὸ $\overline{ΕΡΝ}$ 27. παντάπασιν AB, *distinx.* S

Circumscribantur circuli, et producantur rectae $\alpha\eta$ $\delta\vartheta$ ad circumferentiarum puncta λ , et sumantur circulorum centra μ ν , a quibus ad rectas $\alpha\gamma$ $\beta\gamma$ $\delta\lambda$ $\epsilon\zeta$ ducantur perpendiculares $\mu\xi$ $\mu\sigma$ $\nu\pi$ $\nu\rho$. Est igitur eadem ratione ac supra



(pag. 984 init.) demonstratum est $\alpha\eta : \eta\alpha = \lambda\vartheta : \vartheta\delta$, itaque etiam $\alpha\xi : \xi\eta = \delta\pi : \pi\vartheta$. Iungantur $\alpha\mu$ $\delta\nu$, quae secant rectas $\beta\gamma$ $\epsilon\zeta$ in punctis σ τ . Sed propter parallelus est $\alpha\xi : \xi\eta = \alpha\mu : \mu\sigma$, et $\delta\pi : \pi\vartheta = \delta\nu : \nu\tau$; ergo etiam $\alpha\mu : \mu\sigma = \delta\nu : \nu\tau$. Iungantur $\beta\mu$ $\epsilon\nu$. Quoniam (propter aequales angulos $\beta\alpha\gamma$ $\epsilon\delta\zeta$) segmentum $\beta\alpha\gamma$ segmento $\epsilon\delta\zeta$ simile est, reliquum igitur segmentum $\beta\alpha\gamma$ simile est reliquo $\epsilon\lambda\zeta$; ergo in his centri anguli $\beta\mu\gamma$ $\epsilon\nu\zeta$ aequales sunt, itemque dimidii $\beta\mu\sigma$ $\epsilon\nu\rho$ aequales. Et sunt recti anguli σ ρ , ideoque similia triangula $\beta\mu\sigma$ $\epsilon\nu\rho$: fit igitur

$\beta\mu : \mu\sigma = \epsilon\nu : \nu\rho$, id est (quia $\alpha\mu = \beta\mu$, et $\delta\nu = \epsilon\nu$)
 $\alpha\mu : \mu\sigma = \delta\nu : \nu\rho$. Sed est, ut supra demonstravimus.
 $\alpha\mu : \mu\sigma = \delta\nu : \nu\tau$; ex aequali igitur est
 $\mu\sigma : \mu\sigma = \nu\rho : \nu\tau$.

Et sunt recti anguli σ ρ , et acuti anguli $\mu\sigma\sigma$ $\nu\rho\rho$; ergo propter elem. 6. 7 similia sunt triangula. ideoque est

$\angle\sigma\mu\sigma = \angle\rho\nu\tau$. Sed est etiam, ut demonstravimus
 $\angle\beta\mu\sigma = \angle\epsilon\nu\rho$; ergo etiam summae, id est
 $\angle\beta\mu\sigma = \angle\epsilon\nu\tau$. Suntque hi centri anguli; ergo etiam, qui sunt in iisdem segmentis, circumferentiae anguli aequales sunt, id est

$\angle \alpha\gamma\beta = \angle \delta\zeta\theta$. Et ex hypothesi est

$\angle \beta\alpha\gamma = \angle \epsilon\delta\zeta$; ergo est

$\Delta \alpha\beta\gamma \sim \Delta \delta\epsilon\zeta$, et $\Delta \alpha\beta\eta \sim \Delta \delta\epsilon\theta$, et $\Delta \alpha\eta\gamma \sim \Delta \delta\theta\zeta$.

Talis igitur est demonstratio, obtusis suppositis angulis $\beta\alpha\gamma \delta\zeta$; quodsi hi anguli acuti sint, simili ratione primum demonstratur esse $\alpha\mu : \mu\sigma = \delta\nu : \nu\tau$. Et quia aequales sunt anguli $\beta\alpha\gamma \delta\zeta$, etiam anguli $\beta\mu\sigma \epsilon\nu\theta$, id est dimidii centrorum anguli, aequales sunt. Tunc rursus eadem ratione ac supra demonstratur angulos $\sigma\mu\theta \theta\nu\tau$ aequales esse. Qui subtrahantur ab aequalibus $\beta\mu\sigma \epsilon\nu\theta$: restant igitur aequales $\beta\mu\sigma \epsilon\nu\tau$. Ergo etiam anguli $\beta\mu\alpha \epsilon\nu\delta$ aequales. Suntque hi centri anguli, et cetera perinde ac supra¹⁾.

Verum etiam, unius casus demonstratione absoluta, alter casus sic potest expediri. Supponatur enim ea quae supra scripta est ratione, si primum obtusi sint anguli, propositionem demonstratam esse, et propositum sit, si acuti sint anguli aequales $\beta\alpha\gamma \delta\zeta$, demonstrare triangulorum similitudinem.

Rursus circumscribantur circuli, et rectis $\alpha\eta \delta\theta$ ad $\kappa \lambda$ productis iungantur $\beta\kappa \kappa\gamma \epsilon\lambda \lambda\zeta$; ergo, quia secundum hypothesim segmenta $\beta\alpha\gamma \epsilon\delta\zeta$ similia sunt, etiam reliqua segmenta $\beta\kappa\gamma \epsilon\lambda\zeta$ similia, ideoque anguli obtusi $\beta\kappa\gamma \epsilon\lambda\zeta$ aequales sunt. Et quia ex hypothesi est

$$\beta\eta \cdot \eta\gamma : \alpha\eta^2 = \epsilon\theta \cdot \theta\zeta : \delta\theta^2, \text{ id est}$$

$$\alpha\eta \cdot \eta\kappa : \alpha\eta^2 = \delta\theta \cdot \theta\lambda : \delta\theta^2, \text{ id est}$$

$$\eta\kappa : \alpha\eta = \theta\lambda : \delta\theta, \text{ est igitur etiam } ^\circ$$

$$\alpha\eta^2 : \eta\kappa^2 = \delta\theta^2 : \theta\lambda^2. \text{ Sed est ex hypothesi}$$

$$\beta\eta \cdot \eta\gamma : \alpha\eta^2 = \epsilon\theta \cdot \theta\zeta : \delta\theta^2; \text{ ergo ex aequali est}$$

$$\beta\eta \cdot \eta\gamma : \eta\kappa^2 = \epsilon\theta \cdot \theta\zeta : \theta\lambda^2.$$

¹⁾ Hunc propositionis casum utique necessarium addidimus, qui librarium culpa, non ipsius Graeci scriptoris negligentia a codice abesse videretur. Et simile quid voluit scholiasta ille qui pag. 982, 14 sqq., loco sane alieno quaedam intexuit. Culus verba $\xi\alpha \pi\alpha\rho\alpha\kappa\epsilon\iota\mu\epsilon\tau\epsilon\upsilon$ hanc vim habere videntur: ex hypothesi est $\angle \beta\alpha\gamma = \angle \epsilon\delta\zeta$; estque $\angle \beta\alpha\gamma = \frac{1}{2} \angle \beta\mu\gamma$, et $\angle \epsilon\delta\zeta = \frac{1}{2} \angle \epsilon\nu\zeta$: sed est etiam $\angle \beta\mu\sigma = \frac{1}{2} \angle \beta\mu\gamma$, et $\angle \epsilon\nu\theta = \frac{1}{2} \angle \epsilon\nu\zeta$; ergo $\angle \beta\mu\sigma = \angle \epsilon\nu\theta$.

ἵσαι ἀμβλείαι αἱ ἐπὶ τῶν $BKΓ$ $ΕΛΖ$ γωνίαι, καὶ κάθεται αἱ KH $ΛΘ$ · διὰ δὲ τὸ προγεγραμμένον, ὅμοιον ἐστί τὸ μὲν BKH τριγώνον τῷ $ΕΛΘ$ τριγώνῳ, τὸ δὲ $ΓΚΗ$ τῷ $ΖΛΘ$, ὥστε καὶ τὸ μὲν $ΑΒΗ$ τριγώνον τῷ $ΔΕΘ$ τριγώνῳ ἐστὶν ὅμοιον, τὸ δὲ $ΑΗΓ$ τῷ $ΙΘΖ$, ὥστε καὶ ὅλον τὸ $ΑΒΓ$ ὅλην τῷ $ΔΕΖ$ ἐστὶν ὅμοιον.

294 γ'. Θέσει δεδομένων τῶν $ΑΒ$ $ΑΓ$, ἀγαγεῖν παρὰ θέσει τὴν $ΔΕ$ καὶ ποιεῖν δοθεῖσαν τὴν $ΔΕ$.

Γεγονέτω, καὶ διὰ τοῦ $Α$ τῇ $ΔΕ$ παράλληλος ἤχθῳ ἢ $ΑΖ$ · παρὰ θέσει ἄρα ἐστίν. καὶ ἐστὶν δοθὲν τὸ $Α$ · 10 θέσει ἄρα ἐστὶν ἢ $ΑΖ$. διὰ δὲ τοῦ $Ε$ τῇ $ΑΒ$ παράλληλος ἤχθῳ ἢ $ΕΖ$ · ἴση ἄρα ἐστὶν ἢ $ΑΖ$ τῇ $ΔΕ$. καὶ δοθεῖσά ἐστὶν ἢ $ΔΕ$ · δοθεῖσα ἄρα ἐστὶν καὶ ἢ $ΑΖ$. ἀλλὰ καὶ θέσει καὶ δοθέν ἐστὶν τὸ $Α$ · δοθέν ἄρα ἐστὶν καὶ τὸ $Ζ$. διὰ δὲ δεδομένον τοῦ $Ζ$ παρὰ θέσει τῇ $ΑΒ$ ἔχεται ἢ $ΖΕ$ · θέσει 13 ἄρα ἐστὶν ἢ $ΖΕ$. θέσει δὲ καὶ ἢ $ΑΓ$ · δοθέν ἄρα ἐστὶν τὸ $Ε$. καὶ διὰ αὐτοῦ παρὰ θέσει ἔχεται ἢ $ΔΕ$ · θέσει ἄρα ἐστὶν ἢ $ΔΕ$.

Συντεθίσσεται δὲ τὸ πρόβλημα οὕτως. ἔστωσαν αἱ μὲν τῇ θέσει δεδομέναι δύο εὐθείαι αἱ $ΑΒ$ $ΑΓ$, ἢ δὲ δοθεῖσα 20 τῷ μεγέθει ἔστω ἢ $Η$, παρ' ἣν δὲ ἄγεται ἔστω ἢ $ΑΖ$, καὶ τῇ $Η$ ἴση κείσθω ἢ $ΑΖ$, καὶ διὰ μὲν τοῦ $Ζ$ τῇ $ΑΒ$ παράλληλος ἤχθῳ ἢ $ΖΕ$, διὰ δὲ τοῦ $Ε$ τῇ $ΑΖ$ παράλληλος ἤχθῳ ἢ $ΕΑ$ · λέγω ὅτι ἢ $ΔΕ$ ποιεῖ τὸ πρόβλημα.

Ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἢ $ΔΕ$ τῇ $ΑΖ$, ἀλλὰ ἢ $ΑΖ$ τῇ $Η$ 25 ἐστὶν ἴση, τοτετέστιν τῇ δοθείσῃ, καὶ ἢ $ΔΕ$ ἄρα ἴση ἐστὶν τῇ $Η$ τῇ δοθείσῃ· ἢ $ΔΕ$ ἄρα ποιεῖ τὸ πρόβλημα. καὶ φανερόν ὅτι μόνῃ· αἰεὶ γὰρ ἢ ἔγγιον τοῦ $Α$ τῆς ἀπώτερόν ἐστιν ἐλάσσων.

1. κάθεται Λ , corr. BS 2. ἐστὶ Λ^s BS αὐτὴν add. Hu 3. ὅμοιον
 AB Co, ἴσον S cod. Co τῷ $ΙΘΖ$ Ha pro τῷ $ΙΖΘ$ 7. ἢ add. BS
12. ἐστὶν ἢ $ΑΓ$ AB, corr. S καὶ δοθεῖσά Ha, δοθεῖσα ἄρα ABS, δο-
θεῖσα δὲ Co 13. ἢ $ΑΖ$ Λ^s ex ἢ Λ 16. καὶ ἢ $ΑΓ$ Ha auctore Co
pro καὶ ἢ $ΗΑΓ$ 17. δι' αὐτοῦ S 21. δὲ ἄγεται Hu, δὲ ἄγεται
ABS, δὲ ἄγεσθαι δεῖ Ha 22. 23. παράλληλος ante ἤχθῳ ἢ $ΖΕ$.
add. S 24. ὅτι ἢ $ΔΕ$ ABS, corr. Co 25. αἰεὶ Ha ἔγγιον Λ ,
corr. BS τῇ $Α$ Hu

295 θ'. Ἐστω δύο ἐπίπεδα τὰ $ABΓ$ EBZ ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας τῆς $BΓ$ ἐφροστώτα, τῇ αὐτῇ ἐπιπέδῳ τῷ ὑποκειμένῳ ὀρθά· λέγω ὅτι ἐν ἐνὶ ἐπιπέδῳ εἰσὶν αἱ AB BE $BΓ$ εὐθεῖαι.


Ἐχθω γὰρ ἀπὸ τοῦ B τῇ $BΓ$ ἐν τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ ὀρθῇ ἡ HB · καὶ τῇ EBZ ἄρα ἐπιπέδῳ ἔσται ὀρθῇ ἡ HB , ὥστε καὶ τῇ BE ἔστιν ὀρθῇ. κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ τῇ AB . ἔστι δὲ καὶ τῇ $BΓ$ εὐθείᾳ ἡ BH ὀρθῇ· ἡ BH ἄρα τρισὶν εὐθείαις ταῖς AB BE $BΓ$ ὀρθῇ ἐπὶ τῆς ἀφῆς τῆς B ἐφράσθηκεν· διὰ ἄρα τὸ α' στοιχείων ἐν ἐνὶ εἰσὶν 10 ἐπιπέδῳ αἱ AB BE $BΓ$ εὐθεῖαι.

296 ι'. Ἐστω δύο τρίγωνα τὰ $ABΓ$ $ΔEZ$, ὀρθὰς ἔχοντα τὰς $ΑΔ$ γωνίας, καὶ διήχθωσαν αἱ $ΑΗ$ $ΔΘ$ ἐν ἴσας γωνίαις ταῖς ὑπὸ $ΑΗΒ$ $ΔΘΕ$, ἔστω δὲ ὡς ἡ BH πρὸς τὴν $HΓ$, οὕτως ἡ $EΘ$ πρὸς τὴν $ΘΖ$ · ὅτι ὁμοίον ἔστιν τὸ μὲν 15 $ΑΒΗ$ τρίγωνον τῷ $ΔΕΘ$ τριγώνῳ, τὸ δὲ $ΑΗΓ$ τῷ $ΔΘΖ$.

Ἐκβεβλήσθω ἡ $ΑΗ$, καὶ πεποιήσθω ὡς ἡ $ΔΘ$ πρὸς $ΘΕ$, οὕτως ἡ $ΓΗ$ πρὸς $ΗΚ$, καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ BK $KΓ$ · ἴση ἄρα ἔστιν ἡ ἐπὸ $ΔΕΘ$ γωνία τῇ ἐπὸ $ΓΚΗ$ γωνίᾳ. ἐπεὶ δὲ ἔστιν ὡς μὲν ἡ BH πρὸς $HΓ$, οὕτως ἡ $EΘ$ πρὸς $ΘΖ$, 20 ὡς δὲ ἡ $ΓΗ$ πρὸς $ΗΚ$, οὕτως ἡ $ΔΘ$ πρὸς $ΘΕ$, δι' ἴσου ἄρα ἔστιν ἐν τεταραγμένῃ ἀναλογίᾳ ὡς ἡ BH πρὸς $ΗΚ$, οὕτως ἡ $ΔΘ$ πρὸς $ΘΖ$. καὶ περὶ ἴσας γωνίας· ἴση ἄρα ἔστιν ἡ ἐπὸ τῶν BKH γωνία τῇ Z γωνίᾳ. ἐδείχθη δὲ καὶ ἡ ὑπὸ $ΓΚΗ$ γωνία ἴση τῇ E , καὶ εἰσὶν αἱ E Z ὀρθῇ 25

1. θ' add. BS τὰ $ABΓ$ EBZ Ha, τὰ BA BZ AS, τὰ $βγ$ $βζ$ B, τὰ $ADΓ$ BZ conī. Hu 2. ἐφροστώτα τῇ Ha pro ἐφροστώτα 3. ὀρθά A^s Ha, ὀρθῶ BS 3. ἐν A^s Ha, καὶ BS 6. τῇ EBZ Ha, τῷ $EΓ$ ABS, τῇ BZ conī. Hu 8. ἔστι δὲ A^s S (ἔστι δὲ B) post εὐθείας add. IH AS, ἡ $Iη$ B 8. 9. ὀρθῇ ἡ BH ἄρα add. Ha 10. τὸ στοιχείον ABS, τὸ δίκαιον πρῶτον στοιχείον Ha, τὰ στοιχεῖα Ge, corr. Hu 12. ι' add. BS 13. τὰς AA A, distinx. S, τὰς $α$ $ζ$ B 15. ὅτι BS, λέγω ὅτι A^s Ha 16. ABH τριγώνον — τῇ $ΔΘΖ$ $ABΓ$ τριγώνον τῷ $ΔΕΖ$ τριγώνῳ τὸ δὲ $ΑΗΓ$ τῷ $ΔΘΖ$ καὶ ἐπὶ τὸ ABH τριγώνον τῷ $ΔΕΘ$ τριγώνῳ ABS, corr. Ha: qui praeterea addit καὶ ὅλον ὅλῳ 22. τῇ ante τεταραγμένῃ add. Ha 25. αἱ EZ AB, distinx. S ὀρθῇ Co pro ὀρθαί


VII. Sint duo plana $\alpha\beta\gamma$ $\epsilon\beta\zeta$ eandem basim $\beta\gamma$ habentia, super idem planum subiunctur normaliter erecta: dico rectas $\alpha\beta$ $\beta\epsilon$ $\beta\gamma$ in eodem plano esse. Prop. 219



Ducatur enim a puncto β in subiecto plano rectae $\beta\gamma$ perpendicularis $\beta\eta$: haec igitur plano $\epsilon\beta\zeta$ perpendicularis erit; itaque etiam rectae $\beta\epsilon$ perpendicularis est. Eadem ratione demonstratur rectam $\beta\eta$ rectae $\alpha\beta$ perpendicularem

esse. Sed etiam rectae $\beta\gamma$ perpendicularis est $\beta\eta$: ergo tribus rectis $\alpha\beta$ $\beta\epsilon$ $\beta\gamma$ perpendicularis in sectionis puncto β insistit recta $\beta\eta$; itaque propter elementorum librum XI (propos. 6) in uno plano sunt rectae $\alpha\beta$ $\beta\epsilon$ $\beta\gamma$.

VIII. Sint duo triangula $\alpha\beta\gamma$ $\delta\epsilon\zeta$, angulos α δ rectos habentia, et ducantur $\alpha\eta$ $\delta\vartheta$ sub aequalibus angulis $\alpha\eta\beta$ $\delta\vartheta\epsilon$. sitque $\beta\eta : \eta\gamma = \epsilon\vartheta : \vartheta\zeta$: dico esse $\Delta \alpha\beta\eta \sim \Delta \delta\epsilon\vartheta$, et $\Delta \alpha\eta\gamma \sim \Delta \delta\vartheta\zeta$. Prop. 220



Producatur $\alpha\eta$, fiatque $\eta\chi : \eta\gamma = \delta\vartheta : \vartheta\epsilon$, et iungantur $\beta\chi$ $\eta\chi$; est igitur ex hypothesi et constructione $\Delta \delta\vartheta\epsilon \sim \Delta \eta\chi$. ideoque $\angle \delta\epsilon\vartheta = \angle \eta\chi\eta$. Sed quia ex hypothesi est $\beta\eta : \eta\gamma = \epsilon\vartheta : \vartheta\zeta$, et ex constructione $\eta\eta : \eta\chi = \delta\vartheta : \vartheta\epsilon$, ex aequali igitur in perturbata proportionem (elem. 5, 25) est $\beta\eta : \eta\chi = \delta\vartheta : \vartheta\zeta$. Suntque haec latera proportionalia circa aequales angulos; ergo similia sunt triangula $\beta\eta\chi$ $\delta\vartheta\zeta$, ideoque $\angle \beta\chi\eta = \angle \delta\zeta\vartheta$. Sed demonstravimus etiam esse $\angle \eta\chi\eta = \angle \delta\epsilon\vartheta$: estque angulorum $\delta\zeta\vartheta$ $\delta\epsilon\vartheta$ summa aequalis recto: ergo etiam

ἴσαι· ἡ ἄρα ἐπὶ ΒΚΓ γωνία ἐστὶν ὀρθή· ἀλλὰ καὶ ἐπὶ
 θεσιν καὶ ἡ ἐπὶ ΒΑΓ γωνία ὀρθή· ἐν κύκλῳ ἄρα ἐστὶν
 τὰ Α Β Γ Κ σημεία· ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ἐπὶ ΑΚΓ, τοι-
 ἐστὶν ἡ ἐπὶ ΔΕΘ, τῇ ἐπὶ ΑΒΓ· ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπὶ ΑΗΒ
 γωνία καὶ ἐπὶ ὁθείαις ἴση ἐστὶν τῇ ἐπὶ ΔΘΕ γωνίᾳ· ὁμοιον
 ἄρα ἐστὶν τὸ ΑΒΗ τρίγωνον τῷ ΔΕΘ τριγώνῳ· κατὰ τὰ
 αὐτὰ καὶ τὸ ΑΗΓ τρίγωνον τῷ ΔΘΖ ἐστὶν ὁμοιον.

Ἄλλως ἄμεινον.

- 297 α'. Τετμήσθωσαν διχα τοῖς Κ Α σημείοις αἱ ΒΓ ΕΖ,
 καὶ ἐτεξεύχθωσαν αἱ ΑΚ ΑΔ. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ἡ ΒΗ 10
 πρὸς ΗΓ, οὕτως ἡ ΕΘ πρὸς ΘΖ, συνθέντι καὶ τὰ ἡμίση
 τῶν ἡγουμένων καὶ ἀναστρέψαντι γίνεται ὡς ἡ ΓΚ, τοι-
 ἐστὶν ἡ ΑΚ, πρὸς ΚΗ, οὕτως ἡ ΑΖ, τοιτέστιν ἡ ΑΔ,
 πρὸς ΑΘ. καὶ εἰσὶν ἴσαι μὲν αἱ πρὸς τοῖς Η Θ σημείοις
 γωνίαι, αἱ δὲ ἐπὶ ΚΑΗ ΑΔΘ ἐκατέρω ἄρα ὀξεῖα· ἴση 15
 ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ἐπὶ ΑΚΗ γωνία τῇ ἐπὶ ΑΔΘ γωνίᾳ.
 καὶ τὰ ἡμίση· καὶ ἡ Β ἄρα γωνία ἴση ἐστὶν τῇ Ε. ἀλλὰ
 καὶ ἡ Η γωνία τῇ Θ ἴση ἐστὶν· ὁμοιον ἄρα ἐστὶν τὸ ΑΒΗ
 τρίγωνον τῷ ΔΕΘ τριγώνῳ. κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ τὸ ΑΗΓ
 τρίγωνον τῷ ΔΘΖ τριγώνῳ ἐστὶν ὁμοιον. 20

Τοῦ ζ' ἡ'.

- 298 α'. Παραλλήλογραμμον ὀρθογώνιον τὸ ΑΓ, καὶ διείχθω
 ἡ ΕΖΑ· ὅτι τὸ ἐπὶ ΕΑΖ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ἐπὶ ΖΒΓ καὶ
 τῷ ἐπὶ ΕΔΓ.

3. τὰ ΑΒ ΓΚ Α, *distinx.* BS 4. ἐπὶ ΔΕΘ Co pro ἐπὶ ΔΖΘ ἐπὶ
 ΔΕΖ Ha 5. ἐπὶ ΔΘΕ Ha auctore Co pro ἐπὶ ΔΕΘ 7. post
 ὁμοιον add. καὶ ὅλον ὅλην Ha, item vs. 20 9. α' add. BS τοῖς
 ΑΔ Α, *distinx.* BS 11. συνθέντι Ha auctore Co pro συντεθήσεται
 12. 13. ἡ ΗΓΚ τοιτέστιν ὡς ἡ ΑΚ Α, BS, corr. Ha partim auctore Co
 15. ΑΔΘ Ha auctore Co pro ΑΔΘ 19. 20. τὸ ΑΚ τρίγωνον τῷ
 ΑΔΖ ABS, corr. Ha auctore Co 21. τοῦ Ζ Η Α, τοῦ ἐξιδόμου καὶ
 τοῦ ὀρθοῦ BS, ad quae τῶν πωτικῶν λήμματα add. S 22. α' add.
 BS 23. ἡ ΕΖΑ Co pro ἡ ΕΖ 23. 24. ἐπὶ ΖΓΒ καὶ τῷ ἐπὶ
 ΕΓΔ ABS, corr. Co

angulorum $\beta\alpha\gamma$, $\gamma\alpha\epsilon$ summa, id est angulus $\beta\alpha\gamma$ rectus est. Sed ex hypothesis etiam angulus $\beta\alpha\gamma$ rectus est; in circuli igitur circumferentia sunt puncta α , β & γ ; ergo est in segmento $\alpha\gamma$

$\angle \alpha\gamma\epsilon = \angle \alpha\beta\gamma$, id est, quia demonstravimus esse $\angle \gamma\alpha\epsilon$,
sive $\alpha\gamma\epsilon = \angle \delta\epsilon\theta$,

$\angle \delta\epsilon\theta = \angle \alpha\beta\gamma$. Sed ex hypothesis est etiam


$\angle \alpha\gamma\beta = \angle \delta\theta\epsilon$; ergo est

$\Delta \alpha\beta\gamma \sim \Delta \delta\epsilon\theta$. Et eadem ratione demonstratur esse

$\Delta \alpha\gamma\epsilon \sim \Delta \delta\theta\zeta$.

Aliter melius.

Bifariam secantur $\beta\gamma$ & $\epsilon\zeta$ in punctis κ & λ , et iungantur $\alpha\kappa$ & $\delta\lambda$. Iam quia ex hypothesis est $\beta\gamma : \gamma\epsilon = \epsilon\theta : \theta\zeta$, componendo fit



$\beta\gamma : \gamma\epsilon = \epsilon\zeta : \theta\zeta$, et sumptis antecedentium dimidiis

$\gamma\kappa : \kappa\gamma = \epsilon\lambda : \lambda\theta$, et convertendo

$\gamma\kappa : \kappa\gamma = \epsilon\lambda : \lambda\theta$, id est, quia semicirculorum radii
sunt $\gamma\kappa$ & $\alpha\kappa$ et $\epsilon\lambda$ & $\delta\lambda$,

$\alpha\kappa : \kappa\gamma = \delta\lambda : \lambda\theta$.


Et ex hypothesis aequales sunt anguli $\alpha\gamma\kappa$ & $\delta\theta\lambda$, et acuti anguli $\kappa\alpha\gamma$ & $\lambda\delta\theta$; ergo propter elem. 6. 7 similia sunt triangu-
la. ideoque anguli $\alpha\kappa\gamma$ & $\delta\lambda\theta$ aequales. Item dimidii, id est
 $\angle \alpha\beta\gamma = \angle \delta\epsilon\theta$. Sed ex hypothesis etiam $\angle \alpha\gamma\beta = \angle \delta\theta\epsilon$;
ergo $\Delta \alpha\beta\gamma \sim \Delta \delta\epsilon\theta$. Eadem ratione demonstratur etiam
esse $\Delta \alpha\gamma\epsilon \sim \Delta \delta\theta\zeta$.

LEMATA IN CONICORUM LIBROS VII ET VIII.

1. Sit parallelogrammum orthogonium $\alpha\beta\gamma\delta$, et a pro- Prop.
ducta $\delta\gamma$ ducatur quavis recta $\epsilon\zeta\alpha$: dico esse $\epsilon\alpha \cdot \alpha\zeta =$ 221
 $\gamma\delta \cdot \delta\epsilon + \epsilon\delta \cdot \delta\gamma$.

Ἐπεὶ γὰρ τὸ ἀπὸ τῆς EZ ἴσον ἐστὶν τοῖς ἀπὸ τῶν EE, FZ , ὧν τὰ ἀπὸ τῶν EA, AZ τετράγωνα ἴσα ἐστὶν τοῖς ἀπὸ τῶν EA, AA , τουτέστιν τοῖς ἀπὸ τῶν EA, FB , καὶ τοῖς ἀπὸ τῶν AB, BZ , τουτέστιν τοῖς ἀπὸ τῶν GA, BZ τετραγώνοις, λοιπὸν ἄρα τὸ δις ἐπὶ τῶν EAZ ἴσον ἐστὶν τῷ τε δις ἐπὶ τῶν EA, AF καὶ τῷ δις ἐπὶ τῶν ZB, BF · καὶ τὸ ἅπαξ ἄρα ἐπὶ τῶν EAZ ἴσον 10 ἐστὶν τῷ τε ἐπὶ EA, AF καὶ τῷ ἐπὶ ZB, BF , ὅπερ· ~

299 β. Παράλληλόγραμμον ὁρθογώνιον τὸ AF , καὶ διήχθω ἡ EAZ . ὅτι τὸ ἐπὶ τῶν EA, AF μετὰ τοῦ ἐπὶ FBZ ἴσον ἐστὶν τῷ ἐπὶ EAZ .



300 γ. Ἐστω μείζων ἡ AB τῆς GA , καὶ ἴσον τὸ ἐπὶ AEB τῷ ἐπὶ GZA , καὶ ἔστω μείζων τμήματα τὰ AE, FZ . ὅτι μείζων ἐστὶν ἡ AE τῆς FZ . 25

Τετμήσθωσαν ὅλαι αἱ AB, GA δίχα τοῖς H, Θ σημείοις· μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ HB τῆς $A\Theta$, ὥστε καὶ τὸ

2. ὡν BS , ὡν A , καὶ Co 4. τῶν EA, F, AB , τῶν ED, γ, S , corr. Co
 6. post τετραγώνους auctore Co add. Ha : ἀλλὰ τὸ μὲν ἀπὸ EZ μετὰ τοῦ δις ἐπὶ EAZ ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ EA, AZ , τὰ δ' ἀπὸ FE, FZ μετὰ τοῦ δις ἐπὶ EA, F καὶ τοῦ δις ἐπὶ ZB, F ἴσα ἐστὶ τοῖς τε ἀπὸ EA, BF καὶ τοῖς ἀπὸ τῶν GA, BZ τετραγώνοις 9. ante ZB, BF in A additionem B , sed id del. prima m. 11. ὅπερ BS , ὁ A 12. β' add. BS
 14. ἐπὶ EAZ A Co , ἐπὶ ED BS cod. Co 18. τετραγώνων AB , corr. S 19. AF (post τῶν EA Co pro FZ 24. 25. τῶν FBZ Hu τῶν ZBF Ha) auctore Co pro τῶν ZF 26. καὶ τὸ ἅπαξ καὶ τὸ ἀπο-
 απαξ A BS , corr. Ha τῶν τοῖς $coni.$ Hu 33. γ' add. BS

Quoniam enim est $\epsilon_{\Sigma}^2 = \epsilon\gamma^2 + \gamma_{\Sigma}^2$, et

$$\epsilon\alpha^2 + \alpha_{\Sigma}^2 = \epsilon\delta^2 + \delta\alpha^2 + \alpha\beta^2 + \beta_{\Sigma}^2, \text{ id est}$$

$$= \epsilon\delta^2 + \beta\gamma^2 + \gamma\delta^2 + \beta_{\Sigma}^2, \text{ et propter elem.}$$

$$2. 4 \text{ est } \epsilon\alpha^2 = \epsilon_{\Sigma}^2 + \alpha_{\Sigma}^2 + 2\epsilon_{\Sigma} \cdot \alpha_{\Sigma}.$$

ideoque

$$\epsilon\alpha^2 + \alpha_{\Sigma}^2 = \epsilon_{\Sigma}^2 + 2\alpha_{\Sigma}^2 + 2\epsilon_{\Sigma} \cdot \alpha_{\Sigma}, \text{ id est}$$

$$= \epsilon_{\Sigma}^2 + 2\epsilon\alpha \cdot \alpha_{\Sigma}, \text{ est igitur}$$

$$2\epsilon\alpha \cdot \alpha_{\Sigma} = \epsilon\delta^2 + \gamma\delta^2 + \beta\gamma^2 + \beta_{\Sigma}^2 - \epsilon_{\Sigma}^2. \text{ Sed est}$$

(propter elem. l. c. et communi addito $\gamma\delta^2$)

$$\epsilon\delta^2 + \gamma\delta^2 = \epsilon\gamma^2 + 2\epsilon\delta \cdot \delta\gamma, \text{ itemque (com-}$$

$$\text{muni addito } \beta_{\Sigma}^2,$$

$$\beta\gamma^2 + \beta_{\Sigma}^2 = \gamma_{\Sigma}^2 + 2\gamma\beta \cdot \beta_{\Sigma}, \text{ et primo de-}$$

$$\text{monstratum est } \epsilon_{\Sigma}^2 = \epsilon\gamma^2 + \gamma_{\Sigma}^2;$$

ergo subtractione facta restat

$$2\epsilon\alpha \cdot \alpha_{\Sigma} = 2\epsilon\delta \cdot \delta\gamma + 2\gamma\beta \cdot \beta_{\Sigma}, \text{ itaque}$$

$$\epsilon\alpha \cdot \alpha_{\Sigma} = \epsilon\delta \cdot \delta\gamma + \gamma\beta \cdot \beta_{\Sigma}, \text{ q. e. d.}$$

II. Sit parallelogrammum $\alpha\beta\gamma\delta$, et inter productas $\gamma\beta$ $\gamma\delta$ Prop. 222
ducatur quævis recta $\zeta\alpha\epsilon$: dico esse (perinde ac supra
 $\epsilon\delta \cdot \delta\gamma + \gamma\beta \cdot \beta_{\Sigma} = \epsilon\alpha \cdot \alpha_{\Sigma}$.

Quoniam enim est $\epsilon_{\Sigma}^2 = \epsilon\gamma^2 + \gamma_{\Sigma}^2$, et


$$\epsilon\alpha^2 + \alpha_{\Sigma}^2 = \epsilon\delta^2 + \delta\gamma^2 + \gamma\beta^2 + \beta_{\Sigma}^2: \text{ ergo similiter ac}$$

$$\text{supra demonstratur esse}$$

$$2\epsilon\alpha \cdot \alpha_{\Sigma} = 2\epsilon\delta \cdot \delta\gamma + 2\gamma\beta \cdot \beta_{\Sigma}, \text{ itaque}$$

$$\epsilon\alpha \cdot \alpha_{\Sigma} = \epsilon\delta \cdot \delta\gamma + \gamma\beta \cdot \beta_{\Sigma}.$$

III. Sit $\alpha\beta > \gamma\delta$. et $\alpha\epsilon \cdot \epsilon_{\beta} = \gamma_{\Sigma} \cdot \zeta\delta$, sintque maiora Prop. 223
segmenta $\alpha\epsilon$ γ_{Σ} : dico esse $\alpha\epsilon > \gamma_{\Sigma}$.



Bifariam secantur totæ $\alpha\beta$ $\gamma\delta$ in punctis τ θ :
est igitur $\tau_{\beta} > \theta\delta$, itaque etiam

23. 24. $\Gamma\alpha\sigma\eta$ $\tau\eta$ $\epsilon\pi\acute{o}$ $\overline{AEB}$ $\gamma\omega\rho\tau\alpha$ $\tau\eta\epsilon$ $\epsilon\pi\acute{o}$ $\overline{\Gamma\zeta\delta}$ $A'B$, $\Gamma\alpha\sigma\eta$ η $\epsilon\pi\acute{o}$ cet.
cod. Co. $\Gamma\alpha\eta$ η $\epsilon\pi\acute{o}$ cet. Paris. 2868, $\Gamma\alpha\eta$ η η $\epsilon\pi\acute{o}$ cet. S, corr. Co

24. $\mu\epsilon\iota\zeta\omega$ B'S, $\mu\epsilon\iota\zeta\omega\alpha$ A, $\mu\epsilon\iota\zeta\omega\alpha$ Ha $\tau\mu\acute{\eta}\mu\alpha\tau\alpha$ $\tau\acute{\alpha}$ BS, $\tau\mu\acute{\eta}\mu\alpha\tau\alpha$ $\alpha\iota$
A' Ha 26. $\alpha\iota$ $\delta\lambda\alpha\iota$ $\alpha\iota$ ABS, corr. Ha $\tau\omicron\iota\varsigma$ $H\theta$ A. distinx. BS

27. $\tau\eta\varsigma$ $\overline{AE}$ $\delta\omega\sigma\tau\epsilon$ $\kappa\alpha\iota$ $\tau\acute{\alpha}$ ABS, corr. Co

ἀπὸ HB μείζον τοῦ ἀπὸ $ΔΘ$ τετραγώνου. ἔστιν δὲ καὶ τὸ
ἐπὶ τὸ $ΑΕΒ$ ἴσον τῷ ἐπὶ τὸ $ΓΖΔ$ · καὶ τὸ ἀπὸ HE ἄρα μείζον
ἐστὶν τοῦ ἀπὸ $ΘΖ$ · μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ HE τῆς $ΘΖ$. ἔστι
δὲ καὶ ἡ $ΑΗ$ μείζων τῆς $ΓΘ$ · ὅλη ἄρα ἡ $ΑΕ$ ὅλης τῆς $ΓΖ$
μείζων ἐστίν.

- 301 δ'. Ἰσον τὸ ἐπὶ $ΑΕΒ$ τῷ ἐπὶ $ΓΖΔ$, ἴσων οὖσων τῶν
 $ΑΒ$ $ΓΔ$ · ὅτι τὰ μείζονα τμήματα τὰ $ΑΕ$ $ΓΖ$ ἴσα ἐστίν. τὸ
δ' ἐφεξῆς· τετμήσθωσαν γὰρ αἱ $ΑΒ$ $ΓΔ$ δίχα τοῖς $ΗΘ$ · ~)
- 302 ε'. Ἐστω μὲν μείζων ἡ $ΑΒ$ τῆς $ΓΔ$, ἐλάσσων δὲ ἡ
 $ΒΕ$ τῆς $ΔΖ$, οὓς μείζονος τῆς μὲν $ΑΒ$ τῆς $ΒΕ$, τῆς δὲ 10
 $ΓΔ$ τῆς $ΔΖ$ · ὅτι ἡ τῶν $ΑΒ$ $ΒΕ$ ὑπεροχὴ μείζων ἐστὶν τῆς
τῶν $ΓΔ$ $ΔΖ$ ὑπεροχῆς.

Ἐπεὶ γὰρ μείζων ἐστὶν ἡ $ΑΒ$ τῆς $ΓΔ$, καὶ ἡ τῶν $ΑΒ$
 $ΒΕ$ ὑπεροχὴ ἄρα μείζων ἐστὶν τῆς τῶν $ΓΔ$ $ΕΒ$ ὑπεροχῆς.
ἀλλὰ ἡ τῶν $ΓΔ$ $ΕΒ$ μείζων ἐστὶν τῆς τῶν $ΓΔ$ $ΔΖ$ ὑπερ-
15 οχῆς· ἐλάσσων γὰρ ἐστὶν ἡ $ΕΒ$ τῆς $ΔΖ$, ὥστε ἡ τῶν $ΑΒ$ $ΒΕ$
ὑπεροχὴ πολλῇ μείζων ἐστὶν τῆς τῶν $ΓΔ$ $ΔΖ$ ὑπεροχῆς.

- 303 ζ'. Ἐστω ἴση ἡ μὲν $ΑΒ$ τῇ $ΒΓ$, ἡ δὲ $ΔΕ$ τῇ $ΕΖ$ · ὅτι
τὸ ἐπὶ $ΑΓ$ $ΔΖ$ τετραπλάσιόν ἐστιν τοῦ ἐπὶ $ΑΒ$ $ΔΕ$.

Ἐπεὶ γὰρ διπλῇ ἐστὶν ἡ $ΓΔ$ τῆς $ΑΒ$, κοινὸν ὕψος ἡ 20
 $ΔΕ$ τὸ ἄρα ἐπὶ $ΓΔ$ $ΔΕ$ διπλάσιόν ἐστιν τοῦ ἐπὶ $ΑΒ$ $ΔΕ$.
πάλιν ἐπεὶ διπλῇ ἐστὶν ἡ $ΔΖ$ τῆς $ΔΕ$, κοινὸν ὕψος ἡ $ΑΓ$
τὸ ἄρα ἐπὶ $ΑΓ$ $ΔΖ$ διπλάσιόν ἐστιν τοῦ ἐπὶ $ΑΓ$ $ΔΕ$.
ἀλλὰ τὸ ἐπὶ $ΑΓ$ $ΔΕ$ τοῦ ἐπὶ $ΑΒ$ $ΔΕ$ διπλάσιόν ἐστιν· τὸ
ἄρα ὑπὸ $ΑΓ$ $ΔΖ$ τετραπλάσιόν ἐστιν τοῦ ὑπὸ $ΑΒ$ $ΔΕ$.

- 304 ζ'. Ἐστω ὡς μὲν ἡ $ΑΒ$ πρὸς τὴν $ΒΓ$, οὕτως ἡ $ΔΕ$
πρὸς τὴν $ΕΖ$, ὡς δὲ ἡ $ΑΒ$ πρὸς τὴν $ΒΗ$, οὕτως ἡ $ΔΕ$
πρὸς τὴν $ΕΘ$ · ὅτι γίνεται ὡς τὸ ἐπὶ τῶν $ΑΒΗ$ πρὸς τὸ
ἐπὶ τῶν $ΑΗΓ$, οὕτως τὸ ἐπὶ τῶν $ΔΕΘ$ πρὸς τὸ ἐπὶ τῶν
 $ΔΟΖ$.

1. ἀπὸ HB AB , ἀπὸ HE S *cod.* Co μείζων A , μείζω BS , *corr.*
 Co δὲ καὶ δὲ καὶ ὑπόθεσιν *conl.* Hu 3. μείζων ἄρα A , *corr.*
 BS τῆς $ΘΖ$ Ha *auctore* Co *pro* τῆς $ΘΖ$ · ἐστὶ $A^o S$ ἐστὶ B_1
6. δ' *add.* BS 7. ἴσα *add.* Co 7. 8. τὸ δευτῆς τμήματα γὰρ τῶν
 AB $ΓΔ$ δίχα τοῖς $ΗΘ$ · ~ A , τὸ δ' ἐγ' ἥς τμήματα γὰρ τὰ αὖ γδ
δίχα τοῖς $η θ$ B *et similiter* S , τετμήσθωσαν *corr.* Co , τὸ δ' ἐφεξῆς

$r\beta^2 > \vartheta\delta^2$, id est propter elem. 2. 5

$ae \cdot \varepsilon\beta + r\varepsilon^2 > \gamma\zeta \cdot \zeta\delta + \vartheta\zeta^2$. Et ex hypothesi est

$ae \cdot \varepsilon\beta = \gamma\zeta \cdot \zeta\delta$; ergo est

$r\varepsilon^2 > \vartheta\zeta^2$, itaque $r\varepsilon > \vartheta\zeta$. Sed est etiam $ar_i > \gamma\vartheta$:

ergo

$ar_i + r\varepsilon > \gamma\vartheta + \vartheta\zeta$, id est $ae > \gamma\zeta$.

IV. Sit $ae \cdot \varepsilon\beta = \gamma\zeta \cdot \zeta\delta$, et aequales $\alpha\beta \gamma\delta$; dico maiora Prop. 224
segmenta $ae \gamma\zeta$ aequalia esse.

" η ε β γ ϑ ζ δ

Nam bifariam secantur $\alpha\beta \gamma\delta$ in punctis $r_i \vartheta$ et cet.

V. Sit $\alpha\beta > \gamma\delta$, et $\beta\varepsilon < \delta\zeta$, atque $\alpha\beta > \beta\varepsilon$, et $\gamma\delta > \delta\zeta$; Prop. 225
dico esse $\alpha\beta - \beta\varepsilon > \gamma\delta - \delta\zeta$.

" β ε γ δ ζ

Quoniam enim est $\alpha\beta > \gamma\delta$, est etiam $\alpha\beta - \beta\varepsilon > \gamma\delta - \beta\varepsilon$.
Sed est $\gamma\delta - \beta\varepsilon > \gamma\delta - \delta\zeta$ est enim $\beta\varepsilon < \delta\zeta$: ergo multo
maior est differentia $\alpha\beta - \beta\varepsilon$ quam $\gamma\delta - \delta\zeta$.

VI. Sit $\alpha\beta = \beta\gamma$, et $\delta\varepsilon = \varepsilon\zeta$; dico esse $\alpha\gamma \cdot \delta\zeta = \frac{1}{2} \alpha\beta \cdot \delta\varepsilon$. Prop. 226

Quoniam enim est $\alpha\gamma = 2\alpha\beta$, facta
multiplicatione per $\delta\varepsilon$ est $\alpha\gamma \cdot \delta\varepsilon = 2\alpha\beta \cdot \delta\varepsilon$. Rursus quia $\delta\zeta = 2\delta\varepsilon$, facta
multiplicatione per $\alpha\gamma$ est $\alpha\gamma \cdot \delta\zeta = 2\alpha\gamma \cdot \delta\varepsilon$. Sed est $\alpha\gamma \cdot \delta\varepsilon = 2\alpha\beta \cdot \delta\varepsilon$; ergo $\alpha\gamma \cdot \delta\zeta = \frac{1}{2} \alpha\beta \cdot \delta\varepsilon$.

VII. Sit $\alpha\beta : \beta\gamma = \delta\varepsilon : \varepsilon\zeta$, et $\alpha\beta : \beta\gamma = \delta\varepsilon : \varepsilon\vartheta$; dico Prop. 217
fieri $\alpha\beta \cdot \beta\gamma : \alpha\gamma \cdot r\gamma = \delta\varepsilon \cdot \varepsilon\vartheta : \delta\vartheta \cdot \vartheta\zeta$.

Hu, pro quibus $\chi\alpha\lambda$ τὰ ἐπεξεῖς in line add. Ha 9. ε' add. BS
13. 14. ἡ AB — μέζων ἔστιν add. Hu auctore Co. qui sic dedit: ἡ
AB τῆς ΓΔ, μέζων ἄρα ἔσται add. Ha) ἡ τῶν AB HE ἐπιροχὴ cet.
15. τῶν ΓΔEB A, distinx. BS 16. γὰρ A'S, ἄρα B 18. ε' add.
BS η δὲ δὲ τῇ δὲ S, ἡ δὲ AK τῇ KZ Ha et sic idem toto hoc lemmate
K ponit pro E δὲ om. A, add. BS 19. ἐπὶ ΑΓΑΖ A, distinx. BS
23. τῆς JE Ge auctore Co pro τῆς ZE 24. ἀλλὰ τὸ ἐπὶ ΑΓ ΑΖ
τοῦ ἐπὶ ΑΓ JE ABS, corr. Co 24. 25. διπλασίον ἔστιν add. Hu auc-
tore Co. reliqua ipse Co 26. ε' add. BS η JE ἡ AK Ha et sic
toto hoc lemmate K pro E 28. 29. τῶν AHB πρὸς τὸ ἐπὶ τῶν ABΓ
ABS, corr. Co 29. 30. τῶν ΑΘΖ Co. τῶν ΑΓΖ ABS. τῶν ΖΘΔ Ha

Ἐπεὶ γὰρ ἔστιν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν BH , οὕτως ἡ AE πρὸς τὴν EO , ἀναστρέψαντί· ἔστιν ὡς ἡ BA πρὸς τὴν AH , οὕτως ἡ EA πρὸς τὴν AO . ὥστε καὶ ὡς τὸ ἀπὸ BA πρὸς τὸ ἀπὸ AH , οὕτως τὸ ἀπὸ AB πρὸς τὸ ἀπὸ AO . ἀλλὰ καὶ ὡς τὸ ἀπὸ AB πρὸς τὸ ἐπὶ ABH , οὕτως τὸ ἀπὸ AE πρὸς τὸ ἐπὶ $AEΘ$. καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ AH πρὸς τὸ ἐπὶ ABH , οὕτως τὸ ἀπὸ AO πρὸς τὸ ἐπὶ $AEΘ$. ἔπει δὲ ὑπάρχειται ὡς ἡ AB πρὸς τὴν $BΓ$, οὕτως ἡ AE πρὸς τὴν EZ , ἀνάπαλιν καὶ συνθέντι ὡς ἄρα ἡ GA πρὸς AB , οὕτως ἡ ZA πρὸς AE . ἔστιν δὲ καὶ ὡς ἡ BA πρὸς AH ,¹⁰ οὕτως ἡ EA πρὸς τὴν AO . δι' ἵσον ἄρα ἔστιν ὡς ἡ GA πρὸς AH , οὕτως ἡ ZA πρὸς AO . καὶ ὡς ἄρα ἡ $ΓH$ πρὸς HA , οὕτως ἡ $ZΘ$ πρὸς AO , καὶ ὡς τὸ ἐπὶ πρὸς τὸ ἀπὸ, οὕτως τὸ ἐπὶ πρὸς τὸ ἀπὸ. ἀλλὰ καὶ ὡς τὸ ἀπὸ AH πρὸς τὸ ἐπὶ ABH , οὕτως τὸ ἀπὸ AO πρὸς τὸ ἐπὶ $AEΘ$.¹⁵ καὶ ὡς ἄρα τὸ ἐπὶ ABH πρὸς τὸ ἐπὶ $AHΓ$, οὕτως τὸ ἐπὶ $AEΘ$ πρὸς τὸ ἐπὶ AOZ .

305 γ'. Ἐστω δοθέντα συναμφοτέρα τὰ ἀπὸ τῶν AB $BΓ$, καὶ δοθεῖσα ἡ τῶν ἀπὸ AB $BΓ$ ὑπεροχή· ὅτι δοθεῖσά ἔστιν ἑκατέρα τῶν AB $BΓ$.²⁰

Κείσθω γὰρ τῇ GB ἴση ἡ BA . δοθέν ἄρα ἔστιν καὶ τὸ ἐπὶ τῶν $ΓAA$ (ὑπεροχὴ γὰρ ἔστιν τῶν ἀπὸ AB $BΓ$ τετραγώνων). ἀλλὰ καὶ τὸ δις ἐπὶ τῶν $ΓAA$ δοθέν ἔστιν (ἔπει καὶ τὸ ἐπὶ $ΓAA$ δοθέν ἔστιν). δοθέν ἄρα ἔστιν καὶ τὸ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς $ΓA$ AA , ὥστε δοθεῖσά ἔστι²⁵

4. ἀπὸ EO ante ἀλλὰ; ABS, corr. Ha auctore Co 5. ἐπὶ B, ἀπὸ A'S 6. ἐπὶ (ante $AEΘ$) A, ἀπὸ B'S cod. Co 7. πρὸς τὸ ἐπὶ AEZ ABS, corr. Co 8. καὶ συνθέντι Ha pro συνθέντι καὶ πρὸς AB A'S, πρὸς τὴν AB B 9. οὕτως ἡ EA Ge auctore Co pro οὕτως ἡ EA 10. πρὸς AH Ha auctore Co pro πρὸς AH 11. 12. καὶ ὡς τὸ ἐπὶ πρὸς τὸ ἀπὸ τοῦ πρὸς τὸ ἀπὸ ABS, corr. Co, idem formulam a scriptore breviter adumbratam sic explevit: καὶ ὡς τὸ ἐπὶ $ΓHA$ πρὸς τὸ ἀπὸ AH , οὕτως τὸ ἐπὶ $ZΘA$ πρὸς τὸ ἀπὸ OA 13. ἀπὸ AO Ha auctore Co pro ἀπὸ AE 14. πρὸς τὸ ἀπὸ AEZ AB, ἐπὶ corr. S. AOZ Co 15. γ' add. BS συναμφοτέρα add. Ha auctore Co 16. καὶ δοθέντα ἡ AB, corr. S 17. ἄρα Co pro ὅτι ἄρα 18. 19. καὶ

Quoniam enim est

$$\begin{array}{c} \alpha \quad \eta \quad \beta \quad \gamma \\ \hline \delta \quad \epsilon \quad \zeta \end{array} \quad \alpha\beta : \beta\gamma = \delta\epsilon : \epsilon\zeta, \text{ con-} \\ \text{vertendo est } \alpha\beta : \alpha\eta \\ = \delta\epsilon : \delta\zeta, \text{ itaque} \\ \text{etiam}$$

$$\alpha\beta^2 : \alpha\gamma^2 = \delta\epsilon^2 : \delta\zeta^2. \text{ Sed est etiam}$$

$$\alpha\beta^2 : \alpha\beta \cdot \beta\gamma = \delta\epsilon^2 : \delta\epsilon \cdot \epsilon\zeta; \text{ ergo etiam}$$

$$\alpha\gamma^2 : \alpha\beta \cdot \beta\gamma = \delta\zeta^2 : \delta\epsilon \cdot \epsilon\zeta. \text{ Sed quia ex hypothesi est}$$

$$\alpha\beta : \beta\gamma = \delta\epsilon : \epsilon\zeta, \text{ e con-}$$

trario et componendo est

$$\alpha\gamma : \alpha\beta = \delta\zeta : \delta\epsilon. \text{ Sed est}$$

$$\text{etiam } \alpha\beta : \alpha\eta = \delta\epsilon : \delta\zeta;$$

ex aequali igitur est $\alpha\gamma : \alpha\eta$

$$= \delta\zeta : \delta\zeta; \text{ itaque diri-}$$

$$\text{mendo } \eta\gamma : \alpha\eta = \zeta\epsilon : \delta\zeta;$$

ergo etiam multiplicando

$$\alpha\eta \cdot \eta\gamma : \alpha\eta^2 = \delta\zeta \cdot \zeta\epsilon : \delta\zeta^2; \text{ ergo etiam}$$

$$\alpha\beta \cdot \beta\gamma : \alpha\eta \cdot \eta\gamma = \delta\epsilon \cdot \epsilon\zeta : \delta\zeta \cdot \zeta\epsilon.$$

VIII. Sit data et summa et differentia quadratorum ex Prop. 228

 $\alpha\beta \cdot \beta\gamma$; dico ipsas $\alpha\beta \cdot \beta\gamma$ datas esse.

Putamus iam inven-

$$\begin{array}{c} \alpha \quad \delta \quad \beta \quad \gamma \\ \hline \end{array} \text{tas esse } \alpha\beta \cdot \beta\gamma; \text{ ac} \\ \text{ponatur } \beta\delta = \beta\gamma;$$


ergo datum est $\alpha\gamma \cdot \alpha\delta$ est enim propter elem. 2, 6 aequale datae differentiae $\alpha\beta^2 - \beta\gamma^2$. Sed datum est etiam duplum, scilicet $2\alpha\gamma \cdot \alpha\delta$, cui addatur data summa $\alpha\beta^2 + \beta\gamma^2$ duplicata, id est $\alpha\gamma^2 + \alpha\delta^2$. Sed propter elem. 2, 4 est $\alpha\gamma^2 + \alpha\delta^2 + 2\alpha\gamma \cdot \alpha\delta = (\alpha\gamma + \alpha\delta)^2$; ergo datum est $(\alpha\gamma + \alpha\delta)^2$.

*) Sic demonstrationem a Graeco scriptore brevissime contractam et ne ab Halleio quidem, ut videtur, satis illustratam explevimus. Nimirum est data summa $\alpha\beta^2 + \beta\gamma^2$; ergo etiam dupla; et propter elem. 2, 10 est $2(\alpha\beta^2 + \beta\gamma^2) = \alpha\gamma^2 + \alpha\delta^2$.

τὰ ἀπὸ τῶν ΓΑΓ ABS, corr. Co 22. 28. verba ὑπεροχῇ — τετρα-
γώνων, quae in ABS post δοθέν ἐστιν vs. 24' leguntur, huc transposuit
Ha 23. ἀπὸ add. Ha συναμφοτέρων ABS, συναμφοτέρας Ha,
corr. Hu δοθέν ἐστι ABS, corr. Ha

συναμφοτέρως ἢ $ΓΑ ΑΑ$. καὶ ἔστιν αὐτῆς ἡμίσεια ἢ $ΒΑ$.
δοθεῖσα ἄρα ἔστιν ἢ $ΒΑ$, ὥστε καὶ ἢ $ΒΓ$ δοθεῖσα ἔστιν.

- 306 Ὑ. Ἐστω ἴση ἢ μὲν $ΑΒ$ τῇ $ΒΓ$, ἢ δὲ $ΑΕ$ τῇ $ΕΖ$, ἔτι
δὲ ἔστω ὡς ἢ $ΓΒ$ πρὸς $ΒΗ$, οὕτως ἢ $ΖΕ$ πρὸς $ΕΘ$. ὅτι
γίνεται ὡς τὸ ἐπὶ $ΑΗΒ$ πρὸς τὸ ἐπὶ $ΒΓΗ$, οὕτως τὸ ἐπὶ
ἐπὶ $ΑΘΕ$ πρὸς τὸ ἐπὶ $ΕΖΘ$.



Ἐπεὶ γὰρ ἔστιν
ὡς ἢ $ΓΒ$ πρὸς $ΒΑ$,
οὕτως ἢ $ΖΕ$ πρὸς
 $ΕΑ$, ἀλλὰ καὶ ὡς ἢ 10
 $ΓΒ$ πρὸς $ΒΗ$, οὕτως
ἢ $ΖΕ$ πρὸς $ΕΘ$, ἔ-
σται ἄρα καὶ ὡς τὸ
ἀπὸ $ΑΗ$ πρὸς τὸ
ἐπὶ $ΑΗΒ$, οὕτως 15

τὸ ἀπὸ $ΑΘ$ πρὸς τὸ ἐπὶ $ΑΘΕ$. ἀλλὰ καὶ ὡς μὲν τὸ ἀπὸ
 $ΑΗ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΒΓ$, οὕτως τὸ ἀπὸ $ΑΘ$ πρὸς τὸ ἀπὸ $ΕΖ$,
ὡς δὲ τὸ ἀπὸ $ΒΓ$ πρὸς τὸ ἐπὶ $ΒΓΗ$, οὕτως τὸ ἀπὸ $ΕΖ$
πρὸς τὸ ἐπὶ $ΕΖΘ$. ἔσται ἄρα δι' ἴσον ὡς τὸ ἐπὶ $ΑΗΒ$
πρὸς τὸ ἐπὶ $ΒΓΗ$, οὕτως τὸ ἐπὶ $ΑΘΕ$ πρὸς τὸ ἐπὶ $ΕΖΘ$. 20

- 307 Ἱ. Ἐστω ἴση ἢ μὲν $ΑΒ$ τῇ $ΒΓ$, ἐλάσσων δὲ ἢ $ΒΑ$
τῆς $ΒΕ$. ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΔΒ$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $ΒΓΑ$ ἐλάσ-
σωνα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ὑπὸ τῶν $ΓΕΒ$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν
 $ΒΑΕ$.

Ἐπεὶ γὰρ ἴση μὲν ἔστιν ἢ $ΑΒ$ τῇ $ΒΓ$, ἐλάσσων δὲ ἢ 25
 $ΒΑ$ τῇ $ΒΕ$, ἢ $ΓΑ$ ἄρα μείζων ἔστιν τῆς $ΑΕ$. ὥστε καὶ ἢ
 $ΓΕ$ μείζων ἔστιν τῆς $ΑΑ$. ἐλάσσων ἄρα ἐστὶ τὸ ἐπὶ $ΑΑΒ$
τοῦ ὑπὸ $ΓΕΒ$, μείζων δὲ τὸ ἐπὶ τῶν $ΒΓΑ$ τοῦ ἐπὶ $ΒΑΕ$.
τὸ ἄρα ὑπὸ $ΑΑΒ$ πρὸς τὸ ἐπὶ $ΒΓΑ$ ἐλάσσωνα λόγον ἔχει
ἥπερ τὸ ὑπὸ $ΓΕΒ$ πρὸς τὸ ἐπὶ $ΒΑΕ$. 30

1. συναμφοτέρως ABS, συναμφοτέρα Ha, corr. Hu ἡμίσεια δύο
at $ΒΑ$ ABS, corr. Co 3. $Θ Α$ rec. in marg. BS, eadem manus re-
centior proximos numeros in illis lemmatum in A addidit ἴση add.
S τῇ $ΒΓ Α$ rec. in marg. B. τῇ $ΓΑ Α$ S cod. Co ἢ $δ$ $ΑΚ$
τῇ $ΚΖ$ et sic ubique K pro E Ha in hoc et proximo lemmate
4. οὕτως ἢ $ΘΕ$ πρὸς $ΕΖ$ ABS, corr. Co 16. ὑπὸ (ante $ΑΘΕ$) B'S,

itaque etiam recta $\alpha\gamma + \alpha\delta$ data est. Et est $\alpha\beta = \frac{1}{2} \alpha\gamma + \alpha\delta$:
ergo data est $\alpha\beta$; itaque etiam $\beta\gamma$ data est (nam data $\alpha\beta$
datum etiam $\alpha\beta^2$; et est data summa $\alpha\beta^2 + \beta\gamma^2$; itaque etiam
 $\beta\gamma^2$ datum, et data ipsa $\beta\gamma$).

IX. Sit $\alpha\beta = \beta\gamma$, et $\delta\epsilon = \epsilon\zeta$, atque $\gamma\delta : \beta\gamma = \zeta\epsilon : \epsilon\vartheta$: Prop.
219
dico esse $\alpha\eta : \eta\beta : \beta\gamma : \gamma\eta = \delta\vartheta : \vartheta\epsilon : \epsilon\zeta : \zeta\vartheta$.

Quoniam enim ex hypothesis est et

$$\gamma\delta : \beta\gamma = \zeta\epsilon : \epsilon\vartheta, \text{ et}$$

$$\gamma\delta : \beta\alpha = \zeta\epsilon : \epsilon\delta, \text{ ex aequali igitur est}$$

$$\beta\alpha : \beta\gamma = \epsilon\delta : \epsilon\vartheta, \text{ et componendo}$$

$$\alpha\eta : \eta\beta = \delta\vartheta : \vartheta\epsilon; \text{ ergo etiam}$$

$$\alpha\eta^2 : \alpha\eta \cdot \eta\beta = \delta\vartheta^2 : \delta\vartheta \cdot \vartheta\epsilon. \text{ Sed quia (ut modo demon-}$$

stravimus) est $\alpha\eta : \eta\beta = \delta\vartheta : \vartheta\epsilon$,

et (ex hypothesis) $\eta\beta : \beta\gamma =$

$\vartheta\epsilon : \epsilon\zeta$, ex aequali igitur est

$\alpha\eta : \beta\gamma = \delta\vartheta : \epsilon\zeta$; ergo etiam

$$\alpha\eta^2 : \beta\gamma^2 = \delta\vartheta^2 : \epsilon\zeta^2. \text{ Sed quia ex hypothesis est } \beta\gamma : \beta\eta$$

$= \epsilon\zeta : \epsilon\vartheta$, est igitur in priore

casu e contrario et dirimendo et

rursus e contrario, in altero casu

convertendo $\beta\gamma : \gamma\eta = \epsilon\zeta : \zeta\vartheta$;

ergo etiam

$$\beta\gamma^2 : \beta\gamma \cdot \gamma\eta = \epsilon\zeta^2 : \epsilon\zeta \cdot \zeta\vartheta; \text{ ergo ex aequali erit}$$

$$\alpha\eta \cdot \eta\beta : \beta\gamma \cdot \gamma\eta = \delta\vartheta \cdot \vartheta\epsilon : \epsilon\zeta \cdot \zeta\vartheta.$$

X. Sit $\alpha\beta = \beta\gamma$, et $\beta\delta < \beta\epsilon$; dico esse $\frac{\alpha\delta \cdot \delta\beta}{\beta\gamma \cdot \gamma\delta} < \frac{\gamma\epsilon \cdot \epsilon\beta}{\beta\alpha \cdot \alpha\epsilon}$. Prop.
220

Quoniam enim est

$$\alpha \quad \epsilon \quad \beta \quad \delta \quad \gamma \quad \alpha\beta = \beta\gamma, \text{ et } \beta\delta < \beta\epsilon,$$

est igitur $\gamma\delta > \alpha\epsilon$, itaque etiam $\gamma\epsilon > \alpha\delta$: ergo est

$$\alpha\delta \cdot \delta\beta < \gamma\epsilon \cdot \epsilon\beta, \text{ et}$$

$$\beta\gamma \cdot \gamma\delta > \beta\alpha \cdot \alpha\epsilon; \text{ ergo est elem. 5. 8}$$

$$\frac{\alpha\delta \cdot \delta\beta}{\beta\gamma \cdot \gamma\delta} < \frac{\gamma\epsilon \cdot \epsilon\beta}{\beta\alpha \cdot \alpha\epsilon}.$$

308 α'. Ἐστω δὲ νῦν τὸ τοῖς προηγουμένοις ἀναστρέφειν
 δεῖξαι. οὕτως ἴσως τῆς μὲν AB τῇ BF , τῆς δὲ AE τῇ EZ ,
 ἔστω ὡς τὸ ὑπὸ AHB πρὸς τὸ ὑπὸ $BΓH$, οὕτως τὸ ὑπὸ
 AOE πρὸς τὸ ὑπὸ EZO . δεῖξαι ὅτι γίνεται ὡς ἡ GB πρὸς
 BH , οὕτως ἡ ZE πρὸς EO . 5

Καίσθω τῷ μὲν ἐπὶ AHB ἴσον τὸ ὑπὸ $ΓH AK$, τῷ
 δὲ ὑπὸ AOE ἴσον τὸ ὑπὸ $ZO AA$. ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ
 $AK ΓH$ πρὸς τὸ ὑπὸ $BΓH$, τουτέστιν ἡ AK πρὸς $BΓ$,
 οὕτως τὸ ὑπὸ $AA ZO$ πρὸς τὸ ὑπὸ EZO , τουτέστιν ἡ
 AA πρὸς EZ . ἀλλὰ καὶ ὡς ἡ GB πρὸς BA , οὕτως ἐστὶν 10
 ἡ ZE πρὸς EA . αἱ $AK BΓ BK$ ἄρα ταῖς $AA EZ EA$
 ὁμοταγεῖς εἰσιν ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ [τουτέστιν ὡς ἡ $KΓ$ πρὸς
 $ΓB$, οὕτως ἡ AZ πρὸς ZE]. ἐπεὶ δὲ τὸ ὑπὸ τῶν AHB
 ἴσον ἐστὶν τῷ ἐπὶ τῶν $AK ΓH$, ἀμφότερον ἀφηρέσθω
 ἀπὸ τοῦ ἐπὶ τῶν $AK HB$. λοιπὸν ἄρα τὸ ἐπὶ τῶν BHK 15
 ἴσον ἐστὶν τῷ ἐπὶ τῶν $AK BΓ$. ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ
 τῶν $AK BΓ$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς BK , οὕτως τὸ ἐπὶ τῶν BHK
 πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς BK . διὰ ταῦτα δὲ καὶ ὡς τὸ ὑπὸ τῶν
 $AA EZ$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς EA , οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ τῶν
 EOA πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς EA . καὶ ἐστὶν ὡς τὸ ὑπὸ τῶν 20
 $AK BΓ$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς BK , οὕτως τὸ ἐπὶ τῶν $AA EZ$
 πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς EA διὰ τὴν ἀναλογίαν τῶν ὁμοταγῶν
 τμημάτων· καὶ ὡς ἄρα τὸ ἐπὶ BHK πρὸς τὸ ἀπὸ BK ,
 οὕτως τὸ ἐπὶ EOA πρὸς τὸ ἀπὸ EA . καὶ ἐστὶν τὰ αὐτὰ

1. ἀναστρέφειν A BS, ἀντίστροφον Ha, corr. Hu 8. ἔστω Hu
 pro καὶ ἐπὶ τὸ ὑπὸ AHB πρὸς bis scripta in A 6. τῷ μὲν —
 τὸ ὑπὸ AB , τὸ μὲν — τῷ ἐπὶ S cod. Co 7. post AOE ἴσον add.
 ἐστὶν A BS, ἔστω Ha, del. Hu ἐπὶ $ZO AA$ Ha auctore Co, ὑπὸ
 ZOA AB, ὑπὸ ZO S 7. 8. ἐπὶ $AK ΓH$ Ha auctore Co pro ἐπὶ
 $AK ΓZ$ 9. 10. ἐπὶ $AA ZO$ et ἡ AA Ha auctore Co pro ἐπὶ
 $AA ZO$ et ἡ AA 11. αἱ $AB BΓ ΓK$ ἄρα ταῖς $AE EZ ZA$ ABS,
 corr. Hu 12. 13. τουτέστιν — πρὸς ZE ABS, del. Hu, τουτέστιν
 ὡς ἡ $BΓ$ πρὸς $ΓK$ οὕτως ἡ EZ πρὸς ZE · καὶ ὡς ἄρα ἡ $BΓ$ πρὸς τὴν
 BK οὕτως ἡ ZE πρὸς τὴν EA Ha 14. τῶν $AK ΓH$ A, distinx. BS
 14. 15. ἀμφότερων ἀφηρέσθω ἀπὸ τοῦ ἐπὶ τῶν $AK HB$ ABS, corr. Co
 15. 16. τῶν BHK ἴσον A BS, τῶν $BH KK$ ἴσον Co, τῶν $BK HB$
 ἴσον Ha, corr. Hu 16. 17. ὡς τὸ ἐπὶ τῶν $AK BΓ$ A, distinx. BS

XI. Iam vero propositum sit conversionem lemmatis superioris (novi) demonstrare. Sit $\alpha\beta = \beta\gamma$, et $\delta\epsilon = \epsilon\zeta$, atque $\alpha\eta : \eta\beta : \beta\gamma : \gamma\eta = \delta\vartheta : \vartheta\epsilon : \epsilon\zeta : \zeta\vartheta$; demonstretur fieri

$$\begin{array}{c} \alpha \quad \beta \quad \gamma \quad \quad \quad \eta \quad \quad \quad x \\ \delta \quad \epsilon \quad \zeta \quad \quad \quad \vartheta \quad \quad \quad \lambda \end{array} \quad \begin{array}{l} \gamma\beta : \beta\eta = \zeta\epsilon : \epsilon\vartheta. \\ \text{Ponatur } \gamma\eta \cdot \alpha x \\ = \alpha\eta \cdot \eta\beta, \text{ et } \zeta\vartheta \cdot \delta\lambda \\ = \delta\vartheta \cdot \vartheta\epsilon; \text{ est igitur} \end{array}$$

$$\gamma\eta \cdot \alpha x : \beta\gamma \cdot \gamma\eta = \zeta\vartheta \cdot \delta\lambda : \epsilon\zeta \cdot \zeta\vartheta, \text{ id est}$$

$$\alpha x : \beta\gamma = \delta\lambda : \epsilon\zeta. \text{ Sed ex hypothesi est etiam } \beta\gamma : \alpha\beta = \epsilon\zeta : \delta\epsilon; \text{ ergo ex aequali } \alpha x : \alpha\beta = \delta\lambda : \delta\epsilon, \text{ id est convertendo}$$

$$\alpha x : \beta x = \delta\lambda : \epsilon\lambda; \text{ ergo, quoniam ex aequali est } \beta\gamma : \beta x = \epsilon\zeta : \epsilon\lambda, \text{ } \delta\mu\sigma\tau\alpha\gamma\epsilon\iota\varsigma \text{ in eadem proportionem sunt}$$

$$\alpha x : \beta\gamma : \beta x = \delta\lambda : \epsilon\zeta : \epsilon\lambda.$$

Sed quoniam ex constructione est

$$\alpha\eta \cdot \eta\beta = \alpha x \cdot \gamma\eta, \text{ utrumque auferatur ab } \alpha x \cdot \eta\beta; \text{ restat igitur}$$

$$\eta x \cdot \eta\beta = \alpha x \cdot \beta\gamma; \text{ ergo est } \frac{\alpha x \cdot \beta\gamma}{\beta x^2} = \frac{\beta\eta \cdot \eta x}{\beta x^2}. \text{ Eadem ratione est } \frac{\delta\lambda \cdot \epsilon\zeta}{\epsilon\lambda^2} = \frac{\epsilon\vartheta \cdot \vartheta\lambda}{\epsilon\lambda^2}. \text{ Et est propter proportionem } \tau\omega\tilde{\nu} \delta\mu\sigma\tau\alpha\gamma\omega\tilde{\nu} \tau\mu\eta\mu\acute{\alpha}\tau\omega\tilde{\nu}, \text{ quam modo demonstravimus}^2),$$

$$\frac{\alpha x \cdot \beta\gamma}{\beta x^2} = \frac{\delta\lambda \cdot \epsilon\zeta}{\epsilon\lambda^2}; \text{ ergo etiam}$$

$$\frac{\beta\eta \cdot \eta x}{\beta x^2} = \frac{\epsilon\vartheta \cdot \vartheta\lambda}{\epsilon\lambda^2}. \text{ Et sunt eadem segmenta}^3) \beta\eta \text{ et } \vartheta\lambda; \text{ est igitur}$$

1) Vide append.

2) Quoniam enim est $\alpha x : \beta x = \delta\lambda : \epsilon\lambda$, et $\beta\gamma : \beta x = \epsilon\zeta : \epsilon\lambda$, multiplicando fit $\frac{\alpha x \cdot \beta\gamma}{\beta x^2} = \frac{\delta\lambda \cdot \epsilon\zeta}{\epsilon\lambda^2}$.

3) "Eadem segmenta" dicuntur $\beta\eta$ et $\vartheta\lambda$, quia est $\beta\eta = \beta x - \eta x$, et $\epsilon\vartheta = \epsilon\lambda - \vartheta\lambda$, id est $\eta x = \beta x - \beta\eta$, et $\vartheta\lambda = \epsilon\lambda - \epsilon\vartheta$; ergo scriptor ex aequatione $\frac{\beta\eta (\beta x - \beta\eta)}{\beta x^2} = \frac{\epsilon\vartheta (\epsilon\lambda - \epsilon\vartheta)}{\epsilon\lambda^2}$ efficit esse $\frac{\beta\eta}{\beta x} = \frac{\epsilon\vartheta}{\epsilon\lambda}$.

18. διὰ ταῦτα A²BS, corr. Hu 18. 19. τῶν AA KZ ABS, corr. Co

22. τῶν ὁμοιοτάτων ABS, similium Co, τῶν ὁμοιοτάτων Ha, corr. Hu

24. τὸ ἀπὸ EΘA πρὸς τὸ ἀπὸ AE ABS, corr. Co

τμήματα τὰ $BH E\Theta$. ἔστιν ἄρα ὡς ἡ KB πρὸς BH , οὕτως ἡ AE πρὸς $E\Theta$. καὶ ὡς ἄρα ἡ GB πρὸς BH , οὕτως ἔστιν ἡ ZE πρὸς $E\Theta$.

- 309 ιβ'. Ἐστω ἴση ἡ μὲν AB τῇ $BΓ$, ἡ δὲ AE τῇ EZ , ἔτι δὲ ἡ $BΓ$ πρὸς $ΓH$ μείζονα λόγον ἔχεται ἥπερ ἡ EZ πρὸς τὴν $Z\Theta$. ὅτι ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης πτώσεως καὶ ἡ AH πρὸς τὴν $BΓ$ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ $A\Theta$ πρὸς τὴν EZ , ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας ἐλάσσω.

Ἐπεὶ γὰρ ἡ $BΓ$ πρὸς $ΓH$ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ EZ πρὸς $Z\Theta$, ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης πτώσεως ἡ GB πρὸς BH ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ ZE πρὸς $E\Theta$, ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας μείζω. ὥστε καὶ ἡ AB πρὸς τὴν BH ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης πτώσεως ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ AE πρὸς $E\Theta$, ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας μείζω. καὶ ἡ HA ἄρα πρὸς τὴν AB ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης πτώσεως μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ ΘA πρὸς AE , ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας ἐλάσσω. καὶ ἔστιν ὡς ἡ AB πρὸς $BΓ$, οὕτως ἡ AE πρὸς EZ . δι' ἴσου ἄρα ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης πτώσεως ἡ AH πρὸς τὴν $BΓ$ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ $A\Theta$ πρὸς τὴν EZ , ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας ἐλάσσω.

- 310 ιγ'. Ἐστω πάλιν ἴση ἡ μὲν AB τῇ $BΓ$, ἡ δὲ AE τῇ EZ , ἔτι δὲ ἡ AH πρὸς τὴν HB μείζονα λόγον ἔχεται ἥπερ ἡ $A\Theta$ πρὸς τὴν ΘE . ὅτι καὶ ἡ $BΓ$ πρὸς τὴν $ΓH$ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ EZ πρὸς τὴν $Z\Theta$.

Ἐπεὶ γὰρ κατὰ ἀναστροφὴν καὶ διαίρεισιν ἡ HB πρὸς Z


1. τὰ $BHE\Theta$ A, distinx. BS 1. 2. ἔστιν ἄρα ὡς ἡ KB πρὸς BA οὕτως ἡ AE πρὸς $E\Theta$ ABS, ἔστιν ἄρα ὡς ἡ HB πρὸς BK , οὕτως ἡ ΘE πρὸς EA Co, corr. Ha 2. 3. καὶ ὡς ἄρα ἡ HB πρὸς BF οὕτως ἔστιν ἡ ΘE πρὸς EZ ABS, corr. Hu, ἀλλ' ἐδείχθη ὡς ἡ $BΓ$ πρὸς τὴν BK οὕτως ἡ ZE πρὸς τὴν EA . δι' ἴσου ἄρα ὡς ἡ $BΓ$ πρὸς BH οὕτως ἔστιν ἡ ZE πρὸς $E\Theta$ Ha 4. cap. 309—311 edidit M. Meibomius, dialogi de proportionibus pag. 154—156 (Hafniae 1653) ἴση add. Co ἡ δὲ AK τῇ KZ Ha et sic ubique K pro E in hoc et proximo lemmate 5. πρὸς $ΓH$] πρὸς τὴν $ΓH$ Meibomius suo ingenio, nullius codicis auctoritate; et sic etiam posthac articulos addidit 6. τῆς πρώτης BS, τῆς EA A 6. 7. πρὸς τὴν $BΓ$ Co pro πρὸς τὴν HF 8. ἐλάσσων AB, corr. S, item vs. 16 et 30 10. 11. ἡ EZ —

$\beta\alpha : \beta\eta = \epsilon\lambda : \epsilon\vartheta$. Et demonstravimus esse

$\beta\alpha : \beta\gamma = \epsilon\lambda : \epsilon\zeta$; ergo ex aequali est

$\gamma\beta : \beta\eta = \zeta\epsilon : \epsilon\vartheta$.

XII. Sit $\alpha\beta = \beta\gamma$, et $\delta\epsilon = \epsilon\zeta$, atque $\beta\gamma : \gamma\eta > \epsilon\zeta : \zeta\vartheta$; Prop. 232
dico esse in priore casu $\alpha\eta : \beta\gamma > \delta\vartheta : \epsilon\zeta$, in altero $\alpha\eta : \beta\gamma$
 $< \delta\vartheta : \epsilon\zeta$.



Quoniam enim est $\beta\gamma : \gamma\eta > \epsilon\zeta : \zeta\vartheta$, in priore casu est
 $\beta\gamma : \beta\eta < \epsilon\zeta : \epsilon\vartheta$, itaque etiam $\alpha\beta : \beta\eta < \delta\epsilon : \epsilon\vartheta$; ergo est¹⁾

$\alpha\beta : \alpha\beta + \beta\eta < \delta\epsilon : \delta\epsilon + \epsilon\vartheta$, id est

$\alpha\eta : \alpha\beta > \delta\vartheta : \delta\epsilon$. Et ex hypothesi est

$\alpha\beta : \beta\gamma = \delta\epsilon : \epsilon\zeta$; ex aequali igitur

$\alpha\eta : \beta\gamma > \delta\vartheta : \epsilon\zeta$.

In altero casu, quia est $\beta\gamma : \gamma\eta > \epsilon\zeta : \zeta\vartheta$, est etiam

$\beta\gamma : \beta\gamma + \gamma\eta > \epsilon\zeta : \epsilon\zeta + \zeta\vartheta$, id est

$\beta\gamma : \beta\eta > \epsilon\zeta : \epsilon\vartheta$, itaque etiam

$\alpha\beta : \beta\eta > \delta\epsilon : \epsilon\vartheta$; ergo est similiter ac supra

$\alpha\eta : \alpha\beta < \delta\vartheta : \delta\epsilon$, itaque perinde ac supra


$\alpha\eta : \beta\gamma < \delta\vartheta : \epsilon\zeta$.

XIII. Sit rursus $\alpha\beta = \beta\gamma$, et $\delta\epsilon = \epsilon\zeta$, atque $\alpha\eta : \eta\beta > \delta\vartheta : \vartheta\epsilon$; Prop. 233
dico esse etiam

$\beta\gamma : \gamma\eta > \epsilon\zeta : \zeta\vartheta$.*).

Quoniam enim est

$\alpha\eta : \eta\beta > \delta\vartheta : \vartheta\epsilon$, et
convertendo VII prop. 6,




1) Conf. libri VII propos. 3.

*) Vide append.

ἔχει ἥπερ add. Co 41. τῆς δευτέρας BS, τῆς B A 42. μετῶν AB,
corr. S, item vs. 44 44. καὶ ἡ HA Ha auctore Co pro καὶ ἡ HA
47. post ἄρα add. εἶναι ABS, del. Ha auctore Co 22. μετῶν Hu
pro ἐλάσσονα (conf. append.) 23. 23. ἥπερ ἡ AΘ Ha auctore Co
pro ἥπερ ἡ AE 35. κατ' ἀναστροφὴν Meibom.

τὴν ΒΑ, τουτέστιν τὴν ΒΓ, ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΘΕ πρὸς τὴν ΕΑ, τουτέστιν πρὸς τὴν ΕΖ, ἀναστρέψαντι καὶ διελόντι ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΓΗ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΕΖ πρὸς τὴν ΖΘ.

- 311 Ὡς. Ἰση ἡ μὲν ΑΒ τῇ ΒΓ, ἡ δὲ ΑΕ τῇ ΕΖ, καὶ ἔτι 5 ἡ ΑΗ πρὸς τὴν ΗΒ μείζονα λόγον ἔχεται ἢ περ ἡ ΑΘ πρὸς τὴν ΘΕ· ὅτι ἡ ΒΗ πρὸς τὴν ΗΓ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΕΘ πρὸς τὴν ΘΖ.



Ἐπεὶ γὰρ κατὰ διαίρεσιν ἡ ΑΒ, τουτέστιν ἡ 10 ΒΓ, πρὸς τὴν ΒΗ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΑΕ, τουτέστιν ἡ ΕΖ, πρὸς τὴν ΕΘ, ἀναστρέψαντι καὶ κατὰ διαίρεσιν ἡ ΒΗ πρὸς τὴν ΗΓ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΕΘ πρὸς τὴν ΘΖ.

15

Εἰς τοὺς πρὸς ἐπιφανεία.

- 312 α'. Ἐὰν ᾗ εὐθεῖα ἡ ΑΒ, καὶ παρὰ θέσει ἡ ΓΑ, καὶ ᾗ λόγος τοῦ ὑπὸ ΑΔΒ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΓ, τὸ Γ ἄπτεται κωνικῆς γραμμῆς. ἔαν οὖν ἡ μὲν ΑΒ στερεθῇ τῆς θέσεως, καὶ τὰ Α Β στερεθῇ τοῦ δοθέντος εἶναι, γένηται δὲ πρὸς 20 θέσει εὐθεῖα ταῖς ΑΕ ΕΒ, τὸ Γ μεταωρισθὲν γίνεται πρὸς θέσει ἐπιφανείας. τοῦτο δὲ ἐδείχθη.

β'. Ἐὰν ᾗ θέσει εὐθεῖα ἡ ΑΒ, καὶ δοθὲν τὸ Γ ἐν τῷ ἀντὶ ἐπιπέδῳ, καὶ διαχθῇ τῇ ΑΓ, καὶ πρὸς ὁρθὰς ἀχθῇ

1. τουτέστι πρὸς τὴν ΕΓ Meibom. ἐλάσσονα Hu pro μείζονα
5. Ἰση BS, Ἐστω Ἰση Α^α Meibom. Ha ἡ μὲν ΑΒ, μὲν ἡ S Meibom.
ἐτι non satis expressum est in A ac simile formae ἔστιν 7. ἐλάσσονα Co Ha, μείζονα ABS Meibom. 7. 8. ἢ περ ἡ ΕΘ Ha pro ἢ περ ἡ ΕΒ 13. καὶ add. Ha auctore Co 14. ἐλάσσονα μείζονα Meibom. suo ingenio 16. quae hinc usque ad exitum libri VII sequuntur aliena sunt a consilio eius scriptoris qui praefationem huius libri composuit: vide supra cap. 3 τοὺς (scil. τόλους) Ge pro τὰς ἐπιφανείαν ABS, corr. Hu 17. α' add. BS ἢ ante εὐθεῖα add. Hu παραθέσει ABS, distinx. Hu 20. τὰ ΑΒ Α, distinx. BS, ἐκείτερον τῶν Α Β Hu 20. 21. προσθέσει ABS, distinx. Hu, item vs. 21, 22 23. β' add. BS 24. πρὸς ὁρθὰς Hu coll. p. 1042, 26 pro παραθέσει

$\alpha\eta : \alpha\beta < \delta\theta : \delta\varepsilon$, et dirimendo ¹⁾

$\beta\eta : \alpha\beta < \varepsilon\theta : \delta\varepsilon$, id est

$\beta\eta : \beta\gamma < \varepsilon\theta : \varepsilon\zeta$, est igitur convertendo (VII propos. 6)

$\beta\eta : \gamma\eta > \varepsilon\theta : \zeta\theta$, et dirimendo

$\beta\gamma : \gamma\eta > \varepsilon\zeta : \zeta\theta$.

XIV. Si sit $\alpha\gamma = \beta\gamma$, et $\delta\varepsilon = \varepsilon\zeta$, atque $\alpha\eta : \eta\beta > \delta\theta : \theta\varepsilon$; Prop. 234
dico esse $\beta\eta : \eta\gamma < \varepsilon\theta : \theta\zeta$.

Quoniam enim est

$\alpha\eta : \beta\eta > \delta\theta : \varepsilon\theta$, et dirimendo

$\alpha\beta : \beta\eta > \delta\varepsilon : \varepsilon\theta$, id est


$\beta\gamma : \beta\eta > \varepsilon\zeta : \varepsilon\theta$, est igitur convertendo

$\beta\gamma : \eta\gamma < \varepsilon\zeta : \theta\zeta$, et dirimendo

$\beta\eta : \eta\gamma < \varepsilon\theta : \theta\zeta$.

IN LOCOS AD SUPERFICIEM.

I. Si sit recta $\alpha\beta$, et $\gamma\delta$ parallela rectae positione datae, Prop. 235
sitque data proportio $\alpha\delta : \delta\beta : \delta\gamma^2$, punctum γ tangit conicam



lineam. Iam si recta $\alpha\beta$
positione privetur, et puncta $\alpha\beta$ desinant data esse, fiat autem recta quaedam $\pi\rho\delta\varsigma\theta\acute{\epsilon}\sigma\sigma\iota$ ad $\alpha\varepsilon\beta$, punctum γ sublime elevatum fit $\pi\rho\delta\varsigma\theta\acute{\epsilon}\sigma\sigma\iota$ superficiei. Hoc autem demonstratum est²⁾.

II. Si sit recta $\alpha\beta$ positione data, et in eodem plano Prop. 238³⁾
datum punctum γ , et ducatur $\delta\gamma$, ac datae $\alpha\beta$ perpendicu-

1) Vide append. ad VII propos. 4.


2) Quoniam Euclidis $\pi\rho\delta\varsigma\epsilon\pi\iota\gamma\alpha\nu\epsilon\lambda\epsilon\gamma\tau\acute{o}\pi\omega\rho$ libri, ad quos scriptor provocat, non exstant, Graeca verba sunt obscuriora neque figurae in codicibus traditae ratio satis perspicua. Longiorem demonstrationem supplavit Co.

3) Non hanc ipsam propositionem, sed eandem repetitam, quae infra p. 1012 sqq. sequitur, numerat Commandinus. Laudat huius theorematis elegantiam Charles *Aperçu historique* p. 44 edit. II Paris. (p. 44 versionis German.).

ἡ ΔE , λόγος δὲ ἡ τῆς ΓA πρὸς ΔE , τὸ Δ ἄπτεται θέσει κωνικῆς τομῆς. δεικνύνται δὲ ὅτι γραμμῆς μέρος ποιεῖ τὸν τόπον. δειχθήσεται δὲ οὕτως, παραγραφέντος τόπου τοῦδε.

- 314 γ'. Δύο δοθέντων τῶν $A B$, καὶ ὁρθῆς τῆς ΓA , λόγος ἔστω τοῦ ἀπὸ $A \Delta$ πρὸς τὰ ἀπὸ $\Gamma A \Delta B$. λέγω ὅτι τὸ Γ ἄπτεται κώνον τομῆς, ἐάν τε ἡ δ λόγος ἴσος πρὸς ἴσον ἢ μείζων πρὸς ἐλάσσονα ἢ ἐλάσσων πρὸς μείζονα.

315




Ἔστω γάρ πρότερον ὁ λόγος ἴσος πρὸς ἴσον· καὶ ἐπεὶ ἴσον ἐστὶν τὸ ἀπὸ $A \Delta$ τοῖς 10 ἀπὸ $\Gamma A \Delta B$, κείσθω τῇ $B \Delta$ ἴση ἡ ΔE . ἴσον ἄρα ἐστὶ τὸ ὑπὸ $B \Delta E$ τῷ ἀπὸ $\Delta \Gamma$. τετμήσθω διῆα ἡ AB τῷ Z . δοθέν ἄρα τὸ Z . καὶ ἔστιν 15 διπλῇ ἡ ΔE τῆς $Z \Delta$, ὥστε τὸ ὑπὸ $B \Delta E$ τὸ δις ἐστὶν

ὑπὸ τῶν $AB Z \Delta$. καὶ ἔστιν ἡ διπλῇ τῆς AB δοθεῖσα· τὸ ἄρα ὑπὸ δοθείσης καὶ τῆς $Z \Delta$ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς $\Delta \Gamma$. τὸ Γ ἄρα ἄπτεται θέσει παραβολῆς ἐρχομένης διὰ 20 τοῦ Z .

δ'. Συντεθήσεται δὲ ὁ τόπος οὕτως. ἔστω τὰ δοθέντα $A B$, ὁ δὲ λόγος ἔστω ἴσος πρὸς ἴσον, καὶ τετμήσθω ἡ AB διῆα τῷ Z , τῆς δὲ AB διπλῇ ἔστω ἡ P , καὶ θέσει οὗσης εὐθείας τῆς ZB πεπερασμένης κατὰ τὸ Z , τῆς δὲ P 25 δεδομένης τῷ μεγέθει, γεγράψθω περὶ ἄξονα τὸν ZB παραβολὴ ἡ HZ , ὥστε, οἷον ἐὰν ἐπ' αὐτῆς σημείον ληφθῇ ὡς τὸ Γ , κάθετος δὲ ἀχθῇ ἡ ΓA , ἴσον εἶναι τὸ ὑπὸ $P Z \Delta$

1. ἡ Ge auctore Co pro ἦν τὸ $\bar{E}$ ἄπτεται ABS , corr. Co
 2. δεικνύον δὲ Hu 3. 3. μέρος ποιεῖ τὸν τόπον add. Ge 3. τόπου]
 immo τοῦ λήμματος 4. γ' add. BS τῶν $\overline{AB} A$, distinx. BS
 5. $\Gamma A \Delta B$ Co pro $\overline{\Gamma A B}$, item vs. 11 [at distincte $B \Delta \overline{JF} ABS$ p. 1008,
 12) 10. ἀπὸ $\overline{A \Delta}$ τοῖς bis scripta in A 12. ἐστὶ $A \Delta BS$ 15. ἔστιν
 Hu auctore Co pro ἔσται 19. ὑπὸ δο² καὶ τῆς $\overline{BF}$ ἴσον A , ὑπὸ δο-
 θέν καὶ τῆς $\beta \gamma$ BS , corr. Co 20. παραβολὴ ἐρχομένη AS , παραβολῇ



laris ducatur $\delta\epsilon$, sitque data proportio $\gamma\delta : \delta\epsilon$, punctum δ positione tangit conicam sectionem. Sed demonstrandum est partem lineae locum efficere, quod quidem efficietur hoc praemisso lemmate.

III. Positione datis duobus punctis $\alpha \beta$, et perpendiculari $\gamma\delta$, sit data proportio $\frac{\alpha\delta^2}{\gamma\delta^2 + \delta\beta^2}$; dico punctum γ tangere conicam sectionem, sive proportio sit magnitudinis aequalis ad aequalem, sive maioris ad minorem, sive minoris ad maiorem (*i. e.* sive sit proportio $= 1$ sive ≥ 1).

Sit enim primum proportio aequalis ad aequale; et quia est $\alpha\delta^2 = \gamma\delta^2 + \delta\beta^2$, ponatur $\delta\epsilon = \beta\delta$; est igitur propter elem. 2, 6

$$\begin{aligned}\beta\alpha \cdot \alpha\epsilon + \delta\delta^2 &= \alpha\delta^2, \text{ id est ex hypothesi} \\ &= \gamma\delta^2 + \delta\beta^2, \text{ ideoque}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\beta\alpha \cdot \alpha\epsilon &= \gamma\delta^2. \text{ Bifariam secetur } \alpha\beta \text{ puncto } \zeta; \text{ datum} \\ &\text{igitur est } \zeta. \text{ Estque } \alpha\epsilon = 2\zeta\delta \text{ (quoniam} \\ &\alpha\epsilon = \alpha\beta - \epsilon\beta, \text{ id est } 2\beta\zeta - 2\beta\delta), \\ &\text{itaque}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\beta\alpha \cdot \alpha\epsilon &= 2\beta\alpha \cdot \zeta\delta; \text{ ergo est} \\ 2\beta\alpha \cdot \zeta\delta &= \gamma\delta^2.\end{aligned}$$

Et est data $\alpha\beta$; ergo etiam dupla $\alpha\beta$; ergo rectangulum, quod datà et $\zeta\delta$ continetur, aequale est quadrato ex $\gamma\delta$; itaque propter Apollonii conic. 1, 11 punctum γ positione tangit parabolam per ζ transeuntem.



Componetur locus sic. Sint data puncta $\alpha \beta$, et data proportio sit aequalis ad aequale, et recta $\alpha\beta$ bifariam secetur puncto ζ , et dupla $\alpha\beta$ sit recta ϱ , et cum recta $\zeta\beta$, quae terminatur in puncto ζ , positione data sit, et recta ϱ data magnitudine, secundum conic. 1, 52 circa axem $\zeta\beta$ construatur parabola $\eta\zeta$, ita ut, si in ea quodvis punctum γ su-

ἐξομέρη B, corr. Co 23. δ' add. BS 23. 23. δὸς ἐστὶ $\overline{AB}$, distinct. BS 27. ἐν' αὐτῇς AB Co, ἐν' αὐτῇς S cod. Co 28. PZ A A', $\overline{\varrho} \zeta \delta$ BS

τῷ ἀπὸ $\Delta\Gamma$, καὶ ἤχθω ὁρθὴ ἡ BH : λέγω ὅτι τὸ ΓH μέρος τῆς παραβολῆς ἐστίν.

Ἦχθω γὰρ κάθετος ἡ $\Gamma\Delta$, καὶ τῇ $B\Delta$ ἴση κείσθω ἡ ΔE . ἐπεὶ οὖν διπλῇ ἐστὶν ἡ μὲν AB τῆς BZ , ἡ δὲ EB τῆς $B\Delta$, διπλῇ ἄρα καὶ ἡ AE τῆς $Z\Delta$: τὸ ἄρα ὑπὸ BAE ἴσον ἐστὶν τῷ δις ὑπὸ τῶν $ABZ\Delta$, τουτέστιν τῷ ἀπὸ $\Delta\Gamma$. κοινὸν προσκείσθω τὸ ἀπὸ $E\Delta$ ἴσον ὃν τῷ ἀπὸ ΔB : ὅλον ἄρα τὸ ἀπὸ AD ἴσον ἐστὶν τοῖς ἀπὸ τῶν $\Gamma\Delta$ ΔB : ἡ $Z\Gamma H$ ἄρα γραμμὴ ποιεῖ τὸν τόπον.


- 316 ε'. Ἐστω δὴ πάλιν τὰ δύο δοθέντα σημεῖα τὰ $A B$, καὶ κατήχθω ὁρθὴ ἡ $\Delta\Gamma$, λόγος δὲ ἔστω τοῦ ἀπὸ AD πρὸς τὰ ἀπὸ $B\Delta$ $\Delta\Gamma$ ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης πτώσεως μείζων πρὸς ἐλάσσονα, ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας ἐλάσσων πρὸς μείζονα: λέγω ὅτι τὸ Γ διπτεται κώνον τομῆς, ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης πτώσεως ἑλλείψεως, ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας ὑπερβολῆς. 15



Ἐπεὶ γὰρ λόγος ἐστὶν τοῦ ἀπὸ AD πρὸς τὰ ἀπὸ $B\Delta$ $\Delta\Gamma$, ὁ αὐτὸς αὐτῷ γεγονέντω ὁ 20 τοῦ ἀπὸ $E\Delta$ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔB : ἐπὶ μὲν οὖν τῆς πρώτης πτώσεως ἐλάσσων ἐστὶν ἡ 25 $B\Delta$ τῆς ΔE , ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας μείζων ἐστὶν ἡ $B\Delta$ τῆς ΔE . κείσθω τῇ $E\Delta$ ἴση ἡ 30 ΔZ . ἐπεὶ λόγος ἐστὶν τοῦ ἀπὸ AD

8. καὶ τῇ $B\Delta$ AB Co, καὶ τῇ $\gamma\delta$ S cod. Co 6. ἀπὸ add, Ge
auctore Co 10. ε' add, BS τὰ AB A, distinx. BS 14. κατήχθω
ὁρθὴ ἡ $\Delta\Gamma$ Co pro ἐκάπτεται ἡ $\Delta\Gamma$ καὶ ὁρθὴ 12. 13. ἐλάσσων πρὸς
μείζονα — μείζων πρὸς ἐλάσσονα ABS (Item infra p. 1010, 18. 19).

matur et perpendicularis $\gamma\delta$ ducatur, sit $\epsilon \cdot \zeta\delta = \delta\gamma^2$, et ducatur perpendicularis $\beta\eta$; dico lineam $\gamma\eta$ partem parabolae esse.



Ducatur enim perpendicularis $\gamma\delta$, et ponatur $\delta\epsilon = \beta\delta$. Iam quia est $\alpha\beta = 2\beta\epsilon$, et $\epsilon\beta = 2\beta\delta$, est etiam $\alpha\beta = \epsilon\beta$, id est $\alpha\epsilon = 2\zeta\delta$; ergo est

$$\begin{aligned}\beta\alpha \cdot \alpha\epsilon &= 2\beta\alpha \cdot \zeta\delta, \text{ id est ex constructione} \\ &= \delta\gamma^2. \text{ Commune addatur } \epsilon\delta^2 = \delta\beta^2; \text{ est igitur} \\ \beta\alpha \cdot \alpha\epsilon + \epsilon\delta^2 &= \gamma\delta^2 + \delta\beta^2, \text{ id est propter elem. 2, 6} \\ \alpha\delta^2 &= \gamma\delta^2 + \delta\beta^2; \text{ ergo linea } \zeta\gamma\eta \text{ locum efficit.}\end{aligned}$$

IV. Iam sint rursus data duo puncta $\alpha \beta$, et a dato puncto γ ducatur perpendicularis $\delta\gamma$, sit autem proportio $\frac{\alpha\delta^2}{\beta\delta^2 + \delta\gamma^2}$ Prop. 227^o in priore casu maioris ad minus, in altero minoris ad maius; dico punctum γ tangere conic sectionem, in priore casu ellipsim, in altero hyperbolam.

Quoniam enim data proportio est $\frac{\alpha\delta^2}{\beta\delta^2 + \delta\gamma^2}$ huic aequalis fiat proportio $\frac{\epsilon\delta^2}{\delta\beta^2}$. Iam in priore casu est $\epsilon\delta > \delta\beta$, in

*) Conf. supra IV propos. 34 p. 285.

corr. Co (eadem emendavit ille qui extremæ demonstrationi scholion, quod in adnotatione ad p. 1010, 15 legitur, adscripsit) 19. $\overline{B\Gamma} \overline{A\Gamma}$ Ge pro $\overline{B\Gamma}$ 21. 22. ἀπὸ $\overline{BA}$ πρὸς τὸ ἀπὸ $\overline{JE}$ ABS, corr. Co 22—29. ἐπὶ μὲν οὖν τῆς πρώτης πτώσεως μένων ἔστω ἡ $\overline{EA}$ τῆς $\overline{AB}$, ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας ἑλίσσων ἔστω ἡ $\overline{E\Gamma}$ τῆς $\overline{AB}$ Co 25. 26. ἡ $\overline{BA}$ Co pro ἡ $\overline{BA}$ 29. post $\alpha\tau\iota\sigma\theta\omega$ add. ὅτι ABS, del. Co

πρὸς τὰ ἀπὸ ΓA AB , καὶ ἔστιν αὐτῇ ὁ αὐτὸς ὁ τοῦ ἀπὸ EA πρὸς τὸ ἀπὸ AB , καὶ λοιπὸς ἄρα τοῦ ὑπὸ ZAE πρὸς τὸ ἀπὸ AG λόγος ἐστὶν δοθείς. ἐπεὶ δὲ λόγος ἐστὶν τῆς EA πρὸς AB καὶ τῆς ZB πρὸς BA , ὁ αὐτὸς αὐτῇ γεγενέτω ὁ τῆς AB πρὸς BH · καὶ ὅλης ἄρα τῆς AZ πρὸς AH λόγος ἐστὶν δοθείς. πάλιν ἐπεὶ λόγος ἐστὶν τῆς EA πρὸς AB δοθείς, ὁ αὐτὸς αὐτῇ γεγενέτω ὁ τῆς AO πρὸς BO · λόγος ἄρα καὶ τῆς AB πρὸς BO ἐστὶν δοθείς [δοθὲν ἄρα τὸ Θ]· καὶ λοιπὸς ἄρα τῆς AE πρὸς OA λόγος ἐστὶν δοθείς· καὶ τοῦ ὑπὸ ZAE ἄρα πρὸς τὸ ὑπὸ OAH λόγος 10 ἐστὶ δοθείς. τοῦ δὲ ὑπὸ ZAE πρὸς τὸ ἀπὸ ΓA λόγος ἐστὶν δοθείς· καὶ τοῦ ὑπὸ HAO ἄρα πρὸς τὸ ἀπὸ AG λόγος ἐστὶν δοθείς. καὶ ἔστιν δύο δοθέντα τὰ ΘH · ἐπὶ μὲν ἄρα τῆς πρώτης πτώσεως τὸ Γ ἄπτεται ἑλλείψεως, ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας ὑπερβολῆς.

15

- 317 ζ'. Συντεθήσεται δὲ ὁ τόπος οὕτως. ἔστω τὰ μὲν δύο δοθέντα σημεῖα τὰ $A B$, ὁ δὲ δοθείς λόγος ὁ τοῦ ἀπὸ PT πρὸς τὸ ἀπὸ TZ , ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης πτώσεως μείζων πρὸς ἐλάσσονα, ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας ἐλάσσων πρὸς μείζονα, καὶ τῇ PT ἴση κείσθω ἡ TY , καὶ πεποιήσθω ὡς ἡ YZ 20 πρὸς τὴν ST , οὕτως ἡ AB πρὸς τὴν BH , πεποιήσθω δὲ καὶ ὡς ἡ PT πρὸς τὴν TZ , οὕτως ἡ AO πρὸς τὴν OB , καὶ γεγράφθω περὶ ἄξονα τὸν OH ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης πτώσεως ἑλλειψις, ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας ὑπερβολή, ὥστε, ὅλον ἔαν ἐπ' αὐτῆς ληφθῇ σημεῖον ὡς τὸ Γ , καὶ κάθετος 25 ἀχθῇ ἡ ΓA , λόγον εἶναι τοῦ ὑπὸ τῶν OAH πρὸς τὸ ἀπὸ AG τὸν συνημμένον ἐκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ TZ πρὸς SY καὶ ἐξ οὗ ὄν ἔχει ἡ TZ πρὸς SP καὶ ἐξ οὗ ὄν ἔχει ὁ δοθείς λόγος ὅς ἐστιν ὁ τοῦ ἀπὸ PT πρὸς τὸ ἀπὸ TZ , κατήχθω ὁρθῇ ἡ BK · λέγω ὅτι ἡ OK ποιεῖ τὸ ἐπίταγμα.

30

1. ΓA AB Co pro ΓAB 2. λοιπὸς ἄρα τοῦ Co pro λοιπὸν ἄρα τὸ 3. δοθείς S cod. Co, δοθέντα AB 4. καὶ τῆς $\zeta\delta$ πρὸς $\beta\delta$ B Co, καὶ τῆς $Z\delta$ πρὸς AB καὶ τῆς ZB πρὸς BA A, καὶ τῆς $\zeta\delta$ πρὸς $\delta\beta$ S cod. Co 5. καὶ τῆς AZ ἄρα, delete ὅλης, conl. Hu 6. 7. τῆς $E\delta$ πρὸς AB δοθείς Co, τῆς $E\delta$ πρὸς AO δοθέντα καὶ τῆς EB ἄρα πρὸς BA λόγος ἐστὶν δοθέντα AB, δοθείς (nihil praeterea) S cod. Co

altero $\epsilon\delta < \delta\beta$. Ponatur $\delta\zeta = \epsilon\delta$. Quoniam data est proportio $\frac{\alpha\delta^2}{\beta\delta^2 + \gamma^2}$, eique aequalis est $\frac{\epsilon\delta^2}{\delta\beta^2}$; ergo etiam quae subtrahendo fit proportio $\frac{\alpha\delta^2 - \epsilon\delta^2}{\delta\gamma^2}$, id est propter elem. 2, 6 $\frac{\zeta\alpha \cdot \alpha\epsilon}{\delta\gamma^2}$, data est. Sed ¹⁾ quia data est proportio $\frac{\epsilon\delta}{\delta\beta}$, itemque $\frac{\zeta\beta}{\beta\delta}$, huic aequalis ponatur $\frac{\alpha\beta}{\beta\eta}$; ergo etiam proportio $\frac{\alpha\zeta}{\delta\eta}$ data est. Rursus quia data est proportio $\frac{\epsilon\delta}{\delta\beta}$, huic aequalis fiat $\frac{\alpha\delta}{\beta\delta}$; ergo etiam proportio $\frac{\alpha\beta}{\beta\delta}$ data est; itaque etiam subtractione facta proportio $\frac{\alpha\epsilon}{\delta\delta}$ data est; ergo etiam proportio $\frac{\zeta\alpha \cdot \alpha\epsilon}{\delta\delta \cdot \delta\eta}$ data est. Sed est data proportio $\frac{\zeta\alpha \cdot \alpha\epsilon}{\gamma\delta^2}$; ergo etiam proportio $\frac{\delta\delta \cdot \delta\eta}{\delta\gamma^2}$ data est. Et sunt duo data puncta ϑ et η ; in priore igitur casu punctum γ tangit ellipsim, in altero hyperbolam.

Componetur locus sic. Sint duo data puncta α et β , et data proportio $\varrho\tau^2 : \tau\sigma^2$, in priore casu maioris ad minus, in altero minoris ad maius, et ponatur $\tau\nu = \varrho\tau$, fiatque $\alpha\beta : \beta\eta = \nu\sigma : \sigma\tau$, atque etiam $\alpha\vartheta : \vartheta\beta = \varrho\tau : \tau\sigma$, et circa axem $\vartheta\eta$ describatur in priore casu ellipsis, in secundo hyperbola, ita ut, si in utraque sumatur quodvis punctum γ , et perpendicularis $\gamma\delta$ ducatur, sit

$$\frac{\delta\delta \cdot \delta\eta}{\delta\gamma^2} = \frac{\tau\sigma}{\sigma\nu} \cdot \frac{\tau\sigma}{\sigma\varrho} \cdot \frac{\varrho\tau^2}{\tau\sigma^2} \quad (\text{est autem } \frac{\varrho\tau^2}{\tau\sigma^2} \text{ data proportio}),$$

et ducatur perpendicularis $\beta\chi$; dico lineam $\vartheta\chi$ efficere id quod praecipitur.


¹⁾ Quae hinc usque sequuntur in brevius a scriptore Graeco contracta, ea in appendice partim secundum Commandinum, partim nostra coniectura explicavimus.

7. τῆς ΑΘ pro τῆς ΑΒ 8. εἶστιν Α(Β), om. S 9. δοθεὶς S, δο-
θεν Α(Β) 8. 9. δοθέν ἄρα τὸ Θ del. Hu 9. λοιπὴ Α(Β), corr. S
ἄρα add. Hu πρὸς Θ. I Co pro πρὸς ΕΔ 11. εἰτὶ ΑΒS τοῦ
δὲ BS, τὸ δὲ Α 12. ἄρα add. Hu auctore Co 13. τὰ ΘΗ Α,
distinx. BS 15. post ὑπερβολῆς add. μετῴων πρὸς ἐλάσσονα ἐλάσσων
πρὸς μετῴωνα ABS 16. εἴ add. BS 17. τὰ ΑΒ Α, distinx. BS
17. 18. ὁ τοῦ ἀπὸ PT πρὸς τὸ ἀπὸ TΣ Co pro ὁ τῆς PT πρὸς TΣ
18. 19. ἐλάσσων πρὸς μετῴωνα — μετῴων πρὸς ἐλάσσονα ABS, corr. Co
19. τοῦ ἀπὸ PT Co pro τοῦ ἀπὸ PΣ 30. ὅτι ἡ ΘΚ idem pro ὅτι ἡ ΒΚ

Ἦρθω γὰρ κάθετος ἡ ΓΔ, καὶ πεποιήσθω ὡς μὲν ἡ
 ΑΒ πρὸς τὴν ΒΗ, οὕτως ἡ ΖΒ πρὸς τὴν ΒΔ, ὡς δὲ ἡ
 ΑΘ πρὸς τὴν ΘΒ, οὕτως ἡ ΕΔ πρὸς τὴν ΑΒ, ὥστε ἔσται
 ὁ μὲν τῆς ΔΗ πρὸς τὴν ΑΖ λόγος ὁ αὐτὸς τῷ τῆς ΗΒ
 πρὸς τὴν ΒΔ, τουτέστιν τῷ τῆς ΤΣ πρὸς ΣΥ, ὁ δὲ τῆς
 ΘΔ πρὸς ΑΕ λόγος ὁ αὐτὸς [ἐστίν] τῷ τῆς ΤΣ πρὸς ΣΡ
 (τὸ αὐτὸ γὰρ ἐν τῇ ἀναλύσει ἀπεδείχθη), ὥστε τοῦ ὑπὸ
 ΘΔΗ πρὸς τὸ ὑπὸ ΖΑΕ λόγος συνήπται ἐξ οὗ ὃν ἔχει ἡ
 ΤΣ πρὸς ΣΥ καὶ ἡ ΤΣ πρὸς ΣΡ· ἀλλ' ἐπεὶ τὸ ὑπὸ ΘΔΗ
 πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΓ τὸν συνημμένον ἔχει λόγον ἐξ οὗ ὃν ἔχει 10
 ἡ ΤΣ πρὸς ΣΥ καὶ ἡ ΤΣ πρὸς ΣΡ καὶ ἐξ οὗ ὃν ἔχει ὁ δο-
 θεὶς λόγος, καὶ ἔστιν ὁ δοθεὶς λόγος ὁ τοῦ ἀπὸ ΡΤ πρὸς
 τὸ ἀπὸ ΤΣ, καὶ τὸ ὑπὸ ΘΔΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΓ συνήπται
 ἐξ οὗ ὃν ἔχει τὸ ὑπὸ ΘΔΗ πρὸς τὸ ὑπὸ ΖΑΕ καὶ τὸ ὑπὸ
 ΖΑΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΓ, καὶ ἔστιν ὁ τοῦ ὑπὸ τῶν ΘΔΗ 15
 πρὸς τὸ ὑπὸ ΖΑΕ λόγος ὁ αὐτὸς τῷ συνημμένῳ ἐξ οὗ ὃν
 ἔχει ἡ ΤΣ πρὸς ΣΥ καὶ ἡ ΤΣ πρὸς ΣΡ, λοιπὸς ἄρα τοῦ
 ὑπὸ ΖΑΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΓ λόγος ὁ αὐτὸς ἐστίν τῷ τοῦ
 ἀπὸ ΡΤ πρὸς τὸ ἀπὸ ΤΣ, τουτέστι τῷ τοῦ ἀπὸ ΕΔ πρὸς
 τὸ ἀπὸ ΑΒ. καὶ πάντα πρὸς πάντα· ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ΑΔ 20
 πρὸς τὰ ἀπὸ ΓΔ ΑΒ, οὕτως ἐστὶν τὸ ἀπὸ ΡΤ πρὸς τὸ
 ἀπὸ ΤΣ, τουτέστιν ὁ δοθεὶς λόγος, ὥστε τὸ ΘΚ μέρος τῆς
 τομῆς ποιεῖ τὸν τόπον.

- 318 ζ'. Τούτων οὕτως ἐχόντων ἐλευσόμεθα ἐπὶ τὸ ἐξ ἀρχῆς.
 ἔστω θέσει εὐθεῖα ἡ ΑΒ, καὶ δοθὲν τὸ Γ ἐν τῇ αὐτῇ 25
 ἐπιπέδῳ, καὶ διηχθῶ ἡ ΔΓ, κάθετος ἡ ΔΕ, λόγος δὲ ἔστω
 τῆς ΓΔ πρὸς ΔΕ· λέγω ὅτι τὸ Δ ἄπτεται κώνου τομῆς,
 καὶ ἐὰν μὲν ὁ λόγος ᾗ ἴσος πρὸς ἴσον, παραβολῆς, ἐὰν δὲ

6. ἐστίν del. Hu 7. τοῦτο γὰρ conl. Hu 9. ἐπεὶ BS, ἐπὶ Α
 10. τὸ ἀπὸ ΔΓ Co pro τὸ ἀπὸ ΑΓ 11. 12. καὶ ἐξ οὗ ὃν ἔχει ὁ
 δοθεὶς λόγος add. Co 13. post ἀπὸ ΤΣ add. ἐλάσσω πρὸς μείζονα
 ABS καὶ add. Hu 17. 18. λοιπὸν ἄρα τοῦ ὑπὸ ΘΔΗ ABS, corr.
 Co 19. τουτέστι A²BS 20. ἀπὸ ΑΒ Co pro ἀπὸ ΑΒ 21. πρὸς
 τὰ ἀπὸ ΓΔ ΑΒ Co, πρὸς τῷ ἀπὸ ΒΗ Α', πρὸς τὸ ἀπὸ ΒΗ Α²BS (sed
 in B τὰ ex τὸ correctum esse videtur) 24. ζ' add. BS 28. παρα-
 βολή ABS, corr. Hu



Ducatur enim perpendicularis $\gamma\delta$, et fiat $\frac{\zeta\beta}{\beta\delta} = \frac{\alpha\beta}{\beta\eta}$, et $\frac{\epsilon\delta}{\delta\beta} = \frac{\alpha\delta}{\delta\beta}$, ita ut sit²⁾

$$\frac{\delta\eta}{\alpha\zeta} = \frac{\eta\beta}{\beta\alpha} = \frac{\tau\sigma}{\sigma\nu}, \text{ et } \frac{\delta\delta}{\alpha\epsilon} = \frac{\tau\sigma}{\sigma\varrho} \text{ (hoc enim}$$

in analysi demonstratum est), ita ut per formulam compositae proportionis sit

$$\frac{\delta\delta \cdot \delta\eta}{\zeta\alpha \cdot \alpha\epsilon} = \frac{\tau\sigma}{\sigma\nu} \cdot \frac{\tau\sigma}{\sigma\varrho}.$$

Sed quia ex constructione $\delta\delta \cdot \delta\eta$ ad $\delta\gamma^2$ proportionem habet compositam e proportionibus $\tau\sigma : \sigma\nu$ et $\tau\sigma : \sigma\varrho$ et illa quae data est, id est $\varrho\tau^2 : \tau\sigma^2$, et quia est

$$\frac{\delta\delta \cdot \delta\eta}{\delta\gamma^2} = \frac{\delta\delta \cdot \delta\eta}{\zeta\alpha \cdot \alpha\epsilon} \cdot \frac{\zeta\alpha \cdot \alpha\epsilon}{\delta\gamma^2}, \text{ et } \frac{\delta\delta \cdot \delta\eta}{\zeta\alpha \cdot \alpha\epsilon} = \frac{\tau\sigma}{\sigma\nu} \cdot \frac{\tau\sigma}{\sigma\varrho},$$

divisione igitur facta restat

$$\frac{\zeta\alpha \cdot \alpha\epsilon}{\delta\gamma^2} = \frac{\varrho\tau^2}{\tau\sigma^2} = \frac{\epsilon\delta^2}{\delta\beta^2}, \text{ et } \frac{\zeta\alpha \cdot \alpha\epsilon + \epsilon\delta^2}{\delta\gamma^2 + \delta\beta^2} = \frac{\varrho\tau^2}{\tau\sigma^2}; \text{ ergo est}$$

$$\frac{\alpha\delta^2}{\gamma\delta^2 + \delta\beta^2} = \frac{\varrho\tau^2}{\tau\sigma^2}; \text{ et est } \frac{\varrho\tau^2}{\tau\sigma^2} \text{ data proportio,}$$

itaque linea δx , quae est pars conicae sectionis, locum efficit.

V. Haec cum ita se habeant, transibimus ad id quod ab ^{Prop. 238} initio propositum erat. Sit recta $\alpha\beta$ positione data, et in eodem plano datum punctum γ , et ducatur $\delta\gamma$, ac datae rectae $\alpha\beta$ perpendicularis recta $\delta\epsilon$, sitque data proportio $\gamma\delta : \delta\epsilon$: dico punctum δ conicam sectionem tangere, et quidem, si proportio sit magnitudinis aequalis ad aequalem, parabolam, sin

2) Hinc rursus conf. append.

ἐλάσσων πρὸς μείζονα, ἐλλείψεως, ἐὰν δὲ μείζων πρὸς ἐλάσσονα, ὑπερβολῆς.

Ἔστω γάρ πρότερον ὁ λόγος ἴσος πρὸς ἴσον, τουτέστιν ἔστω πρότερον ἴση ἡ ΓΑ τῇ ΔΕ· δεῖξαι ὅτι τὸ Δ ἄπτεται παραβολῆς.

Ἦχθω κάθετος ἡ ΓΖ (θέσει ἄρα ἐστί), τῇ δὲ ΑΒ παράλληλος ἡ ΔΗ. καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ ΕΔ ἴσον τῷ ἀπὸ ΔΓ, ἴση δὲ ἡ μὲν ΕΔ τῇ ΖΗ, τὸ δὲ ἀπὸ ΔΓ ἴσον τοῖς ἀπὸ ΔΗ ΗΓ, τὸ ἄρα ἀπὸ ΖΗ ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ ΔΗ ΗΓ. καὶ ἔστιν θέσει ἡ ΖΓ, καὶ δύο δοθέντα τὰ Ζ Γ· τὸ Δ ἄρα ἄπτεται παραβολῆς· τοῦτο γὰρ προδέδεικται.

γ'. Συντεθήσεται δὴ οὕτως. ἔστω ἡ τῇ θέσει ἡ ΑΒ, τὸ δὲ δοθὲν τὸ Γ, καὶ ἤχθω κάθετος ἡ ΓΖ, καὶ θέσει οὔσης τῆς ΓΖ καὶ δύο δοθέντων τῶν Ζ Γ, εὐρήσθω παραβολὴ ἡ ΑΘ, ὥστε, οἷον ἐὰν ληφθῇ σημεῖον ὡς τὸ Α, ἀχθῇ δὲ κάθετος ἡ ΔΗ, ἴσον ἐστὶν τὸ ἀπὸ ΖΗ τοῖς ἀπὸ ΔΗ ΗΓ· λέγω ὅτι ἡ ΑΘ γραμμὴ ποιᾷ τὸν τόπον, τουτέστιν, οἷα τις ἂν διαχθῇ ὡς ἡ ΓΑ καὶ κάθετος ἡ ΔΕ, ἴση ἐστὶν ἡ ΓΑ τῇ ΔΕ.

Ἦχθω κάθετος ἡ ΔΗ· διὰ ἄρα τῆς παραβολῆς ἴσον ἐστὶν τὸ ἀπὸ ΖΗ τοῖς ἀπὸ ΔΗ ΗΓ. καὶ ἔστιν τῇ μὲν ΖΗ ἴση ἡ ΕΔ, τοῖς δὲ ἀπὸ ΔΗ ΗΓ ἴσον τὸ ἀπὸ ΔΓ· τὸ ἄρα ἀπὸ ΔΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΔΕ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΓΑ τῇ ΔΕ· ἡ ἄρα ΑΘ γραμμὴ ποιᾷ τὸν τόπον.

1. ἐλάσσων BS, ελασσων (sine spir. et acc.) A ἑλλείπει A(B), Ἐλλειψις S, corr. Hu 2. ὑπερβολή ABS, corr. Hu 3. γὰρ Hu, τῶν AB, om. S 4. ἐστὶ A^oBS, item vs. 9 5. ἀπὸ ΔΗΓ (ante καὶ) ABS, corr. Co (conf. initium vs. 9) 6. ἡ' add. BS 7. τῶν ΖΓ A, distinct. BS 8. 9. ἀπὸ ΔΗΓ ABS, corr. Co, item vs. 24. 22 10. ποιᾷ add. Ge auctore Co 11. οἷα τις ἂν οἷα τις ἐν A^oBS, corr. Hu (nisi forte οἷον ἂν τις restituendum) ὡς ἡ ΓΑ AB, ὡς ἡ γζ S 12. διὰ A rec. ex D** 13. 20. 21. ἴσον ἐστὶν τὸ Hu pro ἴση ἐστὶν παράλληλος 24. post γραμμὴ add. τομὴν ABS, quae est pars sectionis Co (hic igitur voluit τουτέστιν μέρος τῆς τομῆς) post τόπον ultimam demonstrationis partem desiderari non fugit Commandinum; finem libri significat A^o hunc in modum: παπῆ ἀλεξάνδρου συναγωγῆς Ζ ὃ ἡ εἶχει τὴν τάξιν καὶ περιεχόμενα


Λήμμα τοῦ ἀναλυομένου.

- 319 Ἐστω τρίγωνον ὀρθογώνιον τὸ $ABΓ$, ὀρθὴν ἔχον τὴν
 ὑπὸ $ABΓ$ γωνίαν, καὶ ἔστω ὡς ἡ AB πρὸς $BΓ$, οὕτως ἡ
 AZ πρὸς τὴν ZB καὶ ἡ BH πρὸς $HΓ$, καὶ ἐπεξεύχθωσαν
 αἱ ABH $ΓEZ$ BBA . ὅτι ἡ BJ κάθετός ἐστιν ἐπὶ τὴν $ΑΓ$. 5
 Ἐπεὶ ὡς ἡ AB πρὸς $BΓ$, ἡ AZ πρὸς ZB , καὶ ἡ BH
 πρὸς $HΓ$, ὡς ἄρα ἡ AZ πρὸς BZ , ἡ BH πρὸς $HΓ$. συν-
 θέντι καὶ ἐναλλάξ ὡς ἡ AB πρὸς $BΓ$, ἡ ZB πρὸς $HΓ$.
 ἀλλ' ὡς ἡ AB πρὸς $BΓ$, ἡ BH πρὸς $HΓ$. ὡς ἄρα ἡ ZB
 πρὸς $HΓ$, ἡ BH πρὸς $HΓ$. ἴση ἄρα ἡ ZB τῇ BH . (ὥστε 10
 ἐπιζευχθείσης τῆς ZH καὶ γωνία ἡ ὑπὸ $BZΘ$ τῇ ὑπὸ $BHΘ$
 ἐστὶν ἴση. καὶ μείζων ἡ $ZΘ$ εὐθεία τῆς $ΘΗ$. εἰ γὰρ διὰ
 τοῦ H τῇ $ΑΓ$ παράλληλον ἀγάγωμεν τὴν HIK , ἡ ὑπὸ $BΘH$
 γωνία ταῖς ἀπεναντίον ὑπὸ $ΘHI$ $ΘIH$ ἴση οὖσα μείζων
 ἐστὶν τῆς ὑπὸ $HΘI$, τουτέστι τῆς ὑπὸ $ZBΘ$ ὀξείας, ὥστε καὶ 15
 λοιπὴν τὴν ὑπὸ $HBΘ$ ἐλάσσονα γίνεσθαι τῆς ὑπὸ $ZBΘ$.
 δίχα ἡ ZH τῷ A . ὁ ἄρα κέντρον τῷ A διαστήματι δὲ ἐνὶ
 τῶν AZ AB AH γραφόμενος κύκλος ἤξει καὶ διὰ τοῦ A ,
 καὶ ἔσται ἐν κύκλῳ τὸ $AZBH$ τετράπλευρον (τοῦτο γὰρ
 ἕξῃς). ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ BAZ γωνία τῇ ὑπὸ BAH , καὶ 20
 ἔστιν ἑκατέρω ἡμίσεια ὀρθῆς (καὶ γὰρ ἑκατέρω τῶν ὑπὸ

1. cap. 319—321 om. Co, quae quidem omnia misere turbata esse apparet; nam postquam capituli 319 propositio ab inepto quodam scriptore falso demonstrari coepta est, genuina et recta demonstratio paene tota perlit, quam alius quidem scriptor laque bene eruditus cap. 321 breviter adumbravit analytica ratione; praemisit autem lemma quoddam (cap. 320), quod iam initio primae demonstrationis (vs. 6—10) exstat 6. 7. ἡ AB πρὸς $BΓ$ — ὡς ἄρα omisimus in versione Latina, eademque malimus abesse a Graeco contextu 6. οὕτως ante ἡ AZ , idemque posthac ante ἡ BH etc. add. Ge 10. ὥστε ἐπιζευχθείσης — 12. ἐστὶν ἴση nullam per se suspicionem movent; at tamen ab his ipsis incipit demonstratio manifesto corrupta; nam rectam $\zeta\theta$ maiorem esse quam $\theta\eta$ neque ea quam legimus ratione demonstrari potest neque tres illos qui statui possunt casus perspexit scriptor, scilicet aut esse $\alpha\beta > \beta\gamma$ (unde sequitur $\zeta\theta > \theta\eta$; aut $= \beta\gamma$ aut $< \beta\gamma$; denique i nota geometrica aliena est ab antiquis Graecis scriptoribus 18. τῶν (ante AZ ; B, om. A^s 19. ἐν om. AB, add. S 20. τῇ ὑπὸ ZAH καὶ AS, corr. B

LEMMA LOCI ANALYTICI.

1. Sit triangulum orthogonium $\alpha\beta\gamma$, rectum angulum $\alpha\beta\gamma$ habens, sitque $\alpha\beta : \beta\gamma = \alpha\zeta : \zeta\beta = \beta\eta : \eta\gamma$, iunganturque rectae $\alpha\eta$ $\gamma\epsilon\zeta$ $\beta\delta$; dico $\beta\delta$ perpendicularem esse rectae $\alpha\gamma$.



Quoniam est

$\alpha\zeta : \zeta\beta = \beta\eta : \eta\gamma$, componendo est

$\alpha\beta : \zeta\beta = \beta\gamma : \eta\gamma$, et vicissim

$\alpha\beta : \beta\gamma = \zeta\beta : \eta\gamma$. Sed erat $\alpha\beta : \beta\gamma = \beta\eta : \eta\gamma$; ergo

$\zeta\beta : \eta\gamma = \beta\eta : \eta\gamma$; itaque

$\zeta\beta = \beta\eta$.

[Ergo iuncta recta $\zeta\eta$ est etiam $\angle\beta\zeta\eta = \angle\beta\eta\zeta$. Estque recta $\zeta\eta > \eta\gamma$; nam si per η rectae $\alpha\gamma$ parallelam ducamus rectam $\eta\mu$, angulus $\beta\eta\mu$, quippe qui aequalis sit summae oppositorum angulorum $\eta\mu\epsilon + \epsilon\eta\gamma$, maior (?) est quam $\eta\zeta\epsilon$, id est quam angulus $\zeta\beta\eta$ acutus (an forte $\zeta\beta\eta$?), ita ut etiam reliquus angulus $\eta\beta\eta$ minor sit quam $\zeta\beta\eta$. Bifariam secetur recta $\zeta\eta$ puncto λ ; ergo est $\beta\lambda = \zeta\lambda = \eta\lambda$, et circulus, cuius centrum est λ radiusque $\lambda\beta$, transibit etiam per punctum δ , et quadrilaterum $\delta\zeta\beta\eta$ circulo inscriptum erit (id enim deinceps demonstrabitur). Aequales inter se sunt anguli $\beta\delta\zeta$ $\beta\delta\eta$ (est enim $\angle\beta\delta\zeta = \angle\beta\eta\zeta$, et $\angle\beta\delta\eta = \angle\beta\zeta\eta$); et est uterque dimidius rectus nam etiam singuli $\beta\eta\zeta$ $\beta\zeta\eta$

ΒΗΖ ΒΖΗ ἡμίσειά ἐστιν ὁρθῆς. καὶ ὁρθὴ ἢ ἐπὶ ΖΔΗ· λέγω οὖν ὅτι ἢ ἐπὶ ΑΔΒ ὁρθὴ ἐστιν. εἰ γὰρ μή, ἦτοι μείζων ἐστὶν ἢ ἐλάσσων ὁρθῆς. ἔστω πρότερον μείζων ὁρθῆς, καὶ ἔστω ὁρθὴ ἢ ἐπὶ ΒΔΜ, τῶν ΗΓ ΜΔ ἐκβληθεισῶν καὶ συμπιπτονουσῶν κατὰ τὸ Ν. ἐπεὶ οὖν τὸ ΜΒΔ 5 τριγώνον ὁρθογώνιον ὁμοιὸν ἐστὶν τῷ ΜΒΝ τριγώνῳ ὁρθογώνιῳ, καὶ ἐστὶν ἡμίσεια ὁρθῆς ἑκατέρα τῶν ἐπὶ ΒΔΖ ΖΔΜ, ὥς ἄρα ἡ ΜΖ πρὸς ΖΒ, ἢ ΜΔ πρὸς ΔΒ. ἀλλ' ὥς ἡ ΜΔ πρὸς ΔΒ, ἢ ΒΔ πρὸς ΔΝ, τουτέστιν ἢ ΒΗ πρὸς ΗΝ (ὅτι γὰρ τέμνεται καὶ ἢ ἐπὶ ΒΔΝ γωνία τῇ ΔΗ 10 ὥς ἄρα ἡ ΜΖ πρὸς ΖΒ, ἢ ΒΗ πρὸς ΗΝ. πάλιν ἐπεὶ, ὥς ἢ ΑΖ πρὸς ΖΒ, ἢ ΒΗ πρὸς ΗΓ ἐπὶ τίθεται, ἢ ΜΖ ἄρα πρὸς ΖΒ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ ἢ ΒΗ πρὸς ΗΝ, ὅπερ ἀδύνατον· ἐδείχθη γὰρ ὥς ἡ ΜΖ πρὸς ΖΒ, ἢ ΒΗ πρὸς ΗΝ· οὐκ ἄρα μείζων ἐστὶν ὁρθῆς ἢ ἐπὶ ΒΔΔ γωνία. 15 ὁμοίως δὲ δεῖξομεν ὅτι οὐδὲ ἐλάσσων ἐστὶν ὁρθῆς ἢ ἐπὶ ΑΔΒ, διὰ τοῦ Α τῇ ΔΒ πρὸς ὁρθῆς ἀγαγόντες τὴν ΕΔΟ· ἔσται γὰρ πάλιν ὥς ἡ ΕΖ πρὸς ΖΒ, ἢ ΒΗ πρὸς ΗΟ, καὶ δειχθήσεται ἢ ΑΖ πρὸς ΖΒ πολλῶ ἐλάσσονα λόγον ἔχουσα ἢ περ ἢ ΒΗ πρὸς ΗΓ, ὅπερ ἀδύνατον· ἐπὶ τίθεται γὰρ ὥς 20 ἢ ΑΖ πρὸς ΖΒ, ἢ ΒΗ πρὸς ΗΓ.

320 Ἐστω ὥς ἢ ΑΒ πρὸς ΒΓ, ἢ ΑΖ πρὸς ΖΒ καὶ ἢ ΒΗ πρὸς ΗΓ· ὅτι ἴσιν ἐστὶν ἢ ΖΒ τῇ ΒΗ.

Ἐπεὶ ἐστὶν ὥς ἢ ΑΖ πρὸς ΖΒ, ἢ ΒΗ πρὸς ΗΓ, συνθέντι καὶ ἐναλλάξ ὥς ἢ ΑΒ πρὸς ΒΓ, τουτέστιν ὥς ἢ ΒΗ 25 πρὸς ΗΓ, ἢ ΖΒ πρὸς ΗΓ· ἴσιν ἄρα ἢ ΖΒ τῇ ΒΗ.

321 Τριγώνον ὁρθογώνιον τὸ ΑΒΓ, ὁρθὴ ἢ Β, καὶ ἔστω ὥς ἢ ΑΒ πρὸς ΒΓ, ἢ ΑΖ πρὸς ΖΒ καὶ ἢ ΒΗ πρὸς ΗΓ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΓΕΖ ΑΕΗ ΒΕΔ· ὅτι ἢ ΒΔ κάθετός 30 ἐστὶν ἐπὶ τῇ ΑΓ.

Γεγονέντω ὁμοία ἄρα τὰ ΑΒΔ ΒΔΓ τριγώνων τῇ ὕλῃ ΑΒΓ καὶ ἀλλήλοις· ὥς ἄρα ἢ ΑΒ πρὸς ΒΓ, τουτέστιν ἢ

1. ἡμίσειαν Α, corr. BS

6. ΜΒΝ τριγώνων Α, corr. BS

9. ἢ ΜΔ πρὸς ΔΒ post ἀλλ' ὥς; bis scripta in Α ἢ ΒΔ Hu pro ἢ ΜΔ

10. γωνία τῇ ΒΗ AB, corr. S

17. τὴν ΕΔΟ τῶν ΔΕΟ

AB, τὴν corr. S, alterum Hu

18. πρὸς ΖΒ Hu pro πρὸς ΖΘ

dimidii recti sunt. Et rectus est (ut in semicirculo) angulus $\zeta\delta\eta$; iam dico angulum $\alpha\delta\beta$ rectum esse. — Nam si non rectus sit, aut maior aut minor est recto. Sit prius maior recto; et sit rectus $\beta\delta\mu$, productis rectis $\eta\gamma$ $\mu\delta$ et concurrentibus in puncto ν . Iam quia triangulum orthogonium $\mu\delta\beta$ triangulo orthogonio $\mu\beta\nu$ simile est, et singuli $\beta\delta\zeta$ $\zeta\delta\mu$ dimidii recti sunt (nam demonstravimus angulum $\beta\delta\zeta$ dimidium rectum esse; ergo ex hypothesi alter dimidius est $\zeta\delta\mu$), est igitur (propter elem. 6, 3) $\mu\zeta : \zeta\beta = \mu\delta : \delta\beta$. Sed est $\mu\delta : \delta\beta = \delta\beta : \delta\nu$, id est $= \beta\eta : \eta\nu$ (nam etiam angulus $\beta\delta\nu$ recta $\delta\eta$ bifariam sectus est); ergo $\mu\zeta : \zeta\beta = \beta\eta : \eta\nu$. Rursus quia ex hypothesi est $\alpha\zeta : \zeta\beta = \beta\eta : \eta\gamma$, est igitur $\mu\zeta : \zeta\beta < \beta\eta : \eta\nu$, quod quidem fieri non potest; nam demonstravimus esse $\mu\zeta : \zeta\beta = \beta\eta : \eta\nu$; ergo angulus $\beta\delta\alpha$ non maior est recto. Similiter demonstrabimus eundem non minorem recto esse, postquam per δ rectae $\delta\beta$ perpendicularem $\xi\delta\sigma$ duxerimus; nam rursus erit $\xi\zeta : \zeta\beta = \beta\eta : \eta\sigma$, unde efficietur esse $\alpha\zeta : \zeta\beta < \beta\eta : \eta\sigma$, multoque $\alpha\zeta : \zeta\beta < \beta\eta : \eta\gamma$, quod quidem fieri non potest: nam ex hypothesi est $\alpha\zeta : \zeta\beta = \beta\eta : \eta\gamma$.

II. Sit $\alpha\beta : \beta\gamma = \alpha\zeta : \zeta\beta = \beta\eta : \eta\gamma$; dico esse $\zeta\beta = \beta\eta$.

Quoniam est


$\alpha\zeta : \zeta\beta = \beta\eta : \eta\gamma$, componendo est

$\alpha\beta : \zeta\beta = \beta\gamma : \eta\gamma$, et vicissim

$\alpha\beta : \beta\gamma = \zeta\beta : \eta\gamma$, id est

$\beta\eta : \eta\gamma = \zeta\beta : \eta\gamma$; ergo $\zeta\beta = \beta\eta$.

III. Sit triangulum orthogonium $\alpha\beta\gamma$, cuius rectus angulus β , et sit $\alpha\beta : \beta\gamma = \alpha\zeta : \zeta\beta = \beta\eta : \eta\gamma$, et iungantur $\gamma\zeta$ $\alpha\eta$ $\beta\epsilon\delta$: dico $\beta\delta$ rectae $\alpha\gamma$ perpendicularem esse.



Factum iam sit: ergo triangula $\alpha\delta\beta$ $\beta\delta\gamma$ et tota $\alpha\beta\gamma$ et sibi invicem similia sunt; ergo $\alpha\beta : \beta\gamma$.

19. $\delta\epsilon\chi\theta\eta\sigma\epsilon\alpha\iota$ add. Hu $\eta \overline{AZ} \pi\rho\delta\varsigma \overline{ZB}$ A rec. ex $\eta \overline{A\alpha} \pi\rho\delta\varsigma$..

21. $\tau\phi \delta\lambda\phi$! $\delta\lambda\phi$ $\tau\epsilon$ $\tau\phi$ conl. Hu

AZ πρὸς ZB , οὕτως ἡ AA πρὸς AB . ἡ ἄρα ὑπὸ AA B γωνία δίχα τέτμηται ὑπὸ τῆς ZA , ἡμίσεια ἄρα ὀρθῆς ἐστὶν ἡ ὑπὸ ZAB . διὰ ταῦτα δὴ καὶ ἡ ὑπὸ BAG δίχα τέτμηται ὑπὸ τῆς AH . ἡμίσεια ἄρα ὀρθῆς ἡ ὑπὸ BAH . ὀρθῇ ἄρα ἡ ὑπὸ ZAH . ὀρθῇ δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ZBH . ἐν κύκλῳ 5 ἄρα τὸ $BZAH$ τετράπλευρον. καὶ ἐστὶν ἡ ὑπὸ ZAB τῇ ὑπὸ BAH ἴση. ἴση ἄρα καὶ ἡ ZB τῇ BH . [ἐστὶν δὲ διὰ τὸ προδειχθέν.]

id est $\alpha\zeta : \zeta\beta = \alpha\delta : \delta\beta$; ergo angulus $\alpha\delta\beta$ recta $\zeta\delta$ bifariam sectus est (*elem. 6. 3*), itaque angulus $\zeta\delta\beta$ dimidius rectus est. Eadem ratione etiam angulus $\beta\delta\gamma$ recta $\delta\eta$ bifariam sectus est; ergo angulus $\beta\delta\eta$ dimidius rectus, itaque *totus* angulus $\zeta\delta\eta$ rectus est. Sed etiam angulus $\zeta\beta\eta$ rectus; ergo circulo inscriptum est quadrilaterum $\beta\zeta\delta\eta$. Et est angulus $\zeta\delta\beta$ angulo $\beta\delta\eta$ aequalis; ergo etiam (*propter elem. 3, 26. 29*) est $\zeta\beta = \beta\eta$. [Est vero propter id quod supra demonstravimus.]

3. ἡ (ante ὑπὸ ZAB add. BS διὰ ταῦτα $A'BS$, corr. Hu
6. τὸ $BAZH$ ABS, corr. Hu 7. sub finem perit synthesis problematis
8. post προδειχθέν add. B: Τέλος τοῦ ἑβδόμου τῆς πάππου τοῦ ἁλεί συνάγωγῆς ὃ περιέχει τὴν ταξιν καὶ τὴν περιοχὴν καὶ τὰ λήμματα τοῦ ἀναλυομένου τόπου, S: ἑβδόμου βιβλίου τέλος