



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.


We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

11/11/11
P156





QA
302
1E87
1787
v.1

**INSTITUTIONES
CALCULI
DIFFERENTIALIS
VOL. I.**

THE HISTORY OF THE
JESUIT MISSION
IN CALIFORNIA
BY
J. JOY

INSTITUTIONES
CALCULI
DIFFERENTIALIS

CUM EIUS USU
IN ANALYSI FINITORUM
AC
DOCTRINA SERIERUM

AUCTORE
LEONARDO EULERO

ACAD. REG. SCIENT. ET ELEG. LITT. BORUSS. DIRECTORE
PROP. HONOR. ACAD. IMP. SCIENT. PETROP.
ET ACADEMIARUM REGIARUM PARISINAE
ET LONDINENSIS SOCIO.

TICINI
IN TYPOGRAPHEO PETRI GALEATII
Superiorum permissu.
1787:

IOSEPHO . DE . WILZECK

S . R . I . COMITI

IOSEPHI . IL . P . F . AUG .

A . . CUBICULO . ET . PENITIORIBUS . CONSILII

REI . TABELLARIÆ . ET . CURSORIÆ

IN . ITALIA . PRÆFECTO .

PLENA . CUM . POTESTATE

DE . REBUS . IMPERII . PER . ITALIAM . LEGATO

ET . IN . AUSTRIACA . INSUBRIA

ADMINISTRO

CONSTANTI . FORTI . INTEGERRIMO

DE . INSUBRICIS . LITTERIS

DEQUE . ARCHIGYMNASIO . TICINENSI

OPTIME . MERITO

MUSISQUE . OMNIBUS . ET . GRATHS . CARISSIMO

FERDINANDUS . SPERONIUS

EX . MINOR . CONV . FAMILIA

EULERIANUM . OPUS . A . SE . EDITUM

ET . IUVENTUTIS . BONO . PARATUM

L . M . Q . D . D . D .

EDITOR LECTORI.

*A*bsolutissimum Differentialis Calculi Opus, quod trigintaduobus abhinc annis Geometrarum princeps **LEONARDUS EULERUS** Berolinensibus typis, & Petropolitanae Academiae sumptibus vulgaverat, distractis iam cunctis ferme exemplaribus, nec nisi ingenti pretio comparandis, novam iampridem editionem postulabat. Sed ingratum hunc molestumque laborem ut ipse susceperem, a me nunquam impetrare potuissem, nisi votis & flagitationibus illorum, qui diutius hoc opere carere non poterant, accessissent doctorum Virorum invitationes, cohortationesque amicorum, qui rem Geometris gratam, Juventuti utilissimam augurantes, me diu haesitantem & ancipitem stimulis additis pepulerunt.

Ad rem itaque aggressus Eulerianum Opus a capite ad calcem quam potui diligentissime legi & per-lustravi, calculosque omnes analyticos, quodque operosius erat ingentes illos numerorum acervos, qui passim occurrunt, maxima qua potui circumspectione recognovi. Mirum dictu est, quot quantosque offenderim typo-

typographicos errores corruptos numeros vitiatos calculos ambiguos sensus , ut ferre aequo animo haud possim Berolinensis Typographi simulationem dicam an levitatem? qui bina tantum errata, eaque levissima emendanda proposuit: Μέμνησο ἀπιστεῖν . Correclis typothetarum mendis reliquum erat , ut de pretio ac praestantia huic editioni prae antecedenti comparanda cogitarem , eamque novis quibusdam additamentis locupletarem . Igitur elegans , & grave Auctoris Elogium ab eximio Geometra & Philosopho Marchione CONDORCETO exaratum , & in publico Academiae Scientiarum Parisiensis conventu recitatum , sed nondum in eius Academiae Actis publici iuris factum , Operi universo praeposui : tum in operis calce indicem adieci absolutissimum omnium EULERI Lucubrationum , cum earum , quae separatim editae iustis voluminibus continentur , tum earum , quae numero prope incredibili in plurium Academicarum Commentariis leguntur , tum denique caeterarum , quae ineditae ad bis centum usque inter eius manuscripta inventae sunt , quaeque Petropolitanae Academiae traditae in eius Commentariis deinceps in lucem emittentur . Tam amplum atque immensum mathematicae eruditionis thesaurum prae oculis habere illumque pro opportunitate consulere res erit procul dubio iunioribus proveclioribusque Geometris utilissima , qui ex in-

fini-

finita illa rerum tractatarum multitudine quid sibi sumant, quid omittant statim perspicient, & ab iis quaestionibus tractandis abstinebunt, quas cognoverint ab EULERO inchoatas simul & perfectas, neque tanquam novum proponent quod ipse occupaverit; quod caeteroquin evenire facile posset, quum nullum ferme sit in universo Disciplinarum Mathematicarum ambitu argumentum paullo elegantius, quod Geometra iste Briaraeus vel non delibaverit, vel non absolverit.

Postremo operae pretium duxi brevibus quibusdam annotationibus locum unum vel alterum Euleriani Operis illustrare, eaque perpauca huc derivare, quae postmodum ab Auctore ipso, vel a Geometris aliis ad Differentialis Calculi amplificationem inventa sunt; perpauca inquam, nam Euleriano scripto multa addere hominis esset vel incredibilem huius Geometrae fecunditatem ignorantis, vel Phidiae simulacrum, aut Apellis tabulam emendare sibi arrogantis

Superesset nunc, ut grata animi significatione declararem quid ipse debeam Viro celeberrimo & polyhistori Praeceptoris nuper meo GREGORIO FONTANAE in Regio Ticinensi Archigymnasio sublimioris Matheseos Professori, quo suasore & auspice rem omnem molitus sum; sed verecundiae hominis modestissimi, quem vel nominare omnino prohibeor, parcendum est.

ÉLOGE DE M. EULER

Prononcé à la rentrée de l'Académie royale des sciences
le 6 Février 1785

Par

M. LE MARQ. DE CONDORCET

*Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, de l'Institut de Bologne
des Académies de Petersbourg, de Turin &c. &c. &c.*

LÉONARD EULER, Directeur de la classe de mathématique dans l'Académie de Petersbourg, & auparavant dans celle de Berlin, de la Société royale de Londres, des Académies de Turin, de Lisbonne & de Basle, associé étranger de celle des Sciences, naquit à Basle le 15 Avril 1707, de PAUL EULER & de MARGUERITTE BRUCKER.

Son pere, devenu en 1708 pasteur du village de Riechen près de Basle, fut son premier instituteur, & eut bientôt le plaisir de voir les espérances des talens & de la gloire d'un fils, si douces pour un cœur paternel, naître & se fortifier sous ses yeux & par ses soins.

Il avoit étudié les mathématiques sous JAKUES BERNOULLI. On fait que cet homme illustre joignoit à un grand génie

b

pour

pour les sciences une philosophie profonde, qui n'accompagne pas toujours ce génie, mais qui sert à lui donner plus d'étendue & à le rendre plus utile. Dans ses leçons, il faisoit sentir à ses disciples que la géométrie n'est pas une science isolée, & la leur présentoit comme la base & la clef de toutes les connoissances humaines; comme la science où l'on peut le mieux observer la marche de l'esprit; celle dont la culture exerce le plus utilement nos facultés, puisqu'elle donne à l'entendement de la force & de la justesse à la fois; enfin comme une étude également précieuse par le nombre ou la variété de ses applications & par l'avantage de faire contracter l'habitude d'une méthode de raisonner, qui peut s'employer ensuite à la recherche des vérités de tous les genres, & nous guider dans la conduite de la vie.

PAUL EULER, pénétré des principes de son maître, enseigna les éléments des mathématiques à son fils, quoiqu'il le destinât à l'étude de la théologie; & lorsque le jeune EULER fut envoyé à l'université de Basle, il se trouva digne de recevoir les leçons de JEAN BERNOULLI. Sa facilité, son application, ses dispositions heureuses, lui méritèrent bientôt l'amitié de DANIEL & de NICOLAS BERNOULLI, disciples & déjà rivaux de leur père. Il eut même le bonheur d'obtenir celle du sévère JEAN BERNOULLI, qui voulut bien lui donner, une fois par semaine, une leçon particulière, destinée à éclaircir les difficultés qui se présentoient à lui
dans

dans le cours de ses lectures & de ses travaux. Les autres jours étoient employés par M. EULER, à se mettre en état de profiter de cette faveur signalée.

Cette méthode excellente empêchoit son génie naissant de s'épuiser contre des obstacles invincibles, de s'égarer dans les routes nouvelles qu'il cherchoit à s'ouvrir; elle guidoit & secondoit ses efforts: mais en même tems elle l'obligeoit de déployer toutes ses forces, qu'il augmentoit encore par un exercice proportionné à son âge & à l'étendue de ses connoissances.

Il ne jouit pas longtems de cet avantage; & à peine eut-il obtenu le titre de maître-ès-arts, que son père, qui le destinoit à lui succéder, l'obligea de quitter les mathématiques, pour la théologie. Heureusement, cette rigueur ne fut que passagère. On lui fit aisément entendre que son fils étoit né pour remplacer dans l'Europe JEAN BERNOULLI, & non pour être pasteur de Riechen.

Un ouvrage que M. EULER fit à 19 ans sur la mâture des vaisseaux, sujet proposé par l'Académie des Sciences, obtint un accessit en 1727; honneur d'autant plus grand, que le jeune habitant des Alpes n'avoit pu être aidé par aucune connoissance pratique, & qu'il n'avoit été vaincu que par M. BOUGUER, Géomètre habile, alors dans la force de son talent, & déjà depuis dix ans Professeur d'hydrographie dans une ville maritime.

M. EULER concourroit en même tems pour une chaire dans l'Université de Basle ; mais c'est le sort qui prononce entre les savans admis à disputer ces places , & il ne fut pas favorable ; nous ne disons point à M. EULER , mais à sa patrie , qu'il le perdit peu de jours après & pour toujours. Deux ans auparavant , NICOLAS & DANIEL BERNOULLI avoient été appelés en Russie. M. EULER , qui les vit partir avec regret , obtint d'eux la promesse de chercher à lui procurer le même honneur qu'il ambitionnoit de partager , & il ne faut pas en être surpris. La splendeur de la capitale d'un grand empire , cet éclat qui , se rependant sur les travaux dont elle est le théâtre & sur les hommes qui l'habitent , semble ajouter à leur gloire , peuvent aisément séduire la jeunesse & frapper le citoyen libre , mais obscur & pauvre d'une petite république. MM. BERNOULLI furent fideles a leur parole & se donnerent , pour avoir auprès d'eux un concurrent si redoutable , autant de soins que des hommes ordinaires en auroient pu prendre pour écarter leurs rivaux.

Le voyage de M. EULER fut entrepris sous de tristes auspices. Il apprit bientôt que NICOLAS BERNOULLI avoit déjà été victime de la rigueur du climat. Et le jour même où il entra sur les terres de l'empire Russe fut celui de la mort de CATHERINE I. , événement qui parût d'abord menacer d'une dissolution prochaine l'Académie , dont cette Princesse , fidele aux vœux de son Epoux , venoit d'achever la

la fondation. M. EULER, éloigné de sa patrie, n'ayant point, comme M. DANIEL BERNOULLI, à y rapporter un nom célèbre & respecté, prit la résolution d'entrer dans la marine russe. Un des Amiraux de PIERRE I. lui avoit déjà promis une place, lorsque, heureusement pour la géométrie, l'orage élevé contre les sciences se dissipa. M. EULER obtint le titre de Professeur, succéda en 1733 à M. DANIEL BERNOULLI, lorsque cet homme illustre se retira dans son pays; & la même année il épousa M.^{lle} GSELL, sa compatriote, fille d'un peintre que PIERRE I. avoit ramené en Russie, au retour de son premier voyage. Dés-lors pour nous servir de l'expression de BACON, M. EULER sentit qu'il avoit donné des otages à la fortune, & que le pays, où il pouvoit espérer de former un établissement pour sa famille, étoit devenu pour lui une patrie nécessaire. Né chez une Nation où tous les gouvernemens conservent au moins l'apparence & le langage des constitutions républicaines, où, malgré des distinctions plus réelles que celles qui séparent les premiers esclaves d'un despote, du dernier de ses sujets, on a soigneusement gardé toutes les formes de l'égalité, où le respect qu'on doit aux loix s'étend jusqu'aux usages les plus indifférens, pourvu que l'antiquité, où l'opinion populaire, les ait consacrés; M. EULER se trouvoit transporté dans un pays où le Prince exerce une autorité sans bornes, où la loi la plus sacrée des gouvernemens absolus, celle qui règle la succession à l'empire, étoit alors

alors incertaine & méprisée, où des chefs, esclaves du souverain, regnoient despotiquement sur un peuple esclave ; & c'étoit dans le moment où cet empire, gouverné par un étranger ambitieux, défiant & cruel, gémissoit sous la tyrannie de BIREN, & offroit un spectacle aussi effrayant qu'instructif aux savans, qui étoient venus chercher dans son sein la gloire, la fortune & la liberté de goûter en paix les douceurs de l'étude.

On sent tout ce que dut éprouver l'ame de M. EULER, lié à ce séjour par une chaîne qu'il ne pouvoit plus rompre. Peut-être doit on à cette circonstance de sa vie, cette opiniâtreté pour le travail, dont il prit alors l'habitude & qui devint son unique ressource dans une capitale où l'on ne trouvoit plus que des ennemis, ou des satellites du ministre, occupés de flatter ses soupçons, ou de s'y dérober. Cette impression fut si forte sur M. EULER, qu'il la conservoit encore, lorsqu'en 1741, l'année d'après la chute de BIREN, dont la tyrannie fit place à un gouvernement plus modéré & plus humain, il quitta Petersbourg pour se rendre à Berlin, où le Roi de Prusse l'avoit appelé. Il fut présenté à la Reine-mère. Cette Princesse se plaisoit dans la conversation des hommes éclairés, & elle les accueilloit avec cette familiarité noble, qui annonce dans les princes le sentiment d'une grandeur personnelle, indépendante de leurs titres, & qui est devenue un des caractères de cette Famille auguste. Cependant

dant la Reine de Prusse ne put obtenir de M. EULER que des monosyllabes. Elle lui reprocha cette timidité , cet embarras , qu'elle croyoit ne pas mériter d'inspirer. Pourquoi ne voulez-vous donc pas me parler , lui dit-elle ? Madame , répondit-il , parceque je viens d'un pays où , quand on parle , on est pendu.

Parvenu au moment de rendre compte des travaux immenses de M. EULER , j'ai senti l'impossibilité d'en suivre les détails , de faire connoître cette foule de découvertes , de méthodes nouvelles , de vues ingénieuses répandues dans plus de trente ouvrages publiés à part , & dans près de sept-cens mémoires , dont environ deux-cens déposés à l'Académie de Petersbourg avant sa mort , sont destinés à enrichir successivement la collection qu'elle publie.

Mais un caractère particulier m'a semblé le distinguer des hommes illustres , qui , en suivant la même carrière , ont obtenu une gloire que la sienne n'a pas éclipsée : c'est d'avoir embrassé les sciences mathématiques dans leur universalité , d'en avoir successivement perfectionné les différentes parties , & , en les enrichissant toutes par des découvertes importantes , d'avoir produit une révolution utile dans la manière de les traiter. J'ai donc cru qu'en formant un tableau méthodique des différentes branches de ces sciences , en marquant pour chacune les progrès , les changemens heureux , qu'elle doit au génie de M. EULER , j'aurois , du moins autant

tant que mes forces me le permettent , donné une idée plus juste de cet homme célèbre , qui , par la reunion de tant de qualités extraordinaires , a été , pour ainsi dire , un phénomène , dont l'histoire des sciences ne nous avoit encore offert aucun exemple .

L'Algèbre n'avoit été pendant longtems qu'une science très-bornée . Cette maniere de ne considérer l'idée de la grandeur que dans le dernier degré d'abstraction , où l'esprit humain puisse atteindre , la rigueur avec la quelle on sépare de cette idée tout ce qui , en occupant l'imagination , pourroit donner quelqu'appui , ou quelque repos à l'intelligence ; enfin l'extrême généralité des signes que cette science emploie , la rendent en quelque sorte étrangère à notre nature , trop éloignée de nos conceptions communes , pour que l'esprit humain pût aisément s'y plaire & en acquérir facilement l'habitude . La marche même des méthodes algébriques rebutoit encore les hommes les plus propres à ces meditations . Pour peu que l'objet qu'on poursuit soit compliqué , elles forcent de l'oublier totalement , pour ne songer qu'à leurs formules ; la route qu'on suit est assurée , mais le but où l'on veut arriver , le point d'où l'on est parti , disparaissent également aux regards du Géomètre ; & il a fallu longtems du courage pour oser perdre la terre de vue & s'exposer sur la foi d'une science nouvelle . Aussi , en jettant les yeux sur les ouvrages des grands Géomètres du siecle dernier , de ceux
mê-

même, aux quels l'algebre doit les découvertes les plus importantes, on verra combien peu ils étoient accoûtumés à manier ce même instrument qu'ils ont tant perfectionné, & l'on ne pourra s'empêcher de regarder comme l'ouvrage de M. EULER, la révolution, qui a rendu l'analyse algébrique une méthode lumineuse, universelle, applicable à tout & même facile.

Après avoir donné sur la forme des racines des équations algébriques, sur leur solution générale, sur l'élimination, plusieurs théories nouvelles & des vues ingénieuses ou profondes, M. EULER porta ses recherches sur le calcul des quantités transcendentes. LEIBNITZ & les deux BERNOULLI se partagent la gloire d'avoir introduit dans l'analyse algébrique les fonctions exponentielles & logarithmiques. COTES avait donné le moyen de représenter par des sinus ou des cosinus les racines de certaines équations algébriques.

Un usage heureux de ces découvertes conduisit M. EULER à observer les rapports singuliers des quantités exponentielles & logarithmiques avec les transcendentes nées dans le cercle & ensuite à trouver des méthodes au moyen des quelles faisant disparaître de la solution des problèmes les termes imaginaires qui s'y feroient présentés & qui auroient embarrassé le calcul, quoiqu'on fût qu'ils dussent se détruire, réduisant les formules à une expression plus simple & plus commode, il est parvenu à donner une forme entièrement nouvelle à

c

la

la partie de l'analyse, qui s'applique aux questions d'astronomie & de physique. Cette forme a été adoptée par tous les Géomètres, elle est devenue d'un usage commun, & elle a produit dans cette partie du calcul à peu près la même révolution, que la découverte des logarithmes avoit produite dans les calculs ordinaires.

Ainsi, à certaines époques, où, après de grands efforts, les sciences mathématiques semblent avoir épuisé toutes les ressources de l'esprit humain & atteindre le terme marqué à leurs progrès, tout-à-coup une nouvelle méthode de calcul vient s'introduire dans ces sciences & leur donner une face nouvelle. Bientôt on les voit s'enrichir rapidement par la solution d'un grand nombre de problèmes importants dont les Géomètres n'avoient osé s'occuper, rebutés par la difficulté, & pour ainsi dire, par l'impossibilité physique de conduire leurs calculs jusqu'à un résultat réel. Peut-être la justice exigeroit-elle de réserver à celui qui a su introduire ces méthodes & les rendre usuelles, une portion de la gloire de tous ceux qui les employent avec succès; mais du moins il a sur leur reconnoissance des droits, qu'ils ne pourroient contester sans ingratitude.

L'analyse des séries a occupé M. EULER dans presque toutes les époques de sa vie. C'est même une des parties de ses ouvrages, où l'on voit briller le plus cette finesse, cette sagacité, cette variété de moyens & de ressources, qui le caractérisent.

Les

Les fractions continues, inventées par le Vicomte de BROUNKER, paroissent perqu'oubliées des Géomètres. M. EULER en perfectiona la théorie, en multiplia les applications & en fit sentir toute l'importance.

Les recherches, perqu'absolument neuves, sur les séries de produits indéfinis, offrent des ressources nécessaires à la solution d'un grand nombre de questions utiles ou curieuses; & c'est sur-tout en imaginant ainsi de nouvelles formes de séries & en les employant non seulement à des approximations, dont on est si souvent forcé de se contenter, mais aussi à la découverte des vérités absolues & rigoureuses, que M. EULER a sçu aggrandir cette branche de l'analyse, aujourd'hui si vaste, & bornée avant lui à un petit nombre de méthodes & d'applications.

Le calcul intégral, l'instrument le plus fécond de découvertes que jamais les hommes ayent possédé, à changé de face depuis les ouvrages de M. EULER. Il a perfectionné, étendu, simplifié toutes les méthodes employées ou proposées avant lui. On lui doit la solution générale des équations linéaires, premier fondement de ces formules d'approximations si variées & si utiles. Une foule de méthodes particulières, fondées sur differens principes, sont répandues dans ses ouvrages & réunies dans son traité du calcul integral. Là, on le voit, par un heureux usage des substitutions, ou rappeler à une méthode connue des équations qui sembloient

s'y refuser, ou réduire aux premières différentielles des équations d'ordres supérieurs; tantôt, en considérant la forme des intégrales, il en déduit les conditions des équations différentielles, aux quelles elles peuvent satisfaire; & tantôt l'examen de la forme des facteurs, qui rendent une différentielle complète, le conduit à former des classes générales d'équations intégrables. Quelquefois une propriété particulière, qu'il remarque dans une équation, lui offre un moyen de séparer les indéterminées, qui sembloient devoir y rester confondues. Ailleurs, si une équation où elles sont séparées se dérobe aux méthodes communes, c'est en mêlant ces indéterminées qu'il parvient à connoître l'intégrale.

Au premier coup d'œil, le choix & la réussite de ces moyens peuvent sembler en quelque sorte appartenir au hasard. Cependant un succès si fréquent & si sur, oblige de reconnoître une autre cause; & il n'est pas toujours impossible de suivre le fil délié, qui a guidé le génie. Si par exemple, on considère la forme des substitutions employées par M. EULER, on découvrira souvent ce qui a pu lui faire prévoir que cette opération produiroit l'effet dont il avoit besoin; & si on examine la forme que dans une de ses plus belles méthodes il suppose aux facteurs d'une équation du second ordre, on verra qu'il s'est arrêté à une de celles qui appartiennent particulièrement à cet ordre d'équation. A la vérité cette suite d'idées, qui dirige alors un analyste, est moins

moins une méthode, dont il puisse développer la marche, qu'une sorte d'instinct particulier ; dont il seroit difficile de rendre compte ; & souvent il aime mieux ne pas faire l'histoire de ses pensées, que de s'exposer au soupçon d'en avoir donné un roman ingénieux & fait après-coup.

M. EULER a observé que les équations différentielles sont susceptibles de solutions particulières qui ne sont pas comprises dans la solution générale. M. CLAIRAUT a fait la même remarque ; mais M. EULER a montré depuis, pourquoi ces intégrales particulières étoient exclues de la solution générale, il est le premier qui se soit occupé de cette théorie, perfectionnée depuis par plusieurs Géomètres célèbres & dans la quelle le mémoire de M. DE LA GRANGE, sur la nature de ces intégrales & leur usage dans la solution des problèmes, n'a plus rien laissé à désirer.

Nous citerons encore une partie de ce calcul, qui appartient presque en entier à M. EULER. C'est celle où l'on cherche des intégrales particulières pour une certaine valeur déterminée des inconnues, que renferme l'équation. Cette théorie est d'autant plus importante, que souvent l'intégrale générale, fuit absolument nos recherches, & que dans les problèmes où une valeur approchée de l'intégrale, ne suffit pas aux vues qu'on se propose, la connoissance de ces intégrales particulières peut suppléer à ce défaut. En effet, on connoit alors, du moins pour certains points, la valeur ri-

gou-

goureuse ; & cette connoissance , unie à celle d'une valeur générale approchée , doit suffire à presque tous les besoins de l'analyse .

Personne n'a fait un usage plus étendu & plus heureux des méthodes qui donnent la valeur de plus en plus approchée d'une quantité déterminée , par des équations différentielles & dont on a déjà une première valeur ; & il s'est également occupé de donner un moyen direct de deduire immédiatement de l'équation même une valeur assez voisine de la vraie , pour que les puissances élevées de leur différence puissent être négligées ; moyen sans le quel les méthodes d'approximation , en usage parmi les Géomètres , ne pourroient s'étendre aux équations pour les quelles les observations ou des considérations particulières ne donnent pas cette première valeur , dont ces méthodes supposent la connoissance .

Ce que nous avons dit , suffit pour montrer jusqu'à quel point M. EULER avoit approfondi la nature des équations différentielles , la source des difficultés qui s'opposent à l'intégration , & la manière de les éluder ou de les vaincre . Son grand ouvrage sur cet objet est non seulement un recueil précieux de méthodes neuves & étendues ; c'est encore une mine féconde de découvertes , que tout homme né avec quelque talent , ne peut parcourir sans en rapporter de riches dépouilles ; & l'on peut dire de cette partie des travaux de M. EULER , comme de beaucoup d'autres , que les
mé-

méthodes qu'elle renferme serviront longtems après lui à résoudre des questions importantes & difficiles & que ses ouvrages produiront encore & plus d'une découverte & plus d'une réputation.

Le calcul aux différences finies n'étoit presque connu que par l'ouvrage obscur, mais plein de sagacité, de TAYLOR. M. EULER en fit une branche importante du calcul intégral, lui donna une notation simple & commode, & sçut l'appliquer avec succès à la théorie des suites, à la recherche de leurs sommes ou de l'expression de leurs termes généraux, à celle de la racine des équations déterminées, à la manière d'avoir, par un calcul facile, la valeur approchée des produits, ou des sommes indéfinies de certains nombres.

C'est à M. D'ALEMBERT qu'appartient réellement la découverte du calcul aux différences partielles, puisque c'est à lui qu'est due la connoissance des fractions arbitraires, qui entrent dans les intégrales. Mais dans les premiers ouvrages de M. D'ALEMBERT, on voyoit plus le résultat du calcul, que le calcul lui-même. C'est à M. EULER que l'on en doit la notation. Il a sçu se le rendre propre en quelque manière par la profonde théorie qui l'a conduit à résoudre un grand nombre de ces équations; à distinguer les formes des intégrales, pour les différens ordres & pour les différens nombres de variables; à réduire ces équations, lorsqu'elles ont certaines formes, à des intégrations ordinaires; à donner les moyens de rappeler à ces
for-

formes, par d'heureuses substitutions, celles qui s'en éloignent; en un mot, en découvrant dans la nature des équations aux différences partielles plusieurs de ces propriétés singulières, qui en rendent la théorie générale si difficile & si piquante, qualités presque inséparables en géométrie, où le degré de la difficulté est si souvent la mesure de l'intérêt qu'on prend à une question, de l'honneur qu'on attache à une découverte. L'influence d'une vérité nouvelle sur la science même, ou sur quelque application importante, est le seul avantage qui puisse balancer ce mérite de la difficulté vaincue chez des hommes, pour qui le plaisir d'appercevoir une vérité est toujours proportionné aux efforts qu'elle leur a coûtés.

M. EULER. n'avoit négligé aucune partie de l'analyse. Il a démontré quelques uns des Théorèmes de Fermat, sur l'analyse indéterminée, & en a trouvé plusieurs autres non moins curieux, non moins difficiles à découvrir. La marche du Cavalier au jeu d'Echecs, & différens autres problèmes de situation, ont aussi piqué sa curiosité & exercé son génie. Il mêloit aux recherches les plus importantes, ces amusemens souvent plus difficiles, mais presque inutiles & au progrès même de la science & aux applications tentées jusqu'ici. M. EULER avoit un esprit trop sage, pour ne pas sentir l'inconvénient de se livrer longtems à ces recherches purement curieuses; mais trop étendu en même tems pour ne pas voir que leur inutilité ne devoit être que momentanée, & que le
seul

seul moyen de la faire cesser étoit de chercher à les approfondir & à les généraliser.

L'Application de l'Algèbre à la Géométrie avoit occupé, depuis DESCARTES, presque tous les Géomètres du dernier siècle. Mais M. EULER a prouvé qu'ils n'avoient pas, à beaucoup près, tout épuisé. On lui doit de nouvelles recherches sur le nombre des points qui déterminent une ligne courbe, dont le degré est connu, & sur celui des intersections des lignes de différens degrés. On lui doit également l'équation générale des courbes, dont les développées, les secondes, les troisièmes développées, en un mot les développées d'un ordre quelconque, sont semblables à la courbe génératrice; équation remarquable par son extrême simplicité.

La Théorie générale des surfaces courbes étoit peu connue; & M. EULER est le premier qui l'ait développée dans un ouvrage élémentaire. Il y ajouta celle des rayons osculateurs de ces surfaces; & il parvint à cette conclusion singulière, que la courbure d'un élément de surface est déterminée par deux des rayons-osculateurs des courbes formées par l'intersection de la surface & d'un plan qui passe par la perpendiculaire au point donné; que ces rayons sont le plus grand & le plus petit de tous ceux qui appartiennent à la suite des courbes ainsi formées, & qu'enfin ils se trouvent toujours dans des plans perpendiculaires l'un à l'autre.

Il donna de plus une méthode de déterminer les surfa-

d

ces

ces qui peuvent être développées sur un plan & une théorie des projections géographiques de la sphère. Ces deux ouvrages renferment une application de calcul des différences partielles à des problèmes géométriques ; application qui peut s'étendre à beaucoup de questions intéressantes, & dont la première idée est due à M. EULER.

Ses recherches sur les courbes, qui, tracées sur une sphère, sont rectifiables algébriquement, & sur les surfaces courbes, dont les parties correspondantes à des parties d'un plan donné sont égales entr'elles, l'ont conduit à une nouvelle espèce d'analyse, à la quelle il donne le nom d'analyse infinitésimale indéterminée ; parceque, comme dans l'analyse indéterminée ordinaire, les quantités qui restent arbitraires sont assujetties à certaines conditions ; &, de même que l'analyse indéterminée a pu servir quelque fois à la perfection de l'Algèbre, M. EULER regardoit sa nouvelle analyse comme une science qui devoit un jour être utile aux progrès du calcul integral.

En effet, ces questions isolées, qui ne tiennent pas au corps méthodique des sciences mathématiques, qui n'entrent point dans les applications qu'on peut en faire, ne doivent pas être regardées seulement comme des moyens d'exercer les forces, ou de faire briller le génie des Géomètres. Presque toujours, dans les sciences, on commence par cultiver séparément quelques parties isolées. A mesure que les décou-

ver-

vertes successives se multiplient, les liaisons qui unissent ces parties se laissent successivement appercevoir; & le plus souvent c'est aux lumieres qui resultent de cette reunion que sont dues les grandes découvertes, qui sont époque dans l'histoire de l'esprit humain.

La question de déterminer les courbes ou les surfaces, pour les quelles certaines fonctions indéfinies sont plus grandes ou plus petites que pour toutes les autres, avoit exercé les Géomètres les plus illustres du siècle dernier; les solutions des problèmes du solide de la moindre résistance, de la courbe de plus vite descente, de la plus grande des aires isopérimetres, avoient été célèbres en Europe. La méthode générale de résoudre le problème, étoit cachée dans ces solutions, & surtout dans celle que JACQUES BERNOULLI avoit trouvée par la question des isopérimetres & qui lui avoit donné sur son Frere un avantage, que tant de chefs-d'œuvres, enfantés depuis par JEAN BERNOULLI, n'ont pu faire oublier. Mais il falloit développer cette méthode, il falloit la réduire en formules générales; & c'est ce que fit M. EULER dans un ouvrage imprimé en 1744 & l'un des plus beaux monumens de son génie. Pour trouver ces formules, il avoit été obligé d'employer la consideration des lignes courbes. Quinze ans après, un jeune Géomètre (M. de la GRANGE), qui, dans ses premiers essais, annonçoit un digne successeur d'EULER, résolut le même problème par une mé-

thode purement analytique. M. EULER admira le premier ce nouvel effort de l'art du calcul, s'occupa lui-même d'exposer la nouvelle méthode, d'en présenter les principes, & d'en donner les développemens avec cette clarté; cette élégance qui brillent dans tous ses ouvrages. Jamais le génie ne reçut & ne rendit un plus bel hommage; & jamais il ne se montra plus supérieur à ces petites passions, que le partage d'un peu de gloire rend si actives & si violentes dans les hommes ordinaires.

Nous terminerons cet exposé des travaux de M. EULER sur l'analyse pure, en observant qu'il seroit injuste de borner son influence sur les progrès des mathématiques, aux decouvertes sans nombre dont ses ouvrages sont remplis. Ces communications qu'il a ouvertes entre toutes les parties d'une science si vaste; ces vues générales que souvent même il n'indique pas, mais qui n'échappent point à un esprit attentif; ces routes dont il s'est contenté d'ouvrir l'entrée & d'aplanir les premiers obstacles, sont encore autant de bienfaits dont les sciences s'enrichiront, & dont la postérité jouira, en oubliant peut-être la main dont elle les aura reçu.

Le traité de Mécanique, que M. EULER donna en 1736, est le premier grand ouvrage où l'analyse ait été appliquée à la science du mouvement. Le nombre des choses neuves, ou présentées d'une manière nouvelle, qui entrent dans ce trai-

traité, eût étonné, les Géomètres, si M. EULER n'en eût déjà publié séparément la plus grande partie.

Dans ses nombreux travaux sur la même science, il fut toujours fidele à l'analyse & l'usage heureux qu'il en a fait, a mérité à cette méthode la préférence qu'elle a enfin obtenue sur toutes les autres.

La solution du problème où l'on cherche le mouvement d'un corps lancé dans l'espace & attiré vers deux points fixés, est devenue célèbre par l'art avec le quel des substitutions dont M. EULER savoit si bien prévoir la forme, l'ont conduit à réduire aux quadratures des équations, que leur complication & leur forme pouvoient faire regarder comme insolubles.

Il appliqua l'analyse au mouvement d'un corps solide, d'une figure donnée; & elle le conduisit à ce beau Théorème, déjà donné par SEGNER, qu'un corps d'une figure quelconque peut tourner librement d'un mouvement uniforme autour de trois axes perpendiculaires entr'eux, à la connoissance de plusieurs propriétés singulieres de ces trois axes principaux, & enfin aux équations générales du mouvement d'un corps, quelque soit sa figure & la loi des forces accélératrices, qui agissent sur ses élémens, ou sur quelques unes de ses parties.

Le problème des cordes vibrantes, & tous ceux qui appartiennent à la Théorie du son, ou des loix des oscillations de

de l'air, ont été soumis à l'analyse par les nouvelles méthodes dont il enrichit le calcul des différences partielles, une théorie du mouvement des fluides, appuyée sur ce même calcul, étonna par la clarté qu'il a répandue sur des questions si épineuses & la facilité qu'il a su donner à des méthodes fondées sur l'analyse si profonde.

Tous les problèmes de l'astronomie physique, qui ont été traités dans ce siècle, ont été résolus par des méthodes analytiques particulières à M. EULER. Sa Théorie de la lune est un modèle de la simplicité, de la précision aux quelles on peut porter ces méthodes; &, en lisant cet ouvrage, on n'est pas moins étonné de voir jusqu'où un homme d'un grand génie, animé du désir de ne rien laisser à faire sur une question importante, peut pousser la patience & l'opiniâtreté du travail.

L'astronomie n'employoit que des méthodes géométriques, M. EULER sentit tout ce qu'elle pouvoit espérer des secours de l'analyse; & il le prouva par des exemples, qui, imités depuis par plusieurs savans célèbres, pourront un jour faire prendre à cette science une forme nouvelle.

Il embrassa la science navale dans un grand ouvrage, au quel une savante analyse sert de base, & où les questions les plus difficiles sont soumises à ces méthodes générales & fécondes qu'il savoit si bien créer & employer. Longtems après, il publia sur la même matière, un abrégé élémentaire
de

de ce même traité, où il renferme sous la forme la plus simple ce qui peut être utile à la pratique & ce que doivent savoir ceux qui se consacrent au service de mer. Cet ouvrage, quoique destiné par l'auteur aux seules écoles de l'empire de Russie, lui mérita une gratification du Roi, qui jugea que des travaux utiles à tous les hommes, avoient des droits à la reconnaissance de tous les souverains, & voulût montrer que même aux extrémités de l'Europe, des talens si rares ne pouvoient échapper ni à ses regards, ni à ses bienfaits. M. EULER fut sensible à cette marque de l'estime d'un Roi puissant & elle reçut un nouveau prix à ses yeux, de la main qui la lui transmit; c'étoit celle de M. TURGOT, Ministre respecté dans l'Europe par ses lumières, comme par ses vertus, fait pour commander à l'opinion, plutôt que pour lui obéir, & dont le suffrage, toujours dicté par la vérité & jamais par le désir d'attirer sur lui même l'approbation publique, pouvoit flatter un sage trop accoutumé à la gloire, pour être encore sensible au bruit de sa renommée.

Dans les hommes d'un génie supérieur, l'extrême simplicité de caractère peut s'allier avec les qualités de l'esprit, qui semblent le plus annoncer de l'habileté, ou de la finesse.

Aussi M. EULER, malgré cette simplicité qui ne se démentit jamais, savoit cependant distinguer, avec une sagacité toujours indulgente, il est vrai, les hommages d'une admiration

tion éclairée & ceux que la vanité prodigue aux grands hommes, pour s'affurer du moins le mérite de l'enthousiasme.

Les travaux sur la Dioptrique, sont fondés sur une analyse moins profonde; & on est tenté de lui en savoir gré, comme d'une espece de sacrifice. Les différens rayons, dont un rayon solaire est formé, subissent dans le même milieu des refractions différentes; séparés ainsi des rayons voisins, ils paroissent seuls, ou moins mélangés, & donnent la sensation de couleur qui leur est propre. Cette refrangibilité varie dans les différens milieux pour chaque rayon & suivant une loi, qui n'est pas la même que celle de la refraction moyenne dans ces milieux. Cette observation donnoit lieu de croire que deux prismes inégaux & de différentes matieres, combinés ensemble, pourroient détourner un rayon de sa route sans le décomposer, ou plutôt en remplaçant par une triple refraction les rayons élémentaires dans une direction parallele.

De la vérité de cette conjecture pouvoit dépendre, dans les lunettes, la destruction des iris qui colorent les objets vus à travers les verres lenticulaires. M. EULER étoit convaincu de la possibilité du succès, d'après cette idée méthaphisique, que si l'oeil a été composé de diverses humeurs, c'est uniquement dans l'intention d'y détruire les effets de l'aberration de refrangibilité. Il ne s'agissoit donc que de chercher à imiter l'opération de la nature; & il en proposa
les

les moyens, d'après une théorie qu'il s'étoit formée. Ses premiers essais excitèrent les Physiciens à s'occuper d'un objet qu'ils paroissent avoir négligé. Leurs expériences ne confirmèrent point la théorie de M. EULER : mais elles confirmèrent les vues qu'il avoit eues sur la perfection des lunettes. Instruit alors par eux des loix de la dispersion dans les différens milieux, il abandonna ses premières idées, soumit au calcul les résultats de leurs expériences & enrichit la Dioptrique de formules analytiques simples, commodes, générales, applicables à tous les instrumens qu'on peut construire.

On a encore de M. EULER quelques essais sur la théorie générale de la lumière, dont il cherchoit à concilier les phénomènes avec les lois des oscillations d'une fluide, parce que l'hypothèse de l'émission des rayons en ligne droite, lui paroissoit présenter des difficultés insurmontables. La Théorie de l'aiman, celle de la cohésion des corps, celles des frottemens, furent aussi pour lui l'occasion de savans calculs, appuyés malheureusement sur des hypothèses, plutôt que sur des expériences.

Le calcul des probabilités, l'arithmétique politique, furent encore l'objet de ses infatigables travaux. Nous ne citerons ici que ses recherches sur les tables de mortalité & sur les moyens de les déduire des phénomènes avec plus d'exactitude. Sa méthode de prendre un milieu entre des observations, ses calculs sur l'établissement d'une caisse d'em-

e

prunt,

prunt, dont le but est d'affurer aux veuves, aux enfans, ou une somme fixe, ou une rente, payables après la mort d'un mari, ou d'un pere: moyen ingénieux, imaginé par des Géomètres-Philosophes, pour contrebalancer le mal moral, qui résulte de l'établissement des rentes viageres, & pour rendre utiles aux familles les plus petites épargnes que leur chef peut faire sur son gain journalier, ou sur les appointemens soit d'une commission, soit d'une place.

On a vu dans l'éloge de M. DANIEL BERNOULLI, qu'il avoit partagé avec M. EULER seul la gloire d'avoir remporté dix prix à l'académie des sciences. Souvent ils travaillèrent pour les mêmes sujets, & l'honneur de l'emporter sur son concurrent fut encore partagé entr'eux, sans que jamais cette rivalité ait suspendu les temoignages reciproques de leur estime, ou refroidi le sentiment de leur amitié. En examinant les sujets sur lesquels l'un ou l'autre ont obtenu la victoire, on voit que le succès a dépendu surtout du caractère de leur talent; lorsque la question exigeoit de l'adresse dans la maniere de l'envisager, un usage heureux de l'expérience, ou des vues de physique ingénieuses & neuves l'avantage étoit pour M. DANIEL BERNOULLI; n'offroit elle a vaincre que de grandes difficultés de calcul, falloit-il créer de nouvelles méthodes d'analyse, c'étoit M. EULER qui l'emportoit; & si l'on pouvoit avoir la témérité de vouloir juger entr'eux, ce ne seroit pas entre deux hommes qu'on

qu'on auroit à prononcer, ce feroit entre deux genres d'esprit, entre deux manieres d'employer le génie.

Nous n'aurions donné qu'une idée très-imparfaite de la fécondité de M. EULER, si nous n'ajoutions à cette foible esquisse de ses travaux, qu'il est peu de sujets importants pour les quels il ne soit revenu sur ses traces, en refaisant même plusieurs fois son premier ouvrage. Tantôt il substituoit une méthode directe & analytique à une méthode indirecte. Tantôt il étendoit sa première solution à des cas qui lui avoient d'abord échappé; ajoutant presque toujours de nouveaux exemples, qu'il savoit choisir avec un art singulier, parmi ceux qui offroient ou quelque application utile, ou quelque remarque curieuse. La seule intention de donner à son travail une forme plus méthodique, d'y repandre plus de clarté, d'y ajouter un nouveau degré de simplicité, suffisoit pour le déterminer à des travaux immenses. Jamais Géomètre n'a tant écrit; & jamais aucun n'a donné à ses ouvrages un tel degré de perfection. Lorsqu'il publioit un mémoire sur un objet nouveau, il exposoit avec simplicité la route qu'il avoit parcourue, il en faisoit observer les difficultés, ou les détours; & après avoir fait suivre scrupuleusement à ses lecteurs la marche de son esprit dans ses premiers essais, il leur montrait ensuite comment il étoit parvenu à trouver une route plus simple. On voit qu'il préféroit l'instruction de ses disciples, à la petite satisfaction de

les étonner , & qu'il croyoit n'en pas faire assez pour la science , s'il n'ajoutoit aux vérités nouvelles , dont il l'enrichissoit , l'exposition naïve des idées qui l'y avoient conduit.

Cette méthode d'embrasser ainsi toutes les branches des mathématiques , d'avoir pour ainsi dire toujours présentes à l'esprit toutes les questions & toutes les théories , étoit pour M. EULER une source de découvertes fermée pour presque tous les autres , ouverte pour lui seul . Ainsi , dans la suite de ses travaux , tantôt s'offroit à lui une méthode singulière d'intégrer des équations en les différentiant , tantôt une remarque sur une question d'analyse , ou de mécanique , le conduisoit à la solution d'une équation différentielle très-compiquée , qui échappoit aux méthodes directes . C'est quelquefois un problème en apparence très difficile , qu'il résout en un instant par une méthode très simple , ou un problème qui paroît élémentaire & dont la solution a des difficultés qu'il ne peut vaincre que par de grands efforts ; d'autres fois , des combinaisons de nombres singuliers , des séries d'une forme nouvelle , lui présentent des questions piquantes , par leur nouveauté , ou le mènent à des vérités inattendues ; M. EULER avertissoit alors avec soin que c'étoit au hasard qu'il devoit les découvertes de ce genre . Ce n'étoit pas en diminuer le mérite ; car on voyoit aisément que ce hasard ne pourroit arriver qu'à un homme qui joindroit à une vaste

ste

ste étendue de connoissances, la sagacité la plus rare. D'ailleurs, peut-être ne faudroit-il pas le louer de cette candeur, quand même elle lui auroit coûté un peu de sa gloire. Les hommes d'un grand génie ont rarement ces petites ruses de l'amour propre, qui ne servent qu'à rapetisser aux yeux des juges éclairés ceux qu'elles agrandissent dans l'opinion de la multitude, soit que l'homme de génie sente qu'il ne sera jamais plus grand qu'en se montrant tel qu'il est, soit que l'opinion n'ait pas sur lui cet empire qu'elle exerce avec tant de tyrannie sur les hommes médiocres.

Lorsque l'on lit la vie d'un grand homme, soit conviction de l'imperfection attachée à la foiblesse humaine, soit que la justice dont nous sommes capables ne puisse atteindre jusqu'à reconnoître dans nos semblables une supériorité dont rien ne nous console, soit enfin que l'idée de la perfection dans un autre, nous blesse, ou nous humilie encore plus que celle de la grandeur; il semble qu'on a besoin de trouver un endroit foible; on cherche quelque défaut qui puisse nous relever à nos propres yeux, & l'on est involontairement porté à se défier de la sincérité de l'Ecrivain, s'il ne nous montre pas cet endroit foible, s'il ne souleve point le voile important dont ces défauts sont couverts.

M. EULER poroissoit quelquefois ne s'occuper que du plaisir de calculer & regarder le point de mécanique ou de physique, qu'il examinait seulement comme une occasion d'exer-

d'exercer son génie & de se livrer à sa passion dominante. Aussi les savans lui ont-ils reproché d'avoir quelquefois prodigué son calcul à des hypothèses physiques, ou même à des principes métaphysiques, dont il n'avoit pas assez examiné ou la vraisemblance, ou la solidité. Ils lui reprochoient aussi de s'être trop reposé sur les ressources du calcul & d'avoir négligé celles que pouvoit lui donner l'examen des questions même qu'il se proposoit de résoudre. Nous conviendrons que le premier reproche n'étoit pas sans fondement. Nous avouons que dans M. EULER, le Metaphysicien, ou même le Physicien, n'a pas été si grand, que le Géomètre; & l'on doit regretter sans doute que plusieurs parties de ses ouvrages, par exemple de ceux qu'il a faits sur la science navale, sur l'artillerie, n'aient presque été utiles qu'aux progrès de la science du calcul. Mais nous croyons que le second reproche est beaucoup moins mérité. Partout, dans les ouvrages de M. EULER, on le voit occupé d'ajouter aux richesses de l'analyse, d'en étendre & d'en multiplier les applications. En même tems qu'elle paroît son instrument unique, on voit qu'il a voulu en faire un instrument universel. Le progrès naturel des sciences mathématiques devoit amener cette révolution; mais il l'a vu, pour ainsi dire, s'accomplir sous ses yeux; c'est à son génie que nous la devons; elle a été le prix de ses efforts & de ses découvertes. Ainsi, lors même qu'il paroïssoit abuser de l'analyse, & en épuiser
tous

tous les secrets pour résoudre une question dont quelques réflexions , étrangères au calcul , lui eussent donné une solution simple & facile , souvent il ne cherchoit qu'à montrer les forces & les ressources de son art ; & on doit lui pardonner si quelquefois , en paroissant s'occuper d'une autre science , c'étoit encore au progrès & à la propagation de l'analyse que ses travaux étoient consacrés , puisque la révolution qui en a été le fruit est un de ses premiers droits à la reconnaissance des hommes & un de ses plus beaux titres à la gloire .

Je n'ai pas cru devoir interrompre le détail des travaux de M. EULER , par le recit des événemens très-simples & très-peu multipliés de sa vie .

Il s'établit à Berlin en 1741 & y resta jusqu'en 1766 .

Madame la Princesse D'ANHALT-DESSAU , Niece du Roi de Prusse , voulut recevoir de lui quelques leçons de physique . Ces leçons ont été publiées sous le nom de lettres à une Princesse d'Allemagne : ouvrage précieux par la clarté singulière avec laquelle il y a exposé les vérités les plus importantes de la mécanique , de l'astronomie physique , de l'optique & de la théorie des sons ; & par des vues ingénieuses moins philosophiques , mais plus savantes que celles qui ont fait survivre le livre de la pluralité du monde , au système des tourbillons . Le nom d'EULER , si grand dans les sciences , l'idée imposante que l'on se forme de ses ouvra-

ges

ges destinés à approfondir ce que l'analyse a de plus épineux & de plus abstrait, donne à ces lettres si simples, si faciles, un charme singulier. Ceux qui n'ont pas étudié les mathématiques, étonnés, flattés peut-être de pouvoir entendre un ouvrage d'EULER, lui savent gré de s'être mis à leur portée; & ces détails élémentaires des sciences, acquièrent une sorte de grandeur, par le rapprochement qu'on en fait avec la gloire & le génie de l'homme illustre, qui les a tracées.

Le Roi de Prusse employa M. EULER à des calculs sur les monnoies, à la conduite des eaux de Sans-fouci, à l'examen de plusieurs canaux de navigation. Ce Prince n'étoit pas né pour croire que de grands talens & des connoissances profondes, fussent jamais des qualités superflues & dangereuses; & le bonheur de pouvoir être utile, un avantage réservé par la nature à l'ignorance & à la médiocrité.

En 1750, M. EULER fit le voyage de Francfort pour y recevoir sa mère, veuve alors, & la ramener à Berlin. Il eut le bonheur de l'y conserver jusqu'en 1761. Pendant onze ans, elle jouit de la gloire de son fils, comme le cœur d'une mère fait en jouir, & fut plus heureuse encore peut-être par ses soins tendres & assidus dont cette gloire augmentoit le prix.

Ce fut pendant son séjour à Berlin, que M. EULER, lié par la reconnaissance à M. MAUPERTUIS, se crut obligé de défendre ce principe de la moindre action, sur lequel
le

le Président de l'académie de Prusse avoit fondé l'espérance d'une si grande renommée. Le moyen que choisit M. EULER ne pouvoit guere être employé que par lui. C'étoit de résoudre par ce principe quelques uns des problèmes les plus difficiles de la mécanique. Ainsi, dans les tems fabuleux, les Dieux daignoient fabriquer pour les guerriers, qu'ils favorisoient, des armes impénétrables aux coups de leurs adversaires. Nous desirerions que la reconnoissance de M. EULER se fut bornée à une protection si noble & si digne de lui; mais on ne peut se dissimuler qu'il n'ait montré trop de dureté dans ses réponses à KOENIG: & c'est avec douleur que nous sommes obligés de compter un grand homme parmi les ennemis d'un savant malheureux & persécuté. Heureusement, toute la vie de M. EULER le met à l'abri d'un soupçon plus grave. Sans cette indifférence pour la renommée, qu'il a montrée constamment, on auroit pu croire que les plaisanteries d'un illustre partisan de M. EULER (plaisanteries que M. DE VOLTAIRE lui-même a depuis condamnées à un juste oubli) avoient altéré le caractère de M. EULER. Mais s'il fit alors une faute, c'est à l'excès seul de la reconnoissance qu'il faut l'attribuer; & c'est par un sentiment respectable, qu'il a été injuste une seule fois dans sa vie.

Les Russes ayant pénétré dans la Marche en 1760, pillèrent une métairie que M. EULER avoit auprès de Charlottenbourg; mais le Général TOTTEBEN n'étoit pas venu

f

faire

faire la guerre aux sciences. Instruit de la perte que M. EULER avoit essuyée, il s'empressa de la reparer, en faisant payer le dommage à un prix fort au dessus de la valeur réelle; & il rendit compte de ce manque d'égards involontaire à l'Impératrice ELISABETH, qui ajouta un don de quatre mille florins, à une indemnité déjà beaucoup plus que suffisante. Ce trait n'a point été connu en Europe; & nous citons avec enthousiasme quelques actions semblables, que les anciens nous ont transmises. Cette différence dans nos jugemens, n'est-elle pas une preuve de ces progrès heureux de l'espèce humaine; que quelques Ecrivains s'obstinent à nier encore apparemment pour éviter qu'on ne les accuse d'en avoir été les complices?

Le Gouvernement de Russie n'avoit jamais traité M. EULER comme un étranger; une partie de ses appointemens lui fut toujours payée malgré son absence; & l'Impératrice l'ayant appelé en 1766, il consentit à retourner à Petersbourg.

En 1735, les efforts que lui avoit coûté un calcul astronomique, pour le quel les autres Académiciens demandoient plusieurs mois, & qu'il acheva en peu de jours, lui avoient causé une maladie, suivie de la perte d'un œil. Il avoit lieu de craindre une cécité complète, s'il s'exposoit de nouveau dans un climat dont l'influence lui étoit contraire. L'intérêt de ses enfans l'emporta sur cette crainte; &, si on songe que l'étude étoit pour M. EULER une passion
ex-

exclusive, on jugera sans doute que peu d'exemples d'amour paternel ont mieux prouvé qu'il est la plus douce de nos affections.

Il afflua, peu d'années après, le malheur qu'il avoit prévu ; mais il conserva, heureusement pour lui & pour les sciences, la faculté de distinguer encore de grands caractères tracés sur une ardoise avec de la craie. Ses fils, ses élèves, copioient ses calculs, écrivoient sous sa dictée le reste de ses mémoires ; & si on en juge par leur nombre & souvent par le génie qu'on y retrouve, on pourroit croire que l'absence encore plus absolue de toute distraction, & la nouvelle énergie que ce recueillement forcé donnoit à toutes ses facultés, lui ont fait plus gagner que l'affoiblissement de sa vue n'a pu lui faire perdre de facilité & de moyens pour le travail.

D'ailleurs, M. EULER, par la nature de son génie, par l'habitude de sa vie, s'étoit même involontairement préparé des ressources extraordinaires, en examinant ces grandes formules analytiques, si rares avant lui, si fréquentes dans ses ouvrages, dont la combinaison & le développement réunissent tant de simplicité & d'élégance, dont la forme même plait aux yeux come à l'esprit, on voit qu'elles ne sont pas le fruit d'un calcul tracé sur le papier, & que produites toutes entières dans sa tête, elles y ont été créées par une imagination également puissante & active. Il existe dans l'analyse (& M. EULER en a beaucoup multiplié le nombre)

des formules d'une application commune, & presque journaliere. Il les avoit toujours présentes à l'esprit, les savoit par cœur, les recitoit même de mémoire; & M. D'ALEMBERT, lorsqu'il vit M. EULER à Berlin, fut étonné de ce phénomène, nouveau même pour lui. Enfin sa facilité à calculer de tête étoit portée à un degré qu'on croiroit à peine, si l'histoire de ses travaux n'avoit accoutumé aux prodiges. On l'a vû, dans l'intention d'exercer son petit fils aux extractions de racines, se former la table des six premieres puissances de tous les nombres, depuis un jusqu'à cent & la conserver exactement dans sa mémoire. Deux de ses disciples avoient calculé, jusqu'au dixseptieme terme, une série convergente assez compliquée. Leurs résultats, quoique formés d'après un calcul écrit, différoient d'une unité au cinquantième chiffre. Ils firent part de cette dispute à leur maitre. M. EULER refit le calcul entier dans sa tête, & sa décision se trouva conforme à la vérité.

Depuis la perte de sa vue, il n'avoit d'autre amusement que de faire des aimans artificiels, & de donner des leçons de mathématiques à un de ses petits-fils; qui lui paroissoit annoncer d'heureuses dispositions.

Il alloit encore quelque fois à l'Académie, principalement dans les circonstances difficiles, où il croyoit que sa présence pouvoit être utile pour y maintenir la liberté. On sent combien un Président perpétuel nommé par la Cour
peut

peut troubler le repos d'une Académie, & tout ce qu'elle en doit craindre, lorsque, n'étant pas choisi dans la classe des savans, il ne se sent pas même arrêté par le besoin qu'a sa réputation du suffrage de ses confreres. Et comment des hommes, uniquement occupés de leurs paisibles travaux & ne sachant parler que le langage des sciences, pourroient-ils alors se défendre, surtout si étrangers, isolés, éloignés de leur patrie, ils tiennent tout du Gouvernement, au quel ils ont à demander justice contre le chef que ce Gouvernement même leur a donné?

Mais il est un degré de gloire où l'on se trouve au dessus de la crainte: c'est lorsque l'Europe entière s'élèveroit contre une injure personnelle faite à un grand-homme, qu'il peut sans risque déployer contre l'injustice l'autorité de sa renommée & élever en faveur des sciences une voix qu'on ne peut empêcher de se faire entendre. M. EULER, tout simple, tout modeste qu'il étoit, sentoît ses forces, & les a plus d'une fois heureusement employées.

En 1771, la ville de Petersbourg éprouva un incendie terrible. Les flammes gagnèrent la maison de M. EULER, Un Baslois, M. PIERRE GRIMON, (dont le nom mérite sans doute d'être conservé) apprend le danger de son illustre compatriote, aveugle & souffrant, il se précipite au travers des flammes, pénètre jusqu'à lui, le charge sur ses épaules & le sauve au péril de sa vie. Sa Bibliothèque, ses meubles
fu-

furent consumés . Mais les soins empressés du Comte ORLOFF sauverent ses manuscrits ; & cette attention , au milieu du trouble & des horreurs de ce grand désastre , est un des hommages les plus vrais & les plus flatteurs , que jamais l'autorité publique ait rendu au génie des sciences . La maison de M. EULER étoit un des bienfaits de l'Impératrice , & un nouveau bienfait en répara promptement la perte . Il a eu de sa premiere femme treize enfans , dont huit morts en bas-âge . Ses trois fils lui ont survécu ; & il eût le malheur de perdre ses deux filles dans la dernière année de sa vie . De trente huit petits enfans , vingt-six vivoient encore à l'époque de sa mort . En 1776 , il épousa en secondes noces , Mlle. GSELL , sœur de pere de sa premiere femme . Il avoit gardé toute la simplicité de mœurs dont la maison paternelle lui avoit donné l'exemple . Tant qu'il a conservé la vie , il rassembloit tous les soirs , pour la priere commune , ses enfans , ses petits enfans , ses domestiques & ceux de ses élèves qui logeoient chez lui . Il leur lisoit un chapitre de la Bible , & quelque fois accompagnoit cette lecture d'une exhortation .

Il étoit très religieux ; on a de lui une preuve nouvelle de l'existence de Dieu , & de la spiritualité de l'ame . Cette dernière même a été adoptée dans plusieurs écoles de Théologie . Il avoit conservé scrupuleusement la religion de son pays , qui est le Calvinisme rigide ; & il ne paroît pas qu'à l'exem-

l'exemple de la plupart des Savans protestans, il se soit permis d'adopter des opinions particulieres & de se former un système de religion.

Son érudition étoit très étendue, surtout dans l'histoire des mathématiques. On a prétendu qu'il avoit porté sa curiosité jusqu'à s'instruire des procédés & des regles de l'astrologie & que même il en avoit fait quelques applications. Cependant, lorsqu'en 1740 on lui donna ordre de faire l'horoscope du Prince YVAN, il représenta que cette fonction appartenoit à M. KRAAF, qui, en qualité d'astronome de la cour, fut obligé de la remplir. Cette crédulité, qu'on est étonné de trouver à cette époque dans la cour de Russie, étoit générale, un siecle auparavant, dans toutes les Cours de l'Europe. Celles de l'Asie n'en ont pas encore brisé le joug ; & il faut avouer que, si on en excepte les maximes communes de la morale, il n'y a jusqu'ici aucune vérité qui puisse se glorifier d'avoir été adoptée aussi généralement & aussi longtems que beaucoup d'erreurs, ou ridicules ou funestes.

M. EULER avoit étudié presque toutes les branches de la physique, l'anatomie, la chymie, la botanique ; mais sa supériorité dans les mathématiques ne lui permettoit pas d'attacher la plus petite importance à ses connoissances dans les autres genres, quoiqu'assez étendues, pour qu'un homme, plus susceptible des petiteesses de l'amour-propre, eût pû aspirer à une sorte d'universalité.

L'é.

L'étude de la littérature ancienne & des langues savantes avoit fait partie de son éducation. Il en conserva le gout toute sa vie ; & n'oublia rien de ce qu'il avoit appris ; mais il n'eût jamais ni le tems , ni le désir d'ajouter à ses premières études . Il n'avoit pas lû les poètes modernes & savoit par cœur l'Eneïde.

Mais M. EULER ne perdoit pas de vue les mathématiques , même lorsqu'il récitait les vers de Virgile. Tout étoit propre á lui rappeler cet objet presque unique de ses pensées , & on trouve dans ses ouvrages un savant mémoire sur une question de mécanique , dont il racontoit qu'un vers de l'Eneïde lui avoit donné la première idée .

On a dit que , pour les hommes d'un grand talent , le plaisir du travail en étoit une récompense plus douce encore que la gloire . Si cette vérité avoit besoin d'être prouvée par des exemples , celui de M. EULER . ne permettoit plus d'en douter .

Jamais dans ses savantes discussions avec de célèbres Géomètres , il n'a laissé échapper un seul trait qui puisse faire soupçonner qu'il se soit occupé des intérêts de son amour-propre . Jamais il n'a réclamé aucune de ses découvertes ; & , si on revendiquoit quelque chose dans ses ouvrages , il s'empressoit de réparer une injustice involontaire , sans même trop examiner si l'équité rigoureuse exigeoit de lui un abandon absolu . Y avoit-on relevé quelque erreur , si le reproche étoit mal

mal fondé, il l'oublioit ; s'il étoit juste , il se corrigeoit , & ne songeoit même pas à observer que souvent le mérite de ceux qui se vantoient d'avoir aperçu ses fautes , consistoit seulement dans une application facile des Méthodes , que lui même leur avoit enseignées , à des Théories dont il avoit aplani d'avance les plus grandes difficultés .

Presque toujours les hommes médiocres cherchent à se faire valoir par une sévérité proportionnée à la haute idée qu'ils veulent donner de leur jugement , ou de leur génie . Inexorables pour tout ce qui s'élève au dessus d'eux , ils ne pardonnent même pas à l'infériorité . On diroit qu'un sentiment secret les avertit du besoin qu'ils ont de rabaisser les autres . Au contraire , le premier mouvement de M. EULER le portoit à célébrer les talens dès l'instant où quelques essais heureux frappoient ses regards , & sans attendre qu'une juste admiration eût sollicité son suffrage . On le voit employer son tems à refaire , à éclaircir ses ouvrages & même à résoudre des problèmes déjà résolus , qui ne lui laissoient plus que le mérite de plus d'élégance & de méthode , avec la même ardeur , la même constance , qu'il eût mises à poursuivre une vérité nouvelle , dont la découverte auroit ajouté à sa renommée . D'ailleurs , si le désir ardent de la gloire eût existé au fond de son cœur , la franchise de son caractère ne lui eût pas permis d'en cacher les mouvemens . Mais cette gloire , dont il s'occupoit si peu , vint le chercher . La fé-

condité singulière de son génie frappoit même ceux qui n'étoient pas en état d'entendre ses ouvrages. Quoiqu'uniquement livré à la Géométrie, sa réputation s'étendit parmi les hommes les plus étrangers à cette science ; & il fût pour l'Europe entière, non seulement grand Géomètre , mais un grand-homme.

Il est d'usage en Russie d'accorder des titres militaires à des hommes très étrangers au service. C'est rendre hommage au préjugé qui faisoit regarder cet Etat comme la seule profession noble, & avouer en même tems qu'on en reconnoit toute la fausseté. Quelques savans ont obtenu jusqu'au grade de Général-Major : M. EULER n'en eût & n'en vouloit point avoir aucun. Mais quel titre pouvoit honorer le nom d'EULER ? Et alors le respect pour la conservation des droits naturels de l'homme , impose en quelque sorte le devoir de donner l'exemple d'une sage indifférence pour ces hochets de la vanité humaine, si puérile, mais si dangereux.

La plupart des Princes du Nord , dont il étoit personnellement connu , lui ont donné des marques de leur estime, ou plutôt de la vénération , qu'on ne pouvoit refuser à la réunion d'une vertu si simple & d'un génie si vaste & si élevé. Dans le voyage que le Prince Royal de Prusse fit à Petersbourg , il prévint la visite de M. EULER & passa quelques heures à côté du lit de cet illustre vieillard , ayant ses mains dans les siennes & tenant sur ses genoux un petit fils d'EU-

d'EULER, que ses dispositions précoces pour la Géométrie avoient rendu l'objet particulier de sa tendresse paternelle.

Tous les mathématiciens célèbres qui existent aujourd'hui sont ses élèves. Il n'en est aucun qui ne se soit formé par la lecture de ses ouvrages, qui n'ait reçu de lui les formules, la méthode qu'il emploie, qui, dans ses découvertes ne soit guidé & soutenu par le génie d'EULER. Il doit cet honneur à la révolution qu'il a produite dans les sciences mathématiques, en les soumettant toutes à l'analyse; à sa force pour le travail, qui lui a permis d'embrasser toute l'étendue de ces sciences; à l'ordre méthodique qu'il a su mettre dans ses grands ouvrages; à la simplicité, à l'élégance de ses formules; à la clarté de ses méthodes & de ses démonstrations, qu'augmente encore la multiplicité & le choix de ses exemples. Ni NEWTON, ni DESCARTES même, dont l'influence a été si puissante, n'ont obtenu cette gloire; & jusqu'ici, seul entre tous les Géomètres, M. EULER l'a possédée toute entière & sans partage.

Mais comme Professeur, il a formé des élèves qui lui appartiennent plus particulièrement, & parmi les quels nous citerons son fils aîné, que l'Académie des sciences a choisi pour le remplacer, sans craindre que cette succession honorable accordée au nom d'EULER, connue à celui de BERNOULLI, pût devenir un exemple dangereux; un second fils livré aujourd'hui à l'étude de la Médecine, mais qui dans sa jeunesse

a remporté dans cette Académie un prix sur les altérations du moyen mouvement des planètes : M. LEXELL , qu'une mort prématurée vient d'enlever aux sciences , enfin M. FUSS , le plus jeune de ses disciples , le compagnon de ses derniers travaux , qui , envoyé de BASLE à M. EULER , par M. DANIEL BERNOULLI , s'est montré digne par ses ouvrages du choix de BERNOULLI & des leçons d'EULER & qui , après avoir rendu dans l'Académie de Petersbourg un hommage public à son illustre Maître , vient de s'unir à sa petite-fille :

De seize Professeurs attachés à l'Académie de Petersbourg , huit avoient été formés par lui & tous connus par leurs ouvrages & décorés de titres académiques , se glorifioient de pouvoir y ajouter celui de disciples d'EULER.

Il avoit conservé toute sa facilité , & en apparence toutes ses forces. Aucun changement n'annonçoit que les sciences fussent menacées des le perdre. Le sept Septembre 1783 , après s'être amusé à calculer sur une ardoise les loix du mouvement ascensionnel des machines Aërostatiques , dont la découverte récente occupoit alors toute l'Europe , il dina avec M. LEXELL & sa famille , parla de la planète d'Herschell , & des calculs qui en déterminent l'orbite ; peu de tems après , il fit venir son petit-fils , avec le quel il badi-noit en prenant quelques tasses de Thé , lorsque tout à coup la pipe , qu'il tenoit à la main , lui échappa , & il cessa de calculer & de vivre.

Tel-

Telle fut la fin d'un des hommes les plus grands & les plus extraordinaires que la nature ait jamais produits, dont le génie fut également capable des plus grands efforts & du travail le plus continu, qui multiplia ses productions au delà de ce qu'on eut osé attendre des forces humaines & qui cependant fut original dans chacune, dont la tête fut toujours occupée & l'âme toujours calme, & qui, par une destinée malheureusement trop rare, réunit & mérita de réunir un bonheur presque sans nuage à une gloire qui ne fut jamais contestée.

Sa mort a été regardée comme une perte publique, même dans le pays qu'il habitoit. L'Académie de Petersbourg a porté solennellement son deuil & lui a décerné à ses frais un buste de marbre, qui doit être placé dans ses salles d'assemblée. Elle lui avoit déjà rendu pendant sa vie un honneur plus singulier peut-être. Dans un tableau allégorique, la figure de la Géométrie s'appuie sur une planche chargée de calculs; & ce sont les formules de sa nouvelle Théorie de la lune, que l'Académie a ordonné d'y inscrire. Ainsi un Pays qu'au commencement de ce siècle, nous regardions encore comme barbare, apprend aux nations les plus éclairées de l'Europe à honorer la vie des grands hommes & leur mémoire récente. Il donne à ces nations un exemple que plusieurs d'entre elles auroient à rougir peut-être, de n'avoir su ni prévenir, ni même imiter.

PRAEFATIO.

Quid sit Calculus Differentialis, atque in genere Analysis infinitorum, iis qui nulla adhuc eius cognitione sunt imbuti, vix explicari potest: neque hic, uti in aliis disciplinis fieri solet, exordium tractationis a definitione commode sumere licet. Non quod huius calculi nulla plane detur definitio; sed quoniam ad eam intelligendam eiusmodi opus est notionibus, non solum in vita communi, verum etiam in ipsa Analysis finitorum minus usitatis, quae demum in Calculi Differentialis pertractatione evolvi atque explicari solent: quo fit, ut eius definitio non ante percipi queat, quam eius principia iam satis dilucide fuerint perspecta. Primum igitur hic calculus circa quantitates variabiles versatur: etsi enim omnis quantitas sua natura in infinitum augeri & diminui potest; tamen dum calculus ad certum quoddam institutum dirigitur, aliae quantitates constanter eandem magnitudinem retinere concipiuntur, aliae vero per omnes gradus auctoris ac diminutionis variari: ad quam distinctionem notandam illae quantitates constantes, hae vero variabiles vocari solent; ita ut hoc discrimen non tam in rei natura, quam in quaestione, ad quam calculus refertur, indole sit positum. Quoniam haec differentia inter quantitates constantes & variabiles exemplo maxime illustrabitur, consideremus iactum globi ex tormento bellico vi pulveris pyrii explosi; siquidem hoc exemplum ad rem dilucidandam imprimis idoneum videtur. Plures igitur hic occurrunt quantitates, quarum ratio in ista investigatione est habenda: primo scilicet quantitas pulveris pyrii; tum elevatio tormenti supra horizontem; tertio longitudo iactus super plano horizontali; quarto tempus, quo globus explosus in aere versatur: ac nisi experimenta eodem tormento instituantur, insuper eius longitudo cum pondere globi in computum trahi deberet. Verum hic a
va-

varietate tormenti & globi animum removeamus, ne in quaestiones nimium implicatas incidamus. Quodsi ergo servata perpetuo eadem pulveris pyrii quantitate, elevatio tormenti continuo immutetur, iactusque longitudo cum tempore transitus globi per aerem requiratur; in hac quaestione copia pulveris seu vis impulsus erit quantitas constans, elevatio autem tormenti cum longitudine iactus eiusque duratione ad quantitates variabiles referri debebunt; si quidem pro omnibus elevationis gradibus has res definire velimus, ut inde innotescat, quantae mutationes in longitudine ac duratione iactus ab omnibus elevationis variationibus oriantur. Alia autem erit quaestio, si servata eadem tormenti elevatione, quantitas pulveris pyrii continuo mutetur, & mutationes, quae inde in iactum redundant, definiri debeant: hic enim elevatio tormenti erit quantitas constans, contra vero quantitas pulveris pyrii, & longitudo ac duratio iactus quantitates variabiles. Sic igitur patet, quomodo mutato quaestionis statu eadem quantitas modo inter constantes, modo inter variabiles numerari queat: simul autem hinc intelligitur, ad quod in hoc negotio maxime est attendendum, quomodo quantitates variabiles aliae ab aliis ita pendeant, ut mutata una reliquae necessario immutationes recipiant. Priori scilicet casu, quo quantitas pulveris pyrii eadem manebat, mutata tormenti elevatione etiam longitudo & duratio iactus mutantur; suntque ergo longitudo & duratio iactus quantitates variabiles pendentes ab elevatione tormenti, hacque mutata simul certas quasdam mutationes patientes: posteriori vero casu pendent a quantitate pulveris pyrii, cuius mutatio in illis certas mutationes producere debet. Quae autem quantitates hoc modo ab aliis pendent, ut his mutatis etiam ipsae mutationes subeant, eae harum functiones appellari solent; quae denominatio latissime patet, atque omnes modos, quibus una quantitas per alias determinari potest, in se complectitur. Si igitur x denotet quantitatem variabilem, omnes quantitates, quae utcumque ab x pendent, seu per eam determinantur, eius functiones vocantur; cuius-

mo-

modi sunt quadratum eius xx , aliaeve potentiae quaecunque nec non quantitates ex his utcumque compositae; quin etiam transcendentes, & in genere quaecunque ita ab x pendent, ut ducta vel diminuta x ipsae mutationes recipiant. Hinc iam nascitur quaestio, qua quaeritur, si quantitas x data quantitate siue augeatur siue diminuat, quantum inde quaevis eius functiones immutentur, seu quantum incrementum decrementumve accipiant. Casibus quidem simplicioribus haec quaestio facile resolvitur: si enim quantitas x augeatur quantitate ω , eius quadratum xx hinc incrementum capiet $2x\omega + \omega\omega$; sicque incrementum ipsius x se habebit ad incrementum ipsius xx , ut ω ad $2x\omega + \omega\omega$, hoc est, ut 1 ad $2x + \omega$; similique modo in aliis casibus ratio incrementi ipsius x ad incrementum, vel decrementum, quod quaevis eius functio inde adipiscitur, considerari solet. Est vero investigatio rationis huiusmodi incrementorum ipsa non solum maximi momenti, sed ei etiam universa Analysis infinitorum innititur. Quod quo clarius appareat, sumamus exemplum superius quadrati xx , cuius incrementum $2x\omega + \omega\omega$, quod capit, dum ipsa quantitas x incremento ω augetur, vidimus ad hoc rationem tenere, ut $2x + \omega$ ad 1 ; unde perspicuum est, quo minus sumatur incrementum ω , eo propius istam rationem accedere ad rationem $2x$ ad 1 ; neque tamen ante prorsus in hanc rationem abit, quam incrementum illud ω plane evanescat. Hinc intelligimus, si quantitatibus variabilibus x incrementum ω in nihilum abeat, tum etiam quadrati eius xx incrementum inde oriundum quidem evanescere, verumtamen ad id rationem tenere ut $2x$ ad 1 ; & quod hic de quadrato est dictum, de omnibus aliis functionibus ipsius x est intelligendum; quippe quarum incrementa evanescunt, quae capiunt, dum ipsa quantitas x incrementum evanescens sumit ad hoc ipsum certam & assignabilem rationem tenebunt. Atque hoc modo sumus deducti ad definitionem calculi Differentialis, qui est methodus determinandi rationem incrementorum evanescentium, quae functiones quaecunque accipiunt,

h dum

dum quantitati variabili, cuius sunt functiones, incrementum evanescens tribuitur: hacque definitione veram indolem calculi differentialis contineri, atque adeo exhaustiri, iis, qui in hoc genere non sunt hospites, facile erit perspicuum. Calculus igitur differentialis non tam in his ipsis incrementis evanescens, quippe quae sunt nulla, exquirendis, quam in eorum ratione ac proportione mutua scrutanda occupatur: Et cum hae rationes finitis quantitatibus exprimantur, etiam hic calculus circa quantitates finitas versari est censendus. Quamvis enim praecepta, uti vulgo tradi solent, ad ista incrementa evanescencia definienda videantur accommodata; nunquam tamen ex iis absolute spectatis, sed potius semper ex eorum ratione conclusiones deducuntur. Simili vero modo calculi integralis ratio est comparata, qui convenientissime ita definitur, ut dicatur esse methodus ex cognita ratione incrementorum evanescentium ipsas illas functiones, quarum sunt incrementa, inveniendi. Quo autem facilius hae rationes colligi, atque in calculo repraesentari possint, haec ipsa incrementa evanescencia, etiamsi sint nulla, tamen certis signis denotari solent; quibus adhibitis nihil obstat, quo minus iis certa nomina imponantur. Vocantur itaque differentialia, quae cum quantitate destituantur, infinite parva quoque dicuntur; quae igitur sua natura ita sunt interpretanda, ut omnino nulla seu nihilo aequalia reputentur. Ita si quantitati x incrementum tribuatur ω , ut abeat in $x + \omega$, eius quadratum xx abibit in $xx + 2x\omega + \omega\omega$, ideoque incrementum capit $2x\omega + \omega\omega$; quare incrementum ipsius x , quod est ω , se habebit ad incrementum quadrati, quod est $2x\omega + \omega\omega$, uti 1 ad $2x + \omega$; quae ratio abibit in 1 ad $2x$, tum demum, cum ω evanescit. Fiat igitur $\omega = 0$; Et ratio istorum incrementorum evanescentium, quae sola in calculo differentiali spectatur, utique est ut 1 ad $2x$; neque vicissim haec ratio veritati esset consentanea, nisi remota illud incrementum ω evanesceret, penitusque nihilo fieret aequale. Quodsi ergo hoc nihilum per ω indicatum referat incrementum quantitatibus x , quia hoc se ha-

habet ad incrementum quadrati xx ut 1 ad $2x$, erit quadrati xx incrementum $= 2x\omega$, ideoque etiam nihilo aequale; unde simul constat annihilationem horum incrementorum non ob stare, quominus eorum ratio, quae est ut 1 ad $2x$ sit determinata. Quod nihilum iam hic littera ω exhibetur, id in calculo differentiali; quia ut incrementum quantitatis x spectatur, signo dx representari, eiusque differentiale vocari solet; positoque dx loco ω , ipsius xx differentiale erit $2xdx$. Simili modo ostenditur fore cubi x^3 differentiale $= 3x^2dx$, & in genere cuiusque dignitatis x^n differentiale fore $= nx^{n-1}dx$. Quaecunque autem aliae functiones ipsius x proponantur, in calculo differentiali regulae traduntur eorum differentialis inveniendi: verum perpetuo tenendum est, cum haec differentiaalia absolute sint nihila, ex iis nihil aliud concludi, nisi eorum rationes mutuas, quae utique ad quantitates finitas reducuntur. Cum autem hoc modo, qui solus est rationi consentaneus, principia Calculi differentialis stabiliantur, omnes obiectationes; quae contra hunc calculum proferri sunt solitae, sponte corruunt; quae tamen summam vim retinerent, si differentiaalia seu infinite parva non plane annihilarentur. Pluribus autem, qui Calculi differentialis praecepta tradidere, visum est differentiaalia a nihilo absoluto secernere, peculiareque ordinem quantitatum infinite parvarum, quae non penitus evanescent, sed quantitatem quandam, quae quidem esset omni assignabili minor, retineant, constituere: his igitur iure est obiectum, rigorem geometricum negligi, & conclusiones inde deductas, propterea quod huiusmodi infinite parva negligenterentur, merito esse suspectas: quantumvis enim enigma haec infinitae parva concipiantur, tamen non solum singulis, sed etiam pluribus atque adeo innumerabilibus simul reiciendis, errorem tandem inde enormem resultare posse. Quam obiectiorem perperam eiusmodi exemplis, quibus per calculum differentialem eadem conclusiones ac per Geometriam elementarem eliciuntur, infringere conantur: nam si ea infinite parva, quae in calculo negliguntur, non sunt nihil, inde neces-

fario error, isque eo maior; quo magis ea concervantur, resultare debet; hocque si minus eveniat; id potius vitio calculi, quo nonnunquam errores per alios errores compensantur, esset tribuendum, quam ipse calculus ab erroris suspitione liberaretur. Quodsi autem nullo novo errore huiusmodi compensatio fiat, talibus exemplis luculenter id ipsum, quod volo, evincitur, ea quae fuerint neglecta, omnino & absolute pro nihilo esse habenda; neque infinite parva, quae in calculo differentiali tractantur, a nihilo absoluto discrepare. Minime etiam negotium conficitur, quando a nonnullis infinite parva ita describuntur, ut instar pulvisculorum respectu vasti montis vel etiam totius globi terrestris spectari debeant: etsi enim qui magnitudinem totius globi terrestris calculo determinare suscepit, ei error non unius sed plurimum millium pulvisculorum facile condonari soleat; tamen rigor geometricus etiam a tantillo errore abhorret, nimisque gravis esset haec obiectio, si ullam vim retineret. Deinde etiam difficile dictu est, quid lucri inde sperent, qui infinite parva a nihilo distingui volunt: metuunt autem, ne, si plane evanescant, etiam comparatio eorum, ad quam totum negotium perducere sentiunt, tollatur: quomodo enim absolute nihila inter se comparari queant, nullo modo concipi posse profitentur. Necesse ergo putant iis aliquam magnitudinem relinquere, quo habeant aliquid, in quo comparisonem instituunt: hanc tamen magnitudinem tam parvam admittere coguntur, ut quasi esset nulla, spectari ac sine errore in calculo negligi possit. Neque tamen certam ac definitam ipsi magnitudinem, licet incomprehensibiliter parvam, assignare audent; semper enim si eam bis terve minorem assumerent, eodem modo comparationes se essent habiturac. Ex quo perspicuum est, nihil plane ipsam magnitudinem ad comparisonem instituendam conferre, hancque adeo non tolli, etiamsi illa magnitudo penitus evanescat. Ex dictis autem supra manifestum est, eam comparisonem, quae in calculo differentiali spectatur, ne locum quidem habere, nisi illa incrementa prorsus evanescant: incrementum enim quantita-

titatis x , quod in genere indicavimus per ω , ad incrementum quadrati xx , quod est $2x\omega + \omega\omega$, rationem habet ut 1 ad $2x + \omega$; quae semper differt a ratione 1 ad $2x$, nisi sit $\omega = 0$; at si statuamus esse $\omega = 0$, tum demum vere affirmare possumus; hanc rationem fieri exacte ut 1 ad $2x$. Interim tamen perspicitur, quo minus illud incrementum ω accipitur, eo propius ad hanc rationem accedi; unde non solum licet, sed etiam naturae rei convenit, haec incrementa primum ut finita considerare, atque etiam in figuris, si quibus opus est ad rem illustrandam, finite repraesentare; deinde vero haec incrementa cogitatione continuo minora fieri concipiantur, sicque eorum ratio continuo magis ad certum quendam litem appropinquare reperietur, quem autem tum demum attingant, cum plane in nihilum abierint. Hic autem limes, qui quasi rationem ultimam incrementorum illorum constituit, verum est obiectum Calculi differentialis; cuius igitur prima fundamenta is iecisse existimandus est, cui primum in mentem venit, has rationes ultimas, ad quas quantitarum variabilium incrementa dum continuo magis diminuuntur, appropinquant, & cum evanescent, tum demum attingunt, contemplari. Huius autem speculationis vestigia deprehendimus apud antiquissimos Auctores, quibus idcirco idea quaedam levisque cognitio Analysis infinitorum abiudicari nequit. Paullatim deinde haec scientia maiora accepit incrementa, neque subito ad id fastigium, in quo nunc cernitur, est evecta; etiamsi quidem in ea multo plura adhuc sint occulta, quam in lucem protracta. Cum enim Calculus differentialis ad omnis generis functiones, utcumque sint compositae, extendatur, non repente methodus innotuit, omnium plane functionum incrementa evanescentia inter se comparandi; sed sensim haec inventio ad functiones continuo magis complicatas processit. Quod scilicet ad functiones rationales attinet, ratio ultima, quam earum incrementa evanescentia inter se tenent, multo ante NEUTONI ac LEIBNIZII tempora assignari potuit; ita ut Calculus differentialis, quatenus ad solas functiones rationales applicatur, diu ante haec tempora

pora

pora inventus sit censendus. Tum vero nullum est dubium, quin NEUTONO eam calculi differentialis partem, quae circa functiones irrationales versatur, acceptam referre debeamus; ad quam insigni suo Theoremate de evolutione generali potestatum binomii feliciter est deductus, quo enim invento limites calculi differentialis iam mirifice erant amplificati. LEIBNIZIO autem non minus sumus obstricti, quod hunc calculum, antebac tantum velut singulare artificium spectatum, in formam disciplinae redegerit, eiusque praecepta tanquam in systema collegerit, ac dilucide explicaverit. Hinc enim maxima subsidia suggerebantur, ad hunc calculum ulterius excolendum, & ea, quae adhuc desiderabantur, ex certis principiis elicienda. Non igitur studio cum ipsius LEIBNIZII, tum BERNOUILLIORUM ad hoc ab eo incitatorum, fines Calculi differentialis etiam ad functiones transcendentes, quae pars adhuc fuerat inculta, sunt promoti, tum vero etiam solidissima fundamenta Calculi integralis constituta; quibus insistentes, qui deinceps in hoc genere elaborarunt, continuo maiora incrementa addiderunt. NEUTONUS vero etiam amplissima dederat specimina Calculi integralis, cuius prima inventio, cum a prima origine calculi differentialis via separari queat, non ita absolute constitui potest; & quoniam maxima eius pars adhuc excolenda restat, hic calculus ne nunc quidem pro absolute invento haberi potest; sed potius quantum cuique pro viribus ad eius perfectionem conferre contigerit, id grata mente agnoscere debemus. Atque hanc de gloria inventionis huius calculi tenenda esse iudico, de qua quidem antebac tantopere est disceptatum. Quod autem ad varia nomina, quae isti calculo a diversarum nationum Mathematicis imponi solent, attinet, ea omnia huc redeunt, ut cum data hic definitione egregie consentiant: sive enim incrementa illa evanescentia, quorum ratio consideratur, differentialia vocentur, sive fluxiones, ea semper nihilo aequalia sunt intelligenda; in quo vera notio infinite parvorum constitui debet. Hinc vero etiam omnia, quae de differentialibus secun-

secundi & altiorum ordinum curiose magis quam utiliter sunt disputata, reddentur planissima, cum omnia per se aequae evanescent neque ea unquam per se, sed potius eorum relatio mutua spectari soleat. Cum enim ratio, quam duarum functionum incrementa evanescentia tenent, iterum per functionem quandam exprimatur, si & huius functionis incrementum evanescens cum aliis conferatur, res ad differentialia secunda referrī est censenda; sicque porro progressio ad differentialia altiorum graduum intelligi debet, ita ut semper quantitates finitae revera animo obversentur, signaque differentialium tantum ad eas commodē repraesentandas adhibeantur. Primo quidem intuitu ista Analysis infinitorum descriptio plerisque levis ac nimis sterilis videtur, etsi species illa arcana infinite parvorum re haud plus polliceatur: verum si rationes, quae inter incrementa evanescentia functionum quarumvis intercedunt, probe cognoscamus, haec cognitio saepe numero per se maximi est momenti; tum vero in plerisque iisque maxime arduis investigationibus ita est necessaria, ut sine eius adminiculo nihil plane intelligi possit. Veluti si quaestio sit de motu globi ex tormento explosi, simulque ratio resistentiae aeris haberi debeat, quomodo motus per spatium finitum sit futurus, nullo modo statim definire licet, dum tam directio semitae, in qua globus incedit, quam ipsius celeritas, a qua resistentia pendet, quovis momento immutatur. Quo minus autem spatium, per quod motus fiat, consideremus, eo minor erit illa variabilitas, eoque facilius ad cognitionem veri pertingere licebit; quodsi autem illud spatium plane evanescens reddamus, quia iam omnis inaequalitas tam in directione viae quam in celeritate tollitur, effectum resistentiae per regulas motus accurate definire, motusque mutationem puncto temporis productam assignare licebit. Cognitis autem his mutationibus momentaneis, seu potius cum ipsae sint nullae, earum relatione mutua, iam plurimum sumus lucrati; atque calculi integralis opus est, exinde motum per spatium finitum variatum concludere. Minime autem necesse
essc

esse arbitror usum Calculi differentialis atque Analyseos infinitorum in genere pluribus ostendere; cum nunc quidem satis sit exploratum, si vel levissimam investigationem, in quam motus corporum tam solidorum quam fluidorum ingreditur, accuratius instituere velimus, id non solum non sine Analyysi infinitorum praestari posse, sed hanc ipsam scientiam saepe nondum satis excultam esse, ut rem penitus explicare valeamus. Per omnes scilicet Matheseos partes usus huius Analyseos sublimioris usque adeo diffunditur, ut omnia, quae sine eius interventu adhuc expedire licuit, pro nihilo propemodum sint habenda.

Constitui igitur in hoc libro universum Calculum differentialem ex veris principiis derivare, atque ita copiose pertractare, ut nihil praetermitterem eorum, quae quidem adhuc eo pertinentia sunt inventa. In duas opus divisi partes, in quarum priori iactis calculi differentialis fundamentis methodum exposui omnis generis functiones differentiantiandi, neque tantum differentialia primi ordinis, sed etiam superiorum ordinum inveniendi; sive functiones unicam variabilem sive duas pluresve involvant. In altera autem parte amplissimum huius calculi usum in ipsa Analyysi finitorum ac doctrina serierum exposui; ubi etiam imprimis Theoriam maximorum ac minimorum dilucide explicavi. De usu autem huius calculi in Geometria linearum curvarum nihil adhuc affero, quod eo minus desiderabitur, cum in aliis operibus haec pars ita copiose sit pertractata, ut adeo prima calculi differentialis principia quasi ex Geometria sint petita, ad hancque scientiam, cum vix satis essent evoluta, summa cura applicata. Hic autem omnia ita intra Analyseos purae limites continentur, ut ne ulla quidem figura opus fuerit, ad omnia huius calculi praecepta explicanda.

INSTITUTIONUM
CALCULI DIFFERENTIALIS
P A R S P R I O R
CONTINENS
COMPLETAM HUIUS CALCULI
EXPLICATIONEM





CAPUT I.

DE DIFFERENTIIS FINITIS.



I.

X iis, quae in Libro superiori de quantitatibus variabilibus atque functionibus sunt exposita, perspicuum est, prout quantitas variabilis actu variatur; ita omnes eius functiones variationem pati. Sic, si quantitas variabilis x capiat incrementum ω , ita ut pro x scribatur $x + \omega$, omnes functiones ipsius x , cuiusmodi sunt

xx ; x^3 ; $\frac{a + x}{xx + aa}$, alios induent valores: scilicet xx abit in

$xx + 2x\omega + \omega\omega$; x^3 abit in $x^3 + 3xx\omega + 3x\omega\omega + \omega^3$;

& $\frac{a + x}{aa + xx}$ transmutabitur in $\frac{a + x + \omega}{aa + xx + 2x\omega + \omega\omega}$.

A 2

Hu-

Huiusmodi ergo alteratio semper orietur, nisi functio, speciem tantum quantitatis variabilis mentiatur, revera autem sit quantitas constans, veluti x^0 : quo casu talis functio invariata manet, utcunque quantitas x immutetur.

2. Quae cum sint satis exposita, propius accedamus ad eas functionum affectiones, quibus universa analysi infinitorum innititur. Sit igitur y functio quaecunque quantitatis variabilis x : pro qua successive valores in arithmetica progressionem procedentes substituantur, scilicet: $x; x + \omega; x + 2\omega; x + 3\omega; x + 4\omega; \&c.$ ac denotet y^I valorem quem functio y induit, si in ea loco x substituatur $x + \omega$; simili modo sit y^{II} is ipsius y valor, si loco x scribatur $x + 2\omega$; parique ratione denotent $y^{III}; y^{IV}; y^V; \&c.$ valores ipsius y , qui emergunt dum loco x ponuntur $x + 3\omega; x + 4\omega; x + 5\omega; \&c.$ ita ut isti diversi valores ipsarum x & y sequenti modo sibi respondeant:

$$\begin{array}{ccccccc} x; & x + \omega; & x + 2\omega; & x + 3\omega; & x + 4\omega; & x + 5\omega; & \&c. \\ y; & y^I & y^{II} & y^{III} & y^{IV} & y^V & \&c. \end{array}$$

3. Quemadmodum series arithmetica $x; x + \omega; x + 2\omega; \&c.$ in infinitum continuari potest; ita series ex functione y orta $y; y^I; y^{II}; \&c.$ quoque in infinitum progredietur, eiusque natura pendebit ab indole functionis y . Sic, si fuerit $y = x$; vel $y = ax + b$; series $y; y^I; y^{II}; \&c.$ quoque erit arithmetica: si fuerit $y = \frac{a}{bx + c}$, series prodibit harmonica: si autem sit $y = a^x$, habebitur series geometrica. Neque ulla excogitari potest series, quae non hoc modo ex certa functione ipsius x oriri queat; vocari autem solet huiusmodi functio ipsius x , ratione seriei, quae ex illa oritur, eius **TERMINUS GENERALIS**; quare cum omnis series certa lege formata habeat terminum generalem, ea vicissim ex certa ipsius x functione oritur, uti in doctrina de seriebus fusius explicari solet.

4. Hic autem potissimum ad differentias, quibus termini seriei y , y^I , y^{II} , y^{III} , &c. inter se discrepant, attendimus; quas ut ad differentialium naturam accomodemus, sequentibus signis indicemus, ut sit

$y^I - y = \Delta y$; $y^{II} - y^I = \Delta y^I$; $y^{III} - y^{II} = \Delta y^{II}$; &c. Exprimet ergo Δy incrementum, quod functio y capit, si in ea loco x ponatur $x + \omega$, denotante ω numerum quemcunque pro libitu assumptum. In doctrina quidem serierum sumi solet $\omega = 1$; verum hic ad nostrum institutum expedit, valore generali uti, qui pro arbitrio augeri diminuique queat. Vocari quoque solet hoc incrementum Δy functionis y eius DIFFERENTIA, qua sequens valor y^I primum y superat, atque perpetuo tanquam incrementum consideratur; etiamsi saepius re vera decrementum exhibeat, id quod ex eius valore negativo agnoscitur.

5. Quoniam y^{II} oritur ex y , si loco x scribatur $x + 2\omega$; manifestum est eandem quantitatem esse orituram si primum pro x ponatur $x + \omega$, tumque denuo $x + \omega$ loco x statuatur. Hinc y^{II} oriatur ex y^I , si in hoc loco x scribatur $x + \omega$; eritque ideo Δy^I incrementum ipsius y^I quod capit posito $x + \omega$ loco x ; sicque Δy^I vocatur simili modo *Differentia* ipsius y^I . Pari ratione porro erit Δy^{II} differentia ipsius y^{II} , seu eius incrementum, quod accipit, si loco x ponatur $x + \omega$; atque Δy^{III} erit differentia, seu incrementum ipsius y^{III} , & ita porro. Hoc pacto ex serie valorum ipsius y , qui sunt y ; y^I ; y^{II} ; y^{III} ; &c. obtinebitur series differentiarum Δy ; Δy^I ; Δy^{II} ; &c. quae inveniuntur, si quilibet terminus illius seriei a sequente subtrahatur.

6. Inventa serie differentiarum, si ex ea denuo differentiae capiantur, quamlibet a sequente subtrahendo, orientur differentiae differentiarum, quae vocantur *Differentiae secundae*; hocque modo per characteres convenientissime repraesentantur, ut significet:

$$\Delta \Delta y$$

$$\begin{aligned}
 \Delta \Delta y &= \Delta y^I - \Delta y \\
 \Delta \Delta y^I &= \Delta y^{II} - \Delta y^I \\
 \Delta \Delta y^{II} &= \Delta y^{III} - \Delta y^{II} \\
 \Delta \Delta y^{III} &= \Delta y^{IV} - \Delta y^{III} \\
 &\&c.
 \end{aligned}$$

Vocatur itaque $\Delta \Delta y$ differentia secunda ipsius y ; $\Delta \Delta y^I$ differentia secunda ipsius y^I , & ita porro. Simili autem modo ex differentiis secundis, si denuo earum differentiae capiuntur, prodibunt differentiae tertiae hoc modo scribendae: $\Delta^3 y$; $\Delta^3 y^I$; &c. hincque porro differentiae quartae $\Delta^4 y$; $\Delta^4 y^I$; &c. sicque ultra quousque libuerit.

7. Repraesentemus singulas has differentiarum series ita in schemate, quo earum nexus facilius in oculos incidat:

PROGRESSIO ARITHMETICA.

$$n; n + \omega; n + 2\omega; n + 3\omega; n + 4\omega; n + 5\omega; \&c.$$

VALORES FUNCTIONIS.

$$y; y^I; y^{II}; y^{III}; y^{IV}; y^V; \&c.$$

DIFFERENTIAE PRIMAE.

$$\Delta y; \Delta y^I; \Delta y^{II}; \Delta y^{III}; \Delta y^{IV}; \&c.$$

$$\text{DIFF. II.} \quad \Delta \Delta y; \Delta \Delta y^I; \Delta \Delta y^{II}; \Delta \Delta y^{III}; \&c.$$

$$\text{DIFF. III.} \quad \Delta^3 y; \Delta^3 y^I; \Delta^3 y^{II}; \&c.$$

$$\text{DIFF. IV.} \quad \Delta^4 y; \Delta^4 y^I; \&c.$$

$$\text{DIFF. V.} \quad \Delta^5 y; \&c.$$

quarum quaelibet ex praecedente oritur, quosque terminos a sequentibus subtrahendo. Quacunque ergo functione ipsius n loco y substituta, quoniam valores $y^I, y^{II}, y^{III}, \&c.$ per
no-

notas compositiones facile formantur, ex iis sine labore singulae differentiarum series inveniuntur.

8. Ponamus esse $y = x$; eritque $y^I = x^I = x + \omega$; $y^{II} = x^{II} = x + 2\omega$: & ita porro. Unde differentiis sumendis erit $\Delta x = \omega$; $\Delta x^I = \omega$; $\Delta x^{II} = \omega$; &c. ideoque omnes differentiae primae ipsius x erunt constantes, ac proinde differentiae secundae omnes evanescunt; pariterque differentiae tertiae, & sequentium ordinum omnes. Cum igitur sit $\Delta x = \omega$, ob analogiam loco litterae ω iste character Δx commode adhibebitur. Quantitatis ergo variabilis x , cuius valores successivi x , x^I , x^{II} , x^{III} , &c. arithmetica progressionem constituere assumuntur, differentiae Δx , Δx^I , Δx^{II} , &c. erunt constantes atque inter se aequales; ac propterea erit $\Delta \Delta x = 0$, $\Delta^3 x = 0$, $\Delta^4 = 0$, sicque porro

9. Pro valoribus ipsius x , qui ipsi successive tribuuntur, progressionem arithmetica hic assumimus, ita ut horum valorum differentiae primae sint constantes, secundae ac reliquae omnes evanescant. Quod etsi ab arbitrio nostro pendet, cum aliam quamcunque progressionem, aequè adhibere potuissimus; tamen progressio arithmetica prae reliquis omnibus commodissime usurpari solet, cum quod sit simplicissima atque intellectu facillima, tum vero maxime, quod ad omnes omnino valores, quos quidem x induere potest, pateat. Tribuendo enim ipsi ω valores tam negativos quam affirmativos, in hac serie valorum ipsius x omnes omnino continentur quantitates reales, quae in locum ipsius x substitui possunt: contra autem si seriem geometricam elegissemus, ad valores negativos nullus aditus patuisset. Hanc ob causam variabilitas functionum y ex valoribus ipsius x progressionem arithmetica constituentibus aptissime diiudicatur.

10. Uti est $\Delta y = y^I - y$, ita differentiae posteriores quoque ex terminis primae seriei y , y^I , y^{II} , y^{III} , &c. definiri possunt.

Cum

Cum enim sit $\Delta y^I = y^{II} - y^I$
erit

$$\Delta \Delta y = y^{III} - 2y^{II} + y^I$$

&

$$\Delta \Delta y^I = y^{IV} - 2y^{III} + y^{II}$$

ideoque

$$\Delta^2 y = \Delta \Delta y^I - \Delta \Delta y = y^{IV} - 3y^{III} + 3y^{II} - y^I$$

simili modo erit

$$\Delta^3 y = y^{IV} - 4y^{III} + 6y^{II} - 4y^I + y$$

&

$$\Delta^4 y = y^V - 5y^{IV} + 10y^{III} - 10y^{II} + 5y^I - y$$

quarum formularum coefficientes numerici eandem legem tenent, quae in potestatibus Binomii observatur. Quemadmodum ergo differentia prima ex duobus terminis seriei y ; y^I ; y^{II} ; y^{III} ; &c. determinatur, ita differentia secunda determinatur ex tribus, tertia ex quatuor, & ita de ceteris. Cognitis autem differentiis cuiusque ordinis ipsius y , simili modo differentiae omnium ordinum ipsius y^I ; y^{II} ; &c. definientur.

II. Proposita ergo quacunque Functione y singulae eius differentiae, tam prima, quam sequentes, quae quidem differentiae ω , qua valores ipsius x progrediuntur, respondent, poterunt inveniri. Neque vero ad hoc opus est, ut series valorum ipsius y ulterius continuetur; quemadmodum enim differentia prima Δy reperitur, si in y loco x scribatur $x + \omega$, atque a valore orto y^I ipsa functio y subtrahatur; ita differentia secunda $\Delta \Delta y$ obtinebitur si in differentia prima Δy loco x ponatur $x + \omega$, ut oriatur Δy^I , atque Δy a Δy^I subtrahatur. Simili modo si differentiae secundae $\Delta \Delta y$ capiatur differentia, eam subtrahendo a valore, quem induit, si loco x ponatur $x + \omega$, proveniet differentia tertia $\Delta^3 y$; hincque porro eodem modo differentia quarta $\Delta^4 y$, &c. Dummodo ergo quis noverit differentiam primam cuiusque functionis investigare, simul poterit differentiam secundam, tertiam,

tiam, omnesque sequentes invenire, propterea quod differentia secunda ipsius y nil aliud est, nisi differentia prima ipsius Δy ; & differentia tertia ipsius y nil aliud, nisi differentia prima ipsius $\Delta \Delta y$; sicque porro de reliquis.

12. Si functio y fuerit ex duabus pluribusve partibus composita, ut sit $y = p + q + r + \&c.$; tum quia est $y^1 = p^1 + q^1 + r^1 + \&c.$, erit differentia $\Delta y = \Delta p + \Delta q + \Delta r + \&c.$, similique modo porro $\Delta \Delta y = \Delta \Delta p + \Delta \Delta q + \Delta \Delta r + \&c.$, unde inventio differentiarum, si functio proposita ex partibus fuerit composita, non parum facilior redditur. Quod si vero functio y fuerit productum ex duabus functionibus p & q , nempe $y = p q$, quia erit $y^1 = p^1 q^1$, & $p^1 = p + \Delta p$, atque $q^1 = q + \Delta q$, fiet $p^1 q^1 = p q + p \Delta q + q \Delta p + \Delta p \Delta q$, hincque $\Delta y = p \Delta q + q \Delta p + \Delta p \Delta q$. Unde, si sit p quantitas constans $= a$, ob $\Delta a = 0$; erit functionis $y = a q$, differentia prima $\Delta y = a \Delta q$, similique modo differentia secunda $\Delta \Delta y = a \Delta \Delta q$, tertia $\Delta^3 y = a \Delta^3 q$, & ita porro.

13. Quoniam omnis functio rationalis integra est aggregatum ex aliquot potestatibus ipsius x ; omnes differentias functionum rationalium integrarum invenire poterimus, si differentias potestatum tantum exhibere noverimus. Hancobrem singularum potestatum quantitatis variabilis x differentias investigemus in sequentibus exemplis.

Cum autem sit $x^0 = 1$, erit $\Delta x^0 = 0$; propterea quod x^0 non variatur, etiamsi x abeat in $x + \omega$.

Tum vero vidimus esse $\Delta x = \omega$; & $\Delta \Delta x = 0$, simulque differentiae sequentium ordinum evanescent. Quae cum sint manifesta a Potestate secunda incipiamus:

EXEMPLUM I.

Invenire differentias omnium ordinum potestatis x^2 .

Cum hic sit $y = x^2$, erit $y^1 = (x + \omega)^2$, ideoque $\Delta y = 2 \omega x + \omega \omega$; quae est differentia prima. Iam ob ω

B

quan-

quantitatem constantem, erit $\Delta \Delta y = 2 \omega \omega$, & $\Delta^3 y = 0$;
 $\Delta^4 y = 0$; &c.

EXEMPLUM II.

Invenire differentias omnium ordinum potestatis x^3 .

Ponatur $y = x^3$; & cum sit $y^1 = (x + \omega)^3$,

erit

$$\Delta y = 3 \omega x x + 3 \omega^2 x + \omega^3$$

quae est differentia prima. Deinde ob

$$\Delta . x x = 2 \omega x + \omega \omega$$

erit

$$\Delta . 3 \omega x x = 6 \omega \omega x + 3 \omega^3$$

&

$$\Delta . 3 \omega^2 x = 3 \omega^3 ; \quad \& \quad \Delta . \omega^3 = 0 :$$

quibus collectis erit

$$\Delta \Delta y = 6 \omega^2 x + 6 \omega^3 : \quad \text{atque} \quad \Delta^3 y = 6 \omega^3 :$$

Differentiae vero sequentes evanescent.

EXEMPLUM III.

Invenire differentias omnium ordinum potestatis x^4 .

Posito $y = x^4$; ob $y^1 = (x + \omega)^4$

erit

$$\Delta y = 4 \omega x^3 + 6 \omega^2 x^2 + 4 \omega^3 x + \omega^4 ;$$

quae est differentia prima. Tum ex praecedentibus est :

$$\Delta . 4 \omega x^3 = 12 \omega^2 x^2 + 12 \omega^3 x + 4 \omega^4$$

$$\Delta . 6 \omega^2 x^2 = . . . 12 \omega^3 x + 6 \omega^4$$

$$\Delta . 4 \omega^3 x = + 4 \omega^4$$

$$\Delta . \omega^4 = 0$$

His colligendis erit differentia secunda :

$$\Delta \Delta y = 12 \omega^2 x^2 + 24 \omega^3 x + 14 \omega^4 :$$

Quia deinde porro est :

$$\Delta . 12 \omega^2 x^2 = 24 \omega^3 x + 12 \omega^4$$

$$\Delta . 24 \omega^3 x = . . . 24 \omega^4$$

$$\Delta . 14 \omega^4 = 0$$

pro-

prodibit differentia tertia :

$$\Delta^3 y = 24\omega^3 x + 36\omega^4$$

etque tandem differentia quarta :

$$\Delta^4 y = 24\omega^4$$

quae cum sit constans, differentiae sequentium ordinum evanescent.

EXEMPLUM IV.

Invenire differentias cuiusvis ordinis potestatis x^n .

Ponatur $y = x^n$; &c., cum sit $y' = (x + \omega)^n$; $y'' = (x + 2\omega)^n$; $y''' = (x + 3\omega)^n$; &c. Potestates evolutae dabunt:

$$y = x^n$$

$$y' = x^n + \frac{n}{1} \omega x^{n-1} + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} \omega^2 x^{n-2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} \omega^3 x^{n-3} + \&c.$$

$$y'' = x^n + \frac{n}{1} 2\omega x^{n-1} + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} 4\omega^2 x^{n-2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} 8\omega^3 x^{n-3} + \&c.$$

$$y''' = x^n + \frac{n}{1} 3\omega x^{n-1} + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} 9\omega^2 x^{n-2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} 27\omega^3 x^{n-3} + \&c.$$

$$y'''' = x^n + \frac{n}{1} 4\omega x^{n-1} + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} 16\omega^2 x^{n-2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} 64\omega^3 x^{n-3} + \&c.$$

Hinc, differentiis sumendis, prodibit:

$$\Delta y = \frac{n}{1} \omega x^{n-1} + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} \omega^2 x^{n-2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} \omega^3 x^{n-3} + \&c.$$

$$\Delta y' = \frac{n}{1} \omega x^{n-1} + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} 3\omega^2 x^{n-2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} 7\omega^3 x^{n-3} + \&c.$$

B 2

$$\Delta y'' = \frac{n}{1} \omega x^{n-1} + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} 5 \omega^2 x^{n-2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} 19 \omega^3 x^{n-3} + \&c.$$

$$\Delta y''' = \frac{n}{1} \omega x^{n-1} + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} 7 \omega^2 x^{n-2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} 37 \omega^3 x^{n-3} + \&c.$$

sumantur denuo differentiae, atque obtinebitur:

$$\Delta \Delta y = n(n-1) \omega^2 x^{n-2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} 6 \omega^3 x^{n-3} + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} 14 \omega^4 x^{n-4} + \&c.$$

$$\Delta \Delta y' = n(n-1) \omega^2 x^{n-2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} 12 \omega^3 x^{n-3} + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} 50 \omega^4 x^{n-4} + \&c.$$

$$\Delta \Delta y'' = n(n-1) \omega^2 x^{n-2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} 18 \omega^3 x^{n-3} + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} 110 \omega^4 x^{n-4} + \&c.$$

Ex his per subtractionem ulterius eruitur

$$\Delta^3 y = n(n-1)(n-2) \omega^3 x^{n-3} + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} 36 \omega^4 x^{n-4} + \&c.$$

$$\Delta^3 y' = n(n-1)(n-2) \omega^3 x^{n-3} + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} 80 \omega^4 x^{n-4} + \&c.$$

atque porro

$$\Delta^4 y = n(n-1)(n-2)(n-3) \omega^4 x^{n-4} + \&c.$$

14. Quo lex, secundum quam istae differentiae potestatis
 n^n

n^{a} progrediuntur, facilius perspiciatur, ponamus primo brevitatatis ergo:

$$A = \frac{n}{1}$$

$$B = \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2}$$

$$C = \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3}$$

$$D = \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}$$

$$E = \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}$$

&c.

Deinde sequens formetur Tabula, quae pro singulis differentiis interserviet.

y	1	0	0	0	0	0	0	0	0	&c.
Δy	0	1	1	1	1	1	1	1	1	&c.
$\Delta^2 y$	0	0	2	6	14	30	62	126	254	&c.
$\Delta^3 y$	0	0	0	6	36	150	540	1800	5796	&c.
$\Delta^4 y$	0	0	0	0	24	240	1560	8400	40824	&c.
$\Delta^5 y$	0	0	0	0	0	120	1800	16800	126000	&c.
$\Delta^6 y$	0	0	0	0	0	0	720	15120	191520	&c.
$\Delta^7 y$	0	0	0	0	0	0	0	5040	141120	&c.

in qua Tabula numerus cuiusvis seriei invenitur, si eiusdem seriei praecedens ad numerum supra positum addatur, atque summa per indicem characteri Δ infixum multiplicetur. Sic, in serie differentiae $\Delta^5 y$ respondente, terminus 16800 invenitur, si praecedens 1800 ad supra scriptum 1560 addatur, atque summa 3360 per 5 multiplicetur.

15. Tabula ergo hac constituta, singulae differentiae Potestatis $n^{\text{a}} = y$ sequenti modo se habebunt:

$$y = \Delta^0 y$$

$$\Delta y = A \omega x^{n-1} + B \omega^2 x^{n-2} + C \omega^3 x^{n-3} + D \omega^4 x^{n-4} + \&c.$$

$$\Delta^2 y = 2 B \omega^2 x^{n-2} + 6 C \omega^3 x^{n-3} + 14 D \omega^4 x^{n-4} + \&c.$$

$$\Delta^3 y = 6 C \omega^3 x^{n-3} + 36 D \omega^4 x^{n-4} + 150 E \omega^5 x^{n-5} + \&c.$$

$$\Delta^4 y = 24 D \omega^4 x^{n-4} + 240 E \omega^5 x^{n-5} + 1560 F \omega^6 x^{n-6} + \&c.$$

Generatim autem potestatis x^n differentia ordinis m , seu $\Delta^m y$, sequenti modo exprimitur.

Sit

$$I = \frac{n(n-1)(n-2) \dots (n-m+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots m};$$

$$K = \frac{n-m}{m+1} I;$$

$$L = \frac{n-m-1}{m+2} K;$$

$$M = \frac{n-m-2}{m+3} L;$$

&c.

Deinde vero fit:

$$a = m^n - \frac{m}{1} (m-1)^n + \frac{m(m-1)}{1 \cdot 2} (m-2)^n - \frac{m(m-1)(m-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} (m-3)^n + \&c.$$

$$b = m^{n+1} - \frac{m}{1} (m-1)^{n+1} + \frac{m(m-1)}{1 \cdot 2} (m-2)^{n+1} - \frac{m(m-1)(m-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} (m-3)^{n+1} + \&c.$$

$$c = m^{n+2} - \frac{m}{1} (m-1)^{n+2} + \frac{m(m-1)}{1 \cdot 2} (m-2)^{n+2} - \frac{m(m-1)(m-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} (m-3)^{n+2} + \&c.$$

quibus valoribus inventis erit

$$\Delta^m y = a I \omega^m x^{n-m} + 6 K \omega^{m+1} x^{n-m-1} + 9 L \omega^{m+2} x^{n-m-2} + \&c.$$

cu.

cuius expressionis ratio ex modo, quo singulae differentiae ex valoribus $y, y', y'', y''', \&c.$ elicuntur, sponte sequitur.

16. Ex his perspicuum est, si esponens n fuerit numerus integer affirmativus, tandem ad differentias perveniri constantes, hisque ulteriores omnes esse $= 0$. Sic erit

$$\Delta. x = \omega$$

$$\Delta^2. x^2 = 2\omega^2$$

$$\Delta^3. x^3 = 6\omega^3$$

$$\Delta^4. x^4 = 24\omega^4$$

& tandem

$$\Delta^n. x^n = 1. \quad 2. \quad 3. \quad . \quad . \quad n. \omega^n$$

Omnis ergo functio rationalis integra tandem ad differentias constantes deducetur. Scilicet, functio ipsius x primi gradus, $ax + b$ differentiam primam iam habet constantem $= a\omega$. Functio secundi gradus $axx + bx + c$ differentiam secundam habebit constantem $= 2a\omega\omega$; functionis autem tertii gradus differentia tertia erit constans; quarti quarta, & ita porro.

17. Modus autem, quo invenimus differentias potestatis x^n , quoque latius patet, atque ad eas potestates, quarum exponens n est numerus negativus, vel fractus, vel adeo irrationalis, extenditur. Quod quo clarius appareat, differentias tantum primas praecipuarum huiusmodi potestatum exhibebimus, quoniam lex differentiarum secundarum ac sequentium non tam facile cernitur: erit ergo,

$$\Delta. x = \omega$$

$$\Delta. x^2 = 2\omega x + \omega^2$$

$$\Delta. x^3 = 3\omega x^2 + 3\omega^2 x + \omega^3$$

$$\Delta. x^4 = 4\omega x^3 + 6\omega^2 x^2 + 4\omega^3 x + \omega^4 \&c.$$

Simili modo vero erit

$\Delta.$

$$\Delta. x^{-1} = -\frac{\omega}{x^2} + \frac{\omega^2}{x^3} - \frac{\omega^3}{x^4} + \dots \&c.$$

$$\Delta. x^{-2} = -\frac{2\omega}{x^3} + \frac{3\omega^2}{x^4} - \frac{4\omega^3}{x^5} + \dots \&c.$$

$$\Delta. x^{-3} = -\frac{3\omega}{x^4} + \frac{6\omega^2}{x^5} - \frac{10\omega^3}{x^6} + \dots \&c.$$

$$\Delta. x^{-4} = -\frac{4\omega}{x^5} + \frac{10\omega^2}{x^6} - \frac{20\omega^3}{x^7} + \dots \&c.$$

Et inde pro reliquis. Pariter erit

$$\Delta. x^{\frac{1}{2}} = \frac{\omega}{2x^{\frac{1}{2}}} - \frac{\omega^2}{8x^{\frac{3}{2}}} + \frac{\omega^3}{16x^{\frac{5}{2}}} - \dots \&c.$$

$$\Delta. x^{\frac{1}{3}} = \frac{\omega}{3x^{\frac{2}{3}}} - \frac{\omega^2}{9x^{\frac{4}{3}}} + \frac{5\omega^3}{81x^{\frac{8}{3}}} - \dots \&c.$$

$$\Delta. x^{-\frac{1}{2}} = -\frac{\omega}{2x^{\frac{3}{2}}} + \frac{3\omega^2}{8x^{\frac{5}{2}}} - \frac{5\omega^3}{16x^{\frac{7}{2}}} + \dots \&c.$$

$$\Delta. x^{-\frac{1}{3}} = -\frac{\omega}{3x^{\frac{4}{3}}} + \frac{2\omega^2}{9x^{\frac{5}{3}}} - \frac{14\omega^3}{81x^{\frac{10}{3}}} + \dots \&c.$$

18. Apparet itaque has differentias, si exponens ipsius x non fuerit numerus integer affirmativus, in infinitum progredi, seu ex terminorum numero infinito constare. Interim tamen eadem differentiae quoque per expressionem finitam exhiberi possunt. Cum enim, posito

$$y = x^{-1} = \frac{1}{x}, \text{ sit } y^1 = \frac{1}{x+\omega}, \text{ erit } \Delta. x^{-1} = \Delta. \frac{1}{x} = \frac{1}{x+\omega} - \frac{1}{x};$$

un-

unde, si fractio $\frac{I}{x+\omega}$ in seriem convertatur, prodit expressio superior. Simili modo erit

$$\Delta. x^{-2} = \Delta. \frac{I}{xx} = \frac{I}{(x+\omega)^2} - \frac{I}{xx},$$

atque pro irrationalibus erit

$$\Delta. \sqrt{x} = \sqrt{x+\omega} - \sqrt{x}, \text{ \& } \Delta. \frac{I}{\sqrt{x}} = \frac{I}{\sqrt{x+\omega}} - \frac{I}{\sqrt{x}};$$

quae formulae si more solito in series explicantur, superiores expressiones praebent.

19. Hoc vero modo quoque differentiae functionum, siue fractarum siue irrationalium, inveniri possunt: sic si quaeratur differentia prima fractionis $\frac{I}{aa+xx}$ ponatur $y =$

$$\frac{I}{aa+xx}; \text{ \& , quia est } y^2 = \frac{I}{aa+xx+2\omega x+\omega^2} \text{ erit}$$

$$\Delta y = \Delta. \frac{I}{aa+xx} = \frac{I}{aa+xx+2\omega x+\omega^2} - \frac{I}{aa+xx},$$

quae expressio quoque in seriem infinitam converti potest.

Ponatur $aa+xx = P$, & $2\omega x+\omega^2 = Q$;
erit

$$\frac{I}{P+Q} = \frac{I}{P} - \frac{Q}{P^2} + \frac{Q^2}{P^3} - \frac{Q^3}{P^4} + \&c.$$

&

$$\Delta y = -\frac{Q}{P^2} + \frac{Q^2}{P^3} - \frac{Q^3}{P^4} + \&c.$$

Restitutis ergo loco P & Q valoribus erit:

$$\Delta y = \Delta. \frac{I}{aa+xx} = -\frac{2\omega x+\omega^2}{(aa+xx)^2} + \frac{4\omega\omega xx+4\omega^3 x+\omega^4}{(aa+xx)^3} - \frac{8\omega^3 x^3+12\omega^4 x^2+6\omega^5 x+\omega^6}{(aa+xx)^4} + \&c.$$

C

qui

qui termini si secundum potestates ipsius ω ordinentur erit:

$$\Delta \cdot \frac{1}{aa+xx} = -\frac{2\omega x}{(aa+xx)^2} + \frac{\omega^2(3xx-aa)}{(aa+xx)^3} - \frac{4\omega^3(x^3-aa x)}{(aa+xx)^4} + \&c.$$

20. Similibus seriebus infinitis differentiae functionum irrationalium quoque exprimi possunt.

Sit proposita ista functio $y = \sqrt{aa+xx}$;

& cum sit $y^2 = \sqrt{aa+xx+2\omega x+\omega\omega}$,

ponatur $aa+xx = P$, & $2\omega x+\omega\omega = Q$

$$\text{erit } \Delta y = \sqrt{P+Q} - \sqrt{P} = \frac{Q}{2\sqrt{P}} - \frac{QQ}{8P\sqrt{P}} + \frac{Q^3}{16PP\sqrt{P}} - \&c.$$

unde fiet

$$\begin{aligned} \Delta y = \Delta \cdot \sqrt{aa+xx} &= \frac{2\omega x+\omega\omega}{2\sqrt{aa+xx}} - \frac{4\omega^2 x^2+4\omega^3 x+\omega^4}{8(aa+xx)\sqrt{aa+xx}} + \&c. \\ &\text{vel} \\ &= \frac{\omega x}{\sqrt{aa+xx}} + \frac{aa\omega^2}{2(aa+xx)\sqrt{aa+xx}} - \frac{aa\omega^3 x}{2(aa+xx)^2\sqrt{aa+xx}} - \&c. \end{aligned}$$

Hincque adeo colligimus functionis cuiuscunque ipsius x , quae sit y , differentiam hac forma exprimi posse, ut sit

$$\Delta y = \dots P\omega + Q\omega^2 + R\omega^3 + S\omega^4 + \&c.$$

existentibus $P, Q, R, S, \&c.$ certis ipsius x functionibus, quae quovis casu ex functione y definiri possunt.

21. Neque etiam ex hac forma differentiae functionum transcendentium excluduntur, id quod ex sequentibus exemplis clarius apparebit.

EXEMPLUM I.

Invenire differentiam primam logarithmi hyperbolici ipsius x .

Ponatur $y = l x$; & cum sit $y^2 = l(x+\omega)$,
erit

erit

$$\Delta y = y^1 - y = l(x + \omega) - lx = l\left(1 + \frac{\omega}{x}\right).$$

Huiusmodi autem logarithmum supra docuimus per seriem infinitam exprimere; qua adhibita, erit

$$\Delta y = \Delta.lx = \frac{\omega}{x} - \frac{\omega^2}{2xx} + \frac{\omega^3}{3x^3} - \frac{\omega^4}{4x^4} + \&c.$$

EXEMPLUM II.

Invenire differentiam primam quantitatis exponentialis a^x .

Posito $y = a^x$ erit $y^1 = a^{x+1} = a^x \cdot a^1$:

at supra ostendimus esse

$$a^1 = 1 + \frac{\omega l a}{1} + \frac{\omega^2 (la)^2}{1 \cdot 2} + \frac{\omega^3 (la)^3}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \&c.$$

quo valore introducto erit

$$\Delta.a^x = y^1 - y = \Delta y = \frac{a^x \omega l a}{1} + \frac{a^x \omega^2 (la)^2}{1 \cdot 2} + \frac{a^x \omega^3 (la)^3}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \&c.$$

EXEMPLUM III.

In circulo, cuius radius = 1, invenire differentiam sinus arcus x .

Sit $\sin x = y$, erit $y^1 = \sin(x + \omega)$,

unde $\Delta y = y^1 - y = \sin(x + \omega) - \sin x$.

At est $\sin(x + \omega) = \cos \omega \cdot \sin x + \sin \omega \cdot \cos x$,
atque per series infinitas ostendimus esse,

$$\cos \omega = 1 - \frac{\omega^2}{1 \cdot 2} + \frac{\omega^4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} - \frac{\omega^6}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} + \&c.$$

$$\sin \omega = \omega - \frac{\omega^3}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{\omega^5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} - \frac{\omega^7}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7} + \&c.$$

quibus seriebus substitutis erit:

$$\Delta. \sin x = \omega. \cos x - \frac{\omega^2}{2} \sin x - \frac{\omega^3}{6} \cos x + \frac{\omega^4}{24} \sin x + \frac{\omega^5}{120} \cos x - \&c.$$

EXEMPLUM IV.

*In circulo cuius radius = 1 invenire differentiam
cosinus arcus x.*

Posito $y = \cos x$, ob $y^1 = \cos(x + \omega)$

erit $y^1 = \cos \omega. \cos x - \sin \omega. \sin x$

& $\Delta y = \cos \omega. \cos x - \sin \omega. \sin x - \cos x$

Seriebus ergo ante expositis adhibendis prodibit:

$$\Delta. \cos x = -\omega \sin x - \frac{\omega^2}{2} \cos x + \frac{\omega^3}{6} \sin x + \frac{\omega^4}{24} \cos x - \frac{\omega^5}{120} \sin x - \&c.$$

22. Cum igitur proposita quacunque functione ipsius x , five algebraica five transcendente, quae sit y , eius differentia prima eiusmodi habeat formam ut sit:

$$\Delta y = P \omega + Q \omega^2 + R \omega^3 + S \omega^4 + \&c.$$

si huius differentia denuo capiatur, patebit differentiam secundam ipsius y huiusmodi formam esse habituram:

$$\Delta \Delta y = P \omega^2 + Q \omega^3 + R \omega^4 + \&c.$$

similique modo differentia tertia ipsius y , erit huiusmodi

$$\Delta^3 y = P \omega^3 + Q \omega^4 + R \omega^5 + \&c.$$

sicque porro.

Ubi notandum est litteras $P, Q, R, \&c.$ hic non pro valoribus determinatis adhiberi, neque eadem littera in diversis differentiis eandem functionem ipsius x denotari: ideo enim tantum iisdem litteris utor, ne sufficiens diversarum litterarum numerus deficiat.

Ceterum istae differentiarum formae probe sunt notandae, cum in Analyfi infinitorum maximum usum offerant.

23. Cum igitur modum exposuerim, quo cuiusvis functionis differentia prima, ex eaque porro differentiae sequentium ordinum inveniri queant; quippe quae ex valoribus functionis y successivis $y^I, y^{II}, y^{III}, y^{IV},$ &c. reperiuntur: vicissim ex differentiis ipsius y cuiusque ordinis datis, isti ipsi variati valores ipsius y elici poterunt. Erit enim

$$y^I = y + \Delta y$$

$$y^{II} = y + 2\Delta y + \Delta\Delta y$$

$$y^{III} = y + 3\Delta y + 3\Delta\Delta y + \Delta^3 y$$

$$y^{IV} = y + 4\Delta y + 6\Delta\Delta y + 4\Delta^3 y + \Delta^4 y$$

&c.

ubi coefficientes numerici iterum ex evolutione binomii nascuntur. Quemadmodum ergo $y^I, y^{II}, y^{III},$ &c. sunt valores ipsius y , qui oriuntur si loco x successive ponantur hi valores $x + \omega, x + 2\omega, x + 3\omega,$ &c. statim valorem ipsius $y^{(n)}$ assignare poterimus, qui prodit si loco x scribatur $x + n\omega$, erit scilicet iste valor:

$$y + \frac{n}{1}\Delta y + \frac{n(n-1)}{1.2}\Delta^2 y + \frac{n(n-1)(n-2)}{1.2.3}\Delta^3 y + \&c.$$

Hincque adeo etiam valores ipsius y praeberi possunt si n fuerit numerus negativus. Sic, si loco x ponatur $x - \omega$, functio y abibit in hanc formam:

$$y - \Delta y + \Delta^2 y - \Delta^3 y + \Delta^4 y - \&c.$$

si autem loco x ponatur $x - 2\omega$, functio y transibit in:

$$y - 2\Delta y + 3\Delta^2 y - 4\Delta^3 y + 5\Delta^4 y - \&c.$$

24. Pauca quaedam addamus de methodo inversa, qua, si detur differentia, ex ea ipsa illa functio, cuius est differentia, investigari debeat. Cum autem hoc sit difficillimum atque saepe numero ipsam analysin infinitorum requirat, casus

fus tantum quosdam faciliores evolamus. Primum igitur, regrediendo, si functionis cuiuspiam differentiam invenerimus, vicissim hac differentia proposita, ipsa illa functio, unde est nata, exhiberi poterit. Sic, cum functionis $ax + b$ differentia sit $a\omega$, si quaeratur cuiusnam functionis differentia sit $a\omega$; responsio erit in promptu, eam functionem esse $ax + b$. In hac igitur reperitur quantitas constans b , quae in differentia non inerat, & quae propterea ab arbitrio nostro pender. Perpetuo autem si functionis cuiusvis P differentia fuerit Q , quoque functionis $P + A$, (denotante A quantitatem quamcunque constantem,) differentia erit Q . Hinc, si ista differentia Q proponatur, functio, ex qua ea est orta, erit $P + A$, atque idcirco determinatum valorem non habet, cum constans A ab arbitrio pendeat.

25. Vocemus eam functionem quaesitam cuius differentia proponitur, SUMMAM; quod nomen commode adhibetur, cum quod summa differentiae opponi solet, tum etiam, quod functio quaesita revera sit summa omnium valorum praecedentium differentiae. Quemadmodum enim est $y^I = y + \Delta y$, & $y^{II} = y + \Delta y + \Delta y^I$, si valores ipsius y retro continuentur; ita, ut is, qui valori $x - \omega$ respondet, scribatur y_I , huncque praecedens y_{II} , & qui ultra praecedunt y_{III} , y_{IV} , y_V , &c. hincque series formetur retrograda, cum suis differentiis:

$$\begin{array}{c}
 y_V; y_{IV}; y_{III}; y_{II}; y_I; y \\
 \& \\
 \Delta y_V; \Delta y_{IV}; \Delta y_{III}; \Delta y_{II}; \Delta y_I \\
 \text{erit} \\
 y = \Delta y_I + y_I \\
 \& \\
 \text{ob } y_I = \Delta y_{II} + y_{II}, \text{ porroque } y_{II} = \Delta y_{III} + y_{III} \\
 \text{erit utique} \\
 y = \Delta y_I + \Delta y_{II} + \Delta y_{III} + \Delta y_{IV} + \Delta y_V \\
 \&c.
 \end{array}$$

fic-

ficque erit functio y , cuius differentia est Δy , summa omnium valorum antecedentium differentiae Δy , qui oriuntur, si loco x scribantur valores antecedentes $x - \omega$; $x - 2\omega$; $x - 3\omega$; &c.

26. Quemadmodum ad differentiam denotandam usi sumus signo Δ , ita summam indicabimus signo Σ : scilicet, si functionis y differentia fuerit z , erit $z = \Delta y$; unde, si y detur, differentiam z invenire ante docuimus. Quod si autem data sit differentia z , eiusque summa y reperiri debeat, fiet $y = \Sigma z$; atque adeo, ex aequatione $z = \Delta y$ regrediendo, formabitur haec aequatio $y = \Sigma z$; ubi constans quantitas quaecunque adiaci poterit ob rationes supra datas; ex quo, aequatio $z = \Delta y$, si invertatur, dabit quoque $y = \Sigma z + C$. Deinde, cum quantitatis ay differentia sit $a\Delta y = az$, erit $\Sigma az = ay$, si quidem a sit quantitas constans. Quia ergo est $\Delta x = \omega$; erit $\Sigma \omega = x + C$ & $\Sigma a\omega = ax + C$; atque ob ω quantitatem constantem, erit $\Sigma \omega^2 = \omega x + C$; $\Sigma \omega^3 = \omega^2 x + C$; & ita porro.

27. Si igitur differentias potestatum ipsius x supra inventas invertamus, erit

$$\Sigma \omega = x; \text{ hincque } \Sigma 1 = \frac{x}{\omega};$$

Deinde habemus

$$\Sigma (2\omega x + \omega^2) = x^2;$$

unde fit

$$\Sigma x = \frac{x^2}{2\omega} - \Sigma \frac{\omega}{2} = \frac{x^2}{2\omega} - \frac{x}{2}.$$

Porro est

$$\Sigma (3\omega xx + 3\omega^2 x + \omega^3) = x^3$$

feu $3\omega \Sigma x^2 + 3\omega^2 \Sigma x + \omega^3 \Sigma 1 = x^3$

ergo $\Sigma x^2 = \frac{x^3}{3\omega} - \omega \Sigma x - \frac{\omega^2}{3} \Sigma 1$

feu $\Sigma x^2 = \frac{x^3}{3\omega} - \frac{x^2}{2} + \frac{\omega x}{6}$

simi-

simili modo erit

$$\sum x^3 = \frac{x^4}{4\omega} - \frac{3\omega}{2} \sum x^2 - \omega^2 \sum x - \frac{\omega^3}{4} \sum 1$$

ubi, si loco $\sum x^3$, $\sum x$ & $\sum 1$ valores ante inventi substituantur, reperietur:

$$\sum x^3 = \frac{x^4}{4\omega} - \frac{x^3}{2} + \frac{\omega x x}{4}.$$

Deinde, cum fit

$$\sum x^4 = \frac{x^5}{5\omega} - 2\omega \sum x^3 - 2\omega^2 \sum x^2 - \omega^3 \sum x - \frac{\omega^4}{5} \sum 1$$

erit, adhibendis substitutionibus:

$$\sum x^4 = \frac{x^5}{5\omega} - \frac{1}{2} x^4 + \frac{1}{3} \omega x^3 - \frac{1}{30} \omega^3 x$$

simili modo ulterius progrediendo reperietur

$$\sum x^5 = \frac{x^6}{6\omega} - \frac{1}{2} x^5 + \frac{5}{12} \omega x^4 - \frac{1}{12} \omega^3 x^2$$

&

$$\sum x^6 = \frac{x^7}{7\omega} - \frac{1}{2} x^6 + \frac{1}{2} \omega x^5 - \frac{1}{6} \omega^3 x^3 + \frac{1}{42} \omega^5 x$$

quas expressiones infra facilius invenire docebimus.

28. Si ergo differentia proposita fuerit functio rationalis integra ipsius x , eius summa, (seu ea functio, cuius ea est differentia) ex his formulis facile invenitur. Quia enim differentia ex aliquot potestatibus ipsius x constabit, quaeratur uniuscuiusque termini summa, omnesque istae summae colligantur.

EXEM.

EXEMPLUM I.

Quaeratur functio, cuius differentia sit $= axx + bx + c$.

Quaerantur singulorum terminorum summae ope formularum ante inventarum, erit

$$\sum axx = \frac{ax^3}{3\omega} - \frac{axx}{2} + \frac{a\omega x}{6}$$

$$\& \sum bx = \dots \frac{bx^2}{2\omega} - \frac{bx}{2}$$

$$\text{atque} \quad \sum c = \dots \dots \dots \frac{c x}{\omega}$$

Hinc colligendo has summas erit

$$\sum (axx + bx + c) = \frac{a}{3\omega} x^3 - \frac{(a\omega - b)}{2\omega} x^2 + \frac{(a\omega^2 - 3b\omega + 6c)}{6\omega} x + C$$

quae est functio quaesita, cuius differentia est $axx + bx + c$.

EXEMPLUM II.

Quaeratur functio, cuius differentia est $x^4 - 2\omega^2 xx + \omega^4$.

Operationem simili modo instituendo habebitur.

$$\sum x^4 = \frac{1}{5\omega} x^5 - \frac{1}{2} x^4 + \frac{1}{3} \omega x^3 - \frac{1}{30} \omega^3 x$$

$$- \sum 2\omega^2 x^2 = \dots - \frac{2\omega}{3} x^3 + \omega^2 x^2 - \frac{\omega^3}{3} x$$

atque

$$+ \sum \omega^4 = \dots \dots \dots + \omega^3 x$$

unde functio quaesita erit:

$$\frac{1}{5\omega} x^5 - \frac{1}{2} x^4 - \frac{1}{3} \omega x^3 + \omega^2 x^2 + \frac{19}{30} \omega^3 x + C$$

D

Si

Si enim hic loco x ponatur $x + \omega$, atque a quantitate resultante subtrahatur ista inventa, remanebit proposita differentia $x^4 - 2\omega^2 x^2 + \omega^4$.

29. Si summas, quas pro potestatibus ipsius x invenimus, attentius inspiciamus, in terminis primis, secundis, ac tertiis mox quidem legem observabimus, qua illi secundum singulas potestates progrediuntur: reliquorum autem terminorum lex non ita est perspicua, ut summam potestatis x^n in genere inde colligere liceat. Interim tamen in sequentibus docebitur esse:

$$\begin{aligned} \sum x^n = & \frac{x^{n+1}}{(n+1)\omega} - \frac{1}{2} x^n + \frac{1}{2} \cdot \frac{n\omega}{2 \cdot 3} x^{n-1} - \frac{1}{6} \cdot \frac{n(n-1)(n-2)\omega^2}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} x^{n-3} \\ & + \frac{1}{6} \cdot \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)\omega^5}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7} x^{n-5} \\ & - \frac{3}{10} \cdot \frac{n(n-1) \dots (n-6)\omega^7}{2 \cdot 3 \dots 8 \cdot 9} x^{n-7} \\ & + \frac{5}{6} \cdot \frac{n(n-1) \dots (n-8)\omega^9}{2 \cdot 3 \dots 10 \cdot 11} x^{n-9} \\ & - \frac{691}{210} \cdot \frac{n(n-1) \dots (n-10)\omega^{11}}{2 \cdot 3 \dots 12 \cdot 13} x^{n-11} \\ & + \frac{35}{2} \cdot \frac{n(n-1) \dots (n-12)\omega^{13}}{2 \cdot 3 \dots 14 \cdot 15} x^{n-13} \\ & - \frac{3617}{30} \cdot \frac{n(n-1) \dots (n-14)\omega^{15}}{2 \cdot 3 \dots 16 \cdot 17} x^{n-15} \\ & + \frac{43867}{42} \cdot \frac{n(n-1) \dots (n-16)\omega^{17}}{2 \cdot 3 \dots 18 \cdot 19} x^{n-17} \\ & - \frac{1222277}{110} \cdot \frac{n(n-1) \dots (n-18)\omega^{19}}{2 \cdot 3 \dots 20 \cdot 21} x^{n-19} \\ & + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{854513}{6} \cdot \frac{n(n-1)}{2 \cdot 3} \cdot \dots \cdot \frac{(n-20)\omega^{21}}{22 \cdot 23} x^{n-21} \\
& - \frac{1181820455}{546} \cdot \frac{n(n-1)}{2 \cdot 3} \cdot \dots \cdot \frac{(n-22)\omega^{23}}{24 \cdot 25} x^{n-23} \\
& + \frac{76977927}{2} \cdot \frac{n(n-1)}{2 \cdot 3} \cdot \dots \cdot \frac{(n-24)\omega^{25}}{26 \cdot 27} x^{n-25} \\
& - \frac{23749461029}{30} \cdot \frac{n(n-1)}{2 \cdot 3} \cdot \dots \cdot \frac{(n-26)\omega^{27}}{28 \cdot 29} x^{n-27} \\
& + \frac{8615841276005}{462} \cdot \frac{n(n-1)}{2 \cdot 3} \cdot \dots \cdot \frac{(n-28)\omega^{29}}{30 \cdot 31} x^{n-29}
\end{aligned}$$

&c. + C.

cuius progressionis praecipuum momentum in coefficientibus mere numericis est situm, qui quemadmodum formentur, hic locus nondum est, ubi exponi queat.

30. Apparet autem nisi n sit numerus integer affirmativus, hanc summae expressionem in infinitum progredi, neque hoc modo summam in forma finita exhiberi posse. Ceterum hic notandum est, non omnes potestates ipsius x proposita x^n inferiores occurrere; defunt enim termini x^{n-2} , x^{n-4} , x^{n-6} , x^{n-8} , &c. quippe quorum coefficientes sunt $= 0$, etiamsi termini secundi x^n coefficientis hanc legem non sequatur, sed sit $= -\frac{1}{2}$. Poterunt ergo huius expressionis ope summae potestatum, quarum exponentes sunt vel negativi vel fracti in forma infinita exhiberi solo excepto casu

quo $n = -1$, quia tum fit terminus $\frac{x^n + 1}{(n+1)\omega}$ ob $n+1 = 0$ infinitus. Sic, posito $n = -2$; erit

$$\begin{aligned}\Sigma \frac{1}{x^x} &= C - \frac{1}{\omega x} - \frac{1}{2x^2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\omega}{3x^3} + \frac{11}{6} \cdot \frac{\omega^2}{5x^5} \\ &- \frac{1}{6} \cdot \frac{\omega^5}{7x^7} + \frac{3}{10} \cdot \frac{\omega^7}{9x^9} - \frac{1}{6} \cdot \frac{\omega^9}{11x^{11}} + \frac{691}{210} \cdot \frac{\omega^{11}}{13x^{13}} \\ &- \frac{35}{2} \cdot \frac{\omega^{13}}{15x^{15}} + \frac{3617}{30} \cdot \frac{\omega^{15}}{17x^{17}} - \&c.\end{aligned}$$

31. Si ergo differentia proposita fuerit potestas ipsius x quaecumque, eius summa hinc perpetuo assignari, seu functio, cuius ea sit differentia, exhiberi poterit. Sin autem differentia proposita aliam habeat formam, ut in potestates ipsius x , tanquam partes, distribui nequeat, tum summa difficillime ac saepenumero prorsus non inveniri potest: nisi forte pateat, eam ex quapiam functione esse ortam. Hanc ob causam conveniet plurimum functionum differentias investigare easque probe notare, ut si quando huiusmodi differentia proponatur, eius summa, seu functio unde est orta, statim exhiberi queat. Interim tamen methodus infinitorum plures regulas suppeditabit, quarum ope inventio summarum mirifice sublevabitur.

32. Facilius autem saepe ex differentia proposita reperitur summa quaesita, si haec ex factoribus simplicibus constet, qui progressionem arithmeticam constituent, cuius differentia sit ipsa quantitas ω . Sic, si proposita fuerit functio $(x + \omega)$ $(x + 2\omega)$, eius differentia quaeratur: quia, posito $x + \omega$ loco x , haec functio abit in $(x + 2\omega)$ $(x + 3\omega)$, eius differentia erit $2\omega(x + 2\omega)$. Quare vicissim, si proponatur differentia $2\omega(x + 2\omega)$, eius summa erit $(x + \omega)(x + 2\omega)$, hinc ergo erit

$$\Sigma(x + 2\omega) = \frac{1}{2\omega} (x + \omega)(x + 2\omega).$$

Si-

Simili modo, si proponatur functio $(x+n\omega)(x+(n+1)\omega)$, cum sit eius differentia $2\omega(x+(n+1)\omega)$ erit

$$\Sigma(x+(n+1)\omega) = \frac{1}{2\omega}(x+n\omega)(x+(n+1)\omega)$$

&

$$\Sigma(x+n\omega) = \frac{1}{2\omega}(x+(n-1)\omega)(x+n\omega).$$

33. Si functio ex pluribus factoribus constet, ut sit $y = (x+(n-1)\omega)(x+n\omega)(x+(n+1)\omega)$, cum sit

$$y' = (x+n\omega)(x+(n+1)\omega)(x+(n+2)\omega),$$

erit

$$\Delta y = 3\omega(x+n\omega)(x+(n+1)\omega)$$

ac propterea

$$\Sigma(x+n\omega)(x+(n+1)\omega) = \frac{1}{3\omega}(x+(n-1)\omega)(x+n\omega)(x+(n+1)\omega)$$

Pari modo reperietur esse:

$$\Sigma(x+n\omega)(x+(n+1)\omega)(x+(n+2)\omega) = \frac{1}{4\omega}(x+(n-1)\omega)(x+n\omega)(x+(n+1)\omega)(x+(n+2)\omega).$$

unde lex inveniendi summas, si differentia ex pluribus huiusmodi factoribus constet, sponte patet. Quamvis autem hae differentiae sint functiones rationales integrae, tamen earum summae hoc modo facilius reperiuntur, quam per methodum praecedentem.

34. Hinc quoque via patet ad differentiarum fractarum summas inveniendas. Sit enim proposita fractio

$$y = \frac{1}{x+n\omega}; \text{ quia erit } y' = \frac{1}{x+(n+1)\omega}$$

erit

$$\Delta y = \frac{1}{x + (n+1)\omega} - \frac{1}{x + n\omega} = \frac{-\omega}{(x + n\omega)(x + (n+1)\omega)}$$

erit
ac propterea

$$\approx \frac{1}{(x + n\omega)(x + (n+1)\omega)} = -\frac{1}{\omega} \cdot \frac{1}{x + n\omega}$$

Sit porro

$$y = \frac{1}{(x + n\omega)(x + (n+1)\omega)}$$

$$\text{ob } y' = \frac{1}{(x + (n+1)\omega)(x + (n+2)\omega)}$$

erit

$$\Delta y = \frac{-2\omega}{(x + n\omega)(x + (n+1)\omega)(x + (n+2)\omega)}$$

Hinc ideo fiet

$$\approx \frac{1}{(x + n\omega)(x + (n+1)\omega)(x + (n+2)\omega)}$$

$$= \frac{-1}{2\omega} \cdot \frac{1}{(x + n\omega)(x + (n+1)\omega)}$$

Simili modo erit porro

$$\approx \frac{1}{(x + n\omega)(x + (n+1)\omega)(x + (n+2)\omega)(x + (n+3)\omega)}$$

$$= \frac{-1}{3\omega} \cdot \frac{1}{(x + n\omega)(x + (n+1)\omega)(x + (n+2)\omega)}$$

35. Modus iste summandi probe est tenendus, quia huiusmodi differentiarum summae per praecedentem methodum inveniri non possunt. Quodsi autem differentia insuper ha-

habeat numeratorem, vel factores denominatoris non in arithmetica progressionem procedant, tum tutissimus modus investigandi summas est, ut differentia proposita in suas fractiones simplices resolvatur, quarum singulae etsi summi nequeunt, tamen binis coniungendis toties summa inveniri potest, quoties id quidem fieri licet, tantum enim erit difficiendum, utrum summa ope huius formulae inveniri queat:

$$\Sigma \frac{1}{x + (n+1)\omega} - \Sigma \frac{1}{x + n\omega} = \frac{1}{x + n\omega}$$

etsi enim neutra harum summarum per se exhiberi potest, tamen earum differentia cognoscitur.

36. His igitur casibus negotium redit ad resolutionem cuiusque fractionis in fractiones suas simplices, quae in superiori libro fufius est ostensa. Quemadmodum ergo eius beneficio summae inveniri queant, aliquot exemplis docebimus.

EXEMPLUM I.

Quaeratur summa, cuius differentia sit

$$\frac{3x + 2\omega}{x(x + \omega)(x + 2\omega)}$$

Resolvatur haec differentia proposita in suas fractiones simplices, quae erunt

$$\frac{1}{\omega} \cdot \frac{1}{x} + \frac{1}{\omega} \cdot \frac{1}{x + \omega} - \frac{2}{\omega} \cdot \frac{1}{x + 2\omega}.$$

Cum iam sit ex superiori formula:

$$\Sigma \frac{1}{x + n\omega} = \Sigma \frac{1}{x + (n+1)\omega} - \frac{1}{x + n\omega}$$

$$\text{erit} \quad \Sigma \frac{1}{x} = \Sigma \frac{1}{x + \omega} - \frac{1}{x}$$

Hinc erit summa quaesita

$$\frac{1}{\omega} \sum \frac{1}{x} + \frac{1}{\omega} \sum \frac{1}{x+\omega} - \frac{2}{\omega} \sum \frac{1}{x+2\omega} =$$

$$\frac{2}{\omega} \sum \frac{1}{x+\omega} - \frac{2}{\omega} \sum \frac{1}{x+2\omega} - \frac{1}{\omega x}$$

at est

$$\sum \frac{1}{x+\omega} = \sum \frac{1}{x+2\omega} - \frac{1}{x+\omega};$$

unde summa quaesita erit

$$-\frac{1}{\omega x} - \frac{2}{\omega(x+\omega)} = -\frac{3x-\omega}{\omega x(x+\omega)}.$$

EXEMPLUM II.

Quaeratur summa, cuius differentia est $\frac{3\omega}{x(x+3\omega)}$.

Posita hac differentia $= z$, erit $z = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+3\omega}$

ideoque

$$\sum z = \sum \frac{1}{x} - \sum \frac{1}{x+3\omega} = \sum \frac{1}{x+\omega} -$$

$$\sum \frac{1}{x+3\omega} - \frac{1}{x} = \sum \frac{1}{x+2\omega} - \sum \frac{1}{x+3\omega} - \frac{1}{x} - \frac{1}{x+\omega}$$

$$= -\frac{1}{x} - \frac{1}{x+\omega} - \frac{1}{x+2\omega}.$$

quae est summa quaesita. Quoties ergo hoc modo signa summatoria \sum sese tandem tollunt, toties differentiae propositae summa exhiberi poterit; sin autem haec destructio non succedat, signum hoc est, summam inveniri non posse.

CA-

CAPUT II.

DE USU DIFFERENTIARUM IN DOCTRINA SERIERUM.

37.

Naturam serierum per differentias maxime illustrari, ex primis rudimentis satis est notum. Progressionis enim arithmeticae, quae primum considerari solet, praecipua proprietas in hoc versatur, ut eius differentiae primae sint inter se aequales; hinc differentiae secundae ac reliquae omnes erunt cyphrae. Dantur deinde series, quarum differentiae secundae demum sunt aequales, quae hanc ob rem *secundi ordinis* commode appellantur, dum progressiones arithmeticae series *primi ordinis* vocantur. Porro igitur series *tertiis ordinis* erunt, quarum differentiae tertiae sunt constantes, atque ad *quartum ordinem* & sequentes eae referentur series, quarum differentiae quartae, & posteriores demum sunt constantes.

38. In hac divisione infinita serierum genera comprehenduntur, neque tamen omnes series ad haec genera revocare licet. Occurrunt enim innumerabiles series, quae, differentiis sumendis, nunquam ad terminos constantes deducunt: cuiusmodi, praeter innumeras alias sunt progressionis geometricae, quae nunquam praebent differentias constantes, uti ex hoc exemplo videre licet.

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, &c.

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, &c.

1, 2, 4, 8, 16, 32, &c.

Cum enim series differentiarum cuiusque ordinis aequalis sit ipsi seriei propositae, aequalitas differentiarum prorsus excluditur. Quocirca plures serierum classes constitui debebunt,

E

qua-

quarum una tantum in hos ordines, qui tandem ad differentias constantes revocantur, subdividitur; quam classẽ in hoc capite potissimum considerabimus.

39. Duæ autem res ad naturam serierum cognoscendam imprimis requiri solent, Terminus generalis atque Summa seu Terminus summatorius. Terminus generalis est expressio indefinita, quæ unumquemque seriei terminum complectitur, atque eiusmodi propterea est functio quantitatis variabilis x , quæ, posito $x = 1$, terminum seriei primum exhibet; secundum vero posito $x = 2$; tertium posito $x = 3$; quartum posito $x = 4$; & ita porro. Cognito ergo termino generali, quotuscumque seriei terminus invenietur, etiamsi lex, qua singuli termini cohaerent, non respiciatur. Sic verbi gratia ponendo $x = 1000$, statim terminus millesimus cognoscetur. Ita huius seriei

1, 6, 15, 28, 45, 66, 91, 120, &c.

Terminus generalis est $2xx - x$; posito enim $x = 1$, hæc formula dat terminum primum 1; posito $x = 2$, oritur terminus secundus 6; si ponatur $x = 3$, oritur tertius 15; &c. unde patet huius seriei terminum centesimum, posito $x = 100$ fore $= 2.10000 - 100 = 19900$.

40. Indices seu exponentes in qualibet serie vocantur numeri, qui indicant quotus quisque terminus sit in ordine: sic, termini primi index erit 1, secundi 2, tertii 3, & ita porro. Hinc indices singulis cuiusque seriei terminis inscribi solent, hoc modo

INDICES.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, &c.

TERMINI.

A, B, C, D, E, F, G, &c.

unde statim patet G esse seriei propositæ terminum septimum, cum eius index sit 7. Hinc terminus generalis nil aliud erit, nisi terminus seriei, cuius index vel exponent est
nu-

numerus indefinitus x . Quemadmodum ergo in quolibet ferierum ordine, quarum differentiae vel primae, vel secundae, vel aliae sequentes sunt constantes, terminum generalem inveniri oporteat, primum docebimus: tum vero ad investigationem summae summus progressuri.

41. Incipiamus ab ordine primo, qui continet progressionem arithmeticas, quarum differentiae primae sunt constantes; sitque a terminus seriei primus, & b terminus primus seriei differentiarum, cui sequentes omnes sunt aequales: unde series ita erit comparata.

I N D I C E S.

1, 2, 3, 4, 5, 6,

T E R M I N I.

 $a, a+b, a+2b, a+3b, a+4b, a+5b, \&c.$

D I F F E R E N T I A E.

 $b, b, b, b, b, \&c.$

Ex qua statim patet, terminum, cuius index sit $=x$, fore $a+(x-1)b$, eritque ergo terminus generalis $=bx+a-b$, qui ex terminis primis cum ipsius seriei, tum seriei differentiarum componitur. Quodsi autem terminus secundus seriei $a+b$ vocetur a' , ob $b=a'-a$, erit terminus generalis $=(a'-a)x+2a-a'=a'(x-1)+a(x-2)$ unde ex cognitis terminis primo & secundo progressionis arithmeticae, eius terminus generalis formabitur.

42. Sint in serie secundi ordinis termini primi, ipsius seriei $=a$; differentiarum primarum $=b$; differentiarum secundarum $=c$; eritque ipsa series cum suis differentiis ita comparata.

I N D I C E S.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

T E R M I N I.

 $a; a+b; a+2b+c; a+3b+3c; a+4b+6c; a+5b+10c; a+6b+15c;$

D I F F E R. I.

(&c.

 $b; b+c; b+2c; b+3c; b+4c; b+5c; &c.$

D I F F E R. II.

 $c, c, c, c, c, &c.$

ex cuius inspectione liquet terminum, cuius index $=x$ fore
 $= a + (x-1)b + \frac{(x-1)(x-2)}{1 \cdot 2} c$; qui ergo est termi-

nus generalis seriei propositae. Ponatur autem ipsius seriei
 terminus secundus $= a^I$, terminus tertius $= a^{II}$, cum sit
 $b = a^I - a$; & $c = a^{II} - 2a^I + a$; uti ex natura differen-
 tiarum (§. 10.) intelligitur, erit terminus generalis

$$a + (x-1)(a^I - a) + \frac{(x-1)(x-2)}{1 \cdot 2} (a^{II} - 2a^I + a)$$

qui reducitur ad hanc formam

$$\frac{a^{II}(x-1)(x-2)}{1 \cdot 2} - \frac{2a^I(x-1)(x-3)}{1 \cdot 2} + \frac{a(x-2)(x-3)}{1 \cdot 2}$$

vel etiam ad hanc

$$\frac{a^{II}}{2} (x-1)(x-2) - \frac{2a^I}{2} (x-1)(x-3) + \frac{a}{2} (x-2)(x-3)$$

aut denique ad hanc

$$\frac{1}{2} (x-1)(x-2)(x-3) \left(\frac{a^{II}}{x-3} - \frac{2a^I}{x-2} + \frac{a}{x-1} \right);$$

ideoque ex tribus terminis ipsius seriei definitur.

43. Sit series tertii ordinis $a, a^I, a^{II}, a^{III}, a^{IV}, &c.$
 eius differentiae primae $b, b^I, b^{II}, b^{III}, &c.$ & differen-
 tia

tiae secundae $c, c^I, c^{II}, c^{III}, \&c.$ & tertiae $d, d, d, \&c.$ quippe quae sunt constantes.

Indices	1,	2,	3,	4,	5,	6,
Termini	$a,$	$a^I,$	$a^{II},$	$a^{III},$	$a^{IV},$	$a^V, \&c.$
Differ. I.	$b,$	$b^I,$	$b^{II},$	$b^{III},$	$b^{IV},$	$\&c.$
Differ. II.	$c,$	$c^I,$	$c^{II},$	$c^{III},$	$\&c.$	
Differ. III.	$d,$	$d,$	$d,$	$\&c.$		

Quia est $a^I = a + b$; $a^{II} = a + 2b + c$, $a^{III} = a + 3b + 3c + d$; $a^{IV} = a + 4b + 6c + 4d$; $\&c.$ erit terminus generalis, seu is cuius index est x ,

$$a + \frac{(x-1)}{1} b + \frac{(x-1)(x-2)}{1 \cdot 2} c + \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{1 \cdot 2 \cdot 3} d$$

Sicque terminus generalis ex differentiis formabitur.

Cum autem porro fit

$b = a^I - a$; $c = a^{II} - 2a^I + a$; $d = a^{III} - 3a^{II} + 3a^I - a$
 si hi valores substituantur erit terminus generalis

$$a^{III} \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{1 \cdot 2 \cdot 3} - 3a^{II} \frac{(x-1)(x-2)(x-4)}{1 \cdot 2 \cdot 3} + 3a^I \frac{(x-1)(x-3)(x-4)}{1 \cdot 2 \cdot 3} - a \frac{(x-2)(x-3)(x-4)}{1 \cdot 2 \cdot 3}$$

qui etiam hoc modo exprimetur, ut fit

$$= \frac{(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)}{1 \cdot 2 \cdot 3} \left(\frac{a^{III}}{x-4} - \frac{3a^{II}}{x-3} + \frac{3a^I}{x-2} - \frac{a}{x-1} \right).$$

44. Sit nunc series cuiuscunque ordinis proposita:

Indices	1,	2,	3,	4,	5,	6,
Termini	$a,$	$a^I,$	$a^{II},$	$a^{III},$	$a^{IV},$	$a^V, \&c.$
Differ. I.	$b,$	$b^I,$	$b^{II},$	$b^{III},$	$b^{IV},$	$\&c.$
Differ. II.	$c,$	$c^I,$	$c^{II},$	$c^{III},$	$\&c.$	

Dif.

Differ. III. $d, d^1, d^{11}, \&c.$

Differ. IV. $e, e^1, \&c.$

Differ. V. $f, \&c.$

ex ipsius seriei termino primo, atque ex differentiarum terminis primis $b, c, d, e, f, \&c.$ terminus generalis ita exprimitur ut sit:

$$a + \frac{(x-1)}{1} b + \frac{(x-1)(x-2)}{1 \cdot 2} c + \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{1 \cdot 2 \cdot 3} d + \frac{(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} e + \&c.$$

donec ad differentias constantes perveniatur. Ex quo patet, si nunquam prodeant differentiae constantes, terminum generalem per expressionem infinitam exhiberi.

45. Quia differentiae ex ipsis terminis seriei formantur, si earum valores substituantur, prodibit terminus generalis in eiusmodi forma expressus, cuiusmodi pro seriebus primi, secundi, & tertii ordinis exhibuimus. Scilicet, pro seriebus ordinis quarti, erit terminus generalis

$$\frac{(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \times \left(\frac{a^{IV}}{x-5} - \frac{4a^{III}}{x-4} + \frac{6a^{II}}{x-3} - \frac{4a^I}{x-2} + \frac{a}{x-1} \right)$$

unde lex, qua sequentium ordinum termini generales componuntur, facile perspicitur. Ex his autem patet pro quovis ordine terminum generalem fore functionem ipsius x rationalem integram, in qua maxima ipsius x dimensio congruat cum ordine, ad quem series refertur. Ita serierum primi ordinis erit terminus generalis functio primi gradus, secundi ordinis secundi gradus, & ita porro.

46. Differentiae autem, uti supra vidimus, ex ipsis terminis seriei ita resultant, ut sit

$$b = a^I - a$$

$$b^I = a^{II} - a^I$$

$$b^{II} = a^{III} - a^{II}$$

&c.

$$c = a^{II} - 2a^I + a$$

$$c^I = a^{III} - 2a^{II} + a^I$$

$$c^{II} = a^{IV} - 2a^{III} + a^{II}$$

&c.

$$d = a^{III} - 3a^{II} + 3a^I - a$$

$$d^I = a^{IV} - 3a^{III} + 3a^{II} - a^I$$

$$d^{II} = a^V - 3a^{IV} + 3a^{III} - a^{II}$$

&c.

Quare cum in seriebus primi ordinis sint omnes valores ipsius $c = 0$; erit

$$a^{II} = 2a^I - a; a^{III} = 2a^{II} - a^I; a^{IV} = 2a^{III} - a^{II}; \&c.$$

unde patet has series simul esse recurrentes, & scalam relationis esse 2, - 1. Deinde, cum in seriebus secundi ordinis sint omnes valores ipsius $d = 0$, erit

$$a^{III} = 3a^{II} - 3a^I + a; a^{IV} = 3a^{III} - 3a^{II} + a^I; \&c.$$

ideoque & hae erunt recurrentes scala relationis existente

$$3, - 3, + 1.$$

Simili modo apparebit omnes huius classis series, cuiuscunque sint ordinis, simul ad classem serierum recurrentium pertinere, atque ita quidem, ut scala relationis constet ex coefficientibus potestatis binomii, uno gradu superioris, quam est ordo, ad quem series refertur.

47. Quia vero pro seriebus primi ordinis quoque omnes valores ipsius d & e , & sequentium differentiarum omnium sunt $= 0$, erit quoque in his

$$a^{III} = 3a^{II} - 3a^I + a$$

$$a^{IV} = 3a^{III} - 3a^{II} + a^I$$

&c.

aut

aut

$$\begin{aligned} a^{IV} &= 4a^{III} - 6a^{II} + 4a^I - a \\ a^V &= 4a^{IV} - 6a^{III} + 4a^{II} - a^I \\ &\quad \&c. \end{aligned}$$

Pertinebunt ergo & hinc ad series recurrentes idque infinitis modis, cum scalae relationis esse queant:

$$3, -3, +1; 4, -6, +4, -1; 5, -10, +10, -5, +1; \\ \&c.$$

Similique modo intelligitur unamquamque seriem huius, quam tractamus, classis simul esse seriem recurrentem innumeris modis: scala enim relationis erit

$$\frac{n}{1}, -\frac{n(n-1)}{1 \cdot 2}, +\frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3}, -\frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4},$$

dummodo n sit. numerus integer maior, quam numerus quo ordo iudicatur. Orietur ergo haec series quoque ex evolutione fractionis, cuius denominator est $(1-y)^n$, prouti in superiori libro de seriebus recurrentibus fufius est ostensum.

48. Quemadmodum vidimus, omnium huius classis ferierum, cuiuscunque sint ordinis, terminos generales esse functiones ipsius x rationales integras, ita vicissim apparebit omnes series, quarum termini generales sint huiusmodi functiones ipsius x , ad hanc classem pertinere, atque tandem ad differentias constantes reduci. Et quidem, si terminus generalis fuerit functio primi gradus $ax + b$, dum series inde orta erit primi ordinis seu arithmetica, differentias primas habebit constantes. Sin autem terminus generalis fuerit functio secundi gradus in hac forma $ax^2 + bx + c$ contenta, tum series ex eo oriunda, dum loco x successive numeri 1, 2, 3, 4, 5, &c. substituuntur, erit ordinis secundi, atque differentias secundas habebit constantes: simili modo, terminus generalis tertii gradus $ax^3 + bx^2 + cx + d$ dabit seriem tertii ordinis atque ita porro.

49. Ex termino enim generali non solum omnes seriei termini inveniuntur, sed etiam series differentiarum tam prima-

marum quam sequentium deduci possunt. Cum enim, si seriei terminus primus subtrahatur a secundo, prodeat seriei differentiarum terminus primus: secundus autem, si ipsius seriei terminus secundus a tertio auferatur, ita seriei differentiarum obtinebitur terminus, cuius index est x , si ipsius seriei terminus, cuius index est x , subtrahatur a sequente cuius index est $x + 1$. Quare si in termino seriei generali loco x ponatur $x + 1$, ab hocque valore terminus generalis subtrahatur, remanebit terminus generalis seriei differentiarum: si igitur X fuerit seriei terminus generalis, erit eius differentia ΔX , (quae modo in praecedente capite ostenso invenietur, si statuatur ibi $\omega = 1$) terminus generalis seriei differentiarum primarum. Simili igitur modo erit $\Delta\Delta X$ terminus generalis seriei differentiarum secundarum; $\Delta^3 X$ tertiarum, sicque deinceps.

50. Quodsi autem terminus generalis X fuerit functio rationalis integra, in qua maximus exponens potestatis ipsius x sit n , ex capite praecedente colligitur, eius differentiam ΔX fore functionem uno gradu inferiorem, nempe gradus $n - 1$. Hincque porro $\Delta\Delta X$ erit functio gradus $n - 2$, & $\Delta^3 X$ functio gradus $n - 3$, & ita porro. Quare, si X fuerit functio primi gradus, uti $ax + b$, tum eius differentia ΔX erit constans $= a$; quae cum sit terminus generalis seriei primarum differentiarum, perspicitur seriem, cuius terminus generalis X sit functio primi gradus, fore arithmeticam seu primi ordinis. Simili modo si terminus generalis X fuerit functio secundi gradus ob $\Delta\Delta X$ constantem, series inde orta differentias secundas habebit constantes, eritque propterea ordinis secundi; sicque perpetuo, cuius gradus fuerit functio X terminum generalem constituens, eiusdem ordinis erit series ex eo nata.

51. Hanc ob rem series potestatum numerorum naturalium ad differentias constantes perveniunt, uti ex sequenti schemate fit manifestum.

F

PO-

CAPUT II.

POTEST. I.

	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, &c.
Differ. I.	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, &c.

POTEST. II.

	1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, &c.
Differ. I.	3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, &c.
Differ. II.	2, 2, 2, 2, 2, 2, &c.

POTEST. III.

	1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, &c.
Differ. I.	7, 19, 37, 61, 91, 127, &c.
Differ. II.	12, 18, 24, 30, 36, &c.
Differ. III.	6, 6, 6, 6, &c.

POTEST. IV.

	1, 16, 81, 256, 625, 1296, 2401, &c.
Differ. I.	15, 65, 175, 369, 671, 1105, &c.
Differ. II.	50, 110, 194, 302, 434, &c.
Differ. III.	60, 84, 108, 132, &c.
Differ. IV.	24, 24, 24, &c.

Quae igitur in capite praecedente de differentiis cuiusque ordinis inveniendis sunt praecepta, ea hic inservient ad terminos generales differentiarum quarumvis, quae ex seriebus nascuntur, inveniendos.

52. Si terminus generalis cuiusquam seriei fuerit cognitus, eius ope non solum omnes eius termini in infinitum inveniri, sed etiam series retro continuari, eiusque termini, quorum exponentes sint numeri negativi, exhiberi poterunt, loco x numeros negativos substituendo: sic, si terminus generalis fuerit $\frac{x^x + 3x}{2}$ ponendo loco x tam negativos quam affirmativos indices, series utrinque continuata erit huiusmodi.

INDICES.

$$\&c. -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, \&c.$$

SERIES.

$$\&c. +5, +2, 0, -1, -1, 0, 2, 5, 9, 14, 20, 27, \&c.$$

Differ. I. $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \&c.$

Differ. II. $1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, \&c.$

Cum igitur ex differentiis terminus generalis formetur, quaeque series ex differentiis retro continuari poterit; ita quidem, ut, si differentiae tandem fiant constantes, hi termini finite exhiberi, contra vero per expressionem infinitam assignari queant: Quin etiam ex termino generali, ii termini, quorum indices sunt fracti, definiuntur, in quo serierum INTERPOLATIO continetur.

53. His de termino serierum generali monitis, progrediamur ad summam, seu terminum summatorium serierum cuiusque ordinis investigandum. Proposita autem quacumque serie, TERMINUS *summatorius* est functio ipsius x , quae aequalis est summae tot terminorum seriei, quot unitates continet numerus x . Ita ergo terminus summatorius erit comparatus, ut si ponatur $x = 1$, prodeat terminus primus seriei; si autem ponatur $x = 2$, ut prodeat summa primi & secundi, facto autem $x = 3$, summa primi, secundi ac tertii; sicque deinceps. Hinc, si ex serie proposita nova series formetur, cuius primus terminus aequalis sit primo illius, secundus aequalis summae duorum, tertius aequalis summae trium, atque ita porro, haec nova series vocatur illius *summatrix*, huiusque seriei summatricis terminus generalis erit terminus summatorius seriei propositae: ex quo inventio termini summatorii ad inventionem termini generalis revocatur.

54. Sit ergo series proposita haec

$$a, a^I, a^{II}, a^{III}, a^{IV}, a^V, \&c.$$

huiusque seriei summatrix fit

F 2

A

$A, A^I, A^{II}, A^{III}, A^{IV}, A^V, \&c.$
erit ex eius natura modo expofita :

$$A = a$$

$$A^I = a + a^I$$

$$A^{II} = a + a^I + a^{II}$$

$$A^{III} = a + a^I + a^{II} + a^{III}$$

$$A^{IV} = a + a^I + a^{II} + a^{III} + a^{IV}$$

$\&c.$

Hinc seriei fummatricis differentiae erunt :

$$A^I - A = a^I; A^{II} - A^I = a^{II}; A^{III} - A^{II} = a^{III}; \&c.$$

unde series propofita termino primo minuta erit series differentiarum primarum seriei fummatricis . Quod fi igitur seriei fummatrici praefigatur terminus $= 0$, ut habeatur :

$$0, A, A^I, A^{II}, A^{III}, A^{IV}, A^V, \&c.$$

huius series primarum differentiarum erit ipfa series propofita :

$$a, a^I, a^{II}, a^{III}, a^{IV}, a^V, \&c.$$

55. Hanc ob rem seriei propofitae differentiae primae, erunt differentiae secundae fummatricis, atque differentiae secundae illius erunt differentiae tertiae huius, tertiae autem illius quartae huius, atque ita porro . Quare, fi series propofita tandem habeat differentias constantes, tunc etiam eius fummatrix ad differentias constantes deducetur, eritque igitur series eiusdem naturae, at uno ordine superior . Huiusmodi ergo ferierum perpetuo terminus fummatorius exhiberi poterit per expreffionem finitam . Namque terminus generalis seriei :

$$0, A, A^I, A^{II}, A^{III}, A^{IV}, \&c.$$

feu is, qui indici n convenit exhibebit summam $n-1$ terminorum seriei huius $a, a^I, a^{II}, a^{III}, a^{IV}, \&c.$ atque fi tum loco n fcribatur $n+1$, orietur fumma n terminorum, ipfeque terminus fummatorius .

56. Sit igitur seriei propofitae

$a,$

$a, a^I, a^{II}, a^{III}, a^{IV}, a^V, a^{VI}, \&c.$

Series differentiarum primarum

$b, b^I, b^{II}, b^{III}, b^{IV}, b^V, b^{VI}, \&c.$

Series differentiarum secundarum

$c, c^I, c^{II}, c^{III}, c^{IV}, c^V, c^{VI}, \&c.$

Series differentiarum tertiæ

$d, d^I, d^{II}, d^{III}, d^{IV}, d^V, d^{VI}, \&c.$

ficque porro donec ad differentias constantes perveniatur. Deinde formetur series summatix, quæ cum præfixa 0 in locum termini primi, cum suis differentiis continuis se habebit sequenti modo:

INDICES.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, &c.

SUMMATIX.

0, A, A^I, A^{II}, A^{III}, A^{IV}, A^V, &c.

SERIES PROPOSITA.

$a, a^I, a^{II}, a^{III}, a^{IV}, a^V, a^{VI}, \&c.$

Differ. I. $b, b^I, b^{II}, b^{III}, b^{IV}, b^V, b^{VI}, \&c.$

Differ. II. $c, c^I, c^{II}, c^{III}, c^{IV}, c^V, c^{VI}, \&c.$

Differ. III. $d, d^I, d^{II}, d^{III}, d^{IV}, d^V, d^{VI}, \&c.$

erit seriei summatricis terminus generalis, seu qui indici x respondet

$$0 + (x-1)a + \frac{(x-1)(x-2)}{1 \cdot 2}b + \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{1 \cdot 2 \cdot 3}c + \&c.$$

qui simul exhibet summam $x-1$ terminorum seriei propositæ, $a, a^I, a^{II}, a^{III}, a^{IV}, \&c.$

57. Quod si ergo in hac summa loco $x-1$ scribatur x , prodibit seriei propositæ terminus summatorius summam x terminorum complectens

$$= na + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} b + \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} c + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} d + \&c.$$

Hinc, si litterae b, c, d, e, \dots valores ipsas assignatos retineant, erit

S E R I E I.

$$a, a^I, a^{II}, a^{III}, a^{IV}, a^V, \&c.$$

T E R M I N U S G E N E R A L I S.

$$a + (n-1)b + \frac{(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2} c + \frac{(n-1)(n-2)(n-3)}{1 \cdot 2 \cdot 3} d + \frac{(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} e + \&c.$$

E T T E R M I N U S S U M M A T O R I U S.

$$na + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} b + \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} c + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} d + \&c.$$

Invento ergo seriei cuiusvis ordinis hoc, quem ostendimus, modo termino generali, non difficulter ex eo terminus summatorius reperietur, quippe qui ex iisdem differentiis conflatur.

§8. Hic modus terminum summatorium per differentias seriei inveniendi imprimis ad eiusmodi series, quae tandem ad differentias constantes deducunt, est accomodatus; in aliis enim casibus expressio finita non reperitur. Quodsi autem ea, quae ante de indole termini summatorii sunt exposita, attentius perpendamus, alius modus se offert terminum summatorium immediate ex termino generali inveniendi, qui multo latius patet, atque in infinitis casibus ad expressiones finitas deducit, quibus prior modus infinitas exhibet. Sit enim proposita series quaecunque.

$$a, b, c, d, e, f, \&c.$$

cuius terminus generalis, seu index x respondens sit $= X$; terminus autem summatorius sit $= S$, qui cum summam tot terminorum ab initio exhibeat, quot numerus x continet unitates, erit summa $x - 1$ terminorum $= S - X$; eritque
adeo

adeo X differentia expressionis $S - X$, cum relinquatur, si haec a sequente S subtrahatur.

59. Cum igitur sit $X = \Delta(S - X)$ differentia eo modo sumpta, quem capite praecedente docuimus, hoc tantum discrimine, ut quantitas illa constans ω hic nobis sit $= 1$. Quare, si ad summas regrediamur, erit $\Sigma X = S - X$, ideoque terminus summatorius quaesitus

$$S = \Sigma X + X + C.$$

Quaeri ergo debet summa functionis X methodo ante tradita, ad eamque addi ipse terminus generalis X , eritque aggregatum terminus summatorius. Quoniam autem in summis sumendis involvitur quantitas constans, sive addenda sive subtrahenda; ea ad praesentem casum accomodari debebit. Manifestum autem est, si ponatur $x = 0$, quo casu numerus terminorum summandorum est nullus, summam quoque fore nullam; ex quo quantitas illa constans C ita determinari debet, utposito $x = 0$, fiat quoque $S = 0$. Positis ergo in illa aequatione $S = \Sigma X + X + C$ tam $S = 0$, quam $x = 0$, valor ipsius C invenietur.

60. Quoniam ergo hic totum negotium ad summationem functionum supra monstratam reducitur, ponendo $\omega = 1$, exinde depromamus summationes traditas; ac primo quidem pro potestatibus ipsius x erit

$$\Sigma x^0 = \Sigma 1 = x.$$

$$\Sigma x = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x$$

$$\Sigma x^2 = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x$$

$$\Sigma x^3 = \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{4}x^2$$

$$\Sigma x^4 = \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{30}x$$

$$\Sigma x^5 = \frac{1}{6}x^6 - \frac{1}{2}x^5 + \frac{5}{12}x^4 - \frac{1}{12}x^3$$

$$\Sigma x^6 = \frac{1}{7}x^7 - \frac{1}{2}x^6 + \frac{1}{2}x^5 - \frac{1}{6}x^4 + \frac{1}{42}x$$

quibus accenseatur summatio generalis potestatis x^n §. 29. tradita, dummodo ibi ubique loco ω unitas scribatur. Harum ergo formularum ope omnium ferierum, quarum termi-

ni generales sunt functiones rationales integrae ipsius x ; termini summatorii expedite inveniri poterunt.

61. Denotet $S.X$ terminum summatorium seriei, cuius terminus generalis est $= X$; eritque, ut vidimus,

$$S.X = \sum X + X + C$$

dummodo constans C ita assumatur, ut terminus summatorius $S.X$ evanescat posito $x=0$. Hinc igitur terminos summatorios serierum potestatum, seu quarum termini generales comprehenduntur in hac forma x^n exprimamus. Posito itaque

$$S.x^n = 1 + 2^n + 3^n + 4^n + \dots + x^n$$

erit

$$\begin{aligned} S.x^n &= \frac{1}{n+1} x^{n+1} + \frac{1}{2} x^n + \frac{1}{6} \cdot \frac{n}{2 \cdot 3} x^{n-1} - \frac{1}{6} \cdot \frac{n(n-1)(n-2)}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} x^{n-3} \\ &+ \frac{1}{6} \cdot \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7} x^{n-5} - \frac{1}{10} \cdot \frac{n(n-1) \dots (n-6)}{2 \cdot 3 \dots 8 \cdot 9} x^{n-7} \\ &+ \frac{1}{6} \cdot \frac{n(n-1) \dots (n-8)}{2 \cdot 3 \cdot 4 \dots 10 \cdot 11} x^{n-9} - \frac{691}{110} \cdot \frac{n(n-1) \dots (n-10)}{2 \cdot 3 \dots 12 \cdot 13} x^{n-11} \\ &+ \frac{35}{2} \cdot \frac{n(n-1) \dots (n-12)}{2 \cdot 3 \dots 14 \cdot 15} x^{n-13} - \frac{1617}{30} \cdot \frac{n(n-1) \dots (n-14)}{2 \cdot 3 \dots 16 \cdot 17} x^{n-15} \\ &+ \frac{43867}{42} \cdot \frac{n(n-1) \dots (n-16)}{2 \cdot 3 \dots 18 \cdot 19} x^{n-17} \\ &- \frac{1222277}{110} \cdot \frac{n(n-1) \dots (n-18)}{2 \cdot 3 \dots 20 \cdot 21} x^{n-19} \\ &+ \frac{854513}{6} \cdot \frac{n(n-1) \dots (n-20)}{2 \cdot 3 \dots 22 \cdot 23} x^{n-21} \\ &- \frac{1181820455}{546} \cdot \frac{n(n-1) \dots (n-22)}{2 \cdot 3 \dots 24 \cdot 25} x^{n-23} \\ &+ \frac{76977927}{2} \cdot \frac{n(n-1) \dots (n-24)}{2 \cdot 3 \dots 26 \cdot 27} x^{n-25} \\ &\quad \quad \quad \&c. \quad \quad \quad 62. \end{aligned}$$

62. Hinc ergo summae pro variis ipsius n valoribus ita se habebunt.

$$S.x^0 = x$$

$$S.x^1 = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x$$

$$S.x^2 = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x$$

$$S.x^3 = \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{4}x^2$$

$$S.x^4 = \frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{30}x$$

$$S.x^5 = \frac{1}{6}x^6 + \frac{1}{2}x^5 + \frac{5}{12}x^4 - \frac{1}{12}x^3$$

$$S.x^6 = \frac{1}{7}x^7 + \frac{1}{2}x^6 + \frac{1}{2}x^5 - \frac{1}{6}x^4 + \frac{1}{42}x$$

$$S.x^7 = \frac{1}{8}x^8 + \frac{1}{2}x^7 + \frac{7}{12}x^6 - \frac{7}{24}x^5 + \frac{1}{12}x^4$$

$$S.x^8 = \frac{1}{9}x^9 + \frac{1}{2}x^8 + \frac{2}{3}x^7 - \frac{7}{15}x^6 + \frac{2}{9}x^5 - \frac{1}{30}x$$

$$S.x^9 = \frac{1}{10}x^{10} + \frac{1}{2}x^9 + \frac{3}{4}x^8 - \frac{7}{10}x^7 + \frac{1}{2}x^6 - \frac{3}{20}x^5$$

$$S.x^{10} = \frac{1}{11}x^{11} + \frac{1}{2}x^{10} + \frac{5}{6}x^9 - x^8 + x^6 - \frac{1}{2}x^5 + \frac{5}{66}x$$

$$S.x^{11} = \frac{1}{12}x^{12} + \frac{1}{2}x^{11} + \frac{11}{12}x^{10} - \frac{11}{8}x^9 + \frac{11}{6}x^8 - \frac{11}{8}x^7 + \frac{5}{12}x^6$$

$$S.x^{12} = \frac{1}{13}x^{13} + \frac{1}{2}x^{12} + x^{11} - \frac{11}{6}x^{10} + \frac{22}{7}x^9 - \frac{33}{10}x^8 + \frac{5}{3}x^7 - \frac{691}{2730}x^6$$

$$S.x^{13} = \frac{1}{14}x^{14} + \frac{1}{2}x^{13} + \frac{13}{12}x^{12} - \frac{143}{60}x^{11} + \frac{143}{28}x^{10} - \frac{143}{20}x^9 + \frac{65}{12}x^8 - \frac{691}{420}x^7$$

$$S.x^{14} = \frac{1}{15}x^{15} + \frac{1}{2}x^{14} + \frac{7}{6}x^{13} - \frac{91}{30}x^{12} + \frac{143}{18}x^{11} - \frac{143}{10}x^{10} + \frac{91}{6}x^9 - \frac{691}{9}x^8 + \frac{7}{6}x^7$$

$$S.x^{15} = \frac{1}{16}x^{16} + \frac{1}{2}x^{15} + \frac{5}{4}x^{14} - \frac{91}{24}x^{13} + \frac{143}{12}x^{12} - \frac{429}{16}x^{11} + \frac{455}{12}x^{10} - \frac{691}{24}x^9 + \frac{35}{4}x^8$$

$$S.x^{16} = \frac{1}{17}x^{17} + \frac{1}{2}x^{16} + \frac{4}{3}x^{15} - \frac{16}{3}x^{14} + \frac{52}{3}x^{13} - \frac{143}{3}x^{12} + \frac{260}{3}x^{11} - \frac{1332}{15}x^{10} + \frac{140}{3}x^9 - \frac{3617}{516}x^8$$

&c.

quae summae ex forma generali usque ad potestatem vigesimam

G

mam nonam continuari possunt. Atque adhuc ulterius progredi liceret, si coefficientes illi numerici ulterius essent eruti.

63. Ceterum, in his formulis lex quaedam observatur, cuius ope quaelibet ex praecedente facile inveniri potest, excepto tantum termino ultimo, si in eo potestas ipsius x prima contineatur: tum enim in summa sequente unus terminus insuper accedit. Hoc autem omisso, si fuerit

$$S. x^n = a x^{n+1} + b x^n + \gamma x^{n-1} - \delta x^{n-2} + \varepsilon x^{n-3} - \zeta x^{n-4} + \eta x^{n-5} - \&c.$$

erit sequens summa:

$$S. x^{n+1} = \frac{n+1}{n+2} a x^{n+1} + \frac{n+1}{n+1} b x^n + \frac{n+1}{n} \gamma x^{n-1} - \frac{n+1}{n-2} \delta x^{n-2} + \frac{n+1}{n-4} \varepsilon x^{n-3} - \frac{n+1}{n-6} \zeta x^{n-4} + \frac{n+1}{n-8} \eta x^{n-5} - \&c.$$

unde si n fuerit numerus par, sequens summa vera prodit: at si n fuerit numerus impar, tum in sequente summa praeterea desiderabitur terminus ultimus, cuius forma erit $\pm \phi x$. Interim tamen hic sine aliis subsidiis ita inveniri poterit. Cum enim si ponatur $x = 1$, summa unici tantum termini, (hoc est terminus primus, qui erit $= 1$) oriri debeat: ponatur in omnibus terminis iam inventis $x = 1$, ipsaque summa statuatur $= 1$, quo facto valor ipsius ϕ elicietur, eo-que invento ulterius progredi licebit. Atque hoc pacto omnes istae summae inveniri potuissent. Sic, cum fit

$$S. x^5 = \frac{1}{6} x^6 + \frac{1}{2} x^5 + \frac{1}{12} x^4 - \frac{1}{12} x^3$$

$$\text{erit } S. x^6 = \frac{6}{7} \cdot \frac{1}{6} x^7 + \frac{6}{6} \cdot \frac{1}{2} x^6 + \frac{6}{5} \cdot \frac{1}{12} x^5 - \frac{6}{3} \cdot \frac{1}{12} x^3 + \phi x$$

$$\text{seu } S. x^6 = \frac{1}{7} x^7 + \frac{1}{2} x^6 + \frac{1}{5} x^5 - \frac{1}{5} x^3 + \phi x.$$

Ponatur nunc $x = 1$, fiet $1 = \frac{1}{7} + \frac{1}{2} + \frac{1}{5} - \frac{1}{5} + \phi$ ideoque $\phi = \frac{1}{7} - \frac{1}{7} = \frac{1}{7}$, uti ex forma generali invenimus.

64. Ope harum formularum summatoriarum nunc facile omnium serierum, quarum termini generales sunt functiones ipsius x rationales integrae, termini summatorii inveniri po-

po-

poterunt, hocque multo expeditius, quam praecedente methodo per differentias.

EXEMPLUM I.

Invenire terminum summatorium huius seriei

2, 7, 15, 26, 40, 57, 77, 100, 126, &c.

cuius terminus generalis est $\frac{3xx+x}{2}$.

Cum terminus generalis constet duobus membris, quaeratur pro utroque terminus summatorius ex formulis superioribus

$$S. \frac{1}{2}xx = \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{4}xx + \frac{1}{4}x$$

$$\& S. \frac{1}{2}x = \dots \frac{1}{4}xx + \frac{1}{4}x$$

$$\text{eritque } S. \frac{3xx+x}{2} = \frac{1}{2}x^3 + xx + \frac{1}{2}x = \frac{1}{2}x(x+1)^2$$

qui est terminus summatorius quaesitus. Sic, si ponatur $x=5$, erit $\frac{1}{2} \cdot 6^2 = 90$, summa quinque terminorum

$$2 + 7 + 15 + 26 + 40 = 90.$$

EXEMPLUM II.

Invenire terminum summatorium seriei

1, 27, 125, 343, 729, 1331, &c.

quae continet cubos numerorum imparium.

Terminus generalis huius seriei est

$$= (2x-1)^3 = 8x^3 - 12xx + 6x - 1,$$

unde terminus summatorius sequenti modo colligitur.

$$+ 8. S. x^3 = 2x^4 + 4x^3 + 2x^2$$

$$\& - 12. S. x^2 = \dots - 4x^3 - 6x^2 - 2x$$

$$\text{atque } + 6. S. x = \dots + 3x^2 + 3x$$

$$\text{denique } - 1. S. x^0 = \dots - x.$$

Erit scilicet summa quaesita $= 2x^4 - x^2 = xx(2xx-1)$.

Uti, si ponatur $x=6$ erit $36 \cdot 71 = 2556$ summa sex terminorum seriei propositae $= 1 + 27 + 125 + 343 + 729 + 1331 = 2556$.

65. Quod si terminus generalis fuerit productum ex
G 2 facto-

factoribus simplicibus, tum terminus summatorius facilius reperietur per ea, quae supra §. 32. & sequentibus sunt tradita. Cum enim, posito $\omega = 1$, fit

$$\Sigma (x+n) = \frac{1}{2} (x+n-1) (x+n)$$

$$\& \Sigma (x+n) (x+n+1) = \frac{1}{3} (x+n-1) (x+n) (x+n+1)$$

$$\& \Sigma (x+n) (x+n+1) (x+n+2) = \frac{1}{4} (x+n-1) (x+n) (x+n+1) (x+n+2) \\ \&c.$$

si ad has summas ipsos terminos generales addamus, simulque constantem adiiciamus, quae posito $x = 0$, reddat terminum summatorium evanescentem, sequentes obtinebimus terminos summatorios

$$S.(x+n) = \frac{1}{2} (x+n) (x+n+1) - \frac{1}{2} n(n+1)$$

$$\& S.(x+n)(x+n+1) = \frac{1}{3} (x+n)(x+n+1)(x+n+2) - \frac{1}{3} n(n+1)(n+2)$$

$$\& S.(x+n)(x+n+1)(x+n+2) = \frac{1}{4} (x+n)(x+n+1)(x+n+2)(x+n+3) \\ - \frac{1}{4} n(n+1)(n+2)(n+3)$$

sicque porro.

Si ergo fuerit vel $n = 0$ vel $n = -1$, quantitas constans in his summis evanescit.

66. Seriei ergo 1, 2, 3, 4, 5, &c. cuius terminus generalis est $= x$, terminus summatorius erit $= \frac{1}{2} x(x+1)$ seriesque summatrix haec: 1, 3, 6, 10, 15, &c. cuius porro terminus summatorius erit $= \frac{x(x+1)(x+2)}{1 \cdot 2 \cdot 3}$, & series summatrix haec: 1, 4, 10, 20, 35, &c. Haec vero denuo terminum summatorium habebit $= \frac{x(x+1)(x+2)(x+3)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}$, qui erit terminus generalis seriei 1, 5, 15, 35, 70, &c. huiusque terminus summatorius erit $= \frac{x(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}$.

Hae autem series prae reliquis probe sunt notandae, quoniam earum ubique amplissimus est usus. Ex his enim desumuntur coefficientes binomii ad dignitates elevati, qui quam late pateant, cuique in his rebus parum versato abunde constat.

67. Ex his etiam illi termini summatorii, quos ante ex differentiis eliciimus, facile inveniuntur. Cum enim ibi terminum generalem sequenti forma invenerimus expressum

$$a + \frac{(x-1)}{1} b + \frac{(x-1)(x-2)}{1 \cdot 2} c + \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{1 \cdot 2 \cdot 3} d + \&c.$$

si cuiusque membri terminum summatorium quaeramus eosque omnes addamus, habebimus terminum summatorium huic termino generali convenientem. Sic cum fit

$$S \ 1 = x$$

$$\& \quad S \ (x-1) = \frac{1}{2} x(x-1)$$

$$\text{atque} \quad S \ (x-1)(x-2) = \frac{1}{3} x(x-1)(x-2)$$

$$\& \quad S \ (x-1)(x-2)(x-3) = \frac{1}{4} x(x-1)(x-2)(x-3) \\ \&c.$$

erit terminus summarius quaesitus:

$$xa + \frac{x(x-1)}{1 \cdot 2} b + \frac{x(x-1)(x-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} c + \frac{x(x-1)(x-2)(x-3)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} d + \&c$$

quae forma non discrepat ab ea, quam ante ex differentiis obtinuimus.

68. Deinde etiam haec terminorum summatoriorum inventio ad fractiones accomodari potest: quia enim supra §. 34. invenimus esse, ponendo $\omega = 1$

$$\Sigma \frac{1}{(x+n)(x+n+1)} = -1 \cdot \frac{1}{x+n}$$

$$\text{erit} \quad S. \frac{1}{(x+n)(x+n+1)} = -1 \cdot \frac{1}{x+n+1} + \frac{1}{n+1}$$

Simili modo, si ad summas supra inventas ipsos terminos generales addamus, seu quod idem est, si in illis expressionibus loco x ponamus $x+1$ habebimus

$$S. \frac{1}{(x+n)(x+n+1)(x+n+2)} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(x+n+1)(x+n+2)} \\ + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(n+1)(n+2)}$$

$$\& S. \frac{1}{(x+n)(x+n+1)(x+n+2)(x+n+3)} =$$

$$-\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{(x+n+1)(x+n+2)(x+n+3)} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)}$$

quae formae facile pro lubitu ulterius continuantur.

$$69. \text{ Quia erit } S. \frac{1}{(x+n)(x+n+1)} = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{x+n+1}$$

$$\text{erit quoque } S. \frac{1}{x+n} - S. \frac{1}{x+n+1} = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{x+n+1}.$$

etsi ergo neuter horum duorum terminorum summatoriorum seorsim exhiberi potest, tamen eorum differentia cognoscitur; hincque in pluribus casibus summae serierum satis expedite assignantur: id quod usu venit, si terminus generalis fuerit fractio, cuius denominator in factores simplices resolvi potest. Tum enim tota fractio in fractiones partiales resolvatur; quo facto, ope huius lemmatis mox patebit, utrum terminus summatorius exhiberi queat nec ne.

EXEMPLUM I.

Invenire terminum summatorium seriei huius:

$$1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{10} + \frac{1}{15} + \frac{1}{21} + \&c.$$

$$\text{cuius terminus generalis est } = \frac{2}{n^2+n}.$$

Terminus iste generalis per resolutionem reducitur ad hanc formam $\frac{2}{n} - \frac{2}{n+1}$. Hinc terminus summatorius erit $= 2S. \frac{1}{n} - 2S. \frac{1}{n+1}$; qui ergo per praecedens lemma erit $= 2 - \frac{2}{n+1} = \frac{2n}{n+1}$. Sic, si sit $x=4$, erit $\frac{2}{5} = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{10}$.

EXEMPLUM II.

Quaeratur terminus summatorius seriei huius: $\frac{1}{3}, \frac{1}{21}, \frac{1}{45}, \frac{1}{77}, \frac{1}{117}, \&c.$

$$\text{cuius terminus generalis est } = \frac{1}{4n^2+4n-3}.$$

Quia termini generalis denominator habet factores $2n-1$ & $2n+3$, is resolvetur in has partes:

$$\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2n+3} = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{n-\frac{1}{2}} - \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{n+\frac{3}{2}}.$$

At est $S. \frac{1}{n-\frac{1}{2}} = S. \frac{1}{n+\frac{1}{2}} + 2 - \frac{1}{n+\frac{1}{2}}$

&c $S. \frac{1}{n+\frac{1}{2}} = S. \frac{1}{n+\frac{3}{2}} + \frac{2}{3} - \frac{1}{n+\frac{3}{2}}$

ergo $S. \frac{1}{n-\frac{1}{2}} - S. \frac{1}{n+\frac{3}{2}} = 2 + \frac{2}{3} - \frac{1}{n+\frac{1}{2}} - \frac{1}{n+\frac{3}{2}}$

cuius pars octava dabit terminum summatorium quaesitum nempe

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{12} - \frac{1}{8n+4} - \frac{1}{8n+12} = \frac{n}{4n+2} + \frac{n}{3(4n+6)} = \frac{n(4n+5)}{3(2n+1)(2n+3)}.$$

70. Quoniam numeri figurati, quos coefficientes binomii ad dignitates evecti praebent, prae ceteris notari merentur, summas serierum exhibeamus, quarum numeratores sint $= 1$, denominatores vero numeri figurati; id quod ex §. 68. facile fiet. Seriei ergo cuius

Terminus generalis est

$$\begin{array}{l} \frac{1 \cdot 2}{n(n+1)} \\ \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{n(n+1)(n+2)} \\ \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}{n(n+1)(n+2)(n+3)} \\ \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}{n(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)} \\ \text{\&c.} \end{array}$$

Terminus summatorius erit

$$\begin{array}{l} \frac{2}{1} - \frac{2}{n+1} \\ \frac{1}{2} - \frac{1 \cdot 3}{(n+1)(n+2)} \\ \frac{4}{3} - \frac{1 \cdot 2 \cdot 4}{(n+1)(n+2)(n+3)} \\ \frac{5}{4} - \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5}{(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)} \\ \text{\&c.} \end{array}$$

un-

unde lex, qua istae expressiones progrediuntur, sponte apparet. Neque vero hinc terminus summatorius, qui conveniat termino generali $\frac{1}{x}$, colligi potest, quippe qui per formulam definitam exprimi nequit.

71. Quoniam terminus summatorius praebet summam tot terminorum, quot unitates continentur in indice x ; manifestum est harum serierum in infinitum continuatarum summas obtineri, si ponatur index x infinitus: quo casu expressionum modo inventarum termini posteriores, ob denominatores in infinitum abeuntes, evanescent.

Hinc istae series infinitae finitas habebunt summas, quae erunt

$$\begin{aligned} 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{10} + \frac{1}{15} + \&c. &= \frac{2}{1} \\ 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{20} + \frac{1}{35} + \&c. &= \frac{3}{2} \\ 1 + \frac{1}{5} + \frac{1}{15} + \frac{1}{35} + \frac{1}{70} + \&c. &= \frac{4}{3} \\ 1 + \frac{1}{6} + \frac{1}{21} + \frac{1}{36} + \frac{1}{126} + \&c. &= \frac{5}{4} \\ 1 + \frac{1}{7} + \frac{1}{28} + \frac{1}{49} + \frac{1}{210} + \&c. &= \frac{6}{5} \end{aligned}$$

&c.

Omnia ergo serierum, quarum termini summatorii habentur, in infinitum continuatarum summae exhiberi poterunt posito $x = \infty$, dummodo hoc casu summae fiant finitae: quod quidem evenit, si in termino summatorio x tot habeat dimensiones in denominatore, quot habet in numeratore.

CA.

CAPUT III.

DE INFINITIS

ATQUE INFINITE PARVIS.

72.

Cum omnis Quantitas, quantumvis sit magna, ulterius augeri possit, neque quicquam obstat, quominus ad datam quantitatem quamcumque alia quantitas eiusdem generis addi queat; omnis quoque quantitas sine fine augeri poterit: neque enim unquam tam magna fiet, ut ipsi nihil amplius adiaci possit. Nulla igitur datur quantitas tam magna, qua maior concipi nequeat: hincque extra dubium erit positum, *omnem quantitatem in infinitum augeri posse*. Qui enim hoc negaverit, is affirmare cogitur, dari limitem, quem quantitas, cum attigerit, superare nequeat, atque ideo statuere debet quantitatē, cui nihil amplius adiaci possit; quod cum sit absurdum atque quantitatis notioni adversetur, necessario concedendum est, omnem quantitatem sine fine continuo magis, hoc est, in infinitum augeri posse.

73. In singulis quantitatum speciebus hoc etiam clarius perspicitur. Sic, nemo facile reperietur, qui statuerit seriem numerorum naturalium 1, 2, 3, 4, 5, 6, &c. ita usquam esse determinatam, ut ulterius continuari non possit. Nullus enim datur numerus, ad quem non insuper unitas addi, sicque numerus sequens maior exhiberi queat; hinc series numerorum naturalium sine fine progreditur, neque unquam pervenitur ad numerum maximum, quo maior prorsus non detur. Simili modo linea recta nunquam eousque produci potest, ut insuper ulterius prolongari non possit. Quibus evincitur, tam numeros in infinitum augeri, quam lineas in infinitum produci posse. Quae cum sint species quantitatum,

H

simul

simul intelligitur, omni quantitate, quantumvis sit magna, adhuc dari maiorem, hacque denuo maiorem, sicque augendo continuo ulterius sine fine, hoc est in infinitum, procedi posse.

74. Quanquam autem haec sunt adeo perspicua, ut qui ea negare vellet, sibi ipse contradicere deberet; tamen ista infiniti doctrina a pluribus, qui eam explicare sunt conati, tantopere est offuscata, tantisque difficultatibus atque etiam contradictionibus obvoluta, ut, qua se extricarent, nulla via pateret. Ex eo, quod quantitas in infinitum augeri possit, quidam concluderunt, dari revera quantitatem infinitam; eamque ita descriperunt, ut nullum amplius augmentum suscipere possit. Hoc autem ipso ideam quantitatis evertunt, dum eiusmodi quantitatem statuunt, quae ulterius augeri nequeat. Praeterea vero secum ipsi infinitum admittere pugnant; dum enim incrementi, quo quantitas sit capax, finem faciunt, simul negant quantitatem sine fine augeri posse, negant ergo quoque quantitatem in infinitum augeri posse, quoniam utraque locutio congruit: sicque, dum quantitatem infinitam statuunt, eam simul tollunt. Si enim quantitas sine fine, hoc est in infinitum, augeri nequeat, certe nulla quantitas infinita existere poterit.

75. Hinc igitur ex eo ipso, quod omnis quantitas in infinitum augeri possit, sequi videtur nullam dari quantitatem infinitam. Quantitas enim continuis incrementis aucta, infinita non evadet, nisi iam sine fine increverit: quod autem sine fine fieri debet, id non tanquam iam factum concipi potest. Interim tamen non solum huiusmodi quantitatem, ad quam incrementis sine fine congestis pervenitur, certo caractere indicare, sicque debito modo in calculum inducere licet, uti mox fusius ostendemus; sed etiam in mundo eiusmodi casus existere, vel saltem concipi possunt, quibus numerus infinitus actu existere videatur. Sic si materia in infinitum sit divisibilis, uti plures Philosophi statuerunt, numerus par-

partium, quibus datum quodque materiae frustum constat, revera erit infinitus; si enim statueretur finitus, materia certe non in infinitum foret divisibilis. Simili modo si universus mundus esset infinitus, uti pluribus placuit, numerus corporum mundum componentium finitus certe esse non posset, foretque ideo quoque infinitus..

76. Haec etiamsi inter se pugnare videantur, tamen si attentius perpendantur, a cunctis incommodis liberari poterunt. Qui enim statuit materiam in infinitum esse divisibilem, is negat in divisione materiae continua unquam ad partes tam parvas perveniri, quae ulterius dividi nequeant: nullas ergo materia habebit partes, ulterius individuas; cum singulae particulae, ad quas per continuam divisionem iam sit perventum, ulterius se subdividi pariantur. Qui igitur dicit hoc casu numerum partium fore infinitum, is partes ultimas, quae ulterius sint individuae, intelligit; ad quas cum nunquam perveniatur, & quae propterea nullae sunt, is has ipsas partes, quae nullae sunt, numerare conatur. Si enim materia sine fine continuo ulterius subdividi potest, partibus individuis seu simplicibus prorsus caret: neque adeo quicquam superest, quod numerari queat. Hanc ob rem qui materiam in infinitum divisibilem statuit, is simul negat, materiam ex partibus simplicibus esse compositam..

77. Quod si autem, dum de partibus alicuius corporis seu materiae loquimur, non ultimas seu simplices, quippe quae nullae sunt, intelligamus, sed eas, quas divisio revera produxit; tum admissa hac hypothese de divisibilitate materiae in infinitum, unumquodque vel minimum materiae frustum non solum in plurimas partes dissecari, sed etiam nullus numerus tam magnus assignari poterit, quo non maior partium ex illo frusto sectarum numerus exhiberi queat. Numerus ergo partium non quidem ultimarum, sed quae ipsae adhuc sint ulterius divisibiles, quae unumquodque corpus componunt, omni numero assignabili erit maior. Simili mo-

dō, si universus mundus sit infinitus, numerus corporum mundum constituentium pariter omni assignabili erit maior; qui cum finitus esse nequeat, sequitur numerum infinitum & numerum omni assignabili maiorem esse nomina synonyma.

78. Qui ergo hoc modo divisibilitatem materiae in infinitum intuetur, nullis incommodis, quae vulgo huic opinioni imputantur, se implicat, nihilque affirmare cogitur, quod sanae rationi adversetur. Qui autem contra materiam in infinitum divisibilem esse negant, ii in maximas difficultates prolabuntur, ex quibus se nullo prorsus modo extrahere possunt. Statuere enim coguntur unamquodque corpus non nisi in certum partium numerum dissecari posse, ad quas si fuerit perventum, nulla divisio ulterior locum inveniat; quas ultimas particulas alii *atomos*, alii *monades* atque *entia simplicia* vocant. Cur autem istae ultimae particulae nullam amplius divisionem admittant, duplex esse potest causa: altera, quod omni extensione careant; altera quod quidem sint extensae, sed tamen tam durae atque ita comparatae, ut nulla vis ad eas dissecandas sufficiat. Utrumvis patroni huius opinionis dicant, sese aequae difficultatibus implicent.

79. Sint enim ultimae particulae omnis extensionis expertes, ita ut partibus prorsus careant; qua explicatione quidem ideam entium simplicium optime tuentur. At, quemadmodum corpus ex finito huiusmodi particularum numero constare queat, concipi nullo modo potest. Ponamus pedem cubicum materiae ex mille huiusmodi entibus simplicibus esse compositum, huncque actu in mille partes secari; quae si sint aequales, erunt digiti cubici: sin. autem sint inaequales, aliae erunt maiores aliae minores. Unus igitur digitus cubicus foret ens simplex, sicque maxima resurgeret contradictio; nisi forte in digito cubico inesse tantum unum ens simplex, reliquumque spatium vacuum esse dicere velint: at vero hoc modo continuitatem corporum tollerent, praeterquam quod isti Philosophi vacuum plane ex mundo profligant.

Quodsi

Quodsi obiciant numerum entium simplicium, quae pedem cubicum materiae constituunt, millenario longe esse maiorem, nihil omnino lucrantur: incommodum enim, quod ex numero millenario sequitur, ex quovis alio numero quantumvis magno aequae manat. Hanc difficultatem Acutissimus LEIBNIZIUS, primus monadum inventor, probe perspexit, dum materiam absolute in infinitum divisibilem esse statuit. Neque ergo ante ad monades pervenire licet, quam corpus actu in infinitum sit divisum. Hoc ipso autem existentiam entium simplicium, ex quibus corpora constent, penitus tollit: nam qui negat corpora ex entibus simplicibus esse composita, & ille qui statuit corpora in infinitum esse divisibilia, in eadem prorsus sunt sententia.

80. Neque magis autem sibi constant, si dicunt ultimas corporum particulas extensas quidem esse, sed ob summam duritiem in partes divelli non posse. Cum primum enim in ultimis particulis extensionem admittunt, eas ex partibus compositas esse statuunt, quae, utrum revera a se invicem separari queant nec ne, parum refert; etiamsi nullam causam assignare possint, unde tanta durities sit orta. Nunc autem plerique, qui divisibilitatem materiae in infinitum negant; hoc posterius incommodum satis sensisse videntur, quia priori ideae partium ultimarum potissimum inhaerent; hasque difficultates aliter diluere non possunt, nisi aliquot leviusculis metaphysicis distinctionibus, quae maximam partem eo tendunt, ut ne consequentiis, quae secundum mathematica principia formantur, fidamus; neque dimensiones in partibus simplicibus adhiberi oportere regerunt. At primum demonstrare debuissent, istas suas partes ultimas, quarum determinatus numerus corpus constituat, extensas prorsus non esse.

81. Cum igitur ex hoc labyrintho exitum nullum invenire, neque obiectionibus debito modo occurrere queant, ad distinctiones confugiunt, respondentes has obiectiones a sen-

sensibus atque imaginatione suppeditari, in hoc autem negotio solum intellectum purum adhiberi oportere; sensus autem ac ratioſina inde pendentia ſaepiſſime fallere. Intellectus ſcilicet purus agnoſcet fieri poſſe, ut pars milleſima pedis cubici materiae omni extensione careat, quod imaginationi abſurdum videtur. Tum vero, quod ſensus ſaepenumero fallant, res vera quidem eſt, at nemini minus quam mathematicis opponi poteſt. Matheſis enim nos imprimis a fallacia ſenſuum defendit, atque docet obiecta, quae ſenſibus percipiuntur, aliter revera eſſe comparata, aliter vero apparere: haecque ſcientia tutiſſima tradit praecepta, quae qui ſequuntur, ab illuſione ſenſuum immunes ſunt. Huiuſmodi ergo reſponſionibus, tantum abeſt, ut Metaphyſici ſuam doctrinam tueantur, ut eam potius magis ſuſpectam efficiant.

82. Verum ut ad propositum revertamur, etiamſi quis neget in mundo numerum infinitum revera exiſtere; tamen in ſpeculationibus mathematicis ſaepiſſime occurrunt quaestiones, ad quas, niſi numerus infinitus admittatur, reſponderi non poſſet. Sic, ſi quaeratur ſumma omnium numerorum, qui hanc ſeriem $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + \&c.$ conſtituunt; quia iſti numeri ſine fine progrediuntur, atque creſcunt, eorum omnium ſumma certe finita eſſe non poterit: quo ipſo efficitur, eam eſſe infinitam. Hinc, quae quantitas tanta eſt, ut omni quantitate finita ſit maior, ea non infinita eſſe nequit. Ad huiuſmodi quantitatem deſignandam Mathematici utuntur hoc ſigno ∞ , quo denotatur quantitas omni quantitate finita, ſeu assignabili, maior. Sic cum Parabola ita deſiniri queat, ut dicatur eſſe Ellipſis infinite longa, recte affirmare poterimus axem Parabolae eſſe Lineam rectam infinitam.

83. Haec autem infiniti doctrina magis illuſtrabitur, ſi quid ſit infinite parvum Mathematicorum expoſuerimus. Nullum autem eſt dubium, quin omnis quantitas eoſque diminui queat, quoad penitus evaneſcat, atque in nihilum abeat. Sed quantitas infinite parva nil aliud eſt niſi quantitas
eva-

evanescens, ideoque revera erit $= 0$. Consentit quoque ea infinite parvorum definitio, qua dicuntur omni quantitate assignabili minora: si enim quantitas tam fuerit parva, ut omni quantitate assignabili sit minor, ea certe non poterit non esse nulla; namque nisi esset $= 0$, quantitas assignari posset ipsi aequalis, quod est contra hypothesin. Quaerenti ergo, quid sit quantitas infinite parva in Mathesi, respondeamus eam esse revera $= 0$: neque ergo in hac idea tanta Mysteria latent, quanta vulgo putantur, & quae pluribus calculum infinite parvorum admodum suspectum reddiderunt. Interim tamen dubia, si quae supererunt, in sequentibus, ubi hunc calculum sumus tradituri, funditus tollentur.

84. Cum igitur ostenderimus, quantitatem infinite parvam revera esse cyphram, primum occurrendum est obiectioni, cur quantitates infinite parvas non perpetuo eodem caractere 0 designemus, sed peculiare notas ad eas designandas adhibeamus. Quia enim omnia nihila sunt inter se aequalia, superfluum videtur variis signis ea denotare. Verum quamquam duae quaevis cyphrae ita inter se sunt aequales, ut earum differentia sit nihil: tamen, cum duo sint modi comparisonis, alter arithmeticus, alter geometricus; quorum illo differentiam, hoc vero quotum ex quantitativis comparandis ortum spectamus; ratio quidem arithmetica inter binas quasque cyphras est aequalitatis, non vero ratio geometrica. Facillime hoc perspicietur ex hac proportionem geometrica $2 : 1 = 0 : 0$, in qua terminus quartus est $= 0$, uti tertius. Ex natura autem proportionis, cum terminus primus duplo sit maior quam secundus, necesse est, ut & tertius duplo maior sit quam quartus.

85. Haec autem etiam in vulgari Arithmetica sunt planissima: cuilibet enim notum est, cyphram per quemvis numerum multiplicatam dare cyphram, esseque $n \cdot 0 = 0$, sicque fore $n : 1 = 0 : 0$. Unde patet fieri posse, ut duae cyphrae quamcumque inter se rationem geometricam teneant, etiam si,

etiamsi, rem arithmetice spectando, earum ratio semper sit aequalitatis. Cum igitur inter cyphas ratio quaecumque intercedere possit, ad hanc diversitatem indicandam consulto varii characteres usurpantur; praesertim tum, cum ratio geometrica, quam cyphae variae inter se tenent, est investiganda. In calculo autem infinite parvorum nil aliud agitur, nisi ut ratio geometrica inter varia infinite parva indagetur, quod negotium propterea, nisi diversis signis ad ea indicanda uteremur, in maximam confusionem illaberetur, neque ullo modo expediri posset.

86. Si ergo, prouti in Analyfi infinitorum modus signandi est receptus, denotet dx quantitatem infinite parvam, erit utique tam $dx = 0$, quam $adx = 0$, denotante a quantitatem quamcumque finitam. Hoc tamen non obstante erit ratio geometrica $adx : dx$ finita, nempe ut $a : 1$; & hanc ob rem haec duo infinite parva dx & adx , etiamsi utrumque sit $= 0$, inter se confundi non possunt, si quidem eorum ratio investigetur. Simili modo, si diversa occurrunt infinite parva dx & dy , etiamsi utrumque sit $= 0$, tamen eorum ratio non constat. Atque in investigatione rationis inter duo quaeque huiusmodi infinite parva omnis vis calculi differentialis versatur. Usus autem huius comparisonis, etiamsi primo intuitu admodum exiguus videatur, tamen amplissimus deprehenditur, atque adhuc indies magis elucet.

87. Cum igitur infinite parvum sit revera nihil, patet quantitatem finitam neque augeri neque diminui, si ad eam infinite parvum vel addamus vel ab ea subtrahamus. Sit a quantitas finita atque dx infinite parva, erit tam $a + dx$, quam $a - dx$, & generaliter $a \pm ndx = a$. Sive enim relationem inter $a \pm ndx$ & a arithmetice intueamur sive geometricae, utroque casu ratio aequalitatis deprehendetur. Arithmetica quidem ratio aequalitatis manifesta est; cum enim sit $ndx = 0$, erit $a \pm ndx - a = 0$: geometrica

ve-

vero ratio aequalitatis inde patet, quod sit $\frac{a \pm n dx}{a} = 1$.

Hinc sequitur canon ille maxime receptus, quod *infinite parva prae finitis evanescant*, atque adeo horum respectu *reijici queant*. Quare illa obiectio, qua Analysis infinitorum rigorem geometricum negligere arguitur, sponte cadit, cum nil aliud reiiciatur, nisi quod revera sit nihil. Ac propterea iure affirmare licet, in hac sublimiori scientia rigorem geometricum summum, qui in Veterum libris deprehenditur, aequè diligenter observari.

88. Quoniam quantitas infinite parva dx revera est $= 0$, eius quoque quadratum dx^2 , cubus dx^3 , & quaevis alia potestas affirmativum habens exponentem erit $= 0$, ideoque aequè prae quantitatibus finitis evanescant. At vero etiam quantitas infinite parva dx^2 prae ipsa dx evanescit; erit enim $dx \pm dx^2$ ad dx in ratione aequalitatis, sive comparatio arithmetice sive geometricè instituat. De priori quidem dubium est nullum, at geometricè comparando erit

$$dx \pm dx^2 : dx = \frac{dx \pm dx^2}{dx} = 1 \pm dx = 1.$$

Pari modo erit $dx \pm dx^3 = dx$, & generaliter $dx \pm dx^{n+1} = dx$, dummodo sit n numerus nihilo maior: erit enim ratio geometrica $dx \pm dx^{n+1} : dx = 1 \pm dx^n$; ideoque, ob $dx^n = 0$, ratio aequalitatis. Si igitur uti in potestatibus fit, vocetur dx infinite parvum primi ordinis, dx^2 secundi ordinis, dx^3 tertii ordinis & ita porro, manifestum est prae infinite parvis primi ordinis, evanescere infinite parva altiorum ordinum.

89. Simili modo ostendetur infinite parva tertii ac superiorum ordinum evanescere prae infinite parvis ordinis secundi; atque in genere infinite parva cuiusque ordinis superioris evanescere prae infinite parvis ordinis inferioris. Ita si m fuerit numerus minor quam n , erit $adx^m + bdx^n = adx^m$,
I quia

quia dx^n evanescit prae dx^m , uti ostendimus. Hocque etiam in exponentibus fractis habet locum; ita dx evanescet prae $\sqrt[n]{dx}$ seu $dx^{\frac{1}{n}}$, eritque $a\sqrt[n]{dx} + bdx = a\sqrt[n]{dx}$. Quodsi autem exponents ipsius dx sit $= 0$, erit $dx^0 = 1$, quamvis sit $dx = 0$; hinc potestas dx^n , cum fiat $= 1$, si sit $n = 0$, ex finita statim fit quantitas infinite parva, atque exponents n nihilo fit maior. Hinc ergo infiniti ordines infinite parvorum existunt, quae etsi omnia sint $= 0$, tamen inter se probe distinguere debent, si ad earum relationem mutuam, quae per rationem geometricam explicatur, attendamus.

90. Stabilita notione infinite parvorum facilius indolem infinitorum seu infinite magnorum exponere poterimus.

Notum est valorem fractionis $\frac{1}{z}$ eo maiorem evadere, quo

magis diminuatur denominator z ; quare si z fiat quantitas omni assignabili quantitate minor, seu infinite parva, necesse

est ut valor fractionis $\frac{1}{z}$ fiat omni assignabili quantitate ma-

ior, ideoque infinitus. Quamobrem si unitas seu quaevis alia quantitas finita dividatur per infinite parvum seu 0 , quotus erit infinite magnus, ideoque quantitas infinita. Cum igitur hoc signum ∞ denotet quantitatem infinite magnam, ista

habebitur aequatio $\frac{a}{dx} = \infty$; cuius veritas quoque hinc pa-

tet, quod sit invertendo $\frac{a}{\infty} = dx = 0$. Namque quo maior

statuitur fractionis $\frac{a}{z}$ denominator z , eo minor fit fractio-

nis valor, atque si z fiat quantitas infinite magna seu

$z = \infty$, necesse est, ut fractionis valor $\frac{a}{\infty}$ fiat infinite parvus

91. Qui utrumvis horum ratiociniorum negaverit eura

in

in maxima incommoda prolabi, atque adeo certissima Analy-
feos fundamenta evertere neceffe est. Qui enim statuit valo-
rem fractionis $\frac{a}{0}$ esse finitum uti b , utrinque per denomina-
torem multiplicando prodiret $a = 0 \cdot b$, atque ideo quantitas
finita b per nihil 0 multiplicata praeberet quantitatem fini-
tam a , quod esset absurdum. Multo minus valor ille b fra-
ctionis $\frac{a}{0}$ poterit esse $= 0$: nam 0 per 0 multiplicata quan-
titem a producere nullo modo poterit. In idem absurdum
incidit, qui negat esse $\frac{a}{\infty} = 0$, ei enim dicendum erit esse

$\frac{a}{\infty} =$ quantitati finitae b : quare cum ex aequatione $\frac{a}{\infty} = b$

legitime sequatur haec $\infty = \frac{a}{b}$, foret valor fractionis $\frac{a}{b}$, cu-

ius numerator ac denominator sunt quantitates finitae, infini-
te magnus, quod perinde foret absurdum. Neque vero etiam

valores fractionum $\frac{a}{0}$ & $\frac{a}{\infty}$ imaginarij statui possunt; pro-

pterea quod valor fractionis, cuius numerator est finitus de-
nominator vero imaginarius, neque infinite magnus neque
infinite parvus esse potest.

92. Quantitas ergo infinite magna, ad quam nos haec
consideratio perduxit, & quae sola in Analyfi infinitorum
locum habet, commodissime definitur dicendo, quantitatem
infinite magnam esse quotum, qui ex divisione quantitatis
finitae per infinite parvam oritur. Vicissim ergo erit quanti-
tas infinite parva quotus, qui oritur ex divisione quantitatis
finitae per infinite magnam. Quare, cum eiusmodi proportio
geometrica subsistat, ut sit quantitas infinite parva ad fini-
tam, ita finita ad infinite magnam; uti quantitas infinita in-
finites maior est quam finita, ita quantitas finita infinites

maior erit quam infinite parva. Huiusmodi igitur locutiones, quibus plures offenduntur, non sunt improbandae, cum certissimis innitantur principiis. Deinde etiam ex aequatione

$\frac{a}{0} = \infty$ sequitur fieri posse, ut nihil per quantitatem infinite magnam multiplicatum producat quantitatem finitam, quod alienum videri posset, nisi planissime per legitimam consequentiam esset deductum.

93. Quoniam inter infinite parva, si secundum rationem geometricam inter se comparantur, maximum deprehenditur discrimen, ita quoque inter quantitates infinite magnas multo maior differentia intercedit, cum non solum geometricae sed etiam arithmetice comparatae discrepent. Ponatur quantitas illa infinita, quae ex divisione quantitatis finitae a per infinitae parvam dx oritur, $= A$, ita ut sit $\frac{a}{dx} = A$: erit

utique $\frac{2a}{dx} = 2A$ & $\frac{na}{dx} = nA$; cum igitur & nA sit quantitas infinita, sequitur inter quantitates infinite magnas rationem quamcunque locum habere posse. Hincque, si quantitas infinita per numerum finitum sive multiplicetur, sive dividatur, prodibit quantitas infinita. Neque ergo de quantitatibus infinitis negari potest, eas ulterius augeri posse. Facile autem perspicitur, si ratio geometrica, quam duae quantitates infinitae inter se tenent, non fuerit aequalitatis, multo minus earum rationem arithmetica aequalitatis esse posse, cum potius earum differentia semper sit infinite magna.

94. Quantumvis autem nonnullis idea infiniti, qua in Mathesi utimur, suspecta videatur, qui hanc ob causam Analysis infinitorum profligandam arbitrantur; tamen hac idea ne in partibus quidem Matheseos trivialibus carere possumus. In Arithmetica enim, ubi doctrina logarithmorum tradi solet, logarithmus cyphrae & negativus & infinite magnus

gnus statuitur, neque quisquam est tam mente captus, ut hunc logarithmum vel finitum vel adeo nihilo aequalem dicere audeat. In Geometria autem & Trigonometria hoc clarius apparet; quis enim unquam negabit tangentem secantemve anguli recti non esse infinite magnam? & cum rectangulum ex tangente in cotangentem fit radii quadrato aequale, cotangens autem anguli recti sit $=0$; in Geometria adeo concedi debet, productum ex nihilo & infinito esse posse finitum.

95. Cum sit $\frac{a}{dx}$ quantitas infinita A , patet hanc quantitatem $\frac{A}{dx}$ fore quantitatem infinites maiorem, quam A : est enim $\frac{a}{dx} : \frac{A}{dx} = a : A$, hoc est ut numerus finitus ad infinite magnum. Dantur ergo inter quantitates infinite magnas eiusmodi relationes, ut aliae aliis infinites maiores esse queant. Sic $\frac{a}{dx^2}$ erit quantitas infinita infinites maior quam $\frac{a}{dx}$; posito enim $\frac{a}{dx} = A$ erit $\frac{a}{dx^2} = \frac{A}{dx}$. Simili modo erit $\frac{a}{dx^3}$ quantitas infinita infinites maior quam $\frac{a}{dx^2}$, ideoque infinites infinites maior quam $\frac{a}{dx}$. Dantur ergo infiniti gradus infinitorum, quorum quisque infinites maior est quam praecedentes: atque adeo si numerus m vel tantillum maior sit quam n erit $\frac{a}{dx^m}$ quantitas infinita infinites maior quam quantitas infinita $\frac{a}{dx^n}$.

96. Quemadmodum in quantitibus infinite parvis dantur rationes geometricae inaequales, cum tamen rationes arithmeticae omnes sint aequales: ita in quantitibus infinite magnis dantur rationes geometricae aequales, cum tamen arithmeticae sint quantumvis inaequales. Si enim a & b denotent quantitates finitas, hae duae quantitates infinitae

$$\frac{a}{dx} + b \text{ \& } \frac{a}{dx}$$

rationem geometricam habent aequalitatis;

$$\text{erit enim quotus ex earum divisione ortus} = 1 + \frac{bdx}{a} = 1$$

ob $dx=0$: interim tamen, si arithmetice comparentur, ob differentiam $= b$, ratio erit inaequalitatis. Simili modo

$$\frac{a}{dx^2} + \frac{a}{dx} \text{ ad } \frac{a}{dx^2}$$

rationem geometricam habet aequalitatis,

exponens enim rationis est $= 1 + dx = 1$; verum tamen

differentia est $\frac{a}{dx}$ ideoque infinita. Hinc si ad rationem geo-

metricam spectemus, infinite magna inferiorum graduum prae infinite magnis superiorum graduum evanescunt.

97. His de gradibus infinitorum praemonitis, mox apparebit fieri posse, ut productum ex quantitate infinite magna in infinite parvam non solum quantitatem finitam producat, quod supra evenisse vidimus; sed etiam huiusmodi productum esse poterit sive infinite magnum sive infinite par-

vum. Sic quantitas infinita $\frac{a}{dx}$, si per infinite parvam dx

multiplicetur, dat productum finitum $= a$; sin autem $\frac{a}{dx}$

multiplicetur per infinite parvum dx^2 , vel dx^3 , vel aliud superioris ordinis, productum erit vel adx , vel adx^2 , vel adx^3 &c. ideoque infinite parvum. Eodem modo intellige-

tur, si quantitas infinita $\frac{a}{dx^2}$ multiplicetur per infinite par-

vam dx , productum fore infinite magnum : atque generatim si $\frac{a}{dx^n}$ multiplicetur per $b dx^m$, productum $ab dx^{m-n}$ erit infinite parvum si m superat n ; finitum si m aequat n ; & infinite magnum si m superatur ab n .

98. Quantitates tam infinite parvae, quam infinite magnae in seriebus numerorum saepissime occurrunt, in quibus cum sint numeris finitis permixtae, ex iis luculenter patebit, quemadmodum secundum leges continuitatis a quantitatibus finitis ad infinite magnas atque infinite parvas transitio fiat. Consideremus primum seriem numerorum naturalium, quae simul retro continuata erit

$$\&c. -4 -3 -2 -1 +0 +1 +2 +3 +4 + \&c.$$

Numeri ergo continuo decrescendo praebent tandem 0 seu infinite parvum, unde ulterius continuati negativi evadunt. Quamobrem hinc intelligitur a numeris finitis affirmativis decrescantibus transiri per 0 ad negativos crescentes. Sin autem eorum numerorum quadrata spectentur, quia omnia sunt affirmativa

$\&c. +16 +9 +4 +1 +0 +1 +4 +9 +16 + \&c.$ erit 0 quoque transitus numerorum affirmativorum decrescantium ad affirmativos crescentes ; atque si signa mutantur, erit quoque 0 transitus numerorum negativorum decrescantium ad negativos crescentes.

99. Si series consideretur, cuius terminus generalis est \sqrt{x} , quae etiam retro continuata erit huiusmodi

$$\&c. +\sqrt{-3} +\sqrt{-2} +\sqrt{-1} +0 +\sqrt{1} +\sqrt{2} +\sqrt{3} +\sqrt{4} + \&c.$$

ex qua patet 0, quoque tanquam limitem considerari posse, per quem a quantitatibus realibus ad imaginaria transeat. Si isti termini tanquam applicatae curvarum considerentur, perspicitur, si eae fuerint affirmativae atque eousque decreverint ut tandem evanescant, tum eas ulterius continuatas vel fieri negativas, vel iterum affirmativas vel adeo imaginarias.

Idem

Idem eveniet, si applicatae primum fuerint negativae; tum enim aequae postquam evanuerint, si ulterius continuentur, vel affirmativae fient, vel negativae vel imaginariae; quorum phaenomenorum plurima exempla praebet doctrina de lineis curvis in libro praecedente tractata.

100. Eodem modo in seriebus occurrunt saepe termini infiniti: sic in serie harmonica, cuius terminus generalis est

$$\frac{1}{x}, \text{ indici } x=0 \text{ respondebit terminus infinite magnus } \frac{1}{0};$$

totaque series ita se habebit:

$$\&c. -\frac{1}{4} - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} - \frac{1}{1} + \frac{1}{0} + \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \&c.$$

A dextra ergo ad sinistram progrediendo termini crescunt;

ita ut $\frac{1}{0}$ iam sit infinite magnus, quem cum transierint, fient

negativi decrecentes. Hinc quantitas infinite magna spectari potest tanquam limes, per quem numeri affirmativi progressi fiunt negativi, & vicissim: unde pluribus visum est, numeros negativos considerari posse, tanquam infinito maiores, propterea quod in hac serie termini continuo crescentes, postquam infinitum attigerint, abeant in negativos. At vero si

ad seriem, cuius terminus generalis est $\frac{1}{\sqrt{x}}$, attendamus, post transitum per infinitum rursus prodeunt termini affirmativi.

$$\&c. \frac{1}{9} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{0} + \frac{1}{1} + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \&c.$$

quos tamen nemo infinito maiores dixerit.

101. Saepenumero quoque in seriebus terminus infinitus constituit limitem, terminos reales ab imaginariis segregantem, uti fit in serie hac, cuius terminus generalis est $\frac{1}{\sqrt{x}}$

$$\&c. + \frac{1}{\sqrt{-3}} + \frac{1}{\sqrt{-2}} + \frac{1}{\sqrt{-1}} + \frac{1}{0} + \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \&c.$$

ne-

neque tamen hinc sequitur, imaginaria esse infinito maiora : quoniam ex serie ante allata

$$\&c. +\sqrt{-3}+\sqrt{-2}+\sqrt{-1}+0+\sqrt{1}+\sqrt{2}+\sqrt{3}+ \&c.$$

aeque sequeretur, imaginaria esse nihilo minora. Deinde vero etiam a terminis realibus transitus ad imaginarios exhiberi potest, quorum limes neque sit 0 neque ∞ , uti fit si terminus generalis fuerit $1+\sqrt{x}$. His autem casibus, cum ob irrationalitatem quilibet terminus geminum habeat valorem, in limite inter realia & imaginaria semper bini illi valores fiunt inter se aequales. At quoties termini, qui ante erant affirmativi, abeunt in negativos, transitus semper fit per litem vel infinite parvum, vel infinite magnum, quae omnia ex lege continuitatis, quam in lineis curvis deprehendimus, clarius elucet.

102. Ex summatione quoque serierum in infinitum excurrentium plura hic afferri possunt, quae cum ad hanc infiniti doctrinam magis illustrandam, tum vero ad plura dubia, quae in hoc negotio suboriri solent, delenda inserviunt. Ac primo quidem, si series constet ex terminis aequalibus, ut

$$1+1+1+1+1+1+1+ \&c.$$

aeque sine fine, hoc est in infinitum continetur, nullum certe est dubium, quin omnium horum terminorum summa maior sit omni numero assignabili; eaque propterea infinita sit necesse est. Hoc quoque confirmat eius origo, dum oritur ex evolutione fractionis

$$\frac{1}{1-x} = 1+x+x^2+x^3+ \&c.$$

ponendo $x=1$; erit ergo

$$\frac{1}{1-1} = 1+1+1+1+ \&c.$$

$$\text{ideoque summa} = \frac{1}{1-1} = \frac{1}{0} = \text{infinito.}$$

K

103.

103. Quamvis autem hic nullum dubium nasci queat, cum idem numerus finitus infinities sumtus in infinitum abire debeat; tamen ipsa origo ex serie generali

$$\frac{1}{1-n} = 1 + n + n^2 + n^3 + n^4 + n^5 + \&c.$$

gravissima incommoda afferre videtur: si enim pro n successive ponantur numeri 1, 2, 3, &c. sequentes series cum suis summis prodibunt.

$$A \dots 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + \&c. = \frac{1}{1-1} = \text{infinito}$$

$$B \dots 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + \&c. = \frac{1}{1-2} = -1$$

$$C \dots 1 + 3 + 9 + 27 + 81 + \&c. = \frac{1}{1-3} = -\frac{1}{2}$$

$$D \dots 1 + 4 + 16 + 64 + 256 + \&c. = \frac{1}{1-4} = -\frac{1}{3}$$

&c.

Cum igitur series B singulos terminos praeter primum habeat maiores, quam series A, summa seriei B necessario multo maior esse deberet, quam summa seriei A: interint tamen iste calculus ostendit seriei A summam infinitam, seriei B vero summam negativam, hoc est nihilo minorem, quod concipi non potest. Multo minus cum solitis ideis conciliari potest, quemadmodum huius & sequentium serie-rum C, D, &c. summae fiant negativae, cum tamen omnes termini sint affirmativi.

104. Ob hanc rationem opinio supra allata multis probabilis videri solet, quantitates scilicet negativas quandoque considerari posse tanquam infinito maiores seu plus quam infinitas; & cum etiam numeros ultra nihil diminuendo perveniatur ad negativos, discrimen statuunt inter numeros negativos huiusmodi -1 , -2 , -3 , &c. & huiusmodi

†

$\frac{+1}{-1}, \frac{+2}{-1}, \frac{+3}{-1}, \&c.$ illos nihilo minores, hos vero infinito maiores dicendo. Verumtamen hoc pacto difficultatem non tollunt, quam suggerit haec series

$$1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + 5x^4 + \&c. = \frac{1}{(1-x)^2}$$

unde oriuntur sequentes series:

$$A \dots 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + \&c. = \frac{1}{(1-1)^2} = \infty = \text{infinito}$$

$$B \dots 1 + 4 + 12 + 32 + 80 + \&c. = \frac{1}{(1-2)^2} = 1$$

ubi cum singuli termini seriei B sint maiores, quam singuli termini seriei A, primis solis exceptis, quemadmodum summa seriei A sit infinita, seriei B vero summa aequalis 1, hoc est soli termino primo, ex illo principio explicari omnino nequit.

105. Quoniam autem si vellemus negare esse $\frac{+1}{-1}$ & $\frac{+a}{-b} = \frac{-a}{+b}$, firmissima Analyseos fundamenta colla-

berentur, illa ante commemorata explicatio prorsus admitti non potest. Quin potius negare debemus, illas, quas formulae generales suppeditaverant, summas esse veras. Cum enim hae series ex continua divisione oriantur, dum residuum continuo ulterius dividitur: residuum autem perpetuo fiat maius, quo longius progrediamur, id nunquam negligere poterimus; atque minime residuum ultimum, hoc est quod in divisione infinitesima remanet, omitti potest, quippe quod sit infinite magnum. Quia autem hoc in superioribus seriebus non observatur, dum nullius residui ratio habetur, mirum non est, eas summationes ad absurdum deducere. Haecque responsio, uti est ex ipsa serierum genesi petita, ita quoque est verissima, atque omnem dubitationem tollit.

106. Quo hoc clarius appareat, contemplemur evolutionem fractionis $\frac{1}{1-x}$, uti in terminis primum finitis tantum absolvitur. Erit ergo

$$\frac{1}{1-x} = 1 + \frac{x}{1-x}$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + \frac{x^2}{1-x}$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \frac{x^3}{1-x}$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \frac{x^4}{1-x}$$

&c.

qui ergo dicere vellet huius seriei finitae $1 + x + x^2 + x^3$ summam esse $\frac{1}{1-x}$, is erraret a vero quantitate $\frac{x^4}{1-x}$:

& qui summam huius seriei

$$1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^{1000}$$

statuere vellet $= \frac{1}{1-x}$, is erraret quantitate $\frac{x^{1001}}{1-x}$

qui error si x sit numerus unitate maior, foret maximus.

107. Ex his perspicuum est cum, qui eiusdem seriei in infinitum continuatae seu huius:

$$1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^{\infty}$$

summam statuere velit $= \frac{1}{1-x}$, a veritate esse aberraturum

quantitate $\frac{x^{\infty+1}}{1-x}$; quae si sit $x > 1$ utique erit infinite magna. Simul vero hinc ratio patet, cur seriei in infinitum continuatae

$$1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots \&c.$$

summa revera fit $= \frac{1}{1-x}$, si fuerit x fractio unitate minor, tum enim error $\frac{x^{\infty} + 1}{1-x}$ fit infinite parvus, ideoque nullus; cuius propterea ratio tuto potest negligi. Sic posito $x = \frac{1}{2}$, erit revera

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \&c. = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2,$$

similiterque reliquarum serierum, si x sit fractio unitate minor, summa vera hoc modo indicatur.

108. Haec eadem responsio valet de summis serierum divergentium, in quibus signa $+$ & $-$ alternantur, quae vulgo ex eadem formula exhiberi solent, ponendo pro x numeros negativos. Cum enim sit:

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + \&c.$$

nisi ultimi residui ratio habeatur, foret:

$$\begin{array}{lll} \text{A} & . & . & 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \&c. = \frac{1}{2} \\ \text{B} & . & . & 1 - 2 + 4 - 8 + 16 - 32 + \&c. = \frac{1}{3} \\ \text{C} & . & . & 1 - 3 + 9 - 27 + 81 - 243 + \&c. = \frac{1}{4} \end{array}$$

Patet autem seriei secundae B summam ideo non posse esse $= \frac{1}{3}$, cum quo plures termini actu summentur, aggregata eo magis ab $\frac{1}{3}$ recedant. Perpetuo autem cuiusque seriei summa debet esse limes, ad quem eo propius perveniatur, quo plures termini actu addantur.

109. Ex his quidam concluderunt huiusmodi series, quae vocantur divergentes, prorsus nullas habere summas fixas; propterea quod colligendis actu terminis ad nullum litem fiat appropinquatio, qui pro summa seriei in infinitum continuatae haberi posset: quae sententia, cum istae summae iam ob neglecta ultima residua erroneae sint ostensae,

fæ, veritati maxime est consentanea. Interim tamen contra eam summo iure obiici potest, has memoratas summas, quantumvis a veritate abhorrere videantur, tamen nunquam in errores inducere; quin potius iis admissis plurima praeclara esse eruta, quibus si istas summationes prorsus reiicere vellemus, carendum esset. Neque vero hae summae, si essent falsae, perpetuo ad veritatem nos ducere possent; quin potius, cum non parum sed infinite a veritate discrepent, nos quoque in infinitum a vero seducere deberent. Quod tamen cum non eveniat, difficillimus nobis restat nodus solvendus.

110. Dico igitur in voce *summae* latere totam difficultatem; si enim *summa* seriei, ut vulgo usus fert, sumatur pro aggregato omnium eius terminorum actu collectorum, tum dubium est nullum, quin earum tantum serierum in infinitum excurrentium summae exhiberi queant, quae sint convergentes, atque continuo propius ad certum statumque valorem deducant, quo plures termini actu colligantur. Series autem divergentes, quarum termini non decrescunt, sive signa $+$ & $-$ alternentur sive secus, prorsus nullas habebunt summas fixas; si quidem vox summae hoc sensu pro aggregato omnium terminorum accipiat. At vero in iis casibus, quorum meminimus, quibus ex istiusmodi summis erroneis veritas tamen elicitur; id non fit, quatenus expres-

sio finita, verbi gratia $\frac{1}{1-x}$, est summa seriei $1 + x + x^2 + x^3 + \&c.$ sed quatenus ea expressio evoluta hanc seriem praebet; sicque in hoc negotio nomen summae prorsus omit-
ti posset.

111. Haec igitur incommoda, hasque apparentes contradictiones penitus evitabimus, si voci *summae* aliam notionem, atque vulgo fieri solet, tribuamus. Dicamus ergo seriei cuiusque infinitae *summam* esse expressionem finitam, ex cuius evolutione illa series nascatur. Hocque sensu seriei
in-

infinitae $1 + n + n^2 + n^3 + \&c.$ summa revera erit $= \frac{1}{1-n}$,

quia illa series ex huius fractionis evolutione oritur: quicunque numerus loco x substituitur. Hoc pacto, si series fuerit convergens, ista nova vocis summae definitio, cum consueta congruet; & quia divergentes nullas habent summas proprie sic dictas, hinc nullum incommodum ex nova hac appellatione orietur. Denique ope huius definitionis utilitatem serierum divergentium tueri, atque ab omnibus iniuriis vindicare poterimus.



CA.

CAPUT IV.

DE DIFFERENTIALIUM CUIUSQUE ORDINIS NATURA

112.

In capite primo vidimus, si quantitas variabilis x accipiat augmentum $=\omega$, tum cuiusvis functionis ipsius x augmentum inde oriundum tali forma exprimi $P\omega + Q\omega^2 + R\omega^3 + \&c.$ sive haec expressio sit finita sive in infinitum excurrat. Functio ergo y , si in ea loco x scribatur $x + \omega$, valorem sequentem induet:

$$y' = y + P\omega + Q\omega^2 + R\omega^3 + S\omega^4 + \&c.$$

a quo, si valor prior y subtrahatur, remanebit differentia functionis y , quae ita exprimetur

$$\Delta y = P\omega + Q\omega^2 + R\omega^3 + S\omega^4 + \&c.$$

atque cum valor ipsius x sequens sit $x' = x + \omega$, erit differentia ipsius x , nempe $\Delta x = \omega$. Litterae autem $P, Q, R, \&c.$ denotant functiones ipsius x pendentes ab y , quas capite primo invenire docuimus.

113. Hinc ergo quocunque augmento ω augeatur quantitas variabilis x , simul definiri poterit augmentum, quod cuique ipsius x functioni y accedit; dummodo pro quovis ipsius y valore functiones $P, Q, R, S, \&c.$ definire valeamus. In hoc autem capite, atque in universa Analyfi infinitorum augmentum illud ω , quo quantitatem variabilem x crescere sumimus, statuemus infinite parvum, atque adeo evanescens, seu $= 0$. Unde manifestum est, incrementum seu differentiam functionis y quoque fore infinite parvam. Cum autem in hac hypothese singuli termini expressionis

$$P\omega + Q\omega^2 + R\omega^3 + S\omega^4 + \&c.$$

prae antecedentibus evanescant, (88. & seqq.), solus primus
 $P\omega$

$P\omega$ remanebit, eritque propterea hoc casu, quo ω est infinite parvum, differentia ipsius y nempe $\Delta y = P\omega$.

114. Erit ergo. Analysis infinitorum, quam hic tractare coepimus, nil aliud, nisi casus particularis methodi differentiarum. in capite primo expositae, qui oritur, dum differentiae, quae ante finitae erant assumptae, statuuntur infinite parvae. Quo igitur iste casus, quo universa Analysis infinitorum continetur, a methodo differentiarum distinguatur, cum peculiaribus nominibus, tum etiam signis ad differentias istas infinite parvas denotandas uti conveniet. Differentias igitur infinite parvas hic cum LEIBNIZIO *differentialia* vocabimus; atque cum differentiarum in primo capite diversos ordines constituissimus, ex iis. nunc facile quoque intelligitur, quid differentialia prima, secunda, tertia, &c. cuiusque functionis significant. Loco characteris autem Δ , quo ante differentias indicaveramus, nunc utemur characterem d ; ita ut dy significet differentiale primum ipsius y ; d^2y differentiale secundum; d^3y tertium & ita porro.

115. Quoniam differentias infinite parvas, quas hic tractamus *differentialia* vocamus, hinc totus calculus, quo differentialia investigantur, atque ad usum accomodantur, appellari solet *Calculus differentialis*. Mathematici Angli, inter quos primum NEWTONUS aequè ac LEIBNIZIUS inter Germanos hanc novam Analyseos partem excollere coepit, aliis tam nominibus quam signis utuntur. Differentias enim infinite parvas, quas nos differentialia vocamus potissimum *fluxiones* nominare solent, interdum quoque *incrementa*: quas voces uti latino sermoni magis conveniunt, ita quoque res, quas denotant, satis commode exprimunt. Quantitas enim variabilis crescendo continuo alios atque alios valores recipiens tanquam fluens considerari potest, hincque vox fluxionis, quae primum a NEWTONO ad celeritatem crescendi adhibebatur, ad incrementum infinite parvum, quod quantitas quasi fluendo accipit, designandum analogice est translata.

L

116.

116. Quamvis autem circa vocum usum atque definitionem cum Anglis disceptare absonum foret, nosque coram iudice puritatem latinae linguae atque expressionum commoditatem spectante facile superaremur; tamen nullum est dubium, quin Anglis ratione signorum palmam praeripiamus. Differentialia enim, quae ipsi fluxiones appellant, punctis, quae litteris superscribunt, denotare solent, ita ut y iis significet fluxio-

nem primam ipsius y ; \dot{y} fluxionem secundam; \ddot{y} fluxionem tertiam, atque ita porro. Qui notandi modus, uti ab arbitrio pendens, etsi improbari nequit, si punctorum numerus fuerit parvus, ut numerando facile percipi queat, tamen si plura puncta inscribi debeant, maximam confusionem plurimaque incommoda affert. Differentiale enim seu fluxio deci-

ma perquam incommode hoc modo y repraesentatur, cum nostro signandi modo $d^{10}y$ facillime comprehendatur. Oriuntur autem casus, quibus multo adhuc superiores differentialium ordines atque adeo indefiniti exprimi debent, ad quos Anglorum modus prorsus fit ineptus.

117. Nostreis igitur tam nominibus quam signis utemur, quippe quorum illa in nostris regionibus iam sunt usu recepta atque plerisque familiaria, haec vero commodiora. Interim tamen non abs re erat, Anglorum denominationes & signationes hic commemorare, ut qui eorum libros evolvunt, eos quoque intelligere queant. Neque enim Angli suum mori tam pertinaciter adhaerent, ut quae nostro more sunt scripta, prorsus repudiant, nec legere dignentur. Nos quidem ipsorum opera maxima cum aviditate perlegimus, ex iisque summum fructum percipimus; saepenumero vero etiam animadvertimus, ipsos nostratum scripta non sine utilitate legisse. Quamobrem etsi idem ubique atque aequabilis modus cogitata sua exprimendi maxime esset optandus, tamen non admodum est difficile, ut utrique assueamus, quantum quidem

dem intelligentia librorum alieno more scriptorum postulat.

118. Cum igitur littera ω nobis hactenus denotaverit differentiam seu incrementum, quo quantitas variabilis x crescere concipitur, nunc autem ω statuatur infinite parvum, erit ω differentiale ipsius x ; & hancobrem recepto signandi modo erit $\omega = dx$; atque dx proinde erit differentia infinite parva, qua ipsa x crescere concipitur. Simili modo differentiale ipsius y ita exprimeretur dy ; atque si y fuerit functio quaecumque ipsius x , differentiale dy denotabit incrementum, quod functio y capit, dum x abit in $x + dx$. Quare si in functione y ubique loco x substituatur $x + dx$, & quantitas resultans ponatur $= y'$, erit $dy = y' - y$, hocque modo differentiale cuiusque functionis reperietur: quod quidem intelligendum est de differentiali primo seu primi ordinis; de reliquis enim postea videbimus.

119. Probe ergo tenendum est litteram d hic non quantitatem denotare, sed tantum loco signi adhiberi, ad vocem *differentialis* exprimendam, eodem modo, quo in doctrina logarithmorum littera l pro signo logarithmi, & in Algebra caractere $\sqrt{}$ pro signo radice uti consuevimus. Hinc dy non significat, uti vulgo in Analyfi usu est receptum, productum ex quantitate d in quantitatem y , sed ita enunciari debet, ut dicatur differentiale ipsius y . Simili modo si scribatur d^2y , neque binarius exponentem, neque d^2 potestatem ipsius d significat, sed adhibetur tantum ad nomen *differentialis secundi* breviter & apte exprimendum. Cum igitur littera d in calculo differentiali non quantitatem, sed signum tantum exhibeat, ad confusionem vitandam in calculis, ubi plures quantitates constantes occurrunt, littera d ad earam designationem usurpari nequit; perinde atque evitare solemus litteram l tanquam quantitatem in calculum inducere, ubi simul logarithmi occurrunt. Optandum autem esset, ut litterae istae d & l per characteres aliquantulum alteratos exprimerentur, ne cum litteris Alphabeti, quibus quantitates de-

signari solent, confundantur: simili scilicet modo, quo loco litterae r , qua primum vox radice indicabatur, nunc character iste distortus $\sqrt{}$ in usum est receptus.

120. Quoniam igitur vidimus differentiale primum ipsius y , si y fuerit functio quaecunque ipsius x , habiturum esse huiusmodi formam $P\omega$; ob $\omega = dx$, erit $dy = Pdx$. Quaecunque scilicet fuerit y functio ipsius x , eius differentiale dy exprimitur certa quadam functione ipsius x , pro qua hic ponimus P , per differentiale ipsius x , nempe per dx multiplicata. Etiam si ergo differentialia ipsarum x & y revera sint infinite parva, ideoque nihilo aequalia; tamen inter se finitam habebunt rationem: erit scilicet $dy : dx = P : 1$. Inventa ergo functione ista P , innotescit ratio inter differentiale dx & differentiale dy . Cum igitur calculus differentialis in inventionem differentialium consistat, in eo non tam ipsa differentialia, quae sunt nihilo aequalia ac propterea nullo labore invenirentur, quam eorum ratio mutua geometrica investigatur.

121. Differentialia igitur multo facilius inveniuntur; quam differentiae finitae. Ad differentiam enim finitam Δy , qua functio y crescit, dum quantitas variabilis x incrementum ω accipit, non sufficit functionem P nosse, sed indagari insuper oportet functiones Q, R, S , &c. quae in differentiam finitam, quam posuimus

$$= P\omega + Q\omega^2 + R\omega^3 + \&c.$$

ingrediuntur; ad differentiale ipsius y autem inveniendum satis est, si noverimus solam functionem P . Quamobrem ex cognita differentia finita cuiusque functionis ipsius x , facillime eius differentiale definitur; verum contra ex differentiali eius functionis, nondum erui potest eius differentia finita. Interim tamen infra docebitur, quemadmodum ex differentialibus omnium ordinum simul cognitis differentia quaevis finita cuiusque functionis propositae inveniri queat. Ceterum ex his

322

manifestum est differentiale primum $dy = Pdn$, praebere terminum primum differentiae finitae, quippe qui est $= P\omega$.

122. Si igitur incrementum ω , quod quantitas variabilis n accipere concipitur, fuerit vehementer parvum, ita ut in expressione $P\omega + Q\omega^2 + R\omega^3 + \&c.$ termini $Q\omega^2$ & $R\omega^3$, multoque magis reliqui, fiant tam parvi, ut in computo, quo summus rigor non observatur, prae primo $P\omega$ negligantur; tum cognito differentiali Pdn , ex eo differentia finita vero proxime cognoscetur, quippe quae erit $= P\omega$: unde in pluribus occasionebus, quibus calculus ad praxin adhibetur, non parum fructus hauritur. Atque hinc nonnulli arbitrantur, differentialia tanquam incrementa vehementer parva considerari posse, eaque nihilo revera aequalia esse negant, atque tantum indefinite parva statuunt. Haecque idea aliis occasionem praebeuit Analysis infinitorum accusandi, quod non veras rerum quantitates eliciat, sed tantum vero proximas; quae obiectio semper aliquam vim retineret, nisi infinite parva prorsus nihilo aequalia statueremus.

123. Qui autem nolunt infinite parva plane in nihilum abire, si ut vim obiectionis destruere videantur, differentialia comparant minimis pulvisculis ratione totius terrae, cuius quantitatem nemo non veram tradidisse censeretur, qui unico pulvisculo a veritate aberraverit. Talem igitur rationem inter quantitatem finitam & infinite parvam esse volunt, qualis est inter totam terram minimumque pulvisculum: atque si cui hoc discrimen adhuc non satis magnum videatur, eam rationem millies magisque adaugent, ut parvitas amplius omnino percipi nequeat. Interim tamen agnoscere coguntur, summum rigorem geometricum aliquantulum infringi; quare quo huic obiectioni occurrant, ad eiusmodi exempla confugiunt, quorum tam per Geometriam quam per Analysis infinitorum solutiones inveniri possunt, ex earumque congruentia bonitatem posterioris methodi concludunt. Quanquam autem hoc argumentum negotium non conficit, cum saepenum-

ro per erroneas methodos verum elici queat; tamen quia hoc vitio non laborat, potius evincit, eas quantitates, quae in calculo sint neglectae, non solum non incomprehensibiliter parvas, sed plane nullas esse, uti nos assumimus. Ex quo rigori geometrico nullam omnino vim inferimus.

124. Progrediamur ad differentialium secundi ordinis naturam explicandam, quae oriuntur ex differentiis secundis in capite primo expositis, ponendo quantitatem ω infinite parvam $= d\pi$. Cum igitur si ponamus quantitatem variabilem π aequalibus incrementis crescere, ita ut si valor secundus π fuerit $= \pi + d\pi$, sequentes futuri sint $\pi'' = \pi + 2d\pi$; $\pi''' = \pi + 3d\pi$ &c. ob differentias primas constantes $= d\pi$, differentias secundae evanescent: erit ergo quoque differentiale secundum ipsius π nempe $dd\pi = 0$, atque ab hac rationem quoque differentialia ulteriora erunt $= 0$, scilicet $d^3\pi = 0$; $d^4\pi = 0$; $d^5\pi = 0$; &c. Obiici quidem potest, haec differentialia, cum sint infinite parva, per se esse $= 0$, neque hoc proprium esse eius quantitatis variabilis π , cuius incrementa aequalia concipiantur: at vero hanc evanescentiam ita interpretari oportet, ut differentialia $dd\pi$, $d^3\pi$ &c. non solum in se spectata sint nulla, sed etiam ratione potestatum ipsius $d\pi$, cum quibus alias comparari possent, evanescere.

125. Quae quo clarius intelligantur, recordandum est differentiam secundam cuiusque functionis ipsius π , quae sit y , huiusmodi forma exprimi $P\omega^2 + Q\omega^4 + R\omega^6 + \&c.$ Quodsi ergo ω sit infinite parvum, termini $Q\omega^4$, $R\omega^6$ &c. prae primo $P\omega^2$ evanescent, unde posito $\omega = d\pi$, differentiale secundum ipsius y erit $= P d\pi^2$, denotante $d\pi^2$ quadratum differentialis $d\pi$. Quare etsi differentiale secundum ipsius y , nempe ddy per se sit $= 0$, tamen cum sit $ddy = P d\pi^2$, ad $d\pi^2$ habebit rationem finitam uti P ad 1: sin autem sit $y = \pi$, tum sit $P = 0$, $Q = 0$, $R = 0$, &c. ideoque hoc casu differentiale secundum ipsius π etiam respectu $d\pi^2$ altiorumque ipsius $d\pi$ potestatum evanescit. Hocque modo intelligenda sunt
ea,

ea, quae ante diximus, esse scilicet $ddx = 0$, $d^3x = 0$, &c.

126. Cum differentia secunda, nil aliud sit, nisi differentia differentiae primae; differentiale quoque secundum seu uti saepe vocari solet, differentio-differentiale nil aliud erit praeter differentiale differentialis primi. Quia deinde quantitas constans nulla neque augmenta neque decrementa accipit, nullasque admittit differentias, quippe quae solis quantitibus variabilibus sunt propriae, dicimus eodem sensu quantitatum constantium differentialia omnia cuiusque ordinis esse $= 0$, hoc est praeter omnibus adeo potestatibus ipsius dx evanescere. Cum igitur differentiale ipsius dx hoc est ddx sit $= 0$; differentiale dx tanquam quantitas constans considerari potest, & quoties differentiale cuiuspiam quantitatis dicitur constans, toties ea quantitas intelligenda est continuo aequalia incrementa accipere. Sumimus hic autem x pro ea quantitate, cuius differentiale sit constans, hincque singularum eius functionum variabilitatem, cui earum differentialia sunt obnoxia, aestimabimus.

127. Ponamus differentiale primum ipsius y esse $= p dx$; atque ad eius differentiale secundum inveniendum, ipsius $p dx$ denuo differentiale quaeri debet. Cum autem dx sit constans, neque varietur etiam si loco x scribatur $x + dx$, tantum opus est, ut quantitatis finitae p differentiale quaeratur: sit igitur $dp = q dx$, quoniam vidimus omnium functionum ipsius x differentialia ad huiusmodi formam revocari; & cum sit, uti de differentiis finitis ostendimus, differentiale ipsius $xp = n q dx$, si n sit quantitas constans, ponatur dx loco x , eritque differentiale ipsius $p dx = q dx^2$. Hancobrem si sit $dy = p dx$ & $dp = q dx$, erit differentiale secundum $ddy = q dx^2$, sicque constat, quod iam ante inquamus, differentiale secundum ipsius y ad dx^2 habere rationem finitam.

128. In Capite primo iam notavimus differentias secundas atque sequentes constitui non posse, nisi valores successivi ipsius x certa quadam lege progredi assumantur, quae
lex

lex cum sit arbitraria, his valoribus progressionem arithmetica tanquam facillimam simulque aptissimam tribuimus. Ob eandem ergo rationem de differentialibus secundis nihil certi statui poterit, nisi differentialia prima, quibus quantitas variabilis x continuo crescere concipitur, secundum datam legem progrediantur; ponimus itaque differentialia prima ipsius x , nempe dx , dx^I , dx^{II} , &c. omnia inter se aequalia, unde fiunt differentialia secunda

$$ddx = dx^I - dx = 0; ddx^I = dx^{II} - dx^I = 0, \&c.$$

Quoniam ergo differentialia secunda & ulteriora ab ordine, quem differentialia quantitatis variabilis x inter se tenent, pendent, hicque ordo sit arbitrarius, quae conditio differentialia prima non afficit; hinc ingens discrimen inter differentialia prima ac sequentia ratione inventionis intercedit.

129. Quodsi autem successivi ipsius x valores x , x^I , x^{II} , x^{III} , x^{IV} , &c. non secundum arithmetica progressionem statuantur, sed alia quacumque lege progredi ponantur, tum eorum quoque differentialia prima dx , dx^I , dx^{II} , &c. non erunt inter se aequalia, neque propterea erit $ddx = 0$. Hancobrem differentialia secunda quarumvis functionum ipsius x aliam formam induent; si enim huiusmodi functionis y differentiale primum fuerit $= p dx$ ad eius differentiale secundum inveniendum non sufficit differentiale ipsius p per dx multiplicasse, sed insuper ratio differentialis ipsius dx , quod est ddx haberi debet. Quoniam enim differentiale secundum oritur, si $p dx$ a valore eius sequente, qui oritur dum $x + dx$ loco x & $dx + ddx$ loco dx ponitur, subtrahatur ponamus valorem ipsius p sequentem esse $= p + q dx$, eritque ipsius $p dx$ valor sequens

$$= (p + q dx)(dx + ddx) = p dx + p ddx + q dx^2 + q dx ddx;$$

a quo subtrahatur $p dx$, eritque differentiale secundum

$$ddy = p ddx + q dx^2 + q dx ddx = p ddx + q dx^2;$$

quia $q dx ddx$ prae $p ddx$ evanescit.

130. Quanquam autem ratio aequalitatis est simplicissima atque aptissima, quae continuo ipsius x incrementis tribuatur, tamen frequenter evenire solet, ut non eius quantitatis variabilis x , cuius y est functio, incrementa aequalia assumantur, sed alius cuiuspiam quantitatis, cuius ipsa x sit functio quaedam. Quin etiam saepe eiusmodi alius quantitatis differentialia prima statuuntur aequalia, cuius nequidem relatio ad x constet. Priori casu pendebunt differentialia secunda & sequentia ipsius x a ratione, quam x tenet ad illam quantitatem, quae aequabiliter crescere ponitur, ex eaque pari modo definiri debent, quo hic differentialia secunda ipsius y ex differentialibus ipsius x definire docuimus. Posteriori autem casu differentialia secunda & sequentia ipsius x tanquam incognita spectari, eorumque loco signa ddx , d^3x , d^4x , &c. usurpari debebunt.

131. Cum autem, quemadmodum his casibus differentiationes singulas absolvi oporteat, infra fusius simus ostensuri, hic pergamus quantitatem variabilem x tanquam uniformiter crescentem assumere, ita ut eius differentialia prima dx , dx^1 , dx^{11} , &c. inter se omnia aequalia, ac propterea differentialia secunda ac sequentia nihilo aequalia statuuntur, quae conditio ita enunciari solet ut differentiale ipsius x nempe dx constans assumi dicatur. Sit deinde y functio quaecumque ipsius x , quae cum per x & constantes definiatur, singula quoque eius differentialia prima, secunda, tertia, quarta, &c. quae his signis indicantur dy , ddy , d^3y , d^4y , &c. per x & dx exprimi poterunt. Scilicet si in y loco x scribatur $x+dx$, ab hocque valore prior subtrahatur, remanebit differentiale primum dy : in quo si porro loco x ponatur $x+dx$, prodibit dy^1 , eritque $ddy = dy^1 - dy$, simili modo ponendo $x+dx$ loco x , ex ddy nascetur ddy^1 , atque $ddy^1 - ddy$ dabit d^3y & ita porro: in quibus operationibus differentiale dx perpetuo tanquam quantitas constans spectatur, quae nulum differentiale recipiat.

132. Ex ratione, qua functio y per x determinatur, tam ope methodi differentiarum finitarum, quam multo ex-

M

pe-

peditius ex iis, quae postea sumus tradituri, definietur valor functionis p , quae per dx multiplicata praebeat differentiale primum dy . Posito ergo $dy = p dx$, differentiale ipsius $p dx$ dabit differentiale secundum ddy ; unde si fuerit $dp = q dx$, ob dx constans, orietur $ddy = q dx^2$, uti iam ante ostendimus. Ulterius igitur progrediendo, cum differentialis secundi differentiale praebeat differentiale tertium, ponamus esse $dq = r dx$, eritque $d^3 y = r dx^3$: simili modo si huius functionis r differentiale quaeratur, fueritque $dr = s dx$, habebitur differentiale quartum $d^4 y = s dx^4$; sicque porro, dummodo noverimus differentiale primum cuiusque functionis invenire, differentiale cuiusque ordinis assignare poterimus.

133. Quo igitur formae singulorum horum differentialium, simulque ratio ea inveniendi clarius menti repraesentetur, ea sequenti tabella complecti visum est.

Si y fuerit functio quaecunque ipsius x , atque posito	erit
$dp = q dx$	$dy = p dx$
$dq = r dx$	$ddy = q dx^2$
$dr = s dx$	$d^3 y = r dx^3$
$ds = t dx$	$d^4 y = s dx^4$
&c.	$d^5 y = t dx^5$

Cum igitur functio p ex functione y per differentiationem cognoscatur, similique modo ex p inveniatur q , hincque porro r , & ex eo ulterius s , &c. differentialia cuiusvis ordinis ipsius y facile reperientur, dummodo differentiale dx assumatur constans,

134. Cum p, q, r, s, t , &c. sint quantitates finitae, functiones nimirum ipsius x , differentiale primum ipsius y , rationem finitam habebit ad differentiale primum ipsius x , scilicet ut p ad 1; hancque ob causam differentialia dx & dy vocantur homogenea. Deinde cum ddy ad dx^2 habeat rationem finitam ut q ad 1, erunt ddy & dx^2 homogenea; simili modo homogenea erunt $d^3 y$ & dx^3 , itemque $d^4 y$ & dx^4 , & ita porro. Unde uti differentialia prima sunt inter se ho-

mo-

homogenea, seu rationem finitam tenentia; sic differentialia secunda cum quadratis differentialium primorum, differentialia autem tertia cum cubis differentialium primorum atque ita porro erunt homogenea. Atque generatim differentiale ipsius y ordinis n , quod ita exprimitur $d^n y$, homogeneum erit cum dx^n , hoc est cum potestate differentialis dx , cuius exponentis est n .

135. Cum igitur prae dx evanescant omnes eius potestates, quarum exponentes sunt unitate maiores, prae dy quoque evanescant dx^2 , dx^3 , dx^4 , &c. & quae ad has potestates rationem finitam tenent differentialia altiorum ordinum ddy , $d^3 y$, $d^4 y$, &c. Simili modo prae ddy quia est homogeneum cum dx^2 , omnes ipsius dx potestates quadrato superiores dx^3 , dx^4 , &c. evanescant, evanescant ergo quoque $d^3 y$, $d^4 y$, &c. Atque prae $d^3 y$, evanescant dx^4 , dx^5 ; dx^6 , dx^7 , &c. Hincque facile, si propositae fuerint quaecunque expressiones huiusmodi differentialia involventes, dignosci poterunt, utrum sint homogeneae nec ne. Respici enim debent tantum differentialia, omissis quantitativis finitis, quippe quae homogeneitatem non turbant; atque pro differentialibus secundi altiorumque ordinum scribantur potestates ipsius dx ipsis homogeneae, quae si praebeant ubique eundem dimensionum numerum, expressiones erunt homogeneae.

136. Ita patebit has expressiones $Pddy^2$ & $Qdyd^3 y$ esse inter se homogeneas. Nam ddy^2 denotat quadratum ipsius ddy , & quia ddy homogeneum est cum dx^2 , erit ddy^2 homogeneum cum dx^4 . Deinde quia dy cum dx & $d^3 y$ cum dx^3 homogeneum est, erit productam $dyd^3 y$ cum dx^4 homogeneum: ex quo sequitur expressiones $Pddy^2$ & $Qdyd^3 y$ inter se esse homogeneas, ideoque rationem inter se finitam habere. Simili modo colligetur has expressiones $\frac{Pd^3 y^2}{dxddy}$ & $\frac{Qd^5 y}{dy^2}$ esse homogeneas; substitutis enim pro dy , ddy , $d^3 y$ & $d^5 y$ his ipsius dx potestatibus ipsis homogeneis dx , dx^2 , dx^3 , & dx^5 , orientur hae expressiones Pdx^3 & Qdx^3 , quae utique erunt inter se homogeneae.

137. Quod si facta hac reductione expressiones propositae non contineant aequales ipsius dx potestates, tum non erunt homogeneae, neque propterea inter se rationem finitam tenebunt. Erit ergo altera infinites sive maior sive minor altera, hincque una respectu alterius evanescet. Sic $\frac{Pd^3y}{dx^3}$ ad $\frac{Qddy^2}{dy}$ rationem habebit infinite magnam: prior enim expressio reducitur ad Pdx & altera ad Qdx^3 , unde haec prae illa evanescet. Quamobrem si in quopiam calculo aggregatum huiusmodi binarum formularum occurrat, $\frac{Pd^3y}{dx^3} + \frac{Qddy^2}{dy}$, posterior terminus praeteriori tuto reiici, solusque primus $\frac{Pd^3y}{dx^3}$ in calculo retineri poterit: subsistet enim perfecta ratio aequalitatis inter expressiones $\frac{Pd^3y}{dx^3} + \frac{Qddy^2}{dy}$ & $\frac{Pd^3y}{dx^3}$ quia exponens rationis est

$$= 1 + \frac{Qdx^2ddy^2}{Pdyd^3y} = 1 \quad \text{ob} \quad \frac{Qdx^2ddy^2}{Pdyd^3y} = 0.$$

Hocque pacto expressiones differentiales quandoque mirifice contrahi possunt.

138. In calculo differentiali praecepta traduntur, quorum ope cuiusvis quantitatis propositae differentiale primum inveniri potest: & quoniam differentialia secunda ex differentiatione primorum, tertia per eandem operationem ex secundis & ita porro sequentia ex praecedentibus reperiuntur, calculus differentialis continet methodum omnia cuiusque ordinis differentialia inveniendi. Ex voce autem *differentialis*, qua differentia infinite parva denotatur, alia nomina derivantur, quae usu sunt recepta. Sic verbum habetur *differentiare*, quod significat *differentialia invenire*, quantitasque *differentiari* dicitur, quando eius differentiale elicitur. *Differentiatio* autem de-

no-

notat operationem, qua differentialia inveniuntur. Hinc calculus differentialis quoque vocatur methodus *differentiandi*, cum modum differentialia inveniendi contineat.

139. Quemadmodum in calculo differentiali cuiusvis quantitatis differentiale investigatur, ita vicissim calculi species constituitur quoque in inventione eius quantitatis, cuius differentiale proponitur, qui calculus integralis vocatur. Si enim propositum fuerit differentiale quodcunque, eius respectu ea quantitas, cuius est differentiale, vocari solet integrale. Cuius denominationis ratio est, quod, cum differentiale considerari possit, tanquam pars infinite parva, qua quantitas quaepiam crescit, ipsa illa quantitas respectu huius partis tanquam totum seu integrum spectari potest, hancque ob causam eius vocatur integrale. Sic cum dy sit differentiale ipsius y , vicissim y erit integrale ipsius dy , & cum ddy sit differentiale ipsius dy , erit dy integrale ipsius ddy , similique modo erit ddy integrale ipsius d^3y , & d^3y ipsius d^4y & ita porro: unde quaelibet differentiatio, si inverse spectatur, integrationis exemplum exhibet.

140. Origo & natura integralium pariter ac differentialium clarissime ex differentiarum finitarum doctrina in capite primo exposita explicari potest. Postquam enim esset ostensum, quomodo cuiusque quantitatis differentiam inveniri oporteat, retrogrediendo quoque monstravimus, quomodo, si proposita fuerit differentia, ea quantitas inveniri queat, cuius illa sit differentia; quam quantitatem respectu suae differentiae vocavimus eius summam. Uti igitur ad infinite parva procedendo differentiae in differentialia abierunt, ita summae quae ibi erant vocatae, integralium nomen sortiuntur: & hanc ob causam integralia quoque non raro summae appellari solent. Angli qui differentialia fluxiones nominant, integralia vocant quantitates fluentes; eorumque loquendi more datae fluxionis fluentem invenire, idem est, quod nostro more dati differentialis integrale invenire dicimus.

141. Uti differentialia caractere d designamus, ita ad
in.

CAPUT IV.

integralia indicanda hac littera \int utimur, quae ergo quantitatibus differentialibus praefixa eas denotabit quantitates, quarum illa sunt differentialia. Sic si differentiale ipsius y fuerit pdx , seu $dy = pdx$, erit y integrale ipsius pdx , quod hoc modo scribitur $y = \int pdx$, cum sit $y = \int dy$. Integrale ergo ipsius pdx , quod per $\int pdx$ indicatur, denotat quantitatem, cuius differentiale est pdx . Simili modo cum sit $ddy = qdx^2$ existente $dp = qdx$; erit integrale ipsius ddy hoc est $dy = pdx$, atque ob $p = \int qdx$, erit $dy = dx \int qdx$, ac propterea $y = \int dx \int qdx$. Si ulterius sit $dq = rdx$, erit $q = \int rdx$ & $dp = dx \int rdx$; unde si character \int denuo praefigatur, fiet $p = \int dx \int rdx$, porroque $dy = dx \int dx \int rdx$, atque $y = \int dx \int dx \int rdx$.

142. Quia differentiale dy est quantitas infinite parva, eius integrale autem y quantitas finita, parique modo differentiale secundum ddy infinites minus est, quam eius integrale dy , manifestum est differentialia prae suis integralibus evanescere. Quae affectio quo melius percipiatur, infinite parva in ordines dividi solent, diciturque infinite parvum primi ordinis, ad quod referuntur differentialia prima dx , dy . Infinite parvum secundi ordinis complectitur differentialia secundi ordinis, quae homogenea sunt cum dx^2 ; similique modo infinite parva, quae cum dx^3 sunt homogenea, vocantur ordinis tertii, ad quem ergo pertinent differentialia tertia omnia; sicque porro. Unde uti infinite parva primi ordinis prae quantitatibus finitis evanescent, sic infinite parva secundi ordinis prae infinite parvis primi ordinis, atque generatim infinite parva cuiusque ordinis altioris prae infinite parvis ordinis inferioris evanescent.

143. His igitur infinite parvorum ordinibus constitutis, uti differentiale quantitatis finitae est infinite parvum primi ordinis, atque differentiale infinite parvi primi ordinis est infinite parvum secundi ordinis, & ita porro; ita vicissim manifestum est integrale infinite parvi primi ordinis esse quantitatem finitam, integrale autem infinite parvi secundi ordinis esse infinite parvum primi ordinis sicque deinceps.

Qua-

Quare si differentiale propositum fuerit infinite parvum ordinis n , eius integrale erit infinite parvum ordinis $n-1$; hincque uti differentiando ordo infinite parvorum augetur, ita integratione ad ordines inferiores progredimur, donec ad ipsas quantitates finitas perveniamus. Sin autem quantitates finitas denuo integrare velimus, tum secundum hanc legem pervenimus ad quantitates infinite magnas, ab harumque integratione instituta ad quantitates adhuc infinities maiores, sicque progrediendo obtinebimus similes infinitorum ordines, quorum quisque praecedentem infinities superat.

144. Superest ut in hoc Capite quaedam de usu signorum recepto moneamus, ne ambiguitati ullus locus relinquantur. Ac primo quidem signum differentiationis d tantum afficit litteram immediate sequentem solam: sic $dx y$ non denotat differentiale producti xy , sed differentiale ipsius x per ipsam quantitatem y multiplicatum. Solet autem, quominus confusio nascatur, quantitas y ante signum d hoc modo scribi $y dx$, quo productum ex y in dx indicatur. Attamen si y sit quantitas vel signum radicale $\sqrt{}$ vel logarithmicum habens praefixum, tum post differentiale poni solet: nimirum $dx \sqrt{(aa - xx)}$ significat productum ex quantitate finita $\sqrt{(aa - xx)}$ in differentiale dx , similique modo $dx \log(1+x)$ est productum ex logarithmo quantitatis $1+x$, per dx multiplicato. Ob eandem rationem $ddy \sqrt{x}$ exprimit productum differentialis secundi ddy & quantitatis finitae \sqrt{x} .

145. Neque vero signum d litteram immediate sequentem solam afficit, sed etiam nequidem exponentem, si quem habet, spectat. Ita dx^2 non exprimit differentiale ipsius x^2 , sed quadratum differentialis ipsius x , ita ut exponens 2 non ad x , sed ad dx referri debeat. Posset etiam scribi $dx dx$, quemadmodum productum duorum differentialium dx & dy hoc modo $dx dy$ exponitur, verum prior modus dx^2 , uti est brevior, ita usitator. Praesertim si altiores potestates ipsius dx essent indicandae, nimis prolixum foret dx toties repeti: sic dx^3 denotat cubum ipsius dx , & in differentialibus altiorum

rum ordinum similis ratio observatur. Scilicet ddy^4 denotat potestatem quartam differentialis secundi ordinis ddy ; atque $d^3y^2\sqrt{x}$ significat quadratum differentialis tertii ordinis ipsius y multiplicatum esse per \sqrt{x} ; sin autem per quantitatem rationalem x multiplicari deberet, ea praefigitur hoc modo xd^3y^2 .

146. Sin autem velimus, ut signum d plus quam solam litteram subsequentem afficiat, id peculiari modo indicari debet. Utimur hoc casu praecipue uncinulis, quibus ea quantitas includitur, cuius differentiale debet indicare. Uti $d(xx+yy)$ denotat differentiale quantitatis $xx+yy$; verum si velimus differentiale potestatis huiusmodi quantitatis designare, ambiguitatem vix evitare possumus: si enim scribamus $d(xx+yy)^2$, intelligi posset quadratum ipsius $d(xx+yy)$. Poterimus autem hoc casu punctum in auxilium vocare, ita ut $d.(xx+yy)^2$ denotet differentiale ipsius $(xx+yy)^2$, omisso autem puncto $d(xx+yy)^2$ quadratum ipsius $d(xx+yy)$. Puncto scilicet commode indicari potest signum d ad totam quantitatem post punctum sequentem pertinere: sic $dxdy$ exprimet differentiale ipsius xdy ; & $d^3xdy\sqrt{aa+xx}$ differentiale tertii ordinis expressionis $xdy\sqrt{aa+xx}$, quae est productum ex quantitatibus finitis x & $\sqrt{aa+xx}$ atque ex differentiali dy .

147. Quemadmodum autem signum differentiationis d solam quantitatem immediate sequentem afficit, nisi puncto interposito eius vis ad totam expressionem sequentem extendatur; ita contra signum integrationis \int semper totam expressionem, cui est praefixum, complectitur. Ita $\int ydx(aa-xx)^n$ denotat integrale seu eam quantitatem, cuius differentiale est $ydx(aa-xx)^n$, atque haec expressio $\int xdx\int dx\int dx$ denotat quantitatem, cuius differentiale est $x dx \int dx \int dx$. Hinc si velimus productum duorum integralium scilicet $\int ydx$ & $\int zdx$ exprimere, id hoc modo $\int ydx \int zdx$ perperam fiet, intelligeretur enim integrale quantitatis $ydx \int zdx$. Hanc ob causam iterum puncto solet haec ambiguitas tolli, ita. ut $\int ydx . \int zdx$ significet productum integralium $\int ydx$ & $\int zdx$.

148. Analysis infinitorum igitur. cum in differentialibus

bus tum in integralibus inveniendis versatur, & hancobrem in duas praecipuas partes dividitur, quarum altera vocatur Calculus differentialis, altera Calculus integralis. In priori praecepta traduntur, quantitatum quarumvis differentialia inveniendi; in posteriori vero via monstratur differentialium propositorum integralia investigandi: in utroque autem simul summus usus, quem isti calculi tam ad ipsam Analysin quam ad Geometriam sublimiorem afferunt, indicatur. Quam ob causam ista Analyseos pars iam tanta accepit incrementa, ut modico volumine prorsus comprehendi nequeat. Imprimis vero in calculo integrali indies tam nova artificia integrandi, quam adiumenta eius in solvendis varii generis problematibus, deteguntur, ut ob haec nova inventa, quae continuo accedunt, nunquam exauriri, multo minus perfecte describi atque explicari possit. Dabo autem operam, ut quae adhuc sunt reperta, vel cuncta in his libris exponam, vel saltem methodos explicem, unde ea facile deduci queant.

149. Solent vulgo plures Analyseos infinitorum partes numerari; praeter calculos enim differentialem & integralem inveniuntur passim calculi differentio-differentialis atque exponentialis. In calculo differentio-differentiali tradi solet methodus differentialia secundi atque altiorum ordinum inveniendi: quoniam autem modum cuiusque ordinis differentialia inveniendi in ipso calculo differentiali sum expositurus, hac subdivisione, quae potius ex merito inventionis, quam ex re ipsa facta esse videtur, supersedebimus. Quod deinde ad calculum exponentialem attinet, quo Celeb. IOH. BERNOULLI, cui ob innumera eaque maxima incrementa Analyseos infinitorum aeternas debemus gratias, methodos differentiandi atque integrandi ad quantitates exponentiales transtulit, quia utrumque calculum ad omnis generis quantitates tam algebraicas quam transcendentes accommodare constitui, hinc partem peculiarem facere superfluum atque instituto contrarium foret.

150. Primum igitur calculum differentialem in hoc libro pertractare statui, modumque sum expositurus, cuius ope omnium quantitatum variabilium differentialia non solum prima, sed etiam secunda & altiorum ordinum expedite inveniri queant. Primum ergo quantitates algebraicas contemplanbor, sive sint functiones unius variabilis, sive plurium, sive demum explicite dentur, sive per aequationes. Deinde inventionem differentialium quoque accommodabo ad quantitates non algebraicas, ad quarum notitiam quidem sine calculi integralis subsidio pervenire licet: cuiusmodi sunt logarithmi, atque quantitates exponentiales; deinde etiam arcus circuli, vicissimque arcuum circularium sinus, & tangentes. Denique etiam quantitates utcumque ex his compositas & permixtas differentiare docebo; sicque calculi differentialis pars prior, methodus scilicet differentiantiendi absolvetur.

151. Altera pars usui, quem methodus differentiantiendi tam ad Analysin quam Geometriam sublimiorem affert, explicando est destinata. In Algebram autem communem inde plurima redundant commoda, partim ad radices aequationum inveniendas, partim ad series tractandas atque summandas, partim ad maxima minimaque eruenda, partim ad valores expressionum, quae certis casibus indeterminatae videantur, definiendos, & quae sunt alia. Geometria autem sublimior ex calculo differentiali maxima accepit incrementa, dum eius ope tangentes linearum curvarum, earumque curvatura ipsa mira facilitate definiri, multaque alia problemata circa radios a lineis curvis vel reflexos vel refractos resolveri possunt. Quibus etsi amplissimus tractatus impleri posset, tamen conabor, quantum fieri licet, omnia breviter ac perspicue explicare.

CA.

CAPUT V.

DE DIFFERENTIATIONE FUNCTIONUM ALGEBRAICARUM UNICAM VARIABLEM INVOLVENTIUM.

152.

Quia quantitatis variabilis x differentiale est $= dx$ erit x in proximum promovendo $x' = x + dx$. Quare si fuerit y quaecunque functio ipsius x , si in ea loco x ponatur $x + dx$, ea abit in y' , atque differentia $y' - y$ dabit differentiale ipsius y . Si igitur ponamus $y = x^n$ fiet

$$y' = (x + dx)^n = x^n + nx^{n-1} dx + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} x^{n-2} dx^2 + \&c.$$

eritque ergo

$$dy = y' - y = nx^{n-1} dx + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} x^{n-2} dx^2 + \&c.$$

At in hac expressione terminus secundus cum reliquis sequentibus prae primo evanescit, eritque idcirco $nx^{n-1} dx$ differentiale ipsius x^n , seu $d.x^n = nx^{n-1} dx$. Unde si n sit numerus seu quantitas constans, erit quoque $d.n x^n = n d.x^n$. Cuiuscunque ergo ipsius x potestatis differentiale invenitur, multiplicando eam per exponentem, dividendo per x , & reliquum per dx multiplicando, quae regula facile memoria retinetur.

153. Cognito differentiali primo ipsius x^n , ex eo facile differentiale secundum reperitur, dummodo, ut hic constanter assumemus, differentiale dx constans statuatur. Cum enim in differentiali $nx^{n-1} dx$ factor ndx fit constans, alterius factoris x^{n-1} differentiale sumi debet, quod proinde erit $(n-1)x^{n-2} dx$. Hoc ergo per ndx multiplicatum dabit diffe-

N 2

ren-

rentiale secundum : $dd.x^n = n(n-1)x^{n-2}dx^2$. Simili modo si differentiale ipsius x^{n-2} quod est $= (n-2)x^{n-3}dx$ multiplicetur per $n(n-1)dx^2$ prodibit differentiale tertium

$$d^3.x^n = n(n-1)(n-2)x^{n-3}dx^3.$$

Porro itaque erit differentiale quartum

$$d^4.x^n = n(n-1)(n-2)(n-3)x^{n-4}dx^4,$$

& differentiale quintum

$$d^5.x^n = n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)x^{n-5}dx^5;$$

unde simul forma sequentium differentialium facillime colligitur.

154. Quoties ergo n est numerus integer affirmativus, toties ad differentialia tandem pervenitur evanescencia; quæ scilicet ita sunt $= 0$, ut prae omnibus ipsius dx potestatibus evanescant. Horum autem notandi sunt casus simpliciores.

$$d.x = dx; dd.x = 0; d^3.x = 0; \&c.$$

$$d.x^2 = 2xdx; dd.x^2 = 2dx^2; d^3.x^2 = 0; d^4.x^2 = 0 \&c.$$

$$d.x^3 = 3x^2dx; dd.x^3 = 6xdx^2; d^3.x^3 = 6dx^3; d^4.x^3 = 0$$

$$d.x^4 = 4x^3dx; dd.x^4 = 12x^2dx^2; d^3.x^4 = 24xdx^3; d^4.x^4 = 24dx^4$$

$$d.x^5 = 5x^4dx; dd.x^5 = 20x^3dx^2; d^3.x^5 = 60x^2dx^3; d^4.x^5 =$$

$$120xdx^4; d^5.x^5 = 120dx^5; d^6.x^5 = 0.$$

Patet ergo si n fuerit numerus integer affirmativus, potestatis x^n differentiale ordinis n esse constans, nempe $= 1.2.3. \dots n dx^n$, adeoque differentialia superiorum ordinum omnium esse $= 0$.

155. Si n sit numerus integer negativus, huiusmodi

ipsius x potestatum negativarum $\frac{1}{x}, \frac{1}{x^2}, \frac{1}{x^3}, \&c.$ differen-

tialia sumi poterunt, cum sit $\frac{1}{x} = x^{-1}; \frac{1}{x^2} = x^{-2}, \&$ ge-

neraliter $\frac{1}{x^m} = x^{-m}$. Si ergo in formula antecedente ponatur

$n = -m$, erit ipsius $\frac{1}{x^m}$ differentiale primum $= \frac{-mdx}{x^{m+1}}$;
 differentiale secundum $= \frac{m(m+1)dx^2}{x^{m+2}}$; differentiale tertium
 $= \frac{-m(m+1)(m+2)dx^3}{x^{m+3}}$ &c. unde sequentes casus simplices imprimis notari merentur.

$$d. \frac{1}{x} = \frac{-dx}{x^2}; dd. \frac{1}{x} = \frac{2dx^2}{x^3}; d^3. \frac{1}{x} = \frac{-6dx^3}{x^4}$$

$$d. \frac{1}{x^2} = \frac{-2dx}{x^3}; dd. \frac{1}{x^2} = \frac{6dx^2}{x^4}; d^3. \frac{1}{x^2} = \frac{-24dx^3}{x^5}$$

$$d. \frac{1}{x^3} = \frac{-3dx}{x^4}; dd. \frac{1}{x^3} = \frac{12dx^2}{x^5}; d^3. \frac{1}{x^3} = \frac{-60dx^3}{x^6}$$

$$d. \frac{1}{x^4} = \frac{-4dx}{x^5}; dd. \frac{1}{x^4} = \frac{20dx^2}{x^6}; d^3. \frac{1}{x^4} = \frac{-120dx^3}{x^7}$$

$$d. \frac{1}{x^5} = \frac{-5dx}{x^6}; dd. \frac{1}{x^5} = \frac{30dx^2}{x^7}; d^3. \frac{1}{x^5} = \frac{-210dx^3}{x^8}$$

&c.

156. Ponendis deinde pro n numeris fractis differentia-
 lia formularum irrationalium obtinebimus. Sit enim

$n = \frac{\mu}{y}$, erit formulae $n^{\frac{\mu}{y}}$ seu $\sqrt[y]{n^{\mu}}$ differentiale primum

$$= \frac{\mu}{y} n^{\frac{\mu-y}{y}} dx = \frac{\mu}{y} dx \sqrt[y]{n^{\mu-y}} \text{ secundum}$$

$$= \frac{\mu(\mu-y)}{y^2} x^{\frac{\mu-2y}{y}} dx^2 = \frac{\mu(\mu-y)}{yy} dx^2 \sqrt[y]{x^{\mu-2y}} \text{ \&c.}$$

Hinc

CAPUT V.

Hinc erit :

$$\begin{aligned} d.\sqrt{x} &= \frac{dx}{2\sqrt{x}}; \quad dd.\sqrt{x} = \frac{-dx^2}{4x\sqrt{x}}; \quad d.^3\sqrt{x} = \frac{1.3dx^3}{8x^2\sqrt{x}} \\ d.\sqrt[3]{x} &= \frac{dx}{3\sqrt[3]{x^2}}; \quad dd.\sqrt[3]{x} = \frac{-2dx^2}{9x\sqrt[3]{x^2}}; \quad d.^3\sqrt[3]{x} = \frac{2.5dx^3}{27x^2\sqrt[3]{x^2}} \\ d.\sqrt[4]{x} &= \frac{dx}{4\sqrt[4]{x^3}}; \quad dd.\sqrt[4]{x} = \frac{-3dx^2}{16x\sqrt[4]{x^3}}; \quad d.^3\sqrt[4]{x} = \frac{3.7dx^3}{64x^3\sqrt[4]{x^3}} \end{aligned}$$

quae expressiones si paulisper inspiciantur, facile habitus acquiratur huiusmodi differentialia, etiam sine praevia reductione ad formam potestatis, inveniendi.

157. Si μ non fuerit 1, sed numerus alius sive affirmativus sive negativus integer, differentialia aequè facile definiuntur. Cum autem differentialia secunda & altiorum ordinum eadem lege ex primis, qua haec ex ipsis potestatibus, deriventur, exempla simpliciora primorum tantum differentialium apponamus.

$$\begin{aligned} d.x\sqrt{x} &= \frac{1}{2}dx\sqrt{x}; \quad d.x^2\sqrt{x} = \frac{3}{2}x dx\sqrt{x}; \quad d.x^3\sqrt{x} = \frac{7}{2}x^2 dx\sqrt{x}; \\ d.\frac{1}{\sqrt{x}} &= \frac{-dx}{2x\sqrt{x}}; \quad d.\frac{1}{x\sqrt{x}} = \frac{-3dx}{2x^2\sqrt{x}}; \quad d.\frac{1}{x^2\sqrt{x}} = \frac{-5dx}{2x^3\sqrt{x}}; \\ d.\sqrt[3]{x^2} &= \frac{2}{3}\frac{dx}{\sqrt[3]{x}}; \quad d.x\sqrt[3]{x} = \frac{4}{3}dx\sqrt[3]{x}; \quad d.x\sqrt[3]{x^2} = \frac{5}{3}dx\sqrt[3]{x^2}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d.x\sqrt[4]{x} &= \frac{5}{4}x dx\sqrt[4]{x}; \quad d.x\sqrt[4]{x^2} = \frac{7}{4}x dx\sqrt[4]{x^2}; \quad \&c. \\ d.\frac{1}{\sqrt[3]{x}} &= \frac{-dx}{3x\sqrt[3]{x}}; \quad d.\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} = \frac{-2dx}{3x\sqrt[3]{x^2}}; \quad d.\frac{1}{x\sqrt[3]{x}} = \frac{-4dx}{3x^2\sqrt[3]{x}}; \\ d.\frac{1}{x\sqrt[4]{x^2}} &= \frac{-5dx}{3x^2\sqrt[4]{x^2}}; \quad d.\frac{1}{x^2\sqrt[4]{x}} = \frac{-7dx}{3x^3\sqrt[4]{x}}; \quad \&c. \end{aligned}$$

158. Ex his iam functionum omnium algebraicarum rationalium integralum differentialia poterunt inveniri, propterea quod earum singuli termini sunt potestates ipsius x , quas

quas differentiare novimus. Cum enim quantitas huiusmodi $p+q+r+s+\&c.$ posito $x+dx$ loco x abeat in $p+dp+q+dq+r+dr+s+ds+\&c.$ erit eius differentiale $=dp+dq+dr+ds+\&c.$ Quare si singularum quantitatum $p, q, r, s,$ differentialia assignare queamus, simul quoque aggregati earum differentiale innotescet. Atque cum multipli ipsius p differentiale sit aequè multipulum ipsius dp , hoc est $d.ap = adp$; erit quantitatis $ap+bq+cr$ differentiale $=adp+bdq+cdr$. Cum denique quantitatum constantium differentialia sint nulla, erit quoque quantitatis huius $ap+bq+cr+f$ differentiale $=adp+bdq+cdr$.

159. In functionibus ergo rationalibus integris cum singuli termini sint vel constantes vel potestates ipsius x , differentiatio secundum praecepta data facile absolvetur. Sic erit:

$$d(a+x) = dx ; \quad d(a+bx) = bdx ;$$

$$d(a+xx) = 2xdx ; \quad d(aa-xx) = -2xdx ;$$

$$d(a+bx+cx^2) = bdx + 2cxdx ;$$

$$d(a+bx+cx^2+ex^3) = bdx + 2cxdx + 3ex^2dx ;$$

$$d(a+bx+cx^2+ex^3+fx^4) = bdx + 2cxdx + 3ex^2dx + 4fx^3dx .$$

Atque si exponentes fuerint indefiniti erit:

$$d(1-x^n) = -nx^{n-1}dx ; \quad d(1+x^n) = nx^{n-1}dx ;$$

$$d(a+bx^m+cx^n) = mbx^{m-1}dx + ncx^{n-1}dx .$$

160. Cum igitur functiones rationales integrae secundum maximam ipsius x dignitatem in gradus distinguantur, manifestum est, si huiusmodi functionum continuo differentialia capiantur, ea tandem fieri constantia, posteaque in nihilum abire, si quidem differentiale dx assumatur constans. Sic functionis primi gradus $a+bx$ differentiale primum bdx est constans, secundum cum sequentibus nullum. Sit functio secundi gradus

$$a+bx+cx^2=y ; \text{ erit } dy=bdx+2cxdx ;$$

$$ddy=2cdx^2 ; \quad d^2y=0 .$$

Si-

Simili modo si ponatur functio tertii gradus

$a + bx + cxx + cx^3 = y$; erit $dy = bdx + 2cxdx + 3cxxx$; $ddy = 2cdx + 6cxdx^2$ & $d^3y = 6cdx^2$ atque $d^4y = 0$. Quare generaliter si huiusmodi functio sit gradus n , eius differentiale ordinis n erit constans, & sequentia omnia nulla.

161. Neque etiam differentiatio turbabitur, si inter potestates ipsius x , quae huiusmodi functionem componunt, occurrant tales, quarum exponentes sint numeri negativi seu fracti. Ita

I. Si fit $y = a + b\sqrt{x} - \frac{c}{x}$

erit $dy = \frac{b dx}{2\sqrt{x}} + \frac{cdx}{xx}$.

II. Si fit $y = \frac{a}{\sqrt{x}} + b + c\sqrt{x} - cx$

erit $dy = \frac{-adx}{2x\sqrt{x}} + \frac{cdx}{2\sqrt{x}} - cdx$,

& $ddy = \frac{3adx^2}{4xx\sqrt{x}} - \frac{cdx^2}{4x\sqrt{x}}$.

III. Si fit $y = a + \frac{b}{\sqrt{xx}} - \frac{c}{x\sqrt{x}} + \frac{f}{xx}$

erit $dy = \frac{-2b dx}{3x\sqrt{xx}} + \frac{4cdx}{3xx\sqrt{x}} - \frac{2fdx}{x^3}$

& $ddy = \frac{10b dx^2}{9x^2\sqrt{xx}} - \frac{28cdx^2}{9x^2\sqrt{x}} + \frac{6fdx^2}{x^4}$.

cuiusmodi exempla secundum praecepta data facillime absolvuntur.

162. Si quantitas differentianda proposita fuerit potestas eiusmodi functionis, cuius differentiale exhibere valemus, praecedentia praecepta sufficiunt ad eius differentiale primum definiendum. Sit enim p functio quaecunque ipsius x , cuius differentiale dp in potestate est, erit ipsius potestatis p^n differentiale primum $= np^{n-1}dp$. Hinc sequentia exempla solvuntur:

I. Si sit $y = (a+x)^n$; erit $dy = n(a+x)^{n-1}dx$

II. Si sit $y = (aa - xx)^2$; erit $dy = -4x dx (aa - xx)$

III. Si sit $y = \frac{1}{aa+xx}$ seu $y = (aa+xx)^{-1}$

erit $dy = \frac{-2x dx}{(aa+xx)^2}$

IV. Si sit $y = \sqrt{a+bx+cx^2}$; erit $dy = \frac{bdx+2cx dx}{2\sqrt{a+bx+cx^2}}$

V. Si sit $y = \sqrt[3]{(a^4 - x^4)^2}$ seu $y = (a^4 - x^4)^{\frac{2}{3}}$

erit $dy = -\frac{2}{3} x^3 dx (a^4 - x^4)^{-\frac{1}{3}} = \frac{-8x^3 dx}{3\sqrt[3]{(a^4 - x^4)}}$

VI. Si sit $y = \frac{1}{\sqrt{1-xx}}$ seu $y = (1-xx)^{-\frac{1}{2}}$

erit $dy = x dx (1-xx)^{-\frac{3}{2}} = \frac{x dx}{(1-xx)\sqrt{1-xx}}$

VII. Si sit $y = \sqrt[3]{(a+\sqrt{bx+x})}$

erit $dy = \frac{dx\sqrt{b} : 2\sqrt{x} + dx}{3\sqrt[3]{(a+\sqrt{bx+x})^2}} = \frac{dx\sqrt{b} + 2dx\sqrt{x}}{6\sqrt{x}\sqrt[3]{(a+\sqrt{bx+x})^2}}$

VIII. Si sit $y = \frac{1}{x+\sqrt{aa-xx}}$,

O

ob

ob $d \sqrt{aa - xx} = \frac{-x dx}{\sqrt{aa - xx}}$, erit

$$dy = \frac{-dx + x dx : \sqrt{aa - xx}}{(x + \sqrt{aa - xx})^2} = \frac{x dx - dx \sqrt{aa - xx}}{(x + \sqrt{aa - xx})^2 \sqrt{aa - xx}}$$

$$\text{feu } dy = \frac{dx(x - \sqrt{aa - xx})^3}{(2xx - aa)^2 \sqrt{aa - xx}}.$$

IX. Si fit $y = \sqrt[3]{1 - \frac{1}{\sqrt{x}} + \sqrt[3]{(1 - xx)^2}}$.

Ponatur $\frac{1}{\sqrt{x}} = p$ & $\sqrt[3]{(1 - xx)^2} = q$;

ob $y = \sqrt[3]{(1 - p + q)^3}$, erit $dy = \frac{-3 dp + 3 dq}{4 \sqrt[3]{(1 - p + q)}}$.

Iam per antecedentia est $dp = \frac{-dx}{2x\sqrt{x}}$ & $dq = \frac{-4x dx}{3 \sqrt[3]{(1 - xx)}}$,

quibus valoribus substitutis fiet:

$$dy = \frac{3 dx : 2x\sqrt{x} - 4x dx : \sqrt[3]{(1 - xx)}}{4 \sqrt[3]{1 - \frac{1}{\sqrt{x}} + \sqrt[3]{(1 - xx)^2}}}$$

Simili autem modo singulares litteras loco terminorum aliquantum compositiorum substituendo omnium huiusmodi functionum differentialia facile eruuntur.

163. Si quantitas differentianda fuerit productum ex duabus pluribusve functionibus ipsius x , quarum differentialia constant, eius differentiale sequente modo commodissime invenietur. Sint p & q functiones ipsius x , quarum differentialia dp & dq iam sunt cognita, quia posito $x + dx$ loco x ; p abit in $p + dp$ & q in $q + dq$: productum pq transmutabitur in $(p + dp)(q + dq) = pq + p dq + q dp + dp dq$. Unde pro-

producti pq differentiale erit $\equiv pdq + qdp + dpdq$; ubi cum pdq & qdp sint infinite parva primi ordinis, at $dpdq$ secundi ordinis, ultimus terminus evanescet, eritque igitur $d.pq \equiv pdq + qdp$: Differentiale ergo producti pq constat ex duobus membris, quae obtinentur, si uterque factor per differentiale alterius factoris multiplicetur. Hinc facile deducitur differentiatio producti pqr ex tribus factoribus constantis: ponatur enim $qr = z$, fiet $pqr = pz$, & $d.pqr = pdz + zdp$, verum ob $z = qr$ erit $dz = qdr + rdq$, quibus valoribus loco z & dz substitutis erit $d.pqr = pqdr + prdq + qrdp$.

Simili modo si quantitas differentianda quatuor habeat factores erit: $d.pqrs = pqrds + pqsd r + prsdq + qrsdp$: unde quilibet differentiationem plurium factorum facile perspiciet.

I. Si ergo fuerit $y = (a+x)(b-x)$, erit

$dy = -dx(a+x) + dx(b-x) = -adx + bdx - 2xdx$
quod idem differentiale quoque invenitur, si quantitas proposita evolvatur: fit enim $y = ab - ax + bx - xx$, ideoque per superiora praecepta $dy = -adx + bdx - 2xdx$.

II. Si fuerit $y = \frac{1}{x} \sqrt{aa - xx}$.

Ponatur $\frac{1}{x} = p$ & $\sqrt{aa - xx} = q$, quia est $dp = \frac{-dx}{xx}$

$$\& dq = \frac{-xdx}{\sqrt{aa - xx}}, \text{ erit}$$

$$dy = pdq + qdp = \frac{-dx}{\sqrt{aa - xx}} - \frac{dx}{xx} \sqrt{aa - xx};$$

quae ad eundem denominatorem reductae dabunt,

$$\frac{-xxdx - aadx + xxdx}{xx\sqrt{aa - xx}} = \frac{-aadx}{xx\sqrt{aa - xx}}. \text{ Hinc erit diffe-}$$

$$\text{rentiale quaesitum, } dy = \frac{-aadx}{xx\sqrt{aa - xx}}.$$

O 2

III.

III. Si fuerit $y = \frac{xx}{\sqrt{(a^4 + x^4)}}$.

Ponatur $xx = p$, & $\frac{1}{\sqrt{(a^4 + x^4)}} = q$; quia invenimus

$$dp = 2x dx \quad \& \quad dq = \frac{-2x^3 dx}{(a^4 + x^4)^{\frac{3}{2}}}, \quad \text{erit}$$

$$pdq + qdp = \frac{-2x^4 dx}{(a^4 + x^4)^{\frac{3}{2}}} + \frac{2x dx}{\sqrt{(a^4 + x^4)}} = \frac{2a^4 x dx}{(a^4 + x^4)^{\frac{3}{2}}}.$$

Hinc ergo erit differentiale quaesitum

$$dy = \frac{2a^4 x dx}{(a^4 + x^4) \sqrt{(a^4 + x^4)}}.$$

IV. Si fuerit $y = \frac{x}{x + \sqrt{(1 + xx)}}$.

Ponendo $x = p$ & $\frac{1}{x + \sqrt{(1 + xx)}} = q$, ob $dp = dx$

$$\& \quad dq = \frac{-dx - x dx : \sqrt{(1 + xx)}}{(x + \sqrt{(1 + xx)})^2} = \frac{-dx(x + \sqrt{(1 + xx)})}{(x + \sqrt{(1 + xx)})^2 \sqrt{(1 + xx)}}$$

$$= \frac{-dx}{(x + \sqrt{(1 + xx)}) \sqrt{(1 + xx)}}, \quad \text{erit } pdq + qdp =$$

$$= \frac{-x dx}{(x + \sqrt{(1 + xx)}) \sqrt{(1 + xx)}} + \frac{dx}{x + \sqrt{(1 + xx)}} =$$

$$= \frac{dx(\sqrt{(1 + xx)} - x)}{(x + \sqrt{(1 + xx)}) \sqrt{(1 + xx)}}. \quad \text{Fiet ergo differentiale}$$

$$\text{quaesitum } dy = \frac{dx(\sqrt{(1 + xx)} - x)}{(x + \sqrt{(1 + xx)}) \sqrt{(1 + xx)}}; \text{ cuius fractio}$$

nis si numerator ac denominator multiplicetur per

$$\sqrt{(1 + xx)} - x, \text{ fiet } dy = \frac{dx(1 + 2xx - 2x\sqrt{(1 + xx)})}{\sqrt{(1 + xx)}} =$$

dx

$$\frac{dx + 2xxdx}{\sqrt{(1+xx)}} = 2x dx.$$

Idem differentiale alio modo commodius inveniri potest; cum enim sit $y = \frac{x}{x + \sqrt{(1+xx)}}$, multiplicetur numerator ac denominator per $\sqrt{(1+xx)} - x$, fietque

$$y = x\sqrt{(1+xx)} - xx = \sqrt{(x^2 + x^4)} - xx,$$

cuius differentiale per priorem regulam est

$$dy = \frac{x dx + 2x^3 dx}{\sqrt{(xx + x^4)}} - 2x dx = \frac{dx + 2xx dx}{\sqrt{(1+xx)}} - 2x dx.$$

V. Si fuerit $y = (a+x)(b-x)(x-c)$, erit

$$dy = (a+x)(b-x)dx - (a+x)(x-c)dx + (b-x)(x-c)dx.$$

VI. Si fuerit $y = x(aa+xx)\sqrt{(aa-xx)}$.

Ob tres factores ergo reperietur

$$dy = dx(aa+xx)\sqrt{(aa-xx)} + 2xxdx\sqrt{(aa-xx)} - \frac{xxdx(aa+xx)}{\sqrt{(aa-xx)}} = \frac{dx(a^4 + aa xx - 4x^4)}{\sqrt{(aa-xx)}}.$$

164. Quanquam etiam fractiones in factoribus comprehendendi possunt, tamen commodius utemur regula fractionibus differentiandi inserviente. Sit ergo proposita haec fractio $\frac{p}{q}$; cuius differentiale inveniri oporteat. Quoniam posito $x + dx$ loco x fractio illa abit in

$$\frac{p+dp}{q+dq} = (p+dp)\left(\frac{1}{q} - \frac{dq}{qq}\right) = \frac{p}{q} - \frac{pdq}{qq} + \frac{dp}{q} - \frac{dpdq}{qq},$$

unde si fractio ipsa $\frac{p}{q}$ subtrahatur, remanet eius differentiale

$$d. \frac{p}{q} = \frac{dp}{q} - \frac{pdq}{qq}, \text{ ob evanescentem terminum } \frac{dpdq}{qq}.$$

Hinc

Hinc ergo erit $d. \frac{p}{q} = \frac{q dp - p dq}{qq}$, unde haec regula pro differentiatione cuiusque fractionis enascitur. *A differentiali numeratoris per denominatorem multiplicato subtrahatur differentiale denominatoris per numeratorem multiplicatum, residuum dividatur per quadratum denominatoris, quotusque erit differentiale fractionis quaesitum.* Cuius regulae usus per sequentia exempla illustrabitur.

I. Si fuerit $y = \frac{x}{aa + xx}$, erit per hanc regulam

$$dy = \frac{(aa + xx) dx - 2xx dx}{(aa + xx)^2} = \frac{(aa - xx) dx}{(aa + xx)^2}.$$

II. Si fuerit $y = \frac{\sqrt{aa + xx}}{aa - xx}$; reperitur

$$dy = \frac{(aa - xx) x dx \sqrt{aa + xx} + 2x dx \sqrt{aa + xx}}{(aa - xx)^2},$$

& facta reductione $dy = \frac{(3aa + xx) x dx}{(aa - xx)^2 \sqrt{aa + xx}}.$

Saepe numero expedit ea regula uti, quae sequitur ex formula priori $d. \frac{p}{q} = \frac{dp}{q} - \frac{p dq}{qq}$, qua differentiale fractionis aequale reperitur differentiali numeratoris per denominatorem diviso, demto differentiali denominatoris per numeratorem multiplicato at per quadratum denominatoris diviso. Ita

III. Si fuerit $y = \frac{aa - xx}{a^4 + aaxx + x^4}$, erit

$$dy = \frac{-2x dx}{a^4 + aaxx + x^4} - \frac{(aa - xx)(2aax dx + 4x^3 dx)}{(a^4 + aaxx + x^4)^2}$$

quae ad eundem denominatorem revocata praebet.

$$dy = \frac{-2x dx (2a^4 + 2aaxx - x^4)}{(a^4 + aaxx + x^4)^2}$$

165. Haec iam sufficiunt ad cuiusque functionis rationalis ipsius x propositae differentiale investigandum; si enim fuerit integra modus differentiandi iam supra est expositus. Sit igitur functio proposita fracta, quae semper ad huiusmodi formam reducetur:

$$y = \frac{A + Bx + Cx^2 + Dx^3 + Ex^4 + Fx^5 + \&c.}{a + bx + cx^2 + dx^3 + ex^4 + fx^5 + \&c.}$$

Ponatur numerator $= p$ & denominator $= q$, ut fiat

$$y = \frac{p}{q}; \text{ eritque } dy = \frac{qdp - pdq}{qq}. \text{ At cum sit:}$$

$$p = A + Bx + Cx^2 + Dx^3 + Ex^4 + \&c.$$

$$\& q = a + bx + cx^2 + dx^3 + ex^4 + \&c.$$

$$\text{erit } dp = Bdx + 2Cxdx + 3Dx^2dx + 4Ex^3dx + \&c.$$

$$\& dq = bdx + 2cxdx + 3dx^2dx + 4ex^3dx + \&c.$$

unde per multiplicationem obtinebitur:

$$qdp = aBdx + 2aCxdx + 3aDx^2dx + 4aEx^3dx + \&c.$$

$$\begin{array}{r} bB \\ + 2bC \\ 3B \\ + 23C \\ \delta B \\ + \&c. \end{array}$$

$$pdq = bAdx + bBxdx + bCxd^2dx + bDx^3dx + \&c.$$

$$\begin{array}{r} 23A \\ + 23B \\ 3\delta A \\ + 3\delta B \\ 4\epsilon A \\ + \&c. \end{array}$$

Ex his itaque obtinebitur differentiale quaesitum:

$$dy = \frac{\begin{array}{r} + aB \\ - bA \\ + 2aC \\ - 23A \\ + 3aD \\ + bC \\ - 3B \\ - 3\delta A \\ + 4aE \\ + 2bD \\ - 2\delta B \\ - 4\epsilon A \\ + 5aF \\ + 3bE \\ + 3D \\ - \delta C \\ - 3\epsilon B \\ - 5\zeta A \end{array} dx}{(a + bx + cx^2 + dx^3 + ex^4 + fx^5 + \&c.)^2}.$$

Quae

Quae expressio ad cuiusvis functionis rationalis differentiale expedite inveniendum maxime est accommodata. Quemadmodum enim numerator differentialis ex coefficientibus numeratoris ac denominatoris functionis propositae combinatur, ex inspectione mox intelligitur, denominator vero differentialis est quadratum denominatoris functionis propositae.

166. Si fractionis propositae vel numerator vel denominator vel uterque ex factoribus constet, multiplicatione actu instituta orietur quidem forma, qualem modo differentia-
vimus; attamen facilius pro his casibus regula peculiaris formabitur.

Sit igitur proposita huiusmodi fractio $y = \frac{pr}{q}$.

Ponatur numerator $pr = P$, ut sit $dP = pdr + rdp$. Atque ob $y = \frac{P}{q}$, erit $dy = \frac{qdP - Pdq}{qq}$ substitutis autem loco P & dP valoribus, habebitur:

I. Si fuerit $y = \frac{pr}{q}$; eius diff. $dy = \frac{pqdr + qrdp - prdq}{qq}$.

Si sit $y = \frac{p}{qs}$, posito denominatore $qs = Q$,

erit $dQ = qds + sdq$, & $dy = \frac{Qdp - pdQ}{qqss}$. Quare

II. Si fuerit $y = \frac{p}{qs}$, erit $dy = \frac{qsdp - pqds - psdq}{qqss}$.

Si fuerit $y = \frac{pr}{qs}$, ponatur $pr = P$ & $qs = Q$, ut habeatur

$y = \frac{P}{Q}$, & $dy = \frac{QdP - PdQ}{QQ}$. Cum autem sit

$dP = pdr + rdp$ & $dQ = qds + sdq$,
prodibit sequens differentiatio:

III.

III. Si fuerit $y = \frac{pr}{qs}$,

$$\text{erit } dy = \frac{pqsd r + qrsdp - pqrds - prsdq}{qqss},$$

$$\text{seu } dy = \frac{rdp}{qs} + \frac{pdr}{qs} - \frac{prdq}{qqs} - \frac{prds}{qss}.$$

Simili modo, si numerator ac denominator fractionis propositae plures habeant factores, differentialia eadem ratione investigabuntur; neque ad hoc ampliori manu ductione erit opus. Quamobrem quoque exempla huc pertinentia praetermitto, cum mox modus generalis has omnes differentiandi methodos particulares complectens afferetur.

167. Dantur autem casus tam productorum quam fractionum, quibus differentiale commodius exprimi potest, quam per regulas generaliores hic expositas. Evenit hoc si factores, qui vel functionem ipsam, vel functionis numeratorem aut denominatorem constituunt, fuerint potestates.

Ponamus functionem differentiandam esse $y = p^m q^n$, ad cuius differentiale inveniendum sit $p^m = P$ & $q^n = Q$, ut fiat $y = PQ$ & $dy = PdQ + QdP$. Cum autem sit $dP = mp^{m-1}dp$ & $dQ = nq^{n-1}dq$, fiet his valoribus substitutis: $dy = np^{m-1}q^{n-1}dq + mp^{m-1}q^n dp = p^{m-1}q^{n-1}(npdq + mqdp)$; unde sequens oritur regula:

I. Si fuerit $y = p^m q^n$;

$$\text{erit } dy = p^{m-1}q^{n-1}(npdq + mqdp).$$

Simili modo si tres fuerint factores, differentiale inveniatur, ac reperietur hoc modo expressum.

II. Si fuerit $y = p^m q^n r^k$;

$$\text{erit } dy = p^{m-1}q^{n-1}r^{k-1}(mqrdp + nprdq + kpqdr).$$

168. Sin autem fuerit proposita fractio, cuius vel numerator vel denominator habeat factorem, qui est potestas, regulae quoque particulares tradi poterunt. Sit primum proposita

P

fita

fit a huiusmodi fractio $y = \frac{p^m}{q}$, erit per regulam fractionibus
 intervientem $dy = \frac{mp^{m-1}qdp - p^m dq}{qq}$, quod differentiale com-
 modius sic exprimetur.

I. Si fuerit $y = \frac{p^m}{q}$, erit $dy = \frac{p^{m-1}(mqdp - pdq)}{qq}$.

Sit iam $y = \frac{p}{q^n}$, fiet per eandem superiorem regulam
 $dy = \frac{q^n dp - npq^{n-1}dq}{q^{2n}}$, cuius expressionis si numerator ac
 denominator per q^{n-1} dividatur, erit $dy = \frac{qdp - npdq}{q^{n+1}}$.
 Quamobrem.

II. Si fuerit $y = \frac{p}{q^n}$, erit $dy = \frac{qdp - npdq}{q^{n+1}}$.

Quod si vero proponatur $y = \frac{p^m}{q^n}$; invenietur

$$dy = \frac{mp^{m-1}q^n dp - np^m q^{n-1} dq}{q^{2n}}, \text{ quae reducitur ad}$$

$$dy = \frac{mp^{m-1} qdp - np^m dq}{q^{n+1}}. \text{ Quocirca}$$

III. Si fuerit $y = \frac{p^m}{q^n}$ erit $dy = \frac{p^{m-1}(mqdp - npdq)}{q^{n+1}}$.

Denique si proposita fuerit huiusmodi fractio $y = \frac{p^m}{p^m q^n}$,
 habebitur per regulam fractionum generaleni

$$dy = \frac{p^m q^n dr - mp^{m-1} q^n rdp - np^m q^{n-1} r dq}{p^{2m} q^{2n}},$$

cuius expressionis cum numerator & denominator sit divisibi-
 lis per $p^{m-1} q^{n-1}$:

IV.

IV. Si fuerit $y = \frac{r}{p^m q^n}$;

$$\text{erit } dy = \frac{pqdr - mqr dp - npr dq}{p^m + 1 q^n + 1}.$$

Si plures occurrant factores, huiusmodi regulae speciales, quas verbis exprimere superfluum foret, facili negotio pro quovis casu erui poterunt.

169. Regulae differentiandi quas haecenus exposuimus tam late patent, ut nulla excogitari possit functio ipsius x algebraica, quae non earum ope differentiari queat. Si enim functio ipsius x fuerit rationalis, vel erit integra vel fracta, priori casu §. 159. modum dedimus eiusmodi functiones differentiandi, posteriori vero casu in §. 165. negotium absolvimus. Simul vero etiam compendia, si factores involvantur, differentiationis exhibuimus. Deinde vero etiam quantitates irrationales cuiusvis generis differentiare docuimus, quae quomodocunque functionem propositam afficiant, sive ei per additionem, sive per subtractionem sive multiplicationem sive divisionem sint implicatae, perpetuo ad casus iam tractatos revocari poterunt. Intelligenda autem haec sunt de functionibus explicitis; nam de implicitis, quarum natura per aequationem datur, infra, postquam functiones duarum pluriumve variabilium differentiare docuerimus, tractandi locus erit.

170. Si regulas hic traditas singulas perpendamus atque inter se conferamus, eas omnes ad unam maxime universalem reducere poterimus; quam autem infra demum rigida demonstratione munire licebit; interim tamen & hoc loco non adeo difficile erit eius veritatem attendenti intueri. Functio quaecunque algebraica composita est ex partibus, quae vel additione vel subtractione vel multiplicatione vel divisione inter se erunt complicatae; haeque partes erunt vel rationales vel irrationales. Vocemus ergo istas quantitates functionem quamvis constituentes eius partes. Tum pro qualibet parte functio proposita

ea seorsim ita differentietur, quasi ea pars sola esset variabilis, reliquae vero partes omnes constantes. Quo facto singula ista differentialia, quae ex singulis partibus modo descripto eliciuntur, in unam summam colligantur, sicque obtinebitur differentiale functionis propositae. Huiusque regulae ope omnes omnino functiones differentiari poterunt, nequidem transcendentibus exceptis, uti infra ostendetur.

171. Ad regulam hanc illustrandam ponamus functionem y duabus constare partibus, sive per additionem sive subtractionem connexis, ita ut sit $y = p \pm q$. Ponatur primo sola pars p variabilis, altera q constans erit differentiale $= dp$; deinde ponatur altera pars $\pm q$ sola variabilis, altera vero p constans, eritque differentiale $= \pm dq$. Atque ex his differentialibus differentiale quaesitum ita componetur, ut sit $dy = dp \pm dq$, omnino uti idem iam supra invenimus. Hinc vero simul liquet, si functio pluribus constet partibus, sive invicem additis sive subtractis, nempe $y = p \pm q \pm r \pm s$, ope huius regulae inventum iri $dy = dp \pm dq \pm dr \pm ds$, plane uti & superior regula docebat.

172. Si partes sint in se invicem multiplicatae, ita ut sit $y = pq$, manifestum est posita sola parte p variabili, fore differentiale $= qdp$; at si altera pars q sola variabilis statuatur, erit differentiale $= pdq$. Addantur ergo haec duo differentialia invicem, atque prodibit differentiale quaesitum $dy = qdp + pdq$, quemadmodum ex iam allatis constat. Si plures fuerint partes per multiplicationem connexae, scilicet $y = pqrs$, si successive unaquaeque sola variabilis statuatur, orientur ista differentialia $qrsdp$, $prsdq$, $pqsdr$, & $pqrds$, quorum summa dabit differentiale quaesitum, nempe

$dy = qrsdp + prsdq + pqsdr + pqrds$,
prorsus uti iam ante invenimus. Differentiale ergo ex totidem partibus componitur, sive partes functionem constituentes sint invicem additae subtractaeve, sive in se invicem multiplicatae

173. Si partes functionem formantes per divisionem sint connexae, nempe $y = \frac{p}{q}$ ponatur secundum regulam primum sola pars p variabilis, eritque ob q constans differentiale $= \frac{dp}{q}$; deinde ponatur sola pars q variabilis ob $y = pq^{-1}$, erit differentiale $= -\frac{pdq}{qq}$, quae duo differentia collecta dabunt differentiale functionis propositae

$$dy = \frac{dp}{q} - \frac{pdq}{qq} = \frac{qdp - pdq}{qq},$$

sicut iam supra invenimus. Simili modo si functio proposita sit $y = \frac{pq}{rs}$, ponendo successive singulas partes solas p , q , r & s variables, prodibunt sequentia differentia:

$$\frac{qdp}{rs}; \quad \frac{pdq}{rs}; \quad \frac{-pqdr}{rss}; \quad \& \quad \frac{-pqds}{rss}, \quad \text{unde fit}$$

$$dy = \frac{qrsdp + prsdq - pqsd r - pqrds}{rrss}$$

174. Dummodo ergo singulae partes, ex quibus functio componitur, ita fuerint comparatae; ut earum differentia exhiberi queant, simul quoque totius functionis differentiale inveniri poterit. Quodsi igitur partes fuerint functiones rationales, tum earum differentia non solum ope praeceptorum ante iam datorum inveniuntur, sed ea quoque ex hac ipsa regula generali erui poterunt: sin autem partes fuerint irrationales, quia irrationalitas ad potestates, quarum exponentes sunt numeri fracti, reducitur, eae per differentiationem potestatum, qua est $d x^n = nx^{n-1} dx$ differentiabuntur. Atque, ex eodem fonte haurietur quoque differentiatio eiusmodi formularum irrationalium, quae alias insuper expressiones surdas in-

vo-

volvunt. Unde patet si cum regula generali hic data, infra vero demonstranda, coniungatur regula differentiandi potestates, tum omnium omnino functionum algebraicarum differentialia exhiberi posse.

175. Ex his omnibus iam dilucide sequitur, si y fuerit functio quaecunque ipsius x , differentiale eius dy huiusmodi habiturum esse formam $dy = p dx$, in qua valor ipsius p per praecepta hic exposita semper assignari queat. Erit autem p functio ipsius x quoque algebraica, cum in eius determinationem nullae aliae operationes ingrediantur, nisi consuetae, quibus functiones algebraicae constitui solent. Hancobrem si y fuerit functio algebraica ipsius x , erit quoque $\frac{dy}{dx}$ functio algebraica ipsius x . Atque si z fuerit etiam functio algebraica ipsius x , ita ut sit $dz = q dx$, ob q functionem algebraicam ipsius x , erit quoque $\frac{dz}{dy}$ functio algebraica ipsius x , quippe

quae est $= \frac{q}{p}$. Quare si huiusmodi formulae $\frac{dz}{dy}$ in expressionem cetera algebraicam ingrediantur, eae non impediunt, quominus ea expressio sit algebraica, dummodo y & z fuerint functiones algebraicae.

176. Poterimus autem hoc ratiocinium extendere ad differentialia secunda & superiorum ordinum. Si enim manente y functione algebraica ipsius x , fuerit $dy = p dx$, atque $dp = q dx$; erit sumto differentiali dx constante, $ddy = q dx^2$ uti supra vidimus. Cum igitur ob rationes ante allegatas sit quoque q functio algebraica ipsius x , erit quoque $\frac{ddy}{dx^2}$ non solum quantitas finita, sed etiam functio algebraica ipsius x , dummodo y fuerit eiusmodi functio. Simili modo perspicietur, fore $\frac{d^3y}{dx^3}$, $\frac{d^4y}{dx^4}$, &c. functiones al-

gebraicas ipsius x , modo y fuerit talis; atque si z sit quoque functio algebraica ipsius x , omnes expressiones finitae; quae ex differentialibus cuiusvis ordinis ipsarum y , z , & ex dx componuntur cuiusmodi sunt $\frac{ddy}{ddx}$; $\frac{d^2y}{dx ddy}$; $\frac{dx d^4y}{dy^3 ddx}$; &c. simul erunt functiones algebraicae ipsius x .

177. Cum igitur nunc methodus sit tradita cuiusque functionis ipsius x algebraicae differentiale primum invenienti, eadem methodo poterimus quoque differentialia secunda altiorumque ordinum investigare. Si enim y fuerit functio quaecunque algebraica ipsius x , ex eius differentiatione $dy = p dx$ innotescet valor ipsius p . Qui si denuo differentietur atque reperiatur $dp = q dx$, erit $ddy = q dx^2$, posito dx constante, sicque definietur differentiale secundum. Differentiando porro q , ut sit $dq = r dx$, habebitur differentiale tertium $d^2y = r dx^3$; sicque ulterius differentialia altiorum ordinum indagabuntur; quoniam quantitates p , q , r , &c. omnes sunt functiones ipsius x algebraicae, ad quas differentiandas praecepta data sufficiunt. Hoc ergo efficietur continua differentiatione; omissis enim dx , in differentiatione ipsius y , prodibit valor ipsius $\frac{dy}{dx} = p$, qui denuo differentiat ac divisus per dx , quod fit dum ubique differentiale dx omittatur, dabit valorem ipsius $q = \frac{ddy}{dx^2}$. Simili modo porro invenitur $r = \frac{d^3y}{dx^3}$ &c.

I. Sit $y = \frac{aa}{aa + xx}$ cuius differentialia tam prima quam sequentium ordinum requiruntur.

Primum ergo differentiando simulque per dx dividendo erit $\frac{dy}{dx} = \frac{-2aax}{(aa + xx)^2}$, hincque porro ddy

$$\frac{ddy}{dx^2} = \frac{-2a^4 + 6aaxx}{(aa + xx)^3}$$

$$\frac{d^3y}{dx^3} = \frac{24a^4x - 24aax^3}{(aa + xx)^4}$$

$$\frac{d^4y}{dx^4} = \frac{24a^6 - 240a^4xx + 120aax^4}{(aa + xx)^5}$$

$$\frac{d^5y}{dx^5} = \frac{-720a^6x + 2400a^4x^3 - 720aax^5}{(aa + xx)^6}$$

&c.

II. Sit $y = \frac{1}{\sqrt{(1-xx)}}$, eruntque differentialia primum
& sequentia :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x}{(1-xx)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\frac{ddy}{dx^2} = \frac{1 + 2xx}{(1-xx)^{\frac{5}{2}}}$$

$$\frac{d^3y}{dx^3} = \frac{9x + 6x^3}{(1-xx)^{\frac{7}{2}}}$$

$$\frac{d^4y}{dx^4} = \frac{9 + 72x^2 + 24x^4}{(1-xx)^{\frac{9}{2}}}$$

$$\frac{d^5y}{dx^5} = \frac{225x + 600x^3 + 120x^5}{(1-xx)^{\frac{11}{2}}}$$

$$\frac{d^6y}{dx^6} = \frac{225 + 4050x^2 + 5400x^4 + 720x^6}{(1-xx)^{\frac{13}{2}}}$$

&c.

Hæc

Haec Differentialia facile ulterius continuantur; interim tamen lex, qua termini eorum progrediuntur, non cito patet. Coefficientis quidem supremarum ipsius x potestatum semper est productum numerorum naturalium ab 1 usque ad ordinem differentialis, quod quaeritur. Interim si has formas ulterius continuemus atque perpendamus,prehendemus fore genera-

liter, si $y = \frac{1}{\sqrt{(1-xx)}}$,

$$\begin{aligned} \frac{d^n y}{dx^n} = & \frac{1.2.3 \dots n}{(1-xx)^{n+\frac{1}{2}}} \left(x^n + \frac{1}{2} \cdot \frac{n(n-1)}{1.2} x^{n-2} + \right. \\ & \frac{1.3}{2.4} \cdot \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{1.2.3.4} x^{n-4} + \frac{1.3.5}{2.4.6} \cdot \frac{n(n-1)\dots(n-5)}{1.2\dots6} x^{n-6} \\ & \left. + \frac{1.3.5.7}{2.4.6.8} \cdot \frac{n(n-1)\dots(n-7)}{1.2\dots8} x^{n-8} + \&c. \right) \end{aligned}$$

Huiusmodi ergo exempla non solum inserviunt ad habitum in differentiationis negotio acquirendum, sed etiam leges, quae in differentialibus omnium ordinum observantur, per se sunt notatu dignissimae, atque ad alias inventiones deducere possunt.



CAPUT VI.

DE DIFFERENTIATIONE FUNCTIONUM
TRANSCENDENTIUM.

178.

Praeter infinita quantitatum transcendentium seu non algebraicarum genera, quae calculus integralis suppeditabit, in introductione ad analysin infinitorum ad cognitionem aliquot huiusmodi quantitatum magis usitatarum nobis pervenire licuit, quas doctrina de logarithmis & arcubus circularibus suggererat. Quoniam igitur harum quantitatum naturam tam dilucide exposuimus, ut fere eadem facilitate atque quantitates algebraicae in calculo tractari queant, earum quoque differentia- lia in hoc capite investigabimus, quo earum indoles ac proprietates clarius perspiciantur; hocque pacto aditus ad calculum integralem, qui quantitatum transcendentium est fons proprius, patefiat.

179. Primum igitur occurrunt quantitates logarithmi- cae, seu eiusmodi functiones ipsius x , quae praeter expressio- nes algebraicas quoque logarithmum ipsius x , seu cuiusvis ipsi- us functionis involvunt. Ad quas differentiandas, cum quan- titates algebraicae nullum negotium amplius facessant, omnis difficultas in inveniendi differentiali logarithmi cuiusque ipsi- us x functionis erit posita. Quia vero logarithmorum pluri- ma dantur genera diversa, quae tamen inter se constantes te- nent rationes, hic logarithmos hyperbolicos potissimum con- templabimur, cum ex iis omnes reliqui logarithmi facile for- mentur. Si enim functionis p logarithmus hyperbolicus fuerit $= lp$, tum eiusdem functionis p logarithmus ex alio canone desumptus erit $= mlp$, denotante m numerum, quo relatio
huius

huius logarithmorum canonis ad hyperbolicos exprimitur. Hanc ob causam *lp* perpetuo hic designabit logarithmum hyperbolicum quantitatis *p*.

180. Quaeramus ergo differentiale logarithmi hyperbolici quantitatis *x*, ponaturque $y = lx$, ita ut differentialis dy valor definiri debeat. Ponatur $x + dx$ loco x , sicque transibit y in $y' = y + dy$; quare habebitur

$$y + dy = l(x + dx) \text{ \& } dy = l(x + dx) - lx = l\left(1 + \frac{dx}{x}\right).$$

At iam supra logarithmum hyperbolicum huiusmodi expressionis $1 + z$ ita per seriem infinitam expressimus, ut esset

$$l(1 + z) = z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \frac{z^4}{4} + \&c.$$

Posito ergo $\frac{dx}{x}$ pro z , obtinebimus:

$$dy = \frac{dx}{x} - \frac{dx^2}{2x^2} + \frac{dx^3}{3x^3} - \&c.$$

Cum igitur huius seriei omnes termini prae primo evanescent, erit $d. lx = dy = \frac{dx}{x}$. Unde alius cuiuscunque logarithmi, cuius ad hyperbolicum ratio est ut $n:1$, differentiale erit $= \frac{ndx}{x}$.

181. Si igitur cuiusque ipsius x functionis p logarithmus lp proponatur, eodem ratiocinio reperietur eius differentiale esse $= \frac{dp}{p}$, unde ad logarithmorum differentialia invenienda haec habetur regula. *Quantitatis p, cuius logarithmus proponitur, sumatur differentiale, hocque per ipsam quantitatem p divisum dabit differentiale logarithmi quaesitum.* Sequi-

quitur haec eadem regula quoque ex forma $\frac{p^{\omega}-1^{\omega}}{\omega}$, ad quam superiori libro logarithmum ipsius p reduximus. Sit $\omega=0$, & cum sit

$$lp = \frac{p^{\omega}-1^{\omega}}{\omega} : \text{erit } d.lp = d.\frac{1}{\omega} p^{\omega} = p^{\omega-1} dp = \frac{dp}{p} \text{ ob } \omega=0.$$

Notandum autem est $\frac{dp}{p}$ esse differentiale logarithmi hyperbolici ipsius p ; ita ut, si logarithmus vulgaris ipsius p proponeretur, differentiale illud $\frac{dp}{p}$ multiplicari deberet per hunc numerum 0,43429448 &c.

182. Ope huius ergo regulae, cuiuscunque functionis ipsius x logarithmus proponatur, eius differentiale facillime inveniri poterit, quemadmodum ex sequentibus exemplis perspicietur:

I. Si fit $y = lx$; erit $dy = \frac{dx}{x}$.

II. Si fit $y = lx^n$; ponatur $x^n = p$, ut fit $y = lp$, eritque $dy = \frac{dp}{p}$. At est $dp = nx^{n-1} dx$, unde fit $dy = \frac{ndx}{x}$.

Idem quoque ex logarithmorum natura colligitur; cum enim fit $lx^n = nlx$, erit $d.lx^n = nd.lx = \frac{ndx}{x}$.

III. Si fit $y = l(1+xx)$, erit $dy = \frac{2x dx}{1+xx}$.

IV. Si fit $y = l \frac{1}{\sqrt{1-xx}}$; quia erit $y = -l\sqrt{1-xx}$
 $= -\frac{1}{2} l(1-xx)$, invenitur $dy = \frac{x dx}{1-xx}$.

V.

V. Si fit $y = l \frac{x}{\sqrt{1+xx}}$, ob $y = lx - \frac{1}{2} l(1+xx)$,

$$\text{fiet } dy = \frac{dx}{x} - \frac{x dx}{1+xx} = \frac{dx}{x(1+xx)}.$$

VI. Si fit $y = l(x + \sqrt{1+xx})$, fiet

$$dy = \frac{dx + x dx : \sqrt{1+xx}}{x + \sqrt{1+xx}} = \frac{x dx + dx \sqrt{1+xx}}{(x + \sqrt{1+xx}) \sqrt{1+xx}}$$

cuius fractionis cum numerator ac denominator per

$$x + \sqrt{1+xx} \text{ fit divisibilis fiet } dy = \frac{dx}{\sqrt{1+xx}}.$$

VII. Si fit $y = \frac{1}{\sqrt{-1}} l(x\sqrt{-1} - 1 + \sqrt{1-xx})$, ponatur

$$x\sqrt{-1} = z. \text{ Atque ob } y = \frac{1}{\sqrt{-1}} l(z + \sqrt{1+zx}),$$

$$\text{erit per praecedens } dy = \frac{1}{\sqrt{-1}} dz : \sqrt{1+zx}.$$

$$\text{Quare, ob } dz = dx \sqrt{-1}, \text{ fiet } dy = \frac{dx}{\sqrt{1-xx}}.$$

Quamvis ergo logarithmus propositus imaginaria involvat, tamen eius differentiale fit reale.

183. Si quantitas, cuius logarithmus proponitur, habeat factores, tum ipse logarithmus in plures alios resolvetur hoc modo: Si proponatur $y = lpqrs$, quia erit

$$y = lp + lq + lr + ls, \text{ erit } dy = \frac{dp}{p} + \frac{dq}{q} + \frac{dr}{r} + \frac{ds}{s}.$$

Haec resolutio pariter locum habet, si illa quantitas, cuius logarithmus differentiari debet, fuerit fractio. Sit enim

$$y = l \frac{pq}{rs}, \text{ ob } y = lp + lq - lr - ls, \text{ erit } dy = \frac{dp}{p} + \frac{dq}{q} - \frac{dr}{r} - \frac{ds}{s}.$$

Neque etiam potestates difficultatem movebunt, si enim

fuerit $y = l \frac{p^m q^n}{r^\mu s^\nu}$, ob $y = mlp + nq - \mu r - \nu s$,

$$\text{erit } dy = \frac{mdp}{r^\mu s^\nu} + \frac{ndq}{r^\mu s^\nu} - \frac{\mu dr}{r^{\mu+1} s^\nu} - \frac{\nu ds}{r^\mu s^{\nu+1}}.$$

I. Si fuerit $y = l(a+x)(b+x)(c+x)$, quia erit $y = l(a+x) + l(b+x) + l(c+x)$, fiet differentiale quaesitum

$$dy = \frac{dx}{a+x} + \frac{dx}{b+x} + \frac{dx}{c+x}.$$

II. Si fuerit $y = \frac{1}{2} l \frac{1+x}{1-x}$, erit $y = \frac{1}{2} l(1+x) - \frac{1}{2} l(1-x)$,

$$\text{hincque } dy = \frac{\frac{1}{2} dx}{1+x} + \frac{\frac{1}{2} dx}{1-x} = \frac{dx}{1-x^2}.$$

III. Si fit $y = \frac{1}{2} l \frac{\sqrt{1+xx} + x}{\sqrt{1+xx} - x}$, ob $y = \frac{1}{2} l(\sqrt{1+xx} + x)$

$$- \frac{1}{2} l(\sqrt{1+xx} - x), \text{ erit } dy = \frac{\frac{1}{2} dx}{\sqrt{1+xx}} + \frac{\frac{1}{2} dx}{\sqrt{1+xx}} =$$

$\frac{dx}{\sqrt{1+xx}}$. Hoc idem facilius invenitur, si in fractione

$\frac{\sqrt{1+xx} + x}{\sqrt{1+xx} - x}$, irrationalitas in denominatore tollatur multi-

plicando numeratorem ac denominatorem per $\sqrt{1+xx} + x$, prodibit enim

$$y = \frac{1}{2} l(\sqrt{1+xx} + x)^2 = l(\sqrt{1+xx} + x),$$

$$\text{cuius differentiale ante vidimus esse } dy = \frac{dx}{\sqrt{1+xx}}.$$

IV. Si fit $y = l \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}$. Ponatur huius

fractionis numerator $\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} = p$ & de-

nominator $\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x} = q$, erit $y = l \frac{p}{q} = lp - lq$,

$$\& dy = \frac{dp}{p} - \frac{dq}{q}. \text{ Est vero } dp = \frac{dn}{2\sqrt{1+n}} - \frac{dn}{2\sqrt{1-n}} = \\ = \frac{-dn}{2\sqrt{1-nn}} (\sqrt{1+n} - \sqrt{1-n}) = \frac{-qdn}{2\sqrt{1-nn}}; \&$$

$$dq = \frac{dn}{2\sqrt{1+n}} + \frac{dn}{2\sqrt{1-n}} = \frac{pdn}{2\sqrt{1-nn}}. \text{ Hinc fiet}$$

$$\frac{dp}{p} - \frac{dq}{q} = \frac{-qdn}{2p\sqrt{1-nn}} - \frac{pdn}{2q\sqrt{1-nn}} = \frac{-(pp+qq)dn}{2pq\sqrt{1-nn}}.$$

At est $pp + qq = 4$ & $pq = 2n$, unde erit

$$dy = -\frac{dn}{n\sqrt{1-nn}}. \text{ Hoc autem differentiale facilius in-}$$

venietur, si logarithmus propositus ita transformetur,

$$y = l \frac{1+\sqrt{1-nn}}{n} = l \left(\frac{1}{n} + \sqrt{\frac{1}{nn} - 1} \right).$$

Posito enim $\frac{1}{n} + \sqrt{\frac{1}{nn} - 1} = p$, erit

$$dp = \frac{-dn}{nn} - \frac{dn}{n^3 \sqrt{\frac{1}{nn} - 1}} = \frac{-dn}{nn} - \frac{dn}{nn \sqrt{1-nn}} \\ = \frac{-dn(1+\sqrt{1-nn})}{nn \sqrt{1-nn}}, \text{ ideoque, ob } p = \frac{1+\sqrt{1-nn}}{n},$$

$$\text{erit } dy = \frac{dp}{p} = \frac{-dn}{n \sqrt{1-nn}} \text{ ut ante.}$$

184. Cum igitur logarithmorum differentialia prima, si per dx dividantur, sint quantitates algebraicae, differentialia secunda ac sequentium ordinum per praecepta praecedentis capituli facile inveniuntur, si quidem differentiale dx assumatur constans. Sic posito

$$x =$$

$$\begin{aligned}
 y &= \ln, & \text{erit} \\
 dy &= \frac{dx}{x}, & \& \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x} \\
 ddy &= \frac{-dx^2}{x^2}, & \& \frac{ddy}{dx^2} = \frac{-1}{x^2} \\
 d^3y &= \frac{2dx^3}{x^3}, & \& \frac{d^3y}{dx^3} = \frac{2}{x^3} \\
 d^4y &= \frac{-6dx^4}{x^4}, & \& \frac{d^4y}{dx^4} = \frac{-6}{x^4}
 \end{aligned}$$

Atque si p fuerit quantitas algebraica, sitque $y = lp$, etiam si y non sit quantitas algebraica, tamen $\frac{dy}{dx}$; $\frac{ddy}{dx^2}$; $\frac{d^3y}{dx^3}$; &c. erunt functiones algebraicae ipsius x .

185. Expofita logarithmorum differentiatione, functiones, quae ex algebraicis ac logarithmis sunt permixtae, facile differentiabuntur, perinde atque eae, quae ex logarithmis solis componuntur; uti ex fequentibus exemplis fiet perfpicuum.

I. Si fit $y = (lx)^n$, ponatur $lx = p$, atque ob $y = p^n$ erit $dy = 2pdp$; verum $dp = \frac{dx}{x}$; ideoque erit $dy = \frac{2dx}{x} \ln$.

II. Simili modo fi fit $y = (lx)^n$, erit $dy = \frac{ndx}{x} (lx)^{n-1}$,

unde, fi fit $y = \sqrt{lx}$, ob $n = \frac{1}{2}$, erit $dy = \frac{dx}{2x\sqrt{lx}}$.

III. Atque fi p fuerit functio quaecunque ipsius x , ponaturque $y = (lp)^n$, erit $dy = \frac{ndp}{p} (lp)^{n-1}$. Quare cum differentiale dp per praecedentia assignari poffit, erit quoque differentiale ipsius y cognitum.

IV. Si fit $y = lp \cdot lq$, fuerintque p & q functiones quaecun-

cunque ipsius x , per regulam factorum supra datam erit

$$dy = \frac{dp}{p} lq + \frac{dq}{q} lp.$$

V. Si fit $y = x l x$; erit per eandem regulam

$$dy = dx l x + \frac{x dx}{x} = dx l x + dx.$$

VI. Si fit $y = x^m l x - \frac{1}{m} x^m$, differentiatione secundum partes instituta, reperietur $d x^m l x = m x^{m-1} dx l x + x^{m-1} dx$, & $d \frac{1}{m} x^m = x^{m-1} dx$, unde erit $dy = m x^{m-1} dx l x$.

VII. Si fit $y = x^m (l x)^n$, fiet $dy = m x^{m-1} dx (l x)^n + n x^{m-1} dx (l x)^{n-1}$.

VIII. Si logarithmi logarithmorum occurrant, uti si fuerit $y = l l x$, ponatur $l x = p$, erit $y = l p$, & $dy = \frac{dp}{p}$; at est $dp = \frac{dx}{x}$; unde fiet $dy = \frac{dx}{x l x}$.

IX. Atque si fuerit $y = l l l x$, si statuatur $l x = p$, fiet $y = l l p$, eritque per exemplum praecedens $dy = \frac{dp}{p l p}$; at est $dp = \frac{dx}{x}$, quibus valoribus substitutis habebitur $dy = \frac{dx}{x l x l l x}$.

186. Expofita logarithmorum differentiatione, progrediamur ad quantitates exponentiales, seu eiusmodi potestates, quarum exponentes sint variables. Huiusmodi autem ipsius x functionum differentialia per logarithmorum differentiationem inveniri possunt hoc modo. Quaeratur differentiale ipsius a^x , ad quod investigandum ponatur $y = a^x$, eritque logarithmis sumendis $l y = x l a$. Sumantur iam differentialia, atque obti-

R

nebi-

nebitur $\frac{dy}{y} = dxla$; unde fit $dy = ydxa$, cum autem fit $y = a^x$, erit $dy = a^x dxa$, quod est differentiale ipsius a^x . Simili modo, si fit p functio quaecunque ipsius x , huius quantitatis exponentialis a^p differentiale erit $= a^p dpla$.

187. Hoc idem autem differentiale immediate ex natura quantitatum exponentialium in introductione expofita deduci potest. Sit enim propofita a^p , denotante p functionem quamcunque ipsius x , quae, pofito $x + dx$ loco x , abeat in $p + dp$. Unde fi ponatur $y = a^p$, fi x abeat in $x + dx$, erit $y + dy = a^{p+dp}$, ideoque $dy = a^{p+dp} - a^p = a^p (a^{dp} - 1)$. Oftendimus autem fupra, quamvis quantitatem exponentialem a^z , per huiusmodi feriem exprimi $1 + zla + \frac{z^2(la)^2}{2} + \frac{z^3(la)^3}{6} + \&c.$

unde erit $a^{dp} = 1 + dpla + \frac{dp^2(la)^2}{2} + \&c.$, & $a^{dp} - 1 = dpla$,

quia fequentes termini prae $dpla$ omnes evanefcunt. Confequenter erit $dy = d.a^p = a^p dpla$. Quare quantitatis exponentialis a^p differentiale erit productum ex ipfa quantitate exponentiali, exponentis differentiali dp , & logarithmo quantitatis constantis a , quae ad exponentem variabilem eft evelta.

188. Si igitur e fit numerus, cuius logarithmus hyperbolicus eft $= 1$, ut fit $le = 1$, erit quantitatis e^x differentiale $= e^x dx$. Atque fi dx fumatur constans, erit huius differentiale $= e^x dx^2$, quod eft differentiale fecundum ipsius e^x . Simili modo differentiale tertium erit $= e^x dx^3$. Quare fi fit

$$y = e^{nx}, \text{ erit } \frac{dy}{dx} = ne^{nx}, \text{ \& } \frac{ddy}{dx^2} = n^2 e^{nx}$$

$$\text{porroque } \frac{d^3y}{dx^3} = n^3 e^{nx}; \quad \frac{d^4y}{dx^4} = n^4 e^{nx}; \quad \&c.$$

Unde patet ipsius e^{nx} differentialia primum, fecundum & reli-

reliqua sequentia constituere progressionem geometricam :
eritque ergo differentiale ordinis m ipsius $e^{nx} = y$, nempe

$$\frac{d^m y}{dx^m} = n^m e^{nx}; \text{ hincque igitur } \frac{d^m y}{y dx^m} \text{ quantitas constans } n^m.$$

189. Si ipsa quantitas, quae elevatur, fuerit variabilis, eius differentiale simili modo investigabitur. Sint p & q functiones quaecunque ipsius x , ac proponatur quantitas exponentialis $y = p^q$. Sumtis logarithmis erit $ly = qlp$,

$$\text{quibus differentiatitis erit } \frac{dy}{y} = dqlp + \frac{qdp}{p}, \text{ unde fit}$$

$$dy = ydqlp + \frac{yqdp}{p} = p^q dqlp + qp^{q-1} dp, \text{ ob } y = p^q. \text{ Hoc}$$

ergo differentiale constat duobus membris, quorum prius $p^q dqlp$ oritur, si quantitas proposita p^q ita differentietur, quasi p esset quantitas constans, solusque exponens q variabilis: alterum vero membrum $qp^{q-1} dp$ oritur, si in quantitate proposita p^q exponens q tanquam constans spectetur, solaque quantitas p , quasi esset variabilis, tractetur. Hocque ergo differentiale per regulam generalem differentianti supra traditam inveniri potuisset.

190. Eiusdem vero expressionis p^q differentiale quoque ex natura quantitatum exponentialium erui potest hoc modo: sit $y = p^q$, eritque, loco x posito $x + dx$, utique $y + dy = (p + dp)^{q + dq}$, quae expressio, si more solito in seriem resolvatur, fiet

$$y + dy = p^{q+1q} + (q + dq) p^{q+1q-1} dp \\ + \frac{(q + dq)(q + dq - 1)}{1 \cdot 2} p^{q+1q-2} dp^2 + \&c.$$

ideoque

$$dy = p^{q+1q} - p^q + (q + dq) p^{q+1q-1} dp;$$

sequentes enim termini, qui altiores ipsius dp potestates involvunt, prae $(q + dq) p^{q+1q-1} dp$ evanescent. At est

R 2

p^q

$p^{q+1} - p^q = p^q (p^1 - 1) = p^q (1 + dq p + \frac{dq^2 (1p)^2}{2} + \&c. - 1)$
 $= p^q dq p$. In altero vero termino $(q + dq) p^{q+1} dp$ si
 loco $q + dq$ scribamus q , orietur $q p^{q-1} dp$, ideoque differen-
 tiale erit ut ante $dy = p^q dq p + q p^{q-1} dp$.

191. Facilius vero hoc idem differentiale ex natura
 quantitatum exponentialium investigabitur, hoc modo: Cum,
 sumto e pro numero, cuius logarithmus hyperbolicus est $= 1$,
 sit $p^q = e^{q p}$, utriusque enim logarithmus est idem $q p$; erit
 $y = e^{q p}$. Quare, cum nunc quantitas elevata e sit con-
 stans, erit $dy = e^{q p} \left(dq p + \frac{q dp}{p} \right)$, uti ante ostendimus in
 regula §. 187. data. Restituatur igitur p^q loco $e^{q p}$, fietque
 $dy = p^q dq p + p^q q dp : p = p^q dq p + q p^{q-1} dp$.
 Si igitur fuerit $y = x^x$, erit $dy = x^x dx l x + x^x dx$;
 atque hinc quoque eius ulteriora differentialia definientur: re-
 perietur enim:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = x^x \left(\frac{1}{x} + (1 + l x)^2 \right)$$

$$\frac{d^3 y}{dx^3} = x^x \left((1 + l x)^3 + \frac{3(1 + l x)}{x} - \frac{1}{xx} \right)$$

&c.

192. Inter differentialia huiusmodi functionum, quae
 quantitates exponentiales complectuntur, imprimis sunt no-
 tanda sequentia exempla, quae ex differentiatione formulae
 $e^x p$ originem habent; est autem

$$d e^x p = e^x dp + e^x p dx = e^x (dp + p dx).$$

I. Si sit $y = e^x x^n$; erit $dy = e^x n x^{n-1} dx + e^x x^n dx$
 seu $dy = e^x dx (n x^{n-1} + x^n)$

II. Si sit $y = e^x (x - 1)$

$$\text{Erit } dy = e^x x dx.$$

III,

III. Si sit $y = e^x (x^2 - 2x + 2)$

Erit $dy = e^x x dx$.

IV. Si sit $y = e^x (x^3 - 3x^2 + 6x - 6)$

Erit $dy = e^x x^2 dx$.

193. Si ipsi exponentes fuerint denuo quantitates exponentiales, differentiatio secundum eadem praecepta instituetur.

Sic si haec quantitas e^{e^x} differentiari debeat, statuatur

$e^x = p$, ut sit $y = e^{e^x} = e^p$, erit $dy = e^p dp$; at est $dp = e^x dx$, unde si fuerit

$$y = e^{e^x}; \text{ erit } dy = e^{e^x} e^x dx,$$

$$\text{atque si sit } y = e^{e^{e^x}}; \text{ erit } dy = e^{e^{e^x}} e^{e^x} e^x dx.$$

Quod si vero fuerit $x = p$, statuatur $q' = z$, erit $dy = p^z dz + zp^{z-1} dp$; at $dz = q' dr + r q'^{-1} dq$, unde $dy = p^z q' dr + p^z r q'^{-1} dq + p^z q' dp$.

Quare si sit:

$$y = p^{q'}; \text{ erit } dy = p^{q'} \left(dr + \frac{rdq}{q'} + \frac{dp}{p} \right).$$

Hoc ergo modo, quaecunque occurrat quantitas exponentialis, eius differentiale inveniri poterit.

194. Pergamus ergo ad quantitates transcendentes, ad quarum cognitionem consideratio arcuum circularium nos supra deduxit. Sit igitur in circulo, cuius radium constanter ponimus unitati aequalem, propositus arcus, cuius sinus sit

$=x$, quem arcum hoc modo exprimamus. A $\sin x$, huiusque arcus differentiale investigemus, seu incrementum quod accipit, si sinus x differentiali suo dx augeatur. Hoc autem ex differentiatione logarithmorum praestari poterit, quia in introductione ostendimus hanc expressionem A $\sin x$ reduci posse ad hanc logarithmicam:

$$\frac{1}{\sqrt{-1}} l(\sqrt{(1-xx)} + x\sqrt{-1}). \text{ Posito ergo } y = A \sin x, \text{ erit quoque}$$

$$y = \frac{1}{\sqrt{-1}} l(\sqrt{(1-xx)} + x\sqrt{-1}); \text{ quae differentiata dat}$$

$$dy = \frac{\frac{1}{\sqrt{-1}} \left(\frac{-x dx}{\sqrt{(1-xx)}} + dx\sqrt{-1} \right)}{\sqrt{(1-xx)} + x\sqrt{-1}} = \frac{dx(x\sqrt{-1} + \sqrt{(1-xx)})}{(\sqrt{(1-xx)} + x\sqrt{-1})\sqrt{(1-xx)}}$$

$$\text{unde fit } dy = \frac{dx}{\sqrt{(1-xx)}}.$$

195. Istud arcus circularis differentiale etiam hoc modo facilius sine logarithmorum subsidio inveniri potest. Si enim sit $y = A \sin x$, erit x sinus arcus y , seu $x = \sin y$. Cum igitur, posito $x + dx$ loco x , abeat y in $y + dy$, fiet $x + dx = \sin(y + dy)$. At quia est

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b, \text{ erit}$$

$$\sin(y + dy) = \sin y \cos dy + \cos y \sin dy;$$

arcus autem evanescens dy sinus ipsi illi arcui dy , eiusque cosinus sinui toti aequatur, hanc ob rem fiet

$$\sin(y + dy) = \sin y + dy \cos y, \text{ ideoque } x + dx = \sin y + dy \cos y.$$

Quia vero est

$$\sin y = x, \text{ erit cosinus ipsius } y \text{ seu } \cos y = \sqrt{(1-xx)},$$

$$\text{quibus valoribus substitutis, erit } dx = dy \sqrt{(1-xx)},$$

$$\text{ex qua obtinebitur } dy = \frac{dx}{\sqrt{(1-xx)}}.$$

Ar-

Arcus ergo, cuius sinus proponitur, differentiale aequatur differentiali sinus per cosinum diviso.

196. Cum igitur, si p fuerit functio quaecunque ipsius x , atque y denotet arcum, cuius sinus est $= p$, seu

$$y = A \sin p, \text{ sit huius arcus differentiale } dy = \frac{dp}{\sqrt{(1 - pp)}},$$

ubi $\sqrt{(1 - pp)}$ exprimit cosinum eiusdem arcus, inveniri quoque poterit differentiale arcus, cuius cosinus proponitur.

Sit enim $y = A \cos x$, erit eiusdem arcus sinus $= \sqrt{(1 - xx)}$, ideoque $y = A \sin \sqrt{(1 - xx)}$. Facto ergo $p = \sqrt{(1 - xx)}$, erit

$$dp = \frac{-x dx}{\sqrt{(1 - xx)}}, \text{ \& } \sqrt{(1 - pp)} = x; \text{ unde fiet } dy = \frac{-dx}{\sqrt{(1 - xx)}}.$$

Arcus ergo, cuius cosinus proponitur, differentiale aequatur differentiali cosinus negative sumto, atque per sinum eiusdem arcus diviso. Quod etiam hoc modo ostendi potest:

$$\text{si sit } y = A \cos x, \text{ ponatur } z = A \sin x, \text{ erit } dz = \frac{dx}{\sqrt{(1 - xx)}}$$

at arcus $y + z$ simul sumti dant arcum constantem 90° , eritque $y + z = \text{constans}$ ideoque $dy + dz = 0$, seu $dy = -dz$;

$$\text{unde fit } dy = \frac{-dx}{\sqrt{(1 - xx)}}, \text{ ut ante.}$$

197. Si arcus proponatur differentiandus, cuius tangens detur, ita ut sit $y = A \tan x$. Arcus autem cuius

$$\text{tangens est } x, \text{ sinus erit } = \frac{x}{\sqrt{(1 + xx)}}, \text{ \& cosinus } = \frac{1}{\sqrt{(1 + xx)}}.$$

$$\text{Posito ergo } \frac{x}{\sqrt{(1 + xx)}} = p, \text{ ut sit } \sqrt{(1 - pp)} = \frac{1}{\sqrt{(1 + xx)}},$$

fiet $y = A \sin p$: unde per regulam modo datam erit

$$dy = \frac{dp}{\sqrt{(1 - pp)}}. \text{ At, ob } p = \frac{x}{\sqrt{(1 + xx)}}, \text{ erit } dp = \frac{dx}{(1 + xx)^{\frac{3}{2}}};$$

qui-

quibus valoribus substitutis fiet $dy = \frac{dx}{1+xx}$, Arcus ergo, cuius tangens proponitur, differentiale acquatur differentiali tangens per quadratum secantis diviso. Est enim $\sqrt{(1+xx)}$ secans, si x sit tangens.

198. Simili modo si proponatur arcus, cuius cotangens datur, ita ut sit $y = A \cot x$; quia eiusdem arcus tangens est $= \frac{1}{x}$, posita $\frac{1}{x} = p$, erit $y = A \tan p$, ac

propterea $dy = \frac{dp}{1+pp}$. Cum nunc sit $dp = \frac{-dx}{xx}$, facta

substitutione, erit $dy = \frac{-dx}{1+xx}$, quod est differentiale cotangens negative sumtum, atque per quadratum cosecantis divisum. Porro si proponatur $y = A \sec x$, quia est

$y = A \cos \frac{1}{x}$, fiet $dy = \frac{dx}{xx\sqrt{(1-\frac{1}{xx})}} = \frac{dx}{x\sqrt{(xx-1)}}$. At-

que, si sit $y = A \operatorname{cosec} x$, erit $y = A \sin \frac{1}{x}$, ideoque

$dy = \frac{-dx}{x\sqrt{(xx-1)}}$. Saepe etiam sinus versus occurrit; ita si proponatur $y = A \operatorname{fv} x$, quia est $y = A \cos(1-x)$, huiusque arcus sinus est $= \sqrt{(2x-xx)}$, fiet $dy = \frac{dx}{\sqrt{(2x-xx)}}$.

199. Quamquam ergo arcus, cuius sinus, vel cosinus, vel tangens, vel cotangens, vel secans, vel cosecans, vel denique sinus versus datur, est quantitas transcendens, tamen eius differentiale, si per dx dividatur, erit quantitas algebraica, ac propterea quoque eius differentialia secunda, tertia, quarta &c. si per potestates ipsius dx convenientes dividantur.

tur. Ceterum, quo haec differentiatio melius percipiatur, adiunximus sequentia exempla.

I. Si fit $y = A \sin 2n\sqrt{1-xn}$, ponatur $p = 2n\sqrt{1-xn}$, ut fit $y = A \sin p$, eritque $dy = \frac{dp}{\sqrt{1-pp}}$. At est $dp = 2 dx \sqrt{1-xn} - \frac{2nx dx}{\sqrt{1-xn}} = \frac{2 dx (1-2nx)}{\sqrt{1-xn}}$, & $\sqrt{1-pp} = 1-2nx$, quibus valoribus substitutis, erit $dy = \frac{2 dx}{\sqrt{1-xn}}$. Quod etiam inde patet, quod $2n\sqrt{1-xn}$ fit sinus arcus dupli, dum n est sinus simpli, erit ergo $y = 2A \sin n$, ideoque $dy = \frac{2 dx}{\sqrt{1-xn}}$.

II. Si fit $y = A \sin \frac{1-xn}{1+nx}$, ponatur $\frac{1-xn}{1+nx} = p$, erit $dp = \frac{-4nx dx}{(1+nx)^2}$ & $\sqrt{1-pp} = \frac{2n}{1+nx}$. Quare cum fit $dy = \frac{dp}{\sqrt{1-pp}}$, erit $dy = \frac{-2 dx}{1+nx}$.

III. Si fit $y = A \sin \sqrt{\frac{1-xn}{2}}$, ponatur $\sqrt{\frac{1-xn}{2}} = p$, erit $\sqrt{1-pp} = \sqrt{\frac{1+nx}{2}}$, & $dp = \frac{-dx}{4\sqrt{\frac{1-xn}{2}}}$, unde

$$\text{fit } dy = \frac{dp}{\sqrt{1-pp}} = \frac{-dx}{2\sqrt{1-xn}}.$$

IV. Si fit $y = A \tan \frac{2n}{1-xn}$, facto $p = \frac{2n}{1-xn}$, erit $1+pp = \frac{(1+nx)^2}{(1-xn)^2}$, & $dp = \frac{2dx(1+nx)}{(1-xn)^2}$. Quare cum

S

cum sit $dy = \frac{dp}{1+pp}$ per regulam tangentium (197);

$$\text{erit } dy = \frac{2dx}{1+xx}.$$

V. Si sit $y = A \tan \frac{\sqrt{(1+xx)}-1}{x}$, posito
 $p = \frac{\sqrt{(1+xx)}-1}{x}$, fiet $pp = \frac{2+xx-2\sqrt{(1+xx)}}{xx}$, &
 $1+pp = \frac{2+2xx-2\sqrt{(1+xx)}}{xx} = \frac{2(\sqrt{(1+xx)}-1)\sqrt{(1+xx)}}{xx}$.

$$\text{Atqui } dp = \frac{-dx}{xx\sqrt{(1+xx)}} + \frac{dx}{xx} = \frac{dx(\sqrt{(1+xx)}-1)}{xx\sqrt{(1+xx)}}.$$

$$\text{Quare cum sit } dy = \frac{dp}{1+pp}, \text{ fiet } dy = \frac{dx}{2(1+xx)}; \text{ quod}$$

$$\text{etiam inde intelligitur, quod sit } A \tan \frac{\sqrt{(1+xx)}-1}{x} \\ = \frac{1}{2} A \tan x.$$

VI. Si sit $y = e^{A \sin x}$, haec formula quoque per praece-
 $A \sin x$ dx
 dentia differentiabitur: fiet enim $dy = e^{\frac{A \sin x}{\sqrt{(1-xx)}}}$

Hoc ergo modo omnes functiones ipsius x , in quas praeter logarithmos atque exponentiales quantitates etiam arcus circulares ingrediuntur, differentiari poterunt.

200. Quoniam differentialia arcuum per dx divisa sunt quantitates algebraicae, eorum differentialia secunda & sequentia per ea, quae de functionum algebraicarum differentiatione exposuimus, invenientur. Sit $y = A \sin x$, quia est $dy = \frac{dx}{\sqrt{(1-xx)}}$,

$$\text{erit } \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{(1-xx)}}, \text{ cuius differentiale dabit valorem pro } ddy$$

$\frac{dy}{dx}$, si quidem dx sumatur constans: unde differentialia ipsius y cuiusvis ordinis ita se habebunt.

Si sit $y = A \sin x$; erit

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{(1-xx)}}; \quad \& \text{ sumto } dx \text{ constante}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{x}{(1-xx)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\frac{d^3y}{dx^3} = \frac{1+2xx}{(1-xx)^{\frac{5}{2}}}$$

$$\frac{d^4y}{dx^4} = \frac{9x+6xx^3}{(1-xx)^{\frac{7}{2}}}$$

$$\frac{d^5y}{dx^5} = \frac{9+72x^2+24x^4}{(1-xx)^{\frac{9}{2}}}$$

$$\frac{d^6y}{dx^6} = \frac{225x+600xx^3+120x^5}{(1-xx)^{\frac{11}{2}}}$$

&c.

unde concludimus ut supra §. 177. fore generaliter:

$$\frac{d^{n+1}y}{dx^{n+1}} = \frac{1.2.3. \dots n}{(1-xx)^{n+\frac{1}{2}}} \text{ in}$$

$$\left(x^n + \frac{1}{2} \cdot \frac{n(n-1)}{1.2} x^{n-2} + \frac{1.3}{2.4} \cdot \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{1.2.3.4} x^{n-4} \right. \\ \left. + \frac{1.3.5}{2.4.6} \cdot \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)(n-5)}{1.2.3.4.5.6} x^{n-6} + \&c. \right)$$

201. Superfunt quantitates, quae ex harum inversione nascuntur, scilicet sinus, tangentefve arcuum datorum, quas quomodo differentiari oporteat, ostendamus. Sit igitur x arcus circuli,

S 2

&

& $\sin x$ denotet eius sinum, cuius differentiale investigemus. Ponamus $y = \sin x$, ac posito $x + dx$ loco x , quia y abit in $y + dy$, erit $y + dy = \sin(x + dx)$, & $dy = \sin(x + dx) - \sin x$. Est autem $\sin(x + dx) = \sin x \cdot \cos dx + \cos x \cdot \sin dx$. atque cum sit, uti in introductione ostendimus

$$\sin x = \frac{x}{1} - \frac{x^3}{1.2.3} + \frac{x^5}{1.2.3.4.5} - \&c.$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{1.2.} + \frac{x^4}{1.2.3.4} - \&c.$$

erit reiectis terminis evanescentibus $\cos dx = 1$ & $\sin dx = dx$, unde fit $\sin(x + dx) = \sin x + dx \cos x$. Quare, posito $y = \sin x$, erit $dy = dx \cos x$. *Differentiale ergo sinus arcus cuiusvis aequatur differentiali arcus per cosinum multiplicato.* Si igitur fuerit p functio quaecunque ipsius x , erit simili modo $d. \sin p = dp \cos p$.

202. Similiter si proponatur $\cos x$, seu cosinus arcus x , cuius differentiale investigari oporteat. Ponatur $y = \cos x$, & posito $x + dx$ loco x , fiet $y + dy = \cos(x + dx)$. Est vero $\cos(x + dx) = \cos x \cdot \cos dx - \sin x \cdot \sin dx$, & quia ut modo vidimus est $\cos dx = 1$ & $\sin dx = dx$, erit $y + dy = \cos x - dx \sin x$, ideoque $dy = -dx \sin x$. *Quare differentiale cosinus cuiusque arcus aequatur differentiali arcus negative sumto per sinum eiusdem arcus multiplicato.* Sic si p fuerit functio quaecunque ipsius x , erit $d. \cos p = -dp \sin p$. Hae differentiationes quoque ex antecedentibus elici possunt hoc modo: si

fuerit $y = \sin p$, erit $p = A \sin y$; & $dp = \frac{dy}{\sqrt{1-yy}}$; at ob $y = \sin p$, erit $\cos p = \sqrt{1-yy}$, quo valore substituto erit $dp = \frac{dy}{\cos p}$ & $dy = dp \cos p$, ut ante. Pari modo si sit $y = \cos p$, erit $\sqrt{1-yy} = \sin p$, & $p = A \cos y$, ideoque $dp = \frac{-dy}{\sqrt{1-yy}} = \frac{-dy}{\sin p}$, unde fit ut ante $dy = -dp \sin p$.

203. Si fuerit $y = \tan x$, erit $dy = \tan(x + dx) - \tan x$; at est $\tan(x + dx) = \frac{\tan x + \tan dx}{1 - \tan x \cdot \tan dx}$, a qua fractione si tangens x subtrahatur, remanebit $dy = \frac{\tan dx (1 + \tan x \cdot \tan x)}{1 - \tan x \cdot \tan dx}$. Verum arcus evanescentis dx tan-

gens ipsi arcui est aequalis, ideoque $\tan dx = dx$, & denominator $1 - dx \tan x$, abit in unitatem: quocirca fiet $dy = dx(1 + \tan x^2)$. Est vero $1 + \tan x^2 = \sec x^2 = \frac{1}{\cos x^2}$, denotante $\cos x^2$ quadratum cosinus ipsius x : consequenter si fuerit $y = \tan x$, erit $dy = dx \sec x^2 = \frac{dx}{\cos x^2}$. Quod differentiale quoque per differentiationem sinuum & cosinuum inveniri potest; cum enim sit $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$, erit

$$dy = \frac{dx \cos x \cdot \cos x + dx \sin x \cdot \sin x}{\cos x^2} = \frac{dx}{\cos x^2}.$$

ob $\sin x^2 + \cos x^2 = 1$.

204. Aliter etiam hoc differentiale invenitur. Cum sit $y = \tan x$, erit $x = A \tan y$, & per praecepta superiora fiet $dx = \frac{dy}{1 + yy}$. At cum sit $y = \tan x$, erit

$\sqrt{1 + yy} = \sec x = \frac{1}{\cos x}$, ideoque $dx = dy \cos x^2$, &

$dy = \frac{dx}{\cos x^2}$, ut ante. Tangentis ergo cuiusvis arcus differentiale aequatur differentiali arcus diviso per quadratum cosinus eiusdem arcus. Simili modo si proponatur

$y = \cot x$, fiet $x = A \cot y$, & $dx = \frac{-dy}{1 + yy}$. At vero erit

V

$\sqrt{1+yy} = \operatorname{cosec} x = \frac{1}{\sin x}$, unde habebitur $dx = -dy \sin x$,

& $dy = \frac{-dx}{\sin x^2}$. *Cotangentis ergo cuiusvis arcus differentiale aequatur differentiali arcus negative sumto ac per quadratum sinus eiusdem arcus diviso. Vel quia est $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$, fiet hanc fractionem differentiando:*

$$dy = \frac{-dx \sin x^2 - dx \cos x^2}{\sin x^2} = \frac{-dx}{\sin x^2},$$

uti modo invenimus.

205. Si proponatur secans arcus, ut sit $y = \sec x$, quia erit $y = \frac{1}{\cos x}$, erit $dy = \frac{dx \sin x}{\cos x^2} = dx \tan x \sec x$.

Simili modo si fuerit $y = \operatorname{cosec} x$, ob $y = \frac{1}{\sin x}$, erit $dy =$

$$\frac{-dx \cos x}{\sin x^2} = -dx \cot x \operatorname{cosec} x, \text{ pro quibus casibus peculia-}$$

res regulas formare superfluum foret. Si sinus versus arcus proponatur $y = \operatorname{fv} x$, quia est $y = 1 - \cos x$, erit $dy = dx \sin x$. Omnes ergo casus, quibus linea quaequam recta ad arcum relata proponitur, quia semper per sinum cosinumve exprimi potest, sine difficultate differentiari poterunt. Neque vero tantum differentialia prima, sed etiam secunda & sequentia per regulas datas invenientur. Ponamus esse $y = \sin x$ & $z = \cos x$, atque dx esse constans: erit ut sequitur:

$y = \sin x$	$z = \cos x$
$dy = dx \cos x$	$dz = -dx \sin x$
$d^2y = -dx^2 \sin x$	$d^2z = -dx^2 \cos x$
$d^3y = -dx^3 \cos x$	$d^3z = dx^3 \sin x$
$d^4y = dx^4 \sin x$	$d^4z = dx^4 \cos x$
&c.	&c.

206. Simili modo inveniri poterunt differentialia omnium ordinum tangentis arcus x . Sit enim $y = \text{tang } x = \frac{\sin x}{\cos x}$, & ponatur dx constans, erit

$$y = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{2 \sin x}{\cos^3 x}$$

$$\frac{d^3y}{dx^3} = \frac{6}{\cos^4 x} - \frac{4}{\cos^2 x}$$

$$\frac{d^4y}{dx^4} = \frac{24 \sin x}{\cos^5 x} - \frac{8 \sin x}{\cos^3 x}$$

$$\frac{d^5y}{dx^5} = \frac{120}{\cos^6 x} - \frac{120}{\cos^4 x} + \frac{16}{\cos^2 x}$$

$$\frac{d^6y}{dx^6} = \frac{720 \sin x}{\cos^7 x} - \frac{480 \sin x}{\cos^5 x} + \frac{32 \sin x}{\cos^3 x}$$

$$\frac{d^7y}{dx^7} = \frac{5040}{\cos^8 x} - \frac{6720}{\cos^6 x} + \frac{2016}{\cos^4 x} - \frac{64}{\cos^2 x}$$

&c.

207. Functiones ergo quaecunque, in quas sinus vel cosinus arcuum ingrediuntur, per haec praecepta differentiari poterunt, uti ex sequentibus exemplis videre licet.

I. Si sit $y = 2 \sin x \cos x = \sin 2x$

Erit $dy = 2 dx \cos x^2 - 2 dx \sin x^2 = 2 dx \cos 2x$.

II. Si sit $y = \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}}$, vel $y = \sin \frac{1}{2} x$

Erit

Erit $dy = \frac{dx \sin x}{2\sqrt{2(1 - \cos x)}}$. Cum autem sit
 $\sqrt{2(1 - \cos x)} = 2 \sin \frac{1}{2}x$, & $\sin x = 2 \sin \frac{1}{2}x \cos \frac{1}{2}x$;
 fiet $dy = \frac{1}{2} dx \cos \frac{1}{2}x$, uti ex forma $y = \sin \frac{1}{2}x$
 immediate sequitur.

III. Si fit $y = \cos l \frac{x}{n}$; erit, posito $l \frac{x}{n} = p$,
 $y = \cos p$, & $dy = -dp \sin p$. At, ob $p = l x - l n$,
 erit $dp = \frac{-dx}{n}$; ideoque $dy = \frac{dx}{n} \sin l \frac{x}{n}$.

IV. Si fit $y = e^{\frac{\sin x}{\cos x}}$; erit $dy = e^{\frac{\sin x}{\cos x}} dx \cos x$.

V. Si fit $y = e^{\frac{-n}{\cos x}}$; erit $dy = -\frac{e^{\frac{-n}{\cos x}} ndx \sin x}{\cos x^2}$.

VI. Si fit $y = l \left(1 - \sqrt{1 - e^{\frac{-n}{\sin x}}} \right)$; ponatur
 $e^{\frac{-n}{\sin x}} = p$; atque ob $y = l (1 - \sqrt{1 - p})$, erit

$$dy = \frac{dp}{2(1 - \sqrt{1 - p})\sqrt{1 - p}}. \text{ At est } dp = \frac{e^{\frac{-n}{\sin x}} ndx \cos x}{\sin x^2}.$$

Quo valore substituto prodibit

$$dy = \frac{e^{\frac{-n}{\sin x}} ndx \cos x}{2 \sin x^2 \left(1 - \sqrt{1 - e^{\frac{-n}{\sin x}}} \right) \sqrt{1 - e^{\frac{-n}{\sin x}}}}$$

CA.

CAPUT VII.

DE DIFFERENTIATIONE FUNCTIONUM
DUAS PLURESVE VARIABLES INVOLVENTIUM.

208.

Si duae pluresve quantitates variables x, y, z a se invicem prorsus non pendeant, fieri potest, ut etiam si omnes sint variables, tamen dum una crescit decrescitve, reliquae maneant invariantae: quia enim nullum nexum inter se habere ponuntur, immutatio unius reliquas non afficit. Neque ergo differentialia quantitatuum y & z pendebunt a differentiali ipsius x ; ideoque dum x differentiali suo dx augetur, quantitates y & z , vel eadem manere, vel quomodocunque pro lubitu variari possunt. Quod si igitur differentiale quantitatis x statuatur dx , reliquarum quantitatuum differentialia dy & dz manent indeterminata, atque pro arbitrio nostro vel prorsus nihil, vel infinite parva ad dx quamvis rationem tenentia denotabunt.

209. Plerumque autem litterae y & z functiones ipsius x vel incognitas, vel quarum relatio ad x non spectatur, significare solent, hocque casu earum differentialia dy & dz certam ad dx relationem habebunt. Sive autem y & z pendeant ab x sive secus, ratio differentiationis, quam hic spectamus, eodem redit. Quaerimus enim functionis, quae ex pluribus variabilibus x, y , & z utcunque sit formata, differentiale, quod accipit, dum singulae variables x, y , & z suis differentialibus dx, dy , & dz crescunt. Ad hoc ergo inveniendum in functione proposita ubique loco variabilium quantitatum x, y, z scribatur respective $x + dx; y + dy; z + dz$, & ab expressione hoc modo resultante auferatur ipsa functio proposita: residuum dabit ipsum differentiale, quod quaeritur,

T

que-

quemadmodum ex natura differentialium luculenter constat.

210. Sit X functio ipsius x , eiusque differentiale, seu augmentum, dum x differentiali suo dx crescit, sit $= Pdx$. Deinde sit Y functio ipsius y , eiusque differentiale $= Qdy$, quod augmentum Y accipit, dum y abit in $y + dy$: atque Z sit functio ipsius z , eiusque differentiale sit $= Rdz$, quae differentialia Pdx , Qdy , Rdz ex natura functionum X , Y , & Z ope praeceptorum supra datorum inveniri poterunt. Quod si ergo proposita fuerit haec quantitas $X + Y + Z$, quae utique erit functio trium variabilium x , y , & z , eius differentiale erit $= Pdx + Qdy + Rdz$. Utrum autem haec tria differentialia sint inter se homogenea nec ne perinde est. Termini enim qui continent potestates ipsius dx prae Pdx aequae evanescunt, ac si reliqua membra Qdy & Rdz abessent, similisque est ratio terminorum, qui in differentiatione functionum Y & Z sunt neglecti.

211. Retineant X , Y & Z easdem significationes, sitque proposita ista functio XYZ ipsarum x , y & z , cuius differentiale investigari oporteat. Quoniam, si $x + dx$ loco x , $y + dy$ loco y , & $z + dz$ loco z scribatur, abit X in $X + Pdx$; Y in $Y + Qdy$; & Z in $Z + Rdz$, ipsa functio proposita XYZ abibit in

$$\begin{aligned} & (X + Pdx)(Y + Qdy)(Z + Rdz) \\ &= XYZ + YZPdx + XZQdy + XYRdz \\ &+ ZPQdxdy + YPRdx dz + XQRdydz + PQRdxdydz. \end{aligned}$$

At quia dx , dy , & dz sunt infinite parva, sive inter se sint homogenea sive non; ultimus terminus prae unoquoque praecedentium evanescit. Deinde terminus $ZPQdxdy$ tam prae $YZPdx$ quam prae $XZQdy$ evanescit; atque ob eandem rationem termini $YPRdx dz$ & $XQRdydz$ evanescunt. Ablata ergo ipsa functione proposita XYZ , erit eius differentiale

$$= YZPdx + XZQdy + XYRdz.$$

212. Exempla haec functionum trium variabilium x , y , & z , quibus pro lubitu quisque plura adicere potest, sufficiunt

ciunt ad ostendendum, si functio quaecunque trium variabilium x, y , & z proponatur, utcunque etiam hae variables inter se fuerint permixtae, eius differentiale semper huiusmodi formam esse habiturum $pdx + qdy + rdz$: ubi p, q , & r futurae sint singulae functiones, vel omnium trium variabilium x, y , & z , vel binarum, vel unius tantum, prout ratio compositionis, qua functio proposita ex variabilibus x, y , & z atque constantibus formatur, fuerit comparata. Simili modo, si proponatur functio quatuor pluriumve variabilium x, y, z , & v , eius differentiale semper huiusmodi formam habebit

$$pdx + qdy + rdz + sdv.$$

213. Consideremus primum functionem duarum tantum variabilium x & y , quae sit $= V$, cuius ergo differentiale ita se habebit, ut sit $dV = pdx + qdy$. Si igitur quantitas y assumeretur constans, foret $dy = 0$, ideoque functionis V differentiale esset pdx : sin autem x statueretur constans, ut esset $dx = 0$, solaque y maneret variabilis, tum ipsius V differentiale prodiret $= qdy$. Cum igitur utraque quantitate x & y variabili posita sit $dV = pdx + qdy$, ista regula pro differentianda functione V duas variables x & y involvente resultabit: *Ponatur primum sola x variabilis, altera vero y tanquam constans tractetur, & quaeratur ipsius V differentiale, quod sit $= pdx$. Deinde ponatur sola quantitas y variabilis, altera x pro constanti habita, & quaeratur ipsius V differentiale, quod sit $= qdy$. Quibus factis, posita utraque quantitate x & y variabili, fiet $dV = pdx + qdy$.*

214. Simili modo, cum functionis trium variabilium x, y , & z , quae sit $= V$, differentiale huiusmodi habeat formam $dV = pdx + qdy + rdz$, manifestum est, si sola quantitas x fuisset variabilis posita, reliquae vero y & z constantes mansissent, ob $dy = 0$ & $dz = 0$, prodiret ipsius V differentiale $= pdx$. Pari modo inveniretur differentiale ipsius $V = qdy$, si x & z essent constantes solaque y poneretur variabilis; atque si x & y tanquam constantes tractarentur sola-

que z statueretur variabilis, prodiret differentiale ipsius $V = r dz$. Quare ad functionem trium pluriumve variabilium differentiandam, consideretur seorsim quaelibet quantitas variabilis, & functio pro qualibet differentietur, quasi reliquae omnes essent constantes; tum singula haec differentialia, quae ex singulis quantitativis variabilibus sunt inventa, colligantur, eritque aggregatum differentiale quaesitum functionis propositae.

215. In hac regula, quam pro differentiatione functionis quotcunque variabilium invenimus, continetur demonstratio regulae supra §. 170 datae generalis, cuius ope functio quaecunque unicam variabilem complectens differentiri potest. Si enim pro singulis partibus ibi commemoratis totidem litterae diversae collocentur, functio speciem induet functionis totidem diversarum variabilium, atque adeo modo hic praescripto differentietur, successive unamquamque partem, quasi sola esset variabilis, tractando, cunctaque differentialia, quae ex singulis partibus oriuntur, in unam summam coniiciendo: quae summa erit differentiale quaesitum, postquam pro singulis litteris valores fuerint restituti. Haec ergo regula latissime patet, atque etiam ad functiones plurium variabilium, quomodocunque fuerint comparatae, extenditur. Unde eius usus per universum calculum differentialem est amplissimus.

216. Inventa ergo regula generali, cuius ope functiones quotcunque variabilium differentiri possunt, eius usum in nonnullis exemplis ostendisse iuvabit.

I. Si fuerit $V = xy$; erit $dV = xdy + ydx$.

II. Si fuerit $V = \frac{x}{y}$; erit $dV = \frac{dx}{y} - \frac{xdy}{yy}$.

III. Si fuerit $V = \frac{y}{\sqrt{(aa - xx)}}$; erit

$$dV = \frac{dy}{\sqrt{(aa - xx)}} + \frac{yx dx}{(aa - xx)^{\frac{3}{2}}}.$$

IV.

IV. Si fuerit $V = (ax + by + c)^m (\delta x + \varepsilon y + \zeta)^n$; erit

$$dV = m(ax + by + c)^{m-1} (\delta x + \varepsilon y + \zeta)^n (a dx + b dy) \\ + n(ax + by + c)^m (\delta x + \varepsilon y + \zeta)^{n-1} (\delta dx + \varepsilon dy),$$

five $dV = (ax + by + c)^{m-1} (\delta x + \varepsilon y + \zeta)^{n-1}$ in

$$\left(\begin{array}{l} m a \delta \quad x dx + m b \delta \quad x dy + m a \varepsilon \quad y dx \\ n a \delta \quad x dx + n a \varepsilon \quad x dy + n b \delta \quad y dx \\ + m b \varepsilon \quad y dy + m a \zeta \quad dx + m b \zeta \quad dy \\ + n b \varepsilon \quad y dy + n \gamma \delta \quad dx + n \gamma \varepsilon \quad dy \end{array} \right).$$

V. Si fuerit $V = y/x$; erit $dV = dy/x - y dx/x^2$.

VI. Si fuerit $V = x^y$; erit $dV = y x^{y-1} dx + x^y dy/x$.

VII. Si fuerit $V = A \tan \frac{y}{x}$; erit $dV = \frac{x dy - y dx}{x^2 + yy}$.

VIII. Si fuerit $V = \sin x \cdot \cos y$; erit $dV = dx \cos x \cdot \cos y - dy \sin x \cdot \sin y$.

IX. Si fuerit $V = \frac{e^z y}{\sqrt{xx + yy}}$; erit

$$dV = \frac{e^z y dz}{\sqrt{xx + yy}} + \frac{e^z (xx dy - yy dx)}{(xx + yy) \sqrt{xx + yy}}.$$

X. Si fuerit $V = e^z A \sin \frac{x - \sqrt{xx - yy}}{x + \sqrt{xx - yy}}$,

$$\text{reperietur } dV = e^z dz A \sin \frac{x - \sqrt{xx - yy}}{x + \sqrt{xx - yy}} \\ + e^z \cdot \frac{xy dy - yy dx}{(x + \sqrt{xx - yy}) (xx - yy)^{\frac{3}{2}} \sqrt{x}}$$

217. Quoniam vidimus, si V fuerit functio quaecunque binarum variabilium x & y , eius differentiale huiusmodi habiturum esse formam $dV = P dx + Q dy$, in qua sint P & Q functiones a functione V pendentes per eamque determinatae: sequitur has duas quantitates P & Q certo quodam modo

do etiam a se invicem pendere, propterea quod utraque ab eadem functione V pendet. Quicumque igitur sit iste nexus inter quantitates finitas P & Q , quem deinceps investigabimus, perspicuum est, non omnes formulas differentiales huiusmodi $Pdx + Qdy$, in quibus P & Q pro lubitu sint ex x & y formatae, posse esse differentialem cuiuspiam functionis finitae V ipsarum x & y . Nisi enim ea relatio inter functiones P & Q intercedat, quam natura differentiationis requirit, huiusmodi differentiale $Pdx + Qdy$ oriri plane per differentiationem non potuit, ideoque vicissim integrale non habebit.

218. In integratione igitur plurimum interest nosse hanc relationem inter quantitates P & Q , ut differentialem, quae revera ex differentiatione functionis cuiuspiam finitae sunt orta, dignosci queant ab iis, quae ad libitum sunt formata, atque nulla integralia admittunt. Quanquam autem hic nondum integrationis negotium suscipimus, tamen ad naturam differentialium realium penitus inspiciendam conveniet hanc relationem investigari; quippe cuius cognitio non solum ad calculum integralem, ad quem hic viam paramus, est maxime necessaria, sed etiam in ipso calculo differentiali insignem lucem accendit. Primum igitur patet, si V sit functio duarum variabilium x & y , in eius differentiali $Pdx + Qdy$ utriusque differentiale dx & dy inesse oportere. Neque ergo potest esse $P=0$ neque $Q=0$. Hinc si P fuerit functio ipsarum x & y , formula Pdx nullius quantitatis finitae poterit esse differentiale, seu nulla extat quantitas finita, cuius differentiale sit Pdx .

219. Sic nulla datur quantitas finita V sive algebraica sive transcendens, cuius differentiale sit $yxdx$, si quidem sit y quantitas variabilis ab x non pendens. Si enim ponamus dari eiusmodi quantitatem finitam V , quia y in eius differentiale ingreditur, necesse est, ut y quoque in ipsa quantitate V insit; verum si V contineret y , ob variabilitatem ipsius y

ne-

necessario quoque in differentiali ipsius V differentiale dy inesse deberet. Quod tamen cum non adsit, fieri nequit, ut differentiale $yxdx$ ex cuiuspiam quantitatis finitae differentiatione sit ortum. Cum igitur pateat formulam $Pdx + Qdy$, si Q sit 0, & P contineat y , differentiale reale esse non posse, simul intelligitur, quantitati Q non pro lubitu valorem tribui posse, sed eum a valore ipsius P pendere.

220. Quo igitur hanc relationem inter P & Q in differentiali $dV = Pdx + Qdy$ investigemus, ponamus primo V esse functionem nullius dimensionis ipsarum x & y : a casibus enim particularibus ad relationem generalem ascendamus. Quod si ergo ponamus $y = tx$, ex functione V quantitas x prorsus evanescet, prodibitque functio ipsius t tantum, quae sit $= T$, cuius differentiale erit $= \Theta dt$, existente Θ functione ipsius t . Ponamus igitur quoque in differentiali $Pdx + Qdy$ ubique $y = tx$, & $dy = tdx + xdt$, quo facto prodibit

$$Pdx + Qtdx + Qxdt;$$

in quo cum dx non contineatur, necesse est ut sit

$$P + Qt = 0; \text{ ideoque } Q = -\frac{P}{t} = -\frac{Px}{y}, \text{ seu erit}$$

$Px + Qy = 0$, unde relatio inter P & Q pro hoc casu innotescit. Deinde debet esse $\Theta = Qx$, ideoque $Qx =$ functioni ipsius t , hoc est functioni nullius dimensionis

ipsarum x & y . Atque ob $Q = \frac{\Theta}{x}$ fiet $P = -\frac{\Theta y}{xx}$, &

tam Px quam Qy erunt functiones nullius dimensionis ipsarum x & y .

221. Si igitur functio nullius dimensionis ipsarum x & y , quae sit $= V$, differentietur, eius differentiale $dV = Pdx + Qdy$, semper ita erit comparatum, ut sit $Px + Qy = 0$. Hoc est si in differentiali loco differentialium dx & dy scribantur x & y , resultabit quantitas $= 0$: uti in his exemplis usu venire patet:

L

I. Sit $V = \frac{x}{y}$; erit $dV = \frac{ydx - xdy}{yy}$, atque posito n loco dx & y loco dy , erit $\frac{yn - xy}{yy} = 0$.

II. Sit $V = \frac{x}{\sqrt{(xx - yy)}}$, erit $dV = \frac{-yydx + xxdy}{(xx - yy)^{\frac{3}{2}}}$, unde fit $\frac{-yyx + yxy}{(xx - yy)^{\frac{3}{2}}} = 0$.

III. Sit $V = \frac{y + \sqrt{(xx + yy)}}{-y + \sqrt{(xx + yy)}}$, quae est functio nullius dimensionis ipsarum x & y ; erit $dV = \frac{2xxdy - 2xydx}{(\sqrt{(xx + yy)} - y)^2 \sqrt{(xx + yy)}}$, quae forma positis x & y loco dx & dy fit $= 0$.

IV. Sit $V = \frac{x + y}{x - y}$; erit $dV = \frac{2xdy - 2ydx}{xx - yy}$, atque $\frac{2xy - 2yx}{xx - yy} = 0$.

V. Sit $V = A \sin \frac{\sqrt{(x - y)}}{\sqrt{(x + y)}}$, erit $dV = \frac{ydx - xdy}{(x + y)\sqrt{2y(x - y)}}$, quae formula eadem proprietate gaudet.

222. Contemplemur nunc alias functiones homogeneas, fitque V functio n dimensionum ipsarum x & y . Quare si ponatur $y = tx$, induct V huiusmodi formam Tx^n , existente T functione ipsius t , fitque

$$dT = \Theta dt, \quad \text{erit} \quad dV = x^n \Theta dt + nTx^{n-1} dx.$$

Quodsi ergo statuamus:

$$dV = Pdx + Qdy, \quad \text{ob} \quad dy = tdx + xdt,$$

$$\text{fiet} \quad dV = Pdx + Qtdx + Qxdt:$$

quae

quae forma quoniam cum illa congruere debet, erit

$$P + Qx = nTx^{n-1} = \frac{nV}{x}, \text{ ob } V = Tx^n.$$

Hancobrem ob $t = \frac{y}{x}$, fiet $Px + Qy = nV$, quae aequatio relationem inter P & Q ita definit, ut si altera sit cognita, altera facile inveniatur. Quia porro est $Qx = x^n \Theta$, erit Qx , ideoque etiam Qy & Px functio n dimensionum ipsarum x & y .

223. Si ergo in differentiali cuiusvis functionis homogeneae ipsarum x & y , loco dx & dy , ponatur x & y , quantitas oriunda aequabitur ipsi functioni, cuius differentiale proponebatur, per numerum dimensionum multiplicatae.

I. Si fit $V = \sqrt{xx + yy}$; erit $n = 1$, & ob

$$dV = \frac{x dx + y dy}{\sqrt{xx + yy}}, \text{ fiet } \frac{xx + yy}{\sqrt{xx + yy}} = V = \sqrt{xx + yy}.$$

II. Si fit $V = \frac{y^3 + x^3}{y - x}$; erit $n = 2$, &

$$dV = \frac{2y^3 dy - 3yyx dy + 3yxx dx - 2x^3 dx + y^3 dx - x^3 dy}{(y - x)^2},$$

Ponatur x pro dx & y pro dy orietur:

$$\frac{2y^4 - 2y^3x + 2yx^3 - 2x^4}{(y - x)^2} = \frac{2y^3 + 2x^3}{y - x} = 2V.$$

III. Si fit $V = \frac{1}{(yy + xx)^2}$, erit $n = -4$, atque

$$dV = -\frac{4y dy + 4x dx}{(yy + xx)^3}.$$

Quae formula positis x & y loco

$$dx \text{ \& } dy \text{ abit in } -\frac{4yy + 4xx}{(yy + xx)^3} = -4V.$$

V

IV.

IV. Si fit $V = xxl \frac{y+x}{y-x}$; erit $n=2$, atque

$$dV = 2xdx l \frac{y+x}{y-x} + \frac{2xx(ydx - xdy)}{yy - xx}, \text{ facta autem me-}$$

morata substitutione oritur $2xxl \frac{y+x}{y-x} = 2V$.

224. Similis proprietas observabitur, si V fuerit functio homogenea plurium variabilium, sit ergo V functio quantitatum x, y, z , quae coniunctim ubique n dimensiones adimpleant; atque differentiale huiusmodi habebit formam $Pdx + Qdy + Rdz$. Ponatur iam $y = tx$ & $z = sx$, ut sit $dy = tdx + xdt$, & $dz = sdx + xds$, atque functio V induet hanc formam Ux^n , existente U functione binarum variabilium t & s ; hinc ergo si statuatur $dU = pdt + qds$, fiet

$$dV = x^n pdt + x^n qds + nUx^{n-1} dx.$$

Prior autem forma dabit

$$dV = Pdx + Qtdx + Qxdt + Rsdx + Rxds:$$

quae cum illa collata praebet

$$P + Qt + Rs = nUx^{n-1} = \frac{nV}{x},$$

unde obtinetur $Px + Qy + Rz = nV$; quae eadem proprietas ad quocunque plures variables extenditur.

225. Si igitur proposita fuerit functio homogenea quocunque variabilium x, y, z, v , &c. eius differentiale perpetuo hanc habebit proprietatem, ut si loco differentialium dx, dy, dz, dv , &c. scribantur respective quantitates finitae x, y, z, v , &c. prodeat ipsa functio proposita per numerum dimensionum multiplicata. Haecque regula etiam valet, si V fuerit functio homogenea unice tantum variabilis x : Hoc enim casu erit V potestas ipsius x , puta $V = ax^n$, quae est functio homogenea n dimensionum: nulla scilicet alia da-

datur functio ipsius x , in qua x ubique n dimensiones constituat praeter potestatem x^n . Cum igitur sit $dV = nax^{n-1}dx$, ponatur x loco dx , atque prodibit nax^n , hoc est nV . Ista ergo functionum homogenearum insignis proprietas diligenter notari meretur, cum in calculo integrali maximam afferat utilitatem.

226. Quo nunc in genere in relationem inter quantitates P & Q , quae differentiale $Pdx + Qdy$ functionis cuiuscunque V duarum variabilium x & y constituunt, inquiramus, ad sequentia attendi oportebit. Sit igitur V functio quaecunque ipsarum x & y ; atque ponamus V abire in R , si loco x ponatur $x + dx$; posito autem $y + dy$ loco y abeat V in S : quodsi autem simul $x + dx$ loco x , & $y + dy$ loco y scribatur, mutetur V in V^1 . Cum itaque R oriatur ex V , posito $x + dx$ loco x , manifestum est si ulterius in R ponatur $y + dy$ loco y , tum prodire V^1 ; idem enim est, ac si in V statim poneretur $x + dx$ loco x , & $y + dy$ loco y . Simili modo si in S ponatur $x + dx$ loco x , quia S iam orta est ex V posito $y + dy$ loco y , denuo prodibit V^1 ; uti ex hoc schematisino clarius perspicitur.

Quantitas	abit in	si loco	ponatur.
V	R	x	$x + dx$
V	S	y	$y + dy$
V	V^1	x y	$x + dx$ $y + dy$
R	V^1	y	$y + dy$
S	V^1	x	$x + dx$

227. Si igitur V ita differentietur, ut tantum x tanquam variabilis, y vero tanquam constans tractetur, quia posito

V 2

sito $x+dx$ loco x , functio V abit in R , eius differentiale erit $=R-V$; at ex forma $dV=Px+Qdy$, sequitur idem differentiale fore $=Px$, unde erit $R-V=Px$. Quod si iam loco y ponatur $y+dy$, x vero tanquam constans tractetur, quia R abit in V' & V in S , quantitas $R-V$ abit in $V'-S$; ideoque ipsius $R-V=Px$ differentiale, quod oritur si sola y variabilis assumatur, erit $V'-R-S+V$. simili modo, cum posito $y+dy$ loco y , abeat V in S , erit $S-V$ differentiale ipsius V posita sola y variabili, eritque propterea $S-V=Qdy$; nunc quia loco x posito $x+dx$, tranlit S in V' & V in R , quantitas $S-V$ abit in $V'-R$; atque ipsius $S-V=Qdy$ differentiale, quod oritur si sola x variabilis statuatur, erit $=V'-R-S+V$, quod prorsus congruit cum differentiali ante invento.

228. Ex hac convenientia deducitur sequens conclusio: Si functionis V cuiuscunque binarum variabilium x & y differentiale fuerit $dV=Px+Qdy$, tum differentiale ipsius Px quod oritur si sola quantitas y tanquam variabilis, x vero tanquam constans tractetur, aequale erit differentiali ipsius Qdy , quod oritur si sola quantitas x tanquam variabilis, y vero tanquam constans tractetur. Si scilicet posita sola y variabili fuerit $dP=Zdy$ erit differentiale ipsius Pdx praescripto modo sumtum $=Zdxdy$; atque posita sola x variabili erit quoque $dQ=Zdx$; sic enim differentiale ipsius Qdy praescripto modo sumtum fiet quoque $=Zdxdy$. Hacque ratione intelligitur relatio, quae inter quantitates P & Q intercedit, atque paucis verbis in hoc consistit, ut differentiale ipsius Pdx posito x constante aequale sit differentiali ipsius Qdy posito y constante.

229. Ista insignis proprietas clarius perspicietur, si eam nonnullis exemplis illustremus.

I. Sit igitur $V=yx$; erit $dV=ydx+xdy$, ideoque $P=y$ & $Q=x$; unde posito x constante erit $d.Pdx=dx dy$, & posito y constante erit $d.Qdy=dx dy$, sicque haec duo differentialia inter se aequantur.

II. Sit $V = \sqrt{(xx + 2xy)}$; erit $dV = \frac{x dx + y dx + x dy}{\sqrt{(xx + 2xy)}}$,
 ideoque $P = \frac{x + y}{\sqrt{(xx + 2xy)}}$, & $Q = \frac{x}{\sqrt{(xx + 2xy)}}$, unde
 posito x constante erit $d.P dx = \frac{xy dx dy}{(xx + 2xy)^{\frac{3}{2}}}$, & posito y
 constante erit $d.Q dy = \frac{xy dx dy}{(xx + 2xy)^{\frac{3}{2}}}$.

III. Sit $V = x \sin Ay + y \sin Ax$; eritque
 $dV = dx \sin Ay + x dy \cos y + dy \sin Ax + y dx \cos x$.

Quare erit

$$P dx = dx \sin Ay + y dx \cos x,$$

$$\& \quad Q dy = dy \sin Ax + x dy \cos y.$$

Posito ergo x constante erit

$$d.P dx = dx dy \cos y + dx dy \cos x,$$

& posito y constante erit

$$d.Q dy = dx dy \cos y + dx dy \cos x.$$

IV. Sit $V = x^r$; erit $dV = x^r dylx + y x^{r-1} dx$,
 atque $P dx = y x^{r-1} dx$, & $Q dy = x^r dylx$.

Quamobrem posito x constante habebitur

$$d.P dx = x^{r-1} dx dy + y x^{r-1} dx dylx,$$

& posito y constante erit

$$d.Q dy = y x^{r-1} dx dylx + x^r dx dy.$$

230. Ista proprietas etiam hoc modo enunciari potest, unde
 eximia omnium functionum, quae duas variables involvunt,
 indoles cognoscetur. Si functio quaecunque V duarum variabi-
 lium x & y differentiatur posita sola x variabili, hocque dif-
 ferentiale demuo differentiatur posita sola y variabili, tum post
 du-

duplicem hanc differentiationem idem prodibit, ac si ordine inverso functio V primum posita sola y variabili differentietur, hocque differentiale posita sola x variabili denuo differentietur: utroque scilicet casu prodibit eadem expressio huius formae $Zdx dy$. Ratio huius identitatis ex praecedente proprietate manifesto sequitur: si enim V differentietur posita sola x variabili, prodit Pdx ; & si V differentietur posita sola y variabili, prodit Qdy , horum differentialium vero differentialia modo indicato sumta inter se aequalia esse, ante demonstravimus. Ceterum haec indoles immediate sequitur ex ratiocinio (§. 227) allato.

231. Relatio inter P & Q , si $Pdx + Qdy$ fuerit differentiale functionis V sequenti etiam modo indicari potest. Quoniam P & Q sunt functiones ipsarum x & y , differentientur ambae posita utraque x & y variabili:

Si scilicet fuerit $dV = Pdx + Qdy$

$$\text{fit} \quad dP = pdx + rdy$$

$$\& \quad dQ = qdx + sdy.$$

Posito ergo x constante erit

$$dP = rdy, \quad \& \quad d.Pdx = rdx dy.$$

Deinde posito y constante erit

$$dQ = qdx, \quad \& \quad d.Qdy = qdx dy.$$

Cum igitur haec duo differentialia $rdx dy$ & $qdx dy$ sint inter se aequalia, sequitur fore $q = r$. Functiones ergo P & Q ita invicem connectuntur, ut si ambae differentientur, uti fecimus, quantitates q & r inter se fiant aequales. Brevitatis gratia autem hoc saltem capite quantitates r & q ita com-

mode denotari solent, ut r indicetur per $\left(\frac{dP}{dy}\right)$, qua scriptura

designatur P ita differentiari, ut sola y tanquam variabilis tractetur, atque differentiale istud per dy dividatur: sic enim

prodibit quantitas finita r . Simili modo significabit $\left(\frac{dQ}{dx}\right)$

quan-

quantitatem finitam q , quia hac ratione indicatur functionem Q sola x posita variabili differentiari, tumque differentiale per dx dividi debere.

232. Utamur ergo hoc scribendi modo, etiam si alias ambiguitatem afferre possit, quae tamen hic per clausulas evitatur, ut ambages in describendis differentiandi conditionibus evitemus, sicque breviter relationem inter P & Q ita verbis exprimere poterimus, ut dicamus esse $\left(\frac{dP}{dy}\right) = \left(\frac{dQ}{dx}\right)$.

In huiusmodi scilicet fractionibus denominator praeter propriam significationem, qua numerator per eum dividi debet, indicat numeratoris differentiale ita esse capiendum, ut ea sola quantitas cuius differentiale denominatorem constituit, tanquam variabilis spectetur. Hoc enim modo per divisionem differentialia prorsus ex calculo egredientur, istaeque fractiones $\left(\frac{dP}{dy}\right)$ & $\left(\frac{dQ}{dx}\right)$ exhibebunt quantitates finitas, quae in praesenti casu erunt inter se aequales. Hoc itaque modo recepto quantitates quoque p & s ita denotare licebit, ut sit $p = \left(\frac{dP}{dx}\right)$ & $s = \left(\frac{dQ}{dy}\right)$, si quidem ut monitum est, differentiatio numeratoris per denominatorem restringatur.

233. Consentit haec proprietas mirifice cum proprietate, quam ante in functionibus homogeneis inesse ostendimus. Sit enim V functio homogenea n dimensionum ipsarum x & y , ponaturque $dV = Pdx + Qdy$, atque demonstravimus fore $nV = Px + Qy$, ideoque

$$Q = \frac{nV}{y} - \frac{Px}{y}. \quad \text{Sit } dP = pdx + rdy;$$

eritque $\left(\frac{dP}{dy}\right) = r$, cui aequale esse $\left(\frac{dQ}{dx}\right)$ ita ostendetur. Differentietur Q posita sola x variabili, & quia in hac

hac hypothefi est $dQ = \frac{nPd\pi}{y} - \frac{Pd\pi}{y} - \frac{\pi pd\pi}{y}$,

fiet $\left(\frac{dQ}{dx}\right) = \frac{(n-1)P}{y} - \frac{p\pi}{y}$, debeatque effe

$$\frac{(n-1)P}{y} - \frac{p\pi}{y} = r \quad \text{feu} \quad (n-1)P = p\pi + ry.$$

Quae aequalitas inde fit perfpicua, quod P fit functio homogenea $n-1$ dimensionum ipfarum x & y , unde eius differentiale $dP = pd\pi + rdy$, ob proprietatem functionum homogenearum, ita debet effe comparatum, ut fit $(n-1)P = p\pi + ry$.

234. Ista proprietas, quod fit $\left(\frac{dP}{dy}\right) = \left(\frac{dQ}{d\pi}\right)$, quam omnibus functionibus duarum variabilium π & y communem effe ostendimus, nobis quoque patefaciet naturam functionum trium pluriumve variabilium. Sit V functio quaecunque trium variabilium π , y , & z , ac ponatur $dV = Pd\pi + Qdy + Rdz$. Quod si igitur in hac differentiatione z tanquam constans tractaretur, foret utique $dV = Pd\pi + Qdy$; hoc autem casu per antecedentia debet effe $\left(\frac{dP}{dy}\right) = \left(\frac{dQ}{d\pi}\right)$. Deinde si quantitas y constans affu-

meretur, foret $dV = Pd\pi + Rdz$, erit ergo $\left(\frac{dP}{dz}\right) = \left(\frac{dR}{d\pi}\right)$.

Denique posito π constante reperietur $\left(\frac{dQ}{dz}\right) = \left(\frac{dR}{dy}\right)$. In differentiali ergo $Pd\pi + Qdy + Rdz$ functionis V quantitates P , Q , & R ita a se invicem pendent, ut fit

$$\left(\frac{dP}{dy}\right) = \left(\frac{dQ}{d\pi}\right); \left(\frac{dP}{dz}\right) = \left(\frac{dR}{d\pi}\right); \& \left(\frac{dQ}{dz}\right) = \left(\frac{dR}{dy}\right).$$

235. Sequitur hinc ista functionum, quae tres pluresve
va-

variabiles involvunt, proprietates analogae ei, quam supra (230) de functionibus duarum variabilium ostendimus. Si fuerit V functio quaecunque trium variabilium $x, y, \& z$, eaque continuo ter differentietur, ita ut primum una quantitas, puta x , sola variabilis ponatur, in differentiatione secunda sola y , atque in tertia sola z variabilis assumatur, prodibit expressio huius formae $Zdx dy dz$, quae eadem reperietur, quocunque alio ordine quantitates $x, y, \& z$ collocentur. Sex igitur diversis modis post triplicem differentiationem ad eandem expressionem $Zdx dy dz$ pervenietur, quoniam ordo quantitarum $x, y, \& z$ sexies variari potest. Quicunque ergo ordo eligatur, si functio V differentietur posita sola prima variabili, hocque differentiale denuo differentietur posita sola secunda variabili, atque differentiale hoc iterum differentietur posita sola tertia variabili, eadem prodibit expressio, utcunque ordo quantitarum $x, y, \& z$ varietur.

236. Quo ratio huius proprietatis clarius perspiciatur, ponamus esse $dV = Pdx + Qdy + Rdz$; deinde etiam quantitates $P, Q, \& R$ differentiemus, eruntque earum differentialia per ante demonstrata ita comparata:

$$dP = pdx + sdy + tdz$$

$$dQ = sdx + qdy + udz$$

$$dR = tdx + udy + r dz.$$

Differentietur nunc V posito solo x variabili prodibit Pdx , quod differentiale iterum differentietur posito solo y variabili atque habebitur $sdx dy$; quod si differentietur posito solo z variabili, postquam per $sdx dy dz$ fuerit divisum, obtinebitur

$\left(\frac{ds}{dz}\right)$. Collocentur nunc variables hoc ordine y, x, z ,

atque prima differentiatio dabit Qdy , secunda $sdx dy$, & tertia (facta divisione per $sdx dy dz$) dabit $\left(\frac{ds}{dz}\right)$ ut ante. Dis-

ponantur variables hoc ordine z, y, x , ac prima differen-

X

tatio dabit Rdx secunda $udydz$, tertia vero post divisionem per $dxdydz$ praebet $\left(\frac{du}{dx}\right)$. At cum posito y constante sit

$dQ = sdx + udx$; erit $\left(\frac{ds}{dx}\right) = \left(\frac{du}{dx}\right)$, uti pariter est demonstratum.

237. Ponamus esse $V = \frac{xyz}{aa - zz}$; hancque functionem toties ter differentiemus, quoties ordo variabilium x, y, z variari potest:

	I. DIFFER.	II. DIFFER.	III. DIFFER.
posito variabili	folo x $\frac{2xydz}{aa - zz}$;	folo y $\frac{2xdxdy}{aa - zz}$;	folo z $\frac{4xzdxdydz}{(aa - zz)^2}$
posito variabili	folo x $\frac{2xydz}{aa - zz}$;	folo z $\frac{4xyzdxdz}{(aa - zz)^2}$;	folo y $\frac{4xzdxdydz}{(aa - zz)^2}$
posito variabili	folo y $\frac{xxdy}{aa - zz}$;	folo x $\frac{2xdxdy}{aa - zz}$;	folo z $\frac{4xzdxdydz}{(aa - zz)^2}$
posito variabili	folo y $\frac{xxdy}{aa - zz}$;	folo z $\frac{2xxzdydz}{(aa - zz)^2}$;	folo x $\frac{4xzdxdydz}{(aa - zz)^2}$
posito variabili	folo z $\frac{2xxyzdz}{(aa - zz)^2}$;	folo x $\frac{4xyzdxdz}{(aa - zz)^2}$;	folo y $\frac{4xzdxdydz}{(aa - zz)^2}$
posito variabili	folo z $\frac{2xxyzdz}{(aa - zz)^2}$;	folo y $\frac{2xxzdydz}{(aa - zz)^2}$;	folo x $\frac{4xzdxdydz}{(aa - zz)^2}$

ex quo exemplo patet, quocunque ordine tres variables fuerint

rint assumtae, post triplicem differentiationem semper eandem prodire expressionem $\frac{4xyzdxdydz}{(aa-xx)^2}$.

238. Uti autem post triplicem differentiationem ad eandem expressionem est perventum, ita quoque consensus deprehenditur in differentialibus, quae secunda differentiatio supeditavit. In iis scilicet expressio quaevis bis occurrit; unde patet, quae formulae iisdem differentialibus sint affectae, easdem quoque inter se esse aequales, atque differentialia tertia ideo esse omnia inter se aequalia, quia iisdem differentialibus $dxdydz$ sunt affecta. Hinc igitur concludimus, si V fuerit functio quocunque variabilium x, y, z, v, u , &c. eaque successive aliquoties differentietur, ut semper unica tantum quantitas variabilis assumatur; tum quoties ad expressiones perveniat, quae iisdem differentialibus sint affectae, eas quoque inter se aequales fore. Sic duplici differentiatione orietur huiusmodi expressio $Zdxdy$, dum in altera sola x , in altera sola y assumta est variabilis: perindeque est utra prius, posteriusve sit variabilis assumta. Simili modo sex variis modis per triplicem differentiationem eadem exsurget expressio $Zdxdydz$; atque viginti quatuor variis modis pervenietur post quadruplicem differentiationem ad eandem expressionem huius formae $Zdxdydzdv$, atque ita porro.

239. Veritatem horum Theorematum quilibet adhibita levi attentione ex ante explicatis principiis facile agnoscet, atque propria meditatione facilius intuebitur, quam tantis verborum ambagibus, sine quibus demonstrationes proferri non possent. Quia vero harum proprietatum cognitio maximi est momenti in calculo integrali, Tyrones sunt monendi, ut non solum has proprietates ipsi diligenter meditentur, earumque veritatem scrutentur, sed etiam pluribus exemplis comprobeant; quo hoc pacto sibi hanc materiam familiariorem reddant, fructusque inde natos postmodum facilius percipere

queant. Neque vero solum tyrones, sed etiam ii, qui principiis calculi differentialis iam sunt imbuti, ad hoc sunt cohortandi; quoniam in omnibus fere manuductionibus ad hanc Analyseos partem hoc argumentum penitus praetermitti solet. Plerumque enim Auctores solas differentiationis regulas praescripserunt, earumque usum in Geometria sublimiori ostendisse fuerunt contenti, neque in naturam atque proprietates differentialium inquisiverunt; unde tamen maxima subsidia in calculum integralem redundant. Quam ob causam hoc argumentum fere novum in isto Capite fusius persequi visum est, quo simul via ad integrationes alias difficiliore pararetur, atque negotium postea suscipiendum sublevaretur.

240. Cognitis igitur his proprietatibus, quibus differentialia functionum duas pluresve variables involventium gaudent, facile poterimus dignoscere, utrum formula differentialis proposita, in qua occurrunt duae pluresve variables, sit orta ex differentiatione cuiuspiam functionis finitae an secus.

Si enim in formula $Pdx + Qdy$ non fuerit $\left(\frac{dP}{dy}\right) = \left(\frac{dQ}{dx}\right)$, certo poterimus affirmare, nullam existere functionem ipsarum x & y , cuius differentiale sit $= Pdx + Qdy$: neque ergo infra in calculo integrali huiusmodi formulae integrale indagari potest. Sic cum in $yx dx + xdy$ requisita conditio non adfit, nulla datur functio, cuius differentiale est $= yx dx + xdy$.

Utrum autem semper, quoties est $\left(\frac{dP}{dy}\right) = \left(\frac{dQ}{dx}\right)$ formula ex differentiatione cuiuspiam functionis sit orta, quaestio est, quae demum ex integrationis principiis solide affirmari poterit.

241. Si in formula differentiali proposita tres pluresve insint variables, uti $Pdx + Qdy + Rdz$; tum ea ex differentiatione ortum traxisse omnino nequit, nisi tres istae conditiones in ea locum habeant, ut sit

dP

$$\left(\frac{dP}{dy}\right) = \left(\frac{dQ}{dx}\right); \left(\frac{dP}{dz}\right) = \left(\frac{dR}{dx}\right); \& \left(\frac{dQ}{dz}\right) = \left(\frac{dR}{dy}\right),$$

Quarum conditionum, si una tantum defit, certo affirmare debemus, nullam exire functionem ipsarum $x, y, \& z$, cuius differentiale sit $Pdx + Qdy + Rdz$; huius modi ergo formularum differentialium nequidem requiri possunt integralia, hincque integrationem prorsus non recipere dicuntur. Facile autem intelligitur in calculo integrali formulas differentiales ante dignosci oportere, utrum integrationis sint capaces, quam investigatio integralis actu suscipiatur.



CA-

CAPUT VIII.

DE FORMULARUM DIFFERENTIALIUM ULTERIORI DIFFERENTIATIONE.

242.

Si unica variabilis adsit, eiusque differentiale primum constans assumatur, supra iam methodus est tradita differentialia cuiusque gradus inveniendi. Scilicet si functionis cuiusvis differentiale denuo differentietur, oritur eius differentiale secundum, hocque iterum differentiatum dat functionis differentiale tertium, atque ita porro. Haec vero eadem regula locum quoque habet, siue functio plures involvat variables siue unicam tantum, cuius differentiale primum non ponitur constans. Sit igitur V functio quaecunque ipsius x , neque vero dx sit constans, sed utcunque variable, ita ut ipsius dx differentiale sit $=ddx$, huiusque differentiale $=d^3x$, & ita porro, atque investigemus differentialia secundum & sequentia functionis V .

243. Ponamus differentiale primum functionis V esse $=Pd^2x$, ubi erit P functio quaequam ipsius x pendens ab V . Si iam functionis V differentiale secundum invenire velimus, eius differentiale primum Pd^2x denuo differentiari oportet; quod cum sit productum ex duabus quantitativis variabilibus P & d^2x , quarum illius differentiale sit $dP = pd^2x$, huius vero d^2x differentiale dd^2x , per regulam de factoribus datam erit differentiale secundum $ddV = Pd^3x + pd^4x$. Deinde si ponatur $dp = qdx$, cum differentiale ipsius d^2x sit $2dxdd^2x$, erit iterum differentiando

$$d^3V = Pd^3x + dPd^3x + 2pd^2xdd^2x + dpd^4x,$$

iam ob $dP = pd^2x$ & $dp = qdx$; erit

$$d^3V = Pd^3x + 3pd^2xdd^2x + qdx^3,$$

similique modo ulteriora differentialia invenientur.

244. Applicemus haec ad potestates ipsius x , quarum singula differentialia investigemus, si dx non ponatur constans:

I. Sit igitur $V = x$; erit $dV = dx$; $d^2V = d^2x$;
 $d^3V = d^3x$; $d^4V = d^4x$;
 &c.

II. Sit $V = x^2$; erit $dV = 2xdx$; &c
 $ddV = 2xddx + 2dx^2$
 $d^3V = 2xd^2x + 6dxddx$
 $d^4V = 2xd^3x + 8dx d^2x + 6ddx^2$
 $d^5V = 2xd^4x + 10dx d^3x + 20ddx d^2x$
 &c.

III. Si in genere fuerit $V = x^n$; erit
 $dV = nx^{n-1}dx$
 $ddV = nx^{n-1}ddx + n(n-1)x^{n-2}dx^2$
 $d^3V = nx^{n-1}d^3x + 3n(n-1)x^{n-2}dxddx$
 $+ n(n-1)(n-2)x^{n-3}dx^3$
 $d^4V = nx^{n-1}d^4x + 4n(n-1)x^{n-2}dx d^3x$
 $+ 3n(n-1)x^{n-2}ddx^2$
 $+ 6n(n-1)(n-2)x^{n-3}dx^2ddx$
 $+ n(n-1)(n-2)(n-3)x^{n-4}dx^4$
 &c.

Si igitur fuerit dx constans, ac propterea

$$ddx = 0, \quad d^3x = 0, \quad d^4x = 0, \quad \&c.$$

orientur eadem differentialia, quae iam supra pro hac hypothesi sunt inventa.

245. Quoniam igitur differentialia cuiusque ordinis ipsius x eadem lege differentiantur, qua quantitates finitae, expressiones quaecunque, in quibus praeter quantitatem finitam eius differentialia occurrunt, secundum praecepta supra data differentiari poterunt. Quam operationem, cum nonnunquam occurrat, hic aliquot exemplis illustrabimus.

I.

I. Si fuerit $V = \frac{x d d x}{d x^2}$, differentiando prodibit

$$dV = \frac{x d^2 x}{d x^2} + \frac{d d x}{d x} - \frac{2 x d d x^2}{d x^3}.$$

II. Si fuerit $V = \frac{x}{d x}$; erit $dV = 1 - \frac{x d d x}{d x^2}$,

ubi nihil impedit, quod pro V quantitatem infinite magnam posuimus.

III. Si fuerit $V = x x' \frac{d d x}{d x^2}$, quia transmutatur

$$V \text{ in } x x' d d x - 2 x x' d x;$$

erit secundum regulas consuetae differentiando:

$$dV = 2 x x' d d x + \frac{x x' d^2 x}{d d x} - 4 x x' d x - \frac{2 x x' d d x}{d x}.$$

Simili autem modo differentialia altiora ipsius V reperientur.

246. Si expressio proposita duas variables involvat, nempe x & y , vel unius differentiale ponitur constans vel neutrius; arbitrarium enim est alterutrius differentiale constans assumi, quia ab arbitrio nostro pendet, quemadmodum unius valores successivos crescere statuere velimus. Neque vero utriusque variabilis differentialia simul statui possunt constantia, hoc ipso enim ratio inter variables x & y assumetur, quae tamen vel nulla est, vel incognita ponitur. Si enim, dum x aequabiliter crescere ponimus, y quoque aequalia incrementa capere statueretur, tum eo ipso indicaretur fore $y = ax + b$; sicque y ab x penderet, quod tamen assumere non licet. Hancobrem vel unius tantum variabilis differentiale constans assumi potest vel nullum. Quodsi autem differentiationes absolvere noverimus nullo differentiali assumto constante, simul quoque differentialia constabunt, si alterutrum differentiale ponatur constans: tantum enim opus est; ut si

dx

dx constans statuatur; ubique termini continentes ddx, d^3x, d^4x , &c. deleantur.

247. Denotet ergo V functionem quamcunque finitam ipsarum x & y , sitque $dV = Pd x + Qdy$. Ad differentiale ipsius V secundum inveniendum assumamus utrumque differentiale dx & dy variabile, & cum P & Q sint functiones ipsarum x & y statuamus:

$$\begin{aligned} dP &= pdx + rdy \\ dQ &= rdx + qdy \end{aligned}$$

supra enim vidimus esse $\left(\frac{dP}{dy}\right) = \left(\frac{dQ}{dx}\right) = r$.

His positis differentietur $dV = Pd x + Qdy$, & reperietur:

$$ddV = Pddx + pdx^2 + 2rdxdy + Qddy + qdy^2.$$

Si igitur differentiale dx statuatur constans, erit

$$ddV = pdx^2 + 2rdxdy + Qddy + qdy^2,$$

sin autem differentiale dy statueretur constans, foret

$$ddV = Pddx + pdx^2 + 2rdxdy + qdy^2.$$

248. Si igitur functio quaecunque ipsarum x & y bis differentietur, nullo differentiali posito constante, eius differentiale secundum semper huiusmodi formam habebit:

$$ddV = Pddx + Qddy + Rdx^2 + Sdy^2 + Tdxdy.$$

pendebunt autem quantitates P , Q , R , S , & T ita a se invicem, ut sit signandi modo Capite praecedente adhibito:

$$\left(\frac{dP}{dy}\right) = \left(\frac{dQ}{dx}\right); R = \left(\frac{dP}{dx}\right); S = \left(\frac{dQ}{dy}\right);$$

$$\& T = 2 \left(\frac{dQ}{dx}\right) = 2 \left(\frac{dP}{dy}\right),$$

quarum conditionum si vel unica desit, certo affirmare poterimus, formulam propositam nullius functionis esse differentiale secundum. Statim ergo dignosci poterit, utrum huiusmodi formula sit cuiuspiam quantitatis differentiale secundum an minus.

249. Simili modo differentialia tertia ac sequentia inveniuntur, quod in exemplo particulari ostendisse expediet, quam formulas generales adhibendo.

Sit igitur $V = xy$;

$$\text{Erit } dV = ydx + xdy$$

$$ddV = yddx + 2dx dy + xddy$$

$$d^3V = yd^3x + 3dyddx + 3dxddy + xd^3y$$

$$d^4V = yd^4x + 4dyd^3x + 6ddxddy + 4dx d^3y + xd^4y$$

&c.

in quo exemplo coefficientes numerici legem potestatum binomii sequuntur, indeque quousque libuerit continuari possunt.

At si fuerit $V = \frac{y}{x}$;

$$\text{Erit } dV = \frac{dy}{x} - \frac{ydx}{xx}$$

$$ddV = \frac{ddy}{x} - \frac{2dx dy}{xx} + \frac{2ydx^2}{x^3} - \frac{yddy}{x^2}$$

$$d^3V = \frac{d^3y}{x} - \frac{3dxddy}{xx} + \frac{6dx^2 dy}{x^3} - \frac{3dyddx}{x^2} \\ + \frac{6ydx ddx}{x^3} - \frac{6ydx^3}{x^4} - \frac{yd^3x}{x^2}$$

in quo exemplo progressio differentialium non tam facile patet quam in praecedente.

250. Neque vero tantum haec differentiandi methodus ad functiones finitas adstringitur, sed etiam eodem negotio cuiusvis expressionis, quae iam differentialia in se continet, differentiale inveniri potest, siue unum quoddam differentiale assumitur constans siue minus. Cum enim singula differentialia aequae & eadem lege differentientur ac quantitates finitae, regulae in praecedentibus capitibus traditae, etiam hic valent atque observari debent. Denotet igitur V eam expressionem, quam

quam differentiari oportet, five sit finita, five infinite magna five infinite parva; atque ratio differentiationis ex his exemplis perspicietur:

$$\text{I. Sit } V = \sqrt{dx^2 + dy^2};$$

$$\text{Erit } dV = \frac{dxddx + dyddy}{\sqrt{dx^2 + dy^2}}.$$

$$\text{II. Sit } V = \frac{ydx}{dy};$$

$$\text{Erit } dV = dx + \frac{yddx}{dy} - \frac{ydxddy}{dy^2}.$$

$$\text{III. Sit } V = \frac{(dx^2 + dy^2)^{\frac{3}{2}}}{dxddy - dyddx};$$

$$\begin{aligned} \text{Erit } dV = & \frac{(3dxddx + 3dyddy)\sqrt{dx^2 + dy^2}}{dxddy - dyddx} \\ & - \frac{(dx^2 + dy^2)^{\frac{3}{2}}(dx d^3y - dy d^3x)}{(dxddy - dyddx)^2}. \end{aligned}$$

quae differentialia cum sint generalissime sumta, nullo differentiali pro constante habito, hinc facile ea differentialia derivari poterunt, quae oriuntur, si vel dx vel dy statuatur constans.

251. Quia nullo differentiali constante assumpto, nulla etiam lex, secundum quam successivi variabilium valores progrediantur, praescribitur, differentialia secunda & sequentium ordinum non erunt determinata, neque quicquam certi significabunt. Hinc formula, in qua differentialia secunda atque altiora continentur, nullum determinatum habebit valorem, nisi quodpiam differentiale constans sit assumptum; sed eius significatio erit vaga, atque variabitur, prouti aliud atque aliud differentiale fuerit constans positum. Interim tamen dantur quo-

que eiusmodi expressiones differentialia secunda continentes, quae, etiamsi nullum differentiale positum sit constans, tamen significatum determinatum complectuntur, qui perpetuo idem maneant, quodcunque differentiale constans statuatur. Huiusmodi autem formularum naturam infra diligentius scrutabimur, modumque trademus eas ab aliis, quae valores determinatos non includunt, dignoscendi.

252. Quo haec ratio formularum, in quibus differentialia secunda vel altiora insunt, facilius perspiciatur, contemplerur primum formulas unicam variabilem continentes, atque facile patet, si in quapiam formula insit eius variabilis x differentiale secundum ddx , nullumque differentiale constans statuatur, formulam nullum valorem fixum habere posse. Si enim statuatur differentiale ipsius x constans, fiet $ddx = 0$; sin autem ipsius xx differentiale $2x dx$ seu $x dx$ constans ponatur, cum ipsius xx differentiale $x dx + dx^2$ sit $= 0$, fiet

$$ddx = -\frac{dx^2}{x}. \text{ Verum si potestatis cuiuscunque } x^n \text{ diffe-}$$

rentiale $nx^{n-1} dx$ seu $x^{n-1} dx$ debeat esse constans; erit eius differentiale secundum $x^{n-1} ddx + (n-1)x^{n-2} dx^2 = 0$,

$$\text{ideoque } ddx = -\frac{(n-1)dx^2}{x}. \text{ Alii valores pro } ddx \text{ prodi-}$$

bunt, si aliarum ipsius x functionum differentialia constantia ponantur. Manifestum autem est, formulam, in qua ddx occurrat, diversissimos induere valores, prout loco ddx

$$\text{scribatur vel } 0 \text{ vel } -\frac{dx^2}{x} \text{ vel } -\frac{(n-1)dx^2}{x} \text{ vel alia}$$

huiusmodi expressio. Scilicet si proponatur formula $\frac{xx ddx}{dx^2}$,

quae ob ddx & dx^2 infinite parva homogenea, finitum valorem habere deberet; ea posito dx constante abit in 0, si sit dx^2 constans, ea abit in $-x$; si sit dx^3 constans, ea abit in $-2x$; si dx^4 sit constans, ea abit in $-3x$ & ita por-

perro. Neque ergo determinatum valorem habere potest, nisi definiatur, cuiusmodi differentiale constans sit assumtum.

253. Ista inconstantia significationis simili ratione ostenditur, si differentiale tertium in quapiam formula insit.

Consideremus hanc formulam $\frac{x^3 d^3 x}{dx ddx}$, quae pariter finitum valorem prae se fert. Si differentiale dx sit constans, abit ea in $\frac{0}{0}$, cuius valor mox patebit. Sit dx^2 constans, erit

$$ddx = -\frac{dx^2}{x}; \text{ \& denuo differentiando}$$

$$d^3x = -\frac{2dx ddx}{x} + \frac{dx^3}{x^2} = \frac{3dx^3}{x^2}, \text{ ob } ddx = -\frac{dx^2}{x},$$

hoc ergo casu formula proposita $\frac{x^3 d^3 x}{dx ddx}$ abit in $-3x^2$.

At si fuerit dx^n constans, erit $ddx = -\frac{(n-1)dx^2}{x}$,

hincque

$$\begin{aligned} d^3x &= -\frac{2(n-1)dx ddx}{x} + \frac{(n-1)dx^3}{x^2} = \frac{2(n-1)^2 dx^3}{xx} \\ &+ \frac{(n-1)dx^3}{xx} = \frac{(2n-1)(n-1)dx^3}{xx} \end{aligned}$$

Hoc ergo casu erit

$$\frac{d^3x}{ddx} = -\frac{(2n-1)dx}{x}, \text{ \& } \frac{x^3 d^3 x}{dx ddx} = -(2n-1)x^2,$$

unde patet si sit $n=1$, seu dx constans, valorem formulae fore $= -x^2$. Ex quo manifestum est, si in quapiam formula differentialia tertia vel altiora occurrant, neque simul indicetur, cuiusmodi differentiale assumtum sit constans, eam formulam nullum certum valorem habere, atque adeo nihil pror-

prorsus significare; quamobrem tales expressiones in calculo occurrere non possunt.

254. Simili modo si formula contineat duas pluresve variables, in eaque occurrant differentialia secundi altiorisve gradus, intelligetur valorem determinatum locum habere non posse, nisi differentiale quodpiam constans statuatur, iis tantum exceptis casibus, quos mox perpendemus. Quam primum enim ddx in quapiam formula inest, quoniam pro variis differentialibus, quae constantia ponuntur, valor ipsius ddx perpetuo variatur, fieri nequit, ut formula statum obtineat valorem; hocque idem valet de quovis differentiali altiori ipsius x , atque etiam de differentialibus reliquarum variabilium secundis & altioribus. Sin autem duarum pluriumve variabilium differentialia secunda insint, fieri potest, ut inconstantia ab uno oriunda per inconstantiam reliquarum destruat; hincque nascitur ille casus, cuius meminimus, quo formula huiusmodi differentialia secunda duarum pluriumve variabilium involvens valorem definitum habere potest, non obstante quod nullum differentiale constans sit positum.

255. Haec igitur formula $\frac{y ddx + x ddy}{dx dy}$, statam atque fixam significationem habere nequit, nisi quodpiam differentiale primum constans statuatur. Nam si dx constans ponatur habebitur $\frac{x ddy}{dx dy}$; sin autem dy constans ponatur, habebitur $\frac{y ddx}{dx dy}$; manifestum autem est has formulas non necessario inter se esse aequales. Si enim necessario essent aequales, tales manere deberent, quaecunque functio ipsius x loco y substitueretur. Ponamus tantum esse $y = xx$, & cum posito dx constante, sit $ddy = 2dx$, formula $\frac{x ddy}{dx dy}$ abibit in

in 1, fin autem dy seu $2x dx$ ponatur constans, fiet
 $ddy = 2x ddx + 2dx^2 = 0$, ideoque $ddx = -\frac{dx^2}{x}$,

unde formula $\frac{y ddx}{dx dy}$ abit in $-\frac{1}{2}$. Cum igitur in unico ca-

su reperiatur discrepantia, multo minus in genere erit $\frac{x ddy}{dx dy}$

posito dx constante aequalis $\frac{y ddx}{dx dy}$ posito dy constante. Deinde

quia formula $\frac{y ddx + x ddy}{dx dy}$ sibi non constat, dummodo vel

dx vel dy constans ponatur, multo minus sibi constabit, si
 functionis cuiusvis vel ipsius x vel ipsius y vel utriusque dif-
 ferentiale constans ponatur.

236. Hinc apparet huiusmodi formulam statum valo-
 rem habere non posse, nisi ita sit comparata, ut postquam
 loco variabilium y , & x , quae praeter x insunt, functiones
 quaecunque ipsius x fuerint substitutae, differentialia secunda
 & altiora ipsius x , nempe ddx , d^3x , &c. penitus ex calculo
 excedant. Si enim post talem substitutionem quamcunque in
 formula adhuc relinqueretur ddx , vel d^3x , vel d^4x , &c. quia
 haec differentialia, prout alia aliaque constantia assumuntur,
 significationem suam variant, valor quoque ipsius formulae erit
 vagus. Sic comparata est formula ante proposita $\frac{y ddx + x ddy}{dx dy}$,

quae si statum haberet valorem, quicquid y significet,
 statum quoque habere deberet valorem, si y denotaret fun-
 ctionem quampiam ipsius x . At si tantum ponamus $y = x$,

formula abit in $\frac{2x ddx}{dx^2}$ quae utique ob ddx in ea conten-

tum est vaga, atque alios aliosque valores induit, prouti alia
 atque

atque alia differentia constantia ponuntur, uti ex §. 252 satis est manifestum.

257. Dubium autem hic subnascetur, utrum dentur tales formulae duo plurave differentia secundi altiorisve gradus continentia, quae hac proprietate gaudeant, ut si loco reliquarum variabilium quaecunque functiones unius substituantur, differentia secundi gradus prorsus se destruant. Huic dubio primum ita occurramus, ut huiusmodi formulam proponamus, quae ista proprietate sit praedita, quo per explorationem vis quaestionis melius percipiatur. Dico igitur hanc formulam $\frac{dyddx - dxddy}{dx^3}$ memoratam proprietatem possidere:

quaecunque enim functio ipsius x loco y substituat, semper differentia secundi gradus penitus evanescunt; quam proprietatem sequentibus exemplis comprobemus.

I. Sit $y = x^2$; erit $dy = 2x dx$, & $ddy = 2x ddx + 2dx^2$, qui valores in formula $\frac{dyddx - dxddy}{dx^3}$ substituti dabunt,

$$\frac{2x dx ddx - 2x dx ddx - 2dx^2}{dx^3} = -2.$$

II. Sit $y = x^n$; erit $dy = nx^{n-1} dx$,

$$\& ddy = nx^{n-1} ddx + n(n-1)x^{n-2} dx^2$$

qui valores substituti formulam $\frac{dyddx - dxddy}{dx^3}$ transmutabunt in hanc

$$\frac{nx^{n-1} dx ddx - nx^{n-1} dx ddx - n(n-1)x^{n-2} dx^3}{dx^3} = -n(n-1)x^{n-2}.$$

III. Sit $y = -\sqrt{1-x}$; erit $dy = \frac{x dx}{\sqrt{1-x}}$,
&

$$\& \quad ddy = \frac{x ddx}{\sqrt{(1-xx)}} + \frac{dx^2}{(1-xx)^{\frac{3}{2}}};$$

atque formula $\frac{dyddx - dxddy}{dx^3}$, abit in

$$\frac{x ddx}{dx^2 \sqrt{(1-xx)}} - \frac{x ddx}{dx^2 \sqrt{(1-xx)}} - \frac{1}{(1-xx)^{\frac{3}{2}}} = \frac{-1}{(1-xx)^{\frac{3}{2}}},$$

In his igitur omnibus exemplis differentialia secunda ddx se mutuo tollunt, hocque ita eveniet, quaecunque aliae functiones loco y substituantur.

258. Cum ista exempla iam probaverint veritatem nostrae propositionis, quod formula $\frac{dyddx - dxddy}{dx^3}$ fixum

habeat valorem, etiamsi nullum differentiale constans sit assumptum, demonstrationem eo facilius adornare poterimus. Sit y functio quaecunque ipsius x , eiusque differentiale dy huiusmodi erit, ut sit $dy = p dx$, atque p erit functio quaequam ipsius x , eiusque differentiale propterea huiusmodi formam habebit $dp = q dx$, eritque q iterum functio ipsius x . Cum igitur sit $dy = p dx$, erit differentiando $ddy = p ddx + q dx^2$, & $dyddx - dxddy = p dx ddx - p dx ddx - q dx^3 = -q dx^3$; in qua expressione cum nullum insit differentiale secundum, habebit ea valorem fixum, atque $\frac{dyddx - dxddy}{dx^3}$ erit $= -q$.

Quomodocunque igitur y pendeat ab x , differentialia secunda in hac formula semper se mutuo tollent, hancque ob causam eius valor, qui alioquin esset vagus, fiet status ac fixus.

259. Quanquam hic posuimus y esse functionem ipsius x , tamen veritas aequae subsistit, si y ab x prorsus non pendeat, uti assumimus. Dum enim pro y functionem quamcunque substituimus, neque qualis sit determinavimus, nullam dependentiam ab x ipsi y tribuimus. Interim tamen sine fun-

Z

ctio-

tionis mentione demonstratio formari potest; quaecunque enim y sit quantitas sive pendens ab x sive non pendens, eius differentiale dy homogeneum erit cum dx , sicque $\frac{dy}{dx}$ quantitatem finitam denotabit, cuius differentiale, quod capit, dum x in $x+dx$ & y in $y+dy$ abit, erit fixum, neque a differentialium secundorum lege pendeat. Sit igitur $\frac{dy}{dx} = p$;

$$\text{erit } dy = p dx, \text{ \& } ddy = p ddx + dp dx, \text{ unde fit } \\ dxdy - dyddx = dpdx^2,$$

cuius valor non est vagus, quia tantum differentialia prima continet; ac propterea idem manet, sive quodpiam differentiale constans accipiat, quaecunque id demum sit, sive nullo differentiale positum sit constans.

260. Quia igitur $dyddx - dxddy$ non obstantibus differentialibus secundis, quae potentia se mutuo destruere cense-ri possunt, significationem habet fixam; expressio quaecunque, in qua nulla alia differentialia secunda praeter formulam $dyddx - dxddy$ insunt, pariter significationem habebit fixam. Seu si ponatur $dyddx - dxddy = \omega$, atque V fuerit quantitas ex x, y , earum differentialibus primis dx, dy atque ex ω utcunque composita, ea valorem habebit fixum. Cum enim in differentialibus primis dx & dy nulla ratio habeatur eius legis arbitrariae, qua valores successivi ipsius x crescere ponuntur, in ω differentialia secunda se mutuo tollunt, etiam ipsa quantitas V non erit vaga sed fixa. Sic ista expressio $\frac{(dx^2 + dy^2)^{\frac{3}{2}}}{dxddy - dyddx}$ valorem obtinet fixum, quamvis ea differentialibus secundis inquinata videatur, atque insuper, quia numerator est homogeneus denominatori, valorem obtinet finitum, nisi is casu vel infinitae magnus vel infinitae parvus evadat.

261. Quemadmodum formula $dxddy - dyddx$ valorem fixum habere ostensa est, ita quoque si tertia variabilis z accedat; hae formulae: $dxddz - dzddx$ & $dyddz - dzddy$ valores fixos habebunt. Hinc expressiones, quas tres variables x , y , & z involvunt, si in eis nulla alia differentialia secunda occurrant, praeter haec assignata, tum perinde erunt fixae, ac si nulla plane differentialia secunda inessent. Ita haec expressio:

$$\frac{(dx^2 + dy^2 + dz^2)^{\frac{3}{2}}}{(dx + dz)ddy - (dy + dz)ddx + (dx - dy)ddz}$$

non obstantibus differentialibus secundis, fixa gaudet significatione. Similique modo formulae exhiberi possunt, plures variables continentes, in quibus differentialia secunda non impediunt, quominus earum significatio sit fixa.

262. Exceptis ergo huius generis formulis, quae differentialia secunda complectuntur, reliquae omnes significationes habebunt vagas, neque propterea in calculo locum habere possunt, nisi quodpiam differentiale primum definiatur, quod constans sit assumtum. Statim vero atque differentiale quodpiam primum constans assumitur, omnes expressiones quotcunque variables contineant, & cuiuscunque ordinis differentialia post primum in eas ingrediuntur, fixas obtinebunt significationes, neque amplius ex calculo excluduntur. Si enim verbi gratia dx assumtum sit constans, ipsius x differentialia secunda & sequentia evanescent; & quaecunque functiones ipsius x loco reliquarum variabilium y , z , &c. substituantur, earum differentialia secunda per dx^2 , tertia per dx^3 , &c. determinabuntur, sicque inconstantia a differentialibus secundis oriunda tollitur. Idem evenit, si alius variabilis seu functionis cuiuscunque differentiale primum constans ponatur.

263. Ex his igitur sequitur differentialia secunda & altiorum ordinum revera nunquam in calculum ingredi, atque ob vagam significationem prorsus ad Analysin esse inepta.

Z 2

Quan-

Quando enim differentialia secunda adesse videntur, vel differentiale quodpiam primum constans assumitur, vel nullum. Priori casu differentialia secunda prorsus ex calculo evanescunt, dum per differentialia prima determinantur. Posteriori casu autem nisi se mutuo destruant, significatio erit vaga, & propterea in Analyfi locum nullum inveniunt; sin autem se mutuo destruunt, tantum apparenter adsunt, & revera solae quantitates finitae cum suis differentialibus primis adesse censendae sunt. Quoniam tamen saepissime apparenter tantum in calculo usurpantur, necesse fuit, ut methodus eas tractandi exponeretur. Modum autem mox ostendemus, cuius ope differentialia secunda & altiora semper exterminari queant.

264. Si expressio unicam contineat variabilem x , eiusque differentialia altiora ddx , d^3x , d^4x , &c. in ea occurrant, ea significatum fixum habere nequit, nisi quodpiam differentiale primum constans sit positum. Sit igitur t illa quantitas variabilis, cuius differentiale dt sit constans positum, ita ut sit $ddt = 0$, $d^3t = 0$, $d^4t = 0$, &c. Ponatur $dx = p dt$; eritque p quantitas finita, cuius differentiale vaga significatione differentialium secundorum non afficietur, hincque etiam $\frac{dp}{dt}$ erit

quantitas finita. Sit $dp = q dt$, similique modo ulterius $dq = r dt$; $dr = s dt$; &c. erunt q, r, s , &c. quantitates finitae fixos significatus habentes. Cum igitur sit $dx = p dt$; erit

$$ddx = dp dt = q dt^2; d^3x = dq dt^2 = r dt^3;$$

$$d^4x = dr dt^3 = s dt^4; \&c.$$

qui valores si loco ddx , d^3x , d^4x , &c. substituantur, tota expressio meras quantitates finitas cum differentiali primo dt continebit, ideoque non amplius vagam significationem habebit.

265. Si x sit functio ipsius t , poterit hoc modo quantitas x prorsus eliminari, ita ut sola quantitas t cum suo differentiali dt in expressione remaneat: sin autem t sit functio

Etio ipsius x , vicissim quoque x erit ipsius t functio. Interim tamen ipsa quantitas x cum suo differentiali primo dx , in calculo retineri potest, dummodo post substitutiones ante factas ubique loco t & dt earum valores per x & dx expressi restituantur. Quod quo planius fiat, ponamus t esse $= x^n$, ita ut differentiale primum ipsius x^n constans sit positum.

Quia igitur est

$$dt = nx^{n-1} dx; \text{ erit } p = \frac{1}{nx^{n-1}}; \quad \&$$

$$dp = \frac{-(n-1)dx}{nx^n} = qdt = nqx^{n-1} dx;$$

$$\text{unde fit } q = \frac{-(n-1)}{nx^{2n-1}}; \quad \&$$

$$dq = \frac{(n-1)(2n-1)dx}{nmx^{2n}} = rdt = nrx^{n-1} dx.$$

Hinc porro fit

$$r = \frac{(n-1)(2n-1)}{n^3 x^{3n-1}}; \quad \& \quad s = -\frac{(n-1)(2n-1)(3n-1)}{n^4 x^{4n-1}}.$$

Quare si differentiale ipsius x^n ponatur constans, erit:

$$ddx = -\frac{(n-1)dx^2}{x}$$

$$d^3x = \frac{(n-1)(2n-1)dx^3}{xx}$$

$$d^4x = -\frac{(n-1)(2n-1)(3n-1)dx^4}{x^3}$$

&c.

266. Si expressio duas contineat variables x & y , earumque unius x differentiale positum sit constans, ob $ddx=0$, alia differentiaalia secunda & altiora non inerunt, praeter ddy , d^3y , &c. Haec autem eodem modo, quo ante usi sumus, tolli poterunt ponendo

dy

$$dy = p dx; dp = q dx; dq = r dx; dr = s dx; \&c.$$

$$\text{fiet enim } ddy = q dx^2; d^3 y = r dx^3; d^4 y = s dx^4 \&c.$$

quibus substitutis expressio orietur, quae praeter quantitates finitas $x, y, p, q, r, s, \&c.$ nonnisi differentiale primum dx continebit. Sic si proposita fuerit haec expressio

$$\frac{y dx^4 + x dy d^3 y + x d^4 y}{(xx + yy) ddy}$$

in qua dx est constans assumtum; ponatur

$$dy = p dx; dp = q dx; dq = r dx; \& dr = s dx;$$

quibus valoribus substitutis expressio proposita transmutabitur

$$\text{in hanc: } \frac{(y + xpr + xs) dx^2}{(xx + yy) q} \text{ quae nulla amplius differentia-}$$

lia secunda altiorave continet.

267. Simili modo differentialia secunda & altiora tollentur, si dy fuerit constans assumtum. Verum si aliud differentiale primum quodcunque dt statuatur constans, tum primum modo ante indicato differentialia ipsius x altiora ex calculo tollantur, ponendo

$$dx = p dt; dp = q dt; dq = r dt; dr = s dt; \&c.$$

unde fit

$$ddx = q dt^2; d^3 x = r dt^3; d^4 x = s dt^4; \&c.$$

Deinde simili modo differentialia altiora ipsius y ponendo

$$dy = P dt; dP = Q dt; dQ = R dt; dR = S dt; \&c.$$

unde fiet

$$ddy = Q dt^2; d^3 y = R dt^3; d^4 y = S dt^4; \&c.$$

quibus substitutis obtinebitur expressio, quae praeter quantitates finitas, $x, p, q, r, s, \&c. y, P, Q, R, S, \&c.$ solum differentiale dt complectetur, neque propterea vagam habebit significationem.

268. Si differentiale primum, quod constans ponitur, vel ab x vel ab y vel ab utroque simul pendet, tum non opus

opus est, ut duplex quantitatum finitarum $p, q, r, \&c.$ series introducatur. Si enim dt ab x tantum pendet, tum litterae $p, q, r, \&c.$ fient functiones ipsius x , solaeque litterae $P, Q, R, \&c.$ ingrediuntur; idemque evenit, si differentiale constans dt ab y tantum pendeat. At si dt ab utraque pendeat, operatio aliquantulum immutari debet. Ponamus exempli gratia hoc differentiale ydx constans esse assumptum, eritque

$$yddx + dx dy = 0; \text{ unde fit } ddx = -\frac{dx dy}{y}. \text{ Sit nunc}$$

$$dy = pdx; dp = qdx; dq = rdx \&c. \text{ eritque } ddx = -\frac{pdx^2}{y};$$

ulteriusque differentiendo

$$d^3x = -\frac{qdx^3}{y} + \frac{ppdx^3}{yy} - \frac{2pdxd dx}{y},$$

substituatur hic loco ddx eius valor $-\frac{pdx^2}{y}$; fiet

$$d^3x = -\frac{qdx^3}{y} + \frac{3ppdx^3}{yy}; \text{ porroque}$$

$$d^4x = -\frac{rdx^4}{y} + \frac{pqdx^4}{yy} + \frac{6pqdx^4}{yy} - \frac{6p^3dx^4}{y^3} \\ + \left(\frac{3pp}{yy} - \frac{q}{y} \right) 3dx^2 ddx;$$

& pro ddx substituto valore $-\frac{pdx^2}{y}$ emerget

$$d^4x = \left(-\frac{r}{y} + \frac{10pq}{yy} - \frac{15p^3}{y^3} \right) dx^4 \&c.$$

Deinde cum sit $dy = pdx$; erit

$$ddy$$

$$ddy = qdx^2 + pddx = \left(q - \frac{pp}{y} \right) dx^2;$$

& continuo pro ddx valore $-\frac{pdx^2}{y}$ substituendo fiet

$$d^3y = \left(r - \frac{4pq}{y} + \frac{3p^3}{yy} \right) dx^3, \quad \&$$

$$d^4y = \left(s - \frac{7pr}{y} - \frac{4qq}{y} + \frac{25ppq}{yy} - \frac{15p^4}{y^3} \right) dx^4 \quad \&c.$$

qui valores loco differentialium altiorum ipsarum x & y substituti mutabunt expressionem propositam in eiusmodi formam, quae nulla amplius differentialia altiora continebit, hincque consideratione cuiuspiam differentialis constantis exuetur. Facta enim hac transformatione, quia differentialia secunda non insunt, nequidem opus est, ut quale differentiale sumtum sit constans, commemoretur.

269. Saepissime autem in calculo ad lineas curvas applicato evenire solet, ut hoc differentiale primum $\sqrt{(dx^2 + dy^2)}$ constans assumatur: quare quemadmodum hoc casu differentialia secunda & altiora eliminari debeant, ostendamus. Sic enim simul via patebit ad idem negotium absolvendum, si aliud quodcunque differentiale assumendum sit constans. Ponatur iterum $dy = pdx$; $dp = qdx$; $dq = rdx$; $dr = sdx$; &c. atque differentiale $\sqrt{(dx^2 + dy^2)}$ induet hanc formam $dx\sqrt{(1 + pp)}$, quae cum sit constans fiet

$$ddx\sqrt{(1 + pp)} + \frac{pqdx^2}{\sqrt{(1 + pp)}} = 0,$$

$$\text{ideoque} \quad ddx = -\frac{pqdx^2}{1 + pp};$$

unde iam ipsius ddx valor habebitur: hinc porro erit

$$d^3x$$

$$\begin{aligned}
 d^3x &= -\frac{prd\dot{x}^3}{1+pp} - \frac{qqd\dot{x}^3}{1+pp} + \frac{2ppqqd\dot{x}^3}{(1+pp)^2} - \frac{2pqd\dot{x}dd\dot{x}}{1+pp} \\
 &= -\frac{prd\dot{x}^3}{1+pp} - \frac{qqd\dot{x}^3}{1+pp} + \frac{4ppqqd\dot{x}^3}{(1+pp)^2} \\
 &= -\frac{prd\dot{x}^3}{1+pp} + \frac{(3pp-1)qqd\dot{x}^3}{(1+pp)^2}.
 \end{aligned}$$

Deinde fiet:

$$d^4x = -\frac{psd\dot{x}^4}{1+pp} + \frac{(10pp-3)qrd\dot{x}^4}{(1+pp)^2} - \frac{(15pp-13)pq^3d\dot{x}^4}{(1+pp)^3}.$$

Quia autem assumimus $dy = p d\dot{x}$, fiet differentiando

$$ddy = q d\dot{x}^2 + p dd\dot{x} = q d\dot{x}^2 - \frac{ppq d\dot{x}^2}{1+pp} = \frac{q d\dot{x}^2}{1+pp},$$

$$d^3y = \frac{rd\dot{x}^3}{1+pp} - \frac{2pqqd\dot{x}^3}{(1+pp)^2} + \frac{2qd\dot{x}dd\dot{x}}{1+pp}, \quad \text{ideoque}$$

$$d^3y = \frac{rd\dot{x}^3}{1+pp} - \frac{4pqqd\dot{x}^3}{(1+pp)^2};$$

porroque differentiando:

$$d^4y = \frac{sd\dot{x}^4}{1+pp} - \frac{13pqr d\dot{x}^4}{(1+pp)^2} + \frac{4(6pp-1)q^3d\dot{x}^4}{(1+pp)^3}.$$

Omnia ergo differentialia altiora utriusque variabilis x & y per quantitates finitas & potestates ipsius $d\dot{x}$ exprimentur, atque post has substitutiones factas resultabit expressio a differentialibus secundis prorsus libera.

270. Exposito igitur modo differentialia secunda & altiora exuendi, conveniet hoc negotium aliquot exemplis illustrari.

I. Sit proposita haec expressio $\frac{ddy}{d\dot{x}^2}$, in qua $d\dot{x}$ positum

Aa

est

est constans. Posito ergo $dy = p dx$, & $dp = q dx$, ob $ddy = q dx^2$, expressio proposita abit in hanc finitam xq .

II. Sit proposita haec expressio $\frac{dx^2 + dy^2}{ddx}$, in qua positum sit dy constans. Ponatur $dx = p dy$; $dp = q dy$, ob $ddx = q dy^2$, orietur $\frac{1+pp}{q}$. Sin autem ut ante statuere velimus $dy = p dx$, $dp = q dx$; ob dy constans erit $0 = p ddx + dp dx$ & $ddx = -\frac{q dx^2}{p}$; unde expressio proposita transibit in $\frac{-p(1+pp)}{q}$.

III. Sit proposita haec expressio $\frac{y ddx - x ddy}{dxdy}$ in qua $y dx$ positum sit constans. Ponatur $dy = p dx$ & $dp = q dx$, eritque ex §. 268: $ddx = -\frac{p dx^2}{y}$, $ddy = q dx^2 - \frac{pp dx^2}{y}$, quibus substitutis expressio proposita transmutatur in hanc: $-1 - \frac{xq}{p} + \frac{xp}{y}$.

IV. Sit proposita ista expressio $\frac{dx^2 + dy^2}{ddy}$, in qua constans sit positum $\sqrt{(dx^2 + dy^2)}$. Ponatur iterum $dy = p dx$, $dp = q dx$, & ex paragrapho praecedente erit $ddy = \frac{q dx^2}{1+pp}$; unde expressio proposita abibit in $\frac{(1+pp)^2}{q}$.

Ex

Ex his autem exemplis satis intelligitur, quemadmodum in quovis casu oblato, quodcunque differentiale primum assumptum sit constans, differentialia secunda atque altiora eliminari debeant.

271. Cum igitur hoc modo introducendis quantitatibus finitis p, q, r, s , &c. differentialia secunda & altiora ita eliminari queant, ut tota expressio praeter quantitates finitas x, y, p, q, r, s , &c. solum differentiale dx complectatur; vicissim si huiusmodi expressio reducta proponatur, ea iterum in formam priorem transmutari poterit loco litterarum p, q, r, s , &c. introducendis differentialibus secundis & altioribus. Nunc autem perinde erit, quodnam differentiale primum constans assumatur; atque vel id ipsum, quod ante fuit assumptum constans poni potest, vel aliud quodcunque. Quin etiam prorsus nullum differentiale constans assumi poterit, hocque modo prodibunt expressiones differentialia secunda altiorave continentes, quae etiamsi nullum differentiale constans sit assumptum, tamen fixas significationes obtineant, cuiusmodi expressiones dari supra ostendimus.

272. Sit ergo proposita expressio quaecunque continens litteras finitas x, y, p, q, r , &c. una cum differentiali dx ,

in qua sit $p = \frac{dy}{dx}$; $q = \frac{dp}{dx}$; $r = \frac{dq}{dx}$; &c. Si enim

has litteras p, q, r , &c. ita eliminare velimus, ut earum loco introducamus differentialia secunda & altiora ipsarum x & y , nullo differentiali constante assumpto; fiet

$$dp = \frac{dxddy - dyddx}{dx^2}, \text{ hincque } q = \frac{dxddy - dyddx}{dx^3},$$

quae formula differentiatia dabit

$$dq = \frac{dx^2 d^3 y - 3dxddxddy + 3dyddx^2 - dx dy d^3 x}{dx^4},$$

$$\text{unde fit } r = \frac{dx^2 d^3 y - 3dxddxddy + 3dyddx^2 - dx dy d^3 x}{dx^5}$$

A 2 2

Quod

Quod si insuper littera s , quae denotat valorem $\frac{dr}{dx}$, insit,

pro ea substitui debet hic valor $s =$

$$\frac{dx^2 d^4 y - 6 dx^2 ddxd^3 y - 4 dx^2 ddyd^3 x + 15 dx ddx^2 ddy + 10 dx dyddx^2 x - 15 dyddx^2 - dx^2 dyd^4 x}{dx^7}$$

His igitur valoribus loco quantitatum p, q, r, s &c. substitutis expressio proposita transmutabitur in aliam differentialia altiora ipsarum x & y continentem, quae etiam si nullum differentiale primum constans sit assumptum, tamen non vagam sed fixam habebit significationem.

273. Hoc ergo modo quaevis formula differentialis altioris gradus, in qua quodpiam differentiale primum assumptum est constans, transmutari poterit in aliam formam, in qua nullum differentiale constans ponitur, quae hoc non obstante eundem valorem fixum habeat. Primum scilicet operis methodi ante traditae assumptis valoribus

$$dy = p dx; dp = q dx; dq = r dx; dr = s dx; \&c.$$

differentialia altiora eliminantur, tum loco p, q, r, s , &c. valores nunc inventi substituantur, atque orietur expressio priori aequalis nullum differentiale constans involvens: quam transformationem exempla sequentia illustrabunt.

I. Sit proposita haec expressio $\frac{x ddy}{dx^2}$, in qua dx positum constans, quae transmutari debeat in aliam formam nullum differentiale constans involventem. Ponatur $dy = p dx; dp = q dx$; atque ut ante (270) vidimus expressio proposita transibit in hanc: qx . Nunc loco q substituaturs valor, quem obtinet nullo differentiali constanti assumpto $q = \frac{dx ddy - dy ddx}{dx^3}$

atque reperietur haec expressio $\frac{x dx ddy - x dy ddx}{dx^3}$ propositae aequalis, & nullum amplius differentiale constans involvens.

II.

II. Sit proposita haec expressio $\frac{dx^2 + dy^2}{ddx}$; in qua dy assumtum est constans. Ponatur $dy = p dx$ & $dp = q dx$; eaque transibit in hanc: $\frac{p(1+pp)}{q}$, statuatur nunc

$p = \frac{dy}{dx}$ & $q = \frac{dxddy - dyddx}{dx^3}$, atque invenietur: $\frac{dy(dx^2 + dy^2)}{dyddx - dxddy}$ quae nullo differentiali assumto constante eundem fixum habet valorem, quem proposita.

III. Sit proposita haec expressio: $\frac{yddx - xddy}{dxdy}$, in qua differentiale ydx constans est assumtum. Ponatur $dy = p dx$, atque uti supra (270) vidimus haec expressio transmutatur in hanc: $-1 - \frac{xq}{p} + \frac{xp}{y}$, quae nullo differentiali constante assumto transformabitur in istam:

$$\begin{aligned} & -1 - \frac{xdxddy - xdyddx}{dx^2 dy} + \frac{xdy}{ydx} \\ & = \frac{xdxdy^2 - ydx^2 dy - yxdxddy + yx dyddx}{ydx^2 dy} \end{aligned}$$

IV. Sit proposita haec expressio $\frac{dx^2 + dy^2}{ddy}$, in qua constans assumtum est differentiale $\sqrt{(dx^2 + dy^2)}$. Posito $dy = p dx$, & $dp = q dx$, oriatur haec expressio $\frac{(1+pp)^2}{q}$, (loco citato). Statuatur nunc $p = \frac{dy}{dx}$, & $q = \frac{dxddy - dyddx}{dx^3}$, atque nullo assumto differentiali con-

stan-

stante nanciscemur istam expressionem $\frac{(dx^2 + dy^2)^2}{dx^2 ddy - dx dy ddx}$ propositae aequivalentem.

V. Sit proposita haec expressio $\frac{dx d^3 y}{x ddy}$, in qua differentiale dx constans sit assumtum. Ponatur

$$dy = p dx; \quad dp = q dx \quad \& \quad dq = r dx;$$

atque ob

$$ddy = q dx^2 \quad \& \quad d^3 y = r dx^3$$

formula proposita abibit in hanc $\frac{rdx^2}{xq}$. Nunc loco q & r substituantur valores, quos nullo differentiali constante assumto recipiunt scilicet: $q = \frac{dx ddy - dy ddx}{dx^3}$, 88

$$r = \frac{dx^2 d^3 y - 3 dx ddx ddy + 3 dy ddx^2 - dx dy d^3 x}{dx^5}$$

atque obtinebitur sequens expressio propositae aequivalens:

$$\begin{aligned} & \frac{dx^2 d^3 y - 3 dx ddx ddy + 3 dy ddx^2 - dx dy d^3 x}{x(dx ddy - dy ddx)} \\ &= \frac{dx(dx d^3 y - dy d^3 x) \cdot 3 ddx}{x(dx ddy - dy ddx) \cdot x} \end{aligned}$$

274. Si has transformationes diligentius intueamur, methodum eas perficiendi colligere poterimus expeditiorem, ita ut non opus sit litteras p , q , r , &c. introducere. Varii autem modi hoc opus absolvendi occurrent, prout aliud atque aliud differentiale in formula proposita constans fuerit assumtum. Ponamus primum in formula proposita differentiale dx constans esse assumtum; & quia loco dy posuimus $p dx$, rursusque $\frac{dy}{dx}$ loco p : differentialia prima dx & dy ,

ubi-

ubicunque in expressione occurrunt, sine alteratione relinquuntur. Ubi autem occurrit ddy , quia eius loco scribitur qdx^2 , & porro loco q valor $\frac{dxddy - dyddx}{dx^3}$, transmutatio

absolvitur, si ubique loco ddy statim ponatur $\frac{dxddy - dyddx}{dx}$

seu $ddy - \frac{dyddx}{dx}$. Si insuper in expressione proposita occurrat d^3y , quia eius loco ponitur rdx^3 , ob valorem ipsius r ante inventum, ubique loco d^3y scribi debebit

$$d^3y - \frac{3ddxddy}{dx} + \frac{3dyddx^2}{dx^2} - \frac{dyd^3x}{dx},$$

quo facto expressio proposita transmutabitur in aliam, quae nullum differentiale constans involvit. Sic si proponatur

ista expressio $\frac{(dx^2 + dy^2)^{\frac{1}{2}}}{dxddy}$, in qua dx positum est constans,

ei aequalis erit posito $ddy - \frac{dyddx}{dx}$ loco ddy , haec nul-

lum differentiale constans involvens: $\frac{(dx^2 + dy^2)^{\frac{1}{2}}}{dxddy - dyddx}$.

275. Hinc facile colligitur, si in expressione quam proposita assumptum fuerit differentiale dy constans, tum ubique loco ddx scribi debere $ddx - \frac{dxddy}{dy}$, & loco

d^3x hoc $d^3x - \frac{3ddxddy}{dy} + \frac{3dxd^2y}{dy^2} - \frac{dxd^3y}{dy}$; ut obti-

neatur expressio aequivalens, in qua nullum differentiale constans ponatur. Sin autem in expressione proposita constans

fuerit assumptum ydx , quoniam fit $ddx = -\frac{pdx^2}{y}$, &
 ddy

$ddy = qdx^2 - \frac{ppdx^2}{y}$; loco ddx ubique scribi debet
 $-\frac{dx dy}{y}$, & loco ddy ubique $ddy = \frac{dyddx}{dx} - \frac{dy^2}{y}$: ad al-
 tiora differentialia, quia in hoc negotio rarissime occurrere
 solent, non progredior. Quod si vero in expressione pro-
 posita hoc differentiale $\sqrt{(dx^2 + dy^2)}$ assumtum fuerit con-
 stans, quia invenimus $ddx = -\frac{pqdx^2}{1+pp}$ & $ddy = \frac{qdx^2}{1+pp}$:
 pro ddx ubique scribi debet $\frac{dy^2 ddx - dx dy ddy}{dx^2 + dy^2}$ & loco
 ddy ubique $\frac{dx^2 ddy - dx dy ddx}{dx^2 + dy^2}$. Sic si proposita fuerit
 expressio $\frac{dy \sqrt{(dx^2 + dy^2)}}{ddx}$, in qua $\sqrt{(dx^2 + dy^2)}$ as-
 sumtum sit constans, ea transmutabitur in hanc:
 $\frac{(dx^2 + dy^2)^2}{dyddx - dxddy}$, in qua nullum differentiale constans assu-
 mitur.

276. Quo istae reductiones facilius ad usum accommoda-
 ri queant, eas in sequenti tabella complecti visum est.

*Formula igitur differentialis altioris gradus in aliam nul-
 lum differentiale constans involventem transmutabitur ope
 substitutionum sequentium:*

I. Si differentiale dx fuerit constans assumtum

loco	scribatur
ddy	$ddy - \frac{dyddx}{dx}$
d^3y	$d^3y - \frac{3ddxddy}{dx} + \frac{3dyddx^2}{dx^2} - \frac{dyd^3x}{dx}$

II.

II. Si differentiale dy fuerit constans assumtum.

loco scribatur

$$ddx \quad ddx - \frac{dxdy}{dy}$$

$$d^3x \quad d^3x - \frac{3ddxdy}{dy} + \frac{3dxdy^2}{dy^2} - \frac{dxd^3y}{dy}$$

III. Si differentiale ydx fuerit constans assumtum

loco scribatur

$$ddx \quad \frac{dxdy}{y}$$

$$ddy \quad ddy - \frac{dyddx}{dx} - \frac{dy^2}{y}$$

$$d^3x \quad \frac{dyddx^2}{y} - \frac{dxdy}{y} + \frac{3dxdy^2}{yy}$$

$$d^3y \quad d^3y - \frac{3ddxdy}{dx} + \frac{3dyddx^2}{dx^2} - \frac{dyd^3x}{dx} - \frac{4dyddy}{y} \\ + \frac{4dy^2ddx}{ydx} + \frac{3dy^3}{yy}$$

IV. Si differentiale $\sqrt{(dx^2 + dy^2)}$ fuerit constans assumtum.

loco scribatur

$$ddx \quad \frac{dy^2 ddx - dxdyddy}{dx^2 + dy^2}$$

$$ddy \quad \frac{dx^2 ddy - dxdyddx}{dx^2 + dy^2}$$

$$d^3x \quad \frac{dy^2 d^3x - dxdyd^3y}{dx^2 + dy^2} \\ + \frac{(dxdy - dyddx)(3dy^2 ddy - dx^2 ddy + 4dxdyddx)}{(dx^2 + dy^2)^2}$$

$$d^3y \quad \frac{dx^2 d^3y - dxdyd^3x}{dx^2 + dy^2} \\ + \frac{(dyddx - dxdy)(3dx^2 ddx - dy^2 ddx + 4dxdyddy)}{(dx^2 + dy^2)^2}$$

Bb

277.

277. Expressiones ergo istae, quae nullum differentiale constans includunt, ita erunt comparatae, ut pro lubitu quodvis differentiale constans assumi queat. Hincque expressiones differentiales altiorum graduum, in quibus nullum differentiale constans assumtum perhibetur, examinari possunt, utrum significatio earum sit vaga an fixa. Ponatur enim pro lubitu quodpiam differentiale puta dx constans, tum per regulam §. praeced. priorem reducatur expressio iterum ad formam; in qua nullum differentiale constans sit assumtum, quae si cum proposita conveniat, ea erit fixa, neque ab inconstantia differentialium secundorum pendebit: sin autem expressio prodeat diversa, tum proposita vagam habet significationem. Sic si ponatur haec expressio $yddx - xddy$, in qua nullum differentiale positum sit constans; ad investigandum, utrum significationem fixam habeat an vagam, ponatur dx constans, eaque abibit in $-xddy$; nunc per regulam primam §. praeced. loco ddy ponatur, $ddy - \frac{dyddx}{dx}$ ac prodibit $-xddy + \frac{xdyddx}{dx}$,

cuius a proposita discrepantia indicat, propositam expressionem fixam statamque significationem non habere.

278. Simili modo si proponatur expressio generalis huiusmodi $Pddx + Qdxdy + Rddy$, conditio definiri poterit, sub qua ea nullo differentiali constante assumto valorem fixum habeat. Ponatur enim dx constans, atque expressio proposita abibit in hanc $Qdxdy + Rddy$: nunc haec iterum transformetur in aliam formam, ut eius significatus idem maneat, etiamsi nullum differentiale constans fingatur, sicque prodibit

$Qdxdy + Rddy - \frac{Rdyddx}{dx}$, quae forma cum proposita congruet, si fuerit $Pdx + Rdy = 0$; hocque solo casu valor eius erit fixus. Verum si non fuerit $P = -\frac{Rdy}{dx}$ seu $R = -\frac{Pdx}{dy}$ tum expressio proposita $Pddx + Qdxdy + Rddy$ valorem fixum

xum non habebit, sed eius significatio erit vaga atque diversa, prout aliud atque aliud differentiale constans assumitur.

279. Ex his principiis etiam facile erit expressionem differentialem, in qua quodpiam differentiale constans est positum, transmutare in aliam formam, in qua aliud differentiale constans assumatur. Reducatur enim primum ad eiusmodi formam, quae nullum differentiale constans involvat, quo facto illud alterum differentiale constans ponatur. Sic si in expressione proposita differentiale dx assumptum sit constans, eaque transmutanda sit in aliam, quae differentiale dy constans implicet: in formulis supra loco ddy & d^3y substituendis ob dy constans ponatur $ddy = 0$, $d^3y = 0$, atque quaesito satisfiet, si loco ddy substituatur $-\frac{dyddx}{dx}$ & $\frac{3dyddx^2}{dx^3} - \frac{dyddx}{dx}$.

loco d^3y . Hoc modo ista formula $-\frac{(dx^2 + dy^2)^{\frac{3}{2}}}{dxddy}$, in qua dx positum est constans, transmutabitur in hanc $\frac{(dx^2 + dy^2)^{\frac{3}{2}}}{dyddx}$, in qua dy ponitur constans.

280. Si contra formula, in qua dy constans est positum, transmutari debeat in aliam; in qua dx sit constans, tum loco ddx substitui debet $-\frac{dxddy}{dy}$ & loco

d^3x haec expressio $\frac{3dxddy^2}{dy^3} - \frac{dx d^3y}{dy}$. Simili modo

si formula, in qua $\sqrt{(dx^2 + dy^2)}$ positum est constans, transmutari debeat in aliam, in qua dx sit constans, tum

loco ddx scribatur $-\frac{dx dy ddy}{dx^2 + dy^2}$ & $\frac{dx^2 ddy}{dx^2 + dy^2}$ loco

ddy . At si formula, qua dx constans est assumptum, trans-

B b 2.

mu-

mutari debeat in aliam, in qua $\sqrt{(dx^2 + dy^2)}$ fit constans, quia ob $dx^2 + dy^2$ constans fit $dxdx + dydy = 0$, & $ddx = -\frac{dydy}{dx}$, hoc valore loco ddx assumpto,

pro ddy scribi debebit $ddy + \frac{dy^2 ddy}{dx^2} = -\frac{(dx^2 + dy^2) ddy}{dx^2}$.

Sic haec formula $-\frac{(dx^2 + dy^2)^{\frac{3}{2}}}{dxdy}$, in qua dx est constans, transmutabitur in aliam, in qua $\sqrt{(dx^2 + dy^2)}$ ponitur constans, quae erit $-\frac{dx\sqrt{(dx^2 + dy^2)}}{ddy}$.



CA-

CAPUT IX.

DE AEQUATIONIBUS DIFFERENTIALIBUS

281.

In hoc Capite imprimis est propositum earum functionum ipsius x , quae non explicite, sed implicite per aequationem, qua relatio functionis istius y ad x continetur, definiuntur, differentiationem explicare: quo facto naturam aequationum differentialium in genere perpendemus, & quemadmodum ex aequationibus finitis oriantur, ostendemus. Cum enim in calculo integrali summum negotium consistat in integratione aequationum differentialium, seu in inventione eiusmodi aequationum finitarum, qua cum differentialibus conveniant; necesse est, ut hoc loco indolem ac proprietates aequationum differentialium, quae ex earum origine sequuntur, diligentius scrutemur, sicque viam ad calculum integralem praeparemus.

282. Ut igitur hoc negotium absolvamus, fit y functio eiusmodi ipsius x , quae per hanc aequationem quadratam $yy + Py + Q = 0$ definiatur. Cum ergo haec expressio $yy + Py + Q = 0$, quicquid x significet, nihilo quoque aequalis erit, si loco x scribatur $x + dx$, quo casu y abit in $y + dy$. Facta autem hac substitutione, si a quantitate resultante subtrahatur prior $yy + Py + Q$, remanebit eius differentiale, quod propterea quoque erit $= 0$. Hinc patet si expressio quaecunque fuerit $= 0$, eius etiam differentiale fore aequale 0; atque si duae quaecunque expressiones inter se fuerint aequales earum quoque differentialia fore aequalia. Cum igitur sit

$$yy + Py + Q = 0, \quad \text{erit quoque} \\ : 2ydy + Pdy + ydP + dQ = 0$$

quia

quia vero P & Q sunt functiones ipsius x , earum differentia huiusmodi formam hebebunt,

$$dP = p dx, \text{ \& } dQ = q dx;$$

unde fiet

$$2y dy + P dy + y p dx + q dx = 0$$

ex qua oritur
$$\frac{dy}{dx} = \frac{-yp - q}{2y + P}.$$

283. Quemadmodum ergo aequatio finita $yy + Py + Q = 0$ exponit relationem inter y & x , ita aequatio differentialis exprimit relationem seu rationem, quam dy tenet ad dx .

Quoniam vero est $\frac{dy}{dx} = \frac{-yp - q}{2y + P}$, haec ratio $dy : dx$ co-

gnosci non potest, nisi ipsa functio y sit cognita: neque vero res aliter se habere potest; cum enim ex aequatione finita y geminum obtineat valorem, uterque suum peculiare habebit differentiale, & utriusque differentiale reperietur, prouti

hic vel ille valor in expressione $\frac{-yp - q}{2y + P}$ loco y substitua-

tur. Simili modo functio y per aequationem cubicam definiatur, valor functionis $\frac{dy}{dx}$ erit triplex; triplici scilicet ipsius

y valori respondens. Si in aequatione proposita finita y quatuor pluresve habeat dimensiones, necesse est ut $\frac{dy}{dx}$ totidem significationes fortiatur.

284. Interim tamen ipsa functio y ex aequatione eliminari poterit, cum duae habeantur aequationes y continentes, finita scilicet & differentialis: tum autem eius differentiale dy ad totidem dimensiones affurget, quot ante habuerat y , sicque ista aequatio omnes diversas rationes ipsius dy ad dx simul complectetur. Sumamus praecedens exemplum aequationis $yy + Py + Q = 0$; cuius differentialis est:

2y-

$$2ydy + Pdy + ydP + dQ = 0,$$

ex qua fit $y = \frac{-Pdy - dQ}{2dy + dP}$ qui valor loco y in priori aequatione substitutus dabit:

$$(4Q - PP)dy^2 + (4Q - PP)dPdy + QdP^2 - PdPdQ + dQ^2 = 0,$$

cuius radices sunt:

$$dy = -\frac{1}{2}dP \pm \frac{(\frac{1}{2}PdP - dQ)}{\sqrt{(PP - 4Q)}}$$

quae sunt bina differentialia binorum ipsius y valorum ex aequatione finita: $y = -\frac{1}{2}P \pm \frac{1}{2}\sqrt{(PP - 4Q)}$.

285. Invento valore ipsius dy per repetitam differentiationem reperietur valor ipsius ddy , porroque ipsorum d^3y , d^4y , &c. qui autem, cum determinati non sint, nisi aliquod differentiale primum constans statuatur; ponamus commoditatis ergo dx constans, atque ad hoc ostendendum sumamus hoc exemplum $y^3 + x^3 = 3axy$, unde per differentiationem oritur $3yydy + 3xxdx = 3axy + 3aydx$, hincque

$\frac{dy}{dx} = \frac{ay - ax}{yy - ax}$, sumantur denuo differentialia posito dx constante atque inveniatur

$$\frac{ddy}{dx} = \frac{-ayydy - aaxy + 2xyydy - 2xyydx + aaydx + axndn}{(yy - ax)^2}$$

substituatur loco dy eius valor modo inventus $\frac{aydx - axdn}{yy - ax}$

atque divisione per dx facta habebitur

$$\frac{ddy}{dx^2} = \frac{(ay - ax)(2xyy - ayy - aax)}{(yy - ax)^3} + \frac{axn + aay - 2xyy}{(yy - ax)^2}$$

$$\text{feu } \frac{ddy}{dx^2} = \frac{6axy - 2x^4y - 2xy^4 - 2a^3xy}{(yy - ax)^3}$$

$$= -\frac{2a^3xy}{(yy - ax)^3}$$

cum

cum ex aequatione finita sit $2x^4y + 2xy^4 = 6axy^2$: hocque modo ope aequationis finitae hi valores in innumeras formas transmutari possunt.

286. Aequatio etiam differentialis prima infinitis modis potest variari, dum cum aequatione finita permiscetur. Sic cum exemplo praecedente inventa esset aequatio differentialis

$$yydy + xxdx = axdy + aydx,$$

si ea multiplicetur per y , orietur

$$y^3dy + xxydx = axydy + ayydx,$$

in qua si loco y^3 substituatur eius valor $3axy - x^3$ orietur haec aequatio nova

$$2axy^2dy - x^3dy + xxydx = ayydx;$$

quae denuo per y multiplicata, postquam loco y^3 eius valor fuerit substitutus, praebabit

$$2axy^2dy - x^3dy + xxydx = 3aaxydx - ax^3dx.$$

Generaliter autem si P , Q , R denotent functiones quasunque ipsarum x & y , si aequatio differentialis multiplicetur per P , erit

$$Pyydy + Pxxdx = aPxdy + aPydx.$$

Tum cum fit $x^3 + y^3 - 3axy = 0$, erit quoque

$$(x^3 + y^3 - 3axy)(Qdx + Rdy) = 0,$$

quae aequationes invicem additae dabunt aequationem differentialem generalem ex proposita aequatione finita natam

$$Pyydy - aPxdy + Rx^3dy + Ry^3dy - 3aRxydy + Pxxdx - aPydx + Qx^3dx + Qy^3dx - 3aQxydx = 0.$$

287. Possunt vero etiam per ipsam differentiationem infinitae aequationes differentiales ex eadem aequatione finita inveniri, dum ea, antequam differentietur, per quantitatem quamcunque aut multiplicatur aut dividitur. Sic si P fuerit functio quaecunque ipsarum x & y , ut sit $dP = pdx + qdy$, si aequatio finita per P multiplicetur, atque tum demum differentietur, obtinebitur aequatio differentialis generalis, quae infinitas formas diversas induet, prouti pro P aliae atque aliae fun-

functiones assumuntur. Tum vero multiplicitas adhuc in infinitum augebitur, si ad hanc aequationem differentialem inventam addatur ipsa aequatio finita per huiusmodi formulam $Qdx + Rdy$ multiplicata, ubi pro Q & R functiones quaecunque ipsarum x & y assumere licet. Quoniam autem in his omnibus aequationibus relatio inter dy & dx , quam differentiale functionis y aequatione finita per x determinatae ad dx tenet, comprehenditur; tamen plerumque multo latius patent, & differentiale ipsius y per alias aequationes finitas determinati exprimit; cuius rei ratio in calculo integrali potissimum explicabitur.

288. Non solum autem ex eadem aequatione finita innumerabiles aequationes differentiales deduci possunt, sed etiam plures imo infinitae exhiberi possunt aequationes finitae, quae ad easdem aequationes differentiales deducantur. Sic hae duae aequationes $yy = ax + ab$ & $yy = ax$ omnino sunt diversae, dum in priori quaecunque quantitas constans in locum ipsius b collocatur. Interim tamen hae ambae aequationes differentiatiae eandem dant aequationem differentialem $2ydy = adx$; quin etiam omnes aequationes in hac forma $yy = ax$ contentae, quicunque valor ipsi a tribuatur, in una aequatione differentiali, in qua a non insit, comprehendi possunt. Dividatur enim aequatio illa per x ut sit $\frac{yy}{x} = a$, haecque differentiatia dabit $2x dy - y dx = 0$. Possunt quoque aequationes transcendentes & algebraicae ad eandem aequationem differentialem perducere, uti fit in istis aequationibus

$$yy - ax = 0 \quad \& \quad yy - ax = bbe^{\frac{x}{a}},$$

si enim utraque per $e^{\frac{x}{a}}$ dividatur, ut habeantur istae aequationes: $e^{-\frac{x}{a}}(yy - ax) = 0$ & $e^{-\frac{x}{a}}(yy - ax) = bb$, ex utriusque differentiatione orietur eadem differentialis

Cc

2y

$$2ydy - adx - \frac{yydx}{a} + xdx = 0.$$

289. Ratio huius diversitatis in hoc consistit, quod quantitatis constantis differentiale fit $= 0$. Quodsi ergo aequatio finita ad eiusmodi formam reducatur, ut quantitas quae-
piam constans sola adsit, neque per variables vel multiplice-
tur vel dividatur; tum per differentiationem eruetur aequatio,
in qua illa quantitas constans prorsus non adsit. Hoc modo
quaelibet quantitas constans, quae in aequationem finitam in-
greditur, per differentiationem tolli potest. Sic si proposita
fuerit aequatio $x^3 + y^3 = 3axy$; si ea per xy dividatur ut
habeatur $\frac{x^3 + y^3}{xy} = 3a$, haec aequatio differentiatâ dabit:

$$2x^2ydx + 2xy^2dy - x^4dy - y^4dx = 0,$$

quam constans a amplius non ingreditur.

290. Si plures quantitates constantes, quae in aequatio-
ne finita insunt, tolli debeant, id fiet per differentiationem
bis pluriesve repetitam; sicque tandem obtinebuntur aequatio-
nes differentiales altiorum graduum iis constantibus prorsus
carentes. Sit proposita haec aequatio $yy = maa - nxx$, ex
qua per differentiationem constantes maa & n tolli debeant.
Prima quidem tolletur prima differentiatione, unde fit
 $ydy + nx dx = 0$, hinc porro formetur aequatio $\frac{ydy}{x dx} + n = 0$,
quae sumto dx constante, per differentiationem dabit:

$$xyddy + xdy^2 - ydx dy = 0,$$

quae etsi nullam constantem complectitur, tamen omnes ae-
quationes in hac forma $yy = maa - nxx$ contentas, quicunque
valores litteris m , n & aa tribuantur, in se aequae comprehendit.

291. Non solum vero quantitates constantes, quae in
aequationem finitam ingrediuntur, per differentiationem tolli
possunt, sed etiam altera variabilis, eius scilicet, cuius diffe-
rentiale constans assumitur, per differentiationem eliminari
po-

poterit. Ex aequatione enim inter x & y proposita quaeratur valor x , ut sit $x=Y$ denotante Y functionem ipsius y ; eritque $dx=dY$, & sumto dx constante, fiet differentiando $0=ddY$. Sin autem fuerit $xx+ax+b=Y$, fiet ter differentiando $0=d^3Y$, & aequatio $x^3+axx+bx+c=Y$ quater differentiata dat $0=d^4Y$. Quanquam autem in his aequationibus una tantum variabilis inesse videtur, quae propterea variabilis esse cessaret, dum unica variabilis in nulla aequatione adesse potest; tamen quia differentiale dx constans est assumtum, eiusque ratio in aequatione haberi debet, revera in aequationem ingredi censendum est. Hinc mirandum non est, si saepius aequationes differentiales secundi altiorisve gradus occurrant, in quibus una tantum variabilis inesse videatur.

292. Praecipue autem notandum est, per differentiationem quantitates irrationales ac transcendentes ex aequatione tolli posse. Quod quidem ad irrationales attinet, quoniam per reductiones cognitae irrationalitas eliminari potest, hoc facto, per differentiationem aequatio obtinetur ab irrationalitate libera. Verum hoc saepenumero commodius sine ista reductione fieri potest, dum per comparisonem aequationis differentialis cum finita formula irrationalis, si una tantum insit, eliminari potest. Sin autem duae pluresve partes irrationales in aequatione finita contineantur, tum eius aequatio differentialis denuo differentietur, sicque aequationes differentiales altiorum graduum tot quaerantur, quot requiruntur ad singulas partes irrationales eliminandas. Hoc modo etiam exponentes indefiniti pariter atque fracti tolli poterunt. Uti si fuerit $y^n=(aa-xx)^n$, post differentiationem habebitur

$$ny^{n-1}dy = -2n(aa-xx)^{n-1}xdx,$$

quae per finitam divisam dat $\frac{ndy}{y} = -\frac{2nxdx}{aa-xx}$, in qua

nullus amplius exponens indefinitus occurrit. Hinc ergo patet aequationem differentialem ab omni irrationalitate liberam

ortam esse posse ex aequatione finita irrationali, atque adeo quantitates transcendentes involvente.

293. Ut autem intelligatur, quomodo per differentiationem quantitates transcendentes eliminantur, incipiamus a logarithmis, quorum differentialia cum sint algebraica, negotium sine difficultate absolvetur. Sit enim $y = x^l x$: erit $\frac{y}{x} = lx$, unde differentiando fit $\frac{xdy - ydx}{xx} = \frac{dx}{x}$, ideo-

que $xdy - ydx = xdx$. Si bini infint logarithmi duplici differentiatione erit opus: sit enim $ylx = xly$; erit $\frac{yly}{x} = ly$,

& differentiando, $\frac{xdylx + ydx - ydxlx}{xx} = \frac{dy}{y}$, ex qua con-

cluditur fore $lx = \frac{xdy - ydx}{yxdy - yydx}$. Haec aequatio iam iterum differentietur posito dx constante, atque prodibit

$$\begin{aligned} \frac{dx}{x} &= \frac{xxddy + 2xdxdy - ydydx}{yx dy - yydx} \\ &+ \frac{(yydx - xxdy)(yxdy + xdy^2 - ydx dy)}{(yx dy - yydx)^2} \text{ feu } \frac{dx}{x} = \\ &\frac{y^3 x dx dy - yy x dx dy + 3yx dx dy^2 - y^2 x dx dy^2 + y^3 dx^2 dy - 2xy y dx^2 dy - x^2 dy^3}{(yx dy - yy dx)^2} \end{aligned}$$

quae reducta dabit:

$$\begin{aligned} &y^3 x dx dy - yy x dx dy + 3yx dx dy^2 - 2xy y dx^2 dy^2 \\ &+ 3y^3 dx^2 dy - 2xy y dx^2 dy - x^3 dy^3 - \frac{y^4 dx^3}{x} = 0 \end{aligned}$$

$$\text{feu } yyxx(y - x)dx dy + 3yx dx dy(xxdy + yydx) - 2yyxx dx dy(dx + dy) = x^4 dy^3 + y^4 dx^3.$$

194. Quantitates exponentiales ex aequatione eodem modo, quo logarithmi per differentiationem tolluntur. Si enim huiusmodi proposita fuerit $P = e^Q$, ubi P & Q fun-

ctio.

Etiones quascunque ipsarum x & y denotent; ea aequatio transmutari poterit in hanc logarithmicam $lP=Q$; cuius differentialis est $\frac{dP}{P} = dQ$ seu $dP = PdQ$. Neque obstat, si quantitates exponentiales magis fuerint complicatae, tum enim si una differentiatio non sufficit, duabus pluribusve negotium absolvetur.

I. Sit $y = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$; multiplicetur huius fractionis numerator ac denominator per e^x eritque $y = \frac{e^{2x} + 1}{e^{2x} - 1}$ unde fit

$$e^{2x} = \frac{y+1}{y-1} \quad \& \quad 2x = l \frac{y+1}{y-1},$$

cuius differentiale est $dx = -\frac{dy}{yy-1} = \frac{dy}{1-yy}$.

II. Sit $y = l \frac{e^x + e^{-x}}{2}$, fiet per primam differentiationem $dy = \frac{(e^x - e^{-x})dx}{e^x + e^{-x}}$, seu $\frac{dy}{dx} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}$, atque

$$e^{2x} = \frac{dy + dx}{dx - dy}. \quad \text{Ergo} \quad 2x = l \frac{dy + dx}{dx - dy}.$$

Sumto ergo dx constante erit

$$dx = \frac{dxddy}{dx^2 - dy^2} \quad \text{seu} \quad dx^2 = ddy + dy^2.$$

295. Simili modo quantitates transcendentes a circulo pendentes ex aequatione ope differentiationis tollentur, uti ex his exemplis intelligetur.

I. Sit $y = aA \sin \frac{x}{a}$; erit $dy = \frac{adx}{\sqrt{aa - xx}}$.

II. Sit $y = a \cos \frac{y}{x}$; erit $\frac{y}{x} = \cos \frac{y}{x}$ &c.

$$\frac{dy}{a} = - \frac{xdy + ydx}{xx} \sin \frac{y}{x}. \quad \text{At cum sit}$$

$$\cos \frac{y}{x} = \frac{y}{a}; \text{ erit } \sin \frac{y}{x} = \frac{\sqrt{(aa - yy)}}{a};$$

quo valore substituto habebitur

$$\frac{dy}{a} = \frac{(ydx - xdy) \sqrt{(aa - yy)}}{axx}$$

$$\text{seu } xx dy = (ydx - xdy) \sqrt{(aa - yy)}$$

III. Sit $y = m \sin x + n \cos x$, erit post differentiationem primam $dy = m dx \cos x - n dx \sin x$: quae denuo differentiata posito dx constante dabit

$$ddy = -m dx^2 \sin x - n dx^2 \cos x,$$

haec autem per primam divisa dat

$$\frac{ddy}{y} = -dx^2 \quad \text{seu } ddy + ydx^2 = 0,$$

ex qua non solum sinus & cosinus, sed etiam constantes m & n evanuerunt.

IV. Sit $y = \sin lx$; erit $A \sin y = lx$, unde per differentiationem fit $\frac{dy}{\sqrt{(1-yy)}} = \frac{dx}{x}$; quae sumtis quadratis dat $xx dy^2 = dx^2 - yy dx^2$, haecque posito dx constante ulterius differentiata praebet,

$$2xx dy ddy + 2y dx dy^2 = -zy dx^2 dy$$

$$\text{seu } xx ddy + x dx dy + y dx^2 = 0.$$

V. Sit $y = ae^{mx} \sin nx$, erit differentiendo

$$dy = mae^{mx} dx \sin nx + nae^{mx} dx \cos nx,$$

quae per propositam divisa dat

$$\frac{dy}{y} = m dx + \frac{ndx \cos nx}{\sin nx} = m dx + ndx \cot nx.$$

Erit ergo $A \cot \left(\frac{dy}{ny dx} - \frac{m}{n} \right) = nx$. Quae aequatio posito dx constante differentiata dat:

ndn

$$ndx = \frac{ndxdy^2 - nydxdy}{mmyydx^2 + nnyydx^2 - 2mydxdy}$$

seu $(mm + nn)yydx^2 - 2mydxdy = dy^2 - yddy$.

Perpicuum igitur est, etiamsi in aequatione differentiali nulla quantitates transcendentes insint, eam tamen ex aequatione finita oriri potuisse, quae a quantitatibus transcendentibus utcumque sit affecta.

296. Quoniam igitur aequationes differentiales five primi five altioris gradus, quae duas variables x & y continent, ex aequationibus finitis oriuntur; iis etiam relatio inter binas istas variables exprimitur. Proposita scilicet aequatione differentiali quacunque binas variables x & y continente, ea significatur certa quaedam relatio inter x & y , qua y fit functio quaedam ipsius x . Hinc natura aequationis differentialis perspicitur, si loco y ea ipsius x functio assignari poterit, quae per aequationem illam indicatur; seu quae sit ita comparata, ut si ea ubique loco y , eiusque differentiale loco dy , atque eius altiora differentia loco ddy , d^3y , &c. substituantur, aequatio resultet identica. In huius autem functionis investigatione versatur calculus integralis, cuius finis eo tendit, ut proposita aequatione differentiali quacunque, functio illa ipsius x , cui altera variabilis y est aequalis, definiatur; seu quod eodem redit, ut aequatio finita inveniatur, qua relatio inter x & y contineatur.

297. Si exempli gratia proponatur aequatio haec

$$2ydy - adx - \frac{yydx}{a} + xdx = 0$$

ad quam supra §. 288 pervenimus, eiusmodi relatio inter x & y ea definitur, quae simul hac aequatione finita

$yy - ax = bbe^{\frac{x}{a}}$ continetur. Cum igitur hinc sit

$$yy = ax + bbe^{\frac{x}{a}}, \text{ patet } \sqrt{ax + bbe^{\frac{x}{a}}} = y$$

eam

eam esse functionem ipsius x , cui variabilis y vi propositae aequationis differentialis sit aequalis. Namque si in aequatione loco yy , hunc valorem $ax + bbe^{\frac{x}{a}}$ & loco $2ydy$ eius differentiale $adx + \frac{bb}{a}e^{\frac{x}{a}}dx$ substituamus, orietur aequatio identica:

$$adx + \frac{bb}{a}e^{\frac{x}{a}}dx - adx - xdx - \frac{bb}{a}e^{\frac{x}{a}}dx + xdx = 0.$$

Sicque patet omnem aequationem differentialem aequae ac finitam certam relationem inter variables x & y exhibere, quae autem sine subsidio calculi integralis reperiri nequeat.

298. Quo haec facilius intelligantur, ponamus cognitam esse eam functionem ipsius x , quae ipsi y vi cuiusunque aequationis differentialis sive primi sive altioris gradus, conveniat; sitque

$$dy = p dx; dp = q dx; dq = r dx; \&c.$$

atque si in aequatione differentiale dx assumptum sit constans, erit $ddy = q dx$, $d^2y = r dx$, &c. qui valores postquam in aequatione erunt substituti, ob omnes eius terminos homogeneos, differentialia dx per divisionem evanescent, orieturque aequatio finitas tantum quantitates x , y , p , q , r , &c. complectens. Cum igitur sint p , q , r , &c. quantitates a natura functionis y pendentes, aequatio revera tantum inter duas variables x & y subsistet; sicque vicissim constat, omni aequatione differentiali certam quandam relationem inter variables x & y determinari. Quamobrem si in solutione cuiusvis problematis ad aequationem differentialem inter x & y perveniat, per eam aequae relatio inter x & y exprimi censenda est, ac si ad aequationem finitam esset perventum.

299. Hoc igitur modo aequatio quaevis differentialis ita ad formam finitam reduci potest, ut in ea nonnisi quantitates

tates finitae contineantur, differentialia autem seu infinite parva prorsus excedant. Cum enim sit y certa functio ipsius x , si ponatur

$$dy = pdx; dp = qdx; dq = rdx; \&c.$$

quodcunque differentiale fuerit constans acceptum, differentialia secunda & altiora per potestates ipsius dx exprimentur, quae deinceps per divisionem penitus tollentur. Ut si proponeretur haec aequatio

$$xyd^3y + xdyddy + ydxddy - xydx^3 = 0$$

in qua dx ponitur constans; facto

$$dy = pdx, dp = qdx, \& dq = rdx,$$

ea abibit in

$$xyr + xpq + yyq - xy = 0,$$

postquam scilicet tota aequatio per dx^3 est divisa. Haecque aequatio finita relationem inter x & y determinat.

300. Omnes ergo aequationes differentiales, cuiuscunque sint ordinis, his substitutionibus

$$dy = pdx; dp = qdx; dq = rdx; \&c.$$

ad meras quantitates finitas reducuntur. Atque si aequatio differentialis fuerit primi ordinis, ita ut differentialia prima eam tantum ingrediantur, per istam reductionem praeter variables y & x insuper quantitas p introducetur. Sin autem aequatio differentialis fuerit secundi ordinis continens differentialia secunda, praeterea quantitas q ; ac, si fuerit differentialis tertii ordinis, introducetur insuper quantitas r , sicque porro. Quoniam igitur hoc modo differentialia prorsus ex calculo exterminantur, ratio illa differentialis constantis penitus cessat; neque amplius, etiam si insint quantitates q , r , ex differentialibus secundis oriundae, opus erit indicare, an quodpiam differentiale constans sit assumptum. Perinde enim est, utrum in evolutione aliquod differentiale pro lubitu constans statuatur, an nullum.

301. Si igitur aequatio differentialis secundi vel altioris gradus proponatur, in qua nullum differentiale primum

Dd

con-

constans esse assumtum perhibetur, hoc modo statim explorari poterit, utrum ea determinatam relationem inter variables x & y contineat, nec ne. Quia enim nullum differentiale constans assumitur, in arbitrio nostro relinquitur, quodnam differentiale constans ponere velimus; hincque tantum erit dispiciendum, utrum diversis differentialibus constantibus positis aequatio eandem relationem inter x & y exhibeat. Quod si non eveniat, certum est signum, aequationem nullam determinatam relationem exprimere, ideoque in solutione nullius problematis locum habere posse. Tutissimus autem modus simulque facillimus hoc explorandi erit is ipse, quem supra in simili negotio pro expressionibus differentialibus altiorum ordinum, num fixos habeant significatus, dignoscendis tradidimus.

302. Proposita ergo huiusmodi aequatione differentiali secundi altiorisve ordinis, in qua nullum differentiale constans sit positum, statuatur differentiale dx constans; deinde haec aequatio, uti supra de expressionibus differentialibus ostendimus, iterum reducatur ad eiusmodi formam, quae nullum differentiale constans supponat, statuendo scilicet

$$\begin{aligned}
 & ddy - \frac{dyddx}{dx} \text{ loco } ddy; \\
 & \& d^3y - \frac{3ddxddy}{dx} + \frac{3dyddx^2}{dx^2} - \frac{dyd^3x}{dx} \text{ loco } d^3y, \\
 & \qquad \qquad \qquad \&c.
 \end{aligned}$$

Quo facto dispiciatur, utrum aequatio hoc modo resultans conveniat cum aequatione proposita; quod si eveniat, aequatio proposita determinatam relationem inter x & y complectetur; sin autem secus accadat, aequatio erit vaga, neque definitam rationem inter variables x & y exprimet: quemadmodum hoc iam ante fusius est demonstratum.

303. Sit, quo hoc plenius explicetur, haec aequatio proposita, quae nullo differentiali constante posito reperta esse perhibeatur.

$$Pddx + Qddy + Rdx^2 + Sdx dy + Tdy^2 = 0.$$

Ponatur dx constans, atque ea transibit in hanc:

$$Qddy + Rdx^2 + Sdx dy + Tdy^2 = 0.$$

Ex hac nunc iterum consideratio differentialis constantis exuatur, modo ante praescripto, & obtinebitur:

$$-\frac{Qdyddx}{dx} + Qddy + Rdx^2 + Sdx dy + Tdy^2 = 0,$$

quae, quoniam a proposita tantum ratione primi termini discrepat, videndum est, utrum sit $P = -\frac{Qdy}{dx}$. Quod si depre-

hendatur, aequatio proposita fixam relationem inter x & y exhibebit, quae per regulas in calculo integrali tradendas reperietur, quodcunque differentiale primum constans accipiat.

At, si fieri nequeat $P = -\frac{Qdy}{dx}$, aequatio proposita erit impossibilis.

304. Nisi igitur haec proposita aequatio:

$$Pddx + Qddy + Rdx^2 + Sdx dy + Tdy^2 = 0$$

fit absurda, necesse est ut sit $Pdx + Qdy = 0$, quod duplici modo evenire potest: vel enim actu erit

$$P = -\frac{Qdy}{dx}, \text{ seu aequatio } Pdx + Qdy = 0$$

identica; vel erit $Pdx + Qdy = 0$ ipsa illa aequatio differentialis primi gradus, ex cuius differentiatione proposita est orta: quo posteriore casu aequatio $Pdx + Qdy = 0$ congruet cum proposita, eandemque relationem inter x & y continebit, sicque sine auxilio calculi integralis haec relatio erui poterit. Cum enim sit $Pdx + Qdy = 0$, erit differentiando

$$Pddx + Qddy + dPdx + dQdy = 0,$$

quae ab aequatione proposita subtracta relinquet:

$$Rdx^2 + Sdx dy + Tdy^2 = dPdx + dQdy.$$

Dd 2

Cum

Cum autem sit $dy = -\frac{Pdx}{Q}$, differentialia prorsus extingui poterunt, nasceturque aequatio finita inter x & y earum relationem indicans.

305. Ponamus in solutione problematis nullo differentiali constante assumpto perventum esse ad hanc aequationem:

$$x^3 ddx + xxyddy - yydx^2 + xxdy^2 + aadx^2 = 0.$$

Erit ergo, cum aequationem absurdum non continere constet: $x^3 dx + xxydy = 0$, seu $xdx + ydy = 0$:

cuius differentiale erit

$$x^3 ddx + xxyddy + 3xxdx^2 + 2xydx dy + xxdy^2 = 0$$

quae aequatio a proposita subtracta relinquit:

$$aadx^2 - yydx^2 - 3xxdx^2 - 2xydx dy = 0, \quad \text{seu}$$

$$aadx - yydx - 3xxdx - 2xydy = 0.$$

Cum autem sit

$$xdx + ydy = 0; \quad \text{erit} \quad 2xydy = -2xxdx;$$

ideoque

$$aadx - yydx - xxdx = 0 \quad \text{seu} \quad yy + xx = ax;$$

quae aequatio veram relationem inter x & y exprimit, siquidem ea consentit cum differentiali primum inventa $xdx + ydy = 0$. Qui consensus, nisi se manifestasset, aequatio proposita pro impossibili esset habenda; cum autem hoc casu locum habuerit, aequationem finitam $xx + yy = aa$ sine calculo integrali elicere licuit.

306. Ut vero etiam exemplum aequationis impossibilis afferamus, proposita sit haec aequatio:

$$yyddx - xxdy + ydx^2 - xdy^2 + adxdy = 0,$$

in qua nullum differentiale constans sit assumtum. Foret ergo $yydx - xxdy = 0$, ideoque differentiando

$$yyddx - xxdy + 2ydx dy + 2xdx dy = 0,$$

quae propositae aequalis posita dabit:

$$ydx^2 - xdy^2 + 2ydx dy = 2ydx dy - 2xdx dy.$$

Cum

Cum vero fit $\frac{dy}{dx} = \frac{yydx}{xx}$, extinguendis differentialibus obti-

nebitur: $y - \frac{y^4}{x^3} + \frac{ayy}{xx} = \frac{2y^3}{xx} - \frac{2yy}{x}$ seu

$$x^3 - y^3 + axy = 2xyy - 2xxy,$$

quae utrum cum differentiali $yydx - xxdy = 0$ consentiat, eam differentiando, facile patebit, fiet enim:

$$3xxdx - 3yydy + andy + aydx = 2yydx + 4xydy - 2xxy - 4xydx$$

$$\text{feu } \frac{dy}{dx} = \frac{3xx + ay - 2yy + 4xy}{3yy - ax + 4xy - 2xx},$$

at ex illa est $\frac{dy}{dx} = \frac{yy}{xx}$, foretque ergo

$$3x^4 + 4x^3y + axxy = 3y^4 + 4xy^3 - axyy$$

$$\text{feu } axy = \frac{3y^4 + 4xy^3 - 4x^3y - 3x^4}{x + y}$$

$$= 3y^3 + xyy - xxy - 3x^3.$$

Verum ex aequatione finita primum inventa est

$$axy = y^3 + 2xyy - 2xxy - x^3,$$

quae ab ista subtracta relinquit:

$$0 = 2y^3 - xyy + xxy - 2x^3, \text{ quae resolvitur in has:}$$

$$0 = y - x; \quad \& \quad 2yy + yx + 2xx = 0.$$

Quarum illa $y = x$ quidem cum differentiali $\frac{dy}{dx} = \frac{yydx}{xx}$

constare potest, at vero aequationi finitae primum inventae adversatur, nisi statuatur $a = 0$, vel nisi utraque variabilis x & y constans statuatur, quo quidem casu ob $dx = 0$ & $dy = 0$ omnibus aequationibus differentialibus satisfat, aequatio proposita subsistere nequit.

307. Consideremus nunc etiam aequationes differentiales tres variables x, y , & z involventes, quae erunt vel primi, vel secundi, vel altioris gradus. Ad quarum naturam scrutandam

no-

notari oportet, aequationem finitam tres variables complectentem determinare relationem, quam unaquaeque ad binas reliquas teneat; definitur ergo, qualis functio sit z ipsarum x & y . Quemadmodum igitur aequatio huiusmodi finita resolvitur, si reperiatur qualis functio ipsarum x & y loco z substitui debeat, ut aequationi satisfiat, ita quoque aequatio differentialis tres variables complectens determinabit, qualis functio una sit reliquarum; isque huiusmodi aequationem resolvuisse censendus est, qui indicaverit eam binarum variabilium x & y functionem, quae loco tertiae z substituta aequationi satisfaciat, seu eam identicam reddat. Aequatio ergo differentialis resolvitur, si vel functio ipsarum x & y valorem ipsius z exhibens definiatur, vel aequatio finita assignetur, qua idem debitus ipsius z valor exprimat.

308. Quanquam autem omnis aequatio differentialis duas tantum variables complectens, semper determinatam relationem inter eas exprimit; tamen hoc non semper evenit in aequationibus differentialibus trium variabilium. Dantur enim eiusmodi aequationes, quibus plane nullo modo satisfieri poterit, quaecunque functio ipsarum x & y in locum ipsius z substituatur. Uti si proposita fuerit haec aequatio $xdy = ydx$ facile patet, nullam prorsus dari functionem ipsarum x & y , quae loco z substituta reddat $xdy = ydx$, differentialia enim dx & dy nullo modo extinguuntur. Simili modo apparet nullam dari functionem ipsarum x & z , quae loco y substituta eidem aequationi satisfaciat. Quaecunque enim pro y concipiatur functio ipsarum x & z , in eius differentiali dy inest dz , quod quia in aequatione non inest, destrui non poterit. Hancobrem nulla aequatio finita inter x, y , & z dari potest, quae aequationi differentiali $xdy = ydx$ conveniat.

309. Hinc aequationes differentiales tres variables continentes distribui oportet in imaginarias & reales. Huiusmodi autem aequatio erit imaginaria seu absurda, cui per nullam
aequa-

aequationem finitam satisfieri potest, cuiusmodi erat illa $xdy = ydx$, quam modo consideravimus. Aequatio autem erit realis, cui aequivalens aequatio finita exhiberi potest, quod evenit, si una variabilis aequalis sit certae cuipiam functioni binarum reliquarum. Cuiusmodi est haec aequatio:

$$zdy + ydz = xdx + zdx + xdy + ydx$$

congruit enim haec cum ista aequatione finita:

$$yz = xz + xy \quad \text{fitque} \quad z = \frac{xy}{y-x}.$$

Istud ergo discrimen inter huiusmodi aequationes imaginarias & reales diligentissime est observandum; praecipue in calculo integrali, quia ridiculum foret, cuiuspiam aequationis differentialis velle integram, hoc est aequationem finitam satisfacientem quaerere, quae plane nullam habeat.

310. Primum igitur patet, omnes aequationes differentiales trium variabilium, in quibus tantum binarum differentialia occurrant, esse imaginarias & absurdas. Ponamus enim in aequatione, quae contineat variabilem z , tantum inesse differentialia dx & dy , differentiale autem dz prorsus abesse; atque manifestum erit nullam exhiberi posse functionem ipsarum x & y , quae loco z substituta aequationem identicam producat; differentialia enim dx & dy nullo modo tolerantur. His ergo casibus omnino nulla datur aequatio finita satisfaciens: nisi forte eiusmodi relatio inter x & y assignari queat, quae quicquid sit z subsistere possit, uti fit in hac aequatione:

$$zdy - xdx = ydy - xdx,$$

cui satisfacit aequatio $y = x$. Facile autem investigatur, quibus casibus hoc eveniat, quaerendo relationem inter x & y primo si $z = 0$, & tum an ista relatio aequationi pro quocunque ipsius z valore satisfaciat.

311. Neque vero solum aequatio tres variables involvens est absurda, si duo tantum continet differentialia, sed etiam si in ea omnia tria differentialia occurrant, talis esse po-

poterit. Quos casus ut evolvamus, ponamus P & Q esse functiones ipsarum x & y tantum, atque haberi hanc aequationem

$$dz = Pdx + Qdy,$$

quae si non est absurda, erit z functio quaecumque ipsarum x & y , cuius differentiale sit

$$dz = pdx + qdy, \text{ eritque } P = p \text{ \& } Q = q.$$

At supra demonstravimus $pdx + qdy$ non esse posse differentiale cuiusquam functionis ipsarum x & y , nisi sit $\left(\frac{dp}{dy}\right) = \left(\frac{dq}{dx}\right)$,

denotante, uti ante assumimus $\left(\frac{dp}{dy}\right)$ differentiale ipsius p

posita sola y variabili, per dy divisum, atque $\left(\frac{dq}{dx}\right)$ differentiale ipsius q , posita sola x variabili, divisum per dx . Quocirca aequatio $dz = Pdx + Qdy$ realis esse nequit, nisi sit $\left(\frac{dP}{dy}\right) = \left(\frac{dQ}{dx}\right)$.

312. Similis omnino erit ratio huius aequationis

$$dZ = Pdx + Qdy$$

si Z denotet functionem quamcumque ipsius z , P vero & Q sint functiones ipsarum x & y , tertiam variabilem z non complectentes. Ut enim Z aequalis fieri possit functioni ipsarum x & y , necesse est ut sit $\left(\frac{dP}{dy}\right) = \left(\frac{dQ}{dx}\right)$. Ex hoc

ergo criterio aequatio differentialis quaeque proposita, quae quidem in hac forma generali contineatur, diiudicari potest, utrum sit realis an absurda. Sic patebit hanc aequationem $xdz = ydx + xdy$ esse realem, nam ob

$$P = y \text{ \& } Q = x, \text{ fit } \left(\frac{dP}{dy}\right) = 1 = \left(\frac{dQ}{dx}\right) = 1.$$

Haec vero aequatio $xdz = ydx + xdy$ est absurda, fit

fit enim $\left(\frac{dP}{dy}\right) = 2y$ & $\left(\frac{dQ}{dx}\right) = 2x$; qui valores sunt inaequales.

313. Ut autem criterium latissime patens investigemus, sint P , Q , & R functiones quaecunque ipsarum x , y , & z ; atque omnis aequatio differentialis trium variabilium, siquidem sit primi gradus, continebitur in hac forma:

$$Pdx + Qdy + Rdz = 0.$$

Quoties ergo haec aequatio est realis, z aequabitur functioni cuiusdam ipsarum x & y ; eiusque adeo differentiale erit huius formae $dz = pdx + qdy$. Quare si in aequatione proposita ista functio ipsarum x & y loco z , & $pdx + qdy$ loco dz substituaturs, necesse est, ut prodeat aequatio identica $0 = 0$. At-

que cum ex aequatione proposita fiat: $dz = -\frac{Pdx}{R} - \frac{Qdy}{R}$,

si in P , Q , & R valor ille loco z substituatur, necesse est ut fiat $p = -\frac{P}{R}$, & $q = -\frac{Q}{R}$.

314. Quoniam vero est $dz = pdx + qdy$, erit per ante demonstrata. $\left(\frac{dp}{dy}\right) = \left(\frac{dq}{dx}\right)$. Cum igitur substituto loco z ipsius valore in x & y fit

$$p = -\frac{P}{R} \quad \& \quad q = -\frac{Q}{R},$$

$$\text{erit} \quad \left(\frac{dp}{dy}\right) = \left(-\frac{RdP + PdR}{RRdy}\right)$$

$$\& \quad \left(\frac{dq}{dx}\right) = \left(-\frac{RdQ + QdR}{RRdx}\right)$$

ideoque habebitur per RR multiplicando haec aequatio:

$$P\left(\frac{dR}{dy}\right) - R\left(\frac{dP}{dy}\right) = Q\left(\frac{dR}{dx}\right) - R\left(\frac{dQ}{dx}\right);$$

Ee

ubi

ubi denominatores dy & dx iterum indicant, in differentialibus numeratorum eam solam quantitatem variabilem assumi debere, cuius differentiale denominatorem constituit. Haec autem differentialia dP , dQ , dR ante cognosci non possunt, quam in ipsis quantitibus P , Q , & R valor debitus loco z fuerit substitutus, qui autem cum sit incognitus, sequenti modo erit procedendum.

315. Quia P , Q , & R sunt functiones ipsarum x , y , & z , ponamus

$$dP = \alpha dx + \beta dy + \gamma dz$$

$$dQ = \delta dx + \varepsilon dy + \zeta dz$$

$$dR = \eta dx + \theta dy + \iota dz$$

ubi α , β , γ , δ , ε , &c. denotant eas functiones, quae ex differentiatione oriuntur. Concipiamus nunc loco z ubique eius valorem in x & y expressum substitui, & loco dz , ponamus valorem $pdx + qdy$; fietque

$$dP = (\alpha + \gamma p) dx + (\beta + \gamma q) dy$$

$$dQ = (\delta + \zeta p) dx + (\varepsilon + \zeta q) dy$$

$$dR = (\eta + \iota p) dx + (\theta + \iota q) dy.$$

Ex his ergo valoribus erit:

$$\left(\frac{dR}{dy}\right) = \theta + \iota q \quad ; \quad \left(\frac{dR}{dx}\right) = \eta + \iota p$$

$$\left(\frac{dP}{dy}\right) = \beta + \gamma q \quad ; \quad \left(\frac{dQ}{dx}\right) = \delta + \zeta p.$$

316. Cum igitur ad realitatem aequationis requiratur, ut fit:

$$P\left(\frac{dR}{dy}\right) - R\left(\frac{dP}{dy}\right) = Q\left(\frac{dR}{dx}\right) - R\left(\frac{dQ}{dx}\right),$$

fiet si inventi valores substituantur:

$$P(\theta + \iota q) - R(\beta + \gamma q) = Q(\eta + \iota p) - R(\delta + \zeta p).$$

At ante invenimus esse $p = -\frac{P}{R}$ & $q = -\frac{Q}{R}$
qui

qui valores, cum differentialia non amplius in computum veniant, adhiberi poterunt, etiam si loco x eius valor in x & y non substituitur. Eritque ergo

$$P\theta - \frac{PQ_z}{R} - R\beta + Q\eta = Q\eta - \frac{PQ_z}{R} - R\delta + P\zeta.$$

feu $0 = P(\zeta - \theta) + Q(\eta - \delta) + R(\beta - \delta).$

Quia autem quantitates $\beta, \delta, \eta, \zeta, \theta$, per differentiationem inveniuntur, erit superiori notandi modo adhibito:

$$0 = P\left(\frac{dQ}{dz} - \frac{dR}{dy}\right) + Q\left(\frac{dR}{dx} - \frac{dP}{dz}\right) + R\left(\frac{dP}{dy} - \frac{dQ}{dx}\right).$$

Quae proprietas, nisi in aequatione locum habeat, aequatio non erit realis, sed imaginaria & absurda.

317. Quanquam hanc regulam ex consideratione variabilis x eliciamus, tamen quia omnes quantitates aequae ingrediuntur, manifestum est, & reliquarum consideratione, eandem expressionem prodituram fuisse. Proposita ergo aequatione differentiali primi gradus, quae tres variables involvat, quacunque, statim diiudicari poterit utrum sit realis an imaginaria. Comparetur enim cum hac forma generali:

$$Pdx + Qdy + Rdz = 0,$$

atque quaeratur valor huius formulae:

$$P\left(\frac{dQ}{dz} - \frac{dR}{dy}\right) + Q\left(\frac{dR}{dx} - \frac{dP}{dz}\right) + R\left(\frac{dP}{dy} - \frac{dQ}{dx}\right),$$

qui si fuerit $= 0$, aequatio erit realis, sin autem non fuerit $= 0$, certum hoc est signum, aequationem esse imaginariam, seu absurdam.

318. Aequatio proposita per divisionem quoque semper ad huiusmodi formam reduci potest:

$$Pdx + Qdy + dz = 0,$$

in quam, cum prior abeat si fiat $R = 1$, criterium simplicius exprimeretur, hoc modo:

$$P\left(\frac{dQ}{dz}\right) - Q\left(\frac{dP}{dz}\right) + \left(\frac{dP}{dy}\right) - \left(\frac{dQ}{dx}\right) = 0.$$

Quoties enim haec expressio revera nihilo aequalis reperitur, toties aequatio proposita erit realis; sin autem contrarium eveniat, aequatio erit imaginaria. Posterius quidem ex iis, quae demonstravimus, est certum; de priori autem adhuc dubitari possit, utrum aequatio semper sit realis, quoties quidem hoc criterium id indicat. Quod cum hoc loco plenissime demonstrari nequeat, sed in calculo demum integrali demonstratione confirmari possit, hic tantum id affirmamus; neque autem periculum inde est metuendum, si quis tantisper de eius veritate dubitare voluerit.

319. Ex hoc ergo criterio primum patet, si in aequatione $Pdx + Qdy + Rdz = 0$, fuerit P functio ipsius x , Q functio ipsius y , & R functio ipsius z tantum, aequationem semper fore realem.

Fit enim

$$\left(\frac{dP}{dy}\right) = 0 ; \quad \left(\frac{dP}{dz}\right) = 0 ; \quad \left(\frac{dQ}{dz}\right) = 0 ;$$

$$\left(\frac{dQ}{dx}\right) = 0 ; \quad \left(\frac{dR}{dx}\right) = 0 \text{ \& } \left(\frac{dR}{dy}\right) = 0 ;$$

ideoque tota expressio criterii sponte evanescet.

320. Si fuerit ut ante P ipsius x , & Q ipsius y functio tantum, R autem functio quaecunque ipsarum x , y , & z , aequatio erit realis si fuerit:

$$P\left(\frac{dR}{dy}\right) = Q\left(\frac{dR}{dx}\right) \text{ seu } \left(\frac{dR}{dx}\right) : \left(\frac{dR}{dy}\right) = P : Q$$

Sic si proposita fuerit haec aequatio:

$$\frac{2dx}{x} + \frac{3dy}{y} + \frac{x^2 y^3 dz}{z^6} = 0.$$

Quia hic est $P = \frac{2}{x}$; $Q = \frac{3}{y}$, & $R = \frac{x^2 y^3}{z^6}$
hinc

$$\text{hinc } \left(\frac{dR}{dx}\right) = \frac{2xy^3}{z^6}; \text{ atque } \left(\frac{dR}{dy}\right) = \frac{3xxy}{z^6};$$

erit $P\left(\frac{dR}{dy}\right) = Q\left(\frac{dR}{dx}\right) = \frac{6xyy}{z^6}$; ideoque aequatio pro-
ponta erit realis.

321. Si fuerint P & Q functiones ipsarum x & y , at
 R functio ipsius z tantum, ob

$$\left(\frac{dP}{dz}\right) = 0; \left(\frac{dQ}{dz}\right) = 0; \left(\frac{dR}{dx}\right) = 0; \& \left(\frac{dR}{dy}\right) = 0,$$

aequatio erit realis si fuerit $\left(\frac{dP}{dy}\right) = \left(\frac{dQ}{dx}\right)$. Haec

eadem vero conditio requiritur, si $Pdx + Qdy$ debeat esse dif-
ferentiale determinatum, seu ex differentiatione cuiuspiam
functionis finitae ipsarum x & y ortum. Hucque redit quod
supra §. 312 iam observavimus, aequationem $dZ = Pdx + Qdy$,
si Z sit functio ipsius z tantum at P & Q functiones ipsa-
rum x & y , realem esse non posse, nisi sit $\left(\frac{dP}{dy}\right) = \left(\frac{dQ}{dx}\right)$.

Ambo autem isti casus inter se prorsus conveniunt: nam
loco Rdz , si R est functio ipsius z tantum, poni potest
 dZ existente Z functione ipsius z .

322. Ut hoc criterium inventum exemplo illustremus,
consideremus hanc aequationem:

$$(6xy^2z - 5yz^3)dx + (5x^2yz - 4xz^3)dy \\ + (4x^2y^2 - 6xyz^2)dz = 0;$$

qua cum forma generali comparata fit:

$$P = 6xy^2z - 5yz^3; \left(\frac{dP}{dy}\right) = 12xyz - 5z^3;$$

$$\left(\frac{dP}{dz}\right) = 6xy^2 - 15yz^2;$$

$$Q = 5x^2yz - 4xz^3; \left(\frac{dQ}{dx}\right) = 10xyz - 4z^3;$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{dQ}{dz}\right) &= 5x^2y - 12xz^2; \\ R &= 4x^2y^2 - 6xyz^2; \quad \left(\frac{dR}{dx}\right) = 8xy^2 - 6yz^2; \\ &\quad \left(\frac{dR}{dy}\right) = 8x^2y - 6xz^2. \end{aligned}$$

His inventis valoribus aequatio iudicium continens erit haec:

$$\begin{aligned} &+ (6xy^2z - 5yz^3) (-3xxy - 6xxz) \\ &+ (5x^2yz - 4xz^3) (2xyy + 9yzx) \\ &+ (4x^2y^2 - 6xyz^2) (2xyx - z^3) = 0. \end{aligned}$$

Haec autem expressio si evolvatur, omnes termini actu se mutuo destruunt, fitque $0=0$, quod indicat aequationem propositam esse realem.

323. Quando autem expressio hoc modo ex criterio eruta non evanescit, tum id signum est aequationem propositam esse imaginariam. Quoniam vero hoc pacto ex criterio aequatio finita invenitur, ea, si quidem aequationi differentiali conveniat, simul relationem indicabit, quam variables inter se tenent. Atque hoc modo ii casus, quorum supra meminimus (310), evolvuntur. Sit enim proposita ista aequatio:

$$(z-x)dx + (y-z)dy = 0,$$

fiet $P = z - x$; $Q = y - z$; & $R = 0$,

porro $\left(\frac{dP}{dz}\right) = 1, \quad \& \quad \left(\frac{dQ}{dz}\right) = -1.$

Aequatio iudicium exhibens fit $P\left(\frac{dQ}{dz}\right) = Q\left(\frac{dP}{dz}\right)$

seu $z - x = z - y$; unde fit $y = x$.

Quoniam igitur hic casu evenit, ut aequatio $y = x$ simul aequationi differentiali satisfaciat, dicendum est propositam aequationem nil aliud significare, nisi esse $y = x$.

324. Proposita ergo aequatione differentiali tres variables continente: $Pdx + Qdy + Rdz = 0$, tres considerandi erunt casus sequentes, ad quos haec aequatio deducit:

$$P\left(\frac{dQ}{dz} - \frac{dR}{dy}\right) + Q\left(\frac{dR}{dx} - \frac{dP}{dz}\right) + R\left(\frac{dP}{dy} - \frac{dQ}{dx}\right) = 0.$$

Primus est si haec expressio revera fit $= 0$, tumque aequatio proposita erit realis. Sin autem haec aequatio finita non sit identica, tum dispiciendum est, utrum ea aequationi propositae satisfaciat: quodsi evenit, habebitur aequatio finita, qui est casus secundus. Tertius autem casus locum habet, si aequatio finita cum proposita differentiali subsistere nequeat, atque tum aequatio proposita erit imaginaria: neque enim ulla aequatio finita exhiberi poterit, quae ipsi satisfaciat.

325. Casus primus ac tertius per se sunt perspicui, secundus autem, etsi rarissime occurrit, probe tamen notari meretur: & cum eius exemplum iam supra in aequatione, quae duo tantum continet differentialia, exhibuerimus, etiam aequationem afferamus, in qua omnia tria differentialia insunt:

$$(z - y)dx + xdy + (y - z)dz = 0. \quad \text{Erit ergo:}$$

$$P = z - y \quad ; \quad \left(\frac{dQ}{dz}\right) = 0 \quad ; \quad \left(\frac{dR}{dy}\right) = 1$$

$$Q = x \quad ; \quad \left(\frac{dR}{dx}\right) = 0 \quad ; \quad \left(\frac{dP}{dz}\right) = 1$$

$$R = y - z \quad ; \quad \left(\frac{dP}{dy}\right) = -1 \quad ; \quad \left(\frac{dQ}{dx}\right) = 1$$

unde aequatio finita criterium continens evadet:

$$z - x - y = 0, \text{ seu } z = x + y$$

substituatur hic valor pro z in aequatione differentiali fietque

$$xdx + xdy - x(dx + dy) = 0;$$

quae aequatio, cum sit identica, sequitur aequationem differentialem nil aliud significare, nisi $z = x + y$.

326. Quoniam diximus omnes aequationes differentiales primi ordinis, in quibus tres variables insunt contineri in hac forma $Pdx + Qdy + Rdz = 0$,

dubium hic nasci poterit circa eas æquationes, in quibus differentialia prima duas pluresve dimensiones constituunt, cuiusmodi est hæc :

$$Pdx^2 + Qdy^2 + Rdz^2 = 2Sdx dy + 2Tdx dz + 2Vdy dz.$$

Verum de huiusmodi æquationibus notandum est, eas nullo modo reales esse posse, nisi habeant divisores prioris formæ, qui propterea æquationes simplices constituent. Cum enim ex hac æquatione fiat :

$$dz = \frac{Tdx + Vdy + \sqrt{(dx^2(T^2 - PR) + 2dx dy(TV + RS) + dy^2(V^2 - QR))}}{R}$$

facile patet z functioni cuiuspiam ipsarum x & y , seu dz huiusmodi expressioni $pdx + qdy$ æquale fieri non posse, nisi quantitas irrationalis evadat rationalis, quod eveniet si fuerit :

$$(T^2 - PR)(V^2 - QR) = (TV + RS)^2$$

$$\text{seu } R = \frac{PVV + 2STV + QTT}{PQ - SS}$$

Nisi ergo hæc æquatio finita ipsi æquationi propositæ satisfaciatur, hæc erit imaginaria.

327. Superesset ut in hoc Capite quoque æquationes differentiales altiorum ordinum, quæ tres variables complectuntur, perpenderemus, casusque definiremus, quibus eae vel reales vel imaginariae evadunt; verum quia criteria nimis fierent intricata, hunc laborem hic praetermittimus, praesertim, cum ex iisdem fontibus, quos hic aperuimus, sequantur. Ceterum si in calculo integrali his criteriis erit opus, tum ea facile erui poterunt. Ob eandem causam hic quoque æquationes, quæ plures variables complectuntur, non contemplamur, cum fere nunquam occurrant, atque, si unquam occurrerent, ex principiis hic traditis sine negotio examinari possent. Quare his expositis Institutioni Calculi Differentialis hic finem imponimus progressuri ad insignes usus ostendendos, quos iste calculus cum in ipsa Analyfi, tum in Geometria sublimiori affert.
