



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

Math 322 (c)

Math. 322C

Math. 322C



UNIVERSITEITSBIBLIOTH



900000066849



Digitized by Google

THEORIA MOTVS  
CORPORVM  
SOLIDORVM SEV RIGIDORVM

EX  
PRIMIS NOSTRAE COGNITIONIS PRINCIPIIS  
STABILITA  
ET AD OMNES MOTVS,  
QVI IN HVIVSMODI CORPORA CADERE POSSVNT,  
ACCOMMODATA.

---

AVCTORE  
LEONH. EVLERO  
ACADEMIAE REGIAE SCIENT. BORVSSICAE DIRECTORE  
ACADEMIAE IMPER. PETROPOL. SOCIO HONORARIO  
ET ACADEMIARVM SCIENT. REGIARVM PARISINAE  
ET LONDINENSIS MEMBRO.



---

ROSTOCHII ET GRYPHISWALDIAE  
LITTERIS ET IMPENSIS A. F. RÖSE. MDCCCLXV.









## PRAEFATIO.



Quae sint VIRI PERILLVSTRIS, LEON-  
HARDI EVLERI in universam Matheseos  
merita, longa hic enumerare oratione, ac  
imprimis eum, in quo edendo curam &  
operam posui, de motu corporum rigidorum tractatum,  
multis commendare verbis, licet haud incongruum nec a  
scopo prologi alienum esse videatur; supersedere tamen hoc  
negotio me posse arbitror, cum tanta & tot eximia PERILL-  
AVCTORIS inventa, quibus omnes fere Matheseos partes ad  
summum extulit perfectionis fastigium, per universum orbem  
eruditum celebratissima omnem exsuperent laudem. In eo  
itaque solo occupatus ero, ut brevibus integri hujus operis  
summam recenseam, ac ea praecipue capita succinctius ex-

## PRAEFATIO.

ponam, quae lectori in evolvendo hoc scripto ac ratiociniorum filo detegendo utilia esse ac operam sublevare posse mihi visa sunt.

Corporis finitae extensionis motus non innotescit, nisi singularum ipsius particularum motu determinato. Haec causa est, cur principia motus corporum, ut puncta consideratorum, abstrahendo ab eorundem extensione, prius sint stabilienda, quam negotium leges motus corporum finitae magnitudinis evolvendi suscipi queat. Explicata jam est theoria de motu punctorum a CEL. EVLERO in *Mechanicæ sive motus scientiae analytice expositae* Tomo I. & II. quod opus absolutissimum A. 1736 Petropoli ex typographia Academiae scientiarum prodiit. Promiserat simul CLAR. AVCTOR, operi huic subjungere tractatum de motu corporum finitorum & primo quidem rigidorum, pari methodo conscribendum. Ac licet hoc argumentum tam arduum & antehac tam parum tractatum maximis implicatum invenisset difficultatibus; felici tamen successu tandem omnia vicit impedimenta ac prorsus novam fere elaboravit scientiam, cujus principia, qualiacunque licet antea fuerint cognita, ad tantam ab ipso promota sunt universalitatem, ut nihil amplius in hac Mechanices parte desiderandum reliquerit. Quin quod vix expectandum erat, abstrusissima haec inventa mira exposuit evidentia non tantum sed & perspicuitate, ita ut Artis peritis non tantum aditus ad mysteria in hoc libro recondita pateat, sed & idem opus iis erudiendis inservire queat, qui in analysi jam satis

## PRAEFATIO.

fatis exercitati *Mechanices* studio primam admovent manum. In horum praecipue gratiam hic tractatus non tantum instar Tomi III. *Mechanices* duobus jam tomis comprehensae conscriptus est; sed simul praemissa est a CELEB. AVCTORE *Introductio*, universae *Mechanices* fundamenta, prima nimirum de motu punctorum principia, methodo plane nova, priore faciliori concinniori & evidentiori sistens evoluta. Integrum itaque opus perlustrari potest sine ullo subsidio principiorum in prioribus de *Mechanica* libris expositorum, quorum tamen lectio ideo non negligenda, sed potius omnibus commendanda est, qui principiorum de motu punctorum generalium applicationem ad solutiones problematum specialium sibi reddere cupiunt familiarem. Sed operae pretium esse arbitror, ut succinctius exponam, quae sit methodi in *Introductione* huic operi praemissa usurpatae a methodo priorum de *Mechanica* librorum differentia.

Effectus potentiarum, quibus mobile sollicitatur, alias duobus principiis comprehendi solet, quorum altero definitur, quantum celeritas mobilis immutetur, altero autem, quantum ejus directio inflectatur. Eandem methodum effectus virium exprimendi secutus est CEL. AVCTOR in prioribus libris de *Mechanica*, sicque omnes quaestiones de motu punctorum felici successu dedit solutas. Quando autem corporum finitorum motus perpenditur; binorum istorum principiorum applicatio plurimis subjecta est difficultatibus, atque haec causa fuit, cur loco binorum istorum principiorum jam

## PRAEFATIO.

non nisi unico, aequatione  $dc = npdt:M$  comprehenso, utatur in hoc de motu corporum rigidorum tractatu, admissio simul hoc artificio, ut motus secundum datas directiones resolvatur, ad easdemque directiones resolutio virium sollicitantium instituat, ubi cognitio celeritatum lateralium simul motus directionem atque inflexionem in se complectitur. Methodus haec nititur more in Geometria usitato naturam linearum curvarum per binas vel ternas coordinatas exprimendi. Verum cum in Geometria etiam saepe lineae curvae ad punctum aliquod fixum referuntur non sine egregio calculi compendio; eodem quoque modo motus evolutio explicatur, idque non solum, cum motus in eodem absolvitur plano, sed etiam, si mobile extra planum vagatur. Hoc modo uti solent Astronomi, dum motus planetarum respectu alicujus puncti per angulos circa id descriptos distantiasque ab eodem definiunt, ubi si motus non fiat in eodem plano, insuper lineam nodorum cum inclinatione orbitae ad certum planum contemplantur. Quare cum hoc quoque in prioribus libris desiderari possit, quod ea methodus, qua nunc quidem corporum coelestium motus ad calculum revocari solent, ibi non sit exposita, ea in hoc opere accuratius explicata legitur. Quod denique adtinet ad modum, aequationes motum corporum definientes ad mensuras absolutas revocandi, hic quoque commodiore usus est CEL. AVCTOR, quam in praecedentibus libris, ubi quidem celeritates per radicem quadratam ex altitudinibus, per quas grave cadendo pares acquireret

## PRAEFATIO.

quireret celeritates, exprimebantur, quo nimirum efficitur, ut in formula generali  $dc = npdt:M$  constanti  $n$  valor  $\frac{1}{2}$  tribuendus sit. Verum ex altitudine celeritati debita ipsa celeritas non tam perspicue cognoscitur, sed calculo quodam opus est, ut ad mensuras solitas reducatur. Deinde etiam temporis ratio peculiari calculo eget, quo nova quaedam unitas in calculum introduci debet, ut tempus in minutis secundis eliciatur. Quod si vero, uti alias commodissime fieri solet, celeritates per spatium uno minuto secundo uniformiter percursum, & tempora in minutis secundis exprimantur; eadem experimenta, quibus superior modus constantem  $n$  definiendi innitur, ostendunt, esse hunc numerum  $n$  aequalem duplae altitudini, ex qua grave primo minuto secundo libere delabitur. Quare relicta priore methodo haud paucas ambages evitavit PERILL. AVCTOR, hoc ultimo modo multo faciliore & simpliciore in Introductione exposito, & in toto sequente opere retento.

Expositis hisce principiis generalibus transit CLAR. AVCTOR ad motus corporum finitae extensionis considerandos, & quidem ejusmodi corporum, quorum structura partiumque nexus a viribus sollicitantibus non mutari potest, quae rigidorum nomine ab aliis distinguuntur, quorum structura tot roboris non habet, ut virium sollicitantium actioni resistere valeat. Partes itaque talismodi corporis easdem perpetuo durante motu a se invicem distantias servant, nec corpus rigidum alium motum recipere potest, nisi quo haec  
con-

## PRAEFATIO.

conditio salva manet: alias ad aliam corporum classem esset referendum, quorum motus hic non definitur. Nihilo tamen minus ejusmodi corpus infinitorum motuum est capax. Inter omnes hos motus is est simplicissimus, quo singula corporis puncta secundum directiones inter se parallelas paribus celeritatibus quovis temporis momento promoventur, qui motus *progressivus purus* dici solet. Hic motus tanquam simplicissimus, cujus omnia corpora sunt capacia, primus erat considerandus. Servat corpus, cui semet ejusmodi motus est impressus, eundem non tantum ob inertiam, sed motus quoque progressivus purus non turbatur, si corporis tali motu lati singula elementa viribus, quae massis eorum sunt proportionales, secundum directiones inter se parallelas sollicitentur. Tum vero si corpus sit rigidum assignari potest unica vis omnibus illis aequivalens, cujus directio per centrum gravitatis seu inertiae transit. Unde vicissim, si corpori rigido in centro inertiae applicata fuerit vis quaecunque, ea quasi per omnia corporis elementa massis proportionaliter distributa considerari poterit, atque ob aequivalentiam effectus in motu turbando erunt aequales. Haec sunt, quae Capite I. fusius demonstrantur. Ubi imprimis notari mereatur, quod per principia hic stabilita, omnia, quae de motu punctorum in prioribus de Mechanica libris sunt tradita, pro motu progressivo corporum rigidorum valeant. Quae itaque cum in se nimis sterilia multis videri possent, nunc amplissimum usum habebunt, cum eo universum genus motuum  
pro-

## PRAEFATIO.

progressivorum sit referendum. Praeterea dum corpora rigida ejusmodi viribus sollicitata moventur, eorum compages satis firma esse oportet, ne in figura sua mutationem patiantur. Ideo, quantam vim compages corporis a viribus sollicitantibus sustineat, simul erat definiendum.

Corporum rigidorum finitae magnitudinis perinde ac corpusculorum infinite parvorum motus duplici modo est tractandus, prout fuerit vel liber, vel ob externa impedimenta restrictus. Neque vero hanc investigationem ita suscipere licet, ut sepositis omnibus motus obstaculis omnia motus liberi genera, quorum corpora rigida capacia sunt, ad calculum revocentur. Corpus enim libere motum praeter motum progressivum purum infinitis modis motus gyratorios recipere potest, cujusmodi motus complicati ante evolvi prorsus nequeunt, quam motus gyratorii circa axes fixos sunt definiti: tum enim demum ad motus gyratorios circa axes mobiles, ac porro ad motus liberos in genere progredi licet. Expedito itaque motu progressivo puro corpora rigida extrinsecus ita restricta contemplatur PERILL. AVCTOR, ut certum tantum motus genus recipere possint, quod situm ab aliqua causa externa duo corporis puncta fixa retinentur. Hoc casu corpus rigidum circa lineam rectam per haec puncta transeuntem, cum ipso firmiter connexam, motu gyratorio fertur, quare ipsa haec recta *axis gyrationis* vocatur. Sex Capitibus a II do ad VII mum hos motus gyratorios contemplatus est CLAR. AVCTOR. Stabilita notione



## *PRAEFATIO.*

& mensura celeritatis angularis primo definivit motus gyrotorii a nullis viribus turbati continuationem, investigat vires, non tantum quas axis sustinet, seu quae adhiberi debent, ut axis in situ suo conservetur, sed & quas corporis compages sustinet, & quibus mutuus partium nexus resistere debet. Posthaec CLAR. AVCTOR transit ad effectus virium quarumcunque in motu circa axem fixum generando. Ac quidem primo motus tantum initium contemplatur, qui corpori rigido circa axem fixum mobili a viribus quibuscunque imprimitur, quo facilius solus virium effectus a motu jam infito separatus perspiceretur, atque hinc ad sequentes investigationes subsidia peti queant, quando, dum corpus circa quempiam axem gyratur, vires adsunt, id circa alium axem convertere conantes: tum enim ex effectū momentaneo circa hunc axem productō judicare licet, quomodo motus praecedens turbetur. Postea quoque corpus rigidum in motu circa axem fixum considerat & scrutatur, quomodo is a viribus quibuscunque immutari debeat. Utraque investigatio simul conjuncta est cum determinatione virium, quas ipsa corporis compages, & praeterea earum praecipue, quas axis sustinet, quibus itaque sustentari debet, ne de situ suo deturbetur. Haec ultima quaestio de viribus, quas axis sustinet, adhuc minus studiose est tractata. Quare cum ea maximi sit momenti, hocque non solum ut intelligatur, quantis viribus opus sit, ad axem in situ suo retinendum, sed praesertim ut in motu corporum rigidorum libero judicari

## PRAEFATIO.

dicari possit, quibusnam casibus axis nullas plane vires sustinet; CEL. AVCTOR omni cura hoc argumentum luculenter & distincte evolutum dedit.

Universae hujus theoriae de motu corporum rigidorum circa axem fixum summam, quod ad variationem hujus motus a viribus productam adinet, complectitur aequatio

$ds = \frac{2Vfgdt}{frrdM}$ , in qua denotat  $s$  celeritatem angularem,  $Vf$  momentum vis sollicitantis,  $g$  altitudinem ex qua grave primo minuto secundo libere delabitur,  $frrdM$  summam omnium productorum, quae oriuntur, si singula corporis elementa per quadrata distantiarum suarum ab axe multiplicentur. Formula haec simillima est ei, qua variatio motus progressivi exprimitur, nimirum isti alias dudum cognitae  $dc = \frac{2gpdv}{M}$ .

Quemadmodum enim secundum hanc formulam est incrementum celeritatis motus progressivi ut vis sollicitans divisa per massam seu inertiam; ita in motu gyratorio est incrementum celeritatis angularis proportionale momento vis sollicitantis diviso per quantitatem  $frrdM$ , seu per summam omnium productorum ex quovis elemento massae in quadratum distantiae suae ab axe gyrationis. Quare cum loco vis sollicitantis pro motu gyratorio ejus momentum considerari debeat, & quantitas  $frrdM$  loco massae seu inertiae spectanda, ipsa haec quantitas  $frrdM$  nomine *momenti inertiae* commodè insignitur, ita ut incrementum celeritatis angularis proportionale fiat momento vis sollicitantis diviso per momentum

## PRAEFATIO.

inertiae. Similitudo utriusque formulae eo est perfectior, quod utrinque per elementum temporis  $dt$  & duplam altitudinem  $2g$  multiplicari oporteat, ut ipsum celeritatis incrementum exprimatur. Ad motum igitur gyratorium definiendum prae omnibus nosse oportet momentum inertiae respectu axis gyrationis. Patet autem, cum positio axis gyrationis respectu corporis in infinitum variari possit, ejusdem corporis infinita diversa dari momenta inertiae, prout ad alium atque alium axem referatur, ut ideo hujus momenti inertiae investigatio opus maxime laboriosum esse videatur. Ast vero CLAR. AVCTOR peculiari utitur artificio, cujus ope satis concinna methodo pro quovis corpore & pro dato in eodem axe momentum inertiae respectu illius axis indagari potest. Fusius haec omnia explicantur in Cap. V. ubi ista maxime notatu digna proprietas corporum demonstratur: dari in quovis corpore tres axes, quorum respectu momentum inertiae sit vel maximum vel minimum, hosque axes sese invicem in centro inertiae ad angulos rectos secare, ita ut quivis plano duorum reliquorum sit perpendicularis. Ob insignem hanc proprietatem tres illos axes *principales* vocat CLAR. AVCTOR, atque tum explicat modum, quomodo ex momentis inertiae respectu trium axium principalium absque prolixo calculo momentum inertiae ejusdem corporis respectu alius cujuscunque axis per ejus centrum inertiae transeuntis, hincque porro quoque respectu aliorum omnium illi parallelorum assignari possit. Hocque modo inventio momenti inertiae,

## *PRAEFATIO.*

**Inertiae**, quae initio pro quovis corpore quasi infinita videri posset, mirifice in compendium redigitur. Secundum hanc methodum sequenti Cap. VI. **CEL. AVCTOR** momenta inertiae pro praecipuis corporum & quidem homogeneorum speciebus evoluta dedit, ut quoties usus postulat inde desumi queant. Praecipuus casus, ad quem theoria de motu corporum rigidorum circa axem fixum accommodari solet, est motus oscillatorius corporum gravium, quare omnia, quae huc spectant, problemata de centro oscillationis in pendulis compositis Cap. VII. resoluta sunt, hisque tractatio de motu circa axem fixum gyatorio finitur.

Restat vero jam praecipuum totius operis argumentum, theoria scilicet de motu libero corporis rigidi a viribus quibuscunque sollicitati, in qua enodanda Summus **EVLERS** tanta praestitit, quanta in re tam ardua expectari vix poterant. Quomocunque motus corporis fuerit perturbatus, is semper pro quovis temporis momento resolvi potest in binos motus, quorum alter sit progressivus, ex motu centri inertiae dijudicandus, alter gyratorius circa quempiam axem per centrum inertiae ductum: effectus vero virium momentaneus duabus hisce rebus continetur: primo variatione motus centri inertiae tam ratione celeritatis, quam ratione directionis: secundo variatione motus gyatorii & quidem tam ratione celeritatis angularis, quam ratione positionis ipsius axis gyrationis. Ex his dijudicari quodammodo licet, generalem problematis, de motu libero corporis rigidi a viribus

## PRAEFATIO.

bus quibuscunque sollicitati determinando, solutionem haud exiguis premi difficultatibus. Ut itaque lector eo clariorem omnium elementorum solutionem problematis ingredientium cognitionem consequatur, per gradus quasi a casibus specialibus ad generaliora, ab his demum ad universalem problematis generalissimo sensu concepti solutionem adscendit AVCTOR. Casus motus gyratorii liberi simplicissimus is est, qui Cap. VIII. evolvitur, quo nimirum corpus circa ejusmodi axem gyrari concipitur, qui nullas ob motum vires sustinet. Vocantur axes corporis *liberi*, qui ista proprietate sunt praediti. In quolibet corpore libero tres saltem dantur axes gyrationis liberi, suntque isti axes iidem cum illis axibus principalibus, quorum respectu momentum inertiae corporis est vel maximum vel minimum. Licet alias jam considerati sint a Mechanicae Scriptoribus ejusmodi axes per centrum inertiae transeuntes, circa quos corpus libere gyrari possit, si nimirum momenta virium centrifugarum ex motu gyratorio natarum sese mutuo destruant; valde tamen dubito, an ante EVLERVM, hanc proprietatem corporum universalem esse, quod in quolibet corpore *tres* certe dentur axes gyrationis liberi, quis unquam invenerit, si PERILL. DN. DE SEGNER excipiam, qui eandem proprietatem omnibus corporibus competentem demonstravit in Programme sub titulo: *Specimen Theoriae turbinum*, Halae A. 1755. promulgato. Quemadmodum vero in quovis corpore rigido centrum inertiae est punctum maxime memorabile, cujus ratio

## PRAEFATIO.

ratio per universam Mechanicam latissime patet; ita axes principales, qui simul sunt axes gyrationis liberi, in quovis corpore non minus sunt notatu digni, cum iis universa doctrina de motu corporum libero innitatur. Trium momentorum inertiae corporis, quae sunt maxima vel minima, duo esse possunt aequalia, quod accidit in omnibus solidis tornatis homogeneis, quin fieri potest, ut omnia sint aequalia, veluti in sphaera. Si momenta inertiae respectu duorum axium principalium sunt aequalia, respectu reliquorum omnium in plano eorundem axium aequalium fitorum momenta inertiae sunt aequalia. Ac in corpore cujus tria momenta inertiae principalia sunt aequalia, reliqua omnia aequantur. Prouti igitur duobus vel tribus axibus principalibus paribus praedita sint corpora, vel tribus axibus principalibus disparibus gaudeant; quoad cognitionem mechanicam maxime notatu digna inter eadem intercedit differentia. Cum vero quodvis corpus tribus ad minimum axibus principalibus seu liberis sit praeditum; omne corpus quoque ejusmodi motus est capax, vi cujus circa talem axem liberum uniformiter gyratur, & quidem vel circa axem quiescentem, si centrum inertiae corporis quiescat, vel circa axem motu sibi semper parallelo uniformiter in directum progredientem, qui motus tum *mixtus* est ex progressivo & simplici gyratorio. Ac si praeterea corpus ab ejusmodi viribus sollicitetur, quae vel ipsi centro inertiae sint applicatae, vel quarum directiones cadunt in planum ad axem normale per centrum inertiae ductum,

## PRAEFATIO.

ductum, istae vires vel solum motum progressivum vel simul gyrationem turbabunt, ita tamen, ut axis situm sibi parallelum perpetuo servet. Reliquae vires omnes axeos situm simul turbabunt, atque hic est casus, quo principia Mechanicae huc usque cognita haud erant sufficientia ad continuationem motus determinandum. Jam itaque CLAR. AVCTOR. Cap. IX. & X. problema de corporis rigidi a viribus quibuscunque sollicitati motu generatim determinando adgreditur, ubi quidem primo Cap. IX. corpus rigidum in quiete considerat, & dum a viribus quibuscunque sollicitatur, primam motus generationem investigare conatur: deinde vero Cap. X. eum considerat casum omnium difficillimum, quo corpus jam in motu versatur, ac circa axem per centrum inertiae transeuntem gyratur, qui vero a viribus sollicitantibus continuo variatur. Ratiociniorum nexum, quibus CLAR. AVCTOR in evolvendis hisce quaestionibus usus est, brevibus recensebo.

Quotcunque fuerint vires corpus rigidum sollicitantes, & quomodocunque fuerint applicatae, eae semper ad duas revocari possunt, quarum altera per ipsum centrum inertiae corporis transeat. Ast vero si cognitus fuerit effectus duarum virium junctim agentium in motu generando, quarum altera ipsi centro inertiae est applicata, alterius etiam seorsim agentis effectus innotescit. Quodsi itaque quaestio est de prima motus generatione determinando, quando corpus rigidum quiescens & liberum a viribus quibuscunque sollicitatur,

## PRAEFATIO.

tatur, hae vires ad binas revocentur, quarum altera ipsi centro inertiae sit applicata, tumque cum hujus effectus sit determinatu facillimus, totum negotium eo redit, ut effectus ab unica quacunque vi productus definiatur. Quod si minus successerit, cum ea vi, alia quaecunque centro inertiae applicata, combinetur, ac si effectus inde junctim productus assignari poterit, totum negotium erit confectum. His positis primo investigatur, quomodo duae hujusmodi vires comparatae esse debeant, ut ab iis corpori motus circa datum axem per ejus centrum inertiae transeuntem imprimatur; tum vero exinde vicissim colligitur positio axis, circa quem corpus rigidum quiescens primum gyrationem incipit, respectu trium axium principalium corporis, una cum angulo elementari primo tempusculo producto, si a vi quacunque sollicitetur, eique simul in centro inertiae vis aequalis & contraria fuerit applicata. Effectus quidem idem produceretur a viribus sollicitantibus, etiamsi corpus in mota versetur: verum ob hujus motus admixtionem difficilius cognosci poterit. Si enim corpus jam circa alium axem gyrationem, ac nunc incitatur, non solum celeritas angularis, sed etiam ipse axis gyrationis mutabitur, ita ut nunc circa alium axem per centrum inertiae transeuntem gyrationem incipiat. Quare jam in id incumbendum erat, ut ista axis gyrationis variatio & quidem momentanea a viribus producta formulis analyticis expressa quaeratur, ubi demum ex cognita mutatione elementari ad ipsam motus determinationem per calculum integralem



## PRAEFATIO.

transeundum erit. Resolvenda igitur erat quaestio: si data sit positio axis gyrationis corporis moti respectu trium axium principalium corporis, isque a viribus sollicitantibus varietur, ut corpus elapso tempusculo elementari circa alium axem gyretur, quomodo definienda sit positio hujus axis variati respectu axium principalium. Cognitis jam viribus, quibus corpus dum circa quempiam axem gyratur, sollicitatur, is axis, circa quem quiescens gyrari inciperet definiri: tum vero variatio in axe gyrationis ob motum facta explorari poterit. Verum nisi corpus primo circa axem quempiam principalem gyretur, praeter vires externas, quibus corpus forte sollicitatur, imprimis eae vires, quae ex ipso motu gyratorio ejusque vi centrifuga nascuntur, perpendi, & in calculum introduci debent, ideo istae vires ex ipso motu gyratorio natae sollicite erant investigandae. Si enim axis gyrationis non sit principalis, etiamsi nullae vires extrinsecus urgerent, tamen axis parallelismus conservari non posset, quoniam vires centrifugae ad axem deflectendum tendunt. Inventis his viribus ex motu gyratorio ipso ad eum turbandum natis, cum his combinatis viribus externis corpus sollicitantibus methodo supra descripta definiri poterat variatio momentanea tam in ipso axe quam in celeritate angulari inde orta. Ipsum modum procedendi & calculum dirigendi explicat Problema 67. Licet itaque sic totum negotium absolutum esse censei posset; tamen restat aliud argumentum prorsus non negligendum. Cognita enim variatione tam cele-

## PRAEFATIO.

celeritatis angularis, quam axis gyrationis positione respectu trium axium principalium corporis ad quodvis temporis momentum; nondum tamen liquet, quem situm corpus respectu spatii absoluti teneat. Cum enim iste situs corporis labente tempore continuo varietur, etiam haec questio prioribus adjungenda erat: Si ad datum tempus cognitus sit situs corporis rigidi circa quempiam axem per ejus centrum inertiae transeuntem gyrantis, atque tam axis gyrationis, quam celeritas angularis utcunque varietur, quomodo invenienda sit mutatio momentanea in corporis situ orta. Hoc demum problemate resoluta, universa theoria de motu corporum rigidorum absoluta est censenda, tumque quodvis problema mechanicum, utcunque complicatum sit, aequationibus fundamentalibus, ex ipsius conditionibus secundum stabilita principia deductis, calculi integralis ope complete erit resolvendum.

Exposita sic theoria generali de modo singulas motus corporum rigidorum variationes aequationibus analyticis exprimendi, CEL. AVCTOR adgreditur applicationem principiorum ab ipso stabilitorum ad casus speciales in mundo obvios, ita quidem, ut primo, a viribus externis sollicitantibus abstrahendo, corpora sibi relicta tantum contempletur, ac constitutis tribus corporum generibus, ex indole axium principalium petitis, tribus quoque Capitibus XI. XII. XIII. motum evolvat corporum rigidorum, primo ternis axibus principalibus paribus, deinde duobus tantum paribus, ac denique

## PRAEFATIO.

que tertio ternis axibus principalibus disparibus praeditorum, & a nullis viribus sollicitatorum. Statim ab initio hujus tractationis demonstrat CLAR. AVCTOR illud, quod per universam mechanicam maximi est momenti, principium: quomodocunque corpus rigidum moveatur, ejus motum quovis momento compositum seu mixtum concipi posse ex motu progressivo centri inertiae & ex gyratorio circa axem aliquem per ejus centrum inertiae transeuntem. Remotis jam viribus sollicitantibus externis, determinatio motus corporum primi generis nulla laborat difficultate, cum circa nullum axem gyronari queant, qui non axis principalis proprietate gaudeat, unde nullae omnino vires ex ipso motu gyratorio ad motum turbandum ortum trahere possunt. Quaestio de motus corporum secundi generis continuatione determinanda calculum quidem requirit quodammodo complicationem; nihilo tamen minus ejusmodi corporum motus in genere determinare atque ad quosvis casus accommodare docet CEL. AVCTOR, ita ut perfecta & omnibus numeris absoluta sit hujus problematis solutio. Explicat simul CLAR. AVCTOR, quomodo motus hujusmodi corporum reduci queat ad duplicem gyratorium, unum nimirum circa axem *mobilem* (a motu circa axem *variabilem* sollicitate distinguendum) qua corpus circa ipsum axem principalem singularem aequabiliter gyronatur, dum secundo ipse hic axis circa polos extra corpus fixos circumfertur pariter motu uniformi. Tertiae classis corporum motus longe complicatior est, ac aequationum differentialium

## PRAEFATIO.

et alium, variationem momentaneam hujus motus definientium, integratio maxima premitur difficultate, Aequatio differentialis celeritatis angularis variationem exprimens licet ad separationem variabilium reduci queat, paucissimis tamen casibus exceptis, receptas expressiones arcuum circularium vel logarithmorum respuit. Huic quidem incommodo aliqua ratione medelam affert CEL. AVCTOR, loco celeritatis angularis introducendo aliam variabilem, a qua celeritas angularis pendeat: nihilo tamen secius nova aequatio differentialis inde orta ita est comparata, ut non nisi per arcus sectionum conicarum ejus integratio expediri queat; unde nec ullum commodum ad calculum prosequendum redundat, nec ad datum tempus celeritas angularis colligi potest. Quare cum formulae situm axis gyrationis respectu axium principalium definientes a celeritate angulari pendant, universalis problematis solutio a subsidiis analyticis expectari nequit. Explicatis itaque casibus quibusdam specialibus perfectam solutionem admittentibus, ut quodammodo aestimare liceat, quales hic motus sit futurus, ad subsidium quoddam mechanicum confugit CEL. AVCTOR, motum scilicet penduli per circulum; ac concessa motus determinatione, quo corpus grave in peripheria circuli vel oscillando vel revolvendo movetur, ad quodvis tempus determinare docet positionem axis gyrationis respectu axium principalium. Ast vero jam restabat alterum problematis resolvendi momentum, determinatio scilicet situs axium principalium

## PRAEFATIO.

respectu spatii absoluti. Non minores in hoc negotio expediendo, ac ante, occurrunt difficultates, cum res ad ejusmodi aequationes differentiales reducat, quae non solum non integrari, sed ne ad separabilitatem quidem variabilium revocari posse, ipso EVLERO ab initio visa sunt, unde hujus problematis solutionem in §. 761. ad finem perducere non potuit. Postea vero artificia invenit ingeniosissima, quorum ope harum aequationum integratio absolvi poterat, eaque in Supplemento in fine adjecto explicata leguntur.

Expositis sic, quae ad motum corporum rigidorum liberum, remotis viribus externis, pertinent, ordo postulabat, ut principia supra stabilita ad eos quoque casus applicarentur, quibus vires externae corpus sollicitantes ejus motum perturbant. Primo itaque tractandam elegit CEL. AVCTOR theoriam turbinum, cujus explicatio ob continuam axis gyrationis variationem adhuc maximis tenebris fuit involuta. Quod argumentum ut initio a gravioribus difficultatibus liberetur, axis turbine super plano horizontali politissimo incedere assumitur, ne frictioni ullus locus relinquatur, tum vero axis infra in cuspidem desinens statuitur, qua super plano horizontali ingrediatur. Cumque duo genera turbinum constituenda sint, prout vel omnia ejus momenta inertiae principalia fuerint inter se aequalia, vel duo duntaxat; illud genus primo loco Cap. XIV. calculo subjicitur. Inventa itaque primo via a centro inertiae turbine descripta, determinata insuper secundum principia supra stabilita variatione momentanea

## *PRAEFATIO.*

mentanea non tantum in axe gyrationis & celeritate angulari producta, sed & in situ turbinis respectu spatii absoluti orta, generalis solutio problematis de motu & situ turbinis ad quodvis tempus assignando tentatur, ubi vero iterum adeo complicatae prodeunt aequationes differentiales, ut earum integratio nec algebraice nec per logarithmos vel arcus circulares expediri possit. Longe majores praevidere poterat difficultates **CEL. AVCTOR**, si in turbine non omnia momenta inter se aequalia statuerentur, quare id argumentum nondum attingit, sed potius ipsam theoriā generalem de motu corporum rigidorum a viribus quibuscunque sollicitatorum denuo tractandam suscipit, & quidem methodo prorsus nova, prior longe perfectiore & ad usum magis accommodata. Methodum **Cap. IX. & X.** expositam nimis esse operosam compertus est **CEL. AVCTOR**, si inde effectus virium quarumcunque sit definiendus, dum primo axis, circa quem vires corpus, si quiesceret, convertere inciperent, definiri, tum vero hinc variatio axis, circa quem corpus actu gyrat, & celeritas angularis determinari oporteat. Negari quoque non potest, nec ipse **CLAR. AVCTOR** diffitetur, methodum, qua **Cap. X.** momentanae axis mutationes eliciuntur, ea non gaudere evidentia, ut ab omnibus dubiis sat expedite liberari queat, quam Artis periti contra eandem movere possent. His adeo praegnantibus rationibus commotus ingeniosissimus **AVCTOR** idem problema in **Cap. XV.** quod in integro opere est maxime notatu dignum, de novo pertractare voluit,

## PRAEFATIO.

voluit, ita ut ex hactenus allatis nihil in subsidium vocaverit, sed non nisi primis mechanicae principiis utatur, quo effecit, ut omnia hic evadant maxime perspicua. Statim quidem hoc faciliori modo uti potuisset CLAR. AVCTOR, sicque non leves difficultates in superiori tractatione occurrentes evitavisset: verum in argumento adhuc tam parum tractato haud incongruum erat, methodum operosiores & prolixiores praemittere, quo singulae notiones in re pene nova animo firmitus imprimantur, ipsaeque difficultates, quibus haec pars Mechanicae involuta videbatur, luculentius perspiciantur. Insuper haud parum interest, nosse viam, qua incedentes Auctores novis Artibus condendis aut insigniter promovendis operam navarunt, licet postea praestantiores methodi vel ab ipsis vel ab aliis detegantur. Mira facilitate ac evidentia hanc novam methodum ex primis & ab omnibus concessis motus principiis derivavit CEL. AVCTOR, atque ob summam solutionis universalitatem, in eadem jam omnia continentur, quae Cap. IX. & X. per multas ambages magno labore erant evoluta. Supra, dum corpus quiescit, axis, circa quem ipsi vires primum motum gyrationis imprimunt, vehementer operose determinabatur; ista vero determinatio instar Corollarii ex nova hac problematis solutione sponte fluit. Deinde etiam hic planissima fiunt, quae de variatione momentanea motus gyrationis, dum corpus a nullis viribus sollicitatum circa axem non principalem gyrationis, per nimis intricata ratiocinia tandem inventa

## PRAEFATIO,

venta erant. Quae autem supra vix attingi poterant, cum corpus insuper a viribus quibuscunque sollicitatur, hic pari facilitate eodemque labore feliciter expediuntur, ita ut hac nova methodo a primis motus principiis derivata universam theoriam motus corporum rigidorum perfecte condidisse censendus sit **CEL. AVCTOR**. Accedit, quod ipsa haec nova & universalis hujus problematis solutio formularum, quae superiori methodo quodammodo dubia, saltem non prorsus evidenti, nitebantur, veritatem plenissime confirmet, cum omnes istae formulae jam ex universali solutione corollariorum instar nullo negotio deriventur. Cum denique haec praecepta pro motu corporum rigidorum determinando latissime pateant, ea non ad motum liberum solum adstricta sunt. Quomodocunque enim corporum rigidorum motus compescitur, sive super plano quodam, sive juxta alia corpora incedere cogantur, sive quodpiam eorum punctum fixum retineatur, quaestio semper ad tradita praecepta reduci potest.

Ad utriusque igitur generis motus, tam liberos, quam restrictos in sequentibus Capitibus ab **AVCTORE** nostro facta est applicatio. Gravissima ejus generis quaestio, qua corpus motu libero, tam progressivo, quam gyratorio, circa axem variabilem latum a viribus externis sollicitatur, circa motum vertiginis corporum coelestium versatur. Eam ob causam hoc argumentum in Cap. XVI. generatim ita pertractatur, ut in Astronomiam inde haud contemnenda incrementa redundent;



## PRAEFATIO.

dundent; cum motus lunae libratorius. praeceſſio aequinoctiorum, & nutatio axeos terrae principalia ſint hujus Capiſ objecta. Excipit hanc tractationem plenior explicatio motus turbinum ſuper plano horizontali, ſemota frictione. Et cum ſupra tantum ejusmodi turbines ſint conſiderati, in quibus omnia momenta inertiae inter ſe ſunt aequalia, quae conditio nimium erat limitata, nunc motus turbinum in genere exploratur, poſitis tantum duobus momentis inertiae principalibus inter ſe aequalibus, quae conditio cum indole turbinum neceſſario conjuncta videtur. Cum turbo ſit corpus cuspide ſuper plano horizontali incedens, ita ut cuspis ſit quaſi baſis ipſius cenſenda, hinc ad alia corporum genera ducitur *CEL. AVCTOR*, quae baſi quacunq; ſuper plano incedant. Nimias autem ambages, quae in calculos inextricabiles perducerent; evitaturus, duo tantum corporum genera, cylindrica ſcilicet ac ſphaerica potiffimum evolvit, quorum nimirum figura externa, qua plano applicantur, ſit vel cylindrica vel ſphaerica, quomodocunq; materia intrinſecus fuerit diſtributa. Ad genus itaque cylindricum referuntur ea pendula, quae non ab axe lineari ſunt ſuſpenſa, ſed axiculis cylindricis utrinque plano horizontali incumbunt. Huc quoque refertur, ac ideo ſimul inveſtigatur motus vacillatorius, motui cunarum reciproco ſimilis. Ad genus praeterea ſphaericum pertinent turbines, quorum axes infra non in cuspide, ſed quaſi in haemiſphaerium deſinunt. Ab omnibus ejusmodi motibus, quibus corpus in ſuperficie alterius incedit,

## PRAEFATIO.

incedit, frictio est inseparabilis. Quare ut tractatio de ejusmodi motibus eo majorem in praxi habere possit usum, ultimo loco peculiaris tractatus de motu corporum rigidorum a frictione perturbato adnexus est. Explicata itaque frictionis natura in genere, & modo frictionem in calculum introducendi generatim evoluto, perpendet CEL. AVCTOR motus gravium progressivos a frictione impeditos, motus gyrationis corporum gravium circa axem fixum a frictione retardatos, quorsum pertinent motus pendulorum ab axiculis cylindricis suspensorum, motus praeterea turbinum in cuspidem desinentium super plano horizontali, frictionis habitacione, ac denique motus globorum centrum inertiae in ipsorum centro situm habentium super plano horizontali.

Haec erant, quae de praestantissimi hujus operis argumento praefationis loco praemittenda esse putavi. De eo quidem persuasus sum, L. B. etiam absque hac praeliminari recensione ab EVLERO haud vulgares expectasse investigationes. Nihilo tamen fecius haud incongruum mihi visum est, de iis saltem in antecessum aliquid in medium proferre, quae in hoc opere vel prorsus nova sunt, vel nova saltem methodo exposita, & quibus scientia mechanica maximi ponderis augmenta adsecuta est censenda. Mechanicam corporum rigidorum ad tantum perfectionis gradum in hoc tractatu perduxit Ill. AVCTOR, ut plura expectari non possint, nec debeant. Quomodunque enim problema de motu corporis rigidi definiendo fuerit complicatum, secundum principia stabilita sem-

## PRAEFATIO.

per erui possunt aequationes fundamentales, motus variationes elementares definientes. Quodsi itaque accidat, ut aequationes differentiales, ex conditionibus problematis deductae, integrari nequeant; tum non Mechanicae, sed potius Analyseos defectui tribuendum est, quod plena problematis solutio dari nequeat. Una cum EVLERO nostro Magnus Gallicae Geometra, ILL. D'ALEMBERT, in enodandum generale de motu corporum rigidorum problema parem operam contulit. In praestantissimo *de praecessione aequinoctiorum & nutatione axeos terrae* tractatu, A. 1749. Parisiis gallico idiomate edito, exposita leguntur omnia, quae ad problematis nostri solutionem generalem inveniendam conducere possunt principia. Ac EVLERVS noster, postquam ejusdem de praecessione aequinoctiorum & nutatione axeos terrae problematis solutionem suo more evolutam dederat in Historiae Academiae Regiae Berolinensis Tom. V. pro A. 1749. qui Tomus A. 1751 prodiit, in Tomo VI. sequente PERILLUSTRI D'ALEMBERT cedit gloriam debitam, qui arduam hanc de aequinoctiorum praecessione & axeos terrae nutatione quaestionem primus dedit resolutam. Postea vero EVLERVS noster problematis de motu corporum rigidorum generalissime concepti resolutionem investigavit in Historiae Academiae Berolinensis Tomo VI. ad A. 1750. edito demum A. 1752. Sed methodus, qua tunc temporis usus est CEL. AVCTOR, ad multo majorem ab ipso perducta est perfectionem, post insignem de tribus axibus corporum principalibus proprietatem a SEGNERO dete-

## PRAEFATIO.

detectam, ab ipso vero Auctore nostro ad usus mechanicos felicissimo successu ulterius applicatam. Quod in applicatione ad problema de motu vertiginis terrae jam investigaverat, id in Opusculis Mathematicis Parisiis A. 1761. gall. id. editis de-nuo in generalissimo sensu conceptum problema enodavit Cel. D'ALEMBERT, & quidem in prioris Tomi *Commentatione se-cunda: de motu corporis cujuscunque figurae a viribus quibus-cunque sollicitati*. Hanc commentationem CEL. D'ALEM-BERT Auctori nostro, cum in elaborando hoc opere occupa-tus esset, cognitam non fuisse, ideo pro certo evincere possum, quia opus EVLERI nostri jam A. 1760. consummatum & a CEL. AVCTORE initio A. 1761. ad me transmissum erat, prouti de eo testatur schedula jam A. 1761. impressa, qua institutum Dni. Roese de excudendo hoc opere indicebatur. Ipsa etiam methodus, qua CEL. D'ALEMBERT usus est, adeo differt ab EVLERIANA, ut ne minima suspicio oriri queat, unum Aucto-rem alterius opus in subsidium vocasse. Sic iterum Germania de novae scientiae inventore certare potest cum Gallia, prouti alias de Calculi differentialis inventore cum Anglia certavit. Quivis horum primae magnitudinis Geometrarum peculiari-  
usus est methodo ac propriis inveniendi artificiis, quae vero methodus alteri palmam praeripiat, quaestio est, quam subli-miorum hujusmodi scientiarum maxime peritis decidendam relinquo.

Si interest reipublicae litterariae, ut posteris conserventur scripta Auctorum, qui, novis Artibus condendis aut insigniter

## PRAEFATIO.

amplificandis scientiis, promeritam adsecuti sunt gloriam; omnem sane laudem meretur Illustr. Acad. Gryph. bibliopola & typograph. A. F. RÜSE, quod operam & impensas excudendo huic praebere voluit operi, prae multis immortalitate digno. Verendum est, ne posteri incuriam nostri seculi indignentur, cum & alia scriptis mandaverit doctrinae suae monumenta Summus noster EVLERVS, ob sumtum ad ea typis mandanda necessariorum defectum hactenus inedita, inter quae eminet de calculo integrali opus absolutissimum. Non possum non exscribere hic verba, quibus rei hujus mentionem fecerunt Auctores diarii litter. Gryphisw. A. 1763. p. 98. *Wir wissen, daß Herrn Eulers Integralrechnung zum Druck bereit liegt, und nur auf einen Verleger wartet. Wenn unsre Nachkommen wissen könnten, daß bey uns jährlich eine solche Menge schlechter Schriften gedruckt und verkauft werden könnten, so würde es ihnen keine große Idee von der Aufklärung unsrer Zeiten und der Unterstützung, welche den Wissenschaften wiederfähret, machen, wenn sie lesen, daß ein Werk, das für die Welt und alle Zeiten geschrieben ist, aus Mangel eines Verlegers ungedruckt liegt*

Caeterum, ut emendate prodiret opus, omni qua potui providi diligentia. Quae interim oculorum aciem fugerunt, vel operariorum culpa admissa sunt menda, ad calcem libri, ea saltem, quae sensum turbare possunt, sunt adnotata, quae igitur B. L. operis lectionem inchoaturus tollat, officiosissime rogo. Scrib. Bützovii mense Martio MDCCLXV.

WENCESL. JOH. GVSTAVUS KARSTEN.

Phil. D. et Math. P. P. O.

INDEX

# INDEX CAPITVM.

## INTRODVCTIO

CONTINENS ILLVSTRATIONES ET ADDITIONES NECESSARIAS  
DE MOTV PVNCTORVM.

|  |        |
|--|--------|
| CAP. I. Consideratio motus in genere   | Pag. 2 |
| CAP. II. De internis motus principiis  | 29     |
| CAP. III. De caussis motus externis seu viribus                                  | 44     |
| CAP. IV. De mensuris absolutis ex lapsu gravium petitis                          | 69     |
| CAP. V. De motu absoluto corpusculorum a viribus quibuscunque actorum            | 76     |
| CAP. VI. De motu respectivo corpusculorum, a viribus quibuscunque sollicitatorum | 93     |

## TRACTATVS

DE MOTV CORPORVM RIGIDORVM.

|   |     |
|---|-----|
| CAP. I. De motu progressivo corporum rigidorum.                                 | 105 |
| CAP. II. De motu gyratoriò circa axem fixum a nullis viribus turbato            | 122 |
| CAP. III. De motus gyratorii generatione  | 137 |
| CAP. IV. De perturbatione motus gyratorii a viribus quibuscunque orta           | 157 |
| CAP. V. De momento inertiae.  | 166 |
| CAP. VI. Investigatio momenti inertiae in corporibus homogeneis                 | 184 |
| CAP. VII. De motu oscillatorio corporum gravium                                 | 204 |
| CAP. VIII. De axe gyrationis libero motuque corporum rigidorum circa tales axes | 224 |
| CAP. IX. De prima motus generatione in corporibus rigidis.                      | 238 |
| CAP. X. De variatione momentanea axis gyrationis a viribus producta             | 255 |
| CAP.  |     |

|   |     |
|---|-----|
| CAP. XI. De motu libero corporum rigidorum ternis axibus principalibus paribus praedictorum & a nullis viribus sollicitatorum | 275 |
| CAP. XII. De motu libero corporum rigidorum duobus axibus principalibus paribus praedictorum & nullis viribus sollicitat.     | 283 |
| CAP. XIII. De motu libero corporum rigidorum ternis axibus principalibus disparibus praedictorum & nullis viribus sollicitat. | 298 |
| CAP. XIV. De motu turbinum super plano horizontali, in quibus omnia momenta inertiae sunt inter se aequalia                   | 321 |
| CAP. XV. De motu libero corporum rigidorum a viribus quibuscunque sollicitatorum  | 333 |
| CAP. XVI. De motu gyratorio seu vertiginis corpor. coelestium   | 352 |
| CAP. XVII. Plenior explicatio motus turbinum super plano horizontali, semota frictione  | 375 |
| CAP. XVIII. De motu corporum basi sphaerica praedictorum super plano horizontali  | 395 |
| CAP. XIX. De motu corporum cylindricorum super plano horizontali.   | 425 |

## SUPPLEMENTVM I.

DE MOTV CORPORVM RIGIDORVM A FRICTIONE PERTVRBATO.

|   |     |
|---|-----|
| CAP. I. De frictione in genere  | 449 |
| CAP. II. De motu progressivo corporum gravium a frictione impedito.                                   | 457 |
| CAP. III. De motu gyratorio corporum gravium circa axem fixum a frictione retardato                   | 464 |
| CAP. IV. De motu turbinum in cuspidem definientium super plano horizontali, frictionis habita ratione | 482 |
| CAP. V. De motu globorum centrum inertiae in ipsorum centro situm habentium super plano horizontali.  | 489 |

INTRO-

**INTRODUCTIO**  
**CONTINENS**  
**ILLUSTRATIONES ET ADDITIONES**  
**NECESSARIAS**  
**DE**  
**MOTU PUNCTORUM**



INTRODUCTION

GENERAL PRINCIPLES

THEORY OF THE ATOM

THEORY OF THE MOLECULE

THEORY OF THE CRYSTAL



# CAPUT I.

## CONSIDERATIO MOTUS

### IN GENERE.

#### DEFINITIO. I.



I.  
 uemadmodum *Quies* et perpetua in eodem loco permanen-  
 tia: ita *Motus* est continua loci mutatio. *Corpus* scilicet, quod  
*semper in eodem loco* haerere observatur, *quiescere* dicitur:  
 quod autem labente tempore in alia atque alia loca succedit,  
 id moveri dicitur.

#### EXPLICATIO. I.

2. Quanquam notiones quietis et motus in se planissimè videntur,  
 tamen quò accuratiorem earum cognitionem acquiramus, singulas, qui-  
 bus constant, ideas attentius considerari convenit. Ac primo quidem  
 occurrit idea loci: quid autem sit locus? haud facile declaratur. Qui spa-  
 tium immensum imaginantur, in quò totus mundus versetur, ejus par-  
 tes a corporibus occupatas horum loca appellant, ob extensionem enim  
 quodque corpus parem spatii partem occupet, et quasi impleat, necessè  
 est. Verum hujus ipsius spatii notionem nos nonnisi per abstractionem  
 concipimus, dum mente omnia corpora tollentes, id quod residuum fore  
 arbitramur, spatii nomine appellamus: sublati scilicet corporibus eo-  
 rum adhuc extensionem residuam fore putamus; qui conceptus a Philo-  
 sophis multis argumentis impugnari solet. Neque etiam hæc ipsa quæ-  
 stio,

fitio, nisi ante jam adæquata motus idea fuerit stabilita, dirimi posse videtur. A principio certe huiusmodi lubricas abstractions repudiantes, rem prouti in sensus immediate incurrit, perpendere debemus, quos consulentes de loco cuiuspiam corporis aliter judicare non licet, nisi id ad alia corpora circumjacentia referendo, quorum respectu, quam diu, id eundem situm servaverit, id in eodem loco perseverare, fin autem in alium situm pervenerit, locum mutasse pronunciare solemus.

## EXPLICATIO. 2.

3. Cum autem situm corporis respectu aliorum circumjacentium aestimamus, dum hæc inter se eundem situm servant, iudicium nostrum utpote geometricis quasi ideis innixum fallax esse nequit. Determinatur enim situs per distantias ab aliquot punctis diversis, neque unum vel etiam duo puncta ad hoc sufficiunt. Nam si dicam punctum O a puncto A intervallo  $= a$  distare, situs puncti O minime determinatur. Sed universa superficies sphaerica circa centrum A radio  $= a$  descripta relinquatur, in cuius singulis punctis punctum O æque inesse posset, quorum nullum præ reliquis hoc modo ipsi pro loco, ubi existat, assignatur. Sin autem dicam, punctum O a puncto A intervallo  $= a$ , ab alia puncto B vero intervallo  $= b$  distare; concipiatur superficies sphaerica circa A radio  $= a$ , simulque alia circa B radio  $= b$  descripta; et quia intersectio harum superficierum est circulus, huius singula puncta ita erunt comparata, ut a puncto A intervallo  $= a$ , a puncto B vero intervallo  $= b$  distent. Certum ergo erit, punctum O in periphæria huius circuli existere, et ubi revera existat, non definitur. Ponamus igitur, dari insuper puncti O distantiam a tertio quodam puncto C, quæ sit  $= c$ , neque hoc tertium punctum C cum duobus superioribus in directum jaceat; et cum superficies sphaerica circa C radio  $= c$  descripta superiorem circulum duobus adhuc punctis secet, etiam nunc dubitamus, in utro eorum punctum O existat; veruntamen inter duo tantum puncta ancipites hæremus. Hinc concludimus, si puncti O distantias a quaternis punctis A, B, C, D, non in eodem plano sitis noverimus, ejus situm plane determinari; plerumque vero etiam tria sufficiunt, quando scilicet aliunde alterum duorum illorum punctorum, quæ æque satisfaciunt, excluditur.

## SCHOLION.

4. Cum hæc situs cuiusque puncti determinatio sit geometrica, nulli prorsus dubio est subjecta: unde ab ea considerationes de quiete

et

## CONSIDERATIO MOTUS IN GENERE.

5

et motu exordiemur. Quæ autem hic de situ punctorum sunt observata, facile ad quævis corpora accommodantur, quoniam idea quietis vel motus in corporibus locum non habet; nisi quatenus singulis ejus punctis tribuitur. Neque enim, quæcumque etiam idea quietis ac motus statuatur, ea subito de corpore quodam universo prædicari potest, cum fieri possit, ut in corpore alia puncta quiescant alia vero magis minusve moveantur. Atque hanc ob causam omnino necesse est, ut veram quietis motusve in dolem primo tantum in punctis investigemus. Neque tamen ideo hæc consideratio tanquam imaginaria est spectanda, propterea quod punctorum conceptus sit inere abstractus, quibus nonnulli etiam dubitarunt motum vel quietem adscribere. Verum, quicquid sit de hac controversia, necessario concedendum est, si corpus vel quiescat vel moveatur, puncta in eo concipi posse, quæ vel quiescent vel movebuntur: neque hic interest, utrum talia puncta pro corporum elementis haberi queant nec ne? Nihil quoque obstat, quominus quis ut lubuerit loco horum punctorum vera corporum elementa, sive sint infinite parva, sive saltem quam minima substituere velit: res enim omnino eodem redibit, neque hinc nullum dubium nasci potest. Simili modo ea puncta A, B, C, D ad quæ situm puncti O retuli, realitati minime repugnant, cum sint termini in veris corporibus existentes, a quibus distantia mensurentur. Nisi quis existentiam corporum prorsus negaverit, cum quo nobis disputatio foret nulla, hujusmodi conceptus ad sublevandum investigationis negotium minime improbare poterit.

### DEFINITIO. 2.

5. Dum quatuor plurave puncta easdem inter se servant distantias, si punctum aliquod O ab piis perpetuo maneat æquidistans, eorum respectu quiescere dicitur: propterea quod eorum respectu eundem situm conservat.

### COROLL. 1.

6. Si A sit corpus solidum figuram suam constanter servans, in eo, quantumvis fuerit parvum, non solum quatuor, sed quam plurima concipere licet puncta, quæ inter se easdem perpetuo teneant distantias.

### COROLL. 2.

7. Quare si punctum O respectu istius corporis A eundem situm servet, quod sit, si ab omnibus ejus punctis perpetuo æque

A 3

maneat

maneat remotum, tunc punctum O respectu corporis A. quiescere dicitur.

*COROLL. 3.*

8. En ergo realem quietis definitionem nullis ideis vagis seu imaginariis implicatam, quæ autem conjuncta est cum idea cujuspiam corporis, cujus respectu punctum O quiescere dicitur: neque patet, quid sit quies absolute sic dicta separata a talis corporis notione.

*EXPLICATIO. 1.*

9 Verum hic in limine Mechanicæ ne solliciti quidem esse debemus de quiete absoluta, quæ an sit et qualis, etiam nunc prorsus ignoramus, in id tantum inquirentes, quid sensus nobis ostendant. Ubicunque autem nobis de quiete est sermo, semper nostra idea conjuncta est cum corpore quopiam, cujus respectu corpus vel potius punctum quiescere dicamus. Ita navigantibus corpora, quæ respectu navis eundem situm retinent, quiescere dicuntur, æque ac nos in continenti versantes corporibus, respectu soli eundem situm tenentibus, quietem tribuere solemus. Neque illi magis falli sunt putandi, quod navis moveatur, cum etiam universam tellurem moveri Astronomi statuant. In idea enim quietis hic stabilita, minime curamus, utrum corpus illud, cujus respectu quietem asserimus, quiescat, an moveatur. Quamdiu enim punctum O respectu corporis A eundem situm conservat, id hujus respectu quiescere pronunciamus, neque quicquam ultra hac locutione inuimus. Nova plane futura esset quaestio de quiete vel motu ipsius corporis A aliunde dijudicanda, quæ ad illam definitionem nihil conferret. Ita in navi, quicquid ejus respectu eundem situm servat, ejus quoque respectu quiescit, nihilque interest, utrum ipsa navis quiescat, an moveatur.

*EXPLICATIO. 2.*

10. Idea igitur quietis hic tradita inter relationes est referenda, cum non ex sola conditione puncti O, cui tribuitur, desumatur, sed ejus cum alio quodam corpore externo A comparatio instituitur: ex quo si nobis unquam nosse liceat, an detur quies absoluta et quid sit? distinctionis causa hanc, quam definivimus, quietem respectivam appellamus. Atque hinc statim patet, fieri posse, ut idem punctum, quod respectu corporis A quiescat, respectu aliorum corporum non quiescat, sed adeo varie moveatur. Quemadmodum corpus in navi quies-

## MODERATIO MOTUS IN GENERE.

7

cens respectu solis vel aliorum corporum coelestium aliter atque aliter movetur. Unde patet, ista quietis vel motus prædicata in ipso corpore vel puncto O nihil mutare, cum omnia ei simul convenire queant, prout ad alia atque alia corpora referatur.

### SCHOLION.

11. Hæc omnia simili modo de idea loci sunt intelligenda; cum enim quies sit permanentia in eodem loco, ut hæc definitio quoque ad quietem respectivam pateat, punctum O, quod respectu corporis A quiescere dicitur, ejus quoque respectu in eodem loco perseverare dicendum est. Quia igitur in eodem situ respectu corporis A manet, idem locus conveniat cum eodem situ necesse est. Hæc autem loci idea perinde ac quietis est respectiva, ita ut locus respectivus sit certus ac determinatus quidem situs respectu cujusdam corporis. Utrum detur alia magis naturalis loci idea, adhuc ignoramus; cujusmodi siquidem detur, is locus absolutus vocetur. Loco quidem respectivo, prouti eum hic definivimus, immobilitas, ut vulgo fieri solet, tribui nequit; si enim corpus, cujus respectu erat descriptus, ipsum promoveatur, locus cum ipso progredi censendus est. Sin autem cui videantur ea corpora absolute quiescere, quæ respectu stellarum fixarum eundem locum retineant, ei locus absolutus erit certus ac determinatus situs respectu stellarum fixarum. Num autem relatio ad stellas fixas naturæ rei magis sit consentanea, quam relatio ad alia quævis corpora? hic etiamnum in dubio relinquere cogimur.

### DEFINITIO. 3.

12. Si punctum O respectu alicujus corporis A, quod figuram conservat immutatam, situm suum continuo mutet, id respectu corporis A moveri dicitur.

Evidens est, figuram corporis A invariabilem assumi debere, ut quaternaria puncta in eo concepta, ad quæ punctum O refertur, inter se easdem distantias servant.

### COROLL. 1.

13. Quæ de quiete respectiva diximus, facile ad motum respectivum transferuntur; quando enim punctum O respectu corporis A eundem servat situm quiescere, quando autem ejus respectu situm continuo mutat, moveri respectivè dicitur.

### COROLL.

## CAPUT. I.

## COROLL. 2.

14. Simul vero patet, fieri posse, ut idem punctum O, quod respectu corporis A quiescat, respectu alius corporis B moveatur. Unde hæc idea tam motus quam quietis est relativa, neque quicquam in ipso puncto O mutat.

## COROLL. 3.

15. Motus igitur et quies nomine tantum, non verò re ipsa sibi opponuntur, cum utrumque simul eidem puncto, prout cum alio atque alio corpore conferatur, tribui possit. Neque motus a quiete aliter differt, atque alius motus ab alio.

## COROLL. 4.

16. Motus itaque et quies perperam inter affectiones corporum numerantur, quandoquidem dum affectio cuiuspiam rei mutatur, ipsa res mutationem passa sit censenda: cum contra corpori, sive ei motus sive quies tribuatur, nulla mutatio obveniat.

## EXPLICATIO. 1.

17. Cadit ergo celebris illa distinctio inter motum et quietem, quam Philosophi tanquam maxime essentialem corporibus prædicare solent: si quidem rem de motu et quiete respectiva intelligimus. Verum obijcient, rem longe aliter se habere, si de motu et quiete absoluta loquamur: quid autem sit motus absolutus et quies absoluta non satis definiunt. Si velint has denominationes ex relatione ad stellas fixas petendas esse, nihilominus tam motus quam quies erunt respectivi, neque a nostris definitionibus recedunt, nisi quod aliud ac determinatum corpus indicent, ad quod relatio sit instituenda, unde quid in ipsum corpus, quod eo refertur, redundet, nondum apparet. Ceterum minime nego, ullum esse discrimen, inter motum et quietem, vel inter corpus motum et quiescens, cum potius in eo definiendo tota Mechanica sit occupata: sed id jure equidem nego, motum et quietem ullam internam corporis mutationem involvere. Ad quod ergo prædicamentorum genus referri debeant quies et motus, Philosophi viderint, qualitates certe minime vocari possunt; nihil autem prohibet, has res inter relationes numerare, quandoquidem utcumque eadem res cum aliis aliisque objectis comparatur, ejus indoles interna nullam mutationem subit.

J. J. J.

EXPLI-

## CONSIDERATIO MOTUS IN GENERE.

9

### EXPLICATIO 2.

18. Cum loci ideam definiverim, prout eam quidem sensuum iudicium suppeditat, idea nunc quoque temporis, quæ in notione quietis ac motus implicatur, occurrat. Dum enim quies perpetua in eodem loco *permanencia* dicitur, hoc ipsum *perpetuum* vel *permanens* sine temporis notione intelligi nequit. Verum motus idea temporis notionem magis evolutam postulat, ex qua etiam divisio temporis in partes sive æquales sive inæquales percipi queat. Dum enim punctum O situm respectu corporis A mutat; hæc mutatio cognosci nequit, nisi *quanta mutatio* quovis tempore sit facta, intelligamus. Si ergo, ut pluribus placet, temporis notitiam aliunde, nisi ex consideratione motus, haurire non liceret, neque tempus sine motu, neque motum sine tempore cognoscere possemus, mentris ergo unquam ullam notitiam esseimus consecuti. Divisionem quidem temporis ex motus contemplatione, solis scilicet, didicimus, verum sine motus subsidio videmur apprehendisse, quid sit *ante* et *post*; unde idea *successionis* sponte sequi videtur. Atque etiamsi nos temporis accuratorem notitiam considerationi motus debeamus, hinc tamen nondum sequitur, tempus in se nihil esse præter nostrum conceptum. Quid enim sint duo temporis intervalla æqualia? quilibet intelligit, etiamsi fortasse nunquam in iis æquales mutationes eveniant, ex quibus illam æqualitatem colligere possit. Quicquid igitur de temporis fluxu disceptetur inter Philosophos, ad motus cognitionem temporis mensura uti debemus, concedendumque est, tempus ita ab omni motu independenter fluere, ut in eo partes, tam æquales, quam secundum rationem quamcunque inæquales, concipere liceat. Qui hanc nobis veniam recusaverit, omnem motus cognitionem funditus sustulerit. Tempus igitur perinde nobis liceat in calculum introducere, ac hanc aliasque magnitudines geometricas.

### DEFINITIO. 4.

19. In motu puncti spatium vocatur via, quam punctum motu suo percurrit, quæ cum sit linea, erit vel recta vel curva. Illo casu *motus* dicitur *rectilineus*, hoc vero *curvilineus*.

### COROLL. 1.

20. Cum aliam adhuc motus, nisi respectivi, ideam non habeamus, spatium quoque seu linea descripta ad corpus, cuius respectu motus aestimatur, est referenda.

B

COROLL.



## COROLL. 2.

21. Hoc scilicet corpus, siue quiescat ipsum siue moveatur, quoniam haec ratio non in computum ducitur, tanquam fixum spectatur, ejusque respectu tractus et positio illius spatii a puncto descripti assignari debet.

## COROLL. 3.

22. Cognitio ergo hujus spatii ad tres casus reuocatur, quorum primus est, si motus sit rectilineus, spatiumve linea recta. Secundus, si spatium quidem sit linea curva, sed tota in eodem plano sita. Tertius vero, si linea curva non eodem plano contineatur.

## EXPLICATIO. 1.

23. In Geometria jam assumitur, motu puncti lineam describi, quod ipsum per se clarius est, quam ut demonstratione egeat. Si enim punctum quod ante fuerat in A nunc sit in B, interea lineam quandam continuam ab A ad B porrectam percurrerit necesse est, nisi quis dicere velit, id in A subito annihilatum, tum vero in B de novo reproductum esse; verum quia hoc esset miraculum, non motus, ad nostrum institutum non pertinet. Qui motum quidem agnoscere nolunt, rem clarius se concipere opinantur, si dicant, in singulis punctis spatii, quod nobis percursum videtur, punctum annihilari, statimque in sequentibus reproduci; quasi transitus ab uno loco in alium difficilior esset intellectus, quam alterna destructio et creatio. Verum cum motus alio respectu quies esse possit, idem de quiete dicere coguntur, ut sit perpetua ejusdem corporis destructio, in eodemque loco subito secuta creatio: quae opinio cum non differat ab ea, qua conservatio corporum continua eorundem creatio statuitur, a vulgari vix dissentire videtur. Cum enim nullum temporis punctum sit, quo corpus non existat, quin continuo existat dubitari nequit, haecque continua corporum existentia in motu aeque atque in quiete concedi debet. Ex quo conficitur, punctum ab uno termino in alium transire non posse, quin successive totam quandam lineam, ab illo termino ad hunc extensam percurrerit.

## EXPLICATIO. 2.

Fig. 1.

24. Ponamus punctum percurrisse lineam APQB, et cum id simul in A et B esse nequeat, necesse est, ut in B reperiatur, postquam fuerit in A. Ex iis ergo, quae non simul fuisse percipimus, ideam temporis colligimus, atque

## CONSIDERATIO MOTUS IN GENERE.

11

que cum punctum fuerit in A, idem non nisi elapso aliquo tempore in B pervenire potuisse agnoscimus. Quod idem cum de punctis mediis P et Q fit statuendum, punctumque prius pervenerit in P quam in Q, atque prius in Q quam in B, inde simul divisionem temporis intelligimus, qua constat, tempus quo ex A in P pervenerit, minus esse eo, quo ex A in Q perveniat, hocque minus eo, quo ex A usque in B pertingat. Hinc patet, tempus esse quantitatem divisibilem et mensurabilem, ita ut non solum aliud alio majus minusve sit dicendum, sed etiam ejus partes sive aequales, sive secundum rationem quamcumque inaequales, assignari queant. Cum enim tempus sit quantitas, necessario concedi debet, tempus, quo punctum ex A in P pervenit, vel aequale vel majus esse vel minus tempore, quo porro ex P in Q pervenit: et quicquid dixeris, inter haec duo tempora quaedam ratio intercedat, necesse est. Summo ergo jure hic tempus, tanquam quantitatem divisibilem ac mensurae capacem, in calculum introduci posse postulo.

### DEFINITIO. 1.

25. *Motus aequabilis seu uniformis* dicitur, quo aequalibus temporibus aequalia spatia percurruntur. Sin autem aequalibus temporibus inaequalia spatia, vel aequalia spatia inaequalibus temporibus conficiantur, motus vocatur *inaequabilis*.

### COROLL. 1.

26. Si ergo punctum motu aequabili feratur, tempore duplo percurrent spatium duplum, triplo triplum: atque in genere spatia percurra erunt in ratione temporum, ac vicissim. Nempe si tempore  $t$  pereuratur spatium  $s$ , alio vero tempore  $T$  spatium  $S$ , erit  $t : T = s : S$ .

### COROLL. 2.

27. In motu autem inaequabili res secus se habebit, neque spatia percurra  $s$  et  $S$  rationem temporum,  $t : T$  tenebunt, fermo hic autem est de motu quocumque respectivo, cujus solum adhuc habemus ideam, ac perinde est, sive motus sit rectilineus sive curvilineus.

### COROLL. 3.

28. Ex motu ergo aequabili vicissim accuratam temporis divisionem nanciscimur: cum enim spatii divisio geometricè institui possit, tempus inde similem divisionem in partes sive aequales sive inaequales impetrabit.

B 2

SCHO.

## CAPUT I.

### SCHOLION. 1.

29. Hinc intelligitur, temporis divisionem non esse meram mentis operationem, ut ii, qui temporis nomini in mente nostra locum concedunt, ideam temporis ab ipso tempore non secernentes, statuere solent. Si enim tempus nihil aliud esset, nisi ordo successivorum, neque extra mentem quicquam esset, quo tempus determinaretur; nihil impediret, quo minus in omni motu temporis partes, quibus aequalia spatia conficiantur, pro aequalibus haberemus, cum successiones similes videantur, ita ut omnis motus aequo jure tanquam aequabilis spectari posset. Ipsa autem rei natura abunde testatur, motum aequabilem essentialiter ab inaequabili differre; ideoque in aequalitate temporum, qua nititur, plus, quam quod in ideis nostris resideat, insit necesse est. Atque hinc aequalitas temporum rationi cuipiam, extra mentem sitae, inniti dicenda est, nosque potius ejus cognitionem extrinsecus ex motu aequabili hausisse videmur.

### SCHOLION. 2.

30. Quamdiu punctum motu aequabili fertur, ita ut temporibus aequalibus spatia aequalia percurrat, tamdiu aequo celeriter moveri dicitur: unde discimus, quid sit *aequo celeriter moveri*. Ac si duo puncta A et B motu aequabili incedant, illudque A singulis temporibus  $s$  spatia  $= s$ , hoc vero B iisdem temporibus spatia  $= \sigma$  percurrat, fueritque  $s > \sigma$ , punctum A celerius ferri dicitur, quam B, hoc vero illo tardius; unde percipimus, quid sit *celerius*, quid *tardius*. Atque si punctum A eodem tempore spatium duplo vel triplo majus absolvat, quam punctum B, illud *duplo* vel *triplo celerius* incedere dicitur; sicque hinc adeo comparatio hujus rei, quae vocabulo *celerius* subjicitur, menti clare obversatur, etiam si de re ipsa nihil adhuc definiverimus. Est autem haec res conceptus abstractus, quasi basis exhibens ejus, quod sub voce *celerius* cogitamus; vocaturque iste conceptus *celeritas* vel *velocitas*, cujus definitionem proponamus.

### DEFINITIO. 6.

31. In motu aequabili ratio spatiorum ad tempora, quibus percurruntur, vocatur *celeritas* sive *velocitas*. Aestimatur ergo celeritas ex quoto, qui oritur, si spatium per tempus dividatur,

COROLL.

# CONSIDERATIO MOTUS IN GENERE.

13

## COROLL. 1.

32. Si ergo in motu aequabili spatium =  $s$  tempore =  $t$  percurra-  
tur, celeritas erit =  $\frac{s}{t}$ . Unde si celeritas littera  $v$  indicetur, habe-  
tur  $v = \frac{s}{t}$ .

## COROLL. 2.

33. Positis ergo his tribus rebus, spatium =  $s$ , tempore =  $t$ , et ve-  
locitate =  $v$ , ex binis tertia ita definitur; ut sit 1°.  $v = \frac{s}{t}$ ; 2°.  $t = \frac{s}{v}$   
et 3°.  $s = tv$ .

## COROLL. 3.

34. Hinc si alius praeterea fuerit motus aequabilis, quo spatium  
=  $S$  tempore  $T$  conficiatur, ejusque celeritas dicatur =  $V$ , habebun-  
tur istae notissimae proportionēs 1°.  $v : V = \frac{s}{t} : \frac{S}{T}$ ; 2°.  $t : T = \frac{s}{v} :$   
 $\frac{S}{V}$ ; 3°.  $s : S = tv : TV$ .

## EXPLICATIO. 1.

35. Dubium hic orietur, quomodo spatia per tempora dividi  
queant, cum sint quantitates heterogeneae, neque dici possit, quoties  
tempus v. gr. decem minutorum in spatio v. gr. decem pedum conti-  
neatur. Verum hic non de divisione absoluta est sermo. Sed de com-  
parativa, quoniam celeritatis idea nihil absoluti involvit. Scilicet  
celeritas aliter nisi relative intelligi nequit; statim autem atque celeri-  
tatem certi cujusdam motus aequabilis tanquam cognitam assumimus, et  
quasi unitatem spectamus, in quocunque alio motu aequabili celeritas  
per numerum exprimitur, neque ulla amplius occurret difficultas.  
Fingamus enim in motu aequabili, quo spatium =  $s$  tempore =  $t$  absol-  
vitur, celeritatem pro unitate assumi: ita ut  $\frac{s}{t}$  tanquam unitas specte-  
tur; in alio quocunque motu aequabili, quo spatium =  $S$  tempore =  
 $T$  percurritur, celeritas talis erit numerus, qui sit ad unitatem, ut  
 $\frac{S}{T}$  ad  $\frac{s}{t}$ , eritque hic numerus =  $\frac{S t}{T s} = \frac{S}{t} \cdot \frac{t}{T}$ , cujus factores  $\frac{S}{t}$  et  
 $\frac{t}{T}$  veros quosque exhibent.

B 3

EXPLI-

## CAPUT I.

### SCHOLION. 1.

29. Hinc intelligitur, temporis divisionem non esse meram mentis operationem, ut ii, qui temporis nomen in mente nostra locum concedunt, ideam temporis ab ipso tempore non fecernentes, statuere solent. Si enim tempus nihil aliud esset, nisi ordo successivorum, neque extra mentem quicquam esset, quo tempus determinaretur; nihil impediret, quo minus in omni motu temporis partes, quibus aequalia spatia conficiantur, pro aequalibus haberemus, cum successiones similes videantur, ita ut omnis motus aequo jure tanquam aequabilis spectari posset. Ipsa autem rei natura abunde testatur, motum aequabilem essentialiter ab inaequali differre; ideoque in aequalitate temporum, qua nititur, plus, quam quod in ideis nostris resideat, insit necesse est. Atque hinc aequalitas temporum rationi cuipiam, extra mentem sitae, inniti dicenda est, nosque potius ejus cognitionem extrinsecus ex motu aequabili hausisse videmur.

### SCHOLION. 2.

30. Quamdiu punctum motu aequabili fertur, ita ut temporibus aequalibus spatia aequalia percurrat, tamdiu aequè celeriter moveri dicitur: unde discimus, quid sit *aequè celeriter moveri*. Ac si duo puncta A et B motu aequabili incedant, illudque A singulis temporibus  $s$  spatia =  $s$ , hoc vero B iisdem temporibus spatia =  $\sigma$  percurrat, fueritque  $s > \sigma$ , punctum A celerius ferri dicitur, quam B, hoc vero illo tardius; unde percipimus, quid sit *celerius*, quid *tardius*. Atque si punctum A eodem tempore spatium duplo vel triplo majus absolvat, quam punctum B, illud *duplo* vel *triplo celerius* incedere dicitur; sicque hinc adeo comparatio hujus rei, quae vocabulo *celerius* subjicitur, menti clare observatur, etiamsi de re ipsa nihil adhuc definiverimus. Est autem haec res conceptus abstractus, quasi basim exhibens ejus, quod sub voce *celerius* cogitamus; vocaturque iste conceptus *celeritas* vel *velocitas*, cujus definitionem proponamus.

### DEFINITIO. 6.

31. In motu aequabili ratio spatiorum ad tempora, quibus percurruntur, vocatur *celeritas* sive *velocitas*. Estimatur ergo celeritas ex quo, qui oritur, si spatium per tempus dividatur,

### COROLL.

COROLL. 1.

32. Si ergo in motu aequabili spatium =  $s$  tempore =  $t$  percurrat, celeritas erit =  $\frac{s}{t}$ . Unde si celeritas littera  $v$  indicetur, habetur  $v = \frac{s}{t}$ .

COROLL. 2.

33. Positis ergo his tribus rebus, spatio =  $s$ , tempore =  $t$ , et velocitate =  $v$ , ex binis tertia ita definitur; ut sit 1°.  $v = \frac{s}{t}$ ; 2°.  $t = \frac{s}{v}$  et 3°.  $s = tv$ .

COROLL. 3.

34. Hinc si alius praeterea fuerit motus aequabilis, quo spatium =  $S$  tempore  $T$  conficiatur, ejusque celeritas dicatur =  $V$ , habebuntur istae notissimae proportionales 1°.  $v : V = \frac{s}{t} : \frac{S}{T}$ ; 2°.  $t : T = \frac{s}{v} : \frac{S}{V}$ ; 3°.  $s : S = tv : TV$ .

EXPLICATIO. 1.

35. Dubium hic orietur, quomodo spatia per tempora dividi queant, cum sint quantitates heterogeneae, neque dici possit, quoties tempus v. gr. decem minutorum in spatio v. gr. decem pedum contineatur. Verum hic non de divisione absoluta est sermo. Sed de comparativa, quoniam celeritatis idea nihil absoluti involvit. Scilicet celeritas aliter nisi relative intelligi nequit; statim autem atque celeritatem certi cujusdam motus aequabilis tanquam cognitam assumimus, et quasi unitatem spectamus, in quocunque alio motu aequabili celeritas per numerum exprimitur, neque ulla amplius occurret difficultas. Fingamus enim in motu aequabili, quo spatium =  $s$  tempore  $t$  absolvitur, celeritatem pro unitate assumi: ita ut  $\frac{s}{t}$  tanquam unitas spectetur; in alio quocunque motu aequabili, quo spatium =  $S$  tempore =  $T$  percurritur, celeritas talis erit numerus, qui sit ad unitatem, ut  $\frac{S}{T}$  ad  $\frac{s}{t}$ , eritque hic numerus =  $\frac{S t}{T s} = \frac{S}{s} \cdot \frac{t}{T}$ , cujus factores  $\frac{S}{s}$  et  $\frac{t}{T}$  veros quos exhibent.

36. Verum superior difficultas quoque evanescit, omnia ad numeros absolutos revocando. Si enim in spatiis mensurandis spatium quoddam determinatum pro unitate assumamus, similiterque pro temporibus tempus quoddam determinatum pro unitate habeamus, hacque mensura constanter utamur, omnia tam spatia quam tempora numeris absolutis exprimentur, quorum divisionem promiscuam nihil est quod impediat. Quoti ergo supra indicati certe erunt celeritatibus proportionales, et quia arbitrio nostro adhuc relinquitur, quamnam celeritatem instar unitatis spectare velimus, nihil obstat, quo minus eam ipsam celeritatem, quam quotus ille in unitatem abiens indicat, etiam pro unitate assumamus. Quam rationem si constituerimus, quoti supra assignati  $\frac{s}{t}$  et  $\frac{S}{T}$  revera quasvis celeritates designabunt. Semper autem solae relationes mutuae sufficere possunt, et quovis casu oblato facile erit eas ad mensuras absolutas revocare.

## SCHOLION.

37. Hanc celeritatis notionem ex motu uniformi seu aequabili petivimus, nihilo vero minus etiam ad motum inaequabilem patet. Uti enim in motu aequabili celeritas ubique est eadem, ita in inaequabili mutari est intelligenda. Mox enim ostendemus, in omni motu, utcumque sit inaequabilis, minima spatii elementa singula motu aequabili percurra concipi posse, sicque in quovis spatii puncto celeritatem assignare licet, qua scilicet minimum spatiolum ibi conceptum percurritur. Atque hinc celeritas, tanquam indoles quaedam peculiaris motus a descriptione spatii non pendens, considerari potest, cum in quolibet spatii descripti puncto certa detur celeritas. Ex quo *celeritas* etiam ita definiiri posset, ut sit talis motus modificatio, qua is ad certum spatium certo tempore describendum determinetur. Ceterum uti hic motum utcumque respectivum confidero, celeritas quoque pari modo erit respectiva, atque in eodem puncto diversa, idque eodem tempore, est agnoscenda, prouti motus ad alia atque alia corpora referatur. Ita fieri potest, ut corporis in nave moti celeritas, respectu navis, maxime discrepet ab ejusdem celeritate respectu ripae.

DEFI.

DEFINITIO 7.

38. Si motus sit rectilineus, *directio motus* est ipsa recta, in qua fit: si autem fuerit curvilineus, in quovis spatii puncto tangens curvae præbet directionem motus. Quare in motu curvilineo directio continuo mutari dicitur, dum in rectilineo perpetuo eadem manet.

COROLL. 1.

39. Directio ergo motus cognoscitur ex angulo, quo ea ad unam vel duas lineas rectas fixas inclinatur. Scilicet si motus fiat in eodem plano, sufficit ejus inclinationem ad unam rectam fixam nosse: si autem non fiat in eodem plano, ejus inclinationem ad duas rectas fixas nosse oportet.

COROLL. 2.

40. In motu igitur curvilineo, statim ac linea curva a puncto moto descripta fuerit cognita, methodus inveniendi tangentes directionem motus in singulis punctis manifestabit.

SCHOLION.

41. Quemadmodum motus sine celeritate, ita etiam sine directione cogitari nequit, cum enim punctum tempusculo etiam minimo ex suo loco in alium transeat, spatiosi interea percursum magnitudo ad tempusculum applicata motus celeritatem, ejus vero positio motus directionem præbet. In quiete quidem celeritas evanescit, motusque, cujus celeritas est nulla, in quietem abit; verum de quiete dicere non licet, directionem quoque evanescere, sed potius directionis ratio plane cessare est putanda: statim enim ac punctum quiescere dicimus, ne quaestio quidem de directione locum habet. Etsi autem in motu tot sint res, quae in ejus cognitionem ingrediuntur, cum quaeri possit 1°. *Quonam loco punctum post datum tempus sit habiturus?* 2°. *Quamnam lineam seu spatium interea confecerit?* 3°. *Quantam quovis tempore habiturus sit celeritatem?* 4°. *Quaenam ejus futura sit motus directio?* quoniam celeritas et directio sunt notiones, ex motus idea derivatae, dummodo quovis casu primam quaestionem resolverimus, simul omnes confecerimus. Quod quo clarius exponatur, secundum supra factam divisionem, tria motus genera persequar, quorum primo punctum in linea recta moveri assumam, secundo vero spatium descriptum curvum quidem statuam, sed in eodem plano existens: tertio denique id genus per-



persequar, quo spatium motu descriptum non in eodem plano fuerit situm.

### PROBLEMA. 1.

42. Si punctum in linea recta moveatur, universam motus determinationem ad calculum revocare.

### SOLUTIO.

Fig. 2. Totum negotium huc redit, ut ad quodvis tempus locus assignetur, ubi tum punctum reperiatur. Sit ergo AB linea recta, in qua punctum incedat, initio in A constituto, atque elapso tempore  $= t$ , pervenerit in S, statuaturque  $AS = s$ , quod erit ipsum spatium tempore  $t$  descriptum. Quodsi jam inter  $t$  et  $s$  aequatio detur, qua alterum ex altero definiri queat, inde omnia, quae ad motus cognitionem pertinent, innotescunt. Differentiatione enim instituta pro temporis elemento  $dt$  spatii elementum  $ds$ , quod eo percurritur, derivatur: atque fractio  $\frac{ds}{dt}$  celeritatem puncti in S exprimet. Constat enim, hanc fractionem continere quantitatem finitam. Quare si celeritas in S ponatur  $= v$ , erit  $\frac{ds}{dt} = v$ , unde tam ad quodvis tempus, quam ad quemvis spatii locum, celeritas assignari poterit. Directio autem motus ubique cum ipsa recta AB congruet.

### COROLL. 1.

43. Si ad singula temporis momenta celeritas corporis detur  $v$ , ita ut relatio inter  $t$  et  $v$  constet, inde quoque spatia  $s$  singulis temporibus  $t$  descripta definientur ope aequationis  $ds = v dt$ , cujus integrale praebit ipsum spatium  $s = \int v dt$ .

### COROLL. 2.

44. Simili modo si ad singula spatii puncta celeritas  $v$  fuerit cognita, seu data sit relatio inter  $s$  et  $v$ , inde tempus  $t$ , quo spatium  $s$  absolvitur, definietur hac aequatione differentiali  $dt = \frac{ds}{v}$ , ita ut sit

$$t = \int \frac{ds}{v}.$$

### COROLL.

## COROLL. 3.

45. Si ergo motus fuerit aequabilis, celeritas  $\frac{ds}{dt}$  erit quantitas constans, quae si ponatur  $= c$ , erit  $ds = cdt$ , et integrando  $s = ct$ , quoniam sumto  $t = 0$ , etiam spatium  $s$  evanescere debet. Vicissim ergo, si relatio inter  $s$  et  $t$  ita fuerit comparata, ut inde pro  $\frac{ds}{dt}$  quantitas constans eliciatur, motus erit aequabilis.

## EXPLICATIO.

46. Quando dicimus, punctum nostrum motum elapso tempore  $t$  in  $S$  esse, haec locutio admitti nequit, nisi a significato vocabuli *esse* omnis mora vel mansio segregetur. In vulgari autem sermone phrasibus *in loco esse* idem significare solet, atque *in loco morari*, unde vetus illud sophisma contra motus existentiam maximam vim adipiscitur: *Si corpus movetur, vel movetur in loco, ubi est, vel in loco, ubi non est*: quorum cum neutrum dici possit, colligitur, corpus plane moveri non posse: prius enim certe dici nequit, si, *in loco, ubi est*, idem significat, atque *in loco, ubi moratur, seu quiescit*. Si loco vocabuli *esse* substituere-  
tur *transire*, omnis difficultas tolleretur: nam ubi corpus transit, ibi sine dubio movetur: verum talis vox non satis fortis videtur ad existentiam simul innuendam, dum corpus seu punctum per  $S$  transit: videtur autem existentiae notio, ad quempiam locum applicata, moram quandam implicare, a motu prorsus alienam. Quare nisi hoc solo nomine motum e mundo tollere velimus, cavere debemus, ne cum his loquendi formulis, *in loco esse, vel existere, vel haerere*, ullam mansionem jungamus, atque tali significato hic equidem semper utar, ita ut plus non declarent, quam per locum transire, siquidem corpus moveatur. Hinc est, quod nonnulli Philosophi, hanc distinctionem negligentes, admodum perverfas sibi notiones de motu finxerint; dum enim motum per successivam ejusdem corporis in diversis locis existentiam explicant, in singulis locis ipsi quandam moram tribuunt, unde subito in loca sequentia transeat. Si hac definitione incommodum, quod ex existentia sine mora in eodem loco pertimescunt, vitare volunt, saltus illos subitaneos certe multo magis pertimescere debebant; dum enim talis saltus fit, dicere non poterunt, ubi tum corpus existat; ac, si huic opinioni ulla ratio subesset, expediret potius, omnem motum negare,

negare, quam huiusmodi principia, naturam motus evertentia, constituere.

### PROBLEMA. 2.

47. Si punctum in linea curva moveatur, quae autem tota sita sit in eodem plano, universam motus determinationem ad calculum revocare per binas coordinatas.

### SOLUTIO.

Fig. 3.

Quoniam id corpus, cuius respectu motus aestimatur, ut fixum spectatur, planum quoque, in quo spatium percursum est situm, pro fixo est habendum. In eo autem pro lubitu duae rectae directrices OA et OB, inter se sive normales sive obliquae, accipiantur, ad quos motus referatur: sitque ESF via seu spatium, a puncto moto descriptum, in cuius puncto E initio fuerit. Iam tota quaestio huc redit, ut elapso tempore  $t$  locus in curva S definiatur, ubi tum punctum sit futurum, Ponatur totum spatium interea percursum seu linea ES =  $s$ , et ex S binis directricibus OA, OB, parallelae agantur SY et SX, vocenturque coordinatae OX = SY =  $x$ ; XS = OY =  $y$ ; atque si pro tempore  $t$  valores ipsarum  $x$  et  $y$  assignari queant, simul punctum S innotescet; quin etiam relatione inter  $x$  et  $y$  natura curvae ESF exprimitur. Tum vero ex angulo directricium AOB, qui sit =  $\zeta$ , habebitur pro elemento temporis  $dt$  elementum spatii  $Ss = ds = r(dx^2 + 2dx dy \cos \zeta + dy^2)$ , unde prodit celeritas in loco  $S = \frac{ds}{dt}$ , et pro motus directione reperitur angulus, quem ea cum altera directrice OA facit, cuius anguli tangens est =  $\frac{dy \sin \zeta}{dx + dy \cos \zeta}$ , et sinus =  $\frac{dy \sin \zeta}{ds}$ . Vel si angulus quaeratur, quem motus directio Ss cum altera directrice OB facit, erit ejus tangens =  $\frac{dx \sin \zeta}{dy + dx \cos \zeta}$ , et sinus =  $\frac{dx \sin \zeta}{ds}$ .

### COROLL. 1.

48. Ut locus curvae S per coordinatas OX =  $x$  et XY =  $y$  determinatur, ita locus sequens  $s$  per earum elementa  $dx$  et  $dy$  definitur: scilicet punctum ex S egressum tempusculo  $dt$  secundum directionem OA per spatium  $dx$ , secundum directionem OB vero per spatium  $dy$  transfertur.

### COROLL.

COROLL. 2.

49. Duplex ergo haec translatio per spatiola  $dx$  et  $dy$  veram translationem ex  $S$  in  $s$  per spatiolum  $Ss = ds$  ita ostendit, ut tam ejus quantitatem ipsam, quam directionem declaret.

COROLL. 3.

50. Sin autem mobile tempusculo  $dt$  spatiola  $dx$  et  $dy$  revera percurreret, ejus celeritas futura esset  $\frac{dx}{dt}$  et  $\frac{dy}{dt}$ : ex quibus celeritatibus, mente conceptis, non solum vera celeritas per spatiolum  $Ss = ds$ , sed etiam hujus directio indicatur.

COROLL. 4.

51. Si inter binas directrices  $OA$  et  $OB$  angulus  $AOB = \angle$  constituatur rectus, calculus fit simplicissimus. Tum enim ex elementis  $dx$  et  $dy$  definitur  $ds = \sqrt{(dx^2 + dy^2)}$ , et directionis  $Ss$  ad rectam fixam  $OA$  inclinationis tangens est  $= \frac{dy}{dx}$ .

SCHOLION. 1.

52. Geometrica plane est haec consideratio, qua motus puncti, dum tempusculo  $dt$  spatiolum  $Ss = ds$  peragrat, resolvi concipitur in binos motus secundum directiones fixas  $OA$  et  $OB$ , quippe qua in ipso motu nihil mutatur. Atque dum huic duplici motui sua assignatur celeritas  $\frac{dx}{dt}$  et  $\frac{dy}{dt}$ , hoc commodi inde consequimur, ut non solum veram celeritatem  $\frac{ds}{dt}$  sed etiam motus directionem cognoscamus, id quod in calculo plerumque maximum usum praestabit. Cum enim celeritas ac directio sint duae res, natura sua diversae, ambas hoc modo per duas celeritates, seu quantitates ejusdem generis, cognoscere licet. Mente autem tantum motum puncti, pro quovis temporis elemento  $dt$ , in binos motus secundum datas directiones resolvimus, et utrique suam velocitatem assignamus; non quasi in puncto duplex inesset motus, quod sane esset absolum, sed quoniam talis conceptus ad veram cognitionem perducit. Hoc subsidio uti licet, quando jam aliunde certum est, motum puncti in eodem fieri plano: at si de hoc non constet, ad

ternas directrices fixas recurrere debemus, secundum quas motum in ternos motus resolvi conveniet.

### SCHOLION. 2.

53. Evolutio haec motus, in plano facti, usitata nititur ratione, lineas curvas ad binas directiones fixas, quibus coordinatae parallelae statuuntur, revocandi. Cum autem electio harum rectarum directricium ab arbitrio nostro pendeat, manifestum est, eundem motum infinitis modis calculo exprimi posse: qui cum omnes, pro quovis tempore, tam eandem celeritatem quam directionem monstrare debeant, motus etiam resolutio est arbitraria. Motus scilicet puncti, quo tempusculo  $dt$  spatium  $Ss = ds$  percurrit, infinitis modis, mente saltem, in binos motus resolvi potest, prout aliae atque aliae lineae pro directricibus assumuntur: qui vero semper in hoc conveniant, ut binae illae celeritates  $\frac{dx}{dt}$  et  $\frac{dy}{dt}$ , utcumque fuerint diversae, si junctim sumantur, eandem semper tam celeritatem veram  $\frac{ds}{dt}$ , quam directionem seu positionem tangentis in  $S$  ductae, sint ostensurae. Quae infinita varietas, quoniam a Geometria inducitur, nihil habet, quod sit mirandum: interim tamen, quovis casu oblato, plurimum interest, qua ratione rectae illae directrices eligantur, quo calculus maxime facilis reddatur.

### PROBLEMA. 3.

54. Si spatium, a puncto descriptum, non sit in eodem plano, universam motus determinationem per ternas coordinatas ad calculum revocare.

### SOLUTIO.

Fig. 4. Corpus, cujus respectu motus aestimatur, et quod pro fixo habetur, suppeditabit ternas directiones fixas, in longum, latum ac profundum extensas, quarum electio cum arbitrio nostro relinquatur, statuuntur eae, ad calculi commodum, inter se normales. Sint igitur  $OA$ ,  $OB$  et  $OC$  hae tres directrices, quarum binae priores in plano tabulae sint sitae, postrema vero  $OC$  huic plano perpendiculariter insiciens concipiatur. Punctum autem motum confecerit lineam  $ESF$ , extra planum tabulae utcumque sitam, in qua elapso tempore  $t$  ex  $E$  pervenerit in  $S$ , unde ad planum  $AOB$  demittatur perpendicularum  $SY$ , et ex  $Y$  ad  $OA$  normalis

malis YX. Vocentur hae coordinatae orthogonales,  $OX = x$ ,  $XY = y$  et  $YS = z$ , quae ternis directricibus erunt parallelae; inter quas per duplicem aequationem natura curvae ESF definitur, ita ut, si ad tempus  $t$  eorum valores assignari queant, iis locus S, ubi nunc punctum motum versatur, determinetur. Deinde cum posito toto spatio  $ES = s$ , quod tempore  $t$  est percursum, ex differentialibus  $dx$ ,  $dy$ , et  $dz$ , tempusculo  $dt$  convenientibus, colligetur elementum spatii  $Ss = ds$  eodem tempusculo percursum, cum sit  $ds = \sqrt{(dx^2 + dy^2 + dz^2)}$ , unde celeritas in S erit  $= \frac{ds}{dt}$ . Quod autem ad directionem motus Ss attinet, ea indidem determinatur: producta enim recta  $y$  Y ad concursum usque T cum recta AO, erit  $XT = \frac{ydx}{dy}$ , et si concipiatur planum super YT plano AOB normaliter insistens, in eo erit elementum  $Ss$ , quod productum cum recta YT angulum faciet, cujus tangens est  $= \frac{dz}{\sqrt{(dx^2 + dy^2)}}$  et sinus  $= \frac{dz}{ds}$ . Quin etiam directio Ss cum recta, per S ipsi OA parallela ducta, faciet angulum, cujus cosinus  $= \frac{dx}{ds}$ ; cum recta autem, per S ipsi OB parallela ducta, angulum, cujus cosinus  $= \frac{dy}{ds}$ , et cum recta, per S ipsi OC parallela ducta, angulum, cujus cosinus est  $= \frac{dz}{ds}$ : quibus rebus univ[er]sa motus determinatio continetur.

## COROLL. 1.

55. Hic ergo elementum spatii Ss tanquam diagonalis parallelepipedi consideratur, cujus latera sunt  $dx$ ,  $dy$ , et  $dz$ , ternis directricibus fixis OA, OB et OC parallela; ex quibus, cum parallelepipedum statuatur rectangulum, diagonalis  $Ss = ds$  ita definitur, ut sit  $ds = \sqrt{(dx^2 + dy^2 + dz^2)}$ .

## COROLL. 2.

56. Dum mobile tempusculo  $dt$  elementum Ss percurrit, interea secundum directionem, ipsi OA parallelam, per spatium  $dx$ ; secundum directionem, ipsi OB parallelam, per spatium  $dy$ ; et secundum directionem, ipsi OC parallelam, per spatium  $dz$  progredi concipi solet.

## COROLL. 3.

57. Si haec triplex translatio ut verus motus spectetur, etiam si tantum mente concipiatur, exprimet  $\frac{dx}{dt}$  celeritatem, secundum directionem OA; porro  $\frac{dy}{dt}$  celeritatem, secundum directionem OB; atque  $\frac{dz}{dt}$  celeritatem, secundum directionem OC.

## COROLL. 4.

58. Ex his tribus autem celeritatibus fictitiis non solum vera puncti celeritas in S, quae est  $= \frac{ds}{dt}$  colligitur, sed etiam motus directio; atque adeo ex earum integralibus totus motus definitur.

## SCHOLIUM. 1.

59. Calculi gratia hic ternas directrices OA, OB, et OC, inter se normales constitui; quae etiam, ut praecedente casu fecimus, utcumque obliquae assumi potuissent: verum indoles angulorum solidorum obliquorum non tam nota plerisque esse solet, ut eorum proprietates, tanquam ex elementis satis cognitae, hic assumi potuissent. Quin potius, quoniam imprimis calculi prolixitas est evitanda, merito semper directricibus orthogonalibus utemur. Interim tamen, si eae essent oblique, angulique ponantur,  $\angle AOB = \zeta$ ,  $\angle AOC = \eta$  et  $\angle BOC = \theta$ , atque iis coordinatae  $x, y, z$ , parallelae ducantur, haberetur per formulam utique magis complicatam:

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2 + 2dx dy \cos \zeta + 2dx dz \cos \eta + 2dy dz \cos \theta}$$

atque positio elementi S, seu motus directio, nimis incommode exprimeretur.

## SCHOLIUM. 2.

60. Quoniam constitutio ternarum directricium OA, OB, OC, etsi inter se normalium, infinitis modis variari potest, idem motus infinitis modis repraesentari potest. Quin etiam, si punctum moveatur in linea recta, vel curva, tota in eodem plano existente, quasi hoc non constaret, motus nihilo minus per huiusmodi ternas directrices expediri poterit, praestabit tamen methodis simplicioribus supra traditis uti. Ex his ergo patet, eundem motum semper infinitis modis in ternos re-

solvi

solvi posse, quorum cuique sua tribuatur celeritas, ita ut omnes junctim suntae non solum ipsam puncti celeritatem, sed etiam motus directionem exhibeant, id quod in calculo summum praestabit usum, quoniam hoc modo a pluribus investigationibus satis taediosis circa curvaturam spatii descripti, eamque duplicem, nisi motus in eodem plano fiat, liberamur. Hae enim ternae celeritates, mente saltem puncto mobili tributae, totum negotium expedient; quo subsidio cum non sum usus in superioribus de Mechanica libris, in nimis intricatos calculos sum delapsus. Quare cum haec motus resolutio, etsi mente solum instituat, tanti sit momenti, operae pretium erit, eam per peculiarem definitionem stabilivisse.

### DEFINITIO. 8.

61. Motus *resolvi* dicitur, dum spatiolum, elemento temporis percursum, tanquam diagonalis parallelogrammi vel parallelepipedum consideratur, cujus latera datas tenent directiones; punctoque mobili duplex vel triplex motus, secundum latera parallelogrammi vel parallelepipedum, quisque cum sua velocitate, adscribitur.

### SCHOLION. 1.

62. Quae hic de motu quasi elementari per spatiolum infinite parvum dicuntur, transferri possunt ad motum finitum, dum sit aequabilis et rectilineus: propterea, quod ea ideo motui elementari sint adstricta, quoniam quodque elementum lineae curvae, ut lineola recta, et motus per id aequabilis, spectari potest. Quo igitur haec magis fiant sensibilia, ea in motu finito aequabili et rectilineo explicabo, siquidem hinc applicatio ad motum elementarem facillime instituitur.

### EXPLICATIO. 1.

63. Ponamus, punctum tempore =  $t$  percurrere motu aequabili rectam SV, ut ejus celeritas sit =  $\frac{SV}{t}$ ; et concipiamus circa SV parallelogrammum quodcunque SAVB descriptum, cujus recta SV sit diagonalis. Quo facto motus secundum latera SA et SB ita mente resolvi potest, ut illius celeritas sit =  $\frac{SA}{t}$ , et hujus =  $\frac{SB}{t}$ , utroque scilicet aequabili existente: atque hic duplex motus cum his celeritatibus latera-  
libus

Fig. 5



libus non solum veram celeritatem  $\frac{SV}{t}$ , sed etiam veram motus directionem indicabit; sicque ad cognitionem hujus motus sufficiet, binas illas celeritates laterales definivisse. Neque vero hujusmodi resolutio mechanicæ fundamento inniti est existimanda; cum potius certum sit, plus uno motu simul in eodem puncto inesse non posse, sed ea exmero conceptu geometrico nata, atque a natura motus plane aliena, est judicanda, in subsidium tantum calculi in Mechanicam introducta.

### EXPLICATIO. 2.

Fig. 6.

64. Percurrat mobile tempore  $t$  motu aequabili rectam  $SV$ , quem motum secundum ternas directiones resolvere oporteat. His agantur ex utroque termino  $S$  et  $V$  rectae parallelæ  $SA$ ,  $SB$ ,  $SC$ , atque  $VP$ ,  $VQ$ ,  $VR$ , quoad quaque plano binarum reliquarum directionum, ad alterum terminum constitutarum occurrat. Hoc modo orietur parallelepipedum, cujus  $SV$  est diagonalis: atque motus per  $SV$ , cujus celeritas est  $= \frac{SV}{t}$ , ita mente in tres motus secundum  $SA$ ,  $SB$ ,  $SC$ , resolvere potest, ut motus secundum  $SA$  celeritas sit  $= \frac{SA}{t}$ , motus secundum  $SB$  celeritas  $= \frac{SB}{t}$ , et motus secundum  $SC$  celeritas  $= \frac{SC}{t}$ . Ex his tribus celeritatibus non solum vera celeritas per diagonalem  $SV$  determinabitur, sed etiam motus directio, ratione ternarum directricium, innotescit. Eodem vero modo, si  $SV$  sit elementum curvae cujuscunque, tempusculo  $dt$  percursum, resolutio in ternas celeritates secundum ternas quascunque directiones institui potest.

### SCHOLION. 2.

65. In his motus determinationibus secutus sum usitatum in Geometria methodum, naturam linearum curvarum per binas vel ternas co-ordinatas exprimendi; illud scilicet, quando curva tota in eodem plano est sita, hoc vero, ubi eodem plano contineri nequit. Quae methodus, uti primum se obtulit, ita nos manuduxit ad insignem illam motus resolutionem, secundum datas vel duas vel tres directiones instituendam, quae per universam Mechanicam amplissimi erit usus, dum cognitio celeritatum lateralium simul motus directionem atque inflexionem in se complectitur, cujus consideratio calculum alioquin non mediocriter per-

perturbare solet. Verum cum in Geometria etiam saepe lineae curvae ad punctum aliquod fixum non sine egregio calculi compendio referuntur, eodem modo quoque motus evolutionem exposuisse juvabit, idque cum motus non solum in eodem sit plano, sed etiam extra planum vagatur: hoc quippe modo Astronomi feliciter uti solent, dum motus planetarum, respectu alicujus puncti, per angulos circa id descriptos distantiasque ab eodem definiunt, ubi si motus non fiat in eodem plano, insuper lineam nodorum cum inclinatione orbitae ad certum planum contemplantur; quare haud abs re erit, etiam hanc motus repraesentandi rationem paucis in genere explicare.

#### PROBLEMA 4.

Si motus fiat in eodem plano, universam motus determinationem per angulos, circa punctum quoddam fixum absolutos, describere.

#### SOLUTIO.

Si AS sit via a puncto moto in eodem plano descripta, in eodem accipiat punctum fixum O, quod ad motus determinationem maxime accommodatum videatur, ductaque ad motus initium A recta OA, motus perfecte cognoscetur, si ad quodvis tempus elapsum  $= t$ , quo punctum in S versetur, definire poterimus tam angulum AOS  $= \phi$ , quam distantiam OS  $= z$ . Cum enim inde natura curvae AS definiatur, tum etiam differentialia tam motus celeritatem, quam ejus directionem, determinabunt. Si enim punctum tempusculo  $dt$  ex S pervenerit in  $s$ , quo angulus AOS  $= \phi$  cepit incrementum  $SOs = d\phi$ , et distantia OS  $= z$  incrementum  $Sp = dz$ , posito semper sinu toto  $= 1$ , erit  $Sp = zd\phi$ , et  $Ss = r(dz^2 + z^2d\phi^2)$ , unde celeritas in S  $= \frac{r(dz^2 + z^2d\phi^2)}{dt}$  et directio cognoscetur ex angulo ASO seu  $Ssp$ , cujus tangens est  $= \frac{zd\phi}{dz}$ .

#### COROLL. 1.

67. Cum punctum motum tempore  $= t$  circa O angulum descriperit AOS, et ab eodem puncto O jam intervallo OS  $= z$  distet, ejus motus tanquam duplex spectari potest, alter angularis circa punctum fixum O, alter directus ab eodem puncto recedens, vel eo accedens.

D

COROLL.

## COROLL. 2.

68. Et cum tempusculo  $dt$  angulus  $AOS = \phi$  crescat elemento  $d\phi$ , fractio  $\frac{d\phi}{dt}$  celeritatem angularem exprimet, tum vero ob  $dz$  augmentum distantiae  $OS = z$ , fractio  $\frac{dz}{dt}$  celeritatem recessus a puncto  $O$  declarabit.

## COROLL. 3.

69. Cognita autem utraque hac celeritate, tam angulari quam recessus, inde non solum vera puncti celeritas, sed etiam directio, tum vero insuper ipsa curva descripta  $AS$  assignari poterit.

## PROBLEMA. 5.

70. Si punctum non in eodem plano moveatur, ejus motum, cum ad planum, tum ad datum in eo punctum fixum, per angulos exprimere.

## SOLUTIO.

Fig. 8. Repraesentet tabula id planum, ad quod motus sit referendus, in quo sit  $O$  punctum illud fixum, quod quasi centrum spectetur. Moveatur punctum utcumque extra hoc planum in linea  $ES$ , et tempore elapso  $t$  pervenerit in  $S$ , unde in planum demittatur perpendicularum  $SM$ , ducanturque rectae  $MO$  et  $SO$ . Sit  $OA$  directio fixa in hoc plano assumpta, atque manifestum est, ad datum tempus  $t$  locum puncti  $S$  definitum iri, si assignare poterimus 1°. angulum  $AOM = \phi$ . 2°. angulum  $MOS = \psi$ , ac 3°. distantiam  $OM = z$ . Quod quo facilius fieri possit, ducatur ex  $S$  tangens curvae descriptae, quae plano occurrat in  $T$ , unde agatur  $OT$ , quae erit intersectio plani, in quo punctum jam movetur, cum plano assumpto. Vocarique solet haec recta  $OT$  linea nodorum, pro qua sit hoc tempore angulus  $AOT = \omega$  et inclinatio plani  $OST$  ad planum assumptum  $= \epsilon$ , qui duo anguli  $\omega, \epsilon$  si fuerint praeter angulum  $AOM = \phi$  et distantiam  $OM = z$  ad datum tempus  $t$  cogniti, locus puncti  $S$ , hoc est angulus  $MOS = \psi$  cum distantia  $OS = \frac{z}{\cos \psi}$  commode assignari poterit. Hunc in finem ex  $M$  in rectam  $OT$  ducatur normalis  $MN$ , simulque recta  $SN$ ; atque ob angulum

gulum TOM =  $\varphi - \omega$ , erit MN =  $z \sin(\varphi - \omega)$  et ON =  $z \cos(\varphi - \omega)$ : tum vero habebitur angulus MNS =  $\varrho$ , unde fit MS =  $z \sin(\varphi - \omega) \tan \varrho$ , et NS =  $\frac{z \sin(\varphi - \omega)}{\cos \varrho}$ , hincque OS =  $\frac{z}{\cos \varrho} \sqrt{(\sin(\varphi - \omega))^2 + \cos^2(\varphi - \omega) \cos^2 \varrho}$  seu OS =  $\frac{z}{\cos \varrho} \sqrt{(1 - \cos^2(\varphi - \omega) \sin^2 \varrho)}$ . Verum

hinc angulus MOS =  $\psi$  ita definitur, ut fit  $\tan \psi = \frac{MS}{OM} = \sin(\varphi - \omega) \tan \varrho$ .

Cum igitur angulus AOT =  $\omega$  cum inclinatione =  $\varrho$  aequae ad punctum sequens  $s$ , ubi punctum elapso insuper tempusculo  $dt$  haeret, atque ad punctum S pertineat, in differentiatione anguli  $\psi$  elementa  $\omega$  et  $\varrho$

pro constantibus habere licet, unde fit  $\frac{d\psi}{\cos \psi^2} = d\varphi \cos(\varphi - \omega) \tan \varrho$ :

erit vero etiam secundum praecepta differentiationis

$$\frac{d\psi}{\cos \psi^2} = (d\varphi - d\omega) \cos(\varphi - \omega) \tan \varrho + \frac{d\varrho}{\cos \varrho^2} \sin(\varphi - \omega)$$

quibus valoribus aequatis oritur

$$\frac{d\omega}{\tan(\varphi - \omega)} = \frac{d\varrho}{\sin \varrho \cos \varrho} = d. l \tan \varrho$$

qua aequatione ratio inter progressionem momentaneam lineae nodorum OT et variationem inclinationis  $\varrho$  continetur. Invento autem angulo MOS =  $\psi$ , per formulam  $\tan \psi = \sin(\varphi - \omega) \tan \varrho$ , inde inno-

tescit distantia OS =  $\frac{z}{\cos \psi}$ .

### COROLL. I.

71. Quoniam anguli  $\omega$  et  $\varrho$  ita a se invicem pendent, ut fit

$$\frac{d\omega}{\tan(\varphi - \omega)} = \frac{d\varrho}{\sin \varrho \cos \varrho}, \text{ patet si angulus AOT} = \omega \text{ maneat idem, etiam inclinationem } \varrho \text{ perpetuo eandem fore: tum ergo motus puncti fiet in eodem plano. Criterium ergo motus in eodem plano per punctum fixum O transeunte facti in hoc consistit, ut anguli } \omega \text{ et } \varrho \text{ fint constantes,}$$

## 28 CAPUT I. CONSIDERATIO MOTUS IN GENERE.

### COROLL. 1.

72. Dum punctum mobile transit per planum assumptum, versabitur in ipsa linea nodorum OT, eritque  $\text{tang}(\Phi - \omega) = 0$ , unde utcumque inclinatio  $\varrho$  varietur, erit  $d\omega = 0$ , seu linea nodorum quiescet.

### COROLL. 3.

73. Sin autem angulus  $\text{TOM} = \Phi - \omega$  fuerit rectus, ob  $\text{tang}(\Phi - \omega) = \infty$ , utcumque linea nodorum moveatur, erit  $d\varrho = 0$ , seu inclinatio per tempusculum  $dt$  non mutabitur.

### SCHOLION.

74. Si hoc modo elementum spatii  $S_s$  exprimere, indeque celeritatem motus definire velimus, formula nimis fit complexa, quod etiam in directione usu venit. Alio igitur modo calculus institui potest, ut huic incommodo occurratur: ad datum scilicet tempus quaeratur primo positio lineae nodorum OT seu angulus  $\text{AOT} = \omega$ , tum vero inclinatio  $\text{MNS} = \varrho$ , deinde in ipso plano TOS, in quo jam punctum moveri concipitur, angulus  $\text{TOS} = \sigma$ , una eum distantia  $\text{OS} = v$ . Quibus positis habebitur  $\text{QN} = v \cos \sigma$ ;  $\text{SN} = v \sin \sigma$ , hinc  $\text{SM} = v \sin \sigma \sin \varrho$  et  $\text{MN} = v \sin \sigma \cos \varrho$ . Ex his angulus  $\text{SOM} = \psi$  colligitur, nempe  $\sin \psi = \sin \sigma \sin \varrho$ . Porro ob  $\text{tang TOM} = \text{tang } \sigma \cos \varrho$ , quia angulus TOM ante erat  $\Phi - \omega$ , hic differentialia  $d\omega$  et  $d\varrho$  ita a se invicem pendent, ut sit

$$\frac{d\omega}{\text{tang } \sigma \cos \varrho} = \frac{d\varrho}{\sin \varrho \cos \varrho} \text{ seu } d\omega = \frac{d\varrho \text{ tang } \sigma}{\sin \varrho}.$$

Postea vero hinc colligitur elementum spatii  $S_s = r(dv^2 + vv d\sigma^2)$  ideoque celeritas ipsa  $= \frac{1}{dt} r(dv^2 + vv d\sigma^2)$ ; verum directio motus  $S_s$  in plano TOS ita ad rectam OS inclinatur, ut sit anguli OST tangens  $= \frac{vd\sigma}{dv}$ . In Astronomia autem, ubi haec evolutio potissimum adhibetur, angulus TOS vocari solet *argumentum latitudinis*, et angulus SOM *latitudo*: tum vero adjecto angulo TOM, cuius tangens est  $= \text{tang } \sigma \cos \varrho$ , ad longitudinem nodi  $\text{AOT} = \omega$ , summa seu angulus AOM vocatur *longitudo*.

## CAPUT

## CAPUT II.

### DE INTERNIS MOTUS PRINCIPIIS.

#### DEFINITIO. 9.

75. *Interna motus principia* complectuntur omnia ea, quae in ipsis corporibus insunt, in quibus ratio sive quietis sive motus eorum contineatur; exclusis omnibus causis externis, quae quicquam ad eorum motum vel quietem conferre queant.

#### EXPLICATIO. 1.

76. Cum in capite praecedentē modum exposuerim, motum in genere spectatum ad calculum revocandi, nunc in ejus causas inquirere animus est. Sive enim corpus quiescat, sive moveatur, sive in quiete perseveret, sive motum accipiat, eumque quomodocunque continuet, haec phaenomena a certis causis profisciscantur necesse est. Quicquid scilicet in corpore ratione motus vel quietis contingit, id temere ac sine ulla ratione fieri, nullo modo statui potest. Quaecunque autem sit ratio ea, vel in ipso corpore, de quo quaeritur, insit necesse est, vel extra id sit quaerenda; unde duo genera principiorum, quibus motus corporum definiatur, constitui debent, quorum illa *interna*, haec vero *externa* appellabo. Ad *interna* scilicet refero, quicquid in ipsis corporibus inest, in quo ratio sive motus sive quietis eorum contineatur; quae autem extrinsecus ita in corpora agunt, ut eorum status sive motus sive quietis afficiatur, ea ad principia motus *externa* erunt referenda. Cum autem in mundo omnia corpora quaquaversus aliis contingantur, arctissimoque nexu inter se conjungantur, in hoc complexu nemquam discernere licebit, quid principii sive externi sive interni seorsim sit tribuendum. Quare ne in hac investigatione confundamur, mente saltem opus erit, omnia corpora ambientia e medio tollere, ut id, de quo quaeritur, quasi solitarium relinquatur: atque tale corpus, sive fuerit in quiete sive in motu, quomodo deinceps se sit habiturum, erit explorandum; hincque motus principia interna cognoscantur, ab externis sollicite distinguenda.

## EXPLICATIO. 2.

77. Dum autem corpus ita solitarium et extra omnem nexum cum aliis corporibus, quasi solum in mundo existeret, sumi consideraturus, a nonnullis Philosophis statim clamabitur, hanc hypothesin in se contradictionem involvere, cum omnia in mundo ita arctissimo nexu sint inter se colligata, ut, uno sublato, tota compages destruat. Verum hic minime de ullo corpore e mundo tollendo agitur, sed quomocunque aliquod corpus ab aliis ob nexum illum afficiatur, ne Philosophus quidem prohibebitur, quaestionem instituere, quid de illo corpore esset futurum, si nullatenus ab aliis afficeretur? non ut deinceps affirmet, hoc revera esse eventurum, sed ut discat, quid eorum, quae ipsi revera eveniunt, externis causis sit tribuendum. Talibus sane abstractionibus Philosophi perpetuo utuntur, ac, si eas proscribere vellent, ad nullius certe veritatis cognitionem aditus relinqueretur. Si autem licet, corpus ita considerare, quasi a nullis aliis afficeretur; perinde se habebit, ac si alia corpora plane non adessent; quid igitur opus est, hac investigatione reliqua corpora omnia praeter id, de quo quaestio instituitur, tanquam existentia contemplari? cum eo nihil plane conferant. His perpenis nihil profecto ob stare potest, quominus aliquod corpus tanquam prorsus solitarium, et quasi reliqua corpora omnia e mundo essent sublata, consideremus; ac, si quem forte haec hypothesis adhuc offendat, relinquat is omnia corpora, dum nobis concesserit, nullam ab iis actionem in id corpus, quod considerandum sumus, redundare.

## AXIOMA. 1.

78. Omne corpus, etiam sine respectu ad alia corpora, vel quiescit vel movetur, hoc est vel absolute quiescit, vel absolute movetur.

## EXPLICATIO. 1.

79. Haecenus sensus secuti, alium motum vel quietem non agnovimus, nisi respectu aliorum corporum, unde tam quietem quam motum *respectivum* diximus. Nunc vero si omnia corpora praeter unum mente tollimus, ejus quoque ad illa relatio aufertur, qua haecenus ejus quietem vel motum dijudicavimus: ubi primo quaeritur, utrum etiam nunc judicium de motu vel quiete corporis locum habere possit, nec ne? si enim hoc judicium non aliunde, nisi ex comparatione situs corporis propositi cum aliis corporibus, peti queat, his remotis etiam ipsum  
judicium

judicium tollatur, necesse est. Verum tametsi nos quietem vel motum cujuscumque corporis non nisi ex relatione ejus ad alia corpora cognoscimus, inde tamen concludere non licet, has res in se nihil esse, praeter meram relationem in mente institutam, nihilque in ipsis corporibus inesse, quod ideis nostris quietis ac motus respondeat. Quantitatem quippe nobis etiam aliunde cognoscere non licet, nisi ex comparatione: tamen sublati his, quibuscumque comparationem instituebamus, in corpore tamen relinquitur quasi fundamentum quantitatis, quoniam si in majus extenderetur vel in minus contraheretur, vera mutatio in eo facta esset censenda. Ita si etiam unicum corpus existeret, id vel quiescere vel moveri esset dicendum; cum neque utrumque simul, neque neutrum statui possit. Unde concludo, quietem et motum non esse meras res ideales, ex comparatione sola natas, ita ut in ipsis corporibus nihil, quod iis respondeat, insit; sed de corpore etiam solitario recte quaeri posse, utrum moveatur, an quiescat? ubi equidem eos Philosophos, qui omnia ad relationes revocant, minime pertimesco; cum iidem tantum motui tribuant, ut in vi motrice etiam aliquid substantiale agnoscant.

## EXPLICATIO. 2.

80. Cum ergo etiam de unico corpore, nullo ad alia habito respectu, vel his adeo annihilatis, recte quaeri possit, quiescat ne, an moveatur? alterutrum necessario statui debet. Qualis autem haec futura sit quies, qualisve hic motus? cum mutatio situs respectu aliorum corporum hic nullum inveniat locum, ne cogitare quidem possumus, nisi spatium absolutum admittamus, in quo nostrum corpus locum quendam occupet; indeque in alia loca transire possit. Cum enim, secundum eosdem Philosophos, qui spatium absolutum maxime impugnant, plurimum intersit, utrum corpus quodpiam moveatur, an quiescat? nullo etiam ad alia corpora respectu habito dicant, in quamvis alia re discrimen consistat. An dicent, id corpus revera moveri, quod situm suum respectu vicinorum continuo mutet? verum motus in his vicinis inesse posset, illo quiescente. An comparationem cum remotis institui oportebit? sed cum quibus primo? deinde cur cum hisce potius, quam cum aliis? Respondebunt tandem cum talibus, quae per se quiescant. Tum autem porro interrogo, non quomodo nos corpora per se quiescentia agnoscamus, sed quid sit per se quiescere? quando quidem nunc ad situm respectu aliorum non amplius confugere licet. Cogentur ergo tandem confiteri, ea corpora per se quiescere, quae in eodem



dem spatii loco perseverent, a quo cum omnis consideratio aliorum corporum sit remota, ad ipsum spatium absolutum perveniunt, cuius respectu quae corpora vel quiescunt, vel moventur, ea absolute vel quiescere vel moveri dicimus.

### SCHOLION.

81. Qui spatium absolutum negare voluerit, in gravissima incommodo delabitur. Cum enim motum et quietem absolutam tanquam vanos sine mente sonos rejicere debeat, non solum leges motus, quae huic principio innituntur, rejicere debet, sed etiam ne ullas quidem motus leges dari affirmare cogitur. Namque si ea, quae nos huc perduxit questio, *quid in corpore a nexu reliquorum separasse sit eventurum?* per se est absurda, etiam ea, quae ab aliis in eo effici possent, per se incerta et indeterminabilia erunt, sicque omnia temere ac sine ulla ratione evenire essent statuenda. Vel si haec effugere velit, motum omnem negare debet, qua tamen in sententia, etiamsi omnia argumenta contra eam allata feliciter refutaverit, minime acquiescere poterit, cum ne dicere quidem valeat, quid sit quies, quam per totum mundum constituerit. Sed contra tam apertas absurditates pugnare firmissimum nostrae sententiae fundamentum videtur.

### AXIOMA. 2.

82. Corpus, quod absolute quiescit, si nulli externae actioni fuerit subjectum, perpetuo in quiete perseverabit.

### EXPLICATIO.

83. Pronunciari hoc axioma solet de corpore quocunque, et per se tam perspicuum videtur, ut nulla probatione indigeat. Quo autem vis ejus clarius intelligatur, punctum tantum seu elementum corporis consideretur, quod si semel absolute quieverit, perpetuo in quiete perseverare debet: cum enim in eo nulla inest ratio, cur in unam potius directionem moveri incipiat, quam in omnes alias, atque extrinsecus omnis causa motus adimatur, secundum nullam directionem motum concipere poterit. Nititur igitur quidem haec veritas principio sufficientis rationis; interim tamen in ipso puncto seu elemento corporeo causa permanentiae in quiete agnosci debet, ita ut haec veritas pro necessaria sit habenda. Quod autem de puncto quocunque est probatum, id quoque de omnibus junctim sumtis, ideoque de quovis corpore, valeat necesse est; si enim singula ejus elementa quiescant, et in quiete perseverent, quin totum corpus sit quieturum, dubitari

dubitari nequit. Interim circa hujusmodi corpus dubium moveri potest, quod fortasse ejus partes etsi quiescant, in se mutuo agant, motumque excitent: sed hoc etiam concessum nihil contra axioma facit, dum non solum totum corpus, sed etiam singulas ejus partes, ab omni actione externa liberamus; atque nobis sufficit, axioma hoc sensu admisisse, ut saltem omnes particulae corporum minimae quiescentes, quatenus in se invicem non agunt, in quiete persistant.

## S C H O L I O N.

84. Quae lex hic circa quietem absolutam est sancita, neutiquam ad quietem respectivam extendi potest. Si enim corpus, cujus respectu corpusculum adhuc quieverat, subito concutiat, hoc non amplius ejus respectu in quiete permanebit. Finge globum super tabula jacentem in navi uniformiter progrediente, qui respectu navis utique in quiete perseverabit; irruente autem navi in scopulum haec quies respectiva subito cessabit, globusque respectu navis motum concipiet, etsi ipse nullam causam externam fuerit passus. Necessario ergo haec lex ad quietem absolutam adstringitur, et cum lex sit necessaria, etiam relatio corporum ad locum quempiam, quem occupent, est necessaria. Scilicet cum haec lex quietis perseverantiam in eodem loco iuvet, id aliter nisi de loco absoluto interpretari non licet, locus autem absolutus per ordinem inter coëxistentia definiri nequit, quia alioquin nostra lex ad quietem respectivam extenderetur.

## A X I O M A. 3.

85. Corpus, quod absolute movetur; si nulli externae actioni subjiciatur, secundum eandem directionem motu aequabili progredi perget.

## E X P L I C A T I O. 1.

86. Hoc axioma quoque de particulis corporum minimis, quasi punctis, proprie est intelligendum, neque enim de corporibus magnitudine praeditis valet, nisi omnes particulae pari celeritate secundum eandem directionem moveantur: si enim initio vel inaequales celeritates vel secundum diversas directiones accipissent, singulae particulae ne motum hunc quidem conservare possent, quia a se invicem dissipentur, et corporis compages dissolvatur. Quod autem non est metuendum, si omnium particularum celeritates fuerit aequales, in eandemque directionem tendant, vel si corpus ita fuerit exiguum, ut in eo talis disparitas

E

ritas locum habere nequeat. Consideretur ergo huiusmodi punctum corporeum, quasi solum existeret, ac si motum quemcunque acceperit, ita ut data celeritate secundum datam directionem moveri inceperit: atque hoc punctum, vi istius axiomatis, perpetuo tam eandem celeritatem, quam eandem directionem conservabit. Quod cum sit pro axioma receptum, demonstratione non indiget; interim tamen ratio haud difficulter afferri potest. Primo enim in directione nullam patitur mutationem, cum nulla esse possit ratio, cur in unam potius quam omnes alias plagas ab ea deflectat; aequae scilicet certe eandem directionem conservabit, ac punctum quiescens in quiete perseverabit. Quod autem porro ad celeritatem attinet, nisi ea perpetuo eadem maneret, vel augeri vel minui esset dicenda, quorum neutrum sine absurditate dici potest: sive enim augeretur sive minueretur, id secundum certam legem fieri deberet; qualis autem haec futura esset lex, nullo modo concipi posset; cum nulli certe prae reliquis tanta praerogativa conveniret. Deinde si quis forte dicat, celeritatem in ratione temporum diminui; rem nondum definiret, determinare enim insuper deberet, quanta celeritatis pars quovis tempore interiret, in quo quicquid assignaverit, cum nulla ratione fulciatur, nullo modo admitti potest; id quod etiam de quacunque alia lege valet. Nihil aliud ergo relinquitur, nisi ut statuamus, celeritatem quoque perpetuo eandem manere, perinde ac directionem.

### EXPLICATIO. 2.

§7. Huic axiomati, aequae ac praecedenti, opinio eorum Philosophorum adversatur, qui statuunt, omnia corpora vi quadam occulta praedita esse, statum suum motus vel quietis continuo mutandi: quae opinio, nulli rationi innixa, funditus eo ipso evertitur, quod axiomati contradicat. Verum hoc axioma primo intuitu experientiae contrarium videri solet, cum in omnibus experimentis observemus, motum pedetentim retardari ac tandem penitus extinguere, ita ut ex hoc fonte motus perpetuus negetur, dum vi nostri axiomatis omnis motus perpetuus esse deberet. Verum in his ipsis experimentis causa retardationis manifeste deprehenditur, cum in frictione tum in resistentia aeris aliisque motus obstaculis, quae nequaquam penitus tollere licet, Quas circumstantias si probe perpendamus, ex his ipsis experimentis concludere debemus, si omnia haec obstacula abessent, motum revera perpetuo esse duraturum. Quare cum in axioma omnia obstacula expresse sint remota, tantum abest, ut haec experimenta ei adversentur, ut potius ejus veritatem

## DE INTERNIS MOTUS PRINCIPIIS. 35

ritatem sensibili argumento confirmant. Ceterum probe cavendum est, ne hoc axioma, ad motum absolutum adstrictum, ad motus quoque respectivos extendatur.

### DEFINITIO 10.

88. Dum corpus absolute, vel quiescit, vel aequabiliter in directum promovetur, *in eodem statu perseverare* dicitur.

#### COROLL. 1.

89. Ambo ergo axiomata allata ita enunciari possunt, ut corpora, quatenus ab aliis non impediuntur, in eodem statu perseverent.

#### COROLL. 2.

90. Si ergo corpus, quod ante quieverat, moveri incipit, vel, quod motum, mutationem sive in celeritate sive in directione patitur, id *statum suum mutasse* est censendum.

### SCHOLION.

91. Permanentia in quiete, sive in motu aequabili rectilineo, non incongrue *status* appellatur, quia corpus ad eam sponte determinatur: quamdiu enim corpus sibi est relictum, neque ulli externae actioni subiectum, recte in eodem statu manere dicitur, siquidem mutatio status actionem externam innuere videtur. Mansio ergo in eodem statu maxime differt a mansione in eodem loco, cum qua tum demum convenit, quando corpus quiescit. Ad hanc status ideam nos deduxerunt axiomata ante stabilita, neque vicissim idea status, quae per se esset arbitraria, ad eorum cognitionem ducere potuisset; hinc autem ipsa haec idea *stati* significationem est adepta.

### DEFINITIO 11.

92. Proprietas illa corporum, quae rationem perseverationis in eodem statu in se continet, *inertia* appellatur: quandoque etiam *vis inertiae*.

#### COROLL. 1.

93. Inertia ergo vera est causa, cur corpora in eodem statu perseverent, cum enim causa in ipso corpore sit quaerenda, ea sine dubio pro communi omnium corporum proprietate haberi debet.

94. Quodsi ergo quaeratur, cur corpus absolute quiescens quiescere, vel motum aequabiliter in directum moveri pergat, alia causa, praeter ejus inertiam assignari nequit; neque hujus phaenomeni causam usquam extra corpus quaeri licet.

## SCHOLIUM.

95. Vox *inertias* proprie ad eam corporum proprietatem indicandam, qua quiescentia in quiete persistunt, est adhibita, propterea quod in hoc statu motui se quasi opponunt: sed quia corpora, in motu constituta, aequae se omni mutationi ratione, tam celeritatis, quam directionis, opponunt, hoc nomen haud inepte ad conservationem status, sive quietis, sive motus, indicandam usurpatur. Vocatur etiam passim *vis inertias*, quia *vis* est aliquid mutationi status reluctans; sed si *vis* definitur per causam quamcunque, qua status corporum mutatur, hic in ista significatione neutiquam accipi potest: ejus certe ratio maxime discrepat ab ea, qua deinceps vires agere ostendemus. Quare ne hinc ulla confusio oriatur, nomen *vis* omittamus, et hanc corporum proprietatem simpliciter nomine *inertias* appellabimus.

## EXPLICATIO.

96. Inertia ergo tantum cernitur in statu corporum absoluto, neque ad quietem respectivam aut motum respectivum referri potest. Corpus enim, respectu alterius, motu utcumque inaequabili et in linea curva incedere potest, cum tamen absolute, vel quiescat, vel uniformiter in directum moveatur, ideoque in statu suo perseveret: atque si nobis contigerit, corpus videre, de quo certi fuerimus, id nulli actioni externae esse subjectum, quomodocunque id nobis videbitur inaequaliter motu respectivo ferri; certe tamen pronunciare poterimus, id absolute vel quiescere, vel uniformiter in directum progredi. Quoniam autem quietem vel motum corporum nonnisi respectu aliorum nobis cognoscere licet, sensus nobis statum corporum absolutum minime declarant, unde criterium status absoluti inde petitum, quando corpora nulli actioni externae sunt subjecta, in hac scientia maximi est momenti. Fieri tamen potest, ut hoc axioma etiam in motu respectivo locum habeat, quando scilicet corpus, cujus respectu motus aestimatur, ipsum in statu suo manet, hoc est vel absolute quiescit, vel absolute uniformiter in directum promovetur.

THE.

## THEOREMA. I.

97. Si corpus, ejus respectu aliorum corporum inotum aestimamus, absolute vel quiescit, vel uniformiter in directum promovetur, tum axiomata pro quiete vel motu respectivo aequae valebunt, ac pro absoluto.

## DEMONSTRATIO.

Considerentur duo corpora, quorum ambó motu absoluto unifor- Fig. 9.  
 miter in directum ferantur, alterum describat tempore  $= t$  spatium  $Aa = at$ , alterum vero eodem tempore spatium  $Bb = bt$ , ita ut illius celeritas sit  $= a$ , hujus vero  $= b$ : perinde autem est, si hae rectae  $Aa$  et  $Bb$  sint in eodem plano, nec ne. Referatur jam motus corporis  $B$  ad corpus  $A$ , quod tanquam quiescens in  $A$  spectetur, et cum initio corpus  $B$  fuerit in  $B$ , elapso tempore  $= t$  corpus  $B$  aestimabitur esse in  $C$ , ducta recta  $AC$  ipsi  $ab$  parallela et aequali, Quare ob  $bC = Aa = at$ , erit  $Bb : bC = b : a$  seu in ratione constante; et quia angulus  $BbC$  est quoque perpetuo idem, triangulum  $BbC$  est specie datum; hincque etiam angulus  $bBC$  constans neque a tempore pendens, pariter ac ratio laterum  $Bb$  ad  $bC$ , quae sit ut  $b$  ad  $C$ , ficque  $BC = Ct$ . Ex quibus concluditur, motum respectivum corporis  $B$  ita fore comparatum, ut ex  $B$  secundum rectam  $BC$  sit progressum, temporeque  $t$  spatium descriperit  $BC = Ct$ , ideoque celeritatem habeat constantem. Consequenter corpus  $B$ , quod absolute uniformiter in directum moveri ponebatur, etiam respectu corporis  $A$  uniformiter in directum movebitur, dummodo hoc corpus  $A$  etiam absolute uniformiter in directum preferatur.

## COROLL. 1.

98. Si angulus  $BbC$  ponatur  $= \zeta$ , qui ubique est idem, etsi rectae  $Aa$  et  $Bb$  non sunt in eodem plano, erit  $BC = t \sqrt{(aa - 2ab \cos \zeta + bb)}$ , sicque celeritas respectiva  $= \sqrt{(aa - 2ab \cos \zeta + bb)}$  anguli autem  $bBC$  tangens est  $= \frac{a \sin \zeta}{b - a \cos \zeta}$ .

## COROLL. 2.

99. Si corpus  $A$  quiesceret absolute, motus respectivus corporis  $B$  non differret a motu ejus absoluto. Unde si in mundo unicum esset

E 3

corpus

corpus absolute quiescens, reliqua corpora ad id referendo, eorum motum absolutum cognoscere liceret.

### COROLL. 3.

100. Si in mundo esset corpus uniformiter in directum progrediens, ad quod reliqua corpora referantur, de iis, si nullam actionem externam subirent, affirmare possemus, ea etiam in statu respectivo esse perseveratura.

### COROLL. 4.

101. Ob inertiam igitur corpora non solum in eodem statu absoluto, sed etiam in eodem statu respectivo, perseverare conantur, dummodo corpus, cujus respectu eorum status aestimatur, absolute vel quiescat, vel uniformiter in directum promoveatur.

### EXPLICATIO.

102. Si in universo sol, vel potius ejus centrum, absolute quiesceret, omniaque corpora ratione situs cum eo comparentur, inertia efficeret, ut omnia corpora, quae respectu centri solis quiescunt, in quiete, quae autem moventur, in eodem motu aequabili in directum progredi conentur, quoniam hoc casu eorum motus a respectivo non discreparet. At si, ut est verisimile, non centrum solis, sed potius centrum gravitatis commune totius systematis absolute quiescat, ejus respectu haec inertiae proprietas est intelligenda. Verum ad motum respectivum determinandum non sufficit, unicum punctum tanquam fixum considerare, quoniam inde tantum distantiae non vero directiones cognoscere liceret, sed tribus vel adeo quatuor punctis fixis adhuc est opus, uti supra ostendimus. In mundo ergo stellae fixae tanquam totidem puncta fixa considerari solent, quae hypothesis si vera esset, omnia corpora in mundo, quae earum respectu vel quiescunt vel moventur, ob inertiam in eodem statu essent perseveratura. Atque hoc perinde eveniret, si omnes stellae fixae celeritatibus aequalibus secundum directiones parallelas per coelos uniformiter in directum feruntur. Verum in ipsis stellis fixis quaedam exiguae inaequalitates animadvertuntur, quarum rationem in hoc judicio haberi oportet, quod ergo pro maxime arduo merito habetur.

SCHO-

## SCHOLION.

103. Quodſi ergo ejuſmodi corpora, vel potius, ne eorum magnitudo moram faceſſat, puncta quaſi corporea contemblemur, quae nulli actioni externae ſunt expoſita, ea vel perpetuo quieſcent, vel continuo uniformiter in directum promovebuntur, idque non ſolum abſolute, ſed etiam reſpective, ſi modo corpus, ad quod referuntur, ipſum in eodem ſtatu abſoluto perſiſtat. Talem igitur motum, cujuſ ratio in ſola inertia eſt ſita, accuratius perpendere, ad calculumque revocare conveniet. Supra autem in genere tres pertractavimus caſus, quibus calculus ad motus determinationem accommodabatur. Primus erat, quo motus rectilineus ad directricem, cum ejus directione congruentem, referebatur; ſecundus, quo motus ad duas directrices reducebatur, qui cum in omni motu in eodem plano facto ſuccedat, etiam ad motum rectilineum uniformem, qualem hic examinamus, adhiberi poterit. Tertius caſus latiffime patens, quo tribus directricibus ſumus uſi, etiam hunc, quem tractamus, in ſe complectitur, operaeque pretium erit diſpicere, quomodo formulæ illae generales pro motu uniformi rectilineo futurae ſint comparatae. Quare ſecundum hos tres caſus motum aequabilem rectilineum ad calculum revocemus, hincque colligere poterimus, quid in omni motu inertiae ſit tribuendum. Quatenus enim deinceps motus cujuſpiam corporis aliter ſe habere deprehendetur, ejus cauſa non in inertia ejus, ſed aliter extra corpus erit quaerenda.

## PROBLEMA 6.

104. Si motus rectilineus aequabilis ad unicam directricem cum Fig. 2. ejus directione congruentem referatur, eum per calculum determinare, ſeu ad quodvis tempus ejus locum assignare.

## SOLUTIO.

Corpore, quod movetur, inſtar puncti conſiderato, fuerit id initio in A, et elapſo tempore  $t$  pervenerit in S percurſo ſpatio  $AS = s$ . Cum igitur celeritas in S ſit  $= \frac{ds}{dt}$ , eaque perpetuo maneat eadem, ſi ea ponatur  $= c$ , habebimus  $\frac{ds}{dt} = c$ , et integrando  $s = ct$ , quae formula jam ſupra pro motu aequabili eſt tradita. Sed ut in genere phaenomena hujus motus, ſine reſpectu ad quantitatem celeritatis habito, evolva-



evolvamus, sufficit notasse  $\frac{ds}{dt}$  esse quantitatem constantem: unde ejus differentiale nihilo erit aequale. Sumto ergo temporis elemento  $dt$  pro constante, erit  $\frac{dds}{dt} = 0$ , ideoque etiam suppleta homogeneitate  $\frac{dds}{dt^2} = 0$ .

## COROLL. 1.

105. Si igitur in motu rectilineo fuerit  $\frac{dds}{dt^2} = 0$ , is funul erit aequabilis, atque si is fuerit absolutus, vel absoluto aequipollens, inertiae est tribuendum, quod fit  $\frac{dds}{dt^2} = 0$ .

## COROLL. 2.

106. Sin autem in motu rectilineo non fuerit  $\frac{dds}{dt^2} = 0$ , id indicio est, corpusculum non solum inertiam sequi, sed valorem ipsius  $\frac{dds}{dt^2}$  causae cuipiam externae esse tribuendum, siquidem motus absolute spectetur.

## PROBLEMA. 7.

107. Si punctum uniformiter in directum moveatur, ejusque motus ad duas directrices in eodem plano sitas referatur, determinare hujus motus phaenomena, ad calculum revocata.

## SOLUTIO.

Fig. 3.

Sit ergo spatium a puncto descriptum EF linea recta, in eodem etiam directricibus OA et OB plano sita, atque elapsq tempore  $t$  versetur mobile in S, unde directricibus parallelae agantur SY et SX, sitque OX =  $x$  et XS =  $y$ . Quia nunc linea ESF est recta, erit  $\frac{dy}{dx}$  quantitas constans: deinde labente tempusculo  $dt$  perveniat mobile in  $s$ , positisque  $Xx = Sp = dx$  et  $ps = dy$  item angulo AOB =  $\zeta$ , erit  $Ss = \sqrt{(dx^2 + dy^2 + 2dx dy \cos \zeta)}$  et celeritas in S =  $\frac{\sqrt{(dx^2 + dy^2 + 2dx dy \cos \zeta)}}{dt}$ .

Cum autem sit  $\frac{dy}{dx}$  quantitas constans, posito  $dy = a dx$ , erit celeritas

$rs = \frac{dx}{dt} r(1 + aa + 2a \cos \zeta)$ , quae etiam per hypothefin est constans. Quocirca tam  $\frac{dx}{dt}$  quam  $\frac{dy}{dt}$  erunt quantitates constantes, ideoque earum differentialia evanescent, hinc si motus sit rectilineus et aequalis, sumto elemento  $dt$  constante, erit tam  $\frac{ddx}{dt^2} = 0$ , quam  $\frac{ddy}{dt^2} = 0$ , ac vicissim si hae formulae evanescant, erunt  $\frac{dx}{dt}$  et  $\frac{dy}{dt}$  quantitates constantes, ideoque etiam  $\frac{dy}{dt}$ , unde motus erit rectilineus et aequalis.

### COROLL. 1.

108. Si ergo punctum nullam actionem externam patiat, motumque suum per solam inertiam prosequatur, certe erit tam  $\frac{ddx}{dt^2} = 0$ , quam  $\frac{ddy}{dt^2} = 0$ , quippe quibus conditionibus motus rectilineus et aequalis indicatur.

### COROLL. 2.

109. Quare si motus rectilineus aequalis secundum directiones binarum directricium OA et OB resolvatur, utriusque motus celeritas erit constans: ac si vicissim uterque hic motus lateralis fuerit aequalis, etiam motus verus non solum aequalis, sed etiam rectilineus erit.

### COROLL. 3.

110. Contra igitur, si in quopiam motu, ad directrices OA et OB relato, vel non fuerit  $\frac{ddx}{dt^2} = 0$ , vel non  $\frac{ddy}{dt^2} = 0$ , vel etiam neutrum, hoc indicio est, corpus non soli inertiae esse relictum, sed ab aliqua actione externa affici.

### SCHOLION.

111. Quamdiu ergo corpus soli inertiae obediens uniformiter in directum movetur, sive absolute sive respectu corporis, quod ipsum in eodem statu absoluto perseverat; quomocunque ejus motus secundum duas directrices resolvatur, id quod utique infinitis modis fieri potest,

potest, semper uterque motus lateralis erit uniformis, hoc est talis, quem corpus vi inertiae prosequeretur. Atque haec est insignis proprietas hujus resolutionis, quod axiomata ad motum verum adstricta etiam in his motibus lateralibus, etsi fictis tantum, locum habeant, ex quo in calculum eximia commoda redundabunt. Majoris vero adhuc momenti haec resolutio agnoscetur, quando infra ostendemus, ab actione virium hos motus ex resolutione natos et ideales tantum perinde affici, ac si motus essent veri. Verum idem quoque in genere est tenendum de resolutione secundum ternas directiones, uti ex sequente problemate patebit.

### PROBLEMA. 8.

112. Si punctum uniformiter in directum moveatur, ejusque motus ad ternas directrices quascunque referatur, determinare hujus motus phaenomena ad calculum revocata.

### SOLUTIO.

Fig. 4.

Constitutis tribus directricibus OA, OB, OC, sit ESF linea recta a puncto motu uniformi percurra, elapsoque tempore  $t$  versetur in S, pro quo directricibus parallelae sint coordinatae  $OX = x$ ,  $XY = y$  et  $YS = z$ , sive sint inter se normales sive obliquae. Quoniam ESF est linea recta, ejus etiam projectio TY in plano AOB erit linea recta, unde  $\frac{dy}{dx}$  est quantitas constans. Simili modo, quia projectio in plano AOC est recta, erit quoque  $\frac{dz}{dx}$  quantitas constans, itemque  $\frac{dz}{dy}$ . Ponatur nunc spatium tempusculo  $dt$  descriptum  $Ss = ds$ , erunt etiam  $\frac{ds}{dx}$ ,  $\frac{ds}{dy}$ ,  $\frac{ds}{dz}$ , quantitates constantes, quae conditiones inde sequuntur, quod linea ESF est recta. Ob motus porro aequabilitatem celeritas  $\frac{ds}{dt}$  est constans, sicque constantes erunt istae quantitates  $\frac{dx}{dt}$ ,  $\frac{dy}{dt}$  et  $\frac{dz}{dt}$ , quibus tam aequabilitas motus, quam rectitudo spatii continetur. Sumtis ergo differentialibus, posito elemento  $dt$  constante, sequentes formulas nihilo aequales esse oportet;

$$\frac{ddx}{dt^2} = 0, \quad \frac{ddy}{dt^2} = 0, \quad \text{et} \quad \frac{ddz}{dt^2} = 0;$$

quibus adeo natura motus uniformis rectilinei determinatur.

COROLL.

## COROLL. 1.

113. Quando ergo punctum nulli actioni externae subjicitur, ejusque motus absolutus ad tres directrices quascunque refertur, certe hae tres aequationes locum habebunt:  $\frac{ddx}{dt^2} = 0$ ;  $\frac{ddy}{dt^2} = 0$ , et  $\frac{ddz}{dt^2} = 0$ , quarum ratio in inertia corpusculi est collocanda.

## COROLL. 2.

114. Quare si motus fuerit rectilineus et aequabilis, quomocunque is secundum ternas directiones fixas resolvatur, terni motus laterales etiam erunt aequabiles, cum sint  $\frac{dx}{dt}$ ,  $\frac{dy}{dt}$  et  $\frac{dz}{dt}$  quantitates constantes.

## COROLL. 3.

115. In motu ergo absoluto motus laterales, in quos secundum ternas directiones fixas resolvitur, etiam si sint ficti, tamen legem inertiae sequuntur, ita ut hoc capite tanquam veri motus spectari possint.

## SCHOLION.

116. Haec igitur sunt principia motus interna, quae ea proprietate communi innituntur, quae *inertiae* nomine appellari solet. Atque ex his principiis motum punctorum corporeorum, quando nulli actioni externae subjiuntur, determinare valemus. Omnia nempe huc redeunt, ut si tale corpusculum quiescat absolute, id perpetuo in quiete sit perseveraturum, sin autem motum acceperit absolutum quemcunque, id perpetuo eadem celeritate in directum sit progressurum. Hic quidem corpora mota tanquam infinite parva sum contemplatus, sed tamen ea, quae sunt stabilita, ad corpora cujusvis magnitudinis accommodare licet. Verum antequam eo progrediamur, necesse est, quid vires externae efficere valeant, expendere, quam ergo investigationem etiam pro punctis seu particulis corporum minimis fuscipiamus.





# CAPUT III.

## DE CAUSIS MOTUS EXTERNIS SEU VIRIBUS.

### DEFINITIO. 12.

117. **Q**uicquid statum corporum absolutum mutare valet, id *vis* vocatur: quae ergo, cum corpus ob causas internas in statu suo esset permanens, pro causa externa est habenda.

### COROLL. 1.

118. Causa ergo, qua vel corpus absolute quiescens ad motum incitatur, vel in corpore absoluto motu lata ejus celeritas sive directio mutatur, vis appellatur.

### COROLL. 2.

119. Est ergo vis causa externa, statum absolutum corporum mutare valens; et quamdiu talis causa externa non accedit, corpus in eodem statu absoluto sive quietis sive motus aequabilis in directum perseverat.

### EXPLICATIO.

120. In corpore ipso nihil est, quod suum statum mutare conetur; ob hoc enim ipsum dicimus, corpus in eodem statu manere, quamdiu proprium quasi instinctum sequitur, neque ullam actionem externam subit. Quando ergo evenit, ut status absolutus cujuspiam corporis mutetur, causa certe non in ipso corpore quaeri potest, alioquin enim nulla status mutatio contingeret, siquidem statum ita definivimus, ut corpus in eodem statu perseverare dicatur, quamdiu a nullis causis externis sollicitatur. Causa autem illa interna, ob quam corpus in eodem statu perseverat, est ejus inertia, in qua cum ratio omnium, quae in ipso corpore ad quietem sive motum spectant, contineatur, ea non solum penitus tolleretur, sed etiam ne stabiliri quidem potuisset; - si quicquam in ipso corpore inesset, quod ad statum ejus mutandum tenderet. Quare si vocabulum *vis* ad eas causas adstringamus, quae statum corporum absolutum mutare valeant, nulli certe corpori vis tribui potest, suum statum mutandi, sed quoties status cujuspiam corporis

### CAPUT III. DE CAUSIS MOTUS EXTERNIS &c. 45

poris mutatur, causa mutationis seu vis semper extra id existat necesse est.

#### SCHOLION. 1.

121. Hic ergo quaestio oritur, unde vires, quibus corporum statum perpetuo mutari observamus, nascantur? an, cum non in corporibus sit sitae, substantiis immaterialibus erunt tribuendae? Aliter quidam Philosophi argumentari solent; cum enim status corporum continuo mutetur, concludunt mutationis hujus causam in ipsis corporibus contineri, hincque porro inferunt, singula corpora vi esse praedita statum suum jugiter mutandi, sicque principium inertiae funditus evertunt. Verum in hoc ratiocinio insignem saltum committunt; priorem enim partem, quod causa mutationis status in corporibus sit sita, concedentes, alteram partem omnino negamus, quod singula corpora vi sint praedita suum statum mutandi. Causam scilicet mutationis status tantum ab eo corpore removemus, cujus status mutatur, eamque in aliis corporibus quaerendam esse affirmamus; atque adeo corporibus vim tribuimus aliorum statum mutandi, non suum. Quod tantum abest, ut absurdum videri debeat, ut potius ex hoc ipso, quod singula corpora facultate sint praedita in suo statu perseverandi, sequatur, in corporibus vim inesse debere aliorum statum mutandi. In congerie enim plurium corporum, nisi vel omnia quiescant, vel aequalibus celeritatibus secundum eandem directionem ferantur, necessario evenit, ut singula in statu suo salvo reliquorum statu permanere nequeant. Concipiamus enim duo corpora A et B, quorum illud ad hoc pervenerit, fieri certe nequit, ut corpus A motum suum continuet, quin simul corpus B de statu suo quietis deturbetur; neque ut corpus B in quiete persistat, quin simul corporis A motus sistatur. Quare cum ambo simul statum suum conservare nequeant, necesse est, ut vel utriusque vel saltem alterutrius status mutetur, idque ob hoc ipsum, quod utrumque in statu suo perseverare conatur. Consequenter ipsa singulorum corporum facultas in statu suo perseverandi vires suppeditat, quibus aliorum status immutari possit.

#### SCHOLION. 2.

122. Verum si porro quaeramus, cur ambo illa corpora A et B simul quodque in suo statu perseverare non possint: eam in impenetrabilitate manifeste sitam esse deprehendimus. Nam si illa corpora se invicem penetrare possent, ita ut alterum alteri liberrimum transitum per

F 2

suam

suam quasi substantiam permetteret, nihil certe obſtaret, quo minus corpus A motum suum proſequeretur, corpusque B in quiete perſisteret, ſicque utrumque inertiae obtemperaret. Causa ergo virium illarum, quibus ſtatus corporum mutatur, non in ſola inertia, ſed inertia cum impenetrabilitate conjuncta eſt conſtituenda. Quoniam vero impenetrabilitas nonniſi de corporibus praedicari poteſt, corpora autem neceſſario inertia ſunt praedita, impenetrabilitas per ſe inertiam involvit, ita ut impenetrabilitas ſola recte pro fonte omnium illarum virium, quibus ſtatus corporum mutatur, habeatur. Hanc igitur corporum proprietatem, tanquam originem omnium virium, accuratius perpendere conveniet.

## DEFINITIO 13.

123. *Impenetrabilitas* eſt ea corporum proprietas, qua duo plurave corpora in eodem loco inſeſſe nequeunt, atque adeo ad minima corporum elementa extenditur, ita ut ne duo quidem elementa in eodem loco exiſtere poſſint.

## COROLL. 1.

124. Per hanc ergo proprietatem omnia corpora extra ſe invicem exiſtant neceſſe eſt, cum ne minimis quidem partibus in ſe invicem penetrare poſſint.

## COROLL. 2.

125. Cum impenetrabilitas ſit proprietas corporum neceſſaria, nulla vis prorsus datur, quae valeat duo corpora in eundem locum compingere, atque maxima vi tali effectui producendo aequae eſt impar ac minima.

## COROLL. 3.

126. Quomocunque ergo ſtatus corporum a viribus mutantur, tamen nunquam evenire poteſt, ut ab iis duo elementa ſeu puncta corporea in eundem locum compingantur.

## EXPLICATIO. 1.

127. Perperam contra hanc generalem corporum proprietatem adducuntur quaedam experimenta, quibus corpora ſe invicem penetrare videntur et dicuntur. Dicitur ſcilicet globus exploſus in argillam penetrare, ſed hic iſta vox *penetrare* alio ſenſu accipitur: nulla enim pars globi

globi in ejusmodi locum pertingit, ubi revera pars argillae existat; sed quia jam globus locum occupat, ante ab argilla occupatum, vox penetrationis adhibetur. Hic autem tantum negamus, corpus locum quempiam occupare posse, qui simul ab alio occupetur, non qui ante ab alio fuerit occupatus. Simili modo, quando aqua spongiam penetrare dicitur, aqua tantum interstitia seu poros spongiae replet, qui cum ante a substantia spongiae non distinguerentur, ipsa spongia penetrata videtur, sed re accuratius examinata deprehendimus, nusquam vel minimam spongiae particulam existere, ubi simul aquae particula existat. Eodem modo res se habet in corporibus, quae se in minus spatium comprimi patiuntur, nunquam enim duae particulae in eundem locum rediguntur, sed intervallo inter particulas coarctantur, ea materia adeo, quae ante implebantur, inde expulsa. His igitur probe perpenfis nullum dubium relinquitur, quin corpora sint impenetrabilia, seu, quin omnino fieri nequeat, ut duo corpora simul in eodem loco existant.

## EXPLICATIO. 2.

128. Idea igitur impenetrabilitatis nititur idea *loci*, sine qua omnia consistere nequit. Si enim locus nihil esset a corporibus diversum, quid esset impenetrabilitas, nullo modo intelligi posset. Dicunt quidem Philosophi, qui loci realitatem negant, corpora necessario extra se existere; sed quid sit *extra* vel *intra*, si locus sine corporibus nihil sit, minime definiunt. Quae supra de quiete et motu absoluto sunt exposita, abunde evincunt, locum non esse merum mentis conceptum, et nunc ex impenetrabilitate luculenter perspicimus, ideam loci plus in se complecti, quam solam corporum relationem mutuam, ita ut sublati corporibus etiam *loco* nullus locus relinqueretur. Est ergo locus aliquid a corporibus non pendens, neque merus mentis conceptus; quid autem extra mentem realitatis habeat, definire non ausim, etiam si in eo aliquam realitatem agnoscere debeamus. Quando autem Philosophi omnes realitates in certas classes distribuunt, atque perhibent, ad nullam earum locum referri posse; malim credere, has classes ab iis perperam esse constitutas, cum res eo referendas non satis cognovissent. Simili modo ratio *temporis* est comparata, in quo nihil reale inesse autumant, cum tamen vocibus *ante* et *post* haud parum realitatis tribuant. Quemadmodum ergo vera idea loci et spatii plus in se continet, quam ordinem coexistentium, ita quoque vera idea temporis plus in se continet quam ordinem successivorum; quamvis concesserim, primas harum rerum ideas nobis inde esse natas.

SCHO-



## SCHOLION. 1.

129. Stabilita impenetrabilitatis notione, non equidem dubitaverim, in ea essentiam corporum collocare: temerarium hoc videbitur, cum omnes fere Philosophi unanimiter clament, essentiam corporum nobis penitus esse ignotam. Hoc certe de corporum speciebus facile concedo, neque puto, auri vel argenti essentiam nobis esse cognitam. In quacunque enim re quis auri essentiam constituerit, incertum est, an ea auro in omni statu conveniat; et annon aliud corpus, quod non sit aurum, eadem sit praeditum, atque haec ipsa incertitudo assertum illud destruit; sed quando de corpore in genere quaestio est, talem objectionem non pertimesco; qui enim negare voluerit, essentiam corporum in impenetrabilitate sitam esse, is negare vel saltem dubitare debet, aut omnia corpora esse impenetrabilia, aut vicissim, quicquid sit impenetrabile, id esse corpus. Quae enim proprietas omnibus ac solis corporibus convenit, quin in ea corporum essentia sit constituenda, nemo Philosophorum dubitat. Primo autem omnia corpora esse impenetrabilia certissimum est, si enim darentur res extensae atque etiam inertia praeditae, quae scilicet sibi relictæ vel quiescerent, vel uniformiter in directum moverentur, tamen si impenetrabilitate carerent, nemo eas inter corpora esset relaturus, hinc est, quod umbrae et spectra per machinas opticas repraesentata non pro corporibus habeantur. Deinde quicquid impenetrabile est, id quoque extensum et inertia praeditum sit necesse est; sine extensione enim impenetrabilitas concipi nequit, tum vero non mobile esse non potest, posita autem mobilitate inertia ponitur. Quare, quicquid est impenetrabile, nulla certe foret causa, cur id non pro corpore habeatur.

## SCHOLION. 2.

130. Verum gravior contra hanc sententiam obiectio moveri potest, inde petita, quod impenetrabilitatem per se nobis percipere non liceat, quippe cujus notio necessario plura corpora in se involvit. Atque hinc facile concedo, definitionem, qua corpus diceretur substantia impenetrabilis, regulis Philosophandi non esse conformem, non quod essentia male in impenetrabilitate ponatur, sed quia haec definitio sine antecedente notione corporis intelligi nequit. Si enim quaeratur, quid sit substantia impenetrabilis? ac respondeatur, quae a corporibus, hoc est, aliis substantiis impenetrabilibus penetrari nequeat, negotium minime conficitur. Sed quamvis hanc proprietatem nonnisi ex comparisonem

## DE CAUSIS MOTUS EXTERNIS SEU VIRIBUS. - 49

paratione corporum mutua cognoscamus, tamen dubium est nullum, quin ratio impenetrabilitatis in proprietate quadam interna cujusque corporis sit sita, ita ut omnia corpora certa proprietate quadam sint praedita, qua efficiatur, ut inter se fiant impenetrabilia. Haec fortasse proprietas non inepte *soliditas* vocabitur, qua quasi materialitas constituatur, quae proinde recte pro-essentia corporum habebitur. Fateor equidem, rem fere eo redire, ac si dicerem, essentiam corporum in *corporeitate* consistere. Attamen impenetrabilitas nos ad originem virium inanuducit, sicque a nudo sono egregie distinguitur; id quod uberius exponi meretur:

### THEOREMA. 2.

131. Si duo corpora ita coeunt, ut neutrum statum suum conservare possit, quin per alterum penetrèt, tunc in se mutuo agunt, viresque exerunt, quibus eorum status mutetur.

### DEMONSTRATIO.

Cum corpora in ejusmodi statu ponantur, ut in eo perseverare nequeant, nisi se mutuo penetrent; quoniam penetratio nullo modo fieri potest, necesse est, ut in eorum statu mutatio eveniat. Quia autem corporum status sine viribus externis mutari nequit, et in casu posito mutatio status actu producitur, vires sine dubio adesse debent, quibus hic effectus est tribuendus. Quaeritur ergo, unde hae vires oriantur? utrum ex ipsa corporum impenetrabilitate, an aliunde? si dicas, eas aliunde oriri, origo mente saltem tolli posset, salva impenetrabilitate, ideoque nulla mutatio status contingeret, corporaque proinde se mutuo penetrarent, quod cum sit absurdum, necesse est, istas vires ab ipsa impenetrabilitate suppeditari. Statim scilicet atque corpora in statu suo perseverare nequeunt, quin se mutuo penetrent, ipsa impenetrabilitas vires suppeditat, quibus eorum status mutetur, ut penetratio evitetur; et dum hae vires effectum suum exerunt, corpora in se invicem agere dicuntur, alterumque alterius statum mutabit.

### COROLL. 1.

132. Corpora igitur in se invicem agunt, quando ita congregiuntur, ut singula in statu suo perseverare nequeant, quin se mutuo penetrent; unde distincta notio actionis corporum, quae apud plerisque auctores nimis obscura esse solet, est haurienda.

G

COROLL.

## COROLL. 2.

133. Vires, quibus hoc casu status corporum mutatur, ab eorum impenetrabilitate nascuntur, tantumque effectum producunt, ut penetratio impediatur, semperque hae vires tantae erunt, ut huic fini sufficiant.

## COROLL. 3.

134. Magnitudo ergo harum virium non ex impenetrabilitate, quippe quae nullius quantitatis est capax, determinatur, sed ex mutatione status, quae effici debet, ne corpora se inutuo penetrent.

## COROLL. 4.

135. Hae ergo vires, ex impenetrabilitate ortae, eatenus tantum se exerunt, quatenus penetrationi est occurrendum, et quantumvis magnis ad hoc viribus opus fuerit, eas impenetrabilitas semper suppeditabit, quandoquidem penetratio nullatenus contingere potest,

## EXPLICATIO. I.

136. Quando quodpiam corpus ab aliis impeditur, quo minus vel si quiescat, in quiete permaneat, vel si moveatur, uniformiter in directum progrediatur; tam ejus ipsius, quam illorum impenetrabilitas vires ad mutationem necessarias gignit, nam si vel illud vel haec essent penetrabilia, nullis opus esset viribus, ita ut hae vires non ex impenetrabilitate unius tantum corporis, sed duorum pluriumque conjunctim nascantur. Impenetrabilitas certe sine resistentia invincibili concipi nequit, ideoque jure pro fonte illarum virium, quibus penetratio avertitur, habetur. Quae ergo hactenus sunt tradita huc redeunt, ut corpora ob inertiam insitam in statu suo quietis vel motus aequabilis rectilinei tamdiu perseverent, quamdiu nulla penetratio est metuenda, simul ac vero statum suum continuare nequeunt, quin penetratio fieret, impenetrabilitas tantas suppeditat vires, quae ejusmodi mutationem in eorum statu producant, ut omnis penetratio avertatur. Quare cum mundus sit plenus corporibus, quorum status ita est diversus, ut si in eo quaeque vel per minimum temporis spatium manerent, ubique penetrationes essent secuturæ, hinc uberrimus fons virium ad statum corporum continuo mutandum oritur. Quanquam ergo infinitam quasi copiam virium in mundo concedimus, easque adeo a corporibus oriri statuimus, ab eorum tamen opinione maxime abhorremus, qui corporibus

ribus conatum statum suum continuo mutandi tribuunt, cum istae vires non directe ad statum mutandum, sed ad penetrationem avertendam tendant, quas nisi periclitaretur, nullae ejusmodi vires in mundo existerent.

## EXPLICATIO. 2.

137. Iam quaestio hic oritur, num omnes plane vires, quarum effectus in mundo miramur, ex hoc fonte oriantur? hoc est, an status corporum a nullis aliis viribus praeter has, quas periculum penetrationis suppeditat, mutari possit? Ac primo quidem ad Mechanicam non pertinet definire, utrum spiritus in corpora agere eorumque statum mutare valeant? interim in corporibus nihil plane invenimus, quod actioni spirituali adversetur; atque actio in corpora non tam arduum opus videtur, ut soli omnipotentiae divini Numinis sittribuendum, cum adeo vilissimis corporibus sit concedendum. Quin potius fateri debemus, nullam nos perspicere rationem, cur animis potentiam in corpora agendi denegemus, etiamsi modum, quoque agant, minime assignare possimus. Verum an corpora alio insuper modo in se mutuo agere valeant, praeter eum, quem declaravimus? id quidem negandum videtur. Si enim agerent, etiamsi nullum periculum penetrationis adesset, *in distant* agerent, neque pateret, quomodo conservatio status inde turbari posset; deinde vero, quia illa actio non ab impenetrabilitate profisceretur, perinde agere deberent, quamvis corpora essent penetrabilia, quomodo autem actio subsistere posset, non liquet. Ex quo maxime verisimile videtur, corpora in se mutuo alias vires non exercere, nisi quibus penetratio avertatur, et cum hae vires minores esse nequeant, quam hic scopus exigit, ita etiam majores statui non possunt, quam sufficientes. Ceterum hic nihil certi statuere licet, sed contentos nos esse oportet, foecundum fontem virium in mundo operantium detexisse, ex quo simul actio corporum mutua, a plerisque Philosophis vel negata vel crassissimis tenebris involuta, satis luculenter perspiciatur. Quantae autem quovis casu sint istae vires ab impenetrabilitate corporum profectae, et quomodo iis status corporum immutetur, definire nequit, nisi ante in genere in actionem virium inquisiverimus.

## SCHOLION.

138. Perspecta ergo virium origine, recte assumere possumus, dari in mundo vires, quibus eorum status mutetur. Ac de hujusmodi quidem viribus, quatenus in corpora agentes se mutuo in aequilibrio tenent,

nent, in Statica vel Dynamica tractari solet, ubi earum mensura, quae aliae aliis non solum sunt vel majores vel minores, sed etiam datam inter se rationem habere docentur. Referendae scilicet sunt vires ad genus quantitatum, cum ratione quantitatis inter se comparari possint: atque ex Statica intelligimus, quando duae vires inter se aequales, vel secundum datam rationem inaequales sint censendae. Quo igitur facilius earum effectum in statu corporum mutando exploremus, non solum a corpusculis infinite parvis, in quae agant, exordiri conveniet, quandoquidem hinc etiam tota motus tractatio est ducta: sed etiam actionem tantum momentaneam virium scrutabimur, ita ut quantum singulis temporis elementis efficiant, finis investigaturi, quoniam fieri posset, ut successu temporis quantitas virium mutaretur. At cum principia hinc pro corpusculis infinite parvis et pro temporis intervallo infinite parvo fuerint stabilita, haud difficile erit per integrationes ad motus corporum per finitum tempus mutatos progredi.

## DEFINITIO. 14.

139. *Effectus alicujus vis, in dato corpusculo dato tempusculo productus*, vocatur id spatium, per quod vel corpusculum quiescens transfertur, vel si moveatur, ultra id spatium, quod ob inertiam esset percursum, propellitur.

## COROLL. I.

140. Haec ergo effectus determinatio non est absoluta, sed ad certum corpus certumque tempus adstricta, quorum utrumque ut infinite parvum spectatur, ut hoc modo omnis variabilitas aliunde accessura tollatur.

## COROLL. 2.

141. Si igitur posito corpusculo et tempusculo spatium fuerit idem, effectus quoque erit idem, unde et vis pro eadem est habenda, hocque sive corpusculum quiescat, sive jam moveatur.

## COROLL. 3.

142. Scilicet si corpusculum movetur, vis eatenus tantum aestimatur, quatenus per certum spatium ultra id, quod motu jam inuito percursum esset, propellitur, vicissim enim ex quantitate hujus spatii vis aestimabitur.

EXPLI.

## EXPLICATIO.

143. Cum in Statica, unde virium mensuram haurimus, corpora, quibus applicantur, in quiete considerentur, nihil inde circa earum mensuram, quando in corpora mota agunt, definitur, ita ut ista mensura in Mechanica nobis integra relinquatur. Concipiamus ergo Fig. 10. primo punctum seu corpusculum in  $S$  quiescens, quod a vi quadam  $= p$  sollicitetur in directione  $S\sigma$ , atque effectus in hoc consistet, ut id dato tempusculo  $dt$  per certum quodpiam spatium  $S\sigma = d\omega$  profertur, quod quomodo pendeat tam a vi  $p$  quam a tempusculo  $dt$ , deinceps definiemus. Hic tantum observo, si idem corpusculum habeat Fig. 11. motum, quo tempusculo  $dt$  descripturum esset spatium  $Ss = ds$ , illud tum ab aequali vi  $= p$  sollicitari esse censendum, quando eodem tempusculo  $dt$  ultra  $s$  per aequale spatium  $s\sigma = d\omega$  profertur, siquidem vis  $p$  secundum ipsam motus directionem  $Ss$  urgeat. Sin Fig. 12. autem vis in plagam contrariam urgeret, ab eaque corpusculum eodem tempusculo  $dt$  per aequale spatium  $s\sigma = d\omega$  repelleretur, tum vis illi  $= p$  aequalis esset censenda. Generatim autem, si corpusculum habens motum, quo tempusculo  $dt$  percursurum esset spatium Fig. 13.  $Ss = ds$ , sollicitetur a vi quadam secundum directionem  $SV$ , hac efficietur, ut elapso tempusculo  $dt$  corpusculum non in  $s$  sed in  $\sigma$  reperiatur, ita ut quasi ex  $s$  in  $\sigma$  per spatium  $s\sigma$  directioni vis  $SV$  parallelum translatus concipi queat, etiam si revera ob actionem continuam ex  $S$  in  $\sigma$  per viam aequabilem pervenerit, ac tum demum ista vis  $SV$  illi  $p$ , quae idem corpusculum quietum sollicitabat, aequalis est censenda, cum hoc spatium  $s\sigma$  aequale fuerit illi  $S\sigma$  (fig. 10.)

## EXPLICATIO. 2.

144. Pro viribus ergo, quibus corpora jam mota sollicitantur, hanc demetiendi rationem stabilimus, ut eas aequales judicemus iis, quae in iisdem corporibus quiescentibus eodem tempore eundem effectum essent praestituras. Haec autem ratio non indiget probatione, quia definitioni innititur, nobisque adhuc liberum fuerat, eam constituere. Si enim pro motu quocunque spatiola  $s\sigma$  (figg. 11, 12, 13), aequalia fuerint spatiolo  $S\sigma$ , per quod idem corpusculum quiescens tempusculo eodem profertur a vi  $p$ ; huic etiam illas vires aequales appellamus, quain libertatem rationi consentaneam eo minus nobis quisquam adimere potest, cum haec appellatio quoque cum communi loquendi more conveniat. Neque enim statuo, easdem impulsiones,

quas in mundo observamus, pares effectus in eodem corpore sive moto sive quiescente producere, atque omnino, concedo, a flumine idem corpus, sive moveatur sive quiescat, longe aliter impelli. Verum hoc ipsum exemplum nostram mensurae rationem egregie confirmat: dum enim affirmamus, idem corpus a flumine aliter impelli, prout vel quieverit, vel fuerit motum, vires inaequales agnoscimus, ac pro corpore moto vii praecise tantam aestimamus, quanta in corpore quiescente eundem effectum esset productura. Hinc etiam, quando de corporibus in flumine motis agitur, pro quovis celeritatis gradu vis, quam flumen actu in corpus exerit, sollicite determinatur, ac semper tanta statuitur, quanta in eodem corpore, si quiesceret, eundem effectum produceret. Quare divisio virium in absolutas et relativas in superioribus libris facta, proprie huc non pertinet, cum quovis casu et pro quovis momento ea vis in calculum introduci debeat, quae corpus motum aequae, ac si quiesceret, impellit. In contemplatione autem virium ipsarum plurimum interest nosse, utrum corpora mota aequae afficiant, ac quiescentia, nec ne?

## SCHOLION.

145. Quod ergo ad quantitatem virium corpuscula mota sollicitantium attinet, eam ex effectu seu spatio in definitione descripto ita petimus, quasi corpusculum quiesceret. Scilicet si corpusculum in S quiescens a vi  $= p$  tempusculo  $= dt$  per spatium  $S\sigma = d\omega$  protrudatur, idem corpusculum motum, quo tempusculo  $dt$  percursum esset spatium  $Ss \cong ds$ , tum ab aequali vi  $p$  urgeri censebitur, si ultra hoc spatium  $Ss$  insuper per aequale spatium  $s\sigma = d\omega$  secundum directionem vis proferatur, ita ut hic motus corpusculi nihil omnino in effectu vis mutet. Sin autem in figg. 11, 12, 13, spatium  $s\sigma$  majus fuerit vel minus, quam spatium  $S\sigma = d\omega$  (fig. 10), intelligemus, corpusculum quoque a vi majore vel minore impelli. Quare si potuerimus effectus quarumcunque virium in corpusculis quiescentibus determinare, omnium quoque virium effectus in corpusculis motis assignare poterimus, dummodo quovis casu vires, quibus corpuscula mota sollicitantur, rite definiantur. Ubi quidem hoc perpetuo est tenendum, corpusculum aliquod motum a vi  $= p$  sollicitari esse censendum, quando effectus in eo productus aequalis est illi, quem vis  $= p$  in eodem corpusculo quiescente eodem tempore esset productura. Videamus ergo, quomodo in corpusculo quiescente spatium  $S\sigma = d\omega$  se fit

## DE CAUSIS MOTUS EXTERNIS SEU VIRIBUS. 55

fit habiturum, si ab aliis atque aliis viribus, quarum mensura Statica docet, sollicitetur.

### THEOREMA. 2.

146. Spatiola, per quae idem corpusculum quiescens eodem tempusculo  $dt$  a diversis viribus promovetur, sunt ipsis viribus proportionalia.

### DEMONSTRATIO.

Ponamus corpusculum a vi  $= p$  tempusculo  $= dt$  per spatium  $= d\omega$  protrahi; ac si simul alia vis aequalis  $p$  secundum eandem directionem idem corpusculum sollicitaret, ab ea quoque per aequale spatium  $= d\omega$  protraheretur, quoniam hic effectus a priori, unde motus tantum infinite parvus efficitur, non turbabitur. Quare hoc corpusculum a vi  $= 2p$  sollicitatum tempusculo  $= dt$  per spatium  $= 2d\omega$  protrahetur. Simili modo si quotcunque vires aequales ipsi  $p$ , quarum numerus  $= n$ , simul secundum eandem directionem in idem corpusculum quiescens agant per tempusculum  $dt$ , id propellent per spatium  $= nd\omega$ , qui ergo est effectus vis  $= np$ .

### COROLL. 1.

147. Si ergo duo fuerint corpora aequalia quiescentia, quorum alterum a vi  $= p$ , alterum a vi  $= P$  urgetur, atque tempusculo  $= dt$  illud promoveatur per spatium  $= d\omega$ , hoc vero per spatium  $= d\Omega$ , erit  $d\omega : d\Omega = p : P$ .

### COROLL. 2.

148. Sunt igitur hi effectus, eodem tempusculo producti, ipsis viribus sollicitantibus proportionales, ubi quidem eadem virium mensura usurpatur, quae in Statica docetur.

### SCHOLION. 1.

149. Fundamentum hujus demonstrationis in hoc consistit, quod vires tantum per infinite parvum tempusculum agere assumo, ita ut in corpuseulo motus tantum infinite parvus gignatur, qui pro nullo haberi possit. Cum enim evenire queat, ut impulsio, quae in corpusculum quiescens vim  $= p$  exerit, eadem in corpusculum motum aliam vim exerat, haec exceptio in nostro Theoremate locum non habet. Etiam si enim plures vires, ipsi  $p$  aequales, quasi successive in corpusculum agere



agere concipiamus, singulae in eo eundem effectum producent, ac si quiesceret; neque motus infinite parvus in earum actione quicquam mutabit. Veruntamen hinc omnis successio, quae tantum mente est admissa, removeri debet, ut tota vis tantum per tempusculum  $dt$  agere sit censenda.

### SCHOLION. 2.

150. Si quaeratur, cur vis determinata  $p$  in corpusculo dato per datum tempusculum  $dt$  determinatum effectum  $d\omega$  producat? ratio in eo est posita, quod in corpusculo certa quaedam facultas in quiete perseverandi insit, quae est ipsa ejus inertia. Talis autem facultas in quiete perseverandi concipi non potest, sine quadam reluctancia, qua motus productioni adversetur, quae quo fuerit major vel minor, eo difficilius vel facilius actioni vis obsequetur. Quare cum haec facultas cum inertia conveniat, intelligitur, inertiam inter quantitates esse referendam, ita ut diversorum corpusculorum inertia ratione quantitatis diversa esse queat. Quam diversitatem cum hactenus nondum spectaverimus, effectus virium in eodem vel aequalibus corpusculis, quae scilicet aequali inertia sint praedita, sumus scrutati. Nunc igitur ad corpuscula diversa progressuri, ad mensuram inertiae deducemur, atque intelligemus, quomodo inertia in aliis major, in aliis minor inesse possit.

### THEOREMA. 3.

151. Si aequales vires corpuscula inaequalia quiescentia sollicitent, effectus eodem tempusculo producti erunt reciproce inertiae corpusculorum proportionales.

### DEMONSTRATIO.

Fig. 14. Concipiamus corpusculum A, quod quiescens a vi  $= p$  tempusculo  $dt$  protrudatur per spatium  $Ax = d\omega$ ; si jam aliud corpusculum B illi aequale a vi quoque aequali  $= p$  secundum eandem directionem urgeatur, id ab ea eodem tempusculo  $dt$  protrudetur per aequale spatium  $B\epsilon = d\omega$ . Coalescant nunc haec duo corpuscula in unum, quod ergo a vi  $= 2p$  tempusculo  $= dt$  protrudetur per spatium  $= d\omega$ ; ita ut vis duplicata  $2p$  in corpusculo duplicato  $2A$  eundem effectum producat, ac vis simplex  $p$  in corpusculo simplici A. Atque hinc intelligetur, si  $n$  corpuscula ipsi A aequalia coalescant, ut inde unum, quod sit  $= nA$ , resultet, hocque sollicitetur a vi  $= np$ , id tempusculo

## DE CAUSIS MOTUS EXTERNIS SEU VIRIBUS. 57

culo  $= dt$  propulsum iri per spatium  $= d\omega$ . Cum autem corpusculum  $nA$  a vi  $= np$  tempusculo  $dt$  propellatur per spatium  $= d\omega$ , per Theorema praecedens, idem corpusculum  $nA$  a vi  $= p$  sollicitatum tempusculo  $dt$  promovebitur per spatium  $= \frac{d\omega}{n}$ : similique modo corpusculum  $mA$  ab eadem vi  $= p$  sollicitatum pari tempusculo  $dt$  promovebitur per spatium  $= \frac{d\omega}{m}$ , unde patet haec spatia, quibus effectus metimur,  $\frac{d\omega}{n}$  et  $\frac{d\omega}{m}$  esse inter se reciproce, ut corpuscula  $nA$  et  $mA$ , seu ut eorum inertiae.

### EXPLICATIO.

152. Cum corpusculum  $A$  certam habeat inertiam, qua effectus via id sollicitantis determinatur, duo ejusmodi corpuscula aequalia in unum coalescentia exhibebunt corpusculum dupla inertia praeditum, tria triplum, et ita porro. Ac vicissim id corpusculum duplo majorem inertiam habere intelligendum est, ad quod per datum spatium dato tempusculo propellendum requiritur vis dupla. Unde manifestum est, quomodo inertia ad genus quantitatum referatur, et quomodo in aliis corporibus major, in aliis minor esse possit. Omnia scilicet corpuscula, quae ab aequalibus viribus eodem tempusculo per aequalia spatia promoven- tur, ratione inertiae inter se aequalia aestimantur, atque ex conjunctione hujusmodi corpusculorum quocunque oriri possunt corpora, quorum inertiae quaecunque rationem inter se teneant. Quantitas ergo inertiae in determinatione effectus a viribus oriundi maximi est momenti, et hanc ob rem in Mechanica summo studio est perpendenda, ubi cum peculiaribus nominibus indicari soleat, ea in singulari definitione explicari conveniet.

### DEFINITIO. 15.

153. *Massa corporis vel quantitas materiae* vocatur quantitas inertiae, quae in eo corpore inest, qua tam in statu suo perseverare, quam omni mutationi reluctari conatur.

### COROLL. I.

154. *Massa ergo seu quantitas materiae corporum non ex eorum magnitudine, sed ex quantitate inertiae, qua in statu suo perseverare conantur, omni- que mutationi reluctantur, aestimari debet.*

H

60.

## COROLL. 2.

155. Ex inertia igitur quantitas materiae judicatur, atque id corpus plus materiae continere existimatur, non quod majus volumen occupat, sed ad quod dato modo movendum major vis requiritur.

## COROLL. 3.

156. Praecedens ergo Theorema huc redit, ut, si duo fuerint corpuscula quiescentia, quorum massae sint A et B, quae ab aequalibus viribus sollicitentur, spatiola, per quae ea eodem tempusculo protrudantur, sint reciproce ut massae.

## SCHOLION.

157. Consideratio ergo motus nos ad cognitionem plurimum insignium proprietatum corporum manuduxit, quarum prima est eorum inertia, qua in eodem statu absoluto sive quietis sive motus uniformis rectilinei perseverare conantur. Ac primo quidem inertiam tantum in genere cognovimus, nunc autem luculenter eam esse quantitatem et mensurae capacem intelligimus, qua idem plane significetur, quod vulgo nimis vage nomine massae seu quantitatis materiae exprimi solet, cujus adeo nunc quidem distinctam notionem assecuti videmur. In corporibus igitur praeter extensionem aliquid inest, quod eorum quasi realitatem constituit, eorum scilicet inertia seu materia, quae necessario cum soliditate seu impenetrabilitate conjuncta videtur, quid enim praeter materiam impenetrabile esse possit, nullo modo intelligitur. Neque etiam materiam sine extensione concipere licet, interim tamen in dubio relinquitur, an ea ita necessario cum volumine sit connexa, ut corpora ejusdem molis parem etiam massam seu quantitatem materiae contineant. Nulla certe ratio hujusmodi aequalitatem suadet, atque experientiam consulentes deprehendimus, sub aequali volumine in aliis corporibus plus, in aliis minus materiae concludi. Quanquam enim objici solet, vel non totum volumen materia impleri, vel materiam in poris contentam non ad ipsum corpus pertinere, hinc tamen minime evincitur, omnes corporum particulas aequae magnas etiam pari inertia esse praeditas. Sed haec quaestio imprimis ardua huc non pertinet, etiam si probabile videatur, duplicis saltem generis materias in mundo existere, in quarum altera pro aequali volumine massa multo sit major quam in altera.

THEOREMA. 4.

158. Si corpuscula ratione massae inaequalia quiescant, atque a viribus quibuscunque singula sollicitentur, erunt spatiola, per quae eodem tempusculo protrudentur, in ratione composita ex directa virium et inversa massarum.

DEMONSTRATIO.

Sollicitetur corpusculum quiescens, cujus massa est  $= A$  a vi  $= p$ , a qua tempusculo  $dt$  protrudatur per spatiolum  $= d\omega$ . Iam per Theor. 2. si idem corpusculum  $A$  sollicitaretur ab alia vi  $= q$ , ab ea eodem tempusculo promoveretur per spatiolum  $= \frac{q d\omega}{p}$ ; sin autem aliud corpusculum quiescens, cujus massa  $= B$ , a vi  $= q$  urgeretur, id ab ea eodem tempusculo  $dt$  promoveretur per spatiolum  $= \frac{A q d\omega}{B p}$ , per Theor. 3. Ergo si corpusculum quiescens  $A$  a vi  $= p$ , et corpusculum quiescens  $B$  a vi  $= q$  sollicitetur, spatiola per quae ea eodem tempusculo  $dt$  proferentur, erunt ut  $d\omega$  ad  $\frac{A q d\omega}{B p}$  hoc est ut  $\frac{p}{A}$  ad  $\frac{q}{B}$ .

COROLL. 1.

159. Si ergo spatiolum  $d\omega$  innotuerit, per quod corpusculum, cujus massa  $= A$ , a vi  $= p$  sollicitatum tempusculo  $dt$  protruditur, spatiolum, per quod aliud corpusculum, cujus massa  $= B$  a vi  $= q$  sollicitatum eodem tempusculo  $dt$  propellitur, erit  $= \frac{A q d\omega}{B p}$ .

COROLL. 2.

160. Absolute ergo loquendo erit spatiolum, per quod corpusculum tempusculo  $dt$  promovetur, ut vis sollicitans divisa per massam corpusculi: quod etiam de corpusculo moto valet, si ea, quae supra monuimus, hic probe observentur.

SCHOLION.

161. Quemadmodum igitur effectus virium corpuscula quaecunque sollicitantur tam a quantitate virium, quam a massa corpusculorum pendeat, si quidem tempuscula fuerint aequalia, ita definivimus, ut nullum dubium superesse possit, quin regulae hic tradita necessario sit

H 2

vera.

vera. Comparationem hic quidem tantum instituimus, quae inter spatia illa, et vires et massas intercedit, verum notandum est, inter huiusmodi quantitates heterogeneas nullam determinationem absolutam constitui posse, neque hic aliter ad mensuras absolutas pertingere licet, nisi ut effectus quidam in mundo observatus pro cognito assumatur, atque ad eum tanquam ad unitatem reliqui effectus omnes revocentur, quod quomodo commodissime fieri queat, in sequentibus fusius ostendemus. Ceterum hinc nondum patet, quomodo effectus virium se sit habiturus, quando tempuscula fuerint inaequalia; neque enim licet hinc a tempusculo elapso  $dt$  ad tempusculum sequens  $dt$  progredi, quia corpusculum ob motum priori tempusculo conceptum jam ob inertiam sequente tempusculo aliquod spatium conficeret, cui demum id, quod a vi producitur, esset addendum. Quare ne hinc nostrae determinationes praecedentes turbarentur, tempuscula omnia inter se aequalia assumimus, neque etiam temporis ratio haberi potest, nisi celeritas corpori jam jam impressa consideretur, quam investigationem sequente problemate suscipiemus. Hinc autem vicissim ea, quae hactenus sine respectu ad celeritatem habito sunt prolata, illustrabuntur.

### PROBLEMA 9.

162. Si corpusculum celeritate quacunque moveatur, simulque a vi secundum motus sui directionem sollicitetur, definire mutationem momentaneam in ejus motu et celeritate productam.

### SOLUTIO.

Fig. 15. Sit A massa corpusculi, quod moveatur secundum directionem AB celeritate  $= v$ , qua ob inertiam perpetuo uniformiter in directum esset progressurum, nisi a vi externa sollicitaretur. Scilicet si tempore  $= t$  describeret spatium  $AS = s$ , indeque tempusculo  $dt$  pergeret per spatium  $Ss = ds$ , erit  $\frac{ds}{dt}$  ejus celeritas in S, nempe  $= v$ , quae cum sit constans, fiet  $\frac{d^2s}{dt^2} = 0$ , si nulla affuerit vis. Ponamus autem, corpusculum dum ex S egreditur sollicitari a vi  $= p$  secundum ipsam motus directionem SB: atque evidens est, motum non amplius uniformem esse futurum, sed acceleratum iri, ex quo formula  $\frac{d^2s}{dt^2}$  non erit nihilo aequalis, sed valorem quendam habebit positivum, quoniam vis sollicitans auget celeritatem, in directione nihil mutans. Verum quia

## DE CAUSIS MOTUS EXTERNIS SEU VIRIBUS. 61

quia haec formula  $\frac{dds}{dt^2}$  involvit illud spatium, per quod corpusculum ultra spatium motu infito descriptum profertur, erit ea directe ut vis sollicitans  $p$  et reciproce ut massa  $A$ , seu  $\frac{dds}{dt^2}$  erit ut  $\frac{p}{A}$ . Absoluta autem aequalitas constitui nequit, nisi omnes quantitates ad determinatas unitates reducantur; tantisper igitur liceat, hanc aequalitatem ita indefinite exhibere, ut sit  $\frac{dds}{dt^2} = \frac{\lambda p}{A}$ , ubi  $\lambda$  denotat numerum per unitates infra stabiliendas determinandum. Effectus ergo vis sollicitantis  $p$  in hoc consistit, ut sit  $dds = \frac{\lambda p dt^2}{A}$ : sumto elemento  $dt$  constante. Et cum celeritas sit  $v = \frac{ds}{dt}$ , erit  $dds = dv dt$ , ideoque  $dv = \frac{\lambda p dt}{A}$ ; unde celeritatis incrementum innotescit, quod vis  $p$  in corpusculo  $A$  tempusculo  $dt$  producit, siquidem directio vis cum directione motus conveniat, ab eaque motus acceleretur.

### COROLL. 1.

163. Effectus ergo vis sollicitantis  $p$  in corpusculum, cujus massa  $= A$  et quod secundum eandem directionem movetur celeritate  $= v$ , qua tempusculo  $dt$  conficeret spatium  $= ds$ , in hoc consistit, ut sit  $\frac{dds}{dt^2} = \frac{\lambda p}{A}$ : sumto  $dt$  constante, seu  $dv = \frac{\lambda p dt}{A}$ .

### COROLL. 2.

164. Vicissim ergo si acceleratio motus sit cognita, quae est vel  $\frac{dds}{dt^2}$  vel  $\frac{dv}{dt}$ , vis sollicitans assignari potest, eam producens, erit scilicet vis ista  $p = \frac{A}{\lambda} \cdot \frac{dds}{dt^2}$  vel  $p = \frac{A}{\lambda} \cdot \frac{dv}{dt}$ : quae secundum ipsam motus directionem urgere est censenda.

### COROLL. 3.

165. Sin autem directio vis sollicitantis  $p$  directioni motus fuerit opposita, ab ea motus tantumdem retardabitur, eritque  $\frac{dds}{dt^2} = -\frac{\lambda p}{A}$

vel  $\frac{dv}{dt} = -\frac{\lambda p}{A}$ : vis scilicet respectu casus praecedentis tanquam negativa spectari potest.

## EXPLICATIO.

166. Cum hic invenerimus  $dds = \frac{\lambda p dt^2}{A}$ , ideoque corpusculum tempusculo  $dt$  spatium  $ds + dds$  percurrere sit censendum, cum motu infito tantum spatium  $ds$  confecturum fuisset, videtur  $dds$  id ipsum esse spatium, quod ultra id, per quod motu infito ferretur, ob vim sollicitantem percurritur, ita ut  $\frac{\lambda p dt^2}{A}$  esset id spatium  $d\omega$  per quod corpusculum A quiescens a vi  $p$  tempusculo  $dt$  protrudi assumimus. Verum observandum est, hic  $dds$  exprimere excessum spatii, tempusculo  $dt$  percursum, supra id quod tempusculo praecedente  $dt$  percursum fuisset eadem agente vi  $p$ . Quare si spatium praesente tempusculo  $dt$  percursum sit  $ds + d\omega$ , denotante  $ds$  spatium motu infito descriptum et  $d\omega$  spatium a vi  $p$  adiectum; praecedente tempusculo  $dt$ , si ab eadem vi fuerit sollicitatum, tantum spatium  $ds - d\omega$  confecisset, minus scilicet, quam si nullam actionem fuisset passum. Cum igitur  $dds$  exprimat differentiam inter haec duo spatia  $ds + d\omega$  et  $ds - d\omega$ , erit  $dds = 2d\omega$ , ideoque  $d\omega = \frac{1}{2} dds = \frac{\lambda p dt^2}{2A}$ , unde patet spatium  $d\omega$ , per quod corpusculum A quiescens a vi  $p$  tempusculo  $dt$  propellitur, duplo minus esse quam nostrum  $dds$ . In solutione quidem id non aequale sed tantum proportionale assumi, ita ut hinc ei nihil roboris deesse sit putandum. Interim hoc adhuc alio modo ostendisse, operae erit pretium.

## PROBLEMA 10.

167. Data acceleratione, quae corpusculo moto A a data vi  $p$  secundum directionem motus sollicitante tempusculo  $dt$  inducitur, definire spatium  $d\omega$ , per quod idem corpusculum A quiescens ab aequali vi  $p$  sollicitatum eodem tempusculo  $dt$  protruderetur.

## SOLUTIO.

Ob datam accelerationem habemus ex superioribus  $dds = \frac{\lambda p dt^2}{A}$  sumto elemento  $dt$  constante. Concipiamus jam vim sollicitantem  $p$  eandem

## DE CAUSIS MOTUS EXTERNIS SEU VIRIBUS. 63

eandem manere, five corpusculum celerius five tardius moveatur, ita ut quantitas  $p$  pro constante haberi possit; vel potius determinemus hinc motum per tempus aliquod  $t$ , quod tamen ipsum adhuc sit infinite parvum, ita ut dubium nullum superfit, quin vis  $p$  interea maneat constans.

Cum igitur habeamus  $\frac{dds}{dt} = \frac{\lambda p dt}{A}$  erit integrando  $\frac{ds}{dt} =$

$C + \frac{\lambda p t}{A}$ , seu  $ds = C dt + \frac{\lambda p dt^2}{A}$ , quae denuo integrata dat:

$$s = C t + \frac{\lambda p t^2}{2A};$$

quod est spatium tempore  $t$  confectum, cujus pars  $Ct$  denotat spatium, quod corpusculum  $A$  solo motu infito percursurum fuisset, si a nulla

vi sollicitaretur; pars autem  $\frac{\lambda p t^2}{2A}$  est ejus augmentum ab actione vis in super adjectum. Statuatur jam totum tempus  $t$  infinite parvum, et loco

$t$  scribatur  $dt$ , atque  $\frac{\lambda p dt^2}{2A}$  exprimet spatium  $d\omega$ , per quod corpusculum  $A$  ultra id, quod motu infito percurreret, tempusculo  $dt$  a vi  $p$  propelleretur; cui cum aequale sit id spatium  $d\omega$ , per quod idem corpusculum  $A$  quiescens eodem tempusculo  $dt$  ab aequali vi  $p$  protruderetur, habebimus  $d\omega = \frac{\lambda p dt^2}{2A}$ , seu  $d\omega = \frac{1}{2} dds$ , uti jam ante innuimus.

### COROLL. 1.

168. Spatium ergo, per quod corpus  $A$  quiescens tempusculo infinite parvo  $dt$  a vi  $p$  urgetur, est differentiale secundi gradus seu infinites minus est spatio, quod celeritate quacunque finita eodem tempusculo describeret.

### COROLL. 2.

169. Hoc porro spatium  $d\omega = \frac{\lambda p dt^2}{2A}$  est dimidium differentio-differentialis  $dds$ , quod eodem tempusculo  $dt$  ab eadem vi  $p$  in eodem corpusculo  $A$  utunque moto producit.

### COROLL. 3.

170. Hinc jam cognoscimus, istud spatium  $d\omega$ , quod supra visollici-



sollicitanti  $p$  directe et massae  $A$  reciproce proportionale ostendimus, insuper sequi rationem duplicatam tempusculi  $dt$ .

### SCHOLION.

171. Ex his ergo valeamus definire effectus virium in corpuscula utcumque mota, dummodo directio vis sollicitantis cum directione motus conveniat, seu ei fuerit contraria. Superest ergo, ut inquiramus, quomodo is se sit habiturus, quando directio vis ad motus directionem est obliqua, quae investigatio facillime instituetur, motum corpusculi secundum praecepta supra tradita secundum duas vel tres directiones fixas resolvendo; etsi enim haec resolutio tantum est idealis, tamen uti per se est veritati consentanea, ita etiam ad actionem virium felicissimo successu accomodatur, atque hoc pacto totum negotium per eandem formulam absolvetur. Quoniam enim a viribus obliquis non solum celeritas corpusculi sed etiam directio immutatur, tamen haec posterior mutatio simul in mutatione motuum lateralium comprehenditur, ita ut peculiaribus formulis pro inflexione directionis planae non sit opus. Quomodo igitur his casibus calculum instrui oporteat, ostendamus.

### PROBLEMA. II.

Fig. 16.

172. Si corpusculum, dum data celeritate secundum directionem  $Ss$  movetur, a vi quadam secundum directionem  $Sp$  sollicitetur, definire ejus effectum in motu corporis dato tempusculo  $dt$  productum.

### SOLUTIO.

Sit  $A$  massa corpusculi, quod motu infito percurreret spatium  $Ss = ds$  tempusculo  $dt$ , ita ut ejus celeritas in  $S$  sit  $= \frac{ds}{dt}$ : sollicitetur autem interea secundum directionem  $Sp$  vi  $= p$ , atque hujus vis effectus in hoc consistet, ut elapso tempusculo  $dt$  non in  $s$  sed  $\sigma$  reperiatur, translatumque sit insuper per spatium  $s\sigma = d\omega = \frac{\lambda p dt^2}{2A}$ , directioni vis  $Sp$  parallelum. Ad quem effectum commodius repraesentandum resolvatur motus secundum binas directiones  $Sp$  et  $Sq$  quascunque, quarum altera  $Sp$  conveniat cum directione vis, ita ut si nulla vis adesset, corpusculum describeret secundum directionem  $Sp$  spatium  $Sp = dx$  et secundum directionem  $Sq$  spatium  $Sq = dy$ , completo parallelogrammo  $Spq$ . Cum autem accedente vi  $p$  elapso tempusculo  $dt$  in  $\sigma$  reperiatur, ducta  $\sigma\pi$  ipsi  $sp$  parallela, motus idem erit, ac si secundum directionem  $Sp$  descripsisset spatium  $S\pi =$

$Sx = dx + d\omega$ , secundum directionem vero  $Sq$  spatium  $Sq$  ut ante.  
 A vi ergo  $p$  tantum motus lateralis secundum directionem  $Sp$ , qua ipsa  
 vis  $p$  agit, afficitur, altero motu laterali secundum  $Sq$  manente im-  
 mutato, atque motus secundum  $Sp$  ita accelerabitur, ut sit  $ddx =$

$2d\omega$ , seu  $ddx = \frac{\lambda p dt^2}{A}$ . Quare si motus secundum binas vel etiam  
 ternas directiones resolvatur, quarum una cum directione vis  $Sp$  con-  
 veniat, hic motus solus a vi afficitur perinde, ac si corpusculum revera  
 secundum hanc directionem moveretur, reliquique motus laterales ni-  
 hil omnino ab ista vi patientur.

COROLL. 1.

173. Quemadmodum ergo, facta hac motus resolutione, si nulla ad-  
 esset vis sollicitans, foret  $\frac{ddx}{dt^2} = 0$  et  $\frac{ddy}{dt^2} = 0$ , ita accedente vi  $p$  se-  
 cundum directionem  $Sp$  sollicitante erit  $\frac{ddx}{dt^2} = \frac{\lambda p}{A}$ , manente  $\frac{ddy}{dt^2} = 0$ .

COROLL. 2.

174. Simili modo si motus per  $Sf$  in ternos motus resolvatur, et  
 elementa per eos seorsim descripta tempusculo  $dt$  sint  $dx$ ,  $dy$ , et  $dz$ ,  
 quorum primum  $dx$  in directione vis sollicitantis  $p$  sit sumtum, motus  
 his tribus formulis continebitur:

$$\frac{ddx}{dt^2} = \frac{\lambda p}{A}, \quad \frac{ddy}{dt^2} = 0, \quad \text{et} \quad \frac{ddz}{dt^2} = 0.$$

COROLL. 3.

175. Hinc etiam colligitur, si corpusculum  $A$  simul tribus viribus  $p$ ,  
 $q$ , et  $r$  sollicitetur, secundum ternas illas directiones, in quibus ele-  
 menta  $dx$ ,  $dy$ , et  $dz$  assumuntur, motum corporis per has formulas  
 determinatum iri:

$$\frac{ddx}{dt^2} = \frac{\lambda p}{A}, \quad \frac{ddy}{dt^2} = \frac{\lambda q}{A} \quad \text{et} \quad \frac{ddz}{dt^2} = \frac{\lambda r}{A}.$$

SCHOLION. I.

176. Quando motus corpusculi, uti supra docuimus, secundum ter-  
 nas directiones quasunque fixas resolvitur, a quibuscunque viribus  
 corpusculum sollicitetur, perturbatio motus facile hujusmodi formulis  
 determinari potest. Vires enim sollicitantes omnes secundum has eas-  
 dem ternas directiones resolvantur, unde resultent istae vires  $p$ ,  $q$ ,  $r$ , Fig. 4.  
 I quorum

quarum prima  $p$  urgeat secundum directionem OA, in qua elementum  $dx$ , secunda secundum directionem OB, in qua elementum  $dy$ , et tertia secundum directionem OC, in qua elementum  $dz$  capitur, tendantque singulae vires ad motus secundum istas directiones accelerandos. Quo facto motus ita perturbabitur, utposito elemento temporis  $dt$  constante futurum sit

$$\text{I. } \frac{ddx}{dt^2} = \frac{\lambda p}{A}; \quad \text{II. } \frac{ddy}{dt^2} = \frac{\lambda q}{A}; \quad \text{III. } \frac{ddz}{dt^2} = \frac{\lambda r}{A}.$$

ubi notandum, si quae harum virium in plagam oppositam urgeat, eam negative sumi debere, ita ut motus lateralis ei respondens retardetur. Atque hujusmodi ternis formulis perturbatio omnium motuum, quomocunque etiam corpusculum a viribus sollicitetur, includi poterit, quae cum sint similes inter se, universa Mechanica unico adeo principio inniti est censenda.

#### SCHOLION. 2.

177. Quin etiam hoc unicum principium complectitur axiomata praecedentis capitis pro motu spontaneo, seu casu, quo vires sollicitantes evanescunt: tum enim nostrae formulae declarant motum aequabilem rectilineum. Totius ergo Mechanicae fundamentum hac una propositione includitur:

*Si corpusculum cujus massa = A sollicitetur a vi = p; ac per motus resolutionem in directione hujus vis, tempusculo dt conficiat spatium ds, celeritate  $\frac{ds}{dt} = v$ , erit*

$$\frac{dds}{dt^2} = \frac{\lambda p}{A} \quad \text{feu} \quad dv = \frac{\lambda p dt}{A}.$$

*Vel augmentum celeritatis, secundum directionem vis sollicitantis acceptum, est directe ut vis sollicitans ducta in tempusculum, et reciproce ut massa corpusculi.*

Iam quaestio agitari solet, utrum hoc unicum principium, cui tota Mechanica atque adeo universa Motus scientia superstruitur, sit necessario, an tantum contingenter verum? Cujus decisio ex hactenus demonstratis haud difficilis videtur. Ubicunque enim corpora existunt, aliae certe leges in eorum motu locum habere nequeunt; omnesque aliae formulae praeter  $\frac{pdt}{A}$ , quibus quis incrementum celeritatis proportionale statuere voluerit, manifestas contradictiones essent implicaturae. Quare nullo modo dubitare licet, quin hoc principium inter

ter veritates necessarias sit referendum. Atque non solum super terra, ubi ejus veritatem experimentis comprobare licet, sed etiam in planetis cunctisque adeo corporibus coelestibus audacter pronunciare possumus, omnes motus, quicunque ibi fuerint, per hoc unicum principium dirigi ac temperari. Quæstio autem hæc de necessitate et contingentia non tam de isto principio, quam de aliquot aliis regulis, quæ sub nomine legum motus circumferuntur; moveri solet. Verum quatenus hæc leges rite ex nostro principio consequuntur, æque erunt pro necessariis habendæ: quæ deinde ad certa corporum genera, veluti elastica, non-elastica, et fluida astringuntur, eæ concessis talibus corporibus pariter non veræ esse non possunt, dummodo ex nostro principio recte sint deductæ.

### SCHOLION. 3.

178. In superioribus de Mechanica Libris equidem principia hujus scientiæ jam ita constitueram, ut eorum certitudo extra omnem dubitationem esset posita: hic autem visum est, ea alio modo ex natura corporum accuratius perpenſa derivare, atque ad unicum principium derivare, ex quo deinceps omnia quæ ad motum pertinent facilius deduci possent. Quanquam autem omnia, quæ ad motum corpusculorum infinite parvorum seu quasi punctorum spectant, ibi jam fusius sum persecutus, tamen quemadmodum eadem ex isto unico principio sint repetenda, breviter exposuisse juvabit, quæ quidem ita pertractabo, ut via ad motus corporum finitorum scrutandos planior reddatur. Imprimis autem, cum hic tantum rationem seu proportionalitatem inter diversas quantitates notitiam motus ingredientem, quæ per se sunt heterogeneæ, definiverim, quæ ad mensuras absolutas revocari nequeunt, nisi motus quidam pro cognito assumatur; hic omnino necesse est, antequam ulterius progrediamur, motum quendam cognitum, cujusmodi est lapsus gravium, studiosius evolvere, indeque mensuras absolutas stabilire, quibus deinceps consimode uti queamus. Etsi vero assumptio talis motus ab arbitrio nostro pendet, et ad experientiam deducitur, tamen hinc necessitati principii nostri nihil detrahitur, cum arbitrarium tantum se ad mensuras absolutas extendat, hæque ab unitatibus certis omnino arbitrariis pendeant.





## CAPUT IV.

### DE MENSURIS ABSOLUTIS EX LAPSU GRAVIUM PETITIS.

#### DEFINITIO. 16.

179. **G**ravitas est vis, qua omnia corpora circa terrae superficiem deorsum urgentur; et vis, qua quodvis corpus ob gravitatem deorsum sollicitatur, ejus *pondus* vocatur.

#### COROLL. 1.

180. Gravitas ergo est causa externa, quae corpora terrestria deorsum pellit; neque igitur ipsis corporibus tanquam proprietas quaedam tribui potest.

#### COROLL. 2.

181. Corpus itaque circa superficiem terrae dimissum, etiamsi quieverit, ad motum deorsum incitatur, ac tamdiu labetur, donec obstacula lapsum arcentia inveniat.

#### COROLL. 3.

182. Quamdiu autem lapsus impeditur, sive corpus objecto immobili incumbat, sive sit suspensum, ejus pondus se per pressionem exerit.

#### EXPLICATIO.

183. Quotidiana experientia abunde testatur, omnia corpora, quae sub sensus cadunt, esse gravia: ac si quae potius levia videntur, dum sursum nituntur, causa aeri est tribuenda, quo sublato etiam levissima corpora aequae prompte delabuntur, atque gravissima. Hic autem cogitationem ab omnibus obstaculis, quae lapsui corporum se opponere solent, abstrahimus. Experimentis autem in subsidium vocatis discimus, remotis omnibus motus obstaculis, primo omnia corpora aequae celeriter delabi, et secundo sive quiescant sive jam moveantur pari vi deorsum urgeri. Haec ergo duo phaenomena tanquam cognita assumo, et si ampliorem motus notitiam requirant; cum hic tantum fixas mensuras stabilire sit propositum; undecunque enim nobis innotuerint, ad hunc scopum nihil interest.

#### SCHOLION.

184. Gravitatem esse vim externam, quae in corpora extrinsecus agat,

## CAPUT IV. DE MENSURIS ABSOLUTIS &c. 69

agat; eaque deorsum impellat, etiam ii agnoscunt, qui ejus causam in attractione ponunt. Corpora enim non proprio quodam instinctu terram versus urgeri, sed a vi terrae attractrice attrahi statuunt. Rem scilicet ita concipiunt, quasi terra quaquaversus vires emitteret, quae corpora ambientia complexae terram versus impellant; neque vero hanc virium emissionem ope medii interjecti fieri putant, sed eam pariter locum habere volunt, etiamsi omnis materia inter terram et corpora tolleretur. Foret ergo gravitas vis immaterialis in corpora agens, verum cum terra ita conjuncta, ut hac sublata simul evanesceret; perinde igitur esset, ac si spiritus quidam corpora deorsum concitaret; quomodo enim aliter vis sese a terra per longinquas distantias sine admiculo cujusquam materiae interjacentis propagare possit, nullo modo intelligere licet. Finge enim duo corpora A et B ad magnam distantiam a se invicem remota, inter quae nulla plane materia existat, atque circa corpus A nihil omnino aderit, quod ad corpus B pertineat; neque quicquam in corpore A mutabitur, etiamsi corpus B prorsus tollatur, ex quo hujusmodi emissio virium rationi contraria videtur. Quin potius veritati consentaneum est, vim gravitatis ab actione cujuspiam materiae subtilis sensus nostros effugiente oriri; etiamsi enim modum, quo talis vis produceretur, luculenter monstrare non liceret, tamen ad hujusmodi qualitates occultas confugere minime deceret. Verum in fluidis ejusmodi vires oriri posse, in Hydrodynamica docetur. Quando autem fautores attractionis dicunt, a Deo Telluris vim attractivam esse inditam, nihil aliud dicunt, nisi corpora ab Ipso Deo immediate terram versus impelli. Perpendamus ergo in genere descensum corpusculi a gravitate deorsum sollicitati.

### PROBLEMA. 12.

185. Si corpusculum continuo deorsum sollicitetur a vi constante, motumque a quiete incipiat, ad datum tempus altitudinem confectam, et celeritatem quam acquisiverit, determinare.

### SOLUTIO.

Sit A massa corpusculi, quod primum in A quieverit, unde conti- Fig. 17.  
nuo deorsum urgeatur a vi constante  $= p$ , cujus actione remotis omnibus obstaculis per lineam rectam verticalem AG descendet. Pervenerit ergo elapso tempore  $= t$  in S, confecta altitudine  $AS = s$ ; ac sumto temporis elemento  $dt$  constante, ejus motus hac aequatione definitur

I 3

$dds$

$dds = \frac{\lambda p dt^2}{A}$ , seu  $\frac{ds}{dt} = \frac{\lambda p t}{A}$ , cujus integrale est  $\frac{ds}{dt} = \frac{\lambda p t}{A} + \text{Const.}$  At  $\frac{ds}{dt}$  exprimit celeritatem in S, quae cum in A ubi  $t = 0$  per hypothefin fuerit nulla, constans integratione ingressa evanescit, ita ut habeatur celeritas  $\frac{ds}{dt} = \frac{\lambda p t}{A}$ . Porro per  $dt$  multiplicando fit  $ds = \frac{\lambda p t dt}{A}$ , quae denuo integrata dat  $s = \frac{\lambda p t^2}{2A}$ , quoniam posito tempore  $t = 0$ , altitudo AS =  $s$  evanescere debet. Elapso ergo tempore  $t$  corpusculum descendit per altitudinem AS =  $s = \frac{\lambda p t^2}{2A}$ , ibique in S acquisivit celeritatem  $\frac{ds}{dt} = \frac{\lambda p t}{A}$ .

## COROLL. 1.

186. Altitudo ergo lapsu confecta proportionalis est quadrato temporis, celeritas vero acquisita ipsi temporis; utrinque autem accedit ratio directa vis sollicitantis  $p$  et inversa massae  $A$ .

## COROLL. 2.

187. Celeritas in S acquisita  $\frac{ds}{dt}$  tanta est, qua si corpus uniformiter moveretur, eodem tempore  $t$  conficeret spatium  $= \frac{t ds}{dt} = \frac{\lambda p t^2}{A}$ , quod ergo est duplum altitudinis descriptae  $s = \frac{\lambda p t^2}{2A}$ .

## COROLL. 3.

188. Cum omnia corpora remotis obstaculis aequae celeriter descendant, uti experientia testatur, necesse est, ut  $\frac{\lambda p}{A}$  seu  $\frac{p}{A}$  sit quantitas constans. Quare vis quodlibet corpus deorsum sollicitans  $p$  seu ejus pondus ad ejus massam  $A$  eandem tenet rationem.

## EXPLICATIO.

189. Quando ergo quaestio est de lapsu corporum gravium, littera  $p$  exprimet corporis pondus, cujus distinctam habemus ideam, cum adeo

adeo mensurae ponderum sint notissimae, littera  $A$  vero ejusdem corporis massam denotat, cujus cognitio per se occultior ex hoc ipso satis clare percipitur, quod sit ponderi proportionalis. Deinde temporis  $t$  etiam claram habemus notionem, cum ejus quantitatem per mensuras certissimas, veluti minuta secunda, vel minuta prima, vel horas exprimere valeamus. Altitudo autem  $s$ , cum sit linea recta, per mensuras geometricas definitur. Verum littera  $\lambda$ , qua porportionalitas determinatur, per se definitum valorem non recipit, sed prout reliquae quantitates ad alias atque alias mensuras seu unitates referuntur, ita etiam illi alii atque alii valores tribui debent. Statim autem ac reliquas quantitates  $p$ ,  $A$ ,  $t$  et  $s$  per determinatas mensuras exprimimus, littera  $\lambda$  determinatum valorem adipiscitur, qui ita comparatus esse debet, ut pro unico casu veritatem exhibeat, tum enim perpetuo eundem valorem retinebit, quamdiu scilicet iisdem mensuris utemur. Hic autem valor ex experientia peti debet, cum etiam mensurae assumtae experientiae innitantur; hinc vero discimus, quanta sit altitudo, per quam corpus grave dato tempore delabitur, unde litterae  $\lambda$  talis valor tribui

debebit, ut formula nostra pro altitudine inventa  $s = \frac{\lambda p t t}{2A}$ , si ad istum casum accommodetur, hanc ipsam altitudinem, quam experientia declarat, exhibeat.

### SCHOLION.

190. Omnia ergo huc redeunt, ut pro omnibus quantitativis in nostras formulas ingredientibus mensuras certas stabiliamus, quibus in posterum constanter utamur, si quidem omnium motuum phaenomena per mensuras cognitae exprimere velimus. Sunt autem quinque genera quantitatum, quibus omnis motus determinatio continetur.

1°. Spatium percursum, quod cum sit linea ideoque quantitas geometrica, ejus mensura nulli dubio est subjecta.

2°. Tempus, cujus mensura cum sit notissima, cardo rei in hoc versatur, quantum tempus pro unitate assumere velimus.

3°. Celeritas, cujus cognitio planior esse nequit, quam si spatium assignare valeamus, quod ea celeritas dato tempore uniformiter esset percursura.

4°. Vis sollicitans ad mensuras cognitae erit revocanda.

5°. Massa corporum motorum in calculum ingreditur, cujus quantitas; quomodo aestimari debeat, quoque erit statuendum.

Quorum quaque quantitatum generum cum primum nulla difficultate



cultate laboret, quomodo quatuor reliqua per mensuras cognitae aptissime in calculum introducantur, iisque convenienter littera  $\lambda$  definiatur, in sequentibus hypothesebus stabiliamus.

#### HYPOTHESIS. I.

191. *Vires sollicitantes per pondera illis aequalia constanter exprimamus.*

#### EXPLICATIO.

192. Haec virium expressio per pondera nullam habet difficultatem, cum enim pondus cujusque corporis sit vis, qua id deorsum sollicitatur, vires sollicitantes et pondera sunt quantitates inter se homogeneae; et a quacunque vi aliquod corpus sollicitetur, semper corpus concipere licet, quod in superficie terrae positum pari vi deorsum sollicitaretur; hujusque corporis pondus justam illius vis mensuram exhibebit. Et quando quaestio est de tanta vi, ut nullum corpus circa terrae superficiem existere possit, quod aequale pondus haberet, sufficiet nosse, quoties illa vis major sit, quam pondus modici corporis in terrae superficie existentis; si quidem hinc quantitas illius vis aequae certe definiri poterit. Cum autem nunc quidem compertum sit, eadem corpora in omnibus terrae regionibus non paribus viribus deorsum impelli, certa quaedam terrae regio ad hanc mensuram eligi debet, ad quam etiam reliquae mensurae deinceps exponendae accommodentur. Nihil enim interest, quamnam regionem adhibeamus, dummodo in eadem experimenta, quibus sequentes mensurae innituntur, capiantur.

#### HYPOTHESIS. 2.

193. *Massam cujusque corporis per pondus exprimamus, quod idem in regione terrae constitutum esset habiturum.*

#### EXPLICATIO.

194. Ratio hujus mensurae in hoc est sita, quod pondera corporum massis eorum sint proportionalia; quare pondus cujusque corporis justam massae ejus mensuram praebere est censendum. Quando autem quaestio est de massis corporum extra terram versantium, ea saltem mente in terram, et eam quidem ejus regionem, unde virium mensuras hausimus, sunt transferenda. Hinc massa cujusque corporis nobis mensurabitur pondere, quod idem corpus, si in illa regione esset collocatum, haberet. Si de corporibus quaereretur, quae ob magnitudinem a memorata regione capi non possent, ea per partes essent consideranda; vel adeo sufficiet rationem nosse, quam massa corporis propositi teneat

## ABSOLUTIS EX LAPSU GRAVIUM PETITIS. 73

teneat ad massam alicujus dati corporis in ea regione existentis. Hoc modo vires et massae ad quantitates homogeneas sunt perductae, cum ambo per pondera simus expressuri; et quoniam in nostris formulis perpetuo vires per massas divisae occurrunt, perinde est quam unitate in ponderibus dimetiendis utamur, siue libra siue uncia; semper enim quotus ex divisione vis cujuscumque per massam resultans numero absoluto exprimitur. Atque casu quidem gravitatis, cum tam vis sollicitans  $p$  quam massa corporis  $A$  per ejus pondus exprimatur, erit  $\frac{p}{A} = 1$ , unde elapso tempore  $t$  grave descendit per altitudinem  $s = \frac{1}{2} \lambda t^2$ , et acquirit celeritatem  $\frac{ds}{dt} = \lambda t$ , qua corpus uniformiter latum tempore  $t$  percurrent spatium  $= \lambda t^2 = 2s$ .

### HYPOTHESIS. 3.

194. *In dimetiendis temporibus perpetuo minutum secundum pro unitate assumamus.*

### EXPLICATIO. 2.

Quod minutum secundum sit pars sexagies sexagies vigesima quarta diei naturalis, satis notum est, cum dies in 24 horas, una hora in 60 minuta prima, et unum minutum primum in 60 minuta secunda dividi soleat. Diem autem hic assumo medium solarem, quo sol secundum tempus medium circa terram revolvi censetur. Quod tempus si forte non per omnia secula ejusdem durationis videatur, sufficit ejus quantitatem pro data quadam aetate nosse, et ea quidem, unde mensura massarum ex corporum ponderibus petitur. Quare si tempus quodpiam littera  $t$  designemus, haec littera erit numerus absolutus indicans, quot minuta secunda in tempore illo contineantur. Est autem haec temporis mensura commodissima, cum in omnibus experimentis tempora in minutis secundis notari soleant; fractiones etiam nimis frequentes hoc modo evitabimus, quae occurrerent, si majus temporis spatium pro unitate assumeremus.

### HYPOTHESIS. 4.

196. *Celeritatem commodissime metiemur per spatium, quod corpus ea celeritate uniformiter motum singulis minutis secundis percurrat.*

### EXPLICATIO.

Celeritatem sane clarius non cognoscimus, quam si spatium assignare valuerimus, quod corpus ea celeritate uniformiter latum uno

K

mi.

minuto secundo percurrent: ita si dicam, globum ex tormento explosum tantam habere celeritatem, qua uno minuto secundo spatium 1000 pedum percurreret, nemo non adaequatam hujus celeritatis ideam habebit. Hoc ergo modo celeritates et spatia percurfa per quantitates homogeneas, lineas scilicet, exprimentur, et cum tam tempora, quam vires ad massas applicatae, numeris absolutis exhibeantur, in formulis nostris duplicis tantum generis quantitates relinquentur, alterae lineae geometricae, alterae numeri absoluti.

#### HYPOTHESIS. 5.

197. Denotet in posterum nobis perpetuo littera  $g$  altitudinem, per quam grave uno minuto secundo libere delabitur.

#### EXPLICATIO.

198. Per observationes et experimenta summo studio in hunc finem instituta compertum est, corpus grave de quiete libere descendens primo minuto secundo delabi per altitudinem  $15 \frac{1}{2}$  pedum Rhenanorum, ita ut adhibita talium pedum mensura esset  $g = 15 \frac{1}{2}$ . Sed quia gravitas non ubique terrarum eadem deprehenditur, haec quantitas non satis est fixa. Hinc supra jam monui, certam in terra regionem esse eligendam, quorsum tam vires quam massae per pondera experimentandae referantur; hac autem regione constituta ibidem altitudo  $g$ , ex qua grave uao minuto secundo libere descendit, per experimenta accurate definitur. Adjicere possem aetatem, unde simul mensura minutorum secundorum desumatur, si quis putet, labentibus saeculis dierum mediorum durationem alterari. Verum quaecunque regio ad hoc institutum eligatur perinde est, et dum omnes haecenus commemoratae mensurae eo redigantur, conclusiones denique consentire debent; unde patet, has mensuras ad arbitrium nostrum constitutas ipsa Mechanicae principia non afficere, nihilque eo arbitrarii induci, cum ijs tantum id efficiatur, ut ad conclusiones in mensuris cognitis expressas perveniamus.

#### THEOREMA. 5.

199. Omnibus quantitibus secundum Hypotheses modo traditas ad mensuras revocatis, pro littera  $\lambda$  in formulis superioribus assumi debet dupla altitudo  $g$ , per quam grave uno minuto secundo delabitur.

#### DEMONSTRATIO.

Pro lapsu gravium enim, si secundum nostras hypothesen vis  $p$  et

Fig. 17. massa  $A$  exprimatur, erit  $\frac{p}{A} = 1$ , et altitudo, per quam tempore  $t$  delabitur

# ABSOLUTIS EX LAPSU GRAVIUM PETITIS. 75

labitur fiet  $AS = s = \frac{1}{2} \lambda t t$ . Hinc porro tempore  $t$  in minutis secundis expreffo fi ftatuatur  $t = 1$ , pro  $s$  prodire debet altitudo illa  $g$ , per quam grave uno minuto fecundo delabi eft affumptum, unde cum fiat  $g = \frac{1}{2} \lambda$  evidens eft, ftatui debere  $\lambda = 2g$ . Tum vero celeritas in fine minuti fecundi acquifita erit  $\frac{ds}{dt} = \lambda t = \lambda = 2g$ , Haec fcilicet celeritas tanta erit, ut corpus ea uniformiter latum fingulis minutis fecundis percurreret fpatium  $= 2g$ , prorfus ut noftra recepta celeritatem menfurandi ratio exigit.

## COROLL. 1.

200. Denotat ergo  $\lambda$  non numerum, fed lineaem, quae cum fpatio percurfo  $s$  eft homogenea, dum reliquae quantitates  $t$  et  $\frac{p}{A}$  numeris abfolutis experimentur.

## COROLL. 2.

201. Si ergo corpusculum quiefcens, cujus maffa  $= A$ , a vi  $= p$  follicitatur, ab ea tempusculo  $dt$  protrudetur per fpatiolum  $= \frac{g p dt^2}{A}$ ; adhibendo fcilicet perpetuo menfuras praefcriptas.

## COROLL. 3.

202. Ac fi corpusculum  $A$  jam movetur, et a vi  $= p$  follicitatur, tum, refolutione motus inftituta, ejus motus lateralis, quo fecundum directionem vis follicitantis fertur, et tempusculo  $dt$  fpatiolum  $= dx$  conficit, ita variabitur, ut fit  $ddx = \frac{2gp dt^2}{A}$ , et  $\frac{ddx}{dt} = \frac{2gp dt}{A}$ , ubi  $\frac{ddx}{dt}$  eft incrementum celeritatis fecundum hanc directionem.

## COROLL. 4.

203. Si porro hinc celeritas motus lateralis fecundum hanc directionem colligatur, quae eft  $\frac{dx}{dt}$ , ea fecundum noftram receptam menfuram ita exprimetur, ut indicet fpatium, quod corpus ifta celeritate uniformiter motum uno minuto fecundo effet percurfurum.

## SCHOLION.

204. Talibus ergo unitatibus et menfuris, quales descripfimus, adhibitis, fi pro  $\lambda$  feribatur  $2g$ , ex formulis noftris deinceps omnes motus ad menfuras abfolutas facillime revocabimus: haecque ratio mul-

## 76 CAPUT IV. DE MENSURIS ABSOLUTIS &c.

to commodior videtur, quam illa, qua antehac fueram usus, ubi celeritates per radicem quadratam ex altitudinibus, per quas grave labendo pares acquireret celeritates, expresseram; quem in finein loco celeritatum altitudines ipsis debitas in calculum introduxeram. Verum ex altitudine celeritati debita ipsa celeritas non tam perspicue cognoscitur; sed calculo quodam opus est, ut ad mensuras solitas reducat. Deinde etiam temporis ratio peculiari calculo eget, quo nova quaedam unitas in calculum induci debet, ut tempus in minutis secundis eliciatur. Has ergo ambages tam ratione celeritatum quam temporum penitus evitabimus, si praescriptis mensuris utamur: totum autem discrimen in hoc est positum, quod ante in formulis generalibus littera  $\lambda$  fractionem absolutam  $\frac{1}{2}$  significaverat, hic autem pro ea linea =  $2g$  scribatur. Unde si quis priorem modum secutus calculum pro quopiam motu definiendo instituerit, ejus calculus facile ad hunc modum reducetur, indeque promptissime omnes mensurae absolutae innotescunt. Hinc etiam homogeneitas in aequationibus motum complectentibus facilius perspicitur, cum tantum spatia percurra et littera  $g$  sint quantitates lineares et quasi unitis dimensionis, cujus generis quoque sunt celeritates, si forte in calculum introducantur: tempora autem  $t$  cum fractionibus  $\frac{p}{A}$  huic similibus numeris absolutis exprimantur, qui nullam dimensionem constituere sunt censendi. In calculo autem, ad modum ante usurpatum instituto, tam celeritates quam tempora per radices quadratas ex quantitibus linearibus exprimebantur, quae adeo dimidiam tantum dimensionem constituere sunt existimanda. Repudiato ergo isto superiori modo ad mensuras absolutas perveniendi hunc novum modum utpote multo faciliorem et simpliciorum amplectamur, et in sequentibus constantem retineamus.

## CAPUT V.

### DE MOTU ABSOLUTO CORPUSCULORUM A VIRIBVS QVIBVSCVNQVE ACTORVM.

#### PROBLEMA. 13.

205. **S**i corpusculum a viribus ita sollicitetur, ut motum suum in eodem plano absolvat, definire tam spatium percursum, quam ad quodvis tempus ejus locum et celeritatem.

SOLV.

## SOLUTIO.

Ut motus fiat in eodem plano, tam directiones virium, quibus continuo sollicitatur, quam directio motus primo impressi, in eodem plano sitae sint necesse est, quod planum ipsa tabula referatur. In quo ad lumbum assumantur binae directrices OA et OB ad calculi commoditatem inter se normales, sitque ESF spatium a corpusculo descriptum, in quo pervenerit elapso tempore  $t$ , quod in minutis secundis exprimatur, in punctum S, unde ad OA demisso perpendicularo SX sint coordinatae  $OX = x$  et  $XS = y$ , posito ipso spatio percurso  $ES = s$ , ut sit  $ds = \sqrt{(dx^2 + dy^2)}$ . Sit jam massa corpusculi = A, quae scilicet ejus pondus indicaret, si in regione terrae ad mensuras absolutas electa verfaretur: et quibuscunque viribus in S sollicitetur, eas per resolutionem staticam ad duas revocare licet, secundum directiones SP et SQ directricibus parallelas. Sit ergo vis SP = P et vis SQ = Q, ambae in ponderibus ipsis aequalibus datae. His positis, si temporis elementum  $dt$  constans assumatur, motusque pariter secundum directiones SP et SQ resolutus intelligatur, determinatio motus his duabus formulis continebitur:

$$ddx = \frac{2gPdt^2}{A} \text{ et } ddy = \frac{2gQdt^2}{A}.$$

Ubi, quod perpetuo tenendum,  $g$  denotat altitudinem, per quam grave in regione terrae memorata uno minuto secundo delabitur. Hinc erit celeritas motus lateralis secundum SP =  $\frac{dx}{dt} = \frac{2g}{A} \int P dt$  et secundum SQ =  $\frac{dy}{dt} = \frac{2g}{A} \int Q dt$ . Quodsi jam celeritas vera in S ponatur =  $v$ , ob  $v = \frac{ds}{dt}$ , et  $ds^2 = dx^2 + dy^2$ , derivabitur inde haec aequatio:

$$dx ddx + dy ddy = ds dds = \frac{2gdt^2}{A} (Pdx + Qdy).$$

ex qua cum sit  $ds = vdt$  et  $dds = dvdt$ , elicitur:

$$v dv = \frac{2g}{A} (Pdx + Qdy).$$

$$\text{hincque } vv = \frac{4g}{A} \int (Pdx + Qdy).$$

Porro posito  $dy = p dx$ , ut sit  $ds = dx \sqrt{(1 + pp)}$ , erit  $ddy = p ddx + dp dx = \frac{2gQdt^2}{A} = \frac{2gPpdt^2}{A} + dp dx$ , ideoque  $dp = \frac{2gdt^2}{A dx} (Q - Pp) = \frac{2gdt^2}{A dx^2} (Q dx - P dy)$ . At ob  $ds = v dt = dx \sqrt{(1 + pp)}$

$dx \sqrt{1+pp}$  erit  $\frac{ds}{dx} = \frac{r(1+pp)}{v}$ , hincque  $dp = \frac{2g(1+pp)}{Avv}$   
 $(Qdx - Pdy)$ . Verum curvae ESF, quatenus versus OA concava spectatur, radius osculi est  $= -\frac{dx(1+pp)r(1+pp)}{dp} = -\frac{ds(1+pp)}{dp}$ ,  
 qui si vocetur  $= r$ , ob  $dp = -\frac{ds(1+pp)}{r}$  habebitur:  
 $-\frac{ds}{r} = \frac{2g(Qdx - Pdy)}{Avv}$  seu  $\frac{Pdy - Qdx}{ds} = \frac{Avv}{2gr}$ .

## COROLL. 1.

206. Si ergo loco temporis  $t$  introduceatur celeritas  $v$ , motus his duabus aequationibus exprimitur:

$Avdv = 2g(Pdx + Qdy)$  et  $Avvds = 2gr(Pdy - Qdx)$   
 quae commodius adhibentur, si forte vires  $P$  et  $Q$  a celeritate corporis pendeant.

## COROLL. 2.

207. Hic notandum est, formulam  $\frac{Pdx + Qdy}{ds}$  exprimere vim tangentialem, at  $\frac{Pdy - Qdx}{ds}$  vim normalem, quarum illa si dicatur  $= T$  haec vero  $= N$ , habebimus

$Avdv = 2gTds$  et  $Avv = 2gNr$   
 quae conveniunt cum formulis superiori libro traditis.

## COROLL. 3.

208. His autem introductis mensuris effectus vis tangentialis  $T$  in hoc consistit, ut sit  $T = \frac{Avdv}{2gds}$ . Vis autem normalis effectus in hoc, ut sit  $N = \frac{Avv}{2gr}$ . Seu posito  $dy = pdx$  ob  $r = -\frac{ds(1+pp)}{dp}$  erit  
 $N = -\frac{Avvdp}{2gds(1+pp)}$ , si quidem vim normalem versus axem OA vergere sumamus.

## EXEMPLUM.

209. Sollicitetur corpusculum continuo secundum directionem BO vi constante et ejus ponderi  $A$  aequali, ut habeatur casus corporis supra terram projecti. Erit ergo vis  $P = 0$ , et vis  $Q = -A$ , unde habemus has aequationes:

$$ddx = 0 \text{ et } ddy = -2gdt^2$$

Ponamus

Ponamus corpusculum initio in O ita esse projectum, ut fuerit ejus celeritas =  $c$ , et directio fecerit cum recta OA, quae horizontalis sin-  
gatur, angulum =  $\zeta$ , ita ut initio ejus celeritas secundum OA fuerit  
=  $c \cos \zeta$  et secundum OB =  $c \sin \zeta$ . His positis, prior aequatio dabit

$\frac{dx}{dt} = c \cos \zeta$ , altera vero  $\frac{dy}{dt} = c \sin \zeta - gt$ , quoniam posito  $t = 0$ , for-

mulae  $\frac{dx}{dt}$  et  $\frac{dy}{dt}$  dare debent celeritates initiales. Porro autem inte-

grando, quia posito  $t = 0$  tam  $x$  quam  $y$  evanescere debet, fiet

$$x = ct \cos \zeta \text{ et } y = ct \sin \zeta - g t^2$$

seu  $-4gy = 4ggtt - 4cgt \sin \zeta$  hincque

$$c c \sin^2 \zeta - 4gy = (2gt - c \sin \zeta)^2 = (c \sin \zeta - \frac{2gx}{c \cos \zeta})^2$$

unde patet curvam esse parabolam, hac aequatione contentam

$$(\frac{c c \sin \zeta \cos \zeta}{2g} - x)^2 = \frac{c c \cos^2 \zeta}{g} (\frac{c c \sin^2 \zeta}{4g} - y)$$

cujus parameter =  $\frac{c c \cos^2 \zeta}{g}$ ; et axis verticalis a puncto O distans inter-

vallo =  $\frac{c c \sin \zeta \cos \zeta}{2g}$ , atque verticis supra OA elevatio =  $\frac{c c \sin^2 \zeta}{4g}$ . De-  
inde ob

$$\frac{ds}{dt} = r(cc - 4cgt \sin \zeta + 4ggtt) = v$$

fiet celeritas in S nempe  $v = r(cc - 4gy)$ . Ac denique facto  $y = 0$

reperitur longitudo jactus =  $\frac{c c \sin^2 \zeta \cos^2 \zeta}{g}$ .

### SCHOLIUM.

210. Aliis quaestionibus huc pertinentibus evolvendis hic non im-  
moror, cum totum hoc argumentum jam fusius sum persecutus. No-  
tetur autem, hic agi de motu absoluto eoque libero; etsi enim motum  
gravium hinc deduxi, qui cum ad terram referatur, utique est respec-  
tivus, atque a motu absoluto plurimum discrepans, tamen in sequenti-  
bus ostenditur, eum tanquam absolutum spectari posse. Cum enim  
omnia corpora terrestria similibus viribus urgeantur atque ipsa terra, his  
efficitur, ut ea respectu terrae perinde moveantur, ac si terra quiesceret,  
eaeque vires abessent, id quod capite sequente luculenter ostendetur.  
Praeterea vero haec intelligenda sunt de motu libero, ita ut extrinse-  
cus nihil obstat, quo minus corpusculum actioni virium obsequatur,  
quem



quem motum probe discerni convenit a motu coacto, quo corpusculum quasi canali inclusum aliter nisi secundum ductum canalis moveri nequit, cujusmodi motus in libro secundo sum contemplatus. Hic vero unicuique adjiciam problema circa canalem in eodem plano formatum, ubi quidem ab omni frictione mentem abstraho, quo facilius perspicatur, quomodo hujusmodi problemata ope hujus novae methodi resolvi, simulque pressio corpusculi in latera tubi definiti debeat.

P R O B L E M A. 14.

211. Si corpusculum canali in eodem plano formato fuerit inclusum, simulque a viribus quibuscunque sollicitetur, determinare tam ejus motum in canali, quam pressionem quam in canalem exerit.

S O L U T I O.

Fig. 18.

Figura ergo canalís ESF ut data spectatur, quae ad binas directrices OA et OB inter se normales referatur, ut ante. Scilicet si elapsq tempore  $t$  corpusculum pervenerit in S, sit  $OX = x$ ,  $XS = y$ , arcus  $ES = s$ : vires autem sollicitantes ad easdem directiones revocatae sint  $SP = P$  et  $SQ = Q$ , existente corpusculi massa =  $A$ . Iam quatenus canalis inflectit directionem, quam corpusculum per se esset secuturum, in id vires exerit etiamnum incognitas, quae ad easdem directiones reductae sint secundum  $SP = X$  et secundum  $SQ = Y$ ; de quibus autem hoc constat, motum corpusculi ab iis neque accelerari neque retardari. Cum nunc sint vires secundum  $SP = P + X$  et secundum  $SQ = Q + Y$  posita celeritate in  $S = v$ , et radio osculi =  $r$ , habebimus ex §. 206. has aequationes:

$$A v dv = 2g ((P+X) dx + (Q+Y) dy)$$

$$A v v ds = 2gr ((P+X) dy - (Q+Y) dx)$$

Sed quia vires  $X$  et  $Y$  nihil conferunt ad celeritatis incrementum  $dv$ , erit  $X dx + Y dy = 0$ , ex altera autem aequatione pro harum virium cognitione elicitur.

$$\frac{X dy - Y dx}{ds} = \frac{A v v}{2gr} - \frac{P dy + Q dx}{ds}$$

Primo igitur motus per canalem determinatur hac aequatione:  $A v dv = 2g (P dx + Q dy)$ , unde celeritas corpusculi  $v$  in quovis loco  $S$  cognoscitur. Deinde ipse canalis ejusmodi vires  $X$  et  $Y$  secundum directiones  $SP$  et  $SQ$  exerit, ut sit

$$\frac{X dx + Y dy}{ds} = 0 \text{ et } \frac{X dy - Y dx}{ds} = \frac{A v v}{2gr} - \frac{P dy + Q dx}{ds}$$

Scilicet si hae vires ad directionem canalís  $Ss$  et normalis  $SN$  reducuntur, inde oritur secundum directionem canalís vis nulla, et secundum

# CORPUSCULORUM A VIRIBUS QUIBUSC. &c. 81

dum normalem  $SN$  vis quae est  $= \frac{Avv}{2gr} - \frac{Pdy + Qdx}{ds}$ , atque tanta vi vicissim corpusculum urget canalem secundum directionem oppositam  $Sn$ , quae est pressio quaesita.

## COROLL. 1.

212. Si ergo corpusculum, dum per canalem movetur, a nullis viribus externis  $P$  et  $Q$  sollicitatur, motus ejus ob  $Avdv = 0$  erit uniformis. Tum vero ubique canalem premet normaliter vi  $= \frac{Avv}{2gr}$ , secundum directionem  $Sn$  positioni radii osculi oppositam.

## COROLL. 2.

213. Vis haec, qua canalis premitur,  $\frac{Avv}{2gr}$  vocatur *vis centrifuga* inde orta, quod corpusculum contra instinctum inertiae in linea curva progredi cogitur, estque in ratione composita directa massae  $A$ , quadrati celeritatis  $v$ , et reciproca radii osculi  $r$ .

## COROLL. 3.

214. Si corpusculum praeterea sollicitetur a vi tangentiali secundum  $Ss = T$  et normali secundum  $SN = N$ , erit primo  $Avdv = 2g T ds$ , deinde canalis premitur secundum directionem  $Sn$  vi  $= \frac{Avv}{2gr} - N$ .

## EXEMPLVM.

215. Si corpusculum a gravitate sollicitatum per arcum circulem  $OS$  ascendere cogatur, cujus centrum  $B$ , radius  $OB = b$ , qui sit verticalis et recta  $OA$  horizontalis, celeritas autem in  $O$  fuerit  $= c$ , erit vis  $P = 0$  et vis  $Q = -A$ , atque  $r = -b$ ; unde pro motu corporis habetur:  $Avdv = -2Agdy$  seu  $v dv = -2gdy$ : ut sit  $vv = cc - 4gy$ , et celeritas evanescat in  $D$ , ubi  $y = \frac{cc}{4g}$ , vis autem, qua canalis premitur secundum  $SB$ , erit  $= -\frac{A(cc - 4gy)}{2gb} - \frac{Adx}{ds}$ . Tum vero ob  $xx + (b - y)^2 = bb$  erit  $x = r(2by - yy)$ ,  $dx = \frac{b dy - y dy}{r(2by - yy)}$  et  $ds = \frac{b dy}{r(2by - yy)}$ , hincque pressio secundum  $SB = -\frac{Acc}{2bg} + \frac{2Ay}{b} - \frac{A(b - y)}{b} = -A + \frac{3Ay}{b} - \frac{Acc}{2gb}$ , quae quia est negativa pres-

Fig. 19.

L

fin

fio in canalem aget secundum SN, eritque  $= A \left( 1 + \frac{cc}{2bg} - \frac{3y}{b} \right)$ .  
 Cum autem sit  $v = \sqrt{cc - 4gy}$ , erit elementum temporis  $dt = \frac{b dy}{v} = \frac{b dy}{\sqrt{cc - 4gy}}$ , vel ob  $y = \frac{cc - vv}{4g}$  et  $dy = - \frac{v dv}{2g}$  erit  $dt = - \frac{b}{\sqrt{(cc - vv)(2bg - cc + vv)}}$ .

Si celeritas initialis  $c$  sit quasi infinite parva prae  $b$ , quia  $v$  excedere nequit  $c$ , erit proxime  $dt = - \frac{b}{\sqrt{cc - vv}} \cdot \frac{dv}{2g}$ , et integrando  $t = \frac{\pi b}{\sqrt{2g}} \cdot A \cos \frac{v}{c}$ . Unde si  $\pi$  sit semicircumferentia circuli, cujus radius  $= 1$ , erit tempus totius ascensus in D, quoad celeritas  $v$  evanescat,  $= \frac{\pi \sqrt{b}}{\sqrt{2g}}$ , quod tempus *semioscillatio* vocatur. Quare ut tempus integrae oscillationis  $\frac{\pi \sqrt{b}}{\sqrt{2g}}$  sit unius minuti secundi, seu  $= 1$ , radius BO  $= b$  capi debet  $= \frac{12g}{\pi^2}$ , quae est longitudo penduli simplicis singulis minutis secundis oscillantis. Quare si  $g = 15, 625$  ped. Rhen. erit longitudo istius penduli  $= 3, 166287$  ped. Rhen.

## SCHOLION.

216. Non opus est ut moneam, canalem ideo hic tantum esse assumptum, ut motus secundum datam lineam cogatur; id autem pluribus modis veluti pendulis effici potest, cujusmodi casum in praecedente exemplo evolvere visum est. Ceterum Problemata huc pertinentia in secundo Mechanicae Libro satis prolixè pertractavi. Cum autem ibi hoc desiderari possit, quod methodum, qua nunc quidem corporum coelestium motus ad calculum revocari solent, et quam deinceps demum usurpare coepi, non exposuerim, operae pretium erit, eam hic accuratius explicare. Pertinet autem ad probl. 13. ab eoque tantum hoc differt, quod motus non per coordinatas, sed per distantias a puncto fixo et angulos circa id descriptos definiatur. Quatenus ergo hic motus in plano absolvitur, praecepta eum secundum hanc methodum investigandi tradam, postea idem pro motu non in eodem plano facto ostensurus.

## PROBLEMA. 15.

Fig. 20.

217. Si corpusculum libere moveatur in plano, in quo perpetuo duabus sollicitetur viribus, altera ad punctum quoddam fixum O tendente,

dente, alterius vero directione ad illam existente normali; ad quodvis tempus distantiam corpusculi S a puncto fixo O et angulum AOS definire.

SOLUTIO.

Elapso tempore  $t$  corpusculum, cujus massa =  $A$ , pervenerit ex A in S, ponaturque distantia  $OS = u$ , et angulus  $AOS = \phi$ . In S autem sollicitetur primo a vi secundum SO pellente, quae sit =  $V$ , deinde vero a vi secundum directionem SV ad OS normali urgente, quae sit =  $S$ . Quem casum quo facilius ad probl. 13. reducere possumus, demisso ex S ad fixam OA perpendicularo SX introducamus coordinatas  $OX = x$  et  $XS = y$ , erit  $x = u \cos \phi$  et  $y = u \sin \phi$ . Tum vero binas vires  $V$  et  $S$  ad easdem directiones SP et SQ revocemus, habebimusque vim SP =  $-V \cos \phi - S \sin \phi$ , et vim SQ =  $-V \sin \phi + S \cos \phi$  quas supra vocavimus P et Q. Quocirca nanciscemur has duas aequationes:

$$ddx = -\frac{2gdt^2}{A} (V \cos \phi + S \sin \phi)$$

$$ddy = -\frac{2gdt^2}{A} (V \sin \phi - S \cos \phi)$$

ex quarum combinatione deducimus

$$ddx \cos \phi + ddy \sin \phi = -\frac{2gVdt^2}{A}$$

$$ddx \sin \phi - ddy \cos \phi = -\frac{2gSdt^2}{A}$$

Cum autem sit  $x = u \cos \phi$  et  $y = u \sin \phi$ , erit

$$x \cos \phi + y \sin \phi = u \text{ et } x \sin \phi - y \cos \phi = 0,$$

unde differentiando:

$$dx \cos \phi + dy \sin \phi = du \text{ et } dx \sin \phi - dy \cos \phi + u d\phi = 0$$

$$\text{seu } dx \sin \phi - dy \cos \phi = -u d\phi$$

denuoque differentiando:

$$ddx \cos \phi + ddy \sin \phi + u d\phi^2 = ddu$$

$$ddx \sin \phi - ddy \cos \phi + du d\phi = -du d\phi - u dd\phi$$

Quibus valoribus substitutis, adipiscemur pro motus determinatione has duas aequationes.

$$I. \quad ddu - u d\phi^2 + \frac{2gVdt^2}{A} = 0$$

$$II. \quad u dd\phi + 2du d\phi - \frac{2gSdt^2}{A} = 0$$

## COROLL. 1.

218. Posterior aequatio per  $u$  multiplicata per integrationem reducitur ad hanc  $uud\phi = \frac{2gdt}{A} \int S u dt$ , ubi notandum est,  $\frac{1}{2} uud\phi$  exprimere elementum areae AOS, unde haec area erit  $= \frac{g}{A} \int dt \int S u dt$ . Evanescente ergo vi laterali SV = S, haec area AOS est ipsi tempori  $t$  proportionalis, quomodocunque fuerit comparata altera vis V versus punctum O sollicitans.

## COROLL. 2.

219. Si prior aequatio per  $du$ , posterior per  $u d\phi$  multiplicetur, aggregatum fiet

$$duddu + u d u d\phi^2 + u u d\phi dd\phi = - \frac{2gVdt^2 du}{A} + \frac{2gS u dt^2 d\phi}{A}$$

unde integrando elicitur

$$du^2 + u u d\phi^2 = \frac{4gdt^2}{A} \int (S u d\phi - V du)$$

ubi  $\gamma (du^2 + u u d\phi^2)$  exprimit elementum arcus AS, ita ut  $\frac{du^2 + u u d\phi^2}{dt^2}$  sit quadratum celeritatis in S.

## COROLL. 3.

220. Si secunda multiplicetur per  $2u^3 d\phi$ , ob  $dt$  constans reperitur integrale;

$$u^4 d\phi^2 = \frac{4gdt^2}{A} \int S u^3 d\phi.$$

unde per praecedentem eruimus;

$$u u d u^2 = \frac{4gdt^2}{A} (u u \int S u d\phi - \int S u^3 d\phi - u u \int V du)$$

$$\text{seu } u u d u^2 = \frac{4gdt^2}{A} (2 \int u du \int S u d\phi - u u \int V du)$$

ubi notandum, quod elementum temporis  $dt$  extra signa integralia reperiatur.

## COROLL. 4.

221. Si S = 0, qui est casus virium centripetarum, erit  $u u d\phi = f f dt$ , et  $u d\phi = \frac{f^2 dt}{u}$ , quo valore in coroll. 2. substituto fit

$$du^2 = - \frac{f^2 dt^2}{u u} - \frac{4gdt^2}{A} \int V du + u dt^2$$

ideoque

$$\text{ideoque } dt = \frac{u du}{r(ccuu - f^2 - 4guufVdu : A)}$$

$$\text{et } d\phi = \frac{ffdu}{ur(ccuu - f^2 - 4guufVdu : A)}$$

SCHOLION.

222. Usus harum formularum est amplissimus in Theoria Astronomiae, ex iisque determinari solent longitudo, anomalia et distantia planetae ad certum punctum sollicitati. Verum hic non est locus haec fusius prosequi, cum ad Astronomiam pertineant. Sufficiat nimirum hic methodum ejusmodi problemata tractandi in genere explicasse; progrediamur ergo ad motus non in eodem plano factos expendendos.

PROBLEMA. 16.

223. Si corpusculum libere moveatur a viribus quicunque sollicitatum, determinare ejus motum per ternas coordinatas inter se normales.

SOLUTIO.

Constitutis ternis directricibus OA, OB et OC ad se invicem normalibus, moveatur corpusculum, cujus massa = A in linea ESF, et elapso tempore  $t$  pervenerit in S, unde ad planum AOB demisso perpendiculo SY, ex Y ad OA agatur normalis YX, ut habeantur tres coordinatae inter se normales et directricibus parallelae, quae vocentur OA =  $x$  XY =  $y$  et YS =  $z$ , spatium autem jam percursum ES dicatur =  $s$ , ut sit  $ds = r(dx^2 + dy^2 + dz^2)$  et celeritas in S =  $\frac{ds}{dt}$ , quae ponatur =  $v$ . Iam a quibuscunque viribus corpusculum in S sollicitetur, eas reducere licet ad easdem ternas directiones. Sollicitetur ergo ab his viribus SP = P; SQ = Q et SR = R, quarum effectus per superiora determinabuntur per tres sequentes aequationes:

$$ddx = \frac{2gPdt^2}{A}; ddy = \frac{2gQdt^2}{A} \text{ et } ddz = \frac{2gRdt^2}{A}$$

ubi quidem elementum  $dt$  suntum est constans. Prout ergo vires P, Q, R, a coordinatis  $x, y, z$  vel etiam a celeritate  $\frac{ds}{dt} = v$  pendeant, ex Analyfi subsidia resolutionis erunt petenda. Interim notasse juvabit, cum sit  $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$ , et  $vv = \frac{ds^2}{dt^2}$ , ideoque

$$v dv = \frac{ds dds}{dt^2} = \frac{xdx + ydy + zdz}{dt^2}, \text{ fore:}$$

L 3

$v dv$

$$v dv = \frac{2g}{A} (P dx + Q dy + R dz).$$

qua acceleratio corpusculi definitur. Pro curva autem invenienda ponatur  $dy = p dx$  et  $dz = q dx$ , ut sit  $ds = dx \sqrt{(1+pp+qq)}$  et  $v = \frac{dx}{dt} \sqrt{(1+pp+qq)}$ : Hinc ob  $ddy = pddx + dpdx$  et  $ddz = qddx + dqdx$ , si loco  $ddx$  valor  $\frac{2g P dt^2}{A}$  substituatur, reperitur:

$$dp dx = \frac{2g dt^2}{A} (Q - Pp) \text{ et } dq dx = \frac{2g dt^2}{A} (R - Pq).$$

Quare si hic pro  $dt^2$  scribatur  $\frac{dx^2(1+pp+qq)}{vv}$ , erit

$$dp = \frac{2g dx(1+pp+qq)}{Avv} (Q - Pp)$$

$$dq = \frac{2g dx(1+pp+qq)}{Avv} (R - Pq)$$

$$\text{feu } Qdx - Pdy = \frac{Avv dp}{2g(1+pp+qq)}$$

$$\text{et } Rdx - Pdz = \frac{Avv dq}{2g(1+pp+qq)}$$

At si pro  $p$  et  $q$  restituantur valores  $\frac{dy}{dx}$  et  $\frac{dz}{dx}$ , fiet

$$Qdx - Pdy = \frac{Avv(dxddy - dyddx)}{2g ds^2}$$

$$Rdx - Pdz = \frac{Avv(dxddz - dzddx)}{2g ds^2},$$

quae invicem divisae praebent.

$$P(dzddy - dyddz) + Q(dxddz - dzddx) + R(dyddx - dxddy) = 0$$

COROLL. 1.

224. Celeritas igitur in quovis curvae puncto determinatur hac aequatione differentiali

$$Av dv = 2g (P dx + Q dy + R dz)$$

ubi  $\frac{P dx + Q dy + R dz}{ds}$  designat vim tangentialem ex viribus sollicitantibus ortam.

COROLL. 2.

225. Pro curva autem definienda binae ex his tribus aequationibus sufficiunt:

$$2g ds^2 (Qdx - Pdy) = Avv (dxddy - dyddx) = Avv dx^2 d. \frac{dy}{dx}$$

$$2g ds^2 (Pdz - Rdx) = Avv (dzddx - dxddz) = Avv dz^2 d. \frac{dx}{dz}$$

$2gds^2 (Rdy - Qdz) = Avv (dyddz' - dzddy) = Avvdy^2 d. \frac{dz}{dy}$   
 binae enim simul tertiam involvunt. Tum vero hinc consideratio differentialis constantis excessit.

COROLL. 3.

226. Ultima aequatio, a celeritate immunis, et si differentialia secundi gradus continet, tamen non ad differentiale  $dt$  constans assumtum est adstricta, ita enim potest repraesentari.

$$Pdz^2 d. \frac{dy}{dz} + Qdx^2 d. \frac{dz}{dx} + Rdy^2 d. \frac{dx}{dy} = 0$$

SCHOLION.

227. Ternae vires  $P$ ,  $Q$ ,  $R$ , quibus corpusculum in  $S$  sollicitari ponimus, reducuntur ad unam, quae est  $= \sqrt{PP + QQ + RR}$ , ac si ea ponatur  $= V$ , ejus directio inclinatur ad  $SP$  angulo cujus cosinus est  $= \frac{P}{V}$ , ad  $SQ$  angulo cujus cosinus est  $= \frac{Q}{V}$ , et ad  $SR$  angulo cu-

jus cosinus est  $= \frac{R}{V}$ . Tum si directio istius vis  $V$  cum directione motus  $Ss$  faciat angulum  $= \omega$ , erit vis accelerans seu secundum  $Ss$  sollicitans  $= V \cos \omega$ , quae cum sit  $= \frac{Pdx + Qdy + Rdz}{ds}$ , erit  $\cos \omega = \frac{Pdx + Qdy + Rdz}{Vds}$ , unde vis normalis colligitur  $= V \sin \omega$ , cujus posi-

Fig. 22.

tio ope trigonometriae Sphaericae commodissime repraesentatur. Concipiatur  $S$  ut centrum sphaerae, unde ad superficiem porrigantur rectae  $SP$ ,  $SQ$  et  $SR$ , ut sint arcus  $PQ$ ,  $PR$ , et  $QR$  quadrantes; directio motus transeat per  $s$ , et media directio virium per  $V$ , eritque

$$\cos Ps = \frac{dx}{ds}; \cos Qs = \frac{dy}{ds}; \cos Rs = \frac{dz}{ds}$$

$$\cos PV = \frac{P}{V}; \cos QV = \frac{Q}{V}; \cos RV = \frac{R}{V}$$

$$\text{ac praeterea } Vs = \omega \text{ seu } \cos \omega = \frac{Pdx + Qdy + Rdz}{Vds}$$

Cognito angulo  $\omega$ , capiatur  $sVN$  = quadranti, erit recta ex centro  $S$  per  $N$  ducta directio vis normalis: et puncti  $N$  positio ita ex ejus distantia a punctis  $P$ ,  $Q$ ,  $R$  definitur, ut sit

$$\cos PN = \frac{P}{V \sin \omega} - \frac{dx \cos \omega}{ds \sin \omega}; \cos QN = \frac{Q}{V \sin \omega} - \frac{dy \cos \omega}{ds \sin \omega} \text{ et}$$

$$\cos RN = \frac{R}{V \sin \omega} - \frac{dz \cos \omega}{ds \sin \omega}.$$

Hinc



Hinc igitur cum infinitae dentur rectae normales ad directionem motus  $Ss$ , inter eas determinatur illa, secundum quam agit vis normalis, et quae directionem motus incurvat, ita ut radius curvedinis in ipsam rectam  $SN$  incidat, qui erit  $= \frac{Avv}{2gV\sin\omega}$  (207).

## PROBLEMA. 17.

Fig. 21.

228. Si corpusculum, cujus massa =  $A$ , in tubo seu canali moveatur, neque ab ullis viribus sollicitetur, determinare ejus motum, et pressionem, quam ubique in tubum exercet.

## SOLUTIO.

Sit  $ESF$  figura tubi, in quo corpusculum moveatur, in quo elapso tempore  $t$  pertigerit ad  $S$  confecto spatio  $ES = s$ . Locus autem  $S$  ut ante referatur ad ternas directiones fixas  $OA$ ,  $OB$ ,  $OC$  inter se normales, quibus coordinatae parallelae vocentur  $OX = x$ ,  $XY = y$  et  $YS = z$ . Iam quia corpusculum cogitur ubique tubi directionem sequi, ipse tubus vires in id necessarias exercet, quae autem ita erunt comparatae, ut inde celeritas nullam mutationem patiatur. Erit ergo celeritas constans, quae sit  $= c$ , unde sit  $\frac{ds}{dt} = c$  et  $s = ct$ . Revocentur vires a tubo exercitae ad easdem ternas directiones, sintque  $SP = X$ ,  $SQ = Y$  et  $SR = Z$ , et ob celeritatem immutabilem  $Xdx + Ydy + Zdz = 0$ . Deinde quia  $dt = \frac{ds}{c}$ , loco  $dt$  constans erit elementum  $ds$ , ex quo formulae principales erunt

$Accddx = 2gXds^2$ ;  $Accddy = 2gYds^2$  et  $Accddz = 2gZds^2$  existente  $dx^2 + dy^2 + dz^2 = ds^2$ . Tota ergo vis, quam tubus in corpusculum exercet, fiet

$$V(X^2 + Y^2 + Z^2) = \frac{AccV(ddx^2 + ddy^2 + ddz^2)}{2gds^2} = V,$$

cujus directio inclinata erit ad rectam  $SP$  angulo cujus cosinus  $= \frac{X}{V} =$

$$\frac{\frac{ddx}{(ddx^2 + ddy^2 + ddz^2)}}{\frac{ddy}{(ddx^2 + ddy^2 + ddz^2)}}, \text{ ad } SQ \text{ angulo cujus cosinus} = \frac{Y}{V} =$$

$$\frac{\frac{ddz}{(ddx^2 + ddy^2 + ddz^2)}}{\frac{ddy}{(ddx^2 + ddy^2 + ddz^2)}} \text{ et ad } SR \text{ angulo cujus cosinus} = \frac{Z}{V} =$$

$\frac{\frac{ddz}{(ddx^2 + ddy^2 + ddz^2)}}{\frac{ddz}{(ddx^2 + ddy^2 + ddz^2)}}$ . Huic autem vi aequalis et contraria est pressio, quam corpusculum vicissim in tubum exercit.

CO.

## COROLL. 1.

229. Si radius osculi curvae in  $S$  ponatur  $= r$ , ob viam normalem  $= V$  et celeritatem  $= c$ , erit  $r = \frac{Acc}{2gV}$ , ideoque

$$r = \frac{ds^2}{V(ddx^2 + ddy^2 + ddz^2)}, \text{ sumto } ds \text{ constante.}$$

## COROLL. 2.

230. Radii osculi autem positio cum directione vis  $V$ , qua corpusculum a tubo urgetur, congruit, inclinabitur igitur is ad rectam  $SP$  angulo, cujus cofinus  $= \frac{ddx}{V(ddx^2 + ddy^2 + ddz^2)}$ , ad  $SQ$  angulo, cujus cofinus  $= \frac{ddy}{V(ddx^2 + ddy^2 + ddz^2)}$  et ad  $SR$  angulo, cujus cofinus est  $= \frac{ddz}{V(ddx^2 + ddy^2 + ddz^2)}$ .

## SCHOLIUM.

231. Posset hic etiam motus expendi, quando corpusculum non in linea data, sed tantum in data superficie progredi cogitur, sed quia hoc argumentum copiose jam est tractatum in II. Libro Mech. ne hic nimis simpliciter, id non attingam. Praesertim cum pateat, totum negotium, huc redire, ut directio vis, quam superficies in corpusculum exerit, sit ad ipsam superficiem normalis: Quare ex aequatione superficiei proposita determinetur positio normalis, seu ejus inclinatio ad ternas directiones  $SP$ ,  $SQ$  et  $SR$ , quae cum positione vis  $V$  ante definita congruere debet. Atque hinc nova colligetur aequatio inter coordinatas  $x, y, z$ , quae cum priori data conjuncta definiet viam in superficie percursum, quam esse inter suos terminos, brevissimam per se est perspicuum. Revertor ergo ad motum liberum, ac docebo, quomodo motus non in eodem plano factos per angulos ad certum punctum fixum relatos definiri conveniat, ea scilicet ratione, quam supra probl. 5 (70) exposui. Quod quia in Astronomia Theoretica maximam affert utilitatem, neque haec motuum evolutio in praecedentibus libris est explicata, ei sequens problema destinemus.

## PROBLEMA. 18.

Tab. III.

232. Si corpusculum partim ad punctum fixum  $O$  partim ab aliis quibuscunque viribus sollicitetur, definire ejus motum respectu ejus puncti.

Fig. 23.

M

SOLV.

## SOLUTIO.

Constituto plano, quod sit planum tabulae, per punctum fixum O transeunte, ad quod motus referatur, in eoque sumta directrice fixa OA, pervenerit corpusculum elapso tempore  $t$  in S, unde primo in planum demittatur perpendicularum SY, et ex Y in rectam OA normale YX, ut habeantur coordinatae orthogonales  $OX = x$ ,  $XY = y$ ,  $YS = z$ . Cum jam corpusculum in S primo a vi secundum SO sollicitetur, ea resolvatur in directiones YO et SY: reliquae vero vires cum ad easdem directiones, tum ad YV in plano tabulae ad OY normalem revocentur, ita ut omnino tres habeantur vires, quarum prima sit secundum YO = V, altera secundum YV = S, et tertia secundum SR = R. Quae vires cum sint cognitae, ad directiones coordinatarum reducuntur, sicque posito angulo AOY =  $\phi$  obtinebuntur hae vires:

$$\text{vis secundum } XO = V \cos \phi + S \sin \phi = -P$$

$$\text{vis secundum } YX = V \sin \phi - S \cos \phi = -Q$$

$$\text{vis secundum } SR = R$$

quarum effectus per tres sequentes formulas exprimitur.

$$Addx = -2gdt^2 (V \cos \phi + S \sin \phi)$$

$$Addy = -2gdt^2 (V \sin \phi - S \cos \phi)$$

$$Addz = -2gRdt^2 \text{ posita massa corpusculi } = A.$$

Vocetur porro distantia OY =  $u$ , et ob  $x = u \cos \phi$  et  $y = u \sin \phi$ , binae priores aequationes uti supra (217) ad has duas rediguntur.

$$I. ddu - u d\phi^2 + \frac{2gVdt^2}{A} = 0$$

$$II. u dd\phi + 2du d\phi - \frac{2gSdt^2}{A} = 0.$$

Ponatur nunc angulus SOY =  $\psi$ , qui corpusculi latitudo vocatur, dum angulus AOY =  $\phi$  est ejus longitudo; erit SY =  $z = u \tan \psi$ . At pro hoc angulo  $\psi$  commodius inveniendi sit OT linea nodorum, angulus AOT =  $\omega$  et inclinatio plani per O et directionem motus in S ducti ad planum assumptum =  $\epsilon$ , erit TOY =  $\phi - \omega$ , hinc ductis YN et SN ad OT normalibus, fiet ON =  $u \cos(\phi - \omega)$ , et YN =  $u \sin(\phi - \omega)$ , ideoque YS =  $u \sin(\phi - \omega) \tan \epsilon = z$ , hincque  $\tan \psi = \sin(\phi - \omega) \tan \epsilon$ , et uti supra (70).

$$\frac{d\omega}{\tan(\phi - \omega)} = \frac{d\epsilon}{\sin \epsilon \cos \epsilon} = d. \tan \epsilon$$

$$\text{Quare cum sit } dz = \frac{d\omega \sin \epsilon \cos \epsilon}{\tan(\phi - \omega)}, \text{ erit}$$

$$dz =$$

$$dz = du f(\varphi - \omega) \operatorname{tang} \varrho + u (d\varphi - d\omega) \operatorname{cof}(\varphi - \omega) \operatorname{tang} \varrho \\ + u f(\varphi - \omega) \cdot \frac{d\omega \operatorname{tang} \varrho}{\operatorname{tang}(\varphi - \omega)}$$

seu  $dz = (du f(\varphi - \omega) + u d\varphi \operatorname{cof}(\varphi - \omega)) \operatorname{tang} \varrho$   
qui valor denuo differentiatu dat:

$$ddz = (ddu f(\varphi - \omega) + du (2d\varphi - d\omega) \operatorname{cof}(\varphi - \omega) + u dd\varphi \\ \operatorname{cof}(\varphi - \omega) - u d\varphi (d\varphi - d\omega) f(\varphi - \omega)) \operatorname{tang} \varrho \\ + (du f(\varphi - \omega) + u d\varphi \operatorname{cof}(\varphi - \omega)) \frac{d\omega \operatorname{tang} \varrho}{\operatorname{tang}(\varphi - \omega)}$$

sive

$$ddz = (ddu f(\varphi - \omega) + 2du d\varphi \operatorname{cof}(\varphi - \omega) + u dd\varphi \operatorname{cof}(\varphi - \omega) \\ - u d\varphi^2 f(\varphi - \omega) + \frac{u d\varphi d\omega}{f(\varphi - \omega)}) \operatorname{tang} \varrho$$

Cum igitur sit

$$ddu - u d\varphi^2 = - \frac{2gVdt^2}{A} \quad \text{et} \quad u dd\varphi + 2du d\varphi = \frac{2gSdt^2}{A}$$

obtenebitur

$$ddz = \left( \frac{-2gVdt^2}{A} f(\varphi - \omega) + u \frac{2gSdt^2}{A} \operatorname{cof}(\varphi - \omega) \right. \\ \left. + \frac{u d\varphi d\omega}{f(\varphi - \omega)} \right) \operatorname{tang} \varrho.$$

Quare ob  $ddz = \frac{2gRdt^2}{A}$  erit

$$\frac{u d\varphi d\omega}{f(\varphi - \omega)} = \frac{2gdt^2}{A} (Vf(\varphi - \omega) - S\operatorname{cof}(\varphi - \omega) + R\operatorname{cot} \varrho)$$

$$\text{seu } d\omega = \frac{2gdt^2 f(\varphi - \omega)}{Aud\varphi} (Vf(\varphi - \omega) - S\operatorname{cof}(\varphi - \omega) + R\operatorname{cot} \varrho)$$

$$\text{et d. l. } \operatorname{tang} \varrho = \frac{2gdt^2 \operatorname{cof}(\varphi - \omega)}{Aud\varphi} (Vf(\varphi - \omega) - S\operatorname{cof}(\varphi - \omega) + R\operatorname{cot} \varrho)$$

Inventae ergo sunt quatuor aequationes, quibus problematis solutio continetur.

### COROLL. I.

233. Cum igitur ad datum tempus  $t$  assignari debeant haec quatuor quantitates  $u$ ,  $\varphi$ ,  $\omega$  et  $\varrho$ , nacti sumus primo has duas aequationes differentio-differentiales

M 2

$ddu$

$d du - u d\phi^2 + \frac{2gVdt^2}{A} = 0$  et  $u dd\phi + 2du d\phi - \frac{2gSdt^2}{A} = 0$   
 deinde has duas simpliciter differentiales

$$d\omega = \frac{2gdt^2 f(\phi - \omega)}{A u d\phi} (V f(\phi - \omega) - S \cos(\phi - \omega) + R \cot \epsilon)$$

$$\text{et } d. \tan \epsilon = \frac{d\omega}{\tan(\phi - \omega)} \text{ seu } d. \tan \epsilon = \frac{d\omega \tan \epsilon}{\tan(\phi - \omega)}$$

## COROLL. 2.

234. Inventis autem his valoribus colligetur tam angulus  $SOY = \psi$  latitudo dictus; quam distantia vera  $SO$ , ex his formulis,  $\tan \psi = f(\phi - \omega) \tan \epsilon$  et  $OS = \frac{u}{\cos \psi}$ , ubi  $u$  dici solet *distantia curvata*.

## COROLL. 3.

235. Si fuerit  $f(\phi - \omega) = 0$ , hoc est, si corpusculum per planum assumptum transit, supra jam vidimus, fore  $d\omega = 0$ ; at nunc patet, tam lineam nodorum, quam inclinationem, nullam mutationem pati, si fuerit:

$$V f(\phi - \omega) - S \cos(\phi - \omega) + R \cot \epsilon = 0$$

## COROLL. 4.

236. Est vero  $V f(\phi - \omega) - S \cos(\phi - \omega) = -Q \cos \omega + P f \omega$ , atque introductis primitivis viribus  $P$ ,  $Q$ ,  $R$  erit

$$V f(\phi - \omega) - S \cos(\phi - \omega) + R \cot \epsilon = P f \omega - Q \cos \omega + R \cot \epsilon.$$

atque haec est quasi vis, tam locum lineae nodorum quam inclinationem immutans.

## SCHOLIUM.

237. Imprimis hic notari meretur, quod variatio momentanea in situ lineae nodorum et inclinatione, satis concinna hac methodo exprimi potuerit, unde in Astronomiam Theoreticam insignia commoda redundant. Ex hoc fonte à Cel. Mayero Prof. Goetting. incredibili studio deductae sunt Tabulae Lunares excellentissimae, quibus Astronomia fere ad summum fastigium eversa est censenda. Cum autem motus lunae, qui hac methodo definitur, nequaquam sit absolutus, sed ad centrum

crum terrae relatus, in hac investigatione simul motus terrae ratio est habenda; quare ut hac methodo uti queamus, praecepta tradi conveniet, quorum ope motus respectivos ad calculum revocare liceat, si quidem motus ejus corporis, cujus respectu aliorum corporum motus aestimantur, fuerit cognitus. Quod argumentum cum non satis dilucide in superioribus Mechanicae Libris sit expositum, hic majori cura illud pertractabo; quo facto ad motus corporum finitorum, quos ibi nondum attigeram, feliciori cum successu progredi licebit.

## CAPUT VI.

### DE MOTU RESPECTIVO CORPUSCULORUM A VIRIBUS QUIBVSQVE SOLLICITATORUM.

#### THEOREMA. 6.

238. Si corpusculum A a viribus quibuscunque sollicitetur; ejus motus respectu puncti O, quod uniformiter in directum fertur, per easdem vires determinabitur. Fig. 24.

#### DEMONSTRATIO.

Tempusculo  $dt$  feratur corpusculum A ob motum insitum per spatium  $Aa$ , ob vires autem sollicitantes detorqueatur per spatium  $ab$ , ita ut  $ab$  sit effectus virium tempusculo  $dt$  in corpusculo A productus: Interea autem punctum O progrediatur per spatium  $Oo$ , ita ut elapso tempusculo  $dt$  hoc punctum sit in  $o$ , cum ante fuisset in O, corpusculum autem in  $b$ , cum ante fuisset in A. Iam ex O ducatur  $Oa$  ipsi  $aa$  aequalis et parallela, itemque  $ac$  aequalis et parallela ipsi  $ab$ ; atque respectu puncti O corpusculum videbitur ex A in  $b$  pervenisse eodem tempusculo  $dt$ , qui motus ita se habebit, ac si ob motum insitum descripsisset spatium  $Aa$ , simulque ex  $a$  detorqueretur per spatium  $ac$ . Scilicet si corpusculum a nullis viribus sollicitaretur, ac per  $Aa$  aequabiliter in directum moveretur, etiam motus respectivus foret aequabilis rectilineus per  $Aa$ , uti supra ostendimus. Nunc autem ob vires sollicitantes, in motu absoluto producit spatium  $ab$ , in respectivo autem spatium  $ac$ , quod cum illi sit parallelum et aequale, motus respectivus ab iisdem viribus tur-

batur ac motus absolutus. Hinc si punctum  $O$  uniformiter in directum feratur, ejus respectu motus corpusculi  $A$ , a quibuscunque viribus sollicitetur, perinde se habebit, ac si punctum  $O$  quiesceret, corpusculumque ab iisdem viribus sollicitaretur.

COROLL. 1.

239. Si ergo vires noverimus, quibus corpusculum  $A$  sollicitatur, ex iis per praecepta ante tradita non solum ejus motum absolutum, sed etiam respectivum ad punctum  $O$ , quod uniformiter in directum progreditur, relatum definire valemus.

COROLL. 2.

240. Atque adeo eadem formulae differentio - differentiales tam motum absolutum quam respectivum determinabunt; discrimen tantum in integratione cernetur, quae utroque casu rite ad statum initialem est accommodanda.

COROLL. 3.

241. Sive ergo punctum  $O$ , cujus respectu motus aestimatur, quiescat, sive moveatur uniformiter in directum, investigatio motus perinde se habet. Scilicet uti effectus inertiae hoc casu non mutatur, ita etiam effectus virium idem manet.

EXPLICATIO. 1.

242. Dum punctum et corpusculum ex  $o$  et  $b$  in  $O$  et  $C$  mente transferuntur, efficiendum est ut  $C$  respectu  $O$  eundem situm teneat, ac  $b$  respectu  $O$ , quod cum  $O$  et  $o$  ut puncta spectentur, rem minime determinare videtur, quandoquidem, ut supra innuimus, sola distantia  $ob$  et  $OC$  situm respectivum contineret. Verum stabilito jam spatio absoluto plagas seu directiones fixas assumere licet, ita ut  $OC$  non solum ipsi  $ob$  aequalis sed etiam in eandem plagam directam statui debeat, id quod evenit, si  $OC$  ipsi  $ob$  aequalis ac parallela accipiat. Res eodem redit, si secundum prima praecepta loco puncti  $O$  corpus extensum assumatur, in quo tria vel quatuor puncta fixa concipere liceat: tum autem hoc corpus  $O$ , cujus respectu motus alterius aestimatur, ita secundum  $Oo$  moveri est censendum, ut singula ejus puncta paribus celeritatibus secundum directiones inter se parallelas ferantur. Tum enim quem situm tenuerit corpusculum  $b$  respectu quatuor punctorum in corpore  $o$  assumtorum, eundem situm tenebit corpusculum in  $C$  translatum respectu eorundem quatuor punctorum, dum corpus adhuc est

est in  $O$ . His notatis manifestum est, motum corpusculi absolutum, quo ex  $A$  in  $b$  transfertur, dum punctum  $O$  in  $e$  progreditur, convenire cum motu respectivo, quo ex  $A$  in  $C$  transfertur. Quod etsi hic tantum de temporis elemento *de* est ostensum, quoniam idem de omnibus temporis elementis simili modo ostenditur, recte affirmamus in genere, totum motum respectivum hic definitum motui absoluto respondere.

### SCHOLION.

243. Quae hic de motu respectivo corpusculi  $A$  respectu puncti  $O$  sunt tradita ac porro tradentur, alias et potissimum in Astronomia sub titulo *motus apparentis* proponi solent. In puncto scilicet  $O$ , cujus respectu motus corpusculi  $A$  aestimatur, spectator constituitur, et quaestio ita proponitur, quomodo huic spectatori motus corpusculi sit appariturus. Nam spectator, quomodocunque punctum  $O$ , quod est ejus statio, moveatur, motum suum non sentire censetur, ita ut se constanter in eodem loco  $O$  persistere arbitretur. Quare cum nunc vidisset corpusculum in  $A$ , elapso autem tempusculo *de* in  $C$ , corpusculum ipsi interea ex  $A$  in  $C$  translatum videbitur, cum tamen revera ex  $A$  in  $b$  pervenerit; dicitur ergo translatio ex  $A$  in  $C$  *motus apparentis*. In casu ergo nostri Theorematis spectator uniformiter in directum promoveri assumitur, atque demonstravimus, motum apparentem corpusculi  $A$  per praecepta Mechanica definitum iri, si corpusculum ab iisdem viribus, quae actu in id agunt, sollicitari statuatur. Eadem nimirum formulae differentio-differentiales tam motum apparentem, quam motum verum expriment: pro motu autem apparente ita integrari debent, ut initio vel aliquo tempore dato cum motu apparente conveniant. Totum ergo discrimen demum in integration se exerit.

### EXPLICATIO. 2.

244. Vires motum respectivum turbantes propterea illis, quae motum absolutum afficiebant, aequales esse debent, quia effectus seu spatiola *ab* et *ac* aequalia deprehendimus. Atque haec virium aequalitas in calculo facile observatur; si ad genus virium absolutarum pertineant, quae perinde in corpusculum motum agunt atque quiescens: sin autem corpusculum  $A$  ab ejusmodi viribus sollicitetur, quae ab ejus celeritate pendent, cujusmodi est resistentia fluidorum, quantitas earum virium ex celeritate corpusculi vera, quam in motu absoluto habet, est petenda, eademque in motu respectivo adhibenda. Veluti si corpusculum  $A$  in fluido moveretur, resistentia seu vis, quam ab eo patitur,



patitur, pendebit ab ejus celeritate absoluta, qua spatium  $Aa$  percurrit, eademque vis in calculum pro motu respectivo introducti debet; atque insignis error committeretur, si resistentiam ex celeritate motus respectivi, qua spatium  $Aa$  conficitur, definire vellemus. Quem errorem ut evitemus, ipsum fluidum, quantum absolute quiescit, pro motu respectivo quasi motu aequali et opposito ei, quo punctum  $O$  movetur, ferretur, contemplari debemus; tum enim fluidum hoc motu praeditum aequè afficiet corpusculum motu respectivo per  $Aa$  progrediens, atque fluidum quiescens afficiet corpusculum motu absoluto per  $Aa$  latum. Perpetuo autem quoties de motu respectiva quaestio est, non solum corpusculum  $A$ , sed totum quasi spatium cum omnibus corporibus, quae in id agere queant, motu aequali et contrario ei, quem punctum  $O$  habet, moveri est concipiendum, quandoquidem hoc motu ficto punctum  $O$  ad quietem redigitur.

## THEOREMA 7.

Fig. 25. 245. Si duo corpora  $A$  et  $B$  utcumque moveantur a viribus quibuscunque sollicitata, visque eodem momento insuper motus aequales secundum eandem directionem imprimantur, motum inter se eundem conservabunt.

## DEMONSTRATIO.

Exprimat recta  $Aa$  motum corporis  $A$ , seu sit spatium ab eo tempusculo  $dt$  descriptum; similique modo corpus  $B$  tantam habeat celeritatem, qua eodem tempusculo  $dt$  describeret spatium  $Bb$ ; a viribus sollicitantibus autem illud ex  $a$  in  $m$ , hoc vero ex  $b$  in  $n$  deflectatur, ita ut nunc elapso tempore  $dt$  recta  $mn$  referat situm relativum, qui ante recta  $AB$  referebatur. Incipiente autem tempusculo  $dt$  subito utrique corpori motus aequalis secundum eandem directionem imprimatur, quo solo corpus  $A$  in  $p$  et  $B$  in  $q$  tempusculo  $dt$  transferretur, ita ut rectae  $Ap$  et  $Bq$  futurae sint aequales ac parallelae. Accedente autem motu jam insito, si parallelogramma  $Aap$  et  $Bbq$  compleantur, diagonales  $Am$  et  $Bn$  spatia referent, quae corpora ob utrumque motum tempusculo  $dt$  essent percursura. Iam quod rectae  $aa$  et  $bb$  aequales et parallelae, etiam  $ab$  et  $ac$  erunt aequales et parallelae, ita ut situs relativus  $ac$  post novum motum impressum conveniat cum situ relativo  $ab$ . Capiatur porro  $ap$  aequalis et parallela ipsi  $am$ , et  $br$  aequalis et parallela ipsi  $bn$ , et cum  $pa$  et  $rb$  nunc sint loca corporum, accedentibus viribus sollicitantibus, erit quoque  $pr$  aequalis et parallela ipsi

ipsi *mn.* Quare manentibus iisdem viribus sollicitantibus motus impressus nihil mutat in situ et motu relativo amborum corporum.

## COROLL. 1.

246. Hoc etiam ad plura patet corpora: quotcunque enim fuerint, si singulis simul motus aequales et paralleli imprimantur, motus eorum relativus inter se non mutabitur, a quibuscunque etiam viribus singula sollicitentur.

## COROLL. 2.

247. Motus hic de novo impressus eodem redit, ac si totum spatium cum corporibus motu illo novo abriperetur uniformiter in directum. Compositio enim motus hic adhibita cum translatione spatii convenit.

## SCHOLION. 1.

248. Hic non tam de vera motus impressione sermo est, quae utique sine notabili concussione fieri non posset, quam de motu, quem corporibus mente tantum imprimi concipimus. Neque enim quae in isto capite traduntur, ad veras mutationes in motu factas sunt referenda, cum institutum nostrum hic sit motus quoscunque absolutos ad respectivos reducere, ita ut formulae tantum ostendant motum respectivum, absoluto nullam plane mutationem passo. Atque hinc etiam illud Theorema ex praecedente ita demonstrari potest: concipiatur praeter corpora A et B punctum O, quod secundum directionem Oo parallelam illi, secundum quam corporibus novus motus imprimitur, uniformiter moveatur eadem celeritate, ita ut tempusculo *dt* percursum esset spatium  $Oo = Ap = Bq$  his parallelum, sed contra directum. Quoniam igitur ante demonstravimus, motum respectivum corporum A et B respectu puncti O iisdem viribus atque absolutum determinari, evidens est hunc motum respectivum obtineri, si toti spatio cum corporibus motus aequalis et contrarius ei, quo punctum O movetur, imprimatur. Hoc autem modo punctum O ad quietem redigitur, corporibus A et B autem ipse ille motus secundum Ap et Bq imprimitur: et quia ea respectu puncti O eundem motum retineat, etiam inter se eundem motum relativum conservabunt.

## SCHOLION. 2.

249. Quaestio de motu quocunque respectivo seu apparente per calculum determinando eo redit, ut definiatur primo, qualis motus

N

cor-

corpori insuper mente saltem imprimi debeat, deinde a qualibus viribus praeter eas, quibus actu urgetur, sollicitari sit intelligendum, ut si hic motus tanquam absolutus tractetur, et per formulas supra traditas exprimatur, ipse motus respectivus, qui desideratur, sit proditurus. Evidens enim est, semper tam in motu insito, quam in viribus sollicitantibus ejusmodi mutationem concipi posse; ut motus hoc modo mutatus cum respectivo quem quaerimus conveniat. Totum ergo hoc negotium duplici mutatione, altera in motu insito, altera in viribus sollicitantibus facta absolvitur, quae autem utraque mente tantum instituitur; unde nulla difficultas ex eo nasci potest, quemadmodum corporibus A et B motus illi secundum  $Ap$ , et  $Bq$ , praeter eos motus, quibus jam feruntur, imprimi debeant. Sufficit enim declarasse, hanc impressionem ita esse intelligendam, ut corpus A celeritate  $Aa$  latum, si ipsi insuper celeritas  $Ap$  tribuatur, motu per diagonalem  $Aa$  expresso progredi sit censendum: Haec scilicet motus impressio seu potius additio conformis est regulis supra datis circa resolutionem motus in duos tresve laterales, quae etiam mente tantum instituitur. Talis motus impressio etiam ita referri solet, ut totum spatium cum corporibus in eo contentis motu quodam abripi concipiatur. Atque in priori quidem Theoremate vidimus, si punctum, cujus respectu motum assignari oporteat, uniformiter in directum progrediatur, pro motu respectivo definiendo nihil in viribus sollicitantibus esse mutandum, sed tantum motum insitum ita mutari debere, ut insuper imprimatur motus aequalis et contrarius ei, quo punctum illud moveatur.

## THEOREMA 8.

Fig. 26. 250. Si corpuscula A, B, C, utcumque moveantur a viribus quibuscunque sollicitata, eaque insuper secundum directiones parallelas a viribus ipsorum massis proportionalibus sollicitentur, eorum situs relativus non turbabitur.

## DEMONSTRATIO.

Fuerint nunc corpuscula in A, B, C, quae tam ob motum insitum quam vires sollicitantes tempusculo  $dt$  pervenirent in  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , quibus punctis jam eorum situs relativus definitur. Concipiamus autem ea interea praeter istas vires sollicitari singula secundum directiones parallelas  $aa$ ,  $bC$ ,  $c\gamma$  a viribus, quae sint ipsorum massis proportionales, eaque jam non in  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , reperientur, sed in  $a$ ,  $C$ ,  $\gamma$ , ita ut spatiola  $aa$ ,  $bC$ ,  $c\gamma$  futura sint inter se parallela et aequalia: atque

## CORPUSCULORUM A VIRIBUS QUIBUSC. &c. 99

atque evidens est, punctorum  $a$ ,  $C$ ,  $\gamma$  situm relativum inter se eundem fore ac punctorum  $a$ ,  $b$ ,  $c$  ubi essent futura, si hae novae vires non accessissent.

### COROLL. 1.

251. Si ergo corpuscula  $A$ ,  $B$ ,  $C$ , quovis instanti praeter vires quibus actu urgentur, a viribus ipsorum massis proportionalibus secundum directiones inter se parallelas sollicitentur, ad quodvis tempus eundem inter se situm relativum tenebunt, ac si istae novae vires abfuissent.

### COROLL. 2.

252. Motus igitur solis ac planetarum relativus inter se non immutatur, si singula haec corpora praeter vires, quibus actu sollicitantur, a novis viribus ipsorum massis proportionalibus impelli concipiuntur secundum directiones inter se parallelas.

### COROLL. 3.

253. Si istae vires adjectae ita assumantur, ut ea, quae in corpusculum  $A$  agit, aequalis sit et contraria ei, qua actu sollicitatur, hujus motus non immutabitur: quod si singulis momentis fieri concipiamus, corpusculum  $A$  in statu suo permanebit, et uniformiter in directum movebitur.

### EXPLICATIO.

254. Dubium hinc oriri potest, an etsi puncta  $a$  et  $C$  eundem situm inter se teneant ac puncta  $a$  et  $b$ , deinceps non alius situs relativus sit proditurus? Ad quod diluendum seponamus primo vires, quibus haec corpuscula actu sollicitantur, ac remotis etiam viribus adjectis sequenti temptusculo corpuscula pervenirent in  $a'$  et  $b'$ , ut esset  $aa' = Aa$  et  $bb' = Bb$ ; sin autem hae vires pro temptusculo praecedente  $ds$  admittantur, pervenient in  $a'$  et  $C'$ , ut sit  $aa' = Aa$  et  $CC' = Bb$ , sicque erit  $b'C'$  aequalis et parallela ipsi  $a'a'$ , ita ut situs relativus punctorum  $a'$ ,  $C'$  idem sit qui punctorum  $a$ ,  $b$ . Recte quidem hic obijceretur, spatiola  $aa'$  et  $CC'$  perperam ipsis  $Aa$  et  $Bb$  aequalia assumi, cum ob actionem virium celeritates sint mutatae, sed quia mutatio utrinque est similis, nihilominus spatiola  $a'a'$  et  $b'C'$  inter se manebunt aequalia et parallela, id quod sufficit, etiamsi non sint ipsorum  $aa'$  et  $b'C'$  praecise dupla. Quaecunque autem vires per alterum hoc

tempusculum  $dt$  in ambo corpuscula agant, prius A aequè ex  $a'$  detorquebitur, atque ex  $a'$ , et posterius B aequè ex  $C'$  atque ex  $b'$ : sicque etiam si novae vires massis proportionales accesserint siue secus, idem adhuc situs relativus conservabitur. Ponamus enim, a viribus propriis corpusculum A ex  $a'$  in  $m$  transferri, idemque ex  $a'$  in  $\mu$ , transferetur, ut sit  $a'm$  aequale et parallelum ipsi  $a'\mu$ ; simili modo si corpusculum B a propriis viribus, ex  $b'$  in  $n$  transfertur, idem ex  $C'$  in  $\nu$  transferetur, ut sit  $C'\nu$  aequale et parallelum ipsi  $b'n$ . Cum igitur puncta  $\mu$  et  $\nu$  eundem situm relativum teneant, quem puncta  $m$  et  $n$ , patet etiam, temporis successu a viribus illis insuper adjectis situm relativum non mutari.

## PROBLEMA. 19.

Fig. 25. 255. Si corpusculum B moveatur utcumque a viribus sollicitatum, ejus respectu determinare motum respectivum corpusculi A, quod etiam a viribus quibuscunque sollicitatum utcumque moveatur.

## SOLUTIO.

Imprimatur initio utrique corpori motus aequalis et contrarius ei, quo tunc corpusculum B fertur, ac primo saltem momento corpusculum in quietem redigetur: ambo autem corpora motu relativo inter se perinde incedent, ac si iste motus communis illis non fuisset impressus: quin etiam cum tantum in statu initiali haec mutatio sit facta, utriusque motus subsequens iisdem formulis exprimetur. Corpusculum vero B, quatenus actioni virium est subiectum, deinceps quidem movebitur; verum si id continuo insuper a viribus his contrariis et aequalibus agitur, concipiamus, ut illarum effectus destruat, id perpetuo in quiete perseverabit. Quare ne motus relativus turbetur, concipiamus etiam corpusculo A singulis temporis momentis similes vires applicari, quae scilicet sint contrariae illis, quibus corpusculum B sollicitatur, ad easque se habeant ut massa A ad massam B. Hoc modo corpusculum B plane ad quietem redigetur, motu alterius A respectu hujus non mutato, eritque ergo iste motus ipsius A ejus motus respectivus, qualis spectatori in B constituto esset appariturus. Ad hunc igitur motum respectivum per calculum determinandum, corpusculum A a duplicis generis viribus sollicitari est considerandum, primo scilicet ab iis ipsis viribus, quibus revera sollicitatur: deinde vires, quibus corpusculum B sollicitatur, in ratione massarum B ad A augeantur vel minuantur, atque secundum directiones contrarias corpusculo A insuper applicatae intelligantur. Ex his viribus motus corpusculi A, quasi esset absolutus, per praecepta ante

# CORPUSCULORUM A VIRIBUS QUITUSC. &c. 101

ante exposita determinetur, atque obtinebitur ejus motus respectivus quaesitus.

## COROLL. 1.

256. Si ergo elapso tempore  $t$  corpusculum A sollicitetur a vi  $= P$ , corpusculum B vero a vi  $= Q$ , hinc capiatur vis  $= \frac{AQ}{B}$ , quas insuper corpusculo A applicetur in directione contraria ei, qua vis Q in corpusculum B agit.

## COROLL. 2.

257. Quodsi ex his viribus, corpusculo A quovis tempore applicatis, formulae differentio-differentiales ejus motum definientes colligantur, integratio ad statum initialem, qui ut cognitus spectatur, est accommodanda, dum scilicet constantes per integrationes ingressae ex hoc statu determinantur.

## SCHOLION. 1.

258. Ope hujus regulae motus lunae, qualis ex centro terrae spectaretur, definiri solet; etsi enim corpora coelestia ob vastam magnitudinem hinc excludi videntur, tamen infra docebitur, ea perinde moveri, ac si eorum massae in cujusque centro gravitatis essent collectae, ita ut instar punctorum considerari possint. Ad motum ergo hunc lunae apparentem definiendum, non sufficit vires nosse, quibus luna continuo sollicitatur, sed etiam vires diligenter sunt inquirendae, quarum actioni ipsa terra subjicitur. Has vires deinde in ratione massae terrae ad massam lunae diminui oportet, haeque insuper lunae in directionibus contrariis iis, quibus in terram agunt, applicatae concipi debent; atque ex his viribus junctim sumtis motus lunae respectivus, qualis spectatori in centro terrae constituto esset appariturus, determinari debet. Simili modo si centrum solis non quiescat, motusque planetarum primariorum respectu centri solis sit definiendus, omnes vires, quas Sol subit, praecepto modo insuper in planetas transferri debent. Unde patet, usum hujus problematis per universam Astronomiam Theoreticam esse amplissimum; verum etiam inde in investigationem aliorum motuum, ubi saepenumero motus respectivos nosse expedit, maxima subsidia redundant.

## 302 CAPUT VI. DE MOTU RESPECTIVO &c.

### SCHOLIUM. 2.

259. Atque hæc sunt, quibus ea, quae in superioribus libris de motu punctorum exposui, partim illustranda partim supplenda sunt visa, ubi equidem non solum motus principia clarius exposuisse et confirmasse videor, sed etiam eorum applicationem ad quosvis casus non mediocriter sublevavi, reductionemque ad mensuras absolutas faciliorem reddidi. Tum vero etiam doctrinam de motu respectivo, in illis libris fere penitus neglectam, hic diligentius exponendam putavi, quoniam ea etiam in sequentibus uberrimum usum praeestabit. Progredior itaque ad eas Mechanicae partes, quas in istis libris plane non attigeram, ac primo quidem occurrant corpora rigida, quorum figura nullius computationis est capax, quorum motus evolvi oportebit, tam quando sibi sunt relicta, quam a viribus quibusque sollicitata. Tum vero deinceps licebit has investigationes ad motus corporum flexibilium, elasticorum atque adeo fluidorum prosequi: quorsum etiam referri debent motus ex concursu plurium corporum cujusque indolis oriundi. Quae diversa genera si perpendamus, intelligemus in Mechanica amplissimum campum aperiri nostris studiis, cujus cultura largissimam messem polliceatur.



TRA-

**TRACTATUS**  
**DE**  
**MOTU CORPORUM**  
**RIGIDORUM.**








# CAPUT I.

## DE MOTU PROGRESSIVO CORPORUM RIGIDORUM.

### DEFINITIO. 1.

260.  *Corpus rigidum* vocatur, cujus figura nullam mutationem patitur; seu cujus singula elementa constanter easdem inter se distantias conservant.

### COROLL. 1.

261. Cognito ergo loco quaternorum punctorum corporis rigidi, ejus situs innotescit, cum inde omnium reliquorum punctorum loca determinentur: dummodo quatuor illa puncta non sint in eodem plano.

### COROLL. 2.

262. plerumque etiam ad situm corporis rigidi cognoscendum sufficit positionem trium ejus punctorum nosse, dummodo non sint in directum sita: quanquam enim hoc modo duplex relinquitur situs, saepissime uter locum habeat, aliunde patet.

### EXPLICATIO.

263. Corpora rigida non ita definio, ut eorum figura nullam plane mutationem pati possit; quandoquidem constat, nulla in mundo dari corpora tam dura, quorum figurae [alterandae nullae omnino vires pares existant, cum etiam durissimus adamas diffringi queat. Ad classem ergo corporum rigidorum ea omnia refero corpora, quae dum moventur, actu nullam mutationem in figura sua patiuntur, seu quae vires, quarum actionem revera subeunt, sine ulla figurae suae mutatione

O

tione sustinere valeant, etiamsi majoribus viribus non resisterent. Ita in corporibus, quorum motus hic contemplari institui, ejusmodi structuram partiumque nexum statuo, qui a viribus ea actu sollicitantibus turbari nequeat, id minime curans, quando ab aliis viribus afficerentur. Hinc ad vires sollicitantes hic potissimum erit attendendum, quarum respectu corpora pro rigidis erunt habenda, quorum compages earum actioni satis resistat, etiamsi eadem respectu aliarum virium minime pro rigidis essent habenda. Fieri itaque poterit, ut corpora admodum mollia ac debilia nobis sint rigida, alia vero per se multo duriora hinc excludi debeant. Quare dum motus hujusmodi corporum investigamus, in vires, quibus eorum compages partiumque connexio afficitur, sedulo inquiri conveniet, ut intelligamus, quanta firmitate sit opus, ut figura conservetur. Corpus igitur ut rigidum spectabimus, quando nexus inter ejus partes satis est firmus, ut ne duo quidem elementa a viribus, quas actu sustinet, vel propius ad se invicem cogi, vel longius a se invicem divelli queant.

#### SCHOLION.

264. Corpus ergo rigidum aliud motum recipere nequit, nisi quo omnia ejus puncta easdem perpetuo inter se distantias conservant: nihilo vero minus tale corpus infinitorum motuum est capax, dum enim adeo unum aliquod ejus punctum quiescit, aliud per circumferentiam sphaerae circumferri potest, et quomodocunque hoc moveatur, tertium aliquod punctum sive celerius sive tardius moveri potest, ut tamen ab illis duobus debitas distantias servet. Ex quo intelligitur, si nullum punctum quiescat, adhuc multo majorem fore motuum multiplicitatem, qui quidem in corpore inesse possint: cognito autem trium punctorum non in directum sitorum motu, reliquorum omnium hoc est motus totius corporis innotescit. Inter omnes autem hos motus is est simplicissimus, quo singula corporis puncta secundum directiones inter se parallelas paribus celeritatibus quovis temporis momento promoventur: tali enim motu situs relativus omnium particularum nequaquam turbatur. Atque hoc motus genus, quod in omnia corpora cadit, accuratius contemplemur.

#### DEFINITIO. 2.

265. *Motus progressivus* est, quo singula corporis puncta paribus celeritatibus secundum directiones inter se parallelas quovis temporis momento promoventur.

CO-

## COROLL. 1.

266. Cognito ergo motu unici puncti omnium punctorum motus utpote illi aequalis innotescit: singula enim puncta quovis temporis momento secundum eandem directionem et eadem celeritate feruntur, atque illud punctum.

## COROLL. 2.

267. Sive ergo unum aliquod punctum lineam rectam sive curvam motu quocunque describit, omnia plane puncta in-aequalibus lineis sive rectis sive curvis simili modo movebuntur.

## COROLL. 3.

268. Tali motu, sive sit rectilineus sive curvilineus, distantiae binorum quorumque punctorum corporis non mutantur. Quin etiam rectae bina quaeque puncta jungentes perpetuo sibi manent parallelae.

## SCHOLION.

269. Hic motus tanquam simplicissimus, et cuius omnia corpora sunt capacia, primus se considerandum offert, eumque in motibus corporum coelestium primo animadvertimus. Dum enim ea ut puncta spectamus, calculum ita instituimus, quasi solo motu progressivo per coelos ferrentur, ac deinceps demum ipsis insuper motum gyratorium tribuimus: ubi quidem prior motus *periodicus*, posterior *vertiginis* vocari solet. Quando autem corpori solum motum progressivum sine ullo adjuncto gyratorio tribuimus, rem ita concipimus, ut rectae bina quaeque puncta corporis jungentes perpetuo sibi parallelae seu eadem coeli plagas versus directae maneant. At quoties haec conditio in quopiam motu locum non habet, illud corpus non motu progressivo solo seu puro moveri, sed insuper motus quidam gyratorius admisceri censetur, cuiusmodi admixtio quomodo fiat, infra fusius exponetur. Ceterum hinc statim patet, lunam, quoniam terrae semper fere eandem faciem obvertit, non motu progressivo puro promoveri, sed ei motum quandam gyratorium admisceri. Quae ergo hoc capite tradentur, de motu progressivo puro, etiamsi vox *puri* non adjicitur, intelligenda sunt, quando enim gyratio quaedam superadditur, motus in aliud genus transit.

## THEOREMA. 1.

270. Corpus, cui semel fuerit impressus motus progressivus, ob inertiam perpetuo hoc motu uniformiter in directum progredi perget, nisi a causis externis turbetur.

Q 2

DEMON-

## DEMONSTRATIO.

Concipiatur corpus in minima elementa divisum, et cum singula aequales celeritates secundum directiones parallelas acceperunt, dum in statu suo perseverare conantur, situm relativum inter se non mutant. Omnia ergo simul motum suum uniformiter in directum profectui possunt, sine ullo penetrationis periculo: hincque nulla nascetur vis, quae cujusquam elementi statum immutare tendat. Singula igitur elementa perinde motum suum continuabunt, ac si a se invicem essent soluta, nulloque nexu inter se cohaerent. Quare nisi externae causae accedant, corpus, quod semel acceperit motum progressivum, hoc motu perpetuo uniformiter in directum progredi perget.

## COROLL. 1.

271. Quemadmodum ergo corpus finitum, si semel quieverit, quiescere pergit, ita si semel motum progressivum acceperit, eundem perpetuo conservat. Sicque perseverantia in eodem statu etiam ad corpora finitae magnitudinis patet, dummodo motus fuerit progressivus.

## COROLL. 2.

272. Quia a continuatione hujus status partium corporis nexus nullam vim patitur, conservatio figurae etiam nullam firmitatem exigit; respectu ergo talis motus omnia corpora ut rigida considerari possunt.

## COROLL. 3.

273. Inertia ergo est causa, quod omnia corpora, ne fluidis quidem exceptis, quorum particulae nullo vinculo inter se connectuntur, vel in eodem statu quietis, vel in eodem statu motus progressivi perseverent.

## EXPLICATIO.

274. Veritas Theorematis hoc nititur fundamento, quod singula elementa motum suum libere profectui possint, neque ullum impediat, quo minus reliqua in suo statu perseverent. Cujus ratio clarius percipitur, si casum contemplemur, quo corpori initio motus quidam gyriorius fuerit impressus, ita ut alia elementa celerius alia tardius moveri inceperint: tum enim si singula elementa suum quaeque motum continuarent, mox a se invicem separarentur ac dissiparentur, sicque corporis

corporis compages dissolveretur. Hoc ergo casu nexus particularum obstaret, quo mihi singula elementa motum impressum prosequi possent. Quod cum non eveniat, si singulis elementis motus aequales secundum directiones parallelas fuerint impressi, quae est conditio motus progressivi, nulla etiam causa adest, cur cujusquam elementi status mutaretur. Quin etiam nullum elementum in motu suo mutationem pati posset, quin simul status reliquorum perturbaretur. Ex quo necesse est, ut corpus, quod semel hujusmodi motum progressivum acceperit, eodem motu perpetuo uniformiter in directum progredi debeat. Ubi imprimis notandum est, in tali motu compagem partium nullam vim sustinere, ita ut etiam si inter se omni nexu destituerentur, tamen easdem perpetuo distantias inter se essent conservaturae. Quare cum nulla hinc gignatur vis figuram corporis mutare tendens, cui rigiditas resistere debeat, omnia corpora respectu talis motus tanquam rigida spectari possunt.

THEOREMA. 2.

275. Si corporis motu progressivo lati singula elementa viribus, quae massis eorum sint proportionales, secundum directiones inter se parallelas sollicitentur, eorum situs relativus non mutabitur, et singula elementa motum quaeque suum libere continuabunt.

DEMONSTRATIO.

Quia vires singula elementa sollicitantes ipsorum massis statuuntur proportionales, effectus eodem tempusculo producti erunt aequales, et quia directiones virium sunt inter se parallelae, ab actione virium situs partium relativus non mutabitur, et singula elementa perinde movebuntur suis quaeque viribus obsequentia, ac si a se invicem essent dissoluta. Omnia scilicet elementa quovis momento aequaliter movebuntur, ita ut motus totius corporis aequalis sit futurus motui, quo quodque ejus elementum, si esset solitarium, moveretur; ideoque motus corporis erit progressivus.

COROLL. 1.

276. Neque ergo hoc casu, etiam si vires adsint sollicitantes, compages partium ullam vim sustinet. Ex quo si etiam corpus esset fluidum, ejusque partes nullo nexu invicem cohaererent, tamen figuram suam conservaret, et pro rigido haberi poterit.

## COROLL. 2.

277. Prout ergo vires singulis temporis momentis fuerint comparatae, singula corporis elementa in lineis vel rectis vel curvis movebuntur, ac, si unius motus erit determinatus, simul motus totius corporis innotescit.

## COROLL. 3.

278. Corpus autem ab ejusmodi viribus sollicitari ponitur, quae in singula corporis elementa ita agunt, ut sint in massis eorum proportionales, et secundum directiones inter se parallelas agant. Deinde requiritur, ut corpus initio vel fuerit in quiete, vel motum acceperit progressivum purum, quo singula ejus elementa celeritatibus aequalibus secundum eandem directionem moveri coeperint.

## SCHOLION.

279. Si quis dubitet, an dentur ejusmodi vires, quae in singula corporis elementa ita agant, ut sint in massis eorum proportionales, simulque ea secundum eandem directionem sollicitent? exemplum quidem gravitatis adduci posset, quae, ut jam supra notavimus, singula corporum elementa et quidem pro ratione massae afficit. Verum haec proprietas tantum in corporibus tam exiguae molis admitti potest, ut prae distantia a centro terrae pro nihilo haberi queat: si enim corpus insignem habeat molem, ejus elementa, quae a centro terrae magis minusve distant, inaequales actiones gravitatis subibunt; deinde etiam singularum virium directiones, quippe quae circa centrum terrae convergunt, non amplius pro parallelis haberi possunt. Sed hic minime de eo quaeritur, an ejusmodi vires, quales in Theoremate assumimus, in mundo existant? sufficit enim, ejus veritatem pro talibus viribus etsi forte fictis agnovisse. Quod autem de his viribus demonstravimus, idem etiam de aliis, quae his aequivaleant, valebit; atque hinc erat exordiendum, si quidem effectum quarumcunque virium in corpora rigida agentium indagare velimus. Quales vero vires his assumtis aequivaleant, posito scilicet corpore rigido, in Statica docetur, unde investigatio unius vis illis aequivalentis est haurienda. Eatenus autem tantum reductio omnium istarum infinitarum virium ad unicam habet locum, quatenus corpus est rigidum, mutationique figurae resistit, si enim omnia ejus elementa a se invicem prorsus essent dissoluta, loco harum virium alias, quae ipsis perfecte aequivalerent, substituere non liceret. Nunc igitur ratio rigiditatis, seu

# PROGRESSIVO CORPORUM RIGIDORUM. III.

sp. simplicitatis, quae partes corporis invicem connectuntur, in com-  
putum ingreditur.

## P R O B L E M A. 1.

280. Si corporis rigidi singula elementa secundum directiones in-  
ter se parallelas a viribus sollicitentur, quae sint ipsorum massis pro-  
portionales, invenire unam vim omnibus illis viribus junctim sum-  
tis aequivalentem.

## S O L U T I O.

Referatur corpus rigidum ad ternas directrices OA, OB, OC, Fig. 27.  
inter se normales, et sit in Z ejus elementum quodcumque, cujus massa  
ponatur =  $dM$  vocata totius corporis massa =  $M$ . Statuantur pro pun-  
cto Z ternae coordinatae directricibus parallelae  $OX = x$ ,  $XY = y$  et  
 $YZ = z$ . Sollicitentur ergo singula corporis elementa a viribus ipso-  
rum massis proportionalibus secundum directiones directrici OC paral-  
lelas, ita ut elementum  $dM$  in Z sollicitetur in directione  $Zv$ , vi =  
 $\lambda dM$ . Quia omnes istae vires sunt inter se parallelae, vis omnibus  
aequivalens eandem tenebit directionem eritque summae omnium ae-  
qualis, ita ut sit =  $\lambda M$ . Designet recta GV ipsi OC parallela hanc  
vim aequivalentem =  $\lambda M$ , cujus positio ex puncto G, ubi ea per pla-  
num AOB transit, innotescet. Ductis ergo inde rectis GE et GF di-  
rectricibus OB et OA parallelis, vocetur  $OE = e$  et  $OF = f$ , atque  
ex Statica constat, momentum vis GV respectu cujusvis axis aequale  
esse debere momenti singularium virium respectu ejusdem axis simul  
sumtis. Iam respectu axis OA vis  $Zv = \lambda dM$  momentum est  $\lambda y dM$   
omniumque momentorum summa =  $\lambda y dM$ , quae aequalis esse de-  
bet momento vis GV, quod est =  $\lambda M f$ , unde fit  $f = OF = GE =$   
 $\frac{\int y dM}{M}$ . Simili modo respectu axis OB erit vis  $Zv = \lambda dM$  momentum  
=  $\lambda x dM$ , ejusque integrale =  $\lambda x dM$ , quod aequale esse debet mo-  
mento vis GV =  $\lambda M$  respectu ejusdem axis, quod est =  $\lambda M e$ , unde  
fit  $e = OE = GF = \frac{\int x dM}{M}$ . Atque his formulis vera positio vis ae-  
quivalentis GV determinatur, cujus quantitas est =  $\lambda M$ , directio pa-  
rallela directrici OC, ac distat a plano AOC intervallo  $GE = \frac{\int y dM}{M}$ ,  
a plano autem BOC intervallo  $GF = \frac{\int x dM}{M}$ . Sicque una habetur vis  
GV =



$GV = \lambda M$  omnibus viribus elementaribus  $Zv$  aequivalens, si modo corpus fuerit rigidum, uti in Statica assumitur.

## COROLL. 1.

281. Dum ergo vires elementares  $Zv$  sint massulis proportionales et inter se parallelae, vis omnibus aequivalens  $GV$  eandem habet positionem, siue illae vires sint majores siue minores, littera enim  $\lambda$  non ingreditur in distantias  $GE$  et  $GF$ .

## COROLL. 2.

282. Quia vis aequivalentis  $GV = \lambda M$  directio est rectae  $OC$  parallela, si modo unicum punctum veluti  $I$  constaret, per quod transeat, ejus positio perfecte determinaretur. Ex formulis autem pro  $GE$  et  $GF$  inventis patet, directionem  $GV$  per centrum gravitatis corporis transire.

## COROLL. 3.

283. Vis igitur  $GV = \lambda M$  totum corpus, si modo motu progressivo puro feratur, perinde afficiet, ac vis quaelibet elementaris  $Zv = \lambda dM$  elementum corporis  $dM$ : totiusque corporis motus manebit progressivus, dum singula ejus elementa pari motu proferentur.

## SCHOLION.

284. Quoniam, si singulae vires elementares sunt directrici  $OC$  parallelae, media directio  $GV$  distat a plano  $AOC$  intervallo  $GE = \frac{\int y dM}{M}$ , et a plano  $BOC$  intervallo  $GF = \frac{\int x dM}{M}$ : ita si vires elementares massulis quoque elementorum proportionales sint parallelae directrici  $OB$ , media directio eidem erit parallela, et a plano  $BOC$  distabit intervallo  $= \frac{\int x dM}{M}$ , et a plano  $AOB$  intervallo  $= \frac{\int z dM}{M}$ . Simili modo si vires elementares essent parallelae directrici  $OA$ , media directio eidem foret parallela, et a plano  $AOB$  distaret intervallo  $= \frac{\int z dM}{M}$ , et a plano  $AOC$  intervallo  $= \frac{\int y dM}{M}$ . Quare cum hae mediae directiones omnes tam a plano  $AOB$ , quam  $AOC$  et  $BOC$  aequis intervallis distent,

stent, eae se in communi puncto secabunt: quod punctum si sit I, erit ejus situs ita comparatus, ut sit:

$$OE = \frac{\int x dM}{M}; EG = \frac{\int y dM}{M}; GI = \frac{\int z dM}{M}.$$

Puncto ergo hoc I semel invento, si singula corporis elementa a viribus ipsorum massis proportionalibus secundum directionem communem quamcunque sollicitentur, vis illis omnibus aequivalens per hoc punctum I transibit. Et quia vis aequivalens summae omnium virium elementarium est aequalis, et eandem directionem tenet, ejus positio per punctum I perfecte determinatur. Convenit autem hoc punctum cum eo, quod vulgo *centrum gravitatis* vocatur, cujus convenientiae ratio manifesta est, quoniam singula elementa massis proportionaliter gravia, et directiones gravitatis inter se parallelae assumuntur. Quoniam vero haec hypothesis veritati adversatur, et punctum I minime a gravitate pendet, sed in omnibus corporibus locum habet, id alio nomine appellari praestabit.

### DEFINITIO. 3.

285. *Centrum massae seu centrum inertiae* est punctum in quovis corpore, circa quod ejus massa seu inertia quaquaversus aequaliter est distributa secundum aequalitatem momentorum.

### EXPLICATIO.

286. *Centrum massae seu inertiae* idem est punctum, quod vulgo *centrum gravitatis* vocatur: cum autem hoc punctum ita omnibus corporibus sit essentielle, ut iis ob inertiam solam conveniat, gravitas autem pro vi extrinsecus in corpora agente sit habenda: malui ei nomen centri massae seu inertiae tribuere, ut intelligatur, id per solam inertiam determinari. Quod autem de aequali distributione massae circa hoc centrum commemoravi, minus facile explicatur. Optima explicatio sine dubio ex regula, qua hoc centrum invenitur, est petenda. Scilicet referatur corpus ad ternas directrices OA, OB, OC inter se normales, quibus parallelae constituentur coordinatae, tam pro quovis corporis elemento, quam pro centro inertiae I, quod quaeritur. Sit massa totius corporis = M, cujus quodpiam elementum consideretur in Z ejus massula posita = dM, ac vocatis coordinatis OX = x, XY = y et YZ = z, situs centri inertiae I ita determinatur, ut sit  $OE = \frac{\int x dM}{M}$ ;

P

EG =

$EG = \frac{\int y dM}{M}$  et  $GI = \frac{\int z dM}{M}$ , his integralibus per totum corpus extensis.

Quod si ergo punctum  $O$  in ipso centro inertiae  $I$  capiatur, haec tria integralia  $\int x dM$ ,  $\int y dM$ , et  $\int z dM$  evanescent, unde hanc centri inertiae indolem discimus, ut si corpus secetur plano quocunque per centrum inertiae transeunte, singula elementa corporis per distantias ab hoc plano multiplicata utrinque eandem summam producant. Atque ita intelligenda sunt, quae de aequali materiae distributione circa centrum massae seu inertiae secundum aequalitatem momentorum sunt dicta.

#### COROLL. 1.

287. Si ergo singula corporis elementa secundum eandem directionem a viribus ipsorum massulis proportionalibus sollicitentur, iis una vis summae omnium aequalis et parallela, atque in centro inertiae applicata aequivalebit, si quidem corpus fuerit rigidum.

#### COROLL. 2.

288. Ac vicissim si corpori rigido in centro inertiae applicata fuerit vis quaecunque, ea quasi per omnia corporis elementa massis proportionaliter distributa considerari poterit. Atque ob aequivalentiam effectus in motu turbando erunt aequales.

#### SCHOLION.

289. Quod si ergo corpus rigidum a vi sollicitetur, cujus directio transeat per ejus centrum inertiae, illi si quieverit motus progressivus imprimetur, sin autem jam motu progressivo feratur, ejus quidem vel celeritas vel directio vel utraque mutabitur, verum tamen ita ut motus maneat progressivus. Hoc est, si in corpore ductas concipiamus lineas rectas quascunque, eae durante motu perpetuo sibi manebunt parallelae, quod est criterium motus progressivi. Quomodo ergo hujusmodi motum corporis rigidi determinari conveniet, in sequente problemate videamus. Interim cavendum est, ne aequivalentia virium hic monstrata ad corpora non rigida extendatur, quandoquidem fundamentum ejus, quod in aequilibrio vectis est positum, corrueret, si vectis a viribus posset inflecti. Quocirca hic corpora tam rigida assumo, ut a viribus sollicitantibus nullam mutationem in figura sua patiantur; ac deinceps investigabo, quam firma eorum compages esse debeat, ut actionem virium sine ulla figurae mutatione sustinere valeant.

PRO-

## PROBLEMA. 2.

290. Si corpus rigidum, quod initio vel quieverit, vel motum progressivum acceperit, continuo sollicitetur a viribus, quarum media directio per ejus centrum inertiae transeat; ejus motum determinare.

## SOLUTIO.

Quia vis, qua corpus sollicitatur, vel si plures fuerint, earum media directio perpetuo per ejus centrum inertiae transit, motus quomodocunque tam ratione celeritatis quam directionis mutabitur, tamen usque inanabit progressivus. Ad eam ergo cognoscendum sufficit, motum unicum ejusmodi ejus puncti definivisse: quam enim positionem corpus initio respectu hujus puncti tenuerit, eam deinceps perpetuo servabit, si quidem uti assumimus, initio vel quieverit, vel motum progressivum purum acceperit. Quaeri igitur potissimum conveniet motum ejus centri inertiae, quoniam vis sollicitans tanquam ei applicata concipi potest. Sit itaque massa corporis =  $M$ , et elapso tempore =  $t$  sollicitetur a vi =  $V$ , seu si a pluribus simul sollicitetur, sit  $V$  vis iis omnibus aequivalens, directionem habens, per centrum inertiae transeuntem. Quod si jam in hoc centro elementum corporis, cujus massula sit =  $\dot{m}$ , denotante  $\dot{m}$  fractionem infinite parvam, concipiamur, ea a simili particula  $\dot{m}V$  totius vis sollicitari est censenda. Verum ex doctrina sollicitationum ante tradita patet, massam  $\dot{m}$  a vi  $\dot{m}V$  perinde affici, ac massam  $M$  a vi  $V$ , quoniam ratio tantum massae ad vim in calculum ingreditur. Rem ergo ita concipere licet, ac si tota corporis massa  $M$  in ejus centro inertiae collecta, eique vis tota  $V$  applicata esset; ex quo problematis hujus solutio a superioribus de motu puncti datis non discrepabit. Scilicet ut rem generalissime complectamur, referamus motum ad ternas directrices  $OA$ ,  $OB$  et  $OC$ , inter se normales, elapsoque tempore  $t$  pervenerit centrum inertiae in  $S$ , coordinatis existentibus  $OX = x$ ,  $XY = y$  et  $YS = z$ . Deinde vis sollicitans  $V$  pariter secundum has tres directiones resolvatur, unde orientur vires secundum  $SP = P$ ; secundum  $SQ = Q$  et secundum  $SR = R$ . Hinc sumpto elemento temporis  $dt$  constante totus motus his tribus formulis determinabitur:

Fig. 21.

$Mddx = 2gPdt^2$ ;  $Mddy = 2gQdt^2$ ;  $Mddz = 2gRdt^2$   
 quae quomodo quovis casu sint tractandae, jam supra est expositum.

## COROLL. 1.

291. Casu ergo, quo corpus rigidum motu progressivo profertur, ideoque media directio virium sollicitantium per ejus centrum inertiae

P 2

tra-

transit; totam corporis massam tanquam in centro inertiae collectam  
eique vim æquivalentem applicatam concipere licet.

## COROLL. 2.

292. Cum ad datum tempus locus centri inertiae fuerit inventus,  
etiam totius corporis situs innotescet, quippe qui respectu centri in-  
ertiae idem erit perpetuo; qui fuerat initio: eadem enim corporis par-  
tes semper ad easdem mundi plagas spectabunt.

## COROLL. 3.

293. Inventa porro ad quodpiam tempus celeritate centri inertiae,  
simul omnia corporis puncta pari celeritate movebuntur, omniumque  
directiones inter se erunt parallelæ: ita ut totius corporis motus ex  
motu centri inertiae perfecte cognoscatur.

## SCHOLION. 1.

294. Omnia ergo, quæ de motu libero punctorum seu corpuscu-  
lorum infinite parvorum in superioribus libris sunt tradita, etiam pro  
motu corporum rigidorum progressivo valent, ideoque cum in se ni-  
mis sterilia videantur, nunc amplissimum usum habebunt, cum eo uni-  
versum genus motuum progressivorum sit referendum. Quoties nimi-  
rum corpora rigida motu progressivo incedunt, quod sit, si virium sol-  
licitantium media directio per eorum centrum inertiae transit, eaque  
initio vel quieverint, vel motu progressivo fuerint impulsæ, eorum mo-  
tus per Theoriam motus punctorum jam cumulate expositam determi-  
nari poterit; unde hanc tractationem fusius persequi superfluum foret.  
Hinc autem statim diximus, si virium corpora coelestia sollicitantium  
media directio per eorum centrum inertiae transeat, eaque semel motu  
progressivo puro ingredi coepissent, ea perpetuo talem motum esse  
conservatura, neque unquam motum vertiginis esse adeptura. Quare  
cum motu vertiginis gyron observentur, necesse est, ut ipsis talis mo-  
tus jam ab initio fuerit impressus, vel ut media directio non perpetuo  
per eorum centrum inertiae transeat, quod posterius in luna evenire  
merito suspicamur.

## SCHOLION. 2.

295. Ne autem, dum corpora talibus viribus sollicitata moventur,  
in figura sua mutationem patiantur, eorum compagem satis firmam esse  
oportet, quare quantam vim ea sustineat, erit definiendum. Ac pri-  
mo

mo quidem jam animadvertimus, si singulis corporis elementis vires  
 ipsorum massulis proportionales secundum eandem directionem essent  
 applicatae, compagem corporis nullam plane vim sustinere, sed figu-  
 ram, etiam si partes a se invicem penitus essent dissolutae, conserva-  
 tum iri. Quas autem vires nunc ostendimus illis aequivalere, id tan-  
 tum ratione motus est intelligendum, et quatenus ab illis sunt diversae,  
 eatenus etiam figuram mutare tendent; quod ne eveniat, compagem  
 satis firmam esse oportet. Ex quo jam perspicuum est, judicium, quan-  
 ta compagis firmitate opus sit, eo reduci, ut vires, quibus corpus  
 actu sollicitatur, cum viribus illis elementaribus, quibus aequivalent,  
 comparentur, quoniam quo magis ab iis fuerint diversae, eo plus con-  
 ferent ad compagem destruendam. Quare quo clarius hoc argumen-  
 tum evolvere queamus, vires illas, etiam si ratione motus aequipolle-  
 ant, sollicite a se invicem distingui conveniet, quem in finem sequen-  
 tem definitionem praemitto.

#### DEFINITIO. 4.

296. *Vires elementares* sunt vires, quae singulis corporis elemen-  
 tis seorsim applicatae in iis eandem status mutationem producerent,  
 quam eadem in motu corporis revera subeunt.

#### EXPLICATIO.

297. Has vires elementares sollicite distingui convenit a viribus  
 corpus actu sollicitantibus. Cum enim cognovimus motum corporis a  
 viribus sollicitantibus productum, dispendendum est, quantum cujus-  
 vis elementi status turbetur: tum singula elementa quasi seorsim exis-  
 rent considerentur, facileque ex praecedentibus vires definientur, quae  
 iis applicatae eandem status mutationem producerent; atque istae vi-  
 res junctim sumtae sunt eae, quas in posterum sub nomine virium ele-  
 mentarium sum complexurus. Ex quo quidem statim liquet, has vires  
 elementares junctim sumtas esse aequivalentes viribus actu sollicitanti-  
 bus, quoniam ambae in motu corporis eandem mutationem pariunt.  
 Nempe si elementum corporis, cujus massula sit  $dM$ , motu vel vero  
 vel resoluta secundum quandam directionem, in qua tempusculo  $dt$   
 spatium  $dx$  describat, ita acceleretur, ut sumto  $dt$  constante incre-  
 mentum spatii  $dx$  prodeat  $ddx$ : tum vis secundum eandem directio-  
 nem urgens erit  $= \frac{dMddx}{2gdt^2}$ . Unde si motus elementi secundum binas  
 vel ternas directiones fuerit resolutus, vis elementaris ejus statum per-  
 tur-

turbans colligetur, sicque innotescant vires elementares pro quavis motus mutatione.

### COROLL. 1.

298. Vires ergo elementares simul sumtae viribus actu sollicitantibus aequivalent, ac praeterea ita sunt comparatae, ut ab iis compages corporis nullam vim patiatur; propterea quod ab iis singula elementa, perinde quasi sola adessent, afficiuntur.

### COROLL. 2.

299. In motu igitur progressivo vires elementares sunt eas vires, quae singulis elementis eandem motus mutationem inducunt, quam totum corpus a viribus sollicitantibus patitur.

### PROBLEMA. 3.

300. Si corpus a viribus quibuscunque sollicitatum, quarum media directio per ejus centrum inertiae transit, motu progressivo libere moveatur, determinare vires, quas ejus compages sustinet, ne solvatur.

### SOLUTIO.

Fig. 28.

Ad datum tempus sollicitetur corpus a viribus EP' et FQ, quibus aequivaleat vis  $IV = V$  per centrum inertiae I transiens, quae, si massa corporis fuerit  $= M$ , in toto corpore eundem effectum producat, atque in elemento ejus quocunque  $M$ , cujus massa sit  $dM$ , produceret vis  $Mm = \frac{V dM}{M}$ , cujus directio  $Mm$  illi  $IV$  esset parallela: sicque  $Mm$  exhibebit vim elementarem. Cum igitur quaeratur, quantum vim sustineat compages corporis, a viribus EP et FQ actu sollicitantibus, seu quam fortis ea esse debeat, ut figura nullam mutationem patiatur? quoniam corpus in motu versatur, ejusmodi status quietis seu aequilibrii assignari debet, in quo figura corporis pari virium actioni esset subiecta. Ad talem autem statum pervenimus, si corpori mente saltem ejusmodi motum et vires tribuamus, unde compages nullam vim sustineat, ipsum autem corpus ad perfectam quietem redigatur. Quicumque autem corpus habuerit motum, ipsi primo aequalis et contrarius imprimatur, ut hoc saltem instanti corpus in quiete existat: hoc vero motu fictitio nulla vis compagi corporis infertur. Nunc autem praeterea motus a viribus sollicitantibus penitus tolli debet,

bet, per ejusmodi vires, quae compagem non afficiant, quod fit, si singulis elementis vires elementaribus aequales et contrariae applicatae concipiantur: elemento nempe  $dM$  in  $M$  existenti vis  $Mv = \frac{VdM}{M}$ , cujusmodi vires singulis elementis applicatae sunt intelligendae: hocque modo corpus in statum quietis reducitur. Quamobrem corpus a viribus EP et FQ, quibus aequivalet vis  $IV = V$  per centrum inertiae transiens, sollicitatum, quomodocunque motu progressivo feratur, ratione compagis perinde afficitur, ac si quiesceret, eique praeter vires actu sollicitantes EP et FQ applicatae essent in singulis elementis vires viribus elementaribus aequales et contrariae. In hoc statu aequilibrii haud difficile erit judicare, quam valide partes corporis inter se esse debeant connexae, ut earum compages ab istis viribus non turbetur.

COROLL. 1.

301. Vires igitur, quibus compages corporis resistere debet, sunt 1°, vires corpus actu sollicitantes, et 2°, vires elementares contrario modo applicatae: quae contraria applicatio si signo negationis exprimatur, vires sollicitantes dentis viribus elementaribus dabunt vires compagem afficientes.

COROLL. 2.

302. Cum hic de motu corporum rigidorum sit sermo, structura corporum tam firma sit necesse est, ut his viribus compagem afficientibus resistere valeat. Ac nisi ad hoc satis roboris haberet, motus huc non pertineret.

SCHOLION. 1.

303. Regula, quam hic invenimus pro viribus compagem corporis afficientibus determinandis latissime patet, atque ex principio Metaphysico, quod causa semper aequalis sit effectui pleno, deduci potuisset, si modo hoc principium recte intelligatur; plerumque enim nimis vage proponi solet, quam ut inde quicquam tuto concludi queat. Hic autem vires actu sollicitantes vicem causae gerunt, quam littera V designemus; deinde effectus est duplex, alter quo motus corporis afficitur, cujus loco assumi debent vires elementares mutationem motus immediate efficientes, quas vires simul littera T denotemus. Alter vero effectus in conatu structuram corporis turbandi consistit, cujus loco sumi debent vires compagem afficientes, quas littera S notemus.



potamus. Cum igitur a causa  $V$  producat effectus  $= T + S$ , censei debet  $V = T + S$ , unde colligitur  $S = V - T$ , prorsus uti invenimus. Verum in tanta rerum metaphysicarum caligine malim demonstrationem allatam adhibere ad principium metaphysicum illustrandum.

### SCHOLION. 2.

304. Sufficiat autem hic nobis, eas vires assignasse, quas compages corporum rigidorum sustinere debet: quomodo enim his viribus resistat, id pendet a structura corporum, et modo quo partes inter se cohaerent, et quasi glutine quodam connectuntur. Quae cohaesionis ratio cum in diversis corporum generibus plurimum discrepet, ad Physicam potius quam Mechanicam referenda videtur. Interim satendum est, hoc argumentum adhuc parum esse cultum, ac principia, quibus firmitas corporum innititur, plerumque penitus nobis esse incognita; quae doctrina utique mereretur, ut omni studio investigaretur. Verum hoc minimè ad praesens institutum pertinet, in quo tantum assumimus corpora, quorum motum consideramus, sufficienti gradu rigoris esse praedita, ut a viribus, quibus afficiuntur, nullam mutationem in figura patiantur, minime curantes, quomodo structura et cohaesio partium sit comparata. Ceterum satis verisimile videtur, nullam partium connexionem tam esse robustam, quae actioni talium virium, etiam si sint minimae, non aliquantillum cedant: quemadmodum nullum est dubium, quin corpora etiam durissima in mutua collisione sibi quasdam impressiones inducant, etsi eae plerumque sensus nostros effugiant. Quae sententia si vera esset, nulla plane corpora pro rigidis haberi possent, nisi quae nullas omnino vires compagem turbare conantes sustinerent: cum etiam a minimis viribus mutatio quaedam in figura produceretur. Verum utram corpora talia rigida, qualia hic assumo, in mundo existant, nec ne? haec quaestio praesentem tractationem non tangit, cum in omnibus disciplinis liceat objecta non existentia contemplari, quo facilius deinceps ad existentia transitus pateat. Neque enim in Mechanica in motum corporum non rigidorum inquire licet, nisi ante doctrina de motu rigidorum fuerit constituta. Interim tamen negari nequit, quin ejusmodi dentur corpora, quae viribus tantopere resistant, ut mutatio in eorum figura orta plane sit imperceptibilis, atque hoc plerumque sufficit, ut talia corpora, pro perfecte rigidis habere possimus.

### P R O B L E M A. 4.

305. Si corpus rigidum quiescens a vi, cujus directio per ejus centrum

centrum inertiae transit, sollicitetur, determinare spatium, per quod tempusculo minimo protrudetur, simulque celeritatem, quam acquirat.

### SOLUTIO.

Fig. 22.

Quia tempus ut minimum assumitur, vis interea ut constans et eandem directionem servans considerari potest. Sit igitur massa corporis rigidi  $= M$ , cui applicata sit vis  $= V$ , cujus directio IV per centrum inertiae I transeat. In hac ergo directione IV punctum I promovebitur, totumque corpus similem motum progressivum adipiscetur. Ponamus id elapso tempore  $t$ , quod ut minimum spectetur, translatum fuisse per spatium  $Ii = x$ , et in  $i$  jam celeritatem acquisivisse  $= v$ , erit sumto elemento  $dt$  constante  $Mddx = 2gVdt^2$ , seu  $\frac{ddx}{dt} = \frac{2gVdt}{M}$ , unde ob vim  $V$  constantem elicitur  $\frac{dx}{dt} = \frac{2gVs}{M}$ ; ubi cum  $\frac{dx}{dt}$  celeritatem  $v$  exprimat, quae per hypothesein evanescit posito  $t=0$ , additione constantis non est opus. Hinc habetur elapso tempore  $t$  celeritas  $v = \frac{2gVs}{M}$ ; deinde ob  $dx = \frac{2gVsdt}{M}$ , elicitur spatium tempore  $t$  confectum  $Ii = x = \frac{gVt^2}{M}$ .

### COROLL. 1.

306. Est ergo spatium  $Ii$ , per quod corpus tempusculo  $t$  protruditur, ut quadratum temporis, celeritas vero acquisita  $v$  ipsam temporis rationem sequitur. Tum vero est  $2x = vt$ , seu celeritate acquisita  $v$  eodem tempore  $t$  duplum spatium  $2x$  percurri potest.

### COROLL. 2.

307. Haec eadem quoque valent pro tempore quantumvis magno  $t$ , dummodo interea vis  $V$  perpetuo eandem quantitatem et directionem retineat; corpusque initio quieverit.

### SCHOLION.

308. Motus corporum rigidorum perinde ac corpusculorum infinite parvorum duplici modo est tractandus, prout fuerit vel liber, vel ob extrema impedimenta restrictus. Atque hoc quidem caput ad motum

Q

tum liberum pertinet, quandoquidem extrinsecus nihil ob stare assumimus, quo minus corpus sollicitationi virium obsequatur: verumtamen minimam tantum ejus partem complectitur, dum corpus libere motum, praeter motum progressivum purum, quem hic sum contemplatus, infinitis modis motus gyratorios recipere potest: a cujusmodi motu complicato evolvendo, et quomodo is a viribus quibuscunque perturbetur, adhuc longissime absumus. Neque hanc investigationem suscipere licet, ante quam motus gyratorios circa axes fixos expediverimus; hinc enim deinum ad motus gyratorios circa axes mobiles, ac porro ad motus liberos in genere, progredi licebit. Quare relicto quasi ordine naturae, nunc corpora rigida extrinsecus ita restricta contemplantur, ut certum tantum genus motus recipere possint, quod fit, dum ab aliqua causa externa duo corporis puncta fixa retinentur. Facile enim patet, si tria puncta corporis rigidi non in directum sita fixa seu immota manerent, totum corpus nullius motus capax esse futurum: quando autem duo tantum puncta fixa tenentur, circa ea tanquam circa axem motu gyratorio revolvi poterit, qui motus quomodo sit comparatus et a viribus sollicitantibus afficiatur, jam indagabimus: ubi quidem insuper definiri conveniet, cum quantam vim illa puncta fixa sustineant, tum vero etiam quantum compages corporis afficiatur.

## CAPUT II.

### DE MOTU GYRATORIO CIRCA AXEM FIXUM A NULLIS VIRIBUS TURBATO.

#### DEFINITIO. 5.

309. **M**otus *gyratorius* dicitur, quo corpus rigidum circa lineam rectam cum ipso firmiter connexam movetur, quae linea recta *axis gyrationis* vocatur.

#### COROLL. 1.

310. In motu ergo gyratorio axis gyrationis quiescit, seu singula puncta in eo sita manent immota; reliqua vero corporis puncta eo celerius moventur, quo longius ab axe gyrationis distent.

#### COROLL. 2.

311. Quia singula corporis puncta ab axe easdem perpetuo servant distantias, moveri nequeunt, nisi in arcibus circularibus, quorum centra

## CAPUT II. DE MOTU GYRATORIO CIRCA &c. 123

tra in axe gyrationis sunt sita. Scilicet recta a quovis corporis puncto ad axem normaliter ducta erit radius circuli, in cuius peripheria hoc punctum movetur.

### COROLL. 3.

312. Quoniam omnia corporis puncta tam inter se quam ab axe perpetuo easdem servant distantias, singula puncta eodem tempore per similes arcus progrediantur necesse est, ex quo eorum celeritates eodem tempore erunt inter se ut eorum distantiae ab axe.

### COROLL. 4.

313. Cum axis gyrationis maneat in quiete, si unici praeterea corporis puncti situs fuerit cognitus, ex eo totius corporis situs innoscet: ac si unici puncti celeritatem noverimus, omnium punctorum celeritates assignare poterimus.

### EXPLICATIO.

314. Gyratione motus corporis ita restringitur, ut duo ejus quaedam puncta maneant immota: concipiantur enim corpori ABCD in punctis E et F duo styli infigi, ac tam firmiter retineri, ut nequaquam dimoveri queant; atque his stylis non obstantibus corpus adhuc duplici modo moveri poterit, prout in figura puncta A, B, C vel sursum vel deorsum aguntur, quae diversitas ita commodissime innui solet, dum corpus vel in hunc *sensum* vel in oppositum gyrali dicitur. Praeterea vero motus in utrumque sensum factus infinitis modis pro ratione celeritatis variari potest; cognita autem celeritate motus nondum innotescit, nisi declaretur, in utrum *sensum* motus fiat. At statim ac puncta E et F in quiete retinentur, singula puncta inter ea in directum interjacentia quoque quiescent, eritque propterea recta EF axis gyrationis. Tum si *m* sit particula corporis quaecunque, indeque ad axem EF normalis ducatur *mn*, qua tanquam radio in plano ad EF normali circulus concipitur descriptus, haec particula *m* aliter nisi in peripheria huius circuli moveri nequit, eritque semper celeritas puncti *m* distantiae *mn* proportionalis.

Fig. 29.

### SCHOLION.

315. Voce *sensus* hic autor gallicus idipsum innotatus, quoniam vox *Tab. IV.*  
*plaga*, quae alii uti solent, discrimen non satis indicare videtur. Con- Fig. 30.  
cipiatur enim axis gyrationis plano tabulae in O normaliter insistere, ad

Q 2

quem

quem ex corporis punctis A, B, C actae sint normales AO, BO, CO: jam duplex motus corpori imprimi potest, alter quo puncta A, B, C per arcus Aa, Bb, Cc, alter autem, quo eadem puncta per arcus Aa, Bc, Cy procedunt. Priori casu congrue dici nequit, motum fieri in plagam Aa, quippe quod de punctis B et C, quorum motus in alias plagas dirigitur, non esset verum. Plaga scilicet directionem quandam fixam innuit, quae in motu circulari non habet locum; unde ob defectum aptioris vocabuli in tali motu quasi duos sensus statuamus, sibi oppositos, ita ut motus circularis per arcus Aa, Bb, Cc in hunc sensum, alter per arcus Aa, Bc, Cy in sensum oppositum fieri sit dicendus.

## DEFINITIO. 6.

316. Celeritas *angularis* in motu gyratorio est celeritas ejus puncti, cujus distantia ab axe gyrationis unitate exprimitur.

## COROLL. 1.

317. Ex celeritate ergo cujusque puncti cognoscetur celeritas angularis, si ea per distantiam puncti illius ab axe gyrationis dividatur; quoniam in motu gyratorio celeritates sunt distantis ab axe proportionales.

## COROLL. 2.

318. Si ergo puncti, quod ab axe gyrationis distat intervallo  $= x$ , celeritas sit  $= v$ , erit  $\frac{v}{x}$  celeritas angularis. Pro alia enim distantia  $y$  foret celeritas  $= \frac{yv}{x}$ , ac sumpta hac distantia  $y = 1$ , erit ea  $= \frac{v}{x}$ , quae est celeritas angularis.

## COROLL. 3.

319. Hinc vicissim cognita celeritate angulari, quae sit  $= a$ , in distantia quacunque  $x$  erit celeritas, qua ibi sit gyratio,  $= ax$ : celeritas scilicet angularis, per distantiam quancunque ab axe gyrationis multiplicata, dat celeritatem veram pro ea distantia.

## EXPLICATIO.

320. Cum in motu gyratorio puncta corporis pro diversa ab axe distantia diversa celeritate ferantur, quo omnes has celeritates diversas simul

simul in calculo complecti queamus, earum loco celeritatem angularem, quae pro omnibus distantis est eadem, in calculum introducamus; prodit enim ea, si angulus tempusculo quodam confectus per ipsum tempusculum dividatur, ita ut omnibus distantis sit communis. Namque si in distantia  $= x$  ab axe gyrationis celeritas fuerit  $= v$ , tempusculo  $dt$  absolvetur ea arcus  $= vdt$ , qui per radium  $x$  divisus dat angulum interea confectum  $= \frac{vdt}{x}$ : hic autem iterum per tempus

$dt$  divisus producit  $\frac{v}{x}$ , hoc est celeritatem angularem. Perinde igitur est, quonam modo celeritatem angularem definire veliamus, sive sit celeritas distantiae  $= 1$  conveniens, sive celeritas cuicunque distantiae respondens per hanc ipsam distantiam divisa, sive angulus elementaris divisus per tempusculum, quo absolvitur; siquidem hi tres modi inter se conveniunt. Primus quidem naturae rei est maxime conformis, cum eo vera celeritas indicetur, atque distantiam illam fixam, cui respondet, ob similem rationem unitate insignimus, qua in mensura angulorum radius circuli, ad quem referuntur, unitate exprimi solet; ut nimirum anguli et arcus ad communem mensuram revocentur.

### THEOREMA, 3.

321. Si corpus rigidum circa axem fixum moveri coeperit, motum suum gyrationis perpetuo eadem celeritate angulari continuabit, nisi a viribus externis turbetur.

### DEMONSTRATIO.

Sit EF axis gyrationis, circa quem corpus rigidum moveri coeperit, celeritate angulari  $= c$ , quae scilicet respondeat distantiae ab axe  $= 1$ . Quaevis ergo particula  $m$  ab axe distans intervallo  $mn = x$ , habuit celeritatem  $= cx$  in eundem sensum. Quoniam corpus cum axe quasi unum constituit corpus rigidum, particula  $m$  cum axe EF ita colligata est intelligenda, ut ab eo constanter eandem servet distantiam  $mn = x$ . Consideremus hanc particulam solam, tanquam filo  $mn$  cum axe connexam, atque supra vidimus, eam motu accepto uniformiter in peripheria circuli esse gyrationem. Quod cum de omnibus elementis seorsim sumtis valeat, videndum est, num singula motum suum prosequi possint, ut sibi mutuo non sint impedimento. Verum peripicuum est, etiam si singula a se invicem essent dissoluta, dum fuerint cum

Q3

Fig. 29.

cum axe filorum ope connexa, tamen singula in motu suo ita perseverare posse, ut perpetuo easdem inter se distantias servant; corpusque suam retineat figuram. Quare etiam eorum nexus mutuus non obstat, quo minus singula elementa motum suum prosequantur: consequenter totum corpus motum gyrationis impressum ita continuabit, ut uniformiter circa axem eadem perpetuo celeritate angulari revolvatur.

## COROLL. 1.

322. Posita ergo celeritate angulari  $c$ , ut in distantia  $= x$  ab axe sit celeritas  $= cx$ , si haec celeritas ponatur  $= v$ , erit  $c = \frac{v}{x}$ . Quare cum  $x$  et  $v$  sint lineae, celeritas angularis  $c$  numero absoluto exprimitur.

## COROLL. 2.

323. Ex celeritate angulari  $c$  colligitur tempus  $t$ , quo gyratio fit per datum angulum  $\phi$ : cum enim motus sit uniformis, erit  $c = \frac{\phi}{t}$ , ideoque  $t = \frac{\phi}{c}$ : unde patet celeritatem angularem  $c$  dare angulum, qui uno minuto secundo absolvitur.

## COROLL. 3.

324. Quare si  $1$ : $\pi$  denotet rationem diametri ad peripheriam, ut sit  $2\pi$  peripheria circuli, cujus radius est  $= 1$ , tempus unius revolutionis, quo corpus in pristinum situm revertitur est  $= \frac{2\pi}{c}$  min. sec.

## COROLL. 4.

325. Quoniam tempora perpetuo in minutis secundis exprimere institimus, si celeritas angularis sit  $= c$ , tempore  $t$  corpus motu gyrationis absolvet angulum  $= ct$ .

## SCHOLION.

326. Ea igitur pro mensuris absolutis distinctam notationem celeritatis angularis, quippe quae exprimitur angulo, qui eo motu gyrationis, si esset uniformis, intervallo unius minuti secundi conficeretur. Congruit ea cum supra stabilito modo omnia, quae ad motum pertinent, ad mensuras absolutas revocandi: cujus fundamentum in eo consistat, ut tempora perpetuo in minutis secundis exprimamus: cum vero celeri-

celeritatem quamque per spatium, quod corpus ea celeritate latum uniformiter intervallo unius minuti secundi percurreret, indicamus, unde utique clarissima celeritatis idea obtinetur. Quemadmodum ergo celeritas in genere est spatium uno minuto secundo confectum, ita celeritas angularis est angulus uno minuto secundo confectus, si scilicet motus esset uniformis. Quodsi motus gyratorius non fuerit uniformis, ita ut quovis momento celeritas angularis sit diversa, simili modo pro quovis instanti ea exprimeretur angulo, quem corpus, si eo motu gyratorio uniformiter revolveretur, uno minuto secundo esset deseripturum. Ex hoc autem Theoremate motus gyratorius uniformis perfecte cognoscitur, quo omne corpus rigidum, nisi a viribus externis sollicitetur, feratur necesse est; unde patet, principium aequabilitatis motus inertia innixum etiam ad motum gyratorium corporum rigidorum extendi, dummodo axis gyrationis sit fixus. Quare investigari conveniet, quanta vi opus sit ad axem in situ suo fixo conservandum.

## PROBLEMA. 5.

327. Si corpus rigidum circa axem fixum uniformiter gyretur, definire vires, quas axis sustinet, seu quae adhiberi debent, ut axis in suo situ conservetur.

## S O L U T I O.

Consideretur corpus iterum in sua elementa divisum, quae singula cum axe gyrationis ope filorum sint connexa, et quoniam quodlibet elementum  $m$  in circulo circumfertur, cujus radius est ejus distantia  $mn$  ab axe  $EF$ , ob vim centrifugam supra definitam (213), filum tendet, tantaque vi axem in directione  $nm$  sollicitabit. Ad quam calculo exprimentendam sit  $dM$  massula hujus elementi, ejusque ab axe gyrationis  $EF$  distantia  $mn = x$ , ac celeritas angularis  $= \gamma$ , ita ut  $\gamma$  sit angulus singulis minutis secundis confectus; eritque celeritas qua elementum  $m$  in circulo suo revolvitur  $= \gamma x$ . Tum si  $g$  denotet altitudinem, per quam corpus a gravitate sollicitatum uno minuto secundo

Fig. 29.

delabitur, erit per (213) vis centrifuga hujus elementi  $= \frac{\gamma \gamma x x dM}{2g x} =$

$\frac{\gamma \gamma}{2g} \cdot x dM$ , ubi  $dM$  est pondusculum, quod elementum corporis in regione terrae ad mensuras absolutas electa esset habiturum. Quare ob motum hujus elementi, dum versatur in  $m$ , axis  $EF$  sustinet vim  $=$

$\frac{\gamma \gamma}{2g} \cdot x dM$ , qua secundum directionem  $nm$  sollicitatur; et cum ab omnibus



omnibus elementis similes vires sustineat, ex iis colligi poterit vis totalis, quam totum corpus in axem exerit.

## COROLL. 1.

328. Vires ergo a singulis elementis ortae pro eodem motu angulari rationem tenent compositam massarum et distantiarum ab axe: elementa igitur axi propiora minus, remotiora autem plus efficiunt.

## COROLL. 2.

329. Deinde vero pro eodem elemento, vis quam axis ab eo sustinet, sequitur rationem duplicatam celeritatis angularis: quae si fuerit dupla, vis illa quadruplo evadet major.

## COROLL. 3.

330. Quoniam elementum  $m$  per peripheriam circuli circumfertur motu aequabili, vis quidem perpetuo ejusdem manet quantitatis, et eidem axis puncto  $n$  applicata, sed directio continuo mutatur, cum semper ad elementum sit directa.

## SCHOLION.

331. Supra scilicet (213) invenimus, ut corpusculum cujus massa  $= A$ , celeritate  $= v$  in peripheria circuli, cujus radius  $= r$ , moveatur, vim requiri ad ejus centrum tendentem  $= \frac{Avv}{2gr}$ . Cum igitur nostro casu sit massa  $A = dM$ , celeritas  $v = \gamma x$ , et radius  $r = x$ , erit ista vis  $= \frac{\gamma\gamma x dM}{2g}$ , qua filum, quo elementum axi alligatur, tenditur, et qua propterea ipse axis secundum directionem  $nm$  sollicitatur. Ab hujusmodi ergo viribus singula axis puncta afficiuntur: ac si nosse velimus vires, quas punctum  $n$  sustinet, concipiatur sectio plana per punctum  $n$  ad axem  $EF$  normaliter facta, et omnia corporis elementa in hoc plano sita vires suas in punctum  $n$  exerent, quae cum omnes eidem puncto sint applicatae, per praecepta statica facile ad unam vim reduci poterunt. Hic scilicet erit casus, quando totum corpus quasi in planum ad axem normale fuerit compactum, quem igitur, antequam ad ternas dimensiones progrediamur, evolvamur.

## PROBLEMA. 4.

332. Si corpus fuerit lamina tenuissima plana ad axem gyrationis normalis, eaque data celeritate gyretur, determinare vim, quam axis ab ea sustinet.

SOLU.

## SOLUTIO.

Sit AE d F lamina ista tenuissima figurae cujuscunque, cujus massa fit = M, cui axis gyrationis normaliter insistere intelligatur in puncto O: et cum rectae a singulis laminarum elementis ad O ductae simul eorum distantias ab axe gyrationis referant, omnia vires suas in ipsum punctum O exerent. Consideretur ergo elementum laminae quodvis in M, cujus massa sit = dM, ejusque ab axe distantia OM = r; et posita celeritate angulari =  $\gamma$ , erit vis, qua punctum O in directione OM

Fig. 31.

sollicitatur =  $\frac{\gamma \gamma r dM}{2g}$ . Quae vires ab omnibus elementis oriundae,

quo facilius ad unam reducantur, concipiantur per O duae directrices OA, OB in plano laminae inter se normales, ad quas referantur pro puncto M coordinatae OP = x et PM = y, et completo rectangulo OPMQ, vis illa OM resolvitur in duas secundum ipsas directrices,

quarum quae agit secundum OA est =  $\frac{\gamma \gamma x dM}{2g}$ , et quae secundum OB

agit, =  $\frac{\gamma \gamma y dM}{2g}$ . Ex tota ergo lamina oritur vis sollicitans in dire-

ctione OA =  $\frac{\gamma \gamma}{2g} \int x dM$ , et vis sollicitans in directione OB =  $\frac{\gamma \gamma}{2g} \int y dM$ .

Haec autem integralia ex situ centri inertiae laminae innotescunt, quod si statuatur in I, indeque ad directrices demittantur perpendiculara IK et IL, erit  $\int x dM = M \cdot OK$  et  $\int y dM = M \cdot OL$ . Quare cum sit vis

secundum OA =  $\frac{\gamma \gamma}{2g} M \cdot OK$ , et vis secundum OB =  $\frac{\gamma \gamma}{2g} M \cdot OL$ ,

his duabus viribus aequivalet una secundum directionem OI sollicitans,

quae est =  $\frac{\gamma \gamma}{2g} M \cdot OI$ , atque haec est vis, quam axis ob motum laminae in punctu O sustinet.

## COROLL. 1.

333. Directio ergo vis, quam axis ob motum laminae sustinet, a puncto O ad centrum inertiae laminae I tendit, atque distantiae hujus centri I ab axe est proportionalis.

## COROLL. 2.

334. Si tota laminae massa M in ejus centro inertiae esset collecta, eaque circa axem pari celeritate angulari revolveretur,

R

tur,

tur, ab ea axis vim sustineret  $= \frac{v}{s}$ , M. OI in eadem directione OI.

## COROLL. 3.

335. Axis ergo a lamina eandem vim sustinet, ac si tota laminae massa in centro inertiae esset collecta, eaque pari celeritate angulari circa eundem axem revolveretur, quae centri inertiae nova proprietas notatu maxime est digna.

## COROLL. 4.

336. Si igitur axis per ipsum centrum inertiae I laminae transierit, ad eamque esset perpendicularis, ob  $OI = 0$ , axis a motu laminae nullam plane vim sentiret, neque ergo ulla vi opus esset ad axem immotum retinendum.

## SCHOLION.

337. Quodsi axis non per centrum inertiae transit, tam firmiter intra suos cardines retineri debet, ut vi assignatae resistere valeat, neque unquam ab ea de situ suo dimoveri possit. Cum autem ipsa hujus vis directio in gyrum agatur, quaquaversus axis in suo situ vi sufficienti retineri debet: ac perspicuum quidem est, eo majore vi opus esse ad axem retinendum, quo magis centrum inertiae ab eo distet. Praeterea vero haec vis proportionalis est massae laminae et quadrato celeritatis angularis. Ceterum hic casus, quo corpus ut laminam infinite tenuem sumus contemplati, nos manuducit ad corpora quaecunque, quoniam diviso corpore per sectiones ad axem normales in infinitas laminas, vires hinc, quibus axis in singulis punctis sollicitatur, facile colliguntur. Totum scilicet negotium ad inventionem centri inertiae cujusque laminae reducitur: verum alio modo hanc investigationem tentemus.

## PROBLEMA. 7.

Fig. 32. 338. Si corpus rigidum circa axem OA uniformiter gyretur, vires, quas axis sustinet, in summam colligere, vel ad duas vires reducere, quibus axis sollicitetur.

## SOLUTIO.

Cum axe gyrationis OA jungantur in O binae directrices normales OB et OC, quibus pro elemento corporis in Z, cujus massa sit  $dM$ , denotante M massam totius corporis, parallelae constituantur coordi-

# CIRCA AXEM FIXUM A NULLIS VIRIBUS &c. 131

coordinatae ternae,  $OX = x$ ,  $XY = y$  et  $YZ = z$ . Quodsi jam celeritas angularis, qua corpus circa axem OA gyratur, ponatur  $= \gamma$ , et elementi Z ab axe distantia  $XZ = r$ , ob motum hujus elementi axis

in puncto X sollicitatur in directione XZ vi  $= \frac{\gamma \gamma r dM}{2g}$ , quae, ducta XV ipsi YZ seu OC parallela, resolvatur in directiones XY et XV, erit-

que vis urgens secundum XY  $= \frac{\gamma \gamma y dM}{2g}$  et secundum XV  $= \frac{\gamma \gamma z dM}{2g}$ .

ficque a singulis elementis axis binas sustinet vires, quarum directiones sunt ipsis OB et OC parallelae: unde omnes, quae in utraque directione agunt, seorsum in unam summam colligi poterunt. Repraesentet ergo Ee vim omnibus viribus XY et Ff vim omnibus XV aequivalentem; ac primo, quidem utraque aequalis est summae omnium, quibus aequivalet. Quare erit

$$\text{vis } Ee = \frac{\gamma \gamma}{2g} \int y dM, \text{ et vis } Ff = \frac{\gamma \gamma}{2g} \int z dM.$$

Deinde momenta harum virium respectu puncti O aequari debent cunctis momentis elementaribus simul sumtis, unde fit:

$$\frac{\gamma \gamma}{2g} \cdot OE \cdot \int y dM = \frac{\gamma \gamma}{2g} \int x y dM, \text{ seu } OE = \frac{\int x y dM}{\int y dM} \text{ et}$$

$$\frac{\gamma \gamma}{2g} \cdot OF \cdot \int z dM = \frac{\gamma \gamma}{2g} \int x z dM, \text{ seu } OF = \frac{\int x z dM}{\int z dM}.$$

ficque omnes vires, quas axis sustentat, ad duas sunt reductae Ee et Ff, quarum tam magnitudines quam directiones et loca applicationis innotescunt.

## COROLL. 1.

339. Si centrum inertiae corporis fuerit in I, sique respondeant coordinatae OG, GK et KI, erit ut supra vidimus  $OG = \frac{\int x dM}{M}$ ,  $GK = \frac{\int y dM}{M}$ ,  $KI = \frac{\int z dM}{M}$ , unde pro superioribus Formulis est  $\int y dM = M \cdot GK$  et  $\int z dM = M \cdot KI$ .

## COROLL. 2.

340. Si universa corporis massa M in centro inertiae I collecta esset, parique celeritate gyraretur, axis ab ea in puncto G vim sustineret  $= \frac{\gamma \gamma}{2g} \cdot M \cdot GI$  in directione GI, unde oriuntur vires duae

R 2

secun-

secundum GK =  $\frac{\gamma\gamma}{2g} \int y dM$  et secundum GL =  $\frac{\gamma\gamma}{2g} \int z dM$ ,  
 quibus ergo viribus illae secundum Ee et Ff sunt aequales:

## COROLL. 3.

341. Si planum AOB, quod arbitrio nostro relinquitur, per centrum inertiae I corporis ductum assumatur, ut sit KI = 0 et  $\int z dM = 0$ , erit quidem vis Ff = 0, at vero distantia OF infinita; ita tamen ut ejus momentum sit finitum, scilicet vis Ff. OF =  $\frac{\gamma\gamma}{2g} \int x z dM$ .

## SCHOLIUM.

342. Binas autem has vires Ee et Ff non ulterius ad unam revocare licet, nisi intervallum EF evanescat: nam duae vires lineae rectae in duobus diversis punctis applicatae ad unam reduci nequeunt, nisi directiones virium fuerint in eodem plano. Verum duae istae vires Ee et Ff infinitis modis ad duas alias reduci possunt, sicuti fit, si positio directricium OB et OC mutetur, uti vidimus casu, quo planum AOB per centrum inertiae ducitur, vbi Ff evanescere, et distantiam OF fieri infinitam. Invenitis autem hujusmodi binis viribus Ee et Ff, quas axis gyrationis sustinet, ne is de situ suo dimoveatur, necesse est, ut a viribus aequalibus et contrariis retineatur. Scilicet si axis in E et F ex annulis fixis suspendatur, intra quos libere gyrari queat, annulus in E sustinebit vim Ee et annulus in F vim Ff, unde firmitatem annulorum colligere licet. Verum si axis in datis duobus quibuscunque punctis sustineri debeat, vires assignari poterunt, in illis punctis adhibendae, ut axis immotus servetur, quae investigationem in sequenti problemate suscipiamus.

## PROBLEMA 8.

Fig. 32.

343. Si axis, circa quem corpus rigidum motu noniformi gyratur, in datis duobus punctis O et A teneatur, definire vires, quas axis in his duobus punctis sustinet.

## SOLUTIO.

Manentibus omnibus, quae in problemate praecedente sunt posita, vires axem sollicitantes ad duas Ee et Ff sunt revocatae, quarum illa directrici OB, haec vero directrici OC est parallela, ita ut sit

vis

$$\text{vis } Ee = \frac{\gamma\gamma}{2g} \int y dM \text{ et vis } Ff = \frac{\gamma\gamma}{2g} \int z dM$$

$$\text{tum } OE = \frac{\int xy dM}{\int y dM} \text{ et } OF = \frac{\int xz dM}{\int z dM}$$

His ergo viribus aequivalentes in punctis O et A applicandae quaeri debent. Sit ergo distantia OA = a, atque in O et A vires Ob et AG applicentur, quae vi Ee aequivalent, id quod fit si Ob + AG = Ee et Ob. OE = AG. AE, unde oritur:

$$Ob = \frac{AE \cdot Ee}{a} = Ee - \frac{OE \cdot Ee}{a} \text{ et } AG = \frac{OE \cdot Ee}{a}$$

Simili modo in O et A applicentur vires Oc et Ay, quae vi Ff aequivalent, eritque

$$Oc = \frac{AF \cdot Ff}{a} = Ff - \frac{OF \cdot Ff}{a} \text{ et } Ay = \frac{OF \cdot Ff}{a}$$

Quare in utroque puncto O et A binas habemus vires, quas axis ibi sustinet, scilicet in puncto O

$$\text{vim } Ob = \frac{\gamma\gamma}{2g} \left( \int y dM - \frac{1}{a} \int xy dM \right) \text{ et vim } Oc = \frac{\gamma\gamma}{2g} \left( \int z dM - \frac{1}{a} \int xz dM \right)$$

deinde in puncto A

$$\text{vim } AG = \frac{\gamma\gamma}{2g} \cdot \frac{1}{a} \int xy dM \text{ et vim } Ay = \frac{\gamma\gamma}{2g} \cdot \frac{1}{a} \int xz dM$$

Vel si ipsas lineas ad elementum dM in Z situm pertinentes introducamus, erit

$$\text{vis } Ob = \frac{\gamma\gamma}{2ag} \int AX \cdot XY \cdot dM, \text{ et vis } Oc = \frac{\gamma\gamma}{2ag} \int AX \cdot YZ \cdot dM$$

$$\text{vis } AG = \frac{\gamma\gamma}{2ag} \int OX \cdot XY \cdot dM, \text{ et vis } Ay = \frac{\gamma\gamma}{2ag} \int OX \cdot YZ \cdot dM,$$

Ponamus OG = b, AG = c, ut sit a = b + c, tum vero GX = u ut sit AX = c - u et OX = b + u, erit

$$\text{vis } Ob = \frac{\gamma\gamma}{2ag} (c \int y dM - \int uy dM); \text{ vis } Oc = \frac{\gamma\gamma}{2ag} (c \int z dM - \int uz dM)$$

$$\text{vis } AG = \frac{\gamma\gamma}{2ag} (b \int y dM + \int uy dM); \text{ vis } Ay = \frac{\gamma\gamma}{2ag} (b \int z dM + \int uz dM)$$

Accipiamus planum AOB ita, ut per centrum inertiae I transeat, erit  $\int x dM = 0$ , ac statuamus integralia

$$\int y dM = D; \int uy dM = E \text{ et } \int uz dM = F.$$

fietque:

$$\text{vis } Ob = \frac{\gamma\gamma}{2ag}(Dc - E); \quad \text{vis } Oc = \frac{-\gamma\gamma}{2ag} F$$

$$\text{vis } AC = \frac{\gamma\gamma}{2ag}(Db + E); \quad \text{vis } Ay = \frac{\gamma\gamma}{2ag} F$$

Atque jam facile tam in O binæ vires Ob et Oc, quam in A binæ vires AC et Ay ad unam redigi poterunt, ita ut in utroque termino O et A vis innotescat, quam ibi axis sustinet.

## COROLL. 1.

344. Si ergo planum AOB per centrum inertiae corporis I transiens statuatur, vires Oc et Ay sunt aequales sed contrariae, ita ut altera alterius sit negativa: seu erit vis Oc + vi Ay = 0, quoniam KI = 0, ac propterea vis GL = 0.

## COROLL. 2.

345. Si axis gyrationis OA per ipsum centrum inertiae I transeat, erit etiam  $\int y dM = D = 0$ , ideoque vires, quas axis in punctis O et A sustinet, ita se habebunt.

$$\text{vis } Ob = \frac{-\gamma\gamma}{2ag} E; \quad \text{vis } Oc = \frac{-\gamma\gamma}{2ag} F$$

$$\text{vis } AC = \frac{\gamma\gamma}{2ag} E; \quad \text{vis } Ay = \frac{\gamma\gamma}{2ag} F.$$

## COROLL. 2.

346. Ut axis nullas omnino vires sustineat, corpusque circa eum libere gyron possit, necesse est, ut quatuor haec integralia singula evanescant.

$\int y dM = 0$ ,  $\int z dM = 0$ ;  $\int xy dM = 0$  et  $\int xz dM = 0$ .  
ac binis prioribus quidem satisfit, si axis gyrationis per centrum inertiae corporis transeat.

## SCHOLION.

347. Hic duo puncta O et A, unde quasi axis suspendatur, pro lubitu assumimus: atque in genere patet vires, quae ad axem in istis punctis retinendum requiruntur, eo fore minores, quo longius capiatur intervallum OA, quod mirum non est, cum effectus hic a momentis virium pendeat. At si puncta O et A conveniant, ut sit OA = 0, vires illae adeo fiunt infinitae, ex quo intelligitur, axem in uni-

co

co puncto neququam tam firmiter contineri posse, ut immotus maneat; ad minimum ergo ad hoc duae vires requiruntur, axi in diversis punctis applicandae: nisi forte binae vires primitivae  $Ee$  et  $Ff$  jam eidem puncto applicentur. Hoc autem ex praecedente problemate fieri nequit, nisi sit

$$fxydM : fxzdM = fydM : fzdM.$$

Sumto ergo plano AOB ita ut per centrum inertiae corporis  $I$  transeat, ut sit  $fzdM = 0$ , hoc eveniet, si fuerit  $fxzdM = 0$ . Quod etiam ex hoc problemate evidens est, quoniam tum vires  $Oe$  et  $A\gamma$  evanescunt, solaeque vires  $Ob$  et  $Ac$  relinquuntur, quibus unica vis  $Ee$  aequivalet, ita ut axis tum in unico puncto  $E$  sustentari queat, a vi nempe quae aequalis sit et contraria vi  $Ee$ . Sufficiet ergo axem in unico puncto  $E$  sustentari, si ducto plano AOB per centrum inertiae corporis, fuerit

$$fxzdM = 0, \text{ quo casu fit vis } Ee = \frac{\gamma\gamma}{2g} fydM \text{ et distantia } OE = \frac{fxydM}{fydM}.$$

Reliquis casibus omnibus necesse est, ut axis in duobus punctis contineatur, quae utcumque accipiantur, vires ad axem retinendum requisitae aequales et contrariae esse debent viribus hic determinatis. Quas cum assignaverimus, superest ut vires, quas ipsa corporis compages ob motum gyratorium sustinet, definiamus.

### PROBLEMA. 9.

348. Si corpus rigidum circa axem fixum uniformiter gyretur, definire vires, quas corporis compages seu mutuus partium nexus sustinet.

### SOLUTIO.

Gyretur corpus circa axem OA celeritate angulari  $= \gamma$ , ita ut singulis minutis secundis angulum  $= \gamma$  absolvat, atque vidimus si particula corporis, cujus massula  $= dM$ , fuerit in puncto  $Z$ , quod ab axe

Fig. 32.

OA distet intervallo  $XZ = r$ , ejus vim centrifugam fore  $= \frac{\gamma\gamma r dM}{2g}$ , qua haec particula conetur in directione  $Zz$  ab axe recedere: ac simili vi singula corporis elementa conantur ab axe recedere, quod ne fiat compages corporis satis roboris habere debet. Quod quo facilius perspiciamus, consideremus corpus in quiete, et vires ei applicandas investigemus, quae ejus compagem perinde afficiant, atque ea nunc dum corpus est in motu afficitur. Singulis igitur elementis  $dM$  in  $Z$

fitis intelligendae sunt applicatae vires  $Zz = \frac{\gamma\gamma r dM}{2g}$ , ea ab axe OA retrahentes.



## 136 CAPUT II. DE MOTU GYRATORIO CIRCA &c.

trahentes. Praeterea vero ne totum corpus ab his viribus ad motum cieatur,  $\alpha$ xi in punctis E et F concipiantur vires ipsis  $E\alpha$  et  $F\alpha$  aequales et contrariae applicatae, sicque habebuntur omnes vires, quas corpus in quiete consideratum sustinet, .cujus proinde compages tam robusta esse debet, ut ab istis viribus nulla mutatio ejus figurae inferatur: tunc vero corpus ab omnibus istis viribus sollicitatum in aequilibrio conservabitur.

### COROLL. 1.

349. Si Z fuerit aliquod extremum corporis punctum, particula  $\alpha M$  ibi tam firmiter cum reliquo corpore connexa esse debet, ut inde  $\alpha$  vi  $Z\alpha = \frac{\gamma\gamma r dM}{2g}$  avelli nequeat: cujus directio cum ab axe sit averfa, non opus est, ut ad latera sit affixa.

### COROLL. 2.

350. Propius autem ad axem connexio fortior esse debet, quoniam omnes particulae ulterius remotae vires suas recedendi ab axe conjungunt: unde in ipso axe robustissima compages vigeat necesse est.

### SCHOLION.

351. Quod ad axem attinet, assumpsi hic etiam in punctis E et F teneri; sin autem in aliis quibusque binis punctis O et A teneatur, in iis vires supra assignatis aequales et contrariae applicatae sunt intelligendae, quae cum elementaribus  $Z\alpha$  corpus etiam in aequilibrio tenebunt. Compagem ergo tam fortem esse oportet, ut si corpori quiescenti memoratae vires essent applicatae, ejus figura ab earum actione nullam mutationem esset passura. Hinc autem simul patet, omnes istas vires esse in ratione duplicata celeritatis angularis, ita ut motus duplo celerior compagem quadruplo firmiorem postulet. Verum hoc judicium, quod ab interna corporum structura et partium indole pendet, hic ulterius persequi non licet: sed hinc potius peculiaris disciplina constitui mereretur. Quare cum in hoc capite omnia, quae ad motum gyratorium circa axem fixum nullis viribus externis turbatum pertinent, satis sint exposita, quid vires praeterea efficiant investigemus: ac primo quidem corpus rigidum, quod circa axem fixum est mobile, in quiete suam contemplaturus, motumque elementarem, qui circa datis viribus tempore tantum infinite parvo improprietur, scrutabor. Haec tractatio in se porum utilis patefaciet, quantum axis a viribus sollicitantibus patitur, tum vero in sequentibus, ubi de motu libero corporum rigidorum agetur, maximam afferet utilitatem.

## CAPUT

# CAPUT III.

## DE MOTUS GYRATORII

### GENERATIONE.

#### PROBLEMA. 10.

352. Si corpus rigidum circa axem fixum mobile quiescat, definire vires elementares, quibus id tempusculo minimo per datum angulum promovetur.

#### SOLUTIO.

Sit ABCD sectio corporis quaecunque ad axem gyrationis normalis, cui ergo axis in O perpendiculariter insillere concipiatur, circa quem tempusculo  $dt$  per angulum  $=adt^2$  promoveri debeat, siquidem novimus spatia tempusculo infinite parvo  $dt$  genita quadrato tempusculi esse proportionalia. Si ergo elementum quodpiam in M consideremus, cujus massa sit  $=dM$  et distantia ab axe  $OM = r$ , id transferendum est per arcum  $Mm = ardt^2$ . Ad quem effectum producendum necesse est, ut elementum hoc sollicitetur in directione  $Mm$  a vi quadam, quae ponatur  $=p$ : at massula  $dM$  a vi  $p$  sollicitata tempusculo  $dt$  protrahitur per spatium  $=\frac{gp dt^2}{dM}$ , (305). quod illi  $ar dt^2$  aequale positum praebet vim  $p = \frac{ar dM}{g}$ . Tum vero hoc elementum adipiscetur celeritatem  $=\frac{2gp dt}{dM}$ , quae abit in  $2ar dt$ , unde celeritas angularis acquisita erit  $=2a dt$ .

Fig. 33.

#### COROLL. I.

353. Si angulus tempusculo  $dt$  genitus vocetur  $=d\omega$ , ob  $a = \frac{d\omega}{dt^2}$ , erit celeritas angularis genita  $=\frac{2d\omega}{dt}$ , ubi notandum est, angulum  $d\omega$  esse differentiale secundi gradus, seu homogeneum esse cum quadrato tempusculi  $dt$ .

S

CO.

## PROBLEMA I.

354. Ut tempusculo  $dt$  angulus  $d\omega$  generetur, elementum corporis  $dM$  in  $M$  situm secundum directionem motus  $MN$  sollicitari debet a vi  $= \frac{rd\omega}{gdt^2} dM$ , vires ergo singula elementa sollicitantes sunt in ratione composita massarum et distantiarum ab axe gyrationis.

## COROLL. 3.

355. Si aliud elementum consideretur in  $N$ , cujus massa sit  $dN$ , id sollicitari debet in directione  $Nn$  ad distantiam  $ON$  normaliter ducta in plano ad axem gyrationis perpendiculari. Vires autem sollicitantes haec elementa in  $M$  et  $N$  erunt ut  $QM \cdot dM$  ad  $ON \cdot dN$ .

## COROLL. 4.

356. Vicissim ergo si singula corporis elementa  $dM$  secundum directionem motus imprimendi sollicitentur viribus  $= \frac{rd\omega}{gdt^2} dM$ , totum corpus circa axem gyrationis promovebitur angulo  $= d\omega$  tempusculo  $dt$ , et acquirat celeritatem angularem  $= \frac{rd\omega}{dt}$ .

## COROLL. 5.

356. Quoniam hoc modo singula elementa seorsim ad motum concitantur, neque se invicem impediunt, ab istis viribus elementaribus neque corporis compages, neque axis gyrationis afficietur: sed motus perinde producet, ac si cuncta elementa tam a se invicem quam ab axe essent soluta.

## PROBLEMA II.

Fig. 34. 357. Vires elementares, quibus corpus rigidum circa axem  $OA$  dato tempusculo  $dt$  per datum angulum  $d\omega$  promoveatur, ad duas vires finitas reducere, quae illis omnibus aequivalent.

## SOLUTIO.

Cum axe gyrationis  $OA$  normaliter conjungantur binae aliae directrices  $OB$  et  $OC$ , sumtoque corporis quocunque elemento in  $Z$ , cujus massa sit  $= dM$ , inde ad planum  $AOB$  demittatur perpendicularum  $ZY$  et ex  $Y$  ad axem  $OA$  normalis  $YX$ , ponanturque ternae coordinatae  $OX = x$ ,

# DE MOTUS GYRATORI GENERATIONE.

$OX = x$ ,  $XY = y$ , et  $YZ = z$ , tunc vero ejus ab axe distantia  $XZ = \sqrt{yy + zz} = r$ . Imprimatur jam elemento  $Z$  ut toti corpori motus in sensum  $ZZ$ , quas linea ad  $XZ$  est normalis in plano  $XYZ$ , et secundum hanc directionem  $ZZ$  elementum  $dM$  sollicitetur necesse est vi =  $\frac{r d\omega}{g dt^2} dM = \frac{ar dM}{g}$ , posito  $a = \frac{d\omega}{dt^2}$ . Producta  $YZ$  in  $z$  agatur  $ZV$

parallela ipsi  $YX$ , et vis  $ZZ = \frac{ar dM}{g}$  resolvatur secundum directiones  $ZV$  et  $Zz$ , eritque vis secundum  $ZV = \frac{az dM}{g}$  et vis secundum  $Zz = \frac{ay dM}{g}$ . Quia perinde est, in quibusnam harum directionum punctis

istae vires applicatae concipiantur, concipiatur ista  $\frac{az dM}{M}$  applicata plano  $AOC$  in puncto  $V$  secundum  $Vv$ , ita ut sit ista vis secundum  $Vv = \frac{az dM}{g}$ ; vis autem  $\frac{ay dM}{g}$  applicata concipiatur plano  $AOB$  in puncto

$Y$ , ita ut habeatur vis secundum  $Yz = \frac{ay dM}{g}$ . Nunc omnibus viribus secundum  $Vv$  aequivalet vis una  $Rr$  plano  $AOC$  normaliter applicata in  $R$ , eritque ducta  $RP$  ipsi  $OC$  parallela

$$\text{vis } Rr = \frac{a}{g} \int z dM; \quad OP = \frac{\int xz dM}{\int z dM} \quad \text{et} \quad PR = \frac{\int zz dM}{\int z dM}$$

Deinde omnibus viribus secundum  $Yz$  aequivalet vis una  $Sr$  plano  $AOB$  normaliter applicata in puncto  $S$ ; unde ad  $OA$  ducta normalis  $SQ$  erit

$$\text{vis } Sr = \frac{a}{g} \int y dM; \quad OQ = \frac{\int xy dM}{\int y dM} \quad \text{et} \quad QS = \frac{\int yy dM}{\int y dM}$$

Hae ergo duae vires  $Rr$  et  $Sr$  in corpus eundem effectum exerent, atque omnes vires elementares simul sumtae, si modo corpus fuerit rigidum.

## COROLL.

358. Si ergo corpus rigidum ab hujusmodi duabus viribus  $Rr$  et  $Sr$  sollicitetur, ab iis circa axem  $QA$  ita volvi incipit, ut tempusculo  $dt$  conficiat angulum  $d\omega = a dt^2$ : neque ab his viribus ipsis axis ullam vim sustinebit, seu nulla opus erit vi, ad axem interea in quiete conservandum.

## COROLL. 2.

359. Quoniam infinitis modis aliae binae vires exhiberi possunt his aequivalentes, etiam ab his omnibus corpori idem motus imprimetur, ita ut axis OA ab illis non afficiatur. Secus autem ratio compagis est comparata, quae tantum a viribus elementaribus nullam vim patitur.

## SCHOLIUM.

360. In hac virium reductione non respeximus ad axis firmitatem sed quasi corpus perfecte esset liberum, ita omnibus viribus elementaribus binas invenimus vires aequivalentes, quae propterea etiam in axem nullum effectum exerunt. Sed si fixitatis axis rationem teneamus, infinitas alias vires exhibere possumus, quae quidem corpori eundem motum circa axem OA inducant, sed insuper etiam axem afficiant. Omnes scilicet vires, quae respectu axis OA idem praebent momentum, ac vires elementares omnes junctim sumtae, seu binae vires aequivalentes inventae, quoniam earum contrariae cum his in aequilibrio consistere, corpori quoque eundem motum imprimunt. Cum vero vis  $ZL =$

$\frac{ordM}{g}$  momentum respectu axis OA sit  $= \frac{orrdM}{g}$ , ex omnibus viri-

bus elementaribus nascitur momentum  $= \frac{a}{g} \int rrdM = \frac{d\omega}{g dt} \int rrdM$ : omnes ergo vires, quae respectu axis OA aequale habent momentum, corpus circa hunc axem tempusculo  $dt$  convertent per angulum  $= d\omega$ : unde sequens problema facile solvetur.

## PROBLEMA. 12.

361. Si corpus rigidum quiescens et circa axem fixum mobile a viribus quibuscunque sollicitetur, invenire motum primo temporis instante genitum.

## SOLUTIO.

Colligantur omnium virium momenta respectu axis gyrationis, attendendo in utrum sensum quaelibet vergat, sitque summa omnium momentorum  $= Vf$ , ex cuius sensu motus primo impressi directio innotescit. Tum sit  $d\omega$  angulus, per quem corpus circa axem tempusculo  $dt$  protruditur: et singula corporis elementa  $dM$  multiplicentur per quadrata distantiarum suarum ab axe  $rr$ , et calculo colligatur integrale  $\int rrdM$ . Quo facto oportet esse  $\frac{d\omega}{g dt} \int rrdM = Vf$ , unde

jam

jam vicissim angulus  $d\omega$  elicitur, per quem corpus tempusculo  $dt$  a virium momento  $Vf$  promovetur, scilicet  $d\omega = \frac{Vfgdt}{\int r^2 dM}$ . Celeritas autem angularis, quam corpus hoc tempusculo  $dt$  acquirit, erit  $= \frac{2Vfgdt}{\int r^2 dM}$ ; sicque cognoscitur effectus a viribus quibuscunque primo temporis instanti  $dt$  genitus.

## COROLL. 1.

362. Angulus ergo  $d\omega$  dato tempusculo  $dt$  confectus est directe ut momentum virium  $Vf$ , et reciproce ut integrale  $\int r^2 dM$ , quod est aggregatum omnium corporis elementorum  $dM$  per quadrata distantiarum suarum ab axe gyrationis multiplicatorum.

## COROLL. 2.

363. Haec formula similis est ei, qua generatio motus progressivi exprimitur, dum hic loco virium momentum virium, et loco massae corporis  $M$  valor integralis  $\int r^2 dM$  capiatur, quem valorem deinceps *momentum inertiae* appellabimus.

## SCHOLION.

364. In hoc ergo problemate effectus virium quarumcunque in motu circa axem fixum generando perfecte est definitus, ut nihil amplius desiderari queat. Quemadmodum enim virium sollicitantium momenta respectu axis cujusvis capi debeant, in Statica docetur, et mox a nobis accuratius explicabitur. Verum praeter ipsum motum genitum plurimum interest hic vires, quas axis sustinet, determinare: hocque non solum ut intelligatur, quantis viribus opus sit ad axem continendum, ne dimoveatur; sed ut deinceps, quando ad motum corporum rigidorum liberum revertemur, judicare valeamus, quibusnam casibus axis nullas plane vires sustineat. Haec autem quaestio de viribus, quas axis a viribus sollicitantibus sustinet, etsi maximi est momenti, tamen adhuc minus studiose est tractata, quamobrem operam dabo, ut eam luculenter et distincte evolam.

## PROBLEMA. 13.

365. Si corpus rigidum quiescens et circa axem fixum mobile a viribus quibuscunque sollicitetur, determinare vires, quas axis inde sustinet,

## SOLUTIO.

Hæc quaestio iterum ita ad statum quietis est reducenda, ut corpori certae vires se in aequilibrio continentes applicatae concipiantur, a quibus axis perinde afficiatur, atque a viribus sollicitantibus, dum in corpore motum generant. Hinc in finem perpendantur omnes vires corpus sollicitantes, ex iisque momenta respectu axis gyrationis colligantur, quorum summa sit  $= Vf$ , unde quaeratur angulus tempus-

Fig. 34- culo  $dt$  genitus, qui inventus est  $d\omega = \frac{Vf g dt^2}{f r r dM}$ . Deinde quaerantur vires elementares eundem motum generantes, quas pro singulis corporis elementis ita definivimus, ut elementum  $dM$  in  $Z$  positum secundum directionem  $Z\zeta$  ad distantiam  $XZ = r$  ab axe  $OA$  perpendicularem et in plano ad axem normali sitam, seu secundum directionem

motus geniti sollicitetur vi  $= \frac{r d\omega dM}{g dt^2} = \frac{Vf r dM}{f r r dM}$ , simulque notavimus, ab his viribus axem nihil pati. Quare si his viribus aequales et contrarias corpori insuper applicemus, corpus in quiete seu aequilibrio servabitur, simulque axis gyrationis easdem adhuc vires sustinebit, quas in motus generatione sustinuerat. Hinc ad vires axem afficientes inveniendas corpori praeter vires, quibus actu sollicitatur, applicatae concipiantur vires elementares motum genitum iterum tollentes; seu harum loco ex §. 357. corpori applicentur vires oppositae viribus  $Rr$  et  $Sr$  ibi assignatis, statuendo  $\omega = \frac{Vf g}{f r r dM}$ : hoc modo corpus in aequilibrio continebitur, axisque easdem vires sustinebit, quas in generatione motus sustinet.

## COROLL. 1.

366. Praeter vires ergo corpus actu sollicitantes primo ipsi vis  $Rr$  contrarie est applicanda; vis autem haec  $Rr$  est  $= \frac{Vf f z dM}{f r r dM}$  ~~stantis~~  
 $OP = \frac{f x z dM}{f z dM}$  et  $PR = \frac{f z z dM}{f z dM}$ . Deinde etiam contrarie applicari debet vis  $Sr = \frac{Vf f y dM}{f r r dM}$ , existente  $OQ = \frac{f x y dM}{f y dM}$  et  $QS = \frac{f y y dM}{f y dM}$ .

## COROLL. 2.

367. Vel si vires sollicitantes corpori motum in sensum oppositum ipsi  $Z\zeta$  imprimant, tum praeter eas hae ipsae vires  $Rr$  et  $Sr$  corpori

pori applicatae sunt intelligendae: ubi meminisse oportet, esse  $OX = x$ ,  $XY = y$ ,  $YZ = z$ , et  $rr = yy + zz$ .

COROLL. 3.

368. Ex his ergo viribus, quibus corpus in aequilibro tenetur, judicari debet, quantum axis ab iis patiatur, seu quanta vi retineri debeat, ne de loco suo dinoveatur.

SCHOLION.

369. Axis scilicet hic ut omnino fixus consideratur, ita ut corpus in aequilibrio versetur, si virium momenta respectu istius se mutuo destruant. Quo autem clarius pateat, quantas vires axis sustineat, res ita commodissime concipitur, quasi axis in duobus punctis teneretur, ut definiendum sit, quantis viribus in his punctis applicandis opus sit, ut in situ suo retineatur. Quod quidem iudicium esset facile, si singulae vires ipsi axi essent applicatae; quoniam proposita quacunque vi axi applicata, duae semper vires in datis duobus punctis applicandae exhiberi possunt illi aequivalentes. Cum igitur directiones virium, quae corpori motum inducunt, eo ipso non per axem transeant, atque etiam vires insuper applicandae  $Rr$  et  $Ss$  axem non afficiant, totum negotium jam eo reducitur, ut omnes vires, quibus corpus sollicitari consideramus, ad alias ipsis aequivalentes revocemus, quae omnes axi immediate sint applicatae. Primum quidem dubitare liceret, an hoc fieri posset? sed ostendemus, quoties vires corpori applicatae fuerint in aequilibrio, iis semper ejusmodi aequivalentes assignari posse, quae ipsi axi gyrationis sint applicatae. Virium autem sollicitantium duo genera sunt constituenda, alterum earum quae nullum momentum respectu axis praebent, quod fit si earum directiones cum axe gyrationis in eodem fuerint plano; alterum earum quarum directio reperitur in plano ad axem normali, quae quasi totae ad motum gyratorium generandam impenduntur. Verum omnes vires ad haec duo genera reducere licet, unde primum investigabo, quantum axis a primo genere, quod nullum motum gignit, afficiatur.

PROBLEMA. 14.

370. Si corpus rigidum circa axem fixum mobile sollicitetur a vi, cujus directio cum axe in eodem plano est sita, invenire vires, quas axis inde in datis duobus punctis sustinet.

SOLV.



## SOLUTIO.

Fig. 35.

Sit MN axis gyrationis, et PQ directio vis sollicitantis V, quae nisi fuerit axi parallela, eum in quodam puncto T secabit, quoniam cum axi in eodem plano est sita. Cum igitur ab hac vi nullum oriatur momentum respectu axis MN, ab ea etiam motus, si quis adesset, non afficietur, axisque perinde urgebitur, ac si quiesceret. Possumus ergo rem ita concipere, ac si vis V ipsi axi in puncto T secundum directionem TQ esset applicata, quae itaque secundum directiones TN et Tz, quae ad MN in plano MNPQ sit normalis, resoluta dabit

$$\text{vim } TN = V \cos NTQ \text{ et vim } Tz = V \sin NTQ.$$

Quodsi jam quaeratur, quantas vires axis in punctis M et N sustineat, inde ad directionem vis PQ demittantur perpendiculara MP et NQ, et

$$\text{ob } \cos NTQ = \frac{TQ}{TN} = \frac{TP}{TM} = \frac{PQ}{MN} \text{ et } \sin NTQ = \frac{NQ}{TN} = \frac{MP}{TM}, \text{ erit}$$

$$\text{vis } TN = V \cdot \frac{PQ}{MN} \text{ et vis } Tz = V \cdot \frac{NQ}{TN} = V \cdot \frac{MP}{TM}.$$

Primum ergo axis secundum suam directionem MN sollicitatur a vi  $= V \cdot \frac{PQ}{MN}$ , nihilque refert, in quoniam ejus puncto ea applicata concipitur. Alteri autem vi Tz applicari poterunt in M et N vires aequivalentes Mm et Nn normales ad axem in plano MNPQ, quae erunt:

$$\text{vis } Mm = \text{Vis } Tz \cdot \frac{TN}{MN} = V \cdot \frac{NQ}{MN} \text{ et}$$

$$\text{vis } Nn = \text{Vis } Tz \cdot \frac{TM}{MN} = V \cdot \frac{MP}{MN}.$$

Has ergo vires axis in punctis datis M et N praeter illam  $V \cdot \frac{PQ}{MN}$ , quae secundum suam longitudinem urgetur, sustinet a vi proposita V, quia corpus secundum directionem PQ sollicitatur.

## COROLL. I.

Fig. 36.

371. Si intersectio T non cadat inter puncta M et N, perpendicularum NQ ut negativum spectari debet, ideoque vis Mm in M applicanda versus PQ dirigetur, ut sit

$$\text{vis } Mm = V \cdot \frac{NQ}{MN} \text{ et vis } Nn = V \cdot \frac{MP}{MN},$$

praeter quas axis secundum MN sollicitatur vi  $= V \cdot \frac{PQ}{MN}$ .

CO-

## COROLL. 2.

372. Si vis sollicitantis  $V$  directio  $PQ$  fuerit axi  $MN$  parallela ad distantiam  $MP$ , ab ea axis primo secundum suam directionem  $MN$  trahetur vi  $= V$ , præterea vero sustinebit vires  $Mm$  et  $Nn$  æquales inter se, quarum utraque est  $= \frac{MP}{MN} V$ . Fig. 37.

## SCHOLION.

373. Ad nostrum propositum sufficit, hunc casum postremum probl. notasse, quo directio vis sollicitantis est ipsi axi parallela. A quacunque enim vi corpus urgeatur, ea semper resolvi potest in duas, quarum alterius directio sit ipsi axi parallela, altera vero in plano ad axem normali sita. Quod quo clarius appareat, sit  $OA$  axis gyrationis, corporique applicata sit vis quaecunque  $PV = V$ , ex cuius puncto quocunque  $P$  ducatur recta  $PQ$  axi  $OA$  parallela, et ex  $V$  in planum  $OAPQ$  demisso perpendiculo  $VR$ , ductaque  $RQ$  ad  $PQ$  normali, erit quoque  $VQ$  ad  $PQ$  normalis, et in plano ad  $PQ$  normali sita: cui si parallela et æqualis statuatur  $Pv$ , erit hæc ad  $PQ$  perpendicularis et in plano ad axem  $OA$  normali existens. Quare cum  $PQVv$  sit parallelogrammum rectangulum, vis  $PV = V$  resolvetur in vires  $PQ$  et  $Pv$ , ut sit vis  $PQ = \frac{PQ}{PV} \cdot V$  et vis  $Pv = \frac{Pv}{PV} \cdot V$ . Quoniam igitur illius vis  $PQ$  effectum in axem jam definivimus; superest ut quantum axis a vi  $Pv$ , dum motum gyratorium gignit, afficiatur determinemus: quem in finem sequentia problemata evolvamus. Fig. 38.

## PROBLEMA. 15.

374. Si lamina plana rigida  $EFBG$  mobilis sit circa axem fixum ad eam in  $O$  normalem, eaque in eodem plano sollicitetur, a data vi  $V$  secundum directionem  $BD$  invenire vires, quas axis sustinet in ipsa motus generatione. Fig. 39.

## SOLUTIO.

Ab axe  $O$  in directionem vis sollicitantis demittatur perpendiculum  $OD = f$ , erit ejus momentum  $= Vf$ : tum sumto elemento corporis  $dM$  in  $Z$ , cujus distantia ab axe sit  $OZ = r$ , lamina tempusculo  $dt$  in sensum  $Z\zeta$  convertetur per angulum  $d\omega = \frac{Vfg dt \cdot 2}{\int r^2 dM}$ : ad quem effectum producendum opus est vi elementari secundum  $Z\zeta$  sollicitante

tante  $= \frac{rd\omega dM}{gdt^2} = \frac{VfrdM}{frrdM}$ . Quae vires elementares ut colligan-  
tur, sumantur in plano laminae duae directrices OB et OC inter senor-  
males, positisque coordinatis OY = y et YZ = z, ut sit  $rr = yy + zz$ ,  
vis Z' resolvatur secundum directiones ZV et Zz, erit

$$\text{vis ZV} = \frac{Vfz dM}{frrdM} \text{ et vis Zz} = \frac{Vfy dM}{frrdM}.$$

Jam illis omnibus ZV aequivalet vis Rr, his vero Zz vis Ss, eritque

$$\text{vis Rr} = \frac{Vffz dM}{frrdM} \text{ et OR} = \frac{fz dM}{fz dM} \text{ atque}$$

$$\text{vis Ss} = \frac{Vff y dM}{frrdM} \text{ et OS} = \frac{fy dM}{fy dM}.$$

quae vires contrario modo in R<sub>q</sub> et S<sub>o</sub> applicatae intelligantur, qui-  
buscum si vis sollicitans BD = V conjungatur, habebuntur vires, quarum  
actionem axis sustinet. Nunc autem vis Dd = V aequivalet vi ipsi ae-  
quali Oq = V in O secundum eandem directionem applicatae, et in-  
super vi evanescenti in distantia OD in infinitum producta applicanda,  
cujus autem momentum sit = Vf. Simili modo loco virium R<sub>q</sub> et S<sub>o</sub>  
in O substitui possunt vires ipsi aequales OX et OS, una cum viribus  
evanescentibus ita in distantis infinitis applicandis, ut earum momenta  
sint  $\frac{Vffz dM}{frrdM}$  et  $\frac{Vff y dM}{frrdM}$ . Cum igitur haec momenta a viribus eva-  
nescentibus orta se destruant, ipsae vires evanescentes non amplius in com-  
putum ingrediuntur: ex quo axis in puncto O has ternas vires sustinet,  
1<sup>o</sup> vim Oq = V aequalem et parallelam vi sollicitanti, 2<sup>o</sup>, vim OX =  
 $\frac{Vffz dM}{frrdM}$  et 3<sup>o</sup>, vim OS =  $\frac{Vff y dM}{frrdM}$ .

## COROLL. 1.

375. Si directrix OB per centrum inertiae laminae I ducatur, erit  
 $fz dM = 0$ , et  $fy dM = M$ . OI denotante M massam totam. Hinc axis  
in O sustinet duas vires Oq = V et OS =  $\frac{Vf \cdot M \cdot OI}{frrdM}$ , quae facile ad  
unicam reducuntur.

## COROLL. 2.

376. Ut axis nullam plane vim sustineat, necesse est, ut directio  
vis sollicitantis BD sit ad rectam OIB normalis, tum vero ut sit  $V =$   
 $\frac{Vf \cdot M \cdot OI}{frrdM}$ , seu  $f = \frac{frrdM}{M \cdot OI}$ , ubi f = OD designat distantiam vis appli-  
catae ab axe O.

CO-

## COROLL. 3.

377. Sm autem vis sollicitans  $V$  ita fuerit applicata, ut axis  $O$  ab ea non afficiatur, ob  $f = \frac{frrdM}{M.OI}$ , lamina tempusculo  $dt$  per angulum  $d\omega$  vertetur, ut sit  $d\omega = \frac{Vgdt^2}{M.OI}$ ; punctum ergo  $I$  perinde moveri incipiet, ac si tota massa ibi esset collecta, eaque ab eadem vi  $V$  sollicitaretur.

## EXPLICATIO.

378. Fundamentum hujus solutionis isti nititur principio, quod vires, quarum momenta respectu axis gyrationis se destruant, in axem eundem effectum exerant, ac si hae vires ipsi axi immediate in suis directionibus essent applicatae. Quod etiam si in ipsa solutione satis sit confirmatum, propterea quod vires evanescentes, quarum momenta se destruant, recte negligi possunt; tamen si quem evanescencia et distantia infinita, ad quam hae vires applicatae considerantur, offendant, idem alio modo ostendisse juvabit. Sint ergo in eodem plano duae vires  $Bb$  et  $Cc$ , quarum momenta respectu puncti  $O$  se destruant, ita ut ductis in earum directiones ex  $O$  perpendicularis  $OB$  et  $OC$  sit  $Bb.OB = Cc.OC$  seu  $Bb : Cc = OC : OB$ . Concurrant earum directiones in  $E$ ; eademque vires quasi puncto  $E$  applicatae concipi possunt, tum autem dabitur una  $Ee$  illis aequivalens, cujus directio per ipsum punctum  $O$  necessario transit, alioquin enim inde momentum respectu  $O$  oriretur contra hypothesin. Quod etiam sic demonstratur. Sit  $Ee$  media directio virum  $Bb$  et  $Cc$  in  $E$  applicatarum, erit per resolutionem virium  $Bb : Cc = \sin \nu : \sin \mu$ ; at eadem ratio valet, si  $Ee$  per  $O$  transeat, quoniam est  $\sin \nu : \sin \mu = OC : OB = Bb : Cc$ . Hinc vis aequivalens  $Ee$  quasi in  $O$  applicata considerari potest, quae sit  $O\omega$ : cui ergo etiam vires  $OC$  et  $O\gamma$  ipsis  $Bb$  et  $Cc$  aequales aequivalent: sicque loco virium  $Bb$  et  $Cc$  recte substituere licet vires  $OC$  et  $O\gamma$  ipsis aequales et in ipso puncto  $O$  applicatas. Hac igitur demonstratione vicissum principium in solutione usurpatum extra dubium collocatur.

Fig. 40.

## SCHOLION.

379. Notatu omnino dignus est casus, quo vis corpus sollicitans nullam vim in axem gyrationis exerit, qui ergo sponte, dum vis effectum exerere incipit, in quiete manebit. Quo hunc casum accuratius cognoscamus, in recta  $OI$  ab axe  $O$  per centrum inertiae  $I$  producta quaeri debet punctum  $H$ , ut sit distantia  $OH = \frac{frrdM}{M.OI}$ ; tum enim

Fig. 39.

T 2

quae-

quaecunque vis  $Hb$  ad  $OH$  normalis in plano proposito nullo modo axem  $O$  afficiet. Infra autem patebit, punctum  $H$  idem esse, quod vulgo centrum oscillationis vocari solet, quemadmodum  $I$  est centrum gravitatis. Ceterum hoc problemate soluto planior reddetur solutio sequentis, ubi corpori etiam extensio secundum longitudinem axis tribuitur.

### P R O B L E M A. 16.

Fig. 41. 380. Si corpus rigidum circa axem fixum  $OA$  mobile a quocunque viribus sollicitetur, quarum directiones sint in planis ad axem normalibus, invenire vires, quibus in ipso motus initio axis immediate urgetur.

### S O L U T I O.

Cum omnes vires agant in planis ad axem normalibus, quaerantur singularum momenta respectu axis  $OA$ , quorum prout in eundem sensum tendunt vel contra, aggregatum sit  $Vf$ , a quo corpus circa axem tempusculo  $dt$  vertatur per angulum  $d\omega$ , ita ut particula in  $Z$  feratur in sensum  $Z\zeta$ . Assumtis in subsidium calculi binis directricibus  $OB$  et  $OC$  ad  $OA$  normalibus constituantur pro elemento corporis  $dM$  in  $Z$  sito ternae coordinatae  $OX = x$ ,  $XY = y$ ,  $YZ = z$ , sitque ejus ab axe distantia  $XZ = r$  ( $yy + zz = r$ ). Quibus positis supra invenimus

fore  $d\omega = \frac{Vfgdtz}{\int rrdM}$ . Praeter has autem vires, quibus corpus actu sol-

licitatur, axis insuper sollicitatur a viribus aequalibus et contrariis iis, ad quas supra vires elementares reduximus, (vide §. 366): ubi notandum est, omnium harum virium momenta junctim sumta se mutuo tollere. Quare si loco cujusque vis substituatur una ei aequalis ipsi axi in eadem directione applicata, et alia evanescens ad distantiam infinitam applicata, cujus autem momentum sit illius momento aequale, omnium harum virium momenta se destruent, et cum eae evanescant, prorsus non in censum venient. Hinc igitur vires axem immediate sollicitantes ita se habebunt: Primo singulae vires corpus sollicitantes in planis ad axem normalibus ad ipsum axem in eadem directione applicentur;

deinde ob vires elementares sumto intervallo  $OP = \frac{\int xzdM}{\int zdM}$  in  $P$  secundum directionem ipsi  $OB$  parallelam axi applicetur vis  $Pp = \frac{VffzdM}{\int rrdM}$ ,

tum vero sumto intervallo  $OQ = \frac{\int xydM}{\int ydM}$  in  $Q$  secundum directionem ipsi

ipſi OC parallelam et oppoſitam applicetur viſ  $Q\sigma = \frac{VffydM}{frrydM}$ ; ſicque omnes habebuntur vires, quas axis immediate ſuſtinebit, qui ergo ſatis fixus eſſe debet, ut ne ab iis de ſitu ſuo deturbetur.

### COROLL. 1.

381. Si planum AOB ita capiatur, ut per corporis centrum inertiae tranſeat, erit  $fzdM = 0$ , unde viſ  $P\varrho$  evaneſcet, ſimul vero diſtantia OP fiet infinita: ubi tamen notandum eſt, fore  $P\varrho \cdot OP = \frac{Vffxz dM}{frr dM}$ : ita ut hanc vim negligere non liceat.

### COROLL. 2.

382. Quoniam hoc modo omnes vires, quas axis ſuſtinet, ipſi axi ſunt applicatae, ſi eae ſe mutuo in aequilibrio teneant, axis nullam vim patietur, corpusque circa eum, etiamſi ſit liber, ſponte converti incipiet.

### COROLL. 3.

383. A ſingulis autem viribus corpus ſollicitantibus oriuntur totidem vires ipſi axi applicatae; quibus deinde adungi debent binae vires  $P\varrho$  et  $Q\sigma$  axi itidem applicatae; ſicque omnes habentur vires axem afficientes.

### EXPLICATIO.

384. Iam ante oſtendimus, ſi duae vires in eodem plano ad axem normali fuerint applicatae, quarum momenta ſe deſtruant, iis aequivalere duas aequales vires ipſi axi in iisdem directionibus applicatas; nunc igitur, ne ullum dubium circa hanc ſolutionem ſuperſit, ex principiis ſtaticis demonſtrari oportet, idem valere, etiamſi illae vires in diverſis planis ad axem normalibus fuerint applicatae. Sit igitur axi OA in Fig. 42. plano ad E normali applicata viſ quaecunque in figura non expreſſa, tum vero in plano ad axem in F normali applicata ſit viſ  $Nn$ , cujus momentum illius momento ſit aequale et contrarium, ſitque recta FN ad directionem illius viſ  $Nn$  perpendicularis. Ducatur ex E recta EM ipſi FN aequalis et parallela, cui ipſi M viſ  $Mm$  ipſi  $Nn$  aequalis et parallela applicata concipiatur; tum vero in E et F aequales vires illis  $F$ , et  $E\mu$  itidem parallelae applicatae intelligantur. Atque evidens eſt, tres vires  $Mm$ ,  $E\mu$  et  $F$ , aequivalere vi uni  $Nn$ , quoniam haec contrario-

T 3

modo

modo applicata cum illis tribus aequilibrium constitueret. Quare loco vis  $Nn$  substituere licet tres vires  $Mm$ ,  $E\mu$  et  $Fv$ , quarum binae posteriores ipsi axi, prior autem in eodem plano ad axem normali, in quo vis non expressa agit, est applicata. Cum igitur hujus vis  $Mm$  momentum aequale sit et contrarium momento vis in figura non exhibitae, eae vires ad ipsum axem transferri possunt, sicque loco vis  $Mm$  substituetur vis  $EM$  ipsi aequalis et parallela: quae cum a vi  $E\mu$  destruat, unica relinquitur vis  $Fv$ , quae jam locum vis  $Nn$  sustinebit, dum etiam vis in figura non expressa axi in puncto  $E$  applicatur. Ex quo in genere intelligitur, loco virium, quarum momenta se destruant, easdem vires ipsi axi applicatas substitui licere, si quidem directiones fuerint in planis ad axem normalibus.

### PROBLEMA. 17.

Fig. 41. 385. Si corpus rigidum circa axem fixum  $OA$  mobile a viribus quibuscunque sollicitetur, definire vires, quibus axis in datis duobus punctis  $O$  et  $A$  sustentari debet, ne de situ suo deturbetur.

### SOLUTIO.

Per alterum datorum punctorum  $O$  statuatur binae directrices  $OB$  et  $OC$  tam inter se quam ad axem  $OA$  normales, et positis pro corporis elemento quovis  $dM$  in  $Z$  sito ternis coordinatis  $OX = x$ ,  $XY = y$ , et  $YZ = z$ , vocetur ejus ab axe distantia  $XZ = r$  ( $yy + zz = r$ ). Tum considerentur singulae vires corpus sollicitantes, et quae fuerint obliquae, resolvantur in binas, quarum alterae sint axi  $OA$  parallelae, alterae vero in planis ad axem normalibus sint sitae. Priorae, quae ad motum nihil conferunt, quantum effectum in axem exerant, supra (§. 372.) definivimus, unde simul patet, quantae vires inde in datis punctis  $O$  et  $A$  oriantur. Posteriores vero simul praebeant momentum  $= Vf$  ad corpus in sensum  $ZZ$  convertendum: earum autem quaelibet puncto axis cui respondet, in sua directione applicetur, cujusmodi una vis sit  $Ll = L$ . Hujus ergo loco in  $O$  et  $A$  applicentur vires parallelae  $Ol$  et  $Al$ , ut sit  $Ol = L \frac{AL}{OA}$  et  $Al = L \frac{OL}{AO}$ , quippe quae duae illi aequivalent: atque hoc modo ex singulis viribus tales binae vires ad puncta  $O$  et  $A$  transferantur. Deinde vero posito intervallo  $OA = a$ , ob vires  $Po$  et  $Qo$  puncta  $O$  et  $A$  sustinebunt vires  $Oo$ ,  $Aa$  et  $Oo$ ,  $Aa$  illis parallelas, ita ut sit

vis

$$\begin{aligned} \text{vis } O\theta &= \frac{Vff(a-x)z dM}{afrrdM}, \text{ vis } Aa = \frac{Vffxz dM}{afrrdM} \\ \text{vis } O\omega &= \frac{Vff(a-x)y dM}{afrrdM}; \text{ vis } A\alpha = \frac{Vffxy dM}{afrrdM}. \end{aligned}$$

Cum igitur hoc pacto omnes vires, quas axis sustinet, ad puncta O et A fuerint perductae, ab his junctim sumtis ista axis puncta revera sollicitabuntur; quare ea a viribus contrariis coerceantur, necesse est.

#### COROLL. 1.

386. Omnes istae vires axi in punctis O et A applicatae simul ad axem sunt normales, nisi affuerint vires axi parallelae, unde praeter normales axis etiam secundum suam longitudinem urgetur.

#### COROLL. 2.

387. Quotcunque autem vires utrique termino O et A applicatae reperiuntur, pro utroque cunctas ad unam revocare licet, quam propterea axis in eo puncto sustinebit: quae vires in O et A, nisi evanescant, axis non sponte in situ suo permanebit.

#### COROLL. 3.

388. Si nullae adsint vires axi parallelae, axis etiam nequaquam secundum suam longitudinem urgetur, sed in punctis O et A viribus tantum ad axem normalibus erit resistendum, unde sufficiet axem intra duos annulos fixos suspendisse.

#### SCHOLION.

389. Hic autem nondum modos, quibus axis in quiete conservari solet, explicare licet, quoniam in praxi axes corporum notabilem crassitiam habent, ita ut suspensio non ad axem linearem, qualem hic postulamus, referatur: quare, cavendum est, ne ea, quae hic de axe lineari sunt demonstrata, temere ad quovis axes crassos extendantur. Teneatur ergo hic perpetuo, axem nobis esse lineam rectam, quae moto corpore ipsa non moveatur, cujusmodi motus existeret, si corpus intra duas cuspides contineretur, circa quas tamen liberrime sine frictione revolvi posset. Sin autem adsit axis materialis, qualis rotis affigi solet, isque vel plano vel cavitati incumbat, ejus motus utique in computum veniat necesse est, neque tum facile erit lineam illam, quae durante motu corporis ipsa maneat immota, assignare. Verumtamen quia hic nobis tantum de primo motus initio sermo est, haud difficile



cile est lineam, quae pro quovis suspensionis modo in quiete persistat, agnoscere.

## PROBLEMA. 18.

Fig. 43. 390. Si corpus rigidum circa axem OA fuerit mobile, invenire vires, a quibus si corpus sollicitetur, axis inde nullas plane vires sustineat.

## SOLUTIO.

Hujusmodi vires applicari debent in planis ad axem normalibus, et quoniam quotquot earum fuerint, eas ad duo plana reducere licet, quae ramus vires in planis ad axem in punctis O et A normalibus applicandas, a quibus axis nullatenus afficiatur. Constitutis ut ante in O binis directricibus OB et OC tam inter se quam ad axem OA normalibus, iisdem in A parallelas statuatur AF et AH. Quod si jam solutio praecedentis problematis et formulae ibi inventae in subsidium vocentur, huic problemati satisfiet, si rectis OB, OC, AF et AH alicubi vires applicentur illis  $Oo$ ,  $Oa$ ,  $Aa$  et  $Aa$ , quas ibi invenimus, aequales et contrariae, quoniam hae ad axem translatae a viribus elementaribus destruuntur. Sint ergo  $Ee$  et  $Ff$  vires directrici OC, at  $Gg$  et  $Hh$  vires directrici OB parallelas, quae agant, uti figura ostendit. Quare posita distantia  $OA = a$ , vires istae ita esse debent comparatae:

$$\begin{aligned} \text{vis } Ee &= \frac{Vff(a-x)y dM}{afrrdM}; \quad \text{vis } Ff = \frac{Vffxy dM}{afrrdM} \\ \text{vis } Gg &= \frac{Vff(a-x)z dM}{afrrdM}; \quad \text{vis } Hh = \frac{Vffxz dM}{afrrdM}. \end{aligned}$$

Praeterea vero summam momentorum harum quatuor virium ipsi  $Vf$  aequalem esse oportet: ex quo erit

$$OE \cdot f(a-x)y dM + AF \cdot fxy dM + OG \cdot f(a-x)z dM + AH \cdot fxyz dM = afrrdM.$$

Cui aequationi ita infinitis modis satisfieri potest, ut ternis distantis pro lubitu assumtis quarta determinetur. Facilius autem reddetur solutio, si tam distantiae OE, AF, quam OG, AH aequales capiantur: statuamus ergo

$$OE = AF = m, \quad \text{et } OG = AH = n,$$

atque fieri oportet

$$mfy dM + nfx dM = frrdM,$$

unde vel  $m$  vel  $n$  pro lubitu assumi potest. Deinde sufficit, ut quatuor illae vires rationem superiorum formularum teneant, ita ut sint:

vis

# DE MOTUS GYRATORII GENERATIONE. 153

$$\text{vis } Ee = \frac{f(a-x)ydM}{ab}; \text{ vis } Ff = \frac{fxydM}{ab}$$

$$\text{vis } Gg = \frac{f(a-x)zdM}{ab}; \text{ vis } Hh = \frac{fxzdM}{ab}$$

Hae ergo quatuor vires praescripto modo corpori applicatae axem plane non afficient.

## COROLL. 1.

391. Si planum AOB per centrum inertiae I capiatur, erit  $\int zdM = 0$ , et  $KI = \frac{\int ydM}{M}$ , denotante  $M$  massam totius corporis. Erunt ergo vires:

$$\text{vis } Ee = \frac{Ma, KI - \int xydM}{ab}; \text{ vis } Ff = \frac{\int xydM}{ab}$$

$$\text{vis } Gg = \frac{-\int xzdM}{ab}; \text{ vis } Hh = \frac{\int xzdM}{ab}$$

earumque distantiae ab axe in genere ita debent esse comparatae, ut sit  $Ma, KI, OE + (AF + OE) \int xydM + (AH - OG) \int xzdM = afrrdM$ .

## COROLL. 2.

392. Si etiam ipse axis OA per centrum inertiae I transeat, ut sit  $KI = 0$ , vires ita se habebunt:

$$\text{vis } Ee = \frac{-\int xydM}{ab}; \text{ vis } Ff = \frac{\int xydM}{ab}$$

$$\text{vis } Gg = \frac{-\int xzdM}{ab}; \text{ vis } Hh = \frac{\int xzdM}{ab}$$

earumque distantiae ab axe hoc modo, ut sit.

$$(AF - OE) \int xydM + (AH - OG) \int xzdM = afrrdM.$$

## COROLL. 3.

393. Quodsi ergo valores integralium  $\int xydM$  et  $\int xzdM$  evanescant, tam vires evanescunt, quam distantiarum quaedam debent esse infinitae. At loco vis evanescens in distantia infinita applicatae substituere licet duas in distantiis finitis applicandas.

## SCHOLION. I.

394. Vires hae investigavimus in duobus planis ad axem normalibus applicandas, a quibus axis nullam vim sustineat. His autem viribus infinitis modis aliae tam in iisdem planis quam in aliis aequivalen-

U

tes exhiberi possunt. Veluti loco, vis  $E_s$  sumi possunt vires  $P_p$  et  $O_\pi$  in directionibus parallelis, ut sit  $P_p = E_s + O_\pi$ , et  $E_s \cdot EP = O_\pi \cdot OP$  seu  $E_s = P_p - O_\pi$  et  $OE = \frac{OP \cdot P_p}{P_p - O_\pi}$ . Quare ducto plano

AOB per centrum inertiae I corporis, locoque vis  $E_s$  introductis viribus  $P_p$  et  $O_\pi$ , quarum altera  $O_\pi$  maneat indefinita, reliquae ita se habebunt:

$$\text{Vis } P_p = \text{vis } O_\pi + \frac{Ma \cdot KI - fxydM}{ab}; \text{ vis } F_f = \frac{fxydM}{ab},$$

$$\text{vis } G_g = \frac{-fxyzdM}{ab} \text{ et vis } H_h = \frac{fxyzdM}{ab};$$

$$ab \cdot OP \cdot \text{Vis } O_\pi + Ma \cdot KI \cdot OP - OP \cdot fxydM + AF \cdot fxydM + (AH - OG) fxyzdM = afrrdM.$$

Si praeterea simili modo loco vis  $F_f$  binas vires  $R_r$  et  $A_g$  introducatur, cum sit  $F_f = R_r - A_g$  et  $AF = \frac{AR \cdot R_r}{R_r - A_g}$ , atque vis  $A_g$  arbitrio nostro relinquatur; erunt vires:

$$\text{vis } P_p = \text{vis } O_\pi + \frac{Ma \cdot KI - fxydM}{ab}; \text{ vis } R_r = \text{vis } A_g + \frac{fxydM}{ab}$$

$$\text{vis } G_g = \frac{-fxyzdM}{ab} \text{ et vis } H_h = \frac{fxyzdM}{ab}.$$

Tum vero distantiae ita debent esse comparatae:

$$+ ab \cdot OP \cdot \text{Vis } O_\pi + Ma \cdot KI \cdot OP + (AR - OP) fxydM \\ + ab \cdot AR \cdot \text{Vis } A_g + (AH - OG) fxyzdM = afrrdM.$$

Si denique loco vis  $G_g$  binas  $Q_q$  et  $O_\phi$ ; nec non loco vis  $H_h$  binas  $S_s$  et  $A_\sigma$  introducatur, ob

$$G_g = Q_q - O_\phi; OG = \frac{OQ \cdot Q_q}{Q_q - O_\phi};$$

$$H_h = S_s - A_\sigma; AH = \frac{AS \cdot S_s}{S_s - A_\sigma};$$

jam in genere vires ita capiuntur:

$$\text{vis } P_p = \text{vis } O_\pi + \frac{Ma \cdot KI - fxydM}{ab}; \text{ vis } R_r = \text{vis } A_g + \frac{fxydM}{ab}$$

$$\text{vis } Q_q = \text{vis } O_\phi - \frac{fxyzdM}{ab}; \text{ vis } S_s = \text{vis } A_\sigma + \frac{fxyzdM}{ab}$$

earumque distantiae ab axe ita se habeant, ut sit

$$+ ab \cdot OP \cdot \text{Vis } O_\pi + Ma \cdot KI \cdot OP + (AR - OP) fxydM \\ + ab \cdot AR \cdot \text{Vis } A_g + (AS - OQ) fxyzdM = afrrdM.$$

$$+ ab \cdot OQ \cdot \text{Vis } O_\phi$$

$$+ ab \cdot AS \cdot \text{Vis } A_\sigma$$

Nunc

Nunc igitur etiam si intervallum  $KI$  cum integralibus  $\int xy dM$  et  $\int xz dM$  evanescat, tamen infinitae habentur vires finitae et in distantis finitis applicatae, quae quaesito satisficiant.

### SCHOLION. 2.

395. In hac generali solutione quatuor relinquuntur vires  $O\pi$ ,  $O\phi$ ,  $A\phi$  et  $A\sigma$  arbitrio nostro, axi in punctis  $O$  et  $A$  secundum binas directiones  $OB$  et  $OC$  applicandae; deinde etiam quatuor virium  $Pp$ ,  $Qq$ ,  $Rr$ , et  $Ss$  distantiae ab axe  $OP$ ,  $OQ$ ,  $AR$  et  $AS$  pro lubitu assumi possunt, dummodo quantitas  $ab$  ita definiatur, ut sit

$$ab = \frac{a \int r r dM - Ma \cdot KI \cdot OP + (OP - AR) \int xy dM + (OQ - AS) \int xz dM}{OP \cdot vis O\pi + OQ \cdot vis O\phi + AR \cdot vis A\phi + AS \cdot vis A\sigma}$$

Quo valore invento vires hac posteriores ita determinantur, ut fit

$$vis Pp = vi O\pi + \frac{Ma \cdot KI - \int xy dM}{ab}; \quad vis Rr = vi A\phi + \frac{\int xy dM}{ab}$$

$$vis Qq = vi O\phi - \frac{\int xz dM}{ab}; \quad vis Ss = vi A\sigma + \frac{\int xz dM}{ab}$$

quae vires respectu priorum habent directiones oppositas: omnes autem momenta in eundem sensum tendentia praebere assumuntur: eritque momentum totale ex omnibus ortum

$$= \frac{a \int r r dM}{ab}, \quad \text{quod supra vocavimus } Vf,$$

ex quo motus initium ita definitur, ut tempusculo  $dt$  corpus vertatur per angulum  $d\omega = \frac{g dt^2}{b}$ . Recordandum est autem, hic  $a$  designare intervallum  $OA$ , tum vero pro quolibet corporis elemento  $dM$  coordinatas directricibus  $OA$ ,  $OB$ ,  $OC$  parallelas esse  $x$ ,  $y$ ,  $z$ , quarum prima  $x$  a puncto  $O$  capiatur: praeterea vero hic planum  $AOB$  per centrum inertiae  $I$  corporis duximus, ut esset  $OC$  ad istud planum normalis.

### PROBLEMA. 19.

396. Si corpus rigidum circa axem fixum mobile sollicitetur a viribus quibuscunque, atque ad motum cicatur, definire vires, quas ipsa corporis compages sustinet.

### SOLUTIO.

Hic ejusmodi vires inveniri oportet, quae corpori applicatae id quidem in aequilibrio teneant, simul vero compagem ejus aequae afficiant, atque ea in productione motus afficitur. Primo ergo corpus su-

U 2

sinet

stinet vires, quibus actu sollicitatur; ubi eae partes, quibus singulae immediate sunt applicatae probe notentur: quandoquidem quaelibet vis unicam tantum corporis particulam urget. Deinde ex momento omnium istarum virium colligantur vires elementares, quae in singulis elementis parem motum gignerent; ac singulis elementis his aequales et contrariae applicatae concipiantur, quarum loco hic alias ipsis aequivalentes ut supra substituere non licet, quoniam hunc ipsa rigiditatis ratio exquiritur. Tertio adjiciantur vires, quibus axis actu in quiete servatur; atque hi tres virium ordines corpus in perfecto aequilibrio continebunt; simulque in compage partium idem plane efficiunt, quod corpus in motus generatione patitur. Hincque intelligitur, quam firmo nexu singulae corporis particulae inter se colligatae esse debeant, ut nulla earum divulsio sit metuenda: et nisi compages his viribus satis resistere valeat, corpus non pro rigido esset habendum.

#### SCHOLIUM.

397. Hic plus definire non suscipiamus, quam quantis viribus singulae corporis particulae sollicitentur, quae eas a nexu cum reliqua avellere conentur; quomodo enim structura corporis huic effectui resistat, hujus loci non est inquirere, propterea quod haec ratio rigiditatis cuique corporum generi est peculiaris. Ceterum in hoc capite tantum motus initium, qui corpori rigido circa axem fixum mobili a viribus quibuscunque imprimitur, sumus contemplati, quo facilius solus virium effectus a motu jam insito separatus perspiceretur. Imprimis autem hinc ad sequentes investigationes subsidia petentur, quando, dum corpus circa quempiam axem gyrationis, vires adfuerint id circa alium axem convertere conantes; tum enim ex effectu momentaneo circa hunc axem productum judicare licebit, quomodo motus praecedens turbetur. Nunc igitur corpus rigidum in motu circa axem fixum considerabimus, et scrutabimur, quomodo a viribus quibuscunque immutari debeat, postquam jam demonstravimus, ejus motum, si nullae adessent vires sollicitantes, uniformem esse futurum. Praeterea vero vires, quas axis gyrationis interea sustinet, sollicite erunt perpendendae.



# CAPUT IV.

## DE PERTURBATIONE MOTUS GYRATORII A VIRIBUS QUIBUSCUNQUE ORTA.

### PROBLEMA 20.

398. Si corpus rigidum circa axem fixum gyretur celeritate quacunque angulari, invenire vires elementares, a quibus dato tempusculo motus angularis datam accelerationem adipiscatur.

### SOLUTIO.

Sit  $\omega$  celeritas angularis, qua scilicet, si motus gyratorius esset uniformis, singulis minutis secundis conficeret angulum  $= \omega$ , tantam autem motus accipere debeat accelerationem, ut elapso tempusculo  $dt$  celeritas angularis fiat  $= \omega + d\omega$ . Consideretur jam corporis elementum quodcunque  $dM$ , cujus distantia ab axe gyrationis sit  $= r$ , ideoque ejus celeritas  $= r\omega$ , quae, cum distantia  $r$  pro eodem elemento maneat constans, tempusculo  $dt$  augmentum accipere debet  $= r d\omega$ . Ad hoc ergo necesse est, ut massula  $dM$  secundum directionem motus sollicitetur a vi quapian, quae si tantisper ponatur  $= p$ , erit per motus principia supra stabilita  $r d\omega = \frac{2g p dt}{dM}$  (202.); unde vis huic elemento applicanda

fit  $p = \frac{r dM}{2g} \cdot \frac{d\omega}{dt}$ . Singula ergo corporis elementa secundum ipsam

motus sui directionem sollicitari debent a viribus  $= \frac{d\omega}{2g dt} r dM$ , ubi  $dM$  exprimit massam cujusque elementi, et  $r$  ejus distantiam ab axe. Atque hae sunt vires elementares, quae singula corporis elementa sollicitantes motum gyratorium ita accelerant, ut celeritas angularis  $\omega$  tempusculo  $dt$  accipiat augmentum  $d\omega$ .

### COROLL. 1.

399. Cum  $\frac{d\omega}{2g dt}$  pro omnibus elementis corporis eundem valorem retineat, vires elementares sunt in ratione composita massarum earumque distantiarum ab axe gyrationis. Singulae autem hae vires sin-

U 3

gulis

gulis elementis secundum ipsam motus directionem applicatae sunt intelligendae.

## C O R O L L. 2.

400. Quia harum virium nulla obstat, quominus reliquae effectum suum plenum producant, perinde ac si singulae particulae a se invicem essent dissolutae, ab his viribus elementaribus neque compages corporis neque axis gyrationis afficitur.

## C O R O L L. 3.

401. Compages igitur partium atque axis gyrationis nullas alias vires sustinent, nisi quae ex motu gyratorio ipso nascuntur, quaeque hoc tempusculo perinde se habebunt, ac si motus gyratorius esset uniformis.

## S C H O L I O N.

402. Etsi autem vires elementares per se axem gyrationis non afficiunt, sed quasi totae in motu singulorum elementorum accelerando consumuntur, tamen quatenus ab iis motus gyratorius rapidior redditur, eatenus ob auctam vim centrifugam vires, quas axis sustinet, fiunt majores. Verum hic effectus primo instanti est infinite parvus, atque axis aliter non afficitur, ac si motus gyratorius esset uniformis. Scilicet cum celeritas angularis sit  $= \omega$ , quaelibet particula, cujus mas-

sa  $= dM$  et distantia ab axe  $= r$ , ab axe recedere conatur vi  $= \frac{\omega \omega r dM}{2g}$ .

Fig. 32. Ab omnibus autem istis viribus per §. 338. axis OA conjunctim ita afficitur, ut in subsidium vocatis binis directricibus OB et OC invicem et ad axem OA normalibus, quibus pro elemento  $dM$  in Z sito parallelae capiantur coordinatae  $OX = x$ ,  $XY = y$ ,  $YZ = z$ , axis in punctis E et F sustineat duas vires  $Ee$  et  $Ff$ , quarum illa directrici OB haec vero ipsi OC sit parallela; ita ut sit

$$OE = \frac{\int xy dM}{\int y dM} \text{ et vis } Ee = \frac{\omega \omega}{2g} \int y dM$$

$$OF = \frac{\int xz dM}{\int z dM} \text{ et vis } Ff = \frac{\omega \omega}{2g} \int z dM$$

Vel huius loco in datis duobus punctis O et A binae aequivalentes Ob. Oc et Ac, Ay applicatae concipi possunt, quae ex §. 343. erunt, posito intervallo OA = a,

vis

$$\text{vis } Ob = \frac{uu}{2ag} (a/ydM - /xydM); \text{ vis } AC = \frac{uu}{2ag} /xydM$$

$$\text{vis } Oc = \frac{uu}{2ag} (a/zdM - /xzdM); \text{ vis } Ay = \frac{uu}{2ag} /xzdM.$$

Ex quibus formulis colligitur, quantas vires axis ob solum motum gy-  
ratorium sustineat.

### PROBLEMA. III.

403. Si dum corpus rigidum circa axem fixum gyratur, singulae  
ejus particulae secundum ipsam motus sui directionem sollicitentur vi-  
ribus, quae sint in ratione composita massarum et distantiarum ab axe,  
definire incrementum celeritatis angularis dato tempusculo productum.

### SOLUTIO.

Posita celeritate angulari  $= u$ , qua corpus nunc gyratur, conside-  
remus particulam corporis quamcunque, cujus massa sit  $= dM$  et di-  
stantia ab axe  $= r$ . Haec ergo particula secundum motus sui directio-

nem sollicitatur vi, quae est ut  $rdM$ : ponatur ergo  $ea = \frac{rdM}{b}$ , ubi  $b$  sit  
linea pro omnibus corporis elementis hocque instanti eadem. Iam cum  
hujus elementi celeritas sit  $= ru$ , pro eaque sit  $r$  quantitas constans,  
si hoc elementum extra nexum cum reliquis versaretur, foret  $rd u = 2g$ .  
 $\frac{rdM}{b} \cdot dt: dM = \frac{2grdt}{b}$ , incrementum scilicet celeritatis tempusculo  $dt$

productum. Hinc ergo pro celeritate angulari  $u$  fiet  $du = \frac{2gdt}{b}$ : qua-  
re cum ex omnibus elementis eadem celeritatis angularis acceleratio  
oriatur, ea sibi mutuo nulli sunt impedimento, sed singula elementa  
suas accelerationes aequae recipient, ac si a reliquis essent soluta. Hinc  
ab istis viribus, quae cum elementaribus in praec. probl. definitis con-  
veniunt, motus gyratorius totius corporis rigidi ita acceleratur, ut  
tempusculo  $dt$  celeritas angularis  $u$  incrementum capiat  $du = \frac{2gdt}{b}$ .

### COROLL. I.

404. Incrementum ergo celeritatis angularis  $du$  non pendet  
ab ipsa celeritate angulari  $u$ , quae sive major fuerit sive minor, ab iis-  
dem viribus eodem tempusculo idem incrementum adipiscitur.

CO-



## C O R O L L. 2.

405. Quia quaelibet vis elementaris  $\frac{rdM}{b}$  est ad distantiam ab axe  $r$  normalis in plano ad axem normali, ejus momentum respectu axis est  $= \frac{rrdM}{b}$ , ideoque summa omnium momentorum  $= \frac{1}{b} \int rrdM$ .

## C O R O L L. 3.

406. Si corpus praeter has vires elementares ab aliis urgeretur in sensum contrarium, quarum momentum respectu axis ibidem esset  $= \frac{1}{b} \int rrdM$ , ab his illarum effectus destrueretur, motusque nullam reciperet accelerationem.

## S C H O L I O N.

407. De his viribus, quas *elementares* voco, quoniam in singulis elementis mutationem status, quam subeunt, producant, id praefertim observandum est; quod ab iis axis nullam vim patiatur; propterea quod ab iis singula elementa perinde, ac si a se invicem essent dissoluta, afficiuntur. Quanquam autem hujusmodi vires vix in mundo existunt, tamen ab iis exordium erat, ut aliarum quarumcunque virium effectus in motu gyrationis perturbando definire possemus. Si enim aliae vires, quaecunque fuerint, respectu axis gyrationis aequale momentum habeant, eas etiam eandem motus accelerationem producere debent; quoniam si contrario modo essent applicatae, cum elementaribus in equilibrio forent. Haec summa convenientia tantum de motus mutatione est intelligenda: nam longe aliter res se habebit, cum vires, quas axis gyrationis sustinet, determinari debebunt. Verum etiam haec determinatio ope virium elementarium facile expeditur, quemadmodum jam in capite praecedente est ostensum.

## P R O B L E M A. 22.

408. Si corpus rigidum, dum circa axem fixum gyrat, sollicitetur a viribus quibuscunque, definire mutationem momentaneam in motu gyrationis ab iis productam.

## S O L U T I O.

Sit ut hactenus celeritas angularis, qua corpus jam gyrat, tum quaerantur singularum virium sollicitantium momenta, quae collecta

lecta praebeant summam  $= Vf$ , quae tendet motum gyrationis vel accelerare vel retardare, prout in eundem sensum vergat, vel in contrarium. Sumamus autem hoc momentum ad accelerationem tendere, quia si contrarium eveniret, ipsum momentum tanquam negativum spectari posset. Quaeritur ergo, quantum incrementum celeritas angularis  $\omega$  tempusculo  $dt$  sit accepturum? Dabuntur autem utique vires elementares, quae par incrementum essent producturae. Sit igitur pro elemento  $dM$  ad distantiam  $r$  ab axe sito vis elementaris  $= \frac{r dM}{b}$ , cu-

jus momentum cum sit  $= \frac{r r dM}{b}$ , effectus harum virium in motu gyrationis turbando illi, qui a momento  $Vf$  producitur, erit aequalis, si summa omnium illorum momentorum  $\frac{1}{b} \int r r dM$  fuerit momento  $Vf$  aequalis, unde fit  $b = \frac{\int r r dM}{Vf}$ . At ex viribus elementaribus  $\frac{r dM}{b}$

oritur motus gyrationis acceleratio  $d\omega = \frac{2g dt}{b}$  tempusculo  $dt$ . Quare pro  $b$  substituto valore modo invento, incrementum celeritatis angularis  $\omega$  a virium momento  $Vf$  tempusculo  $dt$  productum erit  $d\omega = \frac{2Vfg dt}{\int r r dM}$ , ubi  $\int r r dM$  est quantitas constans a figura et indole corporis pendens.

#### COROLL. 1.

409. Incrementum ergo celeritatis angularis  $d\omega$  proportionale est directe momento virium sollicitantium  $Vf$  et tempusculo  $dt$ , reciproce autem illi quantitati, quae oritur, si singula corporis elementa per quadrata distantiarum suarum ab axe gyrationis multiplicentur, et in unam summam colligantur.

#### COROLL. 2.

410. Si corpus adhuc motu gyrationis confecerit angulum  $= \phi$ , erit nunc  $\frac{d\phi}{dt}$  celeritas angularis  $\omega$ , ideoque sumpto elemento temporis  $dt$  constante, erit  $dd\phi = \frac{2Vfg dt^2}{\int r r dM}$ .

#### COROLL. 3.

411. Sin autem loco tempusculi  $dt$  angulum elementarem  $d\phi$  interea confectum in calculum introducere velimus, ob  $dt = \frac{d\phi}{\omega}$ , habebimus

X

habebimus hanc formulam  $u du = \frac{2Vf g d \phi}{f r r d M}$ , qua incrementum quadrati celeritatis angularis definitur.

## SCHOLION.

412. Quod si ergo ad quodvis tempus noverimus vires quibus corpus sollicitatur, quarum momentum elapso tempore  $t$  sit  $= Vf$ , ope formulae inventae si integretur, totus motus gyrotorius determinari poterit. Ubi quidem observandum est, si vel nullae affuerint vires, vel eae nullum praebent momentum respectu axis gyrationis, motum futurum esse aequabilem, dum axis has vires totas sustineat. Mutatio scilicet motus tantum a momento virium pendet, eique adeo est proportionalis: Verum videamus etiam, quantas vires ipse axis sustineat, dum motus corporis a viribus quibuscunque perturbatur: quae investigatio ex his, quae in capite praecedente sunt exposita, facile instituetur. Exempla autem talis motus gyrotorii a viribus perturbati inferius afferemus, ubi corpora a gravitate animari assumemus.

## PROBLEMA. 23.

413. Si corpus rigidum, dum circa axem fixum gyratur, a viribus quibuscunque sollicitetur, definire vires, quas axis in datis duobus punctis O et A sustineat, et quibus resistere debet, ne vacillet.

## SOLUTIO.

Ex praecedentibus perspicitur, axem triplicis generis vires sustinere, primo scilicet vires, quibus corpus actu sollicitatur, secundo vires aequales et contrarias viribus elementaribus idem momentum producentibus, ac tertio vires centrifugas ex motu gyrotorio natas. Has ergo triplices vires ad data duo axis puncta O et A revocari oportet.

Fig. 44.

Quod ergo ad vires corpus actu sollicitantes attinet, quaelibet earum, nisi ejus directio sit in plano ad axem normali, resolvatur in duas VQ et Vv, quarum illa VQ sit axi OA parallela, altera vero Vv in plano ad axem normali, axem in T secante. Iam ob vim VQ axis primo sustinet vim aequalem secundum suam longitudinem OA: praeterea vero in O et A vires Op et Aq ad axem normales in ipso plano OAQP, quarum illa Op versus PQ est directi, haec vero Aq inde aversa: ambae autem hae vires sunt aequales et  $Op = Aq = \frac{VT}{OA}$  vis VQ. Deinde

Deinde vis  $Vv$  pro punctis  $O$  et  $A$  praebet vires  $Or$  et  $Ar$  ipsi parallelas, quae sunt

$$\text{vis } Or = \frac{AT}{OA} \cdot \text{vis } Vv, \text{ et vis } As = \frac{OT}{OA} \cdot \text{vis } Vv.$$

Hocque modo singula vires corpus sollicitantes ad axem ejusque terminos  $O$  et  $A$  reducuntur.

Pro viribus secundi generis, quae elementaribus sunt contrariae, Fig. 45. §. 385. secuti, sumamus in  $O$  duas directrices  $OB$  et  $OC$  inter se et ad axem  $OA$  normales, quibus etiam in  $A$  parallelas constituentur  $AE$  et  $AF$ , et pro corporis elemento  $dM$  in  $Z$  sito ponamus coordinatas  $OX = x$ ,  $XY = y$ , et  $YZ = z$ , ut sit ejus distantia ab axe  $XZ = r = \sqrt{(yy + zz)}$ . Porro sit omnium virium sollicitantium momentum =  $Vf$  in sensum  $Z\xi$  tendens.

Hinc igitur vidimus, pro utroque termino  $O$  et  $A$  geminas oriri vires, scilicet posito intervallo  $OA = a$  pro termino  $O$

$$\text{vim secundum } OB = \frac{Vff(a-x)z dM}{afrr dM}$$

$$\text{vim secundum } OC = \frac{Vff(a-x)y dM}{afrr dM},$$

at pro altero termino  $A$

$$\text{vim secundum } AE = \frac{Vffxz dM}{afrr dM}$$

$$\text{vim secundum } AF = \frac{Vffxy dM}{afrr dM},$$

ubi  $Oa$  et  $Af$  sunt rectae  $OC$  et  $OF$  in contrariam plagam productae.

Pro viribus tertii generis, ex ipso motu gyratorio natis, ante §. 402. vidimus, cujusmodi vires inde ad utrumque terminum  $O$  et  $A$  redeunt. Scilicet si celeritas angularis sit =  $u$ , manentibus denominationibus modo adhibitis pro termino  $O$  habentur hae duae vires:

$$\text{vis secundum } OB = \frac{uuf(a-x)y dM}{2ag}$$

$$\text{vis secundum } OC = \frac{uuf(a-x)z dM}{2ag},$$

similique modo pro termino altero  $A$

$$\text{vis secundum } AE = \frac{uufxy dM}{2ag}$$

$$\text{vis secundum } AF = \frac{uufxz dM}{2ag} \quad \text{X 2}$$

Colli-

Colligendis ergo omnibus his viribus pro utroque termino O et A habebuntur vires, quas axis in his punctis sustinet.

## COROLL. 1.

414. Quia vires tertii generis quadratum celeritatis angularis involvunt, eadem manent, siue  $\alpha$  sit positiva siue negativa, hoc est siue a viribus sollicitantibus acceleretur, siue retardetur.

## COROLL. 2.

415. Omnes vires utrumque axis terminum sollicitantes, quotcumque fuerint, facile ad unam reduci possunt, ita ut uterque terminus ab unica tantum vi urgeatur; atque ad axem retinendum necesse est, ut in his terminis a viribus aequalibus et contrariis sustentetur.

## COROLL. 3.

416. Si planum AOB ita capiatur, ut per centrum inertiae corporis I transeat, erit  $\sum dM = 0$ , et  $\sum ydM = M \cdot GI$  denotante M massam totius corporis; ex quo superiores formulae aliquanto simplices evadent.

## SCHOLION.

417. Fundamentum hujus solutionis in superioribus jam abunde est explicatum, unde in singulis rationibus afferendis minus fui sollicitus. Cum enim, si corpus a solis viribus elementaribus sollicitetur, ab iis axis nequiquam afficiatur, sed solas vires centrifugas patietur; quando ab aliis viribus quibuscunque sollicitatur, primo axis ab iis perinde afficietur, ac si corpus quieverit, ideoque eas ipsas vires sustinebit, quas jam capite praecedente determinavimus. Praeterea vero ob vires centrifugas eas patietur vires, quas tertio genere hic sumus complexi, ita ut hoc problema non discrepet a problemate 17, nisi quod hic vires tertii generis sint super addendae.

## PROBLEMA. 24.

418. Si corpus rigidum, dum circa axem fixum gyrat, a viribus quibuscunque sollicitetur, definire vires, quas totius corporis compages sustinet.

## SOLUTIO.

Quaeritur ergo, a quibusnam viribus corpus, si esset in quiete, sollicitari deberet, ut ejus compages perinde afficeretur, atque in statu motus,

motus, quem hic consideramus. - Primum ergo corpori eadem vires sunt applicandae, quibus actu sollicitatur, atque adeo in iisdem punctis, quia hic cardo rei in locis, quibus quaeque vires sunt applicatae, versatur. Secundo singulis elementis corporis vires aequales et contrariae viribus elementaribus applicari debent. Scilicet si momentum omnium virium ad motum accelerandum fuerit  $= Vf$ , tum elemento  $dM$  ad distantiam  $= r$  ab axe remoto secundum directionem motui ejus

contrariam applicata concipiatur vis  $= \frac{VfrdM}{r^2dM}$ . Tertio si celeritas angularis sit  $= \omega$ , ob motum gyratorium elemento illi quoque applicata

concipiatur vis  $= \frac{\omega^2 r dM}{2g}$ , qua directe ab axe avellatur. Quarto

axi applicentur ipsae illae vires, quae ad ejus sustentationem requiruntur, et quae in problemate praecedente sunt assignatae. Cunctae jam istae vires corpori applicatae se mutuo in aequilibrio servabunt, et singulas ejus partes aequae sollicitabunt, ac sit in motu proposito. Hincque ergo concludi poterit, quam firmiter omnia corporis elementa inter se cohaerere debeant, ne ab illis viribus ulla dissolutio aut laxatio producat, sed corpus figuram suam intemeratam conservet.

#### COROLL. 1.

419. Si nexus partium debilior fuerit, quam ut actioni harum virium, quas modo definivimus, resistere valeat, quoniam figura corporis revera mutationem patietur, id ratione motus non pro rigido erit habendum.

#### COROLL. 2.

420. Assumimus ergo constanter omnes corporis particulas tam arcte inter se esse connexas, ut vires memoratas sine ulla relaxatione aut figurae mutatione sustinere valeant.

#### SCHOLION.

421. Haec igitur sunt capita praecipua, ad quae omnes quaestiones de motu gyratorio corporum rigidorum circa axem fixum a viribus quibuscunque perturbato reduci possunt: praeter ipsam enim motus accelerationem vel retardationem definivimus, quantas vires cum axis gyrationis tum ipsa corporis compages sustineat. Formulae autem, quas pro his determinationibus invenimus, quasdam involvunt formulas integrales, scilicet  $\int ydM$ ,  $\int zdM$ ,  $\int xydM$ ,  $\int xzdM$  et  $\int rrdM$ , quae

## 166 CAPUT IV. DE PERTURBATIONE MOTUS &c.

autem non tanquam quantitates variables seu indefinitas sunt spectandae; sed haec integralia per totum corporis molem extensa sunt intelligenda, ita ut obtineant valores constantes ac determinatos ab indole ac forma cujusque corporis pendentes. Ac binarum quidem priorum valores ex situ centri inertiae definiri vidimus: reliquarum vero valores ex natura corporis per notas integrationis regulas erui debent. Postrema autem imprimis est notatu digna, cum sola in accelerationem vel retardationem ingrediatur, dum reliquae tantum in expressionibus, quae vires ab axe sustentatas indicant, insunt. Cum igitur hic quaestio de ipsa motus perturbatione sit praecipua, operae pretium erit, valores formulae  $\int r r dM$  pro variis corporum generibus evolvere, ac praecepta tradere, unde illi quovis casu facilius colligi queant: meretur autem haec formulae, ut ei nomen singulare *momenti inertiae* imponamus, cujus investigationi caput sequens destinamus.

## CAPUT V. DE MOMENTO INERTIAE.

### DEFINITIO. 7.

422. **M**omentum inertiae corporis respectu cujuspiam axis est summa omnium productorum, quae oriuntur, si singula corporis elementa per quadrata distantiarum suarum ab axe multiplicentur.

### COROLL. 1.

423. Quoniam tam elementa corporis, quam quadrata distantiarum semper sunt positiva, omnia haec producta positiva sunt necesse est: hinc aucta corporis massa certe ejus momentum inertiae augetur.

### COROLL. 2.

424. Momentum ergo inertiae spectari potest tanquam productum ex massa corporis in quadratum cujuspiam lineae: ita si massa corporis fuerit  $= M$ , ejus momentum respectu cujusvis axis habebit hujusmodi formam  $Mk^2$ .

### COROLL. 3.

425. Invento ergo momento inertiae corporis respectu axis, circa quem id ante gyrari assumimus, idque fuerit  $= Mk^2$ , in formulis supra inventis

Inventis loco expressionis  $\int r r dM$  scribi conveniet  $Mk^2$ . Ita si momentum virium sollicitantium sit  $Vf$ , et celeritas angularis  $= u$ , erit

$$du = \frac{2Vfgdt}{Mkk}.$$

## EXPLICATIO.

426. Ratio hujus denominationis ex similitudine motus progressivi est desumpta: quemadmodum enim in motu progressivo, si a vi secundam suam directionem sollicitante acceleretur, est incrementum celeritatis ut vis sollicitans divisa per massam seu inertiam; ita in motu gyatorio, quoniam loco ipsius vis sollicitantis ejus momentum considerari oportet, eam expressionem  $\int r r dM$ , quae loco inertiae in calculum ingreditur, *momentum inertiae* appellemus, ut incrementum celeritatis angularis simili modo proportionale fiat momento vis sollicitantis diviso per momentum inertiae. Quae similitudo eo est perfectior, quod utrinque per elementum temporis  $dt$  et duplam lineam  $2g$  multiplicari oporteat, ut ipsum celeritatis incrementum exprimatur.

## SCHOLION.

427. Cum idem corpus ad infinitos axes referri possit, respectu cujuslibet peculiare habebit momentum inertiae, ex quo momentum inertiae absolute definiri nequit, nisi ad determinatum axem referatur. Interim tamen non semper opus est, si ejusdem corporis momentum inertiae successive respectu plurium axium investigari debeat, ut calculus de novo ex formula  $\int r r dM$  evolvatur: sed saepe evenit, ut cum momentum inertiae respectu unius axis invenerimus, ex eo facile momenta inertiae ejusdem corporis respectu infinitorum aliorum axium colligere queamus. Haec autem commoditas imprimis locum habet, quando axes fuerint paralleli, ita ut cognito momento inertiae pro uno axe, ex eo facile momentum inertiae pro quovis alio axe illi parallelo assignari possit, id quod sequente problemate ostendamus.

## PROBLEMA. 25.

428. Dato corporis cujusdam momento inertiae respectu axis  $OA$ , Fig. 46. invenire ejusdem corporis momentum inertiae respectu alius axis  $oa$  illi paralleli.

## SOLUTIO.

Sit  $Oo = c$  distantia horum axium, in quorum plano accipiat directrix  $OB$  ad  $OA$  normalis, et tertia  $OC$  ad utramque perpendicularis. Confide-



Consideretur corporis, cujus tota massa  $= M$ , elementum quodvis  $dM$  in  $Z$ , unde ad planum  $AOB$  demisso perpendiculari  $ZY$  et ex  $Y$  ducta ad  $OA$  normaliter  $YX$ , quae producta alteri axi  $oa$  occurrat in  $x$ : ponanturque pro axe dato  $OA$  coordinatae  $OX = x$ ,  $XY = y$  et  $YZ = z$ . Quoniam igitur respectu hujus axis  $OA$  momentum inertiae datur, sit id  $= Mkk$ , eritque  $\int (yy + zz) dM = Mkk$ . Iam pro novo axe  $oa$ , ob  $ox = x$ ,  $xy = c + y$  et  $YZ = z$ , erit momentum inertiae  $= \int ((c + y)^2 + zz) dM = \int cc dM + 2 \int cy dM + \int (yy + zz) dM$ . Cum igitur sit  $\int (yy + zz) dM = Mkk$ , et  $\int cc dM = Mcc$ , pro membro  $2 \int cy dM = 2 \int cy dM$  consideretur centrum inertiae corporis, quod sit in  $I$ , unde ad planum axinum demittatur perpendicularum  $IK$ , et ex  $K$  ad axes normalis  $KG$ , eritque  $\int ydM = M \cdot GK$ . Hinc erit momentum inertiae respectu axis  $oa = Mkk + Mcc + 2Mc \cdot GK$ , quod ob  $Gg = c$ , et  $cg + zc \cdot GK = gK^2 - GK^2$ , ita exprimetur, ut sit

$$Mkk + M \cdot gK^2 - M \cdot GK^2,$$

sicque cognito momento inertiae respectu axis  $OA$ , quod est  $= Mkk$ , facile invenitur momentum inertiae respectu alius cujusque axis  $oa$  illi paralleli.

#### COROLL. 1.

429. Si axis  $oa$  longius distat a centro inertiae  $I$ , quam axis  $OA$ , momentum inertiae respectu axis  $oa$  majus est, quam respectu axis  $OA$ . Est enim momentum inertiae respectu axis  $oa = Mkk + M \cdot gI^2 - M \cdot GI^2$ .

#### COROLL. 2.

430. Si igitur infiniti axes inter se paralleli concipiantur, momentum inertiae erit minimum respectu ejus axis, qui per ipsum centrum inertiae ducitur. Scilicet si centrum inertiae esset in  $G$ , axisque  $OA$  per id transiret, cujus respectu momentum inertiae fuerit  $= Mkk$ , erit respectu axis  $oa$  momentum inertiae  $= Mkk + M \cdot Gg^2$ .

#### COROLL. 3.

431. Si igitur detur momentum inertiae  $Mkk$  respectu cujuscumque axis per centrum inertiae corporis transeuntis, momentum inertiae respectu alius cujusvis axis illi paralleli superat illud producto ex massa in quadratum distantiae hujus axis a centro inertiae.

#### SCHOLIUM.

432. Hinc investigatio momentorum inertiae pro quovis corpore restringitur tantum ad axes per ejus centrum inertiae ductos, quorum respe-

respectu si explorata fuerint momenta inertiae, inde pro aliis quibuscunque axibus momenta inertiae facile colliguntur. Atque haec proprietas centri inertiae, quod momenta inertiae respectu axium per id transcurrentium sint minima, inter omnia respectu aliorum axium parallelorum sumata, omnino est memorabilis, cum etiam pro motu gyatorio insignem hujus centri praestantiam declaret. Verum per centrum inertiae innumerabiles axes ducere licet, quorum respectu momenta inertiae vehementer inter se discrepare possunt, neque patet, quomodo ex datis aliquibus reliqua definiri queant. Interim tamen, quoniam eorum nullum vel evanescere vel in infinitum excrecere potest, inter ea tam maximum detur quam minimum necesse est, quae investigatio omnino digna videtur, ut diligentius suscipiatur. Sed quo ea facilius succedat, conveniet in genere momentum inertiae respectu axis cujuscunque per centrum inertiae ducti calculo exprimi.

## P R O B L E M A. 26.

433. Si natura corporis exprimatur aequatione inter ternas coordinatas, invenire ejus momentum inertiae respectu axis cujuscunque per centrum inertiae ducti.

## S O L U T I O.

Sit I centrum inertiae corporis, in quo simul concursus ternarum directricium IA, IB, IC inter se normalium constituitur, quibus pro elemento corporis quocunque dM in Z sito coordinatae parallelae sint  $IX = x$ ,  $XY = y$ ,  $YZ = z$ , unde si qua directricium pro axe sumeretur, ejus respectu momentum inertiae facile assignaretur. Verum id definiendum sit respectu axis cujuscunque IG, per quem planum ad AIB normale ductum hoc secet in recta IF, ac ponatur angulus AIF =  $\eta$  et angulus FIG =  $\theta$ ; quaestio ergo huc redit, ut punctum Z per alias ternas coordinatas exprimatur, quarum una sit in ipso axe IG sumpta. Mutemus ternas directrices primo ita, ut una sit IF, manente IC, dum tertia ad has sit normalis, et ducta YX' ad IF normali erunt ternae coordinatae, quae sint  $x'$ ,  $y'$ ,  $z'$ .

$IX' = x' = x \cos \eta + y \sin \eta$ ;  $XY' = y' = y \cos \eta - x \sin \eta$ ; et  $YZ = z' = z$ . Simili modo hinc transitus fiat ad novas ternas coordinatas  $x''$ ,  $y''$ ,  $z''$ , quarum  $x''$  in axe IG capiatur eritque

$$x'' = x' \cos \theta + z' \sin \theta; \quad z'' = z' \cos \theta - x' \sin \theta; \quad y'' = y'$$

unde valoribus substitutis habebitur

Y

 $x'' =$

$$x' = x \cos \eta \cos \theta + y \sin \eta \cos \theta + z \sin \theta$$

$$y' = y \cos \eta - x \sin \eta; \text{ et } z' = z \cos \theta - x \cos \eta \sin \theta - y \sin \eta \sin \theta$$

Atque hinc puncti Z ab axe IG distantiae quadratum prodibit  $y'^2 + z'^2 =$

$$x^2 \sin^2 \eta + y^2 \cos^2 \eta + z^2 \cos^2 \theta - 2xy \sin \eta \cos \eta - 2xz \cos \eta \sin \theta \cos \theta - 2yz \sin \eta \sin \theta \cos \theta$$

$$+ x^2 \cos^2 \eta \sin^2 \theta + y^2 \sin^2 \eta \sin^2 \theta + 2xy \sin \eta \cos \eta \sin \theta$$

Ponamus jam sequentia integralia per totum corpus extensa:

$$\int x x dM = A; \int y y dM = B; \int z z dM = C$$

$$\int x y dM = D; \int x z dM = E; \int y z dM = F,$$

eritque momentum inertiae respectu axis IG quaesitum

$$A (\sin^2 \eta + \cos^2 \eta \sin^2 \theta) + B (\cos^2 \eta + \sin^2 \eta \sin^2 \theta) + C \cos^2 \theta - 2D \sin \eta \cos \eta \cos \theta - 2E \cos \eta \sin \theta \cos \theta - 2F \sin \eta \sin \theta \cos \theta.$$

#### COROLL. 1.

434. Hic quantitates A, B, C necessario sunt quantitates positivae, reliquae vero D, E, F pro ratione corporis vel positivae vel negativae esse possunt.

#### COROLL. 2.

435. Momentum inertiae respectu axis IA est  $= B + C$ ; respectu axis IB  $= A + C$ , et respectu axis IC  $= A + B$ : Cognitis ergo his tribus momentis innotescunt valores A, B, et C.

#### COROLL. 3.

436. Quomodocunque autem accipiantur anguli  $\eta$  et  $\theta$ , momentum inertiae inventum nunquam evanescere potest, sed semper valorem positivum obtinet.

#### SCHOLION.

437. Si non solum motum corporis circa axem IG, sed etiam vires ab axe sustentatas determinare velimus, praeter momentum inertiae respectu hujus axis quoque valores formularum integralium  $\int x' y' dM$  et  $\int x' z' dM$  nosse debemus. Fiunt autem istae formulae per coordinatas  $x, y, z$ ;

$$\int x' y' dM = \int dM (x \cos \eta \cos \theta + y \sin \eta \cos \theta + z \sin \theta) (y \cos \eta - x \sin \eta) \text{ et}$$

$$\int x' z' dM = \int dM (x \cos \eta \cos \theta + y \sin \eta \cos \theta + z \sin \theta) (-x \cos \eta \sin \theta - y \sin \eta \sin \theta + z \cos \theta)$$

Quare si hic valores supra assumpti substituantur, habebimus

$$\int x' y' dM$$

$$\int x''y''dM = -A\int \eta \cos \eta \cos \theta + B\int \eta \cos \eta \cos \theta + D(\cos \eta^2 - \int \eta^2) \cos \theta \\ - E\int \eta \sin \theta + F\cos \eta \sin \theta$$

$$\int x''z''dM = -A\cos \eta^2 \int \theta \cos \theta - B\int \eta^2 \int \theta \cos \theta + C\int \theta \cos \theta \\ - 2D\int \eta \cos \eta \sin \theta \cos \theta + E\cos \eta (\cos \theta^2 - \int \theta^2) + F\int \eta (\cos \theta^2 - \int \theta^2)$$

qui valores sunt eo magis notandi, quod casibus, quibus momentum inertiae fit maximum vel minimum, evanescent, uti mox videbimus.

## PROBLEMA. 27.

438. Inter omnes axes per centrum inertiae dati corporis ductos definire eum, cujus respectu momentum inertiae est vel maximum vel minimum.

## SOLUTIO.

Maneant omnia, uti in problemate praecedente, sitque IG axis talis quaesitus, ita ut determinari oporteat angulos AIF =  $\eta$  et FIG =  $\theta$ . Momentum ergo inertiae respectu hujus axis cum sit  $\int (x''y'' + x''z'')dM =$

$$A\int \eta^2 + A\cos \eta^2 \int \theta^2 + B\cos \eta^2 + B\int \eta^2 \int \theta^2 + C\cos \theta^2 \\ - 2D\int \eta \cos \eta \cos \theta^2 - 2E\cos \eta \sin \theta \cos \theta - 2F\int \eta \sin \theta \cos \theta$$

differentietur duplici modo, sumendo primum  $\eta$  deinde  $\theta$  variabile, et utrumque differentiale nihilo aequale ponatur. Ex priore igitur prodibit haec aequatio

$$2A\int \eta \cos \eta \cos \theta^2 - 2B\int \eta \cos \eta \cos \theta^2 + 2D\cos \eta^2 \cos \theta^2 + 2D\int \eta^2 \cos \theta^2 \\ + 2E\int \eta \sin \theta \cos \theta - 2F\cos \eta \sin \theta \cos \theta = 0$$

quae per  $-2\cos \theta$  divisa praebet

$$-(A-B)\int \eta \cos \eta \cos \theta + D(\cos \eta^2 - \int \eta^2) \cos \theta - E\int \eta \sin \theta + F\cos \eta \sin \theta = 0$$

five  $\int x''y''dM = 0$ ; unde colligitur

$$\frac{\int \eta \sin \theta}{\cos \theta} = \tan \theta = \frac{-(A-B)\int \eta \cos \eta + D(\cos \eta^2 - \int \eta^2)}{E\int \eta - F\cos \eta}$$

Sumendo autem  $\theta$  variabile pervenimus ad hanc aequationem;

$$2A\cos \eta^2 \int \theta \cos \theta + 2B\int \eta^2 \int \theta \cos \theta - 2C\int \theta \cos \theta + 4D\int \eta \cos \eta \sin \theta \cos \theta \\ - 2E\cos \eta (\cos \theta^2 - \int \theta^2) - 2F\int \eta (\cos \theta^2 - \int \theta^2) = 0$$

quae formula est  $= -2\int x''z''dM$ . Cum nunc sit

$$2\int \theta \cos \theta = \int \eta^2 \sin \theta \cos \theta \text{ et } \cos \theta^2 - \int \theta^2 = \cos^2 \theta \text{ erit}$$

$$A\cos \eta^2 \int \eta^2 \sin \theta + B\int \eta^2 \int \eta^2 \sin \theta - C\int \eta^2 \sin \theta + 2D\int \eta \cos \eta \sin \theta - 2E\cos \eta \cos^2 \theta \\ - F\int \eta \cos^2 \theta = 0$$

Y 2

unde

unde sequitur

$$\frac{f \sin 2\theta}{\cos 2\theta} = \tan 2\theta = \frac{2E \cos \eta + 2F \sin \eta}{A \cos^2 \eta + B \sin^2 \eta - C + 2D \sin \eta \cos \eta}$$

Verum ex superiori ob  $\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$  habetur:

$$\tan 2\theta = \frac{2(E \sin \eta - F \cos \eta) ((B-A) \sin \eta \cos \eta + D (\cos^2 \eta - \sin^2 \eta))}{(E \sin \eta - F \cos \eta)^2 - ((B-A) \sin \eta \cos \eta + D (\cos^2 \eta - \sin^2 \eta))^2}$$

quibus valoribus coaequatis erit

$$\begin{aligned} (E \cos \eta + F \sin \eta) (E \sin \eta - F \cos \eta)^2 &= (E \cos \eta + F \sin \eta) ((B-A) \sin \eta \cos \eta \\ &+ D (\cos^2 \eta - \sin^2 \eta))^2 \\ &+ (E \sin \eta - F \cos \eta) ((B-A) \sin \eta \cos \eta + D (\cos^2 \eta - \sin^2 \eta)) (A \cos^2 \eta + B \sin^2 \eta \\ &- C + 2D \sin \eta \cos \eta) \\ &= ((B-A) \sin \eta \cos \eta + D (\cos^2 \eta - \sin^2 \eta)) (E (B \sin \eta - C \cos \eta + D \cos \eta) \\ &- F (A \cos \eta - C \sin \eta + D \sin \eta)) \end{aligned}$$

Cum jam  $\sin \eta$  et  $\cos \eta$  ubique totidem compleant dimensiones, si ponamus

$$\frac{f \sin \eta}{\cos \eta} = \tan \eta = \varepsilon, \text{ obtinebimus hanc aequationem}$$

$$(E + F\varepsilon)(F - E\varepsilon)^2 = (D + (B-A)\varepsilon - D\varepsilon)(DE - AF + CF + (BE - CE - DF)\varepsilon)$$

quae in ordinem redacta dat

$$\begin{aligned} 0 &= EFF - DDE + (A-C)DF \\ &+ \varepsilon(F^2 - 2EEF + DDF + (A-2B+C)DE + (A-B)(A-C)F) \\ &+ \varepsilon^2(E^3 - 3EEF + DDE + (B-2A+C)DF + (A-B)(B-C)E) \\ &+ \varepsilon^3(EFF - DDF + (B-C)DE) \end{aligned}$$

ita ut ex hac aequatione cubica valor ipsius  $\varepsilon$  erui debeat.

### COROLL. 1.

439. Cum aequatio, ex qua valor ipsius  $\varepsilon$  inveniri debet, sit cubica, semper unam certe habet radicem realem, quae praebet tangentem anguli AIF =  $\eta$ , quo angulo invento alter FIG =  $\theta$  ita definitur ut sit

$$\tan \theta = \frac{(B-A) \sin \eta \cos \eta + D (\cos^2 \eta - \sin^2 \eta)}{E \sin \eta - F \cos \eta} = \frac{\frac{1}{2}(B-A) \sin 2\eta + D \cos 2\eta}{E \sin \eta - F \cos \eta}$$

### COROLL. 2.

440. Fieri autem potest, ut omnes tres radices sint reales, quo casu tres in corpore dabuntur axes, quorum respectu momenta inertiae sunt vel maxima vel minima.

SCHO-

## S C H O L I O N.

441. Ex rei autem natura intelligitur, in quovis corpore plus uno tali axe inesse, cujus respectu momentum inertiae sit vel maximum vel minimum; si enim unicus daretur, ejus respectu momentum esset omnium vel maximum vel minimum, utrovis ergo casu alius daretur axis necesse est, cujus respectu momentum inertiae foret vel minimum vel maximum. Atque hinc concludere licet, aequationem cubicam inventam non solum unam, sed duas habere radices reales, ex quo adeo omnes tres radices semper erunt reales, quod quidem difficulter ex ejus forma perspicere potest. Verum cognito jam nro tali axe haud difficulter reliqui ejusdem indolis reperiuntur, id quod sequente problemate ostendisse operae erit pretium.

## P R O B L E M A. 28.

442. Dato uno corporis axe per centrum inertiae transeunte, cujus respectu momentum inertiae est maximum vel minimum, invenire reliquos ejus axes per centrum inertiae ductos, quibus eadem proprietas conveniat.

## S O L U T I O.

Existente  $I$  centro inertiae corporis, sit  $IA$  axis ille datus, cujus respectu momentum inertiae est maximum vel minimum, atque ex praecedente problemate constat, hanc proprietatem locum habere non posse, nisi sit  $\int xy dM = 0$  et  $\int xz dM = 0$ ; quare pro formulis superioribus erit  $D = 0$  et  $E = 0$ . Quodsi jam  $IG$  alius fuerit ejusmodi axis, pro quo ponatur ut ante angulus  $AIF = \eta$  et  $FIG = \theta$ , ut sit ejus respectu momentum inertiae  $A (\int \eta^2 + \cos \eta^2 / \theta^2) + B (\cos \eta^2 + \int \eta^2 / \theta^2) + C \cos \theta^2 - 2F \sin \eta \cos \theta$ , methodus maximorum et minimorum has duas supplet aequationes:

$$I. (A - B) \sin \eta \cos \eta \cos \theta^2 - F \cos \eta \sin \theta \cos \theta = 0$$

$$II. (A \cos \eta^2 + B \sin \eta^2) / \theta \cos \theta - C / \theta \cos \theta - F \sin \eta (\cos \theta^2 - \sin \theta^2) = 0.$$

Quarum prior cum sit divisibilis per  $\cos \eta \cos \theta$ , erit vel  $\cos \eta = 0$  vel  $\cos \theta = 0$ ; tertia enim ejus radix  $\tan \theta = \frac{(A - B) \sin \eta}{F}$  in altera aequatione substituta nihil definit, quoniam angulus  $\eta$  prorsus ex calculo egreditur. Sit ergo  $\cos \eta = 0$ , ideoque  $\eta = AIF$  rectus, et  $\sin \eta = 1$ ;

atque altera aequatio praebet:

$$B / \theta \cos \theta - C / \theta \cos \theta - F (\cos \theta^2 - \sin \theta^2) = 0$$

Y 3

seu

seu  $\frac{1}{2}(B-C)/2\theta = F \cos 2\theta$  et  $\tan 2\theta = \frac{2F}{B-C}$  : unde pro angulo FIG duplex prodit valor, alter FIG =  $\theta$ , alter FIG =  $\theta + 90^\circ$ . Sicque ex uno axe IA dato, duo semper novi colliguntur, eadem maximi minimive proprietate gaudentes, qui ergo tres axes respondent tribus radicibus aequationis cubicae ante inventae. Prioris autem aequationis radix  $\cos \theta = 0$  nihil plane huc facit, cum enim angulus FIG esset rectus, utcumque angulus AIF =  $\eta$  variatur, recta IG eundem situm IC perpetuo servat, neque differentiatio hic locum habet, erit vero ob  $\eta = 90^\circ$  momentum inertiae respectu axis IG =  $A + B/\theta^2 + C\cos\theta^2 - 2F/\theta \cos\theta$ , at respectu axis dati IA =  $B + C$ .

## COROLL. 1.

443. Cum igitur sit angulus AIF =  $\eta$  rectus, ambo reliqui axes sunt ad IA normales, et quia illi etiam invicem angulum rectum constituunt, in omni corpore tres dantur axes per centrum inertiae I ducti et inter se normales, quorum respectu momenta inertiae sunt vel maxima vel minima.

## COROLL. 2.

444. Quodsi ergo ipsae rectae IA, IB et IC fuerint hi tres axes, quorum respectu momenta inertiae sunt vel maxima vel minima, erit  $\int xy dM = D = 0$ ;  $\int xz dM = E = 0$  et  $\int yz dM = F = 0$ .

## SCHOLION.

445. In his quidem problematibus sumimus, punctum I esse corporis centrum inertiae, quoniam calculum momenti inertiae tantum ad ejusmodi axes, qui per corporis centrum inertiae transeunt, adstrinximus: verum in toto calculo utriusque problematis nihil inest, quod naturam centri inertiae cum puncto I conjungat. Quare haec problemata multo latius patent, ita ut sumto quocunque puncto I inter omnes axes per id transeuntes semper tres definiri queant, quorum respectu momenta inertiae sint vel maxima vel minima, atque ut hi tres axes sint inter se normales. Verum hic tantum istam proprietatem tanquam centro inertiae convenientem considero, ac pro quolibet corpore plurimum intererit, hos ternos axes nosse, quoniam ex iis momenta inertiae respectu omnium axium facillime inveniri poterunt.

DEFINI.

## DEFINITIO. 8.

446. *Axes principales* cujusque corporis sunt tres illi axes per ejus centrum inertiae transeuntes, quorum respectu momenta inertiae sunt vel maxima vel minima.

## COROLL. 1.

447. Ex praecedentibus intelligitur, pro quolibet corpore non solum dari tales ternos axes principales, sed eos etiam inter se esse normales: unde ii commodissime pro ternis directricibus, ad quas corpus referatur, accipiuntur.

## COROLL. 2.

448. Quodsi ergo  $IA$ ,  $IB$ ,  $IC$  fuerint cujuspiam corporis axes principales, iisque pro elemento corporis  $dM$  in  $Z$  sito parallelae constituantur coordinatae  $IX = x$ ,  $XY = y$ ,  $YZ = z$ , non solum erit,  $\int x dM = 0$ ,  $\int y dM = 0$ ,  $\int z dM = 0$ ; sed etiam  $\int xy dM = 0$ ,  $\int xz dM = 0$ , et  $\int yz dM = 0$ . Fig. 47.

## COROLL. 3.

449. Tum vero si ponatur  $\int xxdM = A$ ;  $\int yydM = B$ ;  $\int zzdM = C$ , erit corporis momentum inertiae respectu axis  $IA = B + C$ ; respectu axis  $IB = A + C$ , et respectu axis  $IC = A + B$ , quae sunt maxima vel minima.

## SCHOLION.

450. Veritas utique est maximi momenti, quod in omni corpore tales tres axes principales dentur, cujus demonstratio ex praecedentibus utique est manifesta. Sunt enim ternis directricibus  $IA$ ,  $IB$ ,  $IC$  utcumque, quae in centro inertiae  $I$  se invicem normaliter interfecent, unum ejusmodi axem principalem  $IG$  definire docuimus ope resolutionis aequationis cubicae: tum vero cognito uno facili calculo duo reliqui assignantur. Iam vero vix occurret corpus tam irregulare, cujus non saltem unus axis principalis innotescat, ita ut deinceps bini reliqui facillime se prodant. Quare in postremum assumam, in quovis corpore hos ternos axes principales nobis esse cognitos; quorum respectu dummodo momenta inertiae, pro omnibus aliis axibus promptissime exhiberi possunt, uti ex sequente problemate patebit.

## EXPLI-



## EXPLICATIO.

451. Quomodo ratio maximi ac minimi his tribus axibus principalibus conveniat, haud ita facile perspicitur. Cum enim inter eos certe sit unus, cujus respectu momentum inertiae sit omnium maximum, itemque unus, cujus respectu momentum inertiae sit omnium minimum; necesse est, ut respectu tertii momentum inertiae sit neque omnium maximum neque omnium minimum, nisi forte cum alterutro illorum conveniat, quod aliquando fieri potest. Verum calculus maximorum et minimorum saepenumero ejusmodi quantitates indicit, quae absolute neque sint maxima neque minima; quoniam eo calculo plus non declaratur, quam si infinite parum ab loco invento recefferis, neque augmentum neque decrementum prodire. Ita si  $IA$  sit axis maximi absolute sumti, et  $IC$  axis minimi absolute sumti, respectu axis  $IB$  momentum inertiae neque omnium erit maximum neque minimum, verumtamen ejusmodi medium tenebit, ut si alius axis ab eo infinite parum distans in quamcunque plagam assumatur, ejus momentum inertiae neque crescat, neque decrescat. Atque hanc ob rem inter hos tres axes principales ingens discrimen intercedit, quod imprimis observari meretur, ut eorum unus habeat maximum momentum, unus minimum, tertius vero medium, quod tamen in calculo tanquam maximum vel minimum spectari possit, cujus rei ratio in sequenti problemate magis illustrabitur.

Fig. 47.

## PROBLEMA 29.

452. Datis cujusdam corporis momentis inertiae respectu trium axium principalium, invenire ejus momentum inertiae respectu cujusvis axis per ejus centrum inertiae ducti.

## SOLUTIO.

Fig. 47. Sint  $IA$ ,  $IB$ ,  $IC$  tres corporis axes principales, sibi mutuo in centro inertiae  $I$  normaliter occurrentes, et posita corporis massa  $= M$ , sit ejus momentum inertiae respectu axis  $IA = Ma_a$ , respectu axis  $IB = Mb_b$  et respectu axis  $IC = Mc_c$ : unde quaeri debeat momentum inertiae respectu axis cujuscunque  $IG$ , qui ad planum  $AIB$  inclinatur angulo  $GIF = \theta$ , sitque angulus  $AIF = \varphi$ . Consideretur nunc elementum corporis  $dM$  in  $Z$ , cujus puncti coordinatae sint  $IX = x$ ,  $XY = y$ , et  $YZ = z$ ; ac positis integralibus  $\int x^2 dM = A$ ,  $\int y^2 dM = B$ ,  $\int z^2 dM = C$ , erit  $\int xy dM = D = 0$ ,  $\int xz dM = E = 0$ ,  $\int yz dM = F = 0$ . Unde ex §. 433. erit momentum inertiae respectu axis  $IG =$

$$A (\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi \sin^2 \theta) + B (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi \sin^2 \theta) + C \cos^2 \theta.$$

Cum

Cum autem ex datis ternis momentis fit

$$Maa = B + C; Mbb = A + C; Mcc = A + B$$

hinc vicissim colligitur

$$A = \frac{1}{2} M(bb + c - aa); B = \frac{1}{2} M(aa + c - bb); C = \frac{1}{2} M(aa + bb - c)$$

quibus valoribus substitutis erit quaesitum momentum inertiae respectu axis IG =  $M(aa \cos \eta^2 \cos \theta^2 + bb \cos \eta^2 \cos \theta^2 + cc \cos \theta^2)$ . Ubi notetur, esse  $\cos \eta \cos \theta = \cos AIG$ ,  $\cos \eta \cos \theta = \cos BIG$  et  $\cos \theta = \cos CIG$ . Quare si distantiae axis IG a ternis axibus principalibus ponantur:

$$AIG = \alpha; BIG = \epsilon, CIG = \gamma$$

erit momentum inertiae respectu axis IG =

$$Maa \cos \alpha^2 + Mbb \cos \epsilon^2 + Mcc \cos \gamma^2$$

illi autem anguli  $\alpha, \epsilon, \gamma$  ita sunt comparati, ut sit semper  $\cos \alpha^2 + \cos \epsilon^2 + \cos \gamma^2 = 1$ .

#### COROLL. 1.

453. Posito momento inertiae respectu axis IG =  $Mkk$ , id sequentibus modis exprimi potest:

$$Mkk = Maa - M(aa - bb) \cos \epsilon^2 - M(aa - cc) \cos \gamma^2$$

$$Mkk = Mbb + M(aa - bb) \cos \alpha^2 - M(bb - cc) \cos \gamma^2$$

$$Mkk = Mcc + M(aa - cc) \cos \alpha^2 + M(bb - cc) \cos \epsilon^2$$

et in qualibet harum expressionum binos angulos pro lubitu assumere licet.

#### COROLL. 2.

454. Si fuerit  $aa > bb$  et  $bb > cc$ , momentum inertiae respectu axis IA omnium erit maximum, at respectu axis IC omnium erit minimum: medium autem tenebit momentum inertiae respectu axis IB.

#### COROLL. 3.

455. Si fuerit  $(aa - bb) \cos \alpha^2 > (bb - cc) \cos \gamma^2$ , momentum inertiae respectu axis IG majus est quam medium  $Mbb$ , contra vero est minus. Sin autem sit  $(aa - bb) \cos \alpha^2 = (bb - cc) \cos \gamma^2$ , quod infinitis locis fieri potest, ibi omnia momenta inertiae sunt inter se aequalia.

#### COROLL. 4.

456. Si fuerit  $aa = bb = cc$ , hoc est si momenta inertiae principalia fuerint inter se aequalia, respectu omnium axium per centrum inertiae ductorum momenta inertiae sunt inter se aequalia: ideoque quilibet axis pro principali haberi potest.

Z

SCHO.

## SCHOLION.

Fig. 48.

457. Eleganter haec more in trigonometria sphaerica recepto repraesentari possunt. Sint enim constituto centro inertiae I in centro sphaerae, puncta A, B, C extremitates axium principalium in superficie sphaerica terminatae, ita ut arcus AB, AC et BC sint quadrantes; axibusque in A, B, C terminatis respondeant momenta inertiae *Maa*, *Mbb*, *Mcc*, quorum primum sit maximum, secundum medium, et tertium minimum. Quodsi jam alius axis quicunque per centrum inertiae transiens, qui superficiem sphaericam in puncto S trajectat, consideretur, ejus respectu momentum inertiae erit:

$$Maa \cos AS^2 + Mbb \cos BS^2 + Mcc \cos CS^2$$

quod ob  $\cos AS^2 + \cos BS^2 + \cos CS^2 = 1$ , his modis exprimi potest:

$$Maa - M(aa - bb) \cos BS^2 - M(aa - cc) \cos CS^2 \text{ vel}$$

$$Mbb + M(aa - bb) \cos AS^2 - M(bb - cc) \cos CS^2 \text{ vel}$$

$$Mcc + M(aa - cc) \cos AS^2 + M(bb - cc) \cos BS^2.$$

Hinc si S sit in quadrante BC puta, in D, erit momentum inertiae respectu axis ID  $= M(bb \cos BD^2 + cc \cos CD^2) = Mbb - M(bb - cc) \cos CD^2 = Mcc + M(bb - cc) \cos BD^2$ ,

seu momentum inertiae respectu axis ID erit:

$$Mbb - M(bb - cc) \cos BD^2 = Mcc + M(bb - cc) \cos CD^2.$$

Simili modo momentum inertiae respectu axis IE est

$$Maa - M(aa - cc) \cos AE^2 = Mcc + M(aa - cc) \cos CE^2;$$

momentum autem inertiae respectu axis IF sit

$$Maa - M(aa - bb) \cos AF^2 = Mbb + M(aa - bb) \cos BF^2$$

## PROBLEMA. 30.

458. Invenire omnes axes per centrum inertiae ductos, quorum respectu momenta inertiae sint inter se aequalia.

## SOLUTIO.

Fig. 48.

Sint momenta inertiae respectu axium principalium IA, IB, IC respective *Maa*, *Mbb*, *Mcc* et  $aa > bb > cc$ : et quaerantur omnes axes per centrum inertiae I ducendi, quorum respectu momenta inertiae sint inter se aequalia, et quidem aequalia ei, quod respondet axi IE, sumto E in quadrante AC; quoniam ab A ad C omnia momenta hujus corporis a maximo ad minimum occurrunt. Sit IS talis axis, et habebimus hanc aequationem:

$$Maa - M(aa - cc) \cos AE^2 = Maa - M(aa - bb) \cos BS^2 - M(aa - cc) \cos CS^2.$$

seu

feu  $(aa - cc) f AE^2 = (aa - bb) \cos BS^2 + (aa - cc) \cos CS^2$

ergo ob  $\cos BS^2 = f AS^2 - \cos CS^2$  erit

$$(aa - cc) f AE^2 = (aa - bb) f AS^2 + (bb - cc) \cos CS^2.$$

Introducatur angulus CAS, et cum sit  $\cos CS = f AS \cos CAS$  erit

$$(aa - cc) f AE^2 = (aa - bb) f AS^2 + (bb - cc) f AS^2 \cos CAS^2$$

$$\text{ergo } f AS^2 = \frac{(aa - cc) f AE^2}{aa - bb + (bb - cc) \cos CAS^2}.$$

Sin autem augulum ACS introducamus, reperiemus

$$f CS^2 = \frac{(aa - cc) f CE^2}{bb - cc + (aa - bb) \cos ACS^2};$$

angulus CAS usque ad rectum augeri potest, dum  $(aa - cc) f AE^2$  non

excedat  $aa - bb$ , hoc est si fuerit  $f AE < r \frac{aa - bb}{aa - cc}$ ; at angulus ACS

usque ad rectum crescere potest, si sit  $f CE < r \frac{bb - cc}{aa - cc}$  seu  $f AE > r \frac{aa - bb}{aa - cc}$ .

Quare punctum S erit in curva, quae ex E affurgens per qua-

drantem AB transibit, si fuerit  $f AE < r \frac{aa - bb}{aa - cc}$ ; curva autem illa

per quadrantem BC transibit, si fuerit  $f AE > r \frac{aa - bb}{aa - cc}$ . Casu autem

quo  $f AE = r \frac{aa - bb}{aa - cc}$  curva per ipsum punctum B transibit, omnia-

que momenta inertiae erunt  $= Mbb$ . Hoc igitur casu erit  $f AS^2 =$

$$\frac{aa - bb}{aa - bb + (bb - cc) \cos CAS^2}.$$

Hinc ob  $\cos AE = r \frac{bb - cc}{aa - cc}$ , et  $\frac{aa - bb}{bb - cc} = \frac{f AE^2}{\cos AE^2}$ , fiet  $f$

$AS^2 = \frac{f AE^2}{f AE^2 + \cos AE^2 \cos CAS^2}$  ideoque  $\tan AS = \frac{\tan AE}{\cos CAS}$ : unde

intelligitur loca punctorum S sita esse in circulo maximo per puncta B et E tracto,

Fig. 49.

Casu quo  $f AE < r \frac{aa - bb}{aa - cc}$ , seu punctum E propius ad A su-

mitur, fit id in e, et in quadrante AB dabitur punctum f, in quo mo-

mentum sit aequè magnum. Erit ergo  $f Af^2 = \frac{(aa - cc) f Ae^2}{aa - bb}$ : unde

si ponatur  $Ae = e$ ;  $Af = f$ ;  $AS = s$  et angulus  $eAs = \Phi$ , ob  $\frac{aa - cc}{aa - bb}$

$= \frac{f f^2}{f e^2}$  et  $\frac{bb - cc}{aa - bb} = \frac{f f^2 - f e^2}{f e^2}$ , habebimus inter  $s$  et  $\Phi$  hanc aequa-

tionem;

tionem;

tionem:  $fs^2 = \frac{fe^2 f f^2}{fe^2 + (ff^2 - fe^2) \cos \varphi^2} = \frac{fe^2 f f^2}{fe^2 f \varphi^2 + f f^2 \cos \varphi^2}$ , qua  
 aequatione natura lineae  $esf$  exprimitur, estque  $\frac{fe}{ff} = f AE$ . Ca-  
 su denique quo  $f AE > r \frac{aa-bb}{aa-cc}$ , cadat punctum E in  $e'$ , da-  
 biturque in quadrante BC punctum  $d$ , ubi momentum est idem atque in  
 $e'$ , ut fit  $fCd^2 = \frac{(aa-cc)fCe'^2}{bb-cc}$ . Ponatur jam  $Ce' = e$ ;  $Cd = f$ ;  
 $Cs' = s$  et angulus  $e'Cs' = \varphi$ ; ob  $\frac{aa-cc}{bb-cc} = \frac{ff^2}{fe^2}$  et  $\frac{aa-bb}{bb-cc} =$   
 $\frac{ff^2 - fe^2}{fe^2}$  inter  $s$  et  $\varphi$  hæc prodit aequatio:  $fs^2 = \frac{fe^2 f f^2}{fe^2 + (ff^2 - fe^2) \cos \varphi^2}$   
 $= \frac{fe^2 f f^2}{fe^2 f \varphi^2 + f f^2 \cos \varphi^2}$ , qua natura lineae  $e's'd$  exprimitur, estque  
 $\frac{fe}{ff} = f CE$ .

## COROLL. 1.

459. Per totum ergo circulum maximum ex B per E ductum ut fit  
 $fAE = r \frac{aa-bb}{aa-cc}$ , momentum inertiae est  $Mbb$ . Et quia arcus  
 AE tam negative quam positive accipi potest, duo in sphaera dantur  
 circuli maximi eadem proprietate gaudentes.

## COROLL. 2.

460. Simili modo tam circa polum A, quam ipsi oppositum, erunt  
 in superficie sphaerae orbes elliptici, quorum semiaxis maior est arcus  
 Af et semiaxis minor arcus Ae, in quibus ubique idem regnabit mo-  
 mentum inertiae majus quam  $Mbb$ . In figura linea  $fse$  refert quadran-  
 tem horum orbium ellipticorum.

## COROLL. 3.

461. Lineae autem, in quibus momentum inertiae minus est quam  
 $Mbb$ , erunt bini orbes elliptici, quorum centra sunt in polo C eique  
 opposito, et semiaxis major arcus Cd, minor vero arcus Ce'. In fi-  
 gura linea  $d's'e'$  refert quadrantem horum orbium ellipticorum.

## SCHOLION. 1.

462. Et si hae lineae  $fse$ , et  $d's'e'$  in superficie sphaerae ductae,  
 non sunt in eodem plano, tamen eas orbium ellipticorum nomine in-  
 figure

signire lubet, quoniam earum projectiones in plana sphaeram in punctis A et C tangentes per rectas eo normales factae sunt ellipses, quarum centra sunt in punctis A et C. In projectione enim lineae *fse* in planum ad A tangens facta si ponatur  $\widehat{Af} = m$ ,  $\widehat{Ac} = n$ , ut sit  $\frac{mm}{nn} = \frac{aa - cc}{aa - bb}$ , et pro puncti *s* projectione abscissa in *m* sumta  $= x = \widehat{fs} \sin \Phi$ , et applicata eo normalis  $= y = \widehat{fs} \cos \Phi$ , habebitur inter *x* et *y* haec aequatio  $nnxx + mmyy = mnnn$ , quae est pro ellipsi centrum in A habente, cujus semiaxes sunt *m* et *n*. Parique modo projectio lineae *ds'e'* in planum ad C tangens facta reperiatur esse ellipsis. Si fuerit  $Mbb = Mcc$ , quo casu punctum E in C cadit, fitque  $Ac = Af$  et  $m = n$ , ellipsis illa abit in circulum, eritque linea *fse* circulus minor circa polum A descriptus.

## SCHOLION. 2.

463. Investigationem ergo momenti inertiae eo redaximus, ut pro quolibet corpore proposita sufficiat terna momenta inertiae definiisse, quae scilicet sumta sint respectu ternorum ejus axium principalium. His enim cognitis facile momentum inertiae ejusdem corporis respectu aliuscujuscunque axis per ejus centrum inertiae transeuntis, atque hinc porro respectu aliorum omnium illi parallelorum assignari potest. Hocque modo inventio momentorum inertiae, quae initio pro quovis corpore quasi infinita videbatur, mirifice in compendium est redacta. Praeterea vero notari meretur, in hoc negotio aliud insigne subsidium, cujus ope momentum inertiae alicujus corporis facile colligi potest ex momentis ejus partium, id quod sequente problemate explicemus.

## PROBLEMA. 31.

464. Datis momentis inertiae duarum partium respectu axium inter se parallelorum, et per cujusque centrum inertiae transeuntium, invenire momentum inertiae totius corporis respectu axis illis paralleli et per hujus centrum inertiae transeuntis.

## SOLUTIO.

Sit ergo corpus compositum ex duabus partibus, quarum alterius massa sit  $= M$  habens suum centrum inertiae in M; alterius vero massa sit  $= N$  ejusque centrum inertiae in N, ponaturque intervallum

Z 3

MN = c.

Fig. 50.

$MN = c$ . Data jam sint momenta inertiae prioris partis  $M$  respectu axis  $mm$ , quod sit  $Mmm$ , et posterioris partis  $N$  respectu axis  $nn$ , quod sit  $Nnn$ ; sintque hi axes  $mm$  et  $nn$ , qui per utriusque partis centrum inertiae transeant, inter se paralleli: unde totius corporis momentum inertiae respectu axis  $ii$  illis paralleli et per suum centrum inertiae  $I$  transeuntis determinari debet. Totius autem corporis massa est  $= M + N$ , ejusque centrum inertiae in rectae  $MN$  puncto  $I$  reperitur, ut sit  $IM = \frac{Nc}{M+N}$  et  $IN = \frac{Mc}{M+N}$ . Cum igitur hi tres axes in eodem plano sint siti, ponatur eorum inclinatio ad rectam  $MN$  seu angulus  $NIs = \delta$  eritque distantia axium  $mm$  et  $ii = \frac{Ncf\delta}{M+N}$ , unde partis  $M$  momentum inertiae respectu axis  $ii$  erit  $= Mmm + \frac{MNNccf\delta^2}{(M+N)^2}$ .

Tum vero ob distantiam axium  $nn$  et  $ii = \frac{Mc f \delta}{M+N}$  prodit partis  $N$  momentum inertiae respectu axis  $ii = Nnn + \frac{NMNccf\delta^2}{(M+N)^2}$ . Quare totius corporis momentum inertiae respectu axis  $ii$  habebitur  $= Mmm + Nnn + \frac{MNccf\delta^2}{M+N}$ .

## COROLL. 1.

465. Momentum ergo totius corporis majus est quam momenta partium simul sumta, respectu axium inter se parallelorum et per cuiusque centrum inertiae traductorum: atque excessus  $\frac{MNccf\delta^2}{M+N}$  proportionalis est quadrato distantiae axium.

## COROLL. 2.

466. Si massa totius corporis ponatur  $= I = M + N$ , ejusque momentum inertiae respectu axis  $ii = Iii$  erit

$$Iii = Mmm + Nnn + \frac{MNccf\delta^2}{I}.$$

Tum vero positis distantii  $IM = a$ , et  $IN = b$ , erit  $a = \frac{Nc}{I}$  et  $b = \frac{Mc}{I}$ : unde fit  $Iii = Mmm + Nnn + Iab\sin\delta^2$ .

CO.

## COROLL. 3.

467. Hinc dato momento totius corporis  $I_{ii}$  una cum momento alterius partis  $M_{mm}$ , facile quoque colligitur momentum alterius partis  $N_{nn} = I_{ii} - M_{mm} - I_{abfi} d^2$  sumtis scilicet axibus inter se parallelis, et per cuiusque centrum inertiae transeuntibus.

## COROLL. 4.

468. Si corpus constet pluribus partibus, quarum singularum momenta inertiae respectu axium inter se parallelorum et per cuiusque centrum inertiae transeuntium sint explorata; hinc binis coniungendis tandem momentum inertiae totius corporis respectu axis illis paralleli et per suum centrum inertiae transeuntis colligetur.

## SCHOLION. 1.

469. Hoc casu plurium partium non opus est secundum problema bina coniungere, sed statim momentum totius corporis colligi potest. Sint enim  $M_{mm}$ ,  $N_{nn}$ ,  $P_{pp}$ ,  $Q_{qq}$  momenta partium, respectu axium inter se parallelorum et per cuiusque centra inertiae transeuntium: pro toto autem corpore concipiatur axis illis parallelus per ejus centrum inertiae transiens, a quo axes partium  $M$ ,  $N$ ,  $P$ ,  $Q$  distent intervallis  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ,  $d$ : quibus cognitis erit momentum inertiae totius corporis  $= M(mm + aa) + N(nn + bb) + P(pp + cc) + Q(qq + dd)$ . Hoc igitur modo saepe corporum admodum irregularium momenta inertiae facile colligi poterunt, dummodo ex ejusmodi partibus fuerint composita, quarum momenta inertiae assignare liceat, quo pacto calculus momentorum inertiae non mediocriter adjuvatur.

## SCHOLION. 2.

470. Verum non sufficit methodum tradidisse omnium corporum momenta inertiae inveniendi; necesse est etiam ea pro praecipuis corporum generibus evolvere, ut quoties usus postulat, inde desumi queant. Ne autem opus sit infinitum, hanc investigationem ad corpora homogenea, quae per totam extensionem similari consistunt materia, restringamus, ita ut calculus quasi ad corpora geometrica tantum sit accommodandus, ubi quidem figuras solum principales sum consideraturus. Ac primo, quoniam fila tenuissima et laminas tenuissimas tanquam lineas et superficies considerare licet, ab iis initium ducamus, inde ad varias



varias species solidorum, cujusmodi prae ceteris occurrere solent, progressuri. In singulis autem his corporibus ternos axes principales eorumque respectu momenta inertiae definiamus, quandoquidem ex his momenta respectu omnium axium facili negotio colligi possunt. Hinc etiam simul patebit, quomodo calculum ad omnia alia corporum genera quam commodissime accommodari conveniat.

## CAPUT VI.

### INVESTIGATIO MOMENTI INERTIAE IN CORPORIBUS HOMOGENEIS.

#### P R O B L E M A. 32.

Fig. 54. 471. Si corpus fuerit filum tenuissimum rectum AIB, invenire ejus axes principales, eorumque respectu momenta inertiae.

#### S O L U T I O.

Sit tota fili longitudo  $AB = 2a$ , in cujus medio puncto I erit ejus centrum inertiae, ut sit  $IA = IB = a$ : massa autem fili, quae geometricè per  $2a$  exprimitur sit  $= M$ . Iam unus axium principalium certo est ipsa linea AB, cujus respectu momentum inertiae est nullum, ideoque minimum: bini reliqui sunt ad AB in I normales, eorumque respectu momenta inertiae aequalia, ita ut eorum situs non determinetur. Ad momentum ergo inertiae respectu talis axis ad AB in I normalis inveniendum, sumto  $IP = IQ = x$ , elementorum  $Pp = Qq = dx$  momenta sunt  $xxdx$ , sicque amborum conjunctim  $= 2xxdx$ , cujus integrale  $\frac{2}{3}x^3$  posito  $x = a$ , dat momentum inertiae fili respectu axium ad filum in I normalium  $= \frac{2}{3}a^3 = \frac{1}{3}Ma^2$  ob  $M = 2a$ .

#### C O R O L L. 1.

472. Bini ergo reliqui axes principales praeter AIB non determinantur, perindeque est, quatenam ducæ rectae tam inter se quam ad filum in I normales pro iis accipiantur. Eorumque respectu momentum inertiae  $\frac{1}{3}Ma^2$  est maximum, ita ut medium cum maximo congruat.

#### C O R O L L. 2.

473. Cum momentum inertiae respectu axis AB sit nihilo aequale, respectu alius cujuscunque axis S I, ad AB angulo AIS  $= \theta$  inclinatio erit

# CAPUT VI. INVESTIGATIO MOMENTI &c. 185

erit  $= \frac{1}{2} Maa \sin^2 \theta$ , quod ex superioribus evidens est, si binorum reliquorum axium principalium alter in plano AIS capiatur: tum enim axis  $Ss$  ad eum inclinatur angulo  $90^\circ - \theta$ , ad alterum vero angulo recto.

## PROBLEMA. 33.

474. Si corpus fuerit filum tenuissimum in peripheriam circuli AEBF incurvatum, invenire ejus axes principales eorumque respectu momenta inertiae. Fig. 52.

## SOLUTIO.

Sit radius circuli  $IA' = a$ , et posita ratione diametri ad peripheriam  $= 1 : \pi$ , erit longitudo fili  $= 2\pi a$ , quae simul ejus massam refert, quae sit  $= M$ . Cum centrum inertiae sit in circuli centro  $I$ , primo recta ad planum circuli in  $I$  perpendicularis erit unus axis principalis, cujus respectu erit momentum inertiae  $= Maa$ , duo reliqui axes in plano circuli sunt siti, pro quibus binos diametros quoscunque inter se normales assumere licet  $AB$  et  $EF$ . Sumta jam abscissa  $IP = x$ , et applicata  $PM = y = \sqrt{aa - xx}$ , ob elementum fili  $Mm = \frac{a dx}{y}$ , erit ejus momentum respectu axis  $AB = ay dx$ , ideoque momentum totum  $= a \int y dx = a \times \text{Aream circuli} = \pi a^3$ , quod ob  $M = 2\pi a$  erit  $= \frac{1}{2} Maa$ . Quare momentum respectu diametri cujusvis est  $= \frac{1}{2} Maa$ .

## COROLL. 1.

475. Momentum ergo inertiae respectu axis principalis ad planum circuli normalis,  $Maa$  est maximum, et momentum medium cum minimo congruit, estque utrumque semissis maximi.

## COROLL. 2.

476. Si alius axis quicunque concipiatur ad planum circuli in  $I$  inclinatus angulo  $= \eta$ , quia is ad axem primum inclinatur angulo  $90^\circ - \eta$ , ad reliquorum alterum angulo  $\eta$  et ad tertium angulo recto, erit ejus respectu momentum inertiae  $= Maa \sin^2 \eta + \frac{1}{2} Maa \cos^2 \eta = \frac{1}{2} Maa (1 + \sin^2 \eta)$ .

## PROBLEMA. 34.

477. Si corpus fuerit lamina tenuissima plana triangularis ABD, invenire ejus tres axes principales, eorumque respectu momenta inertiae. Fig. 53.

Aa

SO

SOLUTIO.

Ut centrum inertiae I obtineatur, ex angulo A ducatur recta AC  
latus oppositum BD bisecans, sumtaque CI parte tertia totius AC erit  
centrum inertiae in I. Ponamus  $CI = a$ ,  $CB = CD = c$ , et angulum  
 $ACB = \zeta$ , ut sit  $AI = 2a$ ,  $AC = 3a$  et  $BD = 2c$ . Iam perspicuum  
est, unum axem principalem fore ad planum trianguli normalem in I,  
quoniam si in hac recta coordinatam  $x$  sumeremus, foret  $\int xy dM = 0$   
et  $\int xz dM = 0$ , ob  $x = 0$ . Quare secundum probl. 28. praeter istum  
axem sumantur in plano trianguli binæ reliquæ directrices, quarum al-  
tera sit IA: et sumto elemento quocumque  $dM$  in Z, indeque ad IA  
dēmissio perpendiculo ZY, sit  $IY = y$  et  $YZ = z$ , vocenturque inte-  
gralia  $\int xxdM = A = 0$ ;  $\int yydM = B$ ,  $\int xzdM = C$ ; tum  $\int yzdM = F$ ;  
unde si IF et IG sint bini reliqui axes principales, ponaturque angulus  
 $AIF = \theta$ , demonstravimus fore  $\tan 2\theta = \frac{2F}{B-C}$ , et respectu axis IF  
momentum inertiae  $= A + B \sin^2 \theta + C \cos^2 \theta - 2F \sin \theta \cos \theta$ , ubi  $\theta$  de-  
notat tam angulum AIF quam AIG. Tum vero respectu primi axis  
ad planum trianguli normalis est momentum inertiae  $= B + C$ . Ad  
hos valores inveniendos per Z ducatur lateri BD parallela MN, positis-  
que  $AP = t$  et  $PZ = u$ , erit  $PM = PN = \frac{ct}{3a}$ ,  $YZ = u \sin \zeta$  et  $PY =$   
 $u \cos \zeta$ , atque elementum in Z  $= dt du \sin \zeta = dM$ . Hinc igitur erit  
 $y = 2a - t + u \cos \zeta$  et  $z = u \sin \zeta$ ; concipiatur aliud aequale elemen-  
tum  $dt du \sin \zeta$  ad alteram partem pro quo sit  $u$  negativum, hisque jun-  
ctum consideratis fiet

$$B = 2 \int dt \int \zeta du ((2a-t)^2 + uu \cos^2 \zeta); C = 2 \int dt \int \zeta u u du \sin^2 \zeta$$

$$\text{et } F = \int dt \int \zeta (u du \sin \zeta (2a-t + u \cos \zeta) - u du \sin \zeta (2a-t - u \cos \zeta))$$

$$\text{seu } F = 2 \int dt \sin \zeta \int u du \cos \zeta.$$

Prima integratione peracta poni debet  $u = \frac{ct}{3a}$ , unde fit

$$B = 2 \sin \zeta \int dt \left( \frac{c^2 t^3}{3a^3} (2a-t)^2 + \frac{c^3 t^3}{81a^3} \cos^2 \zeta \right); C = 2 \sin \zeta \int dt. \frac{c^3 t^3 \sin^2 \zeta}{81a^3}$$

$$\text{et } F = 2 \sin \zeta \cos \zeta \int dt. \frac{c^3 t^3}{81a^3}, \text{ ideoque}$$

$$B = 2 \sin \zeta \left( \frac{2ac^3}{3} - \frac{4c^3 t^3}{9} + \frac{c^3 t^4}{32a} + \frac{c^3 t^4}{324a^3} \cos^2 \zeta \right)$$

$$C = 2 \sin \zeta. \frac{c^3 t^4 \sin^2 \zeta}{324a^3} \text{ et } F = \frac{c^3 t^4 \sin \zeta \cos \zeta}{162a^3}$$

quibus

# INERTIAE IN CORPORIBUS HOMOGENEIS. 187

quibus valoribus per totum triangulum, ponendo  $z = 3a$ , extensis habebimus:

$$B = \frac{1}{2} ac \zeta (3aa + cc \cos^2 \zeta); C = \frac{1}{2} ac^3 \zeta^3; F = \frac{1}{2} ac^3 \zeta^2 \cos \zeta$$

Ex his pro situ axium IF et IG fiet

$$\tan 2\theta = \frac{2ac^3 \zeta^2 \cos \zeta}{ac \zeta (3aa + cc \cos^2 \zeta)} = \frac{cc \zeta^2}{3aa + cc \cos^2 \zeta}$$

hinc enim duo valores pro  $\theta$  eliciuntur. Denique momentum inertiae respectu axis principalis ad planum trianguli normalis est  $= \frac{1}{2} ac \zeta (3aa + cc) = \frac{1}{2} M (3aa + cc)$  ob  $M = 3ac \zeta$ ; et respectu axis IF vel IG, prout  $\theta$  angulum AIF vel AIG denotat, est momentum inertiae

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} M (3aa + cc \cos^2 \zeta) \sin^2 \theta + \frac{1}{2} Mcc \zeta^2 \cos^2 \theta - \frac{1}{2} Mcc \zeta \cos \zeta \sin \theta \cos \theta \\ & = \frac{1}{2} Maa \sin^2 \theta + \frac{1}{2} Mcc (\cos^2 \zeta \sin^2 \theta - \zeta \cos \theta)^2 = \frac{1}{2} Maa \sin^2 \theta \\ & \quad + \frac{1}{2} Mcc \zeta (\zeta - \theta)^2. \end{aligned}$$

## COROLL. 1.

478. Cum sit  $AB^2 + AD^2 = 18aa + 2cc$ , erit  $3aa = \frac{AB^2 + AD^2 - 2cc}{6}$

hincque momentum inertiae respectu axis ad planum trianguli in I normalis fiet  $= \frac{1}{2} M (AB^2 + AD^2 + BD^2)$ , ita ut sit pars tricesima sexta massae per summam quadratorum laterum multiplicatae.

## COROLL. 2.

479. Pro binis reliquis axibus principalibus in plano trianguli sitis IF et IG, notetur  $\zeta$  esse angulum recto non majorem, unde  $\theta$  erit positivus. Posito ergo angulo AIF  $= \theta$  erit  $\tan \theta =$

$$\frac{-3aa - cc \cos^2 \zeta + \sqrt{(9aa + 6aac \cos^2 \zeta + c^4)}}{cc \zeta^2} = \tan AIF; \text{ at } \tan AIG = \frac{-3aa - cc \cos^2 \zeta - \sqrt{(9aa + 6aac \cos^2 \zeta + c^4)}}{cc \zeta^2}$$

## COROLL. 3.

480. Momentum inertiae respectu horum axium est  $= \frac{1}{2} M (\frac{1}{2} 3aa - \frac{1}{2} aa \cos^2 \theta + \frac{1}{2} cc - \frac{1}{2} cc \cos^2 (\zeta - \theta))$ , cum igitur sit  $\tan 2(\zeta - \theta) =$

$$\frac{3aa \zeta^2}{3aa \cos^2 \zeta + cc}, \text{ hoc utrumque momentum ita exprimitur:}$$

$$Aa^2$$

$$\frac{1}{2} M$$

$$\frac{1}{12} M (3aa + cc \pm r (9a^4 + 6aacc \cos 2\zeta + c^4)) = \frac{1}{12} Mcc$$

$$(1 - \cos 2\zeta - \frac{1}{2}\zeta \tan \theta) \Rightarrow \frac{Mcc \zeta r (\zeta - \theta)}{6 \cos \theta}$$

prout enim pro  $\theta$ , angulus AIF vel AIG assumitur, ita ad utrumque axem referetur.

## EXEMPLUM.

481. Sit triangulum ABD isosceles seu angulus  $\zeta$  rectus, hincque ob  $\tan 2\theta = 0$ , erit vel  $\theta = 0$  vel  $\theta = 90^\circ$ , unde alter axis in ipsam rectam AC incidit, alter vero ad eum est normalis. Respectu prioris AC momentum inertiae erit  $= \frac{1}{12} Mcc$ , respectu posterioris vero  $= \frac{1}{12} Maa$ : dum respectu primi, qui ad planum trianguli est normalis, erat  $= \frac{1}{12} Maa + \frac{1}{12} Mcc$  ita, ut hoc sit aequale summae binorum reliquorum. Si praeterea triangulum sit aequilaterum, cujus singula latera  $= 2c$ ; erit  $3a = 6r/3$  seu  $aa = \frac{cc}{3}$ , quare omnes axes in plano trianguli per I ducti aequalia praebent momenta inertiae  $= \frac{1}{12} Mcc$  et momentum respectu axis ad triangulum in I normalis erit duplo majus  $= \frac{1}{6} Mcc$ .

## COROLL. 4.

482. Haec postrema proprietas adeo in genere valet: cum enim sit momentum inertiae respectu axis ad planum trianguli normalis  $= \frac{1}{12} M (3aa + cc)$ , tum vero respectu axis IF  $= \frac{1}{12} M (3aa + cc - r (9a^4 + 6aacc \cos 2\zeta + c^4))$  respectu axis IG  $= \frac{1}{12} M (3aa + cc + r (9a^4 + 6aacc \cos 2\zeta + c^4))$ , evidens est, horum summam priori esse aequalem.

## SCHOLION.

483. Notari hic meretur, si reliqua trianguli latera ponantur AB  $= ab$ , AD  $= zd$ , uti est BD  $= 2c$ , fore  $9aa = 2bb + 2dd - cc$ , et  $\cos \zeta = \frac{dd - bb}{3ac}$ , unde formula irrationalis  $r (9a^4 + 6aacc \cos 2\zeta + c^4)$  abit in hanc

$$\frac{4}{3} r (b^4 + c^4 + d^4 - bbcc - bbdd - ccdd).$$

Ceterum hic in genere definire non licet, uter axium IF et IG majus praebet momentum, cum haec ipsa formula irrationalis quandoque negativum valorem induere debeat, quemadmodum patet ex casu  $\zeta = 90^\circ$ , ubi valor ejus  $3aa - cc$  fit negativus, si  $cc > 3aa$ . In genere autem

tem haec duo momenta inter se aequalia fieri nequeunt, quia formula irrationalis evanescere non potest, nisi sit  $2\zeta = 180^\circ$  et  $3aa = cc$ . At iudicium hoc quovis casu, adhibitis angulis  $\theta$  utrique axi convenientibus, facile instituetur ex formula  $\frac{1}{2} Maa/\theta^2 + \frac{1}{2} Mcc/\zeta(\zeta - \theta)^2$ .

### PROBLEMA. 35.

484. Si corpus fuerit lamina tenuissima plana figuram parallelogrammi  $BDbd$  habens, invenire ejus tres axes principales, eorumque respectu momenta inertiae, Fig. 54.

### SOLUTIO.

Bisectis lateribus binis oppositis  $BD$  et  $bd$  in  $A$  et  $C$ , ductaque recta  $AC$  in ejus puncto medio  $I$  erit centrum inertiae corporis, cujus massa ponatur  $= M$ . Ponantur latera  $Bb = Dd = AC = 2a$ ,  $BD = bd = 2b$ , et angulus acutus  $B = d = \zeta$ , erit area  $= 4ab \sin \zeta = M$ . Iam unus axium principalium erit ad planum laminae in  $I$  normalis, binique reliqui  $IF$  et  $IG$  in ipso hoc plano siti: ad quos inveniendos concipiatur elementum quodcumque  $dM$  in  $Z$ , per quod punctum primo ducatur recta  $MN$  laterali  $BD$  parallela, sitque  $AP = t$  et  $PZ = u$ ; tum ex  $Z$  ad  $AC$  demisso perpendicularo  $ZY$  vocetur secundum probl. 28.  $IY = y$  et  $YZ = z$ . Ob  $APZ = \zeta$  erit  $ZY = u \sin \zeta$  et  $PY = u \cos \zeta$ , unde  $y = a - t + u \cos \zeta$  et  $z = u \sin \zeta$ ; tum vero  $dM = ds du \sin \zeta$ : at in illo calculo fit  $x = 0$ , ut sit  $\int xxdM = 0$ ,  $\int xydM = 0$ ,  $\int xzdM = 0$ . Hinc ergo habemus:  $\int yydM = B = \int ds \int du \int \zeta (a - t + u \cos \zeta)^2$ ,  $\int xzdM = C = \int ds \int u du \sin \zeta$  et  $\int yzdM = F = \int ds \int u du \sin \zeta^2 (a - t + u \cos \zeta)$ . Combinetur cum his elementum simile  $Z'$  ad alteram partem situm, pro quo est  $u$  negativum, fietque:

$$B = 2 \int \zeta \int ds \int du ((a - t)^2 + uu \cos^2 \zeta); \quad C = 2 \int \zeta^3 \int ds \int u du$$

$$\text{et } F = 2 \int \zeta^2 \cos \zeta \int ds \int u du.$$

Priori integratione instituta ponatur  $u = b$ , prodibitque

$B = 2 \int \zeta \int ds (b(a - t)^2 + \frac{1}{3} b^3 \cos^2 \zeta); \quad C = \frac{2}{3} b^3 \int \zeta^3 \int ds$   
 et  $F = \frac{2}{3} b^3 \int \zeta^2 \cos \zeta \int ds$ . Denique posteriori integratione facta ponatur  $t = 2a$ , fietque  $B = \frac{1}{3} ab \int \zeta (aa + bb \cos^2 \zeta) = \frac{1}{3} M (aa + bb \cos^2 \zeta)$ ;  
 $C = \frac{1}{3} ab^3 \int \zeta^3 = \frac{1}{3} Mbb \int \zeta^2$  et  $F = \frac{1}{3} ab^3 \int \zeta^2 \cos \zeta = \frac{1}{3} Mbb \int \zeta \cos \zeta$ .  
 Ex his colligitur momentum inertiae respectu primi axis ad laminam in  $I$  normalis  $B + C = \frac{1}{3} M (aa + bb)$ : quod ergo non ab obliquitate, sed tantum a lateribus pendet. At pro reliquis axibus  $IF$  et  $IG$  posito an-

Angulo

gulo AIF =  $\theta$  invenimus  $\tan 2\theta = \frac{2F}{B-C} = \frac{2bbf\zeta \cos \zeta}{aa+bb \cos 2\zeta}$  seu  $\tan \theta =$

$\frac{bbf\zeta}{aa+bb \cos 2\zeta}$ , cujus duplex valor  $\theta$  praebet utrumque angulum AIF

et AIG. Momentum autem inertiae respectu horum axium est  $B/\theta^2 + C \cos \theta^2 - 2F \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{2} M (aa \sin^2 \theta + bb \cos^2 \zeta^2 / \theta^2 + bb \sin^2 \cos \theta^2 - 2bbf\zeta \cos \zeta / \theta \cos \theta) =$

$$\frac{1}{2} M (aa - aa \cos 2\theta + bb - bb \cos 2\zeta \cos 2\theta - bb f \zeta / 2\theta)$$

sicque hoc momentum inertiae ita exprimi poterit

$$\frac{1}{2} M (aa + bb - aa \cos 2\theta - bb \cos (2\zeta - 2\theta)).$$

Cum igitur sit

$$\sin 2\theta = \frac{bbf\zeta}{r(a^4 + 2aabb \cos 2\zeta + b^4)} \text{ et } \cos 2\theta = \frac{aa + bb \cos 2\zeta}{r(a^4 + 2aabb \cos 2\zeta + b^4)}$$

istud momentum erit:

$$\frac{1}{2} M (aa + bb - r(a^4 + 2aabb \cos 2\zeta + b^4))$$

ubi ambiguitas signi radicalis et ambos axes IF et IG et momenta inertiae eorum respectu praebet. Patet ergo summam horum binorum aequalem esse momento primo.

#### COROLL. 1.

485. Si  $aa + bb \cos 2\zeta$  habeat valorem positivum, sumto radicali positivo, angulus  $2\theta$  recto erit minor, ideoque angulus AIF semirecto minor; ac respectu axis IF momentum inertiae erit minimum =  $\frac{1}{2} M (aa + bb - r(a^4 + 2aabb \cos 2\zeta + b^4))$ ; respectu axis IG vero medium.

#### COROLL. 2.

486. Si  $aa + bb \cos 2\zeta$  habeat valorem negativum, et radicale pro axe IF capiatur positive, angulus  $2\theta$  erit recto major, ideoque angulus AIF semirecto major; atque axis IF respectu momentum inertiae erit minimum.

#### COROLL. 3.

487. Si ducatur diagonalis Bd per angulos acutos B et d, ab tang. AIB =  $\frac{bf\zeta}{a+b \cos \zeta}$  reperitur  $\tan 2BIF = \frac{2abf\zeta(aa-bb)}{a^4 + 2a^3b \cos \zeta + 2aabb \cos 2\zeta + 2ab^3 \cos \zeta + b^4}$  unde

unde patet, in rhomboidi  $a = b$ , ambas diagonales fore axes principales: dum in rectangulo recta AC est axis principalis.

EXEMPLUM. 1.

488. Si parallelogrammum  $Bb dD$  sit rectangulum, ob  $\zeta 90^\circ$  fit  $\text{tang } 2\theta = 0$ , ideoque vel  $\theta = 0$  vel  $\theta = 90^\circ$ : unde respectu axis ad laminam in I normalis erit momentum inertiae  $= \frac{1}{12} M (aa + bb)$ : tum vero alter axis principalis est AC, cujus respectu momentum inertiae est  $= \frac{1}{12} Mbb$ ; tertius vero axis principalis est in plano laminae ad AC normalis, cujus respectu momentum inertiae est  $= \frac{1}{12} Maa$ : existentibus lateribus  $Bb = Dd = 2a$  et  $Bd = bd = 2b$ .

EXEMPLUM. 2.

489. Si parallelogrammum  $Bb dD$  sit rhombus, ut sit  $b = a$  et singula ejus latera  $= 2a$ , existentibus angulis acutis  $= \zeta$ , fit  $\text{tang } 2\theta = \frac{\sin 2\zeta}{1 + \cos 2\zeta} = \text{tang } \zeta$ , hincque vel  $\theta = \frac{1}{2} \zeta$  vel  $\theta = 90^\circ + \frac{1}{2} \zeta$ . Quare respectu primi axis principalis ad planum rhombi in I normalis est momentum inertiae  $= \frac{1}{12} Maa$ ; reliqui ambo axes sunt diagonales  $Bd$  et  $Db$ , quorum illius  $Bd$  respectu momentum inertiae est  $= \frac{1}{12} Maa (1 - \cos \zeta) = \frac{1}{12} Maa \text{ si } \frac{1}{2} \zeta^2$ , respectu vero alterius diagonalis  $Db$  est  $= \frac{1}{12} Maa (1 + \cos \zeta) = \frac{1}{12} Maa \cos \frac{1}{2} \zeta^2$ .

COROLL. 4.

490. Si ergo parallelogrammum abeat in quadratum, cujus latus  $= 2a$ , omnes rectae in ejus plano per centrum inertiae I ductae pro axibus principalibus haberi possunt, eritque eorum respectu momentum inertiae  $= \frac{1}{12} Maa$ ; at respectu axis ad quadratum in I normalis duplo erit majus  $= \frac{1}{3} Maa$ .

PROBLEMA. 36.

491. Si corpus fuerit lamina tenuissima plana in figuram circuli efformata, invenire ejus axes principales, eorumque respectu momenta inertiae.

SOLUTIO.

Sit radius circuli  $= a$ , erit area  $= \pi aa$ , quae massam  $M$  refert: et cum unus axium principalium ad planum circuli in centro I sit normalis, Fig. 52.



normalis, ponantur pro elemento quocunque  $dM$  in  $Z$  sito coordinatae  $IP = y$ ,  $PL = z$ , ob  $dM = dydz$ , erit  $\int yydM = \int dy \int yzdz = \int dy. yxz = \int yydy \int r(aa - yy)$  posito  $z = r(aa - yy)$ . At hoc integrale reducitur ad hanc formam  $\int yydM = \frac{1}{8} a^4 \int \frac{dy}{r(aa - yy)} - \frac{1}{8} y(aa - 2yy)$

$r(aa - yy)$ , quod quater sumtum et posito  $y = a$ , dat  $B = \frac{\pi}{4} a^4 = \frac{1}{4} Ma^2$ . Simili modo vero fit  $\int zzdM = C = \frac{1}{4} Ma^2$ . Deinde  $\int yzdM$  si ex altera diametri parte simile elementum conjungatur, ad nihilum redditur, ita ut sit  $\int yzdM = F = 0$ . Hinc cum  $B + C = 0$ , oritur  $\tan 2\theta = 0$ , sicque angulus  $\theta$  est indeterminatus, ex quo cognoscimus, quod per se est clarum, omnes diametros pro axibus principalibus haberi posse, quorum respectu sit momentum inertiae  $= \frac{1}{4} Ma^2$ . At respectu primi axis ad planum circuli in centro  $I$  normalis est momentum inertiae  $B + C = \frac{1}{2} Ma^2$ .

## S C H O L I O N.

492. Cum hic elementum massae  $dM$  esset  $= dydz$ , notandum est, id semper manere positivum, etiamsi vel  $y$  vel  $z$  capiatur negative, quo casu etiam differentialia alioquin fierent negativa. In hoc ergo calculo probe cavendum est, ne cum coordinatae negative accipiuntur, elementi massae  $dM$  expressio in calculum tanquam negativa inferatur. Ex quo conveniet pro singulis regionibus, ubi coordinatae signis contrariis afficiuntur, calculum seorsum institui. Ceterum idem valor  $B = \int yydM = \frac{1}{4} \pi a^4$  eruitur, si ponatur  $IZ = r$  et angulus  $AIZ = \phi$ , erit enim  $dM = r dr d\phi$  et  $y = r \cos \phi$ , unde  $yydM = r^3 dr d\phi \cos \phi^2$  quae secundum variabilem  $r$  integrata posito  $r = a$  dat  $\frac{1}{2} a^4 d\phi \cos \phi^2$  cujus integrale ob  $\cos \phi^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2\phi$  praebet  $\frac{1}{4} a^4 (\frac{1}{2} \phi + \frac{1}{4} 2\phi)$ . Statuatur nunc  $\phi = 2\pi$ , ob  $\int 4\pi = 0$ , prodit  $\frac{1}{4} \pi a^4$  ut ante; unde patet superiore cautela legi continuitatis non repugnare.

## P R O B L E M A. 37.

Fig. 55. 493. Si corpus sit lamina tenuissima plana figuram habens quamcunque  $ACBD$ , definire ejus axes principales, eorumque respectu momenta inertiae.

## S O L U T I O.

Sit  $I$  figurae centrum inertiae, manifestumque est; rectam ad ejus planum in  $I$  normalem fore unum axium principalium; tum in plano ipso

ipso sumtis binis directricibus AB et CD inter se normalibus, pro elemento quovis  $dM$  in  $Z$  ponantur coordinatae  $IP = y$  et  $PZ = z$ , erit  $dM = dydz$ , hincque  $\int yz dM = \int dy \int yz dz = \int dy \cdot yz$ . Posito ergo  $z = PM$ , fit  $\int yz dM = \int PM \cdot y dy$ , cujus valor pro singulis regionibus AIC, AID, BIC et BID erui debet, eorumque summa erit = B, ut fit

$$B = \int IP^2 \cdot MN \cdot d. IP + \int IQ^2 \cdot \mu \nu \cdot d. IQ.$$

Deinde est  $\int yz dM = \int dy \int z dz = \frac{1}{2} \int dy \cdot z^2 = \frac{1}{2} \int PM^2 \cdot dy$ , ita ut fit

$$C = \frac{1}{2} \int (PM^2 + PN^2) \cdot d. IP + \frac{1}{2} \int (QM^2 + QN^2) \cdot d. IQ.$$

Porro est  $\int yz dM = \int dy \int yz dz = \frac{1}{2} \int yz dz = \frac{1}{2} \int PM^2 \cdot y dy$ , cujus valor in regionibus AID et BIC est negativus, in BID vero positivus, unde habebitur

$$F = \frac{1}{2} \int IP (PM^2 - PN^2) \cdot d. IP - \frac{1}{2} \int IQ (QM^2 - QN^2) \cdot d. IQ.$$

At vero tota massa M erit

$$M = \int MN \cdot d. IP + \int \mu \nu \cdot d. IQ.$$

His valoribus inventis erit momentum inertiae respectu axis ad planum in I normalis = B + C, tum sint reliqui axes principales Flf et Glg,

ac posito angulo AIf =  $\theta$  reperimus  $\tan 2\theta = \frac{2F}{B-C}$ , et momentum

inertiae respectu axis Flf =  $B \sin^2 \theta + C \cos^2 \theta - 2F \sin \theta \cos \theta =$   
 $\frac{1}{2} B + \frac{1}{2} C - \frac{1}{2} (B-C) \cos 2\theta - F \sin 2\theta.$

Verum ob  $\sin 2\theta = \frac{2F}{\sqrt{(B-C)^2 + 4FF}}$  et  $\cos 2\theta = \frac{B-C}{\sqrt{(B-C)^2 + 4FF}}$  obtinebitur momentum inertiae respectu

$$\text{axis Flf} = \frac{1}{2} (B + C) - \frac{1}{2} \sqrt{(B-C)^2 + 4FF} \text{ et}$$

$$\text{axis Glg} = \frac{1}{2} (B + C) + \frac{1}{2} \sqrt{(B-C)^2 + 4FF}$$

### COROLL. 1.

494. Momenta ergo inertiae respectu axium Ff et Gg simul sumta aequalia sunt momento inertiae respectu primi axis principalis, qui ad planum laminae in I est normalis.

### COROLL. 2.

495. Si recta AB fuerit figurae diameter, ut fit  $PM = PN$ , valor litterae F evanescit, id quod etiam evenit si recta CD fuerit diameter, ut sumto  $IQ = IP$  fit  $QM = PM$ . At quoties fit  $F = 0$ , tam ob  $\tan 2\theta = 0$ , ipsae rectae AB et CD erunt axes principales.

### COROLL. 3.

496. Casu hoc quo  $F = 0$ , et AB et CD sunt axes principales, erit momentum inertiae respectu axis  $Ff = C$  et respectu axis  $CD = B$ ,  
Bb quae

# 194 CAPUT VI. INVESTIGATIO MOMENTI

quae si insuper fuerint aequalia ob  $\tan g' 2 \theta = 2$ , omnes rectae per I ductae paria habent momenta  $= B = C$ .

## COROLL. 4.

497. Si praeter diametrum AB reperitur alia recta per I ducta, cujus respectu momentum inertiae illi sit aequale, tum omnes plane rectae per I ductae eadem proprietate gaudebunt, et momenta inertiae habebunt aequalia.

## PROBLEMA. 38.

Fig. 56. 498. Si corpus fuerit lamina tenuissima plana in figuram polygoni regularis efformata, ejus axes principales eorumque respectu momenta inertiae definire.

## SOLUTIO.

Centrum inertiae talis polygoni regularis erit in centro circuli circumscripti I, cujus radius ponatur  $IA = a$ , numerusque laterum  $= n$ .

Hinc fit angulus AIB  $= \frac{2\pi}{n}$ , eoque per rectam IG bisecto angulus

AIG  $= \frac{\pi}{n}$  atque  $AB = 2a \sin \frac{\pi}{n}$  et  $IG = a \cos \frac{\pi}{n}$ : quare area trian-

guli AIB  $= aa \sin \frac{\pi}{n} \cos \frac{\pi}{n} = \frac{1}{2} aa \sin \frac{2\pi}{n}$  et area polygoni totius  $=$

$\frac{n}{2} aa \sin \frac{2\pi}{n}$  vicem massae M gerens. Iam primo observo (497) omnes rectas in plano laminae per I ductas aequalia esse habituras momenta, quorum bina simul sumpta efficiant momentum respectu axis ad planum laminae in I normalis. Hoc vero momentum ex superioribus colligi potest. Consideretur enim triangulum AIB, cujus massa ponatur  $= m$ ,

et centrum inertiae in  $i$ , ut sit  $Gi = \frac{2}{3} a \cos \frac{\pi}{n}$  et  $Is = \frac{2}{3} a \cos \frac{\pi}{n}$

existente  $AG = a \sin \frac{\pi}{n}$ . Quia igitur hoc triangulum est isosceles, per §. 481. erit ejus momentum inertiae respectu axis ad planum trianguli

in  $i$  normalis  $= \frac{1}{2} m. Gi^2 + \frac{1}{2} m. AG^2 = m (\frac{1}{3} aa \cos^2 \frac{\pi}{n} + \frac{1}{2} aa \sin^2 \frac{\pi}{n})$ ;

hincque respectu axis ad idem planum in I normalis  $= m (\frac{1}{3} aa \cos^2 \frac{\pi}{n} + \frac{1}{2} aa \sin^2 \frac{\pi}{n})$

$\cos \frac{\pi}{n} + \frac{1}{2} aa \int \frac{\pi^2}{n} + \frac{1}{2} aa \cos \frac{\pi^2}{n} = maa \left( \frac{1}{2} \cos \frac{\pi^2}{n} + \frac{1}{2} \int \frac{\pi^2}{n} \right)$   
 quod per  $n$  multiplicatum ob  $mn = M$  dabit momentum toti-  
 us polygoni respectu axis ad id in I normalis  $= Maa \left( \frac{1}{2} \cos \frac{\pi^2}{n} + \frac{1}{2} \int \frac{\pi^2}{n} \right)$   
 $\frac{\pi^2}{n} + \frac{1}{2} \int \frac{\pi^2}{n} = \frac{1}{2} Maa \left( 1 + \frac{1}{2} \cos \frac{2\pi}{n} \right)$ . Respectu vero cuiusque axis  
 in plano laminae per punctum I ducti erit momentum inertiae  $= \frac{1}{2}$   
 $Maa \left( 1 + \frac{1}{2} \cos \frac{2\pi}{n} \right)$  illo scilicet duplo minus.

## COROLL. 1.

499. Si praeterea latus polygoni ponatur  $AB = c$ , ut sit  $c = 2a \int \frac{\pi}{n}$ ,  
 $\frac{\pi}{n}$ , ob  $a = \frac{c}{2 \int \frac{\pi}{n}}$  erit momentum inertiae respectu axis principalis ad

$$\text{planum in I normalis} = \frac{Mcc}{12 \int \frac{\pi^2}{n}} \left( 1 + \frac{1}{2} \cos \frac{2\pi}{n} \right) = \frac{1}{12} Mcc, \frac{2 + \cos \frac{2\pi}{n}}{1 - \cos \frac{2\pi}{n}}$$

respectu reliquorum vero axium principalium est duplo minus.

## COROLL. 2.

500. Si praeter radium circuli circumscripti  $IA = a$ , latus po-  
 lygoni  $AB = c$  introducatur, ob  $\int \frac{\pi}{n} = \frac{c}{2a}$  et  $\cos \frac{2\pi}{n} = 1 - \frac{cc}{2aa}$   
 erit momentum respectu axis in I normalis  $= \frac{1}{12} Maa \left( 1 + \frac{1}{2} - \frac{cc}{4aa} \right) =$   
 $\frac{1}{12} M (6aa - cc)$ , respectu axium vero in ipso plano polygoni per I du-  
 ctorum est duplo minus.

## PROBLEMA. 39.

501. Si corpus fuerit cylindrus rectus, cuius axis  $Aa = 2a$  et ra-  
 dius basis  $AB = AD = c$ , invenire ejus axes principales, eorumque re-  
 spectu momenta inertiae. Fig. 57.

## SOLUTIO.

Cum area basis sit  $= \pi c^2$ , erit cylindri soliditas seu massa  $= 2\pi a c^2$   
 $= M$ . In axis autem puncto medio I erit ejus centrum inertiae, ut  
fit

Bb 2

fit  $AI = Ia = a$  : at ipse hic axis  $Aa$  unus manifesto est axium principalium, per quem sumto plano quocunque  $BDbd$  pro elemento quovis  $dM$  in  $Z$  sito habebuntur coordinatae  $IX = x$ ,  $XY = y$ ,  $YZ = z$  ut fit  $dM = dx dy dz$ . Hinc colligantur valores sequentes:

1°.  $\int x x dM = \int x x dx dy dz$  : ubi sumtis primo  $x$  et  $y$  constantibus et posito post integrationem  $z = r (cc - yy)$ , habetur  $\int x x dx / dy r (cc - yy)$ , at  $\int dy r (cc - yy)$  dat aream sectionis per  $X$  factae  $= \pi cc$ , ut habeatur  $\pi cc \int x x dx$ , cujus integrale tam ad  $A$  quam  $a$  extensum praebet  $\frac{1}{3} \pi cc a^3$ , ut fit  $\int x x dM = A = \frac{1}{3} Maa$ .

2°.  $\int y y dM = \int y y dx dy dz = \int dx \int y y dy r (cc - yy)$ , at posito  $y = c$  est  $\int y y dy r (cc - yy) = \frac{1}{8} \pi c^4$ , quod quater sumi debet, ut fit  $\int y y dM = \frac{1}{4} \pi c^4 \int dx$ , hincque habebitur per totum cylindrum  $\int y y dM = \frac{1}{4} \pi c^4 a = \frac{1}{4} Mcc = B$ .

3°.  $\int z z dM = \int z z dx dy dz$ , ubi si primo  $x$  et  $z$  pro constantibus sumantur, posito  $y = r (cc - zz)$  habetur  $\int dx / z z dz r (cc - zz)$ , cujus valor ut ante colligitur  $\int z z dM = \frac{1}{4} Mcc = C = B$ .

4°.  $\int z x dM$  si simile elementum  $dM$  infra planum  $BDbd$  cum eo conjungatur, in nihilum abit, ita ut prodeat  $\int z x dM = F = 0$ .

His positis respectu axis  $Aa$  erit momentum inertiae  $= B + C = \frac{1}{2} Mcc$  : pro reliquis vero binis axibus ad illum normalibus fit  $\text{sang } 2\theta = \frac{\frac{1}{2} F}{B - C} = 0$  ; ita ut omnes diametri sectionis in  $I$  ad  $Aa$  normalis tanquam axes principales spectari possint, quorum omnium respectu erit momentum inertiae  $= A + B = M (\frac{1}{3} aa + \frac{1}{4} cc)$ .

#### C O R O L L. 1.

502. Si alius axis quicunque per  $I$  transiens accipiatur, qui faciat cum axe  $Aa$  angulum  $= \zeta$ , ejus respectu momentum inertiae erit  $= (B + C) \cos^2 \zeta + (A + B) \sin^2 \zeta = M (\frac{1}{4} cc \cos^2 \zeta + \frac{1}{3} aa \sin^2 \zeta + \frac{1}{4} cc \sin^2 \zeta) = M (\frac{1}{3} aa \sin^2 \zeta + \frac{1}{4} cc - \frac{1}{4} cc \cos^2 \zeta)$ .

#### C O R O L L. 2.

503. Fieri potest, ut omnia momenta respectu restarum per  $I$  ductarum fiant inter se aequalia, quod evenit si fuerit  $\frac{1}{3} aa = \frac{1}{4} cc$  seu  $a = \frac{c r^3}{2}$ , ideoque  $\frac{c}{2a} = \frac{1}{r^3}$ , et angulus  $AaB = 30^\circ$ , siue triangulum  $BaD$  aequilaterum, quo casu singula momenta sunt  $= \frac{1}{4} Mcc = \frac{1}{4} M \cdot BD^2$ .

PRO.

## PROBLEMA. 40.

504. Si corpus fuerit conus rectus, cujus vertex A, altitudo AC Fig. 38. = a, et radius basis CB = CD = c, invenire ejus axes principales eorumque respectu momenta inertiae.

## SOLUTIO.

Cum area basis sit =  $\pi cc$  erit soliditas eademque massa  $M = \frac{1}{3} \pi acc$ : tum vero centrum inertiae I ita in axe est situm, ut sit  $CI = \frac{1}{4} a$  et  $AI = \frac{3}{4} a$ . Sumatur jam elementum quodcunque  $dM$  in Z, pro quo sint coordinatae  $IX = x$ ,  $XY = y$  et  $YZ = z$ , erit  $dM = dx dy dz$ .

Ponatur autem  $AX = t$ , erit  $XM = \frac{ct}{a}$ , et  $x = \frac{1}{4} a - t$ , nihilo vero minus capi debet  $dM = dt dy dz$ . Evolvantur ergo sequentes formulae:

1°.  $\int x x dM = A = \int (\frac{1}{4} a - t)^2 dt dy dz$ , ubi sumtis primo  $t$  et  $y$  constantibus positoque  $z = r (\frac{cct}{aa} - yy)$  habebitur:  $\int (\frac{1}{4} a - t)^2 dt dy r (\frac{cct}{aa} - yy) = r (\frac{cct}{aa} - yy) \int (\frac{1}{4} a - t)^2 dt dy r (\frac{cct}{aa} - yy) = \frac{\pi cct}{aa}$ , ita ut integrandum supersit  $\frac{\pi cc}{aa} \int t t dt (\frac{1}{4} a - t)^2 = \frac{\pi cc}{aa} (\frac{1}{8} aat^3 - \frac{1}{4} at^4 + \frac{1}{3} t^3)$ . Ponatur  $t = a$  fietque  $A = \frac{1}{8} \pi cca^3 = \frac{1}{8} Maa$ .

2°.  $\int y y dM = B = \int y y dt dy dz = \int dt \int y y dy r (\frac{cct}{aa} - yy)$  per primam integrationem. At manente adhuc  $t$  constante est  $\int y y dy r (\frac{cct}{aa} - yy)$ , posito  $y = \frac{ct}{a}$  et quater sumtum =  $\frac{1}{4} \pi \cdot \frac{c^4 t^4}{a^4}$ , ut, etiamnum integrari debeat  $\int \frac{1}{4} \pi \cdot \frac{c^4 t^4}{a^4} dt$ , unde posito pro toto cono  $t = a$ , fit  $B = \frac{1}{8} \pi ac^4 = \frac{1}{8} Mcc$ .

3°.  $\int z z dM = C$  pari modo dat  $C = \frac{1}{8} Mcc = B$ , at  $\int z z dM = F$  manifesto evanescit ut ante.

Cum ergo AC sit unus axium principalium, ejus respectu momentum inertiae est =  $B + C = \frac{1}{8} Mcc$ . Reliqui axes principales sunt diametri omnes sectionis in I ad axem normalis, quorum respectu momentum inertiae est  $A + B = \frac{1}{8} M(aa + 4cc)$ .

## COROLL.

505. Casu quo  $aa + 4cc = 8cc$ , seu  $a = 2c$ , hoc est  $AC = BD$ , omnes rectae per I ductae axium principalium proprietate gaudent, eorumque respectu erit momentum inertiae  $= \frac{1}{2} Mcc$ .

## PROBLEMA 41.

Fig. 59.

506. Si corpus fuerit globus ex materia homogenea confectus, cuius centrum I et radius  $IA = a$ , definire ejus momentum inertiae respectu axis cujusvis per ejus centrum transeuntis.

## SOLUTIO.

Ob radium  $IA = a$ , erit area circuli maximi  $= \pi aa$ , et superficies globi  $= 4\pi aa$ , hinc ejus soliditas seu massa  $M = \frac{4}{3} \pi a^3$ . Iam positus pro elemento quocunque  $dM$  in  $Z$  posito coordinatis  $IX = x$ ,  $XY = y$ , et  $YZ = z$ , erit respectu axis  $AC$  momentum inertiae  $= \int dM (xy + zz)$ . Ponatur  $XZ = r$ , et angulus  $YXZ = \phi$ , erit  $y = r \cos \phi$ ,  $z = r \sin \phi$ , et  $dM = r dr d\phi dx$ , unde  $\int r r dM = \int r^3 dr d\phi dx = 2\pi / r^3 dr dx$  ob  $\int d\phi = 2\pi$ : nunc sumto  $r$  variabili, positoque  $r = XM = \sqrt{(aa - xx)}$ , habebimus  $\frac{1}{2} \pi \int dx (aa - xx)^2 = \frac{1}{2} \pi (a^4 x - \frac{2}{3} a^2 x^3 + \frac{1}{5} x^5)$ . Statuatur  $x = a$  pro altero hemisphaerio, et duplum hujus expressionis dabit momentum inertiae quaesitum  $= \pi \cdot \frac{1}{5} a^5 = \frac{8}{3} Maa$ .

## PROBLEMA 42.

Fig. 60.

507. Si corpus fuerit conoides quodcunque revolutione lineae  $AMB$  circa axem  $AC$  genitum, ejus axes principales eorumque respectu momenta inertiae invenire.

## SOLUTIO.

Sit  $AC = a$ , et pro curva  $AX = s$ , et  $XM = u$ , ita ut detur aequatio inter  $s$  et  $u$ : erit soliditas seu massa  $M = \pi \int u u ds$  posito post integrationem  $s = a$ . Tum vero centrum inertiae erit in  $I$ , ut sit  $AI = \frac{\int s u u ds}{\int u u ds}$ . Ponatur brevitatis ergo  $AI = f$  ut sit  $\int s u u ds = f \int u u ds$ : est vero  $AC$  unus axium principalium. Iam pro elemento  $dM$  in  $Z$  posito sint coordinatae  $IX = x = f - s$ ;  $XY = y$ , et  $YZ = z$ , ac ponatur  $XZ = r$ , angulus  $YXZ = \phi$ , erit  $dM = r dr ds d\phi$ ,  $y = r \cos \phi$  et  $z = r \sin \phi$ . Nunc considerentur formulae sequentes.

1<sup>o</sup>.  $\int x x dM = \int (f - s)^2 r dr ds d\phi = 2\pi \int (f - s)^2 r dr ds$  ob  $\int d\phi = 2\pi$ . Sit adhuc  $s$  constans, et posito  $r = XM = u$ , fiet  $\int x x dM = \pi \int (f - s)^2 u u ds$ .

unde =  $\Lambda$ , ideoque  $\Lambda = \pi \int f \sin \theta d\theta - 2\pi \int f \sin \theta d\theta + \pi \int f \sin \theta d\theta = -\pi \int f \sin \theta d\theta + \pi \int f \sin \theta d\theta = M(-f + \frac{\int f \sin \theta d\theta}{\int \sin \theta d\theta})$ .

2°.  $\int y y dM = \int r^3 dr d\theta \cos \theta = \pi \int r^3 dr$  ob  $\int d\theta \cos \theta = \int d\theta$  ( $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2\theta$ ) =  $\frac{1}{2} \theta + \frac{1}{4} \sin 2\theta$ , quae posito  $\theta = 2\pi$  abit in  $\pi$ . Por-

ro prodit  $\frac{\pi}{4} \int u^4 dt$  posito  $r = u$ , ita ut sit  $\int y y dM = B = \frac{\pi}{4} \int u^4 dt = \frac{M \int u^4 dt}{4 \int u^2 dt}$ , cui etiam aequale sit  $\int x x dM = C$ . At  $\int x x dM = F$  evanescit.

His evolutis prodit momentum inertiae respectu axis  $AC = B + C = \frac{M \int u^4 dt}{2 \int u^2 dt}$ , posito post integrationem  $t = a$ , tum vero in sectione ad  $AC$  in  $I$  normali omnes diametri locum axium principalium sustinent, eorumque respectu reperitur momentum inertiae =  $\Lambda + B = M(-f + \frac{4 \int f \sin \theta d\theta + \int u^4 dt}{4 \int u^2 dt}) = M(\frac{\int u^2 dt (4 \int f \sin \theta d\theta + u^4)}{4 \int u^2 dt} - f)$ .

#### EXEMPLUM. 1.

508. Sit corpus hemisphaerium seu  $AMB$  quadrans circuli radii  $CA = CB = a$ : erit  $us = 2at - tt$ , hinc  $\int u^2 dt = at^2 - \frac{1}{3} t^3 = \frac{2}{3} a^3$ , posito  $t = a$ ; porro  $\int u^4 dt = \frac{2}{3} at^3 - \frac{1}{4} t^4 = \frac{1}{12} a^4$ , ergo  $f = AI = \frac{2}{3} a$  et  $CI = \frac{1}{3} a$ . Deinde  $\int u^4 dt = \int dt (4aat - 4at^2 + t^4) = \frac{4}{3} aat^3 - at^4 + \frac{1}{5} t^5 = \frac{1}{15} a^5$ , et  $\int u^2 dt = \int t dt (2at - tt) = \frac{1}{2} at^2 - \frac{1}{3} t^3 = \frac{1}{30} a^3$ . Quare respectu axis  $AC$  est momentum inertiae =  $\frac{M \cdot 8 a^5 \cdot 3}{15 \cdot 4 a^3} = \frac{2}{3} Maa$ , et respectu axis cujusvis alius ad istum in  $I$  normalis =  $M(-\frac{2}{3} \frac{1}{2} aa + \frac{1}{3} \frac{1}{2} aa) = \frac{1}{15} Maa$ : ita ut illud momentum sit ad hoc ut 128 ad 83.

#### EXEMPLUM. 2.

509. Sit corpus conus truncatus cujus axis  $AC = a$ , radius alteri- Fig. 61.  
us basis  $BC = c$ , alterius  $AD = b$ , eritque  $u = b + \frac{(c-b)t}{a}$  et  $us = bb$   
+  $\frac{2b(c-b)t}{a} + \frac{(c-b)^2 t^2}{a^2}$ , unde pro centro inertiae  $I$  inveniundo,  
erit  $\int u^2 dt = bb t + \frac{b(c-b)t^2}{a} + \frac{(c-b)^2 t^3}{3 a^2} = \frac{1}{3} a (bb + bc + cc)$   
ideoque soliditas seu massa  $M = \frac{1}{3} \pi a (bb + bc + cc)$ , deinde  $\int u^4 dt =$   
 $\frac{1}{3} bb t^3 + \frac{2b(c-b)t^3}{3 a} + \frac{(c-b)^2 t^4}{4 a^2} = \frac{1}{15} aa (bb + 2bc + 3cc)$  unde  
oritur



200 CAPUT VI. INVESTIGATIO MOMENTI

oritur intervallum  $AI = f = \frac{a(bb+3bc+3cc)}{4(bb+bc+cc)}$  et  $CI = \frac{a(cc+2bc+3bb)}{4(bb+bc+cc)}$ .

Porro ob  $u^2 = b^2 + \frac{4b^3(c-b)s}{a} + \frac{6bb(c-b)^2s^2}{a^2} + \frac{4b(c-b)^3s^3}{a^3} + \frac{(c-b)^4s^4}{a^4}$  erit  $\int u^2 ds = b^2s + \frac{2b^3(c-b)s^2}{a} + \frac{2bb(c-b)^2s^3}{a^2} + \frac{b(c-b)^3s^4}{a^3} + \frac{(c-b)^4s^5}{5a^4}$  et facto  $s = a$ ,  $\int u^2 ds = \frac{1}{5}a(b^4 + b^3c + bbcc + bc^3 + c^4)$ , denique  $\int u^2 ds = \frac{1}{5}bb^2s^3 + \frac{b^3(c-b)s^4}{2a} + \frac{(c-b)^2s^5}{5aa}$   
 $= \frac{1}{5}a^3(bb+3bc+6cc)$ .

Ex his colligitur momentum inertiae respectu axis  $AC = \frac{1}{5}M \cdot \frac{b^4+b^3c+bbcc+bc^3+c^4}{bb+bc+cc} = \frac{1}{5}M \cdot \frac{b^5-c^5}{b^3-c^3}$ .

at respectu axium ad  $AC$  in  $I$  normalium fit momentum  $= \frac{1}{5}M \cdot \frac{b^4+b^3c+bbcc+bc^3+c^4}{bb+bc+cc} + \frac{1}{5}Maa \left( \frac{8(bb+3bc+6cc)}{bb+bc+cc} - \frac{5(bb+2bc+3cc)^2}{(bb+bc+cc)^2} \right)$   
 quae reducitur ad hanc formam:

$$\frac{1}{5}M \cdot \frac{b^4+b^3c+bbcc+bc^3+c^4}{bb+bc+cc} + \frac{1}{5}Maa \frac{(b+c)^2+4bbcc}{(bb+bc+cc)^2}.$$

COROLL. 1.

510. Si  $b = c$  prodit casus cylindri, quo fit  $AI = f = \frac{1}{2}a$ , mom. inert. respectu  $AC = \frac{1}{5}Maa$ , et mom. inert. respectu axium ad illum in  $I$  normalium  $= \frac{1}{5}Mcc + \frac{1}{5}Maa$ .

COROLL. 2.

511. Si  $b = 0$ , prodit casus conii recti, quo fit  $AI = f = \frac{1}{3}a$ ; mom. inert. respectu  $AC = \frac{1}{5}Mcc$  et mom. inert. respectu axium ad illum in  $I$  normalium  $= \frac{1}{5}Mcc + \frac{1}{5}Maa$ , ut supra.

COROLL. 3.

512. Ut omnia momenta respectu axium per  $I$  ductorum fiant aequalia, debet esse  $4(b^4 + b^3c + bbcc + bc^3 + c^4) = aa \frac{(b+c)^2+4bbcc}{bb+bc+cc}$  ideoque datis basibus conii truncati, altitudo  $AC = a$ , ita debet definiri ut sit  $aa = \frac{4(bb+bc+cc)(b^4+b^3c+bbcc+bc^3+c^4)}{(b+c)^2+4bbcc}$ .

EXEM.

## EXEMPLUM 3.

513. Sit corpus sphaeroides ellipticum conversione semiellipsis AEB, circa axem AB natum, in cuius ergo medio I est centrum inertiae. Ponatur semiaxis  $AI = IB = a$ , et jungatur  $IE = c$ , erit  $uu = \frac{cc}{aa} (2at - t^2)$ : et in integralibus poni oportet  $t = 2a$ . Hinc habebimus  $\int u u dt = \frac{cc}{aa}$  Fig. 62.  
 $(att - \frac{1}{2} t^3) = \frac{1}{2} acc$ , ideoque massam  $M = \frac{1}{2} \pi acc$ : deinde  $\int t u u dt = \frac{cc}{aa}$   
 $(\frac{2}{3} at^3 - \frac{1}{4} t^4) = \frac{1}{2} aacc$ , ergo  $AI = f = a$ , porro  $\int t^2 u u dt = \frac{cc}{aa}$   
 $(\frac{1}{2} at^4 - \frac{2}{5} t^5) = \frac{1}{2} a^2 cc$ , et ob  $u^4 = \frac{c^4}{a^4} (4aat - 4at^3 + t^4)$  erit  
 $\int u^4 dt = \frac{c^4}{a^4} (\frac{4}{3} aat^3 - at^4 + \frac{1}{5} t^5) = \frac{1}{15} ac^4$ . Ex his colligitur momentum inertiae respectu axis  $AB = \frac{2}{5} Mcc$ , at respectu axium ad AB in I normalium  $= \frac{1}{5} M(aa + cc)$ .

## EXEMPLUM 4.

514. Si corpus sit lens ex duobus segmentis sphaerae aequalibus composita, seu ortum ex conversione figurae AEB, ex duobus semi-segmentis circuli aequalibus AIE et BIE formatae, circa axem AB, in cuius ergo medio I erit centrum inertiae. Ponatur semiaxis  $AI = BI = a$ , et  $IE = IF = b$ , erit diameter circuli  $= \frac{aa + bb}{a}$ , quem tantisper ponamus  $= 2c$ , ut sit  $c = \frac{aa + bb}{2a}$ . Quare fiet  $uu = 2ct - t^2$ , et integralibus superioribus poni debet  $t = a$ , quo facto ea debebunt duplicari: nisi quod  $AI = f$  per se sit  $= a$ , ideoque  $A = M(aa - 2a \int t u u dt + \int t^2 u u dt)$ . Hinc namque scimus  $\int t u u dt = \frac{2}{3} a^3 c - \frac{1}{2} a^4$ ;  $\int u u dt = aac - \frac{1}{2} a^3$  et  $M = 2\pi (aac - \frac{1}{2} a^3)$ ;  $\int t^2 u u dt = \frac{1}{2} a^4 c - \frac{1}{2} a^5$ ; et  $\int u^4 dt = \frac{2}{3} a^3 cc - a^4 c + \frac{1}{5} a^5$ . Ex his colligitur momentum inertiae respectu axis  $AB = \frac{1}{10} M \frac{20acc - 15aac + 3a^3}{3c - a} = \frac{1}{10} M \frac{a^4 + 5aabb + 10b^4}{aa + 3bb}$  Fig. 63.  
 at respectu axium EF ad AB in I normalium:

$$\frac{1}{10} M \left( \frac{a^3 - 5aac + 20acc}{3c - a} \right) = \frac{1}{10} M \frac{7a^4 + 15aabb + 10b^4}{aa + 3bb}$$

## PROBLEMA. 42.

515. Si corpus fuerit parallelepipedum rectangulum, invenire ejus axes principales, eorumque respectu momenta inertiae.

## SOLUTIO.

Fig. 64.

Sit rectangulum  $BDbd$  basis parallelepipedum, cujus latera sint  $Bb = 2a$ ,  $BD = 2b$ , altitudo verò  $= 2x$ , atque manifestum est, in puncto medio parallelepipedum fore ejus centrum inertiae, et axes principales fore tres rectas per id punctum lateribus parallelas. Quaeratur ergo momentum inertiae respectu axis altitudini paralleli, qui basi in puncto medio  $G$  perpendiculariter insistet. Consideretur hoc rectangulum  $BDbd$  tanquam sectio basi parallela a centro inertiae distans intervallo  $= x$ , ac ponatur  $GY = y$ , et  $YZ = z$ , erit  $dx dy dz$  elementum soliditatis seu massae  $dM$ , unde fit  $M = 8abc$ . Tum vero habebimus  $\int x x dM = \int x x dx dy dz$ , et bis integrando per  $y$  et  $z$  variables, ponendoque  $y = a$ , et  $z = b$ , duplicentur integralia, ut per totam sectionem extendantur, erit  $\int x x dM = 4ab \int x x dx = \frac{4}{3} abx^3$ : jam posito  $x = c$ , ac duplicando, erit per totum parallelepipedum  $\int x x dM = A = \frac{4}{3} abc^3 = \frac{1}{3} Mcc$ , simili modo erit  $\int y y dM = B = \frac{1}{3} Maa$  et  $\int z z dM = C = \frac{1}{3} Mbb$ : atque  $\int y z dM = F = 0$ . Ex his concluditur momentum inertiae respectu axis principalis altitudini paralleli seu ad basin  $BDbd$  perpendicularis  $= B + C = \frac{1}{3} M(aa + bb)$ : deinde momentum inertiae respectu axis lateri  $Bb$  paralleli  $= \frac{1}{3} M(bb + cc)$ , et respectu axis lateri  $BD$  paralleli  $= \frac{1}{3} M(aa + cc)$ .

## COROLL. 1.

Fig. 65.

516. Si ergo  $ABCDabcd$  fuerit tale parallelepipedum rectangulum, cujus massa sit  $= M$ : erunt ejus axes principales lateribus  $AB$ ,  $AC$ ,  $AD$  paralleli per punctum medium transeuntes, eritque momentum inertiae

$$\text{respectu axis lateri } \begin{cases} AB \\ AC \\ AD \end{cases} \text{ paralleli} = \begin{cases} \frac{1}{12} M(AC^2 + AD^2) \\ \frac{1}{12} M(AB^2 + AD^2) \\ \frac{1}{12} M(AB^2 + AC^2) \end{cases}$$

## COROLL. 2.

517. Si corpus fuerit cubus, cujus latus  $= a$ , haec tria momenta fiunt inter se aequalia; ideoque momenta inertiae respectu omnium plane axium per centrum cubi ductorum erunt inter se aequalia et quidem  $= \frac{1}{6} Maa$ . Talis autem aequalitas in omnibus corporibus regularibus locum habere debet.

PRO.

P. R I O B T I E M A. 143.

518. Si corpus fuerit globus excavatus, ut cavitas sit etiam sphaera Fig. 66. eodem centro praedita, definire ejus momentum inertiae respectu omnium axium per ejus centrum ductorum:

S O L U T I O.

Sit I centrum, et radius globi  $IA = a$ , cavitatis vero  $Ia = b$ , ut crassities crustae sphaericae sit  $= a - b = Aa$ , erit ergo massa hujus globi cavi  $= \frac{4}{3} \pi (a^3 - b^3)$ , quae ponatur  $= M$ ; omnes autem axes per centrum I ductos paria habere momenta inertiae, per se est manifestum; quaeramus ergo momentum inertiae respectu axis AB. Ac si globus esset solidus, ob ejus massam  $= \frac{4}{3} \pi a^3$ , foret ejus momentum inertiae  $= \frac{4}{3} \pi a^3 \cdot \frac{2}{5} aa = \frac{8}{15} \pi a^5$ , globi autem e medio sublatis  $= \frac{8}{15} \pi b^5$ , quo ab illo subtracto remanere debet momentum inertiae globi cavi, quod ergo erit  $= \frac{8}{15} \pi (a^5 - b^5)$   
 $= \frac{2}{5} M \cdot \frac{a^5 - b^5}{a^3 - b^3}$ . Habebitur ergo momentum inertiae pro globo excavato respectu omnium axium per centrum ductorum  $= \frac{2}{5} M$   
 $\frac{aa + ab + bb}{aa + ab + bb}$

C O R O L L. 1.

519. Si  $b = 0$ , prodit casus globi solidi, cujus radius  $= a$ , pro quo momentum inertiae est ut supra  $= \frac{2}{5} Maa$  respectu omnium axium per centrum ductorum.

C O R O L L. 2.

520. Si crusta haec sphaerica fuerit tenuissima, ut sit proxime  $b = a$ , erit momentum inertiae  $= \frac{2}{5} Maa$ , quae formula valet pro superficie sphaerica. Sin autem crassitiem  $Aa$ , quae sit  $= c = a - b$ , omnino negligere nolumus, erit momentum  $= \frac{2}{5} M \cdot \frac{5a^4c - 10a^3c^2}{3aac - 3acc} = \frac{2}{5} M (aa - ac)$ .

S C H O L I O N.

521. Hi casus abunde sufficiunt, non solum ut hinc pro pluribus corporibus momenta inertiae depromere, sed etiam si alia corpora occurrant, calculum eo facilius instituire valeamus. Quamobrem progrediamur ad motus gyrationis corporum a gravitate sollicitatorum definiendos, quandoquidem hic est praecipuus casus, ad quem haec tractatio accommodari solet.

## CAPUT VII.

DE MOTU OSCILLATORIO CORPORA-  
RUM GRAVIUM.

## P R O B L E M A 44.

522. Si corpus rigidum fuerit mobile circa axem horizontalem fixum; ejusque motus a sola gravitate turbetur, determinare mutationem momentaneam in motu gyrationis productam.

## S O L U T I O.

Tab. IX. Communem hic gravitatis hypothesin assumo; qua singula corporis elementa massis proportionaliter deorsum urgentur secundum directiones inter se parallelas. Quatenus ergo corpus est rigidum, his omnibus viribus aequivalet una vis ponderi corporis aequalis, cujus directio deorsum tendens per ejus centrum inertiae transit. Quare si corporis massa dicatur  $= M$ , ejusque centrum inertiae sit in  $I$ , indeque deorsum ducatur recta verticalis  $IG$ , ob gravitatem corpus sollicitabitur in directione  $IG$  a vi, quae ipso massae  $M$  aequalis est statuenda, quandoquidem ipsam massam  $M$  per pondus hujus corporis exprimimus. Porro etiam axis gyrationis sit horizontalis, et eum normaliter constituitur planum per centrum inertiae  $I$  transiens, quod erit verticale, et ipso plano tabulae referatur: axis igitur gyrationis ad hoc planum normalis per punctum  $O$  tractus concipiatur, unde ad  $I$  ducta recta  $OI$  exhibet distantiam centri inertiae  $I$  ab axe gyrationis. His praemissis teneat nunc corpus  $AEBR$  situm in figura repraesentatum, ductaque verticali  $OC$ , ex angulo  $COI$  situs corporis innotescit. Ponatur intervallum  $OI = f$ , et ad tempus  $= t$ , angulus  $COI = \phi$ , erit vis  $IG = M$  momentum respectu axis gyrationis  $= Mf \sin \phi$ , tendens ad angulum  $COI$  minuendum, quae in probl. 22. loco momenti  $Vf$  est substituenda. Praeterea vero necesse est nosse momentum inertiae corporis respectu axis gyrationis  $O$ , ibi per  $\int r^2 dm$  indicatum: hunc in finem concipiatur axis per ipsum centrum inertiae  $I$  transiens axi gyrationis parallelus, cujus respectu sit momentum inertiae corporis  $= Mkk$ , eritque ejusdem momentum inertiae respectu axis gyrationis  $O = M(f + k)$  ob intervallum horum axium  $OI = f$ . Hinc si corpus ita gyretur, ut recta  $OI$  accedat ad verticalem  $OC$ , fueritque celeritas angularis  $= \omega$ , quia

# CAPUT VII. DE MOTU OSCILLATORIO &c. 209

quia ea a vi sollicitante augetur, per §. 408. erit  $ds = \frac{2g \cdot Mf \sin \Phi}{M(f+kk)} dt$   
 seu  $ds = \frac{2fg dt \sin \Phi}{f+kk}$ ; sin autem recta OI recederet a verticali OI ce-  
 leritate angulari  $= \omega$ , foret  $ds = \frac{-2fg dt \sin \Phi}{f+kk}$ . Cum autem illo casu  
 sit  $\omega = \frac{-d\Phi}{dt}$ , hoc vero  $\omega = \frac{d\Phi}{dt}$ , sumto  $dt$  constante pro utro-  
 que erit  $dd\Phi = \frac{-2fg dt \sin \Phi}{f+kk}$ , ubi signum  $-$  adest, quia momen-  
 tum vis sollicitantis tendit ad angulum  $\Phi$  minuendum.

## COROLL. 1.

§23. Si corpus in situ AEBF nullum adhuc habeat motum, a gra-  
 vitate ita rectam verticalem OC versus urgebitur, ut tempusculo  $dt$  eo  
 fit accessurum per angulum  $= \frac{fg dt \sin \Phi}{f+kk}$ , qui est infinite parvus se-  
 cundi ordinis.

## COROLL. 2.

§24. Si ergo corpus fuerit in quiete, in quiete persistere nequit  
 nisi sit  $\sin \Phi = 0$ , hoc est nisi centrum inertiae I in recta verticali OC  
 versetur. Quare si corpus quodcumque hoc modo suspendatur, in quiete  
 esse nequit, nisi recta OI sit verticalis, quod fit si centrum inertiae lo-  
 cum vel imum vel summum obtineat.

## COROLL. 3.

§25. Quoties autem recta OI fuerit obliqua, corpus ob gravitatem  
 ad motum sollicitabitur, ac si jam habuerit motum, ejus motus pertur-  
 babitur, vel accelerando vel retardando, prout motus vel ad OC ac-  
 cedat vel ab eo recedat.

## COROLL. 4.

§26. Patet etiam, si axis per ipsum centrum inertiae I transeat, ut  
 sit  $OI = f = 0$ , momentum gravitatis evanescere, motumque gyra-  
 torium propterea plane non turbari. Hoc ergo casu corpus vel qui-  
 escet, vel uniformiter circa axem O gyraabitur.

## CAPUT VII.

DE MOTU OSCILLATORIO CORPORA-  
RUM GRAVIUM.

## P R O B L E M A. 44.

522. Si corpus rigidum fuerit mobile circa axem horizontalem fixum; ejusque motus a sola gravitate turbetur, determinare mutationem momentaneam in motu gyrationis productam.

## S O L U T I O.

Tab. IX. Communem hic gravitatis hypothese[m] assumo; qua singula cor-  
Fig. 67. poris elementa massis proportionaliter deorsum urgentur secundum di-  
rectiones inter se parallelas. Quatenus ergo corpus est rigidum, his  
omnibus viribus aequivalet una vis ponderi corporis aequalis, cujus di-  
rectio deorsum tendens per ejus centrum inertiae transit. Quare si cor-  
poris massa dicatur =  $M$ , ejusque centrum inertiae sit in  $I$ , indeque de-  
orsum ducatur recta verticalis  $IG$ , ob gravitatem corpus sollicitabitur  
in directione  $IG$  a vi, quae ipsius massae  $M$  aequalis est statuenda, quan-  
doquidem ipsam massam  $M$  per pondus hujus corporis exprimimus.  
Porro etiam axis gyrationis sit horizontalis, ad eum normaliter consti-  
tuatur planum per centrum inertiae  $I$  transiens, quod erit verticale, et  
ipso plano tabulae referatur: axis igitur gyrationis ad hoc planum nor-  
malis per punctum  $O$  trajectus concipiatur, unde ad  $I$  ducta recta  $OI$   
exhibet distantiam centri inertiae  $I$  ab axe gyrationis. His praemissis  
teneat nunc corpus  $AEBH$  situm in figura repraesentatum, ductaque  
verticali  $OC$ , ex angulo  $COI$  situs corporis innotescit. Ponatur in-  
tervallum  $OI = f$ , et ad tempus =  $t$ , angulus  $COI = \phi$ , erit vis  $IG$   
=  $M$  momentum respectu axis gyrationis =  $Mf \sin \phi$ , tendens ad an-  
gulum  $COI$  minuendum, quae in probl. 22. loco momenti  $Vf$  est sub-  
stituenda. Praeterea vero necesse est nosse momentum inertiae corpo-  
ris respectu axis gyrationis  $O$ , ibi per  $frdM$  indicatum: hunc in finem  
concipiatur axis per ipsum centrum inertiae  $I$  transiens axi gyrationis  
parallelus, cujus respectu sit momentum inertiae corporis =  $Mkk$ , erit-  
que ejusdem momentum inertiae respectu axis gyrationis  $O = M(f+kk)$   
ob intervallum horum axium  $OI = f$ . Hinc si corpus ita gyretur, ut  
recta  $OI$  accedat ad verticalem  $OC$ , fueritque celeritas angularis =  $\omega$ ,  
quia

## CAPUT VII. DE MOTU OSCILLATORIO &c. 209

quia ea a xi sollicitante augetur, per §. 408. erit  $ds = \frac{2g \cdot M f \sin \Phi}{M(f + kk)} dt$   
 seu  $ds = \frac{2fg dt \sin \Phi}{f + kk}$ ; sin autem recta OI recederet a verticali OI ce-  
 leritate angulari =  $\alpha$ , foret  $ds = \frac{-2fg dt \sin \Phi}{f + kk}$ . Cum autem illo casu  
 sit  $\alpha = \frac{-d\Phi}{dt}$ , hoc vero  $\alpha = \frac{d\Phi}{dt}$ , sumto  $dt$  constante pro utro-  
 que erit  $dd\Phi = \frac{-2fg dt \sin \Phi}{f + kk}$ , ubi signum - adest, quia momen-  
 tum vis sollicitantis tendit ad angulum  $\Phi$  minuendum.

### COROLL. 1.

§23. Si corpus in situ AEBF nullum adhuc habeat motum, a gra-  
 vitate ita rectam verticalem OC versus urgebitur, ut tempusculo  $dt$  eo  
 fit accessurum per angulum  $= \frac{fg dt \sin \Phi}{f + kk}$ , qui est infinite parvus se-  
 cundi ordinis.

### COROLL. 2.

§24. Si ergo corpus fuerit in quiete, in quiete persistere nequit  
 nisi sit  $\sin \Phi = 0$ , hoc est nisi centrum inertiae I in recta verticali OC  
 versetur. Quare si corpus quodcumque hoc modo suspendatur, in quiete  
 esse nequit, nisi recta OI sit verticalis, quod fit si centrum inertiae lo-  
 cum vel imum vel summum obtineat.

### COROLL. 3.

§25. Quoties autem recta OI fuerit obliqua, corpus ob gravitatem  
 ad motum sollicitabitur, ac si jam habuerit motum, ejus motus pertur-  
 babitur, vel accelerando vel retardando, prout motus vel ad OC ac-  
 cedat vel ab eo recedat.

### COROLL. 4.

§26. Patet etiam, si axis per ipsum centrum inertiae I transeat, ut  
 sit  $OI = f = 0$ , momentum gravitatis evanescere, motumque gyra-  
 torium propterea plane non turbari. Hoc ergo casu corpus vel qui-  
 escet, vel uniformiter circa axem O gyraabitur.



## SCHOLION.

527. Hic statim notari convenit, corpus non perinde moveri, ac si tota ejus massa in ipsius centro inertiae  $I$  esset collecta, quemadmodum in motu progressivo usu venire vidimus. Si enim hic tota corporis massa  $M$  revera in centro inertiae  $I$  esset collecta, ejus momentum inertiae respectu axis per  $I$  ducti evanesceret, foretque  $kk = 0$ ;

motusque ergo ita perturbaretur, ut esset  $dd\phi = \frac{-2gdt^2 f \phi}{f}$ , quae formula major est quam casu proposito. Unde intelligitur, motum corporis extensi, quale hic contemplamur, minus a gravitate perturbari, quam si tota corporis massa in centro inertiae esset collecta. Verum infra videbimus, dari in recta  $OI$  aliud punctum magis ab axe  $O$  remotum, in quo si tota corporis massa esset collecta, motus eandem perturbationem esset passurus, quod punctum in motu gyrationis imprimis notari meretur, quoniam est id ipsum quod vulgo *centrum oscillationis* appellari solet, et de cujus inventione plurima passim occurrunt praecepta.

## P R O B L E M A. 45.

Fig. 67. 528. Si corpus rigidum  $AEBF$  fuerit mobile circa axem horizontalem, ejusque detur situs et celeritas initio motus, ad tempus quodvis invenire ejus situm et celeritatem.

## S O L U T I O.

Manentibus omnibus uti in praecedente problemate, scilicet massa corporis  $= M$ , distantia centri inertiae  $I$  ab axe gyrationis  $O$  scilicet  $OI = f$ , et momento inertiae respectu axis ipsi axi gyrationis paralleli et per  $I$  transeuntis  $= Mkk$ ; teneat corpus elapso tempore  $= t$  situm in figura repraesentatum, sitque angulus  $COI = \phi$ , existente  $CO$  recta verticali, atque sumto elemento  $dt$  constante pervenimus ad hanc

aequationem  $dd\phi = \frac{-2fgdt^2 f \phi}{ff + kk}$ , quae per  $2d\phi$  multiplicata et integrata praebet

$$d\phi^2 =adt^2 + \frac{4fgdt^2 \cos \phi}{ff + kk}$$

unde cognoscitur quadratum celeritatis  $vs \Rightarrow a + \frac{4fg \cos \phi}{ff + kk}$ . Deinde  
posito

posito brevitatis gratia  $\frac{4fg}{f+k} = \lambda$ , ob  $d\phi^2 = dt^2 (a + \lambda \cos \phi)$  reperitur  $dt = \frac{d\phi}{r(a + \lambda \cos \phi)}$  et  $t = \int \frac{d\phi}{r(a + \lambda \cos \phi)}$ : ubi constans  $a$  et altera in ultima integratione ingressa ex statu initiali dato debent definiri.

## COROLL. 1.

529. Evanescente angulo  $\text{COI} = \phi$ , fit celeritas angularis  $\omega = r(a + \frac{4fg}{f+k})$  omnium maxima, in aequalibus autem elongationibus rectae  $\text{OI}$  a verticali  $\text{OC}$  celeritates sunt aequales: et nisi constans  $a$  fit minor, quam  $\frac{4fg}{f+k}$ , corpus integras revolutiones circa axem absolvet: quoniam tum pro angulo  $\phi = 180^\circ$  celeritas angularis adhuc est realis.

## COROLL. 2.

530. Sin autem fuerit  $a < \frac{4fg}{f+k}$ , angulus  $\text{COI} = \phi$  non ultra certum limitem crescere potest, corpusque cum eo pertigerit rursus descendet, motumque oscillatorium peraget: ac ducta  $\text{IK}$  horizontali ob  $\text{OK} = f \cos \phi$ , angulo elongationis  $\text{COI}$  respondebit celeritas angularis  $\omega = r(a + \frac{4g \cdot \text{OK}}{f+k})$ .

## SCHOLION.

531. Sive corpus integras revolutiones absolvat, sive oscillando eat redeatque, determinatio motus eundem calculum postulat, atque motus penduli simplicis, quo corpusculum infinite parvum filo inertiae experti alligatum circa axem horizontalem gyratur. Quem motum cum jam fufius supra exposuerimus, superfluum foret, eosdem calculos hic repetere: sufficiet igitur, pro quovis casu pendulum simplex assignasse, quod pari motu angulari feratur. Atque hic quidem tantum longitudo hujus penduli simplicis in computum venit, cum motus ejus solum ab ejus longitudine pendeat; siquidem initio utrique eundem motum angularem tribuimus.

## DEFINITIO. 9.

532. Pro motu gyratorio vel oscillatorio corporis cujusvis gravis circa axem horizontalem, *pendulum simplex isochronum* vocatur, quod cum

cum semel in pari a recta verticali elongatione parem celeritatem angularem acceperit, deinceps continuo simili motu angulari feratur.

## EXPLICATIO.

Fig. 67.

533. Si corpus ponatur quodcunque AEBF, quod a sola gravitate sollicitatum circa axem horizontalem O gyrètur, primo ejus centrum inertiae I spectandum est, quod si in recta verticali OC versetur, corporis situm naturalem, in quo acquiescat, indicat: angulus autem COI *elongatio a situ naturali* vocatur. Quodsi jam huic corpori in data elongatione datus motus angularis fuerit impressus, pendulum simplex isochronum ita debet esse comparatum, ut si ei in pari elongatione aequalis motus angularis imprimatur, deinceps hujus motus perpetuo sit respondurus motui corporis propositi. Vel quia totum negotium a longitudine hujus penduli simplicis pendet, si id fuerit OS atque ex communi axe O suspensum concipiatur, motu suo perpetuo motum corporis AEBF comitabitur, dummodo semel aequalem motum gyratorium acceperit. Periade quidem est, si hoc pendulum simplex eidem axi applicatum concipiatur, siue secus: sed quoniam utrinque elongationes a situ verticali OC perpetuo eadem esse debent, corporisque elongatio ex situ rectae OI est aestimanda, pendulum simplex commodissime in puncto O suspensum consideratur, ut ejus situs OS perpetuo in rectam OI incidat, totaque quaestio ad determinationem puncti S revocetur.

## COROLL. 1.

534. Invenio hoc punctum S in recta OI producta, corpus perinde movebitur, ac si tota ejus massa in ipso hoc puncto S esset collecta: tum enim ob extensionem evanescentem habetur pendulum simplex longitudinis OS.

## COROLL. 2.

538. Hoc ergo punctum S quaeri debet in recta, quae per centrum inertiae corporis ad axem gyrationis normaliter ducitur, etiamsi hic non sit necessarium, ut pendulum simplex OS ex eodem axis puncto O suspensum statuatur.

## SCHOLION.

536. Cum istud pendulum simili motu latum ob massae evanescentiam *simplex* vocetur, ad hunc modum corpora quaevis extensa circa axem fixum mobilia vocari solent *pendula composita*; ita ut quaestio huc

Huc reducatur, ut proposito quocunque pendulo composito, quod scilicet sit corpus rigidum, assignetur pendulum simplex isochronum, quam quaestionem nunc quidem facillime resolvere poterimus. Ceterum monendum est, filum, quo pendulum simplex axi alligatum intelligimus, non solum inertiae expers statui, sed etiam rigidum concipi oportere, ne ulla inflexio calculum turbare queat.

### PROBLEMA 46.

537. Proposito corpore quocunque rigido et gravi AEBF circa Fig. 67. axem horizontalem fixum O mobili, definire pendulum simplex isochronum OS.

### SOLUTIO.

Posita massa totius corporis = M ejusque centro inertiae in I, hinc ad axem ducatur recta normalis IO = f, quae jam a verticali OC distet angulo COI =  $\phi$ : tum vero sit Mkk momentum inertiae corporis respectu axis per I ducti et axi gyrationis paralleli. His positis, quicunque motus corpori initio fuerit impressus, elapso tempore = t, motus variatio hac formula exprimitur:

$$dd\phi = \frac{-2fgdt^2 \sin \phi}{ff + kk}$$
 Ponatur nunc penduli simplicis isochroni longitudo OS = l, quod cum eodem angulo COS =  $\phi$  a situ verticali distet, ejus motus hanc variationem patietur, ut sit 
$$dd\phi = \frac{-2gdt^2 \sin \phi}{l}$$
 quae quidem formula ex praecedente fluit, ponendo k = 0 et f = l. Quare cum eadem variatio utriusque evenire debeat, obtinemus 
$$l = \frac{ff + kk}{f}$$
 seu 
$$l = f + \frac{kk}{f}$$
.

### COROLL. 1.

538. Longitudo ergo penduli simplicis isochroni OS superat distantiam centri inertiae I ab axe gyrationis O, estque intervallum IS =  $\frac{kk}{f}$ . Cognita vero longitudine OS = l, erit  $kk = f(l - f) = OI \cdot IS$ , ita ut pro eodem corpore rectangulum OI. IS sit constans.

### COROLL. 2.

539. Si pro eodem corpore distantia OI = f varietur, patet, tam casu f = 0, quam f =  $\infty$ , pendulum simplex isochronum l evadere infinitum;

finitum; brevissimum autem erit, si capiatur  $f = k$ , quo casu fit  $l = 2k$ ; praeterea semper est  $l > 2k$ .

## COROLL. 3.

540. Invento pendulo simplici isochrono  $l$ , quoniam oscillationes minimae corporis perinde atque istius penduli sunt isochronae, tempus cujusque oscillationis erit  $= \frac{\pi \tau l}{\tau^2 g}$  min. sec. (215). Hinc si prodeat  $l = \frac{2g}{\pi \pi}$ , singulae oscillationes minimae corporis absolventur minutis secundis.

## SCHOLIUM.

541. Hinc colligitur methodus facilis cujusque corporis momentum inertiae practice definiendi. Suspenso enim corpore ex axe horizontali, circa quem liberrime gyronari queat, omni cura primo definiatur distantia centri inertiae  $I$  ab axe gyrationis  $O$ , nempe  $OI = f$ , quod etiam practice fieri potest: deinde corpus ad minimas oscillationes peragendas incitetur, pluribusque dato tempore numeratis, inde colligatur tempus unius oscillationis, quod sit  $= \tau$  min. sec. hincque habe-

bitur  $l = \frac{2g\tau\tau}{\pi\pi}$ : quo invento erit  $kk = f(l - f)$ , et pondus corporis

$M$  per  $kk$  multiplicatum dabit momentum inertiae, respectu axis per ejus centrum inertiae transeuntis et axi gyrationis paralleli. Potest etiam hoc experimentum multiplicari, dum corpus successive ex variis axibus, qui tamen sint inter se paralleli, suspenditur, quo certiores de vero valore  $kk$  reddamur. Quin etiam hinc vicissim longitudo penduli simplicis singulis minutis secundis oscillantis explorari potest, quandoquidem neque pendulis simplicibus uti licet, neque altitudo lapsus  $g$  uno minuto secundo absoluta satis accurate per experimenta lapsus determinari potest. Hinc autem pro corpore suspenso quantitates  $f$  et  $kk$  accurate nosse oportet, unde colligitur  $l = f + \frac{kk}{f}$ : tum si tempus unius oscillationis minimae  $\tau$  sit obser-

vatum, habebitur  $g = \frac{\pi\pi l}{2\tau\tau}$ , hincque longitudo penduli simplicis singulis minutis secundis oscillantis  $\frac{2g}{\pi\pi} = \frac{l}{\tau\tau}$ .

DEFI-

# OSCILLATORIO CORPORUM GRAVIUM. 21

## DEFINITIO. 10.

542. Centrum oscillationis in pendulo composito est punctum, in quo si tota corporis massa esset collecta, idem motus oscillatorius esset proditurus. Sumitur autem in recta, quae per centrum inertiae corporis transiens ad axem gyrationis est normalis.

### COROLL. 1.

543. Distantia ergo centri oscillationis ab axe gyrationis aequalis est longitudini penduli simplicis isochroni: ac semper ab axe gyrationis  $O$  magis distat, quam centrum inertiae, intervallo  $IS = \frac{kk}{f}$ .

### COROLL. 2.

544. Ad centrum igitur oscillationis  $S$  inveniendum nosse oportet momentum inertiae corporis respectu axis per ejus centrum inertiae  $I$  transeuntis et axi gyrationis paralleli, quod si fuerit  $Mkk$ , dividi debet per  $Mf$ , hoc est per productum ex massa corporis  $M$  in distantiam axis gyrationis a centro inertiae  $OI = f$ , et quotus  $\frac{Mkk}{Mf}$  ostendet distantiam centri oscillationis a centro inertiae.

### SCHOLION.

545. Hoc modo investigatio motus pendulorum compositorum ad centri oscillationis investigationem perducitur solet, etsi ad hoc sufficit, longitudinem penduli simplicis isochroni nosse, neque ulla ratio urget, ut hoc pendulum eidem axi suspensionis, et quidem secundum rectam per centrum inertiae ad axem suspensionis normaliter ductam applicatum concipiatur. Verum hic modus rem concipiendi est commodissimus, et si corpus in situ quietis pendeat, ut recta per centrum inertiae ad axem normaliter ducta summi sit verticalis, centrum oscillationis in eadem recta profundius quam centrum inertiae erit situm; neque enim hic opus est, ut corpus tanquam in motu spectetur. Ita recta  $OI$  in verticalem  $OC$  incidens consideratur, in qua erit centrum oscillationis  $S$  profundius situm centro inertiae  $I$ , quod hic revera nomen *centri gravitatis* obtinet, ita ut sit intervallum  $IS = \frac{Mkk}{Mf} = \frac{kk}{f}$ . Quare calculus centri oscillationis facillime expeditur calculo, quem supra pro momento inertiae inveniundo tradidimus.

D d 2

EXEM.

finitum; brevissimum autem erit, si capiatur  $f = k$ , quo casu fit  $l = 2k$ ; praeterea semper est  $l > 2k$ .

## COROLL. 3.

540. Invento pendulo simplici isochrono  $l$ , quoniam oscillationes minimae corporis perinde atque istius penduli sunt isochronae, tempus cujusque oscillationis erit  $= \frac{\pi \tau l}{\tau^2 g}$  min. sec. (215). Hinc si prodeat  $l = \frac{2g}{\pi \pi}$ , singulae oscillationes minimae corporis absolventur minutis secundis.

## SCHOLION.

541. Hinc colligitur methodus facilis cujusque corporis momentum inertiae practice definiendi. Suspenso enim corpore ex axe horizontali, circa quem liberrime gyrationi queat, omni cura primo definiatur distantia centri inertiae  $I$  ab axe gyrationis  $O$ , nempe  $OI = f$ , quod etiam practice fieri potest: deinde corpus ad minimas oscillationes peragendas incitetur, pluribusque dato tempore numeratis, inde colligatur tempus unius oscillationis, quod sit  $= \tau$  min. sec. hincque habebitur  $l = \frac{2g \tau \tau}{\pi \pi}$ : quo invento erit  $kk = f(I - f)$ , et pondus corporis

$M$  per  $kk$  multiplicatum dabit momentum inertiae, respectu axis per ejus centrum inertiae transeuntis et axi gyrationis paralleli. Potest etiam hoc experimentum multiplicari, dum corpus successive ex variis axibus, qui tamen sint inter se paralleli, suspenditur, quo certiores de vero valore  $kk$  reddamur. Quin etiam hinc vicissim longitudo penduli simplicis singulis minutis secundis oscillantis explorari potest, quandoquidem neque pendulis simplicibus licet, neque altitudo lapsus  $g$  uno minuto secundo absoluta rate per experimenta lapsus determinari potest. Hinc tempore suspenso quantitates  $f$  et  $kk$  accurate nosse oportet.

tur  $l = f + \frac{kk}{f}$ : tum si tempus unius oscillationis

vatum, habebitur  $g = \frac{\pi \pi l}{2 \tau \tau}$ , hincque longitudo

gulis minutis secundis oscillantis  $\frac{2g}{\pi \pi} = \frac{l}{\tau^2}$

DEFINITIO. 10.

542. Centrum oscillationis in pendulo composito est punctum, in quo si tota corporis massa esset collecta, idem motus oscillatorius esset proditurus. Sumitur autem in recta, quae per centrum inertiae corporis transiens ad axem gyrationis est normalis.

COROLL. 1.

543. Distantia ergo centri oscillationis ab axe gyrationis aequalis est longitudini penduli simplicis isochroni: ac semper ab axe gyrationis  $O$  magis distat, quam centrum inertiae, intervallo  $IS = \frac{Ik}{f}$ .

COROLL. 2.

544. Ad centrum igitur oscillationis  $S$  inveniendum nosse oportet momentum inertiae corporis respectu axis per ejus centrum inertiae  $I$  transeuntis et axi gyrationis paralleli, quod si fuerit  $= Mkk$ , dividi debet per  $Mf$ , hoc est per productum ex massa corporis  $M$  in distantiam axis gyrationis a centro inertiae  $OI = f$ , et quotus  $\frac{Mkk}{Mf}$  ostendet distantiam centri oscillationis a centro inertiae.

SCHOLIUM.

545. Hoc modo investigatio motus pendulorum ad centri oscillationis investigationem perducitur, et si ad hoc cit, longitudinem penduli simplicis isochroni nosse oportet, ut hoc pendulum eidem axi suspendatur, et quod rectam per centrum inertiae ad axem gyrationis applicatum recipiatur, hic modissimum si corpus iniet inertiae normalis si latione in recta as q neque opus rpu recta verticaliter ens oscilatio profu ce in asslat in C lus ce ment



finitum; brevissimum autem erit, si capiatur  $f = k$ , quo casu fit  $l = 2k$ ; praeterea semper est  $l > 2k$ .

## COROLL. 3.

540. Invento pendulo simplici isochrono  $l$ , quoniam oscillationes minimae corporis perinde atque istius penduli sunt isochronae, tempus cujusque oscillationis erit  $= \frac{\pi \tau l}{\tau^2 g}$  min. sec. (215). Hinc si prodeat  $l = \frac{2g}{\pi \pi}$ , singulae oscillationes minimae corporis absolventur minutis secundis.

## SCHOLIUM.

541. Hinc colligitur methodus facilis cujusque corporis momentum inertiae practice definiendi. Suspenso enim corpore ex axe horizontali, circa quem liberrime gyroni queat, omni cura primo definiatur distantia centri inertiae  $I$  ab axe gyrationis  $O$ , nempe  $OI = f$ , quod etiam practice fieri potest: deinde corpus ad minimas oscillationes peragendas incitetur, pluribusque dato tempore numeratis, inde colligatur tempus unius oscillationis, quod sit  $= \tau$  min. sec. hincque habetur

$l = \frac{2g\tau\tau}{\pi\pi}$ : quo invento erit  $kk = f(l - f)$ , et pondus corporis

$M$  per  $kk$  multiplicatum dabit momentum inertiae, respectu axis per ejus centrum inertiae transeuntis et axi gyrationis paralleli. Potest etiam hoc experimentum multiplicari, dum corpus successive ex variis axibus, qui tamen sint inter se paralleli, suspenditur, quo certiores de vero valore  $kk$  reddamur. Quin etiam hinc vicissim longitudo penduli simplicis singulis minutis secundis oscillantis explorari potest, quandoquidem neque pendulis simplicibus uti licet, neque altitudo lapsus  $g$  uno minuto secundo absoluta satis accurate per experimenta lapsus determinari potest. Hinc autem pro corpore suspenso quantitates  $f$  et  $kk$  accurate nosse oportet, unde colligitur  $l = f + \frac{kk}{f}$ : tum si tempus unius oscillationis minimae  $\tau$  sit observatum, habebitur  $g = \frac{\pi\pi l}{2\tau\tau}$ , hincque longitudo penduli simplicis singulis minutis secundis oscillantis  $\frac{2g}{\pi\pi} = \frac{l}{\tau\tau}$ .

DEFL.

# OSCILLATORIO CORPORUM GRAVIUM. 321

## DEFINITIO. 10.

542. Centrum oscillationis in pendulo composito est punctum, in quo si tota corporis massa esset collecta, idem motus oscillatorius esset proditurus. Sumitur autem in recta, quae per centrum inertiae corporis transiens ad axem gyrationis est normalis.

## COROLL. 1.

543. Distantia ergo centri oscillationis ab axe gyrationis aequalis est longitudini penduli simplicis isochroni; ac semper ab axe gyrationis  $O$  magis distat, quam centrum inertiae, intervallo  $IS = \frac{k^2}{f}$ .

## COROLL. 2.

544. Ad centrum igitur oscillationis  $S$  inveniendum nosse oportet momentum inertiae corporis respectu axis per ejus centrum inertiae  $I$  transeuntis et axi gyrationis paralleli, quod si fuerit  $= Mkk$ , dividi debet per  $Mf$ , hoc est per productum ex massa corporis  $M$  in distantiam axis gyrationis a centro inertiae  $OI = f$ , et quotus  $\frac{Mkk}{Mf}$  ostendet distantiam centri oscillationis a centro inertiae.

## SCHOLION.

545. Hoc modo investigatio motus pendulorum compositorum ad centri oscillationis investigationem perducitur solet, etsi ad hoc sufficit, longitudinem penduli simplicis isochroni nosse, neque ulla ratio urget, ut hoc pendulum eidem axi suspensionis, et quidem secundum rectam per centrum inertiae ad axem suspensionis normaliter ductam applicatum concipiatur. Verum hic modus rem concipiendi est commodissimus, et si corpus in situ quietis pendeat, ut recta per centrum inertiae ad axem normaliter ducta simul sit verticalis, centrum oscillationis in eadem recta profundius quam centrum inertiae erit situm; neque enim hic opus est, ut corpus tanquam in motu spectetur. Ita recta  $OI$  in verticalem  $OC$  incidens consideratur, in qua erit centrum oscillationis  $S$  profundius situm centro inertiae  $I$ , quod hic revera nomen centri gravitatis obtinet, ita ut sit intervallum  $IS = \frac{Mkk}{Mf} = \frac{k^2}{f}$ . Quare calculus centri oscillationis facillime expeditur calculo, quem supra pro momento inertiae inveniundo tradidimus.

## EXEMPLUM.

Fig. 68.

546. Experimenta ante memorata globo ex materia homogenea confecto institui solent, qui ope fili OB suspensus ad minimas oscillationes incitatur, ubi quidem filum tam tenue est sumendum, ut ejus massa prae globo pro nihilo haberi liceat. Sit igitur radius globi  $BI = b$ , et distantia puncti suspensionis O a centro globi I, quod simul ejus est centrum inertiae vel gravitatis, nampe  $OI = f$ , erit ut supra invenimus  $kk = \frac{2}{3}bb$ . Quare centrum oscillationis erit in S, ut sit  $IS = \frac{2bb}{5f}$ , seu oscillationes convenient cum oscillationibus penduli simplicis, cujus longitudo est  $= f + \frac{2bb}{5f}$ . Ut ergo hoc pendulum singulis minutis secundis oscilletur, necesse est sit  $f + \frac{2bb}{5f} = \frac{2g}{\pi\pi}$  seu  $ff = \frac{2gf}{\pi\pi} - \frac{2}{5}bb$ , unde  $f = \frac{g}{\pi\pi} \pm \sqrt{\left(\frac{g}{\pi\pi}\right)^2 - \frac{2}{5}bb}$ , ita ut pro  $f$  duplex habeatur valor, qui simul fonti deat  $\frac{2g}{\pi\pi}$ . Hi jambo valores fient aequales, si globus tantus accipiat, ut sit  $bb = \frac{gg}{2\pi\pi}$ , et  $b = \frac{g}{\pi\pi}$ ; hoc est in pedibus Rhenanis debet esse radius globi  $= 2,50317$ , ac tum distantia  $OI = f$  fit  $= 1,583144$  ped. ita ut punctum suspensionis seu axis gyrationis intra globum capi debeat. Cum autem sit  $f = \frac{g}{\pi\pi} = b\sqrt{\frac{2}{5}}$  seu  $f = k$ , evidens est hoc casu globum celerrime oscillari. Scilicet si sit  $Ia = b\sqrt{\frac{2}{5}}$ , ducta horizontali  $\mu$ , quae axem gyrationis referet, erit  $\cos B\mu = \sqrt{\frac{2}{5}}$ , ideoque arcus  $B\mu = 50^\circ, 46'$ . Sin autem globus fuerit valde parvus, ut fieri solet, ad minuta secunda producenda sumi debet  $OI = \frac{2g}{\pi\pi} - \frac{\pi\pi bb}{5g}$ ; quare ut globus ex ipsa puncto B suspensus hoc praestet, ejus radius debet esse  $b = \frac{(f^2 - \frac{2g}{\pi\pi})g}{2\pi\pi} = 0,155136g$  proxime.

## PROBLEMA. 47.

547. Si corpus rigidum circa axem horizontalem mobile pluribus constet partibus, quarum singularum centra inertiae et momenta inertiae sint cognita, definire totius corporis centrum oscillationis.

SO.

## SOLUTIO.

Axis gyrationis horizontalis ad planum figurae in puncto O normalis concipiatur, sintque A, B, C, D centra inertiae partium, ex quibus corpus est compositum, quarum partium massae sint A, B, C, D, et momenta inertiae respectu axium ipsi axi gyrationis parallelorum et per cuiusque centrum inertiae transeuntium  $Aa^2, Bb^2, Cc^2, Dd^2$ : centra autem inertiae distent ab axe gyrationis intervallis AO, BO, CO, DO; perinde enim est, siue haec intervalla ad idem axis punctum O tendant, siue ad diversa, quoniam tam momenta gravitatis quam momenta inertiae tantum a distantia ab axe pendent, neque diversitas puncti O quicquam eo confert. Primum ergo centrum inertiae I totius corporis, cuius massa sit  $M = A + B + C + D$ , definiatur, quod in tali recta OI erit situm, ut sit  $AOA \cdot \cos AOI + BOB \cdot \cos BOI = COC \cdot \cos COI + DOD \cdot \cos DOI$ : tum vero erit:

$$M \cdot OI = A \cdot AO \cdot \cos AOI + B \cdot BO \cdot \cos BOI + C \cdot CO \cdot \cos COI + D \cdot DO \cdot \cos DOI,$$

quae quantitas in superiori formula  $IS = \frac{M \cdot k}{Mf}$  loco  $Mf$  scribi debet. At momentum inertiae totius corporis respectu axis gyrationis  $M(f + kk)$  ex partibus ita componitur, ut sit:

$$A(AO^2 + aa) + B(BO^2 + bb) + C(CO^2 + cc) + D(DO^2 + dd).$$

Quare cum sit  $OS = \frac{M(f + kk)}{Mf}$ , erit:

$$OS = \frac{A(AO^2 + aa) + B(BO^2 + bb) + C(CO^2 + cc) + D(DO^2 + dd)}{A \cdot AO \cdot \cos AOI + B \cdot BO \cdot \cos BOI + C \cdot CO \cdot \cos COI + D \cdot DO \cdot \cos DOI}.$$

### COROLL. 1.

348. Si singulae partes seorsum considerentur, earumque centra oscillationis statuatur in punctis  $a, b, c, d$ , ob  $Oa = \frac{A(AO^2 + aa)}{A \cdot OA}$ , erit

$$OS = \frac{A \cdot OA \cdot Oa + B \cdot OB \cdot Ob + C \cdot OC \cdot Oc + D \cdot OD \cdot Od}{A \cdot OA \cdot \cos AOI + B \cdot OB \cdot \cos BOI + C \cdot OC \cdot \cos COI + D \cdot OD \cdot \cos DOI}.$$

### COROLL. 2.

349. Invenio autem centro inertiae seu gravitatis totius corporis I loco denominatoris poni potest  $M \cdot OI$ : per praecepta autem statica centrum gravitatis totius corporis ex datis centris gravitatis partium facile colligitur.

### EXEMPLUM.

350. Sit pendulum compositum ex virga cylindrica recta ACB et globo illi annexo BEDF, quod circa axem horizontalem e Of sit mobile, cuius Fig. 70.

Dd 3

ius centrum oscillationis S quaeratur. Virga autem et globus consent ex materia uniformi, ponaturque virgae longitudo  $AB = a$ , pondus  $= A$ , et extremitatis B ab axe gyrationis O distantia  $BO = b$ , basis autem hujus cylindri radius  $= c$ ; erit ejus centrum inertiae in C, ut sit  $AC = BC = \frac{1}{2}a$ , et  $OC = b - \frac{1}{2}a$ , momentum vero inertiae respectu axis per C ducti et axi gyrationis paralleli  $= A(\frac{1}{12}aa + \frac{1}{4}cc)$ . Porro globi annexi sit massa  $= E$ , radius  $BG = e$ , erit ejus centrum inertiae in G et momentum inertiae  $= \frac{1}{2}Eee$ . Sit jam totius corporis centrum inertiae in I erit  $(A + E)$ .  $OI = A(b - \frac{1}{2}a) + E(e + b) = Mf$ ; deinde momentum inertiae respectu axis gyrationis  $= A(\frac{1}{12}aa + \frac{1}{4}cc + (b - \frac{1}{2}a)^2) + E(\frac{1}{2}ee + (b + e)^2)$  quod loco  $M(ff + k)$  substitui debet. Sicque centrum oscillationis erit in S ut fit:

$$OS = \frac{A(\frac{1}{4}aa - ab + bb + \frac{1}{4}cc) + E(bb + 2be + \frac{1}{4}ee)}{A(b - \frac{1}{2}a) + E(b + e)}$$

ergo qb  $OG = b + e$  fiet

$$GS = \frac{A(bc + \frac{1}{2}ab - \frac{1}{2}ac - \frac{1}{4}aa - \frac{1}{4}cc) - E.\frac{1}{2}ee}{A(b - \frac{1}{2}a) + E(b + e)}$$

C O R O L L. 1.

551. Si axis gyrationis O capiatur in summitate virgae A, ut sit  $b = a$ , erit

$$OS = \frac{A(\frac{1}{4}aa + \frac{1}{4}cc) + E(aa + 2ae + \frac{1}{4}ee)}{A.\frac{1}{2}a + E(a + e)}$$

$$\text{et } GS = \frac{A(\frac{1}{2}ae + \frac{1}{2}aa - \frac{1}{4}cc) - E.\frac{1}{2}ee}{A.\frac{1}{2}a + E(a + e)}$$

si quidem sumamus punctum S supra G cadere.

C O R O L L. 2.

552. Si sit exempli gratia  $E = 30 A$ ;  $a = b = 3$  ped.  $e = \frac{1}{2}$  ped. et  $c = \frac{1}{2}$  ped. ita ut  $cc$  tuto negligi possit, erit  $OG = 3\frac{1}{15} = 3,0833$

$$\text{et } OS = \frac{3 + 285\frac{7}{8}}{1\frac{1}{2} + 92\frac{1}{2}} = \frac{828\frac{7}{8}}{94} = 3,0669, \text{ hocque casu punctum S}$$

supra G cadit; sin autem massa virgae evanesceret, foret  $OS = 3,0842$ , sicque S infra G caderet;

S C H O L I O N.

553. Hic postremus casus ideo est notatu dignus, quod vulgo filum, si fuerit valde tenue ac leve respectu globi, vix quicquam ad centrum

trum oscillationis conferre videatur. hic enim certe, etsi globus tricies ponderosior est. filo, hujus ratio sine insigni errore negligi non posset. Ponamus enim, hoc pendulum oscillationes absolvisse minutis secundis, hincque longitudinem penduli simplicis isochroni determinari oportere. Haec igitur neglecta, fili massa prodiret = 3, 0842 ped. cum tamen revera tantum sit 3, 0659 ped. ita ut error 0, 0173 ped. =  $2\frac{1}{2}$  lin. committeretur minime certe tolerandus. Sin autem manentibus reliquis dimensionibus, filum adhuc levius atque E = 60 A esset, foret OS =  $\frac{3 + 570 \frac{1}{2}}{1\frac{1}{2} + 185} = 3, 0782$ , cujus loco si sumeretur 3, 0842 error committeretur = 0, 0060 ped. =  $\frac{1}{2}$  lin.

PROBLEMA. 48.

Fig. 71.

554. Si pendulum constet ex virga tenuissima OB inertiae experte rigida tamen, et globo BEDF, invenire locum, ubi alius globus datus eidem virgae affigi debeat, ut oscillationes fiant promptissimae.

SOLUTIO.

Cum in O sit axis gyrationis, sit distantia OG = b, et radius globi infra affixi BG = c; massaeque hujus globi = B; tum alterius globi affigendi sit massa = L, et radius QK = c, pro loco autem ejus quaesito distantia OQ = q. His positis sit I centrum inertiae commune, erit (B + L) OI = Bb + Lq = Mf, tum vero momentum inertiae totius penduli respectu axis gyrationis = B ( $\frac{2}{3}cc + bb$ ) + L ( $\frac{2}{3}cc + qq$ ) = M (ff + kk). Quare si centrum oscillationis statuatur in S, erit OS =  $\frac{Bb + Lq}{B (\frac{2}{3}cc + bb) + L (\frac{2}{3}cc + qq)}$ , quae longitudo minima esse debet, ut

oscillationes fiant promptissimae. Hinc prodit ista aequatio:  
 $2BL bq - BL (\frac{2}{3}cc + bb) - \frac{2}{3}LL cc + LL qq = 0$   
 seu  $Lq = -Bb + \frac{1}{3}(BB bb + BL bb + \frac{2}{3}BL cc + \frac{2}{3}LL cc)$   
 unde innotescit distantia OQ = q: ex qua porro colligitur longitudo penduli simplicis isochroni

$$OS = \frac{\frac{2}{3}r (BB bb + BL bb + \frac{2}{3}BL cc + \frac{2}{3}LL cc) - \frac{2Bb}{L}}{L} = 2q.$$

Hinc siambo globi ex eadem materia fuerint confecti, quia B: L = c<sup>3</sup>: c<sup>3</sup> erit OS =  $\frac{2r (c^6 bb + c^3 c^3 bb + \frac{2}{3}c^3 c^3 + \frac{2}{3}c^3 c^3) - 2c^3 b}{c^3}$

et OQ = q =  $\frac{r (c^6 bb + c^3 c^3 bb + \frac{2}{3}c^3 c^3 + \frac{2}{3}c^3 c^3) - c^3 b}{c^3}$

CO.

## COROLL. 1.

555. Si diametri globorum fuerint minimi, ut  $cc$  et  $cc$  prae  $bb$  negligi queant, distantia  $OQ = q$  ita capi debet, ut sit  $OQ = \frac{r^{B(B+L)} - B}{L}$ , et longitudo penduli simplicis isochroni erit  $= 2 \cdot OQ = 2b \cdot \frac{r^{B(B+L)} - B}{L}$ .

## COROLL. 2.

556. Si globus alter  $KLMN$  plane omitteretur, foret  $OS = b + \frac{2cc}{sb}$ , quae maior est, quam adjuncto isto globo, si fuerit  $b + \frac{2cc}{sb} > 2r^{\frac{1}{2}}$ . Unde nisi sit  $e > \frac{r^{\frac{1}{2}}}{2r^{\frac{1}{2}}}(b + \frac{2cc}{sb})$ , hoc alterq. globo adjungendo oscillationes promptiores reddi possunt.

## COROLL. 3.

557. Sin. autem fuerit  $e = \frac{r^{\frac{1}{2}}}{2r^{\frac{1}{2}}}(b + \frac{2cc}{sb})$  quantacunque etiam fuerit hujus globi massa  $L$ , pro oscillationibus celerrimis obtinendis sumi debet  $OQ = q = \frac{1}{2}b + \frac{cc}{sb}$ , et tum longitudo penduli simplicis isochroni erit  $= b + \frac{2cc}{sb}$ , omnia ac si globus  $KLMN$  removeretur.

## COROLL. 4.

558. Si ambo globi fuerint aequales, ut sit  $L = B$  et  $e = c$ , oscillationes promptissimae evadent, capiendo  $OQ = q = r(2bb + \frac{1}{2}cc) - b$ ; ac si  $cc$  prae  $bb$  negligere liceat,  $OQ = OG(r^2 - 1)$ ; hincque longitudo penduli simplicis isochroni  $= 2OG(r^2 - 1) = 0, 828427 \cdot OG$ .

## COROLL. 5.

559. Si ambo globi ex eadem materia constent, definiri potest globi  $KLMN$  radius  $e$ , ut eo rite adjungendo oscillationes fiant promptissime; scilicet  $e$  quaeri debet ex hac aequatione,  $16e^{10} - 48c^2e^8 - 600bbe^6cc + 9c^6(5bb + 2cc)^2 = 0$ .  $-120bbe^3e^5$

## SCHOLION.

560. Ceterum patet, quo minor sit radius  $e$  globi  $KLMN$  manente ejus massa  $L$ , eo minorem prodire distantiam  $OQ = q$ , ideoque eo promptius.

promittentes forte oscillationes. At vero manente radio  $e$  oscillationes  
 fient celerrimae, si massa  $L$  globi affigendi fuerit quam maxima; nam si  
 esset  $L = 0$ , foret  $OS = b + \frac{2cc}{5b}$ , qui est valor maximus, si qui-  
 dem affigendo altero globi oscillationes crebriores reddi possunt. At  
 vero si fuerit  $5bb + 2cc = 2bcr$ , seu  $e = \frac{5bb + 2cc}{2bcr}$ , quantacunque fu-  
 erit hujus globi massa  $L$ , eo rite annexo oscillationes manent ejusdem  
 durationis, et si hic globus adhuc fuerit major, oscillationes adeo tar-  
 diiores evadent. Quodsi ambo globi ex materia aeque gravi fuerint  
 confecti, magnitudo affigendi, ut motus oscillatorius fiat rapidissimus,  
 ex aequatione decimi gradus definiri debet: verum si axis per centrum  
 $G$  globi  $BCDF$  transeat, ut sit  $b = 0$ , inde prodit  $e = cr^{\frac{1}{2}}$ ; pro ra-  
 dio globi affigendi, et pro ejus loco  $OQ = q = r \left( \frac{5}{3} + \frac{1}{3}e^2 \right) =$   
 $cr^{\frac{1}{2}}$ , et longitudo penduli simplicis isochroni  $= 2cr^{\frac{1}{2}}$ . Axis  
 ergo gyrationis per centrum prioris globi transiens alterum ita trajicere  
 debet, ut ab ejus centro distet intervallo  $OQ = cr^{\frac{1}{2}}$ , quod minus  
 est ejus radio  $e = cr^{\frac{1}{2}}$ . Hujusmodi autem quaestiones circa motum  
 oscillatorium plures proponere possent, quae autem ex stabilitis hic prin-  
 cipiis non difficulter solvantur. Plurimum autem intererit investigare,  
 quantas vires ipse axis gyrationis inter motum sustineat.

## PROBLEMA. 49.

561. Dum corpus rigidum grave circa axem horizontalem fixum Fig. 72.  
 $OA$  gyratur, ad quodvis tempus definire vires, quas axis in datis duo-  
 bus punctis  $O$  et  $A$  sustinet.

## SOLUTIO.

Repraesentet tabula planum verticale per axem gyrationis  $OA$  tran-  
 siens, verseturque jam centrum inertiae corporis extra hoc planum in  $I$ ,  
 unde tam ad planum verticale, quam ad axem ducantur perpendiculares  
 $IK$  et  $IG$ , erit angulus  $IGK = \phi$  elongatio corporis a situ naturali, ac  
 posita distantia  $IG = f$ , erit  $KI = f \sin \phi$  et  $IK = f \cos \phi$ . Tum sit  
 massa corporis  $= M$ , quae cum simul ejus pondus exprimat, vis solli-  
 citans erit  $= M$  in directione verticali  $IY$  agens, cujus momentum  $=$   
 $Mf \sin \phi$  tendit ad angulum  $IGK$  minuendum. Deinde consideretur

Ec

elemen-



elementum corporis quodcunque  $dM$  in  $Z$ , unde ad planum verticale et axem ductis perpendicularis  $ZY$ ,  $ZX$  vocentur coordinatae  $OX = x$ ,  $XY = y$ , et  $YZ = z$ , eritque  $OG = \frac{\int x dM}{M}$ ,  $GK = \frac{\int y dM}{M}$  et  $KI = \frac{\int z dM}{M}$ : posita autem distantia  $XZ = r$ , ( $yy + zz$ ) =  $r$ , exprimit  $\int r dM$  momentum inertiae corporis respectu axis  $OA$ , quod fit =  $Mkk$ : denique ponatur distantia punctorum axis  $OA = a$ , et per ambo ducantur rectae  $BOb$ ,  $COc$  et  $EAe$ ,  $FAf$  ipsis  $KG$  et  $KI$  parallelae. His praeparatis secundum ductum probl. 23. primum observo nullam adesse vim, cujus directio cum axe fit in eodem plano: cum autem hic momentum vis  $Mf\dot{\phi}$  in sensum contrarium vergat, atque ibi sumimus, erit  $V\dot{f} = -Mf\dot{\phi}$ .

Nunc igitur ob vim  $IV = M$ , quae axi in  $G$  secundum directionem  $GK$  applicata est concipienda, axis in punctis  $O$  et  $A$  has sustinebit vires:

$$\text{sec. } OB \text{ vim} = \frac{M \cdot AG}{a}; \text{ sec. } AE \text{ vim} = \frac{M \cdot OG}{a}$$

Quibuscum conjungendae sunt illae, quae ex viribus elementaribus contrarie applicatis nascuntur: quae sunt

$$\text{pro termino } O \begin{cases} \text{sec. } Ob \text{ vis} = \frac{f\dot{\phi}\Phi \cdot f(a-x)z dM}{akk} \\ \text{sec. } OC \text{ vis} = \frac{f\dot{\phi}\Phi \cdot f(a-x)y dM}{akk} \end{cases}$$

$$\text{pro termino } A \begin{cases} \text{sec. } Ae \text{ vis} = \frac{f\dot{\phi}\Phi \cdot fxyz dM}{akk} \\ \text{sec. } Af \text{ vis} = \frac{f\dot{\phi}\Phi \cdot fxy dM}{akk} \end{cases}$$

hasque vires axis ob actionem gravitatis corporis sustinet, verum ob motum, quo jam gyratur, si celeritas gyratoria vocetur =  $\omega$ , axis in punctis  $O$  et  $A$  has vires sustinet:

$$\text{pro termino } O \begin{cases} \text{sec. } OB \text{ vim} = \frac{\omega \omega f(a-x)y dM}{2ag} \\ \text{sec. } OC \text{ vim} = \frac{\omega \omega f(a-x)z dM}{2ag} \end{cases}$$

pro

$$\begin{aligned} \text{pro termino A} \quad \left\{ \begin{aligned} \text{sec. AE vim} &= \frac{22 f x y d M}{2 a g} \\ \text{sec. AF vim} &= \frac{22 f x z d M}{2 a g} \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

COROLL. 1.

562. Si distantiae terminorum O et A a puncto G vocentur  $OG = b$  et  $AG = c$ , ut sit  $a = b + c$ ; tum vero ponatur  $GX = u$ , erit  $x = b - u$  et  $a - x = c + u$ ; ideo

$$\begin{aligned} f(a-x)zdM &= f(c+u)zdM = Mc \cdot KI + fuzdM \\ f(a-x)ydM &= f(c+u)ydM = Mc \cdot GK + fuydM \\ fxyzdM &= f(b+u)zdM = Mb \cdot KI - fuzdM \\ fxydM &= f(b-u)ydM = Mb \cdot GK - fuydM. \end{aligned}$$

COROLL. 2.

563. His valoribus introductis axis in puncto O has vires sustinet: primo secundum directionem OB vim

$$\frac{Mc}{a} - \frac{Mc f f \Phi \cdot KI}{akk} - \frac{f f \Phi \cdot fuzdM}{akk} + \frac{22 Mc \cdot GK}{2ag} + \frac{22 fuydM}{2ag}$$

deinde secundum directionem OC vim

$$\frac{Mc f f \Phi \cdot GK}{akk} + \frac{f f \Phi \cdot fuydM}{akk} + \frac{22 Mc \cdot KI}{2ag} + \frac{22 fuzdM}{2ag}$$

At vero in puncto A istas:

primo secundum directionem AE vim

$$\frac{Mb}{a} - \frac{Mb f f \Phi \cdot KI}{akk} + \frac{f f \Phi \cdot fuzdM}{akk} + \frac{22 Mb \cdot GK}{2ag} - \frac{22 fuydM}{2ag}$$

deinde secundum directionem AF vim

$$\frac{Mb f f \Phi \cdot GK}{akk} - \frac{f f \Phi \cdot fuydM}{akk} + \frac{22 Mb \cdot KI}{2ag} - \frac{22 fuzdM}{2ag}$$

COROLL. 3.

564. Si corpus ita fuerit comparatum, ut a plano ICK in duas partes similes et aequales dividatur, sitque  $GO = GA = \frac{1}{2} a$ , ob  $fuzdM = 0$  et  $fuydM = 0$ , axis in puncto O sustinebit has vires

$$\text{sec. OB vim} = \frac{1}{2} M - \frac{M f f \Phi \cdot KI}{2kk} + \frac{22 M \cdot GK}{4g}$$

Ee 2

fec.

$$\text{sec. OC vim} = \frac{Mff\phi.GK}{2kk} + \frac{22.M.KI}{4g}$$

in puncto autem A sustinebit has vires

$$\text{sec. AE vim} = \frac{1}{2} M - \frac{Mff\phi.KI}{2kk} + \frac{22.M.GK}{4g}$$

$$\text{sec. AF vim} = \frac{Mff\phi.GK}{2kk} + \frac{22.M.KI}{4g}$$

hoc ergo casu vires non a magnitudine distantiae OA = a pendent.

#### COROLL. 4.

565. Hoc ergo casu, quo  $f\sin\phi M = 0$  et  $f\sin\phi M = 0$ , nihil impedit, quominus distantia OA = a evanescens accipiat, atque axis in unico puncto G retineri poterit, hinc quippe sustinet binas vires

$$\text{alteram secundum GK} = M - \frac{Mff\phi^2}{kk} + \frac{M22f\cos\phi}{2g}$$

$$\text{alteram secundum GH} = \frac{Mff\phi\cos\phi}{kk} + \frac{M22f\phi}{2g}$$

existente GH ipsi KI parallela,

#### SCHOLIUM.

566. Corpora, quae vulgo ad motum oscillatorium adhiberi solent, ita sunt comparata, ut plano, quod per eorum centrum inertiae ad axem gyrationis normaliter ducitur, in duas portiones aequales et similes secantur: de iis igitur locum habet, quod axis in unico puncto retineri queat. Scilicet si figura 67. representet planum verticale per talis corporis centrum inertiae I ductum et ad axem gyrationis normale, qui figurae in O normaliter insillere concipiatur, existente OC recta verticali, et OH in hoc plano horizontali, axis in puncto ipso O vires modo indicatas sustinebit. Nempe si angulus COI ponatur =  $\phi$ , distantia OI = f, massa corporis = M, ejus momentum inertiae respectu axis gyrationis = Mkk, et celeritas angularis in hoc statu fit =  $\phi$ , sive ad angulum COI augendum tendat, sive minuendum, axis O sustinet duas vires.

$$\text{alteram secundum OC} = M - \frac{Mff\phi^2}{kk} + \frac{M22f\cos\phi}{2g}$$

$$\text{alteram secundum OH} = \frac{Mff\phi\cos\phi}{kk} + \frac{M22f\phi}{2g}$$

Priori

Priori ergo vi deorsum sollicitatur, eamque sustentaculum sustinet: ob alteram vero vim axis in eam plagam, in qua centrum inertiae versatur, horizontaliter super sustentaculo procedere conatur, quem effectum obice arceri convenit. Quando centrum inertiae in contrariam plagam divagatur, haec vis horizontalis in contrarium dirigitur. Ceterum ambae vires ex duobus constant partibus, quarum altera actioni gravitatis, altera motui gyratorio ipsi debetur; ac ducta OL ad OI normali, hae partes ad pauciores ita rediguntur, ut axis in puncto O ab his viribus sollicitetur.

$$\text{sec. OC vi} = M; \text{ sec. OL vi} = \frac{Mff\sin\phi}{kk}; \text{ sec. OI vi} = \frac{Mfsu}{2g}.$$

Si non fuerit  $su\sin\phi = 0$  et  $su\cos\phi = 0$ , tum praeter istas vires axis insuper in punctis O et A fig. 73. eas virium §. 563. partes sustinet, quae has formulas integrales involvunt, quoniam reliquas partes immunes ad unicum punctum reducere licuit.

#### PROBLEMA. 50.

567. Si axis OA, circa quem corpus rigidum grave est mobile, Fig. 73. non fuerit horizontalis, definire motum gyratorium ut et vires, quas axis inde sustinet.

#### SOLUTIO.

Per axem OA ductum concipiatur planum verticale, in quo sit GC recta verticalis, ponaturque angulus OGC =  $\zeta$ , cujus complementum  $90^\circ - \zeta$  dat axis OA inclinationem ad horizontem. Reperitur nunc corporis centrum inertiae I extra hoc planum verticale, unde ad axem ducta normali IG =  $f$ , et ex G in plano verticali ad axem pariter normali GK, erit ipsum planum IGK ad planum verticale normale, ponaturque angulus IGK =  $\phi$ , elongationem corporis a situ suo naturali metiens: recta enim GI in plano IGK movebitur. Statuatur massa corporis, eademque ejus pondus =  $M$ , ejusque momentum inertiae respectu axis OA =  $Mkk$ , quod perinde colligitur, ac si axis esset horizontalis: inclinatio enim tantum ad vim sollicitantem spectat. Effectus autem gravitatis eo redit, ut corpus in puncto I sollicitetur in directione verticali IV a vi =  $M$ , ad quam resolvendam ducantur IM et IN parallelae ipsis GO et GK, eruntque rectae IM, IV et IN in plano verticali, angulusque MIV =  $\zeta$ . Hinc ex vi IV =  $M$  nascuntur duae vires, altera sec. IM =  $M \cos \zeta$  et altera secundum IN =  $M \sin \zeta$ . Prior

or cum sit axi parallela, nihil plane ad motum confert, sed tota in axem impenditur, quemadmodum supra docuimus. Pro motu ergo restat sola vis  $IN = M \sin \zeta$ , cujus directio cum sit ipsi GK parallela, orietur in momentum  $= M \sin \zeta \sin \phi$  tendens ad angulum IGK minuendum, atque pro motu definiendo formulae superiores pro axe horizontali inventae valebunt, nisi quod loco momenti vis sollicitantis, quod ante erat  $= M \sin \phi$ , hic scribi debeat  $M \sin \zeta \sin \phi$ : vel quatenus M pondus corporis denotat, ejus loco scribi debet  $M \sin \zeta$ , quatenus autem in momentum inertiae ingreditur, immutatum relinqui debet. Quare motus similis erit motui penduli simplicis circa axem horizontalem, cujus longitudo  $= \frac{Mkk}{M \sin \zeta} = \frac{kk}{\sin \zeta}$ : quo ipso motus perfecte determinatur.

Quod autem ad vires attinet, quas axis interea sustinet in datis si placeat punctis O et A, primo ob vim  $IM = M \cos \zeta$ , axis secundum suam directionem AO a tanta vi urgetur, praeterea vero in utroque O et A a vi  $= \frac{GI}{OA} \cdot M \cos \zeta$ , in puncto A scilicet secundum directionem ipsi GI parallelam, in O vero secundum oppositam. Tum vero praeter has vires in punctis O et A ab iisdem viribus sollicitabitur, quas in problemate praecedente determinavimus, hoc tantum observato, quod pro M scribi debeat  $M/\zeta$  et  $f/\zeta/\phi$  loco  $f/\phi$ . Nempe si in fig. 72. OA sit noster axis inclinatus & reliqua maneant ut in problemate praecedente, tum axis praeter vires a vi  $IM = M \cos \zeta$  natus sustinet insuper has vires. Primo in puncto O secundum directionem OB vim

$$\frac{Mc \sin \zeta}{a} - \frac{Mc f f / \zeta / \phi^2}{akk} - \frac{f / \zeta / \phi \cdot f u z d M}{akk} + \frac{Mc f u z \cos \phi}{2ag} + \frac{u u f u z d M}{2ag}$$

et secundum directionem OC vim

$$\frac{Mc f f / \zeta / \phi \cos \phi}{akk} + \frac{f / \zeta / \phi \cdot f u y d M}{akk} + \frac{Mc f u z \sin \phi}{2ag} + \frac{u u f u z d M}{2ag}$$

Deinde in puncto A secundum directionem AE vim

$$\frac{Mc / \zeta}{a} - \frac{Mb f f / \zeta / \phi^2}{akk} + \frac{f / \zeta / \phi \cdot f u z d M}{akk} + \frac{Mb f u z \cos \phi}{2ag} - \frac{u u f u y d M}{2ag}$$

et secundum directionem AF vim

$$\frac{Mb f f / \zeta / \phi \cos \phi}{akk} - \frac{f / \zeta / \phi \cdot f u y d M}{akk} + \frac{Mb f u z \sin \phi}{2ag} - \frac{u u f u z d M}{2ag}$$

ubi est OA = a, OG = b, AG = c, et celeritas angularis = u, integralibus sumtis ut ibi definivimus.

CO-

## COROLL. 1.

568. Cum longitudo penduli simplicis isochroni sit  $= \frac{k k}{f f \zeta}$ , corpus circa axem inclinatum tardius oscillationes suas absolvit quam si axis esset horizontalis, ac si oscillationes fuerint minimae, tempus unius erit,  $= \pi \sqrt{\frac{k k}{2 f g f \zeta}}$  min. sec.

## COROLL. 2.

569. Si axis est inclinatus, etiam vim sustinet secundum suam directionem AO, quae est  $= M \cos \zeta$ , reliquae vires omnes ad axem sunt normales, et ad duo data puncta O et A revocari possunt. Fig. 73.

## COROLL. 3.

570. Si corpus a plano IGK in duas partes similes et aequales bise-  
cetur, valores integralium  $\int y y dM$  et  $\int z z dM$  evanescunt et omnes vires praeter eas, quae ex vi IM nascuntur, ad unicum punctum G reduci possunt, ut supra.

## SCHOLION.

571. Haec sunt, quae de motu gyratorio corporum rigidorum circa axem fixum proponenda videbantur, ubi quidem ipsius motus determinatio eo est reducta, ut plus difficultatis non habeat, quam motus corpusculi circa axem fixum, si modo momentum inertiae fuerit exploratum. Vires autem, quas axis gyrationis inter motum sustinet, molestiorem calculum plerumque exigunt, cum ex corporis figura valores binorum integralium  $\int x y dM$  et  $\int x z dM$  erui debeant. Verum haec investigatio maximi est momenti, si ad motum corporum rigidorum circa axes non fixos progredi velimus: ubi primo quidem eos casus diligentius evolvi convenit, quibus axis sponte manet immobilis, etiam si extrinsecus non retineatur. Proposito ergo corpore quocunque rigido, inquirendum est, utrum in eo dentur ejusmodi axes, circa quos si corpus motum gyratorium receperit, ipsum inde nullas sustineat vires: deinde etiam videndum est, a quibusnam viribus corpus circa talem axem motum sollicitari debeat, ut etiam hinc nullae vires ad axem dimovendum nascantur.

## CAPUT VIII.

### DE AXE GYRATIONIS LIBERO MOTUQUE CORPORUM RIGIDORUM CIRCA TALES AXES.

#### DEFINITIO. II.

572. *Axis gyrationis liber* in quovis corpore rigido est ejusmodi axis, qui dum corpus circa eum gyratur, nullas ob motum vires sustinet.

#### COROLL. I.

573. Si igitur corpus circa axem liberum gyrationis coeperit, axis sponte in quiete manebit, neque opus est, ut is extrinsecus in situ suo retineatur: quod quidem intelligendum est, si corpus a nullis viribus sollicitetur.

#### COROLL. 2.

574. Corpus ergo nullis viribus subiectum, si circa talem axem liberum motum gyrationis quemcunque acceperit, hoc motu perpetuo uniformiter gyrationis perget, perinde ac si axis esset fixus.

#### SCHOLION.

575. En igitur alium casum motus liberi, in corpora rigida cadentis, cujus explicatio jam est manifesta. Primus scilicet casus erat, quo vidimus tale corpus motu progressivo libere proferri, at si vires sollicitantes per ejus centrum inertiae transeant, motus perturbationem jam definivimus. Deinde cum ostendissem corpus, cui circa axem fixum impressus fuerit motus gyrationis, eundem motum perpetuo conservare, dum axis ille fixus retineatur, nunc evidens est, si axis iste ita fuerit comparatus, ut vires, quas sustinet, se mutuo destruant, eum sponte immotum manere, corpusque motum gyrationis perpetuo esse continuaturum, qui propterea est casus motus liberi: ubi quidem nullum est dubium, quin ejusmodi etiam dentur vires, quae dum motum gyrationis vel accelerant vel retardant, axem non afficiant, ita ut adhuc in quiete persistat, de quo deinceps tractabimus. Ante omnia autem necesse est, ut inquiremus, in quovis corpore tales axes gyrationis liberi dentur, et quomodo si sint investigandi? in quo negotio summam

man afferent utilitatem ea, quae supra de ternis axibus principalibus cujusque corporis tradidimus, quippe qui simul esse axes gyrationis liberi deprehenduntur.

## P R O B L E M A. 51.

576. Definire conditiones axium liberorum, qui dum corpora circa eos gyran- tur, a nullis viribus sollicitata nullas vires sustineant.

## S O L U T I O.

Quaestio haec ex probl. 7. §. 338. facile resolvetur. In genere Fig. 32. enim si corpus circa axem quemcunque OA gyretur celeritate angulari =  $\gamma$ , ac pro elemento corporis quocunque  $dM$  in Z sito statuantur co- ordinatae orthogonales  $OX = x$ ,  $XY = y$ ,  $YZ = z$ , quarum prima  $x$  in ipso axe gyrationis capiatur, vidimus axem ob hunc motum duas sus- tinere vires secundum  $Ee$  et  $Ff$  quae sint

$$\text{vis } Ee = \frac{\gamma\gamma}{2g} \int y dM \text{ et vis } Ff = \frac{\gamma\gamma}{2g} \int z dM$$

quae applicatae sint in punctis E et F ut sit

$$OE = \frac{\int x y dM}{\int y dM} \text{ et } OF = \frac{\int x z dM}{\int z dM}.$$

Quare ut hic axis gyrationis OA sit liber, primo necesse est, ut ambae hae vires  $Ee$  et  $Ff$  seorsim evanescant, ideoque esse oportet tam  $\int y dM = 0$ , quam  $\int z dM = 0$ , unde patet, axem OA per corporis centrum in- ertiae I transire debere, quoniam posita corporis massa =  $M$  est  $\int y dM = M \cdot GK$  et  $\int z dM = M \cdot KI$ . Haec ergo est prima conditio axium gy- rationis liberorum, ut per corporis centrum inertiae I transeant: ve- rum etiamsi hae duae vires evanescant, tamen quia distantiae OE et OF fiunt infinitae, earum momenta ad axem circa punctum O vertendum

prodeunt  $\frac{\gamma\gamma}{2g} \int x y dM$  et  $\frac{\gamma\gamma}{2g} \int x z dM$ , quae nisi etiam evanescant, axis non sponte in quiete permanet. Quocirca ut axis gyrationis OA sit liber, non sufficit, ut is per corporis centrum inertiae I transeat, sed praeterea hac proprietate praeditus esse debet, ut pro eo fiat tam  $\int x y dM = 0$  quam  $\int x z dM = 0$ . Quae cum sit proprietas axium prin- cipalium supra demonstrata, quorum respectu momenta inertiae sunt, vel maxima vel minima, manifestum est cujusque corporis axes prin- cipales, quos supra invenire docuimus, simul esse axes gyrationis liberos.

Ff

CO-



## 226 CAPUT VIII. DE AXE GYRATIONIS LIBERO

### COROLL. 1.

577. In quolibet ergo corpore libero tres certe dantur axes gyrationis liberi, qui scilicet sunt ejus axes principales, circa quos ita libere gyri possit, ut axes sponte in quiete perseverent.

### COROLL. 2.

578. Si tria principalia momenta fuerint inter se inaequalia, tres tantum dantur axes gyrationis liberi; neque corpus circa ullum alium axem, etiamsi per centrum inertiae transeat, gyri potest, quin viribus externis opus sit ad axem continendum.

### COROLL. 3.

579. Sin autem momentum medium aequale sit vel maximo vel minimo, bini axes principales non determinantur, sed omnes ad tertium normales pari gaudent proprietate, ideoque etiam sunt axes gyrationis liberi.

### COROLL. 4.

580. At si omnia tria momenta principalia fuerint inter se aequalia, uti fit in globo et cubo, omnes plane rectae per centrum inertiae transeuntes proprietatem axium principalium habebunt, corpusque circa eos libere gyri poterit.

### SCHOLION.

581. Quae ergo supra de axibus principalibus omnium corporum tradidimus, non solum in inventione momentorum inertiae maximum habent usum, sed etiam in praesenti investigatione totum negotium conficiunt, cum in quovis corpore axes principales iique soli sint axes gyrationis liberi, circa quos corpus ita gyri possit, ut non opus sit vi externa ad eos in quiete retinendos. Quemadmodum ergo in quovis corpore rigido centrum inertiae est punctum maxime memorabile, cujus ratio per universam Mechanicam latissime patet, ita axes principales, qui simul sunt axes gyrationis liberi, in quovis corpore non minus sunt notatu digni, cum iis universa doctrina de motu corporum libero innitatur. Inter proprietates ergo corporum mechanicas axes hi principales post centrum inertiae praecipuum locum obtinent, atque in quovis corpore, cujus motus examinandus suscipitur, in id potissimum erit incumbendum, ut ejus axes principales exquirantur. Triplex scilicet datur corporum cognitio, prima geometrica, qua ejus extensio mensura-

mensuratur, secunda mechanica, qua ejus massa seu inertia spectatur, ac tertia physica, qua ejus reliquae qualitates expenduntur; cognitio igitur mechanica potissimum centro inertiae et axibus principalibus contineri est censenda.

PROBLEMA. 52.

§82. Dum corpus circa axem gyrationis liberum movetur, invenire, a quibusnam viribus corpus sollicitari debeat, ut nullus inde effectus in axem redundet, atque axis etiamnum sponte in quiete persistat.

SOLUTIO.

Quemcunque motum gyratorium corpus circa axem principalem seu liberum acceperit, modo vidimus, hunc motum perpetuo conservatum iri, axemque sponte in quiete esse perseveraturum, cum vires ex motu natae se mutuo perfecte destruant. Nunc igitur videamus, quomodo vires sollicitantes comparatae esse debeant, ut ab iis etiam axis non afficiatur, id quod ex probl. 17. facile perspicere licet. Primo autem manifesto excluduntur vires obliquae, unde per resolutionem nascerentur vires axi parallelae, quippe quae a viribus elementaribus tolli non possent. Relinquuntur ergo vires, quae in planis ad axem normalibus sunt directae; ab hujusmodi autem viribus axem ita affici ostendimus, ut primo easdem vires in plano quamque suo ad axem translatae sustineat, tum vero insuper vires elementaribus contrarias pariter ad axem translatae. Cum autem ob axem principalem sit  $\int x y dM = 0$ ,  $\int x z dM = 0$ ,  $\int (a-x) y dM = 0$  et  $\int (a-x) z dM = 0$ , vires ex elementaribus natae, quae in probl. 17. punctis O et A sunt applicatae evanescent: ideoque axis tantum ipsas vires sollicitantes ad axem translatae sustinebit. Quare vires sollicitantes ita debent esse comparatae, ut si singulae in planis ad axem normalibus secundum suas directiones ipsi axi applicentur, se mutuo destruant. Binae igitur quaeque vires aequales et contrariae corpori in eodem plano ad axem normali applicatae hoc praestabunt, ut axis ab iis nullam plane vim sentiat. Scilicet si IA fuerit axis gyrationis liber, atque ad eum in puncto quovis L concipiatur planum normale, in quo agant duae vires Nn et Mm aequales et contrariae, ab iis quidem motus gyratorius, quatenus in diversis ab axe distantis sunt applicatae, mutabitur, sed axis nihilominus sponte in quiete persistet. Consequenter quocunque hujusmodi binarum virium paria corpori fuerint applicata, axis ab illis nullo modo afficietur.

Tab. X.  
Fig. 74.

Ff 2

CO.

## 228 CAPUT VIII. DE AXE GYRATIONIS LIBERO

### COROLL. 1.

583. Proposita ergo quaecunque vi  $N\pi$ , ejus directio sit in plano ad axem normali, quod axem in puncto  $L$  secet, si praeterea axi in ipso puncto  $L$  vis aequalis et contraria  $Ll$  applicetur, ab his duabus viribus axis nullam vim sustinebit.

### COROLL. 2.

584. Quodsi igitur corpus a binis hujusmodi viribus  $N\pi$  et  $Ll$  sollicitetur, axis manet immotus, et solus motus gyratorius perturbabitur ab earum momentis. Cum autem vis  $Ll$  nullum habeat momentum, mutatio motus ex momento solius vis  $N\pi$  erit definienda.

### COROLL. 3.

585. Quare si celeritas angularis fuerit  $= \omega$ , momentum vis  $N\pi = V\omega$ , et corporis momentum inertiae respectu axis  $IA = Mkk$ , erit  $d\omega = \pm \frac{2V\omega g dt}{Mkk}$  pro elemento temporis  $dt$ : ubi ambiguitas signi vel accelerationem vel retardationem indicat.

### SCHOLION.

586. Quando ergo corpus rigidum circa quempiam axium suorum principalium gyratur, simulque a quocunque hujusmodi viribus, quarum singulae sibi pares et contrarias ipsi axi applicatas habeant quasi eomites, motus continuationem assignare valemus, quoniam axis sponte manet in quiete, motusque aequae immutatur, ac si axis firmiter retineretur, quem casum jam supra evolvimus. Verum haec determinatio adstricta est ad istam virium sollicitantium rationem, minimeque adhuc patet, cujusmodi effectum aliae vires essent producturae: hoc quidem saltem intelligitur, axem non in quiete esse permanens, utrum vero motum simplicem progressivum sit nactus, an se inclinando sit processurus, nondum liquet. Interim tamen casus, quo axi motus progressivus imprimatur, ita hunc quo in quiete persistet simplicitate excipit, ut ejus evolutionem suscipere valeamus. Observandum enim est, si cum motu quocunque motus progressivus uniformis et rectilineus conjungatur, actionem virium minime perturbari, quod principium ad praesens institutum accommodemus.

### THEOREMA. 4.

587. Quem motum gyratorium corpus rigidum circa axem quiescentem prosequitur, eundem motum circa hunc axem uniformiter in

in directum progredientem profectui poterit, si quidem ab illis viribus sollicitetur.

### DEMONSTRATIO.

Dum axis quiescit, et corpus quomodocumque circa eum gyra-  
tur, resolvantur singulorum elementorum motus secundum ternas di-  
rectrices, quibus coordinatae  $x, y, z$  parallelae constituuntur, erunt  
que posito temporis elemento  $= dt$ , celeritates hae laterales  $\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt},$   
 $\frac{dz}{dt}$ , atque  $\frac{ddx}{dt}, \frac{ddy}{dt}, \frac{ddz}{dt}$  exhibent effectus virium corpus sollici-  
tantium, quatenus iis singula elementa afficiuntur. Ponamus jam cor-  
pori insuper tribui motum progressivum, quo axis motu sibi parallelo  
uniformiter in directum proferatur celeritate  $= c$  secundum eam dire-  
ctionem, cui coordinatae  $x$  capiuntur parallelae, ac jam singulorum  
corporis elementorum celeritates erunt  $c + \frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}$  et  $\frac{dz}{dt}$ , quarum dif-  
ferentialia non discrepabunt a praecedentibus: ideoque motus gyra-  
torius circa axem uniformiter in directum progredientem perinde se ha-  
bebit, ac si axis quiesceret; viresque si quae affuerint, motum gyra-  
torium aequae perturbabunt, sive axis quiescat, sive uniformiter in di-  
rectum progrediatur.

### COROLL. 1.

588. Si igitur corpori, dum circa axem principalem gyra-  
tur, motus progressivus tribuatur, neque ab ullis viribus sollicitetur, utrumque  
motum uniformiter continuabit.

### COROLL. 2.

589. Ac si corpus interea ab ejusmodi viribus sollicitetur, quibus  
solus motus gyriorius mutetur, axis vero non afficiatur, etiam mo-  
tus gyriorius mutationem patietur: motus progressivus autem mane-  
bit uniformis rectilineus.

### COROLL. 3.

590. Sin autem corpus interea sollicitetur a vi, cujus directio tran-  
sit per centrum inertiae, ab ea solus motus progressivus afficietur.  
Nam quia ab hac vi neque ullum momentum respectu axis gyrationis

Ef 3

nascitur

## 230 CAPUT VIII. DE AXE GYRATIONIS LIBERO

nascitur, neque axis de situ suo sibi parallelo deturbatur, motus gyrationis nullam mutationem patitur.

### SCHOLION.

591. Veritas hujus Theorematis etiam per ea, quae supra de motu absoluto et respectivo sunt exposita, quando corpus, ad quod motus refertur, uniformiter in directum progreditur, sufficienter stabilitur. Cum enim corpus, quod motum gyrationis circa quendam axem principalem acceperit, hunc motum perpetuo ita conservet, ut axis sponte maneat in quiete, idem eveniat necesse est, si corpus in spatio uniformiter in directum lato versetur, hujusque respectu ejus axis quiescat. Tum enim res eodem redit, ac si corpus absolute uniformiter in directum progrediatur, simulque circa axem principalem, qui perpetuo situm sibi parallelum servet, aequabiliter gyretur. Ex quo res ita concipi potest quasi in corpore duplex inesset motus, alter gyrationis, quo corpus circa quendam axem principalem gyratur, alter vero progressivus, quo axis cum corpore ita abripiatur, ut axis perpetuo situm sibi parallelum conservet. Atque hinc etiam intelligitur, a viribus supra definitis motum gyrationis perinde accelerari vel retardari oportere, ac si axis quiesceret, simulque vires, quae solum motum progressivum afficere sunt ostendae, nihil quicquam in motu gyrationis mutare, ita ut uterque motus seorsim, quasi solus adesset, considerari queat. Haec igitur, quibus tam insignis casus motus liberi corporum rigidorum continetur, omnino sunt digna, ut diligentius evolvantur.

### DEFINITIO. 10.

592. *Motus mixtus ex progressivo et gyrationis* est, quo corpus partim circa quempiam axem principalem seu liberum gyratur, partim vero ita insuper movetur, ut ejus axis sibi semper maneat parallelus.

### COROLL. 1.

593. Ad motum ergo talem mixtum cognoscendum, ad quodvis tempus nosse oportet, 1°. celeritatem angularem circa axem gyrationis, 2°. celeritatem qua axis motu progressivo promovetur, et 3°. directionem hujus motus progressivi, quomodo ad axem gyrationis sit inclinata.

### COROLL. 2.

594. Celeritas porro angularis eodem modo aestimatur, ac si axis quiesceret; celeritas autem, ac directio motus progressivi

vi ex motu axis gyrationis, vel ex motu centri inertiae judicari debet.

### EXPLICATIO.

595. Idea haec motus mixti ex ideis utriusque motus progressivi et gyratorii est conflata, unde fit, ut neutra in ea pure et perfecte contineatur. Cum enim motum progressivum ita definivimus, ut omnes rectae, quas in corpore concipere licet, sibi perpetuo maneant parallelae, haec proprietas in motu mixto minime valet, sed tantum ad axem gyrationis adstringitur: interim tamen evidens est, si motus gyratorius tolleretur, vel evanesceret, motum progressivum perfectum esse remansurum. Simili modo definitio motus gyratorii supra data ad axem fixum seu quiescentem erat adstricta, nunc autem ad axem motum extenditur, quae translatio per ideam spatii moti corroboratur, dummodo ut hic assumimus, axis sibi semper maneat parallelus. Quinetiam perspicuum est, si alter motus progressivus tolleretur vel evanesceret, motum gyratorium perfectum qualem supra descripsimus esse remansurum. Quo minus erit dubitandum, quin talis motus recte ex progressivo et gyratorio mixtus appelletur, quoniam alterutro sublato alter nomen suum jure sibi vendicat.

### SCHOLION.

596. Circa talem motum mixtum variae quaestiones veniunt considerandae, quarum prima est, quomodo talis motus, si nullae vires accesserint, se sit habiturus, ubi quidem jam vidimus, utrumque aequabiliter esse perfecturum. Deinde viribus accedentibus quaestionem minime in genere tractare licet, ut variatio utriusque motus a viribus quibuscunque orta definiatur; sed ea tantum ad certa virium genera est restringenda. Cum scilicet certae sint vires, quae utrumque motum seorsum ita turbant, ut genus motus non mutetur, his conjungendis eas adipiscemur vires, quarum effectum in hujusmodi motibus mixtis definire valebimus. De reliquis autem cunctis viribus nihil aliud affirmare licebit, nisi quod axis gyrationis non sit situm sibi perpetuo parallelum conservaturus. Quoad enim axis sibi manet parallelus, motus semper erit mixtus ex progressivo et gyratorio, atque ad genus, quod hic tractamus, erit referendus: in quo eximium hujus motus criterium cernitur.

### THEOREMA 5.

597. Si corpori rigido impressus fuerit motus mixtus ex progressivo et gyratorio, idque a nullis viribus porro sollicitetur, utrum-

232 CAPUT VIII. DE AXE GYRATIONIS LIBERO

utrumque motum uniformiter continuabit, et progressivus erit rectilineus.

DEMONSTRATIO.

Veritas hujus Theorematis ex praecedentibus luculenter perspicitur, cum uterque motus seorsum vi inertiae sponte se conservet, neque continuatio unius impediatur continuationem alterius, quandoquidem si spatio motus aequalis et contrarius motui progressivo impressus concipiatur, motus progressivus tolleretur, et gyratorius uniformis esset mansurus, secundum ea, quae supra sunt demonstrata. Necesse autem est, quod probe notandum, ut axis gyrationis per centrum inertiae corporis transeat, simulque sit unus ex ejus axibus principalibus. Nisi enim axis ita sit comparatus, motus gyratorius mox in aliud motus genus transibit, de quo hic nihil adhuc definire licet.

COROLL. 1.

598. In hoc ergo motu mixto, quem corpus vi inertiae prosequitur, non solum centrum inertiae uniformiter in directum progreditur, sed etiam axis gyrationis perpetuo eundem situm conservabit, intereaque corpus circa eum uniformiter gyrationem perget.

COROLL. 2.

599. Talis ergo motus cognoscetur, si noverimus primo directionem et celeritatem centri inertiae, tum vero celeritatem angularem ejusque sensum ac denique positionem axis gyrationis.

COROLL. 3.

600. Quoniam in omni corpore tres dantur axes principales, atque in quibusdam adeo infiniti, qui simul sunt axes gyrationis liberi, omnia corpora talis motus sunt capacia idque infinitis modis.

SCHOLION.

Fig. 75. 601. Ad hujusmodi ergo motum calculo evolvendum, sit AB recta, in qua centrum inertiae I uniformiter progreditur, cujus celeritas sit  $= c$ . Interea autem corpus circa axem principalem MIN gyretur, qui cum recta AB perpetuo eundem angulum AIM constituat, circa quem gyretur celeritate angulari  $= \gamma$ . Quod si jam initio centrum inertiae fuerit in A, et elapso tempore  $t$  pervenerit in I, erit spatium motu progressivo percursum  $AI = ct$ , et interea motu angulari corpus circa axem

axem MN descripserit angulum  $= \gamma$ , necesse est. Ceterum compages corporis easdem vires sustinebit, ac si motus progressivus abesset. Quod denique ad motum cujusvis puncti corporis attinet, is prius definitur quasi motus progressivus abesset, tum cum eo conjungatur celeritas progressiva secundum praecepta resolutionis motus supra tradita, sicque habebitur verus ejus puncti motus.

### PROBLEMA 53.

602. Si corpus rigidum motu feratur mixto ex progressivo et gyatorio, definire eas vires, quarum actione axis gyrationis de situ suo sibi parallelo non deflectatur, motusque ideo maneat mixtus ex progressivo et gyatorio.

### SOLUTIO.

Primo perspicuum est, omnes vires, quarum directiones per centrum inertiae corporis transeunt, nihil in motu gyatorio efficere, sed tantum ad motum progressivum impendi, ita ut ab iis axis gyrationis non de situ suo deflectatur. Tales ergo vires ad id genus virium, quas quaerimus pertinent; tum vero etiam eo sunt referendae illae vires, quae solum motum gyatorium afficiunt, quas ita vidimus esse comparatas, ut si AB sit axis gyrationis, ad eumque in quovis puncto L constituitur planum normale, binae vires aequales et contrariae  $N_n$  et  $L_l$  in hoc plano applicatae hunc effectum praesentent: atque harum virium altera  $L_l$  ipsi axi applicata concipi potest. Verum hujusmodi binis viribus aequivalent binae similes vires, in plano, quod axi normaliter in ipso centro inertiae I constituitur, applicatae, quae sint  $K_k$  et  $I_i$ , illis aequales et parallelae, sumto intervallo  $IK = LN$ ; harum enim contrariae cum illis in aequilibrio confisterent. Sicque loco binarum, quarumvis talium virium  $N_n$  et  $L_l$  semper substituere licet binas similes et aequales in plano per centrum inertiae I ad axem normaliter ducto applicatas. Quare si binas hujusmodi vires quascunque  $K_k$  et  $I_i$  cum viribus quibuscunque ipsi centro inertiae applicatis jungamus, habebimus generatim id genus virium, quibus motus mixtus ita mutatur, ut axis gyrationis sibi maneat parallelus. Inter vires igitur centro inertiae I applicatas statuamus unam  $I_i$  ipsi  $I_i$  aequalem et contrariam, qua haec destruat, ac jam vires quaevis ita describi possunt, ut praeter vires centro inertiae I applicatas complectantur vires quascunque, quarum directiones sint in plano per centrum inertiae I ad axem normaliter ducto, et quocunque hujusmodi vires corpori fuerint applicatae, motus

Fig. 76.

Gg



## 234 CAPUT VIII. DE AXE GYRATIONIS LIBERO

tus ejus mixtus aliam inde mutationem non patitur, nisi qua axis situm sibi parallelum servet.

### COROLL. I.

603. Hic ergo alias vires contemplari non licet, nisi quae vel ipsi centro inertiae sint applicatae, vel quarum directiones reperiantur in plano ad axem normali et per centrum inertiae ducto.

### COROLL. 2.

604. Hujusmodi igitur viribus vel motus progressivus afficitur, vel gyratorius, vel uterque, sed tamen ita, ut axis gyrationis perpetuo situm sibi parallelum sit conservaturus.

### SCHOLION.

605. En ergo vires, ad quas nostra praesens tractatio adstringitur, quarum effectum in motu corporis mixto mutando ex principiis adhuc stabilitis definire licebit: de aliis autem viribus quibuscunque, nisi forte per aequivalentiam ad tales reduci queant, certum est, ab iis axem gyrationis de situ suo deturbari, motumque ad aliud genus traduci, quod etiamnum evolvere non valeamus. Cujusmodi autem effectum vires assignatae producant, tribus problematibus investigabimus, quorum primo in effectum earum virium inquiremus, quarum directiones per ipsum centrum inertiae corporis transeunt; in secundo alteram virium speciem contemplabimus, quarum directiones sitae sunt in plano, quod ad axem in ipso centro inertiae est normale. In tertio denique effectum a viribus utriusque speciei, simul sollicitantibus oriundum investigemus. Perpetuo autem corpori initio ejusmodi motum mixtum imprimi assumimus, ut gyratorius fiat circa axem principalem corporis.

### PROBLEMA. 54.

606. Si corpori rigido initio impressus fuerit motus quicumque mixtus ex progressivo et gyratorio circa axem principalem, idque deinceps sollicitetur a viribus quibuscunque, quarum media directio constanter per ejus centrum inertiae transeat, determinare corporis motum.

### SOLUTIO.

Quia virium sollicitantium media directio perpetuo per ejus centrum inertiae transit, motus gyratorius nullam inde mutationem patitur,

tor, sed uniformiter peragi perget, quasi axis quiesceret, unde ad quodvis tempus facillime patebit, quantus angulus jam circa axem motu gyratorio fuerit descriptus. Tota ergo quaestio reducitur ad motum progressivum, qui ex motu centri inertiae perfecte cognoscetur, corpus scilicet ita consideretur, quasi tota ejus massa in centro inertiae esset collecta, atque ex viribus, quibus quovis temporis momento sollicitatur, ejus motus eodem modo definitur, quo motum punctorum liberum a viribus quibuscunque sollicitatorum determinare docuimus, ita ut superfluum foret haec fufius prosequi, Cum autem ad quodvis tempus locus centri inertiae fuerit definitus, etiam positio axis gyrationis et quanto angulo corpus circa eum jam se converterit, patebit.

### COROLLARIUM.

607. Hic ergo utrumque motum ita seorsim considerare licet, quasi alter plane non adesset, dum motus gyratorius manet aequabilis, progressivus autem perinde turbatur, ac si tota corporis massa in centro inertiae collecta ab iisdem viribus urgeretur.

### PROBLEMA. 55.

608. Si corpori rigido initio impressus fuerit motus mixtus ex progressivo et gyratorio circa axem principalem, idque sollicitetur a viribus, quarum media directio constanter in plano ad axem per centrum inertiae normaliter ducto reperiatur, determinare corporis motum.

### SOLUTIO.

Quia axis sibi semper manet parallelus, elapso tempore  $t$  teneat Fig. 76. situm  $AB$ , et ducto per centrum inertiae  $I$  plano ad axem normali, in hoc sit  $Kk$  media directio virium jam corpus sollicitantium, et vis illis aequivalens sit  $Kk = V$ : cui in  $I$  aequalis et contraria  $Ii = V$  applicata concipiatur, quae autem a pari opposita  $I\eta = V$  denuo destruat, ita ut corpus jam ab his tribus viribus  $Kk$ ,  $Ii$  et  $I\eta$  sollicitetur. Nunc autem a binis viribus  $Kk$  et  $Ii$  solus motus gyratorius afficitur, cujus immutatio ita definitur: Ex centro inertiae  $I$  in directioinem vis  $Kk$  demittatur perpediculum, quod sit  $= f$ , erit momentum hujus vis  $= Vf$  ad motum sive accelerandum sive retardandum tendens: tunc sit massa corporis  $= M$  ejusque respectu axis  $AB$  momentum inertiae  $= Mkk$ . Quibus positis, si celeritas angularis circa axem  $AB$  jam fuerit  $= \omega$ , quae perinde aestimatur, ac si axis quiesceret, erit  $d\omega = + \frac{2Vfgdt}{Mkk}$ : unde.

Gg 2

ad

## 236 CAPUT VIII. DE AXE GYRATIONIS LIBERO

ad quodvis tempus vera celeritas angularis  $\omega$  est petenda. Deinde vis  $I\omega = V$  solum motum progressivum afficit, idque non aliter, ac si tota corporis massa  $M$  in ipso centro inertiae  $I$  esset collecta, ita ut corpus tanquam punctum  $I$ , quod jam a vi  $I\omega = V$  sollicitetur, considerare liceat: quae determinatio cum in praecedentibus satis sit explicata, manifestum est, quomodo ad quodvis tempus tam motum progressivum, quam gyratorium assignari oporteat.

### COROLL. 1.

609. Si motus progressivus initio fuerit nullus, centrum inertiae in ipso plano ad axem normali moveri incipiet, et cum vires sollicitantes perpetuo in eodem plano agant, totus centri inertiae motus in eodem plano absolvetur, ad quod axis gyrationis ubique erit normalis.

### COROLL. 2.

610. Idem evenit, si prima directio motus centri inertiae fuerit ad axem gyrationis normalis; tum enim constanter in plano ad axem gyrationis normali motum suum continuabit. Secus autem evenit, si prima motus progressivi directio cum axe gyrationis angulum fecerit obliquum.

### COROLL. 3.

611. Motus ergo gyratorius ex momento vis sollicitantis  $K\omega$  quod est  $= V\omega$ , motus autem progressivus ex ipsa hac vi  $Kk = V$  ita definitur, quasi haec vis in sua directione ipsi centro inertiae applicata esset.

### PROBLEMA. 56.

612. Si corpori rigido impressus fuerit motus mixtus ex progressivo et gyratorio circa quempiam axem principalem, idque deinceps sollicitetur partim a viribus, quarum media directio per ipsum centrum inertiae transit, partim vero ab ejusmodi viribus, quarum directio media in plano per centrum inertiae normaliter ad axem transiente versatur; determinare motum corporis.

### SOLUTIO.

Hujus problematis solutio sponte ex praecedente fluit, dummodo insuper ratio habeatur virium, quarum media directio per ipsum centrum inertiae transit, et quibus solum motum progressivum affici vidimus. Quare pro motu progressivo determinando praeter vires priores centro inertiae per se applicatas, eidem centro insuper applicatae concipian-

cipiuntur omnes vires posteriores singulae secundum suas directiones: tum si placet tota etiam corporis massa in eodem puncto collecta consideretur, ut habeatur casus puncti seu corpusculi infinite parvi a viribus quibuscunque sollicitati, quem per praecepta superiora expedire licebit. Deinde pro motu gyratorio, omittis viribus per centrum inertiae transeuntibus, considerentur eae solae, quarum media directio est in plano per centrum inertiae ad axem normaliter ducto, atque ex singulis vel vi omnibus aequivalente colligetur momentum respectu axis gyrationis, quod si fuerit  $= V\sqrt{}$ , mutatio motus gyratorii inde elicitur ut supra, cognito autem seorsum utroque motu universus corporis motus sponte innotescit,

### COROLL. 1.

613. Ad motum ergo progressivum definiendum, omnes vires, quibus corpus sollicitatur, singulas in suis directionibus ad centrum inertiae transferri debent, per easque motus progressivus perinde determinabitur, ac si nullus motus gyratorius adesset.

### COROLL. 2.

614. Ad motum autem gyratorium definiendum omnium virium sollicitantium colligantur momenta respectu axis gyrationis; hincque motus gyratorius perinde determinabitur, ac si nullus adesset motus progressivus, seu axis gyrationis teneretur fixus.

### SCHOLIUM.

615. Corollarium prius latissime patet, uti infra videbimus, quomodocunque etiam vires sollicitantes fuerint applicatae: hic autem sufficiat id saltem pro ejusmodi viribus, quales in problemate assumimus, admisisse: posterius vero locum non habet, nisi virium, quae per se non transeunt per centrum inertiae, media directio sita fuerit in plano ad axem normali et per centrum inertiae transeunte: alioquin enim axis sibi non maneret parallelus. Longissime ergo adhuc distamus a problemate generali, quo corporis rigidi a viribus quibuscunque sollicitati motus quaeritur: quo igitur continuo propius eo accedamus, corpus rigidum in quiete consideremus, et dum a viribus quibuscunque sollicitetur, primam motus generationem investigemus. Quamvis enim statim illud problema aggredi possemus tamen praestabit per gradus quasi eo ascendere, ut hoc modo clariorem omnium elementorum cognitionem consequamur.

## CAPUT IX.

DE PRIMA MOTUS GENERATIONE IN  
CORPORIBUS RIGIDIS.

## THEOREMA. 6.

616. Si cognitus fuerit effectus duarum virium junctim agentium in motu generanda, quarum altera ipsi centro inertiae sit applicata, alterius etiam seorsum agentis effectus innotescet.

## DEMONSTRATIO.

A vi corpori in ipso centro inertiae applicata generatur motus progressivus purus, quo singula ejus elementa secundum directionem vis per aequalia spatiola promoventur, quae si vis, sollicitans sit  $= V$  et massa corporis  $= M$ , tempusculo  $dt$  sunt  $= \frac{Vgdt^2}{M}$ . Quodsi jam corpus praeter vim hanc  $V$  centro inertiae applicatam sollicitetur ab alia vi quacunque  $S$ , effectusque harum duarum virium simul agentium fuerit cognitus, res ita concipiatur, quasi corpus insuper a vi contraria ipsi  $V$  aequali et centro inertiae applicata sollicitaretur, qua prior effectus ita turbabitur, ut totum corpus motu progressivo secundum directionem hujus vis retro feratur per spatiolum  $= \frac{Vgdt^2}{M}$ , qui effectus cum illo conjunctus dabit effectum solius vis  $S$  corpus sollicitantis, qui propterea innotescet.

## COROLL. 1.

617. Effectus nempe vis  $S$  aequalis est effectui a binis viribus  $V$  et  $S$  simul agentibus producto, demendo hunc effectum, quem sola vis  $V$  produceret: secundum ea quae supra de resolutione motus sunt praecepta.

## COROLL. 2.

618. Si ergo a duabus viribus  $V$  et  $S$  simul agentibus corpori imprimatur motus gyratorius circa quempiam axem, a vi sola  $S$  corpori imprimetur motus mixtus ex eodem gyratorio et progressivo, qui ipsi a vi ipsi  $V$  aequali et contraria induceretur.

SCHO-

## SCHOLIUM.

619. Legibus justae methodi adversari videbitur, quod ex effectu duarum virium simul agentium in effectum unius vis inquirere conemur. Verum in probl. 18. ubi vires definitivimus a quibus axis gyrationis non afficiatur, vidimus has vires rarissime ad unicam, semper autem ad duas reduci posse; quarum ergo effectus in corpus quiescens assignari poterit. Quare ut unius tantum vis effectum definire valeamus, efficiendum est ut illarum binarum virium altera per ipsum corporis centrum inertiae transeat, sicque hoc Theorema amplissimum nobis praestabit usum. Quo accedit, ut etiam vires quaecunque corpus sollicitantes ad duas hujusmodi vires reduci queant, quemadmodum jam docebimus.

## THEOREMA. 7.

620. Quotcunque fuerint vires corpus rigidum sollicitantes, et quomocunque fuerint applicatae, eae semper ad duas reduci possunt, quarum altera per ipsum centrum inertiae corporis transeat.

## DEMONSTRATIO.

Sit I centrum inertiae corporis, per quod pro lubitu ducatur recta quaecunque ID. Per directionem cujuslibet vis sollicitantis ducatur planum ad rectam ID normale, quod eam secet in puncto R: ac nisi directio hujus vis in isto plano sit sita, ea resolvatur in duas vires  $Sr$  et  $S\sigma$ , quarum illa sit in plano ad ID normali, altera vero  $S\sigma$  ipsi rectae ID sit parallela. Ad certum punctum fixum D statuatur planum ad rectam ID normale, ac ducta recta ISE loco vis  $Sr$  in punctis I et E substitui poterunt vires  $Is$  et  $Es$  ipsi parallelae, ut sit

$$\text{vis } Is = \text{vi } Sr \cdot \frac{DR}{ID} \text{ et vis } Es = \text{vi } Sr \cdot \frac{IR}{ID}.$$

simili modo loco vis  $S\sigma$  substituantur vires  $I\eta$  et  $E\sigma$  ipsi aequivalentes parallelae, ut sit

$$\text{vis } I\eta = \text{vi } S\sigma \cdot \frac{DR}{ID} \text{ et vis } E\sigma = \text{vi } S\sigma \cdot \frac{IR}{ID}.$$

Talis resolutio in omnibus viribus corpus sollicitantibus instituat, atque ex singulis obtinebuntur binae vires ipsi centro inertiae I applicatae, tum vero etiam binae vires  $E\sigma$  et  $Es$  illa in plano ad axem ID in D normali sita, haec vero ad istud planum normalis seu axi ID parallela. Omnibus viribus, quae centro inertiae I applicantur, in unam collectis, omnes vires  $E\sigma$ , quia in eodem sunt plano, pariter in unam colligi

Fig. 77.

Fig. 78. ligi poterunt, quae sit vis  $Mm$ : similique modo omnes vires  $Ee$ , quia sunt inter se parallelae, etiam in unam colligi possunt, quae sit vis  $Nn$ , axi  $ID$  itidem parallela, quemadmodum illa  $Mm$  in plano  $mMD$  ad axem normali versatur. Hoc modo loco omnium virium sollicitantium, quotcunque fuerint, nantiscimur tres vires, unam ipsi centro inertiae  $I$  applicatam et binas  $Mm$  et  $Nn$ , quae tres autem porro ad duas reducuntur hoc modo: Producatur recta  $IN$  in  $Q$  donec ejus ab axe distantia  $QR$  aequalis fiat distantiae  $DM$  ex  $D$  per  $N$  ad occursum vis  $Mm$  usque ductae: eritque  $ID : IR = DN : DM$ . Tum loco vis  $Nn$  substituere licebit vires  $Ll$  et  $Qq$  ipsi parallelas, ut sit

$$\text{vis } Ll = \text{vi } Nn \cdot \frac{MN}{DM} \text{ et vis } Qq = \text{vi } Nn \cdot \frac{DN}{DM}.$$

Prior cum reliquis centro inertiae applicatis in unam coalescit, posterior vero  $Qq$  secundum suam directionem in ipso puncto  $M$  applicata concipi potest, sicque cum vi  $Mm$  pariter uniri potest, quae sit vis  $M\mu$ , ita ut nunc omnes vires sollicitantes reductae sint ad duas, alteram centro inertiae  $I$  applicatam, alteram vero istam vim  $M\mu$ .

#### COROLL. 1.

621. Quoniam tam axem  $ID$  quam in eo punctum  $D$  pro lubitu assumere licet, vires sollicitantes infinitis modis ad hujusmodi binas vires, quarum altera ipsi centro inertiae sit applicata, reduci possunt.

#### COROLL. 2.

622. Facta autem una hujusmodi reductione, per eadem principia loco vis  $M\mu$  duae aliae ipsi parallelae substitui possunt, quarum altera centrum inertiae  $I$  afficiat, altera vero in puncto quovis alio rectae  $IM$  sit applicata, unde patet omnes reductiones ad eandem rectam  $IM$  referri.

#### SCHOLIUM.

623. Theorema hoc maximi est momenti in argumento hujus capituli evolvendo, ubi propositum nobis est in primam motus generationem inquirere, quando corpus rigidum quiescens et liberum a viribus quibuscunque sollicitatur. Cum enim haec vires quotcunque etiam fuerint semper ad binas revocari queant, quarum altera ipsi centro inertiae sit applicata, hujusque effectus sit determinatu facillimus, totum negotium eo redit, ut effectus ab unica quacunque vi productus definiatur; quod si minus successerit, cum ea vi alia quaecunque centro inertiae

inertiae applicata combinari poterit, ac si effectus inde conjunctim productus assignari potuerit, totum negotium erit confectum. Primum ergo dispiciamus, quomodo duae hujusmodi vires comparatae esse debeant, ut ab iis corpori motus circa datum axem per ejus centrum inertiae transeuntem imprimatur; hoc enim praestito facile erit institutum nostrum proficere.

PROBLEMA. 57.

624. Definire duas vires corpori rigido applicandas, quarum alterius directio per centrum inertiae transeat, ut corpus ab iis sollicitatum circa datum axem per ejus centrum inertiae transeuntem converti incipiat.

SOLUTIO.

Incidat centrum inertiae in punctum O, sitque OA axis, circa quem Fig. 49 motus gyriorius generari debeat; ac necesse est, ut vires sollicitantes ita sint comparatae, ut axis ab illis nihil patiat. Hoc ergo problema continetur in probl. 18. supra §. 390. soluto, ubi in scholio §. 394. vires generaliter exhibitae ita determinari oportet, ut pro termino O omnes vires ipsi puncto O sint applicatae. Ponantur ergo vires  $Pp = 0$  et  $Qq = 0$ , unde ob  $KI = 0$ , aequae ac  $OK = 0$ , fiet vis  $O\pi = \frac{\int xy dM}{ab}$

et vis  $O\phi = \frac{\int xz dM}{ab}$ . Deinde pro termino A sumantur vires  $A\epsilon = 0$  et

$A\sigma = 0$ , fientque vires  $Rr = \frac{\int xy dM}{ab}$  et  $Ss = \frac{\int xz dM}{ab}$ , ita ut sit vis

$Rr = vi O\pi$  et vis  $Ss = vi O\phi$ : tum vero requiritur, ut sit  $AR \int xy dM + AS \int xz dM = a f r r dM$ . Quoniam planum OAR ob centrum inertiae I in O positum pro lubitu assumi potest, id ita assumi poterit, ut fiat  $\int xz dM = 0$ , hincque duae tantum supersunt vires problemati satisfaci-

cientes, altera vis  $O\pi = \frac{\int xy dM}{ab}$  ipsi centro inertiae applicata, altera

vis  $Rr = \frac{\int xy dM}{ab}$  in distantia ab axe  $AR = \frac{a f r r dM}{\int xy dM}$  applicanda. Fig. 79. Hinc

solutionem problematis ita brevi complectemur: cum axe gyrationis proposito IA ejusmodi binae directrices IB et IC jungantur, ut constitutis pro quovis corporis elemento dM coordinatis illis parallelis  $IX = x$ ,  $XY = y$  et  $YZ = z$ , positaque  $XZ = r (yy + zz) = r$ , fiat  $\int xz dM = 0$ . Tum sumto intervallo pro lubitu  $IA = a$ , et ipsi IB pa-

Hh

rallela



rallela  $AR = \frac{afrrdM}{fxydM}$ , quaecunque vis  $Rr$  ipsi  $IC$  parallela et in puncto  $R$  applicata effectum propositum producet, si modo insuper centro inertiae  $I$  vis illi aequalis et contraria  $I\pi$  applicetur: et positis his viribus  $Rr = I\pi = V$  cum momentum respectu axis  $IA$  inde natum sit  $= \frac{VafrrdM}{fxydM}$ , tempusculo  $dt$  circa axem  $IA$  generabitur angulus  $d\omega = \frac{Vagdt^2}{fxydM}$ .

## COROLL. 1.

625. Cum intervallum  $IA = a$ , a quo distantia  $AR$  pendet, pro lubitu accipi possit, omnia puncta  $R$  reperiuntur in linea recta  $IR$  faciente cum axe  $IA$  angulum, cujus tangens  $= \frac{frrdM}{fxydM}$ , dummodo planum  $AIB$  ita sit sumtum, ut fiat  $fxzdM = 0$ .

## COROLL. 2.

626. Ducta hac recta  $IR$  quaelibet vis huic rectae in quovis puncto applicata et ad planum  $AIB$  normalis, si in  $I$  vis illi aequalis et contraria  $I\pi$  insuper applicetur, corpus circa axem  $IA$  converti incipiet.

## COROLL. 3.

627. Proposita autem quacunque vi  $Rr$ , cui aequalis in  $I$  contrarie sit applicata, corpus circa quempiam axem per centrum inertiae transeuntem verti incipiet, de quo tantum patet, quod situs sit in plano, per centrum inertiae  $I$  ad directionem vis sollicitantis  $Rr$  normaliter ducto.

## PROBLEMA. 58.

628. Si corpus rigidum quiescens a vi quacunque sollicitetur, determinare primum initium motus, qui ab ea vi in corpore generabitur, circa axem in plano ad directionem vis normali situm, si quidem fieri queat.

## SOLUTIO.

Fig. 80.

Sit  $I$  centrum inertiae corporis, per quod ductum concipiatur planum ad directionem vis normale, quod ipso plano tabulae referatur, cui ergo vis sollicitans  $Rr = V$  normaliter insistere est intelligenda,

genda, et recta IR ad eam sit normalis, quae ponatur  $IR = b$ . Applicetur corpori insuper in centro inertiae vis  $I\pi$  illi aequalis et contraria, ita ut ex opposito in planum tabulae sit normalis. Ab his duabus viribus simul agentibus corpus circa quempiam axem per centrum inertiae transeuntem converti incipiet, atque ex §. praec. patet, hunc axem in plano tabulae fore situm, qui propterea sit IA, pro cuius positione quaeri debet angulus  $RIA = \eta$ ; ita ut ducta ex R ad eum normali RA sit  $RA = b \sin \eta$  et  $IA = b \cos \eta$ . Quoniam autem positionem huius axis nondum novimus, referamus singula corporis elementa ad ternas directrices IR, IP, IQ, quarum prima ex directione vis sollicitantis datur, altera IP in plano tabulae ad eam sit normalis, ac tertia IQ ipsi huic plano normaliter insistat. Sint ergo coordinatae secundum has ternas directrices  $IX = x$ ,  $XY = y$  et  $YZ = z$ . Deinde ad coordinatas superioribus formulis consentaneas obtinendas, ex Y ad axem gyrationis IA ducatur normalis  $YX'$ , sintque istae coordinatae:

$IX' = x'$ ;  $X'Y = y'$  et  $YZ = z' = z$  ut ante, quarum priores per praecedentes ita determinentur, ut sit

$$x' = x \cos \eta - y \sin \eta \text{ et } y' = x \sin \eta + y \cos \eta.$$

Ex his autem necesse est fiat  $\int x' z dM = 0$ , et  $\tan \angle AIR = \tan \eta = \frac{\int r r dM}{\int x' y' dM}$  (625.) existente  $rr = y'y' + zz$ .

At vero erit

$$\int x' z dM = \cos \eta \int x z dM - \sin \eta \int y z dM$$

$$\int r r dM = \int \eta^2 \int x x dM + 2 \sin \eta \cos \eta \int x y dM + \cos^2 \eta \int y y dM + \int z z dM$$

$$\int x' y' dM = \sin \eta \cos \eta \int x x dM + (\cos^2 \eta - \sin^2 \eta) \int x y dM - \sin \eta \cos \eta \int y y dM$$

Ponamus haec integralia per totum corpus extensa:

$$\int x x dM = A; \int y y dM = B; \int z z dM = C$$

$$\int x y dM = D; \int x z dM = E; \int y z dM = F$$

atque habebimus has aequationes:

$$E \cos \eta - F \sin \eta = 0 \text{ et}$$

$$A \sin \eta^2 + D(\cos \eta^2 - \sin \eta^2) \tan \eta - B/\eta^2 = A \sin \eta^2 + 2 D \sin \eta \cos \eta + B \cos \eta^2 + C$$

seu  $D \tan \eta + B + C = 0$ : unde duplici modo nanciscimur:

$$\tan \eta = \frac{E}{F} \text{ et } \tan \eta = \frac{-B-C}{D}$$

qui bini valores nisi consentiant, problema sub conditione proposita, qua axis gyrationis in plano ad directionem vis normali assumitur, resolvi nequit.

Hh 2

Ponamus

Ponamus ergo vim ita esse applicatam, ut fiat  $\frac{E}{F} + \frac{B+C}{D} = 0$ , atque corpus gyrationem incipiet circa axem IA in plano ad directionem vis normali situm, ut sit  $\tan RIA' = \frac{E}{F} = \frac{-B-C}{D}$ . Tum ob momentum vis  $= V b \sin \eta$ , et momentum inertiae respectu hujus axis  $\int r^2 dM = \frac{A}{\eta^2} + B \cos \eta^2 + 2D/\eta \cos \eta + C$ , tempusculo  $dt$  vertetur per angulum  $d\omega = \frac{V g b dt^2 \sin \eta}{A/\eta^2 + B \cos \eta^2 + 2D/\eta \cos \eta + C}$ . Qui cum sit effectus binarum virium  $Rr$  et  $I\pi$  junctim agentium, ut prodeat effectus solius vis  $Rr = V$ , addatur insuper  $v$ .  $p = V$ , et corpori praeter motum gyrationis imprimetur motus progressivus purus secundum directionem IQ ipsi  $Rr$  parallelam, quo tempusculo  $dt$  conficietur spatium  $= \frac{V g dt^2}{M}$ .

## C O R O L L. 1.

629. Solutio ergo hujus problematis ad eos tantum casus extenditur, quibus vis sollicitans  $Rr = V$  corpori ita est applicata, ut collectis formulis integralibus expositis fiat  $\frac{E}{F} + \frac{B+C}{D} = 0$ .

## C O R O L L. 2.

630. Nisi autem haec proprietas locum habeat, solutio problematis adhuc latet: hocque tantum constat, gyrationem non fieri circa axem, qui situs sit in plano ad directionem vis sollicitantis normali.

## S C H O L I O N.

631. Mirum utique videbitur, quod cum praeparatio ex viribus, quas axis supra sustinere inventus est, petita solutionem completam polliceri sit visa, nunc tamen infiniti casus excludantur, quos nostra solutio non complectatur. Cum enim certum sit, conversionem circa nullum alium axem fieri posse, nisi qui nullas plane vires sustineat, problema 18. perfectam solutionem suppeditare deberet, si quidem ipsum in omni extensione fuisset solutum. Verum probe notandum est, in hoc problemate nullas alias vires esse assumptas, nisi quarum directiones reperiantur in planis ad axem normalibus, cum tamen vires etiam obliquae induci potuissent, dummodo vires axi parallelae inde natae se destruerent. Atque hoc revera usu venit in casibus exclusis, ubi corpus initium gyrationis capere debet circa axem, qui est inclinatus ad planum

La 0 0  
 5 a. 16.0

ut d' une lettre centrum inertiae ad vim sollicitantem normaliter ductum, quo-  
 ex resolutione vis  $R_r$  nascitur vis tali axi parallela: cujus uti-  
 haberi debet, si hoc problema in genere resolvere velimus.

P R O B L E M A. 59.

Si corpus rigidum quiescens a vi quacunq[ue] sollicitetur, eique  
 centro inertiae vis aequalis et contraria applicata fuerit, defi-  
 nit circa quem primum gyrari incipiet.

S O L U T I O.

I centrum inertiae corporis, ac tabula referat ut ante planum Fig. 80.  
 directionem vis sollicitantis, quae sit  $R_r = V$ , normaliter du-  
 i quo ponatur distantia  $IR = b$ . Tum sumto in hoc plano  
 $IA = \eta$ , ut ducto ex  $R$  in  $IA$  perpendicularo  $RA$  sit  $IA = b \cos \eta$   
 $b \sin \eta$ : ducatur in  $A$  ad planum normalis  $AD$ , sitque ducta  $ID$   
 $ID = \theta$ , ideoque  $AD = b \cos \eta \tan \theta$  et  $ID = \frac{b \cos \eta}{\cos \theta}$ ; quae li-

axis gyrationis quaesitus ita, ut ambo angulos  $\eta$  et  $\theta$  investi-  
 teat. Corpus ergo exprimi debet per ternas coordinatas, qua-  
 in ipso axe  $ID$  capiatur. Dari igitur assumo relationem inter  
 tas  $IX = x$ ,  $XY = y$  et  $YZ = z$ , quarum prima in ipsa recta  
 nda in plano ad vim normali, ac tertia ipsi vi  $R_r$  parallela capia-  
 Y primo ad  $IA$  perpendicularis,  $YX'$  ducatur, in plano autem  
 n normali  $AID$  perpendicularis  $X'y$  ipsi  $YZ$  et  $yZ$  ipsi  $X'Y$  pa-  
 rit ut ante vidimus:

$X' = x \cos \eta - y \sin \eta$ ;  $X'y = YZ = z$ ;  $X'Y = yZ = x \sin \eta + y \cos \eta$ .  
 plano normali ex  $y$  ad  $ID$  ducatur perpendicularis  $yx$ , et ha-  
 novae coordinatae, quales desideramus, quae sint  $Ix = X$ ;  $xy$   
 $= Z$ , atque ita per praecedentes determinantur.  
 $= x \cos \eta \cos \theta - y \sin \eta \cos \theta + z / \theta$ ;  $Y = z \cos \theta - x \cos \eta / \theta$   
 $+ y \sin \eta / \theta$ ;  $Z = x \sin \eta + y \cos \eta$ .

ordinatae, plano  $IAD$  in planum tabulae projecto in fig. 81.  
 entur, ad quod jam  $AR = b \sin \eta$  erit normalis, et vis  $R_r$  ipsi  
 la: ducatur  $DV$  ipsi  $AR$  parallela, et vis in puncto  $V$  appli-  
 niatur, ut sit vis  $V_r = V$ : ductisque  $Vv$  ipsi  $xy$  et  $Vu$  ipsi  $Ix$   
 ob angulum  $rVv = \theta$ ; vis  $V_r$  resolvitur in binas has: vim  $Vv$   
 et vim  $Vu = V \sin \theta$ , quae contrarie puncto  $I$  applicentur,  
 or sit vis  $Ii = V \cos \theta$ , ad  $ID$  jam in plano tabulae norma-  
 lis,

Hh 3

Ponamus ergo vim ita esse applicatam, ut fiat  $\frac{E}{F} + \frac{B+C}{D} = 0$ , atque corpus gyrationem incipiet circa axem IA in plano ad directionem vis normali situm, ut sit  $\tan RIA' = \frac{E}{F} = \frac{-B-C}{D}$ . Tum ob momentum vis  $= V b \sin \eta$ , et momentum inertiae respectu hujus axis  $\int r^2 dM = \frac{A}{\eta^2} + B \cos \eta^2 + 2D/\eta \cos \eta + C$ , tempusculo  $dt$  vertetur per angulum  $d\omega = \frac{V g b dt^2 \sin \eta}{A/\eta^2 + B \cos \eta^2 + 2D/\eta \cos \eta + C}$ . Qui cum sit effectus binarum virium  $Rr$  et  $I\pi$  junctim agentium, ut prodeat effectus solius vis  $Rr = V$ , addatur insuper  $v$ .  $p = V$ , et corpori praeter motum gyrationis imprimetur motus progressivus purus secundum directionem IQ ipsi  $Rr$  parallelam, quo tempusculo  $dt$  conficietur spatium  $= \frac{V g dt^2}{M}$ .

## C O R O L L. 1.

629. Solutio ergo hujus problematis ad eos tantum casus extenditur, quibus vis sollicitans  $Rr = V$  corpori ita est applicata, ut collectis formulis integralibus expositis fiat  $\frac{E}{F} + \frac{B+C}{D} = 0$ .

## C O R O L L. 2.

630. Nisi autem haec proprietas locum habeat, solutio problematis adhuc latet: hocque tantum constat, gyrationem non fieri circa axem, qui situs sit in plano ad directionem vis sollicitantis normali.

## S C H O L I O N.

631. Mirum utique videbitur, quod cum praeparatio ex viribus, quas axis supra sustinere inventus est, petita solutio completa polliceri sit visa, nunc tamen infiniti casus excludantur, quos nostra solutio non complectatur. Cum enim certum sit, conversionem circa nullum alium axem fieri posse, nisi qui nullas plane vires sustineat, problema 18. perfectam solutionem suppeditare deberet, si quidem ipsum in omni extensione fuisset solutum. Verum probe notandum est, in hoc problemate nullas alias vires esse assumptas, nisi quarum directiones reperiantur in planis ad axem normalibus, cum tamen vires etiam obliquae induci potuissent, dummodo vires axi parallelae inde natae se destruerent. Atque hoc revera usu venit in casibus exclusis, ubi corpus initium gyrationis capere debet circa axem, qui est inclinatus ad planum

nun per centrum inertiae ad vim sollicitantem normaliter ductum, quoniam tum ex resolutione vis  $Rr$  nascitur vis tali axi parallela: cujus utique ratio haberi debet, si hoc problema in genere resolvere velimus.

P R O B L E M A. 59.

632. Si corpus rigidum quiescens a vi quacunque sollicitetur, eique simul in centro inertiae vis aequalis et contraria applicata fuerit, definire axem, circa quem primum gyrationis incipiet.

S O L U T I O.

Sit  $I$  centrum inertiae corporis, ac tabula referat ut ante planum Fig. 80. per  $I$  ad directionem vis sollicitantis, quae sit  $Rr = V$ , normaliter ductam, in quo ponatur distantia  $IR = b$ . Tum sumto in hoc plano angulo  $RIA = \eta$ , ut ducto ex  $R$  in  $IA$  perpendicularo  $RA$  sit  $IA = b \cos \eta$  et  $RA = b \sin \eta$ : ducatur in  $A$  ad planum normalis  $AD$ , sitque ducta  $ID$  angulus  $AID = \theta$ , ideoque  $AD = b \cos \eta \tan \theta$  et  $ID = \frac{b \cos \eta}{\cos \theta}$ ; quae li-

nea  $ID$  sit axis gyrationis quaesitus ita, ut ambo angulos  $\eta$  et  $\theta$  investigari oporteat. Corpus ergo exprimi debet per ternas coordinatas, quarum una in ipso axe  $ID$  capiatur. Dari igitur assumo relationem inter coordinatas  $IX = x$ ,  $XY = y$  et  $YZ = z$ , quarum prima in ipsa recta  $IR$ , secunda in plano ad vim normali, ac tertia ipsi vi  $Rr$  parallela capiatur. Ex  $Y$  primo ad  $IA$  perpendicularis  $YX'$  ducatur, in plano autem ad tabulam normali  $AID$  perpendicularis  $X'y$  ipsi  $YZ$  et  $yZ$  ipsi  $X'Y$  parallela, erit ut ante vidimus:

$IX' = x \cos \eta - y \sin \eta$ ;  $X'y = YZ = z$ ;  $X'Y = yZ = x \sin \eta + y \cos \eta$ . Tum in plano normali ex  $y$  ad  $ID$  ducatur perpendicularis  $yx$ , et habebuntur novae coordinatae, quales desideramus, quae sint  $Ix = X$ ;  $xy = Y$  et  $yZ = Z$ , atque ita per praecedentes determinantur.

$$X = x \cos \eta \cos \theta - y \sin \eta \cos \theta + z \sin \theta; Y = z \cos \theta - x \cos \eta \sin \theta + y \sin \eta \sin \theta; Z = x \sin \eta + y \cos \eta.$$

Hae jam coordinatae, plano  $IAD$  in planum tabulae projecto in fig. 81. repraesententur, ad quod jam  $AR = b \sin \eta$  erit normalis, et vis  $Rr$  ipsi  $AD$  parallela: ducatur  $DV$  ipsi  $AR$  parallela, et vis in puncto  $V$  applicata concipiatur, ut sit vis  $Vr = V$ : ductisque  $Vv$  ipsi  $xy$  et  $Vu$  ipsi  $Ix$  parallela, ob angulum  $rVu = \theta$ ; vis  $Vr$  resolvitur in binas has: vim  $Vv = V \cos \theta$  et vim  $Vu = V \sin \theta$ , quae contrarie puncto  $I$  applicentur, quarum prior sit vis  $Ii = V \cos \theta$ , ad  $ID$  jam in plano tabulae norma-

Hh 3

lis,

lis, altera vero axis secundum DI urgebitur. Momentum autem vis  $Vu = V \cos \theta$  respectu axis ID est  $= V \cos \theta$ .  $b \sin \eta = V b \sin \eta \cos \theta$ , et posito  $YY + ZZ = RR$  momentum inertiae corporis respectu axis ID  $= \int RR dM$ , unde tempusculo  $dt$  conversio fiet per angulum  $d\omega = \frac{V g b dt^2 \sin \eta \cos \theta}{\int RR dM}$ . Cum axis nullas vires sentire debeat, vis  $Vu =$

$V \cos \theta$  ipsi axi in D. applicetur, ut sit vis  $Dd = V \cos \theta$ , vis vero  $Vu = V/\theta$  in sua directione perpendicularo IT  $= DV = b/\eta$  applicata concipiatur, ex qua pro axe primo vis nascitur secundum IDurgens, quae superiorem illam destruit: tum vero posito intervallo ID  $= \frac{b \cos \eta}{\cos \theta} = a$ , inde oriuntur binae vires ad axem et planum tabulae normales  $I\eta = Dd = \frac{b/\eta}{a} V \sin \theta = V \tan \eta \sin \theta \cos \theta$ . Praeterea vero habentur vires  $Ii =$

$Dd = V \cos \theta$ , quae per vires elementares destrui debent. At ex probl. 16. vires elementares huc accommodatae praebent binas vires Pp et Qq in punctis P et Q applicandae, ut sit

$$IP = \frac{\int XZ dM}{\int Z dM}; \text{ vis } Pp = \frac{V b \sin \eta \cos \theta \int Z dM}{\int RR dM}$$

$$IQ = \frac{\int XY dM}{\int Y dM}; \text{ vis } Qq = \frac{V b \sin \eta \cos \theta \int Y dM}{\int RR dM}$$

Cum autem motus hic in contrarium sensum incipiat, atque ibi assumimus, hae vires praecedentibus aequivalentes statui debent; et quia ob I centrum inertiae fit  $\int Y dM = 0$ , et  $\int Z dM = 0$ , omnia ad momenta revocantur, ut esse debeat  $Pp \cdot IP = Dd \cdot ID$  et  $Qq \cdot IQ = Dd \cdot ID$  sicque habebimus has duas aequationes:

$$\frac{V b \sin \eta \cos \theta \int XZ dM}{\int RR dM} = V b \cos \eta \text{ et}$$

$$\frac{V b \sin \eta \cos \theta \int XY dM}{\int RR dM} = V b \sin \theta \text{ sive}$$

$$\sin \eta \cos \theta \int XZ dM = \cos \eta \int RR dM \text{ et } \cos \theta \int XY dM = \sin \theta \int RR dM.$$

Nunc igitur positis integralibus ex coordinatis principalibus  $x$ ,  $y$  et  $z$  natis:

$$\int xxdM = A; \int yydM = B; \int zzdM = C; \int xydM = D; \int xzdM = E; \int yzdM = F$$

ob  $RR = YY + ZZ$  erit

$\int RR dM$

$$\begin{aligned} /RRdM &= A (\int \eta^2 + \cos \eta^2 / \theta^2) + B (\cos \eta^2 + \int \eta^2 / \theta^2) + C \cos \theta^2 \\ &\quad + 2D \int \eta \cos \eta \cos \theta^2 - 2E \cos \eta / \theta \cos \theta + 2F / \eta / \theta \cos \theta \\ /XYdM &= -A \cos \eta^2 / \theta \cos \theta - B \int \eta^2 / \theta \cos \theta + C / \theta \cos \theta \\ &\quad + 2D / \eta \cos \eta / \theta \cos \theta + E \cos \eta (\cos \theta^2 - / \theta^2) - F / \eta (\cos \theta^2 - / \theta^2) \\ /XZdM &= A \int \eta \cos \eta \cos \theta - B / \eta \cos \eta \cos \theta + D \cos \theta (\cos \eta^2 - / \eta^2) \\ &\quad + E / \eta / \theta + F \cos \eta / \theta \end{aligned}$$

quibus valoribus substitutis binæ acuationes inventae induent has formas:

$$\begin{aligned} \text{I.} & -A \cos \eta / \theta^2 - B \cos \eta - C \cos \eta \cos \theta^2 - D / \eta \cos \theta^2 + E (1 + \cos \eta^2) \\ & \quad / \theta \cos \theta - F \int \eta \cos \eta / \theta \cos \theta = 0 \\ \text{II.} & -A \sin \theta - B \sin \theta + E \cos \eta \cos \theta - F \int \eta \cos \theta = 0 \end{aligned}$$

quarum posterior præbet  $\tan \theta = \frac{E \cos \eta - F \sin \eta}{A + B}$ . At II.  $\cos \eta / \theta - I$

præbet

$$B \cos \eta \cos \theta^2 + C \cos \eta \cos \theta^2 + D \int \eta \cos \theta^2 - E / \theta \cos \theta = 0,$$

unde colligitur  $\tan \theta = \frac{(B + C) \cos \eta + D / \eta}{E}$ ; hincque tandem  $\tan \eta =$

$\frac{EE - (A + B)(B + C)}{(A + B)D + EF}$ : unde ambo anguli  $RIA = \eta$  et  $AID = \theta$  atque adeo axis gyrationis ID innotescit.

### COROLL. 1.

633. Proposita ergo vi quacunque  $Rr = V$ , cui simul æqualis in ipso centro inertiae I contrarie fit applicata, si per I planum ad directionem vis normale ducatur PIR, atque ad id recta IQ perpendicularis, his ternis directricibus IR, IP, IQ pro quovis elemento corporis  $dM$  in Z sito parallelæ capiantur coordinatæ  $IX = x$ ,  $XY = y$ , et  $YZ = z$ , hincque ex indole corporis colligi debent sequentes sex valores:

$$\begin{aligned} /xxdM &= A, /yydM = B, /zzdM = C; /xydM = D; \\ /xzdM &= E; /yzdM = F. \end{aligned}$$

### COROLL. 2.

634. His inventis in plano RIP ad directionem vis normali ex opposito coordinatarum  $XY = y$  positivarum, seu in regione negativarum capiatur angulus  $RIA = \eta$  ut sit  $\tan \eta = \frac{EE - (A + B)(B + C)}{(A + B)D + EF}$ , quo invento super illo plano in regione coordinatarum  $YZ = z$  positivarum erigatur



lis, altera vero axis secundum DI urgebitur. Momentum autem vis  $Vu = V \cos \theta$  respectu axis ID est  $= V \cos \theta$ .  $b \sin \eta = V b \sin \eta \cos \theta$ , et posito  $YY + ZZ = RR$  momentum inertiae corporis respectu axis ID  $= \int RR dM$ , unde tempusculo  $dt$  conversio fiet per angulum  $d\omega = \frac{V g b dt^2 \sin \eta \cos \theta}{\int RR dM}$ . Cum axis nullas vires sentire debeat, vis  $Vu =$

$V \cos \theta$  ipsi axi in D. applicetur, ut sit vis  $Dd = V \cos \theta$ , vis vero  $Vu = V/\theta$  in sua directione perpendiculo IT  $= DV = b/\eta$  applicata concipiatur, ex qua pro axe primo vis nascitur secundum IDurgens, quae superiorem illam destruit: tum vero posito intervallo ID  $= \frac{b \cos \eta}{\cos \theta} = a$ , inde oriuntur binæ vires ad axem et planum tabulae normales  $I\eta = D\delta = \frac{b/\eta}{a} V \sin \theta = V \tan \eta \sin \theta \cos \theta$ . Praeterea vero habentur vires  $Li =$

$Dd = V \cos \theta$ , quae per vires elementares destrui debent. At ex probl. 16. vires elementares huc accommodatae praebent binas vires Pp et Qq in punctis P et Q applicandae, ut sit

$$IP = \frac{\int XZ dM}{\int Z dM}; \text{ vis } Pp = \frac{V b \sin \eta \cos \theta \cdot \int Z dM}{\int RR dM}$$

$$IQ = \frac{\int XY dM}{\int Y dM}; \text{ vis } Qq = \frac{V b \sin \eta \cos \theta \cdot \int Y dM}{\int RR dM}$$

Cum autem motus hic in contrarium sensum incipiat, atque ibi assumimus, haec vires praecedentibus aequivalentes statui debent; et quia ob I centrum inertiae fit  $\int Y dM = 0$ , et  $\int Z dM = 0$ , omnia ad momenta revocantur, ut esse debeat Pp.  $IP = Dd$ . ID et Qq.  $IQ = D\delta$ . ID sicque habebimus has duas aequationes:

$$\frac{V b \sin \eta \cos \theta \int XZ dM}{\int RR dM} = V b \cos \eta \text{ et}$$

$$\frac{V b \sin \eta \cos \theta \int XY dM}{\int RR dM} = V b \sin \eta \text{ sive}$$

$$\sin \eta \cos \theta \int XZ dM = \cos \eta \int RR dM \text{ et } \cos \theta \int XY dM = \sin \eta \int RR dM.$$

Nunc igitur positis integralibus ex coordinatis principalibus  $x, y$  et  $z$  natis:

$$\int xxdM = A; \int yydM = B; \int zzdM = C; \int xydM = D; \int xzdM = E, \int yzdM = F$$

ob  $RR = YY + ZZ$  erit

$$\int RR dM$$

$$\begin{aligned} /RRdM &= A (\eta^2 + \cos \eta^2 / \theta^2) + B (\cos \eta^2 + \eta^2 / \theta^2) + C \cos \theta^2 \\ &\quad + 2D / \eta \cos \eta \cos \theta^2 - 2E \cos \eta / \theta \cos \theta + 2F / \eta / \theta \cos \theta \\ /XYdM &= -A \cos \eta^2 / \theta \cos \theta - B \eta^2 / \theta \cos \theta + C / \theta \cos \theta \\ &\quad + 2D / \eta \cos \eta / \theta \cos \theta + E \cos \eta (\cos \theta^2 - \eta^2) - F / \eta (\cos \theta^2 - \eta^2) \\ /XZdM &= A / \eta \cos \eta \cos \theta - B / \eta \cos \eta \cos \theta + D \cos \theta (\cos \eta^2 - \eta^2) \\ &\quad + E / \eta / \theta + F \cos \eta / \theta \end{aligned}$$

quibus valoribus substitutis binæ acuationes inventæ induent has formas:

$$\begin{aligned} \text{I.} & -A \cos \eta / \theta^2 - B \cos \eta - C \cos \eta \cos \theta^2 - D / \eta \cos \theta^2 + E (1 + \cos \eta^2) \\ & \quad / \theta \cos \theta - F / \eta \cos \eta / \theta \cos \theta = 0 \\ \text{II.} & -A \sin \theta - B \sin \theta + E \cos \eta \cos \theta - F / \eta \cos \theta = 0 \end{aligned}$$

quarum posterior præbet  $\tan \theta = \frac{E \cos \eta - F \sin \eta}{A + B}$ . At II.  $\cos \eta / \theta - I$

præbet

$$B \cos \eta \cos \theta^2 + C \cos \eta \cos \theta^2 + D \sin \cos \theta^2 - E \sin \cos \theta = 0,$$

unde colligitur  $\tan \theta = \frac{(B + C) \cos \eta + D / \eta}{E}$ ; hincque tandem  $\tan \eta =$

$\frac{EE - (A + B)(B + C)}{(A + B)D + EF}$ : unde ambo anguli  $RIA = \eta$  et  $AID = \theta$  atque adeo axis gyrationis ID innotescit.

### COROLL. I.

633. Proposita ergo vi quacunque  $Rr = V$ , cui simul æqualis in ipso centro inertiae I contrarie fit applicata, si per I planum ad directionem vis normale ducatur PIR, atque ad id recta IQ perpendicularis, his ternis directricibus IR, IP, IQ pro quovis elemento corporis  $dM$  in Z sito parallelæ capiantur coordinatæ  $IX = x$ ,  $XY = y$ , et  $YZ = z$ , hincque ex indole corporis colligi debent sequentes sex valores:

$$\begin{aligned} /xxdM &= A, \quad /yydM = B, \quad /zzdM = C; \quad /xydM = D; \\ /xzdM &= E; \quad /yzdM = F. \end{aligned}$$

### COROLL. 2.

634. His inventis in plano RIP ad directionem vis normali ex opposito coordinatarum  $XY = y$  positivarum, seu in regione negativarum capiatur angulus  $RIA = \eta$  ut sit  $\tan \eta = \frac{EE - (A + B)(B + C)}{(A + B)D + EF}$ , quo invento super illo plano in regione coordinatarum  $YZ = z$  positivarum erigatur

erigatur angulus  $AID = \theta$ , ut sit  $\tan \theta = \frac{E \cos \eta - F \sin \eta}{A + B}$  seu  $\tan \theta = \frac{(B + C) \cos \eta + D \sin \eta}{E}$  eritque recta  $ID$  axis gyrationis.

## COROLL. 3.

635. Posita distantia  $IR = b$ , erit respectu hujus axis  $ID$  momentum vis sollicitantis  $= Vb \sin \eta \cos \theta$ , et momentum inertiae  $= \int RR dM$ , quod etiam est  $= \tan \eta \cos \theta \int XZ dM = \cot \theta \int XY dM$ , cujus valor ex praecedentibus facile eruitur: inde vero elemento temporis  $dt$  conversio fit per angulum  $d\omega = \frac{Vgb dt \sin \eta \cos \theta}{\int RR dM}$ .

## SCHOLION.

636. En ergo problema nostrum generale, in quo summa hujus capituli versatur, perfecte solutum; unde quidem casus ante tractatus sponte finit, quippe quo est angulus  $\theta = 0$ : nam tunc fit ex formula priori  $\tan \eta = \frac{E}{F}$  et ex posteriore  $\tan \eta = \frac{-B-C}{D}$ , qui valores nisi convenient, casus ille locum habere nequit. Vicissim autem si fuerit  $DE + (B + C)F = 0$ , ob  $B + C = \frac{-DE}{F}$ , fit  $\tan \eta = \frac{E}{F}$  et  $\tan \theta = 0$ . Ceterum hic observo, ex iis quae supra de axibus principalibus sunt tradita esse

$$\int XY dM = \frac{-d \int RR dM}{2 d \theta} \text{ sumto tantum } \theta \text{ variabili, et}$$

$$\int XZ dM = \frac{d \int RR dM}{2 d \eta \cos \theta} \text{ sumto tantum } \eta \text{ variabili.}$$

Quibus valoribus substitutis binae conditiones principales postulant

$$\frac{\int \eta \cdot d \int RR dM}{2 d \eta} = \cos \eta \int RR dM \text{ et } \frac{-\cos \theta \cdot d \int RR dM}{2 d \theta} = \int \theta \int RR dM,$$

in quarum priore tantum  $\eta$  in posteriore tantum  $\theta$  est variabile. Utriusque igitur idem est integrale  $\int RR dM = a \sin^2 \eta \cos^2 \theta$ , unde vicissim

concludo, angulos  $\eta$  et  $\theta$  ita definiri oportere, ut quantitas  $\frac{\sin^2 \eta \cos^2 \theta}{\int RR dM}$  fiat minimum, quoniam hinc eadem binae aequationes resolvendae proveniunt.

venit. Eadem autem formula oritur, si  $d\omega^2 / RRdM$  seu  $\int dM.RRd\omega^2$  reddatur minimum, in qua cum  $Rd\omega$  denotet celeritatem elementi  $dM$ , ideoque  $dM.RRd\omega^2$  ejus vim vivam uti vocatur, hinc colligimus istud infigne Theorema.

THEOREMA. 8.

637. Si corpus rigidum quiescens sollicitetur a vi quacunque, ei que insuper in centro inertiae applicata sit vis aequalis et contraria, ei circa ejusmodi axem per centrum inertiae transeuntem primo instanti motus gyratorius imprimetur, ut totum corpus inde minimam adipiscatur vim vivam, quae est aggregatum omnium elementorum per quadrata celeritatum suarum acquisitarum multiplicatorum.

DEMONSTRATIO.

Quicumque enim axis per centrum inertiae transiens accipiat, ejus respectu vis proposita  $V$  certum obtinebit momentum quod si  $Vf$ , tum vero etiam corpus ejus respectu certum obtinebit momentum inertiae, quod sit  $= \int RRdM$ : utrumque a situ axis assumti pendens; hinc autem tempusculo  $dt$  generabitur circa hunc axem angulus  $d\omega = \frac{Vfgdt^2}{\int RRdM}$ , et celeritas angularis infinite parva  $u = \frac{2Vfgdt}{\int RRdM}$ : unde elementi  $dM$  ab axe intervallo  $= R$  distantis celeritas sit  $= Ru$ , ideoque vis viva  $= R^2 u^2 dM$ . Totius ergo corporis vis viva tempusculo infinite parvo  $dt$  acquisita erit  $= uu / R^2 dM = \frac{4VVffggdt^2}{\int RRdM}$ , quae ob  $V$   $g$  et  $dt$  constans erit minimum, si  $\frac{ff}{\int RRdM}$  reddatur minimum, atque ex hac conditione positio axis determinetur. Hinc autem eadem axis determinatio resultat, quam ante invenimus: ita ut ex hoc principio minimi eadem solutio erui potuisset.

SCHOLIUM.

638. Quod ad usum solutionis ante inventae attinet, hoc adhuc nimis est molestum, quod unaquaque vi sollicitante indoles corporis ad peculiare coordinatas revocari debeat. Cui incommodo remedium affertur per ea quae supra de axibus principalibus cujusque corporis docuimus, quorum respectu si momenta inertiae semel fuerint inventa, facillime inde respectu omnium aliorum axium colligi possunt. Atque

etiam pro praesenti instituto sufficit, relationem corporis ad coordinatas axibus principalibus parallelas nosse, quoniam et hinc relatio ad quasvis alias ternas coordinatas derivari potest. Quamobrem problema superius ita resolvam, ut vim sollicitantem respectu axium principalium dari assumam; ac solutionem ipsam ex principio jam stabilito, quod minima vis viva generetur, petam.

P R O B L E M A. 60.

639. Datis corporis rigidi axibus principalibus eorumque respectu momentis inertiae, si id a vi quacunque sollicitetur, simulque ipsi in centro inertiae applicata sit alia vis illi aequalis et contraria, definire axem, circa quem corpus primum gyroni incipiet.

S O L U T I O.

Fig. 82. Sit I centrum inertiae corporis, et rectae IA, IB, IC ejus tres axes principales, quorum respectu momenta inertiae sint  $M_{aa}$ ,  $M_{bb}$ ,  $M_{cc}$ . Iam a quacunque vi corpus sollicitetur, notetur ejus transitus per planum binis axibus principalibus interceptum AIB, qui sit in puncto V, ab I distante intervallo  $IV = b$ : existente angulo  $AIV = \delta$  ipsa autem vis, quasi huic puncto esset applicata, resolvatur in ternas axibus parallelas quae sint vis  $VP = P$ , vis  $VQ = Q$ , et vis  $VR = R$ , quibus igitur aequales et contrariae in puncto I applicatae sunt intelligendae. Ab his ergo corpus circa quempiam axem per centrum inertiae I transeuntem verti incipiet, qui sit IF ad planum BIA inclinatus angulo  $FIE = \theta$  existente angulo  $AIE = \eta$ , quos binos angulos investigari oportet. Iam primo respectu hujus axis IF quaeratur momentum inertiae, quod cum sit  $\cos AIF = \cos \eta \cos \theta$ ,  $\cos BIF = -\sin \eta \cos \theta$ ,  $\cos CIF = \sin \theta$  erit per superiora

$$M (aa \cos \eta^2 \cos^2 \theta + bb \sin^2 \eta \cos^2 \theta + cc \sin^2 \theta).$$

Deinde momenta virium P, Q, R respectu axis hujus IF sunt investiganda; ex antecedentibus autem patet, ducta VM ad IE normali ut  $VM = b \sin (\delta + \eta)$ , fore vis  $VR = R$ , momentum  $= R \cdot VM \cdot \cos \theta = Rb \sin (\delta + \eta) \cos \theta$ . Verum quo reliquarum virium momenta facilius inveniri queant, puncta V, A, B, C, E, F in superficie sphaerica considerentur cujus centrum sit in I. Erunt ergo arcus AB, AC et BC quadrantes.  $AV = \delta$ ,  $AE = \eta$ ,  $EF = \theta$ ; et vires P, Q, R in V applicatae resolvantur in binas, quarum alterae sint in superficiem sphaericam normales, alterae superficiem sphaericam tangent, ubi

Fig. 83.

ubi priores per centrum transeuntes nulla praebent momenta, unde solas posteriores considerare sufficit, quae erunt: vis sec.  $VA = P \sin AV$ ; vis sec.  $VB = Q \sin BV$  et vis sec.  $VC = R \sin CV = R$  ob  $CV$  quadrantem. Hae vires porro resolvantur secundum directionem  $VF$ , et aliam ad eam normalem, ubi priores cum axe  $IF$  in eodem plano sitae nullum praebent momentum, alterae autem vires erunt

$$P \sin AV \sin AVF - Q \sin BV \sin BVF - R \sin CVF$$

quarum directio cum sit ad planum  $IFV$  normalis, erit etiam in plano ad axem  $IF$  normali, unde cum distantia ab axe sit  $= b \sin FV$ , ob  $AV = \delta$ , et  $\sin BVF = \sin AVF$  erit momentum quaesitum  $= b ((P \sin \delta - Q \cos \delta) \sin AVF \sin FV - R \cos AVF \sin FV)$  at  $\sin AVF \sin FV = \sin FE = \sin \theta$ , sicque momentum habebitur

$$P b \sin \delta \sin \theta - Q b \cos \delta \sin \theta - R b \cos AVF \sin \theta$$

at ex sphaericis est  $\cos AVF \sin \theta = (\delta + \eta) \cos \theta$ , ita ut momentum quaesitum sit  $= P b \sin \delta \sin \theta - Q b \cos \delta \sin \theta - R b (\delta + \eta) \cos \theta$ , ex quo angulus tempusculo de genitus fit

$$d\omega = \frac{g b \delta t^2 (P \sin \delta \sin \theta - Q \cos \delta \sin \theta - R (\delta + \eta) \cos \theta)}{M (a a \cos^2 \eta^2 \cos^2 \theta^2 + b b \sin^2 \eta^2 \sin^2 \theta^2 + c c \sin^2 \theta^2)}$$

Quocirca minimum reddi debet haec expressio

$$\frac{((P \sin \delta - Q \cos \delta) \sin \theta - R (\delta + \eta) \cos \theta)^2}{a a \cos^2 \eta^2 \cos^2 \theta^2 + b b \sin^2 \eta^2 \sin^2 \theta^2 + c c \sin^2 \theta^2}$$

statuamus primo  $\theta$  tantum variabile, et fiet:

$$\begin{aligned} & 2(a a \cos^2 \eta^2 \cos^2 \theta^2 + b b \sin^2 \eta^2 \sin^2 \theta^2 + c c \sin^2 \theta^2) ((P \sin \delta - Q \cos \delta) \cos \theta \\ & \quad + R (\delta + \eta) \sin \theta) = \\ & 2(-a a \cos^2 \eta^2 \sin \theta \cos \theta - b b \sin^2 \eta^2 \sin \theta \cos \theta + c c \sin \theta \cos \theta) \\ & \quad ((P \sin \delta - Q \cos \delta) \sin \theta - R (\delta + \eta) \cos \theta) \end{aligned}$$

quae reducitur ad hanc formam

$$(P \sin \delta - Q \cos \delta) (a a \cos^2 \eta^2 + b b \sin^2 \eta^2) \cos \theta + R c c (\delta + \eta) \sin \theta = 0$$

$$\text{unde oritur } \tan \theta = \frac{(Q \cos \delta - P \sin \delta) (a a \cos^2 \eta^2 + b b \sin^2 \eta^2)}{R c c \sin (\delta + \eta)}$$

Nunc sumto  $\eta$  variabili obtinebimus:

$$\begin{aligned} & 2(a a \cos^2 \eta^2 \cos^2 \theta^2 + b b \sin^2 \eta^2 \cos^2 \theta^2 + c c \sin^2 \theta^2) (-R \cos (\delta + \eta) \cos \theta) = \\ & 2(-a a \sin \eta \cos \eta \cos^2 \theta^2 + b b \sin \eta \cos \eta \cos^2 \theta^2) ((P \sin \delta - Q \cos \delta) \\ & \quad \sin \theta - R (\delta + \eta) \cos \theta) \end{aligned}$$

quae reducitur ad hanc formam

Ii 2

R cos

$$R \cos \theta (aa \cos \delta \cos \eta \cos \theta^2 - bb f \delta f \eta \cos \theta^2 + cc \cos (\delta + \eta) f \theta^2) = (Q \cos \delta - P f \delta) (bb - aa) f \eta \cos \eta f \theta \cos \theta^2$$

ubi si loco  $Q \cos \delta - P f \delta$  ponatur  $\frac{R c c f (\delta + \eta) \tan \theta}{aa \cos \eta^2 + bb f \eta^2}$ , facta reductione

pervenitur ad hanc aequationem

$$\cos \theta^2 (aa \cos \delta \cos \eta - bb f \delta f \eta) (aa \cos \eta^2 + bb f \eta^2) + cc f \theta^2 (aa \cos \delta \cos \eta - bb f \delta f \eta) = 0$$

quae per  $aa \cos \delta \cos \eta - bb f \delta f \eta$  divisa praebet

$$\cos \theta^2 (aa \cos \eta^2 + bb f \eta^2) + cc f \theta^2 = 0$$

aequationem impossibilem ob omnes partes positivas. Quare divifore

utentes nanciscimur determinationem anguli  $\eta$  scilicet  $\tan \eta = \frac{aa \cos \delta}{bb f \delta}$

ex quo porro colligitur  $\tan \theta = \frac{(Q \cos \delta - P f \delta) aa bb}{R c c r (a^2 \cos \delta^2 + b^2 f \delta^2)}$  vel ne  
ambiguitas signi radicalis dubium relinquat

$$\tan \theta = \frac{(Q \cos \delta - P f \delta) aa \cos \eta}{R c c f \delta} = \frac{(Q \cos \delta - P f \delta) bb f \eta}{R c c c o f \delta}$$

Hoc jam axe invento si pro  $Q \cos \delta - P f \delta$  valor superior substituat, colligitur momentum virium sollicitantium respectu istius axis =

$$\frac{R b f (\delta + \eta) (aa \cos \eta^2 \cos \theta^2 + bb f \eta^2 \cos \theta^2 + cc f \theta^2)}{(aa \cos \eta^2 + bb f \eta^2) \cos \theta}$$

unde angulus elementaris  $d\omega$  tempusculo  $dt$  circa axem genitus erit

$$d\omega = \frac{R g b d t^2 f (\delta + \eta)}{M \cos \theta (aa \cos \eta^2 + bb f \eta^2)} = \frac{R g b d t^2 r (a^2 \cos \delta^2 + b^2 f \delta^2)}{M a a b b \cos \theta}$$

in  $(\delta + \eta)$  loco anguli  $\eta$  valor repertus substituitur.

### COROLL. 1.

Fig. 82.

640. Ex puncto ergo V, in quo directio vis sollicitantis planum AIB traiecit, statim invenitur in eodem plano recta IE cui axis gyrationis IF imminet: posito enim angulo AIV =  $\delta$ , erit  $\tan AIE = \tan \eta = \frac{aa \cos \delta}{bb f \delta}$ : neque a directione ipsius vis pendet.

CO-

# GENERATIONE IN CORPORIBUS RIGIDIS. 253

## COROLL. 2.

641. Quare si vis sollicitans per axem principalem IA transeat, angulus AIE sit rectus, axisque gyrationis IF erit in plano ad axem IA normali. At ob  $\delta = 0$  et  $\eta = 90^\circ$  erit  $\tan EIF = \tan \theta = \frac{Qbb}{Rcc}$ .

## COROLL. 3.

642. Si momenta inertiae respectu axium IA et IB fuerint aequalia, erit  $\tan \eta = \cot \theta = \tan (90^\circ - \delta)$ , ideoque angulus VIE rectus: hoc igitur casu axis gyrationis IF erit ad rectam IV normalis, et  $aa = \theta b$  fiet  $\tan \theta = \frac{(Q \cos \delta - P \sin \delta) aa}{Rcc}$ .

## COROLL. 4.

643. Si vis sollicitans, quae sit  $= V$ , et cujus directio planum AIB in puncto V trajicit, ex cujus resolutione nascuntur vires P, Q, R, sola in corpus agat, ea corporis motum assignatur circa axem inventum IF inducet, praeterea vero ipsi motum progressivum secundum suam directionem imprinet, qua tempusculo  $dt$  conficiet spatiolum  $= \frac{Vgd t^2}{M}$ .

## SCHOLION.

644. In solutione hujus problematis jucundum sane erat perspicere, quomodo calculus, qui initio non parum intricatus videbatur, continuo ad majorem simplicitatem quasi sponte fuerit perductus, in quo eximium veritatis criterium cernitur. Plerumque enim talis calculi commoditas deprehenditur, dum in veritatis investigatione felici successu versamur, cum contra a veritatis tramite aberrantes in calculos inextricabiles illabi solemus. Ac principium quidem minimi, quo hic sum usus, elegantem suppeditavit solutionem, quae multo intricatior evasisset, si eam ut ante ex primis mechanicae principiis petere voluissemus. Nunc ergo problema, quo praesens caput absolvitur, in genere pertractare licebit.

## PROBLEMA. 61.

645. Si corpus rigidum quiescens a viribus quibuscunque sollicitetur, definire primum motum elementarem, qui in eo geretur.



## SOLUTIO.

Ex Theor. VII. omnes vires sollicitantes, quocunque fuerint, reducantur ad binas, quarum altera ipsi centro inertiae sit applicata, altera vero extra hoc centrum directae: harum prior sit  $S$  posterior  $= V$ . His duabus viribus inventis primo sola vis  $V$  consideretur, cui aequalis in ipso centro inertiae contrarie applicata concipiatur, ut centrum inertiae etiam nunc in quiete conservetur. Dispiciatur ergo, ubi directio illius vis  $V$  per planum aliquod intra binos axes principales corporis transeat, et ex probl. praeced. quaeratur tam axis gyrationis circa quem corpus primum converti incipiet, quam angulus infinite parvus primo tempusculo productus. Tum autem corpori insuper motus progressivus imprimetur, ad quem inveniendum vis illa altera  $V$  secundum suam directionem ipsam quoque centro inertiae applicata concipiatur, ita ut conjunctim cum vi priore  $S$  jam corpus sollicitet; et quia utraque centro inertiae est applicata, inde oriatur motus progressivus purus, qui si cum gyratorio ante invento combinetur, habebitur totus effectus a viribus propositis productus.

## COROLL. 1.

646. Si vis  $V$  evanescat, hoc est, si unica detur vis  $S$  centro inertiae applicata, quae omnibus viribus sollicitantibus aequivaleat, tum ut supra jam vidimus, corpori solus motus progressivus imprimitur.

## COROLL. 2.

647. Si autem vis  $S$  aequalis sit  $V$  sed directionem habeat oppositam, quod fit si vires sollicitantes ita fuerint comparatae, ut omnes quaeque in sua directione centro inertiae applicatae se mutuo destruerent, tum centrum inertiae in quiete perseverabit, solusque motus gyratorius generabitur.

## COROLL. 3.

648. Reliquis casibus omnibus in corpore motus mixtus generabitur; alter progressivus, alter circa certum quendam axem per centrum inertiae transeuntem; quorum utrumque scorsim considerare ac determinare licet.

## SCHOLIUM.

649. Idem effectus produceretur ab his viribus sollicitantibus, etiam si corpus in motu versetur, verum ob hujus motus admixtionem diffi-

difficilius cognosci poterit. Si enim corpus jam circa alium axem gyretur ac nunc incitatur, non solum celeritas angularis sed etiam ipse axis gyrationis mutabitur, ita ut nunc circa alium axem per centrum inertiae transeuntem gyrari incipiat. Atque in hac axis variatione maxima motus perturbatio est sita, ad quam explicandam primo conveniēt hujusmodi perturbationem momentaneam accurate determinari, quod argumentum in sequente capite evolvamus.

## CAPUT X.

### DE VARIATIONE MOMENTANEA AXIS GYRATIONIS A VIRIBUS PRODUCTA.

#### PROBLEMA. 62.

650. Si corpus rigidum, dum circa axem per centrum inertiae transeuntem gyrationem, ab ejusmodi viribus sollicitetur, quae ipsi si quiesceret, motum gyrationem circa alium axem essent impressurae, determinare motus mutationem tempusculo minimo productum.

#### SOLUTIO.

Cum tam in motu jam insito, quam in eo, qui a viribus impresseretur, centrum inertiae quiescat, id etiam conjunctim in quiete perseverabit. Consideretur ergo centrum inertiae  $I$  tanquam centrum sphaerae. in cujus superficie sit  $O$  polus, et  $IO$  axis circa quem corpus jam gyretur celeritate angulari  $= \omega$ : idque in eum sensum, quo punctum  $S$  feratur in  $s$ . Tum vero corpus ab ejusmodi viribus sollicitetur, ut si quiesceret, gyraretur circa polum  $S$  seu axem  $IS$ , tempusculoque  $dt$  verteretur per angulum  $qdt^2$ , quandoquidem vidimus hunc angulum quadrato tempusculi  $dt$  esse homogeneum, fiatque hac conversio in eum sensum, quo punctum  $O$  versus  $\omega$  ferretur. Datur ergo angulus, quem hi duo axes  $OI$  et  $SI$  in  $I$  constituunt, seu in superficie sphaerica arcus circuli maximi  $OS$ , qui ponatur  $OS = r$ : ac tempusculo  $dt$  hic arcus  $OS$ , ob motum insitum, circa polum  $O$  gyrabitur per angulum  $SOs = \omega dt$  perventurus in situm  $Os$ , ut esset arcus  $Ss = \omega dt$  sit  $s$ . Ob motum autem impressum idem arcus  $OS$  circa polum  $S$  gyrabitur per angulum  $OS\omega = qdt^2$  perventurus in situm  $S\omega$ , ut esset arcus

Fig. 84.

culus  $C\omega = qdt^2 \sin s$ . Utroque igitur hoc motu simul punctum  $S$  in  $s$  et punctum  $O$  in  $\omega$  transferetur, quia neutra translatio alteram turbat: reliqua autem puncta omnia utrumque motum percipient. Scilicet punctum quodvis  $o$  in ipso arcu  $OS$  assumptum, ut sit  $Oo = \omega$ , ob motum insitum circa  $o$  transferetur in  $m$ , ut sit  $om = udt \sin \omega$ , at ob motum genitum circa  $S$  transferetur in  $\mu$  ut sit  $o\mu = qdt^2$ , si  $(s - \omega)$ . Prout jam fuerit vel  $om > o\mu$  vel  $o\mu > om$ , punctum  $o$  ob utrumque motum conjunctionem vel  $m$  versus vel  $\mu$  versus per differentiam istorum arcuorum feretur. Quare si fuerit  $om = o\mu$ , punctum  $o$  refera quiescet, eritque propterea polus circa quem corpus jam gyrari est censendum: ita ut ob vires sollicitantes axis gyrationis  $IO$  tempusculo  $dt$  in  $Io$  transferetur. Ad hanc igitur axis variationem momentaneam inveniendam ponamus  $om = o\mu$ , seu  $u dt \sin \omega = q dt^2 \sin (s - \omega)$  erit  $u \sin \omega = q dt \sin s \cos \omega - q dt \cos s \sin \omega$ , unde evidens est arculum  $Oo = \omega$  esse infinite parvum, ideoque  $\sin \omega = \omega$  et  $\cos \omega = 1$  hinc  $\omega = \frac{q dt \sin s}{u + q dt \cos s}$

$= \frac{q dt \sin s}{u}$ . Circa hunc autem axem  $Io$  corpus tanta celeritate angulari

gyratur, qua tempusculo  $dt$  puncta  $O$  et  $S$  in  $\omega$  et  $s$  transferantur, unde ea cognosci poterit. Cum enim ea tempusculo  $dt$  conficiatur angulus =

$$\frac{O\omega}{Oo} = \frac{q dt^2 \sin s}{\omega} = dt (u + q dt \cos s) \text{ praecedente autem tempusculo ob}$$

similem vim, quippe quae nunc non subito exorta est putanda, angulus confectus censeri debeat  $= dt (u - q dt \cos s)$ , ita ut differentia sit  $2q dt^2 \cos s$  ipsa celeritas angularis augmentum accepit  $2q dt \cos s$  atque ob similem rationem quia valor  $q$  dum ad variationes continuas definiendas inducitur, duplicari debet, etiam spatium  $Oo$  duplo majus est censendum. Dum enim in calculo punctum  $O$  continuo progredi assumitur, hic autem in  $o$  quiescens assumatur, intervallum  $Oo$  hic inventum diversum est a spatioso, per quod polus gyrationis profertur concipiatur enim punctum  $o'$  ut sit  $Oo' = 2Oo$ , ac dico fore;  $o$  polum gyrationis post tempus  $dt$ , cum initio esset  $O$ . Hoc enim posito manifestum est interea punctum  $o$  manere immotum. Quare cum hic invenissemus

$$Oo = \frac{q dt \sin s}{u}, \text{ spatium } Oo' \text{ per quod polus gyrationis transiisse est}$$

censendus erit duplo majus  $= \frac{2q dt \sin s}{u}$ . Vires ergo, quae corpori si

quiesceret,

quiesceret, imprimerent motum gyrationis circa axem IS in sensum OS quo tempusculo  $dt$  abolveretur angulus  $OS\omega = qdt^2$ , motum corporis gyrationis jam insitum circa axem IO in sensum S $\epsilon$  celeritate angulari =  $\omega$  ita turbant, ut elapso tempusculo  $dt$  axis gyrationis sit recta Io, a praecedente IO versus IS vergens angulo  $OIo = \frac{2qdt^3}{3}$ , simulque celeritas gyrationis  $\omega$  augmentum capiat =  $2qdt \cos i$ .

### COROLL. 1.

651. Si vires sollicitantes in sensum oppositum tenderent; quantitas  $q$  negative accipi deberet, et punctum  $o$  in arcum SO ultra O productum caderet, celeritasque gyrationis minueretur.

### COROLL. 2.

652. Si arcus OS vel evanesceret, vel semicirculo esset aequalis, axis gyrationis IO non mutaretur, sed totus effectus in priori motu gyrationis vel accelerando vel retardando consumeretur. Qui est casus jam supra pertractatus, ubi ostendimus incrementum vel decrementum celeritatis angularis esse  $2qdt$ .

### COROLL. 3.

653. Si arcus OS est quadrans circuli, ideoque  $\cos i = 0$ , celeritas angularis  $\omega$  nullam mutationem patietur, sed totus effectus virium in axe gyrationis mutando insinuetur, eum vel propius ad S vel longius inde removendo.

### SCHOLION. 1.

654. Hic ejusmodi tantum vires sumus contemplati, quae corpori, si quiesceret, motum gyrationis simplicem imprimerent, centro inertiae manente immoto; cujusmodi effectum producant vires quaecunque, si modo ipsis aequales et contrariae in centro inertiae applicentur, quemadmodum in superiori capite fusiis est ostensum. Neque vero pro aliis viribus indagatio erit difficilior, cum eae eundem motum gyrationis semper producant, ac si ipsis aequales et contrariae centro inertiae essent applicatae: motus enim progressivus, quem corpori praeterea inducunt, etiam hic nihil in motu gyrationis, qui corpori jam inest, esset mutaturus. Quin etiam si in corpore praeter motum gyrationis circa axem IO jam inesset motus progressivus, is nihil a gyratione

Kk

ratione circa axem IS genita mutaretur : ex quo solutio hujus problematis latissime patet, atque etiam ad motum progressivum, quem corpus vel jam habet, vel a viribus sollicitantibus nancisceretur, extendi potest. Quae combinatio motus progressivi cum gyratorio, cum nihil habeat difficultatis, hic erat praecipuum opus, ut quantum motus gyratorius, ob alium motum gyratorium a viribus oriundum, perturbetur, sollicito definiremus.

## SCHOLION. 2.

655. Si axis IO, circa quem corpus jam gyri assumitur, esset corporis axis principalis, corpus hunc motum, si a nullis viribus sollicitaretur, perpetuo esset conservatum, uti in antecedentibus demonstravimus. Verum si axis IO non sit principalis, etiamsi nullae vires extrinsecus urgerent, tamen motus conservari non posset, quoniam ipse motus vires suppeditat, quae ad axem gyrationis deflectendum tendunt : hoc ergo casu, si quanta variatio in axe gyrationis gignatur, explorare velimus, non sufficit, vires extrinsecus in corpus agentes contemplari, sed cum iis etiam conjungi debent vires ex ipso motu gyratorio natae, quibus axem supra affici ostendimus. Quae vires cum pendent a positione axis gyrationis IO respectu axium principalium corporis, haud abs re erit, antequam ulterius progrediamur, in genere investigare, quomodo a viribus quibusque positio axis gyrationis respectu axium principalium corporis immutetur.

## PROBLEMA. 63.

656. Data positione axis gyrationis respectu trium axium principalium corporis, isque a viribus sollicitantibus varietur, ut corpus elapso tempusculo minimo circa alium axem gyretur, definire positionem hujus axis variati respectu axium principalium.

## SOLUTIO.

Fig. 85. Consideretur iterum superficies sphaerica, in cujus centro sit corporis centrum inertiae I, sintque nunc radii IA, IB, IC axes principales corporis, corpusque circa axem IO gyretur celeritate angulari  $\omega$ , cujus positio cum detur respectu axium principalium, ponatur arcus  $AO = a$ ,  $BO = c$ , et  $CO = \gamma$ , ut sit  $\cos a^2 + \cos c^2 + \cos \gamma^2 = 1$ . Tum vero ponantur anguli  $BAO = \lambda$ ,  $CBO = \mu$ , et  $ACO = \nu$ , erit ob quadrantes AB, BC, et CA

$$\cos c = \sin a \cos \lambda; \cos \gamma = \sin c \cos \mu; \cos a = \sin \gamma \cos \nu, \text{ unde sit } \cos$$

$$\cos \lambda = \frac{\cos \zeta}{f_a}; \cos \mu = \frac{\cos \gamma}{f_\zeta}; \cos \nu = \frac{\cos a}{f_\gamma}$$

$$f_\lambda = \frac{\cos \gamma}{f_a}; f_\mu = \frac{\cos a}{f_\zeta}; f_\nu = \frac{\cos \zeta}{f_\gamma}, \text{ ergo}$$

$$\tan \lambda = \frac{\cos \gamma}{\cos \zeta}; \tan \mu = \frac{\cos a}{\cos \gamma}; \tan \nu = \frac{\cos \zeta}{\cos a}$$

ideoque  $\tan \lambda \tan \mu \tan \nu = 1$ ; quae est relatio inter ternos angulos  $\lambda, \mu, \nu$ , ex quibus arcus  $a, \zeta, \gamma$  ita definiuntur, ut sit:

$$\tan a = \frac{\tan \nu}{\cos \lambda} = \frac{\cot \mu}{f_\lambda}; \tan \zeta = \frac{\tan \lambda}{\cos \mu} = \frac{\cot \nu}{f_\mu}; \tan \gamma = \frac{\tan \mu}{\cos \nu} = \frac{\cot \lambda}{f_\nu}$$

His relationibus notatis ex datis  $\text{BAO} = \lambda$  et  $\text{AO} = a$  reliqua sic definiuntur, ut sit

$$\cos \zeta = f_\mu a \cos \lambda; \cos \gamma = f_\lambda a \cos \lambda; \tan \mu = \frac{\cot a}{f_\lambda}; \tan \nu = \tan a \cos \lambda.$$

Quodsi jam ob vires sollicitantes tempusculo  $dt$  axis gyrationis IO abeat in  $\text{I}o$ , totum corpus, quasi interea circa axem  $\text{I}o$  esset gyratum, considerari potest, quo motu puncta A, B, C, suas distantias a puncto o conservabunt; ita ut elapso tempusculo  $dt$ , polus gyrationis o a polis principalibus A, B, C, habiturus sit distantias  $\text{Ao}, \text{Bo}, \text{Co}$ . Quare si detur angulus elementaris  $\text{OA}o = d\lambda$ , et  $\text{Ao} = a + da$ , variatio reliquorum per differentiationem consuetam elicietur:

$$d\zeta = \frac{d\lambda f_\mu a \cos \lambda - da \cos \lambda \cos \lambda}{f_\mu \zeta}$$

$$d\gamma = \frac{-d\lambda f_\lambda a \cos \lambda - da \cos \lambda \cos \lambda}{f_\lambda \gamma}$$

$$d\mu = \frac{-da f_\lambda - d\lambda f_\lambda a \cos \lambda \cos \lambda}{\cos a^2 + f_\lambda^2 f_\lambda^2}; d\nu = \frac{da \cos \lambda + d\lambda f_\lambda a \cos \lambda \cos \lambda}{\cos a^2 + f_\lambda^2 \cos \lambda^2}.$$

C O R O L L. I.

657. Si ab his differentialibus ad integralia progredi liceret, in corpore ad quodvis tempus ille axis, circa quem tum sit gyraturum, ejusque positio respectu axium principalium assignari posset.

Kk 2

CO.

## C O R O L L. 2.

658. Hic scilicet non ad ipsum motum corporis respicimus, sed tantum id agitur, ut variatio momentanea axis gyrationis respectu axium principalium cognoscatur, ideoque ipsa celeritas gyrationis hic in computum non est ingressa.

## C O R O L L. 3.

659. Cum in praecedente problemate arcus  $Oo$  sit determinatus, hic erit  $Oo = r(da^2 + d\lambda^2/a^2)$ , tum vero pro positione hujus arcus  $Oo$  respectu arcus  $AO$  seu  $Ao$  est  $\text{tang } AoO = \frac{d\lambda/a}{da}$ . Seu  $\text{fi } AoO$

$$= \frac{d\lambda/a}{Oo} \text{ et } \text{cof } AoO = \frac{da}{Oo}, \text{ ita ut hinc habeamus elementa: } da = \frac{Oo \cdot \text{cof } AoO}{\text{fi } a} \text{ et } d\lambda = \frac{Oo \cdot \text{fi } AoO}{\text{cof } a}.$$

## S C H O L I O N.

660. Cognitis ergo viribus, quibus corpus, dum circa quempiam axem gyatur, sollicitatur, per caput praecedens is axis, circa quem quiescens gyrari inciperet, definiri: tum vero ope praecedentis problematis variatio in axe gyrationis facta explorari poterit. Verum nisi corpus primo circa axem quempiam principalem gyretur, praeter vires externas, quibus corpus forte sollicitatur, imprimis eae vires, quae ex ipso motu gyatorio, ejusque vi centrifuga nascuntur, pendendi debent. Quas vires etiam si supra jam in genere assignavimus, tamen easdem nunc denuo respectu axium principalium, quatenus axis gyrationis ab iis discrepat, determinari oportet: quibus cognitis, cum facile sit eas cum viribus externis conjungere, eas deinceps solas contemplantur, et quantum positio axis gyrationis iis turbetur, accurate investigemus.

## P R O B L E M A. 64.

661. Si corpus rigidum gyretur circa axem quemcunque per ejus centrum inertiae transeuntem, cujus positio respectu axium principalium detur, invenire vires hinc ad axem gyrationis turbandum natas.

## S O L U T I O.

Fig. 86.

Existente I centro inertiae sint  $IA$ ,  $IB$ , et  $IC$  ejus axes principales, eorumque respectu momenta inertiae  $Maa$ ,  $Mbb$  et  $Mcc$ . Gyretur autem

autem corpus circa axem IO, celeritate angulari =  $\omega$ , ex cujus quovis puncto O demittatur ad planum AIB perpendiculum OL, ductaque recta IL vocentur anguli AIL =  $m$  et LIO =  $n$ , ita ut pro situ hujus axis IO respectu axium principalium sit  $\cos AIO = \cos m \cos n$ ;  $\cos BIO = \sin m \cos n$  et  $\cos CIO = \sin n$ . Iam sumtis primo axibus principalibus pro directricibus iis parallelae constituentur ternae coordinatae IX =  $x$ , XY =  $y$  et YZ =  $z$ ; et in Z sumto corporis elemento  $dM$  erit ex natura axium principalium  $\int xy dM = 0$ ;  $\int xz dM = 0$ , et  $\int yz dM = 0$ , tum vero  $\int (yy + zz) dM = Maa$ ;  $\int (xx + zz) dM = Mbb$ ; et  $\int (xx + yy) dM = Mcc$  ideoque:

$$\int xxdM = \frac{1}{2} M (bb + cc - aa); \int yydM = \frac{1}{2} M (aa + cc - bb); \\ \int zzdM = \frac{1}{2} M (aa + bb - cc).$$

Porro in plano AOB ducta IP ad IL, et in plano LOC recta IQ ad IO normali, ut rectae IO, IP et IQ sint inter se normales, quas tanquam directrices adhibeamus. Hunc in finem ducatur primo YS ipsi IP in plano AIB parallela, erit IS =  $x \cos m + y \sin m$ ; et YS =  $y \cos m - x \sin m$ : atque ex Z ipsi YS agatur parallela Zy, quae erit in planum LIO normalis, et Zy =  $y \cos m - x \sin m$ , item Sy = YZ =  $z$ . Denique ex y ad IO demittatur perpendiculum yx, ut jam desideratae coordinatae sint Ix = X, xy = Y et yZ = Z fietque

$$X = IS \cos n + Sy \sin n = x \cos m \cos n + y \sin m \cos n + z \sin n$$

$$Y = yS \cos n - IS \sin n = z \cos n - x \cos m \sin n - y \sin m \sin n$$

$$Z = y \cos m - x \sin m.$$

Cum jam elementum  $dM$  in Z ob celeritatem angularem =  $\omega$  exerat vim

$$\text{centrifugam} = \frac{\omega \omega \cdot xZ dM}{2g}, \text{ nascetur inde vis secundum } xy = \frac{\omega \omega Y dM}{2g}$$

$$\text{et vis secundum directionem ipsi } yZ \text{ parallelam in } x \text{ applicata} = \frac{\omega \omega Z dM}{2g},$$

quae vires ipsae cum se mutuo destruant quia  $\int Y dM = 0$  et  $\int Z dM = 0$ , earum momenta tantum erunt spectanda. Sumta ergo IO =  $f$ , dabitur in O vis Oq ipsi IQ parallela omnibus viribus yZ aequivalens, si modo his viribus aequales et contrariae ipsi centro inertiae I applicentur. Cum igitur ob momenta sit

$$\text{vis Oq. IO} = \frac{\omega \omega}{2g} \int XY dM$$

$$\text{vis Op. IO} = \frac{\omega \omega}{2g} \int XZ dM$$

erit

Kk 3

vis



$$\text{vis } Oq = \frac{xy}{2fg} \int XY dM \text{ et vis } Oq = \frac{xy}{2fg} \int XZ dM.$$

At regrediendo ad coordinatas principales est

$$\int XY dM = f n \cos n (fzz dM - \cos m^2 fxx dM - f m^2 fyy dM) \text{ et}$$

$$\int XZ dM = f m \cos m \cos n (fyy dM - fxx dM)$$

ideoque per momenta inertiae data

$$\int XY dM = M f n \cos n (aa \cos m^2 + bb f m^2 - cc) \text{ et}$$

$$\int XZ dM = M f m \cos m \cos n (aa - bb).$$

Consequenter ex motu gyratorio nascuntur hae vires

$$\text{vis } Op = \frac{Mxy f m \cos m \cos n (aa - bb)}{2fg} \text{ et}$$

$$\text{vis } Oq = \frac{Mxy f n \cos n (aa \cos m^2 + bb f m^2 - cc)}{2fg}$$

puncto O secundum directiones rectis OP et OQ parallelas applicatae, quibus autem aequales et contrariae in ipso centro inertiae I applicatae sunt intelligendae.

#### COROLL. 1.

662. Cum vis Oq sit ad axem gyrationis IO in O normalis, ea producta plano AOB in puncto M occurret, quod in IL producta erit situm,

$$\text{eritque } IM = \frac{f}{\cos n} \text{ et } OM = f \tan n \text{ ob } IOM \text{ angulum rectum.}$$

#### COROLL. 2.

663. Directio autem alterius vis Op est ad planum LIO normalis utpote rectae IP in plano AIB ad IL normali parallela: atque planum pOq continuatum ad planum AIB inclinatur angulo  $= 90^\circ - n$ , idque interfecat recta ad IM normali.

#### COROLL. 3.

664. Quoniam hae vires ex motu gyratorio ipso natae sibi aequales et contrarias in centro inertiae applicatas habent, eae solum motum gyratorium perturbabunt, neque corpori ullum motum progressivum inducent, ita ut centrum inertiae in quiete sit permanfurum.

#### PROBLEMA. 65.

665. Inventis viribus ex motu gyratorio ipso natis ad eum perturbandum, invenire axem, circa quem hae vires corpus, si esset in quiete, gyraturae essent.

SO-

## SOLUTIO.

Manentibus omnibus, ut in problemate praecedente, ita ut IA, Fig. 87. IB, IC sint axes corporis principales, eorumque respectu momenta inertiae  $Maa$ ,  $Mbb$ ,  $Mcc$ , sit IO axis, circa quem jam corpus gyratur celeritate  $= u$ , et pro ejus situ anguli  $AIL = m$ , et  $LIO = n$ , existente recta OL ad planum AOB normali, ut posita  $IO = f$ , sit  $IL = f \cos n$  et  $OL = f \sin n$ . Tum vero ex O ad IO ducatur normalis OM, erit  $IM = \frac{f}{\cos n}$  et  $OM = f \tan n$ , ducta autem ad IM in plano AIB

normali MA, erit  $IA = \frac{f}{\cos m \cos n}$  et  $MA = \frac{f \tan m}{\cos n}$ . Nunc autem in O habentur vires Op et Oq, quarum Op ipsi AM parallela et Oq cum OM in directum est sita; suntque hae vires:

$$\text{vis Op} = \frac{M u^2 f m \cos m \cos n (aa - bb)}{2fg}$$

$$\text{vis Oq} = \frac{M u^2 f n \cos n (aa \cos m^2 + bb \sin m^2 - cc)}{2fg}$$

quarum media directio planum AIB alicubi in V in recta MA secabit, ut sit MO: MV = Oq: Op, unde colligitur  $MV = \frac{f m \cos m (aa - bb)}{\cos n (aa \cos m^2 + bb \sin m^2 - cc)}$ ,

hincque  $\tan MIV = \frac{f m \cos m (aa - bb)}{aa \cos m^2 + bb \sin m^2 - cc}$ : ex quo concluditur  $\tan$

AIV =  $\frac{(bb - cc) f m}{(aa - cc) \cos m}$ , quem angulum supra vocavimus  $\delta$ , at distan-

tia IV =  $\frac{f \sqrt{(aa \cos m^2 + bb \sin m^2 + cc - 2cc(aa \cos m^2 + bb \sin m^2))}}{\cos n (aa \cos m^2 + bb \sin m^2 - cc)}$  quam

supra vocavimus  $= b$ , ut sit  $b = \frac{f(bb - cc) f m}{\cos n \delta (aa \cos m^2 + bb \sin m^2 - cc)}$  seu  $b =$

$\frac{f(aa - cc) \cos m}{\cos n \cos \delta (aa \cos m^2 + bb \sin m^2 - cc)}$ . Nunc igitur in puncto V illas vires

applicatas concipere licet, quae sunt

$$\text{vis sec. VM} = \frac{M u^2 f m \cos m \cos n (aa - bb)}{2fg}$$

$$\text{vis sec. VT} = \frac{M u^2 f n \cos n (aa \cos m^2 + bb \sin m^2 - cc)}{2fg}$$

quarum haec secundum VR ipsi LO et VN ipsi ML parallelam resoluta dat

vim

$$\text{vim sec. VR} = \frac{M \mathfrak{A} \mathfrak{B} f n \cos n^2 (a a \cos m^2 + b b f m^2 - c c)}{2 f g}$$

$$\text{et vim sec. VN} = \frac{M \mathfrak{A} \mathfrak{B} f n^2 \cos n (a a \cos m^2 + b b f m^2 - c c)}{2 f g}$$

quarum illa VR supra littera R est indicata. At quod supra erat Q  $\cos \delta - P \sin \delta$ , qua expressione vis ad IV in plano AIB normalis denotatur, hic est vis VM  $\cos MIV$  — vis VN  $\sin MIV$ , unde prodit

$$Q \cos \delta - P \sin \delta = \frac{M \mathfrak{A} \mathfrak{B} f m \cos m \cos n^2 (a a - b b) (a a \cos m^2 + b b f m^2 - c c)}{2 f g \sqrt{(a a \cos m^2 + b b f m^2 + c c - 2 c c (a a \cos m^2 + b b f m^2))}}$$

$$\text{Cum porro sit } \tan \delta = \frac{(b b - c c) f m}{(a a - c c) \cos m} \text{ erit}$$

$$\cos \delta = \frac{(a a - c c) \cos m}{\sqrt{(a a \cos m^2 + b b f m^2 + c c - 2 c c (a a \cos m^2 + b b f m^2))}}$$

His definitis sit jam IF axis ille, circa quem istae vires corpus, si quiesceret, essent gyrationae, ductoque ex F in planum AIB perpendicularo FE, vocentur anguli AIE =  $\eta$  et EIF =  $\theta$ , ac per probl. 60. consequimur:

$$\tan \eta = \frac{a a \cos \delta}{b b f \delta} = \frac{a a (a a - c c) \cos m}{b b (b b - c c) f m}, \text{ et}$$

$$\tan \theta = \frac{Q \cos \delta - P \sin \delta}{R c c \cos \delta} \cdot b b f \eta = \frac{f m \cos n (a a - b b) b b f \eta}{c c (a a - c c) f m}$$

Denique tempusculo  $dt$  circa hunc axem IF angulus  $d\omega$  generabitur, ut sit:

$$d\omega = \frac{\mathfrak{A} \mathfrak{B} dt^2 f n \cos n \sqrt{(a a (a a - c c)^2 \cos m^2 + b b (b b - c c)^2 f m^2)}}{2 a a b b c c f \delta}$$

$$\text{seu } d\omega = \frac{\mathfrak{A} \mathfrak{B} (a a - c c) dt^2 \cos m f n \cos n}{2 b b f \eta \cos \theta} = \frac{\mathfrak{A} \mathfrak{B} (b b - c c) dt^2 f m \cos n}{2 a a c c f \eta \cos \theta}$$

### COROLL. I.

666. Si pro axe gyrationis proposita IO ponantur anguli OIA =  $\alpha$ ; OIB =  $\zeta$ ; OIC =  $\gamma$ ; at pro axe gyrationis elementaris IF anguli FIA =  $\mathfrak{A}$ ; FIB =  $\mathfrak{B}$ ; FIC =  $\mathfrak{C}$ ; erit;

$$\cos \alpha = \cos m \cos n; \cos \zeta = f m \cos n; \cos \gamma = f n, \text{ atque} \\ \cos \mathfrak{A} = \cos \eta \cos \theta; \cos \mathfrak{B} = -f \eta \cos \theta; \cos \mathfrak{C} = f \theta.$$

CO-

## C O R O L L. 2.

667. Deinde ob  $\tan \eta = \frac{aa(aa - cc)\cos\alpha}{bb(bb - cc)\cos\zeta}$ , si ponatur brevitatis gratia  $\mathcal{P}(a^4(aa - cc)^2\cos\alpha^2 + b^4(bb - cc)^2\cos\zeta^2) = W$  erit si  $\eta = \frac{aa(aa - cc)\cos\alpha}{W}$  et  $\cos\eta = \frac{bb(bb - cc)\cos\zeta}{W}$ . Porro autem posito  $\mathcal{P}(a^4b^4(aa - bb)^2\cos\alpha^2\cos\zeta^2 + a^4c^4(aa - cc)^2\cos\alpha^2\cos\gamma^2 + b^4c^4(bb - cc)^2\cos\zeta^2\cos\gamma^2) = \Omega$

habebitur:

$$\cos\chi = \frac{bbcc(bb - cc)\cos\zeta\cos\gamma}{\Omega}; \cos\mathfrak{B} = \frac{aa cc(cc - aa)\cos\alpha\cos\gamma}{\Omega}$$

$$\cos\zeta = \frac{aa bb(aa - bb)\cos\alpha\cos\zeta}{\Omega} \text{ et } d\omega = \frac{xx\Omega dt^2}{2aa b b c c}.$$

## S C H O L I O N.

668. Quod ad sensum attinet, in quem gyratio circa axem IF fiet, quoniam angulus elementaris  $d\omega = \frac{xx\Omega dt^2}{2aa b b c c}$  semper est positivus, notandum est, in indagatione hujus valoris vim VR ut positivam esse spectatam, unde secundum figuram punctum E in sensum Et versus A motu gyatorio feretur. Et si enim haec ratio tantum in figura, ubi anguli  $m, n, \eta, \theta$  sunt positivi et recto minores, locum habet, tamen hinc ratio sensus recte concludi potest; quo semel in calculum introducto deinceps generatim veritati inhaerebimus. Ceterum evidens est, si axis IO in quempiam principalium cadat, fore  $d\omega = 0$ ; namque si  $\alpha = 0$ , fit  $\zeta = \gamma = 90^\circ$ , ideoque  $\cos\zeta = \cos\gamma = 0$  quo casu utique quantitas  $\Omega$  evanescit: simul vero perspicuum est, nullo alio casu hanc perturbationem  $d\omega$  evanescere posse, ideoque plures tribus non dari axes gyrationis liberos, nisi forte duo momenta principalia fuerint aequalia.

## P R O B L E M A. 66.

669. Si corpus gyretur circa axem quemcunque per ejus centrum inertiae transeuntem, ab axibus principalibus diversum, definire variationem momentaneam, quam cum ipse axis gyrationis tum celeritas angularis patietur.

## S O L U T I O.

Fig. 88.

Transferantur omnia, quae in praecedente problemate sunt inventa ad superficiem sphaericam centro inertiae I descriptam, in qua A, B, C sint poli axium principalium, eorumque respectu momenta inertiae  $Maa$ ,  $Mbb$ ,  $Mcc$ . Tum vero sit O polus axis illius, circa quem corpus iam gyratur celeritate angulari =  $\omega$  in sensum ABC. Ex C per O ducto circulo maximo COM qui est quadrans, erunt arcus AM =  $m$  et MO =  $n$ : tum in quadrante BA producto capiatur AE =  $\eta$ , et du-

cto quadrante CE arcus ES =  $\theta$ , ut sit  $\tan \eta = \frac{aa(aa - cc)\cos m}{bb(bb - cc)\sin m}$  seu

$$\frac{bb\sin m\eta}{aa - cc} = \frac{aa\cos m\cos \eta}{bb - cc} \text{ atque } \tan \theta = \frac{bb\sin m\eta \cdot (aa - bb)\cos n}{cc(aa - cc)\sin n} =$$

$$\frac{aa\cos m\cos \eta \cdot (aa - bb)\cos n}{cc(bb - cc)\sin n}. \text{ His ita definitis ob vires corporis centrifugas}$$

corpus conabitur circa polum S gyrari in sensum E, ita ut tempusculo

$$dt \text{ descripturum esset angulum } d\omega = \frac{\omega^2(aa - cc)dt^2\cos m\sin\eta\cos n}{2bb\sin\eta\cos\theta} =$$

$$\frac{\omega^2(bb - cc)dt^2\sin m\sin\eta\cos n}{2aa\cos\eta\cos\theta} \text{ seu } d\omega = \frac{\omega^2(aa - bb)dt^2\sin m\cos m\cos n^2}{2cc\sin\theta}. \text{ Du-}$$

eat ergo arcus circuli maximi OS, qui sit =  $s$ , quem deinceps de-

$$\text{terminemus, atque in probl. 62. erit } q = \frac{\omega^2(aa - bb)\sin m\cos m\cos n^2}{2cc\sin\theta},$$

hincque ob motum gyrationis elementarem corpus gyrabitur circa po-

$$\text{lum } o, \text{ ut sit arculus } Oo = \frac{\omega^2(aa - bb)dt\sin m\cos m\cos n^2\sin s}{cc\sin\theta}; \text{ celeritas autem}$$

$$\text{angularis } \omega \text{ augmentum accipiet } d\omega \text{ ut sit } d\omega = \frac{\omega^2(aa - bb)dt\sin m\cos m\cos n^2\cos s}{cc\sin\theta}.$$

Nunc igitur primo quaeri debet positio arcus OS, seu angulus COS, quo ad arcum CO inclinatur: quem in finem consideretur triangulum OCS, in quo est OC =  $90^\circ - n$ ; CS =  $90^\circ - \theta$  et angulus OCS =  $m + \eta$ , unde reperitur:

$$\cos \text{COS} = \frac{\cos n \tan \theta}{1(m + \eta)} - \frac{\sin n \cos(m + \eta)}{1(m + \eta)}.$$

Est

Est vero  $\tan(m+\eta) = \frac{aa(aa-cc)\cos m^2 + bb(bb-cc)\sin m^2}{(aa-bb)(cc-aa-bb)\sin m \cos m}$ , atque

$\frac{\cos n \tan \theta}{\sin(m+\eta)} = \frac{aabb(aa-bb)\sin m \cos m \cos n^2}{cc \sin(bb(bb-cc))\sin m^2 + aa(aa-cc)\cos m^2}$  unde fit

$\tan \cos = \frac{cc \sin(aa(aa-cc)\cos m^2 + bb(bb-cc)\sin m^2)}{(aa-bb)\sin m \cos m (aabb \cos n^2 + cc(aa+bb)\sin n^2 - c^4 \sin n^2)}$

Porro ex eodem triangulo OCS colligitur,

$\cos s = \cos(m+\eta) \cos n \cos \theta + \sin \eta \sin \theta = \sin \theta \left( \sin + \frac{\cos n \cos(m+\eta)}{\tan \theta} \right)$

seu  $\cos s = \frac{\sin \theta (aabb - (aa+bb)cc + c^4)}{aabb} = \frac{(aa-cc)(bb-cc)\sin \theta}{aabb}$

unde fit  $ds = \frac{ss(aa-bb)(aa-cc)(bb-cc)\sin m \cos m \sin n \cos n^2}{aabbcc} \cdot dt$

Denique positis  $OA = a$ ;  $OB = b$ ,  $OC = c$  erit arcus  $Oo = \frac{ss dt}{aabbcc}$

$r \left( a^4 b^4 (aa-bb)^2 \cos a^2 \cos b^2 + a^4 c^4 (aa-cc)^2 \cos a^2 \cos c^2 + b^4 c^4 (bb-cc)^2 \cos b^2 \cos c^2 - (aa-bb)^2 (aa-cc)^2 (bb-cc)^2 \cos a^2 \cos b^2 \cos c^2 \right)$

et  $ds = \frac{ss(aa-bb)(aa-cc)(bb-cc)\cos a \cos b \cos c}{aabbcc} \cdot dt$

Verum si ex  $o$  ad  $CO$  perpendicularum {ducatur  $op$ , per regulas trigonometriae sphaericae, arculi elementares  $Op$  et  $op$  ita rationaliter exprimuntur ut fit:

$Op = \frac{ss(aa-bb)dt \cos a \cos b (aabb - (aa-cc)(bb-cc)\cos \gamma^2)}{aabbcc \sin \gamma}$

$op = \frac{ss dt \cos \gamma (aa(aa-cc)\cos a^2 + bb(bb-cc)\cos b^2)}{aabc \sin \gamma}$

COROLL. 1.

670. Cum sit  $ds = \frac{ss(aa-bb)(aa-cc)(bb-cc)\cos a \cos b \cos \gamma}{aabbcc} dt$

patet si trium momentorum principalium duo fuerint inter se aequalia, tum celeritatem angularem plane non inmutari.

COROLL. 2.

671. Introductis distantis  $a$ ,  $b$ ,  $c$  poli  $O$  a polis principalibus  $A$ ,  $B$ ,  $C$  erit

Ll 2

tang

$$\text{tang COS} = \frac{cc \cos \gamma (aa(aa - cc) \cos a^2 + bb(bb - cc) \cos \zeta^2)}{(aa - bb) \cos a \cos \zeta (aabb - (aa - cc)(bb - cc) \cos \gamma^2)}$$

ducto autem arcu AO erit  $\text{tang AOC} = \frac{-\cos \zeta}{\cos a \cos \gamma}$ , unde concluditur

$$\text{tang AOS} = \frac{aa \cos a (bb(bb - aa) \cos \zeta^2 + cc(cc - aa) \cos \gamma^2)}{(bb - cc) \cos \zeta \cos \gamma ((bb - aa)(cc - aa) \cos a^2 - bb cc)}$$

## COROLL. 3.

672. Haec formula pro angulo AOS analogia est illi pro angulo COS, indeque oritur, si litterae  $a, b, c$ , item  $a, \zeta, \gamma$  in ordine uno loco promoveantur: hoc autem modo signum prodiret negativum, id quod rei naturae est consentaneum, cum angulus AOS in sensum contrarium cadat respectu prioris.

## COROLL. 4.

673. Si arcus OS quadrantem AC secet in puncto R colligitur:

$$\text{tang AR} = \frac{aa \cos a (bb(aa - bb) \cos \zeta^2 + cc(aa - cc) \cos \gamma^2)}{cc \cos \gamma (aa(aa - cc) \cos a^2 + bb(bb - cc) \cos \zeta^2)}$$

ac si idem arcus SO productus occurrat quadranti BA in Q erit per analogiam:

$$\begin{aligned} \text{tang BQ} &= \frac{bb \cos \zeta (cc(bb - cc) \cos \gamma^2 + aa(bb - aa) \cos a^2)}{aa \cos a (bb(bb - aa) \cos \zeta^2 + cc(cc - aa) \cos \gamma^2)} \\ &= \cot \text{AQ} \end{aligned}$$

## COROLL. 5.

674. Cum tempusculo  $dt$  arcus CO  $\equiv \gamma$  minuatur particula  $Op$ , erit per differentialia

$$aa \, bb \, cc \, d\gamma \, f \gamma = \gamma (bb - aa) \, dt \, \cos a \, \cos \zeta (aa \, bb - (aa - cc) (bb - cc) \cos \gamma^2)$$

hincque per analogiam:

$$aa \, bb \, cc \, d\zeta \, f \zeta = \gamma (aa - cc) \, dt \, \cos \gamma \, \cos a (aa \, cc - (cc - bb) (aa - bb) \cos \zeta^2)$$

$$aa \, bb \, cc \, da \, f a = \gamma (cc - bb) \, dt \, \cos \zeta \, \cos \gamma (bb \, cc - (bb - aa) (cc - aa) \cos a^2)$$

## SCHOLION.

675. Assumimus in solutione, quod probe est notandum, corpus circa axem IO in sensum ABC gyron, ad quem ergo casum formulæ inventæ

inventae sunt accommodatae : sin autem corpus gyraretur in sensum contrarium , formulae facillime eo referentur , statuendo celeritatem gyrationis  $\gamma$  negativam. Atque sic problema hoc difficillimum , quo variatio momentanea quaeritur , dum corpus circa axem non-principalem gyretur , satis commode resolvimus , cum formulae postremae , ad quas tandem solutio est perducta , non adeo sint intricatae , ut simpliciores expectare licuisset. Neque etiam suspicio ullius erroris in calculo commissi locum habet , cum formula qua incrementum celeritatis angularis  $d\gamma$  exprimitur , ad omnes tres axes principales aequae referatur , tum derivatio anguli AOS ex angulo COS rem firmissime evincit : ac tandem aequationes in postremo coroll. exhibitae hanc proprietatem habere comprehenduntur , ut sit  $d\alpha \int \alpha \cos \alpha + d\epsilon \int \epsilon \cos \epsilon + d\gamma \int \gamma \cos \gamma = 0$  , uti conditio principalis  $\cos \alpha^2 + \cos \epsilon^2 + \cos \gamma^2 = 1$  exigit. Ternae autem postremae aequationes , cum ea quae differentiale  $d\gamma$  definit , plenae problematis solutionem continet , ubi quidem quaelibet trium illarum omitti potest. Si corpus insuper a viribus externis sollicitaretur , solutio non multo difficilior evaderet , quemadmodum in sequente problemate ostendetur.

# P R O B L E M A. 67.

676. Si corpus rigidum , dum circa axem quemcunque per ejus centrum inertiae transeuntem gyratur , a viribus quibuscunque sollicitetur , definire variationem momentaneam tam in ipso axe quam in celeritate angulari inde ortam.

# S O L U T I O.

Sit IO axis , circa quem corpus nunc gyretur celeritate angulari  $\gamma$  , in sensum ABC , ac primo dispiciatur ejus situs respectu axium principalium IA , IB , IC , quorum respectu momenta inertiae sint  $Maa$  ,  $Mbb$  ,  $Mcc$  , positisque arcibus  $OA = \alpha$  ,  $OB = \epsilon$  ,  $OC = \gamma$  , per problema praecedens quaeratur , quantum tempusculo  $dt$  tum axis gyrationis IO , quam celeritas angularis ob solum motum gyrationum mutari debeat. Scilicet si polus gyrationis ex O abeat in o , vidimus fore incrementum distantiae CO =  $\gamma$  :

$$Co - CO = \frac{\gamma(aa - bb)dt \cos \alpha \cos \epsilon (aa bb - (aa - cc)(bb - cc) \cos \gamma^2)}{aa bb cc \gamma}$$

atque incrementum anguli BCO

Ll 3

OC



$$OC_0 = \frac{2dt \cos \gamma (aa - cc) \cos \alpha + bb(bb - cc) \cos \epsilon^2}{aabb\gamma^2}$$

quibus elementis situs puncti *o* sine ambiguitate definitur. Praeter hanc autem axis gyrationis mutationem celeritas angularis  $\gamma$  capiet incrementum

$$= \frac{22(aa - bb)(aa - cc)(bb - cc) \cos \alpha \cos \epsilon \cos \gamma}{aabbcc} dt. \text{ Deinde perpendan-}$$

tur vires sollicitantes, utrum corpori motum progressivum imprimant: cujus rei facillimum est judicium, dum omnes vires secundum suas quaeque directiones ipsi centro inertiae applicatae concipiantur: si enim se mutuo in aequilibrio teneant, corpori nullus motus progressivus imprimetur: sin autem detur vis illis aequivalens, ab hac motus progressivus in corpore generabitur, ex primis principiis facile definiendus. Tum isti vi aequivalenti aequalis et contraria ipsi centro inertiae applicetur, ut jam hoc centrum in quiete teneatur, atque hac vi cum iis, quibus corpus actu sollicitatur, conjuncta, omnes revocentur ad duas, quarum altera in centro inertiae altera in alio quodam puncto sit applicata, quae duae vires erunt aequales sed contrariae. Porro ex praecedente capite quaeratur axis, circa quem corpus ab istis viribus converti incipiet simulque angulus conversionis momentaneae, unde per probl. 62. sine ullo respectu ad mutationem jam inventam habito, quoniam haec est infinite parva, quasi corpus adhuc circa axem *Oo* gyraretur, quaeratur variatio in axe et celeritate angulari inde orta, quarum illa ad incrementa vel decrementa tam in arcu *CO* quam in angulo *BCO* nata reducatur. Denique haec terna elementa cum iis, quae jam ante ex motu gyratorio sunt definita, jungatur, sicque obtinebitur vera variatio tam in axe *IO* quam in celeritate angulari ab utraque causa simul producta,

### SCHOLION.

677. Dum vicium sollicitantium effectus exploratur, variatio axis inde orta eodem modo per angulum elementarem *OC<sub>0</sub>* et differentiam arcuum *CO* et *Co* exprimi potest, quo hic usi sumus. Scilicet quaeratur primo axis, circa quem corpus, si quiesceret, a viribus vertetur, qui sit *IS*, sitque  $qdt^2$  angulus conversionis tempusculo *dt* productus circa *S* in sensum *Oa*, ac pro puncto *S* ponatur arcus *AE* =  $\eta$  et *ES* =  $\theta$ , qui valores a praecedentibus, ex ipso motu gyratorio ortis probe sunt distinguendi. Cum ergo sit *AM* = *ACM* = *m*, ut sit  $\cos$   
 $m =$

$m = \frac{\cos \alpha}{\sin \gamma}$ , et  $\sin m = \frac{\cos \beta}{\sin \gamma}$ , erit  $MCE = m + n$ , et ex triangulo OCS reperitur:

$$\cos OS = \cos s = \cos(m + n) \sin \gamma \cos \theta + \cos \gamma \sin \theta \text{ et}$$

$$\cos COS = \frac{\sin \gamma \tan \theta}{\sin(m + n)} - \frac{\cos \gamma \cos(m + n)}{\sin(m + n)}.$$

Nunc autem ex probl. 62. polus gyrationis O transfertur in o ut sit  $Oo = \frac{2qdtfs}{g}$  et incrementum celeritatis angularis

$$2qdt \cos s = 2qdt (\sin \gamma \cos \theta \cos(m + n) + \cos \gamma \sin \theta).$$

Deinde ex Oo elicitur

$$Op = Oo \cos COS = \frac{2qdtfs}{g} \cos COS \text{ et}$$

$$op = Oo \sin COS = \frac{2qdtfs}{g} \sin COS = \frac{2qdt}{g} \cos \theta \sin(m + n)$$

$$\text{ideoque angulus } OCo = \frac{2qdt \cos \theta \sin(m + n)}{g \sin \gamma}.$$

Hinc vero porro deducitur

$$CO - Co = Op = op \cos COS = \frac{2qdt}{g} (\sin \gamma \sin \theta - \cos \gamma \cos \theta \sin(m + n)).$$

Tantum ergo superest, ut haec elementa cum illis, quae ex motu gyrationis sunt eruta combinentur, ut obtineatur axis gyrationis variatus cum incremento vel decremento celeritatis angularis.

#### P R O B L E M A. 68.

678. Si ad aliquod tempus detur situs corporis rigidi circa quempiam axem per ejus centrum inertiae transeuntem gyrantis, atque tam axis gyrationis quam celeritas angularis utcumque varietur, invenire mutationem momentaneam in corporis situ ortam.

#### S O L U T I O.

Cum centrum inertiae corporis quiescat, situs corporis referatur Tab. XII. ad sphaeram fixam, eodem centro descriptam, intra quam corpus motum suum absolvat. In hac sphaera capiatur circulus magnus VXZY in eoque punctum fixum Z: atque ad datum tempus = t axes corporis principales in superficie sphaerica respondeant punctis A, B, C, ut AB, BC,

BC, CA sint quadrantes: ad quorum situm symbolis repraesentandum  
 fiat arcus circulorum maximorum  $ZA = l$ ,  $ZB = m$ ,  $ZC = n$ , erit  
 $\cos l^2 + \cos m^2 + \cos n^2 = 1$ : ac ponantur anguli  $XZA = \lambda$ ,  $XZB$   
 $= \mu$ ,  $XZC = \nu$ , erit ex sphaericis

$$\cos(\mu - \lambda) = -\cot l \cot m; \cos(\nu - \mu) = -\cot m \cot n; \cos(\nu - \lambda) = -\cot l \cot n$$

ergo  $\cos(\mu - \lambda) \cos(\nu - \lambda) = \cot l^2 \cot m \cot n = -\cot l^2 \cos(\nu - \mu)$ , unde fit

$$\cot l^2 = \frac{-\cos(\mu - \lambda) \cos(\nu - \lambda)}{\cos(\nu - \mu)}; \cot m^2 = \frac{-\cos(\lambda - \mu) \cos(\nu - \mu)}{\cos(\nu - \lambda)}$$

$$\cot n^2 = \frac{-\cos(\lambda - \nu) \cos(\mu - \nu)}{\cos(\mu - \lambda)}$$

Cum vero fit  $\cos(\nu - \mu) = \cos(\mu - \lambda) \cos(\nu - \lambda) = \sin(\mu - \lambda) \sin(\nu - \lambda)$  erit

$$\cot l^2 = -\cot(\mu - \lambda) \cot(\nu - \lambda); \cot m^2 = -\cot(\lambda - \mu) \cot(\nu - \mu); \cot n^2 = -\cot(\lambda - \nu) \cot(\mu - \nu).$$

Hac relatione inter quantitates  $l$ ,  $m$ ,  $n$ ,  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$ , quae tempusculo  
 de suis differentialibus crescere sunt censendae, notata, fit nunc O  
 polus gyrationis arcusque  $AO = \alpha$ ,  $BO = \zeta$ ,  $CO = \gamma$ , ut fit:

$$\cos \alpha^2 + \cos \zeta^2 + \cos \gamma^2 = 1: \text{erit } \cos BAO = \frac{\cos \zeta}{\sin \alpha}, \text{ et } \sin BAO = \frac{\cos \gamma}{\sin \alpha},$$

at in triangulo ZAB est  $\cos ZAB = \frac{\cos m}{\sin l}$  et  $\sin ZAB = -\cos ZAC =$   
 $\frac{-\cos n}{\sin l}$ , ita ut fit pro triangulo ZAO

$$\sin ZAO = \frac{\cos \gamma \cos m - \cos \zeta \cos n}{\sin \alpha \sin l}; \cos ZAO = \frac{\cos \zeta \cos m + \cos \gamma \cos n}{\sin \alpha \sin l}$$

unde colligitur  $\cos ZO = \cos \alpha \cos l + \cos \zeta \cos m + \cos \gamma \cos n$ ,

$$\text{et } \cot AZO = \frac{\cos \alpha - \cos l (\cos \alpha \cos l + \cos \zeta \cos m + \cos \gamma \cos n)}{\cos \gamma \cos m - \cos \zeta \cos n},$$

hincque ad quodvis tempus polus gyrationis O innotescit.

Deinde posito celeritate angulari  $= u$  in sensum ABC, tempusculo de  
 punctum A circa O describit arculum  $Aa = u dt \sin \alpha$  quare ducta  $a$  ad  
 ZA normali erit

$$Aa = u dt. \frac{\cos \gamma \cos m - \cos \zeta \cos n}{\sin l}; aa = u dt. \frac{\cos \zeta \cos m + \cos \gamma \cos n}{\sin l}$$

unde, differentialia quantitatum  $l$  et  $\lambda$  deducuntur,

$d \sin l$

$$dl \sin l = xdt (\cos \zeta \cos n - \cos \gamma \cos m), \text{ et} \\ -d\lambda / l^2 = xdt (\cos \zeta \cos m + \cos \gamma \cos n)$$

similique modo reperietur:

$$dm \sin m = xdt (\cos \gamma \cos l - \cos \alpha \cos n); -d\mu / m^2 = xdt \\ (\cos \gamma \cos n + \cos \alpha \cos l) \\ dn \sin n = xdt (\cos \alpha \cos m - \cos \zeta \cos l); -dv / n^2 = xdt \\ (\cos \alpha \cos l + \cos \zeta \cos m).$$

Quocirca si ad quodvis tempus  $t$  dentur quantitates  $\alpha$ ,  $\zeta$ ,  $\gamma$ , et  $g$ , ideoque earum differentialia tempusculo  $dt$  nata, hinc colliguntur variationes eodem tempusculo in arcibus  $l$ ,  $m$ ,  $n$ , et angulis  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  productae: Praeterea vero variatio in polo gyrationis  $O$  facta facile concluditur, quia tantum opus est, ut arcus  $ZO$  et angulus  $AZO$  differentientur, ponendo solum arcus  $\alpha$ ,  $\zeta$ ,  $\gamma$  variables, quia hoc modo polus  $O$  in situm sequentem  $o$  transfertur. Erit ergo  $(Z_o - ZO) \sin ZO$

$$= d\alpha / \alpha \cos l + d\zeta / \zeta \cos m + d\gamma / \gamma \cos n \text{ et cum sit}$$

$$\cot AZO (\cos \gamma \cos m - \cos \zeta \cos n) = \cos \alpha - \cos l \cos ZO \text{ erit} \\ \frac{OZo}{\sin AZO^2} (\cos \gamma \cos m - \cos \zeta \cos n) + \cot AZO (d\gamma / \gamma \cos m - \\ d\zeta / \zeta \cos n) = d\alpha / \alpha \cos l - d\zeta / \zeta \cos l \cos m - d\gamma / \gamma \cos l \cos n$$

hincque reducendo:

$$\frac{OZo}{\sin AZO^2} = \frac{\sin 2 (\frac{d\alpha}{\alpha} \cos l (\cos \gamma \cos m - \cos \zeta \cos n) + \frac{d\zeta}{\zeta} \cos l (\cos \alpha \cos n - \cos \gamma \cos l) + \frac{d\gamma}{\gamma} \cos l (\cos \zeta \cos l - \cos \alpha \cos m))}{(\cos \gamma \cos m - \cos \zeta \cos n)^2}$$

ac denique angulus elementaris

$$OZo = \frac{\frac{d\alpha}{\alpha} \cos l (\cos \gamma \cos m - \cos \zeta \cos n) + \frac{d\zeta}{\zeta} \cos l (\cos \alpha \cos n - \cos \gamma \cos l) + \frac{d\gamma}{\gamma} \cos l (\cos \zeta \cos l - \cos \alpha \cos m)}{1 - (\cos \alpha \cos l + \cos \zeta \cos m + \cos \gamma \cos n)^2}$$

in quam formulam bis ternae litterae  $\alpha$ ,  $\zeta$ ,  $\gamma$ , et  $l$ ,  $m$ ,  $n$  aequaliter ingrediuntur, ut natura rei postulat.

### COROLL. 1.

679. Si ex  $O$  in  $Z_o$  arcus  $Op$  perpendiculariter ducatur erit

$$p_o = \frac{d\alpha / \alpha \cos l + d\zeta / \zeta \cos m + d\gamma / \gamma \cos n}{\sin ZO} \text{ et}$$

$$Op = \frac{d\alpha / \alpha (\cos \gamma \cos m - \cos \zeta \cos n) + d\zeta / \zeta (\cos \alpha \cos n - \cos \gamma \cos l) + d\gamma / \gamma (\cos \zeta \cos l - \cos \alpha \cos m)}{\sin ZO}$$

### COROLL. 2.

680. Porro ex si  $BAO = \frac{\cos \gamma}{\sin \alpha}$  et  $\cos BAO = \frac{\cos \zeta}{\sin \alpha}$  colligitur angulus

gulus  $OAo = \frac{-da \cos a \cos \gamma - d\gamma \sin a \sin \gamma}{\sin a \cos \zeta}$  hincque elementum  $Oo = r \frac{((da^2 + d\gamma^2) \sin^2 a \sin^2 \gamma + 2 da d\gamma \sin a \cos a \sin \gamma \cos \gamma)}{\cos \zeta}$ , quod cum aequae referatur ad  $a, \zeta, \gamma$  ob  $da \sin a \cos a + d\zeta \sin \zeta \cos \zeta + d\gamma \sin \gamma \cos \gamma = 0$  reducitur ad  $Oo = r (da^2 \sin^2 a + d\zeta^2 \sin^2 \zeta + d\gamma^2 \sin^2 \gamma)$ .

## C O R O L L. 3.

681. Ponamus  $ZO = v$  et cum sit  $\cos v = \cos a \cos l + \cos \zeta \cos m + \cos \gamma \cos n$  erit  $\tan g AZO = \frac{\cos \gamma \cos m - \cos \zeta \cos n}{\cos a - \cos l \cos v}$ , et ob analogiam, quia  $B$  ad alteram partem ipsius  $ZO$  in figura cadit  $\tan g BZO = \frac{\cos a \cos n - \cos \gamma \cos l}{\cos \zeta - \cos m \cos v}$  unde fit  $\tan g AZB = \tan g (\mu - \lambda) = \frac{\cos n}{\cos l \cos m}$ ; qui valor cum supra invento  $\cos (\mu - \lambda) = \frac{-\cos l \cos m}{\sin l \sin m}$  egregie conspirat, eritque  $\sin (\mu - \lambda) = \frac{-\cos n}{\sin l \sin m}$ .

## C O R O L L. 4.

682. Hinc ergo pro differentiis ternorum angulorum  $\lambda, \mu, \nu$ , has adipiscimur determinationes.

$$\begin{aligned} \sin (\mu - \lambda) &= \frac{-\cos n}{\sin l \sin m}; \sin (\nu - \mu) = \frac{-\cos l}{\sin m \sin n}; \sin (\lambda - \nu) = \frac{-\cos m}{\sin l \sin n} \\ \cos (\mu - \lambda) &= \frac{-\cos l \cos m}{\sin l \sin m}; \cos (\nu - \mu) = \frac{-\cos m \cos n}{\sin m \sin n}; \cos (\lambda - \nu) = \frac{-\cos l \cos n}{\sin l \sin n} \end{aligned}$$

## S C H O L I O N.

683. Quae hactenus de mutatione momentanea, quam motus gyriorius tam per se quam ob vires sollicitantes subit exposuimus, fundamentum constituunt universae Theoriae de motu corporum rigidorum, quandoquidem ex cognita mutatione elementari ad ipsam motus determinationem transitus per calculum integralem patet. Aggrediamur ergo motum liberum huiusmodi corporum, quo sive proprio quasi instinctui

distinctui five viribus sollicitantibus libere obsequi possunt, ac primo quidem vires sollicitantes externas removeamus, corpora sibi tantum relicta contemplaturi, ut extrinsecus nihil accedat, quod ad motum quicquam conferat. Quoniam autem indoles axium principalium, quibus corpus est praeditum, hic imprimis in computum ingreditur, inde naturale quasi discrimen in corporibus constitui conveniet, prout momenta inertiae eorum respectu fuerint comparata. Tres igitur corporum classes constituamus, ad quarum primam ea referamus corpora, quorum momenta respectu axium principalium sint inter se aequalia; ad secundam vero classem ea corpora, in quibus duo momenta respectu axium principalium sint aequalia, tertium vero illis inaequale. Tertia vero classis in genere omnia ea corpora complectatur, quorum momenta respectu axium principalium inter se sint inaequalia.

## CAPUT XI.

### DE MOTU LIBERO CORPORUM RIGIDORUM TERNIS AXIBUS PRINCIPALIBUS PARIBUS PRAEDITORUM ET A NULLIS VIRIBUS SOLLICITATORUM.

#### DEFINITIO. II.

684. **C**orpus rigidum *tres axes principales pares* habere dicitur, quando ejus momenta inertiae respectu axium principalium inter se sunt aequalia.

#### COROLL. I.

685. In talibus ergo corporibus omnes rectae per ejus centrum inertiae ductae vicem axium principalium gerunt, eorumque respectu momenta inertiae inter se erunt aequalia.

#### COROLL. 2.

686. Quaecunque igitur ternae rectae se mutuo in centro inertiae normaliter secantes pro directricibus assumantur, si situs cujusvis corporis elementi  $dM$  per coordinatas illis parallelas  $x$ ,  $y$ , et  $z$  definatur, erit per totum corpus  $\int xy dM = 0$ ,  $\int xz dM = 0$  et  $\int yz dM = 0$ .

Mm 2

CO.

## C O R O L L 3.

687. Quodsi tale corpus circa rectam quamvis per centrum inertiae transeuntem acceperit motum gyrationis, eum ob suam inertiam perpetuo conservabit, ut ea recta maneat immota; nisi a viribus externis perturbetur.

## S C H O L I O N. 1.

688. Dari huiusmodi corpora, quorum momenta respectu axium principalium sint inter se aequalia, eo minus dubitare licet, cum in superioribus, ubi corpora homogenea sumus contemplati, plures corporum species hac proprietate gaudentes assignaverimus. Inter quas primum locum tenet globus ex materia homogenea confectus, tum vero eo referenda sunt corpora quinque regularia; porro etiam dantur cylindri, coni et coni truncati, qui eadem proprietate sunt praediti. Atque in genere si corpora non constent ex materia homogenea, innumerabilia exhiberi poterunt genera cujusvis figurae, in quibus aequalitas inter momenta inertiae respectu axium principalium locum obtineat. Atque de huiusmodi corporibus tantum in hoc capite agetur, motusque, cujus sunt capacia dum a nullis viribus externis urgentur, definitur. Character ergo essentialis huiusmodi corporum in hoc consistit: ut positis ternis coordinatis orthogonalibus  $x, y, z$  ad centrum inertiae relatis primo sit ut jam notavimus  $\int xy dM = \int xz dM = \int yz dM = 0$  tum vero  $\int xx dM = \int yy dM = \int zz dM$ . Sicque momentum inertiae respectu axis cujuscunque per centrum inertiae ducti erit  $= 2\int xx dM$ . Hoc criterio quasi primum corporum genus constituitur, atque in cognitione mechanica nomine *corporum regularium* commodè insigniri posset, cum omnes plane rectae per centrum inertiae ductae pari proprietate sint praeditae.

## S C H O L I O N. 2.

689. Etsi in hoc capite tantum de motu corporum ternos axes principales pares habentium tanquam de casu simplicissimo tractare constitui; tamen a proprietate, quae etiam ad reliqua corporum genera pateat, exordiri conveniet. Scilicet quomodocunque corporis rigidi motus fuerit perturbatus, is semper pro quovis temporis puncto resolvi potest in binos motus, quorum alter sit progressivus alter gyrationis circa quempiam axem per centrum inertiae ductum. Quae propositio cum fundamentum motus omnium corporum rigidorum contineat, ejus demonstrationem in sequente Theoremate tradamus.

THEO-

## THEOREMA 9.

690. Quomocunque corpus rigidum moveatur, ejus motus quovis momento est compositus seu mixtus ex motu progressivo et ex gyatorio, circa axem aliquem per ejus centrum inertiae transeuntem.

## DEMONSTRATIO.

Si corporis centrum inertiae moveatur, in quo motus progressivus consistit, quippe qui perpetuo cum motu centri inertiae congruit, hunc mente saltem tollendo, dum spatium cum corpore pari celeritate in oppositum ferri concipiatur, de motu qui adhuc in corpore inest, demonstrandum est, eum esse gyatorium circa quempiam axem per centrum inertiae transeuntem, qui sublato motu progressivo quiescat saltem per tempus infinite parvum. Hoc autem modo centrum inertiae corporis in quietem redigitur, et quomocunque corpus circa hoc centrum moveatur, praeter id semper quaecumque linea recta quiescet, quae propterea erit axis gyrationis, id quod sequenti modo ostendo. Circa corpus concipiatur superficies sphaerica centrum suum in ejus centro inertiae habens, quae ut quiescens consideretur, ad quam singula corporis puncta per rectas ex centro ad superficiem ductas referantur. Centro igitur quiescente punctum corporis ad  $P$  relatum tempusculo  $dt$  transferatur in  $p$ , ductoque per  $P$  circulo maximo  $OPB$  ad spatiolum  $Pp$  normali, in eo capiatur aliud quodvis punctum  $Q$ , quod interea transferatur in  $q$ , ita ut totus arcus interceptus  $PQ$  in  $pq$  pervenisse sit censendus, unde cum omnia corporis puncta perpetuo easdem inter se distantias servant, erit  $pq = PQ$ . Quia autem arcus  $Pp$  et  $Qq$  sunt infinite parvi, et angulus  $pPQ$  rectus arcus, illi aequales esse nequeunt, nisi etiam arcus  $qQ$  ad  $PQ$  sit normalis. Continuentur ambo arcus  $PQ$  et  $pq$ , donec sibi occurrant in  $O$  et cum sit  $OP = Op$  et  $OQ = Oq$ , motu illo totus arcus  $OPQ$  in  $Opq$  erit translatus, ideoque punctum  $O$  in loco suo immotum persisterit necesse est. Quare ducta ex centro per hoc punctum  $O$  recta, eam totam interea in quiete perseverasse manifestum est, quae igitur erit axis gyrationis. Ex quo perspicitur corpus circa centrum inertiae quiescens commoveri non posse, quin simul tota quaedam linea recta per id centrum ducta maneat immota, ideoque motum esse gyatorium. Sin autem centrum inertiae ipsum moveatur, universus corporis motus erit compositus seu mixtus ex motu progressivo et gyatorio circa quempiam axem per ejus centrum inertiae transeuntem.

Fig. 90.



## COROLL. 1.

691. Quomocunque ergo corpus rigidum moveatur, ad ejus motum cognoscendum, primo consideretur ejus centrum inertiae, cujus motus dabit motum progressivum, hoc deinde sublato quaeratur punctum O, unde axis gyrationis innotescet.

## COROLL. 2.

692. Ad hoc autem punctum O inveniendum, posito arcu  $OP = v$ , ob angulum  $O = \frac{Pp}{fv} = \frac{Qq}{f(v+PQ)}$ , erit  $Qq \cdot fv = Pp \cdot \cos PQ \cdot f v + Pp \cdot PQ \cdot \cos v$ , hincque,  $\tan v = \frac{Pp \cdot f PQ}{Qq - Pp \cdot \cos PQ}$  unde patet punctum O semper realiter determinari.

## COROLL. 3.

693. Ex motibus punctorum P et Q per spatia  $Pp$  et  $Qq$  etiam facile definitur celeritas angularis circa axem gyrationis, quae est =  $\frac{ang. O}{dt} = \frac{Pp}{dt \cdot fv} = \frac{r(Pp^2 - 2Pp \cdot Qq \cdot \cos PQ + Qq^2)}{dt \cdot f PQ}$  ideoque nulla esse nequit, nisi ambo spatia  $Pp$  et  $Qq$  evanescant.

## SCHOLION.

694. Et si haec demonstratio ex sphaericis maxime est evidens, tamen ejus vim eo magis perpendi convent, quod non defuerint viri aliqui perspicacissimi, quibus adeo visum est fieri posse, ut omnia puncta superficiei sphaericae centro quiescente aequalibus celeritatibus circumferantur. Hoc scilicet obtineri posse sunt arbitrati, si sphaera dum circa unum quempiam axem gyratur, simul circa alium axem ad illum normalem pari velocitate circumagatur. Nunc autem hac demonstratione allata evictum est, etiam si sphaera non solum circa duos axes sed etiam tres pluresve simul circumagatur, ejus motum tamen semper ita fore comparatum, ut quovis momento tota quaedam recta in quiete permaneat. Nulla enim vis demonstrationi infertur, si quis objiciat puncta P et Q non simplici motu, ut hic assumimus, sed composito circa aliquot axes simul ferri; quomocunque hic motus fuerit compositus, tamen haec puncta, P et Q post tempusculum  $dt$  in alia certa puncta  $p$  et  $q$  perveniant necesse est, ut arcus  $pq$  aequalis sit arcui  $PQ$ , et quoniam arcum  $PQ$  ad spatium  $Pp$  normalem assumimus, is etiam ad  $Qq$  normalis esse debet. At si quis adhuc dubitet, num punctum

ctum O, in quo concursum arcuum PQ et pq productorum constituimus, in eodem loco permaneat, ei saltem concedendum est, id adhuc in circulo maximo Opq repertum iri, quoniam ante cum punctis P et Q in eodem circulo maximo erat situm: pervenit ergo in o, et arcus op aequalis esse deberet arcui OP; verum arcus Op aequalis est arcui OP, ex quo punctum o in O cadat necesse est.

PROBLEMA. 69.

695. Dato motu duorum corporis rigidi punctorum, cujus centrum inertiae quiescit, invenire axem per centrum inertiae transeuntem, circa quem hoc instanti gyatur.

SOLUTIO.

Relatis ut ante, omnibus corporis punctis ad superficiem sphaericae quiescentem ABCD circa centrum inertiae descriptam, moveatur tempusculo  $dt$  punctum P per spatium  $Pp = dp$ , et aliud quodvis punctum R per spatium  $Rr = dr$ ; ponaturque arcus circuli maximi PR =  $q$ . Vocentur anguli  $RPp = m$  et  $SRr = n$ , inter quos autem jam certa quaedam relatio intercedere debet, ut arcus pr aequalis fiat arcui PR =  $q$ . Sit jam O polus gyrationis, indeque ad P et R ductis quasi meridianis OP et OR, erunt anguli  $OPR = 90^\circ + m$  et  $ORP = 90^\circ - n$ , quoniam arcus OP et OR ad spatia Pp et Rr sunt normales. Hinc datis in triangulo sphaerico POR latere PR =  $q$ , cum angulis  $OPR = 90^\circ + m$  et  $ORP = 90^\circ - n$ , reperitur.

$$\cos OP = \frac{f \sin OPR}{f \sin PR \cdot \tan ORP} + \frac{\cos PR \cos OPR}{f PR} = \frac{\cos m \sin n}{\cos n \sin q} = \frac{f \sin \cos q}{f q}$$

$$\cos OR = \frac{f \sin ORP}{f PR \cdot \tan OPR} + \frac{\cos PR \cos ORP}{f PR} = \frac{-\sin m \cos n}{\cos m \sin q} + \frac{\sin \cos q}{f q}$$

sive

$$\tan OP = \frac{\cos n \sin q}{\cos m \sin n - \sin m \cos n \cos q}; \tan OR = \frac{\cos m \sin q}{-\sin m \cos n + \cos m \sin n \cos q}$$

unde punctum O innotescit. Tum vero cum sit

$$Pp : Rr = f OP : f OR = f ORP : f OPR$$

erit  $dp : dr = \cos n : \cos m$  seu  $dp \cos m = dr \cos n$ , unde relatio inter spatia  $dp$ ,  $dr$  et angulos  $m$  et  $n$  colligitur. Denique pro ipsa celeritate angu-

lari, ea aequalis est angulo POp per  $dt$  diviso, hoc est =  $\frac{Pp}{dt f OP}$ , qui valor

$$\text{abit in } \frac{dp \sqrt{(\cos m^2 \sin^2 n + \cos n^2 \sin^2 q + \sin m^2 \cos n^2 \cos^2 q - 2 \sin m \cos m \sin n \cos n \cos q)}}{dt \cos n \sin q}$$

CO.

## COROLL. 1.

696. Cum ejusmodi relatio inter spatiola  $dp$ ,  $dr$  et angulos  $m$ ,  $n$  intercedere debeat, ut sit  $dp \cos m = dr \cos n$ , haec relatio ita in figura repraesentari potest, ut demissis ex  $p$  et  $r$  in arcum PR perpendicularis  $p\pi$  et  $r\eta$  fiat  $P\pi = R\eta$ .

## COROLL. 2.

697. Haec proprietas autem per se est manifesta; cum enim arcus  $p\pi$  aequalis sit arcui  $r\eta$ , arcui PR aequalis esse nequit, nisi sit  $P\pi = R\eta$ . Celeritas autem angularis ita commodius exprimitur, ut sit  $= \frac{dp}{dt} \sqrt{1 - (sm \sin n + cos m \cos n \cos q)^2}$ .

## COROLL. 3.

698. Si puncta P et R semicirculo distent, ut sit  $sq = 0$  et  $\cos q = -1$ , necessario debet esse  $cos m \sin n + sm \cos n = 0$ , seu  $\tan m = -\tan n$  et  $m = -n$ , ideoque  $dp = dr$ . Puncta enim opposita sphaerae alium motum nisi aequalem habere nequeunt; hoc autem casu circa axem gyrationis nihil determinatur.

## COROLL. 4.

699. Cognito autem motu duorum punctorum sibi non oppositorum, situs axis gyrationis cum celeritate angulari innotescet, unde deinceps motus omnium corporis punctorum definiri potest.

## SCHOLION.

700. Haec, ut jam monui, non solum ad corpora, in quibus tres axes principales pares existunt, pertinent, sed in genere ad omnia corpora rigida; quae quomodocunque agitentur dum eorum centrum inertiae fixum manet, quovis temporis momento eorum motus est gyriorius circa quempiam axem per centrum inertiae transeuntem. Sin autem centrum inertiae non maneat fixum, quovis temporis momento motus erit compositus ex tali motu gyriorio et motu progressivo; neque alius motus in corpora rigida cadere potest. Quare ad motum corporis rigidi perfecte cognoscendum, duplicem motum investigari oportet, alterum ejus centri inertiae, qui est motus progressivus, alterum vero gyriorium, cujus cognitio postulat, ut ad quodvis tempus axem gyrationis cum celeritate angulari assignare valeamus. Ac si axis quidem gyrationis perpetuo maneat idem, determinatio motus per principia

## CORPORUM RIGIDORUM TERNIS AXIBUS &c. 281

pia ante hac passim exposita nihil habet difficultatis; sin autem ipse gyrationis axis continuo varietur, haec principia minime sufficiunt, sed confugiendum erit ad ea, quae in capitibus praecedentibus fusius sunt explicata. In hoc tamen capite, ubi de motu corporum ternis axibus paribus praedictorum et a nullis viribus sollicitatorum agimus, istis subsidiis non indigemus, sed per vulgaria principia totum negotium unica propositione expedire poterimus.

### P R O B L E M A. 70.

701. Si corpus rigidum tribus axibus paribus praeditum quomodo-  
cunque projiciatur, neque deinceps ab ullis viribus sollicitetur, desi-  
nere motum quo progreditur.

### S O L U T I O.

Motus corpori primum impressus resolvatur in progressivum et gyrationem circa quempiam axem per centrum inertiae transeuntem, quorum utrumque seorsim considerare licet. Ac primo quidem motus progressivus ita continuabitur, ut centrum inertiae uniformiter in directum progrediatur, quae proprietas omni motui progressivo est communis, etiamsi corpus non ad hoc genus referatur. Quod autem ad motum gyrationem corpori primum impressum attinet, hic indoles hujus generis corporum imprimis solutionem suppeditat, cum enim axis gyrationis, quicumque fuerit, proprietate axium principalium gaudeat, motus gyrationis initio impressus ita perpetuabitur, ut axis gyrationis constanter in quiete perseveraret, si nullus motus progressivus adesset; hoc autem accedente axis gyrationis motu sibi parallelo cum centro inertiae uniformiter in directum promovebitur, atque interea motus gyrationis aequabiliter absolvetur.

### C O R O L L. 1.

702. Quicumque ergo motus tam progressivus quam gyrationis corpori initio imprimatur, centrum inertiae cum axe gyrationis ita uniformiter in directum progrediatur, ut axis sibi perpetuo maneat parallelus, corpusque circa eum uniformiter gyri pergat.

### C O R O L L. 2.

703. Etiamsi corpus non ad hoc genus pertineat, tamen si ei initio praeter motum progressivum motus gyrationis circa quempiam axem principalem imprimatur, uterque motus perinde continuabitur.

N II

CO-

## 282 CAPUT XI. DE MOTU LIBERO CORPORUM &c.

### COROLL. 3.

704. Quin etiam si insuper vires externae accedant, quarum media directio per centrum inertiae transeat, iis solus motus progressivus perinde afficietur, ac si tota corporis massa in isto centro esset collecta; motus autem gyrationis manebit uniformis, et axis gyrationis constanter situm sibi parallelum conservabit.

### SCHOLION.

705. Cum etiamnam vires sollicitantes removeamus et in solam motus impressi continuationem inquiramus, motus omnium corporum primi generis perfecte definivimus, ut nihil amplius desiderari possit: pro reliquis autem corporibus jam partem aliquam expedivimus, quando scilicet motus gyrationis primum impressus sit circa axem principalem, quae quidem determinatio per cognita jam pridem subsidia mechanica absolvi potuit. In aliis ergo corporum generibus difficultas tum demum occurrit, quando corpori primum motus gyrationis non circa quempiam axem principalem imprimitur: ad quod negotium tractandum primum peculiare genus constituam eorum corporum, in quibus duo dantur momenta inertiae respectu axium principalium aequalia. Quod genus, praeterquam quod calculus haud mediocriter contrahitur, hoc commodi habet, ut in eo adhuc infiniti dentur axes principales, ita ut infinitis modis ejusmodi motus, qualem jam definivimus, existere possit; cum contra in tertio genere, in quo momenta principalia inter se sunt inaequalia, praeter tres axes determinatos nullus alius detur, circa quem corpus libere gyrationis quaerit. In his igitur generibus id nobis est propositum, ut quicumque motus talibus corporibus fuerit impressus, ejus continuationem investigemus: ubi ad quodvis tempus primo positio axis gyrationis ratione axium principalium corporis cum celeritate angulari, deinde vero situs ipsorum axium principalium ratione spatii absoluti determinari debebit, qui modus hoc arduum argumentum tractandi maxime videtur idoneus, tam ad calculum evolvendum, quam ad ipsam cognitionem nostram illustrandam. Ad utrumque autem in praecedentibus capitibus necessaria adminicula exposuimus.



CAPUT

## CAPUT XII.

### DE MOTU LIBERO CORPORUM RIGIDORUM DUABUS AXIBUS PRINCIPALIBUS PARIBUS PRAEDITORUM ET A NULLIS VIRIBUS SOLLICITATORUM.

#### DEFINITIO. 12.

706. **C**orpus rigidum, *duos axes principales pares habere dicitur, quando inter ejus momenta inertiae respectu axium principalium duo sunt aequalia.*

#### COROLL. 1.

707. Hujus generis ergo corpora innumerabiles habent axes principales; statim enim ac duo axes principales aequalia habent momenta inertiae, omnes rectae in eorum plano per centrum inertiae ductae aequae pro axibus principalibus haberi possunt, eodemque momento inertiae sunt praeditae.

#### COROLL. 2.

708. Hic igitur axis ille principalis, cujus momentum inertiae reliquis est inaequale, erit singularis, atque omnes rectae per centrum inertiae ad eum normaliter ductae paria habebunt momenta inertiae, et tanquam axes principales spectari poterunt.

#### COROLL. 3.

709. Cognito itaque axe singulari, positio binorum reliquorum non determinatur, sed eorum loco pro lubitu binae rectae quaecunque, tam inter se quam ad illum normales accipi possunt, dummodo per centrum inertiae transeant.

#### SCHOLIUM.

710. Cum igitur supra in genere pro axibus principalibus  $IA$ ,  $IB$ ,  $IC$  posuerimus momenta inertiae  $Maa$ ,  $Mbb$ ,  $Mcc$ , hortum duo in isthoc capite aequalia statuamus. Sit igitur primus axis  $IA$  singularis, reliquorumque momenta inertiae inter se aequalia, ut fit.  $bb = cc$ ; ex quo

$N n a$

quo

quo formulae supra inventae nutritice contrahantur. Etsi autem hoc casu situs binorum axium IB et IC non determinatur, tamen eos tanquam determinatos spectabimus, ut eorum ope situs corporis ad quodvis tempus facilius assignari possit. Hujus autem generis utique infinita dantur corpora, atque inter homogenea imprimis hac pertinent cylindri, coni, atque in genere omnia corpora rotunda, quae conversione figurae cujuscunque circa quempiam axem fixum nascuntur; ita ut hoc genus fere omnia corpora, quae quidem a geometris considerari solent, in se complectatur. Quemadmodum ergo haec corpora ratione motus se sint habitura, dum a nullis viribus sollicitantur, in hoc capite investigabimus, ac primo quidem ad quodvis tempus in positionem axis gyrationis ratione axium principalium inquiramus, nondum solliciti quoniam motum hi ipsi axes sint habituri, quem deinceps definire conabimur.

## P R O B L E M A. 71.

711. Si corpori rigido duobus axibus principalibus paribus praedito motus quicunque gyrationis initio fuerit impressus, neque ullae adsint vires externae, ad quodvis tempus positionem axis gyrationis ratione axium principalium assignare.

## S O L U T I O.

Fig. 89.

Centro inertiae corporis I in centro sphaerae, ad cujus superficiem omnia reducamus, constituto sint IA, IB, IC axes corporis principales, ac respectu primi IA momentum inertiae =  $Maa$ , respectu binorum reliquorum autem IB et IC sint momenta inertiae inter se aequalia =  $Mcc$ , ut sit  $bb = cc$ . Nunc autem elapso ab initio tempore =  $t$ , corpus gyretur circa axem IO in sensum ABC celeritate angulari =  $\omega$ , ita ut situs puncti O respectu punctorum A, B, C definiri debeat. Ponantur ergo arcus circulorum maximorum  $OA = \alpha$ ,  $OB = \beta$ , et  $OC = \gamma$ , qui tanquam variables sunt tractandi; atque problema 66. ad hunc casum quo  $bb = cc$  translatum dabit primo  $d\omega = 0$ , unde patet celeritatem angularem manere invariabilem, ideoque adhuc esse aequalem ei, quae initio corpori fuerit impressa. Quare si haec prima celeritas angularis ponatur =  $\omega$  erit  $\omega = \omega$ . Deinde vero ex §. 674. habebimus has aequationes.

$$I. aac^2 d\alpha d\beta d\gamma = 0$$

$$II. aac^2 d\beta d\gamma = aa^2 cc (aa - cc) d\alpha \cos \alpha \cos \gamma$$

$$III. aac^2 d\alpha d\gamma = aa^2 cc (cc - aa) d\beta \cos \alpha \cos \beta$$

ex

# CORPORUM RIGIDORUM DUABUS AXIBUS &c. 283

ex quarum prima discimus, arcum  $AO = a$  esse constantem, ideoque aequalem illi, quo initio axis gyrationis distabat ab axe singulari  $IA$ . Cum igitur sit  $\cos \gamma = r (\sin^2 a - \cos^2 \zeta)$ , reliquarum aequationum altera praebet:

$$\frac{d\zeta \sin \zeta}{r (\sin^2 a - \cos^2 \zeta)} = \frac{s (aa - cc) dt \cos a}{cc}$$

cujus integrale est  $A \cos \frac{\cos \zeta}{\sin a} = C + \frac{s (aa - cc) t \cos a}{cc}$ , ideoque

$$\cos \zeta = \sin a \cos \left( C + \frac{s (aa - cc) t \cos a}{cc} \right) \text{ et}$$

$$\cos \gamma = \sin a \sin \left( C + \frac{s (aa - cc) t \cos a}{cc} \right).$$

Quare si initio ubi  $t = 0$ ; fuerit  $AO = \mathcal{A}$ ,  $BO = \mathcal{B}$ , et  $CO = \mathcal{C}$ , erit  $a = \mathcal{A}$ , et  $\cos \mathcal{B} = \sin \mathcal{A} \cos C$ , unde fit constans  $\cos C = \frac{\cos \mathcal{B}}{\sin \mathcal{A}}$  et  $\sin C = \frac{\cos \mathcal{C}}{\sin \mathcal{A}}$ . Quocirca habebimus

$$\cos \zeta = \cos \mathcal{B} \cos \frac{s (aa - cc) t \cos \mathcal{A}}{cc} - \cos \mathcal{C} \sin \frac{s (aa - cc) t \cos \mathcal{A}}{cc}$$

$$\cos \gamma = \cos \mathcal{B} \sin \frac{s (aa - cc) t \cos \mathcal{A}}{cc} + \cos \mathcal{C} \cos \frac{s (aa - cc) t \cos \mathcal{A}}{cc}$$

unde si initio motus cognoverimus secundum axis gyrationis respectu axium principalium, seu arcus  $\mathcal{A}$ ,  $\mathcal{B}$ , et  $\mathcal{C}$ , pro quovis tempore elapso  $t$  situm axis gyrationis respectu eorundem axium principalium seu arcus  $a$ ,  $\zeta$ ,  $\gamma$  assignare valemus.

## C O R O L L. 1.

712. Si igitur initio corpori impressus fuerit motus gyriorius circa axem  $IE$ , ad axes principales  $IA$ ,  $IB$ ,  $IC$  inclinatum angulis  $\mathcal{A}$ ,  $\mathcal{B}$ ,  $\mathcal{C}$ , celeritate angulari  $= s$  in sensum  $ABC$ ; quomodocunque deinceps axis gyrationis varietur, celeritas angularis perpetuo manebit eadem  $= s$ ; et axis gyrationis  $IO$  eodem angulo  $\mathcal{A}$  ad axem principale singularem  $IA$  inclinabitur.

## C O R O L L. 2.

713. Tum vero si momentum inertiae respectu axis singularis  $IA$  sit  $= Maa$ , respectu binorum reliquorum autem  $= Mcc$  pro tempore

N<sup>o</sup> 3

elapso



elapso =  $t$ , quia  $s$  angulum denotat, ponatur angulus  $\frac{s(aa - cc) \cos \chi}{cc}$

=  $T$ , qui cum tempore  $t$  uniformiter crescit; atque hoc tempore corpus gyrabitur circa axem IO, ut sit  $AO = AE = \chi$  et  $\cos BO = \cos \mathfrak{B} \cos T - \cos \mathfrak{C} \sin T$ ;  $\cos CO = \cos \mathfrak{B} \sin T + \cos \mathfrak{C} \cos T$ .

## COROLL. 3.

714. Quia arcus AO perpetuo manet aequae magnus =  $\chi$ , situs puncti O commodissime ex angulo BAO innotescet, et cum sit  $\cos BAO$

$$= \frac{\cos BO}{\sin \chi} \text{ et } \sin BAO = \frac{\cos CO}{\sin \chi} \text{ erit}$$

$$\cos BAO = \frac{\cos \mathfrak{B} \cos T - \cos \mathfrak{C} \sin T}{\sin \chi} \text{ et } \sin BAO = \frac{\cos \mathfrak{B} \sin T + \cos \mathfrak{C} \cos T}{\sin \chi}.$$

## COROLL. 4.

715. Si fuerit  $cc = aa$ , qui est casus ante tractatus quo omnia tria momenta inertiae sunt inter se aequalia, erit  $T = 0$ , et  $BO = \mathfrak{B}$ , item  $CO = \mathfrak{C}$ , polus scilicet gyrationis O respectu axium principalium maneret immotus, uti jam ante invenimus.

## SCHOLION.

716. Formulae hae multo simpliciores reddi possunt, sed rei dignitas mereretur, ut id potius singulari propositione quam in transitu prosequamur.

## PROBLEMA. 72.

717. Iisdem positis, quae in praecedente problemate sunt constituta, definire promotionem poli gyrationis O respectu axium principalium.

## SOLUTIO.

Fig. 91.

Maneant omnia uti in praecedente solutione, et cum poli pares B et C in circulo BC pro lubitu accipi queant, quadrans AB ita constituatur, ut per polum E, circa quem corpus primum gyrationis incipit, transeat. Cum igitur hic polus gyrationis perpetuo eandem a polo principali A servet distantiam, ejus motus fiet per circulum minorem EFG centro A descriptum, cujus distantia sit arcus  $AE = a$ , quem supra per  $\chi$  indicavimus. Erit ergo  $BE = \mathfrak{B} = 90^\circ - a$ , et  $CE = \mathfrak{C} = 90^\circ$ .

# CORPORUM RIGIDORUM DUABUS AXIBUS &c. 287

90°. Quare si elapso tempore =  $t$ , polus gyrationis ex E pervenerit in O, ob  $\cos E = 0$ , erit

$$\cos BAO = \frac{\cos \delta \cos T}{f^a} = \cos T, \text{ et } f BAO = \frac{\cos \delta f T}{f^a} = f T,$$

ideoque ipse angulus  $BAO = T$ . At angulus  $T$  ita ex tempore  $t$  definitur, ut sit  $T = \frac{e(aa - cc)t \cos a}{cc} = BAO$ , unde hanc egregiam solutionem consequimur.

Si momentum inertiae respectu axis principalis singularis IA fuerit =  $Maa$ , et respectu binorum reliquorum parium IB et IC =  $Mcc$ , corpus autem initio circa axem IE in sensum BCA celeritate angulari =  $s$  gyrationis coeperit; tum respectu axium principalium, quos quasi in quiete spectamus, polus gyrationis per circulum minorem EFG circa polum A descriptum uniformiter proferetur, ita sit elapso

tempore =  $t$  conficiat angulum  $EAO = \frac{e(aa - cc)t \cos AE}{cc}$ , motusque fiat in sensum BC conformem motui gyatorio, si quidem fuerit  $aa > cc$ ; in contrarium autem si  $aa < cc$ .

## COROLL. 1.

718. Polus gyrationis his casibus quiescet. 1°. si  $AE = 0$ , seu corpus circa axem principalem IA gyrationis inceperit. 2°. si  $AE = 90^\circ$  seu si corpus circa quemcunque axem ad IA normalem gyrationis inceperit: ac 3°. si  $aa = cc$ , hoc est si corpus habuerit omnes tres axes principales pares.

## COROLL. 2.

719. Si fuerit  $aa > cc$ , polus gyrationis E circa A in eundem sensum BC in quem sit gyrationis circumferetur celeritate angulari =  $\frac{e(aa - cc) \cos AE}{cc}$ , sin autem fuerit  $aa < cc$ , in sensum contrarium circumferetur celeritate angulari =  $\frac{e(cc - aa) \cos AE}{cc}$ .

## COROLL. 3.

720. Ipse autem arcus circuli minoris EO, per quem axis gyrationis tempore  $t$  procedit, est =  $\frac{e(aa - cc)t \sin AE \cos AE}{cc}$ .

$= \frac{g(aa - cc) \cos AB}{cc}$ , quod ergo spatium ceteris paribus est maximum, si  $AE = \frac{1}{2} AB = 45^\circ$ , hoc est si axis gyrationis aequaliter distet ab axibus principalibus.

## COROLLARIUM

721. Posita ratione diametri ad peripheriam  $= 1 : \pi$ , polus gyrationis totam circumferentiam EFGE percurrent tempore  $= \frac{2\pi cc}{g(aa - cc) \cos AB}$  min. sec. huncque motum perpetuo uniformem conservabit.

## SCHOLIUM

722. Hic nondum de ipso corporis motu agimus, sed quod probe est notandum, corpus, quasi quiesceret, vel aliud ipsi aequale in quiete contemplamur, in eoque ad quodvis tempus axem gyrationis IO definire docuimus, circa quem corpus motum tum sit gyraturum, neque hic sumus solliciti, quemnam situm hic axis gyrationis tum respectu spatii absoluti sit habiturus. Nunc igitur istam completam motus cognitionem aggrediamur.

## PROBLEMA 73.

723. Si corpori rigido duobus axibus principalibus praedito impulsus fuerit initio motus gyriorius quicunque, ad datum tempus tum situm axium principalium quam axis gyrationis respectu spatii absoluti assignare.

## SOLUTIO.

Fig. 89.

Sphaera ex centro inertiae corpori circumscripta cingatur superficie sphaerica immobili ZXVY, atque elapso tempore  $t$  sphaera mobilis cum corpore eum teneat situm, ut axium ternorum principalium poli sint in A, B, C, respectu quorum prius IA momentum inertiae sit  $= Maa$ , respectu autem binorum reliquorum  $= Mcc$ . Ductis inde ad punctum quoddam fixum Z arcubus AZ, BZ et CZ, ponamus ut in probl. 68.  $AZ = l$ ,  $BZ = m$ , et  $CZ = n$ , ut sit  $\cos l^2 + \cos m^2 + \cos n^2 = 1$ , tum vero sint anguli XZA  $= \lambda$ , XZB  $= \mu$  et XZC  $= \nu$ , et quia motus gyriorius, uti jam ostendimus, manet aequabilis, sit ejus celeritas angularis  $= s$  in sensum ABC directus. Porro quoniam axis gyratio-

gyrationis perpetuo ab axe IA aequè maneat remotus. Sit arcus AO =  $\alpha$ , et aequalis initiali AE, ubi assumamus initio polum gyrationis E in ipso arcus AB positum fuisse. Ex praecedentibus ergo si ponamus

$\frac{s(a\alpha - cc) t \cos \alpha}{cc} = T$ , erit nunc elapso tempore =  $t$  angulus BAO =  $T$ ; unde si ponamus arcus BO =  $\zeta$  et CO =  $\gamma$ , erit  $\cos \zeta = \sin \alpha \cos T$  et  $\cos \gamma = \sin \alpha \sin T$  ob BAC angulum rectum. His positis ob  $x = s$  ex §. 678. habemus has aequationes.

$$dl \sin l = s dt \sin \alpha (\cos n \cos T - \cos m \sin T); \quad -d\lambda \sin l^2 = s dt \sin \alpha (\cos m \cos T + \cos n \sin T)$$

$$dm \sin m = s dt \sin \alpha (\cos l \sin T - \cos n \cos \alpha); \quad -d\mu \sin m^2 = s dt \sin \alpha (\cos n \sin T + \cos l \cos \alpha)$$

$$dn \sin n = s dt \sin \alpha (\cos m \cos \alpha - \cos l \cos T); \quad dv \sin n^2 = s dt \sin \alpha (\cos l \cos \alpha + \cos m \cos T)$$

quae quo facilius ad integrationem perducì queant, consideremus arcum ZO =  $v$ , et cum sit  $\cos v = \cos \alpha \cos l + \sin \alpha (\cos m \cos T + \cos n \sin T)$  erit differentiando,

$$dv \sin v = dl \sin l \cos \alpha + dm \sin m \sin \alpha \cos T + dn \sin n \sin \alpha \sin T + dT \sin \alpha \cos m \sin T - dT \sin \alpha \cos n \cos T$$

substitutis autem pro  $dl \sin l$ ,  $dm \sin m$ ,  $dn \sin n$  illis valoribus fit

$$dv \sin v = -dT \sin \alpha (\cos n \cos T - \cos m \sin T) = -dT \sin \alpha \cdot \frac{dl \sin l}{s dt \sin \alpha}$$

Cum igitur sit  $dT = \frac{s(a\alpha - cc) dt \cos \alpha}{cc}$  oritur

$$dv \sin v = \frac{-(a\alpha - cc) \cos \alpha}{cc} \cdot dl \sin l \text{ et integrando}$$

$$\cos v = C - \frac{(a\alpha - cc) \cos \alpha \cos l}{cc} = \cos \alpha \cos l + \sin \alpha (\cos m \cos T + \cos n \sin T)$$

ut ergo jam una habeatur aequatio integralis

$$C = \frac{a\alpha}{cc} \cos \alpha \cos l + \sin \alpha \cos m \cos T + \sin \alpha \cos n \sin T.$$

Hinc autem concludere licet integrationem particularem, ponendo arcum  $l$  constantem, et  $\cos m = \sin l \cos T$  atque  $\cos n = \sin l \sin T$ , ut fiat  $\cos l^2 + \cos m^2 + \cos n^2 = 1$ . simulque primae aequationi  $dl \sin l = 0$  satisfiat, reliquae vero dabunt:

$$dm \sin m = dT \sin l \cos T = s dt \sin \alpha (\cos l \sin T - \cot \alpha \sin l \cos T)$$

$$dn \sin n = -dT \sin l \cos T = s dt \sin \alpha (\cot \alpha \sin l \cos T - \cos l \cos T)$$

Oo

ex

ex quorum utraque prodit  $dT/l = \frac{a \, dt \, \sin a (\cos l - \cos a \sin l)}{cc}$  =  $\frac{a(a-c) \, dt \, \cos a \sin l}{cc}$ , seu  $\sin a \cos l - \cos a \sin l = \frac{(a-a-c) \cos a \sin l}{cc}$ , hinc-

que  $\tan l = \frac{c \tan a}{a}$ , simul autem arcus  $ZO = v$  fiet constans, nempe  $\cos v = \cos a \cos l + \sin a \sin l$  consequenter  $ZO = v = a - l$  et  $\tan AZO = 0$ , ita ut puncta A, Z et O semper sint in eodem circulo maximo. Denique vero pro situ arcus ZA habebitur  $-d\lambda \sin^2 l = \frac{a \, dt \, \sin a}{l}$ ,

hincque  $\lambda = \frac{-a \, dt \, \sin a}{\sin l}$ . Cognito autem angulo  $XZA = \lambda$  reliqui

$XZB = \mu$  et  $XZC = v$  ex his formulis definientur:

$$\sin(\mu - \lambda) = \frac{-\cos n}{\sin l \sin m}; \quad \sin(v - \lambda) = \frac{\cos m}{\sin l \sin n}; \quad \text{seu}$$

$$\cos(\mu - \lambda) = \frac{-\cos l \cos m}{\sin l \sin m}; \quad \cos(v - \lambda) = \frac{-\cos l \cos n}{\sin l \sin n}$$

$$\text{seu } \tan(\mu - \lambda) = \frac{\cos n}{\cos l \cos m} = \frac{\tan T}{\cos l} \quad \text{et } \tan(v - \lambda) = \frac{-\cos T}{\cos l}.$$

Cum autem haec solutio sit particularis, generalem sequenti modo eliciemus.

### SOLUTIO GENERALIS.

Ponamus  $\cos m = \sin l \cos \theta$  et  $\cos n = \sin l \sin \theta$ , ut sit  $\cos l^2 + \cos m^2 + \cos n^2 = 1$ , eritque

$$d \sin l = \frac{a \, dt \, \sin a (\sin l \sin \theta \cos T - \sin l \cos \theta \sin T)}{cc}$$

sive  $dl = \frac{a \, dt \, \sin a \sin(\theta - T)}{cc}$ , tum vero habebitur

$$dm \sin m = d \sin l \sin \theta - d \cos l \cos \theta = \frac{a \, dt \, \sin a (\cos l \sin T - \cos a \sin l \sin \theta)}{cc}$$

ideoque

$$d \theta \sin l \sin \theta = \frac{a \, dt \, \sin a (\cos l \cos \theta \sin(\theta - T) + \cos l \sin T - \cos a \sin l \sin \theta)}{cc}$$

at ob  $T = \theta - (\theta - T)$  est  $\sin T = \sin \theta \cos(\theta - T) - \cos \theta \sin(\theta - T)$

unde per  $\sin \theta$  dividendo erit

$$d \theta \sin l = \frac{a \, dt \, \sin a (\cos l \cos(\theta - T) - \cos a \sin l)}{cc}.$$

Statuamus jam  $\theta - T = \phi$ , erit  $d \theta = d \phi + \frac{a(a-c) \, dt \, \cos a}{cc}$ , et

$$d \phi \sin l + \frac{a(a-c) \, dt \, \cos a \sin l}{cc} = \frac{a \, dt \, \sin a \cos l \cos \phi - a \, dt \, \cos a \sin l}{cc}$$

seu

$$\text{sen } d\phi \text{ fl} = \text{edt } \text{fl} a \cos l \cos \phi - \frac{\text{e} d a d t \cos \phi \text{ fl}}{c c}$$

quae aequatio cum praecedente  $dl = \text{edt } \text{fl} a \text{ fl} \phi$  est conjungenda et resolvenda, quae quidem continent tres variables  $l$ ,  $t$ , et  $\phi$ , quarum

media ob  $\text{edt} = \frac{dl}{\text{fl} a \text{ fl} \phi}$  facile eliminatur; oritur enim

$$d\phi \text{ fl} = \frac{dl \cos l \cos \phi}{\text{fl} \phi} - \frac{a a dl \cos \phi \text{ fl}}{c c \text{ fl} a \text{ fl} \phi} \text{ seu}$$

$$\frac{a a dl \cos \phi \text{ fl}}{c c \text{ fl} a} = dl \cos l \cos \phi - d\phi \text{ fl} \text{ fl} \phi$$

cujus integrale est:

$$C - \text{fl} l \cos \phi = C - \frac{a a c c \text{ fl} a \cos l}{c c \text{ fl} a}$$

Statuamus brevitatis gratia  $\frac{a a c c \text{ fl} a}{c c \text{ fl} a} = D$ , ut sit

$$\cos \phi = \frac{C - D \cos l}{\text{fl} l}, \text{ et } \text{fl} \phi = \frac{1}{\text{fl} l} \sqrt{(1 - CC + 2CD \cos l - (1 + DD) \cos l^2)}$$

quo valore in altera aequatione substituto oritur

$$\text{edt} = \frac{\text{fl} a \sqrt{(1 - CC + 2CD \cos l - (1 + DD) \cos l^2)}}{dl \text{ fl} l}$$

cujus integrale est

$$\text{et} + E = \frac{1}{\text{fl} a \sqrt{(1 + DD)}} \Lambda \text{ fl} n \frac{CD - (1 + DD) \cos l}{\sqrt{(1 - CC + DD)}}$$

$$\text{seu } \frac{CD - (1 + DD) \cos l}{\sqrt{(1 - CC + DD)}} = \text{fl} n ((\text{et} + E) \text{ fl} a \sqrt{(1 + DD)})$$

unde ad quodvis tempus arcus  $ZA = l$ , indeque angulus  $\phi = \Theta - T$ , hincque angulus  $\Theta = \phi + T$  innotescit, quo invento erit  $\cos m = \text{fl} l \cos \Theta$  et  $\cos n = \text{fl} l \text{ fl} \Theta$ . Porro fiet  $\cos ZO = \cos a \cos l + \text{fl} a \text{ fl} l \cos \phi = \cos a \cos l + C \text{ fl} a - D \text{ fl} a \cos l$ , seu  $\cos ZO = C \text{ fl} a - \frac{(a a - c c) \cos a \cos l}{c c}$ . Denique pro angulo  $XZA = \lambda$  obtinemus:

$$-d\lambda \text{ fl} l^2 = \text{edt } \text{fl} a \text{ fl} l \cos \phi, \text{ seu } d\lambda = \frac{-\text{e} d t \text{ fl} a (C - D \cos l)}{\text{fl} l^2}$$

ubi si loco  $\text{edt}$  superior valor substituitur provenit

$$d\lambda = \frac{-dl(C - D \cos l)}{\int l \sqrt{(1 - CC + 2CD \cos l - (1 + DD) \cos^2 l)}} \\ \text{cujus integrale elicitur}$$

$$\lambda = E + A \int \frac{-D + C \cos l}{\sin l}$$

sicque omnia in genere sunt determinata.

#### COROLL. 1.

724. Ex solutione generali nascitur solutio particularis prius eruta, si ponatur constans  $C = \sqrt{1 + DD}$ ; tum enim in aequatione  $er + E = \frac{1}{\sin a \sqrt{1 + DD}} A \int \frac{CD - (1 + DD) \cos l}{\sqrt{1 - CC + DD}}$ , ob denominatorem  $\sqrt{1 - CC + DD} = 0$ , etiam numerator  $CD - (1 + DD) \cos l$  evanescere debet, unde fit  $\cos l = \frac{D}{\sqrt{1 + DD}}$  et  $\sin l = \frac{1}{\sqrt{1 + DD}}$ , ideoque  $\tan l = \frac{1}{D} = \frac{cc}{aa} \tan a$ .

#### COROLL. 2.

725. Sumta autem constans  $C = \sqrt{1 + DD}$  fit  $\cos \phi = \frac{\sqrt{1 + DD} - D \cos l}{\sin l} = 1$ , ideoque  $\phi = 0$  et  $\Theta = T$ , unde colligitur  $\cos m = \sin l \cos T$  et  $\cos n = \sin l \sin T$ , ac denique  $\lambda = E + A \int \frac{-D + \cos l \sqrt{1 + DD}}{\sin l} = E + A \int 0$ . Verum ob  $\phi = 0$ , ad hoc incommodum evitandum, sumatur aequatio  $d\lambda \sin l = -adt \sin a$ , unde fit ut ante  $\lambda = E - \frac{at \sin a}{\sin l}$ .

#### SCHOLION.

726. Solutio generalis ideo tot involvit constantes arbitrarías, ut ubicunque punctum fixum Z in sphaera immobili accipiat, ad id possit accommodari. Cum autem punctum Z ab arbitrio nostro pendeat, id semper ita accipere licebit, ut pro eo solutio particularis locum sit habitura: quae cum sit simplicissima maxime nobis perspicuam cognitionem motus largietur, cum idem motus, si ad alia puncta fixa referretur, vehementer perturbatus videri debeat. Quare punctum hoc fixum Z non pro lubitu sed ita assumamus, ut solutio illa particularis locum inveniat.

PRO-

PROBLEMA. 74.

727. Si corpori rigido duobus axibus principalibus paribus praedito impressus fuerit initio motus gyratorius circa axem quemcunque per centrum inertiae transeuntem motus hujus continuationem determinare.

SOLUTIO.

In centro sphaerae immobilis concipiatur centrum inertiae corporis, quod etiam quiescit; atque initio axes corporis principales fuerint in A, B, C, quorum primi IA respectu momentum inertiae sit =  $Maa$ , respectu vero binorum reliquorum =  $Mcc$ : tum autem acciperit corpus motum gyratorium circa axem IE in sensum BCA, celeritate angulari =  $s$  sitque arcus AE =  $a$ . Quo nunc hujus motus impressi continuationem investigemus, solutione particulari utentes, in arcu AB, quem in sphaera immobili tanquam meridianum fixum spectemus, capiatur AZ ita ut sit  $\text{tang } AZ = \frac{c \text{ et } \text{tang } a}{aa}$  sumaturque Z pro puncto illo fixo, ad quod deinceps situm corporis perpetuo referamus, ponamus autem AZ =  $l$ , ut sit ZE =  $a - l$ . Iam elapso tempore =  $t$  pervenerint poli axium principalium in A', B', C'; et vidimus fore adhuc ZA' = ZA =  $l$ , et in eodem arcu A'Z reperiri punctum O, circa quod tanquam polum corpus nunc gyretur celeritate angulari =  $s$  in sensum B'C'A'. Ex praecedentibus autem, ubi angulum XZA posuimus =  $\lambda$ , quoniam ejus negativum hic angulum AZA' denotat, qui initio

Fig. 92.

erat = 0, erit hic angulus AZA' =  $\frac{s \text{ et } \text{fin } a}{\text{fin } l}$ : unde ad quodvis tempus positio axis principalis IA' cognoscitur. Sint bini reliqui in B' et C', at-

que §. 717. invenimus, fore angulum B'A'O =  $\frac{s(aa - cc)t \cos a}{cc}$ : quare

invento puncto A' capiatur angulus ZA'B' =  $\frac{s(aa - cc)t \cos a}{cc}$ , et sumto

arcu A'B' quadrante, erit B' alter duorum reliquorum polorum principalium, unde sponte tertius C' patet.

COROLL. I.

728. Axis ergo principalis IA uniformiter gyratum circa lineam IZ fixam, sed non ad corpus pertinentem; ita ut sit arcus AZ = A'Z =  $l$

O o 3

existen-



existente  $\text{tang } l = \frac{cc \text{ tang } a}{aa}$ , et tempore  $t$  absolvatur angulus  $AZA' = \frac{a f i a}{f l}$ : cujus ergo motus celeritas angularis in sensum  $AA'$  seu  $BCA$  erit  $= \frac{a f i a}{f l}$ .

## COROLL. 2.

729. Interea autem arcus in corpore  $AB$ , qui initio in  $AZ$  cadebat, ita circa  $ZA$  dum tempore  $t$  in  $ZA'$  procedit, gyatur ut conficiat angulum  $ZA'B' = \frac{a(aa - cc) t \cos a}{cc}$ , cujus ergo motus celeritas angularis est  $= \frac{a(aa - cc) \cos a}{cc}$ .

## COROLL. 3.

730. Motus ergo corporis potest repraesentari tanquam compositus ex duplici gyatorio. Primo scilicet corpus gyabitur circa suum polum principalem singularem  $A$  celeritate angulari  $= \frac{a(aa - cc) \cos a}{cc}$  in sensum  $CB$ ; tum verò interea ipse hic polus  $A$  gyabitur circa punctum  $Z$  in spatio absoluto fixum celeritate angulari  $= \frac{a f i a}{f l}$ .

## COROLL. 4.

731. Posito arcu  $ZA = l$ , sit celeritas angularis, qua punctum  $A$  circa punctum fixum  $Z$  gyatur  $= \zeta$ , in sensum  $AA'$ , quae duo elementa ut data considerentur, erit  $\text{tang } a = \frac{aa}{cc} \text{ tang } l$  et  $s = \frac{\zeta f i l}{f i a}$ . Hinc celeritas angularis, qua interea arcus  $AB$  circa  $A$  gyatur in sensum contrarium, erit  $= \frac{\zeta(aa - cc) f i l}{cc \text{ tang } a} = \frac{\zeta(aa - cc) \cos l}{aa}$ .

## SCHOLION. 1.

732. Hic corporis motus commodissime eodem modo repraesentari potest, quo motum vertiginis terrae concipimus, quatenus axis seu

sēu poli in coelo progrediuntur. Corpus nempe tanquam terra spectetur, cujus alter polus sit  $A$ , in coelo autem punctum  $Z$  polus eclipticae, a quo polus terrae constanter eandem servet distantiam  $ZA = l$ , et circa quem gyretur celeritate angulari  $= \zeta$  in sensum  $AA'$ , qui motus respondet processui poli terrestris in coelo. Interea autem dum sphaera  $AB$  vel  $A'B'$  gyratur circa  $A$  vel  $A'$ , ab arcu  $ZA$  recedens in sensum

$CB$  celeritate angulari  $= \frac{\zeta(aa - cc)\cos l}{aa}$ , hic motus respondebit motui

diurno terrae. Revera autem talis motus maxime discrepat a motu vertiginis terrae, cum hic motus meridiani  $AB$  circa polum  $A$  sit admodum lentus respectu motus angularis poli  $A$  circa punctum fixum  $Z$ , cum contra in terra motus diurnus sit velocissimus praeter motu poli circa polum eclipticae. Quod si ergo motus polorum terrae circa polos eclipticae esset velocissimus, contra vero motus vertiginis circa polos terrae tardissimus, causam hujus motus neutiquam in viribus externis quaeri conveniret, cum terra per se ob inertiam tali motu cieri posset. Nunc autem cum contrarium eveniat, hujus phaenomeni causa manifeste in viribus externis, quibus terra sollicitatur, est sita.

### SCHOLIUM. 2.

733. Memoratu hic omnino dignum est, quod motus corporis, qui revera circa axem variabilem  $IO$  fiebat, quasi sponte reductus fuerit ad binos motus gyrationis, qui autem probe a se invicem sunt distinguendi, dum alter sit circa axem verum et in corpore existentem, alter vero circa axem quasi extra corpus existentem et ad spatium absolutum relatum. Ad quem motum clarius menti exponendum, corpus  $PRQS$  hasta  $APQa$  transfixum concipiat, quae per ejus centrum inertiae  $I$  transeat, ejusque axem principalem singularem referat: tum vero hasta terminis suis  $A$  et  $a$  ita annulo  $ZAza$  inferatur, ut corpus libere circa eam gyri queat: annulus autem in punctis oppositis  $Z$  et  $z$  habeat cardines, qui extrinsecus ita firmiter retineantur, ut annulus circa eos pariter libere circumferri possit. Quod si jam corpus  $PRQS$  circa hastam  $Aa$  in gyrum agatur simulque annulus  $AzaZ$  circa cardines  $Z$  et  $z$  circumferatur, ejusmodi motus brietur qualem hic descripsimus, ubi hasta refert axem verum in corpore existentem et cum corpore motum, cardines vero  $Z$  et  $z$  axem alterum extra corpus fixum. Bini autem hi motus gyrationis in hoc conveniunt, quod uterque altero sublato abeat in verum motum gyrationis circa axem fixum; si enim annulus

mulus quiescat, corpus circa hastam quiescentem *Aa* seu axem *PQ* fixum gyrabitur: sin autem dematur motus circa hastam, solusque annulus circa cardines *Z* et *z* gyretur, in corpore orietur motus gyratorius simplex circa axem fixum ad cardines *Z* et *z* pertingentem.

## S C H O L I O N. 3.

734. Talis motus fieri dicitur circa axem mobilem, qui probe distinguendus est a motu circa axem variabilem, qualem in praecedentibus consideravimus. Corpus enim circa axem variabilem gyrationi dicitur, quando continuo circa aliam lineam per ejus centrum inertiae ductam gyrationi, quae etiam eo instanti revera quiescat; atque de tali axe omnia sunt intelligenda, quae supra de motu gyratorio sunt exposita. Quando autem dicimus corpus circa axem mobilem gyrationi, quae idea nunc demum nobis nata est censenda, axis quidem erit certa quaedam linea in corpore existens invariabilis, quae autem ipsa cum corpore moveatur; ita ut iste axis mobilis nunquam quiescat. Ita axis terrae qui hoc nomen genere solet, non est axis variabilis sed mobilis, cum in terra sit linea quaedam fixa, sed labente tempore ad aliam atque aliam coeli puncta dirigatur: qui ergo etiam abstractione facta a motu terrae annuo nullo temporis puncto quiescit, etiamsi ejus motus sit tardissimus. Verum quovis tempore alia quaedam linea in terra assignari potest, quae tum revera quiescat, successu temporis autem continuo mutetur: hujusque respectu terra circa axem variabilem gyrationi est dicenda. Ob motum autem aequinoctiorum tardissimum praeter motu diurno differentia inter verum terrae axem et axem variabilem quovis tempore locum habentem fere penitus est imperceptibilis; quae autem si esset notabilis, in Astronomia summam attentionem postulariet, cum observationes pro elevatione poli institutae non situm axis veri, sed axis variabilis eo tempore ostendant; circa quem scilicet tum quiescentem terra gyretur.

## P R O B L E M A. 75.

735. Si corpori rigido duobus axibus principalibus paribus praedito motus quicumque imprimatur, corpusque a nullis viribus externis sollicitetur, neque usquam retineatur, quomodo motum suum libere prosequi possit, determinare motum, quo moveri perget.

## S O L U T I O.

Primum dispiciatur, utrum ob motum impressum centrum inertiae moveatur nec ne? si enim moveatur, corpus habebit motum progressivum

gressivum seorsim considerandum, quo uniformiter in directum progreditur, atque mente saltem hunc motum tollere licebit, dum scilicet ipsum spatium motu contrario proferri concipiatur. Sublato ergo motu progressivo, cujus ratio perinde est comparata, ac si praeterea nullus alius motus in corpore inesset, centrum corporis inertiae tanquam quiescens considerari poterit: circa quod quomodocunque corpus agitur, linea quaeque recta per id ducta primo saltem initio quiescet, quae ejus erit axis gyrationis. Tum si iste axis conveniat cum aliquo axium principalium, hoc est, si vel incidat in axem principalem singularem vel ad eum sit normalis, etiam hic motus manebit aequabilis, axisque quiescet, vel adjuncto motu progressivo sibi jugiter manebit parallelus. At si axis ille, circa quem corpus primum gyrationi coepit, neque cum axe principali singulari congruat, neque ad eum sit normalis, corpus circa axem variabilem gyraabitur, qui quomodo continuo varietur, in praecedentibus abunde ostendimus. Clarius etiam hic motus perspicietur per reductionem illam ad axem mobilem, quae corpus circa ipsum axem principalem singularem aequabiliter gyraatur, dum ipse hic axis circa quosdam polos extra corpus fixos circumfertur pariter motu uniformi.

## SCHOLIUM.

736. Hoc problemate universum argumentum, quod hoc capite tractandum suscepimus, exhaustum, ita ut corporum rigidorum duobus axibus principalibus paribus praedictorum, et a nullis viribus sollicitatorum, motus liberos in genere determinare atque ad quovis casus accommodare valeamus. Superfunt ergo corpora tertiae classis, quorum momenta inertiae principalia sunt inaequalia, quibus sequens caput destinatur.





# CAPUT XIII.

## DE MOTU LIBERO CORPORUM RIGIDORUM TERNIS AXIBUS PRINCIPALIBUS DISPARI- BUS PRAEDITORUM, ET A NULLIS VIRI- BUS SOLLICITATORUM.

### PROBLEMA. 76.

737. Si corpori rigido cuicunque impressus fuerit initio motus gyriorius quicunque, neque id ab ullis viribus externis sollicitetur; ad quodvis tempus positionem axis gyrationis respectu axium principalium assignare.

### SOLUTIO.

Fig. 89.

Cum centrum inertiae corporis I perpetuo quiescat, in eo constituitur centrum sphaerae, ad cuius superficiem omnia reducimus: sintque IA, IB, IC, axes corporis principales, et momenta inertiae respectu axis IA = Maa, respectu axis IB = Mbb, et respectu axis IC = Mcc, quae inter se inaequalia assumimus, quoniam si duo vel adeo omnia essent inter se aequalia, casus ad praecedentia capita revolveretur. Nunc elapso tempore  $t$  sit recta IO axis gyrationis, cuius situm respectu axium principalium definiri oportet; ponatur celeritas angularis, qua corpus jam circa hunc axem IO gyatur =  $\omega$ , fiatque gyratio in sensum ABC. Vocentur arcus circulorum maximorum, qui quae-runtur, OA =  $\alpha$ , OB =  $\zeta$ , et OC =  $\gamma$ , qui tempore variantes pro variabilibus sunt habendi, ita autem inter se pendent, ut sit  $\cos \alpha^2 + \cos \zeta^2 + \cos \gamma^2 = 1$ . Deinde vero etiam celeritas angularis  $\omega$  hic erit variabilis, cum sit (670.)

$$\frac{d\omega}{\omega\omega} = \frac{(aa-bb)(aa-cc)(bb-cc) \cos \alpha \cos \zeta \cos \gamma}{aabbcc} dt,$$

tum vero ex §. 674. variabilitas arcuum  $\alpha$ ,  $\zeta$ ,  $\gamma$ , ita determinatur per has ternas aequationes:

$$I. aa bb cc d\alpha \text{ si } \alpha = \omega (cc - bb) dt \cos \zeta \cos \gamma (bb cc - (bb - aa) (cc - aa) \cos \alpha^2)$$

$$II. aa bb cc d\zeta \text{ si } \zeta = \omega (aa - cc) dt \cos \gamma \cos \alpha (aa cc - (cc - bb) (aa - bb) \cos \zeta^2)$$

$$III. aa$$

$$\text{III. } aa\,bb\,cc\,d\gamma\,f\gamma = x\,(bb - aa)\,dt\,\cos a\,\cos \zeta\,(aa\,bb - (aa - cc)(bb - \alpha)\,\cos \gamma^2).$$

$$\text{Cum autem fit } \frac{dt\,\cos a\,\cos \zeta\,\cos \gamma}{aa\,bb\,cc} = \frac{dx}{xx\,(aa - bb)\,(aa - cc)\,(bb - cc)}$$

hae aequationes abeunt in istas:

$$\text{I. } da\,fa\,\cos a = \frac{-dx}{x\,(aa - bb)\,(aa - cc)}\,(bb\,cc - (bb - aa)(cc - aa)\,\cos a^2)$$

$$\text{II. } d\zeta\,f\zeta\,\cos \zeta = \frac{dx}{x\,(aa - bb)\,(bb - cc)}\,(aa\,cc - (cc - bb)(aa - bb)\,\cos \zeta^2)$$

$$\text{III. } d\gamma\,f\gamma\,\cos \gamma = \frac{-dx}{x\,(aa - cc)\,(bb - cc)}\,(aa\,bb - (aa - cc)(bb - cc)\,\cos \gamma^2)$$

five has integrabiles:

$$\text{I. } + \frac{dx}{x} = \frac{-(bb - aa)(cc - aa)\,da\,fa\,\cos a}{bb\,cc - (bb - aa)(cc - aa)\,\cos a^2}$$

$$\text{II. } + \frac{dx}{x} = \frac{-(cc - bb)(aa - bb)\,d\zeta\,f\zeta\,\cos \zeta}{aa\,cc - (cc - bb)(aa - bb)\,\cos \zeta^2}$$

$$\text{III. } + \frac{dx}{x} = \frac{-(aa - cc)(bb - cc)\,d\gamma\,f\gamma\,\cos \gamma}{aa\,bb - (aa - cc)(bb - cc)\,\cos \gamma^2}$$

quarum integralia sunt:

$$\frac{A}{xx} = bb\,cc - (bb - aa)(cc - aa)\,\cos a^2$$

$$\frac{B}{xx} = aa\,cc - (cc - bb)(aa - bb)\,\cos \zeta^2$$

$$\frac{C}{xx} = aa\,bb - (aa - cc)(bb - cc)\,\cos \gamma^2$$

ubi quidem constantium A, B, C, binae sunt arbitrariae, at tertiam ita definiri oportet, ut fiat

$$A\,(cc - bb) + B\,(aa - cc) + C\,(bb - aa) = 0.$$

Vel posito

$$A = \mathfrak{A}\,(bb - aa)(cc - aa); \quad B = \mathfrak{B}\,(cc - bb)(aa - bb); \\ C = \mathfrak{C}\,(aa - cc)(bb - cc)$$

Pp 2

debet

debet esse  $\mathcal{A} + \mathcal{B} + \mathcal{C} = 0$ . Hinc ergo erit

$$\cos \alpha^2 = \frac{bbccxx - \mathcal{A}(bb - aa)(cc - aa)}{(bb - aa)(cc - aa)xx} = \frac{bbcc}{(bb - cc)(cc - aa)} - \frac{\mathcal{A}}{xx}$$

$$\cos \mathcal{C}^2 = \frac{aacc}{(cc - bb)(aa - bb)} - \frac{\mathcal{B}}{xx}$$

$$\cos \gamma^2 = \frac{aabb}{(aa - cc)(bb - cc)} - \frac{\mathcal{C}}{xx}$$

Ponamus brevitatis gratia:

$$\frac{bbcc}{(bb - aa)(cc - aa)} = \mathcal{D}; \quad \frac{aacc}{(aa - bb)(cc - bb)} = \mathcal{E}; \quad \text{et}$$

$$\frac{aabb}{(aa - cc)(bb - cc)} = \mathcal{F};$$

ut sit  $\mathcal{D} + \mathcal{E} + \mathcal{F} = 1$ , uti est  $\mathcal{A} + \mathcal{B} + \mathcal{C} = 0$ .  
erit

$$\cos \alpha = \frac{r(\mathcal{D}xx - \mathcal{A})}{r(\mathcal{F}xx - \mathcal{C})}; \quad \cos \mathcal{C} = \frac{r(\mathcal{E}xx - \mathcal{B})}{r(\mathcal{F}xx - \mathcal{C})}; \quad \text{et } \cos \gamma =$$

quibus valoribus in aequatione primum inventa substitutis habebitur:

$$\frac{(aa - bb)(aa - cc)(bb - cc)dt}{aabbcc} = \frac{rds}{r(\mathcal{D}xx - \mathcal{A})(\mathcal{E}xx - \mathcal{B})(\mathcal{F}xx - \mathcal{C})}$$

Cujus integratio, paucissimis casibus exceptis, receptas expressiones arcuum circularium vel logarithmorum respuit.

#### COROLL. 1.

738. Nisi ergo duo corporis momenta principalia inter se fuerint aequalia, motus gyratorius circa axem variabilem non est uniformis; ac determinatio quidem celeritatis angularis ad quodvis tempus maximam parit difficultatem.

#### COROLL. 2.

739. Inventa autem celeritate angulari  $\omega$  ad tempus elapsum  $t$ , facile positio axis gyrationis respectu axium principalium definitur per formulas pro arcibus  $\alpha$ ,  $\mathcal{C}$ ,  $\gamma$ , inventas.

PRO.

PROBLEMA. 77.

740. Iisdem positis, atque in praecedente problemate, ex dato axe gyrationis, circa quem corpus initio data celeritate angulari gyrationis coepit, ad datum tempus celeritatem angularem et axis gyrationis positionem respectu axium principalium determinare.

SOLUTIO.

Sit IE axis, circa quem corpus initio gyrationis coepit, celeritate angulari =  $s$  in sensum ABC, pro cuius loco sunt arcus AE =  $a$ , BE =  $b$ , et CE =  $c$ . Tum vero cum momenta inertiae  $M_{aa}$ ,  $M_{bb}$ ,  $M_{cc}$ , sint inaequalia, sit  $aa$  maximum,  $bb$  medium, et  $cc$  minimum, ponanturque numeri hinc formandi  $\frac{bbcc}{(aa-bb)(aa-cc)} = A$ ;  $\frac{aacc}{(aa-bb)(bb-cc)} = B$ ; et  $\frac{aabb}{(aa-cc)(bb-cc)} = C$ ; atque  $\frac{aabbcc}{(aa-bb)(aa-cc)(bb-cc)} = D$ , ut sit  $A - B + C = 1$  et  $DD = ABC$ . Pro praecedentibus ergo formulis erit  $\mathfrak{D} = A$ ,  $\mathfrak{E} = -B$ , et  $\mathfrak{F} = C$ , et elapso tempore  $t$  celeritas angularis  $x$  ex hac aequatione differentiali determinari debet,

Fig. 89.

$$\frac{dt}{2D} = \frac{x dx}{r(Axx - \mathfrak{A})(-Bxx - \mathfrak{B})(Cxx - \mathfrak{E})}$$

cujus integratio ita est instituenda, ut posito  $t = 0$  fiat  $x = s$ . Deinde vero habebitur pro arcubus AO =  $\alpha$ , BO =  $\beta$ , et CO =  $\gamma$ ,

$$\cos \alpha = \frac{r(Axx - \mathfrak{A})}{r(Cxx - \mathfrak{E})}; \cos \beta = \frac{r(-Bxx - \mathfrak{B})}{r(Cxx - \mathfrak{E})}; \cos \gamma = \frac{r(Cxx - \mathfrak{E})}{r(Cxx - \mathfrak{E})};$$

qui cum initio fuerint  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , constantes  $\mathfrak{A}$ ,  $\mathfrak{B}$ ,  $\mathfrak{E}$ , ita determinantur, ut sit

$$\mathfrak{A} = (A - \cos^2 a^2)aa; \mathfrak{B} = -(B + \cos^2 b^2)bb; \mathfrak{E} = (C - \cos^2 c^2)cc.$$

Quamobrem habebimus:

$$\cos \alpha = \frac{r(s + \cos a^2 - Aaa + Axx)}{r(Cxx - \mathfrak{E})}$$

$$\cos \beta = \frac{r(s + \cos b^2 + Bbb - Bxx)}{r(Cxx - \mathfrak{E})}$$

$$\cos \gamma = \frac{r(s + \cos c^2 - Ccc + Cxx)}{r(Cxx - \mathfrak{E})}$$



et integrari oportet hanc formulam

$$dt = \frac{D \, d\alpha}{r \cos \alpha^2 - A \alpha + A \alpha \alpha (\cos b^2 + B \alpha - B \alpha \alpha) (\cos c^2 - C \alpha + C \alpha \alpha)}$$

Ad has formulas contrahendas, statuamus  $\frac{\alpha \alpha - \epsilon \epsilon}{\alpha \alpha} = v$ , ut fiat  $\alpha = r(1+v)$

atque

$$2 \epsilon dt = \frac{D dv}{r (\cos a^2 + A v) (\cos b^2 - B v) (\cos c^2 + C v)}$$

quae ita integrari debet, ut posito  $t = 0$  fiat  $v = 0$ , tum vero erit

$$\cos a = \frac{1}{r} r (\cos a^2 + A v); \cos b = \frac{1}{r} r (\cos b^2 - B v);$$

$$\cos \gamma = \frac{1}{r} r (\cos c^2 + C v);$$

vel etiam:

$$\cos a = \frac{r (\cos a^2 + A v)}{r (1+v)}; \cos b = \frac{r (\cos b^2 - B v)}{r (1+v)}; \cos \gamma = \frac{r (\cos c^2 + C v)}{r (1+v)}.$$

Quodsi ergo ad datum tempus  $t$  valorem ipsius  $v$  assignare valuerimus, tam celeritatem angularem  $\alpha = r(1+v)$  quam positionem axis gyrationis IO respectu axium principalium cognoscemus.

#### C O R O L L. 1.

741. Si in statu initiali arcuum  $a, b, c$ , unus evanescat, reliqui erunt quadrantes, et axis gyrationis prius in aliquem axium principalium incidit, circa quem corpus constanter motu aequabili gyrationis perget.

#### C O R O L L. 2.

742. Cum sit  $\frac{d\alpha}{\alpha \alpha} = \frac{dt \cos a \cos b \cos \gamma}{D}$ , et  $D$  sit quantitas posi-

tiva, patet, quamdiu polus gyrationis  $O$  in spatio  $ABC$  fuerit situs, seu cosinus arcuum  $a, b, \gamma$  positivi, celeritatem gyrationis, quatenus in sensum  $ABC$  dirigitur, augeri.

#### C O R O L L. 3.

Fig. 94.

743. Sin autem polus gyrationis, productis quadrantibus in spatio  $aABb; bBCc; \gamma CAa$ , quae sunt etiam quadrantes, cadat, celeritas minuetur:

nuetur ; augebitur autem in quadrantibus  $\alpha Aa$ ,  $\zeta Bb$ ,  $\gamma Cc$ , perinde atque in principali ABC.

SCHOLION. I.

744. Haec probe notasse juvat , ne formula irrationali utentes ambiguitate signi decipiamur , quare si fuerint cosinus arcuum  $a$  ,  $b$  ,  $c$  positivi vel saltem eorum productum positivum , primo initio celeritas  $v$  crescit , ideoque  $v$  positivum consequitur valorem. Formulâ autem integranda ita est comparata , ut neque algebraice neque per arcus circulares vel logarithmos expediri queat , sed ejus integrale per quadraturas nobis concedi postulare cogimur. Tametsi enim per arcus sectionum conicarum negotium expediri potest , tamen inde nihil plane lucrari licet , ut praestare videatur, consueto more per quadraturas uti. Quodsi enim talis scribendi ratio  $\Pi x (f)$  denotet arcum sectionis conicae , cujus semiparametur = 1 et semiaxis transversus =  $f$  , qui arcus a vertice captus respondeat abscissae =  $x$  ; ita ut si  $f > 0$  ; sectio conica sit ellipsis , si  $f < 0$  , hyperbola , et si  $f = \infty$  parabola , nostra

formula integranda  $\int \frac{dv}{r(a+Av)(b-Bv)(c+ Cv)}$  ubi brevitatis ergo litteras  $a$  ,  $b$  ,  $c$  , pro  $\cos a^2$  ,  $\cos b^2$  ,  $\cos c^2$  pono , ad partem algebraicam , arcum ellipticum , et arcum hyperbolicum reducitur. Erit enim

$$\begin{aligned} \int \frac{dv}{r(a+Av)(b-Bv)(c+ Cv)} &= \text{Const} + \frac{2A r(b-Bv)(c+ Cv)}{(Ac-Ca) r(a+Av)} \\ &+ \frac{2}{rA(Bc+Cb)} \Pi \frac{A(Bc+Cb)}{B(Ac-Ca)} \left( 1 - r \frac{A(b-Bv)}{C} \right) \left( \frac{A(Bc+Cb)}{B(Ac-Ca)} \right) \\ &- \frac{2}{rC(Ba+Ab)} \Pi \frac{C(Ba+Ab)}{B(Ac-Ca)} \left( r \frac{(Ba+Ab)(c+ Cv)}{(Bc+Cb)(a+Av)} - 1 \right) \\ &\quad \left( \frac{-C(Ba+Ab)}{B(Ac-Ca)} \right) \end{aligned}$$

ubi sumsi esse  $Ac > Ca$  , si enim secus eveniret , litteras  $a$  ,  $A$  , et  $c$  ,  $C$  , inter se permutari deberent. Hinc autem certe nullam utilitatem ad calculum prosequendum adipiscimur , multo minus inde ad datum tempus  $t$  valorem ipsius  $v$  colligere licebit , in quo tamen cardo quaestionis versatur. Ceterum casus , quo  $Ac = Ca$  , hinc excluditur , qui autem ob hoc ipsum faciliorem evolutionem admittit , et quem propterea seorsim tractari operae erit pretium.

SCHO-

## SCHOLION. 2.

745. Casus hinc sponte excluduntur, quibus arcuum  $a$ ,  $b$ ,  $c$  quidam evanescit, quoniam tum primo motus initio axis gyrationis in aliquem axium principalium incideret, ideoque idem perpetuo conservaretur. Quod etiam nostrae formulae declarant, nam si  $a = 0$ , et

$$\cos a = 1, \text{ erit } \cos b = 0 \text{ et } \cos c = 0, \text{ unde formulae } \cos \zeta = \frac{r - Bv}{r(1+v)}$$

et  $\cos \gamma = \frac{r C v}{r(1+v)}$  subsistere nequeunt, nisi sit  $v = 0$ , et  $s = s$ , ita ut sit  $\cos \zeta = 0$  et  $\cos \gamma = 0$ , ac polus gyrationis  $O$  constanter maneat in  $A$ . Idem evenit si  $c = 0$ , ubi polus gyrationis  $O$  constanter manet in  $C$ , et  $s = s$ . Hoc autem minus apparet, si initio  $E$  fuerit in  $B$ , seu  $b = 0$  et  $\cos a = 0$  atque  $\cos c = 0$ ; formulae enim dant

$$\cos a = \frac{r A v}{r(1+v)}; \cos \zeta = \frac{r(1-Bv)}{r(1+v)}; \text{ et } \cos \gamma = \frac{r C v}{r(1+v)}$$

ubi  $v$  videtur valorem positivum habere posse. At cum sit

$$z dt = \frac{D dv}{v r AC(1-Bv)} = \frac{dv r B}{v r(1-Bv)}, \text{ ob } D = r ABC,$$

haec aequatio ita integrata, ut posito  $v = 0$  fiat  $t = 0$ , dat

$$\frac{z t}{r B} = l \frac{1+l}{1-l} - l \frac{1+r(1-Bv)}{1-r(1-Bv)}$$

unde manifestum est, nonnisi elapso tempore infinito, hoc est nunquam, litteram  $v$  valorem nihilo majorem acquirere posse. Semper ergo polus gyrationis  $O$  puncto  $B$  manebit affixus, atque  $s = s$ . Ceterum si arcuum  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , unus tantum sit quadrans, primo initio celeritas angularis non mutatur ob  $ds = 0$ ; deinceps vero res ita se habebit. Sit primo  $a = 90^\circ$ , seu cadat punctum  $E$  in quadrantem  $BC$ , ut sit  $\cos c$

$$= \cos b, \text{ erit } \cos a = \frac{r A v}{r(1+v)}; \cos \zeta = \frac{r(\cos b^2 - Bv)}{r(1+v)}; \text{ et } \cos \gamma = \frac{r(\cos b^2 + C v)}{r(1+v)}; \text{ unde patet } v \text{ obtinere valorem positivum, foreque}$$

$$z dt = \frac{D dv}{r A v (\cos b^2 - Bv) (\cos b^2 + C v)}$$

Cum ergo sit  $\cos a > 0$  erit  $a < 90^\circ$ , et polus gyrationis a quadrante  $BC$  propius ad  $A$  accedet, fietque  $s > s$ , idemque eveniet, si polus gyrationis fuerit in quadrante  $AB$ . At si polus gyrationis sit in quadrante  $AC$ , ob  $\cos b = 0$ , erit

$\cos$

$$\cos \alpha = \frac{r(\cos a^2 + Av)}{r(1+v)}; \cos \epsilon = \frac{r - Bv}{r(1+v)}; \cos \gamma = \frac{r(\cos c^2 + Cv)}{r(1+v)}$$

acneceffe est, fit  $v$  quantitas negativa crescens saltem ab initio. Sit ergo  $v = -u$ , et cum  $ed$  positivum valorem habere debeat, capi oportet  $rBu$  negative, et fiet  $\epsilon > 90^\circ$ , ideoque polus gyrationis magis a B recedet, et celeritas  $u = s r (1 - a)$  minuetur.

### SCHOLION. 3.

746. Praeterire hic non possum insignem hujus motus proprietatem, quae in hoc consistit, quod corporis vis viva perpetuo maneat eadem. Hic autem notari convenit, si corpus circa quempiam axem gyretur celeritate angulari  $= u$ , sitque ejus momentum inertiae respectu hujus axis  $= Mkk$ , fore ejus vim vivam  $= Mkk u$ . Hoc praemisso cum sit nostro casu  $Mkk = M(aa \cos a^2 + bb \cos \epsilon^2 + cc \cos \gamma^2)$ , tum vero  $u \cos a^2 = ss (\cos a^2 + Av)$ ;  $u \cos \epsilon^2 = ss (\cos b^2 - Bv)$ ;  $u \cos \gamma^2 = ss (\cos c^2 + Cv)$ ; erit corporis circa axem IO celeritate angulari  $= u$  gyrantis vis viva  $= Mss (aa \cos a^2 + bb \cos b^2 + cc \cos c^2 + v(Aaa - Bbb + Ccc))$ . Est vero  $Aaa - Bbb + Ccc = 0$ , ideoque vis viva non pendet ab  $v$ , et primae impressae semper manet aequalis. Quod autem in genere  $Mkk u$  exprimat corporis vim vivam, seu aggregatum omnium particularum per quadrata celeritatum multiplicatarum, evidens est, concipiatur enim elementum corporis  $dM$  ab axe gyrationis distans intervallo  $= r$ , est ejus celeritas  $= ur$ , ideoque ejus vis viva  $= u r r dM$ : unde fit totius corporis vis viva  $= u r r dM = Mkk u$  ob  $f r r dM = Mkk$ .

### PROBLEMA. 78.

747. Positis adhuc iisdem, si initio axis gyrationis ita fuerit comparatus, ut sit  $\cos a^2 : \cos c^2 = A : C = cc (bb - cc) : aa (aa - bb)$ , ad quodvis tempus elapsum  $t$  positionem axis gyrationis respectu axium principalium definire.

### SOLUTIO.

Ponamus  $\cos a^2 = An$ ; ut sit  $\cos c^2 = Cn$ , erit  $\cos b^2 = 1 - (A + C)n = 1 - (1 + B)n$ : Hincposito  $u = s r (1 + v)$  erit

$$\cos \alpha = \frac{r A(n+v)}{r(1+v)}; \cos \epsilon = \frac{r(1-n-Bn-Bv)}{r(1+v)}; \cos \gamma = \frac{r C(n+v)}{r(1+v)}$$

Qq

atque

$$\text{atque } z s dt = \frac{dv r B}{(n+v) r^{(1-n-Bn-Bv)}} \text{ ob } D = ABC.$$

Hic autem assumimus initio polum gyrationis E intra quadrantem ABC extitisse, ut cosinus tam arcuum  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , quam saltem mox ab initio  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ,  $\gamma$ , sint positivi. Hinc igitur integrando adipiscimur.

$$2st = \frac{r B}{r^{(1-n)}} \int \frac{r^{(1-n)} + r^{(1-n-Bn)}}{r^{(1-n)} - r^{(1-n-Bn)}} - \frac{r B}{r^{(1-n)}} \\ \int \frac{r^{(1-n)} + r^{(1-n-Bn-Bv)}}{r^{(1-n)} - r^{(1-n-Bn-Bv)}}$$

Ponamus ad abbreviandum  $\frac{r^{(1-n)}}{r B} = r^m$ , ut fiat

$$2st r^m = \int \frac{r^m + r^{(m-n)}}{r^m - r^{(m-n)}} - \int \frac{r^m + r^{(m-n-v)}}{r^m - r^{(m-n-v)}} \text{ et}$$

sumto  $e$  pro numero, cujus logarithmus est  $= 1$ , statuatur  $e^{2st r^m}$

$$= T, \text{ fietque } \frac{r^m + r^{(m-n-n)}}{r^m - r^{(m-n-v)}} T = \frac{r^m + r^{(m-n)}}{r^m - r^{(m-n)}}$$

unde porro colligitur,

$$r^{(m-n-v)} = \frac{r^m + r^{(m-n)} - T(r^m - r^{(m-n)})}{r^m + r^{(m-n)} + T(r^m - r^{(m-n)})} r^m$$

eritque  $1-n = Bm$  et  $\cos b^2 = B(m-n)$  dum est  $\cos a^2 = An$  et  $\cos c^2 = Cn$ ; invento autem  $v$  est primo  $s = s r^{(1+v)}$  et

$$\cos a = \frac{r^{A(n+v)}}{r^{(1+v)}}; \cos b = \frac{r^{B(m-n-v)}}{r^{(1+v)}}; \cos \gamma = \frac{r^{C(n+v)}}{r^{(1+v)}}.$$

Quo haec magis contrahamus sit  $\frac{r^m + r^{(m-n)}}{r^m - r^{(m-n)}} = k$ , unde fit

$$(m-n) = \frac{k-1}{k+1} r^m, \text{ et } r^{(m-n-v)} = \frac{k-T}{k+T} r^m, \text{ hincque porro}$$

$$v = m \left( \frac{k-1}{k+1} \right)^2 - m \left( \frac{k-T}{k+T} \right)^2; \text{ et ob } n = m - m \left( \frac{k-1}{k+1} \right)^2$$

$$= \frac{4mk}{(k+1)^2}, \text{ erit } n+v = m - m \left( \frac{k-T}{k+T} \right)^2 = \frac{4mkT}{(k+T)^2}.$$

Quocirca si pro motu primum impresso fuerit

$$\cos a = \frac{2r^{Amk}}{k+1}; \cos b = \frac{(k-1)r^{Bm}}{k+1}; \cos c = \frac{2r^{Cmk}}{k+1}$$

et

et celeritas angularis =  $s$  in sensum ABC, erit elapso tempore  $t$ , positoque  $e^{2st} r^m = T$ , primo celeritas angularis  $u = s r (1 + m \left(\frac{k-1}{k+1}\right)^2 - m \left(\frac{k-T}{k+T}\right)^2) r$  deinde vero pro loco poli gyrationis  $\Theta$

$$\cos \alpha = \frac{2srAmkT}{s(k+T)}; \cos \zeta = \frac{s(k-T)rBm}{s(k+T)}; \cos \gamma = \frac{2srCmkT}{s(k+T)},$$

tum vero est  $d\vartheta = 2sdt \cdot \frac{4mkT(k-T)r^m}{(k+T)^3}$ ,

Hinc patet, primo instanti, quo  $T = 1$ , numerum  $v$  a nihilo crescere, donec fiat  $T = k$ , seu  $st r^m = lk$ , hoc est elapso tempore  $t =$

$$\frac{lk}{2sr^m}; \text{quo fit } u = sr \left(1 + m \left(\frac{k-1}{k+1}\right)^2\right), \text{ et celeritas angularis}$$

maxima: simulque erit

$$\cos \alpha = \frac{s}{s} rAm; \cos \zeta = 0, \text{ seu } \zeta = 90^\circ \text{ et } \cos \gamma = \frac{s}{s} rCm$$

ita ut jam polus gyrationis pervenerit in arcum AC, eum mox transgressurus. Postea enim numerus  $v$  iterum minuetur, atque adeo evanescet si  $\frac{T-k}{k+T} = \frac{k-1}{k+1}$ , hoc est si  $T = lk$ , ideoque elapso tempo-

$$\text{re } t = \frac{lk}{sr^m}, \text{ quod illius est duplum, hique fit } u = s; \cos \alpha =$$

$$\frac{2rAmk}{k+1}; \cos \zeta = \frac{-(k-1)rBm}{k+1}; \cos \gamma = \frac{2rCmk}{k+1}. \text{ Hic scilicet}$$

ultra quadrantem AC similem situm habebit respectu poli ipsi B oppositi, ad quem continuo propius accedet, eumque adeo elapso tempore infinito attinget; posito enim  $t = \infty$  quo fit  $T = \infty$ , erit  $u = sr \left(1 - \frac{4mk}{(k+1)^2}\right)$ , hique propterea celeritas angularis minima: tum

Qq 2

vero

vero erit  $\cos \alpha = 0$ ,  $\cos \zeta = -\frac{1}{2} r B m$  et  $\cos \gamma = 0$ . At ob  $1-n =$   
 $1 - \frac{4mk}{(k+1)^2} = Bm$ , evidens est esse  $\cos \zeta = -\frac{1}{2} L$ .

## C O R O L L. 1.

748. Numerum  $n$  ita assumi oportet, ut  $An$  et  $Cn$  sint unitate minores; quo accepto erit  $m = \frac{1-n}{B}$ , et  $k = \frac{r m + r(m-n)}{r m - r(m-n)}$ . Inter numeros autem  $m$  et  $k$  haec relatio intercedit, ut sit  $m = \frac{(k+1)^2}{4k+B(k+1)^2}$ , unde fit  $n = \frac{4k}{4k+B(k+1)^2}$  et  $\cos \zeta = \frac{(k-1)rB}{r(4k+B(k+1)^2)}$ , quae semper est unitate minor ob  $k > 1$ .

## C O R O L L. 2.

749. Eandem rationem inter cosinus arcuum  $\alpha$  et  $\zeta$  constitutam constanter servant cosinus arcuum  $\alpha$  et  $\gamma$ : et dum polus  $O$  per quadrantem  $AC$  transfit, ubi fit  $\zeta = 90^\circ$  est  $\cos \alpha = \frac{1}{2} \frac{(k+1)rA}{r(4k+B(k+1)^2)}$   
 at  $\gamma = r \left( 1 + \frac{(k-1)^2}{4k+B(k+1)^2} \right) = \frac{r(k-1)r(1+B)}{r(4k+B(k+1)^2)}$ , ergo  $\cos \alpha =$   
 $r \frac{A}{1+B}$  et  $\cos \gamma = r \frac{C}{1+B}$ , seu  $\cos \alpha = \frac{cr(bb-cc)}{r(aa-cc)(aa-bb+cc)}$   
 et  $\cos \gamma = \frac{ar(aa-bb)}{r(aa-cc)(aa-bb+cc)}$ .

## C O R O L L. 3.

750. Dum autem axis gyrationis  $O$  per quadrantem  $AC$  transfit, ejus respectu est momentum inertiae  $M(aa \cos^2 \alpha + bb \cos^2 \zeta + cc \cos^2 \gamma)$   
 $= \frac{Maacc}{aa-bb+cc}$ , quod minus est quam  $Mbb$ ; atque etiam minus quam fuerat motus initio, ubi erat  $= Mbb$ . Bm ob  $Aaa + Ccc = Bbb$ . Ergo  
 ergo  $= Mbb \cdot \frac{B(k+1)^2}{4k+B(k+1)^2} = \frac{Maabbbcc(k+1)^2}{4kbb(aa-bb+cc)+aacc(k-1)^2}$ .

EXEM-

## EXEMPLUM.

751, Coeperit corpus initio gyrari circa polum E in quadrante AC Fig. 95.  
 fitum, in sensum ABC celeritate angulari =  $s$ , ita ut fuerit  $\cos AE =$

$r \frac{A}{B+1}$  et  $\cos CE = r \frac{C}{B+1}$ , posito brevitatis gratia

$$A = \frac{bbcc}{(aa-bb)(aa-cc)}; B = \frac{aacc}{(aa-bb)(bb-cc)}; C = \frac{aabb}{(aa-cc)(bb-cc)}$$

hincque  $A + C = B + 1$ ; ad quem casum solutio generalis deducitur  
 sumendo  $k = 1$  et  $m = \frac{1}{B+1}$ . Iam labente tempore polus gyrationis  
 ex E in alterum quadrantem AbC transibit, existente  $b$  polo ipsi B op-  
 posito: atque elapso tempore =  $t$  min. sec. si capiatur  $T = e^{2st} : r(1+B)$ ,  
 polus gyrationis reperiatur in O, ut fit

$$\cos AO = \frac{2rAT}{r(B(1+T)^2 + 4T)}, \text{ et } \cos CO = \frac{2rCT}{r(B(1+T)^2 + 4T)}$$

ibique celeritas angularis erit =  $\frac{r(B(1+T)^2 + 4T)}{(1+T)r(1+B)}$ .

Cum ergo fit

$$\sin AO = \frac{r(B(T-1)^2 + 4CT)}{r(B(1+T)^2 + 4T)} \text{ et } \sin CO = \frac{r(B(T-1)^2 + 4AT)}{r(B(1+T)^2 + 4T)}$$

$$\text{erit } \cos ACO = \frac{2rAT}{r(B(T-1)^2 + 4AT)} \text{ et } \sin ACO = \frac{(T-1)rB}{r(B(T-1)^2 + 4AT)}$$

$$\text{atque } \cos CAO = \frac{2rCT}{r(B(T-1)^2 + 4CT)} \text{ et } \sin CAO = \frac{(T-1)rB}{r(B(T-1)^2 + 4CT)}$$

$$\text{Porro est } \cos bO = \frac{(T-1)rB}{r(B(1+T)^2 + 4T)} \text{ et } \sin bO = \frac{2r(B+1)T}{r(B(1+T)^2 + 4T)}$$

$$\text{ideoque } \cos AbO = r \frac{A}{B+1} \text{ et } \cos CbO = r \frac{C}{B+1}. \text{ Cum ergo sit } AbO$$

= AE et CbO = CE, polus gyrationis O ab E ad  $b$  per circulum ma-  
 ximum transfertur, atque dato tempore  $t$  percurrit arcum EO ut fit

$$\tan EO = \frac{(T-1)rB}{2r(B+1)T} \text{ Posito, ergo hoc arcu confecto } EO = \theta,$$

$$\text{ob } \tan \theta = \frac{(T-1)rB}{2r(B+1)T}, \text{ fit } rT = \frac{\sin \theta r(B+1) + r(B + \sin^2 \theta)}{\cos \theta rB}$$

unde ipsum tempus  $t$ , quo arcus EO =  $\theta$  absolvitur, erit

Qq 3.

$t =$



$$z = \frac{r(B+1)}{e} \cdot \frac{\sin \theta \cdot r(B+1) + r(B+\sin^2 \theta)}{\cos \theta \cdot r B}$$

et celeritas angularis, dum polus gyrationis est in O, reperitur =

$$\frac{e r B}{r(B+\sin^2 \theta)} \cdot \text{Momentum inertiae respectu axis IE est} = \frac{M(Aaa+Ccc)}{B+1}$$

$$= \frac{B}{B+1} \cdot Mbb, \text{ et vis viva} = \frac{B e e}{B+1} \cdot Mbb, \text{ quae perpetuo manet eadem.}$$

### SCHOLION.

752. Si initio motus gyratorius fuerit in sensum contrarium directus, polus gyrationis ex E per circulum maximum ad polum B accederet, scilicet in quadrante AbC poli cognomines contrarium sensum praebent, atque in quadrante ABC. Ceterum hoc casu notatu dignum est, quod polus gyrationis O ad alterutrum polorum B vel b continuo propius accedat, atque adeo satis cito attingat: statim enim ac nume-

rus  $T = e^{2st} \cdot r(i+B)$  mediocriter fit magnus, quod plerumque mox evenire solet, declinatio axis gyrationis IO ab axe Bb non amplius erit sensibilis. Hic ergo circulus maximus BEb, qui quadrantein AC ita

secat in E, ut  $\sin AE = r \frac{C}{B+1}$  et  $\cos AE = r \frac{A}{B+1}$  seu  $\tan AE = r$

$\frac{C}{A} = \frac{a r (aa-bb)}{c r (bb-cc)}$ , hac insigni praeditus est proprietate, ut si axis gyrationis semel in eo fuerit, in eo perseveret, ac polus gyrationis sive ad b sive ad B accedat, prout gyratio fiat vel in sensum ABC vel in contrarium. Videri hinc posset, axem gyrationis, quicumque initio fuerit, semper tandem in aliquem principalium incidere, nisi in capite praecedente res secus evenisset. Atque adeo jam demonstrabo, hunc casum tractatum solum esse, quo axis gyrationis tandem cum aliquo principalium eoque medio coalescat, in reliquis vero omnibus hoc nunquam, ne elapso quidem tempore infinito, usu venire: ad hoc autem necesse est, ut formulam superiorem integram diligentius scrutemur, valoresque, quos ad quodvis tempus recipit, quodammodo assignare valeamus. In quo negotio, cum alia subsidia analytica vix plus luminis polliceantur, quam ejus reductio ad arcus sectionum conicarum, ad subsidium quoddam mechanicum confugiamus, motum scilicet penduli per circulum; quandoquidem hujus motus determinatio simili formula integrali

# CORPORUM RIGIDORUM TERNIS AXIBUS &c. 311

integrali continetur, hoc tamen non obstante, qualis hic motus sit futurus, quodammodo aestimare licet.

## PROBLEMA 79.

753. Concessa motus determinatione, quo corpus grave super peripheria circuli vel oscillando vel revolvendo movetur, ad quodvis tempus determinare positionem axis gyrationis respectu axium principalium, si quidem initio datus fuerit axis gyrationis cum celeritate angulari.

## SOLUTIO.

Cum tempus determinandum sit  $t = \int \frac{dv \sqrt{ABC}}{2\sqrt{(a+Av)(b-Bv)(c+Cv)}}$

Fig. 96.

scribendo tantisper litteras  $a, b, c$  pro  $\cos a^2, \cos b^2, \cos c^2$ , consideremus in genere motum gravis per circulum, cujus radius sit  $ca = cb = r$ , ubique celeritas tanta sit, ac si corpus ex puncto  $g$  eo esset delapsum. Ponatur ergo  $cg = p$ , tum vero initium motus capiatur in  $e$ , ut sit  $cd = q$ , existente scilicet recta  $gab$  vertigali et  $de$  horizontali. Elapso jam tempore  $t$  grave ex  $e$  perveniat in  $z$ , ut ducta horizontali  $vz$ , sit  $dv = kv$ , liquidem in nostra formula  $v$  est numerus absolutus. Sit tantisper  $cv = z$ , erit elementum arcus in  $z = \frac{rdz}{r(r-z)}$ , et quia celeritas in  $z$  est  $= 2\sqrt{g(p+z)}$ , fiet elementum temporis  $dt = \frac{rdz}{2\sqrt{g(p+z)(r-z)(r+z)}}$ . Ergo ob  $z = kv - q$  habebitur

$$dt = \frac{kr dv}{2\sqrt{g(p-q+kv)(r+q-kv)(r-q+kv)}}$$

nostra autem formula construenda simili modo expressa est:

$$dt = \frac{kdv \sqrt{k}}{2\sqrt{g \left(\frac{ak}{A} + kv\right) \left(\frac{bk}{B} - kv\right) \left(\frac{ck}{C} + kv\right)}}$$

ad quam illa perducitur ponendo primum  $\frac{kr}{2\sqrt{g}} = \frac{k\sqrt{k}}{2g}$ , unde fit  $r = \frac{\sqrt{gk}}{g}$ . Deinde in denominatoribus factores medii aequati praebent

$$r + q = \frac{bk}{B}, \text{ hincque } q = \frac{bk}{B} - \frac{\sqrt{gk}}{g}.$$

Porro factores primi ac tertii

tertii promiscue aequari possunt : si primus primo ac tertius tertio aequalis statuatur, fit

$$p - q = \frac{ak}{A} \text{ et } p = \frac{ak}{A} + \frac{bk}{B} - \frac{r g k}{s}$$

$$r - q = \frac{ck}{C}, \text{ seu } \frac{2r g k}{s} - \frac{bk}{B} = \frac{ck}{C} \text{ vel } \frac{2r g}{s} = \frac{(Bc + Cb)r k}{BC}$$

$$\text{unde fit } r k = \frac{2BCr g}{s(Bc + Cb)} \text{ et } k = \frac{4BBCCg}{ss(Bc + Cb)^2}. \text{ Hinc porro } r = \frac{2BCg}{ss(Bc + Cb)}, q = \frac{2BC(Cb - Bc)g}{ss(Bc + Cb)^2}; p = \frac{4BBCCag + 2ABC(Cb - Bc)g}{A ss(Bc + Cb)^2}.$$

Ad datum ergo tempus  $t$  sequenti modo numerus  $v$  definitur : descripto circulo cujus radius  $ca = cb = \frac{2BCg}{ss(Bc \cos^2 c^2 + C \cos^2 b^2)}$  corpus gra-

ve per ejus peripheriam ita moveatur, ac si ex puncto  $g$  eo esset delapsum, existente  $cg = \frac{4BBCC \cos a^2 + 2ABC(C \cos b^2 - B \cos c^2)}{A ss(B \cos^2 c^2 + C \cos^2 b^2)} g$

$$\text{seu } bg = \frac{4BCC(A \cos b^2 + B \cos a^2)}{A ss(B \cos^2 c^2 + C \cos^2 b^2)} g \text{ et } ag = \frac{4BCC(C \cos a^2 - A \cos c^2)}{A ss(B \cos^2 c^2 + C \cos^2 b^2)} g$$

$$\text{Tum in hoc circulo capiatur intervallum } cd = \frac{2BC(C \cos b^2 - B \cos c^2)}{ss(B \cos^2 c^2 + C \cos^2 b^2)}$$

$$g \text{ seu } bd = \frac{4BCCg \cos b^2}{ss(B \cos^2 c^2 + C \cos^2 b^2)}, \text{ sumtoque puncto } e \text{ pro motus}$$

initio, unde corpus per  $z$  progrediatur, abscindatur arcus  $ez$  tempore proposito  $t$  percursus, huicque respondens altitudo  $dv$  sit  $= u$ , qua pro

$$\text{cognita assumpta, erit } v = \frac{ss(B \cos^2 c^2 + C \cos^2 b^2) u}{4BBCCg}, \text{ unde deinceps pro su-}$$

perioribus problematibus colligitur celeritas angularis  $\gamma = r(1 + v)$ ,

$$\text{et pro praesente poli gyrationis situ : } \cos a = \frac{r(\cos a^2 + A v)}{r(1 + v)}; \cos c =$$

$$\frac{r \cos b^2 - B v}{r(1 + v)}; \cos \gamma = \frac{r(\cos c^2 + C v)}{r(1 + v)}.$$

COROLL. 1.

$$754. \text{ Cum sit } dg = cg - cd = p - q = \frac{ak}{A}, \text{ erit altitudo pun-}$$

cti

fiti  $g$  supra horizontalem  $de$  nampe  $dg = \frac{4BBCg \cos a^2}{A^2(B \cos c^2 + C \cos b^2)}$ , quas cum sit necessario positiva, corpus motu suo ad punctum  $e$  pertinere potest.

C O R O L L. 2.

755. Tum vero altitudo  $bd$  non solum etiam est positiva, sed etiam minor diametro circuli  $ab = \frac{4BCg}{A^2(B \cos c^2 + C \cos b^2)}$ : erit enim  $ad = \frac{4BBCg \cos c^2}{A^2(B \cos c^2 + C \cos b^2)}$ , unde punctum  $e$ , ex quo motus initium ducimus, semper certo in peripheria circuli reperitur.

C O R O L L. 3.

756. Cum igitur grave certo ex  $e$  ad inum punctum  $b$  descendat, ubi fit  $u = bd = \frac{4BCCg \cos b^2}{A^2(B \cos c^2 + C \cos b^2)}$ , qui ejus est valor maximus positivus, hoc tempore erit  $v = \frac{\cos b^2}{B}$ , et  $s = \frac{r(B + \cos b^2)}{rB}$ , quae est celeritas angularis maxima, fietque tum  $\cos C = 0$ , hoc est, polus gyrationis per quadrantem AC transit.

S C H O L I O N.

757. Cum igitur polus gyrationis, ubicunque initio fuerit, semper post aliquod tempus transeat per quadrantem AC, ubi celeritas angularis est maxima, hoc tempus tanquam motus initium spectare licebit, quandoquidem hinc etiam ad tempora antecedentia regredi valemus. Fuerit igitur initio polus gyrationis in quadrantis puncto E, ut sit AE =  $a$  et CE =  $c = 90^\circ - a$ , atque celeritas angularis =  $s$  in sensum ABC. Postea ergo polus gyrationis in sphaerae octantem AbC transibit, cum ante versatus sit in octante ABC: ubi notandum est, contrarium esse eventurum, si motus gyratorius in sensum contrarium dirigeretur. Hic autem duo casus considerandi occurrunt, prout in motu circulari punctum  $g$  vel supra circulum cadit, graveque integras revolutiones absolvit, vel intra circulum, graveque oscillationes peragit. Prius evenit, si fuerit  $C \cos a^2 > A \cos c^2$ , posterius vero, si  $C \cos a^2 < A \cos c^2$ . Ad hos casus distinguendos capiatur in quadrante AC pun-

Rr

Fig. 97.

sum D, ut sit  $C \cos AD^2 = A \cos CD^2$ , seu  $\beta AD = r \frac{C}{A}$ ; eritque D id punctum, per quod si polus gyrationis transeat, is per quadrantem D $\beta$  polum principalem  $\beta$  versus accedat, eoque tandem elapso tempore infinito pertingat, quem casum jam ante evolvimus. Sin autem polus gyrationis per quadrantem AC intra terminos A et D transeat, habebitur casus prior, quo  $C \cos a^2 > A \cos c^2$ ; at si intra terminos C et D transeat, habebitur casus posterior, quo  $C \cos a^2 < A \cos c^2$ . Hos igitur duos casus seorsim pertractemus.

## C A S U S. I.

Fig. 97. 758. Transeat polus gyrationis per quadrantis AC punctum E, circa quem corpus celeritate angulari  $s$  in sensum ABC gyretur, ut sit  $C \cos AE^2 > A \cos CE^2$  seu  $\tan g AE > r \frac{C}{A}$ ; unde elapso tempore  $t$  progrediatur in O, quem locum definiri oportet. Cum igitur sit  $AE = a$ ,  $CE = c = 90^\circ - a$  et  $b = 90^\circ$ , describatur circulus  $az'ez'$ , cujus radius  $ca = ce' = \frac{2Cg}{ss \cos c^2}$ , et in diametro verticali  $ea$  sursum producto capiatur  $ag = \frac{4C(C \cos a^2 - A \cos c^2)}{ss \cos c^4} g$ , graveque ex hoc puncto  $g$  delapsum per circulum revolvatur, in sensum  $az'ez'$ , initioque, dum polus gyrationis erat in E, grave per punctum inum  $e$  transeat. Iam elapso tempore  $t$  grave ascendat ad  $z$  usque, sitque altitudo  $ev = u$ , eritque  $v = - \frac{ss u \cos c^4}{4CCg}$ . Polus autem gyrationis nunc sit in O, et celeritas angularis circa eum erit  $\omega = sr \left(1 - \frac{ss u \cos c^4}{4CCg}\right)$ , et pro loco puncti O erit

$$\cos AO = \frac{s}{u} r (\cos a^2 - \frac{A s s u \cos c^4}{4CCg}); \cos BO = \frac{s}{u} \frac{ss \cos c^2 r B u}{2Cr g}$$

$$\text{et } \cos CO = \frac{s}{u} r (\cos c^2 - \frac{ss u \cos c^4}{4CCg}).$$

Tum vero ex motu gravis per circulum isochrono motui poli gyrationis,

nis, si ponamus tempus dimidia revolutionis =  $\tau$ , quo grave ex  $e$  ad punctum summum  $a$  ascendit, ob  $u = \frac{4Cg}{\dots}$ , habebimus  $v = -$

$$\frac{\cos^2 c^2}{C}, \text{ et post tempus } \tau \text{ erit celeritas angularis } \omega = \epsilon \tau \left(1 - \frac{\cos^2 c^2}{C}\right),$$

ovinium minima: polus autem gyrationis tum erit in P, ut sit

$$\cos AP = \frac{\epsilon}{\gamma} \tau \left( \cos a^2 - \frac{A \cos c^2}{C} \right); \cos bP = \frac{\epsilon \cos c}{\gamma} \tau \frac{B}{C} \text{ et } \cos CP = 0$$

unde polus P reperietur in quadrante  $Ab$ , ut sit  $\cos bP = \sin AP =$

$$\frac{\cos c \cdot \tau B}{\tau (C - \cos c^2)} = \frac{\sin a \cdot \tau B}{\tau (C - \sin a^2)} \text{ et } \cos AP = \frac{\tau (C \cos a^2 - A \sin a^2)}{\tau (C - \sin a^2)}.$$

Elapso autem tempore  $2\tau$ , quo fit  $u = 0$ , celeritas angularis  $\omega$  fit ut initio =  $\epsilon$ , et polus gyrationis jam reperietur in quadrantis CA producti puncto  $e$ , ut sit  $Ae = AE$ . Elapso tempore  $3\tau$  perveniet polus gyrationis in  $p$ , ut sit  $Ap = AP$  ac tempore  $4\tau$  elapso revertetur in E. Polus ergo gyrationis circa polum principalem A orbitam quasi ellipticam describet, et tempus unius revolutionis aequale erit tempori, quo grave in circulo duas integras absolvit revolutiones. Hic notari convenit, si punctum E in D incideret, punctum P in  $b$  esse casurum ob  $\cos AP = 0$ , tum autem foret  $ag = 0$ , et tempus semirevolutionis in circulo  $\tau$  fieret infinitum, quemadmodum jam supra habuimus. Porro autem fit  $AP = AE$ , si  $B = \infty$ , et  $C = \infty$  seu  $bb = cc$ , hoc est, si momenta inertiae respectu axium IB et IC sunt aequalia, qui est casus capite praecedente pertractatus.

## C A S U S. II.

759. Transeat polus gyrationis per quadrantis AC punctum E, circa quem tum corpus celeritate angulari  $\epsilon$  in sensum ABC gyretur, ut Fig. 98.

fit  $C \cos AE^2 < A \cos CE^2$  seu  $\tan AE > \tau \frac{C}{A}$ , unde elapso tempore  $t$  progrediatur in O. Cum igitur sit  $b = 90^\circ$ ,  $AE = a$  et  $CE = 90^\circ - a = c$ , describatur circulus  $axex'$  diametro  $ax = \frac{4Cg}{\dots}$ , et ca-

$$\text{piatur } ag = \frac{4C(A \cos c^2 - C \cos a^2)}{A \sin c^4} g, \text{ ut sit } eg = \frac{4C \cos a^2}{A \sin c^4} g. \text{ Ducta}$$

igitur horizontali  $fgf'$ , grave peragat oscillationes per arcum  $fef'$ , sumaturque temporis punctum, quo grave ex  $f'$  descendens transit per inum punctum  $e$ , pro temporis initio, unde elapso tempore  $t$  perveniat

Rr 2

in

in  $z$ , et posita altitudine  $ev = u$ , erit  $v = \frac{-\frac{1}{2} u \cos c^4}{4 C C g}$ , hocque tempore celeritas angularis circa polum  $O$  erit  $\omega = \frac{1}{r} (1 - \frac{\frac{1}{2} u \cos c^4}{4 C C g})$ , et ut ante

$$\cos AO = \frac{1}{r} (1 - \frac{\frac{1}{2} u \cos c^4}{4 C C g}) ; \cos bO = \frac{1}{r}.$$

$$\frac{\frac{1}{2} \cos^2 c^2 r B u}{2 C r g}$$

et  $\cos CO = \frac{1}{r} (1 - \frac{\frac{1}{2} u \cos c^4}{4 C C g})$ . Sit  $\tau$  tempus dimidia oscillationis seu ascensus per  $cf$ , atque hoc tempore elapso, ob  $u = eg = \frac{4 C C \cos a^2}{g}$  et  $v = \frac{-\cos a^2}{A}$ , erit celeritas angularis  $\omega = \frac{1}{r} (1 - \frac{\frac{1}{2} \cos^2 c^2}{A})$ , polusque gyrationis reperitur in  $P$ , ut sit

$$\cos AP = \frac{1}{r} \cdot 0 ; \cos bP = \frac{\frac{1}{2} \cos a^2 r B}{r A} = \frac{\cos a^2 r B}{r (A - \cos a^2)} \text{ et}$$

$$\cos CP = \frac{1}{r} (1 - \frac{C \cos a^2}{A}) = \frac{r (A \cos c^2 - C \cos a^2)}{r (A - \cos a^2)}$$

unde patet polum gyrationis esse in quadrante  $Cb$ , existente  $\beta$   $CP = \frac{\cos a^2 r B}{r (A - \cos a^2)} = \frac{\beta r B}{r (A - \beta^2 c^2)}$ . Capiatur nunc in quadrante  $AC$  productio  $Ce = CE$  et  $Cp = CP$ , eritque orbis ellipticus  $EP$   $ep$   $E$  via poli gyrationis, cujus singuli quadrantes  $EP$ ,  $Pe$ ,  $ep$ ,  $pE$ , &c. tempore  $\tau$  absolvuntur.

Si esset  $aa = bb$ , foret  $A = \infty$ ,  $B = \infty$  et  $CP = CE$ , polusque gyrationis circulum minorem circa axem principalem  $IC$ , qui esset singularis, describeret; qui est casus capite praecedente tractatus. At si  $E$  in  $D$  caderet, ob  $ag = 0$ , foret  $\tau = \infty$ , qui est casus problematis praecedentis.

#### SCHOLIUM.

760. Cum igitur satis clare intelligamus, quomodo variatio in polo gyrationis eveniat, cum is vel circa polum principalem  $A$  vel circa  $C$  circumferatur, in orbita quasi elliptica, prout fuerit vel  $\text{sang } AE >$

$r \frac{C}{A}$  vel  $\tan g AE > r \frac{C}{A}$ , atque adeo ejus locum ad quodvis tempus concessa integratione formulae differentialis assignare liceat; videamus, num etiam ejus locum absolutum ad quodvis tempus simulque positionem axium principalium definire valeamus. Equidem non sine successu hoc negotium in superiore capite expeditimus. Verum hic multo majores difficultates offendemus, quas ne concessis quidem quadraturis superare poterimus, cum res ad ejusmodi aequationes differentiales reducatur, quae non solum non integrari, sed ne ad separabilitatem quidem variabilium revocari queant.

P R O B L E M A. 80.

761. Si corpori rigido cuicunque initio impressus fuerit motus gyriorius circa axem per centrum inertiae transeuntem quemcunque, ad datum tempus tam situm axium principalium quam axis gyrationis respectu spatii absoluti definire. Fig. 89.

S O L U T I O.

In sphaera immobili centro inertiae corporis descripta, post tempus  $= t$  corpus nunc situm teneat, ut axium principalium poli sint in A, B; C, eorumque respectu momenta inertiae  $Maa$ ,  $Mbb$ ,  $Mcc$ . Tum sumto puncto Z et circulo XZ fixo, statuantur arcus  $ZA = l$ ,  $ZB = m$ ,  $ZC = n$ , atque anguli  $XZA = \lambda$ ,  $XZB = \mu$ ,  $XZC = \nu$ : manentibus pro polo gyrationis O arcubus  $OA = \alpha$ ,  $OB = \zeta$ ,  $OC = \gamma$ , qui cum celeritate angulari  $\alpha$  nunc per tempus  $t$  dantur. His positis ex probl. 68. nanciscimur:

$$dl \sin l = \alpha dt (\cos \zeta \cos n - \cos \gamma \cos m); \quad d\lambda \sin l^2 = - \alpha dt (\cos \zeta \cos m + \cos \gamma \cos n)$$

$$dm \sin m = \alpha dt (\cos \gamma \cos l - \cos \alpha \cos n); \quad d\mu \sin m^2 = - \alpha dt (\cos \gamma \cos n + \cos \alpha \cos l)$$

$$dn \sin n = \alpha dt (\cos \alpha \cos m - \cos \zeta \cos l); \quad d\nu \sin n^2 = - \alpha dt (\cos \alpha \cos l + \cos \zeta \cos m).$$

Praecipuum autem opus hic in investigatione arcuum  $l$ ,  $m$ ,  $n$  consistit, qui cum ita sint comparati, ut sit  $\cos l^2 + \cos m^2 + \cos n^2 = 1$ , ponatur:  $\cos m = \sin l \cos \Phi$  erit  $\cos n = \sin l \sin \Phi$ , eruntque tres aequationes:

I.  $dl = \alpha dt (\cos \zeta \sin \Phi - \cos \gamma \cos \Phi)$

II.  $-dl \cos l \cos \Phi + d\Phi \sin l \sin \Phi = \alpha dt (\cos \gamma \cos l - \cos \alpha \sin l \sin \Phi)$

III.  $-dl \cos l \sin \Phi - d\Phi \sin l \cos \Phi = \alpha dt (\cos \alpha \sin l \cos \Phi - \cos \zeta \cos l)$

unde II.  $\sin \Phi -$  III.  $\cos \Phi$  praebet:

Rr 3

$d\Phi$



$d\phi \sin l = v dt (\cos \gamma \cos l \sin \phi - \cos \alpha \sin l + \cos \epsilon \cos l \cos \phi)$   
 ex qua cum prima conjuncta binos arcus  $l$  et  $\phi$  quaeri oportet. Posi-  
 to autem  $v = r(1+v)$  et pro statu initiali brevitatis gratia  $\cos \alpha^2 = \mathcal{A}$ ,  
 $\cos b^2 = \mathcal{B}$ ;  $\cos c^2 = \mathcal{C}$ , ut sit  $\mathcal{A} + \mathcal{B} + \mathcal{C} = 1$ , vidimus esse  
 $\cos \alpha = r \frac{\mathcal{A} + Av}{1+v}$ ;  $\cos \epsilon = r \frac{\mathcal{B} - Bv}{1+v}$ ;  $\cos \gamma = r \frac{\mathcal{C} + Cv}{1+v}$

et  $2v dt = \frac{dv r ABC}{r(\mathcal{A} + Av)(\mathcal{B} - Bv)(\mathcal{C} + Cv)}$ , positis

$$\mathcal{A} = \frac{bbcc}{(aa-bb)(aa-cc)}; \quad \mathcal{B} = \frac{aacc}{(aa-bb)(bb-cc)}; \quad \mathcal{C} = \frac{aabb}{(aa-cc)(bb-cc)} \quad \text{et } D = \frac{aacc}{(aa-bb)(aa-cc)(bb-cc)}$$

ubi quidem sumimus esse  $aa > bb$  et  $bb > cc$ .

Ponamus  $\cos \epsilon = \sin \alpha \cos T$  et  $\cos \gamma = \sin \alpha \sin T$ , fietque  $v =$   
 $\mathcal{B} - (1-\mathcal{A})\cos T^2$ . et  $\cos \alpha = r \frac{\mathcal{A}B + \mathcal{B}A + (\mathcal{A} - A)\cos T^2}{\mathcal{B} + B + (\mathcal{A} - A)\cos T^2}$ , ergo

$$\sin \alpha = r \frac{\mathcal{B}C + \mathcal{C}B}{\mathcal{B} + B + (\mathcal{A} - A)\cos T^2} \quad \text{atque } v = r \frac{\mathcal{B} + B + (\mathcal{A} - A)\cos T^2}{B + (1 - A)\cos T^2}$$

tum vero

$$v dt = \frac{D dT}{r(B/T^2 + C\cos T^2)((\mathcal{A}B + \mathcal{B}A)/T^2 + (\mathcal{A}C - \mathcal{C}A)\cos T^2)}$$

Unde nostrae aequationes resolvendae erunt;

$$dl = v dt \sin \alpha \sin (\phi - T)$$

$$d\phi \cos l = v dt \sin \alpha \cos l \cos (\phi - T) - v dt \cos \alpha \sin l$$

ubi est

$$v dt \sin \alpha = \frac{D dT r (\mathcal{B}C + \mathcal{C}B)}{(B/T^2 + C\cos T^2) r ((\mathcal{A}B + \mathcal{B}A)/T^2 + (\mathcal{A}C - \mathcal{C}A)\cos T^2)}$$

$$v dt \cos \alpha = \frac{D dT}{B/T^2 + C\cos T^2}$$

Statuamus nunc  $\phi - T = \omega$ , ut habeatur

$$dl = v dt \sin \alpha \sin \omega \quad \text{et} \quad d\omega \sin l + dT \sin l = v dt \sin \alpha \cos l \cos \omega - v dt \cos \alpha \sin l$$

quarum posterior abit in

$$d\omega \sin l \sin \omega - dl \cos l \cos \omega + dT \sin l \sin \omega + \frac{D dT \sin l \sin \omega}{B/T^2 + C\cos T^2} = 0$$

dum prior est

$dl$

$$dl = \frac{DdT\sin\omega \cdot r(\mathfrak{B}C + \mathfrak{C}B)}{(B\sin T^2 + C\cos T^2)r((\mathfrak{A}B + \mathfrak{B}A)\sin T^2 + (\mathfrak{A}C - \mathfrak{C}A)\cos T^2)}$$

Ponamus brevitatis gratia:

$$1 + \frac{D}{B\sin T^2 + C\cos T^2} = P \text{ et}$$

$$\frac{Dr(\mathfrak{B}C + \mathfrak{C}B)}{(B\sin T^2 + C\cos T^2)r((\mathfrak{A}B + \mathfrak{B}A)\sin T^2 + (\mathfrak{A}C - \mathfrak{C}A)\cos T^2)} = Q$$

quoniam P et Q sunt functiones cognitae ipsius T, nostrae aequationes resolvendae has induunt formas simpliciores.

$$d\sin l \cos \omega = PdT \sin l \sin \omega \text{ et } dl = QdT \sin \omega$$

Ponamus denique  $\sin l \cos \omega = x$ , et  $\cos l = y$ , erit  $\sin l \sin \omega = r$ ,  $(1 - xx - yy)$  et nostrae aequationes erunt

$$\frac{dx}{r(1 - xx - yy)} = PdT \text{ et } \frac{dy}{r(1 - xx - yy)} = -QdT.$$

Verum hic fateri cogor, ulterius me hanc resolutionem profequi non posse; neque ergo hoc problema ad finem perducere licet. \*)

#### SCHOLION. I.

762. Casu praecedentis capitis, quo erat  $B = \infty$  et  $C = \infty$  atque adeo  $\frac{B}{C} = 1$ , ob  $A - B + C = 1$ , aequationes inventas ideo resolvere licuit, quod quantitates P et Q fiebant constantes, scilicet  $P = 1 + \frac{D}{B} = 1 + \frac{bb}{aa - bb} = \frac{aa}{aa - bb}$ , ob  $bb = cc$  et  $Q = \frac{Dr(\mathfrak{B} + \mathfrak{C})}{Br\mathfrak{A}} = \frac{bb r(1 - \mathfrak{A})}{(aa - bb)r\mathfrak{A}}$ , unde  $dx : dy = aa : -bb r \frac{1 - \mathfrak{A}}{\mathfrak{A}} = P : -Q$ . Ergo

$$dx = -\frac{Pdy}{Q} \text{ et } x = \text{Const.} - \frac{Py}{Q}.$$

Verum hic ratio P : Q constans evadere nequit, ideoque non liquet, quomodo aequationibus inventis satisfieri queat, ne quidem particulariter. Quare cum talium corporum motus calculo sit intractabilis, quousque scilicet fines analyticos adhuc patent, hoc argumentum deferre cogimur, cum etiam conatus irritos proposuisse nihil luminis affere queat. Quod autem ad rationem mechanicam attinet, motum corporum rigidorum liberum, dum a nullis viribus sollicitantur, perfecte determinasse censendi sumus, cum

\*) Plena solutio in fine adjicitur.

cum Analyseos defectui sit tribuendum, quod solutionem ad finem perducere non valuerimus. Haec autem difficultas se tantum in corporibus, quorum tria momenta inertiae principalia sunt inter se inaequalia, exerit; quae corpora cum sint pro maxime irregularibus habenda, hoc incommodum, ubi ad praxin descendimus, minus obest, quoniam rarissime ejusmodi corporum motus requiri solet. Quando autem duo momenta principalia sunt inter se aequalia, investigatio motus prospero successu est absoluta, ut nihil desiderari queat.

## SCHOLION. 2.

763. Expositis ergo, quae ad motum corporum rigidorum liberum, remotis viribus externis, pertinent, ordo postulat, ut jam in effectum virium inquiramus, ad quod etiam supra fundamenta sunt jacta, ubi quarumvis virium effectus momentaneos determinavimus. Dum autem motus perennes tractare instituimus, ejusmodi casus eligere debemus, quibus vires sollicitantes non per corporis centrum inertiae transeunt, quales Astronomia offert. Quoniam autem eorum evolutio majorem Astronomiae cognitionem requirit, quam hic supponere licet, in terra subsistamus, atque ejusmodi motus contemplemur, in quibus motus gyratorius circa axem variabilem occurrat; quandoquidem motus magis regulares nihil habent difficultatis. Hic primum se nobis offert Theoria turbinum, cujus explicatio ob continuam axis gyrationis mutationem adhuc maximis tenebris fuit involuta. Quod argumentum ut initio a gravioribus difficultatibus libere, axem turbinis super plano horizontali politissimo incedere assumam, ne frictioni ullus locus relinquatur, tum vero axem infra in cuspidem desinentem statuam, qua super plano horizontali ingrediatur. Duo autem genera turbinum constituam, prout vel omnia ejus momenta inertiae principalia fuerint inter se aequalia, vel duo duntaxat: si enim omnia essent inaequalia, haec hypothesis non solum figurae turbinum adversaretur, sed etiam vires calculi superaret.



## CAPUT XIV.

### DE MOTU TURBINUM SUPER PLANO HORIZONTALI, IN QUIBUS OMNIA MOMENTA INERTIAE SUNT INTER SE AEQUALIA.

#### DEFINITIO. 13.

764. **T**urbo est corpus rigidum hasta inferius acuminata per centrum inertiae trajectum, quae simul cum axe aliquo principali corporis conveniat.

#### EXPLICATIO.

765. Hujusmodi turbo est  $ABbD$ , in quo  $AD$  hastam, et  $Bb$  corpus trajectum refert, ut hasta cum corpore unum corpus rigidum constitutere sit censenda: ubi quidem hasta non solum per totius corporis centrum inertiae  $I$  transit, sed etiam axem principalem corporis exhibet. Hastam quidem infra in  $D$  in cuspidem acutissimam delinere assumo, qua turbo constanter plano horizontali insistat, et super eo incedat; hic enim alios motus non prosequor, nisi quamdiu turbo sola cuspidem  $D$  planum horizontale contingit. Statim enim ac turbo procumbit, ejus motus ad aliud genus est referendus, quod eum turbini non amplius sit proprium, hic non attingo. Id ergo hic assumo, rectam a cuspidem  $D$  per centrum inertiae  $I$  ductam simul esse corporis totius ex hasta et massa  $Bb$  constantis axem principalem, quae sola linea in computum ingreditur, cum praeterea nihil intersit, quomodo hasta cum massa reliqua sit conjuncta. Tum vero in hoc capite totum turbini corpus ita comparatum assumo, ut momenta inertiae respectu ejus axium principalium sint inter se aequalia, ideoque omnes rectae per ejus centrum inertiae  $I$  ductae pro axibus principalibus haberi queant. Planum denique hic laevigatissimum assumo, ut cuspis  $D$  super eo sine ulla frictione incedere possit, ubi etiam mentem ab aeris resistentia, omnibusque motus obsaculis abstraho, ad solam vim gravitatis respiciens.

Tabula  
XIV.  
Fig. 99.

#### SCHOLION.

766. De tali ergo turbine primum observo, si cuspidem suam  $D$  plano horizontali ita insistat, ut recta  $DI$  sit verticalis, eum in hoc situ constanter

Ss

stanter perseverare posse, etiamsi vel minimum inclinatus procidat. Tum vero etiam, quia nulla adest frictio, in hoc situ verticali uniformiter in directum progredi poterit, quamquam experientia nunquam propter frictionem consentiet. Deinde quia recta DIA est axis principalis, si ea fuerit verticalis, corpusque circa eam motum gyrationum quemcunque acceperit, hunc perpetuo uniformem conservabit, manente recta DIA immota ideoque verticali: neque hic gravitas quicquam turbabit in motu, sed tota ad turbine in cuspide D ad planum horizontale apprimendum impendetur. Statim autem atque hic axis AD vel minimum inclinari coeperit, gravitas motum turbabit, turbineque subvertere tendet; ad quem effectum explorandum simul ad vim, qua cuspis D plano horizontali apprimitur, respici oportet. Quamquam autem haec vis est ignota, atque ab omnibus motus circumstantiis pendet, tamen certum est, ejus directionem semper esse verticalem, ab eaque eundem effectum oriri, ac si turbo in puncto D verticaliter sursum a pari vi pelleretur: ipsa vero vis semper tanta esse debet, ut cuspis D perpetuo plano horizontali maneat applicata, ex qua conditione ejus quantitas ad quodvis tempus est elicienda. Sin autem haec vis ut cognita spectetur, motus centri inertiae I turbine, nullo respectu ad ejus motum gyrationum habito, definiri poterit, id quod in sequente problemate expediamus.

## P R O B L E M A 81.

767. Si ad quodvis tempus cognita fuerit pressio cuspidis in planum horizontale, determinare motum centri inertiae turbine.

## S O L U T I O.

Fig. 100.

Ad datum tempus elapsum  $= t$ , teneat axis turbine AID situm quemcunque inclinatum, faciens cum horizontali DF angulum FDA  $= \theta$ : ubi cuspis premit planum horizontale vi  $= P$ : quod idem est, ac si cuspis D sollicitaretur sursum secundum directionem verticalem vi DP  $= P$ ; massa autem idemque pondus totius turbine sit  $= M$ . Iam quia tantum motum centri inertiae I quaerimus, sine ullo respectu ad motum gyrationum habito, ejus motus perinde afficietur, ac si tota turbine massa M in puncto I collecta, eique vires sollicitantes secundum suam quaeque directionem applicatae essent. Habebimus igitur in I massam  $= M$ , sollicitatam a duabus viribus, altera gravitate  $= M$  verticaliter secundum IX deorsum, altera vi  $= P$  verticaliter sursum secundum IQ; ex quibus vis deorsum secundum IX sollicitans exoritur  $= M - P$ . Cum ergo nulla adsit vis horizontaliter

## SUPER PLANO HORIZONTALI, IN QUIBUS &c. 323

liter urgens, nisi centrum inertiae I initio acceperit motum horizontalem, tantum vel sursum vel deorsum in recta verticali XQ feretur: sin autem initio acceperit motum horizontalem, eundem praeterea intemperatum conservabit. Ponamus ergo distantiam DI =  $f$ , erit altitudo IX =  $f \sin \theta$ , unde centri inertiae I celeritas sursum vergens erit

$$= \frac{f d\theta \cos \theta}{dt}, \text{ sumtoque elemento temporis } dt \text{ constante, ob vim solli-}$$

$$\text{citantem deorsum} = M - P, \text{ habebimus } \frac{f(d^2\theta \cos \theta - d\theta^2 \sin \theta)}{dt} =$$

$$\frac{-2g(M-P)dt}{M} \text{ seu } d^2\theta \cos \theta - d\theta^2 \sin \theta = \frac{2g}{f} \left( \frac{P}{M} - 1 \right) dt^2. \text{ Quare si}$$

vis P ad quodvis tempus  $t$  fuerit data, erit integrando:

$$d\theta \cos \theta = \frac{2g}{f} dt \int dt \left( \frac{P}{M} - 1 \right) \text{ et } f\theta = \frac{2g}{f} \int dt \int dt \left( \frac{P}{M} - 1 \right),$$

ubi  $f\theta \sin \theta = 2g \int dt \int dt \left( \frac{P}{M} - 1 \right)$  altitudinem IX centri inertiae et

$$\frac{f d\theta \cos \theta}{dt} = 2g \int dt \left( \frac{P}{M} - 1 \right) \text{ celeritatem ejus sursum directam exprimit.}$$

### COROLL. 1.

768. Si ergo ad quodvis tempus nossemus pressionem P, qua axis turbinis plano horizontali innititur, motum centri inertiae seu ejus locum ad quodvis tempus assignare, indeque inclinationem axis ad horizontem seu angulum FDA =  $\theta$  definire possemus.

### COROLL. 2.

769. Si turbini initio solus motus gyratorius imprimatur, ut centrum inertiae I manserit in quiete per punctum saltem temporis, tum deinceps quomodocunque axis gyrationis varietur, indeque axis turbinis AD inclinetur, centrum inertiae alium motum non recipiet, nisi verticaliter vel sursum vel deorsum directum.

### COROLL. 3.

770. Sin autem turbini simul motus progressivus fuerit impressus, motum horizontalem inde ortum constanter conservabit uniformem, et in directum progredientem, quocum motus prior verticalis erit conjunctus.

## S C H O L I O N.

771. Motus ergo centri inertiae in turbine nulla laborat difficultate, si modo pressio cuspide  $D$  in planum horizontale ad quodvis tempus assignari posset. Verum in hoc ipso summa sita est difficultas, cum ab hac pressione oriatur momentum ad turbine circa quempiam axem convertendum tendens, ex quo nisi turbo jam circa hunc ipsum axem gyretur, axis gyrationis variabitur, unde etiam turbinis inclinatio ad horizontem mutationem patietur. Ista vero inclinationis mutatio convenire debet cum ea, quam pressio  $P$  assumpta producit, atque ex hac convenientia ipsa haec pressio determinari debet, in qua investigatione vis universae Theoriae turbinum est constituenda. Quo igitur facilius ad hunc scopum pertingamus, turbine in situ quocunque inclinato et circa axem per centrum inertiae ductum gyrantem consideremus, atque inquiremus, quantam mutationem tam axis gyrationis, quam celeritas angularis a pressione, qua cuspis plano horizontali insidet, sit passura.

## P R O B L E M A. 82.

772. Dum turbo utcumque gyatur, si detur pressio, qua cuspis plano horizontali innititur, determinare variationem momentaneam, tam in axe gyrationis, quam celeritate angulari productam.

## S O L U T I O.

Fig. 100.

Sit inclinatio turbinis ad horizontem seu angulus  $FDA = \theta$  et pressio in  $D = P$ , qua punctum  $D$  sursum urgetur. Quoniam in corpore omnia momenta inertiae sunt aequalia, haec vis  $DP = P$  tendet turbine, si quiesceret, convertere circa axem per centrum inertiae  $I$  transeuntem et ad planum  $ADF$  normale. Quare posito momento inertiae turbinis circa omnes axes  $= Maa$ , et distantia  $ID = f$ , erit momentum vis  $DP$  respectu illius axis  $= P f \cos \theta$ ; ideoque tempusculo  $dt$  turbo circa illum axem vertetur per angulum elementarem  $d\omega = \frac{P f g dt^2 \cos \theta}{Maa}$ . Cum autem turbo jam habeat motum gyratorium, ite-

rum omnia ad superficiem sphaericam centro inertiae corporis descriptam referamus, in qua sit punctum  $Z$  quali zenith, et  $A$  superior terminus axis turbinis, erit arcus  $ZA = 90^\circ - \theta$ , quem supra vocavimus  $\pm l$ ; nunc autem ejusmodi teneat situm turbo, ut alii bini axes in eo fixi et ad  $AID$  normales sint in  $B$  et  $D$ . Etsi enim hic omnium axium par est ratio, tamen in corpore ternos axes inter se normales concipi

con-

# SUPER PLANO HORIZONTALI, IN QUIBUS &c. 325

convenit, ut ex iis situs turbinis definiatur. Erunt ergo AB, AC, BC quadrantes, ponaturque angulus  $ZAB = \zeta$ ; tum vero turbo jam gyretur circa axem IO celeritate angulari  $= \varkappa$  in sensum ABC, vocentur-

que arcus  $AO = a$ ,  $BO = b$  et  $CO = \gamma$ , ut sit  $\cos BAO = \frac{\cos b}{\sin a}$

et  $\sin BAO = \frac{\cos \gamma}{\sin a}$ . Ducatur nunc quadrans AS ad arcum ZA normalis, erit IS axis ille ad planum verticale, In quo axis turbinis AID versatur, normalis, circa quem a vi P generatur conversio per angulum

$Pfgdt = \cos \theta$

$d\omega = \frac{Pfgdt}{Ma a}$  in sensum BAC illi sensui ABC contrarium: quae mutatio nisi accederet, turbo circa axem IO, quia principalis proprietate gaudet, gyrationi pergeret. Ob illam igitur viam jam gyrationi incipiet circa polum o in arcu OS ultra O situm. Quare si in figura hoc punctum o versus S notetur, posito arcu  $OS = s$ , et secundum problema

62. statuatur  $q = \frac{Pfg \cos \theta}{Ma a}$ , colligetur inde arculus  $Oo = \frac{-2qdt \sin s}{\varkappa}$

$= \frac{-2Pfgdt \cos \theta \sin s}{Ma a \varkappa}$ , et celeritas angularis  $\varkappa$  decrementum capiet =

$2qdt \cos s = \frac{2Pfgdt \cos \theta \cos s}{Ma a}$ , ut sit  $d\varkappa = \frac{-2Pfgdt \cos \theta \cos s}{Ma a}$ . Ad mutationem autem poli gyrationis O in o factam commodius exprimendam, cum sit angulus  $ZAB = \zeta$ , erit angulus  $BAS = 90^\circ - \zeta$ , deinde vocetur

angulus  $BAO = \eta$ , ut sit  $\cos \eta = \frac{\cos b}{\sin a}$  et  $\sin \eta = \frac{\cos \gamma}{\sin a}$ , in triangulo

OAS habemus  $AO = a$ ,  $AS = 90^\circ$  et  $OAS = 90^\circ - \zeta - \eta$ : unde reperitur  $\cos OS = \cos s = \sin(\zeta + \eta) \sin a$ , et producto arcu AO in p, eo-

que ex o demisso perpendicularo op,  $\cot o Op = \frac{\sin(\zeta + \eta) \cos a}{\cos(\zeta + \eta)}$ . Cum

nunc sit  $Oo = \frac{-2Pfgdt \cos \theta \sin s}{Ma a \varkappa}$

erit  $Op = d\omega = \frac{-2Pfgdt \cos \theta}{Ma a \varkappa} \sin s \cos o Op$



$$\text{et } op = \frac{-2Pfgdt \cos \theta}{Maax}, \text{ si } s \text{ fi } o \text{ Op} = d\eta \text{ fi } a.$$

At est  $fi \text{ s } fi \text{ o } Op = \cos(\zeta + \eta)$  et  $fi \text{ s } cos \text{ o } Op = fi \text{ s } fi \text{ o } Op \cos \text{ o } Op = fi(\zeta + \eta) \cos a$ . Ex his ergo reperitur:

$$dx = \frac{-2Pfgdt \cos \theta}{Maax}, \text{ si } a \text{ fi } (\zeta + \eta)$$

$$da = \frac{-2Pfgdt \cos \theta}{Maax}, \cos a \sin(\zeta + \eta) \text{ et } d\eta = \frac{-2Pfgdt \cos \theta}{Maax} \frac{\cos(\zeta + \eta)}{fi a},$$

sicque tam variatio axis gyrationis in turbine, quam celeritatis angularis  $x$  est definita,

## C O R O L L. 1.

$$773. \text{ Est ergo } dx : da = fi a : \frac{\cos a}{x}, \text{ unde fit } \frac{dx}{x} = \frac{da fi a}{\cos a} \text{ et}$$

integrando  $x = \frac{a \cos a}{\cos a}$ , si quidem initio fuerit celeritas angularis  $= s$ , et arcus  $AO = a$ , qui nunc est  $= a$ . Sicque ex dato axe gyrationis  $O$  statim innotescit celeritas turbine angularis  $x$ .

## C O R O L L. 2.

774. Quo magis ergo axis gyrationis  $O$  ab axe turbine  $A$  recedit, eo major fit celeritas angularis  $x$ , eaque adeo in infinitum augetur, si axis gyrationis  $IO$  usque ad angulum rectum ab axe turbine  $IA$  digrederetur.

## P R O B L E M A. 83.

775. Si detur ad aliquod tempus inclinatio turbine ad horizontem, et axis gyrationis cum celeritate angulari, determinare mutationem momentaneam in situ turbine ortam.

## S O L U T I O.

Sumto sphaerae immobilis centro inertiae turbine descriptae puncto summo  $Z$  quasi zenith, constituatur etiam primus quasi meridianus  $ZX$ : et nunc quidem versetur axis turbine in  $A$ , pro quo dicatur arcus

# SUPER PLANO HORIZONTALI, IN QUIBUS &c. 327

cus  $ZA = 90^\circ - \theta = l$ , et angulus  $XZA = \lambda$ , tum vero reliqui bini axes principales sint in B et C, ponaturque angulus  $ZAB = \zeta$ . Nunc autem turbo gyretur circa polum O, ut sit  $BAO = \eta$ : et  $AO = a$ ; celeritasque angularis  $= \varpi$  in sensum ABC. His positis, si secundum probl. 68. vocemus arcus  $OB = \zeta$ ,  $OC = \gamma$ ;  $ZB = m$ ,  $ZC = n$ , habebimus pro variatione situs:

$$\begin{aligned} dl \text{ si } l &= \varpi dt (\cos \zeta \cos n - \cos \gamma \cos m) \\ dm \text{ si } m &= \varpi dt (\cos \gamma \cos l - \cos a \cos n) \\ dn \text{ si } n &= \varpi dt (\cos a \cos m - \cos \zeta \cos l) \\ \text{et } -d\lambda \text{ si } l^2 &= \varpi dt (\cos \zeta \cos m + \cos \gamma \cos n). \end{aligned}$$

Iam vero est  $l = 90^\circ - \theta$ , ideoque  $\cos l = \text{si } \theta$   
 $\cos \zeta = \text{si } a \cos \eta$ ;  $\cos \gamma = \text{si } a \text{ si } \eta$  atque  
 $\cos m = \cos \zeta \cos \theta$ ; et  $\cos n = -\text{si } \zeta \cos \theta$ , unde concluditur  
 $-d\theta \cos \theta = \varpi dt (-\text{si } a \cos \eta \text{ si } \zeta \cos \theta - \text{si } a \text{ si } \eta \cos \zeta \cos \theta)$

seu  $d\theta = \varpi dt \text{ si } a \text{ si } (\zeta + \eta)$ ;  
 $d\zeta \text{ si } \zeta \cos \theta + d\theta \cos \zeta \text{ si } \theta = \varpi dt (\text{si } a \text{ si } \eta \text{ si } \theta + \cos a \text{ si } \zeta \cos \theta)$   
 $+ d\zeta \cos \zeta \cos \theta - d\theta \text{ si } \zeta \text{ si } \theta = \varpi dt (\cos a \cos \zeta \cos \theta - \text{si } a \cos \eta \text{ si } \theta)$

seu  $d\zeta \cos \theta = \varpi dt (-\text{si } a \text{ si } \theta \cos (\zeta + \eta) + \cos a \cos \theta)$

ac denique  $d\lambda = - \frac{\varpi dt \text{ si } a \cos (\zeta + \eta)}{\cos \theta}$ .

Variatio ergo momentanea in situ turbine his continetur formulis differentialibus:

$$\begin{aligned} d\theta &= \varpi dt \text{ si } a \text{ si } (\zeta + \eta) \\ d\zeta &= \varpi dt (\cos a - \text{si } a \tan \theta \cos (\zeta + \eta)) \\ d\lambda &= - \frac{\varpi dt \text{ si } a \cos (\zeta + \eta)}{\cos \theta}. \end{aligned}$$

## SCHOLION.

776. Has duplicis generis variationes momentaneas evolvi necesse erat, antequam solutionem problematis, quo argumentum hujus capituli continetur, suscipere liceret. Nunc igitur his variationibus momentaneis definitis, in motum turbine, qualem quidem hoc capite consideramus, postquam ipsi motus quicunque fuerit impressus, inquiremus.

## PROBLEMA. 84.

777. Postquam turbine in data axis sui inclinatione motus gyriorius circa hunc axem fuerit impressus, determinare motus hujus continuationis.

tinuationem, hoc est, ad quodvis tempus tam situm quam motum turbinis.

## SOLUTIO.

Fig. 101. Habuerit initio axis turbinis ad horizontem inclinationem  $\delta$ , circa quem acceperit motum gyrationum celeritate angulari  $= \omega$  in sensum ABC. Sumamus autem initio axem turbinis A in ipso meridiano ZX fuisse, in eumque simul arcum AB ad turbine pertinentem incidisse. Pro ipso turbine sit ejus massa  $= M$ , momentum inertiae respectu omnium axium per ejus centrum inertiae transeuntium  $= Maa$ , et in axe turbinis distantia imae cuspidis a centro inertiae  $ID = f$ . Nunc elapso tempore  $= t$ , mentem a motu centri inertiae abstrahendo, pervenerit axis turbinis in A, ut sit angulus XZA  $= \lambda$ , ejusque inclinatio ad horizontem  $\theta$  seu arcus ZA  $= 90^\circ - \theta$ , ita ut initio fuerit  $\lambda = 0$  et  $\theta = \delta$ , tum vero arcus AB cum turbine mobilis jam cum ZA faciat angulum ZAB  $= \zeta$ , ita ut initio fuerit  $\zeta = 0$ . Porro gyretur nunc turbo circa polum O celeritate angulari  $= \omega$  etiamnum in sensum ABC, ponaturque arcus AO  $= \alpha$  et angulus BAO  $= \eta$ , ita ut initio fuerit  $\alpha = 0$ , quia turbo circa ipsum axem AID gyrationi coepit, angulus autem  $\eta$  initio erat indefinitus. Quodsi jam hoc instanti pressio cuspidis in planum horizontale ponatur  $= P$ , praecedentia problemata suppeditant sequentes aequationes:

$$\text{I. } \frac{P}{M} = 1 + \frac{f(d\delta\theta\cos\theta - d\theta^2\sin\theta)}{2gdt^2}$$

$$\text{II. } \frac{a}{\cos\alpha} = \frac{a}{\cos\alpha} \text{ ob } a = 0$$

$$\text{III. } d\alpha = \frac{-2Pfgdt\cos\theta}{Maa\omega} \cos\alpha \sin(\zeta + \eta)$$

$$\text{IV. } d\eta = \frac{-2Pfgdt\cos\theta}{Maa\omega} \cdot \frac{\cos(\zeta + \eta)}{\sin\alpha}$$

$$\text{V. } d\theta = \omega dt \sin\alpha \sin(\zeta + \eta)$$

$$\text{VI. } d\zeta = \omega dt (\cos\alpha - \sin\alpha \tan\theta \cos(\zeta + \eta))$$

$$\text{VII. } d\lambda = \frac{-\omega dt \sin\alpha \cos(\zeta + \eta)}{\cos\theta}$$

ad

# SUPER PLANO HORIZONTALI, IN QUIBUS &c. 329

ad quarum aequationum resolutionem omnes vires intendere debemus. Quo igitur multitudinem variarum restringamus, ex aequationibus III. et IV. eliminando P colligimus

$$\frac{da \cos(\zeta + \eta)}{\sin a \cos a} = d\eta \sin(\zeta + \eta);$$

tum V et VI eliminando  $\delta$  praebent

$$\frac{d\theta \cos a}{\sin a} - d\theta \tan \theta \cos(\zeta + \eta) = d\zeta \sin(\zeta + \eta).$$

Addamus has duas aequationes, et posito  $\zeta + \eta = \Phi$  habebimus

$$\frac{da \cos \Phi}{\sin a \cos a} + \frac{d\theta \cos a}{\sin a} - d\theta \tan \theta \cos \Phi - d\Phi \sin \Phi = 0,$$

quae multiplicata per  $\tan a \cos \theta$  abit in hanc

$$\frac{da \cos \theta \cos \Phi}{\cos a^2} + d\theta \cos \theta - d\theta \tan \theta \sin \theta \cos \Phi - d\Phi \tan a \cos \theta \sin \Phi = 0,$$

quae integrabilis existit praebetque

$$\tan a \cos \theta \cos \Phi + \sin \theta = \sin a$$

quia initio fit  $a = 0$  et  $\theta = \delta$ : hinc ergo nanciscimur

$$\text{vel } \tan a = \frac{\sin \delta - \sin \theta}{\cos \theta \cos \Phi} \text{ vel } \cos \Phi = \frac{\sin \delta - \sin \theta}{\tan a \cos \theta}.$$

Dividamus nunc aequationem III per V, ut  $\sin(\zeta + \eta)$  seu  $\sin \Phi$  removeamus, fiet

$$\frac{da}{d\theta} + \frac{2Pfg \cos \theta \cos \Phi}{Ma \sin a} = 0$$

$$\text{seu } \frac{da \sin a}{\cos a^2} + \frac{2Pfg d\theta \cos \theta}{Ma \sin a} = 0;$$

ubi si ponamus  $\sin \theta = x$ , ut sit  $d\theta \cos \theta = dx$ , quoniam est  $\frac{P}{M} = 1 +$

$\frac{f d d x}{2 g d t^2}$ , nanciscimur hanc aequationem sponte integrabilem:

$$\frac{a a d a \sin a}{\cos a^2} + 2 f g d x + \frac{f^2 d x d d x}{d t^2} = 0,$$

T t

quae

quae integrata dat:

$$\frac{aa}{2 \cos \alpha^2} + 2fg \sin \theta + \frac{ff d\theta^2 \cos \theta^2}{2 dt^2} = \frac{1}{2} C$$

$$\text{feu } f d\theta \cos \theta = dt r \left( C - 4fg \sin \theta - \frac{aa}{\cos \alpha^2} \right).$$

Quare cum ex aequatione V fit

$$d\theta = \sin \alpha \tan \alpha \sin \Phi,$$

habemus novam aequationem finitam

$$\frac{1}{2} C = \frac{aa}{2 \cos \alpha^2} + 2fg \sin \theta + \frac{ff \tan \alpha^2 \cos \theta^2 \sin \Phi^2}{2}$$

ubi esse debet  $\frac{1}{2} C = \frac{1}{2} aa + 2fg \sin \theta$ , unde oritur

$$2fg (\sin \delta - \sin \theta) = \frac{1}{2} aa \tan \alpha^2 + \frac{1}{2} ff \tan \alpha^2 \cos \theta^2 \sin \Phi^2,$$

quae ob  $\sin \Phi^2 = 1 - \frac{\tan \alpha^2 \cos \theta^2}{(\sin \delta - \sin \theta)^2}$  abit in

$$4fg (\sin \delta - \sin \theta) = aa \tan \alpha^2 + ff \tan \alpha^2 \cos \theta^2 - ff (\sin \delta - \sin \theta)^2$$

unde elicimus

$$\tan \alpha = \frac{r (\sin \delta - \sin \theta) (4fg + ff (\sin \delta - \sin \theta))}{r (aa + ff \cos \theta^2)},$$

hincque porro

$$\begin{aligned} \cos \Phi = \cos (\zeta + \eta) &= \frac{r (\sin \delta - \sin \theta) (aa + ff \cos \theta^2)}{\cos \theta r (4fg + ff (\sin \delta - \sin \theta))} \\ \sin \Phi = \sin (\zeta + \eta) &= \frac{r (4fg \cos \theta^2 - aa (\sin \delta - \sin \theta))}{\cos \theta r (4fg + ff (\sin \delta - \sin \theta))} \end{aligned}$$

ficque jam per solam inclinationem  $\theta$  definivimus arcum  $\alpha$  et angulum  $\Phi = \zeta + \eta$ , quin etiam relationem inter  $\theta$  et tempus  $t$  adipiscimur aequatione,  $d\theta = \sin \alpha \tan \alpha \sin \Phi$ , quae induit hanc formam

$$d\theta = \frac{dt r (\sin \delta - \sin \theta) (4fg \cos \theta^2 - aa (\sin \delta - \sin \theta))}{\cos \theta r (aa + ff \cos \theta^2)}$$

$$\text{feu } dt = \frac{d\theta \cos \theta r (aa + ff \cos \theta^2)}{r (\sin \delta - \sin \theta) (4fg \cos \theta^2 - aa (\sin \delta - \sin \theta))}$$

$$\text{Deinde cum fit } \frac{d\zeta}{d\theta} = \frac{1}{\tan \alpha \sin \Phi} - \frac{\tan \alpha \cos \Phi}{\sin \Phi} \text{ erit}$$

$$d\zeta = ed\theta - \frac{d\theta \tan \theta r (\sin \delta - \sin \theta) (aa + ff \cos^2 \theta)}{r (4fg \cos \theta^2 - aa (\sin \delta - \sin \theta))}$$

$$\text{feu } d\zeta = \frac{d\theta (1 - \sin \delta \sin \theta) r (aa + ff \cos^2 \theta)}{\cos \theta r (\sin \delta - \sin \theta) (4fg \cos \theta^2 - aa (\sin \delta - \sin \theta))}$$

unde angulus ZAB =  $\zeta$  per integrationem est eliciendus. Denique cum

$$\text{fit } d\lambda = - \frac{d\theta \tan \alpha \cos \phi}{\cos \theta}, \text{ habebimus}$$

$$d\lambda = \frac{-d\theta (\sin \delta - \sin \theta)}{\cos \theta^2} \text{ feu}$$

$$d\lambda = \frac{-d\theta r (\sin \delta - \sin \theta) (aa + ff \cos^2 \theta)}{\cos \theta r (4fg \cos \theta^2 - aa (\sin \delta - \sin \theta))}$$

Quod si etiam pressionem turbinis in planum horizontale nosse velimus; ea ex aequatione III colligatur, unde est:

$$aa d. \tan \alpha = - \frac{2P}{M} \cdot fg d\theta \cos \theta \sin \phi,$$

hincque concluditur

$$\frac{2P}{M} = \frac{aa (2fg + \cos \theta (\sin \delta - \sin \theta))}{fg (aa + ff \cos^2 \theta)} - \frac{aa \sin \theta (\sin \delta - \sin \theta) (4fg + \cos \theta (\sin \delta - \sin \theta))}{fg (aa + ff \cos^2 \theta)^2}$$

#### COROLL. I.

778. Si initio axis turbinis AD fuerit verticalis, seu  $\delta = 90^\circ$ , turbo perpetuo hunc situm servabit, et uniformiter circa eundem axem AD gyraabitur celeritate angulari  $\alpha$ . Quod etiam declarat aequatio  $d\theta =$

$$\frac{d\theta \cos \theta r (aa + ff \cos^2 \theta)}{(1 - \sin \theta) r (4fg (1 + \sin \theta) - aa)} : \text{ unde patet nonnisi post tempus infinitum hoc est nunquam fieri posse } \sin \theta < 1.$$

#### COROLL. 2.

779. At si fuerit  $\delta < 90^\circ$ , seu  $\sin \delta < 1$ , phaenomena motus ex aequatione  $d\theta =$

$$\frac{d\theta \cos \theta r (aa + ff \cos^2 \theta)}{r (\sin \delta - \sin \theta) (4fg \cos \theta^2 - aa (\sin \delta - \sin \theta))}$$

cognosci possunt: ex qua primum patet, nunquam fieri posse  $\sin \theta > \sin \delta$ , nempe inclinatio ad horizontem  $\theta$  nunquam superabit initialem  $\delta$ .

# CAPUT XIV. DE MOTU TURBINUM

## COROLL. 3.

780. Inclinatio autem  $\theta$  evanescere nequit, nisi sit  $aa/f\delta < 4fg$ : quare si celeritas angularis initio impressa  $s$  minor fuerit, quam  $\frac{2rfg}{ar\delta}$ , turbo tandem procidet; quemadmodum evenit, si turbini inclinato nullus impressus fuerit motus gyratorius.

## COROLL. 4.

782. At si celeritas angularis initio impressa major fuerit, quam  $\frac{2rfg}{ar\delta}$ , inclinatio  $\theta$  non ultra certum limitem imminui poterit, quem simul atque attigerit, turbo se iterum ad initialem inclinationem  $\delta$  eriget. At minima inclinatio  $\theta$  ex aequatione  $4fg \cos \theta^2 - aa(f\delta - h\theta) = 0$  colligitur,  $h\theta = \frac{aa - r(e^2 a^2 - 16aa f g h \delta + 64 f f g g)}{2 f g}$

## COROLL. 5.

783. Quare si celeritas angularis  $s$  initio impressa fuerit quasi infinita, limes minimi sit  $h\theta = h\delta$ , seu turbo perpetuo eandem inclinationem servabit: sin autem sit valde magna, minima inclinatio ita proxime definitur:  $h\theta = h\delta - \frac{2fg \cos \delta^2}{aa}$ ; ut sit  $\theta = \delta - \frac{2fg \cos \delta}{aa}$ .

## SCHOLION.

784. Cum turbo tardius in gyrum actus mox procumbat, ea celeritas angularis notari meretur, quam si turbo superaverit, iterum erigatur. Esset quidem haec celeritas  $= \frac{2rfg}{ar\delta}$ , quippe cui maxima inclinatio convenit, nempe  $\theta = 0$ : sed quia ob motum turbinis axis non ad horizontem usque inclinari potest, ea pro maxima inclinatione erit reputanda, ubi turbo quasi corpore suo horizontem attingit; quae si vocetur  $i$ , ne turbo eoque inclinetur, celeritas angularis initio impressa  $s$  major esse debet, quam  $\frac{2 \cos i r f g}{ar(h\delta - h i)}$ , et quamdiu ea major manserit, turbo a lapsu erit immunus. Haecque est causa, quod turbo, cum ob frictionem aliaque obstacula ejus motus sensim imminuatur, tandem prolabatur. Ceterum cum hic ad ejusmodi obstacula non respectum,

xerim, mirum non est, si etiam reliqua phaenomena experientiae non satis respondeant: etiamsi certus velocitatis gradus, ad perennitatem gyrationis requisitus, experientiae maxime sit consentaneus. Verum ingens sine dubio discrimen deprehenderetur, si formulas differentiales inventas integraremus; atque ob hanc ipsam causam istum laborem suscipere haud operae esset pretium, cum eas tam sint complicatae, ut per logarithmos et arcus circulares expediri nequeant. Eae autem adhuc magis proditurae essent intricatae, si in turbine non omnia momenta inertiae inter se aequalia statuerentur, quocirca etiam hoc argumentum non attingam; quoniam principia stabilita his allatis exemplis satis sunt illustrata: sed potius uberiores ipsius Theoriae de motu corporum rigidorum explicationem in medium afferre studebo. Et si enim, quae haecenus sunt tradita, totum opus absolvere videntur, tamen si inde effectum virium quatumcunque definire velimus, methodus ante praescripta nimis est operosa; dum primo axem, circa quem vires corpus, si quiesceret, convertere inciperent definiri, tum vero hinc variationem axis, circa quem corpus actu gyrationis, et celeritatis angularis determinari oportet: ex quo methodum perfectiorem magisque ad usum accommodatam proponam, qua deinceps ad investigationes magis arduas uti liceat.

## CAPUT XV.

### DE MOTU LIBERO CORPORUM RIGIDORUM A VIRIBUS QUIBUSCUNQUE SOLLICITATORUM.

#### THEOREMA. 10.

785. Quomocunque corpus rigidum a viribus sollicitetur, effectus momentaneus his quatuor rebus continetur: primo variatione celeritatis centri inertiae: secundo variatione directionis centri inertiae: tertio variatione celeritatis angularis circa axem gyrationis per centrum inertiae transeuntis, et quarto variatione ipsius axis gyrationis.

#### DEMONSTRATIO.

Quomocunque corpus rigidum moveatur, ejus motus quovis  
 T t 3 temporis



temporis puncto resolvitur in motum progressivum, quo centrum inertiae movetur, et motum gyratorium circa axem quempiam per centrum inertiae transeuntem: unde cognitio hujus motus haec quatuor elementa involvit: 1°. celeritatem centri inertiae; 2°. directionem, secundum quam movetur; 3°. axem per centrum inertiae transeuntem, circa quem corpus jam gyratur, et 4°. celeritatem angularem hujus motus; quas quatuor res qui cognoverit, motum corporis hoc instanti perfecte habet perspectum. Ob vires autem sollicitantes fieri potest, ut haec quatuor res immutentur, ideoque ad earum effectum cognoscendum necesse est, ut quantum singulae tempusculo insinuat, parvo variatur, definire valeamus. Effectus ergo virium non tam in his quatuor rebus, quam in earum variatione momentanea consistit, quam si assignare poterimus, effectum perfecte cognoverimus; unde veritas Theorematis est manifesta.

## COROLL. 1.

786. Quomodo ergo in motu punctorum effectus virium ex variatione celeritatis et directionis perfecte cognoscitur; ita in motu corporum rigidorum, praeter has binas variationes, ad centrum inertiae relatas, nosse oportet variationes, quas cum ipse axis gyrationis tum celeritas angularis subit.

## COROLL. 2.

787. Sicut ergo vires definivimus, quibus motui gyratorio circa axem fixum data acceleratio inducatur, ita etiam vires definire licebit, quibus insuper ipse axis gyrationis datam variationem adipiscatur.

## COROLL. 3.

788. Fundamentum ergo universae Theoriae de motu corporum rigidorum in hoc consistit, ut quomodocunque vires sollicitantes fuerint comparatae, quaternas illas variationes temporis elemento productas assignare valeamus.

## SCHOLION. 1.

789. Principia ad hunc finem ducentia in praecedentibus jam factis sunt exposita, ubi ostendimus, quomodo variationem tam in motu centri inertiae, quam in axe gyrationis ejusque motu determinari oportet. Verum quia hoc posterius opus, in quo summa hujus Theoriae continetur, pluribus investigationibus innititur, quae saepe plurimum

num molestiae simplicare solent, hic eas quasi in unum contrahens hanc Theoriam ita proponam, ut unico principio absolvi possit. Statim quidem hoc faciliiori modo uti potuissem, sicque non leves difficultates in superiori tractatione occurrentes evitavissem; verum in argumento adhuc tam parum tractato haud incongruum visum est, methodum operosiorum et prolixiorum praemittere, quo singulae notiones in re pene nova animo firmitus imprimantur, ipsaeque difficultates, quibus haec pars Mechanicae adhuc involuta videbatur, luculentius perspiciantur. Nihilo vero minus hoc argumentum hic quasi de novo pertractabo, neque ex hactenus allatis quicquam in subsidium vocabo.

### SCHOLION. 2.

790. Cum igitur totum negotium huc reducat, ut quantae variationes in quaternis memoratis rebus a datis viribus producantur, definiatur; quoniam methodus directa hoc praestandi non patet, vice versa primum in vires inquirem, quae ad datas variationes momentaneas producendas sint necessariae, ut hinc vicissim ad id, quod quaerimus, reverti queamus. Et cum variatio in motu centri inertiae producta nihil habeat difficultatis, id tanquam in quiete spectabo; et cuiusmodi vires requirantur, investigabo, ut tam axis gyrationis, circa quem corpus iam gyatur, quam celeritas angularis, tempusculo infinite parvo datas variationes accipiant. Quoniam enim axis gyrationis cum celeritate angulari dari assumitur, motus singulorum elementorum corporis erit datus, qui si secundum ternas directiones fixas resolvatur, quantum hae ternae celeritates, tam ob variatam axis gyrationis positionem, quam ob celeritatis angularis variationem immutentur, colligere, simulque vires hanc mutationem in singulis elementis corporis producentes assignare valebimus; atque his denique viribus elementaribus colligendis ipsas vires finitas quaesitas impetrabimus. Cum igitur primum motum singulorum corporis elementorum, dum corpus circa axem quemcunque per centrum inertiae transeuntem data celeritate angulari gyatur, nosse debeamus, ejus resolutionem secundum ternas directiones fixas, pro quibus ternos corporis axes principales assumam, in sequente problemate docebo.

### PROBLEMA. 87.

791. Si corpus rigidum circa axem quemcunque per ejus centrum inertiae transeuntem gyretur data celeritate, singulorum ejus elementorum

torum motum definire, eumque secundum directiones axium principalium resolvere.

## S O L U T I O.

Circa centrum inertiae corporis I, quod in figura non est expressum, concipiatur descripta superficies sphaerica, in qua sint A, B, C poli axium principalium, ita ut arcus AB, AC et BC sint quadrantes. Gyretur jam corpus circa axem quemcunque IO celeritate angulari  $\omega$  in sensum ABC, fiatque pro gyrationis polo O arcus OA =  $\alpha$ , OB =  $\beta$ , et OC =  $\gamma$ . Consideretur nunc corporis elementum quodcunque, a quo recta, ad centrum inertiae I ducta, superficiem sphaericam secet in Z; ejus autem distantia a centro I sit =  $r$ , dum radius sphaerae unitate exponitur; atque manifestum est, motum ejus elementi similem fore motui puncti Z, dum nempe hujus celeritas in ratione 1 ad  $r$  augetur. Quare sufficiet motum puncti Z definivisse, pro quo si ad arcum OZ constituatur arcus ZzT normalis, erit Zz directio motus, et celeritas =  $\omega \sin OZ$ , quoniam  $\sin OZ$  distantiam puncti Z ab axe gyrationis IO exprimit. Constituatur autem arcus ZT quadrans, ut radius IT fiat directioni motus Zz parallelus, ac jam celeritatem  $\omega \sin OZ$  secundum hanc directionem IT latam resolveri oportet secundum directiones axium principalium IA, IB, IC. Quem in finem ductis arcibus AT, BT, CT, qui illius rectae IT inclinationes ad hos axes metiuntur, obtinebitur

$$\begin{aligned} \text{cel. sec. IA} &= \omega \sin OZ \cdot \cos AT; \text{ cel. sec. IB} = \omega \sin OZ \cdot \cos BT \\ \text{et cel. sec. IC} &= \omega \sin OZ \cdot \cos CT. \end{aligned}$$

Iam quia arcus OT est pariter quadrans, ex triangulo AOT fit  $\cos AT = \cos AOT \cdot \sin AO = -\sin AOL \cdot \sin AO$  ob  $TOZ = 90^\circ$ . Simili modo est

$$\begin{aligned} \cos BT &= \cos BOT \cdot \sin BO = \sin BOZ \cdot \sin BO \\ \cos CT &= \cos COT \cdot \sin CO = \sin COZ \cdot \sin CO. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{At ob.} \sin AZ : \sin AOL &= \sin OZ : \sin OAZ \text{ erit} \\ \sin AOL \cdot \sin OZ &= \sin AZ \cdot \sin OAZ \text{ similique modo} \\ \sin BOZ \cdot \sin OZ &= \sin BZ \cdot \sin OBZ \text{ et} \\ \sin COZ \cdot \sin OZ &= \sin CZ \cdot \sin OCZ; \text{ unde fit} \\ \text{cel. sec. IA} &= -\omega \sin AO \cdot \sin AZ \cdot \sin OAZ \\ \text{cel. sec. IB} &= \omega \sin BO \cdot \sin BZ \cdot \sin OBZ \\ \text{cel. sec. IC} &= \omega \sin CO \cdot \sin CZ \cdot \sin OCZ. \end{aligned}$$

Tum vero est

$$\sin BAO = \frac{\cos CO}{\sin AO}; \cos BAO = \frac{\cos BO}{\sin AO};$$

$$\sin BAZ$$

$$\sin \text{BAZ} = \frac{\cos \text{CZ}}{\sin \text{AZ}}; \cos \text{BAZ} = \frac{\cos \text{BZ}}{\sin \text{AZ}}$$

$$\text{ergo} \sin \text{OAZ} = \frac{\cos \text{CO} \cdot \cos \text{BZ} - \cos \text{BO} \cdot \cos \text{CZ}}{\sin \text{AO} \cdot \sin \text{AZ}}$$

ideoque celeritas secundum IA =  $\omega$  ( $\cos \text{BO} \cdot \cos \text{CZ} - \cos \text{CO} \cdot \cos \text{BZ}$ )  
similique modo reperitur

$$\text{celeritas secundum IB} = \omega (\cos \text{CO} \cdot \cos \text{AZ} - \cos \text{AO} \cdot \cos \text{CZ})$$

$$\text{celeritas secundum IC} = \omega (\cos \text{AO} \cdot \cos \text{BZ} - \cos \text{BO} \cdot \cos \text{AZ})$$

quae per  $r$  multiplicatae dabunt celeritates elementi propositi: pro quo si coordinatae axibus principalibus parallelae ponantur  $x, y, z$ , erit  $r \cos \text{AZ} = x$ ;  $r \cos \text{BZ} = y$  et  $r \cos \text{CZ} = z$ : quare ob  $\text{AO} = a$ ,  $\text{BO} = b$ ,  $\text{CO} = c$ , erunt elementi propositi celeritates

$$\text{cel. sec. IA} = \omega (z \cos c - y \cos b)$$

$$\text{cel. sec. IB} = \omega (x \cos c - z \cos a)$$

$$\text{cel. sec. IC} = \omega (y \cos a - x \cos b)$$

#### PROBLEMA. 86.

792. Si corpus rigidum gyretur circa axem quemcunque, per ejus centrum inertiae transeuntem data celeritate angulari, invenire vires elementares, quibus singula elementa sollicitari debent, ut elemento temporis  $dt$  tam ipse axis gyrationis quam celeritas angularis datas subeant variationes.

#### SOLUTIO.

Sit I centrum inertiae corporis, ejusque axes principales IA, IB, Fig. 103, IC, gyreturque corpus circa axem quemcunque IO, cujus ad quemlibet axem sit inclinatio  $\text{AIO} = a$ ;  $\text{BIO} = b$ ,  $\text{CIO} = c$ , celeritas autem angularis sit  $= \omega$  in sensum ABC directa; quae quantitates tempusculum  $dt$  crescere debeant suis differentialibus  $d\omega$ ,  $da$ ,  $db$  et  $dc$ , ad quem effectum producendum vires elementares necessarias quaeri oporteat. Consideretur elementum corporis quodcunque  $dM$  in Z situm, pro quo sint coordinatae axibus principalibus parallelae  $\text{IX} = x$ ,  $\text{XY} = y$ ,  $\text{YZ} = z$ : vocenturque vires ad ejus motum praescriptum efficiendum requisitae et secundum axes principales resolutae  $\text{Za} = p$ ,  $\text{Zb} = q$  et  $\text{Zc} = r$ . Secundum easdem directiones ejus motus resolvatur, ponaturque celeritas secundum  $\text{Za} = u$ ; secundum  $\text{Zb} = v$  et secundum  $\text{Zc} = w$ , atque cum ex primis motus principiis sit

$$du = \frac{2gpdt}{dM}, dv = \frac{2gqdt}{dM}, dw = \frac{2grdt}{dM},$$

U u

vires

vires quæsitæ erunt:

$$p = \frac{du dM}{ag dt}; \quad q = \frac{dv dM}{ag dt}; \quad r = \frac{dw dM}{ag dt}.$$

Verum in præcedente problemate celeritates ternas  $u$ ,  $v$ ,  $w$ , ita invenimus expressas, ut sit:

$$u = z \cos \zeta - y \cos \gamma; \quad v = x \cos \gamma - z \cos \alpha; \quad w = y \cos \alpha - x \cos \zeta;$$

quæ quantum augeantur tempusculo  $dt$  cum ex variabilitate litterarum  $u$ ,  $\alpha$ ,  $\zeta$ ,  $\gamma$ , quæ ut data spectatur, tum vero coordinatarum  $x$ ,  $y$ ,  $z$  judicari oportet. At harum differentialia  $dx$ ,  $dy$ ,  $dz$  exhibent spatia, per quæ elementum  $dM$  tempusculo  $dt$  transferetur, ita ut sit

$$\begin{aligned} dx &= u dt = u dt (z \cos \zeta - y \cos \gamma) \\ dy &= v dt = u dt (x \cos \gamma - z \cos \alpha) \\ dz &= w dt = u dt (y \cos \alpha - x \cos \zeta). \end{aligned}$$

Unde differentiatione rite instituta adipiscimur:

$$\begin{aligned} du &= dx (z \cos \zeta - y \cos \gamma) - u (z d\zeta \sin \zeta - y d\gamma \sin \gamma) + u dt \\ &\quad (w \cos \zeta - v \cos \gamma) \\ dv &= dx (x \cos \gamma - z \cos \alpha) - u (x d\gamma \sin \gamma - z d\alpha \sin \alpha) + u dt \\ &\quad (u \cos \gamma - w \cos \alpha) \\ dw &= dx (y \cos \alpha - x \cos \zeta) - u (y d\alpha \sin \alpha - x d\zeta \sin \zeta) + u dt \\ &\quad (v \cos \alpha - u \cos \zeta). \end{aligned}$$

Cum vero sit  $\cos \alpha^2 + \cos \zeta^2 + \cos \gamma^2 = 1$  ideoque  $\cos \alpha^2 + \cos \zeta^2 = \sin \gamma^2$ ,  $\cos \alpha^2 + \cos \gamma^2 = \sin \zeta^2$  et  $\cos \zeta^2 + \cos \gamma^2 = \sin \alpha^2$ , hæc formulæ abeunt in istas:

$$\begin{aligned} du &= dx (z \cos \zeta - y \cos \gamma) - u z d\zeta \sin \zeta + u y d\gamma \sin \gamma + u dt \\ &\quad (y \cos \alpha \cos \zeta + z \cos \alpha \cos \gamma - x \sin \alpha^2) \\ dv &= dx (x \cos \gamma - z \cos \alpha) - u x d\gamma \sin \gamma + u z d\alpha \sin \alpha + u dt \\ &\quad (z \cos \zeta \cos \gamma + x \cos \alpha \cos \zeta - y \sin \zeta^2) \\ dw &= dx (y \cos \alpha - x \cos \zeta) - u y d\alpha \sin \alpha + u x d\zeta \sin \zeta + u dt \\ &\quad (x \cos \alpha \cos \gamma + y \cos \zeta \cos \gamma - z \sin \gamma^2) \end{aligned}$$

ex quibus vires quæsitæ elementares  $p$ ,  $q$ ,  $r$  innotescent, has scilicet formulas per  $\frac{dM}{ag dt}$  multiplicando.

#### COROLL. I.

793. Si igitur singula corporis elementa a talibus ternis viribus sollicitentur, dum corpus circa axem IO celeritate angulari  $\omega$  gyratur, elapso tempusculo  $dt$ , celeritas angularis  $\omega$  augmentum accipiet  $= d\omega$ , simulque axis gyrationis respectu axium principalium IA, IB, IC ita variabitur,

variabitur, ut anguli  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  suis differentialibus  $d\alpha$ ,  $d\beta$ ,  $d\gamma$  augeantur.

COROLL. 2.

794. Quatenus vires contemplamur idem corporis elementum  $dM$  sollicitantes, quantitates  $x$ ,  $y$ ,  $z$  in his formulis insunt, tanquam constantes, quoniam iis situs elementi respectu axium principalium designatur, qui semper manet idem,

COROLL. 3.

795. Sin autem ab hoc elemento ad alia transire velimus, vires et sollicitantes investigaturi, eadem quantitates  $x$ ,  $y$ ,  $z$  erunt variables, et reliquae  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\nu$  cum suis differentialibus tanquam constantes spectandae: quoniam hae pro omnibus corporis elementis eodem instanti manent eadem.

COROLL. 4.

796. Quare si vires omnia elementa sollicitantes in unam summam colligere velimus, hae tantum formulae  $\int x dM$ ,  $\int y dM$ , et  $\int z dM$  integrandae occurrunt; quarum differentialia cum evanescant, ob I centrum inertiae corporis, patet summas omnium virium  $p$ , item  $q$  et  $r$  seorsum evanescere.

SCHOLION.

797. Quia summae omnium virium  $p$ ,  $q$ , et  $r$  evanescunt; quod semper evenire debet, quamdiu centrum inertiae in quiete persistit, earum effectus tantum ex earum momentis est dijudicandus; atque alias quaeque vires eadem momenta habentes eundem effectum producent, dummodo illis aequales et contrariae in centro inertiae applicentur. Verum hic non sufficit, ut vires idem habeant momentum respectu unius cuiuspiam axis, sed necesse est, ut respectu omnium plane axium eadem momenta producant, alioquin non pro aequivalentibus essent habendae. Hoc autem evenit, dummodo pro tribus axibus principalibus eadem momenta suppeditent, id quod sequente propositione extra dubium collocabitur.

PROBLEMA. 87.

798. Dum corpus rigidum circa axem quemcunque per centrum inertiae transeuntem data celeritate angulari gyratur, definire virium  
Uu 2
momenta

momenta respectu trium axium principalium, quibus tam ipsi axi gyrationis quam celeritati angulari data immutatio inducatur.

## SOLUTIO.

Fig. 103. Manentibus pro axe gyrationis IO angulis AIO =  $\alpha$ , BIO =  $\zeta$ , CIO =  $\gamma$ , circa quem corpus jam gyretur celeritate angulari  $\omega$  in sensum ABC; haeque quantitates tempusculo  $dt$  differentialibus suis crescere debeant; considerentur pro elemento corporis quocumque  $dM$  in Z coëordinatis IX =  $x$ , XY =  $y$  et YZ =  $z$  determinato vires elementares ante definitae

$$Za = p = \frac{du dM}{2g dt}; Zb = q = \frac{dv dM}{2g dt}; Zc = r = \frac{dw dM}{2g dt},$$

ex quibus respectu axis IA oritur momentum in sensum BC

$$= ry - qz = \frac{dM}{2g dt} (ydw - zdv)$$

at respectu axis IB momentum in sensum CA

$$= pz - rx = \frac{dM}{2g dt} (zdu - xdw)$$

ac denique respectu axis IC momentum in sensum AB

$$= qx - py = \frac{dM}{2g dt} (x dv - y du).$$

Quodsi hic pro  $du$ ,  $dv$ ,  $dw$  formulas ante inventas substituamus, reperiemus:

$$\begin{aligned} ydw - zdv &= d_x((yy + zz)\cos\alpha - xy\cos\zeta - xz\cos\gamma) - v(yy + zz) \\ &\quad d\alpha \sin\alpha + xxy d\zeta \sin\zeta + xxz d\gamma \sin\gamma \\ &\quad + vdt((yy - zz)\cos\zeta \cos\gamma + xy\cos\alpha \cos\gamma - \\ &\quad xz\cos\alpha \cos\zeta - yz(\sin^2\gamma - \sin^2\zeta)) \\ xdu - xdw &= d_x((xx + zz)\cos\zeta - yz\cos\gamma - xy\cos\alpha) - u(xx + zz) \\ &\quad d\zeta \sin\zeta + xyz d\gamma \sin\gamma + xxy d\alpha \sin\alpha \\ &\quad + vdt((zz - xx)\cos\alpha \cos\gamma + yz\cos\alpha \cos\zeta - \\ &\quad xy\cos\zeta \cos\gamma - xz(\sin^2\alpha - \sin^2\gamma)), \\ xdv - ydu &= d_x((xx + yy)\cos\gamma - xz\cos\alpha - yz\cos\zeta) - u(xx + yy) \\ &\quad d\gamma \sin\gamma + xxz d\alpha \sin\alpha + xyz d\zeta \sin\zeta \\ &\quad + vdt((xx - yy)\cos\alpha \cos\zeta + xz\cos\zeta \cos\gamma - \\ &\quad yz\cos\alpha \cos\gamma - xy(\sin^2\zeta - \sin^2\alpha)). \end{aligned}$$

Multiplicentur jam hae formulae per  $\frac{dM}{2g dt}$ , et per totam corporis mo-

lem

lem integrentur : quem in finem sint  $Maa$ ,  $Mbb$ ,  $Mcc$ , momenta inertiae respectu axium principalium  $IA$ ,  $IB$ ,  $IC$ , et cum sit

$$fxxdM = \frac{1}{2} M (bb + cc - aa); fyzdM = 0$$

$$fyydM = \frac{1}{2} M (aa + cc - bb); fxyzdM = 0$$

$$fzzdM = \frac{1}{2} M (aa + bb - cc); fxydM = 0$$

obtinemus terna virium momenta respectu axium principalium, quibus effectus praescriptus producitur, ita expressa:

I. Momentum virium respectu axis  $IA$  in sensum  $BC$

$$\frac{M}{2gdt} (aa d\alpha \cos \alpha - \alpha a da \sin \alpha + \alpha \alpha (cc - bb) dt \cos \beta \cos \gamma)$$

II. Momentum virium respectu axis  $IB$  in sensum  $CA$

$$\frac{M}{2gdt} (bb d\beta \cos \beta - \alpha \beta d\beta \beta + \alpha \alpha (aa - cc) dt \cos \alpha \cos \gamma)$$

III. Momentum virium respectu axis  $IC$  in sensum  $AB$

$$\frac{M}{2gdt} (cc d\gamma \cos \gamma - \alpha \gamma d\gamma \sin \gamma + \alpha \alpha (bb - aa) dt \cos \alpha \cos \beta)$$

C O R O L L. 1.

799. Ut ergo corpus circa eundem axem uniformiter gyretur, terna momenta virium ob  $d\alpha = 0$ ,  $da = 0$ ,  $d\beta = 0$ ,  $d\gamma = 0$ , erunt

$$I. = \frac{M \alpha \alpha (cc - bb) \cos \beta \cos \gamma}{2g}; II. = \frac{M \alpha \alpha (aa - cc) \cos \alpha \cos \gamma}{2g}$$

$$et III. = \frac{M \alpha \alpha (bb - aa) \cos \alpha \cos \beta}{2g}$$

quae, nisi axis gyrationis in aliquem axium principalium incidat, non evanescunt.

C O R O L L. 2.

800. Simili modo intelligitur, quibusnam viribus sit opus, ut vel sola celeritas angularis mutetur, vel sola axis gyrationis positio varietur: scilicet vires, quarum momenta cum ante definitis convenient, hoc praestabunt, si modo illis aequales et contrariae in centro inertiae applicentur, ut ipsae vires pro evanescentibus haberi queant, totusque effectus solis earum momentis debeat.

C O R O L L. 3.

801. Si corpus circa ipsum axem principale  $IA$  celeritate angulari & gyretur, quae suo differentiali  $d\alpha$  augeri debeat, ob  $\alpha = 0$ , et

$$Uu \quad 3 \quad \beta$$



$\beta = \gamma = 90^\circ$ , ad hoc tantum respectu axis IA requiritur momentum virium  $= \frac{Maad\alpha}{2gdt}$ , uti jam supra invenimus.

## SCHOLION.

802. Problema hoc haud difficiliter solutu fuisset, si corpori praeter motum gyrationis insuper motum progressivum quencunque tribuissimus, qui tempusculo  $dt$  etiam praescripto modo variari deberet: si enim centrum inertiae motum habeat quencunque, qui secundum axes principales resolutus praebet celeritates  $l, m, n$ , tempusculo  $dt$  suis quoque differentialibus augendas, celeritates  $u, v, w$  supra valores ex motu gyrationis natos his progressivis  $l, m, n$  augeri deberent, atque ex harum incrementis nascerentur vires, quarum aequivalens per centrum inertiae transiret, pariterque se haberet, ac si corpus sine ullo motu gyrationis hunc solum motum progressivum prosequi deberet. Quo id confirmatur, quod jam supra ostendimus, in tali motu mixto semper motum progressivum et gyrationis separari, et utrumque seorsim, quasi alter non adesset, considerari ac determinari licere.

## PROBLEMA. 88.

803. Si corpus rigidum, dum circa datum axem IO data celeritate angulari  $= \alpha$  gyrat, a viribus quibuscunque sollicitetur, quibus simul aequales et contrariae ipsi centro inertiae sint applicatae, determinare tam variationem axis, quam mutationem celeritatis angularis elemento temporis  $dt$  productum.

## SOLUTIO.

Colligantur virium sollicitantium momenta respectu ternorum axium principalium corporis, sitque

momentum virium respectu axis IA in sensum BC  $= P$

momentum virium respectu axis IB in sensum CA  $= Q$

momentum virium respectu axis IC in sensum AB  $= R$ .

Momenta autem inertiae corporis respectu eorundem axium sint ut haecenus  $Maa, Mbb, Mcc$ . Quod si jam corpus gyretur in sensum ABC celeritate angulari  $= \alpha$  circa axem IO, cujus inclinationes ad eosdem axes principales nunc sint  $\text{AIO} = \alpha, \text{BIO} = \beta, \text{CIO} = \gamma$ , hae quantitates tempusculo  $dt$  sequentes mutationes subibunt,

$$\frac{2gPdt}{Aaa}$$

$$\frac{2gPd\epsilon}{Maa} = d\alpha \cos \alpha - \alpha d\alpha \text{ si } \alpha + \frac{cc-bb}{aa} \alpha d\epsilon \cos \beta \cos \gamma$$

$$\frac{2gQd\epsilon}{Mbb} = d\beta \cos \beta - \beta d\beta \text{ si } \beta + \frac{aa-cc}{bb} \beta d\epsilon \cos \alpha \cos \gamma$$

$$\frac{2gRd\epsilon}{Mcc} = d\gamma \cos \gamma - \gamma d\gamma \text{ si } \gamma + \frac{bb-aa}{cc} \gamma d\epsilon \cos \alpha \cos \beta$$

ex quibus aequationibus quaternae incognitae  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , et  $\alpha$  determinantur, quoniam tantum pro tribus sunt habendae ob  $\cos \alpha^2 + \cos \beta^2 + \cos \gamma^2 = 1$ . Cum igitur sit  $d\alpha \text{ si } \alpha \cos \alpha + d\beta \text{ si } \beta \cos \beta + d\gamma \text{ si } \gamma \cos \gamma = 0$ , si prima per  $\cos \alpha$ , secunda per  $\cos \beta$ , tertia per  $\cos \gamma$  multiplicetur, productis addendis prodibit:

$$d\alpha + \left( \frac{cc-bb}{aa} + \frac{aa-cc}{bb} + \frac{bb-aa}{cc} \right) \alpha d\epsilon \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma =$$

$$\frac{2g d\epsilon}{M} \left( \frac{P \cos \alpha}{aa} + \frac{Q \cos \beta}{bb} + \frac{R \cos \gamma}{cc} \right)$$

sen

$$d\alpha = \frac{(cc-bb)(aa-cc)(bb-aa)}{aabbcc} \alpha d\epsilon \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma + \frac{2g d\epsilon}{M}$$

$$\left( \frac{P \cos \alpha}{aa} + \frac{Q \cos \beta}{bb} + \frac{R \cos \gamma}{cc} \right)$$

quo valore substituto obtinebuntur hae aequationes:

$$\alpha d\alpha \text{ si } \alpha = \frac{cc-bb}{aa} \alpha d\epsilon \cos \beta \cos \gamma \left( 1 + \frac{(aa-cc)(bb-aa)}{bbcc} \cos \alpha^2 \right)$$

$$+ \frac{2g d\epsilon}{M} \left( \frac{Q \cos \alpha \cos \beta}{bb} + \frac{R \cos \alpha \cos \gamma}{cc} - \frac{P \text{ si } \alpha^2}{aa} \right)$$

$$\beta d\beta \text{ si } \beta = \frac{aa-cc}{bb} \beta d\epsilon \cos \alpha \cos \gamma \left( 1 + \frac{(bb-aa)(cc-bb)}{aacc} \cos \beta^2 \right)$$

$$+ \frac{2g d\epsilon}{M} \left( \frac{R \cos \beta \cos \gamma}{cc} + \frac{P \cos \beta \cos \alpha}{aa} - \frac{Q \text{ si } \beta^2}{bb} \right)$$

$$\gamma d\gamma \text{ si } \gamma = \frac{bb-aa}{cc} \gamma d\epsilon \cos \alpha \cos \beta \left( 1 + \frac{(cc-bb)(aa-cc)}{aabb} \cos \gamma^2 \right)$$

$$+ \frac{2g d\epsilon}{M} \left( \frac{P \cos \gamma \cos \alpha}{aa} + \frac{Q \cos \gamma \cos \beta}{bb} - \frac{R \text{ si } \gamma^2}{cc} \right)$$

At si prima illarum aequationum per  $aa \cos \alpha$ , secunda per  $bb \cos \beta$ , tertia per  $cc \cos \gamma$  multiplicetur, eas addendo oriatur

$$\frac{2g d\epsilon}{M}$$

$$\frac{2gdt}{M} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) = dx (aa \cos \alpha^2 + bb \cos \beta^2 + cc \cos \gamma^2)$$

$$- x (aa d\alpha \sin \alpha \cos \alpha + bb d\beta \sin \beta \cos \beta + cc d\gamma \sin \gamma \cos \gamma)$$

quae per  $2Mx$  multiplicata et ex altera parte integrata dat

$$Mx (aa \cos \alpha^2 + bb \cos \beta^2 + cc \cos \gamma^2) = 4g \int x dx (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma)$$

quae quantitas exprimit corporis vim vivam.

### COROLL. 1.

804. Si igitur, dum circa axem quemcumque per centrum inertiae transeuntem gyratur, a viribus quibuscumque follicitetur, hinc variationes momentaneae tam in situ axis gyrationis respectu axium principalium, quam in celeritate angulari determinantur.

### COROLL. 2.

805. Si corpus a nullis plane viribus externis follicitetur, axis gyrationis cum celeritate angulari ita variantur, ut fit:

$$I. dx = \frac{(cc - bb)(aa - cc)(bb - aa)}{aabbcc} x dt \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma$$

$$II. d\alpha \sin \alpha = \frac{cc - bb}{aa} x dt \cos \beta \cos \gamma \left(1 + \frac{(aa - cc)(bb - aa)}{bbcc} \cos \alpha^2\right)$$

$$III. d\beta \sin \beta = \frac{aa - cc}{bb} x dt \cos \alpha \cos \gamma \left(1 + \frac{(bb - aa)(cc - bb)}{aacc} \cos \beta^2\right)$$

$$IV. d\gamma \sin \gamma = \frac{bb - aa}{cc} x dt \cos \alpha \cos \beta \left(1 + \frac{(cc - bb)(aa - cc)}{aabb} \cos \gamma^2\right)$$

et vis viva  $Mx (aa \cos \alpha^2 + bb \cos \beta^2 + cc \cos \gamma^2)$  perpetuo manet constans.

### COROLL. 3.

806. Si corpus quiescat, ut sit  $x = 0$ , ex momentis virium  $P$ ,  $Q$ ,  $R$  respectu axium principalium suntis, axis, circa quem corpus primum gyrat incipiet, ex his aequationibus definietur:

$$\frac{Q \cos \alpha \cos \beta}{bb} + \frac{R \cos \alpha \cos \gamma}{cc} - \frac{P \sin \alpha^2}{aa} = 0 \quad \text{scilicet} \quad \frac{P}{aa} = \cos \alpha$$

$$\left( \frac{P \cos \alpha}{aa} + \frac{Q \cos \beta}{bb} + \frac{R \cos \gamma}{cc} \right)$$

$$\frac{R \cos \beta \cos \gamma}{cc}$$

$$\frac{R \cos \beta \cos \gamma}{cc} + \frac{P \cos \beta \cos \alpha}{aa} - \frac{Q \cos \alpha}{bb} = 0 \text{ seu } \frac{Q}{bb} = \cos \beta$$

$$\left( \frac{P \cos \alpha}{aa} + \frac{Q \cos \beta}{bb} + \frac{R \cos \gamma}{cc} \right)$$

$$\frac{P \cos \gamma \cos \alpha}{aa} + \frac{Q \cos \gamma \cos \beta}{bb} - \frac{R \cos \gamma}{cc} = \beta \text{ seu } \frac{R}{cc} = \cos \gamma$$

$$\left( \frac{P \cos \alpha}{aa} + \frac{Q \cos \beta}{bb} + \frac{R \cos \gamma}{cc} \right)$$

unde cum fit  $\cos \alpha : \cos \beta : \cos \gamma = \frac{P}{aa} : \frac{Q}{bb} : \frac{R}{cc}$  crit

$$\cos \alpha = \frac{P}{aa} r \left( \frac{PP}{aa} + \frac{QQ}{bb} + \frac{RR}{cc} \right)$$

$$\cos \beta = \frac{Q}{bb} r \left( \frac{PP}{aa} + \frac{QQ}{bb} + \frac{RR}{cc} \right)$$

$$\cos \gamma = \frac{R}{cc} r \left( \frac{PP}{aa} + \frac{QQ}{bb} + \frac{RR}{cc} \right)$$

ac tempusculo  $dt$  fiet:

$$ds = \frac{2gdt}{M} r \left( \frac{PP}{aa} + \frac{QQ}{bb} + \frac{RR}{cc} \right)$$

SCHOLIA Quidam.

807. In hoc ergo solo problemate omnia continentur, quae supra per multas ambages magno labore elucimus, cum tamen hic non nisi primis motus principii sumus usi, omniaque sint maxime perspicua. Ita cum supra, dum corpus quiescit, axem, circa quem ipsi vires primum motum gyrationum imprimunt, vehementer operose determinavissimus, hic ista determinatio instat corollarii ex praesente problemate sponte fluxit: cujus consensus cum superiori quo facillime perspicatur, ac ne ambiguitas signi radicalis incertam faciat, sit iterum pro axe gyrationis IF angulus AIE =  $\eta$  et angulus EIF =  $\theta$ , erit  $\cos \alpha = \cos \eta$

Fig. 82

$$\cos \theta; \cos \beta = -\cos \eta \cos \theta \text{ et } \cos \gamma = \cos \theta, \text{ unde ob tang } \eta = \frac{-\cos \beta}{\cos \alpha}$$

$$\text{erit tang } \eta = \frac{-Qaa}{Pbb} \text{ et tang } \theta = \frac{\cos \gamma}{\cos \alpha} = \frac{Raa}{Pcc} \cos \eta$$

Cum autem vires sollicitantes ibi sint VP = P, VQ = Q; VR = R existente angulo AIV =  $\delta$  et IV =  $\delta$ : erit harum virium momentum respectu axis

axis IA in sensum BC =  $Rb \sin \delta$ , quod hic nobis est P; tum earum momentum respectu axis IB in sensum CA =  $-Rb \cos \delta$ , quod hic nobis est Q, et momentum respectu axis IC in sensum AB =  $Qb \cos \delta - P b \sin \delta$ , quod hic nobis est R. Quibus valoribus pro  $\delta$ , Q et R positis,

$$\text{habetimus prorsus ut supra } \tan \eta = \frac{aa \cos \delta}{bb \sin \delta} \text{ et } \tan \theta = \frac{aa(Q \cos \delta - P \sin \delta)}{cc R \sin \delta} \cos \eta.$$

Deinde, etiam quae supra de variatione momentanea motus gyatorii, dum corpus a nullis viribus sollicitatum circa axem non principalem gyatur, per nimis intricata ratioocinia tandem eruiamus, hic positis virium momentis  $P = 0$ ,  $Q = 0$ ,  $R = 0$  sunt planissima, uti in coroll. 2. ostendimus. Quae autem supra vix attingere ausi fuimus, cum corpus insuper a viribus quibuscunque sollicitatur, hic pari facilitate eodemque labore feliciter expedivimus, ita ut in hoc tantum capite a primis motus principiis profecti universam Theoriam motus corporum rigidorum perfecte condidisse videamur.

### SCHOLION. 2.

808. Cum autem propositis viribus sollicitantibus quibuscunque, quarum momenta respectu axium principalium in sensum ABC sumta sint P, Q, R, totum negotium in determinatione ternorum angulorum  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  et velocitatis  $v$  versetur, pro quo ternas invenimus aequationes; quandoquidem anguli illi relationem inter se tenent: aequationes illae levi substitutione multo commodiores reddi possunt. Quodsi enim, quia litteris  $x$ ,  $y$ ,  $z$  ad indolem corporis indicandam non amplius indigemus, ponamus

$$x \cos \alpha = \xi; \quad x \cos \beta = \eta; \quad x \cos \gamma = \zeta;$$

omnes anguli ex calculo elidentur, summaque totius Theoriae motus corporum rigidorum his tribus formulis satis simplicibus continebitur:

$$\begin{aligned} dx + \frac{cp - bb}{aa} yz \, dt &= \frac{agP \, dt}{Maa} \\ dy + \frac{ap - cc}{bb} xz \, dt &= \frac{agQ \, dt}{Mbb} \\ dz + \frac{bp - ca}{cc} xy \, dt &= \frac{agR \, dt}{Mcc} \end{aligned}$$

Quare si corpus a nullis viribus sollicitetur, statim colligimus  $ag \, xdx + bb \, ydy + cc \, zdz = 0$  seu  $aa \, xx + bb \, yy + cc \, zz = \text{Const.}$  Tum vero

ex

ex binis  $dx$  evidendo erit  $\frac{aax}{bbdy} = \frac{(cc-bb)y}{(aa-cc)x}$  ideoque integrando  $\frac{aa}{cc-bb}$

$xx = \frac{-bb}{aa-cc} yy + \text{Const.}$  Quare si initio fuerit  $x = A$ ;  $y = B$ ;

$z = C$ , ponamusque  $\frac{aa}{cc-bb} = A$ ;  $\frac{bb}{aa-cc} = B$  et  $\frac{cc}{bb-aa} = C$ , habebitur

$$Axx - Byy = AA^2 - BB^2 \text{ et } Axx - Cz^2 = AA^2 - CC^2$$

$$\text{ideoque } y = \frac{\sqrt{(Axx - AA^2 + BB^2)}}{\sqrt{B}} \text{ et } z = \frac{\sqrt{(Axx - AA^2 + CC^2)}}{\sqrt{C}}$$

Quare cum sit  $A dx + yz ds = 0$ , fiet

$$-ds = \frac{A dx \sqrt{B} \sqrt{C}}{\sqrt{(Axx - AA^2 + BB^2)} \sqrt{(Axx - AA^2 + CC^2)}}$$

sicque etiam hoc problema, quod supra non parum molestie creaverat, satis expeditè est solutum.

### P R O B L E M A. 89.

89. Si ad quodvis tempus noverimus axem gyrationis respectu axium principalium, una cum celeritate angulari corporis circa hunc axem; definire ad quodvis tempus situm axium principalium respectu spatii absoluti.

### SOLUTIO.

Fig. 89.

In spatio absoluto concipiatur sphaera immobilis, in cuius centro versetur corporis centrum inertiae  $I$ , in eaque assumatur circulus fixus maximus  $VXVY$ , in eoque punctum fixum  $Z$ , quo situs axium principalium quovis tempore referatur. Ac nunc quidem elapso tempore  $t$  respondeant corporis axes principales in sphaera immobili punctis  $A$ ,  $B$ ,  $C$ , a quibus si ad  $Z$  ducantur arcus circuli ordinem maximorum, vocentur ii  $ZA = l$ ,  $ZB = m$  et  $ZC = n$ , tunc vero sint anguli  $XZA = \alpha$ ,  $XZB = \beta$  et  $XZC = \gamma$ . Nullo autem reperiatur axis gyrationis in  $O$ , ut sit  $AO = a$ ,  $BO = \beta$  et  $CO = \gamma$ ; circa quem corpus gyretur in sensum  $ABC$  celeritate angulari  $= s$ ; tempusculo ergo  $dt$  polus  $A$  vertetur per arculum  $Aa = ydt$  existente  $Aa$  ad arcum  $OA$  normali, ita ut sit

$$\sin BAa = \frac{\cos \beta}{\sin \alpha} \text{ et } \cos BAa = \frac{\cos \gamma}{\sin \alpha}$$

$$\text{At est } \sin ZAB = -\frac{\cos n}{\sin l} \text{ et } \cos ZAB = \frac{\cos m}{\sin l}$$

unde colligitur

$$Xx 2$$

$$\sin Z\Lambda a = \frac{\cos \beta \cos m + \cos \gamma \cos n}{\sin \alpha \sin l}; \cos Z\Lambda a = \frac{\cos \gamma \cos m - \cos \beta \cos n}{\sin \alpha \sin l}$$

Ducto jam ex  $a$  ad arcum  $ZA$  perpendicularo  $aa$ , erit

$$\Lambda a = \frac{u \, dl}{\sin l} (\cos \gamma \cos m - \cos \beta \cos n) \text{ et } aa = \frac{u \, dl}{\sin l} (\cos \beta \cos m + \cos \gamma \cos n).$$

Verum est  $\Lambda a = -dl$  et  $aa = -d\lambda \sin l$

ideoque hinc et ob analogiam sequentes concluduntur differentialium valores:

$$dl \sin l = u \, dt (\cos \beta \cos n - \cos \gamma \cos m); d\lambda \sin l^2 = -u \, dt (\cos \beta \cos m + \cos \gamma \cos n)$$

$$dm \sin m = u \, dt (\cos \gamma \cos l - \cos \alpha \cos n); dp \sin m^2 = -u \, dt (\cos \gamma \cos n + \cos \alpha \cos l)$$

$$dn \sin n = u \, dt (\cos \alpha \cos m - \cos \beta \cos l); dn \sin n^2 = -u \, dt (\cos \alpha \cos l + \cos \beta \cos m)$$

Hanc autem ternarum priorum binas resolvisse sufficit, cum sit  $\cos l^2 + \cos m^2 + \cos n^2 = 1$ , iisque resolutis unica reliquarum totum negotium absolvit.

### COROLL. I.

810. Si ponamus  $u \cos \alpha = x$ ;  $u \cos \beta = y$  et  $u \cos \gamma = z$ , ut sit ex momentis virium sollicitantium  $P$ ,  $Q$ ,  $R$ ,

$$u \, dx + \frac{cc - bb}{aa} y \, dz = \frac{2gP \, dt}{Maa}; dy + \frac{aa - cc}{bb} x \, dz = \frac{2gQ \, dt}{Mbb};$$

$$dz + \frac{bb - aa}{cc} x \, dy = \frac{2gR \, dt}{Mcc};$$

aut sequentes aequationes adjungi oportet.

$$dl \sin l = dt (y \cos n - x \cos m); dm \sin m = dt (z \cos l - x \cos n);$$

$$dn \sin n = dt (x \cos m - y \cos l); d\lambda \sin l^2 = -dt (y \cos m + z \cos n);$$

$$dp \sin m^2 = -dt (z \cos m + x \cos l); dn \sin n^2 = -dt (x \cos l + y \cos m).$$

### COROLL. 2.

811. Si porro ponamus  $\cos l = p$ ;  $\cos m = q$ ,  $\cos n = r$ , posteriores aequationes has induent formas, ubi  $pp + qq + rr = 1$ :

$$dp + dt (yr - xq) = 0; dq + dt (zp - xr) = 0; dr + dt (xq - yp) = 0$$

et

$d\lambda$

$$d\lambda + \frac{dt(pp+qr)}{qq+rr} = 0; \quad d\mu + \frac{dt(qr+rp)}{pp+rr} = 0; \quad dv + \frac{dt(rp+rq)}{pp+qq} = 0;$$

unde etiam fit  $xdp + ydq + zdr = 0$ , quemadmodum est  $pdp + qdq + rdr = 0$ .

SCHOLIUM.

812. Et si hic problema praecedens, quasi jam esset solutum, spectavi, tamen plerumque ambo problemata conjungi eorumque resolutionem simul institui oportet, quemadmodum in praecedente capite de motu turbinum usu venit. Haec scilicet amborum problematum conjunctio necessaria est, quando vires sollicitantes a situ corporis absoluto pendent, quod quidem, si vires externae affuerint, semper contingere solet. His igitur casibus, momenta virium  $P, Q, R$  arcus  $l, m, n$  ac fortasse etiam angulos  $\lambda, \mu, \nu$  involvent: ita ut omnes aequationes coroll. 1. exhibitae simul perpendi debeant, antequam solutio suscipi queat. Quod si corpus insuper motu progressivo feratur, fieri solet, ut vires etiam ab eo pendeant, ex quo formulas motuum progressivum involventes simul ad reliquas adjici oportebit, quibus casibus solutio maxime complicata reddetur. Nunc igitur his problematibus expeditis problema generale de motu libero corporum rigidorum a viribus quibuscunque sollicitatorum aggredi poterimus.

PROBLEMA. 90.

813. Si corpus rigidum initio quomodocunque projectum deinceps a viribus quibuscunque sollicitetur, quarum actioni libere obsequi queat, ejus motum determinare.

SOLUTIO.

Quod primo ad ejus motum progressivum, seu motum, quo centrum inertiae promovetur, attinet, is per eadem praecepta, quae pro motu punctorum sunt tradita, definitur. Scilicet tota corporis massa, quae sit  $= M$ , in ejus centro inertiae collecta concipiatur, ac singulis momentis omnes vires, quibus corpus sollicitatur, secundum suam quaeque directionem ipsi centro inertiae applicentur; ut habeatur casus puncti, cujus autem massa finita est censenda  $= M$ , a viribus sollicitati, cujus propterea motus per praecepta supra tradita determinari vel saltem formulis analyticis exprimi poterit, nulla habita ratione

XX 3

motus



motus gyrori, quo interea forte corpus circa centrum inertiae agitur. Tum vero ad hunc motum investigandum, priori motu progressivo penitus seposito, centrum inertiae jam ut quiescens consideretur; ac primo quidem corporis terni axes principales explorentur, qui ex centro inertiae  $I$ educti sint  $IA$ ,  $IB$ ,  $IC$ , eorumque respectu momenta inertiae  $Maa$ ,  $Mbb$ ,  $Mcc$ : quibus cognitis sphaera concipiatur immobilis circa centrum inertiae  $I$  descripta, in qua tam circulus maximus  $ZXVY$  quam in eo punctum  $Z$  fixum assumatur, quo situs corporis quovis tempore referatur. Nunc igitur elapso tempore  $t$  teneat corpus ob motum gyrorium situm in figura repraesentatum, in quo axes principales respondeant in superficie sphaerica punctis  $A$ ,  $B$ ,  $C$  quadrantis intervallo a se invicem distantibus: pro quorum situ praesente ponatur;

arcus  $ZA = l$ ,  $ZB = m$  et  $ZC = n$  item

anguli  $XZA = \lambda$ ;  $XZB = \mu$ ,  $XZC = \nu$ ,

qui quomodo a se invicem pendeant, ex sphaericis est manifestum.

Porro gyretur nunc corpus circa axem  $IO$  celeritate angulari  $= s$  in sensum  $ABC$ , ac pro situ hujus axis ponantur arcus  $AO = \alpha$ ,  $BO = \beta$ ,  $CO = \gamma$ ; atque hae sunt quantitates per sua differentialia ita determinanda, ut posito  $t = 0$ , statui corporis initiali convenient. Ad hoc considerentur vires corpus nunc sollicitantes, quarum colligantur momenta inertiae respectu axium principalium corporis: sitque

mom. virium respectu axis  $IA$  in sensum  $BC = P$ ,

mom. virium respectu axis  $IB$  in sensum  $CA = Q$ ,

mom. virium respectu axis  $IC$  in sensum  $AB = R$ ,

atque ponendo brevitatis gratia  $s \cos \alpha = x$ ,  $s \cos \beta = y$ , et  $s \cos \gamma = z$ , ut sit  $s = r \sqrt{xx + yy + zz}$ , supra invenimus fore:

$$dx + \frac{cc - bb}{aa} yz dt = \frac{2gPdt}{Ma^2}$$

$$dy + \frac{aa - cc}{bb} xz dt = \frac{2gQdt}{Mb^2}$$

$$dz + \frac{bb - aa}{cc} xy dt = \frac{2gRdt}{Mc^2}$$

quibuscum, posito  $\cos l = p$ ,  $\cos m = q$  et  $\cos n = r$ , conjungantur hae aequationes:

$$dp + dt (yr - xq) = 0; \quad dq + dt (xp - zr) = 0, \quad dr + dt (xq - yp) = 0$$

$$d\lambda + \frac{dr(yq + zr)}{qq + rr} = 0; \quad d\mu + \frac{dr(zr + xp)}{rr + pp} = 0; \quad dr + \frac{dr(xp + yq)}{pp + qq} = 0,$$

quae si ita resolvi et integrari queant, ut ad quodvis tempus  $t$  assignari possint quantitates  $x, y, z, p, q, r, \lambda, \mu, v$ , problema erit perfecte solutum. In his postremis autem aequationibus notandum est, esse  $pp + qq + rr = 1$ , unde  $pdp + qdq + rdr = 0$ , tum vero etiam  $xdp + ydq + zdr = 0$ . Denique  $\sin(\mu - \lambda) = \frac{-\cos n}{\sin m}$  et  $\cos(\mu - \lambda) = \frac{-\cos j \cos m}{\sin j \sin m}$ . Itaque  $\tan(\mu - \lambda) = \frac{r}{p q}$ ; et  $\tan(v - \mu) = \frac{p}{q r}$ , tum  $\tan(\lambda - v) = \frac{q}{p r}$  seu  $\tan(v - \lambda) = \frac{-q}{p r}$ ; ita ut sufficiat angulorum  $\lambda, \mu, v$  unicum invenisse.

#### SCHOLIUM.

§14. Haec praecepta pro motu corporum rigidorum determinando latissime patent, neque tantum ad motum liberum sunt adstricta: quomocunque enim eorum motus compescitur, sive super plano quodam, sive juxta alia corpora incedere cogantur, sive quodpiam eorum punctum fixum retineatur, quaestio semper ad tradita praecepta reduci potest. Scilicet qua parte aliud corpus contingunt, ibi dabitur pressio, quae primo indefinite in calculum intrudenda deinceps ita determinari debet, ut motus propositis conditionibus consentaneus reddatur; atque etiam hoc modo conflictus corporum explorabitur. Cujusmodi investigationes antequam suscipiamus, casum quendam motus liberi expendi conveniet, in quo motus gyrationis circa axem variabilem locum inveniat, dum corpus a viribus externis sollicitatur; cujusmodi motus a vi gravitatis, quippe cujus directio per centrum inertiae cujusque corporis transit, non producitur. Gravissima autem hujus generis quaestio sine dubio in motu vertiginis corporum coelestium versatur, quae autem nonnisi positis Astronomiae Theoreticae principiis suscipi potest. Consensu autem omnium observationum, quas adhuc instituere licuit, compertum est, corpora coelestia perinde moveri, ac si se mutuo attraherent, vel ad se invicem pellerentur viribus, quae sint in ratione reciproca duplicata distantiarum atque insuper massis proportionales. Scilicet quemadmodum quaevis corpora terram versus gravia sunt, ita etiam nifum quandam habent versus omnia corpora coelestia, qui

qui eo major evadat, quo magis quadratum distantiae diminuat. Atque ex his viribus Astronomi motus progressivos corporum coelestium scrutari solent, quae investigatio cum ad motus punctorum sit referenda, hic tantum in motus gyatorios corporum coelestium inquiremus, quod argumentum in sequente capite generatim ita pertractare studebo, ut Astronomia inde haud contemnenda incrementa sit consecutura.

## CAPUT XVI.

### DE MOTU GYRATORIO SEU VERTIGINIS CORPORUM COELESTIUM.

#### P R O B L E M A. 91.

815. Si corporis rigidi singula elementa sollicitentur versus aliquod punctum  $F$  viribus, quae sint ut eorum massae per quadrata distantiarum ab eo puncto divisae, determinare harum virium momenta respectu axium principalium corporis.

#### S O L U T I O.

Fig. 104. Sint  $IA, IB, IC$  axes principales corporis, eorumque respectu ejus momenta inertiae  $Ma, Mb, Mc$ . Puncti autem  $F$  (scilicet centri virium) a centro inertiae corporis  $I$  distantia ponatur  $IE = s$ , quae ita ad terminos axes principales corporis sit inclinata, ut sint anguli  $AIF = \zeta$ ,  $BIF = \eta$  et  $CIF = \theta$ , hinc demisso ex  $F$  ad planum  $AIB$  perpendiculari  $FE$ , et ex  $E$  ad axem  $IA$  normali  $EA$ , erit  $IA = s \cos \zeta$ ,  $AE = s \sin \zeta$  et  $EF = s \cos \theta$ . Vis porro singula corpora ad punctum  $F$  pollens tanta sit, ut in distantia  $= s$  aequetur gravitati: in aliis autem distantiis secundum quadrata earum diminuat. Consideretur nunc corporis elementum quodcumque  $dM$  in  $Z$ , pro quo sint coordinatae axibus principalibus congruae  $IX = x$ ,  $XY = y$ ,  $YZ = z$ , atque vis, qua hoc elementum  $dM$  ad punctum  $F$  urgetur, erit  $= \frac{2s}{ZF^3} dM$ . Iam haec vis resolvatur secundum directiones axium  $Za, Zb, Zc$ , eritque

$$\text{vis secundum } Zp = \frac{2s(\cos \zeta - x) dM}{ZF^3}$$

vis

$$\text{vis secundum } Zq = \frac{ee(s \cos \eta - y) dM}{ZF^3}$$

$$\text{vis secundum } Zr = \frac{ee(s \cos \theta - z) dM}{ZF^3}$$

atque hinc erunt momenta istarum virium respectu axium principalium:

$$\text{mom. axis IA in sensum BC} = \frac{ees(y \cos \theta - z \cos \eta) dM}{ZF^3}$$

$$\text{mom. axis IB in sensum CA} = \frac{ees(z \cos \zeta - x \cos \theta) dM}{ZF^3}$$

$$\text{mom. axis IC in sensum AB} = \frac{ees(x \cos \eta - y \cos \zeta) dM}{ZF^3}$$

His igitur momentis per totum corpus colligendis obtinebimus momenta, quae supra litteris P, Q, R indicavimus; ita ut sit ob  $s$  quantitatem constantem:

$$P = ees \int \frac{(y \cos \theta - z \cos \eta) dM}{ZF^3}$$

$$Q = ees \int \frac{(z \cos \zeta - x \cos \theta) dM}{ZF^3}$$

$$R = ees \int \frac{(x \cos \eta - y \cos \zeta) dM}{ZF^3}$$

Est autem

$$ZF = r((s \cos \zeta - x)^2 + (s \cos \eta - y)^2 + (s \cos \theta - z)^2)$$

seu ob  $\cos^2 \zeta + \cos^2 \eta + \cos^2 \theta = 1$ :

$$ZF = r(ss - 2sx \cos \zeta - 2sy \cos \eta - 2sz \cos \theta + xx + yy + zz).$$

Cum autem in corporibus coelestibus distantia IF =  $s$  sit semper vehementer magna prae ipso corpore seu quantitativis  $x, y, z$ , erit satis exacte ad nostrum institutum

$$\frac{1}{ZF^3} = \frac{1}{s^3} + \frac{3x \cos \zeta + 3y \cos \eta + 3z \cos \theta}{s^4}$$

Quoniam vero ob I centrum corporis inertiae, et IA, IB, IC ejus axes principales habemus  $\int x dM = 0$ ,  $\int y dM = 0$ ,  $\int z dM = 0$ , atque  $\int xy dM = 0$ ,  $\int xz dM = 0$ ,  $\int yz dM = 0$ , prodibit his factis substitutionibus:

Y y

P

$$P = \frac{3 \int (xy \cos \eta \cos \theta - zx \cos \eta \cos \theta) dM}{s^4} = \frac{3 \int xy \cos \eta \cos \theta dM}{s^3}$$

$$Q = \frac{\int (yy - zz) dM}{s^3} / (xx - yy) dM; R = \frac{3 \int xy \cos \eta \cos \theta dM}{s^3}$$

Verum ob data momenta inertiae est

$\int x^2 dM = \frac{1}{2} M (bb + cc - aa); \int y^2 dM = \frac{1}{2} M (aa + cc - bb)$   
 et  $\int z^2 dM = \frac{1}{2} M (aa + bb - cc)$ : quocirca erit

$$P = \frac{3 M \int xy \cos \eta \cos \theta dM}{s^3}$$

$$Q = \frac{3 M \int xy \cos \eta \cos \theta dM}{s^3}$$

$$R = \frac{3 M \int xy \cos \eta \cos \theta dM}{s^3}$$

#### COROLL. 1.

816. Haec igitur momenta virium non rigore geometrico sunt definita, sed tantum valent, quando distantia puncti attrahentis magnitudinem corporis attracti longe superat. Atque sic commode evenit, ut ea per momenta inertiae tam concinne exprimi potuerint.

#### COROLL. 2.

817. Si corpus attractum omnia momenta inertiae habeat inter se aequalia, etiam haec virium momenta evanescent: etenim ergo tantum motus gyratorius corporum coelestium ab huiusmodi viribus afficitur, quatenus ea non sunt sphaerica, seu saltem momentis inertiae aequalibus praedita.

#### SCHOLION. 1.

818. Si quantum hae vires ad motum progressivum conferant, definire velimus, singulas vires elementares ipsi centro inertiae applicare debemus: quas si pro quolibet axe in unam summam colligamus, habebimus totam vim corpus ad motum progressivum sollicitantem. Ut autem ad binas dimensiones variabilium  $x, y, z$  ascendamus, accuratius valorem  $ZF$  exprimere debemus, ut sit:

$$\frac{1}{ZF^2}$$

$$\frac{1}{ZF^2} = \frac{1}{s^2} + \frac{3(x \cos \zeta + y \cos \eta + z \cos \theta)}{s^4} + \frac{15(x \cos \zeta + y \cos \eta + z \cos \theta)^2}{2s^6} - \frac{3(xx + yy + zz)}{2s^5}$$

Haec formula per  $(s \cos \zeta - x) dM$  multiplicata, et secundum praecepta superiora integrata dabit  $\int \frac{(s \cos \zeta - x) dM}{ZF^3} =$

$$\frac{M \cos \zeta}{ss} + \frac{15 \cos \zeta}{2s^4} \int dM (xx \cos \zeta^2 + yy \cos \eta^2 + zz \cos \theta^2) - \frac{3 \cos \zeta}{2s^4} \int dM (xx + yy + zz) - \frac{3 \cos \zeta}{s^4} \int x x dM$$

quae in hanc formam transmutatur:

$$\frac{M \cos \zeta}{ss} + \frac{3 M \cos \zeta}{2s^4} (aa(3 - s \cos \zeta^2) + bb(1 - s \cos \eta^2) + cc(1 - s \cos \theta^2))$$

Quare nanciscemur sequentes tres vires

$$\text{I. sec. IA} = \frac{M \cos \zeta}{ss} + \frac{3 M \cos \zeta}{2s^4} (aa(3 - s \cos \zeta^2) + bb(1 - s \cos \eta^2) + cc(1 - s \cos \theta^2))$$

$$\text{II. sec. IB} = \frac{M \cos \eta}{ss} + \frac{3 M \cos \eta}{2s^4} (bb(3 - s \cos \eta^2) + aa(1 - s \cos \zeta^2) + cc(1 - s \cos \theta^2))$$

$$\text{III. sec. IC} = \frac{M \cos \theta}{ss} + \frac{3 M \cos \theta}{2s^4} (cc(3 - s \cos \theta^2) + aa(1 - s \cos \zeta^2) + bb(1 - s \cos \eta^2))$$

Haec tres attem vires revocantur primo ad unicam in directione IF sollicitantem, quae est:

$$\frac{M \cos \zeta}{ss} + \frac{3 M \cos \zeta}{2s^4} (aa(1 - s \cos \zeta^2) + bb(1 - s \cos \eta^2) + cc(1 - s \cos \theta^2))$$

cui insuper sunt adiungendae hae ternae

$$1^a \text{ sec. IA} = \frac{3 M a a c c \cos \zeta}{s^4}; \quad 2^a \text{ sec. IB} = \frac{3 M b b c c \cos \eta}{s^4};$$

$$3^a \text{ sec. IC} = \frac{3 M c c c c \cos \theta}{s^4}$$

Y y 2

Unde

Unde patet, si terna momenta inertiae principalia fuerint inter se aequalia, omnes vires ad unicam  $\frac{Mre}{ss}$  secundum IF agentem reduci, quae in Theoria Astronomiae spectatur, reliquis vero casibus vis illa centripeta non erit pure quadrato distantiae reciproce proportionalis, sed eo accedunt insuper exiguae particulae biquadrato distantiae reciproce proportionales, quae autem praeterea a situ corporis respectu virium F pendent: ad quam aberrationem in calculo Astronomico attendisse iuvabit, praecipue si corpora notabiliter a figura sphaerica recedant.

## SCHOLION. 2.

819. Assumsi hic singula corporis elementa versus unicum punctum F urgeri, cum tamen in hypothese Attractionis etiam ad singula corporis attrahentis elementa sollicitentur. Verum si corpus attrahens fuerit sphaera, certum est, id perinde ad se adtrahere, ac si tota ejus massa in centro esset unita; ita ut nostrum problema etiam hos casus in se complectatur. At si corpus attrahens non fuerit sphaericum, mutabitur quidem paulisper tam ratio reciproca duplicata, quam directio, vis, quae non amplius ad certum punctum erit directa: verum haec irregularitas in ingenti distantia penitus evanescere est censenda, praecipue cum corpora coelestia parum a figura sphaerica discrepent. Hic autem quoniam tantum ad motum gyratorium respicio, a motu progressivo mentem abstrahendo, centrum inertiae corporis in quiete considero, ac primo, si ipsum corpus quiescat, circa quoniam axem motum gyratorium sit acceptarum, investigabo.

## PROBLEMA. 92.

Tab.XV. 820. Si corpus quiescat, idque a centro virium F modo ante de-  
Fig.105. finito sollicitetur, definire axem circa quem primo instanti motum gyratorium accipiet, ac celeritatem angularem inde genitam.

## SOLUTIO.

Corpus ergo in quiete consideramus, seu potius ab ejus motu progressivo mentem abstrahimus: ejus igitur centro inertiae in centro sphaerae constituto sint A, B, C poli axium principalium, eorumque respectu, ut hactenus, momenta inertiae  $Maa$ ,  $Mbb$ ,  $Mcc$ . Iam recta ex centro inertiae ad centrum virium ducta trajiciat superficiem sphaericam in puncto F, ut sint arcus  $AF = \angle$ ,  $BF = \varphi$ ,  $CF = \theta$ ; distantia autem centri virium sit  $= s$ , ejusque vis attrahens tanta, ut in distantia  $= e$  aequ-

aequetur gravitati. Hinc virium momenta  $P$ ,  $Q$ ,  $R$  respectu axium principalium  $IA$ ,  $IB$ ,  $IC$  sunt:

$$P = \frac{3Mee(cc-bb)\cos\eta\cos\theta}{s^3}; \quad Q = \frac{3Mee(aa-cc)\cos\zeta\cos\theta}{s^3}$$

$$\text{atque } R = \frac{3Mee(bb-aa)\cos\zeta\cos\eta}{s^3}.$$

Quare ex §. 806. corpus gyrari incipiet circa ejusmodi axem  $IO$ , ut positus arcubus  $AO = \alpha$ ,  $BO = \beta$ ,  $CO = \gamma$  futurum sit

$$\cos \alpha = \frac{P}{aa} : r \left( \frac{PP}{aa} + \frac{QQ}{bb} + \frac{RR}{cc} \right)$$

$$\cos \beta = \frac{Q}{bb} : r \left( \frac{PP}{aa} + \frac{QQ}{bb} + \frac{RR}{cc} \right)$$

$$\cos \gamma = \frac{R}{cc} : r \left( \frac{PP}{aa} + \frac{QQ}{bb} + \frac{RR}{cc} \right)$$

tempusculo antem  $dt$  acquireret celeritatem angularem nascentem  $d\omega =$

$$\frac{2gdt}{M} r \left( \frac{PP}{aa} + \frac{QQ}{bb} + \frac{RR}{cc} \right)$$

quae in sensum  $ABC$  erit directa. Atque ex his distantia poli gyrationis  $O$  a puncto  $F$  ita reperitur expressa, ut sit

$$\cos OF = \left( \frac{P\cos\zeta}{aa} + \frac{Q\cos\eta}{bb} + \frac{R\cos\theta}{cc} \right) : r \left( \frac{PP}{aa} + \frac{QQ}{bb} + \frac{RR}{cc} \right).$$

#### COROLL. 1.

821. Memoratu hic dignus est casus, quo centrum virium  $F$  cadit intra binos polos principales: cadat enim punctum  $F$  in arcum  $AB$  et ob  $\cos \theta = 0$ , et  $\cos \zeta^2 + \cos \eta^2 = 1$ , erit  $P = 0$ ,  $Q = 0$  et  $R =$

$$\frac{3Mee(bb-aa)\cos\zeta\cos\eta}{s^3}; \quad \text{unde etiam fit. } \cos \alpha = 0, \text{ et } \cos \beta = 0, \text{ et } \cos \gamma$$

$= 1$ , ita ut polus gyrationis  $O$  cadat in polum principalem  $C$ .

#### COROLL. 2.

822. Eodem casu, quo centrum virium est in plano  $AIB$ , et corpus circa axem  $IC$  gyrari incipit, primo tempusculo  $dt$  acquirit celeritatem angularem nascentem  $d\omega = \frac{3g e e (bb-aa) dt \sin \zeta \cos \zeta}{cc s^3}$  in sensum  $AB$ ,

$$\text{sen } d\omega = \frac{3g e e (bb-aa) dt \sin 2\zeta}{cc s^3}.$$

Yy 3

CQ.



## COROLL. 3.

823. Quod si ergo eodem casu corpus jam habuerit motum gyrationem circa istum axem IC celeritate  $= s$  in sensum AB, is ob vim sollicitantem versus centrum virium F tendentem accelerabitur, ita ut fiat

$$ds = \frac{3gct(bb-aa)dt\sin 2\zeta}{ccs}$$

## SCHOLION.

824. Hinc ergo evidens est, si centrum virium F ita circa corpus circumferatur; ut per circulum maximum AB duos axes principales IA et IB continentem incedat, corpusque circa reliquum axem principalem IC gyrationem coeperit: tum perpetuo circa eundem axem IC esse gyraturum, solamque celeritatem angularem  $s$  modo auctum modo minus iri. Casus hic omnino dignus est, qui omni studio evolatur: quoniam motum libratorium lunae, quo semper fere eandem faciem terrae obvertit, complecti videtur. Quae investigatio quo faciliior et clarior reddatur, primo centrum virium motu uniformi circa corporis centrum inertiae in eodem plano circumferri, ac perpetuo eandem distantiam servare assumamus.

## PROBLEMA. 93.

825. Si corpus gyretur circa suum axem principalem IC, centrum virium autem F in plano ad eum normali uniformiter circumferatur, ejus distantia a centro inertiae corporis eadem manente, definire motum gyrationum hujus corporis.

## SOLUTIO.

Fig. 106. Quoniam ergo axis gyrationis IC manet constans, et coeli respectu quasi fixus: sit XCY hemisphaerium coeleste, et XY circulus maximus polo C descriptus, in quo centrum virium F uniformiter incedat, atque in hoc circulo quoque constanter inerunt bini reliqui poli principales corporis A et B. Ponatur celeritas angularis centri virium  $F = d$ , quod cum initio fuisset in X, tempore elapso  $= t$  arcum descripserit necesse est  $XF = dt$ . Eodem autem temporis momento alter axis principalis reperiatur in A, positoque arcu  $XA = \lambda$ , si celeritas angularis corporis circa axem IC sit  $= s$ , in sensum AB, erit  $d\lambda = sdt$ . Tum vero ob  $AF = dt - \lambda$ , quod supra erat  $\zeta$ , hic nobis est  $dt - \lambda$ ; at retentis reliquis quantitativibus  $aa$ ,  $bb$ ,  $cc$ , itemque  $ss$  et  $t$ , quae sunt constantes;

stantes, ut supra, habebimus hanc aequationem  $dx = \frac{3gee(bb-aa)}{ccs^3}$   
 $dt \sin 2\zeta$ . Introducamus autem angulum  $ACF = \zeta$ , et ob  $\zeta = \delta t - \lambda$ ,  
 nanciscamur  $\lambda = \delta t - \zeta$  et  $d\lambda = \delta dt - d\zeta = xdt$ , unde sit  $x = \frac{d\zeta}{dt}$ .  
 Quocirca sumpto elemento  $dt$  constante prodit haec aequatio re-  
 solvenda:

$$d\zeta + \frac{3gee(bb-aa)}{ccs^3} dt^2 \sin 2\zeta = 0.$$

Statuamus brevitatis gratia  $\frac{3gee(bb-aa)}{ccs^3} = N$ , et multiplicando per  
 $2d\zeta$  fit

$$2d\zeta dd\zeta + 2N dt^2 d\zeta \sin 2\zeta = 0$$

cujus integralis est:  $d\zeta^2 - N dt^2 \cos 2\zeta = C dt^2$ , unde colligitur  $dt =$   
 $\frac{d\zeta}{\sqrt{r(C+N\cos 2\zeta)}}$

$$\text{atque } x = \delta - r(C+N\cos 2\zeta).$$

Ex illa autem aequatione ad quodvis tempus  $t$  arcum  $AF = \zeta$  definiri  
 oportet, qui si esset constans, corpus perpetuo eandem faciem centro  
 virium  $F$  obverteret. Quatenus ergo  $N$  non est  $= 0$ , et angu-  
 lus  $\zeta$  variationi obnoxius, celeritas angularis  $x$  est variabilis: ad quae  
 phaenomena exploranda binos casus evolvi decet, prout fuerit vel  $bb$   
 $> aa$  vel  $bb < aa$ , quorum uterque pro ratione constantis  $C$  infinitam  
 varietatem complectitur.

C A S U S. I. quo  $bb > aa$ .

226. Sit igitur  $\frac{3gee(bb-aa)}{ccs^3} = n$  numero positivo, et dum cen-  
 trum virium  $F$  celeritate  $\delta$  per circulum  $XFY$  progreditur, et ad tem-  
 pus  $t$  arcus  $FA$  in antecedentia vergens vocetur  $= \zeta$ , erit  $dt =$   
 $\frac{d\zeta}{\sqrt{r(C+n\cos 2\zeta)}}$

ubi ratione constantis  $C$  sequentia annoto:

1°. Si  $C = -n$ , (nam valorem negativum majorem habere ne-  
 quit), erit  $dt = \frac{d\zeta}{r n (-1 + \cos 2\zeta)}$ , ideoque angulus  $\zeta$  necessario est  
 $= 0$ ; scilicet punctum  $A$  cum  $F$  semper congruet, cum eoque unifor-  
 miter circa axem  $IA$  gyrabitur,

2°. Si

2°. Si  $C = 0$ , angulus  $\zeta$  minor erit semirecto sive positivus sive negativus, et intra limites  $+45^\circ$  et  $-45^\circ$  vagabitur: Punctum A ergo nunquam ultra  $45^\circ$  a puncto F recedet, sed modo ante modo post

id reperietur, qui motus ex aequatione  $dt = \frac{d\zeta}{r n \cos 2\zeta}$  colligi debet.

3°. Si  $C = n$ ; et aequatio  $dt = \frac{d\zeta}{r n (1 + \cos 2\zeta)}$  abit in hanc  $dt =$

$\frac{d\zeta}{\cos \zeta r 2n}$ , quae integrata dat  $t = \frac{1}{r 2n} \log (45^\circ + \frac{1}{2} \zeta)$ , si sumto  $t = 0$  fuerit  $\zeta = 0$ , unde patet demum elapso tempore infinito fieri  $\zeta = 90^\circ$ .

4°. Si  $C > n$ , punctum A ab F tempore finito ad  $90^\circ$  digredietur, indeque porro in oppositum ipsi F punctum progredietur, et ad alteram partem circumeundo iterum in F revertet. Sit enim  $C = mmn$ ,

existente  $mm$  numero unitate majore, ob  $dt = \frac{d\zeta}{r n (mm + \cos 2\zeta)}$ , erit

proxime  $dt = \frac{d\zeta}{r n} \left( \frac{1}{m} - \frac{\cos 2\zeta}{2m} \right)$  et integrando  $r n = \frac{\zeta}{m} - \frac{\sin 2\zeta}{4m^2}$ : unde patet angulum  $\zeta$  successive per omnes valores migrare.

5°. Haecenus posuimus  $\delta < \delta$ , ita ut motus puncti F celerior sit, quam gyratorius circa axem IC: si contrarium eveniat, tantum signum formulae  $r (C + n \cos 2\zeta)$  mutari debet.

C A S U S. II. quo  $bb < aa$ .

827. Sit igitur  $\frac{3gee(aa - bb)}{ccs3} = n$ , erit  $dt = \frac{d\zeta}{r (C - n \cos 2\zeta)}$

et  $\delta = \delta - r (C - n \cos 2\zeta)$ : in quibus formulis si ponatur  $\zeta = 90^\circ + \Phi$ , ut jam  $\Phi$  denotet distantiam poli B a centro virium F antecedentia verfis sumtam, resultabunt formulae praecedentes, quae propterea eadem phaenomena exhibebunt.

C O R O L L. I.

828. Si ergo ponamus centrum virium F initio cum polo A convenisse existente  $bb > aa$ ; corpus semper eandem faciem puncto F

# SEU VERTIGINIS CORPORUM COELESTIUM. 161

F obvertet, si celeritas angularis ipsi celeritati centri virium  $\delta$  fuerit aequalis.

## COROLL. 2.

829. Sin autem initio, quo F cum A conveniebat, celeritas corporis angularis  $\delta$  sit aliquanto major vel minor quam  $\delta$ , ut differentia non superet  $r^{2n} = r \frac{\delta g e a (b b - a a)}{c c r^2}$ : polus A utrinque ab F digreditur non ultra certum intervallum, et circa punctum F quasi oscillationes peragere videbitur; in quo utique similitudo cum motu lunae libratorio cernitur.

## COROLL. 3.

830. In hujusmodi ergo motu libratorio celeritas angularis corporis est maxima vel minima, dum punctum A ipsi F conjungitur, ab eo vel in consequentia vel in antecedentia digressurum: unde celeritas minima major est, quam  $\delta - r^{2n}$ . Fieri igitur potest, ut talis motus oriatur, dum initio corpus plane nullum habuit motum gyrationis.

## SCHOLION. 1.

831. Dubium ergo reliquitur nullum, quin motus libratorius lunae hac ratione oriatur; atque adeo probabile videtur, in luna eum casum locum habere, quo lunae initio nullus plane motus gyrationis fuerat impressus; tum autem axem lunae principalem IA, cujus respectu momentum inertiae  $Maa$  est minimum, terram versus fuisse directum. Quoniam igitur novimus, digressiones poli A ab F esse minimas, tempus harum oscillationum definire poterimus; cum enim arcus AF =  $\zeta$

sit valde parvus, erit  $\cos 2\zeta = 1 - 2\zeta^2$ , ideoque  $d\zeta = \frac{d\zeta}{r(C+n-2n\zeta^2)}$ ,

unde fit integrando  $r^{2n} = A \int \frac{\zeta r^{2n}}{r(C+n)}$ . Quare cum in digressionem maxima fiat  $\zeta = r \frac{C+n}{2n}$ , erit tempus, quo punctum A ab F ma-

xime digreditur,  $= \frac{\pi}{2r^{2n}}$  secundis, cujus duplum  $\frac{\pi}{r^{2n}}$  dabit tempus, quo polus A ab F digressus iterum eodem redit. Tum autem celeritas angularis minima, quando scilicet polus A ab F in antecedentia digreditur, erit  $= \delta - r^{2n}$ : quae ut evanescat, constans C esse debet.

bet =  $\delta - \pi$ , nunde digressio maxima hoc casu fuerit =  $\frac{\delta}{r_{2n}}$  necesse est. Consideremus nunc etiam tempus unius revolutionis centri virium F, quod est =  $\frac{2\pi}{\delta}$  min. sec. ejus, dimidium si aequale sit uni oscillatio-

ni poli A =  $\frac{\pi}{r_{2n}}$ , fiet  $\delta = r_{2n}$ , seu  $\pi = \frac{\delta}{2}$ ; ideoque C =  $\frac{\delta}{2} = \pi$ ; neque ergo digressio amplius foret minima, uti assumseramus.

## SCHOLION. 2.

832. Hinc igitur concludimus, motum lunae libratorium non ita explicari posse, ut statuamus lunae initio nullum plane motum gyratorium fuisse impressum: sed potius cum vehementer verisimile sit, lunam, si ea circa terram in orbita circulari uniformiter circumferretur, quae est hypothesis nostri problematis, perpetuo eandem plane faciem nobis esse obversuram, neque ullam nutationem in ea observatum iri: in eadem hypothesi statuere debemus, lunae initio talem motum gyratorium fuisse impressum, ut praecise fuerit celeritas angularis =  $\delta$ , nempe celeritati terrae circa lunam, et simul axem ejus IA terram versus fuisse directum. Hoc autem satis probabile videtur: cum enim respectu axis IA momentum inertiae sit minimum, ideoque lunae, si ejus corpus sphaeroides oblongum statuatur, axis maximus, causa esse potuit, quae initio hunc axem ad terram direxerit, atque eidem causae fortasse tribuendum est, quod dum luna primum motum accepit, hic ipse axis directionem suam versus terram conservaverit: quod idem est, ac si celeritas angularis prima ipsi celeritati terrae  $\delta$  fuisset aequalis. Cum igitur luna, si circumulum circa terram motu uniformi describeret, nobis constanter eandem faciem esset obversura, ejus librationes observatae motui lunae irregulari, quo modo celerius modo tardius incedit, tribui debent. Quare etiam praecedens problema in hac hypothesi resolvamus, ut punctum F neque uniformiter circumferri, neque perpetuo eandem distantiam a centro inertiae corporis tenere assumamus.

## PROBLEMA. 94.

833. Si corpus gyrenit circa suum axem principalem IC, centrum virium autem F in plano ad eum normali neque uniformiter neque in eadem distantia circumferatur: initio vero axis IA fuerit ad centram virium

# SEU VERTIGINIS CORPORUM COELESTIUM. 363

virium F directus similemque motum acceperit, definire motum corporis libratorium.

## SOLUTIO.

Motus corporis irregularis puncti F ita exprimi poterit, ut tempore  $t$ , descriperit arcum  $XF = \delta t + a \sin At$ ; ac pro distantia variabili sit  $\frac{r}{r_0} = \frac{r_0}{r_0} (1 + G \cos At)$ . Quare si jam celeritas angularis sit  $= u$ , posito arcu  $XA = \lambda$ , erit  $d\lambda = u dt$ , et vocato arcu  $AF = \zeta$  habebimus  $ds = \frac{3 G c c (bb - aa) dt \sin 2\zeta}{ccs^3}$ . Cum igitur sit  $\lambda = \delta t + a \sin At$

$At - \zeta$ , erit  $u = \delta + Aa \cos At - \frac{d\zeta}{dt}$ , ideoque posito  $\frac{3 G c c (bb - aa)}{ccs^3}$   
 $= u$  erit

$$- A A a d s \sin At - \frac{d d \zeta}{d t} = n d t (1 + G \cos At) \sin 2 \zeta.$$

Quod si jam assumamus arcum  $\zeta$  semper manere valde parvum, habebimus hanc aequationem

$$\frac{d d \zeta}{d t^2} + A A a \sin At + 2 n \zeta (1 + G \cos At) = 0,$$

cui proxime satisfieri potest ponendo  $\zeta = m \sin At$ , unde fit  $- A A m \sin At + A A a \sin At + 2 m n \sin At = 0$  ob terminum  $G \cos At$  praevalde

parvum. Hinc ergo adipiscimur  $m = \frac{A A a}{A A - 2 n}$ , ideoque  $\zeta = \frac{A A a}{A A - 2 n}$

$\sin At$ , unde fit  $u = \delta + Aa \cos At - \frac{A^2 a \cos At}{A A - 2 n} = \delta - \frac{2 A a n}{A A - 2 n} \cos At$ .

Hic cum sit  $XF = \delta t + a \sin At$ , pars prior  $\delta t$  vocatur locus medius puncti F, et pars altera  $a \sin At$  ejus aequatio seu prostaphaeresis, unde patet digressionem FA huic prostaphaeresi esse proportionalem, eaque majorem ob  $n$  numerum positivum. Ita evanescente prostaphaeresi, seu quoties locus verus cum medio congruit, toties corpus eandem faciem centro virium F obvertit, neglectis quidem minoribus inaequalitatibus, quas ratio quantitatis  $G$  inveharet. Verum haec fusius prosequi, atque accuratius determinare sine majori astronomiae cognitione haud convenit.

## COROLL. 1.

834. Si ergo inaequalitas motus puncti F ita exprimitur, ut tempore  $t$  conficiat arcum  $XF = bt + a \int \Lambda t$ , eodem tempore fit arcus librationis  $FA = \zeta = \frac{AAa}{AA-2n} \int \Lambda t$ , existente  $n = \frac{3gee(bb-aa)}{ccf^2}$ , ubi  $f$  distantiam mediam centri virium F denotat.

## COROLL. 2.

835. Si hunc arcum librationis  $\zeta$  accuratius definire velimus, variabilitas distantiae  $FI = s$  etiam in computum ingreditur, ita ut si fuerit

$$\frac{1}{f^3} = \frac{1}{f_1^3} (1 + G \cos \Lambda t), \text{ reperitur } \zeta = \frac{AAa}{AA-2n} \sin \Lambda t + \frac{n a G}{4(AA-2n)} \int 2\Lambda t.$$

## COROLL. 3.

836. Simili modo si generatius fuerit arcus tempore  $t$  confectus  $XF = C + bt + a \int (\Lambda t + \Lambda') + a' \int (\Lambda' t + \Lambda'') \&c.$  et  $\frac{1}{f^3} = \frac{1}{f_1^3} (1 + G \cos (\Lambda t + \Lambda) + G' \cos (\Lambda' t + \Lambda') \&c.)$ , invenitur proxime arcus librationis

$$FA = \zeta = \frac{AAa}{AA-2n} \int (\Lambda t + \Lambda) + \frac{AA'a'}{AA'-2n} \int (\Lambda' t + \Lambda') + \&c.$$

## SCHOLION. 1.

837. Hic jam perinde est, five numerus  $n = \frac{3gee(bb-aa)}{ccf^2}$  sit positivus five negativus: nequa conditio superius requisita, ut pro arcu  $\zeta$  evanescente esse debeat  $bb > aa$ , amplius locum habet. Casu enim si

(837.) si ponatur  $C = n$  fit  $dy - 2n = \frac{d\zeta}{f^2}$ , et  $y - 2n = 2 \tan \frac{1}{2} \zeta - \text{Const.}$

unde si initio  $t = 0$ , fuerit  $\zeta = 0$ , constans addenda sit infinita, ideoque nonnisi elapso tempore infinito punctum A ad F discedetur. Quare dum punctum F uniformiter in circulo circumferretur, quicumque axis principalis initio ad punctum F fuerit directus, cum eoque pari celeritate gyroni coeperit, ita ei constanter manebit annexus. Ac si deinceps punctum F motum suum vel intendat vel remittat, polus A ad

eo digredietur secundum formulas inventas. Quia etiam patet, si fuerit  $n = 0$ , seu  $bb = aa$ , quo casu corpus uniformiter circa polum C gyraretur, digressiones  $\zeta$  perpetuo differentiae inter locum medium et verum puncti F futuras esse aequales: At si numerus  $n$  sit positivus seu  $bb > aa$ , digressiones ista differentia essent majores, contra autem si  $bb < aa$  minores. Ceterum numerus  $A$  inaequalitatem motus definiens, ex tempore quo inaequalitas  $\sin At$  ad eosdem valores revertitur, colligi potest, quod si eveniat post tempus  $= \odot$  min. sec. erit  $A\odot = \pi$  ideoque  $A = \frac{\pi}{\odot}$ .

### SCHOLION. 2.

8:8. Hinc patet motum libratorium lunae, quo non semper eandem faciem terrae obvertit, potissimum defectui uniformitatis motus, quo terra circa lunam, seu quod idem est, luna circa terram circumferri videtur, tribui debere, neque huc inaequalitatem momentorum principalium in luna multum conferre, quoniam ea tantum coefficientes terminorum afficiuntur. Libratio scilicet adesse posset, etiam si luna esset corpus sphaericum, seu ejus momenta principalia aequalia. Verum tum nulla ratio patet, cur lunae initio praecise tantus motus gyriorius fuisset impressus, quantum formulae nostrae exhibent: si autem luna sit corpus sphaeroidicum sive oblongum sive compressum, rationem quodammodo intelligere licet, ob quam initio quidam axis principalis reliquis notabilior terram respicere inceperit: Verum autem sit sphaeroides oblongum an compressum? ex quantitate librationis dijudicare licet, quae si excedat differentiam inter locum lunae verum ac medium, indicet esse  $bb > aa$ , seu axem lunae terrae obversum momento minimo gaudere. Verum hic non est locus quicquam definiendi, cum etiam luna ad solem urgeatur, indeque libratio turbetur: praeterea vero quoque uti luna non in eodem plano circa terram movetur, ita etiam vicissim motus centri virium F non in eodem plano circa lunam absolvetur, ex quo haec investigatio vehementer intricata reddetur; ut in tractatu generali locum invenire nequeat. Ceterum hoc semper insigne foret mysterium, quod luna initio praecise tantum motum gyriorium, quantum hic librationis casus postulat, acceperit: si enim vel majorem vel minorem accepisset, labente tempore tandem facies opposita nobis obverti debuisset. Interim tamen hoc phaenomenon praescriptum celeritatis gradum non tam exacte postulat, quoniam et si



fuerit tantillo vel maior vel minor, librationes tamen ob problema praecedens contingere deberent; unde illud mysterium haud leviter illustratur. Talis autem latitudo admitti nequit, nisi casu quo  $bb' > aa$ ,

scu  $n > 0$ ; aequatio enim differentialis  $\frac{dd\zeta}{dt^2} + AAa \zeta \Lambda t + 2n\zeta (1 + C \cos \Lambda t) = 0$  generalius accedente constante arbitraria ita integrari potest, ut sit  $\zeta = C \sin t \gamma^{2n} + \frac{AAa}{AA-2n} \zeta \Lambda t$ , unde fit celeritas angularis  $\dot{\zeta} = \delta - C \gamma^{2n} \cos t \gamma^{2n} - \frac{2AAa}{AA-2n} \cos \Lambda t$ ; ubi etiam pro  $t \gamma^{2n}$  scribi potest  $(t + \gamma) \gamma^{2n}$ , ita ut  $C$  et  $\gamma$  pro lubitu assumi queant. Quare cum initio  $t = 0$  fuerit  $\zeta = C \zeta \gamma^{2n}$ , dum celeritas angularis impressa sit  $\dot{\zeta} = \delta - C \gamma^{2n} \cos \gamma \gamma^{2n} - \frac{2AAa}{AA-2n}$ , atque  $C$  sit fractio satis parva, motus libratorius sequetur, ut constanter pars quaedam lunae nobis maneat abscondita. At vero etiam fractio  $\frac{AAa}{AA-2n}$  esse debet valde parva, ut pro  $\zeta$  recte scribere liceat  $\zeta$ .

## SCHOLION. 3.

339. Explicatio ergo motus libratorii lunae huc redit, ut statuamus, lunae corpus esse sphaeroides oblongum, cujus major axis, vel is cujus respectu momentum inertiae est minimum, initio terram versus directus, lunae autem tum circa axem ad planum orbitae terrestris normalem impressus fuerit motus gyratorius, cujus celeritas angularis propemodum motui lunae medio fuerat aequalis, in quo quidem insignis latitudo locum habere potest. Quin etiam sufficit, dummodo axis gyrationis propemodum fuerit ad planum orbitae terrestris normalis, et axis major propemodum tantum terram versus directus: namque etiam his casibus nutatio disci lunae reciproca evenire debet, etiam si eam haud facile determinare liceat. Quare hoc casu relicto ad alias motus gyratorii perturbationes a viribus centripetis ortas progrediamur, unde nutatio axis terrae explicari possit.

## P R O B L E M A. 95.

340. Si corpus gyratur circa axem, qui alicui atri principali fuerit proximus, ac simul alicui centri virium subiciatur, determinare nutationem

tionem momentaneam, tam in ipso axe gyrationis quam in celeritate angulari productam.

### SOLUTIO.

Sint A, B, C, terni poli principales corporis, eorumque respectu Fig. 107. momenta inertiae  $Maa$ ,  $Mbb$ ,  $Mcc$ , corpus autem nunc gyretur circa polum O ipsi A proximum celeritate angulari  $\omega$  in sensum ABC; unde positis ternis arcibus  $OA = \alpha$ ,  $OB = \zeta$ ,  $OC = \gamma$ , erit arcus  $\alpha$  valde parvus, at  $\zeta$  et  $\gamma$  minime a quadrante discrepabunt, ita ut sit  $\cos \alpha = 1$  et  $\cos \zeta = \cos \gamma = 0$ . Quare posito  $x = \omega \cos \alpha$ ,  $y = \omega \cos \zeta$  et  $z = \omega \cos \gamma$ , hae litterae  $y$  et  $z$  pro evanescentibus haberi poterunt, neque tamen earum differentialia, quae erunt  $dy = -\omega d\zeta$  et  $dz = -\omega d\gamma$ . Transeat jam recta ad centrum virium ducta per punctum F, sinque arcus  $AF = \zeta$ ,  $BF = \eta$ ,  $CF = \theta$ ; distantia autem centri virium ponatur  $= r$ , ejusque vis attrahens tanta, ut in distantia  $= r$  aequetur gravitati. Ab actione ergo hujus vis quantitates  $x$ ,  $y$ ,  $z$  tempusculo  $dt$  ita immutabuntur, ut sit

$$\begin{aligned} dx + \frac{cc-bb}{aa} yzdt &= \frac{6gee(cc-bb)dt \cos \eta \cos \theta}{aa r^3} \\ dy + \frac{aa-cc}{bb} xzdt &= \frac{6gee(aa-cc)dt \cos \zeta \cos \theta}{bb r^3} \\ dz + \frac{bb-aa}{cc} xydt &= \frac{6gee(bb-aa)dt \cos \zeta \cos \eta}{cc r^3} \end{aligned}$$

Cum nunc sit  $dx = d\omega$ , ob  $y$  et  $z$  evanescentes, erit

$$\begin{aligned} d\omega &= \frac{6gee(cc-bb)dt \cos \eta \cos \theta}{aa r^3} \\ -\omega d\zeta &= \frac{6gee(aa-cc)dt \cos \zeta \cos \theta}{bb r^3} \\ -\omega d\gamma &= \frac{6gee(bb-aa)dt \cos \zeta \cos \eta}{cc r^3} \end{aligned}$$

Quam variationem quo diligentius exploremus, quaeramus arcum FO,

$$\begin{aligned} \text{at ob } \angle BAO &= \frac{\cos \gamma}{\sin \alpha}; \cos BAO = \frac{\cos \zeta}{\sin \alpha}; \angle BAF = \frac{\cos \theta}{\sin \zeta}; \cos BAF = \\ \frac{\cos \eta}{\sin \zeta} \text{ fit } \angle FAO &= \frac{\cos \gamma \cos \eta - \cos \zeta \cos \theta}{\sin \alpha \sin \zeta} \text{ et } \cos FAO = \frac{\cos \zeta \cos \eta + \cos \gamma \cos \theta}{\sin \alpha \sin \zeta} \end{aligned}$$

hinc.

368. CAPUT XVI. DE MOTU GYRATORIO

hincque  $\cos FO = \cos \zeta \cos \eta + \cos \gamma \cos \theta + \cos \alpha \cos \zeta$  : cuius differentiale dat,

$$(Fo - FO) \text{ si } FO = d\zeta \cos \eta + d\gamma \cos \theta \text{ ob } \text{si } \zeta = \text{si } \gamma = 1 \text{ et } \text{si } \alpha = 0.$$

Quare cum sit  $FO = FA = \zeta$  habebitur

$$(Fo - FO) \text{ si } \zeta = - \frac{d\zeta \cos \zeta \cos \eta \cos \theta}{\zeta^3} \left( \frac{aa - cc}{bb} + \frac{bb - aa}{cc} \right)$$

$$\text{seu } Fo - FO = \frac{d\zeta \cos \zeta (cc - bb) \cos \eta \cos \theta}{\zeta^3} \text{ ob}$$

$$\text{tang } BAO = \frac{\cos \gamma}{\cos \zeta}$$

Pro sita autem puncti  $o$  inveniendō habemus

$$\text{differentiando: } \frac{-O Ao.}{\cos BAO} = \frac{-d\gamma \cos \zeta \text{ si } \gamma + d\zeta \cos \gamma \text{ si } \zeta}{\cos \zeta^2} \text{ ideoque}$$

$$O Ao = \frac{d\gamma \cos \zeta \text{ si } \gamma - d\zeta \cos \gamma \text{ si } \zeta}{\text{si } \alpha^2} \text{ et } Oo = r (d\zeta^2 + d\gamma^2). \text{ Tum}$$

$$\text{vero cum sit } da = \frac{-d\zeta \text{ si } \zeta \cos \zeta - d\gamma \text{ si } \gamma \cos \gamma}{\text{si } \alpha \cos \alpha} \text{ oritur tang } OoA =$$

$$\frac{d\zeta \text{ si } \zeta \cos \gamma - d\gamma \text{ si } \gamma \cos \zeta}{d\zeta \text{ si } \zeta \cos \zeta + d\gamma \text{ si } \gamma \cos \gamma} \text{ ob } \cos \alpha = 1, \text{ seu tang } OoA = \frac{d\zeta \cos \gamma - d\gamma \cos \zeta}{d\zeta \cos \zeta + d\gamma \cos \gamma}$$

COROLL. 1.

841. Si momenta inertiae respectu axium  $IB$  et  $IC$  sint aequalia seu  $bb = cc$ , primo fit  $da = 0$ , seu celeritas angularis nullam patitur mutationem: tum vero erit

$$d\zeta = \frac{-d\zeta \cos \zeta (aa - cc) d\cos \zeta \cos \theta}{\zeta^3} \text{ et } d\gamma = \frac{d\zeta \cos \zeta (aa - cc) d\cos \zeta \cos \eta}{\zeta^3}$$

ita ut sit  $d\zeta \cos \eta + d\gamma \cos \theta = 0$ .

COROLL. 2.

842. Hoc porro casu  $bb = cc$ , fit  $Fo - FO = 0$ , seu polus gyrationis  $O$  ita transfertur in  $o$ , ut spatium  $Oo$  sit normale ad arcum

$$FO: \text{ est hoc spatium } Oo = \frac{d\zeta \cos \zeta (aa - cc) d\cos \zeta \text{ si } \zeta}{\zeta^3}, \text{ sed jam quaeritur utrum ab } O \text{ versus } FA, \text{ an contra sit directum.}$$

CO.

## COROLL. 3.

843. Cum autem sit  $\angle FO$ ;  $\angle FAO = \angle AO$ ;  $\angle AFO$  erit  $\angle AFO = \cos \gamma \cos \eta - \cos \zeta \cos \theta$

Iam quia FO non variatur, fiet secundum figuram, ubi O ad AF accedere sumitur;

$$-O\dot{F}o \cdot \cos AFO = \frac{-d\gamma \cos \eta + d\zeta \cos \theta}{\sin \angle FFO} = \frac{-d\gamma \cos (aa - cc) dt \sin \angle \cos \zeta}{\sin \angle FFO}$$

ideoque  $O\dot{F}o = \frac{d\gamma \cos (aa - cc) dt \sin \angle \cos \zeta}{\sin \angle FFO \cos AFO}$ . Cum igitur sit angulus

AFO infinite parvus, et  $\cos AFO = 1$ , et  $FO = FA = \zeta$ , erit  $O\dot{F}o = \frac{d\gamma \cos (aa - cc) dt \cos \zeta}{\sin \angle}$

Ergo si  $aa > cc$ , punctum O ad arcum AF accedit, vel circa A in sensum CB procedit.

## SCHOLIUM.

843. Casus hic quo  $bb = cc$ , ita ut corpus duo habeat momenta principalia respectu axium IB et IC aequalia, et propemodum circa axem singularem IA gyretur celeritate angulari  $\gamma$  in sensum BC, praecipue locum habet in motu vertiginis terrae, ideoque meretur plenius evolvi. Quod quo facilius fieri possit, cum sit  $AO = a$ , ponatur angulus  $BAO = \rho$  erit  $90 - \zeta = a \cos \rho$  et  $90 - \gamma = a \sin \rho$ , unde  $\zeta = 90^\circ - a \cos \rho$  et  $\gamma = 90^\circ - a \sin \rho$ . Quodsi ergo brevitatis gratia ponamus  $\frac{d\gamma \cos (aa - cc)}{\sin \angle} = N$ , ut sit  $d\zeta = -2Ndt \cos \angle \cos \theta$  et  $d\gamma =$

$2Ndt \cos \angle \cos \eta$ , erit  $-da \cos \rho + ad\rho \sin \rho = -2Ndt \cos \angle \cos \theta$  et  $-da \sin \rho - ad\rho \cos \rho = 2Ndt \cos \angle \cos \eta$ ; unde colligitur

$$da = 2Ndt \cos \angle (\cos \rho \cos \theta - \sin \rho \cos \eta)$$

$$\text{et } ad\rho = -2Ndt \cos \angle (\sin \rho \cos \theta + \cos \rho \cos \eta).$$

Si jam centro virium F motum quemcunque tribuamus, etiam tandem his formulis uti poterimus, quamdiu arcus  $AO = a$  manet tam parvus, ut contractiones adhibitas locum habere possint.

## PROBLEMA. 96.

844. Si corpus habeat duo momenta principalia aequalia, ac circa tertium axem singularem propemodum gyretur, centrum autem virium uniformiter in circulo circa centrum inertiae corporis circumferatur, ad quodvis tempus situm et motum corporis determinare,

## S O L U T I O.

Fig. 108. Progrediatur centrum virium per circulum maximum XFY cele-  
ritate angulari  $= \delta$ , ac tempore elapso  $= t$  ex X pervenerit in F, ut sit  
 $XF = \delta t$ . In sphaera igitur consideretur circulus fixus XZY, in quo  
sit Z polus circuli XFY, ut sit angulus XZF  $= \delta t$ . Nunc autem ver-  
setur axis corporis singularis in A, ponaturque angulus XZA  $= \lambda$ , et  
arcus ZA  $= p$ : tum vero corporis quasi primis meridianus sit AB,  
distans ab arcu ZA angulo ZAB  $= q$ . Porro gyretur nunc corpus circa  
axem IO, ut sit arcus minimus AO  $= a$ , et angulus BAO  $= e$ , cele-  
ritate angulari  $= s$ , quoniam jam novimus eam fore constantem, et pun-  
ctum A abibit tempusculo  $dt$  in  $a$ , ut sit  $Aa = sdt$  si  $a = asdt$  et angu-  
lus AAO rectus: quare ob ZAO  $= q + e$  erit ZAA  $= q + e - 90^\circ$ ,  
ideoque demisso  $aa$  perpendicularo ad ZA, fiet  $aa = -asdt \cos(q + e)$   
et  $Aa = asdt \sin(q + e)$ , unde colligimus  $dp = -asdt \sin(q + e)$  et  $d\lambda =$   
 $asdt \cos(q + e)$ :

deinde vero quia corpus quasi circa polum A gyra-  
tur, erit  $dq = sdt$ . Denique in triangulo AZF ob ZA  $= p$ ; ZF  $= 90^\circ$   
et AZF  $= \lambda - \delta t$ , reperitur  $\cos FA = \cos \zeta = \sin p \cos(\lambda - \delta t)$ ; et  $\cos$   
ZAF  $= -\cos p \cot(\lambda - \delta t)$ . Ponamus brevitatis gratia angulum ZAF  
 $= \phi$ , ut sit  $\tan \phi = \frac{-\tan(\lambda - \delta t)}{\cos p}$ , erit BAF  $= \phi - q$ ; hincque  
 $\cos BF = \cos(\phi - q) \sin \zeta = \cos \eta$  et  $\cos CF = \sin(\phi - q) \sin \zeta = \cos \theta$ .  
Est vero  $\sin \phi \sin \zeta = \sin(\lambda - \delta t)$  et  $\cos \phi \sin \zeta = -\cos p \cos(\lambda - \delta t)$ ,  
ideoque  $\cos \eta = -\cos p \cos q \cos(\lambda - \delta t) + \sin q \sin(\lambda - \delta t)$   
et  $\cos \theta = \cos q \sin(\lambda - \delta t) + \cos p \sin q \cos(\lambda - \delta t)$ .

Unde si ponatur  $\frac{3gsc(aa - cc)}{4ccs} = N$ , colligitur fore

$$da = 2Ndt \sin p \cos(\lambda - \delta t) (\cos p \sin(q + e) \cos(\lambda - \delta t) + \cos(q + e) \sin(\lambda - \delta t))$$

$$\text{et } ade = -2Ndt \sin p \cos(\lambda - \delta t) (\sin(q + e) \sin(\lambda - \delta t) - \cos p \cos(q + e) \cos(\lambda - \delta t));$$

quibus si adjungamus  $dq = sdt$  et  $dp = -asdt \sin(q + e)$ , ex his qua-  
tuor aequationibus quatuor quantitates  $p$ ,  $q$ ,  $a$  et  $e$  definiri oportet.  
Binæ autem priores transformantur in has simplices:

$$da \cos(q + e) - ade \sin(q + e) = 2Ndt \sin p \sin(\lambda - \delta t) \cos(\lambda - \delta t)$$

$$da \sin(q + e) + ade \cos(q + e) = 2Ndt \sin p \cos p (\lambda - \delta t)^2.$$

Cum sit  $q = st + C$ , ponamus  $q + e = \omega$ , ut sit  $e = \omega - q$ , et ad-  
jungendo aequationes priores quatuor adhuc habebimus aequationes:

$dp$

$$dp = -\epsilon \omega dt \sin \omega, \quad d\lambda = \frac{\epsilon \omega dt \cos \omega}{\sin p}$$

$$d\omega \cos \omega - \omega d\omega \sin \omega + \epsilon \omega dt \sin \omega = 2Ndt \sin p \sin (\lambda - \delta) \cos (\lambda - \delta)$$

$$d\omega \sin \omega + \omega d\omega \cos \omega - \epsilon \omega dt \cos \omega = 2Ndt \sin p \cos p \cos (\lambda - \delta)$$

ac si insuper ponamus  $\lambda - \delta = \Phi$ , quae littera cum praecedente  $\Phi$  non est confundenda, erunt:

$$dp = -\epsilon \omega dt \sin \omega; \quad d\Phi = -\delta dt + \frac{\epsilon \omega dt \cos \omega}{\sin p}$$

$$d\omega \cos \omega - \omega d\omega \sin \omega + \epsilon \omega dt \sin \omega = 2Ndt \sin p \sin \Phi \cos \Phi$$

$$d\omega \sin \omega + \omega d\omega \cos \omega - \epsilon \omega dt \cos \omega = 2Ndt \sin p \cos p \cos \Phi$$

Ponamus porro  $\omega \cos \omega = x$  et  $\omega \sin \omega = y$ , ut habeamus has aequationes

$$1^\circ. dp = -y dt, \quad 2^\circ. d\lambda = \frac{\epsilon x dt}{\sin p}, \quad 3^\circ. d\Phi = -\delta dt + \frac{\epsilon x dt}{\sin p}$$

$$4^\circ. dx + y dt = Ndt \sin p \sin \Phi$$

$$5^\circ. dy - \epsilon x dt = Ndt \sin p \cos p + Ndt \sin p \cos p \cos 2\Phi,$$

ubi cum  $x$  et  $y$  sint quantitates minimae, ad veritatem satis appropinquabimus, si in binis postremis aequationibus arcum  $p$  et angulum  $\lambda$  ut constantes spectemus. Tribuamus ergo illis valores quasi medios, sitque proxime  $p = n$ , et  $\lambda = m$ , ideoque  $d\Phi = -\delta dt$ , ut habeamus aequationes:

$$4^\circ. dx - \frac{y d\Phi}{\delta} = -\frac{N d\Phi}{\delta} \sin n \sin \Phi$$

$$5^\circ. dy + \frac{\epsilon x d\Phi}{\delta} = -\frac{N d\Phi \sin n \cos n}{\delta} - \frac{N d\Phi \sin n \cos n \cos 2\Phi}{\delta}$$

quibus evidens est satisfieri posse ponendo

$$x = E + F \cos 2\Phi \text{ et } y = G \sin 2\Phi,$$

ac hi coefficientes ita definiuntur, ut sit

$$E = \frac{-N \sin n \cos n}{\epsilon - 4\delta\delta}; \quad F = \frac{-N \sin n (2\delta + \epsilon \cos n)}{\epsilon - 4\delta\delta}; \quad G = \frac{N \sin n (2\delta \cos n + \epsilon)}{\epsilon - 4\delta\delta}$$

Tum vero quia haec solutio tantum esset particularis, ponatur  $x = E + F \cos 2\Phi$

$\cos 2\phi + u$  et  $y = G \sin 2\phi + v$ , orienturque hae aequationes  $\frac{du}{d\phi} = 0$  et  $dv + \frac{u d\phi}{d} = 0$ , ex quibus elicitur  $u = b \sin \frac{e}{d}$

$(\phi + \zeta)$ , et  $v = b \cos \frac{e}{d} (\phi + \zeta)$ , ubi  $b$  et  $\zeta$  sunt constantes arbitrariae.

Quocirca habebimus

$$x = a \cos \omega = \frac{-N \sin \cos n}{e} - \frac{N \sin (e \cos n + 2d)}{ee - 4dd} \cos 2\phi +$$

$$b \sin \frac{e}{d} (\phi + \zeta)$$

$$y = a \sin \omega = \frac{N \sin (e + 2d \cos n)}{ee - 4dd} \sin 2\phi + b \cos \frac{e}{d} (\phi + \zeta)$$

ubi  $\phi$  exprimit angulum FZA =  $\lambda - \delta$ . Deinde ob  $dp = -y dt = \frac{ey d\phi}{d}$ , nanciscimur integrando:

$$p = n - \frac{N \sin (e + 2d \cos n)}{2d(ee - 4dd)} \cos 2\phi + b \sin \frac{e}{d} (\phi + \zeta) = ZA.$$

Denique aequatio  $d\lambda = \frac{ex dt}{\sin p} = \frac{-ex d\phi}{d \sin n}$  praebit:

$$\lambda = m - N \cos n + \frac{e N (e \cos n + 2d)}{2d(ee - 4dd)} \sin 2\phi + \frac{b}{\sin n} \cos \frac{e}{d} (\phi + \zeta) = XZA.$$

#### COROLL. 1.

845. Cum sit ex nostris positionibus  $a = r (xx + yy)$ , patet successu temporis distantiam AO =  $a$  non ultra certum limitem angere posse, qui si fuerit satis exiguus, hypothese nostra tuto utimur. Simul vero patet hanc distantiam  $a$  nunquam plane evanescere, nisi forte fiat tam  $x = 0$  quam  $y = 0$ .

#### COROLL. 2.

846. Neglectis inaequalitatibus ab angulis  $2\phi = e$  FZA et  $\frac{e}{d}$   $(\phi + \zeta)$

$(\varphi + \zeta)$  pendentibus, polus  $Z$  uniformiter circa punctum  $Z$  in antecedentia regreditur celeritate angulari  $= N \cos n$ , si quidem  $N = \frac{3gee(aa - cc)}{cccs}$  fuerit numerus positivus, sicque integram revolutionem absolvet tempore  $= \frac{2\pi}{N \cos n}$  min. sec. dum centrum virium  $F$  revolutionem absolvit tempore  $= \frac{2\pi}{\delta}$ , et ipsum corpus tempore  $= \frac{2\pi}{\epsilon}$ .

### COROLL. 3.

847. Praeterea vero tam distantia  $ZA$ , quam angulus  $XZA$  exiguas inaequalitates patientur, partim ab angulo  $2\varphi = 2FZA$  partim ab angulo  $\frac{\epsilon}{\delta}(\varphi + \zeta) = C - u$ , hoc est, partim a motu centri virium, partim a motu vertiginis ipsius corporis pendent. Quare si ponamus angulum  $ZAB = \psi$  erit

$$ZA = n - \frac{N \sin n (1 + 2\delta \cos n)}{2\delta(11 - 4\delta\delta)} \cos 2\varphi - b \sin(\psi + \zeta)$$

$$XZA = m - N \epsilon \cos n + \frac{N(1 \cos n + 2\delta)}{2\delta(11 - 4\delta\delta)} \sin 2\varphi + \frac{b}{\sin n} \cos(\psi + \zeta).$$

### SCHOLION. 1.

848. Sumimus hic corpus in eundem sensum gyron, in quem centrum virium  $F$  circa id circumfertur, quemadmodum fit in terra, quae ab occidente in orientem gyron, in quem sensum etiam sol et luna motu proprio promoveri cernuntur. Deinde etiam spectavimus.

numerum  $N = \frac{3gee(aa - cc)}{cccs}$  ut positivum, seu corpus ita compara-

tum, ut ejus momentum inertiae respectu axis, circa quem proximae gyron, sit maximum  $= Maa$ , dum respectu axium in aequatore suntorum est minimum  $= Mcc$ , qua proprietate terram esse praeditam observationes circa figuram terrae sphaeroidicam compressam institutae declarant. In hac ergo constitutione axis terrae circa polum eclipticae  $Z$  in antecedentia regredi debet, quemadmodum etiam per observationes constat. Praeterea vero neque

Aaa 3

iste



iste axis motus est: acquabilis, neque ejus distantia a polo elepticae Z. constans, sed duplici inaequalitati est obnoxia, quarum altera ab angulo  $FZA = \varphi$  duplicato pendet, altera vero ab ipso motu vertiginis corporis, quae posterior major minorve esse potest, prout initio polus gyrationis O tam ratione poli A quam ratione situs centri virium F fuerit constitutus. Scilicet cum  $\omega$  denotet angulum ZAO, si initio vel dato saltem tempore innotuerint quantitates  $AO = a$ ,  $ZAO = \omega$ ,  $FZA = \varphi$ , et  $ZAB = \psi$ , sumto AB pro corporis primo meridiano, ex his aequationibus

$$a \cos \omega + \frac{N \sin \cos n}{1} + \frac{N \sin (1 \cos n + 2 \delta)}{11 - 4 \delta \delta} \cos 2\varphi + b \sin (\psi + \zeta) = 0$$

$$a \sin \omega - \frac{N \sin (1 + 2 \delta \cos n)}{11 - 4 \delta \delta} \sin 2\varphi - b \cos (\psi + \zeta) = 0$$

binæ constantes  $b$  et  $\zeta$  definiuntur. Nisi ergo prodeat  $b = 0$ , polus A inaequalitates etiam diurnas patietur, ita ut intervallo cujusque revolutionis ad polum eclipticae alternatim accedat ab eoque recedat, simulque alternatim in antecedentia et consequentia nutet. Ob hanc scilicet inaequalitatem polus A singulis revolutionibus circulum describeret: cujus centrum cum quiescat, id potius pro vero polo terrae habebitur, ita ut hæc inaequalitates non percipiantur. Tum vero reliquæ inaequalitates ab actione centri virium pendentes non hunc polum apparentem, sed ipsum polum axis principalis afficient.

#### SCHOLIUM. 2.

849. Praetermissis autem his inaequalitatibus diurnis, quibus forte nutatio axis afficitur, si fuerit  $aa > cc$  corpusque in eundem sensum gyrat ac centrum virium, phaenomena ita se habebunt;

Primo distantia poli A a puncto Z, quod est vertex seu polus orbitae, quam centrum virium describit, erit variabilis ac minima quidem deprehendetur, si angulus FZA vel evanescit, vel fit  $180^\circ$ ; maxima autem, si iste angulus fuerit vel  $90^\circ$  vel  $270^\circ$ , differentia inter ma-

$$\text{ximam minimamque distantiam existente} = \frac{1 N \sin (1 + 2 \delta \cos n)}{\delta (11 - 4 \delta \delta)}.$$

Secundo polus A circa punctum Z in antecedentia motu non uniformi regredietur, qui si ut moris est per motum medium prosthaphaereseos corrigendum representetur, motu medio regredietur celeritate angula-

angulari =  $N \cos n$ , tum vero correctio seu prosthaphaeresis maxima erit =  $\frac{N(\sec n + 2\delta)}{2\delta(11 - 4\delta\delta)}$ , addenda si angulus FZA sit vel  $45^\circ$  vel  $225^\circ$ ,

subtrahenda vero si iste angulus fiat vel  $135^\circ$  vel  $315^\circ$ , ubi notandum est, hunc angulum FZA =  $\phi$  reperiri, si longitudo centri virium Fa longitudine poli A subtrahatur. Ceterum hic celeritatem motus vertiginis  $\epsilon$  prae celeritate centri virium  $\delta$  ut multo maiorem spectamus: si enim esset  $\epsilon = 2\delta$ , conationes inventae adeo in infinitum abirent; verum hoc casu integratio nostrarum aequationum singulari modo esset instituenda, ponendo  $x = E + F \cos 2\phi + A\phi$  et  $y = G \sin 2\phi + B\phi \cos 2\phi$ , reperireturque  $E = \frac{-N \sin n \cos n}{2\delta}$ ,  $A = B = \frac{-N \sin n (1 + \cos n)}{2\delta}$  et

$$F + G = \frac{N \sin n (1 - \cos n)}{4\delta} \quad \text{Verum quia hic } x \text{ et } y \text{ continuo crescerent,}$$

mox hypothesein factam transgrederentur, totusque calculus non amplius locum haberet. Quare nisi  $\epsilon$  notabiliter discrepet a  $4\delta\delta$ , formulae nostrae adhiberi nequeunt.

## CAPUT XVII.

### PLENIOR EXPLICATIO MOTUS TURBINUM SUPER PLANO HORIZONTALI SEMOTA FRICTIONE.

#### DEFINITIO. 14.

850. *Axis turbine* est recta AF ex cuspide F per centrum inertiae I ducta, qui simul sit ejus axis principalis singularis, ita ut respectu omnium axium ad eum normalium IB momenta inertiae sint inter se aequalia. Fig. 109.

#### COROLL. 1.

851. Aptissima ergo turbine figura est tornata, quae generatur, si figura quaecunque circa axem AF revolvitur; dummodo ea in cuspide F desinat, qua super plano horizontali incedere possit.

CO.

## COROLL. 2.

852. In turbine autem sequentes quantitates cognitae esse oportet, quae in calculum ingrediuntur: 1°. ejus massam vel pondus, quod sit =  $M$ . 2°. Distantiam cuspidis a centro inertiae, quae sit  $IF = f$ ; 3°. Momentum inertiae respectu axis  $AF$ , quod sit =  $Maa$  et 4°. Momentum inertiae respectu omnium axium ad illum normalium, quod sit =  $Mcc$ .

## COROLL. 3.

853. Cum ergo supra in genere momenta inertiae principalia cujusque corporis posuerimus  $Maa$ ,  $Mbb$ , et  $Mcc$ , hic bina posteriora aequalia statuamus, ut sit  $bb = cc$ .

## COROLL. 4.

854. Dum igitur turbo cuspide  $F$  super plano horizontali incedit, ejus axis  $AF$  non ultra certum terminum ad horizontem inclinari potest, qui habebitur ducendo ab  $F$  ad corpus turbinis rectam extremam  $Fk$  tum enim angulus  $AFk$  dabit illum terminum.

## SCHOLION.

855. Supra tantum ejusmodi turbines consideravimus, in quibus omnia momenta inertiae inter se essent aequalia; quae conditio nimium erat limitata. Nunc igitur motum turbinum in genere exploremus, siquidem conditio, quod  $AF$  sit axis principalis, et respectu binorum reliquorum axium momenta inertiae aequalia, cum indole turbinum necessario conjuncta videtur. Principia autem, unde hujus motus determinatio est petenda, supra in Cap. 14. jam sunt exposta, ubi vidimus totum negotium a pressione, qua turbo, dum movetur, cuspide sua  $F$  plano horizontali innititur, pendere. Quae pressio, etiamsi nonnisi solutione ad finem perducta cognosci queat, tamen statim ab initio in calculum ingreditur. Sit ergo  $\Pi$  ista pressio, cujus directio a cuspide  $F$  semper verticaliter sursum tendit; atque de hac pressione supra §. 767 ostendimus, si inclinatio axis  $AF$  ad horizontem ponatur =  $\theta$ , quae tempusculo  $dt$  suo differentiali  $d\theta$  crescat, sumto elemento  $dt$  con-

$$\text{stante, fore } \frac{d(d\theta \cos\theta - d\theta^2 \sin\theta)}{dt^2} = \frac{2g}{f} \left( \frac{\Pi}{M} - 1 \right); \text{ sive } \frac{\Pi}{M} = 1 + \frac{f(d(d\theta \cos\theta - d\theta^2 \sin\theta))}{2g dt^2} = 1 + \frac{f d. d\theta \cos\theta}{2g dt^2} = 1 + \frac{f d d. \sin\theta}{2g dt^2}.$$

Dum igitur turbo praeter hanc vim  $\Pi$  a gravitate tantum urgeri statuatur,

tuatur, ejus centrum inertiae I alium motum recipere nequit, nisi in directione verticali vel ascendendo vel descendendo, dum ejus distantia a plano horizontali est  $= f \sin \theta$ . Sin autem initio ei insuper quidam motus horizontalis fuerit impressus, eum constanter aequabilem conservabit, sicque tota quaestio ad solum motum gyratorium reducit. Quare cum gravitas ad eum nihil conferat, ejusque perturbationes omnes a sola pressione  $\Pi$  oriuntur, hujus vis momenta respectu axium principalium turbinis definiri oportet.

PROBLEMA. 97.

856. Si turbo teneat situm quomodocunque inclinatum ad horizontem, simulque detur pressio  $\Pi$ , qua ejus cuspis horizontali plano innititur, definire hujus vis momenta respectu axium principalium turbinis.

SOLUTIO.

Descripta sphaera circa centrum inertiae turbinis I, in qua sit Z Fig. 110. punctum verticale, axis turbinis autem sphaeram trajiciat in punctis A et F, bini reliqui vero axes principales pertingant ad sphaerae puncta B et C: est enim hi duo axes per se non determinantur, tamen certas duas lineas tam inter se quam ad axem AF normales accipi convenit, ex quibus deinceps situs turbinis ad quodvis tempus definietur. Ponantur arcus circulorum maximorum  $ZA = l$ ,  $ZB = m$ , et  $ZC = n$ , erit  $l = 90^\circ - \theta$  denotante  $\theta$  inclinationem axis AF ad horizontem. Cum jam cuspis F, cujus distantia a centro inertiae I est  $FI = f$ , urgeatur in directione verticali  $F\Pi$  vi  $= \Pi$ , ut sit angulus  $AF\Pi = l$ , resolvatur ea secundum directiones FA et FV, quarum haec FV sit in plano verticali AZF ad AF normalis, erit vis sec. FA  $= \Pi \cos l$ , et vis sec. FV  $= \Pi \sin l$ , quarum illa per centrum inertiae transiens nulla praebet momenta. Haec vero vis FV  $= \Pi \sin l$  respectu axis AF quoque nullum praebet momentum; at respectu axis IB dat momentum  $= \Pi f \sin l \sin VFB$  in sensum AC, similique modo respectu axis IC momentum  $= \Pi f \sin l \sin VFC$  in sensum BA. Verum est ang.  $VFB = ZAB$ , et  $\sin ZAB = -\cos ZAC = -\frac{\cos n}{\sin l}$ , tum vero ang.  $VFC = ZAC$  et  $\sin ZAC$   
 $\Rightarrow \cos ZAB = \frac{\cos m}{\sin l}$ . Quamobrem habebimus

mom. resp. axis IB  $= -\Pi f \cos n$  in sensum AC

mom. resp. axis IC  $= \Pi f \cos m$  in sensu BA

et quia momenta virium respectu axium IA, IB, IC in sensum BC,

Bbb

CA,

378 CAPUT XVII. PLENIOR EXPLICATIO

CA, AB supra in genere posuimus P, Q, R, erit pro nostro casu:

$$P = 0; \quad Q = + \pi f \cos n \text{ et } R = - \pi f \cos m.$$

P R O B L E M A. 98.

857. Si turbo in situ quocunque inclinato gyretur circa axem quemcunque, per ejus centrum inertiae tranſcuntem, definire variationem momentaneam tam in axe gyrationis quam in celeritate angulari productam.

S O L U T I O.

Fig. III. Circa centrum inertiae I constituta ſphaera immobilis, in qua ſit Z punctum verticale, et ZX circulus verticalis fixus; teneat jam turbo ejusmodi ſitum, ut axis turbinis proprius respondeat ſphaerae puncto A, binique reliqui axes principales punctis B et C, ponanturque horum axium declinationes a verticali ſeu arcus  $ZA = l$ ,  $ZB = m$ ,  $ZC = n$ , ut ſit  $\cos^2 l + \cos^2 m + \cos^2 n = 1$ : tum vero anguli  $XZA = \lambda$ ,  $XZB = \mu$ , et  $XZC = \nu$ , quorum relationes ad illos arcus ſunt cognitae. Nunc autem turbo gyretur circa axem IO celeritate angulari  $\omega$  in ſenſum ABC, ſintque pro polo gyrationis O arcus  $AO = \alpha$ ,  $BO = \zeta$ , et  $CO = \gamma$ , atque ponendo  $\omega \cos \alpha = x$ ,  $\omega \cos \zeta = y$ ,  $\omega \cos \gamma = z$  ob momenta virium  $P = 0$ ,  $Q = \pi f \cos n$ , et  $R = - \pi f \cos m$ , atque  $bb = cc$ , variationes tempuſculo  $dt$  productae ſequentibus formulis exprimentur:

I.  $dx = 0$

II.  $dy + \frac{aa - cc}{cc} xz dt = - \frac{2\pi f g dt \cos n}{Mcc}$

III.  $dz - \left( \frac{aa - cc}{cc} \right) xy dt = - \frac{2\pi f g dt \cos m}{Mcc}$

Præterea vero has aequationes pro  $l$ ,  $m$ ,  $n$ ,  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$ , adjungi oportet:

$$dl \sin l = dt (y \cos n - z \cos m); \quad d\lambda \sin l = - dt (y \cos m + z \cos n)$$

$$dm \sin m = dt (z \cos l - x \cos n); \quad d\mu \sin m = - dt (x \cos n + z \cos l)$$

$$dn \sin n = dt (x \cos m - y \cos l); \quad d\nu \sin n = - dt (x \cos l + y \cos m).$$

Cum autem inclinatio axis ad horizontem ſit  $= 90^\circ - l$  quam ſupra po-

ſita eſt  $\theta$ , ob  $\sin \theta = \cos l$  erit  $\frac{\pi}{M} = 1 + \frac{f d d \cos l}{2g dz^2}$ . Ad hanc magis contrahenda ſtatueretur:

$\cos l = p$ ;  $\cos m = q$ ;  $\cos n = r$   
 et habebimus  $\frac{\Pi}{M} = 1 + \frac{f \lambda dp}{2g dt^2}$ , ac praeterea has aequationes:

$$I. dx = 0$$

$$II. dy + \frac{(aa - cc) x z dt}{cc} = \frac{2 \Pi f g r ds}{Mcc}$$

$$III. dz - \frac{(aa - cc) x y dt}{cc} = \frac{-2 \Pi f g q ds}{Mcc}$$

$$IV. dp = dt (qz - ry); VII. d\lambda = \frac{-dt(qy + rz)}{1 - pp}$$

$$V. dq = dt (rx - pz); VII. dp = \frac{-dt(rz + px)}{1 - qq}$$

$$VI. dr = dt (py - qx); IX. dr = \frac{-dt(px + qy)}{1 - rr}$$

ubi notandum est, esse  $pp + qq + rr = 1$ .

### COROLL. 1.

858. Si turbo circa ipsum axem  $IA$  gyretur, ut sit  $a = 0$  et  $C = 90^\circ$ , erit  $x = u$ ,  $y = 0$  et  $z = 0$ , et  $dx = du$ ,  $dy = -u dC$ ,  $dz = -u dy$ . Fiet ergo

$$ds = 0; dC = \frac{-2 \Pi f g r ds}{u Mcc}, dy = \frac{2 \Pi f g q ds}{u Mcc};$$

$dp = 0$ ;  $dq = u r dt$ ;  $dr = -u q dt$ , et  $d\lambda = 0$ ,  
 tum ergo primo instanti neque celeritas angularis  $u$ , neque situs puncti  $A$ , mutationem patitur.

### COROLL. 2.

859. Cum sit  $dp = dt (qz - ry)$  erit differentiando  $ddp = dt (qdz - rdy) + dt (zdq - ydr)$ , et substitutis valoribus datis reperietur:

$$\frac{ddp}{dt^2} = \frac{(aa - cc)x}{cc} (qy + rz) - \frac{2 \Pi f g}{Mcc} (qq + rr) + x (qy + rz) - p (yy + zz)$$

unde fit

$$\frac{\Pi}{M} = 1 + \frac{f(aa - cc)x}{2g cc} (qy + rz) - \frac{\Pi f}{Mcc} (qq + rr) + \frac{f x (qy + rz)}{2g} - \frac{f p (yy + zz)}{2g}$$

Bbb a

feu

$$\text{feu } \frac{\Pi}{M} \left( 1 + \frac{ff(qq+rr)}{cc} \right) = 1 + \frac{faa(qq+rr)}{2gdc} - \frac{fp(yy+zz)}{2g},$$

$$\text{hincque } \frac{\Pi}{M} = \frac{2gcc + faa(qq+rr) - fcsp(yy+zz)}{2gcc + 2gff(qq+rr)}.$$

## COROLL. 3.

860. Ex aequationibus IV. V. VI. colligitur, ut jam ante notavimus,  $x dp + y dq + z dr = 0$ , quae aequatio, cum sit  $pp + qq + rr = 1$ , loco aequationum V. et VI. usurpari potest. At aequationum VII, VIII, IX unicam tractasse sufficiet, quod negotium postremo loco erit fuscipiendum.

## COROLL. 4.

861. Inventis autem quantitibus  $x$ ,  $y$  et  $z$ , ob  $\cos a^2 + \cos^2 \gamma + \cos^2 \gamma^2 = 1$  erit celeritas angularis  $u = r'(xx + yy + zz)$  hincque vicissim arcus  $a$ ,  $\gamma$ ,  $\gamma^2$  concluduntur; nempe

$$\cos a = \frac{x}{u}; \cos \gamma = \frac{y}{u} \text{ et } \cos \gamma^2 = \frac{z}{u}.$$

## PROBLEMA. 99.

862. Aequationes differentiales ante inventas, quibus motus turbinis exprimitur, ad integrationem perducere, quantum fieri licet.

## SOLUTIO.

Primo statim patet esse  $x = \text{const}$ : ponamus ergo  $x = \Lambda$ , et reliquae aequationes integrandae erunt

$$1^\circ. dy + \frac{A(aa - cc)z dt}{cc} = \frac{2\Pi fgr dt}{Mcc}$$

$$2^\circ. dz - \frac{A(aa - cc)y dt}{cc} = \frac{-2\Pi fgq dt}{Mcc}$$

$$3^\circ. dp = dt(qz - ry)$$

$$4^\circ. y dq + z dr = -\Lambda dp$$

$$\text{existente } \frac{\Pi}{M} = 1 + \frac{fddp}{sgdz} \text{ et } pp + qq + rr = 1.$$

Nunc 1°.  $q$  + 2°.  $r$  supeditat hanc aequationem

$$qdy + rdz + \frac{A(aa - cc)}{cc} dt (qz - ry) = 0$$

quae ob  $dt(qz - ry) = dp$  abit in hanc:

qdy

$$qdy + rdx = \frac{-A(a^2 - cc)}{cc} dp \text{ huc addatur 4}^o$$

$$y dq + z dr = -A dp$$

erit  $qdy + ydq + rdx + zdr = \frac{-aa}{cc} A dp$  cujus integrale est

$$qy + rz = B - \frac{aa}{cc} A p.$$

Porro colligendo 1<sup>o</sup>.  $y$  + 2<sup>o</sup>.  $z$  prodest:

$$y dy + z dz = \frac{2\pi f g dt}{Mcc} (ry - qz) = \frac{-2\pi f g dp}{Mcc}$$

quare cum sit  $\frac{\pi}{M} = 1 + \frac{f ddp}{2g d r^2}$  erit

$$y dy + z dz = \frac{-2fg dp}{cc} - \frac{f d p d d p}{cc d r^2}$$

unde integrando nanciscimur:

$$yy + zz = C - \frac{4fgp}{cc} - \frac{f d p^2}{cc d r^2}$$

Cum jam sit  $\frac{dp}{dt} = qz - ry$ , obtinemus novam aequationem finitum:

$$yy + zz = C - \frac{4fgp}{cc} - \frac{f}{cc} (qz - ry)^2$$

ex qua cum sit

$$(qz - ry)^2 = \frac{Ccc}{f} - \frac{4gp}{f} - \frac{cc(yy + zz)}{f}$$

ex ante inventa autem

$$(qy + rz)^2 = \left(B - \frac{Aap}{cc}\right)^2$$

prodibit his addendis

$$(qq + rr)(yy + zz) = \frac{Ccc}{f} - \frac{4gp}{f} - \frac{cc(yy + zz)}{f} + \left(B - \frac{Aap}{cc}\right)^2$$

unde ob  $qq + rr = 1 - pp$  elicetur

$$(1 - pp + \frac{cc}{f})(yy + zz) = \frac{Ccc}{f} - \frac{4gp}{f} + \left(B - \frac{Aap}{cc}\right)^2$$

$$yy + zz = \frac{(Ccc - 4fgp + f(B - \frac{Aap}{cc})^2)}{cc + f - fpp}$$

$$(qz - ry)$$



# 382 : CAPUT XVII. PLENIOR EXPLICATIO.

$$(qz - ry)^2 = \frac{(Ccc - 4fgp)(1 - pp) - cc(B - \frac{Aaap}{cc})^2}{cc + ff - fpp}$$

Cum ergo jam has quantitates  $qy + rz$ ,  $yy + zz$  et  $qz - ry$  per solam  $p$  definiverimus; statim pressionem  $\Pi$  per eandem solam  $p$  ita reperi-  
mus expressam

$$\frac{\Pi}{M} = \frac{2gccc + faaA(B - \frac{Aaap}{cc})}{2g(cc + ff - fpp)} - \frac{fcep(Ccc - 4fgp + ff(B - \frac{Aaap}{cc})^2)}{2g(cc + ff - fpp)^2}$$

deinde vero etiam elementum temporis  $dt$  obtinebimus

$$dt = \frac{dp \sqrt{(cc + ff - fpp)}}{\sqrt{(Ccc - 4fgp)(1 - pp) - cc(B - \frac{Aaap}{cc})^2}}$$

$$\text{ex quo pariter per } p \text{ erit } d\lambda = \frac{-dt(B - \frac{Aaap}{cc})}{1 - pp}$$

atque celeritas angularis  $\omega$  ita definietur, ut sit

$$\omega = \Lambda\Lambda + \frac{Ccc - 4fgp + ff(B - \frac{Aaap}{cc})^2}{cc + ff - fpp}$$

Ex  $\omega$  autem porro cognoscitur arcus  $\Lambda O = \omega$ , ita ut, quoniam tem-  
pus  $t$  per  $p$  datur, quantitates  $\omega$ ,  $\alpha$ ,  $p$  et  $\lambda$  ad datum tempus assignari  
queant. Denique etiam parum refert, nosse quantitas  $y$  et  $z$  seorsim: ta-  
men ex 1<sup>o</sup> et 2<sup>o</sup> fit

$$z dq - y dz + \frac{A(aa - cc)(yy + zz)}{cc} dt = \frac{2\Pi fg dt}{Mcc} (rz + qy)$$

ideoque

$$\frac{y dz - z dy}{yy + zz} = \frac{A(aa - cc) dt}{cc} - \frac{2\Pi fg dt (B - \frac{Aaap}{cc}) (cc + ff - fpp)}{Mcc (Ccc - 4fgp + ff(B - \frac{Aaap}{cc})^2)}$$

quae cum etiam sit integrabilis, dabit  $\Lambda \text{ tang } \frac{z}{y}$  ideoque rationem inter  
 $y$  et  $z$ , ex qua cum  $yy + zz$  conjunctim, utraque  $y$  et  $z$  seorsim datur:  
quibus inventis etiam  $q$  et  $r$  seorsim ex valoribus formularum  $qy + rz$   
et  $qz - ry$  eliciuntur.

PRO.

PROBLEMA. 100.

863. Si turbini initio in data inclinatione impressus fuerit motus gyrorius circa, proprium axem data celeritate angulari, definire ejus situm et motum ad quodvis tempus inde elapsum.

SOLUTIO.

Ponamus initio quo  $t = 0$ , axem turbini fuisse in  $a$  distantia seu Fig. III.  
arcu existente  $Za = l$ , ac ponatur  $\cos l = p$ , ut fuerit  $sp$  altitudo centri inertiae supra planum horizontale, eodem autem tempore arcus  $AB$  fuerit in  $ab$ , ita ut pro initio habeatur  $l = 1$ ,  $m = 90 - l$ ,  $n = 90^\circ$ , et  $\lambda = 0$ , ideoque  $p = p$ ,  $q = r(1 - pp)$ , et  $\dot{r} = 0$ . Deinde initio turbo circa ipsum axem  $IA$  acceperit in sensum  $BC$  motum gyrorium celeritate angulari  $= s$ , ita ut fuerit  $\alpha = 0$ ,  $\zeta = 90^\circ$ , et  $\gamma = 90^\circ$ , ideoque  $x = s$ ,  $x = s$ ,  $y = 0$ , et  $z = 0$ . Hinc ergo si constantes supra per integrationem ingressae definiantur, obtinebimus:

$$1^\circ. A = s; \quad 2^\circ. B = \frac{ssap}{cc} \text{ et } 3^\circ. C = \frac{4fsv}{cc}$$

Hic autem valoribus substitutis primo inter  $t$  et  $p$  haec reperitur aequatio

$$dt = \frac{cdpr(cc + ff - ffp)}{r(p-p)(4ccfg(1-pp)) - ss\alpha^2(p-pp)}$$

Deinde angulus  $XZA = \lambda$  ita definitur, ut sit

$$d\lambda = \frac{-ssadt(p-p)}{cc(1-pp)} = \frac{-ssadpr(p-p)(cc + ff - ffp)}{c(1-pp)r(4ccfg(1-pp)) - ss\alpha^2(p-pp)}$$

Porro celeritas angularis  $s$  in sensum  $ABC$  ita exprimitur

$$ss = s + \frac{4r^2fg(p-p) + ss\alpha^2ff(p-p)^2}{c^2(cc + ff - ffp)}$$

hincque  $\cos \alpha = \frac{s}{u}$ ; at pro  $\cos \zeta = \frac{z}{y}$  et  $\cos \gamma = \frac{z}{u}$  est primum

$$\bar{x} + z = \frac{4ccfg(p-p) + ss\alpha^2ff(p-p)^2}{c^2(cc + ff - ffp)} = ux - ss.$$

Præterea vero invenimus:

$$qy + rz = \frac{ss\alpha}{cc} (p-p) \text{ et}$$

$$qz - ry = \frac{r(p-p)(4ccfg(1-pp) - ss\alpha^2(p-pp))}{cr(cc + ff - ffp)}$$

atque

atque pressionem, quam nunc turbo cuspidē suā exerit in planum horizontale

$$\frac{\pi}{M} = \frac{2c^2g + aa^2f(p-p)}{2ccg(cc+ff-ffpp)} - \frac{fp(p-p)(4c^2fg + aa^2ff(p-p))}{2ccg(cc+ff-ffpp)^2}$$

Denique ad quantitates  $y$  et  $z$  theorū definiēdas habetur haec aequatio

$$\frac{ydz - zdy}{yy + zz} = \frac{a(aa - cc)dt}{cc} - \frac{\pi}{M} \frac{aa fgd(cc + ff - ffpp)}{4c^2fg + aa^2ff(p-p)} \text{ seu}$$

$$\frac{ydz - zdy}{yy + zz} = \frac{a(aa - cc)dt}{cc} - \frac{aaadt(2c^2fg + aa^2ff(p-p))}{2cc(4c^2fg + aa^2ff(p-p))}$$

$$+ \frac{aaaffpd(p-p)}{2cc(cc + ff - ffpp)}$$

Inventis autem  $y$  et  $z$ , etiam  $q$  et  $r$  per eas determinantur.

### COROLL. 1.

864. Arcus  $ZA = l$  usque ad angulum rectum augeri, seu turbo procidere potest, quamdiu  $aa^2p < 4ccfg$ . Ne ergo turbo prolābatur, necesse est, ut ejus celeritas angularis primo impressa major sit quam  $\frac{2c}{aa} \cdot \frac{fg}{p}$ , ubi est  $p = \cos ZA$ . Unde, si turbo initio fuerit verticalis, debet esse  $a > \frac{2crfg}{aa}$  nisi enim haec conditio observetur, levissima causa turbine deturbare valebit.

### COROLL. 2.

865. Sin autem fuerit  $aa^2p > 4ccfg$ , quemadmodum quantitas  $p$  nunquam superare potest  $p$ , ita dabitur limes, infra quem nunquam diminuetur, qui definitus ex aequatione,  $4ccfgpp = 4ccfg - aa^2p + aa^2p$  prodit

$$p = \frac{aa^2 - r(a^2 - 16aa^2ccfgp + 64r^2ffgg)}{8ccfg}$$

unde fit proxime  $p = p - \frac{4ccfg(1 - pp)}{aa^2 - 8ccfgp}$  pro minimo valore ipsius  $p = \cos ZA$ , seu pro maximo arcu  $ZA$ .

### COROLL. 3.

866. Sin autem in fig. 109. spectemus ad angulum  $IFk$ , quo inclinatio axis ad horizontem, cujus sinus est  $= p$ , minor fieri non potest:

# MOTUS TURBINUM SUPER PLANO &c. 385.

est: motus turbinis gyratorius perennis esse nequit, nisi valor minimus ipsius  $p$  adhuc fuerit major quam sinus anguli  $IFk$ . Quare posito

$$\sin IFk = k, \text{ debet esse } s > \frac{4ccfg(1-kk)}{aa(p-k)}.$$

## SCHOLION. 1.

867. Hic ergo duos casus constitui convenit, alterum quo celeritas angularis turbini primum impressa  $s$  minor est, quam  $\frac{2c\sqrt{fg(1-kk)}}{aa\sqrt{(p-k)}}$ , alterum quo hac quantitate est major. Priori casu quo  $s < \frac{2c\sqrt{fg(1-kk)}}{aa\sqrt{(p-k)}}$ , turbo mox procidet, quoniam ad minimam inclinationem pervenire nequit, quin corpore suo planum horizontale attingat, sicque motus gyratorius destratur. Posteriori vero casu quo  $s > \frac{2c\sqrt{fg(1-kk)}}{aa\sqrt{(p-k)}}$ , motus gyratorius perpetuo durabit, quandoquidem a frictione omnibusque motus obstaculis mentem abstrahimus. Ut ergo motus gyratorius prodeat perennis, necesse est turbini primum majorem celeritatem angularem  $s$  imprimi, quam ista formula exhibet. Patet autem, quo major turbini celeritas angularis imprimatur, eo minus eum ad horizontem inclinatum iri, ac si celeritas illa foret infinita, turbo eandem inclinationem perpetuo conservaret. Quando autem motus gyratorius est perennis, turbo ab initio magis ad horizontem inclinabitur, donec maximam inclinationem attigerit, tum iterum se eriget usque ad statum initialem, quo ubi pervenerit, quasi unam motus sui periodum absolvisse est censendus, deinceps simili modo progressurus; nunquam enim turbo magis fiet erectus, quam fuerat initio, si quidem nulla affuerit frictio. Namque si turbo, dum cuspe super plano horizontali incedit, frictionem offendat, ejus effectus in erigendo turbine consumetur, quatenus is ob minutam celeritatem angularem non prolabi cogitur. Quare nemini mirum videri debet, si experientia nostro calculo minus conveniat, cum aberrationes frictioni sint tribuendae.

## SCHOLION. 2.

868. Ex his etiam ratio constructionis turbinum perspicitur, ut facillime motum gyratorium recipiant, seu ut minima celeritas angularis ad hoc sufficere possit. Scilicet cum celeritas angularis initio impressa major esse debeat quam  $\frac{2c\sqrt{fg}}{aa}$ , patet turbinis figuram ejusmodi esse

Ccc

# 386 CAPUT XVII. PLENIOR EXPLICATIO

esse oportere, ut ejus momentum inertiae respectu axis  $\Delta F$  fit maximum prae momento respectu axium ad hunc normalium. Quare figura aptissima erit discus planus hasta tenuissima transfixus, quo casu fit  $aa = 2cc$ : ac si radius ejus disci fuerit  $= b$ : erit  $aa = \frac{1}{2}bb$ , et  $cc = \frac{1}{4}$

$bb$ , hincque  $s > \frac{2rfg}{b}$ . Deinde quo brevior fuerit cuspis seu intervallum  $IF = f$ , eo magis celeritas angularis  $s$  ad durationem gyrationis requisita minuitur: verum tum etiam in minore inclinatione turbo planum horizontale corpore suo attinget. Ponamus  $b = \frac{1}{2}$  dig. et  $f = \frac{1}{4}$  dig. quoniam  $g = 187 \frac{1}{2}$  dig. sumi debet  $s > r750$ : quare si capiatur  $s$  duplo major vel  $s = 55$ , turbo uno minuto secundo conficiet arcum  $= 55$ , seu  $\frac{55}{2\pi}$ , hoc est fere novem revolutiones absolvet.

Pro turbinibus autem majoris moduli celeritas angularis minor secundum rationem subduplicatam laterum sufficiet.

## PROBLEMA. 101.

869. Si turbini initio datam inclinationem tenenti impressus fuerit motus gyriorius satis insigni celeritate angulari, ut inclinatio ejus minimas subeat mutationes, definire ejus motum gyriorium.

## SOLUTIO.

Manentibus omnibus, uti in problemate praecedente sunt constituta, assumimus hic  $ss$  multis vicibus excedere quantitatem  $\frac{4ccfg}{a^4p}$ . Ponamus ergo  $ss = \frac{4nccfg}{a^4p}$ , ut  $n$  hic denotet numerum satis magnum, ac primo pro relatione inter  $s$  et  $p$  hanc habebimus aequationem, quia ab initio quantitas  $p$  decrescit

$$dt = \frac{-dp r p (cc + ff - ffpp)}{2rfg(p-p)(p-ppp-np+np)}$$

Cum igitur  $p$  quam minimum  $a$   $p$  deficiat, ponamus  $p = p - u$ , ut  $u$  sit particula vehementer exigua, fietque

$$dt = \frac{+du r p (cc + ff - ffpp)}{2rfg u (p-p^3-nu)} \text{ hincque}$$

$$s = \frac{+r p (cc + ff - ffpp)}{2r n f g} \int \frac{du}{r(p-p^3-nu)} = C +$$

$$\frac{r p (cc + ff - ffpp)}{2r n f g} \Lambda \sin \text{vers} \frac{2nu}{p-p^3}$$

ubi

# MOTUS TURBINUM SUPER PLANO &c. 387

ubi debet esse  $C = 0$ . Quare ab initio ubi  $u = 0$  seu  $p = p$  usque ad tempus, quo inclinatio fit maxima  $u = \frac{p(1-pp)}{n}$ , seu  $p = p - \frac{p(1-pp)}{n}$ , erit tempus  $= \frac{\pi r p(cc+ff-ffpp)}{2r nfg}$ , quod ergo eo est brevius, quo major fuerit numerus  $n$ .

Deinde vero fit  $d\lambda = \frac{-r nfg}{c(1-pp)r p} u dt$  five

$$\lambda = \frac{-r(cc+ff-ffpp)}{c(1-pp)} \int \frac{du r u}{r(p-p^2-u)}, \text{ unde elicitur}$$

$$\lambda = \frac{-r(cc+ff-ffpp)}{c(1-pp)} \left( \frac{p(1-pp)}{2n} A \sin \text{verf.} \frac{2nu}{p(1-pp)} - r \left( \frac{p(1-pp)}{n} u - nu \right) \right).$$

Arcus scilicet ZA in sensum oppositum progreditur, et elapso tem-

$$\text{pore } t = \frac{\pi r p(cc+ff-ffpp)}{2r nfg} = \frac{\pi c r(cc+ff-ffpp)}{2aa} \text{ quo turbo ma-}$$

xime ad horizontem inclinatur, fit  $\lambda = - \frac{\pi p r(cc+ff-ffpp)}{2nc}$ . Non

quidem axis A motu aequabili circa verticem Z circumferetur, sed ne-

glecta motus inaequalitate, erit celeritas angularis media  $= \frac{r pfg}{c r n} =$

$$\frac{2fg}{aa}, \text{ ob } n = \frac{aa p}{4ccfg}, \text{ ita ut haec celeritas angularis ipsius axis turbi-}$$

nis circa verticem Z sit reciproce, ut celeritas angularis turbinis circa proprium axem. Deinde dum turbo maximam habet inclina-

tionem, ut sit  $p = p - \frac{4ccfg(1-pp)}{aa}$ , celeritas angularis & ita definitur

ut sit

$$uu = aa + \frac{16ffgg(1-pp)}{aa^4} \text{ seu } u = a + \frac{8ffgg(1-pp)}{a^3 a^4},$$

$$\text{eritque } \cos a = \cos AO = 1 - \frac{8ffgg(1-pp)}{a^4 a^4} = 1 - \frac{1}{2} aa$$

$$\text{seu ipse arcus minimus } a = AO = \frac{4fg r(1-pp)}{aa}$$

Ccc. 2

Pro

Pro preffione autem cuspidis F in planum horizontale habetur pro motus initio, seu ubi  $p = p$ , et axis turbinis maxime erectus  $\frac{\Pi}{M} =$

$\frac{cc}{cc + ff - ffpp}$ : at quando turbo maxime inclinatur:

$$\frac{\Pi}{M} = \frac{cc + 2ff(1 - pp)}{cc + ff - ffpp} - \frac{cccf^3gp(1 - pp)}{aa^2(cc + ff - ffpp)}$$

Haecque ad motus cognitionem sufficiunt.

## COROLL. 1.

870. Si axis turbinis initio fuerit in  $a$ , posito  $Za = l$  cum sit  $p = \cos l$ ,  $\beta$   $\Delta$  sit maxima elongatio axis a vertice, posito  $Z\Delta = l$ , quia est  $p = \cos l = \cos l - \frac{4ccfg\sin l^2}{aa^2}$  erit  $l = l + \frac{4ccfg\sin l}{aa^2}$ .

## COROLL. 2.

871. Quia in maxima turbinis inclinatione arcus  $ZA$  est maximus, evidens est polum gyrationis  $O$  tum in ipsum arcum  $ZA$  cadere debere, ut sit  $ZO < ZA$ , et tum intervallum hoc  $AO$  erit  $= \frac{4fg\sqrt{1 - pp}}{aa}$ .

## SCHOLION.

872. Haecenus summus turbini initio motum gyrationum imprimi circa ipsum axem  $AF$ , qui est casus maxime communis. Verum tamen fieri potest, ut ipsi circa alium axem motus imprimatur, quod evenit, si axis verus  $AF$ , dum turbo circa eum gyatur, simul impulsionem accipiat, qua ad horizontem vel magis inclinetur, vel inde magis erigatur. Hoc enim eodem redit, ac si turbini circa alium axem motus gyrationis imprimeretur, nisi quatenus inde simul motus progressivus oritur, qui cum nihil habeat difficultatis, ad eum non respiciamus. Casus quidem jam ante tractatus huc referri potest, si statum quendam medium, quo turbo jam circa alium axem praeter  $AF$  gyatur, tanquam initialem spectemus, sed quoniam ibi axis turbinis se nunquam ad situm verticalem erigere potest, in eo non omnes motus continentur. Quare conveniet adhuc eum casum pertractari, quo turbinis axis  $AF$  primo quidem tenet situm verticalem, ipsi autem motus gyrationis circa alium axem ad horizontem inclinatum imprimitur, quem casum etiam per formulas generales ante evolutas resolvere poterimus.

PRO-

P R O B L E M A. 102.

873. Si turbinis axis initio fuerit verticalis, eique circa axem quendam inclinatum impressus sit motus gyratorius data celeritate angulari, determinare motum turbinis.

S O L U T I O.

Cum ergo initio punctum A fuerit in Z, ponamus arcum AC in circulum ZX incidisse, ita ut arcus AB fuerit ad ZX normalis. Quare facto  $t = 0$ , erat  $l = 0$ ,  $m = 90^\circ$  et  $n = 90^\circ$ , ideoque  $p = 1$ ,  $q = 0$ , et  $r = 0$ : ac  $\mu = 90^\circ$ ,  $\nu = 0$ , manente  $\lambda$  indefinito, tum vero initio turbini impressus fuerit motus gyratorius celeritate angulari  $= s$  in sensum ABC circa polum in arcu AC situm, ita utposito  $t = 0$ , fuerit  $\alpha = a$ ,  $\zeta = 90^\circ$ , et  $\gamma = 90^\circ - a$ , ideoque  $x = s \cos a$ ,  $y = 0$ , et  $z = s \sin a$ . His positis statum turbinis post tempus  $= t$  ex §. 862. definimus, si constantes per integrationem ingressas his conditionibus convenienter determinemus. Primo ergo fiet  $A = s \cos a$ , deinde B

$$= \frac{aa}{cc} s \cos a; \text{ tertio } \frac{Ccc}{ff} - \frac{4g}{f} - \frac{s^2 cc \sin^2 a}{ff} = 0, \text{ sive } C = \frac{4fg}{cc} + ss \sin^2 a; \text{ His autem valoribus substitutis obtinebimus.}$$

$$qy + rz = \frac{saa \cos a}{cc} (1-p)$$

$$qz - ry = \frac{r(\sec^4(1-pp)\sin^2 a + 4ccfg(1-p)(1-pp) - s^2 a^2(1-p)^2 \cos^2 a)}{c r(cc+ff-ffpp)}$$

$$yy + zz = \frac{s \sec^6 \sin^2 a + 4c^2 fg(1-p) + s^2 a^2 ff(1-p)^2 \cos^2 a}{c^4(cc+ff-ffpp)}$$

$$\text{hincque } dt = \frac{-cdpr(cc+ff-ffpp)}{r(1-p)(4ccfg(1-pp) + \sec^4(1+p)\sin^2 a - s^2 a^2(1-p)\cos^2 a)}$$

quoniam initio quantitas  $p$  minuitur.

Porro ob  $ss = xx + yy + zz$  et  $x = s \cos a$  erit

$$ss = s \cos^2 a + \frac{s \sec^6 \sin^2 a + 4c^2 fg(1-p) + s^2 a^2 4ff(1-p)^2 \cos^2 a}{c^4(cc+ff-ffpp)}$$

ac tandem

$$d\lambda = \frac{-saa dt \cos a}{cc(1+p)}$$

CO.



## COROLL. 1.

874. Ex formula pro  $dt$  inventa judicare licet, utrum turbo sit prolapsurus, nec ne? ponatur enim  $p = 0$ , et denominatoris factor  $4ccfg + \sec^4 \sin a^2 - \sec^4 \cos a^2$ , quoties est positivus, turbinem ad lapsum proclivem indicat: quod ergo evenit, si  $4ccfg + \sec^4 \sin a^2 > \sec^4 \cos a^2$ .

## COROLL. 2.

875. Ne ergo turbo prolabatur, primo necesse est, ut sit  $a^4 \cos a^2 > c^4 \sin a^2$ , seu  $\tan a < \frac{aa}{cc}$ , deinde vero esse oportet  $\frac{4ccfg}{a^4 \cos a^2 - c^4 \sin a^2}$ ; seu celeritas angularis primum impressa superare debet limitem  $\frac{2c^2 fg}{\sqrt{(a^4 \cos a^2 - c^4 \sin a^2)}}$ : et quidem notabiliter, ne turbo, dum inclinatur, corpore suo horizontem attingat.

## COROLL. 3.

876. Quando autem est tam  $\tan a < \frac{aa}{cc}$  quam  $\frac{4ccfg}{a^4 \cos a^2 - c^4 \sin a^2}$ , axis turbinis non ad horizontem usque inclinari, seu quantitas  $p$  ad nihilum usque diminui potest: sed minimus ejus valor prodians ex aequatione  
 $4ccfgpp = \sec^4 p (a^4 \cos a^2 + c^4 \sin a^2) - \sec^4 \cos a^2 + \sec^4 \sin a^2 + 4ccfg$   
reperitur

$$p = \frac{\sec^4 (a^4 \cos a^2 + c^4 \sin a^2) - \sqrt{\sec^4 (a^4 \cos a^2 + c^4 \sin a^2)^2 - 16 \sec^4 ccfg (a^4 \cos a^2 - c^4 \sin a^2) + 64 c^4 ffgg}}{4ccfg}$$

## COROLL. 4.

877. Sin autem fuerit  $\tan a = \frac{aa}{cc}$  seu  $a^4 \cos a^2 = c^4 \sin a^2$ , aequatio inter  $p$  et  $z$  erit  $dt = \frac{-dp \sqrt{(cc + ff - ffp)}}{\sqrt{(1-p)(4fg(1-pp) + 2 \sec^4 ccps a^2)}}$   
atque  $p$  non solum ad nihilum usque, sed etiam ad valorem negativum minui poterit, qui foret:

$$p =$$

$$p = \frac{11ccfa^2 - r(1^2c^2fa^2 + 16ffgg)}{4fg}$$

sed tantam inclinationem status quaestionis excludit.

# SCHOLION.

878. Status initialis talem motum exhibens in fig. 112. repraesentatur, ubi axis turbine A in ipso vertice versatur, bini reliqui vero in B et C, et circulum quidem verticalem fixum AX ita assumimus, ut in eo esset quadrans AC, et alter AB ad istum normalis. Initio motus ergo erat  $l = 0$ ,  $m = 90^\circ$ ,  $n = 90^\circ$ , ideoque  $p = 1$ ,  $q = 0$ ,  $r = 0$ , tum vero  $\mu = 90^\circ$  et  $\nu = 0$ , existente  $\lambda$  indefinito. Deinde vero turbine initio motum gyrationum impressum esse sumo circa axem IO, existente arcu AO = a, eumque celeritate s in sensum ABC: sicque posito  $z = 0$  erat  $\omega = a$ ,  $\phi = 90^\circ$ ,  $\gamma = 90^\circ - a$ , et  $\varepsilon = s$ , hincque  $x = s \cos a$ ,  $y = 0$  et  $z = s \sin a$ . Ne igitur hoc casu turbo probatur, binæ conditiones requiruntur, altera ut sit  $\tan a$  seu  $\tan$

AO <  $\frac{aa}{cc}$ , et altera ut sit  $s > \frac{2c\sqrt{fg}}{r(a^2 \cos a^2 - c^2 \sin a^2)}$ . Ac si velimus ut axis quam minime inclinetur, fiatque  $p = 1 - \omega$  existente  $\omega$  particula valde parva, reperitur

$$\omega = \frac{211c^2fa^2}{11a^2 \cos a^2 + 11c^2fa^2 - 8ccfg}$$

quare arcus AO = a quam minimus esse, deinde vero  $11a^2$  multum excedere debet  $8ccfg$  ut sit  $s > \frac{2c\sqrt{2fg}}{aa}$ . Quod si eveniat, motus satis erit regularis, quem accuratius determinasse juvabit.

# PROBLEMA. 103.

879. Si turbine in situ erecto constituto circa axem quam minime declinantem impressus fuerit motus gyrationis satis celer, ut turbo parumper tantum a statu erecto recedat, ejus motum determinare.

# SOLUTIO.

Sumimus ergo arcum AO = a initio fuisse valde parvum, et celeritatem angularem initio impressam s tantam ut fuerit  $11a^2 \cos a^2 > 8ccfg$ . Ponamus ergo

$$11a^2 \cos a^2 = 8nccfg \text{ ut sit } n > 1, \text{ et habebimus}$$

dt

$$dt = \frac{-cdp r(cc+ff-ffap)}{r(1-p)(4ccfg(s-pp) - 8nccfg(1-p) + sc^2(1+p)ka^2)}$$

Quia ergo novimus  $p$  parum infra unitatem diminui, statuemus  $p=1-u$ , fietque neglectis terminis minimis

$$dt = \frac{cd u}{r u(sfgu - 8nfgu + 2sc^2fa^2 - sc^2cu fa^2)}$$

cujus integrale est

$$t = \frac{c}{r(cc^2fa^2 + 8(n-1)fg)} A \sin \text{vers.} \frac{u(cc^2fa^2 + 8(n-1)fg)}{cc^2fa^2}$$

$$\text{Cum nunc maximus valor ipsius } u \text{ sit} = \frac{2sc^2fa^2}{cc^2fa^2 + 8(n-1)fg} \text{ tempus}$$

$$\text{usque ad maximam turbinis inclinationem est} = \frac{\pi c}{r(cc^2fa^2 + 8(n-1)fg)}$$

$$= \frac{\pi cc}{r(cc^2 \cos^2 \alpha + sc^2 \sin^2 \alpha - 8ccfg)}$$

atque turbo tum declinabit a situ erecto angulo exiguo, cujus sinus

$$\text{versus est} = \frac{2sc^2 \sin \alpha}{cc^2 \cos^2 \alpha + sc^2 \sin^2 \alpha - 8ccfg} \text{ et ipse angulus} =$$

$$\frac{2sc^2 \sin \alpha}{r(cc^2 \cos^2 \alpha + sc^2 \sin^2 \alpha - 8ccfg)} \text{ Deinde cum sit } d\lambda = \frac{-aa \, dt \, \cos \alpha}{cc(1+p)},$$

hicque  $p$  ut constans = 1 considerari possit, tempore quo turbo ad maximam inclinationem pertingit, ejus axis versabitur in plano verticali, quod a circulo ZX declinat angulo XZA = 90° —

Fig. III.

$$\frac{\pi aa \cos \alpha}{2r(cc^2 \cos^2 \alpha + sc^2 \sin^2 \alpha - 8ccfg)} \text{ primo enim initio, quo A circa}$$

O gyatur fig. III. angulus  $\lambda$  est rectus seu =  $\frac{\pi}{2}$ .

#### COROLL. I.

880. Cum arcus initialis AO =  $a$  sit quasi infinite parvus, et angulus XZA =  $\lambda$  initio fuerit = 90°, elapso tempore  $t$ , fiet hic angulus

$$\lambda = 90^\circ - \frac{aa t}{2cc}. \text{ Axis ergo turbinis ex puncto verticali egressus}$$

in

# MOTUS TURBINUM SUPER PLANO &c. 393

in antecedentia movetur, et integrum circuitum absolvit tempore =

$$\frac{4\pi cc}{aa} \text{ min. sec.}$$

## COROLL. 2.

881. Cum initio esset  $u = 0$ , elapso tempore  $t$  fiet

$$1 - \frac{u(aa^2 - 8ccfg)}{aa^2 fga} = \cos \frac{tr(aa^2 - 8ccfg)}{cc}$$

Posito autem arcu ZA minimo =  $l$ , ob  $p = \cos l = 1 - \frac{1}{2}u$ , erit  $u$

$$= \frac{1}{2}u, \text{ hincque } l = \frac{2cc fga}{r(aa^2 - 8ccfg)} \sin \frac{tr(aa^2 - 8ccfg)}{2cc}$$

ita ut ad quodvis tempus  $t$  assignare valeamus  $\lambda$  et  $l$ .

## COROLL. 3.

882. Cum axis turbinis ex Z digressus ad maximam declinationem

pertingit, praeterlabitur tempus =  $\frac{\pi cc}{r(aa^2 - 8ccfg)}$ , quo tempore

is circa Z in antecedentia circumfertur per angulum =  $\frac{\pi aa}{2r(aa^2 - 8ccfg)}$ ,

qui ergo recto est major: atque in verticem Z revertetur absoluto an-

gulo =  $\frac{\pi aa}{r(aa^2 - 8ccfg)}$  majore duobus rectis.

## SCHOLIUM.

883. Hujusmodi motibus evolvendis fufius non immoror, cum quoniam omnia phaenomena facile ex formulis inventis derivari queant. Probe autem meminisse oportet, hic nullam frictionis rationem esse habitam, quae quamvis parva statuatur, phaenomena hic definita vehementer perturbat. Ex frictione enim, quam cuspidis F super plano horizontali incedens patitur, nascitur vis horizontalis, qua turbini motus progressivus imprimitur, et quia directio illius vis continuo mutatur, facile causa perspicitur, cur turbines motu curvilineo incedere observentur. Verum motus ob frictionem perturbati singularem exigunt tractationem: quare sepositis hujusmodi impedimentis ad alia quaedam motus genera, in quibus gyratio occurrit, progrediamur; et quoniam hic ejusmodi corpora sunt contemplatus, quae cuspidem super plano hori-

Ddd

zon-

zontali incedunt, ita ut cuspis sit quasi basis eorum censenda, hinc ad alia corporum genera ducimur, quae basi quacunque super plano incedant. Ac de basi quidem plana vel angulosa vix quicquam proferri potest attentione dignum, cum vel nullus motus gyriorius locum inveniat, ideoque motus determinatio nihil habeat difficultatis, vel saltem per saltus gyratio se immisceat, dum contactus ad aliam hedram transfertur, ubi simul conflictus se exerit, cujus explicatio ad aliam Mechanicae partem est referenda. Hic igitur ejusmodi tantum bases, quibus corpora super plano immobili incedant, contemplari convenit, quae curvatura continua sint praeditae, ne ullus saltus in motu occurrat. Niuias autem ambages, quae in calculos inextricabiles perducerent, evitaturi, duo tantum corporum genera, cylindrica scilicet ac sphaerica, potissimum evolvauius, quorum nimirum figura externa, qua plano applicantur, sit vel cylindrica vel sphaerica, quomodocunque materia intrinsecus fuerit distributa, cujus ratio ex centro inertiae et axibus principalibus determinatur. Hinc ad genus cylindricum referuntur ea pendula, quae non ab axe lineari, uti supra assumimus, sunt suspensa, sed axiculis cylindricis utrinque plano horizontali incumbant. Deinde etiam huc pertinet motus vacillatorius motui cunarum reciproco similis, cujusmodi corpora, quatenus super plano incumbunt, tanquam cylindrica spectari possunt. Deinde etiam, quomodo huiusmodi corpora super plano inclinato descendant, operae pretium erit scrutari. Ad corpora porro sphaerica refero non solum ea, quorum tota figura est globosa, sed etiam quae inferius, ubi planum attingunt, in hemisphaerium sunt efformata, veluti sunt turbines, quorum axes infra non in cuspidem sed quasi in hemisphaerium desinunt; ubi quidem centrum inertiae magis est elevatum, quam centrum hemisphaerii, quando autem profundius est situm, aliud motus genus oriri potest, quo corpus quasi titubando oscillationes peragit, in quo motu mira motus gyriorii perturbatio locum habere potest.



# CAPUT XVIII.

## DE MOTU CORPORUM BASI SPHAERICA PRAEDITORUM SUPER PLANO HORIZONTALI.

### P R O B L E M A. 104.

884. Si corpus basi sphaerica praeditum plano horizontali quomodocunque incumbat, definire vires, quibus sollicitatur, earumque effectum in motu corporis progressivo turbando.

### S O L U T I O.

Sit  $EH$  planum horizontale et  $T$  punctum, ubi corpus ei insistit, Fig. 113. in corpore autem notetur primo centrum baseos sphaericae  $MTN$ , quod sit in  $G$ , deinde centrum inertiae corporis  $I$ , ac tabula repraesentet planum, in quo haec tria puncta sunt sita. Ducatur radius  $GT$ , qui cum sit ad horizontem  $EH$  normalis, situm habebit verticalem, ideoque ipsum planum  $TGI$  erit verticale. Iam quia pro motu progressivo totam corpus massam, quae sit  $= M$ , tanquam in centro inertiae  $I$  collectam concipere licet, ducta  $IP$  ipsi  $GT$  parallela corpus primo ob gravitatem urgetur in directione  $IP$  vi  $= M$ ; deinde vero ubi planum horizontale in  $T$  tangit, ab eo certa quadam vi urgetur sursum in directione  $TG$ , et pressioni aequali, quae vis sit  $= \Pi$ . Quare nisi hae duae vires se destruant, corpus in quiete persistere nequit: ex quo perspicuum est, statum quietis exigere, ut producta recta  $GI$  in  $F$  corpus puncto  $F$  plano horizontali insistat, sicque recta  $DIGF$  fiat verticalis. Figura ergo repraesentat statum corporis inclinatum, et inclinatio indicatur angulo  $FGT$ , qui sit  $= \varphi$ , quo evanescente corpus in statu aequilibrui versatur. Ponamus porro radium basis sphaericae  $GF = GT = e$ , et intervallum punctorum  $G$  et  $I$  nempe  $GI = f$ , quatenus centrum inertiae  $I$  longius distat a puncto  $F$  quam centrum figurae  $G$ : ita ut si propius caderet, quantitas  $f$  negative esset accipienda. Hinc ergo erit  $IP = e + f \cos \varphi$ , quae est altitudo centri inertiae  $I$  supra planum horizontale  $EH$ , et quae a viribus sollicitantibus sola afficitur. Translata autem vi  $TG = \Pi$  in centrum inertiae  $I$ , punctum  $I$  deorsum sollicitatur vi  $= M - \Pi$ ; et quia ejus celeritas deorsum directa est

$Ddd =$

$= \frac{f d e \sin e}{dt}$ , posita ea =  $\pi$  erit  $du = \frac{2g(M-\pi)dt}{M}$ , denotante  $dt$  elementum temporis, ex quo habetur  $f(dd e \sin e + de^2 \cos e) = 2g(1 - \frac{\pi}{M}) dt^2$  sumto  $dt$  constante: neque aliter motus progressivus afficietur.

## COROLL. 1.

885. Vicissim ergo si ratio motus progressivi detur, vel saltem ut data consideretur, inde pressio  $\pi$  definietur, cum sit  $\frac{\pi}{M} =$

$$1 - \frac{f(dd e \sin e + de^2 \cos e)}{2g dt^2} \text{ seu } \frac{\pi}{M} = 1 + \frac{f dd \cos e}{2g dt^2}.$$

## COROLL. 2.

886. Si fuerit  $f = 0$ , seu centrum inertiae I in ipsum centrum sphaerae G incidat, prodit  $\pi = M$ , et corpus in omni situ aequilibrîi proprietate gaudet.

## COROLL. 3.

887. Si fuerit  $f > 0$  seu  $FI > FG$ , statim ac corpus tantillum inclinatur, a vi sollicitante inclinatio augebitur, sin autem sit  $f < 0$  seu  $FI < FG$ , inclinatio minuetur, corpusque in situm aequilibrîi, quo punctum F plano insistit, restituetur: dum priori casu procumbit, alium quaerens aequilibrîi situm.

## SCHOLION. 1.

888. Quamcunque autem corpus habuerit figuram, in eo semper ad minimum duo dantur aequilibrîi situs, quorum alter ita est comparatus, ut si corpus ex eo parumper declinetur, sponte sua se restituat, alter vero, ut penitus prolabatur: quorum prior *status aequilibrîi stabilis*, posterior vero *labilis* vocari solet. Quodcunque enim corpus plano horizontali incumbit, in aequilibrîo versatur, si recta a centro inertiae ad punctum contactus ducta fuerit verticalis: id quod semper duplici saltem modo evenire potest. Namque si ex centro inertiae ad omnia superficiei puncta rectae concipiantur ductae, quoniam nulla earum vel evanescit, vel sit infinita, inter eas necesse est dari et

et maximam et minimam : utraque autem ad planum tangens erit normalis : quare si corpus alterutro eorum punctorum , a quibus centrum inertiae vel maxime vel minime distat , plano horizontali incumbat , recta ex centro inertiae ad punctum contactus ducta erit verticalis , idcircoque situm aequilibrum dabit , eumque stabilem , si recta ista fuerit minima , contra vero labilem , si maxima : unde intelligitur , centrum inertiae semper infimum locum quaerere , ubi acquiescat . Saepenumero autem plures dantur aequilibrum situs , alii stabiles alii labiles , qui se alternatim excipere debent , quoniam corpus ex situ labili digressum in stabilem perveniat necesse est .

SCHOLION. 2.

889. In praesente casu , quo corporis superficiem sphaericam statuimus , recta per centrum inertiae I et centrum figurae G ducta dabit duo illa puncta F et D , quibus si corpus plano horizontali incumbat , situm aequilibrum teneat : ac dum puncto F planum horizontale tangit , situs aequilibrum erit stabilis , si  $FI < FG$  seu  $f < 0$  , labilis autem si  $FI > FG$  seu  $f > 0$  : neque praeter hos duos situs aequilibrum alius hic dabitur , nisi fuerit  $f = 0$  , quo casu subito omnes plane situs aequilibrum indolem recipiunt . Et si autem hic totam corporis superficiem ut sphaericam considero , tamen ad institutum nostrum sufficit , si ea saltem portio , qua durante motu planum horizontale contingit , fuerit sphaerica : atque hinc ista tractatio etiam ad eos turbines patet , quorum axes inferius non in cuspidem , ut ante assumimus , sed in hemisphaerium vel etiam minus sphaerae segmentum efformantur , ita ut forma supra considerata hinc prodeat , si radius sphaerae  $GF = e$  evanescat , sicque haec tractatio superiorem in se complectatur . Recta igitur DIGF per centrum inertiae I et centrum basis sphaericae G ducta proprium turbine axis exhibet , quae quidem , uti turbines construuntur solent , simul unus est axium principalium corporis , bini vero reliqui momenta inertiae habent paria , qualem formam jam supra statuimus . Verum quo haec tractatio latius pateat , simulque ad titubationes corporum quorumcunque basi sphaerica praeditorum accommodari queat , axes corporis principales utcumque ab axe proprio DF diversos considerabo , eorumque respectu momenta virium explorabo .

PROBLEMA. 105.

890. Data pressione  $\Pi$  , quo corpus basi sphaerica praeditum plano horizontali incumbit , definire momenta inde orta respectu axium

Ddd 3

princi-



principalium corporis, quomodocunque hi ratione axis proprii corporis fuerint dispositi.

## SOLUTIO.

Fig. 114. Circa corporis centrum inertiae I descripta sphaera, sit Z ejus punctum verticale, axisque proprius teneat jam situm DIG, ut ejus declinatio a situ verticali sit  $DZ = \varphi$ . Cum ergo directio pressionis  $\Pi$  sit verticalis et per punctum G transeat existente  $IG = f$ , referat recta verticalis  $G\Pi$  hanc pressionem  $= \Pi$ , ita ut  $ZDG\Pi$  sit planum verticale, in quo resolvatur vis  $G\Pi = \Pi$  secundum directiones  $GI$  et  $GV$ , quarum haec ad illam sit normalis, et ob angulum  $DG\Pi = \varphi$  prodit vis secundum  $GI = \Pi \cos \varphi$  et vis secundum  $GV = \Pi \sin \varphi$ : quarum illa per centrum inertiae I transiens nulla suggerit momenta. Sint nunc  $IA$ ,  $IB$ ,  $IC$ , corporis tres axes principales, datum situm ratione axis proprii  $ID$  tenentes, ac per puncta  $A$ ,  $B$ ,  $C$  ex  $D$  ducantur semicirculi  $DAG$ ,  $DBG$ ,  $DCG$ . Quodsi axis  $IA$  esset normalis ad planum  $IGV$ , ejus respectu foret momentum vis  $GV = \Pi f \sin \varphi$ , quod autem nunc in ratione sinus totius tam ad sinum arcus  $GA$  quam ad sinum anguli  $VGA$  minui debet, ita ut ex vi pressionis resultet

mom. respectu axis  $IA = \Pi f \sin \varphi \cdot \sin GA \cdot \sin VGA$  in sensum  $CB$

mom. respectu axis  $IB = \Pi f \sin \varphi \cdot \sin GB \cdot \sin VGB$  in sensum  $AC$

mom. respectu axis  $IC = \Pi f \sin \varphi \cdot \sin GC \cdot \sin VGC$  in sensum  $BA$ .

Haec autem terna momenta supra litteris  $P$ ,  $Q$ ,  $R$  indicavimus, quatenus quidem in sensum contrarium agere statuuntur, quare omnibus ad punctum  $D$  translatis habebimus:

$$P = -\Pi f \sin DZ \cdot \sin DA \cdot \sin ZDA = -\Pi f \sin ZD \cdot \sin ZA \cdot \sin DZA$$

$$Q = -\Pi f \sin DZ \cdot \sin DB \cdot \sin ZDB = -\Pi f \sin ZD \cdot \sin ZB \cdot \sin DZB$$

$$R = -\Pi f \sin DZ \cdot \sin DC \cdot \sin ZDC = -\Pi f \sin ZD \cdot \sin ZC \cdot \sin DZC.$$

## C O R O L L. I.

891. Assumimus hic; centrum basis  $G$  propius esse termino iino  $F$  quam centrum inertiae  $I$ : sin autem secus eveniat, ut intervallum  $FI$  minus sit intervallo  $FG = e$ , intervallum  $GI = f$  negative capi debet. At si fuerit  $GI = 0$ , momenta inventa evanescent, seu corpus in omni situ aequilibrium tenebit.

## C O R O L L. 2.

892. Si pro situ axis proprii  $ID$  respectu axium corporis principalium ponatur, arcus  $AD = \zeta$ ,  $BD = \eta$ ,  $CD = \theta$ , tum vero angulus  $ZDA$

$ZDA = \varphi$ , existente arcu  $ZD = \varrho$ , ob  $\cos ADB = -\frac{\cos \zeta \cos \eta}{\sin \zeta \sin \eta}$  et  $\sin$

$ADB = \frac{-\cos \theta}{\sin \zeta \sin \eta}$ , quia  $\sin ADB : \sin DAB$  seu  $\sin ADB : -\cos DAC = 1 : \sin$

$BD = 1 : \sin \eta$ , erit  $\sin ZDB = \frac{-\cos \zeta \cos \eta \sin \varphi + \cos \theta \cos \varphi}{\sin \zeta \sin \eta}$ , at  $\cos DAC =$

$\frac{\cos CD}{\sin AD} = \frac{\cos \theta}{\sin \zeta}$ , ideoque  $P = -\pi \sin \varrho \sin \zeta \sin \varphi$ , atque

$Q = \frac{\pi \sin \varrho (\cos \zeta \cos \eta \sin \varphi - \cos \theta \cos \varphi)}{\sin \zeta}$  et  $R = \frac{\pi \sin \varrho (\cos \zeta \cos \theta \sin \varphi - \cos \eta \cos \varphi)}{\sin \zeta}$ .

### COROLL. 3.

893. Si axis proprius ID congrueret cum axe principali IA, foret  $\zeta = 0$  atque  $\eta = \theta = 90^\circ$ , ut esset  $\cos \eta = \cos \theta = \sin \zeta$  et angulus  $\varphi$  maneret indefinitus. At ex prioribus formulis fiunt momenta virium:

$P = 0$ ,  $Q = -\pi \sin \varrho \sin \zeta \sin \varphi$ , et  $R = -\pi \sin \varrho \sin \zeta \sin \varphi$   
seu  $P = 0$ ,  $Q = \pi \sin \varrho \cos \zeta$  et  $R = -\pi \sin \varrho \cos \zeta$ .

### COROLL. 4.

894. Quodsi vero ut supra ponamus  $ZA = l$ ,  $ZB = m$  et  $ZC = n$ , reperiemus momenta virium in genere

$P = \pi \sin \varrho (\cos \theta \cos m - \cos \eta \cos n)$ ;  $Q = \pi \sin \varrho (\cos \zeta \cos n - \cos \theta \cos l)$   
atque  $R = \pi \sin \varrho (\cos \eta \cos l - \cos \zeta \cos m)$ ,  
unde illa si  $\zeta = 0$ , et  $\eta = \theta = 90^\circ$  sponte sequuntur.

### EXPLICATIO.

895. Ratio investigationis harum posteriorum formularum ita se habet: Primo cum sit  $\sin \varphi \sin ZDA = \sin ZA \sin ZAD$  erit  $P = -\pi \sin \varphi \sin DA \sin ZA \sin ZAD$ ; at est  $ZAD = BAD - BAZ$ , et

$$\sin BAD = -\cos CAD = \frac{-\cos \theta}{\sin DA}; \cos BAD = \frac{\cos \eta}{\sin DA}$$

$$\sin BAZ = -\cos CAZ = \frac{-\cos n}{\sin ZA}; \cos BAZ = \frac{\cos m}{\sin ZA}$$

unde  $\sin ZAD = \frac{-\cos m \cos \theta + \cos n \cos \eta}{\sin ZA \sin DA}$  et  $P = +\pi \sin \varrho (\cos \theta \cos m - \cos \eta \cos n)$ ;

Reliqua

Reliqua duo momenta Q. et R. praebet analogia sine ulteriori calculo. Deinde vero est  $\cos DL = \cos \varphi = \cos \zeta \cos l + \cos \eta \cos m + \cos \theta \cos n$ , quae expressio uti unitatem nunquam superare potest, ita unitati aequalis esse nequit, seu  $DL = 0$ , nisi sit  $l = \zeta$ ,  $m = \eta$  et  $n = \theta$ , scilicet has ternas determinationes simul suppeditat haec aequatio,  $\cos \zeta \cos l + \cos \eta \cos m + \cos \theta \cos n = 1$ . Cum enim praeterea sit

$$\cos^2 \zeta + \cos^2 \eta + \cos^2 \theta = 1 \text{ et } \cos^2 l + \cos^2 m + \cos^2 n = 1,$$

si a summa harum illius duplum subtrahatur, prodit

$$(\cos \zeta - \cos l)^2 + (\cos \eta - \cos m)^2 + (\cos \theta - \cos n)^2 = 0,$$

trium autem quadratorum summa nihilo aequari nequit, nisi singula sint nulla.

## SCHOLIUM.

896. Cum neque in his expressionibus pro momentis virium, P,

Q, R inventis, neque in pressione  $\Pi = M \left( 1 + \frac{f d d. \cos \varphi}{2 g d t^2} \right)$  radius

sphaerae  $e$  basin constituentis insit, cuncta quae supra de motu turbine infra in cuspidem desinentis sunt tradita, etiam valent de ejusmodi turbinibus, qui desinunt in hemisphaerium seu aliam sphaerae partem, dummodo punctum F, quod ante cuspidem denotabat, hic in centro figurae sphaericae G constituitur. Perinde ergo est, siue turben gyretur super cuspide, siue super hemisphaerio, dummodo  $f$  sit distantia centri inertiae I a centro basis sphaericae, quantuscunque enim fuerit radius hujus basis  $e$ , is in computum non ingreditur, eo autem evanescente basis turbine abit in cuspidem. Totum igitur caput praecedens hic inferi intelligatur, ita ut Theoria turbine sine ullo labore haud mediocriter amplificata sit censenda. Basin autem sphaericam faciendo casus occurrit ante exclusus, scilicet quo centrum inertiae I fundo propius est, quam centrum sphaericitatis, hicque sit quantitas  $f$  negativa. Sive jam tale corpus sit globus, completus, siue basin habeat MFN portionem sphaerae, centro G descriptae, qua plano horizontali incumbat, ejus motum, quatenus contactus in hanc basin cadit, investigemus. Hic autem cogimur corpori talem indolem tribuere, ut axis proprius AGIF, qui si fuerit verticalis, statum quietis exhibeat, simul sit corporis axis principalis, reliqui vero bini axes principales habeant momenta inter se aequalia. Scilicet si respectu axis IA momentum inertiae sit  $Maa$  respectu binorum reliquorum vero  $Mbb$ , et  $Mcc$ , statuamus  $bb = cc$ . Hujusmodi ergo corpus quemcunque receperit motum impressum, quomodo motum sit continuaturum, determinemus.

PRO-

Fig. 115.

## P R O B L E M A. 106.

897. Si corpus basi sphaerica MFN instructum, in quo axis aequilibrii AGIF sit axis principalis, ejusque respectu momentum inertiae =  $Maa$ , respectu binorum reliquorum autem aequalia =  $Mcc$ , motum acceperit quemcunque, determinare motus continuationem.

Fig. 115.

## S O L U T I O.

Sit radius basis sphaericae  $FG = e$ , centrum autem inertiae  $I$  cadat infra centrum basis  $G$  ad intervallum  $GI = f$ . Pro motu progressivo, si centrum inertiae  $I$  habuerit motum secundam directionem horizontalem, eum constantem in directum conservabit, quatenus autem motu verticali cietur, is cognita pressione, quae sit =  $\Pi$ , inde definietur,

quod si declinatio axis  $AF$  a situ verticali ponatur =  $\varphi$ , sit  $\frac{\Pi}{M} = r -$

$\frac{fdd \cos \varphi}{2gdt^2}$ , existente  $M$  corp o ris massa seu pondere. Verum ipsa haec

pressio  $\Pi$ , quam corpus in planum horizontale exerit, non nisi ex motu gyrationis cognosci potest.

Fig. 116.

Tempor ergo corpus nostrum respectu sphaerae fixae, in qua  $Z$  est punctum verticale, nunc elapso tempore  $t$  ejusmodi situm, ut ejus axes principales in  $A, B, C$  pertingant, ponanturque arcus  $ZA = l$ ,  $ZB = m$ ,  $ZC = n$ , tum vero anguli  $XZA (= \lambda)$ ,  $XZB (= \mu)$ ,  $XZC (= \nu)$  ita ut sit  $l = e$ . Nunc autem gyretur circa polum  $O$  in sensum  $ABC$  celeritate angulari =  $\omega$ , ac positae arcibus  $OA = a$ ,  $OB = b$ ,  $OC = \gamma$  sit brevitatis gratia  $\omega \cos a = x$ ,  $\omega \cos b = y$ ,  $\omega \cos \gamma = z$ . Momenta autem virium ex pressione  $\Pi$  orta sunt  $P = 0$ ,  $Q = -\Pi f \cos \varphi$ ,  $R = +\Pi f \cos m$ , unde colligimus sequentes aequationes:

$$dx = 0; dy + \frac{aa - cc}{bc} x y dz = \frac{-2\Pi f g dt \cos n}{Mcc}; dz + \frac{cc - aa}{cc}$$

$$x y dz = \frac{2\Pi f g dt \cos m}{Mcc}$$

$$d(\sin l) = d(\gamma \cos a - a \cos \gamma) = d(\gamma \cos a) - d(a \cos \gamma)$$

$$d(\sin m) = d(z \cos b - b \cos z) = d(z \cos b) - d(b \cos z)$$

$$d(\sin n) = d(x \cos \gamma - \gamma \cos x) = d(x \cos \gamma) - d(\gamma \cos x)$$

Si porro ponamus  $\cos l = p$ ,  $\cos m = q$ ,  $\cos n = r$ , quoniam haec aequationes congruunt cum iis, quae supra probl. 99. integravimus, nisi quod  $f$  capiatur negative, habebimus in finibus has aequationes:  $x = A$  et

Ecc

I. qy

$$\begin{aligned}
 \text{I. } qy + rz &= B - \frac{Aap}{cc} \\
 \text{II. } (qz - ry)^2 &= \frac{(Ccc + 4fgp)(1 - pp) - cc(B - \frac{Aap}{cc})^2}{cc + ff(1 - pp)} \\
 \text{III. } yy + zz &= \frac{(Ccc + 4fgp + ff(B - \frac{Aap}{cc})^2)}{cc + ff(1 - pp)} \\
 \text{IV. } \frac{\Pi}{M} &= \frac{2gcc - Afaa(B - \frac{Aap}{cc})}{2g(cc + ff(1 - pp))} + \frac{fcp(Ccc + 4fgp + ff(B - \frac{Aap}{cc})^2)}{2g(cc + ff(1 - pp))^2} \\
 \text{V. } dt &= \frac{dp \sqrt{cc + ff(1 - pp)}}{r(Ccc + 4fgp)(1 - pp) - cc(B - \frac{Aap}{cc})^2} \\
 \text{VI. } d\lambda &= \frac{-dt}{1 - pp} (B - \frac{Aap}{cc}) \\
 \text{VII. } uv &= AA + \frac{Ccc + 4fgp + ff(B - \frac{Aap}{cc})^2}{cc + ff(1 - pp)} \\
 \text{VIII. } \frac{ydz - zdy}{yy + zz} &= \frac{A(aa - cc)dt}{cc} + \frac{2ffgdt(B - \frac{Aap}{cc})(cc + ff - fpp)}{Mcc(Ccc + 4fgp + ff(B - \frac{Aap}{cc})^2)}
 \end{aligned}$$

nbi constantes A, B, C et reliquae per integrationem ingressurae ex statu corporis initiali debent definiri.

C O R O L L. I.

898. Si corpus initio quieverit, axisque principalis A fuerit in declinatione ejus existente  $Za = 1$  et  $\cos i = p$ , initio erat  $x = 0$ ,  $y = 0$  et  $z = 0$ , ob  $u = 0$ ; atque  $p = p$ . Fit ergo  $A = 0$ ;  $B = 0$ , et  $Ccc = -4fgp$ : Hinc elapso tempore  $t$  erit  $x = 0$ ;  $qy + rz = 0$ ;

$$\begin{aligned}
 qz - ry &= \frac{2rfg(p - v)(1 - pp)}{r(cc + ff(1 - pp))} ; yy + zz = \frac{4fg(p - v)}{cc + ff(1 - pp)} \\
 &= uv, \text{ et } \frac{\Pi}{M} = \frac{2ffcp(p - v)}{ff + ff(1 - pp)} + \frac{2ffcp(p - v)}{(cc + ff(1 - pp))^2}
 \end{aligned}$$

COROLL. 2.

899. Praeterea vero in eodem casu est  $d\lambda = 0$ ; ideoque axis, qui initio in  $a$  erat, per ipsum arcum  $aZ$  movebitur, eritque  $dt = \frac{dp \sqrt{(cc + ff(1 - pp))}}{2r \sqrt{fg(p - p)(1 - pp)}}$ , unde quia  $p > p$  seu  $l < l$  axis ab  $a$  recta ad  $Z$  progreditur. Denique ob  $ydz - zdy = 0$ , fit  $z = dy$ , et  $y = \frac{2r \sqrt{fg(p - p)}}{r(1 + dd)(cc + ff(1 - pp))}$ ; atque  $q(yy + zz) = \frac{2zr \sqrt{fg(p - p)(1 - pp)}}{r(cc + ff(1 - pp))}$ , seu  $q = \frac{dy(1 - pp)}{r(1 + dd)}$  et  $r = \frac{-r(1 - pp)}{r(1 + dd)}$ , unde fit  $\cos ZAB = \frac{q}{r(1 - pp)}$  =  $\frac{dy}{r(1 + dd)}$ , qui ergo angulus manet constans.

COROLL. 3.

900. Si ergo corpus initio quiescat, ejusque axis principalis  $IA$  tenuerit situm inclinatum  $Ia$ , inde recta se eriget ex  $a$  ad  $Z$  ascendens, gyrabitur autem circa punctum  $O$ , ut ob  $x = x \cos a = 0$  arcus  $AO$  sit quadrans, et quia  $\cos ZO = \cos a \cos l + \cos b \cos m + \cos y \cos n = \frac{qy + rz}{g} = 0$ , erit etiam  $ZO$  quadrans, sicque  $O$  erit polus circuli  $XZY$ .

Et cum axis in  $Z$  pervenerit, erit celeritas angularis  $\omega = \frac{2r \sqrt{fg(1 - p)}}{c}$ .

SCHOLION. I.

901. Si corpus initio non quieverit, sed motum quemcunque acceperit, continuatio motus ex iisdem formulis determinatur, dummodo constantes  $A$ ,  $B$ ,  $C$  statui initiali convenienter definiantur; ubi autem ad ejusmodi formulas integrandas devenitur, quae nonnisi concessis quadraturis superioris ordinis expediri possunt. Quin etiam casus hic simplicissimus, quo corpus initio in situ inclinato quievit, ab integratione formulae hujus  $dt = \frac{dp \sqrt{(cc + ff(1 - pp))}}{2r \sqrt{fg(p - p)(1 - pp)}}$  pendet, quae neque per logarithmos neque arcus circulares absolvi potest. At si declinatio initialis  $Za$  fuerit quasi infinite parva, negotium ad arcus circulares perducitur: fit enim initio  $Za = l$ , et elapso tempore  $t$  declinatio  $Za = l$ , ob  $l$  et  $l$  arcus minimos, erit  $p = 1 - \frac{1}{2} ll$ ,  $dp = -ll$ , et  $p = 1 - \frac{1}{2} ll$ .  
Ecc 2

Unde  $dt = \frac{-cdl}{r^2 \sin(\theta - \theta_0)}$ , et  $t = \frac{c}{r^2 \sin \theta} \Lambda \cos \frac{l}{c}$  seu  $l = c \cos \frac{r^2 \sin \theta}{c}$ . Quare axis IA fiet verticalis elapso tempore  $= \frac{\pi c}{2r^2 \sin \theta}$ , et corpus titubationes isochronas conficiet, uti pendulum simplex longitudinis  $= \frac{cc}{f}$ .

## SCHOLION. 2.

902. Nisi corpori ejusmodi indolem tribuissimus, ut ejus axis naturalis FD, qui in statu quietis sit verticalis, simul esset ejus axis principalis, binique reliqui haberent momenta inertiae aequalia, formulas quidem differentiales motum ejus continentes assignare, nullo autem modo ob analyseos defectum ipsum motum definire potuissimus. Interim tamen, quemadmodum in casu tractato, ubi corpori infinite parvam declinationem tribuimus, usu venit, ut motus fieret satis simplex motuique penduli conformis, id adeo in genere locum habet, quomodocunque axes principales respectu axis naturalis fuerint dispositi. In situ scilicet aequilibrii, ubi axis naturalis DF situm tenet verticalem, assumo centrum inertiae I infra centrum basis sphaericae G ad interval- lum GI = f cadere: tum vero hoc corpus infinite parum de situ suo quietis declinari ponamus, ut arcus ZD =  $\varphi$  sit infinite parvus, atque evidens est, corpus se restituendo oscillationes seu titubationes esse peracturum, donec tandem motu ob resistentiam extincto in statu aequilibrii aequiescat. Quoniam declinatio corporis hic perpetuo est minima, non opus est, ut tota corporis figura sit sphaerica, sed sufficit, si infima ejus portio eaque minima, qua plano horizontali applicatur, sit pars superficiei sphaericae, cujus centrum est in G. Hunc igitur motum titubatorium investigaturi primo dispiciamus, quomodo formulae supra in genere erutae pro hoc casu, quo axis corporis naturalis DF quam minime a situ verticali declinat, contrahi, indeque momenta virium P, Q, R ita commode definiri queant, ut deinceps ex his motum assignare valeamus.

## A P R O B L E M A. 107.

Fig. 114. 902. Si corpus basi sphaerica instructum infinite parum a sita aequilibrii declinet, definire momenta virium respectu terminorum ejus axium principalium.

S O-

SOLUTIO.

Circa corporis centrum inertiae I descripta sphaera, in qua Z sit punctum verticale, teneat axis corporis naturalis ID situm a verticali minime declinans, ut sit arcus  $ZD = \epsilon$  minimus: axes autem corporis principales respondeant punctis A, B, C, quorum situs ratione puncti D ita se habeat, ut sint arcus  $DA = \zeta$ ,  $DB = \eta$ ,  $DC = \theta$ , qui sunt constantes. Nunc autem respectu puncti verticalis Z sint arcus  $ZA = l$ ,  $ZB = m$ , et  $ZC = n$ , qui ob arcum  $ZD = \epsilon$  minimum vix discrepabunt ab illis  $\zeta$ ,  $\eta$ ,  $\theta$ : quare si ponamus:

$\cos l = \cos \zeta + p$ ;  $\cos m = \cos \eta + q$ ;  $\cos n = \cos \theta + r$   
quantitates  $p$ ,  $q$ ,  $r$  erunt minimae. Quia vero est tam  $\cos \zeta^2 + \cos \eta^2 + \cos \theta^2 = 1$ ; quam  $\cos l^2 + \cos m^2 + \cos n^2 = 1$ , fiet

$$2p \cos \zeta + 2q \cos \eta + 2r \cos \theta + pp + qq + rr = 10.$$

Deinde autem cum sit  $\cos \epsilon = \cos \zeta \cos l + \cos \eta \cos m + \cos \theta \cos n$ , erit  $\cos \epsilon = 1 + p \cos \zeta + q \cos \eta + r \cos \theta$ , ideoque

$$p \cos \zeta + q \cos \eta + r \cos \theta = -\frac{1}{2}\epsilon\epsilon \text{ et } pp + qq + rr = \epsilon\epsilon.$$

Nunc igitur, posita pressione corporis in planum horizontale = H, ex §. 894. tribuendo ipsi  $f$  valorem negativum, obtinebimus momenta virium respectu axium principalium:

$$P = \Pi f (r \cos \eta - q \cos \theta); \quad Q = \Pi f (p \cos \theta - r \cos \zeta) \\ \text{et } R = \Pi f (q \cos \zeta - p \cos \eta).$$

tum vero vidimus esse  $\Pi = M \left(1 - \frac{f d d \cos \epsilon}{2 g d t^2}\right)$ ; quia autem  $\cos \epsilon$  proxime est = 1, et minimas variationes subit, erit satis exacte  $\Pi = M$ , ita ut corpus toto suo pondere planum horizontale premere sit censendum: sicque habebimus

$$P = M f (r \cos \eta - q \cos \theta).$$

$$Q = M f (p \cos \theta - r \cos \zeta).$$

$$R = M f (q \cos \zeta - p \cos \eta).$$

PROBLEMA 108.

903. Si corpus basi sphaerica praeditum de situ quietis, in quo axis DI est verticalis, parumper declinetur, iterumque dimittatur, ut ex quiete versus statum aequilibrii revertatur, determinare ejus motum.

SOLUTIO.

Elapso tempore  $t$  teneat corpus situm in fig. 114, repraesentatum, Fig. 114. maneanque omnes denominationes in probl. praecedente stabilitae:

Ecc 3

tum



tum vero sint corporis momenta inertiae *Maa*, *Mbb*, *Mcc* respectu axium principalium *IA*, *IB*, *IC*. Nunc autem corpus gyretur circa axem *IO* in sensum *ABC* celeritate angulari =  $\gamma$ , sintque arcus *AO* =  $\alpha$ , *BO* =  $\zeta$ , *CO* =  $\eta$ : ac ponatur  $\gamma \cos \alpha = x$ ,  $\gamma \cos \zeta = y$ ,  $\gamma \cos \eta = z$ . Quoniam igitur initio ubi  $t = 0$ , corpus ex quiete motum incipere assumitur, erat tum  $x = 0$ ,  $y = 0$ , et  $z = 0$ . Tum vero quia motus corporis perpetuo manet tardissimus, quantitates  $x$ ,  $y$ ,  $z$  semper manebunt minimae, ita ut binarum producta  $xy$ ,  $xz$ , et  $yz$  prae singulis pro evanescentibus haberi queant. Cum ergo momenta virium sollicitantium *P*, *Q*, *R*, modo sint definita ex §. 810. sequentes adipiscimur aequationes.

$$dx = \frac{2fgdt}{aa} (r \cos \eta - q \cos \theta)$$

$$dy = \frac{2fgdt}{bb} (p \cos \theta - r \cos \zeta)$$

$$dz = \frac{2fgdt}{cc} (q \cos \zeta - p \cos \eta).$$

Deinde quia est  $\cos l = \cos \zeta + p$ ,  $\cos m = \cos \eta + q$ , et  $\cos n = \cos \theta + r$  ob  $\zeta$ ,  $\eta$ ,  $\theta$  constantes erit  $dl \sin l = -dp$ ;  $dm \sin m = -dq$  et  $dn \sin n = -dr$ , unde insuper hae ternae aequationes accedunt

$$-dp = dt (y \cos \theta - z \cos \eta); \text{ ubi producta } yr, zq, zp, xr, xq,$$

$$-dq = dt (z \cos \zeta - x \cos \theta); \text{ } yp \text{ ut minima prae terminis}$$

$$-dr = dt (x \cos \eta - y \cos \zeta); \text{ hic exhibitis omittimus.}$$

Denique si arcus *ZA* a circulo quodam verticali fixo nunc declinare statuatur angulo  $\lambda$ , ob  $\sin l^2 = \sin^2 \zeta - 2p \cos \zeta$  habebimus hanc aequationem:  $d\lambda = \frac{-dt(y \cos \eta + z \cos \theta)}{\sin^2 \zeta - 2p \cos \zeta}$ . Quia autem in superioribus aequationibus quantitates  $x$ ,  $y$ ,  $z$  et  $p$ ,  $q$ ,  $r$  ubique unam dimensionem occupant, atque  $x$ ,  $y$ ,  $z$  posito  $t = 0$  evanescere debent, manifestum est, tam huic conditioni, quam sex illis aequationibus satisfieri posse ponendo:

$$x = A \sin dt, y = B \sin dt, z = C \sin dt;$$

$$p = D \cos dt, q = E \cos dt, r = F \cos dt,$$

tum enim ternae priores aequationes per  $\cos dt$  divisae, et ternae posteriores per  $\sin dt$  divisae dabunt.

$$Ad = \frac{2fg}{aa} (F \cos \eta - E \cos \theta); Dd = B \cos \theta - C \cos \eta$$

$$Bd = \frac{2fg}{bb} (D \cos \theta - F \cos \zeta); Ed = C \cos \zeta - A \cos \theta$$

$$C\partial = \frac{2fg}{cc} (E \cos \zeta - D \cos \eta); F\partial = A \cos \eta - B \cos \zeta.$$

Ex posterioribus substituantur valores coefficientium D, E, F in prioribus et obtinebimus:

$$\frac{A\partial\partial aa}{2fg} = A \cos \eta^2 - B \cos \zeta \cos \eta - C \cos \zeta \cos \theta + A \cos \theta^2$$

$$\frac{B\partial\partial bb}{2fg} = B \cos \theta^2 - C \cos \eta \cos \theta - A \cos \zeta \cos \eta + B \cos \zeta^2$$

$$\frac{C\partial\partial cc}{2fg} = C \cos \zeta^2 - A \cos \zeta \cos \theta - B \cos \eta \cos \theta + C \cos \eta^2.$$

Quodsi jam brevitatis gratia ponamus  $A \cos \zeta + B \cos \eta + C \cos \theta = G$ ,  
ob  $\cos \zeta^2 + \cos \eta^2 + \cos \theta^2 = 1$  erit

$$A \left(1 - \frac{\partial\partial aa}{2fg}\right) = G \cos \zeta, \quad B \left(1 - \frac{\partial\partial bb}{2fg}\right) = G \cos \eta$$

et  $C \left(1 - \frac{\partial\partial cc}{2fg}\right) = G \cos \theta.$

Ponamus brevitatis causa  $\frac{\partial\partial}{2fg} = u$ ; ut fiat

$$A = \frac{G \cos \zeta}{1 - aau}; \quad B = \frac{G \cos \eta}{1 - bbu}; \quad C = \frac{G \cos \theta}{1 - ccu}.$$

Cum autem fit  $A \cos \zeta + B \cos \eta + C \cos \theta = G$ , erit

$$\frac{\cos \zeta^2}{1 - aau} + \frac{\cos \eta^2}{1 - bbu} + \frac{\cos \theta^2}{1 - ccu} = 1,$$

qua aequatione evoluta consequimur per  $u$  dividendo,

$$\frac{aabbccuu - bbccu \cos \zeta^2 + aa \cos \zeta^2}{1 - aau} + \frac{aa \cos \eta^2 + bb \cos \eta^2}{1 - bbu} + \frac{aa \cos \theta^2 + cc \cos \theta^2}{1 - ccu} = 0.$$

Statuantur quantitates cognitae.

$$bb \cos \zeta^2 + aa \cos \eta^2 + aa \cos \theta^2 = K,$$

$$aa \cos \zeta^2 + bb \cos \eta^2 + cc \cos \theta^2 = L,$$

ut fit  $uu - K + L = 0$ , hincque

$$u = \frac{\partial\partial}{2fg} = \frac{1}{2} K + \sqrt{\left(\frac{1}{2} KK - L\right)}$$

et quantitas G manet indefinita ex statu initiali definienda, dum contra

408 CAPUT XVIII. DE MOTU CORPORUM

tra quantitates K et L, sunt ex natura corporis datae. Cum igitur hinc inventus sit valor ipsius  $u$ , inde habemus  $\delta = r \delta g u$ , et

$$A = \frac{G \cos \zeta}{1 - a a u}; B = \frac{G \cos \eta}{1 - b b u}; C = \frac{G \cos \theta}{1 - c c u}$$

$$D = \frac{G u (b b - c c) \cos \eta \cos \theta}{\delta (1 - b b u) (1 - c c u)}; E = \frac{G u (c c - a a) \cos \zeta \cos \theta}{\delta (1 - c c u) (1 - a a u)}$$

et  $F = \frac{G u (a a - b b) \cos \zeta \cos \eta}{\delta (1 - a a u) (1 - b b u)}$ .

Si jam initio fuerit arcus  $ZD = r$ , qui nunc est  $\varphi$ , cum sit initio  $\varphi = D$ :  $\eta = E$ ;  $r = F$ , habebimus

$$DD + EE + FF = rr,$$

unde per  $r$  invenitur constans  $G$ . Denique pro angulo  $\lambda$  inveniendo

$$\text{prodit } d\lambda = \frac{-\delta t (B \cos \eta + C \cos \theta) \sin \delta t}{\delta \zeta^2}, \text{ ideoque } d\lambda = \frac{(B \cos \eta + C \cos \theta) (\cos \delta t - 1)}{\delta \zeta^2}$$

si quidem arcus  $ZA$  initio fuerit in verti-

cali fixo, indeque in sensum  $XOY$  moveri sumatur, quatenus ergo haec expressio pro  $\lambda$  est negativa, in sensum contrarium axis  $IA$  circa  $Z$  gyron est censendus.

Denique cum sit  $pp + qq + rr = \varphi\varphi$ , erit  $\varphi = r \cos \delta t$ , ob  $r = r (DD + EE + FF)$ , unde patet axem  $ID$  in situm verticalem erigi elapso

tempore  $= \frac{\pi}{2\delta}$  et titubationes isochronas fore oscillationibus penduli,

$$\text{cujus longitudo est } = \frac{2g}{\delta^2} = \frac{K + r(KK + LL)}{2Lf},$$

COROLL.

904. Cum  $DD + EE + FF = rr$ , erit  $\delta\delta rr = AA(\cos^2 \zeta + \cos^2 \theta) + BB(\cos^2 \zeta + \cos^2 \eta) + CC(\cos^2 \zeta + \cos^2 \eta) - 2BC \cos \eta \cos \theta - 2AC \cos \zeta \cos \theta - 2AB \cos \zeta \cos \eta$

et quia  $G = A \cos \zeta + B \cos \eta + C \cos \theta$ , hujus quadratum eo additum dabit

$$\delta\delta rr + GG = AA + BB + CC,$$

ubi

ubi si brevitatis gratia ponatur  $\frac{1}{1-aa u} = P$ ;  $\frac{1}{1-bb u} = Q$ ;  $\frac{1}{1-cc u} = R$ , ob  $P \cos \zeta^2 + Q \cos \eta^2 + R \cos \theta^2 = 1$  et  $A = GP \cos \zeta$ ;  $B = GQ \cos \eta$  et  $C = GR \cos \theta$ , fiet

$$ddrr = GG (PP \cos \zeta^2 + QQ \cos \eta^2 + RR \cos \theta^2 - 1)$$

ideoque ob  $PP - P = \frac{aa u}{(1-aa u)^2}$  habebitur

$$ddrr = GG u \left( \frac{aa \cos \zeta^2}{(1-aa u)^2} + \frac{bb \cos \eta^2}{(1-bb u)^2} + \frac{cc \cos \theta^2}{(1-cc u)^2} \right).$$

### COROLL. 2.

905. Quia porro est  $dd = 2fgu$ , si in subsidium vocetur aequatio  $uu - Ku + L = 0$ , reperietur

$$GG = \frac{-2fgrr(1-aa u)(1-bb u)(1-cc u)}{aa \cos \zeta^2 + bb \cos \eta^2 + cc \cos \theta^2 - aabbccuu}$$

### EXPLICATIO.

906. Haec expressio pro GG satis concinna sequenti modo eruitur.

Posito brevitatis gratia  $\frac{1}{aa} = a$ ,  $\frac{1}{bb} = b$ ,  $\frac{1}{cc} = c$ , habemus:

$$I. K = a + b + c - a \cos \zeta^2 - b \cos \eta^2 - c \cos \theta^2$$

$$II. L = ba \cos \zeta^2 + az \cos \eta^2 + a b \cos \theta^2$$

$$III. 1 = \cos \zeta^2 + \cos \eta^2 + \cos \theta^2.$$

Hinc deducitur ob  $uu - Ku + L = 0$

$$\cos \zeta^2 = \frac{aK - L - aa}{(a-b)(c-a)}, \text{ et } u \cos \zeta^2 = \frac{(a-u)(KL - au)}{(a-b)(c-a)}$$

ideoque

$$\frac{ddrr}{GG} = \frac{a(L-au)}{(a-b)(c-a)(a-u)} + \frac{b(L-au)}{(b-c)(a-b)(b-u)} + \frac{c(L-au)}{(c-a)(b-c)(c-u)}$$

ex qua aequatione reducta illa expressio obtinetur.

### SCHOLIUM.

907. Quoniam haec ad substitutiones similes corporum, quorum basis est portio sphaerica, patent, quomodocunque ejus axes principales ratione axis naturalis DGIF fuerint dispositi, eorumque respectu momenta inertiae inaequalia, ne in tanta amplitudine confundamur,

Fff

con-

conveniet primo formulas nostras ad species corporum simpliciores accommodari, quo inde facilius ad species magis complicatas progredi liceat. Ac primo quidem casus, quo omnia momenta ineffectiae sunt inter se aequalia, seu  $aa = bb = cc$ , omnium est simplicissimus, quia tum etiam axis DF pro principali haberi potest, et titubationes eadem prodire debent, quas jam ante definivimus. Tum vero duo saltem momenta inertiae aequalia statuamus, scilicet  $bb = cc$ .

## CASUS. I.

quo  $aa = bb = cc$ .

§ 98. Hoc ergo casu habemus:

$$A = \frac{G \cos \zeta}{1 - aa u}; B = \frac{G \cos \eta}{1 - aa u}; C = \frac{G \cos \theta}{1 - aa u},$$

$$\text{hincque } G = \frac{G \cos^2 \zeta + G \cos^2 \eta + G \cos^2 \theta}{1 - aa u} = \frac{G}{1 - aa u}, \text{ ita ut sit } u = 0.$$

Verum iisdem quoque formulis satisfacit ponendo  $u = \frac{r}{aa}$  et  $G = 0$ , ut sit  $A \cos \zeta + B \cos \eta + C \cos \theta = 0$ , neque quicquam praeterea determinetur, sicque habebimus  $\delta = \frac{r^2 f g}{a}$ : tum vero

$$D = \frac{B \cos \theta - C \cos \eta}{\delta}; E = \frac{C \cos \zeta - A \cos \theta}{\delta}; F = \frac{A \cos \eta - B \cos \zeta}{\delta}$$

atque  $\delta^2 r r = AA + BB + CC$ : ut sit  $\varphi = r \cos \delta t$ . Videamus jam circa quemnam polum O corpus sit gyraturum, ac primo habemus  $\cos OD = \cos a \cos \zeta + \cos b \cos \eta + \cos \gamma \cos \theta$ , seu

$$u \cos OD = x \cos \zeta + y \cos \eta + z \cos \theta = 0, \text{ sicque arcus OD quadrans.}$$

Deinde est  $\cos OZ = \cos a \cos l + \cos b \cos m + \cos \gamma \cos n$  seu

$$u \cos OZ = x \cos l + y \cos m + z \cos n = 0 + px + qy + rz = 0$$

ob  $AD + BE + CF = 0$ , eritque ergo etiam OZ quadrans. Ex quo perspicitur corpus circa punctum O, quod est polus circuli verticalis ZDX gyron, sicque axem ex D recta in situm verticalem Z erigi, ita

ut elapso tempore  $t$  sit  $\varphi = r \cos \frac{r^2 f g}{a}$ . Quare hae titubationes iso-

chronae erunt oscillationibus penduli, cujus longitudo est  $= \frac{aa}{f}$ .

CA

## C A S U S. II.

quo duo tantum momenta principalia sunt  
aequalia seu  $bh = cc$ .

$$909. \text{Hoc ergo casu est } K = \frac{ccfi\zeta^2 + aafi\eta^2 + aafi\theta^2}{aacc} = \frac{ccfi\zeta^2 + aa + aacof\zeta^2}{aacc}, \text{ et } L = \frac{aacof\zeta^2 + ccfi\zeta^2}{aac^4} : \text{ five cum ac-}$$

quatio, unde  $u$  definiri debet, fit  $\frac{cof\zeta^2}{1-aau} + \frac{fi\zeta^2}{1-ccu} = 1$ , erit

$$aacof\zeta^2 + ccfi\zeta^2 = aaccu, \text{ ideoque } u = \frac{aacof\zeta^2 + ccfi\zeta^2}{aacc}$$

qui valor etiam ex generali forma elicatur, nisi quod hoc modo radix  
inutilis  $u = \frac{1}{cc}$  excluditur. Quamobrem habebimus

$$J = \frac{r^2fg(aacof\zeta^2 + ccfi\zeta^2)}{ac}, \text{ tum vero}$$

$$A = \frac{Gcc}{(aa+cc)cof\zeta}; B = \frac{Gaacof\eta}{(aa-cc)fi\zeta^2}; C = \frac{Gaacof\theta}{(aa-cc)fi\zeta^2}.$$

Deinde pro  $G$  ex  $r$  inveniendū fit

$$Jdrr + GG = \frac{GG(a^2cof\zeta^2 + c^2fi\zeta^2)}{(aa-cc)^2fi\zeta^2cof\zeta^2} \text{ five}$$

$$Jdrr = \frac{GG(aacof\zeta^2 + ccfi\zeta^2)^2}{(aa-cc)^2fi\zeta^2cof\zeta^2}, \text{ et } G = \frac{(aa-cc)dr\zeta fi cof\zeta}{aacof\zeta^2 + ccfi\zeta^2}$$

$$\text{vel } G = \frac{(aa-cc)fi\zeta cof\zeta r^2fg}{acr(aacof\zeta^2 + ccfi\zeta^2)}. \text{ Deinde vero obtinemus}$$

$$D = 0, E = \frac{rcof\theta}{fi\zeta}; F = \frac{-rcof\eta}{fi\zeta}; \text{ atque}$$

$$A = \frac{-ccfi\zeta r^2fg}{ar(aacof\zeta^2 + ccfi\zeta^2)}; B = \frac{arcof\zeta cof\eta r^2fg}{cfi\zeta r(aacof\zeta^2 + ccfi\zeta^2)};$$

$$C = \frac{arcof\zeta cof\theta r^2fg}{cfi\zeta r(aacof\zeta^2 + ccfi\zeta^2)}$$

ex quibus consequimur

Fff 2

z = 0

$$\begin{aligned} x &= u \cos a = A \sin \delta t; \quad y = u \cos \epsilon = B \sin \delta t; \quad z = u \cos \gamma = C \sin \delta t \\ p &= \cos l - \cos \zeta = D \cos \delta t; \quad q = \cos m - \cos \eta = E \cos \delta t; \quad r = \cos n \\ &\quad - \cos \theta = F \cos \delta t, \end{aligned}$$

$$\text{atque } \lambda = \frac{-ar \sin \zeta \cos \zeta (1 - \cos \delta t) r^2 fg}{dc r (aa \cos \zeta^2 + cc \sin \zeta^2)} = \frac{-aar \sin \zeta \cos \zeta (1 - \cos \delta t)}{aa \cos \zeta^2 + cc \sin \zeta^2}$$

estque  $\lambda$  angulus VZA, existente ZV circulo verticali fixo, a quo declinationem poli A computamus. Deinde vero est  $\epsilon = r \cos \delta t$ , et ut obtineamus angulum DZV, quaeramus angulum DZA, ex formula  $\cos$

$$DZA = \frac{\cos \zeta - \cos l \cos \epsilon}{\epsilon \sin l} = \frac{\cos \zeta - \cos \zeta \cos \epsilon - p \cos \epsilon}{\epsilon \sin \zeta} = \frac{1}{2} \epsilon \frac{\cos \zeta}{\sin \zeta},$$

$$\text{ob } D = 0 \text{ ideoque } p = 0, \text{ ergo } \cos DZA = \frac{r \cos \zeta \cos \delta t}{2 \sin \zeta}, \text{ qui cum sit}$$

infinite parvus, patet angulum DZA esse rectum proxime et angulo ZDA aequalem. Quare cum initio angulus ZDA fuerit non rectus, haec solutio, quippe quae manifesto tantum est particularis, eo non extenditur. Ceterum vero et hae titubationes erunt isochronae oscillationibus

$$\begin{aligned} \text{penduli, cujus longitudo est} &= \frac{aac}{f(aa \cos \zeta^2 + cc \sin \zeta^2)} \\ \text{Denique cum sit } u &= \sin \delta t \cdot r (AA + BB + CC), \text{ prodibit} \\ u &= \frac{rr^2 fg (a^2 \cos \zeta^2 + c^2 \sin \zeta^2)}{acr (aa \cos \zeta^2 + cc \sin \zeta^2)} \cdot \sin \delta t. \end{aligned}$$

Pro polo autem gyrationis O invenimus:

$$\begin{aligned} u \cos OD &= (A \cos \zeta + B \cos \eta + C \cos \theta) \sin \delta t = G \sin \delta t \text{ et} \\ u \cos OZ &= (A \cos l + B \cos m + C \cos n) \sin \delta t = G \sin \delta t, \\ \text{ita ut sit } OD &= OZ, \text{ ob } Ap + Bq + Cr = 0. \end{aligned}$$

#### SCHOLION.

910. Mirum non est, hanc solutionem non esse generalem, cum enim ex data indole corporis, quantitibus *aa*, *bb*, *cc* et angulis  $\zeta$ ,  $\eta$ ,  $\theta$  comprehensa, et ex situ axis DF initiali ejusque declinatione *r* a situ verticali omnes coefficientes *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F* cum numero  $\delta$  determinentur, ex his angulus ADZ, quo arcus DA initio ab arcu DZ deviat, sponte determinatur, neque amplius arbitrio nostro, uti natura rei postulat, relinquitur. Verum cum in genere pro quantitate *u* geminum valorem elicerimus, quorum neutrum prae altero rejicere fas est, si utrumque simul adhibeamus, solutionem ampliorem obtinebimus,

# BASI SPHAERICA PRAEDITORUM SUPER &c. 413

bimus, unde simul effici potest, ut angulus ADZ initio fuerit dato angulo aequalis: Cum enim in aequationibus differentialibus quantitates  $x, y, z$ , et  $p, q, r$  ubique unicam habeant dimensionem, si iis duplici modo satisfieri queat, pro qualibet quantitate summa binorum ejus valorum statui poterit, hincque solutionem generalem impetrabimus, quam hic exponamus.

## P R O B L E M A. 109.

911. Si corpus basi sphaerica praeditum de situ aequilibrui quomodo-  
docunque infinite parum declinetur, subitoque dimittatur, definire  
motum titubatorium, quo agitabitur.

## S O L U T I O.

Retentis denominationibus superioris problematis, quoniam  
posito

$$\frac{f\zeta^2}{aa} + \frac{f\eta^2}{bb} + \frac{f\theta^2}{cc} = K \text{ et } \frac{\cos\zeta^2}{bbcc} + \frac{\cos\eta^2}{aacc} + \frac{\cos\theta^2}{aabb} = L$$

pro  $u$  geminum invenimus valorem, sint ii

$$u = \frac{1}{2} K + r \left( \frac{1}{4} KK - L \right) \text{ et } u' = \frac{1}{2} K - r \left( \frac{1}{4} KK - L \right)$$

unde pro  $\delta$  etiam binos adipiscimur valores, qui sint  $\delta = r\frac{2f\zeta u}{gu}$  et  
 $\delta' = r\frac{2f\zeta u'}{gu'}$

atque hinc pro senis quantitatibus  $x, y, z$  et  $p, q, r$  sequentes impe-  
trabimus valores

$$x = u \cos \alpha = \frac{G \cos \zeta \sin \delta t}{1 - aau} + \frac{H \cos \zeta \sin \delta' t}{1 - aau'}$$

$$y = u \cos \zeta = \frac{G \cos \eta \sin \delta t}{1 - bbu} + \frac{H \cos \eta \sin \delta' t}{1 - bbu'}$$

$$z = u \cos \gamma = \frac{G \cos \theta \sin \delta t}{1 - ccu} + \frac{H \cos \theta \sin \delta' t}{1 - ccu'}$$

tum vero porro

$$p = \cos l - \cos \zeta = \frac{Gu(bb - cc) \cos \eta \cos \theta \cos \delta t}{\delta(1 - bb)(1 - ccu)} + \frac{Hu'(bb - cc) \cos \eta \cos \theta \cos \delta' t}{\delta'(1 - bbu')(1 - ccu')}$$

Fff 3

q =



$$\begin{aligned} x &= u \cos a = A \sin \delta t; \quad y = u \cos \epsilon = B \sin \delta t; \quad z = u \cos \gamma = C \sin \delta t \\ p &= \cos l - \cos \zeta = D \cos \delta t; \quad q = \cos m - \cos \eta = E \cos \delta t; \quad r = \cos n \\ &\quad - \cos \theta = F \cos \delta t, \end{aligned}$$

$$\text{atque } \lambda = \frac{-ar \sin \zeta \cos \zeta (1 - \cos \delta t) r \sin \zeta}{\delta c r (aa \cos \zeta^2 + cc \sin \zeta^2)} = \frac{-aar \sin \zeta \cos \zeta (1 - \cos \delta t)}{aa \cos \zeta^2 + cc \sin \zeta^2}$$

estque  $\lambda$  angulus VZA, existente ZV circulo verticali fixo, a quo declinationem poli A computamus. Deinde vero est  $\epsilon \equiv r \cos \delta t$ , et ut obtineamus angulum DZV, quaeramus angulum DZA, ex formula  $\cos$

$$DZA = \frac{\cos \zeta - \cos l \cos \epsilon}{\sin l} = \frac{\cos \zeta - \cos \zeta \cos \epsilon - p \cos \epsilon}{\sin \zeta} = \frac{\frac{1}{2} \epsilon \cos \zeta}{\sin \zeta},$$

$$\text{ob } D = 0 \text{ ideoque } p = 0, \text{ ergo } \cos DZA = \frac{r \cos \zeta \cos \delta t}{2 \sin \zeta}, \text{ qui cum sit}$$

infinite parvus, patet angulum DZA esse rectum proxime et angulo ZDA aequalem. Quare cum initio angulus ZDA fuerit non rectus, haec solutio, quippe quae manifesto tantum est particularis, eo non extenditur. Ceterum vero et hae titubationes erunt isochronae oscillationibus

$$\text{penduli, cuius longitudo est } = \frac{aac}{f(aa \cos \zeta^2 + cc \sin \zeta^2)}.$$

Denique cum sit  $u = \sin \delta t \cdot r (AA + BB + CC)$ , prodibit

$$u = \frac{r r \sin \zeta (aa \cos \zeta^2 + cc \sin \zeta^2)}{a c r (aa \cos \zeta^2 + cc \sin \zeta^2)} \cdot \sin \delta t.$$

Pro polo autem gyrationis O invenimus:

$$u \cos OD = (A \cos \zeta + B \cos \eta + C \cos \theta) \sin \delta t = G \sin \delta t \text{ et}$$

$$u \cos OZ = (A \cos l + B \cos m + C \cos n) \sin \delta t = G \sin \delta t.$$

ita ut sit  $OD = OZ$ , ob  $Ap + Bq + Cr = 0$ .

# SCHOLIUM.

910. Mirum non est, hanc solutionem non esse generalem, cum enim ex data indole corporis, quantitibus *aa*, *bb*, *cc* et angulis  $\zeta$ ,  $\eta$ ,  $\theta$  comprehensa, et ex situ axis DF initiali ejusve declinatione *r* a situ verticali omnes coefficientes *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F* cum numero  $\delta$  determinentur, ex his angulis ADZ, quo arcus DA initio ab arcu DZ deviat, sponte determinatur, neque amplius arbitrio nostro, uti natura rei postulat, relinquitur. Verum cum in genere pro quantitate *u* geminum valorem elicuerimus, quorum neutrum prae altero rejicere fas est, si utrumque simul adhibeamus, solutionem ampliorem obtinebimus,

bimus, unde simul effici potest, ut angulus ADZ initio fuerit dato angulo aequalis. Cum enim in aequationibus differentialibus quantitates  $x, y, z$ , et  $p, q, r$  ubique unam habeant dimensionem, si iis duplici modo satisfieri queat, pro qualibet quantitate summa binorum ejus valorum statui poterit, hincque solutionem generalem impetrebimus, quam hic exponamus.

PROBLEMA. 109.

911. Si corpus basi sphaerica praeditum de situ aequilibrui quomodocunque infinite parum declinetur, subitoque dimittatur, definire motum titubatorium, quo agitabitur.

SOLUTIO.

Retentis denominationibus superioris problematis, quoniam posito

$$\frac{f\zeta^2}{aa} + \frac{f\eta^2}{bb} + \frac{f\theta^2}{cc} = K \text{ et } \frac{\cos\zeta^2}{bbcc} + \frac{\cos\eta^2}{aacc} + \frac{\cos\theta^2}{aabb} = L$$

pro  $u$  geminum invenimus valorem, sint ii

$$u = \frac{1}{2}K + r \left( \frac{1}{2}KK - L \right) \text{ et } u' = \frac{1}{2}K - r \left( \frac{1}{2}KK - L \right)$$

unde pro  $\delta$  etiam binos adipiscimur valores, qui sint  $\delta = r\sqrt{2gu}$  et  $\delta' = r\sqrt{2gu'}$

atque hinc pro senis quantitatibus  $x, y, z$  et  $p, q, r$  sequentes impetrebimus valores

$$x = x \cos \alpha = \frac{G \cos \zeta \sin \delta t}{1 - aau} + \frac{H \cos \zeta \sin \delta' t}{1 - aau'}$$

$$y = y \cos \zeta = \frac{G \cos \eta \sin \delta t}{1 - bbu} + \frac{H \cos \eta \sin \delta' t}{1 - bbu'}$$

$$z = z \cos \gamma = \frac{G \cos \theta \sin \delta t}{1 - ccu} + \frac{H \cos \theta \sin \delta' t}{1 - ccu'}$$

tum vero porro

$$p = \cos l - \cos \zeta = \frac{Gu(bb - cc) \cos \eta \cos \theta \cos \delta t}{\delta(1 - bb')(1 - ccu)} + \frac{Hu'(bb - cc) \cos \eta \cos \theta \cos \delta' t}{\delta'(1 - bbu')(1 - ccu')}$$

Fff 3

q =

$$q = \cos m - \cos \eta = \frac{Gu(cc - aa) \cos \zeta \cos \theta \cos \delta t}{\delta(1 - ccu)(1 - aa'u)} + \frac{Hu'(cc - aa) \cos \zeta \cos \theta \cos \delta' t}{\delta'(1 - ccu')(1 - aa'u')}$$

$$r = \cos n - \cos \theta = \frac{Gu(aa - bb) \cos \zeta \cos \eta \cos \delta t}{\delta(1 - aa'u)(1 - bb'u)} + \frac{Hu'(aa - bb) \cos \zeta \cos \eta \cos \delta' t}{\delta'(1 - aa'u')(1 - bb'u')}$$

Hic jam habemus binas quantitates constantes arbitrarias  $G$  et  $H$ , atque hi valores ita satisfaciunt, ut facta substitutione in aequationibus differentialibus termini tam per  $G$  quam per  $H$  affecti seorsim se destruant. Verum si initio arcus  $ZD$  fuerit  $= r$ , posito  $t = 0$ , fieri debet  $pp + qq + rr = rr$ . Deinde vero si initio fuerit angulus  $ZDA = f$ , ob

$$\cos f = \frac{\cos \zeta \cos \eta \cos \delta t}{fi \zeta fi r} = \frac{\cos \zeta (1 - \cos \delta t) + p}{fi \zeta fi r} = \frac{r \cos \zeta}{fi \zeta} + \frac{p}{r fi \zeta}$$

et ob  $r$  infinite parvum, erit  $p = r fi \zeta \cos f$ . Si hic ergo pro  $p$  ejus valor superior posito  $t = 0$  substituatur, habebitur alia aequatio ex qua cum illa conjuncta binae constantes  $G$  et  $H$  determinabuntur. At posito angulo

$$VZA = \lambda \text{ erit } d\lambda = \frac{-dt(y \cos \eta + z \cos \theta)}{fi \zeta^2}, \text{ cujus integrale facile ex-}$$

hibetur. Simili autem modo positis angulis  $VZB = \mu$  et  $VZC = \nu$ , erit

$$d\mu = \frac{-dt(z \cos \theta + x \cos \zeta)}{fi \eta^2}; \text{ et } d\nu = \frac{-dt(x \cos \zeta + y \cos \eta)}{fi \theta^2}.$$

Hic autem notari convenit, si sit  $bb = cc$ , fore binos valores  $u = \frac{r}{cc}$

$$\text{et } u' = \frac{fi \zeta^2}{aa} + \frac{\cos \zeta^2}{cc}, \text{ ideoque pro priorē fractionum superiorum}$$

quasdam numeratores ac denominatores simul evanescere. Ad earum ergo valores investigandos ponatur  $\frac{1}{bb} = \frac{1}{cc} + \omega$ , existente  $\omega$  quantitate evanescente, reperieturque

$$u = \frac{1}{cc} + \frac{\omega \cos \theta^2}{fi \zeta^2} \text{ et } u' = \frac{fi \zeta^2}{aa} + \frac{\cos \zeta^2}{cc}; \text{ hincque si}$$

$\frac{G}{a}$  ponatur = I, ut sit  $G = Ia = 0$ , fiet

$$\begin{aligned}
 x &= u \cos a = \frac{H \cos \zeta \sin \delta t}{1 - aa u^2} = \frac{-H c c \sin \delta t}{(aa - cc) \cos \zeta} \\
 y &= u \cos \zeta = \frac{I \sin \zeta^2 \sin \delta t}{c c \cos \eta} + \frac{H \cos \eta \sin \delta t}{1 - cc u^2} = \frac{I \sin \zeta^2 \sin \delta t}{c c \cos \eta} + \\
 &\quad \frac{H a a \cos \eta \sin \delta t}{(aa - cc) \sin \zeta^2} \\
 z &= u \cos \gamma = \frac{-I \sin \zeta^2 \sin \delta t}{c c \cos \theta} + \frac{H \cos \theta \sin \delta t}{1 - cc u^2} = \frac{-I \sin \zeta^2 \sin \delta t}{c c \cos \theta} \\
 &\quad + \frac{H a a \cos \theta \sin \delta t}{(aa - cc) \sin \zeta^2}
 \end{aligned}$$

deinde vero

$$\begin{aligned}
 p &= \cos l - \cos \zeta = \frac{I \sin \zeta^2 \cos \delta t}{\delta c c \cos \eta \cos \theta} \\
 q &= \cos m - \cos \eta = \frac{-I \sin \zeta^2 \cos \zeta \cos \delta t}{-\delta c c \cos \theta} - \frac{H u^2 (aa - cc) \cos \zeta \cos \theta \cos \delta t}{\delta (1 - aa u^2) (1 - cc u^2)} \\
 r &= \cos n - \cos \theta = \frac{-I \sin \zeta^2 \cos \zeta \cos \delta t}{\delta c c \cos \eta} + \frac{H u^2 (aa - cc) \cos \zeta \cos \eta \cos \delta t}{\delta (1 - aa u^2) (1 - cc u^2)} \\
 \text{ubi est } &\frac{aa - cc}{(1 - aa u^2) (1 - cc u^2)} = \frac{-a a c c}{(aa - cc) \sin \zeta^2 \cos \zeta^2}
 \end{aligned}$$

$$\text{Vel si ponamus } I = \frac{\delta a c c \cos \eta \cos \theta}{\sin \zeta^2} \text{ et } H = \frac{\delta u^2 (aa - cc) \sin \zeta^2 \cos \zeta}{a a c c}$$

$$\text{ob } u = \frac{1}{c c} \text{ et } u' = \frac{a a \cos \zeta^2 + c c \sin \zeta^2}{a a c c}, \text{ ideoque } \delta = \frac{r^2 f g}{a c} \text{ et } \delta' = \frac{r^2 f g (a a \cos \zeta^2 + c c \sin \zeta^2)}{a c}$$

$$\text{erit } x = u \cos a = \frac{-\delta u^2 \sin \zeta^2 \sin \delta t}{a a}$$

$r =$

$$y = x \cos \zeta = \frac{\int \partial \cos \zeta \cos \eta \sin \partial t}{cc} + \mathfrak{G} \partial \cos \theta \sin \partial t$$

$$z = x \cos \gamma = \frac{\int \partial \cos \zeta \cos \theta \sin \partial t}{cc} - \mathfrak{G} \partial \cos \eta \sin \partial t$$

$$p = \cos l - \cos \zeta = \mathfrak{G} \sin \zeta^2 \cos \partial t$$

$$q = \cos m - \cos \eta = - \mathfrak{G} \cos \zeta \cos \eta \cos \partial t + \int u' \cos \theta \cos \partial t$$

$$r = \cos n - \cos \eta = - \mathfrak{G} \cos \zeta \cos \theta \cos \partial t - \int u' \cos \eta \cos \partial t$$

quae formulae jam sine ulla difficultate ad omnes casus accommodari possunt.

## C O R O L L. 1.

912. Haec integralia adhuc latius extendi possunt, cum  $x$ ,  $y$ ,  $z$  et  $p$ ,  $q$ ,  $r$  partes constantes recipiant; ac forma litterarum  $G$  et  $H$  mutata, habebimus:

$$x = \cos \zeta (\mathfrak{E} + \mathfrak{G} (1 - bbu) (1 - ccu) \sin \partial t + \int (1 - bbu') (1 - ccu') \sin \partial t)$$

$$y = \cos \eta (\mathfrak{E} + \mathfrak{G} (1 - aa u) (1 - ccu) \sin \partial t + \int (1 - aa u') (1 - ccu') \sin \partial t)$$

$$z = \cos \theta (\mathfrak{E} + \mathfrak{G} (1 - aa u) (1 - bbu) \sin \partial t + \int (1 - aa u') (1 - bbu') \sin \partial t)$$

atque

$$p = \mathfrak{F} \cos \zeta + (bb - cc) \cos \eta \cos \theta \left( \frac{\mathfrak{G} u (1 - aa u) \cos \partial t}{\partial} + \frac{\int u' (1 - aa u') \cos \partial t}{\partial} \right)$$

$$q = \mathfrak{F} \cos \eta + (cc - aa) \cos \zeta \cos \theta \left( \frac{\mathfrak{G} u (1 - bbu) \cos \partial t}{\partial} + \frac{\int u' (1 - bbu') \cos \partial t}{\partial} \right)$$

$$r = \mathfrak{F} \cos \theta + (aa - bb) \cos \zeta \cos \eta \left( \frac{\mathfrak{G} u (1 - ccu) \cos \partial t}{\partial} + \frac{\int u' (1 - ccu') \cos \partial t}{\partial} \right)$$

CO-

C O R O L L. 2.

913. Angulorum etiam  $\delta t$  et  $\delta s$  uterque quantitate constante augeri potest, ac si eorum loco scribamus  $\delta t + g$  et  $\delta s + h$ , integralia continebunt sex constantes arbitrarias  $g, h, \mathfrak{E}, \mathfrak{F}, \mathfrak{G}, \mathfrak{H}$ , ideoque erunt integralia completa harum sex aequationum differentialium:

$$\begin{aligned} aadx &= 2fgdt (r \cos \eta - q \cos \theta); & dp &= dt (z \cos \eta - y \cos \theta) \\ bbdy &= 2fgdt (p \cos \theta - r \cos \zeta); & dq &= dt (x \cos \theta - z \cos \zeta) \\ ccdz &= 2fgdt (q \cos \zeta - p \cos \eta); & dr &= dt (y \cos \zeta - x \cos \eta). \end{aligned}$$

C O R O L L. 3.

914. Si corpus initio quieverit, ut in problemate assumimus, ita ut tum fuerit  $x = 0, y = 0$  et  $z = 0$ ; poni debet  $\mathfrak{E} = 0, g = 0$ , et  $h = 0$ , reliquas autem constantes ex situ corporis initiali definiri oportet

C O R O L L. 4.

915. Nempe si pro initio, quo  $t = 0$ , ponantur anguli  $ZDA = l$ ,  $ZDB = m$ , et  $ZDC = n$ ; ut sit

$$\begin{aligned} f(l - m) &= \frac{-\cos \theta}{f\zeta f\eta}; & f(m - n) &= \frac{-\cos \zeta}{f\eta f\theta}; & f(n - l) \\ &= \frac{-\cos \eta}{f\zeta f\theta} \\ \cos(l - m) &= \frac{-\cos \zeta \cos \eta}{f\zeta f\eta}; & \cos(m - n) &= \frac{-\cos \eta \cos \theta}{f\eta f\theta}; \\ \cos(n - l) &= \frac{-\cos \zeta \cos \theta}{f\zeta f\theta} \end{aligned}$$

pro initio  $t = 0$ , constantes ita definiri oportet, ut si tum fuerit  $ZD = r$ , fiat

$$p = r f\zeta \cos l; \quad q = r f\eta \cos m; \quad r = r f\theta \cos n.$$

E X P L I C A T I O.

916. Ad constantes  $\mathfrak{F}, \mathfrak{G}, \mathfrak{H}$  in genere ex statu initiali modo descripto definiendas, ponamus brevitatis gratia

$$\begin{aligned} aa \cos \zeta^2 + bb \cos \eta^2 + cc \cos \theta^2 &= \mathfrak{A} \\ bb \cos \cos \zeta^2 + aa \cos \cos \eta^2 + aa \cos \cos \theta^2 &= \mathfrak{B} \end{aligned}$$

G g g

fitque

418 CAPUT XVIII. DE MOTU CORPORUM

fitque  $\frac{\mathfrak{G} u \cos g}{\mathfrak{d}} = X$ , et  $\frac{\mathfrak{G} u' \cos h}{\mathfrak{d}} = Y$ , quo calculus facilis expediatur.

Eo autem absoluto reperietur

$$\mathfrak{G} = r \sin \zeta \cos \zeta \cos l + r \sin \eta \cos \eta \cos m + r \sin \theta \cos \theta \cos n$$

$$X + Y = \frac{+r \zeta \cos l}{\cos \eta \cos \theta} (\mathfrak{B} - bbcc) + \frac{r \sin \eta \cos m}{\cos \zeta \cos \theta} (\mathfrak{B} - aacc) + \frac{r \sin \theta \cos n}{\cos \zeta \cos \eta} (\mathfrak{B} - aabb)$$

$$(bb - cc)(cc - aa)(aa - bb)$$

$$uX + u'Y = \frac{-r \zeta \cos l}{\cos \eta \cos \theta} (X - aa) - \frac{r \sin \eta \cos m}{\cos \zeta \cos \theta} (X - bb) - \frac{r \sin \theta \cos n}{\cos \zeta \cos \theta} (X - cc)$$

$$(bb - cc)(cc - aa)(aa - bb)$$

Ex his autem valoribus  $X$  et  $Y$  est pro superioribus

$$L = \frac{X}{aabbcc} \text{ et } K = \frac{aabb + aacc + bbcc - \mathfrak{B}}{aabbcc}$$

ex quibus fit

$$u \frac{1}{2} K - r \left( \frac{1}{2} KK - L \right) \text{ et } u' = \frac{1}{2} K + r \left( \frac{1}{2} KK - L \right)$$

ita ut sit  $u + u' = K$  et  $u' - u = r(KK - 4L)$ .

Haec analysis in genere valet, etiamsi corpori initio motus fuerit impressus, quoniam loco angulorum  $\mathfrak{d}t$  et  $\mathfrak{d}r$  hic adhibuimus  $\mathfrak{d}t + g$  et  $\mathfrak{d}r + h$ . Simili modo, quo hic ex situ initiali constantes  $\mathfrak{G}$ ,  $\mathfrak{G}$  et  $\mathfrak{H}$  definivimus, ex motu initio impresso, quantitates  $x$ ,  $y$ ,  $z$  datos obtinebunt valores, quibus si formulae coroll. 1. traditae et pro  $\mathfrak{d}t$  et  $\mathfrak{d}r$  scribendo  $\mathfrak{d}t + g$  et  $\mathfrak{d}r + h$  extensae, posito  $t = 0$  aequentur, determinabuntur reliquae constantes  $\mathfrak{E}$ ,  $g$  et  $h$ : quae quidem, uti jam ante notavimus evanescunt, si motus a quiete incipiat.

SCHOLIUM.

917. Pro casu ergo ejusmodi corporum pro quibus est  $bb = cc$ ,

$$\text{erit } u = \frac{1}{cc}, \quad u' = \frac{aa \cos \zeta^2 + cc \sin \zeta^2}{aacc}, \text{ atque } \mathfrak{d} = r \mathfrak{d}f g u, \quad \mathfrak{d}' = r \mathfrak{d}f g u',$$

integralia in genere ita se habebunt:

$$x = \mathfrak{E} \cos \zeta = \frac{\mathfrak{H} \mathfrak{d} \sin \zeta^2 \sin(\mathfrak{d}t + h)}{aa}$$

$$y = \mathfrak{E} \cos \eta + \mathfrak{G} \mathfrak{d} \cos \theta \sin(\mathfrak{d}t + h) + \frac{\mathfrak{H} \mathfrak{d}' \cos \zeta \cos \eta \sin(\mathfrak{d}t + h)}{cc}$$

$$z =$$

$$z = \mathcal{E} \cos \theta - \mathcal{G} \sin \theta \cos \eta \sin (\delta t + g) + \frac{\mathcal{H} \sin \theta \cos \zeta \cos \theta \sin (\delta t + h)}{cc}$$

atque

$$p = \mathcal{F} \cos \zeta + \mathcal{G} \sin \zeta^2 \cos (\delta t + g)$$

$$q = \mathcal{F} \cos \eta - \mathcal{G} \cos \zeta \cos \eta \cos (\delta t + g) + \mathcal{H} u' \cos \theta \cos (\delta t + h)$$

$$r = \mathcal{F} \cos \theta - \mathcal{G} \cos \zeta \cos \theta \cos (\delta t + g) - \mathcal{H} u' \cos \eta \cos (\delta t + h).$$

Quare si initio  $t = 0$  fuerit

$$p = r \sin \zeta \cos l; \quad q = r \sin \eta \cos m; \quad r = r \sin \theta \cos n$$

reperitur

$$\mathcal{H} = \frac{r \sin \eta \cos \theta \cos m - r \cos \eta \sin \theta \cos n}{u' \sin \zeta^2 \cos h}$$

$$\mathcal{G} = \frac{r \sin \zeta^2 \cos l - r \sin \eta \cos \zeta \cos \eta \cos m - r \sin \theta \cos \zeta \cos \theta \cos n}{\sin \zeta^2 \cos g}$$

$$\mathcal{F} = r \sin \zeta \cos \zeta \cos l + r \sin \eta \cos \eta \cos m + r \sin \theta \cos \theta \cos n.$$

At datis angulis  $l, m, n$ , simul dantur  $\zeta, \eta, \theta$

$$\cos \zeta^2 = \frac{\cos(l-m) \cos(n-l)}{\sin(l-m) \sin(n-l)}; \quad \cos \eta^2 = \frac{\cos(m-n) \cos(l-m)}{\sin(m-n) \sin(l-m)};$$

$$\cos \theta^2 = \frac{\cos(n-l) \cos(m-n)}{\sin(n-l) \sin(m-n)}.$$

$$\sin \zeta^2 = \frac{-\cos(m-n)}{\sin(l-m) \sin(n-l)}; \quad \sin \eta^2 = \frac{-\cos(n-l)}{\sin(m-n) \sin(l-m)};$$

$$\sin \theta^2 = \frac{-\cos(l-m)}{\sin(n-l) \sin(m-n)}.$$

Ex his autem formulis colligitur, esse

$$\sin \zeta \cos \zeta \cos l + \sin \eta \cos \eta \cos m + \sin \theta \cos \theta \cos n = 0,$$

ita ut constans supra definita  $\mathcal{F}$  semper fit  $= 0$ . Simili vero modo est

$$\frac{\sin \zeta \cos l}{\cos \eta \cos \theta} - \frac{\sin \eta \cos m}{\cos \zeta \cos \theta} + \frac{\sin \theta \cos n}{\cos \zeta \cos \eta} = 0$$

unde valores coefficientium supra definiti multo simplicius determinantur, ita ut litterae  $\mathcal{A}$  et  $\mathcal{B}$  ex illis prorsus elidantur. Valent haec in genere etiam si non fit  $bb = cc$ .

### PROBLEMA. no.

918. Si corpus basi sphaerica praeditum habeat duos axes principales pares, eique cum de situ quietis infinite parum fuerit declinatum

Ggg 2



420 CAPUT XVIII. DE MOTU CORPORUM

tum, motus minimus quicumque fuerit impressus, definire motus continuationem.

SOLUTIO.

Fig. 116. Sit ID axis corporis aequilibrum per centrum inertiae I et centrum basis G transiens, sitque hoc illo altius situm existente intervallo GI = f. Sit porro IA axis corporis singularis principalis ejusque, respectu momentum inertiae = Maa, respectu axium omnium autem ad hunc normalium = Mcc, quos omnes cum aequae pro principalibus habere liceat, sumatur alter IB in arcu DA productio, eritque alter IC, ut quadrans AC sit ad AD normalis, ideoque DC etiam quadrans ad AD normalis. Posito ergo DA = ζ, erit DB = η = ζ + 90° et DC = θ = 90°. Initio autem quo s = 0, fuerit arcus DZ = r, et angulus ZDA = l, erit ZDB = m = l et ZDC = n = l + 90°. Ex formulis ergo praecedentibus habebimus

$$u = \frac{1}{cc}; u' = \frac{aa \cos \zeta^2 + cc \sin \zeta^2}{aacc}; d = \frac{r \sin \zeta}{c}; y = \frac{r \sin \zeta (aa \cos \zeta^2 + cc \sin \zeta^2)}{ac}$$

tum vero ex hoc situ initiali fiet primo  $\zeta = 0$ , tum vero

$$r \sin \zeta \cos l = \Theta \sin \zeta^2 \cos g; \quad \text{ergo}$$

$$r \cos \zeta \cos l = \Theta \sin \zeta \cos \zeta \cos g; \quad \Theta = \frac{r \cos l}{\sin \zeta \cos g}$$

$$-r \sin l = \Theta u' \sin \zeta \cos \eta; \quad \Theta = \frac{-r \sin l}{u' \sin \zeta \cos \eta}$$

Deinde initio corpori motus sit impressus circa axem IO celeritate angulari = s in sensum ABC, existente OA = a, OB = b, OC = c, hincque debet

$$s \cos a = \Theta \cos \zeta - \frac{\sin \zeta \sin \zeta^2 \sin \eta}{aa}$$

$$s \cos b = -\Theta \sin \zeta - \frac{\sin \zeta \sin \zeta \cos \zeta \sin \eta}{cc}$$

$$s \cos c = \Theta \sin \zeta \sin g$$

unde concludimus

$$s (aa \cos a \cos \zeta - cc \cos b \sin \zeta) \pm \Theta (aa \cos \zeta^2 + cc \sin \zeta^2)$$

$$\text{et } s (\cos a \sin \zeta + \cos b \cos \zeta) = -\Theta \sin \zeta \sin \eta \left( \frac{\sin \zeta^2}{aa} + \frac{\cos \zeta^2}{cc} \right)$$

Ergo

$$\text{Ergo } \Theta = \frac{s(a a \cos \alpha \cos \zeta - c c \cos b \sin \zeta)}{a a \cos \zeta^2 + c c \sin \zeta^2}$$

$$\Theta = \frac{s \cos c}{\delta \sin \zeta \sin g}$$

$$\delta = \frac{-s(\cos \alpha \sin \zeta + \cos b \cos \zeta)}{\delta u' \sin \zeta \sin h}$$

$$\text{hinc erit } \tan g = \frac{s \cos c}{\delta r \cos l}, \text{ et } \tan h = \frac{s(\cos \alpha \sin \zeta + \cos b \cos \zeta)}{\delta r \sin l} \quad \text{unde}$$

anguli  $g$ , et  $h$  hincque numeri  $\Theta$  et  $\delta$  innotescunt.

His definitis teneat corpus elapso tempore  $t$  situm in figura re-  
praesentatum, sitque  $ZD = p$ ,  $ZA = l$ ,  $ZB = m$ ,  $ZC = n$ : ac po-  
natur  $\cos l = \cos \zeta + p$ ,  $\cos m = \cos \eta + q$ ;  $\cos n = \cos \theta + r$   
seu  $\cos m = -\sin \zeta + q$  et  $\cos n = r$ . Deinde gyretur nunc circa axem  
IO celeritate angulari  $= u$  in sensum ABC existentibus arcibus  $OA = a$ ,  
 $OB = c$ ,  $OC = \gamma$ , ac ponendo  $u \cos a = x$ ,  $u \cos c = y$  et  $u \cos \gamma = z$ ,  
habebimus ex §. 917.

$$u \cos a = \frac{s \cos \zeta (a a \cos \alpha \cos \zeta - c c \cos b \sin \zeta)}{a a \cos \zeta^2 + c c \sin \zeta^2} + \frac{\delta r \sin \zeta \sin l \sin (\delta t + h)}{a a u' \cos h}$$

$$u \cos c = \frac{-s \sin \zeta (a a \cos \alpha \cos \zeta - c c \cos b \sin \zeta)}{a a \cos \zeta^2 + c c \sin \zeta^2} + \frac{\delta r \cos \zeta \sin l \sin (\delta t + h)}{a a u' \cos h}$$

$$u \cos \gamma = \frac{\delta r \cos l \sin (\delta t + g)}{\cos g}$$

tum vero praeterea:

$$p = \frac{r \sin \zeta \cos l \cos (\delta t + g)}{\cos g}$$

$$q = \frac{r \cos \zeta \cos l \cos (\delta t + g)}{\cos g}$$

$$r = \frac{-r \sin l \cos (\delta t + h)}{\cos h}$$

Ex his si ponatur arcus  $ZD = p$ , erit

$$p = r r \left( \frac{\cos l^2 \cos (\delta t + g)^2}{\cos g^2} + \frac{\sin l^2 \cos (\delta t + h)^2}{\cos h^2} \right).$$

Ggg 3

Porro

Porro ex triangulo AZD est  $\cos ADZ = \frac{\cos l - \cos \zeta \cos g}{\sin \zeta \sin g} = \frac{p + \frac{1}{2} g g \cos \zeta}{g \sin \zeta}$   
 $= \frac{p}{g \sin \zeta}$  evanescente termino  $\frac{g \cos \zeta}{2 \sin \zeta}$ , hinc ergo erit

$$\cos ADZ = \frac{\cos l \cos(\delta t + g)}{\cos g} : r \left( \frac{\cos l^2 \cos(\delta t + g)^2}{\cos g^2} + \frac{\sin l^2 \cos(\delta t + h)^2}{\cos h^2} \right)$$

$$\text{ideoque } \tan ADZ = \frac{\cos g \tan l \cos(\delta t + h)}{\cos h \cos(\delta t + g)}$$

Praeter arcum autem  $DZ = p$  et angulum  $ADZ$  nosse oportet angulum  $XZD$  a circulo verticali fixo  $ZX$  computatum; est vero  $DZA = 180^\circ - ADZ$ , seu  $\tan DZA = \frac{-\cos g \cos(\delta t + h)}{\cos h \cos(\delta t + g)} \tan l$ , cum initio esset

$DZA = 180^\circ - l$  et  $\tan DZA = -\tan l$ . Deinde vero posito angulo  $XZA = \lambda$ , est  $d\lambda = \frac{-dt(y \cos \eta + z \cos \theta)}{\sin \zeta^2} = \frac{y dt}{\sin \zeta}$ , hincque  $\lambda = \text{Const.} - \frac{zt(a a \cos a \cos \zeta - c c \cos b \sin \zeta)}{a a \cos \zeta^2 + c c \sin \zeta^2} - \frac{r \cos \zeta \sin l \cos(\delta t + h)}{c c u' \sin \zeta}$ . Quod-

si ponamus initio angulum  $XZD$  evanuisse, initio fuerat  $\lambda = 180^\circ - l$ , sicque constans hic ingressa est:

$$\text{Const.} = 180^\circ - l + \frac{r \cos \zeta \sin l}{c c u' \sin \zeta}$$

unde habebimus:

$$\lambda = 180^\circ - l - \frac{zt(a a \cos a \cos \zeta - c c \cos b \sin \zeta)}{a a \cos \zeta^2 + c c \sin \zeta^2} + \frac{r \cos \zeta \sin l}{c c u' \sin \zeta} \left( 1 - \frac{\cos(\delta t + h)}{\cos h} \right)$$

hincque  $XZD = \lambda - DZA$ , ex quibus ad tempus  $t$  situs corporis perfecte cognoscitur, in hacque determinatione simul motus continetur.

#### COROLL. 2.

919. Si motus corpori initio impressus evanescat, est  $g = 0$  et  $h = 0$ ; hincque

$\lambda = 180^\circ - l$

$$x = u \cos a = \frac{\delta' r \zeta \zeta' \zeta \delta' \epsilon}{a a u'}$$

$$y = u \cos \epsilon = \frac{\delta' r \cos \zeta \zeta' \zeta \delta' \epsilon}{c c u'}$$

$$z = u \cos \gamma = \delta' r \cos l \zeta \delta' \epsilon$$

$$p = r \zeta \cos l \cos \delta \epsilon; q = r \cos \zeta \cos l \cos \delta \epsilon; r = -r \zeta \cos \delta' \epsilon$$

$$\text{tang ADZ} = \text{tang} (180^\circ - \text{DZA}) = \frac{\cos \delta' \epsilon}{\cos \delta \epsilon} \text{tang } l, \text{ et } \lambda = 180^\circ - l +$$

$$\frac{r \cos \zeta \zeta' l}{c c u' \zeta} (1 - \cos \delta' \epsilon).$$

COROLL. 2.

920. Sin autem corpori initio motus fuerit impressus celeritate angulari  $\epsilon$ , haec non multo major esse debet quam  $r$ . Si enim  $\frac{s}{r}$  esset numerus praemagnus, anguli  $g$  et  $h$  prodirent fere recti, eorumque cosinus fere evanescerent, sicque numeri  $p$ ,  $q$ ,  $r$  nimis fierent magni, quam ut tanquam valde parvae, uti natura solutionis exigit, considerari possent. Namque arcus  $ZD = \epsilon$  semper minimus esse debet.

COROLL. 3.

921. Cum sit  $s = r (xx + yy + zz)$ , nisi ternae quantitates  $x$ ,  $y$ ,  $z$  seorsum evanescant, fieri nequit, ut corpus unquam ad quietem redigatur. Atque etiamsi corpus a quiete moveri inceperit, tamen fieri potest, ut corpus deinceps nunquam ad quietem revertatur, hocque adeo semper eveniet, nisi fuerit vel  $\zeta l = 0$  vel  $\cos l = 0$ ; quin etiam tum axis corporis naturalis  $DF$  nunquam in situm verticalem perveniet.

COROLL. 4.

922. Cum sit  $r$  quantitas valde exigua, si corpus initio nullum motum acceperit, ut sit  $\epsilon = 0$ , erit satis exacte  $\lambda = 180 - l$ ; scilicet angulus  $XZA$  manebit constans, motusque axis  $IA$  ita comparatus, ut in arcu  $ZA$  modo ad punctum verticale  $Z$  propius accedat modo ab eo longius recedat, erit autem  $\Delta Z = \zeta - r \cos l \cos \delta \epsilon$ , et ang.  $ZAD = \frac{r \zeta l \cos \delta' \epsilon}{\zeta}$ .

CO-

## COROLL. 5.

923. In genere autem quicumque motus corpori initio fuerit impressus, erit

$$XZA = \lambda = 180^\circ - 1 - \frac{et(aacofacof\zeta - cc cosb fi\zeta)}{aa cos\zeta^2 + cc fi\zeta^2}$$

sicque arcus ZA uniformiter circa punctum verticale Z circumferetur: deinde vero cum sit  $h AD : h DZA = ZD (\varphi) : ZAD$ , erit  $ZAD = \frac{rfi\cos(\delta't+h)}{fi\zeta cosb}$  atque arcus  $ZA = \zeta - \frac{r cosl cos(\delta't+h)}{cosg}$ . Seu pro  $g$  et  $h$  substituendis valoribus:

$$\text{angulus } ZAD = \frac{rfi\cos\delta't}{fi\zeta} - \frac{e(cosaf\zeta + cosb cos\zeta)fi\delta't}{\delta fi\zeta}$$

$$\text{et arcus } ZA = \zeta - r cosl cos\delta't + \frac{ecofc fi\delta't}{\delta}.$$

## SCHOLION. 1.

924. Hae tres postremae formulae, angulos XZA, ZAD cum arcu ZA exhibentes, totam problematis solutionem complectuntur. Quodsi enim has res ad quodvis tempus assignare possumus, litum corporis perfecte cognoscimus. Quare si pro  $\delta$  et  $\delta'$  valores supra inventos substituamus, universa problematis solutio his formulis continebitur:

$$\text{ang. } XZA = 180^\circ - 1 - \frac{et(aacofacof\zeta - cc cosb fi\zeta)}{aa cos\zeta^2 + cc fi\zeta^2}$$

$$\text{arc. } ZA = \zeta - r cosl cos \frac{r^2 f g}{c} + \frac{ecofc}{r^2 f g} fi \frac{r^2 f g}{c}$$

$$\text{ang. } ZAD = \frac{rfi\cos}{fi\zeta} - \frac{r^2 f g (aa cos\zeta^2 + cc fi\zeta^2)}{ac} - \frac{eac(cosaf\zeta + cosb cos\zeta)}{fi\zeta r^2 f g (aa cos\zeta^2 + cc fi\zeta^2)}$$

$$fi \frac{r^2 f g (aa cos\zeta^2 + cc fi\zeta^2)}{ac}$$

Quodsi ergo omnia momenta inertiae fuerint aequalia, scilicet  $aa = cc$ , erit

$$\text{ang. } XZA = 180^\circ - 1 - et(cosaf\zeta - cosb fi\zeta)$$

$$\text{arc. } ZA = \zeta - r cosl cos \frac{r^2 f g}{c} + \frac{ecofc}{r^2 f g} fi \frac{r^2 f g}{c}$$

ang.

$$\text{ang. ZAD} = \frac{r \sin \zeta}{\sin \zeta} \cos \frac{r \sin 2fg}{\sin \zeta} - \frac{ac(\cos a \sin \zeta + \cos b \cos \zeta)}{\sin \zeta r \sin 2fg} \sin \frac{r \sin 2fg}{\sin \zeta}$$

quo casu positio puncti A est plane arbitraria.

SCHOLION. 2.

925. Argumentum, quod in hoc capite potissimum evolvendum suscepimus, motum scilicet titubatorium corporum in basi sphaerica praeditorum, perfecte pertractavimus, dummodo titubationes fuerint quam minimae, quae hypothesis etiam in doctrina oscillationum statui solet: formulae enim §. 912. et seqq. exhibitae perfectam continent hujus quaestionis solutionem, si quidem ibi anguli  $\delta$  et  $\delta'$  constantibus  $g$  et  $h$  augeantur. Constantes autem ex statu initiali definire docuimus in §. 916. quae operatio vehementer sublevatur annotatione sub finem §. 917. adjuncta; quare ad motum corporum cylindricorum explicandum progrediamur.

## CAPUT XIX.

### DE MOTU CORPORUM CYLINDRICORUM SUPER PLANO HORIZONTALI.

THEOREMA. II.

926. **D**um corpus cylindricum plano horizontali movetur, pressio, qua plano innititur, est verticalis, et per centrum cujusdam sectionis cylindri ad longitudinem normaliter factae transit.

DEMONSTRATIO.

Corpus cylindricum plano horizontali incumbit secundum lineam rectam axi cylindri parallelam, in qua vires existunt cylindrum sustentantes, fierique potest ut hae vires per totam illam rectam sint dispersae. Cum autem istae vires omnes sint ad planum horizontale normales, ideoque verticales, ac parallelae inter se, una dabitur vis iis omnibus aequivalens: cujus ergo directio pariter erit verticalis, certoque rectae contactus puncto insidet. Quodsi igitur in hoc puncto cylindrus ad longitudinem normaliter secetur, sectio erit circulus, et vis omnibus pressionibus aequivalens, quia est in hac sectione ad punctum contactus

Hhh

tactus

## 426 CAPUT XIX. DE MOTU CORPORUM

tactus verticalis per ejus centrum transibit. Nisi ergo haec sectio transeat per centrum inertiae corporis, directio media pressionis non in sectione per centrum inertiae ad longitudinem normaliter facta versabitur.

### EXPLICATIO.

927. Corpora igitur hic consideramus cylindrica, in quibus primo notetur eorum axis quasi geometricus, ad quem omnes sectiones normaliter factae, sint circuli aequales, ita ut corpus sit cylindrus rectus, cujus motus, dum plano horizontali perpetuo incumbit, sumus exploraturi. Si centrum inertiae in ipso axe geometrico esset, in omni situ cylindrus aequilibrium teneret: sin autem secus, consideretur sectio cylindri ad axem normalis per centrum inertiae I facta, cujus centrum sit in G, atque ad statum aequilibrii requiritur, ut recta GI sit verticalis, ex quo duplex datur aequilibrii situs, alter quo centrum inertiae I infra G alter, quo supra G versatur, quorum ille *stabilis*, hic *labilis* vocetur. In omni autem cylindri situ axis geometricus est horizontalis, rectae contactus verticaliter imminens. Deinde ternos axes mechanicos cylindri fuisse oportet, qui si qualemcunque materiae distributionem admittimus, utcumque ab axe geometrico seu secundum longitudinem ducto differre possunt, a quorum positione motus determinatio potissimum pendet. Per centrum inertiae I etiam ducta concipiatur recta axi geometrico parallela, quae plerumque axis principalis esse solet, et semper manet horizontalis. His igitur notatis, quomodo-  
 Fig. 177. cunque cylindrus plano horizontali incumbat, in sectione LMFN per centrum inertiae I facta notetur punctum T, ubi hic circulus planum horizontale tangit, deinde etiam illa sectio huic parallela probe notetur, in qua media directio pressionum versatur, quae rectae TG erit parallela; ac tam quam quantitas pressionis, quam distantia sectionis, in qua versatur, a sectione per centrum inertiae facta, erit incognita, deinde ex motu deinceps determinanda: siquidem hac vi effici debet, ut axis cylindri longitudinalis perpetuo maneat horizontalis, et cylindrus plano horizontali incumbat.

### SCHOLION.

928. In his motibus investigandis non opus est, ut totum corpus in figuram cylindri sit efformatum, sed sufficit, si in locis, quibus plano horizontali incumbit, talem habuerit formam. Huc ergo pertinent motus omnium eorum corporum, quae in terminos cylindricos desinunt.

desinunt, quibus tantum planis horizontalibus aequè elevatis utrinque incumbant, dum intra eos moles corporis utcumque fuerit extensa, quemadmodum evenit in cunis, quae motu vacillatorio super terminis, quos tanquam circulos spectare licet, agitantur: deinde etiam huc referendus est motus pendulorum, quae non circa axem linearem, uti supra assumimus, sed materialem utrinque in cylindrum abeuntem oscillantur, dum his binis cylindris planis horizontalibus incumbunt, intra quae massa penduli dependet. Etsi igitur his casibus sectiones mediae non sunt circuli, tamen binas illas sectiones, in quarum altera centrum inertiae versatur, in altera vero vis pressionis, tanquam circulos spectare licet, quoniam figura externus tantum in censum venit, quatenus corpus plano horizontali incumbit. Tum vero etiam nisi huiusmodi corpora integras circumvolutiones peragant, ne opus quidem est, ut toti termini sint cylindrici, sed sufficit, si eorum portio, qua fit contactus, talem habeat figuram, cujus axem longitudinalem per totum corpus extensum probe notasse convenit. Quocirca haec tractatio ad plurimos casus extenditur, de quo motu primum tenendum, centrum inertiae a viribus sollicitantibus alium motum nisi in eadem recta verticali recipere non posse; ita ut nullum consequatur motum horizontalem, nisi extrinsecus talem acceperit, quem autem deinceps uniformiter esset prosecuturum, in quo cum nulla insit difficultas, ad eum hic non attendimus.

## PROBLEMA III.

929. Si corpus cylindricum super plano horizontali moveatur, deturque pressio, qua plano innititur, definire motum progressivum, quo centrum inertiae corporis incedet.

## SOLUTIO.

Ad axem cylindri fiat sectio normalis per centrum inertiae  $I$ , quae Fig. 118. sive corpus sit cylindrus continuus, sive tantum terminis cylindricis sit praeditum, spectetur tanquam circulus  $LMFN$  basis aequalis, cujus centrum sit in  $G$ , centrum autem inertiae corporis in  $I$ , existente intervallo  $GI = f$ , ita ut in statu quietis recta  $LIGF$  teneat situm verticalem, in quo centrum inertiae  $I$  supra centrum circuli  $G$  in figura repraesentatur, quod si fuerit profundius, intervallum  $GI = f$  negative est capiendum. Nunc autem contactus respondeat puncto  $T$ , ita ut recta ad planum circuli in  $T$  normalis sit linea contactus in planum horizontale  $Hh$  cadens. Ducta igitur per centrum circuli recta  $IGT$  ad contactum

Hhh 2

T



T, parallela erit directioni pressionis, qua corpus a plano horizontali repellitur, quae vis, in quacunque alia sectione versetur, ponatur  $= \Pi$ , quam tanquam cognitam spectamus. Sit porro pondus cylindri  $= M$ , radius circuli  $GF = GT = e$ , et angulus declinationis  $BGL = \varphi$ ; erit elevatio centri inertiae I supra horizontem  $IP = e + f \cos \varphi$ , quae ponatur  $= v$ . Quoniam igitur in motum progressivum inquirimus, et gravitas deorsum urget secundum IP vi  $= M$ , pressionis vis  $\Pi$  ipsi centro inertiae I sursum secundum IV applicata concipiatur, ita ut jam tota vis deorsum sollicitans sit  $= M - \Pi$ , et massa movenda  $= M$ : unde ex principiis motus habetur  $ddv = \frac{-2g(M - \Pi)}{M} dt^2$ ; hincque  $\frac{\Pi}{M} =$

$$1 + \frac{ddv}{2g dt^2} \text{ seu } \Pi = M \left( 1 + \frac{f d d. \cos \varphi}{2g dt^2} \right), \text{ qua aequatione angulus}$$

$BGL = \varphi$ , ex eoque elevatio centri inertiae  $IP = e + f \cos \varphi$  innotescit: ac nisi corpori motus horizontalis fuerit impressus, punctum I in recta PIV agitaretur, in ea vel ascendens vel descendens, ita ut punctum P maneret fixum, ex quo punctum contactus T definitur, quia est  $PT = f \sin \varphi$ . Sin autem corpus acceperit motum horizontalem, eum constanter servaret uniformem in directum, motusque puncti I ex hoc aequabili rectilineo horizontali et illo verticali foret compositus.

### SCHOLION.

930. Praeterea autem in hoc corpore motus gyriorius generari potest, ita tamen ut tam punctum G quam recta ad circulum LMFN in G normalis, quae est axis proprius cylindri, perpetuo maneat in eodem plano horizontali. Ad hunc motum gyriorium investigandum, seposito motu progressivo centrum inertiae I tanquam in quiete spectabimus, circa quod sphaera descripta, in ea circulus LMFN perpetuo erit verticalis, ad quem si recta normalis per I ducatur, erit ea axis cylindri longitudinalis. Qua conditione observata, omnes motus gyriorii, quorum cylindrus est capax, facile in figura repraesentari possunt. Hic autem ante omnia ad situm axium principalium probe attendi oportet, quorum respectu momenta ex vi pressionis nata sunt definienda.

### PROBLEMA. 112.

931. Si corpus cylindricum plano horizontali incumbens habeat situm quemcunque, deturque tam pressio  $\Pi$  quam sectio cylindri trans-

versa, in qua versatur, invenire ejus momenta respectu axium principalium.

## SOLUTIO.

Sectio cylindri per centrum inertiae I ad longitudinem normaliter Fig. 129.  
facta cadat in planum tabulae, in qua recta IZ sit normalis, et recta  
LIG per centrum hujus sectionis G transeat, ita ut sit intervallum IG  
 $= f$ , et angulus ZIL  $= \epsilon$ . Ex G erigatur ad planum tabulae normalis  
GH usque ad sectionem, in qua vis pressionis  $\Pi$  versatur, sitque inter-  
vallum GH  $= b$ , ac supra vidimus esse  $\Pi = M \left( 1 + \frac{f d d. \cos \epsilon}{2 g d s^2} \right)$  cujus

vis directio erit HII verticalis ideoque parallela ipsi IZ. Iam radio ar-  
bitrario  $= 1$ , circa centrum inertiae I sphaera concipiatur descripta,  
ad cujus superficiei puncta A, B, C axes corporis principales dirigantur,  
vocenturque arcus pro horum punctorum determinatione LA  $= \zeta$ ,  
LB  $= \eta$ , LC  $= \theta$ ; item ZA  $= l$ , ZB  $= m$ , ZC  $= n$  existente ZL  
 $= \epsilon$ ; tum vero anguli ZLA  $= \xi$ , ZLB  $= \gamma$ , ZLC  $= \delta$ , ut sit

$$\begin{aligned} \cos l &= \cos \zeta \cos \epsilon + \cos \xi \sin \zeta \sin \epsilon; \cos m = \cos \eta \cos \epsilon + \cos \gamma \sin \eta \sin \epsilon; \\ \cos n &= \cos \theta \cos \epsilon + \cos \delta \sin \theta \sin \epsilon. \end{aligned}$$

Ac primo quidem vis HII  $= \Pi$  resolvatur secundum directiones axibus  
principalibus parallelas, quae resolutio perinde instituitur, ac si vis  
haec in centro I secundum directionem IZ esset applicata: inde autem  
nascitur

vis sec. IA  $= \Pi \cos l$ ; vis sec. IB  $= \Pi \cos m$ ; vis sec. IC  $= \Pi \cos n$ ,  
quae autem vires jam in puncto H applicatae sunt intelligendae. Du-  
catur recta IH quae erit  $= r (ff + bb)$ , secans sphaeram in F, erit  
 $\tan \text{ GIH} = \frac{b}{f}$ , et arcus LF cum arcu ZL faciet angulum ZLF re-

ctum. Ponatur arcus LF  $= e$ , erit  $b = -f \tan e$  et IH  $= \frac{-f}{\cos e}$ ,  
ita ut loco intervalli GH  $= b$  commode arcum LF  $= e$  in calculo reti-  
neamus. Nunc autem investigari oportet, quomodo recta IF ad axes  
principales inclinetur, quae inclinatio per arcus FA, FB et FC defini-  
tur. Reperitur autem

$$\begin{aligned} \cos AF &= \cos \zeta \cos e + \sin \xi \sin \zeta \sin e \\ \cos BF &= \cos \eta \cos e + \sin \gamma \sin \eta \sin e \\ \cos CF &= \cos \theta \cos e + \sin \delta \sin \theta \sin e. \end{aligned}$$

Repraesentent jam rectae inter se normales IA, IB, IC axes principia- Fig. 130.

Hhh 3

lcs

430 CAPUT XIX. DE MOTU CORPORUM

les corporis, inter quos existat recta  $IH = \frac{-f}{\cos e}$  eruntque coordinatae pro puncto H axibus parallelae

$IN = IH \cos AF$ ;  $NM = IH \cos BF$ ;  $MH = IH \cos CF$   
et vires in H applicatae axibusque parallelae erunt

vis  $Ha = \Pi \cos l$ ; vis  $Hb = \Pi \cos m$ ; vis  $Hc = \Pi \cos n$ ,

unde respectu axium principalium nascuntur momenta:

Mom. respectu axis IA in sensum BC  $= \Pi. IH (\cos n \cos BF - \cos m \cos CF)$

Mom. respectu axis IB in sensum CA  $= \Pi. IH (\cos l \cos CF - \cos n \cos AF)$

Mom. respectu axis IC in sensum AB  $= \Pi. IH (\cos m \cos AF - \cos l \cos BF)$ .

Quae momenta cum supra litteris P, Q, R indicaverimus, si valores supra exhibitos substituamus, obtinebimus:

$$P = \frac{-\Pi f}{\cos e} \left( \begin{aligned} & \sin e \cos e (\sin g \sin \eta \cos \theta - \sin h \cos \eta \sin \theta) + \cos e \sin e (\cos h \cos \eta \sin \theta - \cos g \sin \eta \cos \theta) \\ & + \sin \eta \sin \theta \sin e \cos h (\sin g \cos \eta - \cos g \sin \eta) \end{aligned} \right)$$

At est  $\sin g \cos \eta - \cos g \sin \eta = \sin (g - \eta) = \frac{-\cos \zeta}{\sin \eta \sin \theta}$ , tum vero

$$\begin{aligned} \sin g \sin \eta \cos \theta - \sin h \cos \eta \sin \theta &= \cos \zeta \sin \zeta \\ \cos h \cos \eta \sin \theta - \cos g \sin \eta \cos \theta &= \sin \zeta \sin \zeta \end{aligned}$$

ita ut tam pro P quam pro Q et R ex analogia habeamus

$$P = \frac{-\Pi f}{\cos e} (\cos \zeta \sin \zeta \sin e \cos e + \sin \zeta \sin \zeta \cos e \sin e - \cos \zeta \sin e \sin e)$$

$$Q = \frac{-\Pi f}{\cos e} (\cos g \sin \eta \sin e \cos e + \sin g \sin \eta \cos e \sin e - \cos \eta \sin e \sin e)$$

$$R = \frac{-\Pi f}{\cos e} (\cos h \sin \theta \sin e \cos e + \sin h \sin \theta \cos e \sin e - \cos \theta \sin e \sin e).$$

COROLL. 1.

932. Cum sit  $-f \tan e = b$ , et  $b$  denotet intervallum GH, quo sectio, in quam cadit pressio, antrorsum distat a sectione, in qua est centrum inertiae, erit

$$P = -\Pi f \sin \zeta \sin \zeta \sin e + \Pi b (\cos \zeta \sin \zeta \cos e - \cos \zeta \sin e)$$

$$Q = -\Pi f \sin g \sin \eta \sin e + \Pi b (\cos g \sin \eta \cos e - \cos \eta \sin e)$$

$$R = -\Pi f \sin h \sin \theta \sin e + \Pi b (\cos h \sin \theta \cos e - \cos \theta \sin e).$$

CO.

## C O R O L L . 2.

933. Dum ergo motus corporis determinatur, non solum quantitatem pressionis  $\Pi$  sed etiam intervallum  $GH = b$  definiri oportet, ut habeatur locus, ubi media directio pressionum est applicata.

## E X P L I C A T I O.

934. Relatio inter arcus  $\zeta$ ,  $\eta$ ,  $\theta$  et angulos  $f$ ,  $g$ ,  $h$  insignes suppeditat proprietates, inter quas substitutiones in solutione adhibitae continentur. Primo enim pro illorum angulorum differentiis invenimus

$$\begin{aligned} \cos(f-g) &= \frac{-\cos \zeta \cos \eta}{\sin \zeta \sin \eta}; \cos(g-h) = \frac{-\cos \eta \cos \theta}{\sin \eta \sin \theta}; \cos(h-f) \\ &= \frac{-\cos \zeta \cos \theta}{\sin \zeta \sin \theta} \\ \sin(f-g) &= \frac{-\cos \theta}{\sin \zeta \sin \eta}; \sin(g-h) = \frac{-\cos \zeta}{\sin \eta \sin \theta}; \sin(h-f) \\ &= \frac{-\cos \eta}{\sin \zeta \sin \theta} \end{aligned}$$

Hinc jam anguli  $g$  et  $h$  ad angulum  $f$  reduci possunt, ob  $g = f - (f-g)$  et  $h = f + (h-f)$ , unde colligitur

$$\begin{aligned} \sin g &= \frac{-\sin f \cos \zeta \cos \eta + \cos f \cos \theta}{\sin \zeta \sin \eta}; \sin h = \frac{-\sin f \cos \zeta \cos \theta - \cos f \cos \eta}{\sin \zeta \sin \theta} \\ \cos g &= \frac{-\cos f \cos \zeta \cos \eta - \sin f \cos \theta}{\sin \zeta \sin \eta}; \cos h = \frac{-\cos f \cos \zeta \cos \theta + \sin f \cos \eta}{\sin \zeta \sin \theta} \end{aligned}$$

Quodsi binis conjungendis vel  $\cos f$  vel  $\sin f$  elidatur, obtinentur sequentes formulae:

- I.  $\sin f \sin \zeta \cos \zeta + \sin g \sin \eta \cos \eta + \sin h \sin \theta \cos \theta = 0$
- II.  $\cos f \sin \zeta \cos \zeta + \cos g \sin \eta \cos \eta + \cos h \sin \theta \cos \theta = 0$
- III.  $\sin f \sin \zeta = -\cos g \sin \eta \cos \theta + \cos h \cos \eta \sin \theta$
- IV.  $\sin g \sin \eta = -\cos h \sin \theta \cos \zeta + \cos f \cos \theta \sin \zeta$
- V.  $\sin h \sin \theta = -\cos f \sin \zeta \cos \eta + \cos g \cos \zeta \sin \eta$
- VI.  $\cos f \sin \zeta = \sin g \sin \eta \cos \theta - \sin h \cos \eta \sin \theta$
- VII.  $\cos g \sin \eta = \sin h \sin \theta \cos \zeta - \sin f \cos \theta \sin \zeta$
- VIII.  $\cos h \sin \theta = \sin f \sin \zeta \cos \eta - \sin g \cos \zeta \sin \eta$
- IX.  $\sin f \cos f \sin \zeta^2 + \sin g \cos g \sin \eta^2 + \sin h \cos h \sin \theta^2 = 0$
- X.  $\sin f^2 \sin \zeta^2 + \sin g^2 \sin \eta^2 + \sin h^2 \sin \theta^2 = 1$ : XI.  $\cos f^2 \sin \zeta^2$   
 $+ \cos g^2 \sin \eta^2 + \cos h^2 \sin \theta^2 = 1$

quarum

quorum ope aequationes, ad quas motus determinatio perducitur, simpliciores reddi possunt.

## P R O B L E M A. 113.

Fig. 131. 935. Si corpus cylindricum quodcumque super plano horizontali moveatur utcumque, aequationes exhibere, quibus ad quodvis tempus ejus situs et motus gyriorius determinetur.

## S O L U T I O.

Manentibus denominationibus in praecedente problemate factis, consideretur centrum inertiae  $I$  ut quiescens, circa quod descripta sit sphaera, cujus punctum verticale  $Z$ , et circulus verticalis fixus  $ZDX$ , in quo recta centralis  $IL$  initio situm  $ID$  tenuerit. Elapso autem tempore  $t$  ea pervenerit in  $L$ , ac ponatur arcus  $ZL = \varphi$  et angulus  $XZL = \varphi$ , atque hinc situs axium principalium, quorum poli sint  $A, B, C$  ita definitur, ut sint arcus  $LA = \zeta$ ,  $LB = \eta$ ,  $LC = \theta$ , et anguli  $ZLA = f$ ,  $ZLB = g$ ,  $ZLC = h$ ; qui sunt quantitates constantes, ex quibus cum arcu variabili  $ZL = \varphi$ , ita definiuntur arcus  $ZA = l$ ,  $ZB = m$ ,  $ZC = n$  ut sit:

$$\cos l = \cos \zeta \cos \varphi + \cos f \sin \zeta \sin \varphi; \cos m = \cos \eta \cos \varphi + \cos g \sin \eta \sin \varphi; \cos n = \cos \theta \cos \varphi + \cos h \sin \theta \sin \varphi.$$

Quodsi jam momenta inertiae corporis respectu axium principalium  $IA, IB, IC$  sint  $Maa, Mbb, Mcc$  existente  $M$  massa corporis,  $\Pi$  autem sit pressio, et sectio in qua ea versatur ab  $I$  antrosum distet intervallo  $= r$ , quod quia est variabile, in superioribus formulae loco  $b$  scribi debet  $s$ . Gyretur nunc corpus circa polum  $O$  celeritate angulari  $= \omega$  in sensum  $ABC$ , positisque arcibus  $OA = \alpha$ ,  $OB = \beta$ ,  $OC = \gamma$  sit  $\omega \cos \alpha = x$ ,  $\omega \cos \beta = y$ ,  $\omega \cos \gamma = z$ , ac primo habemus  $\Pi = M(1 +$

$\frac{f d d \cos \varphi}{2 g d s})$ , tum vero has tres aequationes

$$a a d x + (c c - b b) y z d t = \frac{-2 \Pi f g}{M} d t \sin f \sin \zeta \sin \varphi + \frac{2 \Pi g s}{M} d t$$

$$(\cos f \sin \zeta \cos \varphi - \cos \zeta \sin \varphi)$$

$$b b d y + (a a - c c) x z d t = \frac{-2 \Pi f g}{M} d t \sin g \sin \eta \sin \varphi + \frac{2 \Pi g s}{M} d t$$

$$(\cos g \sin \eta \cos \varphi - \cos \eta \sin \varphi)$$

$c c d z$

$$cdz + (bb - aa)xydt = \frac{-2\pi fg}{M} ds \sin \theta \sin \varphi + \frac{2\pi g s}{M} ds$$

$$(\cos \theta \sin \varphi \cos \varphi - \cos \theta \sin \varphi).$$

Praeterea habemus has tres aequationes

$$dl \sin l = dt (y \cos n - z \cos m) = d\varphi (\cos \zeta \sin \varphi - \cos \varphi \sin \zeta \cos \varphi)$$

$$dm \sin m = dt (z \cos l - x \cos n) = d\varphi (\cos \eta \sin \varphi - \cos \varphi \sin \eta \cos \varphi)$$

$$dn \sin n = dt (x \cos m - y \cos l) = d\varphi (\cos \theta \sin \varphi - \cos \varphi \sin \theta \cos \varphi)$$

quarum autem binas tantum fuisse sufficit, ita ut supersint sex aequationes, ex quibus variables totidem  $x, y, z, \Pi, s$  et  $\varphi$  ad datum tempus  $t$  determinari oporteat. Denique vero positis angulis  $XZA = \lambda, XZB = \mu, XZC = \nu$ , fit

$$d\lambda \sin l^2 = -dt (y \cos m + z \cos n)$$

quam unam resolvisse sufficit. At cum sit  $LZA = \lambda - \varphi$ , erit  $\cos$

$$(\lambda - \varphi) = \frac{\cos \zeta - \cos l \cos \varphi}{\sin l \sin \varphi} \text{ et } \sin (\lambda - \varphi) = \frac{\sin \zeta \sin \varphi}{\sin l}, \text{ unde } (d\lambda - d\varphi)$$

$$\cos (\lambda - \varphi) = \frac{-dl \sin \zeta \sin \varphi \cos l}{\sin l^2} = \frac{(d\lambda - d\varphi)(\cos \zeta - \cos l \cos \varphi)}{\sin l \sin \varphi}, \text{ ideoque}$$

$$d\varphi = \frac{-dt (y \cos m + z \cos n)}{\sin l^2} + \frac{dl \sin \zeta \sin \varphi \cos l \sin \varphi}{\sin l (\cos \zeta - \cos l \cos \varphi)}$$

hincque etiam ad datum tempus angulus  $\varphi$  definitur: ex quibus rebus motus corporis perfecte cognoscitur.

#### COROLL. 1.

936. Cum sit  $\cos \zeta - \cos l \cos \varphi = \sin \varphi (\cos \zeta \sin \varphi - \cos \varphi \sin \zeta \cos \varphi) =$   
 $\frac{dl \sin l \sin \varphi}{d\varphi}$  erit  $d\varphi = \frac{-dt (y \cos m + z \cos n)}{\sin l^2} + \frac{d\varphi \sin \zeta \sin \varphi \cos l}{\sin l^2}$ , hincque

$$d\varphi \sin^2 \varphi = -dt (y \cos m + z \cos n) + d\varphi \cos \varphi \sin \zeta \sin \varphi \cos \zeta$$

$$+ d\varphi \sin \varphi \sin \zeta \cos \varphi \sin \zeta^2.$$

Similes autem expressiones pro  $d\varphi \sin^2 m$  et  $d\varphi \sin^2 n$  reperiuntur, quae in unam summam collectae, ob  $\sin^2 l + \sin^2 m + \sin^2 n = 2$ , dabunt

$$d\varphi = -dt (x \cos l + y \cos m + z \cos n) \text{ per } n^\circ 1 \text{ et IX. §. 934.}$$

tibi  $x \cos l + y \cos m + z \cos n$  denotat cosinum arcus  $ZO$  per  $\pi$  multiplicatum.

#### COROLL. 2.

937. Ex aequationibus pro  $dl \sin l, dm \sin m, dn \sin n$  inventis colligimus,

$dl \beta l \cos \zeta + dm \beta m \cos \eta + dn \beta n \cos \theta = de \beta e$   
 ac valoribus per  $ds$  substitutis, impetrabimus,

$de = -ds (x \beta f \beta \zeta + y \beta g \beta \eta + z \beta h \beta \theta)$   
 ope reductionum supra traditarum,

## COROLL. 3.

938. Ex tribus autem prioribus aequationibus deducimus, ob  
 $xdl \beta l + ydm \beta m + zdn \beta n = 0$ , hanc aequationem

$$aaxdx + bbydy + cczdz = \frac{-2\pi fg}{M} ds \beta e (x \beta f \beta \zeta + y \beta g \beta \eta + z \beta h \beta \theta) \\ = \frac{2\pi fg}{M} de \beta e = -2fgd \cos e \left(1 + \frac{fdd \cos e}{2gdt^2}\right), \text{ cuius ergo inte-} \\ \text{grale est}$$

$$aaxx + bbyy + cczz = C - 4fg \cos e - \frac{ffde^2 \beta e^2}{dt^2}$$

## SCHOLIUM.

939. Si in sphaera nostra dicatur circulus maximus horizontalis  
 YMX, in eo perpetuo axis cylindri longitudinalis reperiatu necesse est.  
 Pertingat ejus terminus anterior in M, et quia tam ML quam MZ sunt  
 quadrantes, erunt anguli MZL et MLZ recti, ideoque angulus ZML  
 $= e$  et arcus XM = angulo XZM =  $90^\circ + \varphi$ . Tum vero quia pun-  
 ctum M aliter nisi in circulo XY moveri nequit, polus gyrationis O ne-  
 cessario in quadrante ZM situs sit necesse est. Hinc si arcus OM po-  
 natur =  $\omega$ , ob celeritatem angularem =  $\omega$  in sensum ABC tendentem,  
 punctum M tempusculo  $dt$  regreditur versus X per arculum =  $uds \beta \omega$ :  
 est vero  $\beta \omega = \cos OL = \cos \alpha \cos l + \cos \zeta \cos m + \cos \gamma \cos n$ , ideo-  
 que  $\omega \beta \omega = x \cos l + y \cos m + z \cos n$ , ita ut sit  $-d\varphi = ds (x \cos l +$   
 $y \cos m + z \cos n)$  uti in coroll. 1. invenimus. Deinde cum in triangulo  
 OZL sit ZO =  $90^\circ - \omega$ , ZL =  $e$  et OZL =  $90^\circ$ , erit arcus  $\cos OL$

$$= \beta \omega \cos e, \beta OL = \frac{\cos \omega}{\beta OL} \text{ et } \cos OL = \frac{\beta \omega \beta e}{\beta OL} \text{ qd } \cos OL = \\ \frac{\beta e \beta \omega}{\cos \omega}.$$

Quare si tempusculo  $dt$  punctum L circa O gyretur in L, erit  
 $Ll = uds \beta OL$ , et angulus OLI rectus, hinc ducto circulo Ll ad Zl  
 perpendiculari fiet  $Ll = Ll \cos ZLl = Ll \beta OL = uds \cos \omega$ , at est  
 $Ll = -de$  ideoque  $de = -uds \cos \omega$ . Quae formula comparata cum  
 ea, quam §. 937. invenimus, dat

$\omega \cos$

Fig. 122.

$$x \cos \omega = x \beta \beta \beta \zeta + y \beta \beta \beta \eta + z \beta \beta \beta \theta$$

ut est  $xx + yy + zz = us = (x \cos l + y \cos m + z \cos n)^2 + (x l \beta \beta \zeta + y \beta \beta \beta \eta + z \beta \beta \beta \theta)^2$  quae aequalitas per aequationem  $x dl \beta \beta l + y dm \beta \beta m + z dn \beta \beta n = 0$  confirmatur. Verum ne multitudinem litterarum ob-ruamur, evolvamur casum, quo axis cylindri longitudinalis simul est axis principalis.

## P R O B L E M A. 114.

940. Si corporis cylindrici axis longitudinalis per ejus centrum inertiae ductus simul fuerit axis principalis, idque super plano horizontali utcumque moveatur, definire ejus motum. Fig. 123.

## S O L U T I O.

Cum puncta A et M in unum incidant, bini reliqui poli principales B et C in circulo verticali ZL existent, eritque propterea:  $LA = \zeta = 90^\circ$ ;  $LB = \eta$ ;  $LC = \theta = 90^\circ - \eta$ ;  $ZLA = \zeta = 90^\circ$ ,  $ZLB = \eta = 180^\circ$ ;  $ZLC = \theta = 0$ ; hincque  $ZA = l = 90^\circ$ ;  $ZB = m = \eta + \varrho$  et  $ZC = n = \varrho - \theta = \eta + \varrho - 90^\circ$ . Quibus valoribus substitutis, habebimus istas aequationes:

$$\frac{\Pi}{M} = 1 + \frac{fdd \cos \varrho}{2gdt^2}$$

$$aadx + (cc - bb) yzdt = \frac{-2\Pi fg}{M} dt \beta \varrho$$

$$bbdy + (aa - cc) xzdt = \frac{-2\Pi gs}{M} dt \beta (\eta + \varrho)$$

$$ccdz + (bb - aa) xydt = \frac{2\Pi gs}{M} dt \cos (\eta + \varrho)$$

$$y \beta (\eta + \varrho) - z \cos (\eta + \varrho) = 0$$

$$-x dt \beta (\eta + \varrho) = d\varrho \beta (\eta + \varrho) \text{ seu } d\varrho = -x dt$$

$$\text{et } d\varphi = -dt (y \cos (\eta + \varrho) + z \beta (\eta + \varrho)).$$

Ponatur  $y = u \cos (\eta + \varrho)$  et  $z = u \beta (\eta + \varrho)$ , ac pro<sup>1</sup> dt scribatur =

$$\frac{d\varrho}{u}, \text{ seu } x = \frac{-d\varrho}{ds}, \text{ quo facto nostrae aequationes erunt}$$

$$\text{I. } \frac{\Pi}{M} = 1 + \frac{fdd \cos \varrho}{2gdt^2}$$

$$\text{II. } -aadd\varrho + \frac{1}{2}(cc - bb) u m d\varrho^2 \beta^2 (\eta + \varrho) + \frac{2\Pi}{M} f g d\varrho^2 \beta \varrho = 0$$

III 2

III. bb



$$\text{III. } b b d u \cos(\eta + \varphi) - (a a + b b - c c) u d \varphi \sin(\eta + \varphi) = \frac{-2\pi}{M} \int g s d t \sin(\eta + \varphi)$$

$$\text{IV. } c c d u \sin(\eta + \varphi) + (a a - b b + c c) u d \varphi \cos(\eta + \varphi) = \frac{2\pi}{M} \int g s d t \cos(\eta + \varphi)$$

$$\text{et V. } d\Phi = -u d t.$$

Ex tertia et quarta eliminando  $s$  nanciscimur,

$$b b d u \cos(\eta + \varphi)^2 + c c d u \sin(\eta + \varphi)^2 - 2(b b - c c) u d \varphi \sin(\eta + \varphi) \cos(\eta + \varphi) = 0$$

cujus integrale est

$$u = \frac{C}{b b + c c + (b b - c c) \cos(2\eta + 2\varphi)}$$

qui valor in II substitutus praebet

$$-2a a d d \varphi + \frac{C C (c c - b b) d t^2 \sin 2(\eta + \varphi)}{(b b + c c + (b b - c c) \cos 2(\eta + \varphi))^2} + d t^2 \sin \varphi (4 f g + \frac{2 f f d d \cos \varphi}{d t^2}) = 0$$

quae aequatio per  $d \varphi$  multiplicata et integrata dat,

$$-a a d \varphi^2 - \frac{\frac{1}{2} C C d t^2}{b b + c c + (b b - c c) \cos 2(\eta + \varphi)} - 4 f g d t^2 \cos \varphi - f f d \varphi^2 \sin^2 \varphi + D d t^2 = 0$$

$$\text{seu } d \varphi^2 (a a + f f \sin^2 \varphi) = d t^2 (D - 4 f g \cos \varphi - \frac{\frac{1}{2} C C}{b b + c c + (b b - c c) \cos 2(\eta + \varphi)})$$

unde fit

$$d t = \frac{d \varphi \sqrt{(a a + f f \sin^2 \varphi) (b b + c c + (b b - c c) \cos 2(\eta + \varphi))}}{\sqrt{(D - 4 f g \cos \varphi) (b b + c c + (b b - c c) \cos 2(\eta + \varphi)) - \frac{1}{2} C C}}$$

Nunc dato tempore  $t$  per  $\varphi$ , pariter ac  $u$ , inde colligimus pressionem  $\pi$  porroque intervallum  $s$  ex hac aequatione

$$\frac{2\pi}{M} g s d t = (c c - b b) d u \sin(\eta + \varphi) \cos(\eta + \varphi) + a a u d \varphi + (c c - b b) u d \varphi \cos 2(\eta + \varphi).$$

Tum vero obtinemus  $x = \frac{-d \varphi}{d t}$ ;  $\eta = u \cos(\eta + \varphi)$  et  $z = u \sin(\eta + \varphi)$   
 ac denique  $\Phi = -\int u d t.$

CO-

COROLL. 1.

941. Si initio punctum L fuerit in D ut fit  $ZD = r$ , ibique quieverit, posito  $t = 0$  erat  $u = 0$ ,  $\frac{d\varphi}{dt} = 0$ , ob  $z = 0$ ; ideoque constantes ita definiri oportet, ut fit  $C = 0$ ; et  $D = 4fg \cos r$ : unde fit  $dt = d\varphi r \frac{aa + fff\varphi^2}{4fg(\cos r - \cos \varphi)}$ , sicque  $\varphi > r$ . Porro est  $u = 0$ , hinc  $\varphi = 0$ , et  $s = 0$ ; pressio autem  $\Pi$  hinc facile innotescit, et cum  $\varphi$  ad  $90^\circ$  augeri possit, corpus quasi procumbet. Hic ergo motus neque a positione axium principalium IB et IC, neque a radio basium cylindri  $\epsilon$  pendet.

COROLL. 2.

942. Si initio recta IL fuerit verticalis seu  $\varphi = 0$ , et corpus circa eam gyron coeperit celeritate angulari  $\epsilon$  in sensum AB, ut fuerit O in L, ideoque  $\alpha = 90^\circ$ ,  $\zeta = \eta$  et  $\gamma = 90^\circ - \eta$ : initio erat  $x = \frac{-d\varphi}{dt} = 0$ ,  $y = s \cos \eta$  et  $z = s \sin \eta$ . Hinc fiunt constantes  $C = s(bb + cc + (bb - cc) \cos 2\eta)$  et  $D = 4fg + \frac{1}{2}ss(bb + cc + (bb - cc) \cos 2\eta)$ : unde colligitur  $u = \frac{s(bb + cc + (bb - cc) \cos 2\eta)}{bb + cc + (bb - cc) \cos 2\eta(\eta + \varphi)}$  atque  $\frac{d\varphi^2(aa + fff\varphi^2)}{dt^2} = 4fg(1 - \cos \varphi) + \frac{\frac{1}{2}ss(bb - cc)(bb + cc + (bb - cc) \cos 2\eta)(\cos 2(\eta + \varphi) - \cos 2\eta)}{bb + cc + (bb - cc) \cos 2(\eta + \varphi)}$ .

COROLL. 3.

943. Si esset  $bb = cc$ , fieret  $dt = d\varphi r \frac{aa + fff\varphi^2}{4fg(1 - \cos \varphi)}$ , et recta IL perpetuo maneret verticalis: corpusque circa eam uniformiter gyron pergeret: cum enim denominator contineat  $r(1 - \cos \varphi) = r\frac{1}{2}\varphi^2$  nonnisi tempore elapso infinito arcus  $\varphi$  finitus evaderet: quod idem evenit, si fuerit vel  $\eta = 0$ , vel  $\theta = 0$ , hoc est si recta IL fuerit axis principalis.

SCHOLIUM.

944. Nisi axis longitudinalis simul fit axis principalis corporis, ob multitudinem literarum vix patet, quomodo formulae supra

rutac generaliter evolvi queant, quod tamen inferius suscipiemus. Verum si huiusmodi corporum cylindricorum tantum motus quasi infinite parvos consideremus, ad quod necesse est, ut in recta centrali LF (fig. 118.) centrum inertiae I infra centrum circuli G cadat, corpusque infinite parvum de statu quietis deturbetur, oscillationes vel vacillationes minimae orientur, quarum indolem ex formulis nostris generalibus determinare licebit. Hic non opus est, ut totum corpus sit cylindricum, sed sufficit, si ejus termini circa M et N sint cylindrici, quibus super planis horizontalibus firmis P et Q sustentetur, quin etiam sufficit, si tantum circa contactum utriusque termini figura fuerit cylindrica, siquidem motus tantum admittimus infinite parvos. Deinde inter sustentacula P et Q annexum esse potest corpus pendulum quodcunque FMH, ut oriatur pendulum non circa axem fixum linearem, sed circa terminos cylindricos planis horizontalibus incumbentes mobile, cujus motum oscillatorium definiiri oporteat. In tali ergo pendulo primo notetur ejus centrum inertiae I, per quod ducatur recta *mn* axi geometrico cylindri MN parallela, quae est axis longitudinalis jugiter manens horizontalis. Ducatur porro ex I ad MN recta perpendicularis IGL, quae si fuerit verticalis, corpus in quiete versabitur: ac si intervallum GI ponamus =  $f$ , in superioribus formulis litteram  $f$  negative sumere debemus. Tum pro figura cylindrica terminorum sit radius basis =  $e$ , qui autem, ut vidimus, prorsus non in computum ingreditur, ita ut perinde sit sive termini sint crassiores sive graciliores. Quod si recta IG =  $f$  minor fuerit, quam GF =  $e$ , totumque corpus supra sustentacula P et Q versetur, motus prodit similis ei, quo cunae agitari solent. Quicquid autem sit centrum inertiae I, perpetuo in eadem recta verticali manebit, unde tota investigatio ad motum gyratorium definiendum perducitur, in quo centrum inertiae I ut quiescens consideramus.

## P R O B L E M A. 115.

945. Si corpus, quod basibus cylindricis super planis horizontalibus incumbit, infinite parvum de situ quietis deturbetur, eique forte simul motus infinite parvus imprimatur, determinare motum vacillatorium, quo agitabitur.

## S O L U T I O.

Fig. 121. In formulis nostris generalibus primo intervallum GI =  $f$  negativum statnatur: deinde arcus ZL =  $e$ , quo recta centralis LGI a situ verticali declinat, ut infinite parvus spectari debet, perinde atque celestas

ritas angularis  $\alpha$ : unde quantitates  $x = r \cos \alpha$ ,  $y = r \cos \beta$ ,  $z = r \cos \gamma$ , ut evanescentes tractari debent. Quomocunque ergo axes principales IA, IB, IC respectu rectae centralis GI et axis longitudinalis  $mn$  fuerint dispositi, quorum situs cum arcubus  $LA = \zeta$ ,  $LB = \eta$ ,  $LC = \theta$ , tum angulis  $ZLA = f$ ,  $ZLB = g$ ,  $ZLC = h$  definitur, primo habebimus  $\sin \varphi = e$ ,  $\cos \varphi = 1$ , deinde producta  $xy$ ,  $xz$  et  $yz$  omitti poterunt; unde fiet  $\cos l = \cos \zeta$ ,  $\cos m = \cos \eta$  et  $\cos n = \cos \theta$ ; et

aequationes solutionem continentes ex probl. 113. ob  $\frac{\pi}{M} = 1 - \frac{fdd.\cos e}{2gdt^2}$   
 = 1 erunt:

$$I. aadx = 2fg e dt \sin f \sin \zeta + 2gs dt \cos f \sin \zeta$$

$$II. bbdy = 2fg e dt \sin g \sin \eta + 2gs dt \cos g \sin \eta$$

$$III. cc dz = 2fg e dt \sin h \sin \theta + 2gs dt \cos h \sin \theta$$

unde ex §. 938. haec integralis est derivata

$$aaxx + bbyy + cczz = C - 2fg e e - \frac{ff e e d e^2}{dt^2}$$

ob  $\cos \varphi = 1 - \frac{1}{2} e e$ , quia hic infinite parvum  $e e$  negligere non licet; Deinde habemus:

$$IV. y \cos \theta - z \cos \eta = - \frac{de}{dt} \cos f \sin \zeta$$

$$V. x \cos \zeta - x \cos \theta = - \frac{de}{dt} \cos g \sin \eta$$

$$VI. x \cos \eta - y \cos \zeta = - \frac{de}{dt} \cos h \sin \theta$$

atque ex §. 936. et 937.

$$de = - dt (x \sin f \sin \zeta + y \sin g \sin \eta + z \sin h \sin \theta)$$

$$d\varphi = - dt (x \cos \zeta + y \cos \eta + z \cos \theta).$$

Cum nunc sit IV.  $x + V. y + VI. z = 0$ , erit

$$x \cos f \sin \zeta + y \cos g \sin \eta + z \cos h \sin \theta = 0.$$

Deinde ex n°. I. II. III. in subsidium vocando formulas n°. I. et II. ex

§. 934. colligimus

$$aax \cos \zeta + bb y \cos \eta + cc z \cos \theta = A.$$

et pro intervallo  $s$  determinando

$$aadx \cos f \sin \zeta + bbdy \cos g \sin \eta + cc dz \cos h \sin \theta = 2gs ds.$$

Statuamus  $de = - u ds$  et  $d\varphi = - v ds$ , atque ob  $x \cos f \sin \zeta + y \cos g \sin \eta + z \cos h \sin \theta = 0$  consequimur

$$x = 0$$

$$x = u \sin \zeta \cos \zeta + v \cos \zeta; \quad y = u \sin \eta \cos \eta + v \cos \eta; \quad z = u \sin \theta \cos \theta + v \cos \theta \text{ hincque}$$

$$A = u (aa \sin \zeta \cos \zeta + bb \sin \eta \cos \eta + cc \sin \theta \cos \theta) + v (aa \cos \zeta + bb \cos \eta + cc \cos \theta).$$

Ponamus ad abbreviandum

$$\left. \begin{aligned} bb \cos \eta \cos \theta - cc \cos \eta \cos \theta &= \mathcal{A} \\ cc \cos \zeta \cos \theta - aa \cos \zeta \cos \theta &= \mathcal{B} \\ aa \cos \zeta \cos \eta - bb \cos \zeta \cos \eta &= \mathcal{C} \end{aligned} \right\} \text{eritque } \mathcal{A} \cos \zeta + \mathcal{B} \cos \eta + \mathcal{C} \cos \theta = 0$$

$$aa \cos^2 \zeta + bb \cos^2 \eta + cc \cos^2 \theta = \mathcal{D}; \quad aa \sin \zeta \cos \zeta + bb \sin \eta \cos \eta + cc \sin \theta \cos \theta = \mathcal{E}$$

et habebimus

$$v = \frac{A - \mathcal{E}u}{\mathcal{D}}$$

$$x = \frac{A \cos \zeta + \mathcal{A}u}{\mathcal{D}}; \quad y = \frac{A \cos \eta + \mathcal{B}u}{\mathcal{D}}; \quad z = \frac{A \cos \theta + \mathcal{C}u}{\mathcal{D}}$$

qui valores, in aequatione integrali vim vivam complectente substituti, ob

$$\frac{d\epsilon}{dt} = -u \text{ dabunt:}$$

$$\frac{AAD + 2Au(\mathcal{A}a^2 \cos \zeta + \mathcal{B}b^2 \cos \eta + \mathcal{C}c^2 \cos \theta) + uu(\mathcal{A}^2 a^2 + \mathcal{B}^2 b^2 + \mathcal{C}^2 c^2)}{\mathcal{D}\mathcal{D}} = C - 2fg\epsilon\epsilon - f\epsilon\epsilon u$$

quae aequatio ob  $\mathcal{A}aa \cos \zeta + \mathcal{B}bb \cos \eta + \mathcal{C}cc \cos \theta = 0$  abit in hanc

$$AAD + (\mathcal{A}^2 a^2 + \mathcal{B}^2 b^2 + \mathcal{C}^2 c^2) uu = C\mathcal{D}\mathcal{D} - 2\mathcal{D}\mathcal{D}fg\epsilon\epsilon - \mathcal{D}\mathcal{D}ff\epsilon\epsilon u$$

ubi si loco  $C\mathcal{D}\mathcal{D} - AAD$  ponatur  $B\mathcal{D}\mathcal{D}$ , fiet

$$u = \frac{\mathcal{D}r(B - 2fg\epsilon\epsilon)}{r(\mathcal{A}^2 a^2 + \mathcal{B}^2 b^2 + \mathcal{C}^2 c^2 + \mathcal{D}\mathcal{D}ff\epsilon\epsilon)}$$

Statuamus porro  $\mathcal{A}^2 a^2 + \mathcal{B}^2 b^2 + \mathcal{C}^2 c^2 = \mathcal{D}\mathcal{D}h$ , et rejecto termino infinite parvo  $\mathcal{D}\mathcal{D}ff\epsilon\epsilon$  habebimus

$$u = \frac{r(B - 2fg\epsilon\epsilon)}{h} \text{ et } dt = \frac{-h d\epsilon}{r(B - 2fg\epsilon\epsilon)}$$

unde colligimus  $t = \text{Const.} + \frac{h}{r^2 fg} \text{Arc. cos } \frac{r^2 fg}{rB}$ , seu

$$\epsilon = \frac{rB}{r^2 fg} \cos \frac{(t + \delta)r^2 fg}{h}, \text{ et } u = \frac{rB}{h} \sin \frac{(t + \delta)r^2 fg}{h}$$

turn

tum vero  $v = \frac{A}{D} - \frac{\mathfrak{F}rB}{D\mathfrak{H}} \int \frac{(t+d)r^2fg}{\mathfrak{H}}; \text{ hincque}$

$$\varphi = D - \frac{At}{D} - \frac{\mathfrak{F}rB}{D r^2fg} \cos \frac{(t+d)r^2fg}{\mathfrak{H}} = D - \frac{At}{D} - \frac{\mathfrak{F}\xi}{D}$$

Deinde reperiemus:

$$s = \frac{-rBf}{D\mathfrak{H}\mathfrak{H}r^2g} (aa\,bb\,\mathfrak{f}\mathfrak{h}\,\cos\mathfrak{f}\mathfrak{h}\,\theta^2 + aa\,cc\,\mathfrak{f}\mathfrak{g}\,\cos\mathfrak{f}\mathfrak{g}\,\eta^2 + \\ bb\,cc\,\mathfrak{f}\mathfrak{f}\,\cos\mathfrak{f}\mathfrak{f}\,\zeta^2) \cos \frac{(t+d)r^2fg}{\mathfrak{H}}.$$

Denique vero erit

$$xx + yy + zz = \frac{AA - 2A\mathfrak{F}u + (\mathfrak{H}\mathfrak{H} + \mathfrak{B}\mathfrak{B} + \mathfrak{C}\mathfrak{C})uu}{D\mathfrak{D}}$$

ficque omnia ad datum tempus sunt definita. Ceterum hic notasse juvat, esse  $\mathfrak{H}\mathfrak{H} + \mathfrak{B}\mathfrak{B} + \mathfrak{C}\mathfrak{C} = D\mathfrak{D} + \mathfrak{F}\mathfrak{F}$ , ita ut fit  $xx = vv + uu$ .

#### COROLL. 1.

946. Cum sit  $\xi = \frac{rB}{r^2fg} \cos \frac{(t+d)r^2fg}{\mathfrak{H}}$ ; patet arcum  $ZL = \xi$  seu declinationem rectae LI a situ verticali ad similitudinem penduli variari, hujusque lineae LI vacillationes isochronas fore oscillationibus penduli, cujus longitudo est  $= \frac{D\mathfrak{H}}{f}$ , quae longitudo est  $= \frac{\mathfrak{H}^2 aa + D^2 bb + \mathfrak{C}^2 cc}{D\mathfrak{D}f}$ .

#### COROLL. 2.

947. Deinde cum sit  $\varphi = D - \frac{At}{D} - \frac{\mathfrak{F}\xi}{D}$ , punctum L motu medio revolvitur circa verticem Z celeritate angulari  $= \frac{A}{D}$ ; verum locus medius corrigi debet particula  $\frac{\mathfrak{F}\xi}{D}$ . Sin autem sit constans  $A = 0$ , angulus DZL parumper mutatur, nisi sit  $\mathfrak{F} = 0$ .

#### COROLL. 3.

948. Si ergo revolutiones corporis circa axem verticalem IZ excludantur, ut sit  $A = 0$ , atque initio fuerit  $\varphi = 0$ ;  $\xi = r$   
 $\mathfrak{K}\mathfrak{K}\mathfrak{K}$ 
 $\mathfrak{C}\mathfrak{F}$

442 CAPUT XIX. DE MOTU CORPORUM

et celeritas angularis  $\omega = s$ , constantes ita definiuntur, ut fit

$$D = \frac{\partial r}{\partial t}; \quad r = \frac{rB}{r^{2fg}} \cos \frac{\partial r^{2fg}}{\partial t} \quad \text{et} \quad \omega = \frac{(DD + \partial\partial)B}{DD\partial\partial} \left( \frac{\partial r^{2fg}}{\partial t} \right)^2$$

$$\text{Ergo } rB = \frac{r r^{2fg}}{\cos \frac{\partial r^{2fg}}{\partial t}} = \frac{\partial\partial}{\frac{\partial r^{2fg}}{\partial t} r (DD + \partial\partial)}, \quad \text{ideoque}$$

$$\tan \frac{\partial r^{2fg}}{\partial t} = \frac{\partial\partial}{r r^{2fg} (DD + \partial\partial)}, \quad \text{unde et constans } B \text{ innotescit.}$$

Sin autem fuerit  $s = 0$ ; prodit  $rB = r r^{2fg}$ , et  $\partial = 0$ .

EXEMPLUM.

Fig. 123. 949. Ponamus rectam IM, quae per centrum inertiae I axi geometrico cylindri (MN fig. 124.) parallela ducitur, simul esse corporis axem principalem, et habebimus uti §. 940.  $f = 90^\circ$ ,  $g = 180^\circ$ ,  $h = 0$  et  $\zeta = 90^\circ$ , atque  $\vartheta = 90^\circ - \eta$ . Hinc autem colligimus:

$A = bb \cos \eta^2 + cc \sin \eta^2$ ;  $B = 0$ ;  $C = 0$ ;  $D = A$  et  $\partial = 0$  ergo  $\omega = \partial\partial$ : unde longitudo penduli simplicis isochroni fit  $\frac{aa}{f}$ . Tum vero axis IA horizontalis manebit immotus. Ac si initio,

ubi  $\xi = r$ , corpus motum a quiete inceperit, erit  $\partial = 0$ , et  $rB = r r^{2fg}$ : ex quibus reliquae quantitates variables colliguntur,

$$\xi = r \cos \frac{r r^{2fg}}{a}; \quad u = \frac{r r^{2fg}}{a} \sin \frac{r r^{2fg}}{a}; \quad v = 0; \quad \text{ob } A = 0$$

$$\text{et } x = u = \frac{r r^{2fg}}{a} \sin \frac{r r^{2fg}}{a}; \quad y = 0 \text{ et } z = 0, \text{ atque } s = x.$$

Fig. 124: Revera autem adjuncto motu progressivo centrum inertiae I in recta verticali alternatim ascendet ac descendet, cylindro superiore MN hunc motum sequente, dum super planis P et Q liberrime incedere potest, neque a frictione impediri assumitur.

SCHOLIUM.

950. Quia magnitudo cylindri MN in computum non ingreditur, eadem solutio valebit, si ejus crassities evanescat, corpusque annexum ab axe lineari esset suspensum. Ex quo hic motus convenire debere videtur cum motu oscillatorio supra definito, quod tamen longe aliter usu venit; quoniam pro motu oscillatorio vero longitudo penduli simplicis isochroni prodit  $= f + \frac{aa}{f} = \frac{aa + f^2}{f}$ , cum hic motum sit  $\frac{aa}{f}$ .

Causa

Causa hujus discriminis in eo est sita, quod supra in doctrina oscillationum axem MN fixum assumimus, dum hic liberrime mobilis statuitur. Hinc patet, ob libertatem axis, etsi plano horizontali incumbat, oscillationes multo promptiores fieri, quam si axis in eodem loco firmiter detineretur. Atque hoc etiam Theoriae omnino est conforme, si enim (fig. 118.) circulus PMTN planum semper in eodem puncto T tangere debeat, praeter pressionem  $\Pi$  vis quaedam horizontalis in calculum introduci debet, quae si ponatur =  $\Theta$  secundum THurgens, ut pun-

ctum T maneat constans, ob  $TP = f\theta$  esse oportet  $\frac{fdd\theta^2}{dt^2} =$

$\frac{-2\Theta g}{M}$  Ex hac autem vi quoque nascitur momentum respectu axium

principalium, quae propterea motus gyratorius afficitur, ut talis prodeat, qualem supra in motus oscillatorii investigatione determinavimus. Ceterum hic probe notasse juvabit, si axiculi penduli planis horizontalibus politissimis incumbant, motum oscillatorium plurimum discrepare posse ab eo, qui oriretur, si firmiter detinerentur, et multo quidem promptiorem esse futurum. Minima autem frictio, hoc discrimen tollere, motumque ad oscillationum legem reducere valebit. Hujus autem problematis solutio nos ad solutionem problematis generalis n°. 113. manuducet.

#### PROBLEMA. 116.

951. Si corpus cylindricum quodcunque super plano horizontali moveatur utcunque, aequationes supra inventas, quibus ejus motus definitur, resolvere atque ad integrationem perducere.

#### SOLUTIO.

Maneant hic omnia, uti supra in problemate 113. sunt constituta, atque in recta centrali LIGF sumamus ut ibi centrum inertiae I a puncto F magis remotum, quam centrum sectionis cylindri G, ponendo intervallum  $GI = f$ . Ex aequationibus igitur differentialibus ibi exhibitis jam unam aequationem integralem eruimus, quae est:

Fig. 121.

$$aaxx + bbyy + cczz = C - afg \cos \varphi - \frac{ff d\varphi^2 f \varphi^2}{dt^2}$$

Praeterea vero ternae priores aequationes ope ternarum posteriorum in postremis terminis applicatarum abeunt in has formas

$$Kkk \ a$$

$$L \ aad\varphi$$



444 CAPUT XIX. DE MOTU CORPORUM

$$I. aadx + (cc - bb) yzdt = \frac{-2\pi fg}{M} \cdot dt \, \zeta \, \eta \, \theta \, \epsilon - \frac{2\pi gs}{M} \cdot \frac{dt \, dl \, \zeta l}{d\epsilon}$$

$$II. bbdy + (aa - cc) xzdt = \frac{-2\pi fg}{M} \cdot dt \, \zeta \, g \, \eta \, \theta \, \epsilon - \frac{2\pi gs}{M} \cdot \frac{dt \, dm \, \zeta m}{d\epsilon}$$

$$III. ccdz + (bb - aa) xydt = \frac{-2\pi fg}{M} \cdot dt \, \zeta \, h \, \eta \, \theta \, \epsilon - \frac{2\pi gs}{M} \cdot \frac{dt \, dn \, \zeta n}{d\epsilon}$$

Hinc jam colligatur forma I.  $\cos l$  + II.  $\cos m$  + III.  $\cos n$ , et quia  $dl \, \zeta l \, \cos l + dm \, \zeta m \, \cos m + dn \, \zeta n \, \cos n = 0$ , termini ultimi interval-  
lum  $s$  involventes se destruent: tum vero etiam per relationes §. 934.  
traditas reperitur

$$\zeta \, \zeta \, \zeta \, \cos l + \zeta \, g \, \zeta \, \eta \, \cos m + \zeta \, h \, \zeta \, \theta \, \cos n = 0$$

ita ut quoque penultimi tollantur. Quocirca pervenimus, ad hanc  
aequationem.

$$aadx \cos l + bbdy \cos m + ccdz \cos n + aaxzdt \cos m + bbxydt \cos n + ccyzdt \cos l = 0$$

$$- aaxydt \cos n - bbyzdt \cos l - ccxzdt \cos m,$$

at ex ternis posterioribus est

$$x \cos m - y \cos n = \frac{-dl \, \zeta l}{dt}; \quad x \cos n - z \cos l = \frac{-dm \, \zeta m}{dt}; \quad y \cos l - x \cos m$$

$$= \frac{-dn \, \zeta n}{dt}$$

quibus valoribus substitutis obtinemus

$$aadx \cos l + bbdy \cos m + ccdz \cos n - aax \, dl \, \zeta l - bby \, dm \, \zeta m - ccz \, dn \, \zeta n = 0$$

eius integralis est

$$aax \cos l + bby \cos m + ccz \cos n = D.$$

Deinde loco  $x$ ,  $y$  et  $z$  introducamus novas variables hinc definiendas

$$x \cos \zeta + y \cos \eta + z \cos \theta = p$$

$$x \cos \zeta \, \zeta + y \cos g \, \zeta \, \eta + z \cos h \, \zeta \, \theta = q$$

$$x \zeta \, \zeta \, \zeta + y \zeta \, g \, \zeta \, \eta + z \zeta \, h \, \zeta \, \theta = r$$

eritque primo  $d\epsilon = -r \, dt$ ; porro ob  $x \cos l + y \cos m + z \cos n = p$   
 $\cos \epsilon + q \, \zeta \, \epsilon$ ; erit  $d\Phi = -dt (p \cos \epsilon + q \, \zeta \, \epsilon)$ . Praeterea ob  $x \, dl \, \zeta l$   
 $+ y \, dm \, \zeta m + z \, dn \, \zeta n = 0$ , fit,  $p \, \zeta \, \epsilon - q \, \cos \epsilon = 0$ . Quam ob rem  
ponamus

$$p = u \cos \epsilon \text{ et } q = u \sin \epsilon \text{ eritque } d\Phi = -u \, dt \text{ et } d\epsilon = -r \, dt,$$

at ex illis aequationibus assumtis elicimus

$$x = r \, \zeta \, \zeta \, \zeta + u \cos l; \quad y = r \, \zeta \, g \, \zeta \, \eta + u \cos m; \quad z = r \, \zeta \, h \, \zeta \, \theta + u \cos n$$

$$\text{hincque } xx + yy + zz = rr + uu = uu.$$

Nunc aequatio integralis modo ante inventa praebet

$$D = r$$

$$D = r (aa \, \text{fi} \, \text{fi} \, \zeta \cos l + bb \, \text{fi} \, \text{g} \, \text{fi} \, \eta \cos m + cc \, \text{fi} \, \text{h} \, \text{fi} \, \theta \cos n) \\ + u (aa \cos l^2 + bb \cos m^2 + cc \cos n^2)$$

qua  $u$  determinatur per  $r$  et  $\varrho$ ; ideoque et  $x, y, z$ . Denique aequatio integralis primum inventa

$$aaxx + bbyy + cczz = C - 4fg \cos \varrho - ffrr \, \text{fi} \, \varrho^2$$

quia tantum  $r$  et  $\varrho$  continet, determinabit  $\varrho$  per  $\varrho$ , indeque aequatio

$dt = \frac{-d\varrho}{r}$  pro dato tempore  $t$  omnes quantitates motum continentes manifestabit.

Quodsi ad abbreviandum ponantur constantes:

$$aa \cos \zeta^2 + bb \cos \eta^2 + cc \cos \theta^2 = \mathcal{A}$$

$$aa \cos \text{fi} \, \zeta \cos \zeta + bb \cos \text{g} \, \text{fi} \, \eta \cos \eta + cc \cos \text{h} \, \text{fi} \, \theta \cos \theta = \mathcal{B}$$

$$aa \cos \text{fi}^2 \, \zeta^2 + bb \cos \text{g}^2 \, \eta^2 + cc \cos \text{h}^2 \, \theta^2 = \mathcal{C}$$

$$aa \, \text{fi} \, \text{fi} \, \zeta \cos \zeta + bb \, \text{fi} \, \text{g} \, \text{fi} \, \eta \cos \eta + cc \, \text{fi} \, \text{h} \, \text{fi} \, \theta \cos \theta = \mathcal{D}$$

$$aa \, \text{fi} \, \text{fi} \, \cos \text{fi} \, \zeta^2 + bb \, \text{fi} \, \text{g} \, \cos \text{g} \, \eta^2 + cc \, \text{fi} \, \text{h} \, \cos \text{h} \, \theta^2 = \mathcal{E}$$

$$aa \, \text{fi} \, \text{fi}^2 \, \zeta^2 + bb \, \text{fi} \, \text{g}^2 \, \eta^2 + cc \, \text{fi} \, \text{h}^2 \, \theta^2 = \mathcal{F}$$

nostrae aequationes integrales erunt

$$D = r (\mathcal{D} \cos \varrho + \mathcal{E} \text{fi} \, \varrho) + u (\mathcal{A} \cos \varrho^2 + 2 \mathcal{B} \text{fi} \, \varrho \cos \varrho + \mathcal{C} \text{fi} \, \varrho^2)$$

$$C - 4fg \cos \varrho - ffrr \, \text{fi} \, \varrho^2 = \mathcal{F}rr + 2ru (\mathcal{D} \cos \varrho + \mathcal{E} \text{fi} \, \varrho) \\ + uu (\mathcal{A} \cos \varrho^2 + 2 \mathcal{B} \text{fi} \, \varrho \cos \varrho + \mathcal{C} \text{fi} \, \varrho^2)$$

ex quibus concluditur

$$r = \frac{DD - (\mathcal{A} \cos \varrho^2 + 2 \mathcal{B} \text{fi} \, \varrho \cos \varrho + \mathcal{C} \text{fi} \, \varrho^2)(C - 4fg \cos \varrho)}{(\mathcal{D} \cos \varrho + \mathcal{E} \text{fi} \, \varrho)^2 - (\mathcal{A} \cos \varrho^2 + 2 \mathcal{B} \text{fi} \, \varrho \cos \varrho + \mathcal{C} \text{fi} \, \varrho^2)(\mathcal{F} + ff \text{fi} \, \varrho^2)}$$

Hinc pro tempore adipiscimur  $t = \int \frac{-d\varrho}{r}$ , et cum sit  $u =$

$$\frac{D - r (\mathcal{D} \cos \varrho + \mathcal{E} \text{fi} \, \varrho)}{\mathcal{A} \cos \varrho^2 + 2 \mathcal{B} \text{fi} \, \varrho \cos \varrho + \mathcal{C} \text{fi} \, \varrho^2}, \text{ erit angulus } \varphi = - \int u dt = \int \frac{u d\varrho}{r}.$$

Cum autem ad quodvis tempus  $t$  tam arcum  $\varrho$  quam angulum  $\varphi$  determinaverimus, totus motus erit perfecte cognitus.

### COROLL. I.

952. Quantitates ergo  $\mathcal{A}$ ,  $\mathcal{C}$ , et  $\mathcal{F}$  necessario sunt positivae, et  $\mathcal{B}$  ad  $\mathcal{A}$  et  $\mathcal{C}$  ad  $\mathcal{A}$  et  $\mathcal{C}$  ita refertur, ut sit

$$\mathcal{A}\mathcal{C} - \mathcal{B}\mathcal{B} = aabb \, \text{fi} \, \text{h}^2 \, \text{fi} \, \theta^2 + aacc \, \text{fi} \, \text{g}^2 \, \text{fi} \, \eta^2 + bbcc \, \text{fi} \, \text{fi}^2 \, \zeta^2$$

unde patet, formam  $\mathcal{A} \cos \varrho^2 + 2 \mathcal{B} \text{fi} \, \varrho \cos \varrho + \mathcal{C} \text{fi} \, \varrho^2$  in duos factores simplices resolveri non posse,

Kkk 3

CO

## COROLL. 2.

953. Ex hac solutione generali casus in præcedente problemate evolutus facile deducitur, sumendo  $f$  negative, et arcum  $g$  infinite parvum, unde fit

$$rr = \frac{DD - AC - 4Afg \cos g}{DD - A\mathfrak{F}} = \frac{\text{Const.} + 4Afg \cos g}{Af - DD}$$

Reperitur autem valoribus evolutis

$$A\mathfrak{F} - DD = aabb \cos \zeta^2 \sin^2 \theta^2 + aacc \cos \zeta^2 \sin^2 \eta^2 + bbcc \cos^2 \zeta^2 \sin^2 \zeta^2$$

unde longitudo penduli simplicis isochroni simplicius quam supra ita exhibetur, ut sit =

$$\frac{aabb \cos \zeta^2 \sin^2 \theta^2 + aacc \cos \zeta^2 \sin^2 \eta^2 + bbcc \cos^2 \zeta^2 \sin^2 \zeta^2}{f(aa \cos \zeta^2 + bb \cos \eta^2 + cc \cos \theta^2)}$$

## SCHOLION.

954. His de motu corporum cylindricorum super plano horizontali expeditis, institueram pauca de motu super plano inclinato adjungere: verum si motus fuerit simplex, res nullam habet difficultatem, si autem sit complicatus, in calculos incommodos incideremus. Quare cum in praxi frictionem ab his motibus separare hand liceat, motus saltem simpliciores super plano inclinato ita pertractabimus, ut simul frictionis rationem habeamus, ex quo peculiarem tractatum de motu corporum rigidorum a frictione perturbato adjungi conveniet.



SUP-

**SUPPLEMENTUM**  
**DE**  
**MOTU CORPORUM**  
**RIGIDORUM A FRICTIONE**  
**PERTURBATO.**

NOV 1 1955

MUSEUM OF THE


AMERICAN INDIAN

WASHINGTON, D. C.

# CAPUT I.

## DE FRICTIONE IN GENERE.

### DEFINITIO.

955.  *Frictio* est resistentia, quam corpus super superficie aspera incedens eamque radens, in motu suo patitur. Est ergo frictio vis motus directioni contraria, et basi corporis, qua superficiem tangit, applicata

### COROLL. 1.

956. Quamdiu corpus quiescit, frictio nullam plane vim exerit, statim autem atque corpus movetur, subito ejus vis existit motui semper contraria eumque propterea retardans.

### COROLL. 2.

957. Si corpus a vi quapiam sollicitetur, etiamsi quiescat, frictio se illi vi opponit, quoniam in prima motus generatione statim existit, ac nisi vis sollicitans frictionem superet, corpus movere non valebit.

### COROLL. 3.

958. Quia directio frictionis motus directioni jugiter est contraria, mutata motus directione simul frictionis directio mutatur. Statim autem atque corpus ad quietem redigitur, uti motus directio tollitur, ita subito frictio evanescit.

### EXPLICATIO.

959. Ad haec, quae ad frictionem pertinent, dilucidanda, ad omnes circumstantias, quae ad frictionem quicquam conferre posse videantur, attendi conveniet, etsi adhuc minime pateat, quid quisque efficere valeat. Primo igitur superficies, super qua fit incessus, considerari debet, quae sive sit plana sive secus parum refert, quoniam  
LII quovis

**Fig. 125.** quovis tempore ad contactum est respiciendum. Sit igitur EF superficies, quam tanquam planam contemplemur, siquidem hinc facile ad superficies convexas et concavas iudicium extendere licebit: hujus ergo asperitas praecipuum locum inter causas frictionis tenet, quoniam si superficies perfecte esset polita et laevigata, frictioni nullus locus relinqueretur: ex quo colligitur, quo magis superficies fuerit aspera, eo majorem frictionem fieri oportere. Deinde balis corporis AB, qua fit contactus, in computum est ducenda, cujus magnitudo et figura an quicquam ad frictionem conferat, nondum liquet, asperitas vero certe cum asperitate superficiei conjuncta, ubi imprimis motui est obstaculo, ita frictionem generare est putanda. Circa ipsum denique corpus ABCD praeter ejus massam reliquasque proprietates, ejus pressio ad superficiem sine dubio maximi est momenti, quoniam si nulla vi ad eam apprimeretur, nulla certe frictio adesset, corpusque perinde moveretur, ac si superficies abesset. Cum tandem frictio non nisi in motu cernatur, celeritas quoque tanquam insigne frictionis momentum videri posset, sed praeter expectationem videbimus, celeritatem nullo modo ad frictionem determinandam concurrere, quod eo magis est mirandum, cum sublata celeritate omnis frictio certe cesset. Quod si ergo corpus secundum directionem BF super superficie promoveatur, vis aderit, qua id secundum directionem oppositam AE sollicitatur, haecque vis frictio vocatur.

#### SCHOLION.

960. Frictionem hic primo tanquam phaenomenon considerabo, cujus quantitas et indoles nobis experientia innotuerit, deinceps in ejus causas, quantum fieri licet, inquisiturus. Cum enim hic physicae corporum qualitates, cujusmodi sunt asperitates superficierum, et ratio, qua duae superficies invicem appressae sibi mutuo cedant, et minimis particulis quasdam impressiones inducant, totum quasi negotium conficiant; ob defectum talis cognitionis corporum contenti esse debemus phaenomena frictionis ita accipere, prouti ea nobis ab experientia suppeditantur, quemadmodum etiam aliarum virium, quarum effectus in Mechanica evolvimus, origo minime est perspecta. Quae ergo per experientiam nobis circa frictionis indolem innotuerunt, breviter recenseamus.

#### PHAENOMENON. 1.

961. *Si cetera sint paria, frictio non pendet a corporis celeritate, sed sive id celerius incedat sive tardius, eandem exerit vim, cujus directio semper est contraria motus directioni.*

CO-

## COROLL. 1.

962. Frictio ergo non tanquam functio quaedam celeritatis spectari potest, cum perpetuo eandem quantitatem fervet, sive motus sit celerrimus, sive tardissimus. Interim tamen, motu penitus cessante, subito evanescit.

## COROLL. 2.

963. Etsi autem frictio a motus celeritate neutiquam pendet, tamen ejus directio per motus directionem unice determinatur, quippe cui est contraria et in ipso contactu applicata.

## SCHOLION.

964. De motu corporis absoluto haec sunt intelligenda, si superficies, in qua corpus incedit, absolute quiescat, sin autem haec superficies ipsa moveatur, ex motu corporis respectivo ad superficiem relato judicium est petendum. Scilicet si corpus respectu superficiei quiescat, etiamsi utcumque moveatur absolute, frictio est nulla, sin autem respectu superficiei moveatur, frictio eam impetrat quantitatem, quam reliquae circumstantiae exigunt, neque quantitas motus huc quicquam confert. Directio autem frictionis per directionem respectivam corporis respectu superficiei constanter determinatur: neque igitur hic motum secundum duas tresve directiones resolvere licet, et pro quolibet, quasi solus adesset, frictionem definire, indeque frictionem totam colligere: sed uti quantitas frictionis non a motus quantitate pendet, ita directio semper ex directione, secundum quam corpus super superficie incedit, definiri debet. Ceterum hoc phaenomenon non ita accurate per experimenta indicatur, ut nullis plane dubiis sit subjectum: quin potius motus celerrimi ab hac regula aliquantillum recedere videntur. Quod si forte veritati fuerit consentaneum, id potius alii causae tribuamus, quam stabilitam frictionis notionem immutemus: et cum aberratio sit valde parva, eam eo magis negligamus, cum alias nonnullas exiguas vires, quae ex eodem fonte atque frictio originem trahere videntur, negligere cogamur. Hic scilicet in eos tantum effectus, qui à frictione prouti vulgo concipi solet, inquirere constitui, de aliis motus obstaculis minime sollicitus.

## PHAENOMENON. 2.

965. Si cetera sunt paria, quantitas frictionis etiam neque a figura neque magnitudine basis, qua corpus superficiem contingit, pendet; sed si-



*ut ea fuerit major sive minor, et cujuscunque figurat, frictio eandem semper vim exerit.*

## COROLL. 1.

Fig. 125. 966. Quodsi ergo basis, qua corpus superficiem contingit, AB ponatur =  $bb$ , haec quantitas non in expressionem frictionis ingreditur, aequae parum ac velocitas corporis.

## COROLL. 2.

967. Neque etiam frictio mutatur, licet contactus in unico fiat puncto, quemadmodum evenit, si corpus sit globus seu corpus basi convexa praeditum: dummodo corpus superficiem radat.

## SCHOLION.

968. Hoc phaenomenon, etsi certissimis experimentis confirmatum, exceptionem tamen patitur, si corpus in acutissimam desinat cuspidem, qua superficiei infigi queat, quo casu sine dubio penitus coerceretur. Excipiendi scilicet hinc sunt casus, quibus superficies ab incedente corpore damnum patitur, de quibus etiam hic non tractabimur. Ceterum maxime paradoxon videbitur, quod a contactu in unico puncto facto tanta frictio nasci queat, quanta a basi satis vasta, cum frictio ab asperitate ambarum superficierum, quae se mutuo terunt producat, in ampliori autem contactu plus asperitatis superari debeat. Verum hoc dubium mox evanescet, cum ostendamus, quomodo frictio se ratione pressionis habere debeat.

## PHAENOMENON. 3.

969. Si cetera sint paria, frictio proportionalis est pressioni, qua corpus ad superficiem apprimitur: eoque majori pressionis parti aequatur, quo major fuerit asperitas superficierum se mutuo atterentium.

## COROLL. 1.

970. Quodsi corpus nulla plane vi ad superficiem, super qua incedit, apprimatur, nullam etiam patietur frictionem; quae autem eo major evadet, quo magis appressio augetur.

## COROLL. 2.

971. Si ergo asperitas fuerit eadem, frictio, quam corpora super superficieribus incedentia patiuntur, certae cuidam parti pressionis aequatur, qua parte cognita, frictionis quantitas perfecte determinatur.

CO-

## COROLL. 3.

972. Quodsi ergo corpus ABCD vi = P ad superficiem apprimatur, ac super ea incedat in directione BF, frictio erit =  $\delta P$  (denotante  $\delta$  partem illam memoratam) quæ corpus secundum directionem oppositam AE retrahitur. Fig. 125.

## SCHOLION. 1.

973. Hæc manifesta sunt, quando corpus motu progressivo incedit super superficie, quo casu frictio motus directioni est contraria. Verum si corpus insuper habeat motum quempiam gyratorum, videndum est, in quam directione basis superficiem terat, huicque erit contraria frictionis directio, cujus quantitas cum ex pressione constet, effectus frictionis in motu corporis perturbando ex principiis supra stabilitis definiri poterit. Ceterum quemadmodum frictio a solo attritu corporis et superficiæ oritur, patet si corpus ita volvendo promoveatur, ut nullus attritus exisat, cujusmodi motus provolutio perfecta vocatur, nulla etiam frictio locum habebit; simulatque autem motus volutorius tantillo fuerit celerior vel tardior, quam illa conditio postulat, sicque attritus sese admisceat, etiamsi sit minimus, tamen statim subito plena frictio  $\delta$  effectum suum exerit. Quare phaenomena hinc orta ingentem saltum implicare debent, cum pro certa motus specie omnis frictio subito tollatur, dum autem motus tantillum inde discrepat, pleno effectui adsit.

## SCHOLION. 2.

974. Insigne calculi compendium hinc consequimur, quod frictio tam simpliciter exprimitur, et a sola pressione P cum fractione  $\delta$ , quam asperitas definit, pendet; si enim insuper tam a celeritate corporis quam ab ejus basi penderet, facile in calculos inextricabiles illaberemur. Ac si calculum ad praxin accomodare velimus, totum negotium ad valorem fractionis  $\delta$  reducitur, quem unico experimento pro singulis corporum generibus assignasse sufficit. Pro corporibus autem ligneis experimenta ostendunt litteræ  $\delta$  valorem circiter  $\frac{1}{4}$  tribui debere, si quidem eorum superficies mediocriter fuerit dolata, sin autem magis sit rudis et aspera, majorem valorem sortitur, quemadmodum e contrario corpora metallica probe polita pro littera  $\delta$  fractionem  $\frac{1}{4}$  adeoque minorem exigunt. Verum ex sequentibus patebit, quomodo quovis casu per experimenta conveniens fractionis  $\delta$  quantitas facile explorari queat. Experientia autem didicimus, nullam superficiem ne-

que corpus tam perfecte poliri possè, ut frictio plane evanescat, quin potius semper satis notabili adhuc parti frictionis aequari deprehenditur. Quare quae supra de motu corporum super plano politissimo, quod nullam gignat frictionem, sunt allata, in praxi neutiquam locum inveniunt.

## P R O B L E M A. I.

975. Si corpus superficiei cuicunque incumbens quiescat, simulque a virtutibus quibuscunque sollicitetur, distinguere casus, quibus id vel ad motum impellatur vel in quiete perseveret.

## S O L U T I O.

Fig. 125.

Omnes vires, quibus corpus ABCD sollicitatur, resolvantur in binas, quarum altera sit ad superficiem normalis, altera eidem parallela. Sit  $P$  summa omnium ad superficiem perpendicularium, quatenus corpus ab iis ad superficiem apprimatur, erit  $P$  pressio, foretque  $\mathcal{P}$  frictio, si corpus moveretur. Quod ad alteras vires attinet, consideremus hic tantum casum, quo ab iis corpori motus progressivus induceretur, si nulla esset frictio; quoniam motus gyratorius ampliorem postulat evolutionem infra suscipiendam. Cum igitur corpus alium motum nisi secundum directionem superficiei recipere nequeat, vires huic parallelae quasi uni puncto applicatae spectentur, earumque quærat<sup>r</sup>ur æquivalens, quæ sit  $= V$  secundum directionem BFurgens, atque manifestum est, quamdiu fuerit  $V < \mathcal{P}$  corpus in quiete esse perseveraturum, neque id commoveri posse, nisi vis sollicitans  $V$  major fuerit, quam  $\mathcal{P}$ . Habemus ergo pro vi sollicitante  $V$  terminum  $\mathcal{P}$ , quo si vis fuerit minor, nullus motus fit consecuturus, sin autem fuerit major, tum demum motus producat<sup>r</sup>ur.

## C O R O L L. I.

976. Cum corpus in quiete persistere pergat, quamdiu fuerit  $V < \mathcal{P}$ , frictio censenda est vim exercere ipsi vi  $V$  æqualem et contrariam: si enim fortius urgeret, corpus in plagam oppositam AE moveri deberet, quod esset absurdum, cum in plagam BF incitetur.

## C O R O L L. 2.

977. Dum ergo corpus quiescit, frictio non determinatam exercit vim, sed quovis casu tantam, quanta opus est ad corpus in quiete conservan-

servandum, nisi opus fuerit vi majori quam  $\mathcal{P}$ . Unde si corpus a nulla vi sollicitetur ad motum, etiam frictio nullam vim exercet.

## COROLL. 3.

978. Quamdiu ergo motus a vi, quae non superet  $\mathcal{P}$ , impediri potest, eam vim frictio suppeditat, et quidem secundum eam directionem, qua opus est ad motum impediendum. Sin autem quietis conservatio majorem postulet vim, quoniam frictio tantum praestare nequit, motus generabitur.

## SCHOLION. 1.

979. Cum supra dixerimus, in quiete corporum nullam dari frictionem, id de vera quiete tantum, in qua corpus esset perseveraturum, etiamsi nulla adesset frictio, est intelligendum. Statim enim atque corpus a viribus sollicitatur, quibus ad motum incitaretur, si nulla esset frictio, huic etiam motus productioni frictio reluctatur, etiamsi corpus adhuc sit in quiete. Ita igitur frictio tam ratione motus quam quietis est definienda, ut dum corpus movetur, vim exerat perpetuo ipsi  $\mathcal{P}$  aequalem et secundum directionem motui contrariam: dum autem corpus quiescit, eadem vim non per se definitam, sed tantam dumtaxat exerceat, quanta motui impediendo sufficit, nisi forte ad hoc majori vi opus sit quam  $\mathcal{P}$ : tum enim hac tantum vi  $\mathcal{P}$  motus productioni resistit, quae cum motum coercere non valeat, motus revera generabitur. Vis scilicet  $\mathcal{P}$  est maximus conatus, quo frictio aniti potest, quo revera semper ipsi motui resistit, et quo etiam motus generationi reluctatur, si opus est. Sin autem minor vis sufficiat, etiam minorem tantum exerit: seu quoties vis ad motus productionem cohibendam necessaria non fuerit major quam  $\mathcal{P}$ , ea vis a frictione suppeditatur. Haec autem tantum de motu progressivo sunt tenenda, si enim motus gyriorius accedat, praecipue si axis gyrationis fuerit ad superficiem inclinatus, res est altioris indaginis, et quia hoc casu non omnia basis elementa secundum eandem directionem moventur, superficiemque terunt, frictio singulorum elementorum considerari debet, ex quo etiam basis figura et magnitudo in computum ingreditur. Atque ad hanc circumstantiam supra, ubi basis figuram a determinatione frictionis removimus, non respeximus.

## SCHOLION. 2.

980. Difficile sane est frictionis, quemadmodum hic eam experientiae consentaneam statuimus, causam assignare, facile autem causas, quae

quae forte menti occurrant, refellere. Perspicuum enim est, neque ab abrasione quadam particularum, neque a depressione filamentorum, dum corpus super superficie incedit, frictionem oriri posse, quia tum necessario baseos magnitudo in computum intraret. Quod ad frictionem, quatenus motus generationi resistit, attendamus, ea sequenti modo

Fig. 126. haud inepte explicari posse videtur. Dum nempe corpus ABCD superficiei EF incumbit, contactus non secundum planum AB, ut sensus ostendit, fieri est concipiendus, sed ob minimas utrinque prominentias et cavitates secundum superficiem sinuosam et quasi undulatam, ab ab ab, dum ob pressionem prominentiae alterius in cavitates alterius se insinuant. Hoc admissio corpus moveri nequit, quin simul supra superficiem AB aliquantillum elevetur; seu prima motus impressio non secundum directionem OV ipsi AB parallelam, sed secundum quandam directionem OS inclinatum fieri debet, quae scilicet parallela sit maximae quasi declivitati in contactu illo sinuoso: atque haec declivitas seu obliquitas respondet asperitati utriusque superficiei in contactu ita, ut pro maiore minoreve asperitate angulus VOS major minorve sit concipiendus. Statuatur ergo iste angulus  $VOS = \zeta$ , corpusque superficiei apprimatur vi  $OP = P$ , ac jam videamus, quanta vi secundum directionem OV agente opus sit, ut corpus de situ suo dimovere valeat. Agat ergo vis  $OV = V$ , a qua corpus secundum directionem OS sollicitabitur vi  $= V \cos \zeta$ : at vis pressionis  $OP = P$  huic actioni resistit vi  $= P \sin \zeta$ . Quare nili fuerit  $V \cos \zeta > P \sin \zeta$  seu  $V > P \tan \zeta$ , corpus de quiete non deturbabitur; vel quamdiu vis sollicitans  $OV = V$  minor fuerit quam  $P \tan \zeta$ , corpus in quiete perseverabit. Id quod egregie cum supra traditis convenit, cum loco fractionis illius  $\delta$  hic habeamus tangentem cuspis anguli  $\zeta$ . Verum fateri cogor, hinc non intelligi, cur dum corpus movetur, frictionis vis motui contraria etiam ipsi  $P \tan \zeta$  aequalis esse debeat: cum enim basis corporis alternatim se ex illis sinuositatibus expediat, iterumque se eo insinuet, minus patet quantum detrimentum hinc motus sit passurus. Quoniam tamen hypothesis stabilita hinc non evertitur, ei inhaereamus, causamque hic assignatam tanquam a vero non abhorrentem spectemus.



## CAPUT II.

### DE MOTU PROGRESSIVO CORPORUM GRAVIUM A FRICTIONE IMPEDITO.

#### PROBLEMA. 2.

981. Si corpus grave super plano horizontali motu progressivo incedat, determinare motus retardationem a frictione oriundam.

#### SOLUTIO.

Sit  $M$  corporis massa idemque ejus pondus, quod planum hori-Fig. 127.  
zontale  $EF$  tangat basi sua  $AB$ , quam pariter planam esse oportet. Consideretur corporis centrum inertiae  $O$ , in quo ejus pondus  $M$  collectum concipiatur, ita ut corpus deorsum sollicitetur vi  $OP = M$ , quae cum ad planum  $EF$  sit normalis, tanta quoque vi ad planum apprimitur: ubi primum observo, nisi recta  $OP$  intra corporis basim  $AB$  cadat, motum progressivum esse non posse. Verum ne hoc quidem sufficit, cum enim progrediente corpore secundum directionem  $BF$  id secundum directionem contrariam  $BE$  ob frictionem retrahatur vi  $= \delta M$ , denotante  $\delta$ : rationem pressionis ad frictionem, haec vis conatur corpori motum gyratorium circa horizontalem axem per  $O$  transeuntem inducere, cujus momentum est  $= \delta M \cdot OP$ . Cui vi si corpus obsequatur, primo instanti basis punctum  $A$  elevari incipiet, ita ut jam totum corpus extremitati basis  $B$  innitatur, quo etiam pressio transferetur. In hoc ergo statu ad gyrandum proclivi corpus in  $B$  sursum urgeri censendum est vi  $BM = M$ , unde momentum gyrationi resistens nascitur  $= M \cdot BP$ : quod nisi superet illud  $\delta M \cdot OP$ , corpus revera gyriari incipiet. Quare cum hic tantum motum progressivum contemplari statuerimus, haec conditio insuper requiritur, ut sit  $BP > \delta \cdot OP$ , quam ergo hic locum habere assumamus. Fuerit ergo initio corporis celeritas secundum directionem  $EF = c$ , et elapso tempore  $t$  confecerit spatium  $= s$ , habeatque celeritatem  $= v$ . Atque ob vim  $\delta M$  motui con-

trariam erit  $\frac{dv}{2g dt} = \frac{-\delta M}{M} = -\delta$ , ideoque  $v = c - 2g\delta t$ . Porro

quia est  $ds = v dt$ , fiet  $s = ct - \delta g t^2$ . Motus autem tandiu tantum durabit, quoad corpus ad quietem fuerit reductum, frictione  $\delta M$  tum subito

Mmm

## 458. |CAPUT II. DE MOTU PROGRESSIVO

bito cessante : corpus ergo ad quietem redigetur elapso tempore  $t = \frac{c}{2\delta g}$  et percursio spatii  $= \frac{c^2}{4\delta g}$ .

### COROLL. 1.

982. Ut ergo corpus grave super plano horizontali motu progressivo incedere possit, perpendiculum OP ex centro inertiae corporis O in planum demissum non solum intra basin AB cadere, sed etiam a termino basis anteriori B tanto intervallo BP remotum esse debet, ut sit  $BP > \delta$ . OP.

### COROLL. 2.

983. Ductis igitur ex centro inertiae O cum perpendiculari OP, tum ad anteriorem basis terminum B recta OB, angulum BOP majorem esse oportet angulo, cujus tangens est  $= \delta$ . Unde si fuerit  $\delta = \frac{1}{2}$ , angulus BOP major esse debet quam  $18^\circ$ ,  $26'$ . Sin autem fuerit minor, corpus progrediendo simul provolvetur.

### COROLL. 3.

984. At si corpus motu progressivo puro promoveatur, ejus motus erit uniformiter retardatus, et similis ei, quo corpus celeritate  $c$  sursum projectum ascenderet, deorsum sollicitatum vi, quae sit ad ejus massam ut  $\delta$  ad 1. Hoc tantum discrimine, quod hic corpus ad quietem reductum perpetuo in quiete sit permanens.

### SCHOLION. 1.

985. Ut tali corpori quieto motus imprimatur, necesse est ut secundum directionem horizontalem impellatur vi, quae major sit quam  $\delta M$ : quamdiu autem sollicitatur vi minore, in quiete perseverabit, nisi forte ad provolutionem incitetur, quod quando evenire debeat, accuratius evolvamus. Sollicitetur ergo primo corpus secundum directionem horizontalem OS, quae per ejus centrum inertiae O transeat, vi  $OS = S$ , ut sit  $S < \delta M$ , et frictio pari vi S secundum BA renitetur. An autem circa extremitatem B provolvatur? Judicium petetur ex momento frictionis S. OP et momento pressionis M in B translatae, quod est  $= M \cdot BP$ : hinc si fuerit  $S \cdot OP > M \cdot BP$ , corpus provolvetur, sin ininus, in quiete persistet: quia enim vis sollicitans  $OS = S$  ipsi centro inertiae est applicata, ea nihil huc confert. Sit nunc vis S infra centrum

trum inertiae in R applicata, et quia hinc momentum provolutioni contrarium nascitur  $= S. OR$ , ne corpus provolvatur, esse oportet  $S. OR + M. BP > S. OP$ , seu  $S. PR < M. BP$ ; unde simul patet, si vis horizontalis S sublimius in r esset applicata, corpus provolutioni non fore obnoxium, si fuerit  $S. Pr < M. BP$ , ubi quidem assumimus esse  $S < \mathcal{M}$ . Idem etiam hinc magis fit perspicuum, si punctum B ut axem fixum, corpusque circa eum mobile spectemus, tum enim vis  $rv = S$  momentum in sensum DC est  $= S. Pr$ , expondere autem corporis M in O collecto oritur momentum in sensum contrarium M. BP: ideoque corpus provolvitur si  $S. Pr > M. BP$ , quiescet vero si  $S. Pr < M. BP$ .

SCHOLION. 2.

986. Sin autem vis  $rv = S$  major fuerit quam  $\mathcal{M}$ , motus corpori progressivus inducetur ab excessu  $S - \mathcal{M}$ , quia frictio jam tantum vi  $= \mathcal{M}$  secundum directionem BE reluctatur. Utrum autem simul corpus sit motum gyratorium adepturum, nec ne? hoc modo cognoscetur. Seposito nimirum motu progressivo, assumo corpori alium motum gyratorium imprimi non posse, nisi circa axem horizontalem per centrum inertiae O transeuntem et ad motus directionem OS normalem, ad quem investigandum, cum basis punctum B maneat in plano horizontali, simul ac punctum A elevari incipit, tota pressio in puncto B exercetur, ita ut tum in B habeatur vis sursum urgens  $BM = M$ . Nunc igitur ex viribus  $rv = S$ ,  $BE = \mathcal{M}$ ,  $OP = M$  et  $BM = M$  colligitur momentum provolutionem producens  $= S. Or + \mathcal{M}. PO - M. BP$ ; quare ut corpus solo motu progressivo feratur, haec conditio requiritur, ut sit  $S. Or + \mathcal{M}. PO < M. BP$ , ubi per hypothesin est  $S > \mathcal{M}$ . Si vis horizontalis S infra centrum inertiae in R esset applicata, corpus provolutioni non erit obnoxium, si fuerit  $\mathcal{M}. PO < M. BP + S. OR$  seu  $S. OR + M. BP > \mathcal{M}. PO$ . Hinc igitur clare intelligimus, quantum cum amplitudo basis, seu distantia perpendiculari ex centro inertiae demissi OP ab ejus terminis, tum elevatio centri inertiae supra planum horizontale, tum altitudo in qua vis horizontalis applicatur, atque ipsa frictio conferant, ut nulla provolutio sit metuenda.

PROBLEMA. 3.

987. Si corpus grave ABCD plano inclinato EF imponatur, de Fig. 128. finire conditiones, sub quibus id ob frictionem in quiete sit permanfurum.

Mmm 2

SO.



## SOLUTIO.

Sit angulus, quem planum inclinatum EF cum horizonte GF constituit,  $GFE = \zeta$ , corporis autem ei impositi massa  $= M$ , et centrum inertiae O, basi autem AB plano inclinato incumbat. Ducatur recta verticalis OQR, secundum quam corpus ob gravitatem sollicitari censendum est vi  $= M$ , quae resolvatur secundum directiones OP et OC, quarum illa in planum EF sit normalis, haec vero eidem parallela, et ob angulum POQ  $= GFE = \zeta$ , erit vis OP  $= M \cos \zeta$  et vis OC  $= M \sin \zeta$ . Illa autem vi OP corpus ad planum EF apprimitur, unde si moveretur, frictio foret  $= \delta M \cos \zeta$ : hac vero vi OC  $= M \sin \zeta$  ad motum secundum plani inclinati EF directionem sollicitatur. Nisi ergo haec vis  $M \sin \zeta$  major sit, quam  $\delta M \cos \zeta$ , corpus nullum motum progressivum adipiscetur; quare ut corpus quiescat, necesse est, sit  $M \sin \zeta < \delta M \cos \zeta$  seu  $\tan \zeta < \delta$ . Prima ergo conditio ad conservationem quietis necessaria exigit, ut anguli inclinationis  $F = \zeta$  tangens minor sit quam fractio  $\delta$  qua frictio determinatur. Deinde manifeste requiritur, ut recta verticalis OQ intra basin AB cadat. Nam ne corpus circa basis extremitatem B provolvatur, necesse est, ut vis OQ  $= M$  momentum respectu puncti B, quod est  $M \cdot BQ \cos \zeta$  sit positivum, ideoque BQ positivum, seu punctum Q intra basin AB cadere debet. Quod etiam ex motu gyatorio circa O generando ita ostendi potest. Fingamus enim corpus jam talem motum gyatorium incipere, et dum punctum A elevatur, tota pressio  $M \cos \zeta$  in B transferetur, ut nunc corpus in B sollicitetur primo vi BM  $= M \cos \zeta$ , ob frictionem autem vi BA  $= M \sin \zeta$ , ex quibus momentum generans motum gyatorium erit  $= M \sin \zeta \cdot OP - M \cos \zeta \cdot BP$ . Quare ne talis motus oriatur, debet esse BP  $\cos \zeta > OP \cdot \sin \zeta$  seu BP  $> OP \tan \zeta$ , at OP  $\tan \zeta = PQ$ , ergo ob BP  $> PQ$  intervallum BQ positivum esse oportet. Consequenter ut corpus ABCD plano inclinato EF impositum quiescat, primo requiritur, ut verticalis OQ intra basin AB cadat, deinde ut tangens anguli inclinationis F minor sit quam  $\delta$ .

## COROLL. I.

988. Hinc igitur facillimum modum nanciscimur, explorandi frictionem seu fractionem  $\delta$ : planum enim EF eousque elevetur, quoad corpus super eo descendere incipiat, et tangens anguli maximi F, quo corpus etiamnum in quiete persistit, dabit valorem fractionis  $\delta$ .

CO-

COROLL. 2.

989. Quodsi fuerit  $\delta = \frac{1}{4}$ , corpus tandiu in quiete permanebit, quamdiu angulus elevationis GFE non superat  $18^\circ, 26'$ . Sin autem sit  $\delta = \frac{1}{4}$ , hunc angulum minorem esse oportet, quam  $14^\circ, 2'$ , sicque vicissim ex hoc angulo valor ipsius  $\delta$  innotescit.

COROLL. 3.

990. Ut autem corpus super plano inclinato quiescat, non sufficit ut sit  $\text{tang GFE} < \delta$ , sed etiam basis corporis tum ampla esse debet, ut sit  $\text{BP} > \text{OP tang GFE}$ ; seu ut angulus BOP major sit quam angulus GFE.

SCHOLION.

991. In figura repraesentatur sectio corporis verticalis per ejus centrum inertiae O facta, quae simul ad planum inclinatam sit normalis; in qua propterea recta OP ad id est perpendicularis, et OC sit directio motus progressivi, quem gravitas corpori imprimere conatur. Ex dictis autem manifestum est, motum progressivum coepceri, si fuerit  $\text{tang F} < \delta$ . Verum ad judicium expediendum, num corpus motum gyrationum sit accepturum, non sufficit ad solam sectionem ABCD ejusque basin AB spectare, cum fieri posset, ut in hac sectione corpus plano nusquam incumberet, sed contactus in extremitatibus corporis tantum existeret. Tum igitur universus contactus considerari ac dispici debet, quomodo et circa quamnam lineam provolutio oriri possit, quae utique ex figura basis est dijudicanda. Quodsi ergo corpora tam irregularia adhibeantur, ut hoc judicium nimis difficile evadat, experientiam consulere conveniet, an corpus ad provolutionem sit proclive? prior vero conclusio de angulo F manet, et ab hac irregularitate neutiquam pendet.

PROBLEMA. 4.

992. Si elevatio plani inclinati EF major fuerit, quam ut grave ei incumbens ABCD in quiete persistere possit, definire condiciones, quibus id solo motu progressivo super plano inclinato EF sit descensurum.

SOLUTIO.

Sit massa, idemque pondus corporis = M, et ejus centrum inertiae O ut ante, atque  $\delta$  exponens frictionis. Vocato ergo angulo elevationis  $\text{GFE} = \zeta$ , erit per hypothesin  $\text{tang } \zeta > \delta$ . Iam ex vi gravitatis

Fig. 128.

Mmm 3

## 462 CAPUT II. DE MOTU PROGRESSIVO

vitatis  $OQR = M$  colligimus pressionem in planum inclinatum, seu vim  $OP = M \cos \zeta$ , et vim ad descensum sollicitantem  $OC = M \sin \zeta$ . Cum igitur frictio ei renitatur vi  $= \delta M \cos \zeta$ , corpus revera ad descensum incitabitur excessu virium  $M \sin \zeta - \delta M \cos \zeta = M (\sin \zeta - \delta \cos \zeta)$ , a qua motus progressivus producet, dummodo praeterea in corpore nullus motus gyratorius generetur. Videamus ergo, sub quibusnam conditionibus corpori motus gyratorius circa axem horizontalem et ad planum  $COP$  normalem per centrum inertiae  $O$  ductum generari possit; statim autem ac talis motus incipit, tota pressio  $M \cos \zeta$  in  $B$  transfertur, ita ut nunc corpus sollicitetur a vi  $BM = M \cos \zeta$ , et ob frictionem a vi  $BA = \delta M \cos \zeta$ , unde momentum gyrationem in sensum  $BADC$  generans est  $= \delta M \cos \zeta \cdot OP - M \cos \zeta \cdot BP$ . Quare ne corpus provolutioni sit obnoxium, oportet hanc quantitatem esse negativam, ideoque  $BP > \delta \cdot OP$ , seu  $\text{tang } BOP > \delta$ .

### COROLL. 1.

993. Quia conditio inventa  $\text{tang } BOP > \delta$  non pendet ab inclinatione plani  $EF$ , si corpus in minori inclinatione provolutioni non fuerit obnoxium, etiam in majori elevatione nulla provolutio erit metuenda.

### COROLL. 2.

994. Quodsi ergo fuerit  $\delta = \frac{1}{3}$ , dummodo angulus  $BOP$  major sit quam  $18^\circ$ ,  $26'$ , corpus nullum motum volutorium accipiet, sed super plano inclinato vel quiescet, vel solo motu progressivo descendet.

### SCHOLION.

995. In hoc autem iudicio pro puncto  $B$  non tam extremitas in ipsa sectione  $ABCD$  per centrum inertiae  $O$  facta est sumenda, sed in tota basi, qua sit contactus, linea per terminos a puncto  $P$  maxime remotos ducta est intelligenda, cujus a  $P$  distantia pro intervallo  $PB$  accipi debet.

### PROBLEMA. 5.

996. Si corpus ita fuerit comparatum, ut nulla provolutio sit metuenda, ejus motum descensus super plano inclinato  $EF$  determinare.

### SOLUTIO.

Posita corporis massa eodemque pondere  $= M$ , et elevatione plani supra horizontem seu angulo  $GFE = \zeta$ , ut sit  $\text{tang } \zeta > \delta$ , qua

alioquin corpus in quiete perseveraret. Confecerit jam corpus tempore  $t$  super plano inclinato spatium  $= s$ , motu scilicet a quiete inchoato, et quia vis accelerans est  $= M \sin \zeta$ , a gravitate oriunda, retardans autem  $= \delta M \cos \zeta$  a frictione profecta, hinc nanciscimur istam

$$\text{aequationem : } \frac{d ds}{2 g dt^2} = \frac{M \sin \zeta - \delta M \cos \zeta}{M} = \sin \zeta - \delta \cos \zeta,$$

hincque integrando  $\frac{ds}{dt} = 2gt (\sin \zeta - \delta \cos \zeta)$ , quae est celeritas corporis hoc tempore  $t$  acquisita, ipsum autem spatium interea confectum sit  $s = gt^2 (\sin \zeta - \delta \cos \zeta)$ .

COROLL. 1.

997. Frictio ergo non impedit, quo minus corpus super plano inclinato descendat motu uniformiter accelerato, cum celeritates in ratione temporum crescant: verum in multo minore ratione crescant; sublatam enim frictionem foret  $s = gtt \sin \zeta$ .

COROLL. 2.

998. Si observetur tempus  $t$  quo datum spatium  $s$  fuerit confectum, simulque elevatio plani seu angulus  $\zeta$  fuerit exploratus, inde exponens frictionis  $\delta$  colligi poterit: erit enim  $\delta = \tan \zeta - \frac{s}{gt^2 \cos \zeta}$ .

SCHOLION.

999. Hoc modo explorari poterit, utrum pro quiete idem valor exponentis  $\delta$  reperiatur, ac pro motu eoque sive celeriore sive tardiore: sed hujusmodi experimenta sunt lubrica, quia exiguus error in observatione temporis  $t$  commissus multum turbat. Tum vero etiam resistentiae aeris ratio est habenda, quae praesertim in motibus velocioribus insigne momentum afferre potest. Quare nonnisi plurimis hujusmodi experimentis summa cura institutis quicquam certi in hoc negotio concludi poterit. Ne autem resistentia aeris moram facessat, planum non multum ultra statum quietis elevari convenit, quia in motibus tardioribus ejus effectus est minimus. Tum vero corpus quantum fieri potest, ponderosum efficiatur, frustum plumbi intra ejus volumen includendo, ut tamen basis ex ea constet materia, cujus frictionem explorare lubet.

EXEM-

## 464 CAPUT II. DE MOTU PROGRESSIVO &c.

### EXEMPLUM.

1000. Ponamus tabulae EF longitudinem esse 6 ped. Rehn. tempusque  $t$  observari, quo corpus descendendo totam hanc longitudinem conficiat, ac videamus, quantum discrimen in tempore  $t$  frictione  $\delta$  parumper mutata oriri debeat. Cum igitur sit  $g = 15 \frac{1}{2}$  ped. Rhen. erit

$$\text{tempus descensus } t = \sqrt{\frac{48}{125(\sin \zeta - \delta \cos \zeta)}}.$$

Ponamus  $\delta = \frac{1}{2}$ , et angulum  $\zeta = 20^\circ$ , quia debet esse  $\tan \zeta > \frac{1}{2}$ , ac reperietur tempus descensus  $t = 3,652$  min. sec. seu  $t = 3 \frac{2}{3}$  sec. proxime.

Sit jam  $\delta$  aliquantulum majus, nempe  $\delta = \frac{1}{2} + \frac{1}{1000}$ , manente  $\zeta = 20^\circ$ , et prodit tempus  $t = 4,45 = 4 \frac{1}{20}$  sec.

At si esset  $\delta = \frac{1}{2} - \frac{1}{1000}$  manente  $\zeta = 20^\circ$ , invenitur tempus  $t = 3,171 = 3 \frac{1}{6}$  sec.

Pars igitur centesima unitatis in valore ipsius  $\delta$  gignit temporis discrimen illo casu  $\frac{1}{3}$  sec. hoc vero tantum  $\frac{1}{2}$  sec. unde in observatione temporis valde attentum esse oportet. Si plano minor tribuatur elevatio, ut motus multo lentior oriatur, dubium est, an observationibus multum confidere queamus. Levissima enim inaequalitas in superficie descensum vehementer perturbare valebit, ita ut si experimentum idem aliquoties repetatur, phaenomena multum discrepare possunt. Atque hanc ob causam, etsi hic calculum hypothese de frictione stabilitae superstruo, tamen si conclusiones inde deductas cum experientia conferre velimus, minime perfectum consensum expectare debemus,

## CAPUT. III.

### DE MOTU GYRATORIO CORPORUM GRAVIUM CIRCA AXEM FIXUM A FRICTIONE RETARDATO.

#### PROBLEMA. 6.

1001. **E**fficere ut corpus circa axem fixum per ejus centrum inertiae transeuntem gyrari possit.

SO.

## SOLUTIO.

Si corpus debeat gyron citca axem GG, necesse est, ut utrinque Fig. 129. instructum sit terminis cylindricis CEFD, quos axis GG medium trahat, ita ut utriusque cylindri axis existat: atque hic quidem assumo, hunc axem GG per corporis centrum inertiae I transire, quanquam eadem structura est observanda, si recta GG non per corporis centrum gravitatis transire debeat. Ut jam durante motu gyratorio haec recta GG fixa maneat, id pluribus modis obtineri potest. Primo hi termini cylindrici annulis fixis ejusdem amplitudinis inseri possunt, intra quas libere, frictione saltem excepta, converti queant: verum si amplitudo annulorum non excedat amplitudinem cylindricorum CEFD, verendum est, ne ob nimis arctam insertionem ingens resistentia oriatur, ac si termini illi cylindrici vel minimum intumescent, motus omnis coerceatur.

Deinde termini cylindrici utrinque canali MLN in figuram quadrati excavato imponi possunt, ut contactus tantum in tribus punctis E, H, F fiat; dum enim corpus intra has cavitates circumvolvitur, axis GG manet immotus. Ne autem motus nimis impediatur, non opus est, ut ambo parietes verticales M et N cylindrum tangerent, sed majore intervallo a se invicem distare possunt. Statim enim atque corpus gyratur, cylindrici termini se alterutri parieti applicabunt, perindeque est, ac si alter abesset; qui tantum ideo adjicitur, ut corpus si forte in sensum contrarium gyretur, se ei pari modo applicare possit.

Tertio termini cylindrici etiam utrinque cavitati MLN, ex duobus Fig. 131. planis inclinatis ML et NL efformatae, imponi possunt; hoc modo contactus perpetuo fiet in duobus punctis E et F, axisque GG manebit in quiete; dummodo inclinatio illorum planorum tanta sit, ut termini cylindrici super illis non ascendant, quam conditionem deinceps investigabimus.

Quarto imponi etiam possunt ambo termini cylindrici fulcris in Fig. 132. figuram circularem MLN excavatis, quibus quidem corpus dum quiescit ita incumbit, ut contactus fiat in imo puncto H. Quando autem gyratur, contactus fiet in alio puncto elevato, quod cum perpetuo maneat idem, uti ostendimus, axis GG, quamdiu motus gyratorius in eundem sensum durat, manebit immotus. Hic sufficit radium circuli MLM majorem fuisse radio termini cylindrici, sed tanta profunditas huic cavitati tribui debet, ut non sit verendum, ne corpus supra ejus oras M et N transiliat.

## COROLL. 1.

1002. Dum corpus hoc modo utrinque talibus cavitatibus incumbit, ob pondus suum eas premit: ac si centrum inertiae  $I$  in medio versetur, utrinque pressio aequalis exeretur: sin autem id non fuerit in medio, pressiones erunt distantis reciproce aequales, ita ut summa sit toti ponderi aequalis.

## COROLL. 2.

1003. Quodsi autem corpus gyretur, pressio non amplius a solo pondere corporis pendet, sed ob ipsam frictionem impantabitur, ideoque ex frictionis ratione determinari debet, unde etiam ultimo casu punctum contactus est definiendum.

## SCHOLION.

1004. Pressio etiam, ideoque et frictio, plurimum perturbatur a viribus, quibus corpus dum gyratur, praeter gravitatem sollicitatur. Quare quo hoc argumentum dilucide pertractemus, primo mentem ab huiusmodi viribus abstrahamus, corpusque tantum grave spectemus, cui initio motus gyratorius fuerit impressus; et quantum is ob frictionem retardari debeat, indagemus. Tum vero etiam assumamus, axem gyrationis  $GG$  per centrum inertiae corporis  $I$  transire, ab eoque ambos terminos aequae esse remotos, ita ut corpus utrinque sibi sit simile. Quin etiam ne vires obliquae calculum turbent, statuamus, rectam  $GG$  simul esse axem principalem corporis. Minime enim consultum videtur, corpori figuram nimis irregularem tribuendo, investigationes nostras difficilibus calculis implicare, cum ipsa principia hactenus stabilita etiam his casibus evolvendis sufficiant, si quis laborem suscipere voluerit. Casus autem fig. 130. representatus in fig. 131. continetur, dum alterum planum sit verticale et alterum horizontale; deinde vero etiam casum fig. 132. ex eo dijudicari posse videbimus.

## PROBLEMA 7.

Fig. 133. 1005. Si corporis (in fig. 129. representati) termini cylindrici utrinque inter duo plana utrinque inclinata  $ML$  et  $NL$  sustententur, corpusque in gyrum agatur celeritate quacunque, definire frictionem ejusque effectum in motu corporis retardando.

SO.

## SOLUTIO.

Quia centrum inertiae I in medio axis GG situm assumimus, respectu terminorum cylindricorum utrinque omnia erunt paria. Sit igitur pro altero termino radius basis circularis  $GE = GF = f$ , et puncta contactus in E et F. Ducta verticali GH ponantur anguli  $EGH = \zeta$  et  $FGH = \eta$ , quibus positio planorum ML et NL determinantur: tum vero corpus jam elapso tempore  $t$  gyretur in sensum EF celeritate angulari  $= \omega$ , quae initio fuerit  $= \omega_0$ . Quia ergo ex hac parte corpus in punctis E et F sustinetur, sint E et F pressiones, quibus corpus planis innititur, ac vicissim secundum directiones eo normales EG et FG urgetur. Frictio porro in punctis E et F, ubi sit attritus, ita se exeret, ut in E corpus sollicitetur vi sec. EM  $= \delta E$  et in F vi sec. FL  $= \delta F$ , ita ut ex hac parte quatuor habeantur vires.

vis EG = E; vis EM  $= \delta E$ ; vis FG = F; vis FL  $= \delta F$ , totidemque pares ex altera parte. Posita ergo massa eodemque pondere corporis = M, quia omnis motus progressivus excluditur, hae vires centro inertiae applicatae se mutuo destruere debent: Colligitur autem ex istis quaternis viribus vis verticaliter sursum tendens

$E \cos \zeta + F \cos \eta + \delta E \sin \zeta - \delta F \sin \eta$   
et vis horizontalis dextorsum directam

$E \sin \zeta - F \sin \eta - \delta E \cos \zeta - \delta F \cos \eta$ ,  
ubi haec debet evanescere, illa autem dimidio ponderi corporis aequari. Hinc nanciscimur:

$$E \sin \zeta - F \sin \eta = \delta (E \cos \zeta + F \cos \eta) \text{ et} \\ (1 + \delta\delta) (E \cos \zeta + F \cos \eta) = \frac{1}{2} M, \text{ ideoque}$$

$$E \cos \zeta + F \cos \eta = \frac{M}{2(1 + \delta\delta)} \text{ et}$$

$$E \sin \zeta - F \sin \eta = \frac{M\delta}{2(1 + \delta\delta)}$$

ex quibus elicitur

$$E = \frac{M(\sin \eta + \delta \cos \eta)}{2(1 + \delta\delta)\sin(\zeta + \eta)}; F = \frac{M(\sin \zeta - \delta \cos \zeta)}{2(1 + \delta\delta)\sin(\zeta + \eta)}$$

ubi statim est observandum, cum vires E et F negative esse nequeant, necessario esse oportere  $\sin \zeta > \delta \cos \zeta$  seu  $\tan \zeta > \delta$ .

Nunc demum colligantur momenta ex frictione nata, quae erunt

$$\delta(E + F)f = \frac{M\delta f(\sin \zeta + \sin \eta - \delta \cos \zeta + \delta \cos \eta)}{2(1 + \delta\delta)\sin(\zeta + \eta)} \text{ ejus duplum motui} \\ \text{Nnn 2} \quad \text{opponitur.}$$



opponitur. Quare si momentum inertiae corporis respectu axis GG fuerit  $= Maa$ , habebimus hanc aequationem:

$$\frac{dx}{2gd} = \frac{-\delta f(f\zeta + f\eta - \delta \cos \zeta + \delta \cos \eta)}{(1 + \delta\delta) a a f(\zeta + \eta)}, \text{ et integrando}$$

$$x = 1 - \frac{2\delta f g t (f\zeta + f\eta - \delta \cos \zeta + \delta \cos \eta)}{(1 + \delta\delta) a a f(\zeta + \eta)}.$$

## COROLL. 1.

1006. Quo minor ergo est  $f$ , seu quo graciliores termini cylindrici, eo minor est effectus frictionis. Sed hos terminos non pro lubitu diminuere licet, quia eos satis fortes esse oportet ad onus gestandum, atque quantitas  $f$  fere rationem subduplicatam ponderis  $M$  sequi debet.

## COROLL. 2.

1007. Si sit  $\zeta = 90$  et  $\eta = 0$ , qui est casus fig. 130. momentum frictionis est  $= \frac{M\delta(1 + \delta)f}{1 + \delta\delta}$ ; Sin autem sit  $\eta = \zeta$ , seu plana ML et NL aequaliter ad horizontem inclinata, erit momentum frictionis  $= \frac{2M\delta f f \zeta}{(1 + \delta\delta) f 2\zeta} = \frac{M\delta f}{(1 + \delta\delta) \cos \zeta}$ : ubi debet esse  $\text{tang } \zeta > \delta$ .

## COROLL. 3.

1008. Minimum autem fit momentum frictionis sumendo  $\text{tang } \zeta = \delta$ , tum enim ob  $F = 0$ , erit  $E = \frac{M}{2(1 + \delta\delta) \cos \zeta} = \frac{M}{2r(1 + \delta\delta)}$  ideoque momentum frictionis  $= \frac{M\delta f}{r(1 + \delta\delta)}$ . Hoc ergo casu corpus soli plano ML innititur, et alterum NL plane non in computum venit.

## COROLL. 4.

1009. Hinc casus fig. 132. quaecunque sit cavitatis MLN figura facile evolvitur. Termini enim cylindrici puncto O applicabuntur, ubi tangens cum horizonte facit angulum, cujus tangens est  $= \delta$ , eritque momentum frictionis  $= \frac{M\delta f}{r(1 + \delta\delta)}$ .

SCHO-

## S C H O L I O N.

1010. Terminos ergo cylindricos ita sustentari convenit, ut contactus utrinque in unico fiat puncto, quia tum momentum frictionis minimum redditur: quem in finem eos cavitatibus MLN (fig. 132.) imponi expediet, quae in formam semicirculi crassitiem non multum superantis sint excavatae, ne situs, quem in motu obtinent, multum discrepet a situ quietis. Tum vero hos terminos cylindricos quam maxime tenues effici oportet, quantum quidem eorum firmitas ratione ponderis gestandi permittit. Praeterea etiam hi termini oleo aliave materia lubrica inungi solent, quo magis attritus diminuatur, fractionique minor valor concilietur. Interim tamen casu, quem sumus contemplat, motus mox extinguetur, quod fiet elapso tempore

$$t = \frac{(1 + \delta \delta) a a f i (\zeta + \eta)}{2 \delta f g (f i \zeta + f i \eta - \delta \cos \zeta + \delta \cos \eta)}$$

Quando autem vires adhibentur, ad motum conservandum, ex iisdem principiis earum quantitas definiri potest, ut motus maneat uniformis. Quin etiam huiusmodi machinae, dum in gyrum aguntur, ad onera elevanda instrui solent, quae operatio ut motu uniformi perficiatur, tantis viribus opus est, quae non solum oneris resistantiam, sed etiam frictionem superare valeant; quem casum, cum in vita communi frequentissime occurrat, hic evolvamur.

## P R O B L E M A. 8.

1011. Si cylindrus (fig. 129.) adhibeatur ad onus quodpiam elevandum, determinare vires ei applicandas, ut habita frictionis ratione motus servetur uniformis.

## S O L U T I O.

Incumbat alter terminus cylindricus, cujus radius  $GE = GF = f$  Fig. 134. binis planis inclinatis ML et NL, quae cum horizonte angulos faciant  $\zeta$  et  $\eta$ , quibus aequales erunt anguli, quos radii GE et GF ad puncta contactus E et F ducti cum recta verticali GH faciunt. Dum autem corpus in sensum EF gyratur, ope cordae in medio circumvolutae elevet onus = Q, quod pondere suo = Q vecti horizontali  $GS = s$  secundum directionem verticalem SQ motui reluctetur. Tum vero radio  $GR = r$ , a verticali GA declinanti angulo  $AGR = \theta$  jugiter applicata sit vis  $RP = P$  ad eum normalis, cujus quantitas quaeritur, ut motus maneat uniformis existente celeritate angulari circa axem  $GG = s$ . Quod-

si jam pondus ipsius corporis, per cuius centrum inertiae axis gyrationis GG transit, ponatur ut ante  $= M$ , et vires quibus alter terminus cylindricus a planis, quibus in E et F incumbit, repellitur, secundum EG  $= E$  et secundum FG  $= F$ , unde frictiones nascuntur secundum EM  $= \delta E$  et secundum FL  $= \delta F$ , supra vidimus, hinc eriri vim verticaliter sursum tendentem  $E \cos \zeta + F \cos \eta + \delta (E \sin \zeta - F \sin \eta)$ , et vim horizontalem dextorsum directam  $E \sin \zeta - F \sin \eta - \delta (E \cos \zeta + F \cos \eta)$ , quas ob binos terminos cylindricos duplicari oportet. Deinde ex pondere ipsius corporis habemus vim verticaliter deorsum nitentem  $= M$  et ex onere elevando vim  $= Q$ . Ex vi sollicitante P vero oritur vis deorsum urgens  $= P \sin \theta$ , et vis horizontaliter sinistrorsum  $= P \cos \theta$ : quae vires cum se mutuo debeant destruire, obtinebimus has aequationes:

$$\begin{aligned} E \cos \zeta + F \cos \eta + \delta (E \sin \zeta - F \sin \eta) &= \frac{1}{2} M + \frac{1}{2} Q + \frac{1}{2} P \sin \theta \\ E \sin \zeta - F \sin \eta - \delta (E \cos \zeta + F \cos \eta) &= \frac{1}{2} P \cos \theta \end{aligned}$$

unde colligimus

$$\begin{aligned} E \cos \zeta + F \cos \eta &= \frac{M + Q + P \sin \theta - \delta P \cos \theta}{2(1 + \delta \delta)} \\ E \sin \zeta - F \sin \eta &= \frac{M \delta + Q \delta + P \delta \sin \theta + P \cos \theta}{2(1 + \delta \delta)} \end{aligned}$$

hincque porro

$$\begin{aligned} E &= \frac{M(\sin \eta + \delta \cos \eta) + Q(\sin \eta + \delta \cos \eta) + P(\sin \eta + \delta \cos \eta) \sin \theta + P(\cos \eta - \delta \sin \eta) \cos \theta}{2(1 + \delta \delta) \sin(\zeta + \eta)} \\ F &= \frac{(M + Q + P \sin \theta)(\sin \zeta - \delta \cos \zeta) - P(\cos \zeta + \delta \sin \zeta) \cos \theta}{2(1 + \delta \delta) \sin(\zeta + \eta)} \end{aligned}$$

Praeterea vero, quia motum uniformem desideramus, momenta virium respectu axis gyrationis se destruire debent. Est autem momentum accelerans  $= Pr$ , et momenta opposita  $= 2\delta(E + F)f + Qr$ , unde necesse est sit  $Pr = 2\delta(E + F)f + Qr$ , ideoque

$$Pr - Qr = \frac{\delta(M + Q + P \sin \theta)(\sin \zeta + \sin \eta - \delta \cos \zeta + \delta \cos \eta) + \delta P(\cos \eta - \cos \zeta - \delta \sin \eta - \delta \sin \zeta) \cos \theta}{(1 + \delta \delta) \sin(\zeta + \eta)} f$$

hincque vim sollicitantem P definire licet.

Quodsi jam ponamus terminos cylindricos in cavitatibus circularibus sustineri, ut contactus unico loco fiat, ubi scilicet tangens ad horizontem inclinatur angulo  $= \zeta$ : erit  $F = 0$ , ideoque

$$(M + Q + P \sin \theta - \delta P \cos \theta) \tan \zeta = \delta(M + Q + P \sin \theta) + P \cos \theta$$

et

$$\text{et } E = \frac{M + Q + P \sin \theta - \delta P \cos \theta}{2(1 + \delta \delta) \cos \zeta}$$

$$\text{Inde colligitur } P = \frac{(M + Q)(\delta - \tan \zeta)}{(\sin \theta - \delta \cos \theta) \tan \zeta - \cos \theta - \delta \sin \theta}$$

quo valore in postrema aequatione, quae fit  $P r - Q r = 2 \delta E f$ , substituto prodeat

$$(M + Q) \delta f \cos \theta = (M + Q) r (\delta \zeta - \delta \cos \zeta) + Q r (\delta \theta - \delta \cos \theta) \delta \zeta - (\cos \theta + \delta \sin \theta) \cos \zeta$$

ubi si ponamus  $\delta = \tan \lambda$ , haec aequatio erit

$$(M + Q) f \delta \lambda \cos \theta = (M + Q) r \delta (\zeta - \lambda) - Q r \cos (\zeta + \theta - \lambda)$$

unde angulus  $\zeta$  erui debet, quo invento erit

$$P = \frac{(M + Q) f (\zeta - \lambda)}{\cos (\zeta + \theta - \lambda)}$$

$$\text{seu } P = \frac{Q r}{r} + \frac{(M + Q) f \delta \lambda \cos \theta}{r \cos (\zeta + \theta - \lambda)}$$

COROLL. 1.

1012. Si terminus cylindricus unico loco incumbat in alveolo cavo, pro  $P$  substituto valore prodeat pressio in eo loco

$$E = \frac{(M + Q) \cos \theta}{2(1 + \delta \delta) \cos \lambda \cos (\zeta + \theta - \lambda)} = \frac{(M + Q) \cos \lambda \cos \theta}{2 \cos (\zeta + \theta - \lambda)} \text{ posito } \delta = \tan \lambda$$

Haec ergo pressio evanescit casu  $\cos \theta = 0$ , nisi simul fiat  $\cos (\zeta + \theta - \lambda) = 0$ .

COROLL. 2.

1013. Posito autem  $\theta = 90^\circ$ , erit

$$(M + Q) r \delta (\zeta - \lambda) + Q r \delta (\zeta - \lambda) = 0$$

$$\text{quo ergo casu fit } \zeta = \lambda \text{ seu } \tan \zeta = \delta, \text{ et } P = \frac{Q r}{r} + \frac{(M + Q) f \delta \lambda}{r}$$

$$2. \text{ Cum autem sit } E = \frac{M + Q + P}{2(1 + \delta \delta) \cos \lambda}, \text{ erit } P r - Q r = \frac{\delta (M + Q + P) f}{(1 + \delta \delta) \cos \lambda}$$

$$= (M + Q + P) f \delta \lambda, \text{ et } P = \frac{Q r + (M + Q) f \delta \lambda}{r - f \delta \lambda}$$

CO.

## COROLL. 3.

1014. Si ponamus  $\theta = -90^\circ$ , primo ob  $F = 0$  habemus

$$(M + Q - P) \tan \zeta = \delta (M + Q - P)$$

tum vero cum sit  $E = \frac{M + Q - P}{2(1 + \delta\delta) \cos \zeta}$ , erit

$$Pr - Q_s = \frac{\delta f (M + Q - P)}{(1 + \delta\delta) \cos \zeta}$$

Quare si capiatur  $P = M + Q$ , pressio ideoque et frictio evanescit, sumique oportet  $r = \frac{Q_s}{M + Q}$ .

## COROLL. 4.

1015. Nisi autem hoc casu  $\theta = -90^\circ$  statuatur  $P = M + Q$ , erit

$$\tan \zeta = \delta, \text{ et } Pr - Q_s = \frac{\delta f (M + Q - P)}{r(1 + \delta\delta)} = f(M + Q - P) f \lambda \text{ hinc}$$

$$\text{que } P = \frac{Q_s + (M + Q) f f \lambda}{r + f f \lambda}. \text{ At } r \text{ ita sumi oportet, ut valor ip-}$$

sus  $E$  ne fiat negativus. Hoc enim casu sustentatio ex opposito fieret, ibique frictio oriretur.

## SCHOLION. I.

1016. Hoc ergo modo frictio penitus tolli posset, vim  $P$  ita applicando, ut cum pondere corporis  $M$  et onere  $Q$  aequilibrium constituat. Verum hic casus in praxi parum utilitatis haberet, quia termini cylindrici intra alveos suos, quos ipsis ampliores esse oportet, hinc inde vacillarent, quo incommodo motus magis quam frictione impediretur. Deinde vero pleraeque hujus generis machinae ita disponi solent, ut vis sollicitans  $P$  multo sit minor quam onus elevandum  $Q$ , ideoque multo magis  $P < M + Q$ . Si enim vim oneri aequalem impendere velimus, negotium sine machina absolvi posset, unde non mirum hoc casu frictionis lucrum obtineri posse. Ac si vis  $P$  pro data sumatur, ex nostris formulis elicitur  $r$ , pro loco applicationis: unde si celeritas angularis machinae sit  $= \epsilon$ , onus elevabitur celeritate  $\epsilon r$ , vis vero sollicitans agat celeritate  $= \epsilon r$ . Nisi ergo frictio motum impediret, foret  $P\epsilon r = Q\epsilon r$ , nunc autem ob frictionem erit  $P\epsilon r - Q\epsilon r = 2\delta E f$ : ubi observari convenit, denotare  $P\epsilon r$  actionem vis sollicitantis,  $Q\epsilon r$  vero quantitatem effectus uno minuto secundo producti, cum  $\epsilon r$  et

et fiat spatia uno minuto secundo confecta. Verum hæc ad Theoriam machinarum sunt referenda, quam seorsim pertractari convenit.

SCHOLIUM 2.

1017. Si vis sollicitans  $P$  cum angulo  $\theta$  fuerit data, quaeraturque distantia applicationis seu longitudo vectis  $GR = r$ , ex prima aequatione statim colligitur angulus  $\xi$  seu punctum  $E$ , ubi in cavitate fiet contactus, scilicet:

$$\text{tang } \xi = \frac{\delta(M + Q + P \sin \theta) + P \cos \theta}{M + Q + P \sin \theta - \delta P \cos \theta};$$

ad quem cognoscendum statuatur duo anguli  $\lambda$  et  $\xi$  ut sit

$$\text{tang } \lambda = \delta \text{ et } \text{tang } \xi = \frac{P \cos \theta}{M + Q + P \sin \theta}$$

eritque  $\text{tang } \zeta = \frac{\text{tang } \lambda + \text{tang } \xi}{1 - \text{tang } \lambda \text{ tang } \xi}$  ideoque  $\zeta = \lambda + \xi$ .

Unde patet fore  $\zeta > \lambda$ , si  $\cos \theta > 0$ , hoc est, si recta  $GR$  sursum vergat, sin autem deorsum dirigatur, fore  $\zeta < \lambda$ , quo casu fieri potest,

ut contactus fiat in infimo puncto, si scilicet fuerit  $P = \frac{\delta(M + Q)}{-\cos \theta - \delta \sin \theta}$ .

Tum vero habebitur pressio  $E = \frac{(M + Q + P \sin \theta - \delta P \cos \theta) \cos \lambda^2}{2 \cos(\lambda + \xi)}$  seu

$$E = \frac{P \cos \lambda \cos \theta}{2 \sin \xi} = \frac{1}{2} \cos \lambda r ((M + Q)^2 + 2P(M + Q) \sin \theta + PP)$$

hincque tandem concluditur longitudo vectis

$$GR = r = \frac{Q \delta}{P} + \frac{f \sin \lambda}{P} r ((M + Q)^2 + 2P(M + Q) \sin \theta + PP).$$

Ut igitur pro eadem vi sollicitante  $P$  pressio  $E$  ideoque et frictio fiat minima, angulum  $\theta$  esse oportet  $= -90^\circ$ , seu vectem  $GR$  in ipso radio  $GS$  capi convenit, quo casu fit, ut jam vidimus,  $\xi = 0$ , hincque  $\zeta = \lambda$ , et  $E = \frac{1}{2} (M + Q - P) \cos \lambda$

$$\text{atque } GR = r = \frac{Q \delta}{P} + \frac{f(M + Q - P) \sin \lambda}{P}$$

Investigemus nunc etiam motum penduli, terminis cylindricis simili modo suspensi, qui scilicet utrinque binis planis inclinatis incumbant:

O o o

et

et quia hic motus est reciprocus, ista plana aequaliter ad horizontem inclinata statui conveniet.

P R O B L E M A. 9.

1018. Si pendulum oscilletur circa axem horizontalem fixum, cujus termini cylindrici utrinque binis planis aequaliter inclinatis incumbant, definire ejus motum ob frictionem perturbatum.

S O L U T I O.

Fig. 135. Sit AEBF basis alterius termini cylindrici, qui incumbat planis ML et NL ad horizontem inclinatis angulo  $= \zeta$  erunt puncta contactus in E et F, ut radii GE et GF cum verticali ABLH angulos constituent  $= \zeta$ , quae omnia ad alteram partem perinde se habeant, ut axis gyrationis sit recta horizontalis GG. Sit porro penduli forma utrinque sibi similis, ac jam elapso tempore  $t$  declinet penduli centrum inertiae I a situ verticali angulo  $HGI = \varphi$ , unde ad situm verticalem accedat celeritate angulari  $= \omega$ , ita ut motus gyratorius fiat in sensum EBF. Sit massa tota idemque pondus penduli  $= M$ , distantia  $GI = b$ , et momentum inertiae ejus respectu axis gyrationis  $GG = Mkk$ . Quod ergo ad actionem gravitatis attinet, totum pondus  $M$  in puncto I collectum concipere licet.

Ponatur jam terminorum cylindricorum radius  $GE = GF = f$ , sintque vires, quibus ii a planis sustentantur, secundum  $EG = E$  et secundum  $GF = F$ : unde frictiones erunt secundum  $EM = \delta E$ , et secundum  $FL = \delta F$ .

Ex his autem viribus ut supra §. 1005. ubi  $\eta = \zeta$  nascuntur primo vis verticalis sursum tendens  $= (E + F) \cos \zeta + \delta (E - F) \sin \zeta$  et vis horizontalis dextrorsum directa  $= (E - F) \sin \zeta - \delta (E + F) \cos \zeta$ . Pondus autem praebet vim deorsum tendentem  $= M$ .

Unde pro motu progressivo seu motu centri inertiae I habemus primo vim verticaliter deorsum directam:

$$M - 2(E + F) \cos \zeta - 2\delta(E - F) \sin \zeta = P$$

et vim dextrorsum tendentem horizontalem

$$2(E - F) \sin \zeta - 2\delta(E + F) \cos \zeta = Q$$

Motus autem hujus, cum celeritas centri inertiae sit  $= b\omega$ , celeritas verticalis deorsum tendens est  $= b\omega \sin \varphi$  et celeritas horizontalis dextrorsum directa  $= b\omega \cos \varphi$ , unde colligimus:

$$\frac{b d \omega \sin \varphi + b \omega d \varphi \cos \varphi}{2g dt} = \frac{P}{M} \text{ et } \frac{b d \omega \cos \varphi - b \omega d \varphi \sin \varphi}{2g dt} = \frac{Q}{M}$$

ubi

ubi est  $u dt = -d\phi$ . Deinde cum corpus circa axem fixum GG gyretur, cujus respectu est momentum virium ad accelerandum  $= M b f \phi - 2\delta (E + F) f$ , erit

$$\frac{du}{2g dt} = \frac{M b f \phi - 2\delta (E + F) f}{M k k}$$

Qui valor si in illis substituatur, habebimus

$$\frac{M b h f \phi^2 - 2\delta (E + F) f b f \phi}{M k k} - \frac{b u u \cos \phi}{2g} = \frac{P}{M}$$

$$\frac{M b b f \phi \cos \phi - 2\delta (E + F) f b \cos \phi}{M k k} + \frac{b u u f \phi}{2g} = \frac{Q}{M}$$

hincque

$$\frac{M b b f \phi - 2\delta (E + F) f b}{M k k} = \frac{P f \phi + Q \cos \phi}{M} \text{ et}$$

$$\frac{b u u}{2g} = \frac{Q f \phi - P \cos \phi}{M},$$

ex quibus quantitibus pressiones E et F definiri debent.

Cum autem sit  $P + \delta Q = M - 2(1 + \delta\delta)(E + F) \cos \zeta$ , erit

$$M - 2(1 + \delta\delta)(E + F) \cos \zeta = \frac{M b b f \phi (f \phi + \delta \cos \phi) - 2\delta (P + F) f b (f \phi + \delta \cos \phi)}{k k} - \frac{M b u u (\cos \phi - \delta f \phi)}{2g}$$

hincque

$$2(E + F)((1 + \delta\delta) k k \cos \zeta - \delta f b (f \phi + \delta \cos \phi)) = M k k - M b b f \phi (f \phi + \delta \cos \phi) + \frac{M b k k u u (\cos \phi - \delta f \phi)}{2g}$$

unde valor ipsius E + F substitutus praebet

$$\frac{du}{2g dt} = \frac{(1 + \delta\delta) b \cos \zeta f \phi - \delta f - \frac{\delta f b u u (\cos \phi - \delta f \phi)}{2g}}{(1 + \delta\delta) k k \cos \zeta - \delta f b (f \phi + \delta \cos \phi)}$$

ex qua aequatione motus penduli ope formulae  $u dt = -d\phi$  determinari potest.

Ooo 2

CO:



## COROLL. 1.

1019. De pressione in E nullum est dubium, quin ea fiat positiva; sed pressio in F sequenti modo determinatur.

$$2F((1+\delta\delta)k\zeta + \frac{2\delta fb}{kk} \cos \zeta \cos \varphi - \frac{2\delta\delta fb}{kk} \cos \zeta \sin \varphi) =$$

$$M(\sin \zeta - \delta \cos \zeta + \frac{\delta fb}{kk} \cos \varphi) - \frac{Mbb\sin \varphi}{kk} (\cos(\zeta - \varphi) + \delta \sin(\zeta - \varphi))$$

$$+ \frac{Mbb\sin \varphi}{2g} (\sin(\zeta - \varphi) - \delta \cos(\zeta - \varphi) + \frac{\delta fb}{kk} \cos 2\varphi)$$

unde valor ipsius F positivus prodire debet, quod fit, dum fuerit  $\tan \zeta > \delta$  existente  $\varphi$  angulo parvo.

## COROLL. 2.

1020. Si frictio esset nulla seu  $\delta = 0$ , foret  $\frac{dy}{2gdt} = \frac{b\sin \varphi}{kk}$ , unde motus pendulorum supra definitus facile eruitur, pro pressionibus autem E et F haberemus has aequationes:

$$2(E+F)kk \cos \zeta = M(kk - bb \sin^2 \varphi + \frac{bkk\sin \varphi \cos \varphi}{2g})$$

$$\text{et } 2Fk^2 \sin \zeta = M(kk \zeta - bb \sin \varphi \cos(\zeta - \varphi) + \frac{bkk\sin \varphi \sin(\zeta - \varphi)}{2g})$$

$$\text{et } 2Ek^2 \sin \zeta = M(kk \sin \zeta + bb \sin \varphi \cos(\zeta + \varphi) + \frac{bkk\sin \varphi \sin(\zeta + \varphi)}{2g})$$

quarum utraque ut sit positiva debet esse:

$$\tan \zeta > \frac{2gbb\sin \varphi \cos \varphi + bkk\sin \varphi}{2gkk - 2gbb\sin^2 \varphi + bkk\sin \varphi \cos \varphi}$$

ubi notandum est, esse  $kk > bb$ .

## COROLL. 3.

1021. Aequatio differentialis inventa ob  $dt = \frac{-d\varphi}{y}$  abit in hanc

formam

$$0 = ydy((1+\delta\delta)kk \cos \zeta - \delta fb(\sin \varphi + \delta \cos \varphi)) - \delta fb\sin \varphi$$

$$(\cos \varphi - \delta \sin \varphi)$$

+2

+ 2 (1 + dd) gb dφ cos ζ fi φ - 2 dfg dφ  
 quae per (1 + dd) kk cos ζ - dfb (fi φ + d cos φ) multiplicata fit integrabilis, proditque

$$C = \frac{1}{2} ((1 + dd) kk \cos \zeta - dfb (fi \phi + d \cos \phi))^2 + 4g/d\phi ((1 + dd) b \cos \zeta fi \phi - d f) ((1 + dd) kk \cos \zeta - d fb (fi \phi + d \cos \phi)).$$

SCHOLION.

1022. Si hoc integrale evolamus, reperiemus

$$C = \frac{1}{2} ((1 + dd) kk \cos \zeta - d fb (fi \phi + d \cos \phi))^2 - 4(1 + dd)^2 g b k k \cos \zeta^2 \cos \phi - d(1 + dd) f g b b \cos \zeta (2 \phi - fi 2 \phi - d \cos 2 \phi) - 4 d(1 + dd) f g k k \phi \cos \zeta - 4 d d f f g b (\cos \phi - \zeta fi \phi).$$

Quare si sumamus angulum HGI initio fuisse = θ, indeque pendulum a quiete descensum inchoasse, constans C ita definitur, ut sit

$$C = -4(1 + dd)^2 g b k k \cos \zeta^2 \cos \theta - \zeta^2 (1 + dd) f g b b \cos \zeta (2 \theta - fi 2 \theta - d \cos 2 \theta) - 4 d(1 + dd) f g k k \theta \cos \zeta - 4 d d f f g b (\cos \theta - d fi \theta)$$

quo valore substituto pendulum ex altera parte eousque ascendet, donec iterum fiat  $y = 0$ . Verum hanc determinationem in genere suscipere haud licet, Neque vero ipsum problema in latissimo sensu resolvimus, ut ad omnia cujuscunque formae pendula pateret, sed primo assumimus, binos terminos cylindricos utrinque a centro gravitatis aequae esse remotos: deinde etiam talem structuram statuimus, ut recta per centrum inertiae I axi gyrationis GG parallela ducta simul esset corporis axis principalis. Quae conditio nisi locum haberet, non licuisset momenta virium statim ad axem gyrationis GG transferre, sed etiam ratio habenda fuisset virium obliquarum, quae in terminis axis GG inaequales pressiones prodixissent, ideoque formulae multo magis intricatae prodissent. Ut igitur hinc quicquam ad usum concludamus, statuamus oscillationes esse minimas, et quomodo earum motus a frictione perturbetur, diligentius investigemus.

PROBLEMA. 10.

1023. Si pendulum eo modo suspensum, uti in problemate prae- Fig. 135. cedente assumimus, oscillationes peragat quam minimas, earum motum a frictione perturbatum determinare.

## SOLUTIO.

Maneant omnia uti in problemate praecedente constituimus, ac si initio pendulum ad angulum  $HGI = \theta$  fuerit declinatum, unde descensum ex quiete inchoaverit, elapso autem tempore  $t$  angulus  $HGI$  sit  $= \varphi$ , et celeritas angularis in sensum  $IH = u$ , in praesenti hypothefi anguli  $\theta$  et  $\varphi$  erunt minimi, qui ergo loco finium et cosinum ita introducantur, ut eorum potestates quadrato altiores rejiciantur. Hinc aequatio integralis §. praec. eruta induet hanc formam:

$$C = uu \left( (1 + \delta\delta) kk \cos \zeta - \delta fb (\varphi + \delta - \frac{1}{2} \delta\varphi\varphi) \right)^2 - 4 \\ (1 + \delta\delta)^2 gbkk \cos \zeta^2 (1 - \frac{1}{2} \delta\varphi\varphi) \\ + \delta\delta (1 + \delta\delta) fgbb \cos \zeta (1 - \varphi\varphi) - 4\delta (1 + \delta\delta) fgkk \varphi \cos \zeta \\ - 4 \delta\delta fggb (1 - \delta\varphi - \frac{1}{2} \delta\varphi\varphi) \\ \text{ubi constans } C = -4 (1 + \delta\delta)^2 gbkk \cos \zeta^2 (1 - \frac{1}{2} \delta\theta\theta) + \delta\delta (1 + \delta\delta) \\ fgbb \cos \zeta (1 - 2\theta\theta) \\ - 4\delta (1 + \delta\delta) fgkk \theta \cos \zeta - 4\delta\delta fggb (1 - \zeta\theta - \frac{1}{2} \theta\theta).$$

Hac igitur aequatione evoluta obtinebimus:

$$uu \left( (1 + \delta\delta) kk \cos \zeta - \delta\delta fb \right)^2 = \\ 2gb \left( (1 + \delta\delta)^2 kk \cos \zeta^2 - \delta\delta (1 + \delta\delta) fb \cos \zeta + \delta\delta ff \right) (\theta\theta - \varphi\varphi) \\ - 4\delta fg \left( (1 + \delta\delta) kk \cos \zeta - \delta\delta fb \right) (\theta - \varphi)$$

ubi in coefficiente ipsius  $uu$  angulum  $\varphi$  neglexi, quia in evolutione perducturus esset ad altiores potestates. Ad hanc aequationem resolvendam statuamus brevitatis gratia:

$$(1 + \delta\delta) kk \cos \zeta - \delta\delta fb = A \\ (1 + \delta\delta)^2 kk \cos \zeta^2 - \delta\delta (1 + \delta\delta) fb \cos \zeta + \delta\delta ff = B$$

ut fit

$$AA uu = 2Bgb (\theta\theta - \varphi\varphi) - 4A\delta fg (\theta - \varphi)$$

unde ponendo  $u = 0$  invenimus, quousque pendulum sit ascensurum, donec iterum ad quietem perducatur. Divisione autem per  $2g (\theta - \varphi)$  instituta oritur

$$Bb (\theta + \varphi) - 2A\delta f = 0$$

hincque  $\varphi = -\theta + \frac{2A\delta f}{Bb}$ , seu ad alteram partem ultra  $H$  tantum per

angulum  $\theta - \frac{2A\delta f}{Bb}$  ascendet.

Porro ad durationem hujus oscillationis investigandam, cum fit  $u =$

$$\frac{r(2Bgb(\theta\theta - \varphi\varphi) - 4A\delta fg(\theta - \varphi))}{A} = \frac{-d\varphi}{dt}, \text{ erit}$$

dt

$$dt = \frac{-A d\varphi}{r(2Bgb(\theta - \varphi) - 4A\delta f g(\theta - \varphi))} \text{ seu}$$

$$dt = \frac{-A d\varphi}{r 2g(\theta - \varphi)(Bb(\theta + \varphi) - 2A\delta f)}$$

unde integrando colligitur:

$$t = \frac{A}{r 2Bgb} \cdot \text{Arc. } \cos \frac{Bb - \varphi A\delta f}{Bb\theta - A\delta f}$$

Statuatur nunc  $\varphi = -\theta + \frac{2A\delta f}{Bb}$  seu  $Bb\varphi - A\delta f = -Bb\theta + A\delta f$ , erit

tempus oscillationis integrae =  $\frac{\pi A}{r 2Bgb}$ ; quod ergo non pendet ab

amplitudine oscillationis, ita ut omnes oscillationes minimae maneant isochronae perinde ac si nulla frictio adefset. Sed non pari tempore absolventur. Quantum autem frictio tempus cujusque oscillationis tur-

bet, quaeratur valor  $\frac{A}{rB}$ , ubi si crassitiem terminorum cylindricorum

seu  $f$  ut minimam spectamus, est  $\frac{A}{rB} = \frac{A}{(1+\delta\delta)k \cos \zeta} +$

$\frac{\delta\delta f b}{2(1+\delta\delta)^2 k^2 \cos^2 \zeta}$  ideoque  $\frac{A}{rB} = k - \frac{\delta\delta f b}{2(1+\delta\delta)k \cos \zeta}$ : quare

tempus unius oscillationis =  $\frac{\pi}{r 2gb} \left( k - \frac{\delta\delta f b}{2(1+\delta\delta)k \cos \zeta} \right)$ , unde pa-

tet, ob frictionem tempora oscillationum minui.

#### COROLL. I.

1024. Si radius terminorum cylindricorum  $f$  sit valde exiguus prae quantitibus  $b$  et  $k$ , erit proxime  $B = A(1 + \delta\delta) \cos \zeta$ . Hinc si primus arcus descensus sit  $= \theta$ , erit sequens arcus ascensus  $= \theta -$

$\frac{2\delta f}{(1+\delta\delta)b \cos \zeta}$ , qui simul est arcus descensus in secunda oscillatione.

CO-

## COROLL. 2.

1025. Oscillationes ergo successivæ sequenti modo se habebunt:

| In Oscillatione | arcus descensus   | arcus ascensus  | tôtus arcus   |
|-----------------|---|---|---|
| prima           | $\theta$  | $\theta - \frac{2\delta f}{(1+\delta\delta)b\cos\zeta}$ | $2\theta - \frac{2\delta f}{(1+\delta\delta)b\cos\zeta}$  |
| secunda         | $\theta - \frac{2\delta f}{(1+\delta\delta)b\cos\zeta}$ | $\theta - \frac{4\delta f}{(1+\delta\delta)b\cos\zeta}$ | $2\theta - \frac{6\delta f}{(1+\delta\delta)b\cos\zeta}$  |
| tertia          | $\theta - \frac{4\delta f}{(1+\delta\delta)b\cos\zeta}$ | $\theta - \frac{6\delta f}{(1+\delta\delta)b\cos\zeta}$ | $2\theta - \frac{10\delta f}{(1+\delta\delta)b\cos\zeta}$ |
| quarta          | $\theta - \frac{6\delta f}{(1+\delta\delta)b\cos\zeta}$ | $\theta - \frac{8\delta f}{(1+\delta\delta)b\cos\zeta}$ | $2\theta - \frac{14\delta f}{(1+\delta\delta)b\cos\zeta}$ |

## COROLL. 3.

1026. Oscillationes tandiu durabunt, quamdiu arcus ascensuum manent positivi. Statim enimque ac vel evanescent, vel adeo negativi evadunt, motus omnis cessat. Atque ut motus oriatur, necesse est, ut sit

$\theta > \frac{A\delta f}{Bb}$ , si enim fuerit  $\theta =$  vel  $< \frac{A\delta f}{Bb}$  pendulum ob frictionem plane in quiete coercetur, et si teneat situm inclinatum.

## COROLL. 4.

1027. Ut ergo pendulum saltem unam oscillationem peragat, debet esse  $\theta > \frac{A\delta f}{Bb}$  existente  $\frac{A}{B} = \frac{1}{(1+\delta\delta)\cos\zeta}$ : ut duas peragat os-

cillationes, debet esse  $\theta > \frac{3A\delta f}{Bb}$ : ut tres, debet esse  $\theta > \frac{5A\delta f}{Bb}$ , at-

que in genere, ut peragat  $n$  oscillationes, debet esse  $\theta > \frac{(2n-1)A\delta f}{Bb}$ .

Verum hic numerum  $n$  majorem assumere non licet, quam ut angulus  $\theta$  adhuc satis parvus maneat.

## SCHOLIUM I.

1028. Quod ad diminutionem temporis oscillationum singularum attinet, notasse juvabit, significare  $\frac{kk}{b}$  distantiam centri oscillationis ab

axe

axe gyrationis, quae si ponatur  $= l$ , erit tempus unius oscillationis  $=$

$$\frac{\pi r l}{r^2 g} \left( 1 - \frac{\delta \delta f}{2(1 + \delta \delta) \cos \zeta} \right). \text{ Hic autem primum observetur, capi de-}$$

bere  $\tan \zeta > \delta$ , ut axis GG in loco suo maneat immotus. Quare si fuerit  $l = 3$  pedum, quo casu pendulum, nisi frictio obstar, fere singulis minutis secundis oscillationes absolveret; axiculorum autem radius sit  $f = \frac{1}{300}$  pedis, tum vero sumatur  $\delta = \frac{1}{2}$  et  $\zeta = 20^\circ$ , fiet tem-

$$\text{pus unius oscillationis} = \frac{\pi r l}{r^2 g} \left( 1 - \frac{1}{15151} \right); \text{ ita ut ob frictionem de-}$$

minum post 28101 oscillationes peractas seu post 8 fere horas error unius minuti secundi producat. Hoc eodem casu ut pendulum  $\pi$  oscillationes peragere possit, antequam ad quietem redigatur, debet esse  $\theta >$

$$\frac{2\pi - 1}{4008}, \text{ seu } \theta > 4, 3905 (2\pi - 1) \text{ min. sec. Quare si 100 oscillationes}$$

absolvere debeat, primum sumi debet  $\theta > 874''$  seu  $\theta > 14', 34''$ .

Quod si ergo  $\theta$  capiatur  $= 5^\circ$ , pendulum peraget oscillationes 2050, antequam ad quietem redigatur. Si  $f$  sit major vel minor quam  $\frac{1}{300}$ , effectus frictionis in eadem ratione major vel minor evadet.

### SCHOLION. 2.

1029. Cum jam determinaverimus motum corporum circa axem fixum, ad alias motus species progrediamur, quibus corpus, dum movetur, ad superficiem quandam atteritur. Hic igitur praecipue figura corporis, quatenus successive aliae atque aliae partes superficiei applicantur, spectari debet: ubi quidem ejusmodi corpora occurrunt, quae unico tantum puncto eodemque perpetuo superficiem tangunt. Hic scilicet est casus turbinum in cuspidem desinentium, qua continuo superficiei insistant, quorum motum, quantum ob frictionem cuspidis perturbetur, definiri conveniet. Deinde occurrunt corpora, quae unico quidem puncto perpetuo superficiem tangunt, quod autem jugiter varietur, quemadmodum fit, si globi aliave corpora sphaeroidica super quadam superficie moveantur, ac praeter motum progressivum motu gyatorio quocumque ferantur. His casibus ad effectum frictionis cognoscendum directio motus, quo punctum contactus superficiem terit, quovis momento est spectanda, quippe cui directio vis frictionis est contraria. Sequuntur casus, quibus corpus eadem quidem basi superficiem perpetuo tangit, uti fit in motu progressivo, sed ubi corpus simul gyratur circa axem ad basin normalem, ita ut ipsa basis super-

Ppp

super-

superficie in gyrum agatur. Porro progrediamur ad motus corporum cylindricorum super planis superficiebus, ubi contactus perpetuo fit secundum lineam rectam, ex cuius motu et appensione frictio est definenda. Quae autem corpora figuram ejusmodi habent, angulosam, ut dum moventur, aliae atque aliae hedrae superficiei applicentur, quoniam conflictus talem motum comitatur, dum nova hedra ad contactum pertingit, eorum motus hic nondum evolvere licet, sed prius ratio conflictus explicari debet. Secundum hanc ergo divisionem motum turbinum in cuspidem desinentium super plano horizontali determinare aggrediamur.

## CAPUT IV. DE MOTU TURBINUM IN CUSPIDEM DESINENTIUM SUPER PLANO HORIZONTALI FRICTIONIS HABITATIONE.

### P R O B L E M A. II.

Fig. 136. 1030. Si turbo super plano horizontali moveatur utcumque, deturque singulis momentis ejus pressio in planum, definire frictionem motumque turbinis progressivum.

### S O L U T I O.

Repraesentet tabula planum horizontale, super quo turbo incidit, cujus axis transiens per centrum inertiae et cuspidem nunc elapso tempore  $t$  situm teneat AIF, ut I sit centrum inertiae in sublimi situm, F vero cuspis, qua fit contactus in plano horizontali; voceturque intervallum  $IF = f$ , quod est constans. Ex I in planum demittatur perpendicularum IG, et sumta in plano recta directrix OV ad fixam mundi plagam spectante, ad eam ex G et F ducantur normales GX et FZ, itemque per G recta KL ipsi OV parallela. Ponatur angulus FIG  $= \varphi$ , qui exprimit declinationem axis turbinis AF a linea verticali: et angulus KGH  $= \phi$ , qui praebet declinationem plani verticalis, in quo sit axis turbinis, a plano verticali super OV vel LK constructo.

# CAPUT IV. DE MOTU TURBINUM IN &c. 483

ſto. Erit ergo  $GI = f \cos \varphi$  et  $GF = f \sin \varphi$ : tum vero  $GN = f \sin \varphi \cos \varphi$  et  $FN = f \sin \varphi \sin \varphi$ . Praeterea vero ſit  $OX = x$ , et  $XG = y$ ; unde pro puncto F ſit  $OL = x - f \sin \varphi \cos \varphi$  et  $LF = y + f \sin \varphi \sin \varphi$ : ex quibus motus cuspidis F colligi poteſt, ejus celeritas ſecundum directionem OV vel NG eſt  $= \frac{dx - f d \sin \varphi \cos \varphi}{dt}$ , et celeritas ſecundum di-

rectionem NF  $= \frac{dy + f d \sin \varphi \sin \varphi}{dt}$ ; quarum utraque niſi evaneſcat, cu-

ſpis F ſuper plano movebitur frictionemque excitabit; ad cujus directionem inveniendam, ſit Ff directio ſecundum quam cuspidis progreditur, quae retro in L producta dabit directionem frictionis FL, pro qua

ponatur angulus FLG  $= \omega$  eritque  $\text{tang } \omega = \frac{dy + f d \sin \varphi \sin \varphi}{dx - f d \sin \varphi \cos \varphi}$ . Sit jam

preſſio, quam cuspidis in planum exerit  $= \Pi$ , pondere totius turbinis exiſtente  $= M$ , atque ob frictionem turbo in F ſollicitatur ſecundum directionem FL vi  $= \partial \Pi$ , quae reſoluta dat vim ſec. XO  $= \partial \Pi \cos \omega$  et ſec. FZ  $= \partial \Pi \sin \omega$ . Ad motum ergo progreſſivum centri inertiae I deſiniendum, praeter has vires frictionis, ei applicata concipiatur vis deorſum urgens ſecundum IG,  $= M - \Pi$ , ac principia motus ſuppeditabunt has ternas aequationes:

$$\frac{ddx}{2g dt^2} = \frac{-\partial \Pi \cos \omega}{M}; \quad \frac{ddy}{2g dt^2} = \frac{-\partial \Pi \sin \omega}{M}$$

$$\text{et } \frac{f d d \cos \varphi}{2g dt^2} = -1 + \frac{\Pi}{M}$$

unde ſtatim colligimus  $ddx \sin \omega = ddy \cos \omega$ . Ex his aequationibus, ſi

anguli  $\varphi$  et  $\omega$  ad tempus  $t$  ut cogniti ſpectentur, inde primo  $\frac{\Pi}{M}$  tum vero differentialia  $dx$  et  $dy$  determinantur; ex iisque tandem angulus  $\varphi$

$$\text{ex formula } \text{tang } \omega = \frac{dy + f d \sin \varphi \sin \varphi}{dx - f d \sin \varphi \cos \varphi}$$

## COROLL. I.

1031. Si pro  $\frac{\Pi}{M}$  valor inventus per  $\varphi$  ſubſtituatur, pro quantitatibus  $x$  et  $y$  determinandis habebimus has aequationes differentiales ſecundi gradus.

Ppp 2

ddx



484 CAPUT IV. DE MOTU TURBINUM IN

$$\begin{aligned} ddx &= -2\delta g dt^2 \cos \omega - df \cos \omega d\delta \cos \varphi \\ ddy &= -2\delta g dt^2 \sin \omega - df \sin \omega d\delta \cos \varphi \end{aligned}$$

C O R O L L. 2.

1032. Pro directione frictionis FL, ratione rectae FH, cum sit angulus LGF =  $\Phi$  et angulus FLG =  $\omega$ , erit angulus GFL =  $180^\circ - \Phi - \omega$ ; ipsa autem frictio est =  $\delta \Pi$ ; nisi sit celeritas cuspidis F nulla, quo casu frictio subito evanescit; id quod evenit, si fuerit  $dx = fd. \sin \varphi \cos \Phi$  et  $dy = -fd. \sin \varphi \sin \Phi$ .

SCHOLION.

1033. Ex his aequationibus nihil adhuc concludere licet, cum relatio variabilium  $\omega$  et  $\Pi$  seu  $\varphi$  ad tempus  $t$  nondum constet, quae demum ex motu gyatorio erui debet. His autem inventis, per formulas hic traditas variables  $x$  et  $y$ , sicque motus progressivus centri inertiae I definiri poterit. Quamobrem angulum  $\omega$  in determinationem motus gyatorii introducamus, etiam si ejus relatio ad angulos  $\varphi$ ,  $\Phi$  et tempus assignari possit. Cum enim sit

$$dy \cos \omega + f \cos \omega d. \sin \varphi \sin \Phi - dx \sin \omega + f \sin \omega d. \sin \varphi \cos \Phi = 0$$

quo  $x$  et  $y$  facilius elidere queamus, ponamus

$$f \cos \omega d. \sin \varphi \sin \Phi + f \sin \omega d. \sin \varphi \cos \Phi = s dt$$

$$\text{ut sit } dy \cos \omega - dx \sin \omega + s dt = 0;$$

quae aequatio differentiatia ob  $ddy \cos \omega = ddx \sin \omega$  dat

$$-dy \sin \omega - dx \cos \omega + \frac{ds dt}{d\omega} = 0.$$

Differentietur porro, et ob  $ddy \sin \omega + ddx \cos \omega = \frac{-2\delta g \Pi dt^2}{M}$  prodit

$$\frac{2\delta g \Pi dt^2}{M} - dy d\omega \cos \omega + dx d\omega \sin \omega + dt d. \frac{ds}{d\omega} = 0;$$

addatur prima per  $d\omega$  multiplicata, fietque per  $dt$  dividendo

$$\frac{2\delta g \Pi dt}{M} + s d\omega + d. \frac{ds}{d\omega} = 0,$$

qua aequatione relatio inter  $s$ ,  $\omega$ ,  $\Pi$  et  $t$  exprimitur, quae forte in sequentibus usum habebit. Involvit autem  $s$  angulos  $\varphi$ ,  $\Phi$  et  $\omega$ , estque

$$\frac{\Pi}{M} = 1 + \frac{fd d. \cos \varphi}{\varphi g dt^2}, \text{ ita ut hic adhuc insint quatuor variables } \varphi, \Phi, \omega \text{ et } t.$$

PRO-

PROBLEMA 12.

1034. Dum turbo utcumque super plano horizontali movetur, et frictionem patitur, determinare virium, quibus sollicitatur, momenta respectu axium principalium turbinis.

SOLUTIO

In sphaera centro inertiae turbinis I descripta repraesentet circulus GZH planum verticale, in quo jam axis turbinis per centrum inertiae I et cuspidem F ductus AIF versetur, qui simul sit axis principalis turbinis, ejusque respectu momentum inertiae =  $Maa$ , bini reliqui vero axes principales ex I ad sphaerae puncta B et C pertingant, quorum respectu sint momenta inertiae aequalia =  $Mcc$ , ita ut in formulis nostris generalibus sit  $bb = cc$  quemadmodum jam supra assumimus. Posito, Z puncto sphaerae verticali; erit arcus  $ZA = \varphi$ , ponamus autem ductis arcibus ZB et ZC, ut supra  $ZA = l$ ,  $ZB = m$ , et  $ZC = n$ , ut sit  $\varphi = l$ . His positis vires, quibus turbo sollicitatur, sunt primo ejus pondus =  $M$ , quae vis centro inertiae I applicata nulla praebet momenta; deinde adest pressio, qua planum horizontale in cuspidem F reagit, cujus directio est verticalis sursum directio FI, quae vis sit =  $\Pi$ ,

Fig. 137.

vidimusque esse  $\frac{\Pi}{M} = 1 + \frac{fdd \cos \varphi}{2gdz}$ . Denique sollicitatur turbo in F a frictione =  $\delta\Pi$ , nisi cuspis quiescat, cujus directio FL est horizontalis: ac pro ejus situ ducatur circulus maximus horizontalis GAH, in quo capiatur secundum §. 1032. arcus  $HA = 180^\circ - \varphi - \omega$  seu  $GA = \varphi + \omega$ , ubi  $\varphi$  denotat declinationem plani GZH a plano quodam verticali fixo; angulus  $\omega$  autem ex formulis in praecedente problemate traditis definiri debet: eritque directio FL radio IA parallela. Iam ad virium harum momenta respectu axium principalium investiganda; primum ipsae vires secundum directiones horum axium resolvantur, quem in finem ut in centro inertiae applicatae considerentur. Vis ergo  $F\Pi = \Pi$ , in directione IZ applicata praebet vim sec. IA =  $\Pi \cos ZA = \Pi \cos l$ ; vim sec. IB =  $\Pi \cos ZB = \Pi \cos m$  et vim sec. IC =  $\Pi \cos ZC = \Pi \cos n$ . Deinde vis FL =  $\delta\Pi$  in IA applicata resolvitur in vires 1<sup>o</sup> sec. IA =  $\delta\Pi \cos AA$ , 2<sup>o</sup> sec. IB =  $\delta\Pi \cos BA$ , 3<sup>o</sup> sec. IC =  $\delta\Pi \cos CA$ . Ad has autem evolvendas sit ZX ille circulus verticalis fixus, ideoque angulus XZA =  $\varphi$ , ponamus autem ut supra angulos XZA =  $\lambda$ , XZB =  $\mu$  et XZC =  $\nu$ , ut sit  $\varphi = \lambda$ , et ob  $AZ\lambda = 180^\circ - \lambda - \omega$ , erit  $XZ\lambda = 180^\circ - \omega$ , hincque  $BZ\lambda = \mu + \omega - 180^\circ$ , et  $CZ\lambda = 180^\circ - \nu - \omega$ , unde ob ZA quadrantem prodit  $\cos AA = -\cos(\lambda + \omega)$ .

PPP 3

# 486 CAPUT IV. DE MOTU TURBINUM IN

$\cos BA = -f m \cos(\mu + \omega)$  et  $\cos CA = -f n \cos(\nu + \omega)$ . Quocirca habebimus

$$\text{viii sec. IA} = \pi \cos l + \delta \pi f l \cos(\lambda + \omega)$$

$$\text{viii sec. IB} = \pi \cos m - \delta \pi f m \cos(\mu + \omega)$$

$$\text{viii sec. IC} = \pi \cos n - \delta \pi f n \cos(\nu + \omega)$$

has autem vires nunc in puncto F applicatas concipi oportet, existente  $IF = f$ ; unde momenta earum respectu axium principalium, quae supra litteris P, Q, R designavimus, concluduntur

$$P = 0,$$

$$Q = \pi f \cos n - \delta f \pi f n \cos(\nu + \omega)$$

$$R = -\pi f \cos m + \delta \pi f f m \cos(\mu + \omega).$$

## PROBLEMA. 13.

1035. His virium momentis inventis exhibere aequationes, quibus motus turbine super plano horizontali incidentis et a frictione perturbatus, contineatur.

## SOLUTIO.

Fig. 137. Primo pro motu gyatorio tenet elapso tempore  $t$  turbo situm in figura representatum, ubi omnes denominationes modo factae maneat. Ac nunc gyretur turbo circa axem IO in sensum ABC celeritate angulari  $= \omega$ , pro puncto O autem sint arcus  $AO = a$ ,  $BO = b$ ,  $CO = \gamma$ , ponaturque

$$a \cos a = x, \quad b \cos b = y, \quad \gamma \cos \gamma = z,$$

quae quantitates per momenta modo inventa ita determinantur, ut primo sit  $dx = 0$ , ideoque  $x = \text{const}$ . Ponatur ergo  $x = b$ , et pro  $y$  et  $z$  has habebimus aequationes

$$dy + \frac{(aa - cc)}{cc} bz dt = \frac{2\pi f g d t}{Mcc} (\cos n - \delta f n \cos(\nu + \omega))$$

$$dz - \frac{(aa - cc)}{cc} by dt = \frac{-2\pi f g d t}{Mcc} (\cos m - \delta f m \cos(\mu + \omega)).$$

Tum vero pro arcibus  $l, m, n$  itemque angulis  $\lambda, \mu, \nu$  ostendimus esse:

$$d f l = d t (\gamma \cos n - x \cos m); \quad d \lambda f l^2 = - d t (\gamma \cos n + z \cos m)$$

$dm \sin m = dt (z \cos l - b \cos n)$ ;  $d\mu \sin m^2 = -dt (z \cos n + b \cos l)$   
 $dn \sin n = dt (b \cos m - y \cos l)$ ;  $dv \sin n^2 = -dt (b \cos l + y \cos m)$   
 ubi praeterea haec relationes sunt notandae:

$$\cos(\mu - \lambda) = \frac{-\cos l \cos m}{\sin l \sin m}; \cos(v - \lambda) = \frac{-\cos l \cos n}{\sin l \sin n}$$

$$\sin(\mu - \lambda) = \frac{-\cos n}{\sin l \sin m}; \sin(v - \lambda) = \frac{+\cos m}{\sin l \sin n}$$

unde anguli  $\mu$  et  $v$  per  $\lambda$  ita definiuntur:

$$\cos \mu = \frac{-\cos \lambda \cos l \cos m + \sin \lambda \cos n}{\sin l \sin m}; \cos v = \frac{-\cos \lambda \cos l \cos n - \sin \lambda \cos m}{\sin l \sin n}$$

$$\sin \mu = \frac{-\sin \lambda \cos l \cos m - \cos \lambda \cos n}{\sin l \sin m}; \sin v = \frac{-\sin \lambda \cos l \cos n + \cos \lambda \cos m}{\sin l \sin n}$$

Hicque est  $\frac{\Pi}{M} = 1 + \frac{f d d \cos l}{2 g dt^2}$ . At angulus  $\omega$  ex motu progressivo est ingressus, pro quo si in fig. 136. ad situm centri inertiae I definiendum; distinctionis causa vocemus coordinatas  $OX = X$  et  $XG = Y$ , existente  $GI = f \cos l$ , ad superiores aequationes insuper has adjungere debemus:

$$\frac{d d X}{2 g dt^2} = \frac{-\partial \Pi}{M} \cos \omega; \frac{d d Y}{2 g dt^2} = \frac{-\partial \Pi}{M} \sin \omega$$

et  $dY \cos \omega - dX \sin \omega + f \cos \omega d \sin l \sin \lambda + f \sin \omega d \sin l \cos \lambda = 0$ .

Atque in his aequationibus omnia, quae tam ad motum progressivum quam gyratorium spectant, determinantur. Si primo quantitates  $X$  et  $Y$  e calculo excludere velimus, loco harum trium postremarum aequationum sequentem unicam adhibuisse sufficit: pro qua si ponatur

$$s dt = f \cos \omega d \sin l \sin \lambda + f \sin \omega d \sin l \cos \lambda$$

seu sumtis his differentialibus locoque  $dl$  et  $d\lambda$  valoribus superioribus substitutis erit

$$s = -f y \sin n \sin(\omega + v) + f z \sin m \sin(\omega + \mu)$$

et aequatio loco illarum trium usurpanda supra inventa est

$$\frac{2 d g \Pi dt}{M} + s d\omega + d \frac{ds}{d\omega} = 0.$$

#### SCHOLION. I.

1036. Multitudo harum aequationum, praecipue autem angulus  $\omega$  primas aequationes ingrediens causa est, quod earum resolutionem nullo modo suscipere liceat. Ut patet motum turbinum ob frictionem maxime fore perturbatum, ita ut ex his aequationibus nihil omnino,

## 488 CAPUT IV. DE MOTU TURBINUM IN &c.

omnino, unde hic motus cognosci posset, concludere valeamus. Quod si verò hujus motus causas obiter tantum contemplemur, evidens est centrum inertiae I non in recta tantum verticali, ut remota frictione eveniebat, ascendere vel descendere, sed etiam motum horizontalem adipisci, qui oritur a vi frictionis, cujus directio cum sit contraria motui cuspidis, motus centri inertiae secundum eandem directionem incitatur, unde neque uniformis neque rectilineus erit, et quatenus incurvatur, ejus convexitas in eam regionem spectabit, in quam cuspis progreditur. Simili modo etiam motus gyriorius tam ratione celeritatis quam ratione axis gyrationis maxime perturbabitur, de quo vix quicquam ex consideratione frictionis affirmare licet.

### SCHOLION. 2.

1037. Verum haec tanta motus perturbatio tandiu duntaxat durat, donec frictio cessat, hoc autem tandem evenire debere per se est evidens, quandoquidem motus ob frictionem continuo retardatur. At frictio cessare nequit, nisi cuspis turbine in eodem loco persistat, ex quo necesse est motum ita temperari debere, ut cuspis tandem in eodem plani puncto sit perseveraturus, dummodo hoc eveniat, antequam turbo procumbat. Si enim turbine primo motus gyriorius nimis tardus fuerit impressus, nullum est dubium, quin procumbat, antequam illud phaenomenon oriatur: ex quo vicissim concludere licet, si motus satis fuerit celer, fore, ut antequam turbo procumbat, cuspis a frictione ad idem plani horizontalis punctum redigatur. Quod cum evenierit, atque in turbine adhuc motus insit gyriorius, ex superioribus patet, axem turbine verticalem esse debere; si enim esset inclinatus, nullo modo ita gyri posset, ut cuspis eidem puncto insisteret. Ex his igitur conjunctis hanc conclusionem deducimus: turbine, si modo ei satis celer motus gyriorius fuerit impressus, ob frictionem se tandem in situm verticalem erigere, et tunc circa axem verticalem motum gyriorium esse continuaturum. Quod phaenomenon eo magis est notatu dignum, quod soli frictioni debeat; ita ut ope frictionis linea verticalis, ideoque etiam planum horizontale obtineri queat; id quod in navigatione magnum usum habere potest, ad quem etiam in Anglia olim fuit commendatum.

CAPUT

## CAPUT V.

DE MOTU GLOBORUM, CENTRUM  
INERTIAE IN IPSORUM CENTRO SITUM  
HABENTIUM, SUPER PLANO  
HORIZONTALI.

## P R O B L E M A. 14.

1038. Si globus super plano horizontali utcumque tam motu progressivo quam gyatorio moveatur, determinare celeritatem et directionem, qua punctum contactus iradit superficiem horizontalem.

## S O L U T I O.

Sit I centrum simulque centrum inertiae globi, ejusque radius Fig. 138.  $= f$ , et contactus fiet in puncto imo T. Motus autem globi ita sit comparatus, ut centrum inertiae moveatur secundum directionem PIR celeritate  $= v$ , simul vero gyretur circa axem quemcumque IO celeritate angulari  $= \omega$ , in eum sensum, ut punctum T circa O incedat per arculum  $Tz$ , ac pro positione puncti O statuamus angulum  $PTO = \theta$  et arcum  $TO = s$ , ubi quidem arcus ita sumo, quasi radius globi esset  $= 1$ . Ducatur TV ipsi PIR parallela, ac si motus gyriorius abesset, punctum contactus T rasurum esset planum horizontale celeritate  $= v$  in directione TV. Deinde si globus solo motu gyatorio ferretur, quia punctum T per  $Tz$  moveretur celeritate  $= f\omega \sin TO = f\omega \sin s$ , cujus directio cum sit horizontalis, in plano per rectam T $\Theta$  referatur, ita ut sit angulus  $ST\Theta = PTz = \theta - 90^\circ$  ob  $OTz$  rectum. Erit ergo  $VT\Theta = 270^\circ - \theta$ . Capiantur rectae  $TV = v$  et  $T\Theta = f\omega \sin s$ , et quia punctum T his duobus motibus conjunctum movetur, ejus verus motus fiet secundum rectam TF diagonalem parallelogrammi TV $\Theta$ . Ex F ad TV ducta normali FH, erit  $VH = f\omega \sin s \sin \theta$  et  $FH = -f\omega \sin s \cos \theta$ , unde fit  $TH = v - f\omega \sin s \sin \theta$  atque celeritas radens TF  $= \sqrt{(v - f\omega \sin s \sin \theta)^2 + f^2 \omega^2 \sin^2 s \cos^2 \theta}$

$$\text{et tang VTF} = \frac{-f\omega \sin s \cos \theta}{v - f\omega \sin s \sin \theta}$$

Ducatur ex centro I ipsi TF parallela IQ, erit arcus TQ quadrans, et angulus

Qq

490 CAPUT V. DE MOTU GLOBORUM,

angulus  $RTQ = VTF$ . Quare si  $IQ$  sit directioni, secundum quam punctum  $T$  radit, parallela, erit

$$\text{tang } PTQ = \frac{f u f s \cos \theta}{v - f u f s \sin \theta},$$

ac posita celeritate radente  $r (vv - 2fuv f s \sin \theta + f u u f s^2) = u$  erit

$$\sin PTQ = \frac{-f u f s \cos \theta}{u} \text{ et } \cos PTQ = \frac{f u f s \sin \theta - v}{u}.$$

COROLL. 1.

1039. Fieri ergo potest, ut celeritas radens ideoque et attritus evanescat, quo casu hae duae conditiones locum habere debent, altera  $u f s \cos \theta = 0$ , altera  $v = f u f s \sin \theta$ . Unde statim patet, si nullus adsit motus progressivus, seu  $v = 0$ , nullum attritum affore, si  $f s = 0$ , hoc est si globus circa axem verticalem  $ZT$  gyretur.

COROLL. 2.

1040. Deinde motus globi ab attritu erit liber, si fuerit primo  $\cos \theta = 0$ , seu angulus  $PTO$  rectus: deinde celeritas progressiva  $v$  ad angularem  $u$  hanc relationem tenere debet, ut sit  $v = f u f s$ , seu  $TV = T\odot$ , et angulus  $ST\odot = 0$ .

COROLL. 3.

1041. Quando ergo globus huiusmodi motum est consecutus, quia sublato omni attritu etiam nulla adest frictio, globus eundem motum constanter conservabit, siquidem axis gyrationis  $IO$  habeat proprietatem axis principalis.

SCHOLION. 1.

1042. Quemadmodum hic frictionem constituimus, ea non obstat, quominus globus super plano horizontali motum suum internatum conservare possit, quod tamen minime fieri observamus, cum globus super tabula tali motu latus mox omnem motum amittat, cuius rei causa resistentiae aeris tribui nequit. Verum hic primum animadverto, experimenta nunquam Theoriae perfectissime congruere: veluti dum casu hic tractato assumimus, contactum unico fieri puncto, id semper in praxi secus evenit. Interim tamen si arcus  $TO$  est quadrans et  $PTO = 90^\circ$ , existente  $v = f u$ , tamen contactus non fiat in uno

uno puncto, tamen attritus evanescit, ideoque hic motus extinctio nentiquam frictioni adscribi potest. Ex quo concludere debemus, praeter frictionem, uti hic eam definivimus, aliud adhuc dari motus impedimentum, dum corpora super superficiebus incedunt, a frictione probe distinguendum, cujus ratio utcumque fuerit comparata, ejus effectus potius seorsim investigari convenit, quam frictionis indolem hic stabilitatem immutari. Et quemadmodum hic a resistantia aeris mentem abstrahimus, ita etiam licebit hoc obstaculum frictionem concomitans a praesenti argumento sejungere.

## S C H O L I O N. 2.

1043. Corpora hic sphaerica considero, in quorum centro situm sit ipsorum centrum inertiae  $I$ , quod ergo ipsum etiam in plano horizontali moveatur, et puncto contactus  $T$  perpetuo verticaliter immineat. Ex quo patet, pressionem in contactu semper fore ponderi corporis  $M$  aequalem. Si ergo corpus ex materia uniformi constaret, omnes ejus diametri proprietate axium principalium gauderent, sed concipiamus materiae distributionem utcumque inaequabilem, ita tamen ut centrum inertiae cadat in centrum figurae: Quare necesse erit in globo ternos axes principales considerari, qui ex centro  $I$  pertingant in puncta  $A$ ,  $B$ ,  $C$ , quadrantibus a se invicem distantia, quorum respectu sit, ut supra posuimus, momenta inertiae  $Maa$ ,  $Mbb$ ,  $Mcc$ . Quanquam autem deinceps hinc vel omnia haec momenta inter se aequalia statuimus, tamen conveniet hujusmodi tria puncta in superficie fixa notasse, quo ex eorum relatione ad spatium absolutum, facilius motus globi definiri possit. Constitutis autem in globo his tribus punctis  $A$ ,  $B$ ,  $C$ , quoniam motus gyrationis circa  $O$ , quem in plagam  $Tz$  dirigi assumimus, sensum habet  $CBA$  contrarium ei, quem supra statuimus, in applicatione formularum generalium ad hunc casum celeritatem angularem  $\omega$  ut negativam spectare debemus.

## P R O B L E M A. 15.

1044. Si globus super plano horizontali utcumque moveatur, definire vires, quibus sollicitatur, earumque momenta respectu ternorum axium principalium globi.

## S O L U T I O.

Inclusus concipiatur globus sphaerae vel fixae vel cum eo parem Fig. 139. motum progressivum habenti, in qua  $Z$  sit punctum verticale ejusque

Qq q 2

oppo-



490 CAPUT V. DE MOTU GLOBORUM,

angulus RTQ = VTF. Quare si IQ sit directioni, secundum quam punctum T radit, parallela, erit

$$\text{tang PTQ} = \frac{f u f s \cos \theta}{v - f u f s \sin \theta},$$

ac posita celeritate radente  $r (v^2 - 2 f u v f s \sin \theta + f^2 u^2 f s^2) = u$  erit

$$\sin \text{PTQ} = \frac{-f u f s \cos \theta}{u} \text{ et } \cos \text{PTQ} = \frac{f u f s \sin \theta - v}{u}.$$

COROLL. 1.

1039. Fieri ergo potest, ut celeritas radens ideoque et attritus evanescat, quo casu hae duae conditiones locum habere debent, altera  $u f s \cos \theta = 0$ , altera  $v = f u f s \sin \theta$ . Unde statim patet, si nullus adsit motus progressivus, seu  $v = 0$ , nullum attritum affore, si  $f s = 0$ , hoc est si globus circa axem verticalem ZT gyretur.

COROLL. 2.

1040. Deinde motus globi ab attritu erit liber, si fuerit primo  $\cos \theta = 0$ , seu angulus PTO rectus: deinde celeritas progressiva  $v$  ad angularem  $u$  hanc relationem tenere debet, ut sit  $v = f u f s$ , seu  $TV = T\theta$ , et angulus  $ST\theta = 0$ .

COROLL. 3.

1041. Quando ergo globus huiusmodi motum est consecutus, quia sublato omni attritu etiam nulla adest frictio, globus eundem motum constanter conservabit, siquidem axis gyrationis IO habeat proprietatem axis principalis.

SCHOLION. 1.

1042. Quemadmodum hic frictionem constituimus, ea non obstat, quominus globus super plano horizontali motum suum intemperatum conservare possit, quod tamen minime fieri observamus, cum globus super tabula tali motu latus mox omnem motum amittat, cuius rei causa resistentiae aeris tribui nequit. Verum hic primum animadverto, experimenta nunquam Theoriae perfectissime congruere: veluti dum casu hic tractato assumimus, contactum unico fieri puncto, id semper in praxi secus evenit. Interim tamen si arcus TO est quadrans et  $PTO = 90^\circ$ , existente  $v = f u$ , tamen contactus non fiat in uno

uno puncto, tamen attritus evanescit, ideoque hic motus extinctio nentiquam frictioni adscribi potest. Ex quo concludere debemus, praeter frictionem, uti hic eam definivimus, aliud adhuc dari motus impedimentum, dum corpora super superficiebus incedunt, a frictione probe distinguendum, cujus ratio utcumque fuerit comparata, ejus effectus potius seorsum investigari convenit, quam frictionis indolem hic stabilitam immutari. Et quemadmodum hic a resistantia aëris mentem abstrahimus, ita etiam licebit hoc obstaculum frictionem concomitans a praesenti argumento sejungere.

## S C H O L I O N. 2.

1043. Corpora hic sphaerica considero, in quorum centro situm sit ipsorum centrum inertiae  $I$ , quod ergo ipsum etiam in plano horizontali moveatur, et puncto contactus  $T$  perpetuo verticaliter immineat. Ex quo patet, pressionem in contactu semper fore ponderi corporis  $M$  aequalem. Si ergo corpus ex materia uniformi constaret, omnes ejus diametri proprietate axium principalium gauderent, sed concipiamus materiae distributionem utcumque inaequabilem, ita tamen ut centrum inertiae cadat in centrum figurae: Quare necesse erit in globo ternos axes principales considerari, qui ex centro  $I$  pertingant in puncta  $A$ ,  $B$ ,  $C$ , quadrantibus a se invicem distantia, quorum respectu sit, ut supra posuimus, momenta inertiae  $Maa$ ,  $Mbb$ ,  $Mcc$ . Quanquam autem deinceps bina vel omnia haec momenta inter se aequalia statuimus, tamen conveniet hujusmodi tria puncta in superficie fixa notasse, quo ex eorum relatione ad spatium absolutum, facilius motus globi definiri possit. Constitutis autem in globo his tribus punctis  $A$ ,  $B$ ,  $C$ , quoniam motus gyrationis circa  $O$ , quem in plagam  $Tz$  dirigi assumimus, sensum habet  $CBA$  contrarium ei, quem supra statuimus, in applicatione formularum generalium ad hunc casum celeritatem angularem  $\omega$  ut negativam spectare debemus.

## P R O B L E M A. 15.

1044. Si globus super plano horizontali utcumque moveatur, definire vires, quibus sollicitatur, earumque momenta respectu ternorum axium principalium globi.

## S O L U T I O.

Inclusus concipiatur globus sphaerae vel fixae vel cum eo parem Fig. 139. motum progressivum habenti, in qua  $Z$  sit punctum verticale ejusque

Qq9 2

oppo-

oppositum T punctum contactus, DE vero sit diameter horizontalis ad certam mundi plagam tendens, et DPQE circulus maximus horizontalis. Nunc autem elapso tempore  $t$ , moveatur globus motu progressivo secundum directionem PI celeritate  $= v$ , ponaturque arcus DP seu angulus DZP  $= \varphi$ ; axes autem principales nunc sint in A, B, C. Tum vero globus jam gyretur circa axem IO, celeritate angulari  $= \omega$  in sensum ACB: sitque pro situ puncti O angulus PTO seu PZO  $= \theta$ , et arcus ZO  $= s$ . Etti enim ante arcum TO posuimus  $= s$ , quia tantum ejus sinus in computum intrat, perinde est. Erit ergo angulus DZO  $= \theta + \varphi$ , et EZO  $= 180^\circ - \theta - \varphi$ . Deinde si a punctis A, B, C tam ad O quam ad Z arcus circulorum magnorum ducti concipiantur, sint ut hactenus arcus AO  $= \alpha$ , BO  $= \beta$ , CO  $= \gamma$ ; ZA  $= l$ , ZB  $= m$ , ZC  $= n$ , et anguli EZA  $= \lambda$ , EZB  $= \mu$ , EZC  $= \nu$ . In praecedente autem problemate ostendimus, punctum contactus T planum subjectum radere secundum directionem radio IQ parallelam celeritate  $= v$  ( $v - 2f\omega v \sin s \sin \theta + f\omega s \sin^2 s$ ), foreque

$$\tan PTQ = \tan PZQ = \frac{f\omega s \sin \cos \theta}{v - f\omega s \sin \theta}$$

denotante  $f$  radium globi. Cum igitur pressio in T sit  $= M$ , frictio erit  $= \delta M$ , quae puncto T est applicata secundum directionem ipsi QI parallelam. Hac ergo vi resoluta secundum directiones axium principalium IA, IB, IC, prodit vis sec. IA  $= -\delta M \cos AQ$ ; vis sec. IB  $= -\delta M \cos BQ$ , et vis sec. IC  $= -\delta M \cos CQ$ , quae ternae vires in puncto T applicatae sunt concipiendae, unde colliguntur momenta

$$\text{Resp. axis IA in sensum BC} = -\delta M f \cos CQ \cos BT + \delta M f \cos BQ \cos CT = P$$

$$\text{Resp. axis IB in sensum CA} = -\delta M f \cos AQ \cos CT + \delta M f \cos CQ \cos AT = Q$$

$$\text{Resp. axis IC in sensum AB} = -\delta M f \cos BQ \cos AT + \delta M f \cos AQ \cos BT = R$$

Erunt ergo haec tria momenta:

$$P = \delta M f (\cos m \cos CQ - \cos n \cos BQ)$$

$$Q = \delta M f (\cos n \cos AQ - \cos l \cos CQ)$$

$$R = \delta M f (\cos l \cos BQ - \cos m \cos AQ)$$

Pro puncto autem Q ponamus angulum PZQ  $= \xi$  ut sit  $\tan \xi =$

$$\frac{f\omega s \sin \cos \theta}{v - f\omega s \sin \theta} \text{ et posita celeritate radente } v' (v - 2f\omega v \sin s \sin \theta + f\omega s \sin^2 s)$$

= u,

$$= u, \text{ erit } f\xi = \frac{-f_2 f_1 s \cos \theta}{u} \text{ et } \cos \xi = \frac{f_2 f_1 s f \theta - v}{u}.$$

Fit ergo  $DZQ = \varphi + \xi$  et  $EZQ = 180^\circ - \xi - \varphi$ ; hincque

$$AZQ = 180^\circ - \xi - \varphi - \lambda; BZQ = \mu + \xi + \varphi - 180^\circ;$$

$$CZQ = 180^\circ - \xi - \varphi - \nu$$

$$\text{ergo } \cos AQ = -\cos(\xi + \varphi + \lambda) f l$$

$$\cos BQ = -\cos(\xi + \varphi + \mu) f m$$

$$\cos CQ = -\cos(\xi + \varphi + \nu) f n.$$

Ex relatione igitur, quae inter angulos  $\lambda$ ,  $\mu$  et  $\nu$  intercedit, concludemus momenta virium:

$$P = \delta M f l f (\lambda + \varphi + \xi)$$

$$Q = \delta M f m f (\mu + \varphi + \xi)$$

$$R = \delta M f n f (\nu + \varphi + \xi).$$

#### PROBLEMA. 16.

1045. Si motum gyrationis ad quodvis tempus ut datum spectemus, definire motum progressivum globi.

#### SOLUTIO.

Quia centrum globi in plano horizontali movetur, describerit id Fig. 140. tempore  $t$  lineam  $GI$ , quae referatur ad directricem  $GX$  superiori directioni fixae  $DE$  parallelam, ductaque  $IX$  ad  $GX$  normali, sint coördinatae  $GX = X$ ,  $XI = Y$ . Per  $I$  ducatur recta  $DE$  ipsi  $GX$  parallela, quae erit ipsa diameter  $DE$  in fig. 139. Ducatur  $IP$ , ut sit  $DIP = EIR = \varphi$  et centrum  $I$  per hypothesein progreditur in directione  $IR$  celeritate  $= v$ , ita ut sit celeritas secundum  $GX = v \cos \varphi$  et celeritas secundum  $XI = v f \varphi$ , ideoque  $dX = v dt \cos \varphi$  et  $dY = v dt f \varphi$ . Ducatur recta  $QIS$ , ut  $IQ$  sit directioni, qua punctum contactus radit parallela, erit angulus  $EIQ = DIS = 180^\circ - \xi - \varphi$ , est enim aequalis angulo  $EZQ$  in praec. figura, unde globus sollicitari censendus est vi  $= \delta M$  in directione  $IS$ . Hinc ergo oritur vis secundum  $ID = -\delta M \cos(\xi + \varphi)$  et vis secundum  $XI = \delta M f(\xi + \varphi)$ . Ex quibus colligitur

$$\frac{d.v \cos \varphi}{2g dt} = \frac{dv \cos \varphi - v d\varphi f \varphi}{2g dt} = \delta \cos(\xi + \varphi)$$

$$\frac{d.v f \varphi}{2g dt} = \frac{dv f \varphi + v d\varphi \cos \varphi}{2g dt} = \delta f(\xi + \varphi)$$

Qq 3

hinc.

hincque porro.

$$\frac{dv}{2g dt} = \delta \cos \xi \text{ et } \frac{v d\phi}{2g dt} = \delta \sin \xi$$

$$\text{ita ut sit } \frac{v d\phi}{dv} = \tan \xi = \frac{f u f s \cos \theta}{v - f u f s \sin \theta}$$

### P R O B L E M A. 17.

1046. Definito motu progressivo globi, determinare ejus motum gyrationum.

### S O L U T I O.

Fig. 139. Spectetur nunc centrum globi I ut quiescens, et maneant omnes denominationes in probl. 15. adhibitae, sintque *Maa*, *Mbb*, *Mcc* momenta inertiae respectu axium principalium *IA*, *IB*, *IC*, quae primo ut inaequalia consideremus. Quoniam vero hic celeritatem angularem & ut negativam spectare debemus, quia tendit in sensum *ACB*, si ponamus  $\alpha \cos a = x$ ,  $\alpha \cos b = y$ , et  $\alpha \cos c = z$ , in formulis generalibus has literas  $x$ ,  $y$ ,  $z$  negative sumi oportet, ex §. 810. habebimus has aequationes motum determinantes,

$$dx + \frac{bb - cc}{aa} yz dt + \frac{2dfg}{aa} dt \sin l \sin (\lambda + \phi + \xi) = 0$$

$$dy + \frac{cc - aa}{bb} xz dt + \frac{2dfg}{bb} dt \sin m \sin (\mu + \phi + \xi) = 0.$$

$$dz + \frac{aa - bb}{cc} xy dt + \frac{2dfg}{cc} dt \sin n \sin (\nu + \phi + \xi) = 0$$

$$\begin{aligned} dl \sin l &= dt (x \cos m - y \cos n); & d\lambda \sin l^2 &= dt (y \cos m + z \cos n) \\ dm \sin m &= dt (x \cos n - z \cos l); & d\mu \sin m^2 &= dt (z \cos n + x \cos l) \\ dn \sin n &= dt (y \cos l - x \cos m); & d\nu \sin n^2 &= dt (x \cos l + y \cos m). \end{aligned}$$

Tum vero ex motu progressivo habemus:

$$dv = 2g dt \cos \xi; \quad v d\phi = 2g dt \sin \xi$$

$$\text{et } \tan \xi = \frac{f u f s \cos \theta}{v - f u f s \sin \theta}.$$

Ubi est  $\angle PQO = \theta$  et  $\angle ZO = s$ . Cum ergo sit  $\angle EZO = 180^\circ - \nu - \phi$ : erit  $\angle AZO = 180^\circ - \lambda - \theta - \phi$ : hincque

$$\cos \alpha = \cos l \cos s - \sin l \sin s \cos (\lambda + \theta + \Phi)$$

$$\cos \epsilon = \cos m \cos s - \sin m \sin s \cos (\mu + \theta + \Phi)$$

$$\cos \gamma = \cos n \cos s - \sin n \sin s \cos (\nu + \theta + \Phi)$$

$$\text{existente } \cos s = \cos l \cos \alpha + \cos m \cos \epsilon + \cos n \cos \gamma$$

unde sequitur fore

$$\sin l \cos l \cos (\lambda + \theta + \Phi) + \sin m \cos m \cos (\mu + \theta + \Phi) + \sin n \cos n \cos (\nu + \theta + \Phi) = 0.$$

$$\text{Ponamus } \cos s = p \text{ et } \sin s = q, \text{ ut sit } \tan \xi = \frac{fq \cos \theta}{p - fq \sin \theta} =$$

$$\frac{vd\phi}{dv}; \text{ eritque}$$

$$x = p \cos l - q \sin l \cos (\lambda + \theta + \Phi)$$

$$y = p \cos m - q \sin m \cos (\mu + \theta + \Phi)$$

$$z = p \cos n - q \sin n \cos (\nu + \theta + \Phi)$$

ex quibus valoribus fit

$$dl = q dt \sin l (\lambda + \theta + \Phi); \quad d\lambda = p dt + q dt \cot l \cos (\lambda + \theta + \Phi)$$

$$dm = q dt \sin m (\mu + \theta + \Phi); \quad d\mu = p dt + q dt \cot m \cos (\mu + \theta + \Phi)$$

$$dn = q dt \sin n (\nu + \theta + \Phi); \quad d\nu = p dt + q dt \cot n \cos (\nu + \theta + \Phi)$$

indeque porro

$$dx = dp \cos l - dq \sin l \cos (\lambda + \theta + \Phi) + q (d\theta + d\Phi) \sin l \sin (\lambda + \theta + \Phi)$$

$$dy = dp \cos m - dq \sin m \cos (\mu + \theta + \Phi) + q (d\theta + d\Phi) \sin m \sin (\mu + \theta + \Phi)$$

$$dz = dp \cos n - dq \sin n \cos (\nu + \theta + \Phi) + q (d\theta + d\Phi) \sin n \sin (\nu + \theta + \Phi).$$

At sine subsidio harum substitutionum ex aequationibus ternis primis, cum in genere sit  $\sin l \cos l \sin (\lambda + \Lambda) + \sin m \cos m \sin (\mu + \Lambda) + \sin n \cos n \sin (\nu + \Lambda) = 0$ , elicimus hanc aequationem.

$$aadx \cos l + bbdy \cos m + ccdz \cos n - aaxdl \sin l - bbydm \sin m - cczdn \sin n = 0$$

cujus integrale est

$$aax \cos l + bby \cos m + ccz \cos n = C$$

quae adhibitis substitutionibus abit in hanc formam:

$$p(aa \cos l^2 + bb \cos m^2 + cc \cos n^2) - q(aa \sin l \cos l \cos (\lambda + \theta + \Phi) + bb \sin m \cos m \cos (\mu + \theta + \Phi) + cc \sin n \cos n \cos (\nu + \theta + \Phi))$$

= Const.

Deinde

Deinde etiam per reductiones §. 934. traditas pro vi viva colligitur haec aequatio differentialis

$$aaxdx + bbydy + cczdz = 2d\int gqdt f(\xi - \theta).$$

## S C H O L I O N.

1047. Ad reductiones hic factas intelligendas ex formulis supra traditis, ubi angulos  $\mu$  et  $\nu$  per  $\lambda$ ,  $l$ ,  $m$ ,  $n$  expressimus, notari convenit fieri:

$$\cos(\mu + \theta + \varphi) = \frac{-\cos l \cos m \cos(\lambda + \theta + \varphi) + \cos n f(\lambda + \theta + \varphi)}{f l f m}$$

$$\cos(\nu + \theta + \varphi) = \frac{-\cos l \cos n \cos(\lambda + \theta + \varphi) - \cos m f(\lambda + \theta + \varphi)}{f l f n}$$

$$f(\mu + \theta + \varphi) = \frac{-\cos l \cos m f(\lambda + \theta + \varphi) - \cos n \cos(\lambda + \theta + \varphi)}{f l f m}$$

$$f(\nu + \theta + \varphi) = \frac{-\cos l \cos n f(\lambda + \theta + \varphi) + \cos m \cos(\lambda + \theta + \varphi)}{f l f n}$$

Ac simili modo anguli  $\mu + \varphi + \xi$  et  $\nu + \varphi + \xi$  ad angulum  $\lambda + \varphi + \xi$  revocari possunt. Deinde etiam pro sequentibus reductionibus haec forma imprimis est notanda

$f(\mu + B) \cos(\nu + C) = f(\nu + B) \cos(\mu + C)$   
 quae ob  $f M \cos N = \frac{1}{2} f(M + N) + \frac{1}{2} f(M - N)$  reducitur ad  $f(\mu - \nu) \cos(B - C)$ ; hocque modo reductionem pro aliis formulis instituendo, reperimus:

$$f(\mu + B) \cos(\nu + C) - f(\nu + B) \cos(\mu + C) = f(\mu - \nu) \cos(B - C)$$

$$f(\mu + B) f(\nu + B) - f(\nu + B) f(\mu + C) = -f(\mu - \nu) f(B - C)$$

$$\cos(\mu + B) \cos(\nu + C) - \cos(\nu + B) \cos(\mu + C) = -f(\mu - \nu) f(B - C)$$

ubi  $f(\mu - \nu)$  per formulas usurpatas datur, est enim  $f(\mu - \nu) = \frac{\cos l}{f m f n}$ .

## P R O B L E M A. 18.

1048. Si globus ex materia uniformi constet; vel saltem ita fuerit comparatus, ut omnia momenta inertiae sint inter se aequalia, eique initio impressus fuerit motus quicumque, determinare ejus continuationem,

S O.

## SOLUTIO.

Cum hic fit  $aa = bb = cc$ , seu momentum inertiae respectu omnium diametrorum  $= Maa$ , prima aequatio integrata praebet  $aap = \text{Const.}$  unde  $p$  erit quantitas constans. Statuatur ergo  $p = b$ ; et ternae aequationes differentiales priores induent has formas:

$$\text{I. } -dq \cos(\lambda + \theta + \varphi) + q(d\theta + d\varphi) \sin(\lambda + \theta + \varphi) + \frac{2\delta fg}{aa} dt \sin(\lambda + \varphi + \xi) = 0$$

$$\text{II. } -dq \cos(\mu + \theta + \varphi) + q(d\theta + d\varphi) \sin(\mu + \theta + \varphi) + \frac{2\delta fg}{aa} dt \sin(\mu + \varphi + \xi) = 0$$

$$\text{III. } -dq \cos(\nu + \theta + \varphi) + q(d\theta + d\varphi) \sin(\nu + \theta + \varphi) + \frac{2\delta fg}{aa} dt \sin(\nu + \varphi + \xi) = 0$$

quarum autem sufficit binas considerasse, quia inde jam nata est conclusio  $p = b$ . Iam per superiores reductiones binae posteriores ita combinentur:

II.  $\cos(\nu + \theta + \varphi)$  — III.  $\cos(\mu + \theta + \varphi)$  praebet

$$q(d\theta + d\varphi) \sin(\mu - \nu) + \frac{2\delta fg}{aa} dt \sin(\mu - \nu) \cos(\xi - \theta) = 0$$

$$\text{seu } q(d\theta + d\varphi) + \frac{2\delta fg}{aa} dt \cos(\xi - \theta) = 0$$

Deinde II.  $\sin(\nu + \theta + \varphi)$  — III.  $\sin(\mu + \theta + \varphi)$  dat

$$dq \sin(\mu - \nu) - \frac{2\delta fg}{aa} dt \sin(\mu - \nu) \sin(\xi - \theta) = 0$$

$$\text{seu } dq = \frac{2\delta fg}{aa} dt \sin(\xi - \theta)$$

qui valor in ultima aequatione pro viribus vivis substitutus praebet  $x dx + y dy + z dz = q dq$

hincque  $xx + yy + zz = uv = \text{Const.} + qq = \text{Const.} + uv \sin^2$  ita ut sit  $uv \cos^2 = \text{const.}$  ut jam invenimus ob  $u \cos^2 = p = b$ . Hinc istas habemus aequationes a litteris  $f, m, n, \lambda, \mu, \nu$  immunes:

Rrr

I. q



$$I. q(d\theta + d\varphi) + \frac{2\delta f g}{a a} dt \cos(\xi - \theta) = 0; \quad II. d\varphi = \frac{2\delta f g}{a a} dt \sin(\xi - \theta)$$

$$III. dv = 2\delta g dt \cos \xi; \quad IV. v d\varphi = 2\delta g dt \sin \xi$$

quibus adjungatur haec finita  $\tan \xi = \frac{f q \cos \theta}{v - f q \sin \theta}$ , quae transformata in

hanc  $v \sin \xi - f q \cos(\xi - \theta) = 0$ , differentietur

$$dv \sin \xi + v d\xi \cos \xi - f dq \cos(\xi - \theta) + f q d\xi \sin(\xi - \theta) - f q d\theta \sin(\xi - \theta) = 0.$$

Iam I.  $\sin(\xi - \theta) + II. \cos(\xi - \theta)$  dat

$$q(d\theta + d\varphi) \sin(\xi - \theta) + dq \cos(\xi - \theta) = 0$$

quae per  $f$  multiplicata illi addatur

$$dv \sin \xi + v d\xi \cos \xi + f q (d\xi + d\varphi) \sin(\xi - \theta) = 0.$$

Porro ob  $\frac{dv}{v d\varphi} = \frac{\cos \xi}{\sin \xi}$ , erit

$$v(d\varphi + d\xi) \cos \xi + f q (d\xi + d\varphi) \sin(\xi - \theta) = 0$$

$$\text{feu } (d\varphi + d\xi)(v \cos \xi + f q \sin(\xi - \theta)) = 0$$

quorum factorum finitus  $v \cos \xi + f q \sin(\xi - \theta)$  evanescere nequit, ob  $v \sin \xi - f q \cos(\xi - \theta) = 0$ , sequeretur enim inde  $v \cos \theta = 0$ , et  $f q \cos \theta = 0$ ; quod non nisi casu  $\theta = 90^\circ$  locum habet. Relinquitur ergo ut sit  $d\varphi + d\xi = 0$  ideoque  $\varphi + \xi = \text{Const.}$

Hoc impetrato reliqua non difficulter expediuntur; ad integrationes autem determinandas pro statu initiali  $t = 0$ , ponamus fuisse celeritatem progressivam  $v = e$ , ang.  $\varphi = 0$ ; ang.  $PZO = \theta = f$ , arcum  $ZO = r = f$ ; et celeritatem angularem  $\omega = s$  in sensum ACB; hincque  $p = h = s \cos r = s \cos f$ , et  $q = s \sin f$ ; porro  $\tan \xi = \frac{s f \sin f \cos f}{e - s f \sin f \sin f}$ . Statuatur  $\frac{s f \sin f \cos f}{e - s f \sin f \sin f} = \tan \zeta$  ut fuerit initio  $\xi = \zeta$ , ac perpetuo erit  $\xi + \varphi = \zeta$ , ita ut angulus  $DZQ = \zeta$  maneat constans. Quare cum sit  $\xi = \zeta - \varphi$ : erit  $v \sin(\zeta - \varphi) = f q \cos(\zeta - \theta - \varphi)$ . Supra autem invenimus:

$$\frac{d(v \cos \varphi)}{2g dt} = \delta \cos(\xi + \varphi) = \delta \cos \zeta; \quad \text{et} \quad \frac{d(v \sin \varphi)}{2g dt} = \delta \sin \zeta$$

$$(\xi + \varphi) = \delta \sin \zeta$$

unde

unde integrando colligimus

$$v \cos \varphi = c + 2dgt \cos \zeta \text{ et } v \sin \varphi = 2dgt \sin \zeta$$

$$\text{hincque } v = r (c + 4dgt \cos \zeta + 4ddggt) \text{ et } \tan \varphi = \frac{2dgt \sin \zeta}{c + 2dgt \cos \zeta}$$

$$\text{atque } \tan (\zeta - \varphi) = \frac{e \sin \zeta}{e \cos \zeta + 2dgt} = \frac{f \cos \theta}{v - f \sin \theta} = \tan \xi.$$

Deinde ob  $d\varphi = -d\xi$  binae priores aequationes abeunt in

$$\text{I. } q(d\xi - d\theta) = \frac{2dfg}{aa} dt \cos (\xi - \theta); \text{ II. } dq = \frac{2dfg}{aa} \frac{dt \sin (\xi - \theta)}{\cos (\xi - \theta)},$$

quarum haec per illam divisa dat:

$$\frac{dq}{q(d\xi - d\theta)} = \frac{\sin (\xi - \theta)}{\cos (\xi - \theta)}, \text{ quae integrata dat } q \cos (\xi - \theta) = \text{Const.}$$

ideoque  $q \cos (\xi - \theta) = s \sin \zeta \cos (\zeta - \theta)$ , unde valor ipsius  $q$  in prima substitutus praebet:

$$\frac{s(d\xi - d\theta) \sin \zeta \cos (\zeta - \theta)}{\cos (\xi - \theta)^2} = \frac{2dfg}{aa} dt, \text{ et integrando}$$

$$s \sin \zeta \cos (\zeta - \theta) \tan (\xi - \theta) = C + \frac{2dfg}{aa} t,$$

ubi  $C = s \sin \zeta \cos (\zeta - \theta)$ . At  $\tan (\xi - \theta) = \tan (\zeta - \varphi - \theta)$

$$= \frac{\tan (\zeta - \varphi) - \tan \theta}{1 + \tan \theta \tan (\zeta - \varphi)}, \text{ et } \tan \theta = \frac{\tan \xi - \tan (\xi - \theta)}{1 + \tan \xi \tan (\xi - \theta)}$$

Sed per hypothefin est  $s \sin \zeta = \frac{e \sin \zeta}{f \cos (\zeta - \theta)}$ ; unde fit

$$\tan (\xi - \theta) = \tan (\zeta - \theta) + \frac{2dffgt}{eaa \sin \zeta}, \text{ at } \tan \xi = \frac{e \sin \zeta}{e \cos \zeta + 2dgt}$$

hincque angulus  $\theta$  facile determinatur: indeque  $q = \frac{e \sin \zeta}{f \cos (\xi - \theta)}$

Verum hic notari oportet, cum fit  $\tan \zeta = \frac{e \sin \zeta \cos \theta}{e - s \sin \zeta \sin \theta}$ , esse ut supra

de angulo  $\xi$  ostendimus,

Rrr 2

$$\sin \zeta = \frac{-ef \sin \phi \cos \psi}{r(cc - 2ef \sin \phi \sin \psi + ef \sin^2 \phi)} \text{ et } \cos \zeta = \frac{-c + ef \sin \phi \sin \psi}{r(cc - 2ef \sin \phi \sin \psi + ef \sin^2 \phi)}$$

$$\text{unde } \cos(\zeta - \psi) = \frac{-c \cos \psi}{r(cc - 2ef \sin \phi \sin \psi + ef \sin^2 \phi)}$$

His inventis cum sit  $\omega \cos s = c \cos \phi$  et  $\omega \sin s = q$ , erit  $\omega = r \cdot (qq + c \cos^2 \phi)$  et  $\tan s = \frac{q}{c \cos \phi}$ . Sicque tam motus progressivus, quam ad

quodvis tempus axis gyrationis O cum celeritate angulari  $\omega$  poterit assignari, id quod ad motus cognitionem sufficit. Determinatio autem situs punctorum A, B, C ad quodvis tempus nimis est ardua, quam ut eam perficere liceat.

## COROLL. 1.

1049. Cum sit celeritas angularis  $\omega = \frac{c \cos \phi}{\cos s}$ , seu cosinui arcus SO

reciprocè proportionalis; sequitur, si polus gyrationis O initio fuerit in superiori hemisphaerio DZE, eum nunquam in inferius pervenire posse: in transitu enim per circulum horizontalem DE prodiret celeritas angularis  $\omega$  infinita.

## COROLL. 2.

1050. Ob eandem rationem, si polus gyrationis O initio fuerit in hemisphaerio inferiori DTE, is nunquam in superius ascendet. Sin autem initio fuerit in ipso circulo horizontali DE, perpetuo in eodem manebit. Scilicet si initio axis gyrationis fuerit horizontalis, perpetuo horizontalis manebit.

## COROLL. 3.

1051. Si fuerit initio angulus DZO =  $\psi$  rectus, fiet  $\sin \zeta = 0$  et ob  $\tan(\zeta - \psi) = \frac{ef \sin \phi - c \sin \psi}{c \cos \psi}$ , erit etiam  $\zeta = 0$  rectus. Sed ob  $\tan$

$\zeta = \frac{ef \sin \phi}{c \cos \zeta + 2 \delta g t}$ , angulus  $\zeta$  evanescit, unde angulus  $\theta = \text{PZO}$  prodit rectus. Simulatque igitur angulus PZO factus fuerit rectus, perpetuo rectus manebit.

CO.

## COROLL. 4.

1052. Memorabilis est etiam proprietas, quod angulum  $\xi + \phi$  seu DZQ et in fig. 140. angulus DIQ sit constans. Recta enim QIS sibi perpetuo manebit parallela, et quia globus in motu progressivo sollicitatur vi constante JM secundum eandem directionem IS, curva ab eo descripta GI parabola sit necesse est.

## SCHOLION. 1.

1053. Hic autem motus globi, uti nostris formulis est definitus, diutius non durat, quam revera frictio adest, seu planum horizontale in puncto contactus T raditur. Si enim eveniat, ut ratio cesset, seu celeritas radens in T evanescat, subito frictio evanescit, formulaeque inventae non amplius locum habent. Tum igitur globus motu tantum progressivo, quam gyratorio uniformiter in directum progreditur, neque axis gyrationis ullam amplius mutationem patietur. Ac si statim initio motus globo impressus ita fuerit comparatus, ut frictio fuerit nulla, quod evenit, si tam  $ef\delta f \cos \psi = 0$  quam  $e = ef\delta f \cos \psi$ , deinceps etiam globus nullam frictionem sentiet, et statim ab initio motum progressivum uniformiter in directum prosequetur, simulque uniformiter circa eundem axem gyraabitur. Verum si corpori ab initio alius motus quicunque fuerit impressus, semper aliquo tempore elapso eo reducetur, ut frictio evanescat, indeque motum suum uniformiter prosequetur; quod memorabile temporis punctum in sequenti problemate investigabimus.

## SCHOLION. 2.

1054. Quae in solutione problematis elicimus, huc redeunt: Ex motu primum impresso habemus celeritatem motus progressivi  $= e$  secundum directionem DI: ac si gyretur circa axem IO celeritate angulari  $s$  in sensum ACB seu ZETD, qui sensus *antrorsum tendens* dici solet, fueritque arcus ZO  $= f$  et angulus DZO  $= \psi$ : tum vero radius globi sit  $= r$  ejusque momentum inertiae  $= Ma$  respectu omnium diametrorum, existente M ejus massa: ex his datis colligitur celeritas radens in puncto contactus  $= r(\cos - 2ef\delta f \cos \psi + ef\delta f^2)$  quae si ponatur  $= k$ , quaeratur angulus  $\zeta$ , ut sit  $\delta f \zeta = \frac{-ef\delta f \cos \psi}{k}$  et  $\cos \zeta = \frac{ef\delta f \cos \psi - e}{k}$ , qui sit DZQ  $= \zeta$ , eritque IQ directio motus radentis.

Rrr 9

Tum

Tum si elapso tempore  $t$  globi centrum proferatur celeritate  $v$  secundum directionem PI, et gyretur celeritate angulari  $= \omega$  in sensum ZETD circa polum O, ponaturque  $DZP = \varphi$ ,  $PZO = \theta$ , et  $ZO = r$ ;

invenimus primo:  $\tan \varphi = \frac{2 \delta g t \sin \zeta}{c + 2 \delta g t \cos \zeta}$  et celeritatem centri  $D =$

$r (cc + 4 \delta g t \cos \zeta + 4 \delta \delta g g t t)$ , at celeritas radens etiamnum fiet in directione IQ, existente  $DZQ = \zeta$ : unde posito  $PZQ = \xi$  erit  $\tan \xi$

$= \frac{c \sin \zeta}{c \cos \zeta + 2 \delta g t}$ . Porro est  $\tan (\xi - \theta) = \tan (\zeta - \theta) + \frac{2 \delta f g t}{c a a \sin \zeta}$

existente  $\tan (\zeta - \theta) = \frac{c \sin \zeta \cos \theta}{c \cos \zeta}$ , unde angulus  $\theta$  innotescit, hinc-

que ob  $DZO = \varphi + \theta = \zeta - \xi + \theta$  concluditur  $\tan DZO = \tan$

$(\varphi + \theta) = \frac{c a a k \sin \zeta \cos \theta + 2 \delta f g t (c - c \sin \zeta \cos \theta)}{c a a k \sin \zeta \cos \theta - 2 \delta f f g t \sin \zeta \cos \theta}$ . Atque ex his tandem

nacti sumus:

$$\omega \cos s = c \cos f \text{ et } \omega \sin s = \frac{c \sin \zeta}{f \cos (\zeta - \theta)}$$

Denique pro celeritate radente secundum IQ, ea est  $= r (v v - 2 \omega f v \sin s \sin \theta + \omega \omega f f \sin^2 s)$ ; quae si vocetur  $w$ , supra ostendimus esse

$$h \xi = \frac{-\omega f \sin s \cos \theta}{w} \text{ et } \cos \xi = \frac{\omega f \sin s \sin \theta - v}{w}$$

unde  $\omega$  et  $s$  definiuntur. Sed pro situ punctorum A, B, C in globo fixorum ad quodvis tempus determinando formulae adeo fiunt intricatae, ut nihil inde concludi queat. Interim si pro puncto A vocetur  $ZA = l$  et  $EZA = \lambda$ , ad has binas aequationes totum negotium reducitur;

$$\text{I. } dl = dt (c \sin f \sin (\theta + \lambda) - \frac{2 \delta f g t}{a a} \cos (\zeta + \lambda))$$

$$\text{II. } d\lambda \sin l = a dt \cos f \sin l + dt \cos l (c \sin f \cos (\theta + \lambda) + \frac{2 \delta f g t}{a a} \sin (\zeta + \lambda))$$

quarum resolutio vereor ne frustra suscipiatur. Cum autem ad quodvis tempus axem gyrationis cum celeritate angulari assignare valeamus, quod ad motus cognitionem, qualis vulgo desideratur, sufficere potest, eo magis mirum videtur, quod motus singulorum globi punctorum quasi vires analyticos superet. Multo minus igitur de motu globorum,

rum, in quibus momenta inertiae non sunt aequalia, quicquam definire licebit.

## PROBLEMA. 19.

1055. Si globo, cuius omnia momenta inertiae sunt inter se aequalia, motus quicumque fuerit impressus, assignare temporis punctum, ubi celeritas radens ideoque frictio evanescit, indeque globus motu uniformi progredi pergat.

## SOLUTIO.

Supra §. 1039. vidimus, ut attritus evanescat, has duas requiri condiciones, alteram  $u \beta s \cos \theta = 0$  alteram  $v = f u \beta s \beta \theta$ , seu in expres-

sione  $\text{tang } \xi = \frac{f u \beta s \cos \theta}{v - f u \beta s \beta \theta}$  tam numeratorem quam denominatorem

simul evanescere debere. Cum autem invenerimus  $\text{tang } \xi = \frac{e \beta \zeta}{e \cos \zeta + 2 \delta g t}$

ubi numerator  $e \beta \zeta$  est constans, si in illa formula numerator evanescit, necesse est denominator simul evanescat, quia alioquin aequalitas inter has duas fractiones subsistere nequit. Unde positio  $\cos \theta = 0$  tempus quaesitum declarabit. Verum idem luculentius determinabimus, si ad quodvis tempus elapsum  $t$  celeritatem radentem  $w$  investigemus. Cum igitur

ex formula  $\beta \xi = \frac{-u f \beta s \cos \theta}{w}$  sit  $w = \frac{-u f \beta s \cos \theta}{\beta \xi}$ , quae expres-

sio, ob  $u \beta s = \frac{e \beta \zeta}{f \cos(\xi - \theta)}$ , abit in  $w = \frac{-e \beta \zeta \cos \theta}{\beta \xi \cos(\xi - \theta)}$ : atque ob  $u =$

$\xi - (\xi - \theta)$  in hanc  $w = -e \beta \zeta (\cos \xi + \text{tang } (\xi - \theta))$ , si his pro  $\text{tang } \xi$  et  $\text{tang } (\xi - \theta)$  valores supra inventos substituamus, reperiemus:

$$w = -(e \cos \zeta + 2 \delta g t + e \beta \zeta \text{tang } (\zeta - \theta) + \frac{2 \delta f f g t}{a a}).$$

At  $\cos \zeta + \beta \zeta \text{tang } (\zeta - \theta) = \frac{\cos \theta}{\cos(\zeta - \theta)}$ , et  $\cos(\zeta - \theta) = \frac{-e \cos \theta}{k}$ ,

unde  $e \cos \zeta + e \beta \zeta \text{tang } (\zeta - \theta) = -k$ , ubi  $k$  denotat celeritatem radentem initialem. Quamobrem elapso tempore  $t$  habebimus celerita-

tem radentem  $w = k - 2 \delta g (t + \frac{\theta}{a a})$ , ita ut ea labente tempore uni-

formiter

504 CAPUT V. DE MOTU GLOBORUM

formiter decreſcat. Tandem ergo certo evaneſcet, idque fiet elapſo

tempore  $t = \frac{aak}{2\delta g(aa+ff)}$ ; eritque tum  $\cos \theta = 0$  et  $\theta = 90^\circ =$

PZO. Quod ergo cum evenerit, videamus quomodo reliquæ motus determinationes ſe ſint habituræ: et quoniam  $2\delta g t = \frac{aak}{aa+ff}$ , erit  $\tan$

$$\phi = \frac{aak\hbar\zeta}{e(aa+ff)+aak\cos\zeta} \text{ et } \tan \xi = \frac{e(aa+ff)\tan\zeta}{e(aa+ff)+aak}. \text{ Hinc fit}$$

$$u\hbar s = \frac{e\hbar\zeta}{f\hbar\xi}. \text{ Cum autem ſit } v = r \left( ee + \frac{2aak\cos\zeta}{aa+ff} + \frac{a^2kk}{(aa+ff)^2} \right); \text{ erit } \hbar\phi = \frac{aak\hbar\zeta}{(aa+ff)v} \text{ et } \cos \phi = \frac{e(aa+ff)\hbar\cos\zeta}{(aa+ff)v};$$

$$\text{atque } \hbar\xi = \frac{e\hbar\zeta}{v}, \text{ ideoque } u\hbar s = \frac{v}{f}. \text{ Porro quia } u \cos s =$$

$$s \cos f, \text{ erit } \tan s = \frac{v}{sf \cos f} \text{ et } s = r \left( \frac{vv}{f} + ss \cos f^2 \right) \text{ ſeu } s =$$

$$\frac{r(eeff+2eaa\hbar f\hbar\hbar\hbar+aa^2\hbar f^2+ss(aa+ff)^2 \cos f^2)}{aa+ff}$$

$$\text{ob } kk = ee - 2e\hbar f\hbar\hbar\hbar + ss\hbar f\hbar^2.$$

COROLL. 1.

1056. Quod major ergo initio fuerit celeritas radens  $k$ , eo diutius motus durat, antequam ceſſante friſtione ad uniformitatem redigatur. Ac ſi globus conſiſt ex materia homogenea, ſit  $aa = \frac{2}{3}ff$ , ideoque motus uniformitas incipit elapſo tempore  $t = \frac{k}{2\delta g}$  min. ſec. hinc in

hypotheſi  $\delta = \frac{1}{3}$  ſit  $t = \frac{3k}{7g}$ , exiſtente  $g = 15\frac{1}{2}$  ped. Rhen.

COROLL. 2.

1057. Ut centrum globi eodem tempore ad quietem redigatur, ſtatus initialis ita comparatus eſſe debet, ut ſit  $\cos \xi = -1$  et  $e = \frac{aak}{aa+ff}$ . Fit ergo  $k = e - e\hbar f\hbar\hbar\hbar$ , et  $\hbar\hbar = 1$ ; ſen  $\hbar = 90^\circ$ ; et  $k = e - e\hbar f\hbar$ ; hincque

hincque  $\frac{ef}{aa} = \frac{-ef}{aa}$ . Porro ob  $v = a$  fit  $s = 0$ ; et  $u = a \cos f$ , quae celeritate angulari jam globus circa axem verticalem quiescentem gyra-  
bitur: elapso ab initio tempore  $t = \frac{a}{2dg}$  min. sec.

COROLL. 3.

1058. Hoc autem casu, quo initio est  $\eta = 90^\circ$ , et  $\epsilon = \frac{-ef}{aa \sin f}$  fit  $\zeta = 180$ ;  $\phi = 0$ ;  $\xi = 180$ ;  $\theta = 90^\circ$ ;  $v = \epsilon - 2dgt$ ; tum vero  $u \cos f = \frac{-ef \cos f}{aa \sin f}$ ;  $u \sin f = \frac{-ef}{aa} (1 - \frac{2dgt}{\epsilon})$ , hincque  $\tan f = (1 - \frac{2dgt}{\epsilon}) \tan f$  et  $u = \frac{-ef}{aa \sin f} (1 - \frac{4dgt}{\epsilon} \sin^2 f + \frac{4d^2 g^2 t^2}{\epsilon^2} \sin^2 f)$ . At initio erat celeritas radens  $k = \epsilon (1 + \frac{ff}{aa})$ , elapso autem tempore  $t$  ea est  $w = (1 + \frac{ff}{aa}) (\epsilon - 2dgt)$ , sicque posito  $t = \frac{a}{2dg}$  simul fit  $w = 0$ ,  $v = 0$  et  $s = 0$ , ut ante.

COROLL. 4.

1059. Ne valor  $u \sin f = \frac{ef \zeta}{f \cos(\zeta - \theta)}$  indefinitus videatur, quod fit si numerator ac denominator evanescant, seu  $\zeta = 0$ , conveniet loco  $\sin \zeta$  et  $\cos(\zeta - \theta)$  valores ex superioribus substitui, atque hinc reperietur:

$$u \sin f = r (u \sin^2 f - \frac{4defgt \sin f (ef \sin f - e \sin \theta)}{aak} + \frac{4d^2 ffggtt}{a^2})$$

unde ob  $u \cos f = a \cos f$  prodit:

$$uu = u - \frac{4defgt \sin f (ef \sin f - e \sin \theta)}{aak} + \frac{4d^2 ffggtt}{a^2}$$

COROLL. 5.

1060. Cum sit vis viva globi  $= M(vv + aa uu)$ , erat ea initio  $= M(vv + aa uu)$ , elapso autem tempore  $t$  ea erit  $=$

Sss

M



$$M(cc + aa - 4dgt + 4(1 + \frac{ff}{aa}) \frac{aak}{aa})$$

At elapso tempore  $t = \frac{aak}{2dg(aa+ff)}$ , vis viva fiet =

$$M(ccff + 2ccaf\sqrt{fh} + ccaa(aa+ff\cos^2))$$

cujus defectus ab initiali est =

$$\frac{Maa(cc - 2cf\sqrt{fh} + cffh^2)}{aa+ff} = \frac{Maakk}{aa+ff}$$

ita ut ista vis viva sit =  $M(cc + aa - \frac{aakk}{aa+ff})$ .

SCHOLION.

1061. Ex his ergo formulis totus motus globi assignari potest, quicunque motus ei initio fuerit impressus: interim tamen hae formulae non parum sunt complexae, unde ad clariorem explicationem haud abs re erit, casus quosdam magis notabiles evolvi. Cujusmodi sunt, uti jam supra innuimus, duo potissimum, alter quo arcus ZO initio erat quadrans, alter vero quo angulus DZO =  $h$  erat rectus: utrumque igitur seorsim explicemus.

PROBLEMA. 20.

1062. Si globo, in qua omnia momenta inertiae sunt aequalia, initio motus gyriorius circa axem horizontalem fuerit impressus praeter motum progressivum, definire continuationem motus.

SOLUTIO.

Fig. 139. Cum initio axis gyrationis fuerit horizontalis, erit  $f = ZO = 90^\circ$ . Denotante ergo  $e$  celeritatem progressivam secundum directionem DIE, et  $c$  celeritatem angularem circa axem IO in sensum ZETD, sit pro puncto O angulus DZO =  $h$ : manente  $f$  = radio globi et  $Maa$  = momento inertiae. Ex his erat initio celeritas cadens  $k = r(cc - 2cf\sqrt{fh} + cff)$  et pro ejus directione IQ angulus DZQ =  $\zeta$  ut sit  $k\zeta$

Fig. 140. =  $\frac{-cf\cos h}{k}$  et  $\cos \zeta = \frac{cf\sqrt{fh} - e}{k}$ . His pro statu initiali constitutis

elapso tempore  $t$  centrum globi descripsit viam GI, ut jam sit in I ubi ejus celeritas secundum IK erit =  $v = r(cc + \frac{4dgt(affh - e)}{k} +$

4ddgg ii): unde positis coordinatis GX = X et XI = Y ob tang EIR  

$$= \text{tang } \varphi = \frac{-2\delta f g t \cos h}{ek + 2\delta g t (f f h - e)} \text{ erit } dX = edt + \frac{2\delta g t dt}{k}$$

(f f h - e) et dY = 
$$\frac{-2\delta f g t dt \cos h}{k}$$
, ideoque GX = X = et +

$$\frac{\delta g t t}{k} (f f h - e) \text{ et XI = Y = } \frac{-\delta f g t t}{k} \cos h. \text{ Tum vero pro motu Fig. 139.}$$

gyratorio, qui jam fiat in sensum ZETD celeritate angulari =  $\omega$  circa  
 polum O existente ZO =  $r$ , PZO =  $\theta$ , et DZQ =  $\varphi + \xi$ , ubi IQ re-  
 fert directionem celeritatis radentis, quia constanter est  $\varphi + \xi = \zeta$ ,

seu directio IQ constans, erit tang  $\xi = \frac{-f \cos h}{ef f h - ee + 2\delta g k t}$ , et

$$\text{tang } (\xi - \theta) = \frac{ef - ef h}{e \cos h} - \frac{2\delta f g k t}{e e a a \cos h}$$
, unde ambo anguli  $\xi$  et  $\theta$

definiuntur. Vel erit tang  $(\varphi + \theta) = \frac{e a a k f h + 2\delta f g t (e - f f h)}{e a a k \cos h - 2\delta f f g t \cos h}$ .

Celeritas autem radens secundum directionem IQ est  $v = k - 2\delta g (1 + \frac{ff}{aa}) t$ . Tum vero ob  $\omega \cos r = 0$ , erit arcus ZO =  $r$  quadrans, et

$$\omega = r \left( \omega - \frac{4\delta f g t (ef - ef h)}{a a k} + \frac{4\delta \delta f f g g t t}{a^4} \right).$$

Hic motus inaequabilis autem tantum durabit per tempus  $t = \frac{a a k}{2\delta g (a a + ff)}$ , quo elapso est tang  $\varphi = \frac{-e a a f \cos h}{e (a a + ff) + a a (f f h - e)}$

$$= \frac{-e a a \cos h}{ef + e a a f h} = r \left( \omega + \frac{2 a a e (f f h - e)}{a a + ff} + \frac{a^4 k k}{(a a + ff)^2} \right),$$

$$= 90^\circ$$
, et  $\omega = \frac{v}{f} = \frac{r (e e f f + 2 e a a f f h + e a^4)}{a a + ff}$ , substituto pro

$kk$  valore. Tum autem sit angulus  $\theta = 90^\circ$ , et  $\sin \xi = \frac{ef \zeta}{v}$ .

COROLL. 1.

1062. Si initio fuerit angulus DZO =  $f = 0$ , erit  $k = r (\omega + \omega f)$   
 S s s 2 pro

pro angulo  $DZQ = \zeta$  fit  $\sin \zeta = \frac{-ef}{k}$ ;  $\cos \zeta = \frac{-e}{k}$ ; tum post tempus  
 $s$  prodit  $v = r \left( ee - \frac{4deegt}{k} + 4ddggst \right)$ ;  $\tan \Phi = \frac{-2defgt}{e(k-2dgt)}$ ;  
 $X = et \left( 1 - \frac{dgt}{k} \right)$ ,  $Y = \frac{-defgt}{k}$ . Porro  $\tan \xi = \frac{ef}{ee-2dgt}$ ;  
 $\tan (\xi - \theta) = \frac{ef}{e} - \frac{2dfekt}{eaa} \tan (\Phi + \theta) = \frac{2dfgt}{eak-2dffgt}$ ;  
 $s = r \left( ee - \frac{4dffgt}{eak} + \frac{4ddffggt}{a^2} \right)$  et  $w = k - 2dg \left( 1 + \frac{ff}{aa} \right)$ ;  
 Elapso autem tempore  $s = \frac{aak}{2dg(aa+ff)}$  erit  $\tan \Phi = \frac{-eaa}{ef}$ ;  $v =$   
 $\frac{fr(eeff+eaa^2)}{aa+ff} = fs$ ;  $\theta = 90^\circ$  et  $\tan \xi = \frac{ef(aa+ff)}{ee(aa+ff)-eakk}$   
 $= \frac{ef(aa+ff)}{f(ee-eaa^2)}$ .

## COROLL. 2.

1064. Si angulus  $DZO = f$  esset  $= 180^\circ$ , eadem formulae motum indicabunt, sumta celeritate angulari  $s$  negativa seu motu gyatorio in contrarium verso. At si fit  $s = 0$ , seu globo solus motus progressivus fuerit impressus, fit  $k = e$ ,  $\zeta = 180^\circ$ ,  $v = e - 2dgt$ ;  $\Phi = 0$ ,  
 $X = s(e - dgt)$ ,  $Y = 0$ ;  $\xi = 180^\circ$ ;  $\theta = 90^\circ$ ,  $s = \frac{2dfgt}{aa}$ ; et elap-

so tempore  $s = \frac{aae}{2dg(aa+ff)}$ , fit  $v = \frac{eff}{aa+ff}$ ,  $w = \frac{ef}{aa+ff}$  et  $X =$   
 $\frac{st(aa+2ff)}{2(aa+ff)} = \frac{aaee(aa+2ff)}{4dg(aa+ff)^2}$ .

## SCHOLIUM

1065. Casus hic, quo globus initio nullum motum gyatorium est adeptus, in genere valet, neque ad ullam hypothesin angularum  $f$  et  $\theta$  est adstrictus. Tum igitur globus in directum progreditur motu progressivo

gressivo retardato, motumque paulatim gyratorium accipiet, donec elapso tempore  $t = \frac{a a s}{2 \delta g (a a + f f)}$  motum uniformem acquirat, quo

deinceps continuo progrediatur. Hinc deducimur ad casum, quo globus initio motum tantum gyratorium acceperit sine ullo motu progressivo, cujus evolutio est facilis. Posito enim  $e = 0$ , erit  $k = s f f$ , hincque fit  $\delta \zeta = -\cos \theta$  et  $\cos \zeta = f \theta$ , ergo  $\zeta = \theta - 90^\circ$ ; ubi pro axe gyrationis initio impressae IO est ZO = f et DZO =  $\theta$ , existente celeritate angulari in sensum ZETD = s. Elapso ergo tempore t fit  $\Phi = \zeta$ , scilicet sublato ab angulo DZO =  $\theta$  angulo recto PZO, erit PI directio motus progressivi, quem globus acquireret, cujus celeritas erit  $v = 2 \delta g t$ , ideoque tempori proportionalis. Tum vero erit  $\tan \xi = 0$  et  $\tan (\xi - \theta) = \infty$ , ergo ob  $\Phi + \xi = \zeta = \theta - 90^\circ$ , erit  $\xi = 0$ , et  $\theta = 90^\circ$ , hinc DZO =  $\zeta + 90 = \theta$ , ita ut polus gyrationis O in eodem perpetuo circulo verticali reperiatur. Denique ex §. 1059. est  $s f s$

$$= r (u f f^2 - \frac{4 \delta s f g t f f}{a a} + \frac{4 \delta \delta f f g g t t}{a^2}) = s f f - \frac{2 \delta f g t}{a a} \text{ et } s$$

$\cos s = s \cos f$ , unde fit  $\tan s = \tan f - \frac{2 \delta f g t}{s a a \cos f}$ , ita ut arcus ZO di-

minuatur, nisi fuerit quadrans vel eo major, et  $s = r (u - \frac{4 \delta f g t f f}{a a} + \frac{4 \delta \delta f f g g t t}{a^2})$ . Motus autem ad uniformitatem reducetur elapso

tempore  $t = \frac{s a a f f f}{2 \delta g (a a + f f)}$ ; fitque tum  $s = \frac{r (a^2 f f^2 + (a a + f f)^2 \cos^2 f)}{a a + f f}$ ,

$v = \frac{s a a f f f}{a a + f f}$  et  $\tan s = \frac{a a \tan f}{a a + f f}$ . Si ergo fuisset  $f = 0$ , seu glo-

bo motus gyratorius circa axem verticalem impressus esset sine ullo motu progressivo, eundem motum sine ulla mutatione esset conservaturus.

# P. R O B L E M A. 21.

1066. Si globo, in quo omnia momenta inertiae sunt aequalia, motus gyratorius fuerit impressus circa axem ad motus progressivi directionem normalem; definire continuationem motus.

S s 3

SO.

## S O L U T I O.

Fig. 139.

Cum motus progressivi initio impressi directio sit recta DIE, et celeritas =  $e$ , angulus DZO =  $\frac{1}{2}$  est rectus, et sumto ZO =  $f$  erat O polus circa quem initio globus accepit celeritatem angularem =  $e$  in sensum ZETD. Habemus ergo  $k = \frac{1}{2}(e - sf/f)$  ubi valorem positivum pro  $k$  sumi oportet: ita ut hic prodeant duo casus seorsum tractandi.

Casus I. Sit  $e > sf/f$ , erit  $k = e - sf/f$ , quae est celeritas radens initio, ejusque directio IQ, ut sit  $f DQ = 0$  et  $\cos DQ = -1$  ideoque  $DQ = \zeta = 180^\circ$ , et Q cadat in E: globusque a frictione  $\delta M$  secundum ID constanter retrahatur: unde statim colligitur globi centrum I in eadem recta DE esse incessurum. Elapso tempore  $t$  ergo ob  $\cos \zeta = -1$  sit celeritas centri  $v = e - 2\delta g t$ , et celeritas radens  $w = e - sf/f - 2\delta g (1 + \frac{ff}{aa})t$ : tum vero  $\phi = 0$  et  $\zeta = 180^\circ$ , atque  $\theta = 90^\circ$ . Qua-

re pro axe gyrationis praesente IO, est DIO =  $90^\circ$ , et posito arcu ZO =  $s$  et celeritate angulari =  $u$  habemus  $u \cos s = e \cos f$  et ex §.

$$1059. u \cos s = e \cos f + \frac{2\delta f g t}{aa}, \text{ unde colligitur } \tan s = \tan f +$$

$$\frac{2\delta f g t}{aa \cos f}, \text{ et } u = r \left( u + \frac{4\delta f g t f}{aa} + \frac{4\delta \delta f f g g t t}{a^2} \right). \text{ Hocque}$$

$$\text{tempore } t \text{ percurrit centrum I lineam rectam } GX = X = t(e - \delta g t).$$

$$\text{Hic autem motus inaequalis durabit per tempus } t = \frac{aa(e - sf/f)}{2\delta g(aa + ff)}$$

$$\text{quo elapso erit spatium } X = \frac{aa(e - sf/f)(e(aa + 2ff) + 1aa f f)}{2\delta g(aa + ff)^2},$$

$$\text{et celeritas } v = \frac{f(e f + 1aa f f)}{aa + ff}. \text{ At pro motu gyatorio } \tan s = \tan$$

$$ZO = \tan f + \frac{f(e - sf/f)}{s(aa + ff)\cos f} = \frac{ef + 1aa f f}{s(aa + ff)\cos f}, \text{ existente perpetuo}$$

$$\text{DIO} = 90^\circ \text{ et celeritas angularis}$$

$$u = \frac{r(e \cos f + 2e a a f f + 1e a^2 f f^2 + 1e(aa + ff)^2 \cos f^2)}{aa + ff}$$

Casus II. Sit  $e < sf/f$  seu  $k = sf/f - e$ , quae est celeritas radens initio, ejusque directio IQ talis ut sit  $f DQ = 0$  et  $\cos DQ = 1$ , ergo

ergo  $DQ = \zeta = a$ , et  $Q$  in  $D$  cadat. Globus ergo a frictione  $dM$  secundum directionem  $IE$  constanter acceleratur, ejusque centrum  $I$  in eadem recta  $IE$  progreditur: atque elapso tempore  $t$  erit ejus celeritas

$$v = e + 2\delta g t, \text{ et celeritas radens } w = e f h f - e - 2\delta g \left(1 + \frac{ff}{aa}\right)$$

2. Tum vero fit  $\phi = 0$  et  $\xi = 0$ , atque  $\theta = 90^\circ$ . Quare pro axe gyrationis praesente  $IO$  est  $DIO = 90^\circ$ , et posito arcu  $ZO = s$  et celeritate angulari  $= \alpha$  habemus  $\alpha \cos s = e \cos f$  et  $\alpha s = e f h f - \frac{2\delta f g t}{aa}$

$$\text{unde fit } \tan s = \tan f - \frac{2\delta f g t}{e a a \cos f} \text{ et } \alpha = r \left( e - \frac{4\delta f g t h f}{a a} + \frac{4\delta\delta f f g g t t}{a a} \right)$$

hocque tempore  $t$  centrum globi percurrit lineam rectam  $GX = X = t(e + \delta g t)$ . Hic autem motus inaequabilis durabit tantum tempore  $t = \frac{a a (e f h f - e)}{2\delta g (a a + f f)}$ , quo elapso erit celeritas  $v = \frac{f(e f - e a f h f)}{a a + f f}$

$$\text{et spatium } X = \frac{a a (e f h f - e) (e (a a + 2 f f) + e a a f h f)}{2\delta g (a a + f f)^2} \text{ At pro motu gyrationis reperitur } \tan s = \tan ZO = \frac{e f + e a a f h f}{e (a a + f f) \cos f}$$

existente perpetuo  $DIO = 90^\circ$ , et celeritas angularis

$$\alpha = \frac{r(e e f + 2 e a a f h f + e a a^2 h f^2 + e e (a a + f f)^2 \cos^2 f)}{(a a + f f)}$$

COROLL. 1.

1067. Si fuerit  $e = e f h f$ , globus statim ab initio motum prosequetur uniformem, tam progressivum quam gyrationis, qui casus limitem constituit inter binos tractatos.

COROLL. 2.

1068. Ad priorem casum quo  $e > e f h f$  referendū sunt ii, quibus  $e$  habet valorem negativum, seu globo impressus fuerit initio motus gyrationis in sensum  $ZDTE$ . Posito autem  $-e$  loco  $e$ , fieri potest, ut globus

globus revertatur, antequam ad uniformitatem pervenerit: scilicet si fuerit  $s > \frac{ef}{aa\dot{f}\dot{f}}$ .

## COROLL. 3.

1069. Casu hoc, quo  $s$  negative capitur, habebimus ad tempus  $t$ :  $\phi = 0$ ,  $\theta = 0$ ,  $\xi = 180$ ,  $v = e - 2\dot{g}t$ ;  $w = e + f\dot{f}\dot{f} - 2\dot{g}(1 + \frac{ff}{aa})t$ ;  $\tan s = \tan f - \frac{2\dot{g}fgt}{aa\cos f}$ ; et  $u = r(u - \frac{4\dot{g}f\dot{g}t\dot{f}\dot{f}}{aa} + \frac{4\dot{d}\dot{d}ff\dot{g}gt}{aa})$ . At post tempus  $t = \frac{aa(e + f\dot{f}\dot{f})}{2\dot{g}(aa + f)}$  percurso spatio  $X = \frac{aa(e + f\dot{f}\dot{f})(e(aa + 2f) - aa\dot{f}\dot{f})}{2\dot{g}(aa + f)^2}$ , uniformitatem attinget, eritque tum  $v = \frac{f(e\dot{f} - aa\dot{f}\dot{f})}{aa + f}$ ;  $\tan s = \frac{aa\dot{f}\dot{f} - e\dot{f}}{aa + f}$  et  $u = \frac{r(e\dot{e}\dot{f} - 2\dot{e}aa\dot{f}\dot{f} + aa^2\dot{f}\dot{f}^2 + (aa + f)^2\cos f^2)}{aa + f}$ .

## SCHOLION.

1070. Casus hic praecipue est memorabilis, quo globo ejusmodi motus imprimi potest, ut primo recedat, mox autem iterum revertatur, quod experimento ostendi solet, dum digito ad globum circa D applicato et deorsum presso duplex motus globo imprimitur, alter progressivus in directione DIE, alter gyratorius in sensum ZDTE. Sed ut phaenomenon succedat, necesse est, ut celeritas angularis prae progressiva certum quendam limitem excedat; quem quo facilius agnoscamus, calculum ad istum casum accommodemus, quo motus gyratorius globi circa axem horizontalem et ad directionem motus progressivi normalem imprimitur. Quod si ergo  $s$  denotet celeritatem progressivam secundum directionem DIE, et  $s$  celeritatem angularem retro gyrantem in sensum ZDTE, existente  $f$  radio globi et  $Maa$  ejus momento inertiae, frictioneque  $= \dot{M}$ ; primo globus in directione DIE procedet, et elapso tempore  $t$  ejus celeritas secundum eandem directionem erit  $v = e - 2\dot{g}t$ , confecto spatio  $X = t(e - \dot{g}t)$ ; tum vero etiamnum circa eundem axem retro volvetur celeritate angulari  $u = s - \frac{2\dot{d}f\dot{g}t}{aa}$ .

Motus

# CENTRUM INERTIAE IN IPSORUM &c. 513

Motus autem aequabilis evadit elapso tempore  $t = \frac{aa(e+ef)}{2\delta g(aa+ff)}$ , eritque  
tum celeritas progressiva  $v = \frac{f(ef-eha)}{aa+ff}$ ; et angularis  $\omega = \frac{eaa-ef}{aa+ff}$ .

Quare si fuerit  $e > \frac{ef}{aa}$ , globus nunc retro movetur, gyratorio adhuc  
retro vergente: sin autem fuerit  $e < \frac{ef}{aa}$ , globus adhuc procedit, et  
gyratio in sensum contrarium est versa. Illo casu globus regredi coo-  
pit elapso tempore  $t = \frac{e}{2\delta g}$  et percurso spatio  $X = \frac{ee}{4\delta g}$ .

Si globus sit homogeneus, erit  $aa = \frac{2}{3}ff$ , et  $ef$  exprimit celerita-  
tem gyrationis in puncto contactus, quae si vocetur  $b$ , erit post  
tempus  $t$  celeritas progressiva  $v = e - 2\delta gt$ , et gyratoria in puncto con-  
tactus, quae sit  $u = b - \delta gt$ , et spatium percursum  $= t(e - \delta gt)$ : mo-  
tus vero aequabilis evadet elapso tempore  $t = \frac{e+b}{7\delta g}$ , et confecto spa-  
tio  $= \frac{(6e-b)(e+b)}{49\delta g}$ : ubi erit  $v = \frac{5e-2b}{7}$ , et  $u = \frac{2b-5e}{7}$ .

Ut ergo phaenomenum memoratum succedat, debet esse initio  $b > \frac{1}{2}e$ .  
Sin autem esset  $b = \frac{1}{2}e$  uterque motus simul extingueretur elapso tem-  
pore  $= \frac{e}{2\delta g}$  min. sec. et confecto spatio  $= \frac{ee}{4\delta g}$ .





# SUPPLEMENTUM

ad Problema 80. §. 761. de motu quocunque libero  
corporis solidi a nullis viribus sollicitati.

Posito  $x = u \cos \alpha$ ;  $y = u \cos \epsilon$ ; et  $z = u \cos \gamma$ , aequationes resolvendae erunt novem sequentes:

$$\text{I. } dx = \frac{bb - cc}{aa} yz dt; \text{ II. } dy = \frac{cc - aa}{bb} xz dt; \text{ III. } dz = \frac{aa - bb}{cc} xy dt$$

$$\text{IV. } dl \text{ si } l = dt (y \cos n - z \cos m); \text{ VII. } d\lambda \text{ si } l^2 = -dt (y \cos m + z \cos n)$$

$$\text{V. } dm \text{ si } m = dt (z \cos l - x \cos n); \text{ VIII. } d\mu \text{ si } m^2 = -dt (z \cos n + x \cos l)$$

$$\text{VI. } dn \text{ si } n = dt (x \cos m - y \cos l); \text{ IX. } dv \text{ si } n^2 = -dt (x \cos l + y \cos m)$$

unde novem quantitates  $x, y, z, l, m, n, u, \lambda, \mu, v$  definiiri oportet. Trium priorum quidem solutio jam in antecedentibus problematibus est tradita; ad usum autem sequentium statuatur

$$\frac{bb - cc}{aa} = A; \frac{cc - aa}{bb} = B; \frac{aa - bb}{cc} = C \text{ et } xyz dt = du$$

$$\text{eritque } x dx = A du; y dy = B du; z dz = C du$$

unde integrando elicitur:

$$xx = 2Au + A; yy = 2Bu + B; zz = 2Cu + C$$

$$\text{ideoque } dt = \frac{du}{\sqrt{(2Au + A)(2Bu + B)(2Cu + C)}}$$

Ratione autem quantitatum  $A, B, C$  eae ita inter se sunt comparatae, ut fit:  $Aaa + Bbb + Ccc = 0$  et  $Aa^2 + Bb^2 + Cc^2 = 0$ ; Quare fiet  $aaxx + bbyy + cczz = Aaa + Bbb + Ccc =$  quantitati constanti. Restitutis autem pro  $x, y, z$  valoribus assumtis fit

$$aaxx + bbyy + cczz = uu (aa \cos \alpha^2 + bb \cos \epsilon^2 + cc \cos \gamma^2) = \text{Const.}$$

At posita massa corporis =  $M$  expressio  $M(aa \cos \alpha^2 + bb \cos \epsilon^2 + cc \cos \gamma^2)$  denotat momentum inertiae corporis respectu axis  $IO$ ; circa quem corpus nunc gyatur, quod momentum ergo si dicatur =  $Mrr$ , erit  $Mrr$  vis viva corporis, quae ergo manet constans.

Deinde cum sit  $\cos \alpha^2 + \cos \epsilon^2 + \cos \gamma^2 = 1$  erit

$$u = \sqrt{(xx + yy + zz)} = \sqrt{(2(A + B + C)u + A + B + C)}$$

et ex cognitis  $x, y, z$  per  $u$ , etiam anguli  $\alpha, \epsilon, \gamma$ , per  $u$  definiuntur.

Atque hucusque quidem in problematibus antecedentibus pertingere licuit;

cuius; nunc igitur videamus, quomodo solutio propriis probl. 30. expediri queat. Omnem autem difficultatem in aequationibus IV, V, VI sitam esse potest, ad quam superandam, statuerimus

$\cos l = px$ ,  $\cos m = qy$ , et  $\cos n = rz$ ,  
ut prodeant hae aequationes:

$$\text{IV. } 0 = p dx + x dp + dz (ryz - qyz) \text{ at est } yz dz = \frac{dx}{A}$$

$$\text{V. } 0 = q dy + y dq + dz (pxz - rxz) \quad xz dz = \frac{dy}{B}$$

$$\text{VI. } 0 = r dz + z dr + dz (qxy - pxy) \quad xy dz = \frac{dz}{C}$$

unde hae aequationes in sequentes formas mutantur

$$\text{IV. } 0 = p dx + x dp + \frac{(r-q) dx}{A}; \text{ seu } \frac{dx}{x} = \frac{A dp}{q-r-Ap} = \frac{A du}{2Au+A}$$

$$\text{V. } 0 = q dy + y dq + \frac{(p-r) dy}{B}; \text{ seu } \frac{dy}{y} = \frac{A dp}{r-q-Bq} = \frac{B du}{2Bu+B}$$

$$\text{VI. } 0 = r dz + z dr + \frac{(q-p) dz}{C}; \text{ seu } \frac{dz}{z} = \frac{C dr}{p-q-Cr} = \frac{C du}{2Cu+C}$$

Multiplicetur IV, per  $aax$ ; V, per  $bby$  et VI per  $ccz$ , ut habeatur

$$\text{IV. } aapx dx + aaxx dp = a^2 \frac{(q-r) x dx}{A} = a^2 (q-r) du$$

$$\text{V. } bbqy dy + bbyy dq = \frac{bb(r-p) y dy}{B} = bb(r-p) du$$

$$\text{VI. } ccrz dz + cczz dr = \frac{cc(p-q) z dz}{C} = cc(p-q) du$$

Ex terris autem primis colligantur

$$\text{I. } aapx dx = Aaapx du = (bb - cc) p du$$

$$\text{II. } bbqy dy = Bbbqy du = (cc - aa) q du$$

$$\text{III. } ccrz dz = Cccrz du = (aa - bb) r du$$

Ttt 2

Hic

His sex aequationibus in unam summam coniectis, partes posteriores se mutuo destruiunt, proditque aequatio integrabilis:

$$2apx dx + aax dp + abbq dy + bby dq + 2crr dz + ccz dr = 0$$

cujus integrale est

$$aapxx + bbqyy + ccrzz = \text{Const.}$$

in quo maxima vis inest ad integrationem desideratam absolvendam, si conjugatur cum aequatione  $\cos l^2 + \cos m^2 + \cos n^2 = 1$ , quae abit in  $ppxx + qqyy + rrrz = 1$ . Cum enim  $x, y, z$  dentur per  $u$  ex his duabus aequationibus quantitates  $p$  et  $q$  per  $u$  et  $r$  definiiri poterunt, qui

in aequatione  $\frac{dr}{p-q-Cr} = \frac{du}{2Cu+E}$  substituti perducunt ad aequationem

binas tantum variables  $u$  et  $r$  involventem, ex qua etiam  $r$  per  $u$  determinare licebit.

Primum autem observo, aequationibus nostris satis fieri posse, tribuendo litteris  $p, q$ , et  $r$  valores constantes: ad hoc enim necesse est fiat

$$q-r-Ap=0; r-p-Bq=0; p-q-Cr=0;$$

$$\text{unde fit } p=n(1-B); q=n(1+A) \text{ et } r=n(1+AB)$$

si modo sit  $A+B+C+ABC=0$ , quod autem revera evenit. Erit ergo pro  $A, B, C$  valores assumptos substituendo

$$p = \frac{n(aa+bb-cc)}{bb}; q = \frac{n(aa+bb-cc)}{aa} \text{ et } r = \frac{ncc(aa+bb-cc)}{aabb}$$

$$\text{quare sumto } n = \frac{maabb}{aa+bb-cc}, \text{ colligitur}$$

$$p = maa; q = mbb; \text{ et } r = mcc.$$

ubi coefficientis  $m$  ita debet esse comparatus, ut fiat  $ppxx + qqyy + rrrz = 1$  seu  $mm(a^2(2Au+A) + b^2(2Bu+B) + c^2(2Cu+E)) = 1$ ,

$$\text{quare cum sit } Aa^2 + Bb^2 + Cc^2 = 0, \text{ erit } m = \frac{1}{r(Aa^2 + Bb^2 + Cc^2)}$$

simulque fit

$$aapxx + bbqyy + ccrzz = m(a^2(2Au+A) + b^2(2Bu+B) + c^2(2Cu+E))$$

cujus ergo expressionis valor constans est  $= \frac{1}{r}(Aa^2 + Bb^2 + Cc^2)$ . Observo autem, hanc integrationem non esse pro incompleta habendam, propterea quod vertex sphaerae immobilis  $Z$  pro libitu assumi potest. Eum ergo semper ita accipere licebit, ut quantitates  $p, q, r$  fiant constantes

stantes. Posito itaque brevitatis gratia  $r^2 (Aa^4 + Bb^4 + Cc^4) = n$  omnia per  $u$  sequenti modo definiuntur : ut sit

$$x = r (2Au + A); p = \frac{aa}{n}; \cos l = \frac{aa}{n} r (2Au + A)$$

$$y = r (2Bu + B); q = \frac{bb}{n}; \cos m = \frac{bb}{n} r (2Bu + B)$$

$$z = r (2Cu + C); r = \frac{cc}{n}; \cos n = \frac{cc}{n} r (2Cu + C)$$

Pro ternis postremis aequationibus ob  $dt = \frac{du}{xyz}$  fiet

$$d\lambda = \frac{-ndt(Bbb + Ccc - 2Aaau)}{Bb^4 + Cc^4 - 2Aa^4u},$$

sufficit autem unicum ternorum angulorum  $\lambda, \mu, \nu$  determinasse, cum binii reliqui ex eo per se consent.



## EMENDANDA.

- Pag. 3. lin. 1. loco et leg. est  
 — 4 — 19 — alia — alto  
 — 5 — 18 — nullum — ullum  
 — 5 — 26 — piis — his  
 — 21 — 5 — Deinde cum — Deinde  
 — 22 — 31 —  $2dx dy \cos \eta$  —  $2dx dz \cos \eta$   
 — 27 — 4 —  $r(1 - \cos \phi - \omega)^2$  —  $r(1 - \cos(\phi - \omega))^2$   
 — 27 — 6 — aquae — aque  
 — 28 — 24 —  $dv^2 v d\sigma^2$  —  $dv^2 + v d\sigma^2$   
 — 32 — 7 — incommodo — incommoda  
 — 37 — 18 —  $P\beta$  —  $B\beta$   
 — 41 — 6 —  $\frac{dy}{dt}$  —  $\frac{dy}{dx}$   
 — 53 — 28 — demetiendi — dimetiendi  
 — 56 — 28 —  $\Lambda x$  —  $\Lambda a$   
 — 80 — 30 et 35 —  $Pdy + Qdx$  —  $Pdy - Qdx$   
 — 84 — 27 —  $\frac{f^2 dt}{u}$  —  $\frac{f^2 dt}{x}$   
 — 84 — 28 —  $\frac{u}{P}$  —  $\frac{x}{R}$   
 — 87 — ult —  $\frac{V\hbar u}{V\hbar \omega}$   
 — 90 — 20 —  $2gRdt^1$  —  $2gRdt^2$   
 — 94 — 23 — respectu  $\alpha$  — respectu  $\phi$   
 — 100 — 33 — corpusculum  $\Lambda a$  — corpusculum  $\Lambda a$   
 — 111 — 23 — singularium — singularum  
 — 121 — ult — extrema — externa  
 — 139 — 19 —  $R_s$  et  $S_t$  —  $R_s$  et  $S_s$   
 — 146 — 15 — ipsi — ipsis  
 — 149 — 1 —  $frry dM$  —  $frr dM$   
 — 160 — 7 — ibidem — itidem  
 — 163 — 20 — OF — AF  
 — 167 — 6 — secundam — secundum  
 — 175 — 32 — inertiae — inertiae novimus,  
 — 191 — 4 —  $\zeta 90^\circ$  —  $\zeta = 90^\circ$   
 — 199 — 3 —  $\int r^3 dr d\phi \cos \phi$  —  $\int r^3 dr d\phi \cos \phi$   
 — 201 — 18 — et inte — et in inte —  
 — 223 — 28 — ipsum — ipsi

Pag. 223 lin. 28 *loca* fustineat *leg.* fustineant

— 228 — 18 — viribus, — viribus sollicitatur,

— 235 — ult — + — ±

— 237 — 14 — singulas — singulae

— 246 — ult — ob RR — = F, ob RR

— 249 — 28 — quod — quod pro

— 251 — 17 —  $\frac{bb}{q^2} / \frac{q^2}{q^2}$  —  $\frac{bb}{q^2} \cos \theta^2$

— 253 — 7 —  $\cos \theta$  —  $\cos \delta$

— 256 — 9 refesa — revera

— 256 — 28 — fore, o — fore o'

— 262 — 1 — et vis Oq — et vis Op

— 267 — 16 —  $\frac{aab}{\gamma}$  —  $\frac{aabb}{\gamma}$

— 279 — 4 — pervenit — pervenerit

— 300 — 2 —  $\frac{bbcc}{(bb-cc)(cc-aa)}$  —  $\frac{bbcc}{(bb-aa)(cc-aa)}$

— 304 — 5 —  $\frac{f}{a}$  —  $\frac{f}{a}$

— 306 — 10 —  $m + n - n$  —  $m + n - v$

— 328 — 23 —  $\frac{u}{\cos a}$  —  $u = \frac{u}{\cos a}$

— 347 — 18 — VXVY — ZXVY

— 350 — 5 — IA, IB, IB — IA, IB, IC,

— 353 — 4 — ZE<sup>3</sup> — ZF<sup>3</sup>

— 356 — 2 —  $\frac{Mrs}{ss}$  —  $\frac{Mec}{ss}$

— 369 — 8 —  $\frac{f}{a} \frac{aa}{a}$  —  $\frac{f}{a} \frac{aa}{a}$

— 379 — 20 —  $\frac{adq}{dta}$  —  $\frac{ddq}{dta}$

— 381 — 11 — nevam — novam

— 381 — 11 — finitum — finitum

— 381 — 14 —  $(qz - ry)^2 \frac{Ccc}{ff}$  —  $(qz - ry)^2 = \frac{Ccc}{ff}$

— 383 — 17 —  $ssa^*(p - pp)$  —  $ssa^*(p - p)$

— 383 — 23 —  $+ ssa^*ff(p - )^2$  —  $+ ssa^*ff(p - p)^2$

— 383 — ult —  $\frac{4cccf}{g}$  —  $\frac{4ccf}{g}$

— 384 — 5 —  $\frac{\Pi}{M}$  : —  $\frac{\Pi}{M}$

— 386 — 25 — ap — ap

— 388 — 8 —  $\frac{f}{A}$  —  $\frac{f}{A}$

— 395 — 16 — corpus — corporis

Pag.

Pag. 397 lin. 16 loco  $\text{fi FI}$  leg.  $\text{fi FI}$

--- 399 --- 9 ---  $\text{fiut} \rightarrow \text{fiut}$

--- 408 --- 10 ---  $d\lambda = \lambda =$

--- 409 --- 20 ---  $b(L - cu) \rightarrow b(L - bu)$

--- 411 --- 14 ---  $(aa - cc) \delta \zeta \text{ fi } \cos \zeta \rightarrow (aa - cc) \delta \zeta \text{ fi } \cos \zeta$

--- 413 --- 25 ---  $\delta(1 - bb) \rightarrow \delta(1 - bbu)$

--- 416 --- 5 ---  $\cos n - \cos \eta \rightarrow \cos n - \cos \theta$

--- 418 --- 5 ---  $\text{fi } \cos m \rightarrow \text{fi } \eta \cos m$

--- 421 --- 13 et 14 ---  $cc \cos C \sin \zeta \rightarrow cc \cos b \text{ fi } \zeta$

--- 424 --- 6 ---  $\delta t + \delta \rightarrow \delta t + \delta$

--- 424 --- 8 ---  $\cos \delta t \text{ et } \delta \sin \zeta \rightarrow \cos \delta t \text{ et } \delta \sin \zeta$

--- 424 --- 9 ---  $\frac{\cos \delta t \sin \delta t}{\delta} \rightarrow \frac{\cos \delta t \sin \delta t}{\delta^2}$

--- 435 --- 2 ---  $x \text{ fi } \zeta \rightarrow x \text{ fi } \zeta$

--- 454 --- 2 ---  $\text{frictionis} \rightarrow \text{pressionis}$

--- 462 --- 4 ---  $M(\text{fi} - \delta \cos \delta) \rightarrow M(\text{fi} \zeta - \delta \cos \zeta)$

--- 465 --- 11 ---  $\text{cylindricorum} \rightarrow \text{cylindrorum}$

--- 467 --- 20 ---  $+ \delta E \text{ fi} \rightarrow + \delta E \text{ fi} \zeta$

--- 477 --- 13 ---  $(\cos \varphi - \zeta \text{ fi } \varphi) \rightarrow (\cos \varphi - \delta \text{ fi } \varphi)$

--- 477 --- 16 ---  $\zeta(1 + \delta \delta) \rightarrow \delta(1 + \delta \delta)$

--- 478 --- 11 ---  $(1 - \varphi \varphi_2) \rightarrow (1 - 2\varphi \varphi)$

--- 478 --- 15 ---  $(1 - \zeta \theta) \rightarrow (1 - \delta \theta)$

--- 479 --- 4 ---  $Bb - \varphi \Delta \delta \text{ fi} \rightarrow Bb \varphi - \Delta \delta \text{ fi}$

--- 487 --- 5 ---  $\text{fi } i \text{ fi } m \rightarrow \text{fi } i \text{ fi } m$


--- 491 --- 29 ---  $\delta \rightarrow \mu$

--- 496 --- 21 ---  $\sin(\mu + B) \sin(v + B) \rightarrow \sin(\mu + B) \sin(v + C)$

--- 498 --- 21 ---  $\theta = f \rightarrow \theta = \delta$

--- 503 --- 19 ---  $\text{ob } \mu = \rightarrow \text{ob } \theta =$









Pag. 397 lin. 16 loco *fi FI* leg. *fi FI*

- 399 --- 9 --- *fiut* --- *fiut*  
 --- 408 --- 10 ---  $d\lambda = \lambda =$   
 --- 409 --- 20 ---  $b(L - eu) \dots b(L - bu)$   
 --- 411 --- 14 ---  $(aa - cc) \delta \zeta \text{ fi } \cos \zeta \dots (aa - cc) \delta \zeta \text{ fi } \cos \zeta$   
 --- 413 --- 25 ---  $\delta(1 - bb) \dots \delta(1 - bb)$   
 --- 416 --- 5 ---  $\cos n - \cos \eta \dots \cos n - \cos \theta$   
 --- 418 --- 5 ---  $\tau \text{ fi } \cos m \dots \tau \text{ fi } \eta \cos m$   
 --- 421 --- 13 et 14 ---  $cc \cos \zeta \sin \zeta \dots cc \cos \zeta \text{ fi } \zeta$   
 --- 424 --- 6 ---  $\delta t + b \dots \delta t + b$   
 --- 424 --- 8 ---  $\cos \delta t \text{ et } \delta \sin \zeta \dots \cos \delta t \text{ et } \delta \sin \zeta$   
 --- 424 --- 9 ---  $\frac{s \cos c \sin \delta t}{\delta} \dots \frac{s \cos c \sin \delta t}{\delta^2}$   
 --- 435 --- 2 ---  $x \text{ fi } \zeta \dots x \text{ fi } \zeta$   
 --- 454 --- 2 --- *frictionis* --- *pressionis*  
 --- 462 --- 4 ---  $M(\text{fi} - \delta \cos \delta) \dots M(\text{fi} \zeta - \delta \cos \zeta)$   
 --- 465 --- 11 --- *cylindricorum* --- *cylindrorum*  
 --- 467 --- 20 ---  $+ \delta E h \dots + \delta F \text{ fi } \zeta$   
 --- 477 --- 13 ---  $(\cos \varphi - \zeta \text{ fi } \varphi) \dots (\cos \varphi - \delta \text{ fi } \varphi)$   
 --- 477 --- 16 ---  $-\zeta(1 + \delta \delta) \dots -\delta(1 + \delta \delta)$   
 --- 478 --- 11 ---  $(1 - \varphi \varphi_2) \dots (1 - 2\varphi \varphi)$   
 --- 478 --- 15 ---  $(1 - \zeta \theta) \dots (1 - \delta \theta)$   
 --- 479 --- 4 ---  $Bb - \varphi \Delta \delta f \dots Bb \varphi - \Delta \delta f$   
 --- 487 --- 5 ---  $\text{fi } i \text{ fi } m \dots \text{fi } i \text{ fi } m$   
 --- 491 --- 29 ---  $\delta \dots \alpha$   
 --- 496 --- 21 ---  $\text{fi } n(\mu + B) \text{ fi } n(\nu + B) \dots \text{fi } n(\mu + B) \text{ fi } n(\nu + C)$   
 --- 498 --- 21 ---  $\theta = f \dots \theta = b$   
 --- 503 --- 19 --- *ob*  $\alpha =$  --- *ob*  $\theta =$





















Fig. 48.




Fig. 47.




Fig. 49.




Fig. 51.




Fig. 53.










Fig. 54.
















1  
12

